Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 162 del 14 luglio 2006 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 luglio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

MINISTERO DELLA SALUTE

Etichette di prodotti fitosanitari riclassificati ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, con decreti dirigenziali del Ministero della salute.

ELENCO I

S O M M A R I O

MINISTERO DELLA SALUTE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo alle etichette di prodotti fitosanitari riclassificati ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 con decreti dirigenziali del Ministero della salute. (I Elenco).

Si pubblica il primo elenco di etichette di prodotti fitosanitari riclassificati ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65.

Il presente comunicato raccoglie le etichette, fornite dalle Imprese, dei prodotti fitosanitari riclassificati con decreti dirigenziali i cui allegati sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

La vendita e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in questione, confezionati con le etichette precedentemente autorizzate, è consentito fino al 30 gennaio 2007.

INDICE

PRIMO ELENCO

ZOLFI VENTILATI MANNINO S.p.a

POLTIR - 10

Anticrittogamico in polvere secca

Composizione : 100 gr di prodotto contengono:
Tiram puro g. 10
Coadiuvanti . . . . q. b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO :
Irritante per gli occhi le vie respiratorie e la pelle.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.
Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego –Non gettare i rifiuti nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti atti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

ZOLFI VENTILATI MANNINO spa C.da Corsa Cianciana (AG)
Registrazione n. 8961 del 25/10/96 del Ministero della Salute
Data di scadenza dell'autorizzazione: Come da Decreto del Ministero della Salute

Officina di produzione:
ZOLFI VENTILATI MANNINO Spa - C.da Corsa - Cianciana (AG)
Kg 1 - 5 - 10 - 25 Partita n.

NORME PRECAUZIONALI : Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
TIRAM : sintomi: Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; Occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; Apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto Antabuse: si verica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcol. e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostastica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso e alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. Consultare un centro antiveleni.

CONCENTRAZIONI E DOSI D'IMPIEGO Kg 30 – 40 per ettaro contro: Peronospora e Botrytis della **Vite**, Bolla e Coreneo del **pesco**, Vaiolatura e Botrytis della **fragola**, Sclerotinia e Antrachinosi della **lattuga**, Fusariosi del **garofano**, botrytis del **tulipano**.
METODI D'IMPIEGO: il prodotto deve essere distribuito con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile, partendo da un minimo sino ad ottenere una nube che investa la vegetazione , ricoprendola uniformemente. Profittare delle ore di rugiada per ottenere la massima adesività sule foglie ed una buona solubilizzazione del principio attivo (Tiram)
EPOCA D'APPLICAZIONE: coincide con lo schema tradizionale dei trattamenti antiperonosporici.
COMPATIBILITA': è compatibile con la totalità degli anticrittogamici a polvere secca ad eccezione dei prodotti rameici.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
FITOTOSSICITA': Può essere fitotossico sulle seguenti varietà di pesco: Cardinal, Dixired, Haven. Può essere fitotossico su vegetazione precedentemente trattata con prodotti rameici.
NOCIVITA': il prodotto è nocivo per gli insetti utili , animali domestici, pesci, il bestiame e per le api.

Intervallo di tempo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta del prodotto: 10 giorni

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e negli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n. 65/2003). Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

POLTIR - 45

Anticrittogamico in polvere bagnabile

Composizione : 100 gr di prodotto contengono:
Tiram puro g. 45
Coadiuvanti .... q. b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO :
Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.
Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego –Non gettare i rifiuti nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti atti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

ZOLFI VENTILATI MANNINO spa C.da Corsa Cianciana (AG)

Registrazione n. 8962 del 25/10/1996 del Ministero della Salute
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto del Ministero della Salute.
Officina di produzione:
ZOLFI VENTILATI MANNINO Spa - C.da Corsa - Cianciana (AG)
Kg 1 - 5 - 10 - 25 Partita n.

NORME PRECAUZIONALI : Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
TIRAM : sintomi: Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; Occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; Apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto Antabuse: si verica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcol, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostastica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso e alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. Consultare un centro antiveleni.

CONCENTRAZIONI E DOSI D'IMPIEGO (per ogni 100 litri di acqua) :
DRUPACEE: Bolla e Corineo (trattamenti autunno – invernali) gr. 500 – 600; trattamenti primaverili – estivi gr. 250
POMACEE: Ticchiolatura (sino alla fioritura) gr. 250 – 300
FRAGOLA: Muffa grigia gr 300
GAROFANO;: Fusariosi (solo infezioni esterne) gr. 200 – 400
ORTAGGI E FLOREALI: Septoria, antrcnosi gr. 200 – 300
CONCIA DELLE SEMENTI: Pythium, Rhizoctonia, Phoma, Botrytis, Alternariosi per ogni 100 Kg di seme gr. 300.
I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non utilizzabili, devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
METODI D'IMPIEGO: stemperare in poca acqua la quantità voluta di prodotto sino ad ottenere una poltiglia semidensa ed omogenea, indi aggiungere acqua sino alla concentrazione voluta. Nebulizzare con ugelli a getto sottilissimo evitando il trattamento nelle ore calde.
COMPATIBILITA': non è compatibile con i prodotti rameici e gli oli minerali.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
FITOTOSSICITA': Non impiegare il prodotto sulle varietà di pesco: Cardinal, Dixired, Red Haven e di pero: Abate Fetel, Armella, Butirra Clargeau, Butirra precoce, Morettini, Conference, Contessa di Parigi, Coscia, Curato, Decana del Comizio, gentil bianca, Bentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Trionfo di Vienna, Zecchermanna. Il prodotto può essere fitotossico su vegetazione precedentemente trattata con rame.
NOCIVITA': il prodotto è nocivo per gli insetti utili , animali domestici, pesci, il bestiame e per le api.
Intervallo di tempo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta del prodotto: 10 giorni
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e negli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n. 65/2003). Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

POLVERE TIPO BORDOLESE MANNINO

Anticrittogamico per uso agricolo
Solfato di rame neutralizzato nella calce
Polvere bagnabile per irrorazione pronta all'uso

Composizione : 100 gr di prodotto contengono:

Rame metallo (sotto forma di solfato g 54)		g	13
Coformulanti (neutralizzato con calce)	q. b. a	g	100

NOCIVO PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO : Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico – Proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente - Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Registrazione n. 9945 del 12/02/1999 del Ministero della Salute

Ditta: **ZOLFI VENTILATI MANNINO spa C.da Corsa Cianciana (AG)**
Officina di produzione: ZOLFI VENTILATI MANNINO Spa - C.da Corsa - Cianciana (AG)
Kg 1 -5 - 10 - 25 Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi,. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso, febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Terapia. Gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillammina se la via orale è agibile, oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO : Anticrittogamico per uso agricolo da usare contro la peronospora della vite, della patata, del pomodoro, della cipolla, delle colture floreali, contro l'occhio di pavone dell'olivo la ticchiolatura del pero e del melo, la cercospora della barbabietola, il vaiolo e la gommosi del pesco, dell'albicocco e del ciliegio. Indicato comunque nei trattamenti invernali degli alberi da frutto e consigliabile nei trattamenti dopo la fioritura della vite.
DOSI PER OGNI 100 LITRI DI ACQUA: Kg 1 - 2. Melo e pero nei soli trattamenti al bruno Kg 2 - 3
Si versa il quantitativo nell'acqua, si mescola ed è pronto all'uso.

COMPATIBILITA': Il prodotto è miscibile con gli insetticidi comuni, con gli zolfi bagnabili.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
FITOTOSSICITA': Si sconsigliano le irrorazioni quando la temperatura va al di sotto di 7 °C.
Non si deve trattare durante la fioritura. Sul pesco e varietà di melo (Abbondanze Belford, Black Stayman,Golden, Delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Devis, King Davis, Renetta del canada, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibile, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
NOCIVITA': E' tossico per i pesci.
SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e negli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n. 65/2003). Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

POLVERE TIPO BORDOLESE MANNINO 20% Cu

Anticrittogamico per uso agricolo

Solfato di rame neutralizzato nella calce Polvere bagnabile per irrorazione pronta all'uso

Composizione : 100 gr di prodotto contengono:

Rame metallo (sotto forma di solfato g 83) g

Coformulanti..................... q. b. a g 100

NOCIVO PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO : Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere. nè fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico – Proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente - Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Registrazione n. 10169 del 11/10/1999 del Ministero della Salute
Ditta: **ZOLFI VENTILATI MANNINO spa C.da Corsa Cianciana (AG)**
Officina di produzione: ZOLFI VENTILATI MANNINO Spa - C.da Corsa - Cianciana (AG)
Kg 1 -5 - 10 - 25 Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi,. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso, febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Terapia. Gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillammina se la via orale è agibile, oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO : Anticrittogamico per uso agricolo da usare contro la peronospora della vite, della patata, del pomodoro, della cipolla, delle colture floreali, contro l'occhio di pavone dell'olivo, la ticchiolatura del pero e del melo, la cercospora della barbabietola, il vaiolo e la gommosi del pesco, dell'albicocco e del ciliegio. Indicato comunque nei trattamenti invernali degli alberi da frutto e consigliabile nei trattamenti dopo la fioritura della vite.
DOSI PER OGNI 100 LITRI DI ACQUA: MELO E PERO (Ticchiolatura, Monilia, Cancro pomacee) : nei trattamenti al bruno Kg 2, nei trattamenti al verde non consigliata. PESCO, SUSINO,MANDORLO, CILIEGIO (Bolla, corineo o gommosi, batteriosi, cancri rameali) nei soli trattamenti al bruno Kg 1. OLIVO (occhio di pavone, rogna): nei trattamenti primaverili-estivi Kg 1-1,5. VITE (peronospora): prima della fioritura Kg 0,5, dopo la fioritura Kg 0,8 – 1. ORTAGGI (contro la peronospora di pomodoro e cipolla) Kg 0,6 – 1; patata contro la peronospora Kg 0,7 –1; Barbabietola da zucchero: contro cercospora Kg 0,7 –1.ORNAMENTALI (contro il cancro del cipresso) Kg 1,5 – 2. FLORICOLE: (contro peronospora, antracnosi, ruggini) Kg 0,5 –1.
Si versa il quantitativo nell'acqua già preparata nel serbatoio, si mescola ed è pronta per l'uso.
COMPATIBILITA': Il prodotto è miscibile con gli zolfi bagnabili. Non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
FITOTOSSICITA': Si sconsigliano le irrorazioni sulla vite quando la temperatura va al di sotto di 7°C. Non si deve trattare durante la fioritura. Sul pesco, susino e varietà di melo (Abbondanze Belford, Black Stayman,Golden, Delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Devis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibile, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
NOCIVITA': E' tossico per i pesci.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e negli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n. 65/2003). Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

PULVIRAM 16

Polvere rameica

Composizione : 100 gr di prodotto contengono:

Rame metallo (sotto forma di ossicloruro tetraramico) g 16
Coformulanti. q. b. a g 100

NOCIVO PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO : Nocivo per inalazione e ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente - Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Registrazione n. 8211 del 16/03/1993 del Ministero della Salute

Ditta: **ZOLFI VENTILATI MANNINO spa C.da Corsa Cianciana (AG)**
Officina di produzione: ZOLFI VENTILATI MANNINO Spa - C.da Corsa - Cianciana (AG)
Kg 1 -5 - 10 - 25 Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi,. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso, febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Terapia. Gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillammina se la via orale è agibile, oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro Antiveleni

MODALITA' DOSI D'IMPIEGO : Pulviram 16 è un fungicida da usare contro la peronospora della vite, della patata e del pomodoro, la ticchiolatura delle pomacee, la bolla ed il corineo delle drupacee, l'occhio di pavone dell'ulivo, il mal secco, la gommosi, l'allupatura, la fumaggine degli agrumi.
Pulviram 16 può essere mescolato in qualsiasi proporzione agli zolfi per la preparazione degli zolfi ramati; può essere usato per la disinfezione a secco del grano da seme contro la carie.
Pulviram 16 si stempera in poca acqua fino ad ottenere una poltiglia semifluida. Versare la rimanente acqua fino alla concentrazione desiderata.
Dosi
- Trattamenti liquidi (irrorazioni) Kg 1 in 100 litri di acqua
- Per la ramatura degli zolfi Kg 20 in 80 Kg di zolfo
- Contro la carie del grano (concia secca) g 200 per quintale di seme

COMPATIBILITA': Pulviram 16 non è compatibile con i prodotti a base di maneb.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
FITOTOSSICITA': Non trattare durante la fioritura su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili. Il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo piena ripresa vegetativa.
(*) Meli cuprosensibili: Abbondanza, Belford, Black Stayman, Commercio, Golden Delicious, Graven Stein, Jonathan, Rome Beauty, Morgen Duft, Stayman, Stayman Red, Stayman Wienesap, Black Ben Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana.
(**) Pero cuprosensibile: Abate Fetel, Buona Luigia da Avranches, Butirra Clayergeau, Passacrassana, D.C. William Dottor Julias Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.
NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e negli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n. 65/2003). Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

PULVIRAM 32 % Cu

Anticrittogamico in polvere bagnabile

Composizione : 100 gr di prodotto contengono:

Rame metallo (sotto forma di ossicloruro)		g 32
Coformulanti.	q. b. a	g 100

NOCIVO PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO : Nocivo per inalazione e ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente - Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Registrazione n. 8957 del 25/10/1996 del Ministero della Salute
Data scadenza Registrazione come da Decreto del Ministero della Salute

Ditta: **ZOLFI VENTILATI MANNINO SPA C.da Corsa - Cianciana (AG)**
Officina di produzione: ZOLFI VENTILATI MANNINO SPA - C.da Corsa - Cianciana (AG)
Kg 1 -5 - 10 - 25 Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi,. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso, febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Terapia. Gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillammina se la via orale è agibile, oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO : (per ogni 100 litri di acqua)

- Peronospora della vite g **600**
- Ticchiolatura del pero e del melo, nei trattamenti pre-fioriali g **600**
- Bolla, Corineo, Cancro dei rametti del pesco, nei trattamenti autunno-invernali g **1250**
- Occhio di Pavone dell'olivo g **650**

Cercosporiosi della barbabietola da zucchero **Kg 5 – 6** di prodotto per ettaro di coltura in 500-600 litri di acqua
Sciogliere in poca acqua la quantità voluta di prodotto rimestando sino ad ottenere una pasta semifluida ed omogenea, quindi versare il tutto nella quantità di acqua necessaria al trattamento.
EPOCA DI APPLICAZIONE: Intervenire seguendo criteri preventivi.
COMPATIBILITA': Pulviram 32 non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina e con i preparati a base di olii bianchi, malathion, metilparathion, TMTD.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
FITOTOSSICITA': Non trattare durante la fioritura su pesco e varietà di melo (Abbondanza, Black Stayman, Golden Delicious, Graven Stein, Jonathan, Rome Beauty, Morgen Duft, Stayman, Stayman Red, Stayman Wienesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia da Avranches, Butirra, Clayergeau, Passacrassana, D.C. William, Dottor Julias Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili. Il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo piena ripresa vegetativa. Evitare comunque di trattare nelle ore più calde in periodi con temperature elevate.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, è tossico per i pesci e gli altri organismi acquatici.
AVVERTENZA: Per lavorazioni agricole da effettuare entro il periodo di 24 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e negli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n. 65/2003). Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

PULVIRAM 50% Cu

Anticrittogamico per trattamenti in polvere bagnabile

Composizione : 100 gr di prodotto contengono:

Rame metallo (sotto forma di ossicloruro)		g 50
Tensioattivi e supporto inerte	q. b. a	g 100

NOCIVO PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO : Nocivo per inalazione e ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente - Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Registrazione n. 8958 del 25/10/1996 del Ministero della Salute
Data scadenza Registrazione come da Decreto del Ministero della Salute

Ditta: **ZOLFI VENTILATI MANNINO SPA C.da Corsa - Cianciana (AG)**
Officina di produzione: ZOLFI VENTILATI MANNINO SPA - C.da Corsa - Cianciana (AG)
Kg 1 -5 - 10 - 25 Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi,. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso, febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Terapia. Gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillammina se la via orale è agibile, oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO : (per ogni 100 litri di acqua)
- Peronospora della vite g 400 – 500
- Peronospora e Septoria del pomodoro, peronospora e alternaria della patata, antracnosi del pisello g 500
- Ticchiolatura del pero e del melo, nei trattamenti pre-fioriali g 400 - 500
- Bolla e Corineo del pesco e del mandorlo nei trattamenti autunno-invernali g 800 - 1000
- Occhio del pavone e Lebbra dell'olivo g 500 - 700

Sciogliere in poca acqua la quantità voluta di prodotto rimestando sino ad ottenere una pasta semifluida ed omogenea, quindi versare il tutto nella quantità di acqua necessaria al trattamento.
EPOCA DI APPLICAZIONE: Intervenire seguendo criteri preventivi.
COMPATIBILITA': Pulviram 50 non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina e con i preparati a base di olii bianchi, malathion, metilparathion, TMTD.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
FITOTOSSICITA': Non trattare durante la fioritura su pesco e varietà di melo (Abbondanza, Black Stayman, Golden Delicious, Graven Stein, Jonathan, Rome Beauty, Morgen Duft, Stayman, Stayman Red, Stayman Wienesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia da Avranches, Butirra, Clayergeau, Passacrassana, D.C. William, Dottor Julias Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili. Il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo piena ripresa vegetativa. Evitare comunque di trattare nelle ore più calde in periodi con temperature elevate.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, è tossico per i pesci e gli altri organismi acquatici.
AVVERTENZA: Per lavorazioni agricole da effettuare entro il periodo di 24 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e negli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n. 65/2003). Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

SOLFOTHIRAM 50/10

Anticrittogamico in polvere secca

Composizione : 100 gr di prodotto contengono:
Zolfo puro (esente da Selenio) gr. 50
Tiram puro gr 10
Eccipienti inerti . . . . q. b. a gr 100

NOCIVO PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO :
Irritante per gli occhi le vie respiratorie e la pelle.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.
Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego –Non gettare i rifiuti nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti atti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

ZOLFI VENTILATI MANNINO spa C.da Corsa Cianciana (AG)
Registrazione n. 8960 del 25/10/96 del Ministero della Salute
Data scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto del Ministero della Salute.
Officina di produzione:
ZOLFI VENTILATI MANNINO Spa - C.da Corsa - Cianciana (AG)
Kg 1 - 5 - 10 - 25 Partita n.

NORME PRECAUZIONALI : Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: TIRAM 10 %, ZOLFO (esente da selenio) 50%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
- TIRAM : sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto Antabuse: si verica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcol, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostastica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso e alla perdita di coscienza.
- ZOLFO: ———

Terapia: sintomatica. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CONCENTRAZIONI E DOSI D'IMPIEGO Kg 20 per ettaro
COLTURE E AVVERSITA' : **VITE** : Oidio, Peronospora e Muffa grigia **PESCO**: Contro Oidio e Corineo

METODI D'IMPIEGO: il prodotto deve essere distribuito con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile, partendo da un minimo sino ad ottenere una nube che investa la vegetazione , ricoprendola uniformemente. Profittare delle ore di rugiada per ottenere la massima adesività sulle foglie
EPOCA D'APPLICAZIONE: coincide con lo schema tradizionale dei trattamenti antioidici e antiperonosporici.
COMPATIBILITA': è compatibile con la totalità degli anticrittogamici a polvere secca ad eccezione dei prodotti rameici.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
FITOTOSSICITA': Può essere fitotossico sulle seguenti varietà di pesco: Cardinal, Dixired, Red Haven, e su Vite Sangiovese. Deve essere utilizzato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego di oli minerali e del Captano. "Per lavorazioni agricole da effettuare entro 24 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle"
NOCIVITA': il prodotto è nocivo per gli insetti utili , animali domestici, pesci, il bestiame e per le api.
Intervallo di tempo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta del prodotto: 10 giorni
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e negli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n. 65/2003). Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ZOLFO BAGNABILE MANNINO 60% S

Anticrittogamico idrosospendibile

Composizione : 100 gr di prodotto contengono:

Zolfo puro (esente da Selenio)		gr 60
Inerti, bagnanti, disperdenti	q. b. a	gr 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO : Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Registrazione n. 8966 del 25/10/1996 del Ministero della Salute
Data scadenza registrazione: come da decreto Ministero della Salute

Ditta: ZOLFI VENTILATI MANNINO spa C.da Corsa Cianciana (AG)

Officina di produzione: ZOLFI VENTILATI MANNINO Spa - C.da Corsa - Cianciana (AG)
Kg 1 - 5 - 10 - 25 Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

DOSI D'IMPIEGO (per ogni 100 litri di acqua):
Malattie combattute: **OIDIO (mal bianco) in genere**

- Frutticoltura (agrumi, drupacee, pomacee, fragola, nocciolo, olivo)	**g 350 - 550**
- Viticoltura	**g 300 - 450**

Usare la dose più bassa in caso di temperature elevate.

MODALITA' D'IMPIEGO : Stemperare in poca acqua la quantità voluta di prodotto sino ad ottenere una poltiglia semi densa ed omogenea, indi aggiungere acqua sino alla concentrazione voluta. Nebulizzare con ugelli a getto sottilissimo, evitare il trattamento nelle ore più calde.

EPOCA D'APPLICAZIONE: Secondo lo schema tradizionale dei trattamenti antioidici.

COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con antiparassitari alcalini (Polisolfuro, poltiglia bordolese ecc.), con oli minerali, captano, DDVP e diclofluanide.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
FITOTOSSICITA': Nei periodi con temperature più elevate evitare di applicare il prodotto nelle ore più calde e soleggiate della giornata.
Può arrecare danni alle seguenti cultivar di melo: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap e di pero: Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, Williams, Decana del Comizio.
Vite: Sangiovese
Avvertenza: deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del captano.
SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e negli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D..L.vo n. 65/2003). Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ZOLFO BAGNABILE MANNINO 80% S

Anticrittogamico idrosospendibile

Composizione : 100 gr di prodotto contengono:

Zolfo puro (esente da Selenio)		gr 80
Inerti, bagnanti, disperdenti	q. b. a	gr 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO : Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Registrazione n. 8964 del 25/10/1996 del Ministero della Salute
Data scadenza registrazione: come da decreto Ministero della Salute

Ditta: ZOLFI VENTILATI MANNINO spa C.da Corsa Cianciana (AG)

Officina di produzione: ZOLFI VENTILATI MANNINO Spa - C.da Corsa - Cianciana (AG)
Kg 1 - 5 - 10 - 25 Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

DOSI D'IMPIEGO (per ogni 100 litri di acqua):
Malattie combattute: **OIDIO (mal bianco) in genere**

- Frutticoltura (agrumi, drupacee, pomacee, fragola, nocciolo, olivo)	**g 250 - 450**
- Viticoltura	**g 250 - 350**

Usare la dose più bassa in caso di temperature elevate.

MODALITA' D'IMPIEGO : Stemperare in poca acqua la quantità voluta di prodotto sino ad ottenere una poltiglia semidensa ed omogenea, indi aggiungere acqua sino alla concentrazione voluta. Nebulizzare con ugelli a getto sottilissimo, evitare il trattamento nelle ore calde.

EPOCA D'APPLICAZIONE: Secondo lo schema tradizionale dei trattamenti antioidici.

COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con antiparassitari alcalini (Polisolfuro, poltiglia bordolese ecc.), con oli minerali, captano, DDVP e diclofluanide.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
FITOTOSSICITA': Nei periodi con temperature più elevate evitare di applicare il prodotto nelle ore più calde e soleggiate della giornata.
Può arrecare danni alle seguenti cultivar di melo: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap e di pero: Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, Williams, Decana del Comizio.
Vite: Sangiovese
Avvertenza: deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del captano.
SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e negli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D..L.vo n. 65/2003). Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ZOLFO BAGNABILE MANNINO 90% S

Anticrittogamico idrosospendibile

Composizione : 100 gr di prodotto contengono:

Zolfo puro (esente da Selenio)		gr 90
Inerti, bagnanti, disperdenti	q. b. a	gr 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO : Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Registrazione n. 8965 del 25/10/1996 del Ministero della Salute

Data scadenza registrazione: come da decreto Ministero della Salute

Ditta: ZOLFI VENTILATI MANNINO spa C.da Corsa Cianciana (AG)

Officina di produzione: ZOLFI VENTILATI MANNINO Spa - C.da Corsa - Cianciana (AG)

Kg 1 - 5 - 10 - 25 Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

DOSI D'IMPIEGO (per ogni 100 litri di acqua):

Malattie combattute: **OIDIO (mal bianco) in genere**

- Frutticoltura (agrumi, drupacee, pomacee, fragola, nocciolo, olivo)	**g 250 - 450**
- Viticoltura	**g 250 - 350**

Usare la dose più bassa in caso di temperature elevate.

MODALITA' D'IMPIEGO : Stemperare in poca acqua la quantità voluta di prodotto sino ad ottenere una poltiglia semidensa ed omogenea, indi aggiungere acqua sino alla concentrazione voluta. Nebulizzare con ugelli a getto sottilissimo, evitare il trattamento nelle ore calde.

EPOCA D'APPLICAZIONE: Secondo lo schema tradizionale dei trattamenti antioidici.

COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con antiparassitari alcalini (Polisolfuro, poltiglia bordolese ecc.), con oli minerali, captano, DDVP e diclofluanide.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

FITOTOSSICITA': Nei periodi con temperature più elevate evitare di applicare il prodotto nelle ore più calde e soleggiate della giornata.

Può arrecare danni alle seguenti cultivar di melo: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap e di pero: Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, Williams, Decana del Comizio.

Vite: Sangiovese

Avvertenza: deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del captano.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e negli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D..L.vo n. 65/2003). Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ZOLFO DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 95% S

Anticrittogamico

Composizione : 100 gr di prodotto contengono:

Zolfo puro (esente da Selenio)		gr	95
Inerti	q. b. a	gr	100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO : Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Registrazione n. 7737 del 23/03/1989 del Ministero della Salute

Ditta: ZOLFI VENTILATI MANNINO spa C.da Corsa Cianciana (AG)
Officina di produzione: ZOLFI VENTILATI MANNINO Spa - C.da Corsa - Cianciana (AG)
Kg 5 - 10 - 25 Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

MODALITA' DOSI D'IMPIEGO : Anticrittogamico per uso agricolo da usare contro l'oidio della vite, delle piante da frutto, delle colture orticole e floreali.

Dovrà essere distribuito con impolveratori ad erogazione regolabile facendo in modo da ottenere una nube che investa la vegetazione ricoprendola uniformemente.

DOSI D'IMPIEGO CONTRO L'OIDIO: Kg 25 - 40 per ettaro

COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con la generalità degli anticrittogamici in commercio.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
FITOTOSSICITA': Nei periodi con temperature più elevate evitare di applicare il prodotto nelle ore più calde e soleggiate della giornata.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e negli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D..L.vo n. 65/2003). Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ZOLFO RAMATO 5 % CON BENTONITE

Anticrittogamico - Polvere secca

Composizione : 100 gr di prodotto contengono:

Zolfo puro (esente da Selenio)		g 50
Rame metallo (sotto forma di solfato g 5)		g 1,2
Coadiuvanti	q. b. a	g 100

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO : Irritante per gli occhi le vie respiratorie e la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non disperdere nell'ambiente - Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Registrazione n. 10052 del 31/05/1999 del Ministero della Salute
Data scadenza registrazione come da decreto Ministero della Salute

Ditta: **ZOLFI VENTILATI MANNINO SpA C.da Corsa Cianciana (AG)**
Officina di produzione: ZOLFI VENTILATI MANNINO SpA - C.da Corsa - Cianciana (AG)
Kg 5 - 10 - 25 Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame metallo puro 1,2%, Zolfo 50%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Rame metallo: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi,. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso. Febbre da ingestione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Zolfo: ---
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un centro Antiveleni

Nell'utilizzo del prodotto devono essere indossati indumenti protettivi ed una maschera intera munita di filtro antipolvere P3.
Non rientrare nelle zone trattate prima di tre giorni.

MODALITA' DOSI D'IMPIEGO : Anticrittogamico per uso agricolo da usare contro l'Oidio della vite, con azione coadiuvante nei trattamenti antiperonosporici, contro Botrytis Cinerea, Muffa grigia dell'uva da tavola.
Dovrà essere distribuito con impolveratore meccanico ad erogazione regolabile facendo in modo da ottenere una nube che investa la vegetazione, alle seguenti dosi:
Contro Oidio e Botrytis Kg 20 – 30 per ettaro
Epoca di applicazione: secondo lo schema tradizionale dei trattamenti antioidici e anti Botrytis.

COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con la generalità degli anticrittogamici in commercio.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
FITOTOSSICITA': Nei periodi con temperature più elevate evitare di applicare il prodotto nelle ore più calde e soleggiate della giornata. Non trattare durante la fioritura.
NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e negli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n. 65/2003). Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ZOLFO SCORREVOLE TRIVENTILATO 95% S

Anticrittogamico

Composizione : 100 gr di prodotto contengono:

Zolfo puro (esente da Selenio)		gr 95
Inerti	q. b. a	gr 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO : Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Registrazione n. 7736 del 23/03/1989 del Ministero della Salute

Ditta: ZOLFI VENTILATI MANNINO spa C.da Corsa Cianciana (AG)
Officina di produzione: ZOLFI VENTILATI MANNINO Spa - C.da Corsa - Cianciana (AG)
Kg 5 - 10 - 25 Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO : Anticrittogamico per uso agricolo da usare contro l'oidio della vite, delle piante da frutto, delle colture orticole e floreali.
Dovrà essere distribuito con impolveratori ad erogazione regolabile facendo in modo da ottenere una nube che investa la vegetazione ricoprendola uniformemente.

DOSI D'IMPIEGO CONTRO L'OIDIO: Kg 25 - 40 per ettaro

COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con la generalità degli anticrittogamici in commercio.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
FITOTOSSICITA': Nei periodi con temperature più elevate evitare di applicare il prodotto nelle ore più calde e soleggiate della giornata.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e negli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D..L.vo n. 65/2003). Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ZOLFO VENTILATO RAMATO 3%

Anticrittogamico - Polvere secca

Composizione : 100 gr di prodotto contengono:

Zolfo puro (esente da Selenio)	g	97
Rame metallo (sotto forma di ossicloruro)	g	0,5
Inerti	q. b. a g	100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO : Irritante per gli occhi le vie respiratorie e la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non disperdere nell'ambiente – Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

Registrazione n. 8900 del. 08/07/1996 del Ministero della Salute
Ditta: **ZOLFI VENTILATI MANNINO spa C.da Corsa Cianciana (AG)**
Officina di produzione: ZOLFI VENTILATI MANNINO Spa - C.da Corsa - Cianciana (AG)
Kg 5 - 10 - 25 Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame metallo puro 0.5 %, Zolfo 97%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Rame metallo: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso. Febbre da ingestione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Zolfo: - Terapia : sintomatica
Avvertenza: consultare un centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO : Anticrittogamico per uso agricolo da usare contro l'oidio della vite, con azione coadiuvante nei trattamenti antiperonosporici. Dovrà essere distribuito con impolveratore ad erogazione regolabile per ottenere una nube che investa uniformemente la vegetazione, alle seguenti dosi:
Contro OIDIO Kg 20-25 per ettaro

COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con la generalità degli anticrittogamici in commercio.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

FITOTOSSICITA': Nei periodi con temperature più elevate evitare di applicare il prodotto nelle ore più calde e soleggiate della giornata. Non trattare durante la fioritura.

NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero Salute

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e negli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n. 65/2003). Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ZOLFO VENTILATO RAMATO 5%

Anticrittogamico - Polvere secca

Composizione : 100 gr di prodotto contengono:

Zolfo puro (esente da Selenio)	g	95
Rame metallo (sotto forma di ossicloruro)	g	0,8
Inerti	q. b. a g	100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO : Irritante per gli occhi le vie respiratorie e la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non gettare i residui nelle fognature – Non disperdere nell'ambiente – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

Registrazione n. 8899 del. 08/07/1996 del Ministero della Salute
Ditta: **ZOLFI VENTILATI MANNINO spa C.da Corsa Cianciana (AG)**
Officina di produzione: ZOLFI VENTILATI MANNINO Spa - C.da Corsa - Cianciana (AG)
Kg 5 - 10 - 25 Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame metallo puro 0.8 %, Zolfo 95%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Rame: sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso,. Febbre da ingestione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Zolfo: - Terapia : sintomatica
Avvertenza: consultare un centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO : Anticrittogamico per uso agricolo da usare contro l'oidio della vite, con azione coadiuvante nei trattamenti antiperonosporici. Dovrà essere distribuito con impolveratore ad erogazione regolabile per ottenere una nube che investa uniformemente la vegetazione, alle seguenti dosi:
Contro OIDIO Kg 20-25 per ettaro

COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con la generalità degli anticrittogamici in commercio.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

FITOTOSSICITA': Nei periodi con temperature più elevate evitare di applicare il prodotto nelle ore più calde e soleggiate della giornata. Non si deve trattare durante la fioritura.

NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero Salute

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e negli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n. 65/2003). Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ZOLFO VENTILATO RAMATO 95/0,8

Anticrittogamico - Polvere secca

Composizione : 100 gr di prodotto contengono:

Zolfo puro (esente da Selenio)	g	95
Rame metallo (sotto forma di ossicloruro)	g	0,8
Inerti	q. b. a g	100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO : Irritante per gli occhi le vie respiratorie e la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non gettare i residui nelle fognature –Non disperdere nell'ambiente – Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Registrazione n. 7739 del. 23/03/1989 del Ministero della Salute
Ditta: **ZOLFI VENTILATI MANNINO spa C.da Corsa Cianciana (AG)**
Officina di produzione: ZOLFI VENTILATI MANNINO Spa - C.da Corsa - Cianciana (AG)
Kg 5 - 10 - 25 Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame metallo puro 0.5 %, Zolfo 97%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Rame metallo: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso. Febbre da ingestione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Zolfo: - Terapia : sintomatica
Avvertenza: consultare un centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO : Anticrittogamico per uso agricolo da usare contro l'oidio della vite, con azione coadiuvante nei trattamenti antiperonosporici. Dovrà essere distribuito con impolveratore meccanico ad erogazione regolabile per ottenere una nube che investa uniformemente la vegetazione, alle seguenti dosi:
Contro OIDIO Kg 20-25 per ettaro

COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con la generalità degli anticrittogamici in commercio.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

FITOTOSSICITA': Nei periodi con temperature più elevate evitare di applicare il prodotto nelle ore più calde e soleggiate della giornata. Non si deve trattare durante la fioritura.

NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e negli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n. 65/2003). Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ZOLFO VENTILATO RAMATO 97/0,5

Anticrittogamico - Polvere secca

Composizione : 100 gr di prodotto contengono:

Zolfo puro (esente da Selenio)	g	97
Rame metallo (sotto forma di ossicloruro)	g	0,5
Inerti	q. b. a g	100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO : Irritante per gli occhi le vie respiratorie e la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non gettare i residui nelle fognature –Non disperdere nell'ambiente – Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Registrazione n. 7740 del. 23/03/1989 del Ministero della Salute

Ditta: **ZOLFI VENTILATI MANNINO spa C.da Corsa Cianciana (AG)**

Officina di produzione: ZOLFI VENTILATI MANNINO Spa - C.da Corsa - Cianciana (AG)

Kg 5 - 10 - 25 Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame metallo puro 0.5 %, Zolfo 97%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Rame metallo: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso. Febbre da ingestione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.

Zolfo: - Terapia : sintomatica

Avvertenza: consultare un centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO : Anticrittogamico per uso agricolo da usare contro l'oidio della vite, con azione coadiuvante nei trattamenti antiperonosporici. Dovrà essere distribuito con impolveratore meccanico ad erogazione regolabile per ottenere una nube che investa uniformemente la vegetazione, alle seguenti dosi:

Contro OIDIO Kg 20-25 per ettaro

COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con la generalità degli anticrittogamici in commercio.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

FITOTOSSICITA': Nei periodi con temperature più elevate evitare di applicare il prodotto nelle ore più calde e soleggiate della giornata. Non si deve trattare durante la fioritura.

NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e negli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n. 65/2003). Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ZOLFO DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 50% S

Anticrittogamico

Composizione : 100 gr di prodotto contengono:

Zolfo puro (esente da Selenio)		gr 50
Inerti	q. b. a	gr 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO : Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Registrazione n. 7741 del 23/03/1989 del Ministero della Salute

Ditta: ZOLFI VENTILATI MANNINO spa C.da Corsa Cianciana (AG)
Officina di produzione: ZOLFI VENTILATI MANNINO Spa - C.da Corsa - Cianciana (AG)
Kg 5 - 10 - 25 Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

MODALITA' DOSI D'IMPIEGO : Anticrittogamico per uso agricolo da usare contro l'oidio della vite, delle piante da frutto, delle colture orticole e floreali.
Distribuire il prodotto con impolveratore meccanico ad erogazione regolabile facendo in modo da ottenere una nube che investa la vegetazione ricoprendola uniformemente.

DOSI D'IMPIEGO CONTRO L'OIDIO: Kg 25 - 40 per ettaro

COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con la generalità degli anticrittogamici in commercio.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
FITOTOSSICITA': Nei periodi con temperature più elevate evitare di applicare il prodotto nelle ore più calde e soleggiate della giornata.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e negli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D..L.vo n. 65/2003). Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ZOLFO DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 85% S

Anticrittogamico

Composizione : 100 gr di prodotto contengono:
Zolfo puro (esente da Selenio) gr 85
Inerti q. b. a gr 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO : Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Registrazione n. 7738 del 23/03/1989 del Ministero della Salute

Ditta: ZOLFI VENTILATI MANNINO spa C.da Corsa Cianciana (AG)
Officina di produzione: ZOLFI VENTILATI MANNINO Spa - C.da Corsa - Cianciana (AG)
Kg 5 - 10 - 25 Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

MODALITA' DOSI D'IMPIEGO : Anticrittogamico per uso agricolo da usare contro l'oidio della vite, delle piante da frutto, delle colture orticole e floreali.
Dovrà essere distribuito con impolveratori ad erogazione regolabile facendo in modo da ottenere una nube che investa la vegetazione ricoprendola uniformemente.

DOSI D'IMPIEGO CONTRO L'OIDIO: Kg 25 - 40 per ettaro

COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con la generalità degli anticrittogamici in commercio.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
FITOTOSSICITA': Nei periodi con temperature più elevate evitare di applicare il prodotto nelle ore più calde e soleggiate della giornata.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e negli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D..L.vo n. 65/2003). Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ZOLFOBENTON 40

Anticrittogamico – Zolfo con bentonite - Polvere secca

Composizione : 100 gr di prodotto contengono:

Zolfo puro (esente da Selenio)		gr 40
Coadiuvanti	q. b. a	gr 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO : Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Registrazione n. 11477 del 22/10/2002 del Ministero della Salute
Data scadenza registrazione, come da Decreto del Ministero della Salute

Ditta: ZOLFI VENTILATI MANNINO spa C.da Corsa Cianciana (AG)
Officina di produzione: ZOLFI VENTILATI MANNINO Spa - C.da Corsa - Cianciana (AG)
Kg 1 – 5 –10 - 25 Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

ATTENZIONE: Nell'applicazione del prodotto indossare indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Non rientrare nelle zone trattate prima che la polvere sia completamente depositata,

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO : Anticrittogamico per uso agricolo da usare contro l'oidio della vite, contro Botrytis Cinerea, Muffa grigia dell'uva da tavola.

Distribuire il prodotto con impolveratore meccanico ad erogazione regolabile facendo in modo da ottenere una nube che investa la vegetazione ricoprendola uniformemente, alle seguenti dosi:

VITE contro OIDIO: Kg 20 - 30 per ettaro
Colture orticole e floreali: contro OIDIO Kg 20 – 30 per ettaro

Epoca di applicazione: Secondo lo schema tradizionale dei trattamenti antioidici e antibotrytis

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
FITOTOSSICITA': Nei periodi con temperature più elevate evitare di applicare il prodotto nelle ore più calde e soleggiate della giornata. Non si deve trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e negli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D..L.vo n. 65/2003). Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ZOLFINDUSTRIA S.r.l

Tiosam 80

Fungicida a base di zolfo

(polvere bagnabile micronizzata)

TIOSAM 80

Registrazione del Ministero della Salute n. 11566 del 22/01/2003

COMPOSIZIONE

ZOLFO puro (esente da Selenio)	gr. 80
Adesivanti, bagnanti, sospensivanti ed inerti q.b.a	gr. 100

FRASI DI RISCHIO

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

ZOLFINDUSTRIA Srl

SEDE LEGALE:

Via Cantarana, 17 - San Cipriano Po (PV)

SEDE AMMINISTRATIVA

Via San Cassiano, 99

28069 San Martino di Trecate (NO)

Stabilimento di produzione:

ZOLFINDUSTRIA Srl

Via Cantarana, 17 - San Cipriano Po (PV)

Distribuito da:

Industria Chimica Scarmagna Alberto & C. s.a.s.

Minerbe (Verona)

Partita n. Contenuto: 0,1 - 1 - 5 - 10 - 25 Kg

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Tiosam 80 combatte l'Oidio della Vite, l'Oidio del melo, del pero, del pesco e del pomodoro, l'Oidio delle piante floreali e di numerose altre colture frutticole ed orticole, l'Eriofide della vite e del pero.

Tiosam 80 si impiega alle seguenti dosi per 100 litri d'acqua:

Viticoltura	**gr. 100-200**
Frutticoltura (pomacee, drupacee, mandorlo, nocciolo, olivo, fragola)	**gr. 200-300**
Orticoltura e Floricoltura in pieno campo o in serra	**gr. 150-250**

Con temperature elevate adoperare le dosi più basse.

Stemperare il prodotto in poca acqua e versare la poltiglia nel totale quantitativo di liquido richiesto agitando per qualche minuto.

Nell'effettuare il trattamento curare una uniforme irrorazione delle piante operando con getto ben nebulizzato, in modo che risultino completamente bagnate.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci; non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (Polisolfuri, Poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP.

AVVERTENZE: Deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Effettuare i trattamenti nelle ore meno calde della giornata preferibilmente nelle prime ore del mattino o in giornata con cielo coperto.

Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:

MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.

PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.

VITE: Sangiovese.

CUCURBITACEE: può essere fitotossico.

INTERVALLO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 5 GIORNI.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

D.L. n 65/2003

ZEB 80

ANTICRITTOGAMICO ORGANICO-COMPLESSO A VASTO SPETTRO D'AZIONE

polvere bagnabile

ZEB 80 – FUNGICIDA

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6916 del 18/12/1986

COMPOSIZIONE

MANCOZEB puro	g 80
Coformulanti q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO

Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

ZOLFINDUSTRIA Srl

SEDE LEGALE

Via Cantarana, 17 - San Cipriano Po (PV)

SEDE AMMINISTRATIVA

Via San Cassiano, 99

28069 San Martino di Trecate (NO)

Stabilimento di produzione

ZOLFINDUSTRIA Srl

Via Cantarana, 17 - San Cipriano Po (PV)

Partita n. **Contenuto netto: Kg 0,300 – 1 – 5 – 10 - 25**

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento, proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

MANCOZEB – Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: nausea, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

zeb 80 è un anticrittogamico a vasto spettro di azione particolarmente indicato per la lotta contro la Ticchiolatura delle **pomacee**, la Peronospora della **vite**, del **pomodoro** e del **tabacco**, la Marssonina del **pioppo** e le Ruggini del **garofano**.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Vite: contro Peronospora, Antracnosi, Rossore parassitario in pre-fioritura g 200-300/hl; contro Escoriosi, negli interventi a gemma chiusa e con germogli a cm. 5 g 350-400/hl.

Pomacee (melo e pero): contro Ticchiolatura, Gloeosporium g 150-200/hl.

Pomodoro (solo fino alla prima fioritura): contro Peronospora, Alternaria, Antracnosi e Septoriosi g 250-300 g/hl.

Pioppo: contro Marssonina (su piante adulte) g 400-500/hl; (su pioppello in vivaio) g 250-350/hl.

Tabacco: contro Antracnosi, Peronospora (in pieno campo) g 200-250/hl; (in semenzaio) g 100-150/hl.

Grano, Orzo, Segale, Avena: contro Ruggine, Septoriosi. Norume Kg 2,5-3/ha.

Garofano: contro la Ruggine g 200-300/hl.

PER I TRATTAMENTI UTILIZZARE POMPE A VOLUME NORMALE

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Si sconsiglia l'impiego del prodotto sulle seguenti cultivar di pero: Butirra estiva, Kaiser, Abate Fetel, Giardina, William precoce.

Sulle nuove varietà e sulle varietà locali di pero, prima dell'applicazione in pieno campo, effettuare delle prove su alcune piante.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Zolfo 80 Micronizzato

Fungicida a base di zolfo

(polvere bagnabile micronizzata)

ZOLFO 80 MICRONIZZATO
Registrazione del Ministero della Sanità n. 1823 del 19/4/75

COMPOSIZIONE

ZOLFO puro (esente da Selenio)	gr. 80
Adesivanti, bagnanti, sospensivanti ed inerti q.b.a	gr 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

ZOLFINDUSTRIA Srl
SEDE LEGALE
Via Cantarana, 17 - San Cipriano Po (PV)
SEDE AMMINISTRATIVA
Via San Cassiano, 99
28069 San Martino di Trecate (NO)
Stabilimento di produzione
ZOLFINDUSTRIA Srl
Via Cantarana, 17 - San Cipriano Po (PV)

Partita n. Contenuto 0,1 - 1 - 5 - 10 - 25 Kg

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Zolfo 80 combatte l'Oidio della Vite, l'Oidio del melo, del pero, del pesco e del pomodoro, l'Oidio delle piante floreali e di numerose altre colture frutticole ed orticole, l'Eriofide della vite e del pero.

Zolfo 80 si impiega alle seguenti dosi per 100 litri d'acqua:

Viticoltura	**gr. 100-200**
Frutticoltura (pomacee, drupacee, mandorlo, nocciolo, olivo, fragola)	**gr. 200-300**
Orticoltura e Floricoltura in pieno campo o in serra	**gr. 150-250**

Con temperature elevate adoperare le dosi più basse.

Stemperare il prodotto in poca acqua e versare la poltiglia nel totale quantitativo di liquido richiesto agitando per qualche minuto.
Nell'effettuare il trattamento curare una uniforme irrorazione delle piante operando con getto ben nebulizzato, in modo che risultino completamente bagnate.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci: non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (Polisolfuri, Poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP.

AVVERTENZE: Deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Effettuare i trattamenti nelle ore meno calde della giornata preferibilmente nelle prime ore del mattino o in giornata con cielo coperto.
Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap
PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio
VITE: Sangiovese
CUCURBITACEE: può essere fitotossico.
INTERVALLO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 5 GIORNI.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

D.L. A 16/2003

SOLFOCHIMICA S.a.s

AGRIRAME 33% Cu

Anticrittogamico in polvere bagnabile

AGRIRAME 33% Cu **Registrazione Ministero della Salute n. 11406 del 23/07/2002**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE	
100 gr. di prodotto contengono:	
RAME metallico (sotto forma di ossicloruro)	g. 33
Coformulanti q.b. a	g. 100

Partita n.

CONTENUTO **0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 Kg**

SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via della Libertà, 60 – Realmonte (AG)

Stabilimento di produzione:
ZOLFI VENTILATI MANNINO SpA
Contrada Corsa – 92012 Cianciana (Agrigento)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO

- **VITE**: contro Peronospora: **400-500 g/hl**. Effettuare i normali trattamenti sulla base dei calendari di lotta comunemente usati in zona. Impiegare il prodotto preferibilmente dopo la fioritura della vite, usando prima della fioritura fungicidi acuprici. Contro l'Oidio aggiungere un antioidico specifico (zolfo bagnabile, ecc.).
- **MELO, PERO, COTOGNO**: contro Ticchiolatura e Cancri rameali : **1-1,5 Kg/hl** in trattamenti autunnali o di fine inverno ; **400-500 g/hl** in trattamenti primaverili.
- **DRUPACEE**: contro Bolla, Corineo e Cancri rameali (trattamenti invernali) **1-1,2 Kg/hl.**
- **OLIVO**: contro Occhio di pavone e Lebbra **400-500 g/hl.**
- **AGRUMI**: contro Mal secco, Antracnosi, Fumaggine, Batteriosi, Gommosi, Allupatura: **400-500 g/hl.**
- **ACTINIDIA** : contro Marciume del colletto **500-600 g/hl**.
- **FRAGOLA** : Contro Maculatura rosso-bruna e zonata (Marssonina e Gnomonia), Vaiolatura rossa (Mycosphaerella) **300 g/hl**. Intervenire in pre-fioritura e sulla vegetazione autunnale.
- **FRUTTIFERI MINORI ED A GUSCIO**: contro Cancri rameali nei trattamenti autunnali o di fine inverno **1-1,2 Kg/hl.** In trattamenti primaverili **300 g/hl.**
- **POMODORO, MELANZANA**: contro Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi, Batteriosi: **500-600 g/hl.**
- **SEDANO, CAROTA, PREZZEMOLO**: contro Cercospora, Septoria: **400-500 g/hl.**
- **MELONE, ANGURIA, ZUCCHINO E CETRIOLO**: contro Peronospora ed Antracnosi: **400-500 g/hl.**
- **PISELLO E FAGIOLO**: contro Antracnosi e Ruggine: **400-500 g/hl.**
- **CIPOLLA, CARCIOFO, CARDO, E CAVOLI**: contro Peronospora: **400-600 g/hl.**
- **PATATA**: contro Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi, Batteriosi: **400-600 g/hl.**
- **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO**: contro Cercospora: **4-6 Kg/ha**.
- **OLEAGINOSE**: contro Peronospora e Antracnosi : **400-500 g/hl.**
- **TABACCO**: contro Peronospora ed Antracnosi : **400-500 g/hl.**
- **CEREALI**: contro Ruggine e Septoria : **400-500 g/hl.**
- **FLOREALI (GAROFANO, ROSA, CRISANTEMO), ORNAMENTALI E FORESTALI**: contro Ruggine, Peronospora, Ticchiolatura e Septoria : **400-500 g/hl**.

Le dosi si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale. Nel caso di trattamenti a volume ridotto, le dosi vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Diluire il prodotto in poca acqua a parte, quindi versare la miscela cosi ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

COMPATIBILITÀ - Il prodotto non è compatibile con le miscele alcaline come Polisolfuri e Calce.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

(*) Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana.

(**) Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Avvertenza: Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

CARBARYLENE 5

Insetticida in polvere secca per uso agricolo

CARBARYLENE 5 **Registrazione Ministero della Sanità n. 7553 del 25/10/88**

COMPOSIZIONE	
CARBARYL puro (esente da β naftolo)	g. 5
Coformulanti q.b. a	g. 100

Partita n.

CONTENUTO **1 - 5 - 10 - 20 Kg**

SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via della Libertà, 60 – Realmonte (AG)

Stabilimento di produzione:
ZOLFI VENTILATI MANNINO SpA
Contrada Corsa – 92012 Cianciana (Agrigento)

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO: Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
CARBARYL - Sintomi: Inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomo-dazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

METODO D'IMPIEGO
Distribuire il prodotto con impolveratore meccanico ad erogazione regolabile per ottenere una nube che investa la vegetazione ricoprendola uniformemente.

DOSE D'IMPIEGO: Kg 30-40 per ettaro
- **VITE, AGRUMI, OLIVO**: contro le TIGNOLE.
- **FRUTTIFERI IN GENERE**: contro TORTRICI e LARVE DI LEPIDOTTERI.
- **PATATA**: contro la DORIFORA
- **CAVOLO**: contro CAVOLAIA e MAMESTRA

COMPATIBILITÀ
Non sussistono indicazioni di incompatibilità. Tuttavia se ne sconsiglia l'impiego in associazione a formulati a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non impiegare il prodotto nel periodo della fioritura. Sul MELO non impiegare il prodotto per 30 giorni dopo la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame; è tossico per le api.

INTERVALLO DI TEMPO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 7 GIORNI

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

DL 65/2003

POLVERE SOLFOCHIMICA 16% Cu

Anticrittogamico per uso agricolo

POLVERE BAGNABILE

POLVERE SOLFOCHIMICA 16% Cu **Reg. Ministero della Sanità N° 7481 del 25-05-1988**

NOCIVO

COMPOSIZIONE	
100 gr. di prodotto contengono:	
RAME metallico (sotto forma di ossicloruro)	g. 16
Inerte e bagnante q.b. a	g. 100

Partita n.

CONTENUTO **Kg 1 - 5 - 10 - 20**

Ditta:
SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via della Libertà, 60 – Realmonte (AG)
Stabilimento di produzione:
ZOLFI VENTILATI MANNINO SpA
Contrada Corsa – 92012 Cianciana (Agrigento)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Il RAME provoca i seguenti sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaDTa endovena e BAL intramuscolare; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ DOSI E CAMPI D'IMPIEGO.
Per ogni 100 litri d'acqua:
- **MELO: contro la TICCHIOLATURA gr. 700-800**
- **POMACEE: contro i cancri (trattamenti invernali) gr. 2– 2,5**
- **VITE: contro PERONOSPORA sul grappolo e OIDIO: 30 parti con 70 parti di zolfo polverulento**
- **OLIVO: contro LEBBRA ed OCCHIO DI PAVONE Kg 1**
- **AGRUMI: contro ALLUPATURA, MAL SECCO (in quattro trattamenti autunno-invernali) Kg 1**
- **POMODORO: contro PERONOSPORA, SEPTORIA, ALTERNARIA, BATTERIOSI Kg 1**
- **CARDO, CARCIOFO, CAVOLO, CICORIA, MELLONE, PISELLO, RAVANELLO, SPINACIO, ZUCCA contro PERONOSPORA gr. 600- 800**

METODO D'IMPIEGO: Aggiungere poca acqua alla POLVERE SOLFOCHIMICA 16%Cu sino ad ottenere una poltiglia semidensa ed omogenea indi, versare il rimanente d'acqua sino a raggiungere la concentrazione voluta. Irrorare a getto ben nebulizzato.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con la totalità degli ad eccezione dei preparati a base di Olii bianchi, Malathion, Tiram.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non si deve trattare durante la fioritura.
Su varietà di MELO (*) e di PERO (**) cuprosensibili, il prodotto può essere fitossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
(*) Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana.
(**) Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

INTERVALLO DI TEMPO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: GIORNI VENTI.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

THIRAM 10

Anticrittogamico in polvere secca

THIRAM 10 Registrazione Ministero della Salute n. 7480 del 25/05/88

COMPOSIZIONE	
THIRAM puro	g. 10
Coformulantiq.b. a	g. 100

Partita n.

CONTENUTO **1 - 5 - 10 – 20 Kg**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via della Libertà, 60 – Realmonte (AG)
Stabilimento di produzione:
ZOLFI VENTILATI MANNINO SpA
Contrada Corsa – 92012 Cianciana (Agrigento)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione: apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Concentrazione e dose d'impiego: Kg 30-40 per ettaro

- **VITE**: contro PERONOSPORA e BOTRYTIS.
- **PESCO**: contro BOLLA e CORINEO.
- **FRAGOLA**: contro VAIOLATURA e BOTRYTIS
- **LATTUGA**: contro SCLEROTINIA e VAIOLATURA
- **GAROFANO**: contro FUSARIOSI
- **TULIPANO**: contro il MARCIUME

Metodo d'impiego: La distribuzione deve essere eseguita con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile per ottenere una nube che investa la vegetazione ricoprendola uniformemente. Profittare delle ore di rugiada per ottenere la massima adesività sulle foglie.

Epoca di applicazione: Coincide con lo schema tradizionale dei trattamenti antiperonosporici.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con la totalità degli anticrittogamici per trattamenti a polvere secca.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI TEMPO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 10 GIORNI

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

TIO THIRAM 50/8

Anticrittogamico in polvere secca

TIO THIRAM 50/8 Registrazione Ministero della Salute n. 7482 del 25/05/88

IRRITANTE

COMPOSIZIONE	
- THIRAM puro	g. 8
- ZOLFO puro (esente da selenio)	g. 50
- Coformulanti q.b. a	g.100

Partita n.

CONTENUTO 1 - 5 - 10 – 20 - 25 Kg

SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via della Libertà, 60 – Realmonte (AG)

Stabilimento di produzione:
ZOLFI VENTILATI MANNINO SpA
Contrada Corsa – 92012 Cianciana (Agrigento)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: TIRAM 8% e ZOLFO 50% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
TIRAM: Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
ZOLFO: --
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Concentrazione e dose d'impiego: Kg 30-40 per ettaro

- **VITE**: contro OIDIO, PERONOSPORA LARVATA e MUFFA GRIGIA dell'UVA.
- **PESCO**: contro OIDIO e CORINEO.

Metodo d'impiego: La distribuzione deve essere eseguita con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile per ottenere una nube che investa la vegetazione ricoprendola uniformemente. Profittare delle ore di rugiada per ottenere la massima adesività sulle foglie.

Epoca di applicazione: Coincide con lo schema tradizionale dei trattamenti antioidici ed antiperonosporici.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con la totalità degli anticrittogamici per trattamenti a polvere secca.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI TEMPO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 10 GIORNI

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

Zolfo Bagnabile 60%

Anticrittogamico idrosospensibile

ZOLFO BAGNABILE 60% Registrazione Ministero della Sanità n. 6763 del 08/07/1986

COMPOSIZIONE	
100 gr. di prodotto contengono:	
zolfo puro esente da selenio:	gr. 60
inerti, bagnanti e disperdenti: q.b. a	gr. 100

Partita n.

CONTENUTO KG 1-5-10-25

SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via della Libertà, 60 – Realmonte (AG)

Stabilimento di produzione:
SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via Contrada Serra Polizzi – Realmonte (AG)

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI D'IMPIEGO – per ogni 100 litri d'acqua:

Frutticoltura (agrumi, drupacee, pomacee, fragole, nocciolo, olivo)	grammi 250–450
Viticoltura	grammi 250-350

MODALITÀ D'IMPIEGO:
Stemperare in poca acqua in quantità stabilita di ZOLFO BAGNABILE 60% sino ad ottenere una poltiglia semidensa ed omogenea, indi aggiungere acqua sino alla concentrazione voluta.
Nebulizzare con ugelli a getto sottilissimo, evitare il trattamento nelle ore calde.

EPOCA DI APPLICAZIONE:
Secondo lo schema tradizionale dei trattamenti antioidici.

COMPATIBILITÀ:
È compatibile con la maggioranza dei fitofarmaci.
Non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con oli minerali, con Captano, con Diclorvos.

AVVERTENZA:
Deve essere distribuito a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ:
Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
MELE: Black Ben Davis – Black Stayman – Calvilla Bianca – Commercio – Golden delicious – Jonathan – Imperatore – Renetta – Rome Beauty – Stayman Red – Winesap.
PERE. Buona Luigia D'Avranches – Contessa di Parigi – Kaiser Alexander – Olivier de Serres – William – Decana del Comizio.
VITE: Sangiovese.
Per queste varietà usare dosi ridotte

INTERVALLO DI TEMPO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: GIORNI CINQUE

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

DL 65/2003

Zolfo Bagnabile 90%

Anticrittogamico idrosospensibile

ZOLFO BAGNABILE 90% Registrazione Ministero della Sanità n. 6523 del 03/10/1985

COMPOSIZIONE
100 gr. di prodotto contengono:
90 gr. zolfo puro esente da selenio
10 gr. inerti, bagnanti e disperdenti

Partita n.

CONTENUTO KG 1-5-10-25

SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via della Libertà, 60 – Realmonte (AG)

Stabilimento di produzione:
SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via Contrada Serra Polizzi – Realmonte (AG)

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

EPOCA DI APPLICAZIONE
Secondo lo schema tradizionale dei trattamenti antioidici.

DOSI D'IMPIEGO
per ogni 100 litri d'acqua:
Melo – Pero: gr. 250-450
Viticoltura: gr. 250-250

MODALITÀ D'IMPIEGO
Stemperare in poca acqua in quantità stabilita di ZOLFO BAGNABILE 90% sino ad ottenere una poltiglia semidensa ed omogenea, indi aggiungere acqua sino alla concentrazione voluta.
Nebulizzare con ugelli a getto sottilissimo, evitare il trattamento nelle ore calde.

COMPATIBILITÀ
Non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con oli minerali, con Captano, con Diclorvos.
Deve essere distribuito a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
MELE: Black Ben Davis – Black Stayman – Calvilla Bianca – Commercio – Golden delicious – Jonathan – Imperatore – Renetta – Rome Beauty – Stayman Red – Winesap.
PERE. Buona Luigia D'Avranches – Contessa di Parigi – Kaiser Alexander – Olivier de Serres – William – Decana del Comizio.
VITE: Sangiovese.
Per queste varietà usare dosi ridotte

INTERVALLO DI TEMPO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: GIORNI CINQUE

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

DL 65/2003

Zolfo Ventilato Scorrevole 85%S

ZOLFO VENTILATO SCORREVOLE 85% S Registrazione Ministero della Sanità n. 6843 del 11/11/1986

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
100 gr. di prodotto contengono:
zolfo puro (esente da selenio): gr. 85
inerti (solfato di calcio): q.b. a gr. 100

Partita n.

CONTENUTO KG 5-10-25

SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via della Libertà, 60 – Realmonte (AG)

Stabilimento di produzione:
SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via Contrada Serra Polizzi – Realmonte (AG)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Kg. 25 – 35per ettaro.
Distribuire il prodotto con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile partendo da un minimo sino ad ottenere una nube che investa la vegetazione ricoprendola uniformemente.

APPLICAZIONE – Contro l'oidio della vite.

EPOCA DI APPLICAZIONE:
Secondo lo schema tradizionale dei trattamenti antioidici.

COMPATIBILITÀ:
È compatibile con la maggioranza degli anticrittogamici per trattamenti in polvere.
Non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con oli minerali, con Captano, con Diclorvos.

AVVERTENZA:
Deve essere distribuito a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del captano.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ:
Evitare i trattamenti nelle ore calde.
Può arrecare danno alle cultivar di VITE Sangiovese.

INTERVALLO DI TEMPO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: GIORNI CINQUE

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

DL 65/2003

Zolfo doppio Ventilato Scorrevole 95%S

ZOLFO DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 95% S Registrazione Ministero della Sanità n. n. 7252 del 26/11/1987

COMPOSIZIONE	
100 gr. di prodotto contengono:	
zolfo puro (esente da selenio):	gr. 95
inerti (solfato di calcio): q.b. a	gr. 100

Partita n.

CONTENUTO KG 5-10-25

SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via della Libertà, 60 – Realmonte (AG)

Stabilimento di produzione:
SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via Contrada Serra Polizzi – Realmonte (AG)

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CAMPI D'IMPIEGO – VITE: Contro l'oidio

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Kg. 25 – 35per ettaro.
Distribuire il prodotto con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile partendo da un minimo sino ad ottenere una nube che investa la vegetazione ricoprendola uniformemente.

EPOCA DI APPLICAZIONE:
Secondo lo schema tradizionale dei trattamenti antioidici.

COMPATIBILITÀ:
È compatibile con la totalità degli anticrittogamici per trattamenti in polvere.

AVVERTENZA:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Nei periodi con temperatura elevate non eseguire i trattamenti nelle ore più calde della giornata per evitare effetti fitotossici sulle colture sensibili. Può arrecare danno alle cultivar di Vite Sangiovese.

INTERVALLO DI TEMPO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: GIORNI CINQUE

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

DL 65/2003

Zolfo Ramato 85 – 2,5

Anticrittogamico per trattamenti a polvere secca

ZOLFO RAMATO 85 – 2,5 Registrazione Ministero della Sanità n. 7030 del 26/03/1987

COMPOSIZIONE	
100 gr. di prodotto contengono:	
Zolfo puro esente da selenio:	gr. 85
Rame metallo (sotto forma di ossicloruro)	gr. 2,5
Coformulanti q.b. a	gr. 100

IRRITANTE

Partita n.

CONTENUTO KG 5-10-25

SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via della Libertà, 60 – Realmonte (AG)

Stabilimento di produzione:
SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via Contrada Serra Polizzi - Realmonte (AG)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ZOLFO PURO 85% e RAME METALLO 2,5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
ZOLFO: ––
RAME - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia: Gastrolusi con soluzione latto- albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Trattamenti a secco contro Oidio della Vite, Mal Bianco delle Pomacee e Drupacee.
Ad azione complementare dei trattamenti liquidi contro la Ticchiolatura delle Pomacee e Peronospora della Vite.
Kg 20 – 25 per Ettaro.
Distribuire il prodotto con impolveratore meccanico ad erogazione regolabile partendo da un minimo sino ad ottenere una nube che investa la vegetazione ricoprendola uniformemente.

EPOCA DI APPLICAZIONE:
Secondo lo schema tradizionale dei trattamenti antioidici.

COMPATIBILITÀ:
È compatibile con la totalità degli anticrittogamici in polvere.

AVVERTENZA:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ:
Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne consiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
(*) Abbondanza Belford - Black Davis – Black Stayman – Golden delicious – Gravestein - Jonathan – Morgenduft – Renetta del Canadà – Rome Beauty – Stayman Red – Stayman – Stayman Winesap Rosa Mantovana.
(**) Buona Luigia d'Avranches – B.C. William – Abate Fetel – Butirra Clairgeau – Passacrassana – Dott. Jules Guyot – Favorita di Clapp – Kaiser – Butirra Giffard.
Evitare, comunque, di trattare nelle ore più calde in periodi con temperature elevate.

INTERVALLO DI TEMPO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: GIORNI VENTI.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

Zolfo Ramato 94 – 2,5

Anticrittogamico per trattamenti a polvere secca

ZOLFO RAMATO 94 – 2,5 Registrazione Ministero della Sanità n. 7029 del 26/03/1987

COMPOSIZIONE	
100 gr. di prodotto contengono:	
Zolfo puro esente da selenio:	gr. 94
Rame metallo (sotto forma di ossicloruro)	gr. 2,5
Coformulanti q.b. a	gr. 100

Partita n.

CONTENUTO KG 5-10-25

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via della Libertà, 60 – Realmonte (AG)

Stabilimento di produzione:
SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via Contrada Serra Polizzi - Realmonte (AG)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ZOLFO PURO 94% e RAME METALLO 2,5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
ZOLFO: --
RAME - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia: Gastrolusi con soluzione latto- albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Trattamenti a secco contro Oidio della Vite, Mal Bianco delle Pomacee e Drupacee.
Ad azione complementare dei trattamenti liquidi contro la Ticchiolatura delle Pomacee e Peronospora della Vite.
Kg 20 – 25 per Ettaro.
Distribuire il prodotto con impolveratore meccanico ad erogazione regolabile partendo da un minimo sino ad ottenere una nube che investa la vegetazione ricoprendola uniformemente.

EPOCA DI APPLICAZIONE:
Secondo lo schema tradizionale dei trattamenti antioidici.

COMPATIBILITÀ:
E' compatibile con la totalità degli anticrittogamici in polvere.

AVVERTENZA:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ:
Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibile il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne consiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
(*) Abbondanza Belford - Black Davis – Black Stayman – Golden delicious – Gravenstein - Jonathan – Morgenduft – Renetta del Canadà – Rome Beauty – Stayman Red – Stayman – Stayman Winesap Rosa Mantovana.
(**) Buona Luigia d'Avranches – B.C. William – Abate Fetel – Butirra Clairgeau – Passacrassana – Dott. Jules Guyot – Favorita di Clapp – Kaiser – Butirra Giffard.
Evitare, comunque, di trattare nelle ore più calde in periodi con temperature elevate.

INTERVALLO DI TEMPO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: GIORNI VENTI.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

Zolfo Ramato 96 – 1,5

Anticrittogamico per trattamenti a polvere secca

ZOLFO RAMATO 96 – 1,5 Registrazione Ministero della Sanità n. 7028 del 26/03/1987

COMPOSIZIONE	
100 gr. di prodotto contengono:	
Zolfo puro esente da selenio:	gr. 96
Rame metallo (sotto forma di ossicloruro)	gr. 1,5
Coformulanti q.b. a	gr. 100

Partita n.

CONTENUTO KG 5-10-25

IRRITANTE

SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via della Libertà, 60 – Realmonte (AG)

Stabilimento di produzione:
SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via Contrada Serra Polizzi - Realmonte (AG)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ZOLFO 96% e RAME METALLO 1,5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
ZOLFO: --
RAME - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia: Gastrolusi con soluzione latto- albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Trattamenti a secco contro Oidio della Vite, Mal Bianco delle Pomacee e Drupacee.
Ad azione complementare dei trattamenti liquidi contro la Ticchiolatura delle Pomacee e Peronospora della Vite.
Kg 20 – 25 per Ettaro.
Distribuire il prodotto con impolveratore meccanico ad erogazione regolabile partendo da un minimo sino ad ottenere una nube che investa la vegetazione ricoprendola uniformemente.

EPOCA DI APPLICAZIONE:
Secondo lo schema tradizionale dei trattamenti antioidici.

COMPATIBILITÀ:
È compatibile con la totalità degli anticrittogamici in polvere.

AVVERTENZA:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ:
Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibile il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne consiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
(*) Abbondanza Belford - Black Davis – Black Stayman – Golden delicious – Gravenstein - Jonathan – Morgenduft – Renetta del Canadà – Rome Beauty – Stayman Red – Stayman – Stayman Winesap – Rosa Mantovana.
(**) Buona Luigia d'Avrancges – B.C. William – Abate Fetel – Butirra Clairgeau – Passacrassana – Dott. Jules Guyot – Favorita di Clapp – Kaiser – Butirra Giffard.
Evitare, comunque, di trattare nelle ore più calde in periodi con temperature elevate.

INTERVALLO DI TEMPO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: GIORNI VENTI

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

Zolfo Triventilato Scorrevole 93%S

ZOLFO TRIVENTILATO SCORREVOLE 93% S Registrazione Ministero della Sanità n. 6842 del 11/11/1986

COMPOSIZIONE	
100 gr. di prodotto contengono:	
zolfo puro (esente da selenio):	gr. 93
inerti (solfato di calcio): q.b. a	gr. 100

Partita n.

CONTENUTO KG 5 – 10 - 25

SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via della Libertà, 60 – Realmonte (AG)

Stabilimento di produzione:
SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via Contrada Serra Polizzi – Realmonte (AG)

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Kg. 25 – 35 per ettaro.
Distribuire il prodotto con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile partendo da un minimo sino ad ottenere una nube che investa la vegetazione ricoprendola uniformemente.

APPLICAZIONE – Contro l'oidio della vite.

EPOCA DI APPLICAZIONE:
Secondo lo schema tradizionale dei trattamenti antioidici.

COMPATIBILITÀ:
È compatibile con la maggioranza degli anticrittogamici per trattamenti in polvere.
Non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con oli minerali, con Captano, con Diclorvos.

AVVERTENZA:
Deve essere distribuito a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del captano.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ:
Evitare i trattamenti nelle ore calde.
Può arrecare danno alle cultivar di VITE Sangiovese.

INTERVALLO DI TEMPO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: GIORNI CINQUE

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

DL 65/2003

Zolfo Ventilato Scorrevole 50%S

ZOLFO VENTILATO SCORREVOLE 50% S Registrazione Ministero della Sanità n. 6841 del 11/11/1986

COMPOSIZIONE
100 gr. di prodotto contengono:
zolfo puro (esente da selenio): gr. 50
inerti (solfato di calcio): q.b. a gr. 100

Partita n.

CONTENUTO KG 5-10-25

SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via della Libertà, 60 – Realmonte (AG)

Stabilimento di produzione:
SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via Contrada Serra Polizzi – Realmonte (AG)

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Kg. 25 – 35 per ettaro.
Distribuire il prodotto con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile partendo da un minimo sino ad ottenere una nube che investa la vegetazione ricoprendola uniformemente.

APPLICAZIONE – Contro l'oidio della vite.

EPOCA DI APPLICAZIONE:
Secondo lo schema tradizionale dei trattamenti antioidici.

COMPATIBILITÀ:
È compatibile con la maggioranza degli anticrittogamici per trattamenti in polvere.
Non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con oli minerali, con Captano, con Diclorvos.

AVVERTENZA:
Deve essere distribuito a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del captano.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ:
Evitare i trattamenti nelle ore calde.
Può arrecare danno alle cultivar di VITE Sangiovese.

INTERVALLO DI TEMPO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: GIORNI CINQUE

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

DL 65/2003

SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH

FUNGURAN-OH 300 SC

(Sospensione concentrata)

FUNGICIDA A BASE DI RAME IDROSSIDO

FUNGURAN-OH 300 SC Registrazione del Ministero della Sanità n. 9985 del 16/03/1999

Composizione:

RAME METALLO	g. 21,9 (=300 g/l)
(sotto forma di idrossido)	
Coformulanti q.b.a	g. 100

Spiess-Urania Chemicals GmbH
Heidenkampsweg 77
D 20097 Amburgo (Germania)

NOCIVO

Stabilimento di produzione:
Spiess-Urania Chemicals GmbH
Heidenkampsweg 77
D 20097 Amburgo (Germania)

Partita n.

Contenuto: 0,500 - 1 - 5 - 10 - 25 Litri

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il FUNGURAN-OH 300 SC è un fungicida a base di rame, sotto forma di idrossido, in sospensione concentrata che, grazie alla sua particolare formulazione, possiede in modo accentuato notevole stabilità, adesività, persistenza d'azione e resistenza al dilavamento. Viene impiegato sulle seguenti colture:

- Vite: contro la Peronospora alla dose di 350-450 ml/hl con trattamenti preventivi;
- Pomacee: contro Ticchiolatura e Cancri rameali, nei trattamenti autunno-invernali alla dose di 450-700 ml/hl e con trattamenti prefiorali alla dose di 300-350 ml/hl e post-fiorali a 200 ml/hl (solo su colture non sensibili). Impiegare i dosaggi più bassi in caso di basse temperature;
- Drupacee **(Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino, Mandorlo)**: contro Sclerotinia, Bolla e Corineo alla dose di 400-450 ml/hl nei trattamenti autunno-invernali ed alla dose di 200 ml/hl nei trattamenti primaverili-estivi;
- Agrumi: contro Mal secco, Antracnosi, Fumaggine alla dose di 300 ml/hl nei diversi stadi vegetativi;
- Olivo: contro Occhio di Pavone, Fumaggini e Lebbra alla dose di 300-400 ml/hl;
- Nocciolo: contro la Batteriosi (Xanthomonas corylina) 350-450 ml/hl con 2 trattamenti nel mese di ottobre, distanziati di 20-25 giorni l'uno dall'altro;
- Noce: contro Antracnosi 350 ml/hl con trattamenti iniziati in prefioritura e continuando in caso di necessità. Nel periodo estivo si può aggiungere olio bianco (ml 150 per hl di acqua);
- Patata e Pomodoro: contro Peronospora, Alternaria, Batteriosi, Septoria, Cladosporiosi alla dose di 400-450 ml/hl;
- Sedano : contro Septoria 250-350 ml/hl. Intervenire quando le condizioni climatiche diventano favorevoli allo sviluppo della malattia, in corrispondenza di precipitazioni e bagnature prolungate;
- **Carciofo, Cavolo, Cardo, Cavoli, Cicoria, Cipolla, Spinacio e Cucurbitacee** : contro Peronospora 250 ml/hl. Intervenire quando le condizioni climatiche diventano favorevoli allo sviluppo della malattia;
- Pisello e Fagiolo : contro Antracnosi e Peronospora 250-300 ml/hl. Intervenire quando le condizioni climatiche diventano favorevoli allo sviluppo della malattia;
- **Altre orticole (Asparago, Insalate, Bietola da foglia e da costa, Finocchio, Prezzemolo, Erba cipollina, Basilico, Melanzana, Fava, Cece, Lenticchia, Lupino, Fagiolino, Pisello mangiatutto, Ortaggi a radice, Aglio, Scalogno e Porro)** : contro Peronospora, Septoria e Batteriosi 250-350 ml/hl. Intervenire quando le condizioni climatiche diventano favorevoli allo sviluppo della malattia;
- Fragola: contro la Vaiolatura rossa (sulla vegetazione autunnale) 400 ml/hl;
- **Barbabietola da zucchero**: contro Cercospora delle foglie e Peronospora 3,5 l/ha se impiegato da solo, 2,5 l/ha nel caso sia impiegato in miscela con altri prodotti;
- **Oleaginose (Arachide, Girasole, Soia, Colza, Ravizzone, Cotone, Sesamo, Cartamo, Lino, Canapa, Senape, Ricino)**: contro Peronospora, Septoria, Sclerotinia e Batteriosi in genere, da 3 a 4 l/ha. Intervenire quando le condizioni climatiche diventano favorevoli allo sviluppo della malattia;
- Riso: contro le alghe verdi 4,5 l/ha con trattamenti alla comparsa dell'attacco;
- Cereali: contro Ruggine alla dose di 3-4 l/ha;
- Tabacco: contro la Peronospora 350-450 ml/hl;
- Floricoltura: (in pieno campo o in serra) contro Peronospora, Ticchiolatura, Ruggine, Septoriosi, Maculatura fogliare, Antracnosi alla dose di 250-300 ml/hl.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscelabile con gli zolfi bagnabili e colloidali e con i fertilizzanti fogliari. Non è miscibile con antiparassitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (meli cuprosensibili : Abbondanza, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairegeau, Passacrassana, B.C. Williams, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE STRADE

DL 65/2003

SO. CHI. MED. S.r.l.

ZOLFO VENTILATO BAGNABILE 79,6

ZOLFO VENTIALTO BAGNABILE 79,6 Registrazione del Ministero della Sanità N° 2958 del 02/02/1979

COMPOSIZIONE riferita a g. 100 g
ZOLFO puro esente da selenio (da zolfo tecnico 99,5-100%) g. 79,6
Disperdenti, bagnanti, sospensivanti ed inerti q.b.a g. 100

So.Chi.Med. s.r.l. *Società Chimica Mediterranea*

Contrada Cardilla 150 - 91025 Marsala (TP)

STABILIMENTO DI PRODUZIONE: **So.Chi.Med. s.r.l.** - Contrada Cardilla 150 - 91025 Marsala (TP)

IRRITANTE

Partita n. PESO NETTO: **Kg 1 - 10**

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

APPLICAZIONE
Anticrittogamico a base di zolfo ad azione antioidica o mal bianco delle piante da frutto.
L'epoca e la frequenza delle applicazioni segue lo schema tradizionale dei trattamenti antioidici in relazione anche alla entità della infezione.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: per 100 litri d'acqua.

VITICOLTURA – OIDIO:	
trattamenti pre-fiorali	g. 250-300
trattamenti post- fiorali	g. 150-200
FRUTTICOLTURA – MAL BIANCO del pesco, susino, melo:	
trattamenti pre- fiorali	g. 250-300
trattamenti post- fiorali	g. 150-200

Stemperare in poca acqua la quantità richiesta di zolfo bagnabile sino ad ottenere una poltiglia semidensa ed omogenea, indi aggiungere acqua sino alla concentrazione voluta, nebulizzare con ugelli e getto regolabile e sottile. Evitare i trattamenti nelle ore calde.

COMPATIBILITÀ
È compatibile con la maggior parte degli anticrittogamici, non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese), con oli minerali, con Captano, con Diclorvos, con Euparen.
Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati compatibili, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Può arrecare danno alle seguenti cultivar di MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap. PERE: Buona Luigia d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.

Intervallo di tempo tra l'ultimo trattamento e la raccolta: GIORNI CINQUE

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

DL 65/2003

ZOLFRAM 50

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE SECCA

ZOLFRAM 50 Registrazione del Ministero della Sanità N° 3073 del 30/04/1979

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

COMPOSIZIONE riferita a g.100:

ZOLFO puro esente da selenio (da zolfo tecnico 99,5-100%)	g	49,75
RAME puro (da ossicloruro di rame)	g	2,5
Coformulanti q. b. a	g	100

So.Chi.Med. s.r.l. *Società Chimica Mediterranea*

Contrada Cardilla 150 - 91025 Marsala (TP)

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
So.Chi.Med. s.r.l. - Contrada Cardilla 150 - 91025 Marsala (TP)

Partita n.

PESO NETTO: **Kg 10-25**

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME 2,5% e ZOLFO (esente da selenio) 49,75% le quali, separatamente, provocano i seguanti sintomi di intossicazione:
RAME - denaturazione delle proteine con lesioni al livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni e collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
ZOLFO - --
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Trattamenti a secco contro l'oidio della vite, mal bianco delle drupacee e delle pomacee, delle colture ortive. Esplica una blanda azione complementare nei trattamenti liquidi contro la peronospora e la ticchiolatura delle pomacee. Il prodotto deve essere distribuito uniformemente sulle piante a completa copertura della vegetazione. Si consiglia di eseguire il trattamento con impolveratori ad erogazione regolabile, di preferenza nelle prime ore del mattino per favorire una migliore adesività della polvere sulle colture.

DOSI D'IMPIEGO: Kg 20-30 per ettaro.

EPOCA DI APPLICAZIONE
Secondo lo schema tradizionale dei trattamenti antioidici.

COMPATIBILITÀ
È compatibile con la totalità degli anticrittogamici per trattamenti in polvere.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
In alcune varietà di melo e pero il rame può provocare, in determinate condizioni di temperatura e di umidità, necrosi alle foglie e rugginosità sui frutti, se ne sconsiglia quindi l'impiego sulle seguenti varietà di melo: Golden Delicious, Jonathan, Abbondanza Belford, Imperatore, Renetta del Canadà e di pero Abate Fetel, Passacrassana, William.

Intervallo di tempo tra l'ultimo trattamento e la raccolta: GIORNI VENTI.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

RATTICIDA VENETA S.a.s.

TALPACID®

Cartuccia fumogena antitalpa

TALPACID

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Zolfo esente da Selenio gr.33,75
Coformulati q.b. a 100 gr.

Frasi di rischio:
Può provocare l'accensione di materie combustibili.
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

Consigli di prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'incendio o di esplosione non respirare i fumi. In caso d'ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Xi O

IRRITANTE **COMBURENTE**

Importatore esclusivo per l'Italia

RATTICIDA VENETA S.A.S.
Via del Bersagliere, 29 - Verona

Officina di Produzione: SONY FIREWORKS (P) LTD - SIVAKASI (INDIA).

Registrazione del Ministero della Sanità n° 5901 del 06/04/1984.

Contenuto n° 4 cartucce fumogene (peso netto gr.80)

Norme precauzionali: conservare in luoghi inaccessibili agli animali domestici. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Usare solo in luoghi ben ventilati.

Attenzione: il gas che si libera durante la combustione della cartuccia è irritante e nocivo

Informazioni per il medico:
in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

Istruzioni d'impiego:
Il Talpacid va usato esclusivamente in orti, giardini e prati. Accendere la cartuccia, introdurla velocemente e completamente nella tana delle talpe e tappare con terra il foro. Tappare anche gli altri fori dai quali può fuoriuscire il fumo, in modo tale che il fumo sviluppato resti all'interno delle tane. Il gas snida le talpe mettendole in fuga, dopodiché queste evitano il terreno trattato.
Dopo aver introdotto la cartuccia evitare di sostare nei pressi del luogo di introduzione e soprattutto di non respirare i fumi che si liberano dalla combustione della cartuccia.

Compatibilità: il Talpacid non va miscelato ad altri prodotti.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA E PER GLI USI CONSENTITI. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA.**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.**
- **IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO.**

DA NON VENDERSI SFUSO.

VALENT BIOSCIENCES

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ACCEL®

Fitoregolatore a base di Acido Gibberellico.
Tipo di formulazione: TAVOLETTE EFFERVESCENTI

COMPOSIZIONE
100 g. di prodotto contengono:

Acido gibberellico puro	g. 20
Inerti, quanto basta a	g. 100

(una tavoletta contiene 1 g di p.a. puro)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8756 del 22/05/95

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Valent BioSciences
una divisione della
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 2, Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)
Stabilimento di produzione
(formulazione e confezionamento o sola formulazione):
Amerilab Technologies – New Hope, Minnesota (Stati Uniti)
Stabilimento di confezionamento:
ISAGRO SpA – Aprilia (LT)

Distribuito da:
INTRACHEM BIO ITALIA SpA
Via XXV Aprile, 44 – Grassobbio (BG)
ISAGRO ITALIA Srl
Via Caldera, 21 - 20153 Milano

Partita No.:

PESO NETTO
g. 50 (pari a 10 tavolette da 5 g)
g. 100 (pari a 20 tavolette da 5 g)
g. 200 (pari a 40 tavolette da 5 g)

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
Accel è un prodotto a base di acido gibberellico (GA3). Il prodotto è indicato per stimolare processi quali la crescita dei tessuti vegetali, l'allegagione, la fioritura e la fruttificazione di numerose colture. Si consiglia di intervenire su colture concimate ed irrigate adeguatamente.

CAMPI E MODALITÀ DI IMPIEGO
PERO:
- per stimolare l'allegagione, lo sviluppo dei frutti originati da fecondazione e di quelli partenocarpici, trattare piante di almeno tre anni usando 1-2 tav./hl, effettuando una buona bagnatura, con circa il 20-30% dei fiori aperti (in caso di abbondante fioritura un eccesso di bagnatura può comportare un'allegagione troppo intensa); impiegare la dose più alta per le aree più fredde
- per ridurre i danni da gelate durante la fioritura e l'allegagione, impiegare 2-3 tav./hl, per gelate non inferiori a –5°C, trattando nelle ore più soleggiate o intervenendo entro le 36-48 ore successive all'evento.

FRAGOLA:
- per anticipare la produzione sulle varietà Gorella, Pocahontas, Red Gauntlet, Cambridge Favourite, Surprise des Halles, impiegare 2-3 tav./hl almeno 20-25 giorni prima della fioritura
- per aumentare la produzione di stoloni, in serra o in pieno campo, applicare 2-3 tav./hl, al termine della raccolta.

CARCIOFO:
- per anticipare sia la prima raccolta che le successive, trattare alla comparsa delle prime calatidi con 1-2 tav./hl distribuendo 400-500 litri/ha, evitando le ore più soleggiate nelle giornate molto calde
- per mitigare i danni da gelate intervenendo prima delle 24-36 ore successive, usare 1-3 tav./hl, effettuando il trattamento quando la temperatura si è già riportata ai valori normali.

SEDANO, SPINACIO, ZUCCHINO: per stimolare lo sviluppo e limitare lo stress da freddo impiegare 2-4 tav./hl, distribuendo 300-500 litri/ha, 4-5 settimane prima della raccolta.
CILIEGIO DOLCE: per aumentare la consistenza e la pezzatura, 1-2 tav./hl all'invaiatura.
CILIEGIO ACIDO: per ridurre i danni da giallume virotico, da scarsa vigoria e bassa produzione, trattare 10-14 giorni dopo la caduta petali con 1-2 tav./hl.
ARANCIO: per migliorare la qualità della buccia e ridurre il fenomeno della "spigatura", o invecchiamento, impiegare 2-4 tav./hl, effettuando una buona bagnatura. N.B.: se si desidera ottenere un ritardo nella raccolta, trattare quando i primi frutti virano – verde pallido – se invece il ritardo non è gradito, intervenire quando i frutti hanno già raggiunto una colorazione idonea per il mercato.
CLEMENTINE: per una migliore allegagione e per una più evidente assenza di semi (apirenia), usare 1-2 tav./hl bagnando abbondantemente, trattando tra la piena fioritura e l'inizio della caduta petali.
LIMONI: per aumentare colore e pezzatura dei frutti e per uniformare le raccolte usare 1-2 tav./hl circa 5-7 settimane prima della raccolta e comunque quando il colore della maggior parte dei frutti inizia a virare (giallo-argenteo).
VITE:
Uva da tavola senza semi (varietà Thompson, Sultanina, ecc.)
Un completo calendario di trattamento comprende:
- per allungare il rachide trattare in pre-fioritura con il tralcio lungo 4-8 cm alla dose di 2 tav./hl
- per diradare il grappolo trattare al 30-40% della fioritura, alla dose di 2 tav./hl
- per aumentare le dimensioni degli acini trattare dopo l'allegagione con acini di 3-4 mm di diametro, alla dose di 3 tav./hl
- per ottenere acini più omogenei e più grandi ripetere il trattamento precedente dopo 8-10 giorni.

Uva da vino (con semi): per allungare il rachide sulle varietà a grappolo compatto quali Tocai, Picolit, Chardonnay, ecc. trattare prima della fioritura con tralci di 10-15 cm alla dose di 0,5-1 tav./hl con 200-300 litri di acqua per ettaro.
L'allungamento consente una migliore difesa nei programmi di Lotta Integrata contro la Botrite, grazie ad una migliore aerazione del grappolo. Si raccomanda di non superare il dosaggio e l'epoca indicati onde evitare effetti indesiderati.
FLOREALI IN CAMPO: per facilitare, anticipare la fioritura, per interrompere la dormienza vegetativa, stimolare la crescita e allungare gli steli, 1-2 tav./hl alla comparsa dei primi boccioli fiorali. Si raccomandano prove preventive onde rilevare eventuali sensibilità di specie e/o varietali.
COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con i prodotti alcalini.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Le applicazioni di Accel possono dare risposte molto differenziate con il variare delle condizioni ambientali e dello stadio fenologico della pianta trattata e delle diverse varietà per la presenza naturale nelle piante di GA3 (GA3 endogeno). Si consiglia di effettuare preventivamente saggi su piccole superfici con le dosi minori sulle varietà mai trattate e per le finalità meno note. Adattare localmente le tecniche di impiego.
AVVERTENZE:
- Conservare il prodotto in ambiente fresco, asciutto e ventilato
- Distribuire la soluzione subito dopo averla preparata e comunque non oltre le 24 ore successive onde evitarne la degradazione
- Applicare durante le ore fresche della giornata evitando alte temperature per ottimizzare l'assorbimento
  Utilizzare ugelli a getto molto fine per ottenere una migliore copertura e assorbimento del prodotto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

® Marchio registrato

DL 65/2003

ETICHETTA RIDOTTA

ACCEL®

Fitoregolatore a base di Acido Gibberellico.
Tipo di formulazione: TAVOLETTE EFFERVESCENTI

COMPOSIZIONE
100 g. di prodotto contengono:

Acido gibberellico puro	g. 20
Inerti, quanto basta a	g. 100

(una tavoletta contiene 1 g di p.a. puro)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8756 del 22/05/95

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Valent BioSciences
una divisione della
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 2, Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)
Stabilimento di produzione
(formulazione e confezionamento o sola formulazione):
Amerilab Technologies – New Hope, Minnesota (Stati Uniti)
Stabilimento di confezionamento:
ISAGRO SpA – Aprilia (LT)

Distribuito da:
INTRACHEM BIO ITALIA SpA
Via XXV Aprile, 44 – Grassobbio (BG)
ISAGRO ITALIA Srl
Via Caldera, 21 - 20153 Milano

Partita No.:

PESO NETTO
g. 50 (pari a 10 tavolette da 5 g)
g. 100 (pari a 20 tavolette da 5 g)

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato

DL 65/2003

Etichetta/foglio illustrativo

BACTOSPEINE HPWP

Insetticida biologico in polvere bagnabile a base di Bacillus thuringiensis, varietà kurstaki

Composizione
100 g di prodotto contengono:
- Bacillus thuringiensis varietà kurstaki, ceppo HD-1 sierotipo 3a3b (potenza 32.000 UI/mg di formulato) g. 6,4
- Coformulanti q.b.a g. 100

Contiene Bacillus thuringiensis: può causare una reazione allergica

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Valent BioSciences una Divisione di
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy
2 Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or – Francia

Stabilimento di produzione: **A-Z Dryng – Osage, Iowa (USA)**

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9679 del 07/07/98

Contenuto: Kg. 0,100/0,200/0,250/0,500/1/5/10/25

Partita No.:

Distribuito da:
....

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODO D'AZIONE
Il prodotto agisce esclusivamente per ingestione sulle larve dei lepidotteri che interrompono il processo di alimentazione dopo poche ore dall'ingestione, arrivando alla morte anche dopo qualche giorno. Per una efficace azione si raccomanda di trattare popolazioni di larve nei primi stadi di sviluppo.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi di seguito riportate riferite ad un ettaro di superficie, da irrorarsi con una quantità d'acqua sufficiente a garantire la completa copertura delle colture da difendere. Intervenire con attrezzature che, munite di pompe a volume, distribuiscano volumi medio-alti di acqua.
Agrumi: Tignola 600-800 g/ha.
Pomacee: Falene defogliatrici, Ifantria 300-500 g/ha; Tortrici 600-1000 g/ha.
Vite: Tignole, Ifantria 600-1000 g/ha.
Olivo: Tignola, Ifantria 600-800 g/ha.
Actinidia: Eulia e Tignola 600-1000 g/ha.
Drupacee: Cidia, Anarsia, Ifantria 600-1000 g/ha.
Fragola: Piralide, Pandemis, Eulia 550-600 g/ha.
Ortaggi a foglia, Erbe fresche, Fagiolo, Fagiolino, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo, Porro:
- Nottue, Udea e Vanessa del cardo 450-500 g/ha
- Cavolaie e Tignola (Plutella) 200-250 g/ha
- Falene defogliatrici, Tortrici, Ifantria 600-1000 g/ha.

Solanacee (Pomodoro, Melanzana, Peperone) e Cucurbitacee (Zucca, Zucchino, Cetriolo, Melone, Cocomero):
- Nottue e Piralide 550-600 g/ha
- Falene defogliatrici, Tortrici, Ifantria 600-1000 g/ha.

Cavoli, Rapa, Ravanello, Colza, Ravizzone: Cavolaie, Tignola 200-250 g/ha.
Patata: Ifantria, Tignola 600-1000 g/ha.
Mais: Piralide, Ifantria 600-1000 g/ha.
Barbabietola da zucchero, bietola rossa: Mamestra, Tignola, Ifantria 600-1000 g/ha.
Soia: Vanessa (*Vanessa cardui*), Ifantria 600-1000 g/ha.
Girasole e cotone: Nottue, Ifantria 600-1000 g/ha.
Colture floreali ed ornamentali, tappeti erbosi e vivai: larve di lepidotteri defogliatori, Ifantria 600-1000 g/ha.
Negli impieghi su tappeti erbosi non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento, segnalando con appositi cartelli il divieto di accesso nelle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione.
Essenze forestali: Processionarie, Limantrie, Ifantria 600-800 g/ha.
Pioppo: Stilpnozia, Ifantria 600-800 g/ha.

Modalità di applicazione: applicare il prodotto preferibilmente nelle ore più fresche della giornata con un volume medio-alto di acqua. L'aggiunta di un bagnante-adesivante può essere utile per ottenere una migliore distribuzione e persistenza del prodotto.

Avvertenze: conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato; chiudere ermeticamente le confezioni parzialmente utilizzate; evitare l'esposizione diretta delle confezioni ai raggi solari; a temperatura ambiente e in confezioni integre, il prodotto è stabile per almeno 2 anni.

Preparazione della poltiglia: sciogliere il prodotto in poca acqua a parte ed aggiungere, sempre mescolando, al totale quantitativo di acqua. Distribuire la miscela acquosa entro 12 ore dalla sua preparazione con pompe a volume normale.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con sostanze alcaline (es. calce e poltiglia bordolese alcalina).
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto

BACTOSPEINE HPWP

Insetticida biologico in polvere bagnabile a base di Bacillus thuringiensis, varietà kurstaki

Composizione
100 g di prodotto contengono:
- Bacillus thuringiensis varietà kurstaki, ceppo HD-1 sierotipo 3a3b (potenza 32.000 UI/mg di formulato) g. 6,4
- Coformulanti q.b.a g. 100

Contiene Bacillus thuringiensis: può causare una reazione allergica

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

VALENT BioSciences

Valent BioSciences una Divisione di
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 2 Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or – Francia

Stabilimento di produzione: **A-Z Dryng – Osage, Iowa (USA)**

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9679 del 07/07/98

Contenuto: **g. 100** Partita No.:
Distribuito da: ………………………………

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.**

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

BERELEX®

Fitoregolatore in compresse a base di acido gibberellico per impiego in frutticoltura, orticoltura, floricoltura di pieno campo o in serra e viticoltura

COMPOSIZIONE		
Acido gibberellico (Gibberellina A_3)	g	9,4
Coformulanti q.b.a	g	100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Valent BioSciences
una divisione della
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 2, Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

Distribuito da:
Syngenta Crop Protection S.p.A. - Via Gallarate, 139 - Milano

Stabilimento di produzione:
Medentech Ltd. – Wexford, Irlanda

Registrazione Ministero della Sanità n° 5363 del 30.06.1983

Partita N.: vedere margine etichetta

Contenuto: **100 g (10 pastiglie da 10 g)**

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

NORME PER L'IMPIEGO DI BERELEX

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE

Grazie alla sua particolare formulazione in compresse, "BERELEX" risulta di facile e pronto impiego. Sciogliere le pastiglie in poca acqua fredda: 5 minuti sono sufficienti per ottenere una completa soluzione. Aggiungere poi un bagnante non ionico tipo "AGRAL" e successivamente il quantitativo di acqua necessario ad ottenere la diluizione voluta. La soluzione deve essere preparata immediatamente prima dell'uso e se ne consiglia il pronto impiego, poiché nel volgere di 24 ore perde totalmente la sua efficacia. Il prodotto a contatto con il terreno si disattiva, perdendo la sua efficacia; è pertanto sconsigliabile l'impiego di acque limacciose per preparare le soluzioni da irrorare.

ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO

E' consigliabile eseguire il trattamento con "BERELEX" con calma di vento e senza pericolo di pioggia per le successive 8 ore: tale lasso di tempo è infatti necessario per il totale assorbimento del "BERELEX" da parte delle colture trattate.

AVVERTENZA: Per consentire alla coltura di trasformare in un fenomeno positivo e duraturo l'effetto stimolante del "BERELEX", si consiglia di provvedere ad una idonea nutrizione delle piante trattate, assicurando una attiva disponibilità di tutti gli elementi nutritivi necessari per portare a maturazione l'aumentata produzione.

Si consiglia di distribuire un fertilizzante fogliare con "BERELEX".

COMPATIBILITÀ

"BERELEX" è compatibile con tutti i più comuni fitofarmaci, sostanze di crescita e fertilizzanti fogliari, purché il pH della soluzione non superi il valore di pH 7. Non è compatibile con soluzioni contenenti cloro libero. Comunque ogni qualvolta sia possibile, è sempre consigliabile usare il "BERELEX" da solo o in associazione soltanto con il fertilizzante fogliare.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

"BERELEX" IN AGRICOLTURA

Tra i regolatori di crescita l'acido gibberellico, principio attivo del "BERELEX", è una delle sostanze vegetali naturali più attive nello stimolare lo sviluppo delle piante, nell'anticipare la fioritura con la formazione di frutti precoci, nell'aumentare la produzione, nell'interrompere la dormienza di semi, giovani rami, bulbi e stoloni e nel ridurre la quantità di freddo necessaria ad ogni singola coltura. Applicato al momento opportuno ed alla dose consigliata, determinerà un accrescimento nel valore di uva, arance, limoni, pere, patate, carciofi, sedano ed altre colture floricole ed orticole. Alcuni impieghi dopo lunga sperimentazione sono oggi realizzabili su vasta scala. Per altri che riportiamo nel prospetto sotto il titolo "impieghi condizionati", si richiede invece una messa a punto locale che tenga conto delle epoche indicative ma modifichi la dose a seconda delle varietà e dell'ambiente in cui si deve operare. Per tali impieghi non si assume alcuna responsabilità, ma si offrono solo indicazioni di massima che dovranno servire per avviare una sperimentazione in loco, premessa indispensabile per una applicazione più precisa.

NOTA BENE: le dosi sono indicate in compresse di "BERELEX".

In ogni compressa di "BERELEX" è contenuto **1** grammo di acido gibberellico tecnico.

CAMPI DI IMPIEGO

PERO

Nel pero vi sono cultivar che producono frutti con semi normali derivanti cioè da un regolare processo di fecondazione, ed altre invece che producono frutti con semi atrofizzati (partenocarpici), cioè non derivanti da un processo di fecondazione.

Le cultivar che producono frutti con semi normali sono però spesso ostacolate nel loro regolare processo di fecondazione da:

- assenza o insufficienza di cultivar impollinatrici;
- fioritura non contemporanea delle cultivar associate;
- fiori insufficientemente forniti di sostanze nutritive;
- temperature troppo basse per consentire la normale formazione del polline e l'attività degli insetti pronubi;
- distruzione degli ovuli a causa di gelate tardive;
- luminosità troppo debole durante la fioritura;
- vento o pioggia perdurante.

Una applicazione razionale di "BERELEX" fatta in questi casi al momento opportuno, stimolerà lo sviluppo dei frutti con semi normali e nel contempo assicurerà una maggiore formazione dei frutti con semi atrofizzati. Tra le varietà che in Italia hanno reagito positivamente a trattamenti con "BERELEX" ricordiamo: Passacrassana, Trionfo di Vienna, Butirra Giffard, Coscia, William, Spadona, Gentilona, Spadoncina, Buona Luisa d'Avaranches. Tra quelle trattate all'estero ricordiamo la Butirra Hardy, Duca di Bordeaux, Butirra Durondeau, Favorita di Clapp, Giovanna d'Arco, Presidente Lotreuil, Clairgeau, Kaiser.

a) Tabella per NORD-ITALIA

PERI GIOVANI ALL'INIZIO DI PRODUZIONE

"BERELEX"
20 compresse per ha
Acqua
almeno 10 hl
"AGRAL"
100 ml per hl
Varietà: Trionfo di Vienna, Butirra Giffard, Passacrassana.
Epoca: Trattare quando il 20-30% dei fiori sono aperti e con tempo favorevole

PERI ADULTI IN PIENA PRODUZIONE

"BERELEX" 10-20
compresse per ha
Acqua
almeno 10 hl
"AGRAL"
100 ml per hl
Varietà: Trionfo di Vienna, Butirra Giffard, Passacrassana.
Epoca: Trattare quando il 20-30% dei fiori sono aperti e con tempo favorevole

PERI COLPITI DA UNA GELATA DURANTE LA FIORITURA

"BERELEX" 15-25
compresse per ha
Acqua
10-15 hl
"AGRAL"
100 ml per hl
Varietà: in genere.
Epoca: Trattare entro 48 ore dalla gelata, nelle ore più calde.
Attendere la piena fioritura se la gelata si verifica a fiore chiuso.

PERI IN ANNATA DI SCARICA

"BERELEX" 8-10
compresse per ha
Varietà: Coscia, William, Buona Luisa d'Avaranches ed altre.
Epoca: Trattare quando le piante sono in piena fioritura.
Questo trattamento permette di regolarizzare la produzione limitando contemporaneamente l'eccessiva fioritura nell'annata seguente.

b) Tabella per CAMPANIA

PERI ADULTI IN PIENA PRODUZIONE

"BERELEX" 10
compresse per ha
Acqua
10 hl
Varietà: Coscia precoce, Coscia di Firenze, Spadona, Spadoncina, Gentilona.
Epoca: Trattare quando circa il 90% dei fiori sono aperti.

AVVERTENZE:

- La preparazione della soluzione e l'esecuzione del trattamento dovranno essere effettuate con grande cura: dosi eccessive potrebbero modificare anche in misura notevole l'aspetto dei frutti e ridurre la fioritura nell'annata successiva.
- Un'allegagione notevole dopo un trattamento, significherà che la dose impiegata è stata troppo elevata.
- Evitare il trattamento quando vi sia pericolo di pioggia imminente.

La deformazione delle perine sul calice, molto visibile dopo la caduta dei petali, si attenuerà progressivamente nel corso dello sviluppo dei frutti e non avrà alcuna importanza economica al momento della raccolta, sempre che il trattamento sia stato fatto alle dosi consigliate. In alcune annate i peri producono naturalmente frutti più o meno anormali, che sono quelli derivanti dalla seconda fioritura.

- Se la gelata tardiva è stata troppo forte (-7 °C) o prolungata, il trattamento potrà risultare inefficace; i frutti presenteranno una zona annerita al centro, alcuni cadranno e non saranno commercializzabili.

DL 65/2003

- La ripetizione del trattamento, a dosi ridotte, sarà consigliabile solo su piante vigorose, quando una seconda gelata dovesse sopravvenire dopo 10-12 giorni dalla prima.
- I risultati migliori si ottengono su piante preventivamente potate.
- Si sconsigliano i trattamenti tardivi, e ciò per il motivo che l'accresciuta concorrenza della nuova vegetazione potrebbe accentuare la cascola di giugno.
- L'aumentata allegagione richiederà una concimazione proporzionalamente più elevata, per sopperire alle maggiori esigenze nutritive delle piante.
- Si sconsiglia l'impiego sulla Decana del Comizio; per le varietà non citate nella tabella converrà effettuare prove preliminari su piccola scala.

CARCIOFO

"BERELEX" PER ANTICIPARE LA PRODUZIONE DE CAPOLINI DI CARCIOFO

Con il "BERELEX" si può anticipare la produzione dei capolini od ottenere una "compressione" della raccolta nel periodo in cui i prezzi risultano più remunerativi. In molti casi si ottiene un miglioramento qualitativo, con gambi più lunghi e capolini compatti ed affusolati.

Varietà di carciofo che si possono trattare con il "BERELEX":

CASTELLAMARE, CARCIOFO DI OGNI MESE, CARCIOFO DI MOLA (MOLESE), MASEDU

Sono in corso sperimentazioni per estendere l'impiego ad altre cultivar.

Epoca d'impiego

a) Per anticipare le prime produzioni. Intervenire al momento della formazione del capolino centrale. Il periodo è facilmente individuabile grazie all'arricciamento delle foglie centrali ("orecchiette"). Un secondo trattamento alla dose minima potrà essere ripetuto subito dopo la prima raccolta.

b) Per anticipare produzioni successive alle prime. Intervenire 20 giorni prima del periodo nel quale si vuole ottenere il massimo raccolto.

c) Rinvigorimento della coltura. Intervenire con mezza compressa alla comparsa del primo abbozzo di cimarolo.

Ripetere il trattamento ogni 20 giorni circa.

N.B.: Su colture non forzate oppure là dove la tradizionale forzatura con irrigazione nei mesi caldi può essere causa di pericolosi marciumi, si potranno effettuare con "BERELEX" due trattamenti a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, di cui il primo 40-60 giorni avanti il periodo previsto per la raccolta del cimarolo.

Dosi d'impiego:

Per le varietà sopra citate la dose varia dalle 10 alle 20 ppm di Acido Gibberellico, pari a 1-2 compresse di "BERELEX" in 100 litri d'acqua. Effettuare una bagnatura completa ed abbondante di tutta la pianta de carciofo. Con pompe a spalla si richiedono in genere da 4 a 5 ettolitri per ettaro.

Effettuare l'irrorazione di preferenza nel tardo pomeriggio, evitando comunque le ore di pieno sole. Per le varietà che presentano difficoltà a trattenere la soluzione irrorata sarà bene aggiungere alla soluzione 100 ml/ hl del bagnante "AGRAL".

CONDIZIONI DA OSSERVARE PER OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI

Nei carciofeti in cui si impiega il "BERELEX" si ritiene indispensabile che vengano seguite le seguenti pratiche colturali:

1. Irrigare abbondantemente prima o subito dopo il trattamento
2. Aumentare proporzionalmente la concimazione minerale che, a seconda delle necessità di ogni tipo di terreno dovrà contenere sostanze azotate facilmente assimilabili. Intervenire anche con fertilizzanti fogliari, impiegati da soli od in miscela con il "BERELEX".
3. Ridurre, dove è possibile, le lavorazioni al terreno, in modo da lasciare intatto l'apparato radicale della coltura, che si troverà così nelle migliori condizioni per assorbire prontamente acqua e sostenze fertilizzanti.
4. Intervenire tempestivamente per impedire le infestazioni di afidi ed altri parassiti animali.

LIMITI DEL BERELEX

La "forzatura chimica" del carciofo pone la coltura in condizioni di maggior sensibilità nei riguardi delle condizioni climatiche ed ambientali. Sbalzi di temperatura, inadeguate concimazioni, insufficiente umidità del terreno, intempestiva o incompleta protezione dai parassiti, possono compromettere i risultati sperati. Tra queste condizioni particolare importanza riveste la frequenza delle gelate. Prima di impiegare il "BERELEX" si dovrà pertanto attendere che la pianta sia in grado di fornire i massimo della produzione prima del sopraggiungere del periodo in cui normalmente si verificano abbassamenti di temperatura prossimi allo 0 °C. In tal condizioni l'impiego del "BERELEX" potrà essere spostato e precisamente:

- anticipato, in modo da assicurare al coltivatore una buona produzione prima dei freddi;
- posticipato, per stimolare la ripresa delle piante che abbiano subito danni di una gelata, allorché le temperature si saranno riportate su livelli sufficienti a sostenere una crescita accelerata della coltura.

In quest'ultimo caso si dovrà comunque attendere, intervenendo solo quando le piante si saranno completamene riprese dai danni da gelo e soltanto su colture immuni da attacchi parassitari e in buone condizioni di salute.

FRAGOLA

Il trattamento con "BERELEX" viene fatto per aumentare il raccolto delle fragole durante i primi due mesi di produzione, quando i prezzi sono più alti.

Cultivar che possono essere trattate:

Gorella, Pochaontas, Red Gauntlet, Cambridge, Favorita, Surprise des Halles. Sono in corso altre prove su altre cultivar.

Epoca d'impiego: intervenire con "BERELEX" 30-40 giorni prima della fioritura.

Dosi d'impiego: 1-4 compresse di "BERELEX" in 100 litri d'acqua.

Dose normale: 2-3 compresse.

È consigliabile l'aggiunta di 100 ml d "AGRAL". In media si richiedono da 3 a 4 ettolitri di soluzione per ettaro con pompe a spalla, e da 6 a 8 hl/ha con motopompe. Bagnare molto bene la parte centrale ("cuore") delle piantine. Adottare le dosi più alte nelle zone dove l'andamento dei prezzi porterà a "comprimere" la produzione nel primo mese di raccolta e viceversa adottare le dosi più basse là dove si voglia diluire la produzione in un periodo lungo (40-60 giorni).

CONDIZIONI DA OSSERVARE PER OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI

Con il "BERELEX" si interrompe la dormienza, si stimola la crescita della pianta, si anticipa e si aumenta la fioritura. Affinché i risultati di produttività siamo i più favorevoli sarà necessario fornire alla coltura tutti gli elementi necessari a trasformare lo "stimolo" alla crescita in un fatto duraturo e cioè:

- pratiche colturali razionali (tra cui il diserbo);
- concimazione equilibrata (si prestano molto bene anche i fertilizzanti fogliari ricchi di azoto);
- sufficiente umidità del terreno;
- lotta tempestiva contro tutti i parassiti fungini ed animali.

AVVERTENZE

Si sconsiglia l'impiego del "BERELEX" per la coltura di fragole in pieno campo nelle località soggette a repentini abbassamenti della temperatura.

La caduta della temperatura a livelli prossimi allo 0 °C, sempre pericolosa per le colture forzate, può causare danni in un fragoleto in attiva fase di crescita; si potrà avere aborto fiorale con un ritardo nella comparsa degli effetti benefici del "BERELEX". In tali zone intervenire solo su coltura sotto tunnel o in serra. La possibilità di un riscaldamento artificiale nelle giornate più fredde consentirà al "BERELEX" di esplicare appieno la propria azione.

UN SUGGERIMENTO PRATICO

L'effetto del "BERELEX" come del resto avviene per tutti i prodotti ormonici, può variare a seconda della varietà, dello stadio di sviluppo e dall'ambiente in cui si opera. Le norme esposte in questo volantino hanno perciò un valore meramente indicativo, anche se sono il risultato di una complessa sperimentazione protrattasi per più anni in diverse zone d'Italia. Sarà bene pertanto che ogni fragolicoltore effettui prove su piccola scala prima di passare al trattamento di tutta la superficie coltivata a fragola.

IMPIEGHI CONDIZIONATI

Le applicazioni di "BERELEX" sulle colture sotto indicate sono soggette a notevoli variazioni, dovute alla presenza nelle piante di Acido Gibberellico di formazione endogena (cioè normalmente prodotto dalle piante stesse), alle condizioni ambientali locali e alle numerose varietà coltivate in Italia. Non è pertanto possibile fornire consigli sicuri e generalizzabili. Anche con dosi normali di "BERELEX" si rischierebbe di superare le quantità ottimali di Gibberelline in circolo nella pianta e ciò potrebbe significare diminuzione di produzione, alterazione dei frutti ed anche, in casi estremi, danni alla coltura stessa. Pertanto le notizie che seguono devono essere considerate come semplici informazioni orientative per la messa a punto locale, esigenza indispensabile prima di iniziare qualsiasi trattamento su vasta scala in pieno campo. Si consiglia di saggiare dapprima le dosi più basse, elevandole gradualmente secondo i risultati via via raggiunti.

VITE: uve senza semi

per aumentare la grossezza degli acini e la produzione trattare dopo l'allegagione, nel periodo dell'incisione anulare. Bagnare solo il grappolo.

Dose di "BERELEX": 10-40 compresse in 10 quintali di acqua con 1,5 l di "Agral".

VITE: uva con semi

per allungare il grappolo e distanziare gli acini consentendo così una migliore esposizione all'aria e alla luce e riducendo le condizioni favorevoli allo sviluppo della Botrytis (muffa grigia). Effettuare una irrorazione quando i getti sono lunghi 5-10 cm.

Dose di "BERELEX": 0,5-1 compressa per quintale di acqua, con 100 ml di "Agral".

Hanno dato risultati positivi le seguenti varietà: Barbera, Dolcetto, Muller, Nebbiolo, Tocai. Per le altre varietà non si hanno per ora indicazioni utili. Attenzione: un aumento delle dosi di impiego o l'intervento in un periodo diverso da quello indicato potrebbe compromettere lo sviluppo delle piante. Trattare solo viti sane, rigogliose e ben sviluppate. E' sempre utile intervenire con fertilizzanti fogliari.

ARANCIO

Per migliorare la qualità della buccia dei frutti, facilitare la conservazione e prevenire a cascola intervenire quando la colorazione dei frutti è soddisfacente per la commerciabilità del prodotto.

Dose di "BERELEX": 25-30 compresse per ettaro in 50 quintali di acqua, con 6 - 8 l di "Agral".

LIMONE

Per aumentare il numero di frutti grossi e ritardare la data di raccolta trattare subito prima dell'ingiallimento dei frutti.

Dose di "BERELEX": 25-50 compresse in 50 quintal di acqua, con 68 l di Agral.

CLEMENTINE

Per ottenere una maggiore produzione nelle località dove questi ibridi forniscono raccolte scarse si consiglia di trattare tutta la pianta quando circa i 2/3 dei fiori hanno perso i petali o sono in piena fioritura.

Dose di "BERELEX": 1 compressa per quintale di acqua.

DL 65/2003

COLTURE FIORALI IN PIENO CAMPO

Molte colture da fiore reagiscono positivamente all'azione dell'Acido Gibberellico, anticipando ed aumentando la fioritura e molte volte portando alla formazione di fiori più grossi e con steli allungati. I trattamenti a dosi basse potranno essere ripetuti a distanza di 20-30 giorni, iniziando dalla fase della comparsa dei primi boccioli. Risultati positivi si sono ottenuti su Ortensie, Cactus, Crisantemi, Ciclamini, Anemoni, Fiordalisi.

Dosi di "Berelex": da 1 a 2 compresse per quintale di acqua.

COLTURE ORTIVE

LATTUGA

A. per aumentare la produzione di semi: effettuare trattamenti ripetuti a partire dalla 4a-8a foglia;

Dose di "BERELEX": 1 compressa per quintale di acqua.

B. in primavera ed autunno per accelerare la crescita ed aumentare la produzione effettuare un trattamento con "BERELEX" quando le piante hanno già formata la 7a-8a impalcatura di foglie, vale a dire circa 20 giorni prima della raccolta.

Dose di "BERELEX": 1-1,5 compressa per quintale di acqua usando la dose bassa a temperatura alta (15 °C).

POMODORO

Un aumento dell'allegagione si può ottenere spruzzando la soluzione di "BERELEX" all'interno di ogni fiore, ripetendo il trattamento alla comparsa di ogni corimbo fiorale. In miscela con l'acido paraclorofenossiacetico, a dosi che devono essere studiate zona per zona, si potranno eliminare le note deformazioni dovute a questo principio attivo.

Dose di "BERELEX": 1-2 compresse per quintale d'acqua.

SEDANO

Per aumentare la lunghezza del germoglio e il rendimento, trattare da due a quattro settimane prima della raccolta. Questa tecnica non è indifferentemente efficace per tutte le varietà.

Dose di "BERELEX": 2-4 compresse per quintale d'acqua.

PATATA

Per interrompere la quiescenza dei tuberi da seme e stimolare lo sviluppo dei germogli, immergere per 10 minuti i tuberi selezionati in una soluzione di "BERELEX". In molti casi questo trattamento ha consentito un aumento della produzione.

Dose di "BERELEX": per tuberi interi, 0,5 compressa di "BERELEX" per quintale d'acqua; per tuberi tagliati, 0,1 di compressa di "BERELEX" per quintale d' acqua.

AVVERTENZE

Le pastiglie di "BERELEX" devono essere conservate in luogo asciutto e nei loro contenitori originali ben chiusi, a temperature inferiori ai 20 °C; mai al di sopra di 30°C. In queste condizioni il prodotto si conserva perfettamente senza alcun termine di scadenza e senza subire alterazioni di sorta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

® Marchio registrato

DL 65/2003

ETICHETTA RIDOTTA

BERELEX®

Fitoregolatore in compresse a base di acido gibberellico per impiego in frutticoltura, orticoltura, floricoltura di pieno campo o in serra e viticoltura

COMPOSIZIONE		
Acido gibberellico (Gibberellina A_3)	g	9,4
Coformulanti q.b.a	g	100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Valent BioSciences

una divisione della

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.

Parc d'Affaires de Crécy - 2, Rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

Distribuito da: **Syngenta Crop Protection S.p.A.** - Via Gallarate, 139 - Milano

Stabilimento di produzione: **Medentech Ltd.** – Wexford, Irlanda

Registrazione Ministero della Sanità n° 5363 del 30.06.1983

Partita N.: vedere margine etichetta Contenuto: **100 g (10 pastiglie da 10 g)**

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato

DL 65/2003

Etichetta/foglio illustrativo

Biobit® XL

Insetticida biologico in sospensione liquida selettivamente attivo sulle larve di lepidotteri

BIOBIT XL Registrazione del Ministero della Sanità n. 9976 del 05.03.1999

Composizione:

Bacillus thuringiensis varietà *kurstaki*, sierotipo 3A3B (potenza 10.600 UI/mg di formulato) g 2,2 (= 25 g/L)

Coformulanti .... q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

Valent BioSciences una Divisione di
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy
2 Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or – Francia

Contenuto:
ml 100, 250, 500 - litri 1, 5, 10, 20

Stabilimento di produzione:
A-Z Drying – Osage, Iowa (U.S.A.)

Distribuito da:

Partia N° .....

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Usare indumenti di protezione per agenti biologici, classificati come dispositivi di protezione individuale e con relativa marcatura CE per la protezione da agenti biologici, e guanti, quali dispositivi di protezione individuale con relativa marcatura CE e conformità alla EN 374

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto agisce per ingestione sulle larve di Lepidotteri, con interventi preferibilmente su larve giovani, subito dopo la loro comparsa, eventualmente ripetuti ad intervalli di 812 giorni. Le larve, subito dopo il trattamento, cessano di nutrirsi morendo entro 2-5 giorni.

Una completa ed uniforme applicazione garantisce i migliori risultati.

Il prodotto, data la sua particolare formulazione, può essere utilizzato sia con attrezzature atte a distribuire un volume medio-alto di acqua (fino a 1000 litri di acqua per ettaro), sia con attrezzature per bassi volumi (20-120 litri per ettaro).

AGRUMI: Tignola: 1,7-2,5 L/ha

POMACEE: Falene defogliatrici, Ifantria: 0,3-0,5 L/ha; Tortici: 1,7-3 L/ha

VITE: Tignole, Ifantria: 1,7-3 L/ha

OLIVO: Tignola, Ifantria: 1,7-2,5 L/ha

ACTINIDIA: Eulia e Tignola: 1,7-3 L/ha

DRUPACEE: Cidia, Anarsia, Ifantria: 1,7-3 L/ha

FRAGOLA: Piralide, Pandemis, Eulia: 1,5-1,8 L/ha

ORTAGGI A FOGLIA, ERBE FRESCHE, FAGIOLO, FAGIOLINO, CARDO, SEDANO, FINOCCHIO, CARCIOFO, PORRO:

- Nottue, Udea e Vanessa del cardo: 1,3-1,5 L/ha
- Cavolaie e Plutella: 0,5-0,8 L/ha
- Falene defogliatrici, Tortrici, Ifantria: 1,7-3 L/ha

SOLANACEE (Pomodoro, Melanzana, Peperone), CUCURBITACEE (Zucca, Zucchino, Cetriolo, Melone, Cocomero) E TABACCO:

- Nottue e Piralide: 1,5-1,8 L/ha
- Falene defogliatrici, Tortrici, Ifantria: 1,7-3 L/ha

CAVOLI, RAPA, RAVANELLO, COLZA, RAVIZZONE: Cavolaie, Tignola: 0,5-0,8 L/ha

PATATA: Ifantria, Tignola: 1,7-3 L/ha

MAIS: Piralide, Ifantria: 1,7-3 L/ha

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, BIETOLA ROSSA: Mamestra, Tignola, Ifantria: 1,7-3 L/ha

SOIA, GIRASOLE E COTONE: Vanessa (Vanessa cardui), Nottue, Ifantria: 1,7-3 L/ha

COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI, TAPPETI ERBOSI E VIVAI: larve di Lepidotteri defogliatori, Ifantria: 1,7-3 L/ha

Negli impieghi su tappeti erbosi obbligo di segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.

ESSENZE FORESTALI, PIOPPO E CASTAGNO: Processionarie, Limantrie, Ifantria, Stilpnotia: 1,7-3 L/ha

AVVERTENZE:

- Il prodotto va conservato nelle confezioni oroginali sigillate, in luoghi freschi ed asciutti al riparo dalla luce diretta e fonti di calore. Il prodotto conservato in queste condizioni a 5°C rimane stabile per almeno due anni. L'esposizione prolungata a temperature superiori a 25°C riduce la vita media del prodotto. Chiudere ermeticamente la confezione parzialmente utilizzata.
- Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Impiegare il prodotto entro 72 ore dalla sua diluizione in acqua.
- Evitare l'applicazione in previsione di imminenti piogge.
- Evitare i trattamento con temperature inferiori a 10°C data la scarsa attività nutritiva delle larve alle basse temperature.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto si impiega normalmente da solo. Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli insetticidi, acaricidi, adesivi, ad eccezione di quelli nettamente alcalini come la poltiglia bordolese che ne riduce l'efficacia. Evitare la miscelazione con prodotti contenenti solventi organici.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

® Marchio registrato

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto

Biobit® XL

Insetticida biologico in sospensione liquida selettivamente attivo sulle larve di lepidotteri

BIOBIT XL Registrazione del Ministero della Sanità n. 9976 del 05.03.1999

Composizione:
Bacillus thuringiensis varietà *kurstaki*, sierotipo 3A3B
(potenza 10.600 UI/mg di formulato) g 2,2 (= 25 g/L)
Coformulanti .... q.b. a g 100

Contenuto:
ml 100

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

Partita N° .....

Valent BioSciences una Divisione di
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 2 Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or – Francia

Distribuito da:
....

Stabilimento di produzione:
A-Z Drying – Osage, Iowa (U.S.A.)

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Usare indumenti di protezione per agenti biologici, classificati come dispositivi di protezione individuale e con relativa marcatura CE per la protezione da agenti biologici, e guanti, quali dispositivi di protezione individuale con relativa marcatura CE e conformità alla EN 374

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato

Etichetta/foglio illustrativo

DiPel® 8L SC

Insetticida biologico in Sospensione Concetrata a base di *Bacillus thuringiensis,* varietà *kurstaki*
ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:
Bacillus thuringiensis varietà *kurstaki*, ceppo HD-1, sierotipo 3a3b (Potenza 17.600 UI/mg di formulato) ... g 3,5 (= 33 g/L)
Coformulanti .... q.b. a g 100
Contiene *Bacillus thuringiensis* varietà *kurstaki*, ceppo HD-1, sierotipo 3a3b: può provocare una reazione allergica

VALENT BioSciences
Valent BioSciences una Divisione di
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy
2 Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or – Francia

Stabilimento di produzione: **A-Z Drying – Osage, Iowa (U.S.A.)**

Registrazione n. 9530 del 20/02/1998 del Ministero della Salute

Contenuto: **50 – 100 – 200 – 250 – 500 ml; 1 – 5 – 10 – 20 L**

Partita N°..........

Distribuito da:
SIAPA Srl – Via Caldera, 21 – 20153 Milano
ISAGRO ITALIA Srl – Via Caldera, 21 – 20153 Milano

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI:
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODO D'AZIONE
Il prodotto agisce esclusivamente per ingestione sulle larve di lepidotteri che interrompono il processo di alimentazione dopo poche ore dall'ingestione, arrivando alla morte anche dopo qualche giorno. Per una efficace azione si raccomanda di trattare popolazioni di larve nei primi stadi di sviluppo.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi di seguito riportate riferite ad un ettaro di superficie, da irrorarsi con una quantità d'acqua sufficiente a garantire la completa copertura delle colture da difendere.
Agrumi: Tignola: 1-1,5 L/ha
Pomacee: Falene defogliatrici, Ifantria 0,5-1 L/ha; Tortrici: 1-2 L/ha
Vite: Tignole, Ifantria 1-2 L/ha
Olivo: Tignola, Ifantria 1-1,5 L/ha
Actinidia: Eulia e Tignola 1-2 L/ha
Drupacee: Cidia, Anarsia, Ifantria 1-2 L/ha
Fragola: Piralide, Pandemis, Eulia 1-1,2 L/ha
Ortaggi a foglia, Erbe fresche, Fagiolo, Fagiolino, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo, Porro:
- Nottue, Udea e Vanessa del Cardo 0,8-1 L/ha
- Cavolaie e tignola (Plutella) 0,3-0,5 L/ha
- Falene defogliatrici, Ifantria 0,5-1 L/ha; Tortrici 1-2 L/ha

Solanacee (Pomodoro, Melanzana, Peperone) e Cucurbitacee (Zucca, Zucchino, Cetriolo, Melone, Cocomero):
- Nottue e Piralide 1-1,2 L/ha
- Falene defogliatrici, Ifantria, Tortrici 1-2 L/ha

Cavoli, Rapa, Ravanello, Colza, Ravizzone: Cavolaie, Tignola 0,3-0,5 L/ha
Patata: Ifantria, Tignola 1-2 L/ha
Mais: Piralide, Ifantria 1-2 L/ha
Barbabietola da zucchero, Bieta rossa: Mamestra, Tignola, Ifantria 1-2 L/ha
Soia: Vanessa (Vanessa cardui), Ifantria 1-2 L/ha
Girasole e Cotone: Nottue, Ifantria 1-2 L/ha
Colture floreali ed ornamentali, Tappeti erbosi e vivai: Larve di lepidotteri defogliatori, Ifantria 1-2 L/ha
Avvertenza: In caso di impiego su tappeti erbosi non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento, segnalando con appositi cartelli il divieto di accesso nelle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione .
Essenze forestali: Processionarie, Limantrie, Ifantria 1-1,5 L/ha
Pioppo: Stilpnozia, Ifantria 1-1,5 L/ha

MODALITÀ DI APPLICAZIONE: applicare il prodotto preferibilmente nelle ore più fresche della giornata con attrezzature che, munite di pompe a volume, distribuiscano volumi medio-alti di acqua. L'aggiunta di un bagnante-adesivante può essere utile per ottenere una migliore distribuzione e persistenza del prodotto.

AVVERTENZE
- Conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato;
- Chiudere ermeticamente le confezioni parzialmente utilizzate;
- Evitare l'esposizione diretta delle confezioni ai raggi solari;
- A temperatura ambiente e in confezioni integre, il prodotto è stabile per almeno 2 anni.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: diluire il prodotto in poca acqua a parte ed aggiungere, sempre mescolando, al totale quantitativo di acqua. Distribuire la miscela acquosa entro 12 ore dalla sua preparazione, con pompe a volume normale.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con sostanze alcaline (es. calce e poltiglia bordolese alcalina).
ATTENZIONE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere il trattamento 3 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

® Marchio registrato

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto

DiPel® 8L SC

Insetticida biologico in Sospensione Concetrata
a base di *Bacillus thuringiensis,* varietà *kurstaki*

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione: Contenuto: **50 – 100 ml**

Bacillus thuringiensis varietà *kurstaki*, ceppo HD-1, sierotipo 3a3b .. g 3,5 (= 33 g/L)
(Potenza 17.600 UI/mg di formulato)
Coformulanti .... q.b. a g 100

Contiene *Bacillus thuringiensis* varietà *kurstaki*, ceppo HD-1, sierotipo 3a3b: può provocare una reazione allergica

Valent BioSciences una Divisione di
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy
2 Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or – Francia

Registrazione del Ministero della Salute n. 9530 del 20/02/1998

Partita N°...........

Distribuito da: **SIAPA Srl – Via Caldera, 21 – 20153 Milano**
ISAGRO ITALIA Srl – Via Caldera, 21 – 20153 Milano

Stabilimento di produzione:
A-Z Drying – Osage, Iowa (U.S.A.)

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato

DL 65/2003

Etichetta/foglio illustrativo

DiPel® HPWP

Insetticida biologico in polvere bagnabile a base di *Bacillus thuringiensis,* varietà *kurstaki*

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:
Bacillus thuringiensis varietà *kurstaki*, ceppo HD-1, sierotipo 3a3b .... g 6,4
(Potenza 32.000 UI/mg di formulato)
Coformulanti .... q.b. a g 100

Contiene *Bacillus thuringiensis*: può provocare una reazione allergica

Valent BioSciences una Divisione di
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy
2 Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or – Francia

Stabilimenti di produzione:
A-Z Drying – Osage, Iowa (U.S.A.)
ISAGRO SpA – Aprilia (Latina)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9531 del 20/02/1998

Contenuto: Partita
g 50 – 100 – 250 – 500 Kg 1 – 5 – 10 -25 N°......

Distribuito da:
SIAPA Srl – Via Caldera, 21 – 20153 Milano

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI:
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODO D'AZIONE
Il prodotto agisce esclusivamente per ingestione sulle larve dei lepidotteri che interrompono il processo di alimentazione dopo poche ore dall'ingestione, arrivando alla morte anche dopo qualche giorno. Per una efficace azione si raccomanda di trattare popolazioni di larve nei primi stadi di sviluppo.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi di seguito riportate riferite ad un ettaro di superficie, da irrorarsi con una quantità d'acqua sufficiente a garantire la completa copertura delle colture da difendere.
AGRUMI: Tignola: 600-800 g/ha
POMACEE: Falene defogliatrici, Ifantria 300-500 g/ha; Tortrici: 600-1000 g/ha
VITE: Tignole, Ifantria: 600-1000 g/ha
OLIVO: Tignola, Ifantria: 600-800 g/ha
ACTINIDIA: Eulia e Tignola: 600-1000 g/ha
DRUPACEE: Cidia, Anarsia, Ifantria: 600-1000 g/ha
FRAGOLA: Piralide, Pandemis, Eulia: 550-600 g/ha
ORTAGGI A FOGLIA, ERBE FRESCHE, FAGIOLO, FAGIOLINO, CARDO, SEDANO, FINOCCHIO, CARCIOFO, PORRO:
- Nottue, Udea e Vanessa del Cardo: 450-500 g/ha
- Cavolaie e tignola (Plutella): 200-250 g/ha
- Falene defogliatrici, Tortrici, Ifantria: 600-1000 g/ha

SOLANACEE (Pomodoro, Melanzana, Peperone) e Cucurbitacee (Zucca, Zucchino, Cetriolo, Melone, Cocomero):
- Nottue e Piralide: 550-600 g/ha
- Falene defogliatrici, Tortrici, Ifantria: 600-1000 g/ha

CAVOLI, RAPA, RAVANELLO, COLZA, RAVIZZONE: Cavolaie, Tignola: 200-250 g/ha
PATATA: Ifantria, Tignola: 600-1000 g/ha
MAIS: Piralide, Ifantria: 600-1000 g/ha
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, BIETA ROSSA: Mamestra, Tignola, Ifantria: 600-1000 g/ha
SOIA: Vanessa (Vanessa cardui), Ifantria: 600-1000 g/ha
GIRASOLE E COTONE: Nottue, Ifantria: 600-1000 g/ha
COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI, TAPPETI ERBOSI E VIVAI: Larve di lepidotteri defogliatori, Ifantria: 600-1000 g/ha
Avvertenza: In caso di impiego su tapperi erbosi non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento, segnalando con appositi cartelli il divieto di accesso nelle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione .
ESSENZE FORESTALI: Processionarie, Limantrie, Ifantria: 600-800 g/ha
PIOPPO: Stilpnozia, Ifantria: 600-800 g/ha

MODALITÀ DI APPLICAZIONE: applicare il prodotto preferibilmente nelle ore più fresche della giornata con attrezzature che, munite di pompe a volume, distribuiscano volumi medio-alti di acqua. L'aggiunta di un bagnante-adesivante può essere utile per ottenere una migliore distribuzione e persistenza del prodotto.

AVVERTENZE
- Conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato;
- Chiudere ermeticamente le confezioni parzialmente utilizzate;
- Evitare l'esposizione diretta delle confezioni ai raggi solari;
- A temperatura ambiente e in confezioni integre, il prodotto è stabile per almeno 2 anni.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Sciogliere il prodotto in poca acqua a parte ed aggiungere, sempre mescolando, al totale quantitativo di acqua. Distribuire la miscela acquosa entro 12 ore dalla sua preparazione, con pompe a volume normale.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con sostanze alcaline (es. Calce e Poltiglia Bordolese alcalina).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere il trattamento 3 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

® Marchio registrato Sumitomo Chemical Agro Europe - Francia

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto

DiPel® HPWP

Insetticida biologico in polvere bagnabile
a base di *Bacillus thuringiensis,* varietà *kurstaki*

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:
Bacillus thuringiensis varietà *kurstaki*, ceppo HD-1, sierotipo 3a3b g 6,4
...
(Potenza 32.000 UI/mg di formulato) g 100
Coformulanti .... q.b. a
Contiene *Bacillus thuringiensi s*: può provocare una reazione allergica

VALENT BioSciences

Valent BioSciences una Divisione di
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 2 Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or – Francia

Contenuto:
g 50 – 100

Stabilimenti di produzione:
A-Z Drying – Osage, Iowa (U.S.A.)ISAGRO SpA – Aprilia (Latina)

Partita N°......

Registrazionedel Ministero della Sanità n. 9531 del 20/02/1998

Distribuito da: **SIAPA Srl – Via Caldera, 21 – 20153 Milano**

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI:
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato Sumitomo Chemical Agro Europe - Francia

DL 65/2003

Etichetta/foglio illustrativo

Florbac®

Insetticida biologico in microgranuli idrodispersibili selettivamente attivo sulle larve di lepidotteri

Composizione:
Bacillus thuringiensis subsp. *aizawai*, sierotipo H7 g 10
.....
(Potenza 15.000 U.I./mg di formulato) g 100
Coformulanti ed inerti .... q.b. a

Contiene *Bacillus thuringiensis* subsp. *aizawai*, sierotipo H7 può provocare una reazione allergica

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Valent BioSciences una Divisione di
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy
2 Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or – Francia

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione): **A-Z Drying – Osage, Iowa (U.S.A.)**

Stabilimento di confezionamento: **ISAGRO SpA – Aprilia (Latina)**

Registrazione n. 12066 del 30/03/2004 del Ministero della Salute

Contenuto: **g 50, 100, 250, 500, kg 1-5-10-25**

Partita N°..........

Data di produzione: ....

Distribuito da:
SIAPA Srl – Via Caldera, 21 – 20153 Milano

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI:
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO:
Il prodotto va impiegato appena compaiono le larve. E' preferibile operare nel tardo pomeriggio, per minimizzare gli effetti negativi dei raggi U.V. E' consigliabile ripetere il trattamento una seconda volta a distanza di 7-14 gg. in relazione al grado di infestazione da combattere.
Riempire per metà il serbatoio con acqua, versare la necessaria quantità di prodotto, miscelare e mantenendo in agitazione, riempire il serbatoio a volume.
Irrorare con attrezzature che, munite di pompe a volume, distribuiscano un volume medio-alto di acqua.
Agrumi: Tignola: 60-80 g/hl (600-2400 g/ha)
Pomacee: Falene defogliatrici, Ifantria 30-50 g/hl (150-750 g/ha); Tortrici: 60-100 g/hl (300-1500 g/ha)
Vite: Tignole, Ifantria: 60-100 g/hl (300-2500 g/ha)
Olivo: Tignola, Ifantria: 60-80 g/hl (600-2400 g/ha)
Actinidia: Eulia e Tignola: 60-100 g/hl (300-1000 g/ha)
Drupacee: Cidia, Anarsia, Ifantria: 60-100 g/hl (300-1000 g/ha)
Fragola: Piralide, Pandemis, Eulia: 55-60 g/hl (80-300 g/ha)
Ortaggi a foglia, Erbe fresche, Fagiolo, Fagiolino, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo, Porro:
- Nottue, Udea e Vanessa del Cardo: 45-50 g/hl (450-750 g/ha)
- Cavolaie e Plutella: 20-25 g/hl (200-375 g/ha)
- Falene defogliatrici, Tortrici, Ifantria: 60-100 g/hl (600-1500 g/ha)
Solanacee (Pomodoro, Melanzana, Peperone), Cucurbitacee (Zucca, Zucchino, Cetriolo, Melone, Cocomero) e Tabacco:
- Nottue e Piralide: 45-50 g/hl (450-750 g/ha)
- Falene defogliatrici, Tortrici, Ifantria: 60-100 g/hl (600-1500 g/ha)
Cavoli, Rapa, Ravanello, Colza, Ravizzone: Cavolaie, Tignola: 20-25 g/hl (200-350 g/ha)
Patata: Ifantria, Tignola: 60-100 g/hl (600-1500 g/ha)
Mais: Piralide, Ifantria: 60-100 g/hl (600-2000 g/ha)
Barbabietola da zucchero, Bieta rossa: Mamestra, Tignola, Ifantria: 60-100 g/hl (600-1500 g/ha)
Soia, Girasole, Cotone: Vanessa (Vanessa cardui), Nottue, Ifantria: 60-100 g/hl (600-2000 g/ha)
Colture floreali ed ornamentali, Tappeti erbosi(*) e vivai: Larve di lepidotteri defogliatori, Ifantria: 60-100 g/hl (300-1000 g/ha).
(*) Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento, segnalando con appositi cartelli il divieto di accesso nelle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione .
Essenze forestali e Pioppo: Processionarie, Limantrie, Ifantria, Stilpnotia: 60-80 g/hl (1500-4000 g/ha)

AVVERTENZA
Il prodotto va conservato nelle confezioni originali sigillate, in luoghi freschi ed asciutti al riparo da luce diretta e fonti di calore. In queste condizioni la formulazione a temperatura ambiente (21-24°C) conserva la sua efficacia per tre anni.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari, ad eccezione di quelli nettamente alcalini come la poltiglia bordolese che ne riduce l'efficacia.
ATTENZIONE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere il trattamento 3 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI IER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.
® Marchio registrato Valent Biosciences Corporation, U.S.A.

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto

Florbac®

Insetticida biologico in microgranuli idrodispersibili selettivamente attivo sulle larve di lepidotteri

Composizione:
Bacillus thuringiensis subsp. *aizawai*, sierotipo H7 ... g 10
(Potenza 15.000 U.I./mg di formulato)
Coformulanti ed inerti .... q.b. a g 100

Contiene *Bacillus thuringiensis* subsp. *aizawai*, sierotipo H7 può provocare una reazione allergica

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Valent BioSciences una Divisione di
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy
2 Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or – Francia

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione)
A-Z Drying – Osage, Iowa (U.S.A.)
Stabilimento di confezionamento: **ISAGRO SpA – Aprilia (Latina)**

Registrazione n. 12066 del 30/03/2004 del Ministero della Salute

Contenuto: **g 50, 100**

Partita N°.......... Data di produzione: ....

Distribuito da:
SIAPA Srl – Via Caldera, 21 – 20153 Milano

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato Valent Biosciences Corporation, U.S.A.

DL 65/2003

Foray® 48B

Insetticida biologico in Sospensione Liquida selettivamente attivo sulle larve di lepidotteri

FORAY 48B Registrazione del Ministero della Sanità n. 9977 cel 05.03.1999

Composizione:

Bacillus thuringiensis varietà *kurstaki*, sierotipo 3A3B g 2,2 (=25 g/L)

(Potenza 10.600 UI/mg di formulato)

Coformulanti .... q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

Valent BioSciences una Divisione di
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy
2 Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or – Francia

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
A-Z Drying – Osage, Iowa (U.S.A.)
Stabilimento di confezionamento:
ISAGRO SpA – Aprilia (Latina)
Distribuito da:
ISAGRO ITALIA Srl - Via Caldera, 21 – 20153 Milano
SIAPA Srl – Via Caldera, 21 – 20153 Milano

Contenuto: **litri 1 - 5 - 10 - 20 – 25 – 50 – 100 - 200**

Partita N°........ Data di produzione: ......

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Usare indumenti di protezione per agenti biologici, classificati come dispositivi di protezione individuale e con relativa marcatura CE per la protezione da agenti biologici, e guanti, quali dispositivi di protezione individuale con relativa marcatura CE e conformità alla EN 374

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida biologico che agisce per ingestione sulle larve di Lepidotteri.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Intervenire su larve giovani, al momento della loro prima comparsa, preferibilmente appena dopo la completa schiusura delle uova. A poche ore dal trattamento le larve cessano di nutrirsi e muoiono entro 2-5 giorni. Se necessario ripetere il trattamento dopo 8-12 giorni.
Assicurare una completa ed uniforme copertura delle parti verdi delle piante trattate.
Intervenire preferibilmente su vegetazione asciutta in assenza di imminenti piogge.

Colture Forestali di Latifoglie e Aghifoglie, Pioppo e Castagno:
- Tortrice verde delle querce (*Tortrix viridana*): 2-3 L/ha
- Falena defogliatrice (*Operophtera brumata*): 1,5-2 L/ha
- Bombice dal ventre bruno (*Euproctis chrysorroea*): 1,5-2 L/ha
- Bombice dispari (*Lymantria dispar*): 2-5 L/ha
- Stilpnozia del salice (*Stilpnotia salicis*): 2-3 L/ha
- Ifantria americana (*Hyphantria cunea*): 1,5-2 L/ha
- Limantria (*Lymantria monaca*): 4 L/ha
- Processionaria della quercia (*Thaumatopoea processionea*): 2-4 L/ha
- Dasichira (Dasychira putibunda): 2-3 L/ha
- Processionaria del pino (*Thaumatopoea pityocampa*): 2-3 L/ha

Modalità di distribuzione
Impiegare il prodotto con sistemi di atomizzazione concenzionali a bocchetta ed ugello, operando con volumi fino a 200 litri/ha, diluendo quindi la dose prescelta e scegliendo ugelli in grado di spruzzare goccioline da 100 a 250 micron (es. Teejet 8004).

Istruzioni per l'uso
Agitare bene il prodotto prima dell'uso e farlo circolare per 10 minuti all'interno del sistema di distribuzione prima di iniziare il trattamento.
Una volta diluito in acqua distribuire il prodotto entro 24 ore.

Conservazione del prodotto: il **Foray 48B** è un prodotto biologico, pertanto richiede uno stoccaggio adeguato. Conservare nelle confezioni originali sigillate, in luogo asciutto, ventilato e fresco (5°C): in queste condizioni il prodotto rimane stabile per almeno due anni. Se la confezione non viene completamente utilizzata deve essere chiusa in modo ermetico. La conservabilità del prodotto si riduce quando viene esposto a temperature superiori a 25°C per consistenti periodi di tempo.

Avvertenze: Durante il trattamento è vietato l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone estranee e agli operatori non adeguatamente equipaggiati e protetti.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega preferibilmente da solo. Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza. Sospendere i trattamenti su castagno 3 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO*

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Per le confezioni da 100 e 200 litri:
Contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo; non disperdere nell'ambiente.
Per le confezioni da 200 litri:
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

*** Frase applicabile alle confezioni da 1–5–10–20- 25 e 50 L**

® Marchio registrato

DL 65/2003

Novodor® FC

Insetticida biologico a base di
Bacillus thuringiensis* varieta *tenebrionis
in Sospensione Liquida

NOVODOR FC Registrazione del Ministero della Sanità n. 8321 del 15.06.1993

Composizione:

Bacillus thuringiensis varietà *tenebrionis*, ceppo NB 176, g 3 (= 33g/l)
sierotipo H 8a8b, cristalli proteici attivi .... g 100
Coformulanti .... q.b. a

BTTU (Unità Tossiche di Bacillus thuringiensis tenebrionis determinate su larve di Leptinotarsa decemlineata)

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

Valent BioSciences una Divisione di
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy
2 Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or – Francia

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
A-Z Drying – Osage, Iowa (U.S.A.)
Stabilimenti di confezionamento:
ISAGRO SpA – Aprilia (Latina)
SCAM S.r.l. - Via Bellaria 164 - Modena
Distribuito da:
SCAM S.r.l. - Via Bellaria, 164 Modena
ISAGRO ITALIA S.r.l. - Via Caldera, 21 – 20153 Milano
SIAPA Srl – Via Caldera, 21 – 20153 Milano

Contenuto: **litri 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 - 25**

Partita N°........ Data di produzione: ......

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
Usare indumenti di protezione per agenti biologici, classificati come dispositivi di protezione individuale e con relativa marcatura CE per la protezione da agenti biologici, e guanti, quali dispositivi di protezione individuale con relativa marcatura CE e conformità alla EN 374

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

INDICAZIONI GENERALI
Il NOVODOR FC è un insetticida biologico che agisce per ingestione sulle larve di I e II età della Dorifora della Patata (*Leptinotarsa decemlineata*). Il NOVODOR FC contiene il cristallo proteico attivo prodotto da *Bacillus thurigiensis var. tenebrionis*. Il prodotto deve essere ingerito dalla larva dell'insetto. Una volta ingerita, la proteina viene attivata dalle proprietà specifiche dell'apparato digerente dell'insetto. L'apparato digerente viene paralizzato e l'insetto cessa la sua attività trofica quasi immediatamente arrestando quindi il danno fogliare. La morte subentra circa 2-5 giorni più tardi.

Preparazione della sospensione:
Agitare bene la confezione prima di aprirla. Riempire parzialmente d'acqua il contenitore dell'attrezzatura di irrorazione, aggiungere la dose di NOVODOR FC necessaria, mescolare continuando a riempire d'acqua il contenitore fino al volume richiesto. Per ottenere la massima efficacia dal prodotto, la sospensione deve essere usata il giorno stesso.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE:
- Effettuare gli interventi quando i fitofagi sono all'esterno del vegetale e, in ogni caso, ai primi stadi larvali (I e II).
- È essenziale una buona copertura della vegetazione. Perché questo avvenga, NOVODOR FC dovrebbe essere sospeso in una adeguata quantità d'acqua: da 300 a 500 L/ha a seconda dello stadio vegetativo della coltura.
- La prima applicazione dovrebbe coincidere con la massima presenza di larve di I età.
- Per densità di popolazioni elevate e con larve di diverse età si consiglia un secondo trattamento 7-10 giorni più tardi.
- Se un evento meteorologico piovoso intercorre a circa 12 ore dall'applicazione, o se il trattamento è seguito da un breve periodo di freddo durante il quale le larve cessano di nutrirsi, il trattamento dovrà essere ripetuto.
- Per zone geografiche dove l'insetto compie più di una generazione per stagione, la ripetizione del trattamento è considerata necessaria.
- Trattare preferibilmente verso sera.
- Irrorare con attrezzature che, munite di pompe a volume, distribuiscano volumi medio alti di acqua.

DOSI E CAMPI DI IMPIEGO
Il NOVODOR FC è raccomandato per la lotta alla Dorifora della patata (*Leptinotarsa decemlineata*) su colture di patata, pomodoro e melanzana. Dose d'impiego: 2-5 L/ha. Tale dose è efficace su larve di I e II età e va adattata alla pressione ed allo stadio di sviluppo della popolazione dell'insetto.

COMPATIBILITÀ
Il NOVODOR FC è incompatibile con i prodotti a reazione alcalina. Qualora il NOVODOR FC venga miscelato con altri prodotti assicurarne l'immediata applicazione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO
Conservare in luogo fresco, asciutto e ventilato, ad una temperatura ambiente massima di 10°C. In queste condizioni il prodotto rimane stabile per circa due anni. Mantenere la confezione, parzialmente usata, rigorosamente chiusa. La conservazione del prodotto è ridotta se si mantiene lo stesso a temperature costantemente sopra i 10°C.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

® Marchio registrato

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ProGibb® 20 PS

Fitoregolatore a base di Acido Gibberellico.
Tipo di formulazione: POLVERE SOLUBILE

COMPOSIZIONE
100 g. di prodotto contengono:

Acido gibberellico puro	g. 20
Inerti, quanto basta a	g. 100

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8755 del 22/05/95

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Valent BioSciences
una divisione della
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 2, Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
A-Z Drying – Osage, Iowa (USA)
Stabilimento di confezionamento:
ISAGRO SpA – Aprilia (LT)
STI Solfotecnica Italiana SpA – Cotignola (RA)

Distribuito da:
SIAPA Srl - Via Caldera, 21 - 20153 Milano

PESO NETTO: g. 50 g. 100 Partita No.:

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
ProGibb 20 PS è un prodotto a base di acido gibberellico (GA3). Il prodotto è indicato per stimolare processi quali la crescita dei tessuti vegetali, l'allegagione, la fioritura e la fruttificazione di numerose colture. Si consiglia di intervenire su colture concimate ed irrigate adeguatamente.

CAMPI E MODALITÀ DI IMPIEGO
PERO:
- per stimolare l'allegagione, lo sviluppo dei frutti originati da fecondazione e di quelli partenocarpici, trattare piante di almeno tre anni usando 5-10 g/hl, effettuando una buona bagnatura, con circa il 20-30% dei fiori aperti (in caso di abbondante fioritura un eccesso di bagnatura può comportare un'allegagione troppo intensa); impiegare la dose più alta per le aree più fredde
- per ridurre i danni da gelate durante la fioritura e l'allegagione, impiegare 10-15 g/hl, per gelate non inferiori a –5°C, trattando nelle ore più soleggiate o intervenendo entro le 36-48 ore successive all'evento.

FRAGOLA in coltura protetta:
- per anticipare la produzione sulle varietà Gorella, Pocahontas, Red Gauntlet, Cambridge Favourite, Surprise des Halles, impiegare 10-15 g/hl almeno 20-25 giorni prima della fioritura
- per aumentare la produzione di stoloni, in serra o in pieno campo, applicare 15-20 g/hl, al termine della raccolta.

CARCIOFO:
- per anticipare sia la prima raccolta che le successive, trattare alla comparsa delle prime calatidi con 5-10 g/hl distribuendo 400-500 litri/ha, evitando le ore più soleggiate nelle giornate molto calde
- per mitigare i danni da gelate intervenendo prima delle 24-36 ore successive, usare 5-15 g/hl, effettuando il trattamento quando la temperatura si è già riportata ai valori normali.

SEDANO, SPINACIO, ZUCCHINO: per stimolare lo sviluppo e limitare lo stress da freddo impiegare 10-20 g/hl, distribuendo 300-500 litri/ha, 4-5 settimane prima della raccolta.
CILIEGIO DOLCE: per aumentare la consistenza e la pezzatura, 5-10 g/hl all'invaiatura.
CILIEGIO ACIDO: per ridurre i danni da giallume virotico, da scarsa vigoria e bassa produzione, trattare 10-14 giorni dopo la caduta petali con 5-10 g/hl.
ARANCIO: per migliorare la qualità della buccia e ridurre il fenomeno della "spigatura", o invecchiamento, impiegare 10-20 g/hl, effettuando una buona bagnatura. N.B.: se si desidera ottenere un ritardo nella raccolta, trattare quando i primi frutti virano – verde pallido – se invece il ritardo non è gradito, intervenire quando i frutti hanno già raggiunto una colorazione idonea per il mercato.
CLEMENTINE: per una migliore allegagione e per una più evidente assenza di semi (apirenia), usare 5-10 g/hl bagnando abbondantemente, trattando tra la piena fioritura e l'inizio della caduta petali.
LIMONI: per aumentare colore e pezzatura dei frutti e per uniformare le raccolte usare 5-10 g/hl circa 5-7 settimane prima della raccolta e comunque quando il colore della maggior parte dei frutti inizia a virare (giallo-argenteo).
VITE:
Uva da tavola senza semi (varietà Thompson, Sultanina, ecc.)
Un completo calendario di trattamento comprende:
- per allungare il rachide trattare in pre-fioritura con il tralcio lungo 4-8 cm alla dose di 10 g/hl
- per diradare il grappolo trattare al 30-40% della fioritura, alla dose di 10 g/hl
- per aumentare le dimensioni degli acini trattare dopo l'allegagione con acini di 3-4 mm di diametro, alla dose di 15 g/hl
- per ottenere acini più omogenei e più grandi ripetere il trattamento precedente dopo 8-10 giorni.

Uva da vino (con semi): per allungare il rachide sulle varietà a grappolo compatto quali Tocai, Picolit, Chardonnay, ecc. trattare prima della fioritura con tralci di 10-15 cm alla dose di 3-5 g/hl con 200-300 litri di acqua per ettaro.
L'allungamento consente una migliore difesa nei programmi di Lotta Integrata contro la Botrite, grazie ad una migliore aerazione del grappolo. Si raccomanda di non superare il dosaggio e l'epoca indicati onde evitare effetti indesiderati.
FLOREALI IN CAMPO: per facilitare, anticipare la fioritura, per interrompere la dormienza vegetativa, stimolare la crescita e allungare gli steli, 5-10 g/hl alla comparsa dei primi boccioli fiorali. Si raccomandano prove preventive onde rilevare eventuali sensibilità di specie e/o varietali.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con i prodotti alcalini.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Le applicazioni di ProGibb 20 PS possono dare risposte molto differenziate con il variare delle condizioni ambientali e dello stadio fenologico della pianta trattata e delle diverse varietà per la presenza naturale nelle piante di GA3 (GA3 endogeno). Si consiglia quindi di effettuare preventivamente saggi su piccole superfici con le dosi minori sulle varietà mai trattate e per le finalità meno note. Adattare localmente le tecniche di impiego.
AVVERTENZE:
- Conservare il prodotto in ambiente fresco, asciutto e ventilato
- Distribuire la soluzione subito dopo averla preparata e comunque non oltre le 24 ore successive onde evitarne la degradazione
- Applicare durante le ore fresche della giornata evitando alte temperature per ottimizzare l'assorbimento
- Utilizzare ugelli a getto molto fine per ottenere una migliore copertura e assorbimento del prodotto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

® Marchio registrato

DL 65/2003

ETICHETTA RIDOTTA

ProGibb® 20 PS

Fitoregolatore a base di Acido Gibberellico.
Tipo di formulazione: POLVERE SOLUBILE

COMPOSIZIONE
100 g. di prodotto contengono:

Acido gibberellico puro	g. 20
Inerti, quanto basta a	g. 100

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8755 del 22/05/95

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Valent BioSciences
una divisione della
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 2, Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)
Distribuito da:
SIAPA Srl - Via Caldera, 21 - 20153 Milano

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
A-Z Drying – Osage, Iowa (USA)
Stabilimento di confezionamento:
ISAGRO SpA – Aprilia (LT)
STI Solfotecnica Italiana SpA – Cotignola (RA)
PESO NETTO: g. 50 g. 100
Partita No.:

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato

DL 65/2003

PROMALIN® NT

(Concentrato solubile)
Regolatore di crescita

COMPOSIZIONE		
100 g di prodotto contengono:		
Gibberelline A4 e A7 pure	g	1,8 (=18,8 g/L)
Benziladenina pura	g	1,8 (=18,8 g/L)
Coadiuvanti e solventi q.b.a	g 100	

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Valent BioSciences
una divisione della
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 2, Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

Distribuito da:
Bayer CropScience Srl
Viale Certosa, 130 - Milano

Stabilimento di produzione e confezionamento
(formulazione e confezionamento o sola formulazione)
A-Z Drying – Osage, Iowa, U.S.A.
Stabilimento di confezionamento:
ISAGRO SpA – Aprilia (Latina)

Registrazione Ministero della Sanità n° 9509 del 16.02.1998

Partita N.: **ml 250 – 500 L 1 - 5**

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
Il PROMALIN NT è un fitoregolatore che trova interessanti campi di applicazione su alcune cultivar di melo e pero. In determinate situazioni ambientali, i frutti delle mele appartenenti al gruppo Delicious rosse, sia normali che Spur, tendono ad assumere una forma schiacciata: PROMALIN NT provoca una modifica della forma (allungamento) secondo gli standard varietali delle zone più vocate.
PROMALIN NT, sulle mele della varietà Golden Gelicious, previene o riduce significativamente la rugginosità, fisiopatia che causa un importante deprezzamento della produzione.
PROMALIN NT sulle mele appartenenti al gruppo Gala consente di migliorare l'efficacia del trattamento specifico di diradamento a base di NAD e di aumentare la quantità raccolta al primo stacco.
PROMALIN NT può essere anche impiegato su impianti giovani di melo non ancora in produzione e in vivaio, per stimolare l'apertura delle gemme e l'emissione di rami anticipata, migliorare l'angololatura dei rami ed accelerare l'entrata in produzione della pianta.
PROMALIN NT, su pero, favorisce l'allegagione dei fruttii

CAMPI APPLICATIVI, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO
MELO (gruppo Delicious rosse) – Miglioramento forma
Applicare 70-100 ml/hl, distribuendo il prodotto tra la piena fioritura (80% di fiori aperti) e la caduta petali, preferibilmente in due applicazioni di 35-50 ml/hl ciascuna ad un intervallo di 7-10 giorni.
MELO (Golden Delicious) – Prevenzione rugginosità
Impiegare 25-30 ml/hl per trattamento, realizzando un programma di 3-4 applicazioni; effettuare il primo trattamento a fine fioritura ed i successivi ad intervalli di 7-10 giorni.
MELO (gruppo Gala) – Aumento quantità raccolta al primo stacco
Impiegare 25 ml/hl per trattamento realizzando un programma di 4 applicazioni; effettuare il primo trattamento con PROMALIN NT allo stadio di "orecchiette di topo" ed i successivi ad intervalli di 15 giorni. Effettuare il diradamento con prodotti a base di NAD allo stadio di "inizio caduta petali".
MELO (impianti giovani non in produzione e vivai) – Emissione branchette anticipate
Applicare 2,5 L/hl (4,5-5,5 L/ha) trattando astoni di 50-70 cm in piena crescita e con buon sviluppo fogliare, sulla parte apicale (30 cm).
PERO – Miglioramento allegagione
Applicare 60-80 ml/hl, distribuendo il prodotto all'inizio della fioritura, preferibilmente in due applicazioni di 30-40 ml/hl, effettuando il primo trattamento al 20-30% di fiori aperti ed il secondo entro 2-3 giorni.

Avvertenze d'impiego:
- Aggiungere sempre 100 ml/hl di un bagnante non ionico (es. Tensol), avendo cura di metterlo prima del PROMALIN NT.
- Mettere la dose prestabilita di PROMALIN NT in circa metà della quantità d'acqua necessaria e, mantenendo la soluzione in agitazione, aggiungere altra acqua sino al raggiungimento del volume totale richiesto.
- Mantenere in agitazione la soluzione anche durante la distribuzione, provvedendo al suo impiego entro 24 ore dalla preparazione.
- Impiegare nella distribuzione un getto finemente nebulizzato, bagnando uniformemente la massa fiorale ed evitando lo sgocciolamento.
- La quantità totale di soluzione per ettaro dovrà essere regolata in funzione dello sviluppo delle piante e della forma di allevamento.
- Trattare in assenza di pioggia per almeno 4-6 ore dopo l'applicazione; nel caso di trattamento dopo una pioggia, attendere che si asciughi la vegetazione.
- Trattare preferibilmente nelle ore del tardo pomeriggio e comunque con temperature non inferiori a 7°C o superiori a 32°C.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con sostanze alcaline quali polisolfuri e poltiglia bordolese. Durante la preparazione di miscele, aggiungere il PROMALIN NT per ultimo.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
L'impiego del PROMALIN NT in prossimità di interventi con prodotti diradanti, può accentuare l'effetto diradante degli stessi: pur essendo tale aspetto talvolta ricercato, si raccomanda particolare attenzione allo scopo di evitare danni alla produzione.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

®Marchio registrato Valent BioSciences Corporation - USA

DL 65/2003

PROVIDE®

Fitoregolatore a base di Gibberelline A_4 e A_7
Tipo di formulazione: Concentrato Solubile

PROVIDE Registrazione del Ministero della Sanità n. 8754 del 22/05/1995

Composizione:
Gibberelline pure (isomeri A_4+A_7) g 2 (= 21 g/L)
Solventi q.b. a g 100
Contiene Alcool Tetraidrofurfurilico

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

Valent BioSciences una Divisione di
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy
2 Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or – Francia

Partita N°........

Stabilimento di produzione:
A-Z Drying – Osage, Iowa (U.S.A.)

CONTENUTO: **ml 500**

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
Trattasi di Gibberelline 2% in solvente Alcool Tetraidrofurfurilico.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ DI IMPIEGO

Caratteristiche tecniche:
Il PROVIDE è un fitoregolatore a base di Gibberelline A_4 e A_7, sostanze già presenti in natura, indicato per favorire lo sviluppo regolare delle cellule della buccia delle mele, prevenendo così la formazione di suberosità e di piccole screpolature normalmente definite "rugginosità".
Come noto, questa fisiopatia, oltre a deprezzare il frutto, causa un significativo calo di peso durante la conservazione. Il PROVIDE, oltre a prevenire la rugginosità, migliora l'uniformità della pezzatura dei frutti trattati.

Dosi, epoca e modalità d'impiego
MELO
Applicare il prodotto alla dose di 25 ml per ettolitro d'acqua, curando l'uniformità di bagnatura.
Effettuare quattro trattamenti a distanza di 10 giorni uno dall'altro, iniziando dallo stadio di "inizio caduta petali".

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i prodotti alcalini. Distanziare di almeno tre giorni i trattamenti con prodotti diradanti.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

® Marchio registrato

DL 65/2003

REGULEX®

Fitoregolatore in formulazione liquida contro la rugginosità e per la buona finitura dei frutti del melo

COMPOSIZIONE		
Acido gibberellico (Gibberelline A4+A7)	g	1 (=10,4 g/L)
Diluenti e coadiuvanti q.b.a	g	100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Valent BioSciences
una divisione della
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 2, Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

Distribuito da:
Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 - Milano

Stabilimento di produzione
(formulazione e confezionamento o sola formulazione):
A-Z Drying – Osage, Iowa, U.S.A.
Stabilimento di confezionamento:
DIACHEM SpA – U.P. SIFA – Caravaggio (Bergamo)

Registrazione Ministero della Sanità n° 6938 del 22.01.1987

Partita N.: **L. 0,5 - 1**

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
Sulle varietà di melo che presentano un certo grado di difficoltà a produrre le quantità di gibberelline naturali necessarie al proprio metabolismo, si possono evidenziare difetti fisiologici. Questi possono essere ridotti o eliminati impiegando REGULEX®.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Intervenire all'inizio della caduta dei petali curando la uniforme bagnatura delle infiorescenze senza, peraltro, giungere allo sgocciolamento. Successivamente effettuare altri tre trattamenti ad intervalli di 10 giorni l'uno dall'altro.
Nel caso di giornate calde, intervenire durante le ore fresche del pomeriggio. Evitare sempre le ore di massima insolazione. Utilizzare attrezzature ad alto volume, impiegando 1000-1500 lt/ha in funzione della densità e sviluppo della vegetazione.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
A seconda della sensibilità varietale impiegare, per ogni 100 lt d'acqua, le seguenti dosi:

Varietà	Dose
Golden delicious – Karamiyne de Sonnaville – Jonagold – Red Boskoop	50-60 ml
Cox Orange Pippin	25-50 ml

Impiegare la dose maggiore quando, in precedenza, la cultivar ha presentato forte rugginosità. Adottare la minore con debole rugginosità e sviluppo vegetativo rigoglioso. Su Golden delicious, qualora risulti più pratico, effettuare gli interventi ogni 7 giorni, applicare REGULEX® per sette trattamenti alla dose di 30 ml.

Avvertenza: la soluzione va impiegata nello stesso giorno della sua preparazione.

COMPATIBILITÀ
REGULEX® è compatibile con NIMROD, captan, mancozeb, metiram. Non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. In tutti i casi di miscela in cui non esista evidenza di sufficiente sicurezza, si effettuano prima piccole prove di saggio.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZA
Il trattamento con le gibberelline può determinare, l'anno successivo, una leggera diminuzione del numero di gemme fiorali.

Intervallo di sicurezza: 20 giorni

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

®Marchio registrato

DL 65/2003

Etichetta/foglio illustrativo

XenTari®

Insetticida biologico in microgranuli idrodispersibili selettivamente attivo sulle larve di lepidotteri

Composizione:
Bacillus thuringiensis subsp. *aizawai*, sierotipo H7 g 10
(Potenza 15.000 U.I./mg di formulato)
Coformulanti ed inerti .... q.b. a g 100

Contiene *Bacillus thuringiensis* subsp. *aizawai*, sierotipo H7 può provocare una reazione allergica

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Valent BioSciences una Divisione di
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy
2 Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or – Francia

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione): **A-Z Drying – Osage, Iowa (U.S.A.)**

Stabilimento di confezionamento: **ISAGRO SpA – Aprilia (Latina)**

Registrazione n.11793 del 09/09/2003 del Ministero della Salute

Contenuto: **g 50, 100, 250, 500, kg 1-5-10-25**

Partita N°..........

Data di produzione: ....

Distribuito da:
ISAGRO ITALIA Srl – Via Caldera, 21 - 20153 Milano

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO:
Il prodotto va impiegato appena compaiono le larve. E' preferibile operare nel tardo pomeriggio, per minimizzare gli effetti negativi della ventilazione dei raggi U.V. E' consigliabile ripetere il trattamento una seconda volta a distanza di 7-14 gg. in relazione al grado di infestazione da combattere.
Riempire per metà il serbatoio con acqua, versare la necessaria quantità di prodotto, miscelare e mantenendo in agitazione, riempire il serbatoio a volume.
Irrorare con attrezzature che, munite di pompe a volume, distribuiscano un volume medio-alto di acqua.
Agrumi: Tignola: 60-80 g/hl (600-2400 g/ha)
Pomacee: Falene defogliatrici, Ifantria 30-50 g/hl (150-750 g/ha); Tortrici: 60-100 g/hl (300-1500 g/ha)
Vite: Tignole, Ifantria: 80-100 g/hl (300-2500 g/ha)
Olivo: Tignola, Ifantria: 60-80 g/hl (600-2400 g/ha)
Actinidia: Eulia e Tignola: 60-100 g/hl (300-1000 g/ha)
Drupacee: Cidia, Anarsia, Ifantria: 60-100 g/hl (300-1000 g/ha)
Fragola: Piralide, Pandemis, Eulia: 55-60 g/hl (80-300 g/ha)
Ortaggi a foglia, Erbe fresche, Fagiolo, Fagiolino, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo, Porro:
- Nottue, Udea e Vanessa del Cardo: 45-50 g/hl (450-750 g/ha)
- Cavolaie e Plutella: 20-25 g/hl (200-375 g/ha)
- Falene defogliatrici, Tortrici, Ifantria: 60-100 g/hl (600-1500 g/ha)

Solanacee (Pomodoro, Melanzana, Peperone), Cucurbitacee (Zucca, Zucchino, Cetriolo, Melone, Cocomero) e Tabacco:
- Nottue e Piralide: 45-50 g/hl (450-750 g/ha)
- Falene defogliatrici, Tortrici, Ifantria: 60-100 g/hl (600-1500 g/ha)

Cavoli, Rapa, Ravanello, Colza, Ravizzone: Cavolaie, Tignola: 20-25 g/hl (200-350 g/ha)
Patata: Ifantria, Tignola: 60-100 g/hl (600-1500 g/ha)
Mais: Piralide, Ifantria: 60-100 g/hl (600-2000 g/ha)
Barbabietola da zucchero, Bieta rossa: Mamestra, Tignola, Ifantria: 60-100 g/hl (600-1500 g/ha)
Soia, Girasole, Cotone: Vanessa (Vanessa cardui), Nottue, Ifantria: 60-100 g/hl (600-2000 g/ha)
Colture floreali ed ornamentali, Tappeti erbosi(*) e vivai: Larve di lepidotteri defogliatori, Ifantria: 60-100 g/hl (300-1000 g/ha).
(*) Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento, segnalando con appositi cartelli il divieto di accesso nelle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione .
Essenze forestali e Pioppo: Processionarie, Limantrie, Ifantria, Stilpnotia: 60-80 g/hl (1500-4000 g/ha)

AVVERTENZA
Il prodotto va conservato nelle confezioni originali sigillate, in luoghi freschi ed asciutti al riparo da luce diretta e fonti di calore. In queste condizioni la formulazione a temperatura ambiente (21-24°C) conserva la sua efficacia per tre anni.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari, ad eccezione di quelli nettamente alcalini come la poltiglia bordolese che ne riduce l'efficacia.
ATTENZIONE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere il trattamento 3 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI ER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

® Marchio registrato Valent Biosciences Corporation, U.S.A.

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto

XenTari®

Insetticida biologico in microgranuli idrodispersibili selettivamente attivo sulle larve di lepidotteri

Composizione:
Bacillus thuringiensis subsp. *aizawai*, sierotipo H7 g 10
(Potenza 15.000 U.I./mg di formulato)
Coformulanti ed inerti .... q.b. a g 100

Contiene *Bacillus thuringiensis* subsp. *aizawai*, sierotipo H7 può provocare una reazione allergica

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Valent BioSciences una Divisione di
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy
2 Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or – Francia

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione)
A-Z Drying – Osage, Iowa (U.S.A.)
Stabilimento di confezionamento: **ISAGRO SpA – Aprilia (Latina)**

Registrazione n.11793 del 09/09/2003 del Ministero della Salute

Contenuto: **g 50, 100**

Partita N°.......... Data di produzione: ....

Distribuito da:
ISAGRO ITALIA Srl – Via Caldera, 21 - 20153 Milano

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato Valent Biosciences Corporation, U.S.A.

DL 65/2003

Etichetta/foglio illustrativo

Biobit® P.B.

Insetticida biologico a base di
Bacillus thuringiensis* varieta *kurstaki
in Polvere Bagnabile

BIOBIT P.B. Registrazione del Ministero della Sanità n. 7970 del 06.04.1991

Composizione:
Bacillus thuringiensis varietà *kurstaki*, ceppo HD-1,
sierotipo 3a3b (potenza 16.000 UI/mg di formulato) g 3,2
Coformulanti ....q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

Valent BioSciences una Divisione di
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy
2 Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or – Francia

Contenuto: **Kg 0,100-0,250-0,5-1-10-25**

Stabilimento di produzione: **A-Z Drying – Osage, Iowa (U.S.A.)**

Distribuito da:
SCAM Srl – Via Bellaria, 164 - Modena

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Usare indumenti di protezione per agenti biologici, classificati come dispositivi di protezione individuale e con relativa marcatura CE per la protezione da agenti biologici, e guanti, quali dispositivi di protezione individuale con relativa marcatura CE e conformità alla EN 374

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODO D'AZIONE
Il prodotto agisce esclusivamente per l'ingestione sulle larve dei lepidotteri che interrompono il processo di alimentazione dopo poche ore dall'ingestione, arrivando alla morte anche dopo qualche giorno. Per una efficace azione si raccomanda di trattare popolazioni di larve nei primi stadi di sviluppo.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi di seguito riportate riferite ad un ettaro di superficie, da irrorarsi con una quantità d'acqua sufficiente a garantire la completa copertura delle colture da difendere.
AGRUMI: Tignola: 1-1,5 Kg/ha
POMACEE: Falene defogliatrici, Ifantria: 0,5-1Kg/ha; Tortici: 1-2 Kg/ha
VITE: Tignole, Ifantria: 1-2 Kg/ha
OLIVO: Tignola, Ifantria: 1-1,5 Kg/ha
ACTINIDIA: Eulia e Tignola: 1-2 Kg/ha
DRUPACEE: Cidia, Anarsia, Ifantria: 1-2 Kg/ha
FRAGOLA: Piralide, Pandemis, Eulia: 1-1,2 Kg/ha
ORTAGGI A FOGLIA, ERBE FRESCHE, FAGIOLO, FAGIOLINO, CARDO, SEDANO, FINOCCHIO, CARCIOFO, PORRO:
- Nottue, Udea e Vanessa del cardo: 0,75-1 Kg/ha
- Cavolaie e Plutella: 0,4-0,5 Kg/ha
- Falene defogliatrici, Tortrici, Ifantria: 1-2 Kg/ha

SOLANACEE (Pomodoro, Melanzana, Peperone), CUCURBITACEE (Zucca, Zucchino, Cetriolo, Melone, Cocomero) E TABACCO:
- Nottue e Piralide: 1-1,2 Kg/ha
- Falene defogliatrici, Tortrici, Ifantria: 1-2 Kg/ha

CAVOLI, RAPA, RAVANELLO, COLZA, RAVIZZONE: Cavolaie, Tignola: 0,4-0,5 Kg/ha
PATATA: Ifantria, Tignola: 1-2 Kg/ha
MAIS: Piralide, Ifantria: 1-2 Kg/ha
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, BIETA ROSSA: Mamestra, Tignola, Ifantria: 1-2 Kg/ha
SOIA, GIRASOLE E COTONE: Vanessa (Vanessa cardui), Nottue, Ifantria: 1-2 Kg/ha
COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI, TAPPETI ERBOSI E VIVAI: larve di Lepidotteri defogliatori, Ifantria: 1-2 Kg/ha
Negli impieghi su tappeti erbosi obbligo di segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.
ESSENZE FORESTALI, PIOPPO E CASTAGNO: Processionarie, Limantrie, Ifantria, Stilpnotia: 1-1,5 Kg/ha

MODALITÀ DI APPLICAZIONE: applicare il prodotto preferibilmente nelle ore più fresche della giornata con attrezzature che, munite di pompe a volume, distribuiscano volumi medio-alti di acqua.
L'aggiunta di un bagnante adesivante può essere utile per ottenere una migliore distribuzione e persistenza del prodotto.

AVVERTENZE:
- Conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato;
- Chiudere ermeticamente le confezioni parzialmente utilizzate;
- Evitare l'esposizione diretta delle confezioni ai raggi solari;
- A temperatura ambiente e in confezioni integre, il prodotto è stabile per almeno 2 anni.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Sciogliere il prodotto in poca acqua a parte ed aggiungere, sempre mescolando, al totale quantitativo di acqua. Distribuire la miscela acquosa entro 12 ore dalla sua preparazione con pompe a volume normale.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con sostanze alcaline (es. Calce e Poltiglia bordolese alcalina).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

® Marchio registrato

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto

Biobit® P.B.

Insetticida biologico a base di *Bacillus thuringiensis* varieta *kurstaki* in Polvere Bagnabile

BIOBIT P.B. Registrazione del Ministero della Sanità n. 7970 del 06.04.1991

Composizione:
Bacillus thuringiensis varietà *kurstaki*, ceppo HD-1,
sierotipo 3a3b (potenza 16.000 UI/mg di formulato) g 3.2
Coformulanti .... q.b. a g 100

Contenuto: **g 100**

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

Valent BioSciences una Divisione di
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 2 Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or – Francia

Distribuito da: **SCAM Srl – Via Bellaria, 164 - Modena**

Stabilimento di produzione: **A-Z Drying – Osage, Iowa (U.S.A.)**

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Usare indumenti di protezione per agenti biologici, classificati come dispositivi di protezione individuale e con relativa marcatura CE per la protezione da agenti biologici, e guanti, quali dispositivi di protezione individuale con relativa marcatura CE e conformità alla EN 374

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato

TRIAGRIBERIA S.l.

TRIPICRIN™

FUMIGANTE LIQUIDO CONCENTRATO VOLATILE, DA DISTRIBUIRE NEL TERRENO DOVE SI DIFFONDE COME VAPORE, PER LA LOTTA PREVENTIVA CONTRO I PARASSITI DEL SUOLO PRIMA DELLA SEMINA O TRAPIANTO DELLE COLTURE.

TRIPICRIN*

COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:

Cloropicrina g 94,0 (= 1.607 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100,0

L'utilizzo del prodotto è riservato solo agli operatori professionali autorizzati a norma del R.D. 9.1.1927 n. 147 (e successive modifiche, sull'impiego dei gas tossici) nonché muniti del patentino di cui all'art. 25 e 26 del D.P.R. 23.04.2001 n. 290.

MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. – Molto tossico per inalazione.– Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. – Nocivo per gli organismi acquatici. – Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. – Usare indumenti protettivi e guanti adatti. – In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza. – In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

TRIAGRIBERIA, S.L.
Paseo de la Castellana, 53 – MADRID (Spagna)

Officina di produzione:
TRINITY MANUFACTURING, Inc. – Hamlet, North Carolina, USA

Prodotto Fitosanitario
Registrazione del Ministero della Salute n. 11.394 del 15.07.2002

Contenuto netto: litri 56,44 (pari a kg 90,7) o litri 62,23 (kg 100) o litri 95,95 (kg 154,2) in bombole d'acciaio
Partita n. xxxxx

(™) = Marchio TRIAGRIBERIA, S.L.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in locale idoneo per immagazzinare gas tossici (R.D. 9/1/1927 n. 147), con apertura di aerazione anche a livello del suolo, inaccessibile anche agli animali domestici. Il prodotto sviluppa gas tossico. In caso di sversamento in ambiente chiuso allontanare gli astanti e dotare il personale addetto all'emergenza di tuta chimica protettiva completa ed autorespiratore ad aria compressa con pressione positiva. Usare per i contenitori vuoti le stesse precauzioni relative alla custodia di quelli pieni. I contenitori vuoti vanno ritirati dalla ditta fornitrice.

(Etichetta p.f. TRIPICRIN - pag. 1 di 2)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: la sostanza attiva è un liquido volatile che allo stato di vapore ha un potente effetto lacrimogeno anche a concentrazioni molto basse. I primi sintomi di esposizione sono lacrimazione, difficoltà respiratorie e vomito, mentre successivamente si può sviluppare l'edema polmonare. Dopo iniziali sintomi di irritazione ad occhi, naso e gola, l'esposizione continuata a basse concentrazioni di vapore causa dolorosi bruciori agli occhi o cecità temporanea.

Il prodotto come tale liquido può produrre ustioni chimiche se giunge in contatto con la pelle o gli occhi ed è dannoso se ingerito in quantità ridotte ma può risultare fatale se ne vengono assunte quantità cospicue.

Interventi di pronto soccorso: se il prodotto venisse inalato in locale chiuso, portare la persona esposta all'aria aperta, tenerla al caldo, assicurarsi che possa respirare liberamente; se cessasse di respirare applicarle la respirazione artificiale, preferibilmente bocca a bocca; se avesse perso i sensi non somministrarle nulla per bocca. Se il prodotto giungesse a contatto con la pelle, rimuovere immediatamente vestiti, scarpe ed ogni altro indumento che coprisse la pelle e lavare abbondantemente con acqua e sapone la parte contaminata. Se il prodotto schizzasse negli occhi, tenere le palpebre aperte e lavare l'occhio per almeno 15 minuti con un flusso moderato ma continuo d'acqua. Se il prodotto venisse ingerito, cercare di provocare il vomito, non somministrare nulla per bocca. In tutti i casi sollecitare immediatamente un intervento medico o portare la persona infortunata ad un Pronto Soccorso mostrando l'etichetta del prodotto. **Cure**: applicare trattamenti sintomatici. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il **TRIPICRIN** è un prodotto liquido che a temperatura ambiente rapidamente evapora diffondendosi nel terreno dove distrugge soprattutto gli agenti patogeni fungini che provocano marciumi alle radici ed al fusto delle piante coltivate, quali ***Fusarium***, ***Verticillium***, ***Rhizoctonia***, ***Phytophtora***, ***Pyrenochaeta***, ***Pythium***, ***Sclerotinia***, ***Sclerotium***, ***Didymella***, ***Armillaria*** ma ha azione collaterale anche contro alcuni insetti terricoli, quali i **Grillotalpa**, i Nematodi ed i semi di erbe infestanti in fase di germinazione.

MODALITA' D'IMPIEGO

Le applicazioni di TRIPICRIN debbono effettuarsi su terreno nudo e precedentemente ben lavorato, sminuzzato e livellato. E' consigliabile che il terreno presenti un grado di umidità simile a quello richiesto normalmente per la semina ed una temperatura non inferiore ai 10°C. I trattamenti possono avvenire in due maniere: a) per diluizione tarata con acqua ed immissione nelle tubature del sistema di irrigazione a goccia, prevedendo un numero di almeno 5-6 gocciolatori a metro quadrato per ottenere una distribuzione uniforme, senza eccedere la concentrazione di g 1 o ml 0,6 di prodotto per litro (pari a 1000 ppm) nell'acqua di distribuzione per non danneggiare il sistema di irrigazione; dopo la distribuzione continuare l'irrigazione a goccia per 15-30 minuti con sola acqua (almeno 5-10 l/m^2) per pulire pompe e tubature da ogni traccia di prodotto; b) oppure per iniezione diretta nel suolo mediante apposite macchine fumigatrici trainate da trattrici, con coltelli erogatori spaziati non più di cm 30 e con penetrazione di cm 15-30 nel suolo. In ambedue i casi, rispettivamente prima della distribuzione del prodotto o contemporaneamente, il terreno deve essere coperto da

teli di plastica virtualmente impermeabile ai gas (VIF), saldati fra loro se contigui ed interrati ai bordi per la profondità di cm 15-20, che hanno la funzione di trattenere nel suolo i vapori di TRIPICRIN man mano che si sprigionano. Dopo il trattamento la copertura di plastica deve essere mantenuta per almeno 7 giorni al fine di permettere una completa fumigazione ed un pieno effetto disinfestante del prodotto. Quando la copertura deve essere rimossa, procedere prima a sollevare i margini interrati e, dopo 12-24 ore, l'intero telo di plastica.

L'operazione di trattamento e quella di scopertura delle aree trattate, che non deve avvenire prima di 8 giorni dal trattamento, devono essere effettuate solo da operatori specializzati ed autorizzati ai sensi del Regio Decreto 09.01.1927 n. 147 e successive modifiche. Tra la scopertura delle aree trattate e l'inizio delle semine o trapianti devono intercorrere almeno 7 giorni.

ATTENZIONE: durante le operazioni di fumigazione e rimozione dei teli di plastica ed in caso di eventuali rientri nei terreni trattati entro 24 ore dal trattamento, usare una maschera a facciale completo munita di filtro combinato (A2/P3), indumenti protettivi e guanti.

Prima di seminare o trapiantare si raccomanda di smuovere ed arieggiare il terreno, con motozappature ed erpicature incrociate profonde non oltre lo strato disinfestato, in modo da liberarlo completamente da eventuali vapori residui. Per essere sicuri che non permangano residui di TRIPICRIN nel terreno, che possono risultare fitotossici per le colture da impiantare, effettuare il "test del crescione" mettendo a germinare in un campione di terreno trattato previamente inumidito dei semi di crescione (*Nasturtium officinale*) ed osservando se le piantine nascono ed iniziano a crescere regolarmente.

DOSI D'IMPIEGO

Per la disinfestazione dei terreni destinati alle colture di **Fragola**, **Pomodoro**, **Melanzana**, **Peperone**, **Melone**, **Cocomero, Zucchino, Insalate, Vite (per uva da tavola e da vino), Pomacee (Melo, Pero, Cotogno), Drupacee (Pesco, Albicocco, Susino), Actinidia** (**o Kiwi)** e **Floricole** impiegare 12-24 ml/m^2 (pari a 20 - 40 g/m^2). Usare la dose maggiore nelle situazioni di presunta forte infestazione di agenti patogeni nel terreno (per es. dove la medesima coltura è stata ripetuta più volte).

Attenzione: per evitare reinfestazioni sui terreni già trattati non apportare terricci, spazzature o comunque materiali provenienti da aree infestate o sospette tali. A scanso di inconvenienti la concimazione organica dovrà sempre effettuarsi molto prima della fumigazione oppure anche dopo la fumigazione, ma spargendo con le operazioni colturali di arieggiamento solo letame ben maturo.

COMPATIBILITA'

Il prodotto non si prevede sia impiegato in miscela estemporanea con altri preparati.

FITOTOSSICITA'

Non effettuare i trattamenti in vicinanza di altre colture. Prima della messa a coltura effettuare una leggera lavorazione onde rimuovere eventuali vapori residui.

(Etichetta p.f. TRIPICRIN - pag. 2 di 2)*

RISCHI DI NOCIVITA'

ATTENZIONE: il formulato contiene sostanza attiva molto tossica per la fauna selvatica, gli uccelli e gli organismi acquatici.

Far trascorrere almeno 15 GIORNI tra il trattamento e l'impianto della coltura.

AVVERTENZA: chi utilizza il prodotto deve provvedere, in modo idoneo, a vietare l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone non adeguatamente protette per tutto l'intervallo di agibilità (15 giorni). Applicare il prodotto ad una distanza non inferiore a m 50 dalle abitazioni.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

DA NON VENDERSI SFUSO

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO DEVE ESSERE RITIRATO DAL PRODUTTORE E NON DISPERSO NELL' AMBIENTE.

Il contenitore non può essere riutilizzato se non in officine di confezionamento autorizzate.

TRIAGRIBERIA, S.L. (logo)

(ATTENZIONE: la seguente nota non appartiene all'etichetta registrata)
Etichetta conforme a quella allegata al decreto del 18.10.2005 di approvazione per estensioni impiego con inclusa riclassificazione –12.01.2006

SOCIETÀ ITALIANA STERILIZZAZIONI S.p.a.

BROMETHYL 980

Fumigante del terreno impiegato nella lotta contro: Funghi del terreno, Nematodi, Erbe infestanti e Orobanche.

BROMETHYL 980

Composizione (g 100 di prodotto contengono):
- Bromuro di metile puro .... g 97,51 (1740 g/l)
- Cloropicrina .... q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Tossico per inalazione e ingestione – Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle – Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione – Possibilità di effetti irreversibili – Altamente tossico per gli organismi acquatici – Pericoloso per lo strato di ozono.

TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi adatti – In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) – Richiedere informazioni al fornitore per il recupero – Non disperdere nello ambiente. Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L' AMBIENTE

SOCIETA' ITALIANA STERILIZZAZIONI S.p.A.
Via Palestro, 241 – VITTORIA (RG)
Confezionato nello stabilimento ELF ATO di Port de Bouc (Francia)- Importato dalla Francia in confezioni pronte all'impiego.
Stabilimento di Vittoria (RG).
Prodotto Fitosanitario
Registrazione del Ministero della Salute n. 0949 del 21 agosto 1972

Contenuto netto: litri 28 / 46-56

Partita N. ....

Norme precauzionali

L'utilizzo del prodotto è riservato solo agli operatori autorizzati a norma del R.D. 9/1/1927 n. 147 (e successive modifiche) sull'impiego dei gas tossici.

Il contenitore è destinato al recupero da parte del produttore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI: avvelenamento grave per inalazione o per contatto con la pelle.

Veleno neurotropo: provoca lesioni encefaliche di tipo paralitico. Tempo di latenza: anche parecchie ore. Cefalea, vertigini, sonnolenza, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione. Disturbi della parola, iperacusia dolorosa, ambiopia. I disturbi neurologici sono tardivi e costituiscono prognosi grave. Lesioni cutanee da contatto.

TERAPIA: Sintomatica. Trattare l'acidosi metabolica; in caso di edema polmonare cortisonici endovena; se convulsioni diazepam, monitoraggio emogas, analisi quadro elettrolitico, ECG, EEG, esame urine, ospedalizzare.

Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

per il trattamento di terreni, di vivai e di semenzai in assenza di colture

1. – Fumigante da impiegare esclusivamente per i trattamenti dei terreni in assenza di colture e per i trattamenti di vivai e semenzai (D.M. 16/6/94).
2. – Il trattamento deve essere effettuato prima della semina o della piantagione. Si prepara il terreno ben lavorato e livellato e con un sufficiente grado di umidità. Prima della fumigazione si devono applicare i fertilizzanti organici.
3. – La fumigazione deve essere effettuata solo se il terreno ha una temperatura di 8°C o superiore. Non si deve eseguire il trattamento quando il terreno è troppo bagnato o troppo asciutto.
4. – **Metodo di applicazione**: si ricopre la superficie preparata per il trattamento con un foglio di plastica intero ed in perfetto stato (polietilene o PVC dello spessore di mm 0,1). Si solleva al centro la plastica di circa cm 20 al di sopra del terreno e si interrano i bordi nel terreno. La superficie da fumigare nei frutteti per la piantagione di piante di sostituzione è di m 2 x 2.
5. – Il prodotto è venduto allo stato liquido sotto pressione in contenitori di metallo e si trasforma in gas non appena liberato. Il gas, di solito, è immesso in un vaso evaporatore di vetro sotto copertura di plastica a mezzo di un tubo di plastica. La quantità di gas necessaria per il trattamento è misurata a mezzo di un applicatore o segnando sul vaso di vetro l'altezza alla quale deve giungere la miscela.
6. – L'operazione di trattamento e quella di scopertura delle aree trattate, la quale ultima non deve avvenire prima di sette giorni dal trattamento, devono essere effettuate solo da operatori specializzati, autorizzati ai sensi del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e successive modifiche, nonché muniti di patentino di cui agli art. 25 e 26 del D.P.R. 23.04.2001, n. 290.
7. – Per il trattamento deve essere rispettata la distanza minima di cinquanta metri dalle abitazioni, salva espressa diversa autorizzazione delle autorità sanitarie locali.
8. – La dose di impiego non deve essere superiore a 60 grammi per metro quadrato per impieghi al terreno, assicurando l'adozione di tecniche di applicazione, incluso l'uso di adeguate plastiche di copertura, che consentono di ridurre ulteriormente le dosi.
9. – Non ripetere il trattamento sullo stesso terreno prima di 24 mesi.

Per la lotta contro erbe infestanti e parassiti	Colture	Dosi
Nematodi, germi di funghi patogeni (*Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Sclerotinia, Botrytis, Phytophtora, Alternaria, Verticillium*), gli insetti (Maggiolino, Grillotalpa, Elateridi), le erbe infestanti.	Pomodoro. Melanzana, Peperone, Fragola, Zucchina, Melone, Cocomero, Cetriolo, Fagiolo, Sedano, Finocchio, Lattuga. Cicoria, Carota, Aglio, Cipolla, Radicchio, Cavolorapa, Cavolfiore, Spinacio, Ravanello, Cardo, Carciofo, Lampone, Mirtillo, Barbabietola, Bietola, Papaia, Vite, Pesco, Albicocco, Arancio, Limone, Ciliegio, Olivo, Anemone, Azalea, Begonia, Crisantemo, Crocus, Ciclamino, Dalia, Fresia, Garofano, Geranio, Gerbera, Mughetto, Narciso, Petunia, Robinia, Rododendro, Rosa, Tulipano; Semenzai e Vivai.	60 g/mq

COMPATIBILITA' - Non e' compatibile o miscibile con altri principi attivi.

FITOTOSSICITA' - E' fortemente fitotossico e perciò deve essere usato solamente per trattamenti prima della semina o del trapianto.

RISCHI DI NOCIVITA' – Il prodotto è tossico per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. E' tossico anche per gli insetti utili quando questi restano imprigionati sotto il foglio di polietilene dove viene immesso il prodotto. L'intervallo da rispettare prima della messa a coltura (semina o trapianto) va fissato in relazione alla natura del terreno e delle condizioni climatiche e , comunque, non deve essere inferiore a 10 giorni e dopo conveniente arieggiamento del terreno trattato.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato, ciò anche ai sensi del R.D. 09/01/1927 sui gas tossici.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARSI CON MEZZI AEREI

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

DA NON VENDERSI SFUSO

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO DEVE ESSERE RITIRATO DAL PRODUTTORE E NON DISPERSO NELL' AMBIENTE.
Il contenitore non può essere riutilizzato se non in officine di confezionamento autorizzate.

SOCOA S.a.s.

CADIM

DISERBANTE SELETTIVO

Composizione:
Dicamba acido puro.....................g. 16
coformulanti ....q.b.a g. 100

Frasi di Rischio
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

SOCOA sas Via Larga, 34/2- 40138 BOLOGNA

Stabilimento di produzione: BRABANT CHEMIE, Oosterhout (Olanda) / CHEMIA S.p.a., S.Agostino (FE) / TERRANALISI S.r.l., Cento (FE) / STI SOLFOTTECNICA SPA, Via Pian d'Asso Torrenieri, Montalcino (SI) / HOCKLEY Int. Ltd, Poynton, Cheshire, SK12 1 RL, (UK) / ALTHALLER ITALIA srl, S.Colombano (Milano) / SIDECO Dr Schirm GMBH, Mecklenburger Str. 229, 23568Lubeck (D) / IRCA SERVICE SpA SS:Cremasca 591- Fornovo S.Giovanni (BG)
Registrazione nø 9341 del 15-9-1997 del Ministero della Sanità
Litri 0,1-0,2-0,5-1-5-20 Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibili atassia, bradicardia. Terapia: sintomatica. Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE:
Il CADIM è un diserbante selettivo di pre e post emergenza; viene assorbito dalle infestanti sia per via fogliare che radicale e traslocato nella pianta tramite la circolazione linfatica. Possiede un rapido assorbimento da parte delle infestanti ed eventuali piogge, anche dopo poche ore dal trattamento, non influiscono sull'attività erbicida.
Indicato contro le seguenti infestanti:
Amaranto (*Amaranthus* spp.), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Canapa selvatica (*Galeopsis* spp.), Cencio molle (*Cerastium* spp), Centocchio comune (*Stellaria media*), Erba correggiola (*Poligonum aviculare*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Erba storna comune (*Thlaspi arvense*), Farinello comune (*Chenopodium album*), Fiordaliso vero (*Centaurea cyanus*), Poligono convolvolo (*Poligonum convolvolus*), Poligono persicaria (*Poligonum persicaria*), Senape selvatica (*Sinapis* spp.), Senecione comune (*Senecio* spp.), Vecia (*Vicia* spp.), Veronica (*Veronica* spp.), Stoppione (*Cirsium arvense*), Vilucchio bianco (*Poligonum* spp.), Vilucchio comune (*Convolvolus arvensis*).
Dosi d'impiego:
(dosi riferite ad ettaro)
Viene impiegato sulle seguenti colture (in miscela con altri erbicidi, utilizzare la dose minore):
Melo: lt/ha 0.6 - 1.250; **Riso** lt/ha 0.5 - 0.750; **Prati e Pascoli**: lt/ha 0.6 - 1.250; **Prati ornamentali, campi sportivi e campi da golf**: lt/ha 0.6 - 1.250; **Asparago**: lt/ha 0.300 - 0.600 in primavera, prima dell'emergenza dei turioni, con terreno ben sarchiato e leggermente umido. **Frumento - Orzo - Avena - Segale**: lt/ha 0.600 dallo stadio delle 5-6 foglie della coltura sino allo stadio di botticella; **Mais**: lt/ha 0.900 - 1.350 in post-emergenza, con piante già nate, quando la coltura non ha ancora superato l'altezza di cm 10.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Il prodotto è fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta per riso, prati, pascoli, grano orzo, mais, avena, 30 giorni prima della raccolta del melo.
Attenzione: da inpiegarsi eclusivamente in agricoltura : ogni altro impiego è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

FITOSPRINT

FITORMONE - FITOSTIMOLANTE - ALLEGANTE

COMPOSIZIONE:
Acido gibberellico puro .... g 0,150 (1,65 g/l)
NAA (Acido alfa-naftalenacetico)............... g 0,300 (3,3 g/l)
Coformulanti e coadiuvanti .... q.b.a. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
FITOSPRINT per la sua particolare composizione è un Fitoregolatore con azione di stimolo sullo sviluppo vegetativo, con attività complementari quali l'anticipo della fioritura e della maturazione, maggiore allegagione, pezzatura uniformi, migliore colore della frutta.
CAMPI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
AGRUMI: (Arancio, Limone, Pompelmo, Clementino)
Per una maggiore fioritura e allegagione. **Dosi**: ml 100-150/hl. Sono consigliati due trattamenti: il primo all'inizio della fioritura; il secondo durante l'allegagione.
Per una più uniforme pezzatura ed una più precoce ed uniforme colorazione. **Dosi**: ml 150-200/hl. Sono consigliati due trattamenti: il primo dopo l'allegagione, il secondo prima della invaiatura.
PERO E MELO:
per una migliore allegagione **Dosi**: ml 100-150/hl. Trattamento nella fase della fioritura con 20-30% dei fiori aperti.
Come anticascola. **Dosi**: ml 150-200/hl ai primi sintomi di cascola
COLTURE ORTICOLE: (Fragola, pomodoro, zucchino, carciofo, spinacio, patata)
Fragola - **Per l'anticipo della fioritura ed una più precoce raccolta**. **Dosi**: ml 100-150/hl con due o più trattamenti: il primo 20-30 giorni prima della prevista fioritura; il secondo dopo l'allegagione.
Carciofo - **Per anticipare la produzione dei capolini**. **Dosi**: ml 150-200/hl alla formazione del primo abbozzo fiorale.
Ripetere il trattamento ogni 15-20 giorni.
Pomodoro - **Per una maggiore fioritura, allegagione, pezzatura e colorazione dei frutti**. **Dosi**: ml 150-200/hl. Sono consigliati due o più trattamenti irrorando tutta la vegetazione. Il primo alla dose di 150 ml/hl prima della fioritura; il secondo ed i successivi dopo la formazione dei primi frutti.
Patata - **Per stimolare l'emissione dei germogli**. **Dosi**: ml 150-200/hl. Immergere i tuberi (interi o tagliati) per circa 5 minuti.
Zucchino - **Per favorire l'ingrossamento dei frutti ed una più uniforme e anticipata pezzatura**. **Dosi**: ml 150-200/hl. Sono consigliati due o più trattamenti. Il primo appena formati i primi frutticini, irrorando tutte le piante. Ripetere il trattamento ad intervalli di 15-20 giorni appena si sono formati i nuovi frutti.
Spinacio - **Per un più precoce sviluppo e dimensione fogliare**. **Dosi**: ml 150-200/hl. Sono consigliati due o più trattamenti distanziati di 15-20 giorni l'uno dall'altro.
COLTURE FLORICOLE IN SERRA E PIENO CAMPO
Per aumentare la fioritura e per la formazione di fiori più grossi. **Dosi**: ml 150-200/hl. Sono consigliati tre o più trattamenti distanziati di 10-20 giorni l'uno dall'altro a partire dalle prime fasi di piena attività vegetativa.
COMPATIBILITA':
Il prodotto è miscibile con i fertilizzanti fogliari.
AVVERTENZA : In caso di miscele deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto è fitotossico per le pere Decana del Comizio.
Sospendere i trattamenti 27 giorni prima della raccolta della fragola e 20 giorni per le altre colture eduli
ATTENZIONE : mpiegare il prodotto esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

SOCOA **sas - Via Larga, 34/2 - 40138 Bologna**

Officina di Produzione:
TERRANALISI s.n.c., Via BIxio, 6 - Cento (Ferrara)
STI SOLFOTECNICA SPA, via Pian d'Asso Torrenieri, Montalcino (SI)
IRCA SERVICE SpA Fornovo S.Giovanni (BG)
Registrazione n 8557 del 3-12-1994 del Ministero della Salute
ml 20 - 100 - 250 - 500 - 1.000 Partita n

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

FRUMINEX MCPA

Diserbante ormonico selettivo liquido per frumento, orzo, avena, riso

Partita:

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
MCPA puro (da sale sodico) .....gr. 25 (= 282 g/l)
Coformulanti ....q.b. a gr. 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione; Irritante per la pelle; Rischio di gravi lesioni oculari

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico: Proteggersi gli occhi/la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

SOCOA s.a.s. - Via Larga, 34/2 - 40138 Bologna

Officina di Produzione:
Terranalisi srl, via N.Bixio n.6, Cento (FE)
CHEMIA Spa, SS 255 km 46, Dosso (FE)
IRCA SERVICE SpA Fornovo S.Giovanni (BG)
CONTENUTO: kg 0,250 - 0,5 - 1 – 10 Reg. n 9567 del 23/03/98 del Ministero della Salute

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: SINTOMI: Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare , miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatia arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: Il Fruminex MCPA è un diserbante ormonico selettivo indicato per il diserbo del frumento, orzo, avena e riso, contro le infestanti non graminacee. Il Fruminex MCPA, dopo l'assorbimento, viene traslocato con celerità nei vari organi della pianta, evitando rischi di dilavamento provocati da eventuali piogge che seguono il trattamento.
L'epoca del trattamento è compresa nel periodo intercorrente tra l'emissione della 5a e della 7 a foglia sul culmo principale, oppure alla fine dell'accestimento. Tuttavia non bisogna effettuare trattamenti nel periodo precedente la formazione della botticella e la maturazione delle cariossidi.
Per il diserbo del frumento, orzo e avena, il Fruminex MCPA si impiega alla dose di 2,5-4 kg/Ha in 400-600 litri di acqua ad iniziare dalla comparsa della 5a foglia del culmo principale (quando il frumento ha completato l'accestimento) fino all'inizio della fase di botticella. Per il diserbo del riso si consigliano le seguenti dosi - in risaia all'asciutto: 1,8-2 kg/ha; - in risaia con livello d'acqua da 3 a 4 cm: 2-3 kg/ha;
- in risaia a pieno livello (10 cm): 3-4 kg/ha. Il prodotto viene diluito in 400-600 lt di acqua per ettaro, ed iniziare a trattare dal completo accestimento (nell'intervallo tra l'emissione della 2a e della 4 a foglia sui germogli secondari) fino a qualche giorno prima della levata degli steli (circa nella prima quindicina di giugno per tutti i risi di semina e 20 giorni dopo per i risi da trapianto). Nelle risaie, prima del trattamento, il livello dell'acqua deve essere abbassato fino a scoprire la porzione superiore delle infestanti e rialzato 24 ore dopo il trattamento non trattare quando la temperatura è inferiore a 15øC.
Il prodotto si versa direttamente e lentamente, sotto agitazione, nel quantitativo di acqua richiesto.

COMPATIBILITÀ: FRUMINEX MCPA è miscibile con tutti gli altri prodotti per uso agricolo.
AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: FRUMINEX MCPA può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, ortaggi, fruttiferi, barbabietola da zucchero, leguminose, piante ornamentali, pioppeti, ecc. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento. Dopo il trattamento le attrezzature impiegato vanno ripetutamente lavate con acqua calda e soda.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

POLTIGLIA BORDOLESE SOCOA 20

Anticrittogamico cuprico. Tipo di formulazione: Polvere bagnabile

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
- Rame metallo .... gr 20
(da solfato, neutralizzato alla calce)
-Coformulanti ....q.b.a gr 100

Frasi di Rischio
Nocivo per inalazione; Rischio di gravi lesioni oculari;
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effettinegativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Non gettare i residui nelle fognature; Proteggersi gli occhi/la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

SOCOA sas - via Larga 34/2, 40138 Bologna

Stabilimento produttore:
CHEMIA spa, S.S.255, km 46 - S.Agostino (Ferrara)
TERRANALISI, via N.Bixio, 6 - Cento (Ferrara)
STI SOLFOTECNICA SPA, via Pian d'Asso Torrenieri, Montalcino (SI)
Registrazione n. 8822 del 11/4/1996 del Ministero della Sanità
kg. 0,1-1-5-10-25 Partita n

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolisi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenze: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO
La POLTIGLIA BORDOLESE SOCOA 20 è un fungicida polivalente a base di solfato di rame neutralizzato alla calce indicato per combattere le crittogame delle seguenti colture:
VITE: contro peronospora, botrite, alla dose di 1 kg/hl; MELO: contro ticchiolatura, cancri rameali, alla dose di 0,6-0,7 kg/hl; PERO: contro ticchiolatura, fumaggine, ruggine, maculatura bruna, cancri rameali, marciumi del colletto, alla dose di 0,6-0,7 kg/hl: per trattamenti in vegetazione; DRUPACEE (albicocco, susino, ciliegio, pesco-nettarine, mandorlo): contro bolla, monilia, fumaggine, corineo, cladosporiosi, cancri rameali, batteriosi, alla dose di 0,6-0,7 kg/hl; OLIVO: contro occhio di pavone, rogna, lebbra, alla dose di 0,7-0,8 kg/hl; AGRUMI: contro mal secco, antracnosi, allupatura, fumaggine, alla dose di 0,7-0,8 kg/hl; POMODORO: contro septoriosi, peronospora, cladosporiosi, botrite, batteriosi, alternaria, alla dose di 0,6-0,7 kg/hl; PATATA: contro peronospora, alternaria, alla dose di 0,6-0,7 kg/hl; FAGIOLO-PISELLO: contro peronospora, antracnosi, ruggine, batteriosi, alla dose di 0,5-0,6 kg/hl; CAVOLI, CAVOLFIORI, CAVOLI DI BRUXELLES, BROCCOLI: contro peronospora e alternaria alla dose di 0,5-0,6 kg/hl; CAROTA: contro alternaria alla dose di 0,5-0,6 kg/hl; SEDANO, FINOCCHIO, contro peronospora, septoria e cercospora, alla dose di 0,5-0,6 kg/hl;
MELANZANA, contro alternaria e peronospora alla dose di 0,5-0,6 kg/hl; CETRIOLO, contro peronospora, antracnosi, cladosporiosi e batteriosi, alla dose di 0,5-0,6 kg/hl; MELONE, ANGURIA: contro peronospora e antracnosi, alla dose di 0,5-0,6 kg/hl; CIPOLLA, AGLIO: contro peronospora e alternaria, alla dose di 0,5-0,6 kg/hl; INSALATA, CARDO, CARCIOFO: contro peronospora e alternaria, alla dose di 0,5-0,6 kg/hl; ROSA: contro ticchiolatura, peronospora, ruggine, fumaggine, alla dose di 0,6-0,7 kg/hl; CICLAMINO: contro antracnosi e maculatura fogliare, alla dose di 0,6-0,7 kg/hl; FILODENDRO: contro le batteriosi, 0,6-0,7 kg/hl; COLTURE FORESTALI: contro fumaggine, cancri rameali, alla dose di 0,8-1 kg/hl; BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro ruggine, cercospora, alternaria, alla dose di 0,7-0,8 kg/hl; OLEAGINOSE: contro, peronospora, alternaria, sclerotinia, alla dose di 0,7-0,8 kg/hl; FRAGOLA: contro vaiolatura, phytophthora, Colletotrichum, botrite, antracnosi, batteriosi, alternaria, alla dose di 0,7-0,8 kg/hl; TABACCO: contro peronospora, alternaria, alla dose di 0,6-0,7 kg/hl; CEREALI: contro septoriosi, ruggine alla dose di 0,7-0,8 kg/hl;
Nell'impiego autunno-invernale sulle pomacee e drupacee il formulato viene impiegato alla dose di kg 1,5-2 per quintale d'acqua.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve eseere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare durante la fioritura. Su Cv. di pesco, susino, e varietà di melo (Abbondanza, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Wine-sap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero (Abate fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cupro-sensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego. Non trattare su vite quando la temperatura è inferiore ai 6-8 °C.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO;IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

PROCILEX

Fungicida preventivo e curativo in polvere bagnabile

partita n

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione
-Procimidone puro ....g. 50
-Coformulanti ....qb a 100

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

SOCOA SAS - Via Larga 34/2 40138 Bologna

Officina di produzione: CHEMIA Spa, SS 255, km 46 - Dosso (FE) / Terranalisi Srl, Cento (Ferrara) / STI Solfotecnica spa, Cotignola (RA)
Hockey Int. Ltd., Poynton, Stockport, Cheshire (UK)
Registrazione n 9618 del 20/4/1998 del Ministero della Salute
g: 25-50-100-200 kg 0,5-1-5-10

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO
PROCILEX è un fungicida ad azione preventiva e curativa che viene indicato sulle seguenti colture:
VITE: contro la Muffa grigia alla dose di g. 100 - 150 per hl, effettuando 3-4 trattamenti nei periodi sotto indicati:
-a fine fioritura
-quando gli acini hanno il diametro di ca. 3 mm (in coincidenza della chiusura del grappolo)
-all'invaiatura, circa 7-8 settimane prima del raccolto
-3-4 settimane prima della raccolta.
Si consiglia di bagnare bene affinché vi sia una distribuzione uniforme del prodotto, la dose più alta impiegarla su varietà più sensibili all'attacco della malattia.
FRAGOLA: contro la Muffa grigia a g. 80 - 100 per q.le acqua con 3 trattamenti alle seguenti epoche:
-alla schiusura dei petali
-con ca. il 10-20% dei fiori aperti
-alla completa sfioritura. Bagnare bene sia la pianta che il terreno circostante.
POMODORO: contro la Muffa grigia g. 80 - 100 per q.le acqua, iniziando a trattare a fine fioritura del primo palco fiorale e ripetendo ogni 15 giorni sino a concludere 28 giorni prima della raccolta
PESCO - NETTARINE - PERCOCHE: contro il Marciume bruno (Monilia) sia dei fiori e dei rami (g. 150-200 per q.le acqua, con un primo trattamenti ai bottoni fiorali ed un altro con il 25% dei fiori aperti ed un successivo in piena fioritura) e dei frutti (g. 100 - 150 per q.le acqua, trattando 30-35 gg e 15-20 gg prima della raccolta.
PERO: contro la Maculatura bruna g. 1000 - 150 per q,le acqua con trattamenti a partire dalla fioritura e ripetuti.
LATTUGA: contro il Mal dello Sclerozio alla dose di kg 1,5 - 2 per ettaro.
INDIVIA: contro il Mal dello Sclerozio e la Muffa grigia alla dose di kg 1,5 - 2 per ettaro
TABACCO: contro i Marciumi da Botritis e Marciumi da Sclerotinia alla dose di kg. 1,5 - 2 per ettaro
ALBICOCCO - SUSINO: contro Muffa grigia e Marciume bruna da Monilia alla dose di 100 - 200 g. per q.le acqua
MANDORLO: contro Monilia alla dose di 150 - 200 g. per q.le acqua
PEPERONE - MELANZANA: contro Muffa grigia e Marciumi da Sclerotinia alla dose di 80 -100 g. per q.le acqua
CIPOLLA: contro Muffa grigia e Marciume bianco dei bulbi alla dose di 100 - 150 g/hl
CETRIOLO: contro Marciumi da Botrytis e da Sclerotinia a g. 100 - 150 / hl
FAGIOLINO: contro muffa grigia, mal dello sclerozio, a g 100 per quintale di acqua.
ACTINIDIA: contro Marciumi da Botrytis e Marciumi da Sclerotinia a g. 100/hl alla caduta dei petali ed eventualmente in pre - raccolta
NOCCIOLO: contro Marciume Bruno del nocciolo a g. 75 - 100/hl
GIRASOLE: contro la Sclerotinia a g. 100/hl prima della fioritura e g. 100-200 per q.le di seme nella concia
COLZA: contro la Sclerotinia alla dose di kg 1-1,5 per ettaro all'inizio della fioritura.
FLORICOLTURA IN PIENO CAMPO ED IN SERRA
contro Muffa grigia della rosa a g. 40-80 per q.le acqua, effettuando almeno 3 trattamenti iniziando dal germogliamento sin ad inizio fioritura, bagnando molto bene tutta la vegetazione. Contro la Muffa grigia della Gerbera, Geranio, Crisantemo, Garofano g. 40-80 per q.le acqua trattando con presenza della malattia a ripetuti

interventi. Contro Rhizoctonia del garofano ed altri ornamentali g. 4 dispersi in 5-10 litri di acqua per mq. di superficie, intervenendo 10 gg circa dopo la messa a dimora, quando è superata la crisi del trapianto e con comparsa dei primi sintomi della malattia ed eventualmente ripetendo l'intervento dopo circa un mese.

COMPATIBILITÀ: Miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservare le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': sui trattamenti alle colture orticole e floricole, specie se in serra, fare saggi preliminari.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO DELLA VITE, GIRASOLE, SUSINO, 45 GIORNI PER LA COLZA E 14 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SULLE ALTRE COLTURE.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

SOCOIL

INSETTICIDA – OVICIDA A BASE DI OLIO BIANCO

Composizione (riferita a 100 g.):
Olio minerale bianco (con oltre il 95% di R.I.)
purezza 100% .... g. 80
Emulsionanti, coadiuvanti, solventi .... g. 20

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso (se possibile mostrargli l'etichetta). **CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI**

SOCOIL è un olio bianco insetticida - ovicida emulsionato per la lotta primaverile-estiva contro le cocciniglie dei fruttiferi, agrumi, olivo, pinate ornamentali, uova di acari, afidi e psille.
MODALITA' D'IMPIEGO: Si diluisce con cura il quantitativo di SOCOIL richiesto in poca acqua e poi si versa si versa nel volume di acqua desiderato.
DOSI D'IMPIEGO
Frutticoltura a gemme chiuse .... 2-3 lt/hl
Frutticoltura al verde .... 1,5-2 lt/hl
Agrumicoltura ed olivicoltura .... 2-2,5 lt/hl
Floricoltura (Rose-Oleandri) .... 1,5-2 lt/hl
COMPATIBILITA': SOCOIL è compatibile con tutti gli antiparassitari esclusi i polisolfuri, il solfato di rame e lo zolfo. Su piante trattate con polisolfuri o zolfi distanziare i trattamenti con SOCOIL di 15 giorni.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionale prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. **FITOTOSSICITA':** Il prodotto non è fitotossico se impiegato secondo le istruzioni.
NOCIVITA': Impiegato alle dosi indicate e secondo le modalità prescritte il prodotto non è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. **Intervallo che deve essere rispettato dall'ultimo trattamento alla raccolta: 20 giorni se impiegato da solo**
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall' uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

SOCOA s.a.s., Viale Larga 34/2 - 40138 Bologna

Officina di produzione: TERRANALISI s.r.l. Via N.Bixio, 6 - Cento (FE) / CHEMIA s.p.a., s.s. 255 - km 46 - S.Agostino (FE) / STI SOLFOTECNICA SPA, via Pian d'Asso Torrenieri, Montalcino (SI) / IRCA SERVICE SPA, Fornovo S.Giovanni (BG).
CONTENUTO: Litri 0,1-0,2-0,5-1-5-10-20-50-100-200
Reg. n°9219 del 28/4/1997 del Ministero della Sanità - Riferimento partita

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

TOMYL - L

INSETTICIDA SISTEMICO
A LARGO SPETTRO D'AZIONE

Composizione:
METOMIL puro....... g 18,4 (=195g/l)
Coformulanti .... q.b. a g 100

MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO:
Molto tossico per ingestione;
Tossico per gli organismi acquatici,
può provocare a lungo termine
effetti negativi per l'ambiente
acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Non gettare i residui nelle fognature; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

SOCOA S.a.s.
Via Larga, 34/2 - 40138 Bologna

Officina di produzione: HOCKLEY INT. Ltd., Poynton, Stockport, Cheshire, UK / CHEMIA S.p.a., s.s. nø255 - S.Agostino (FE) / ALTHALLER ITALIA srl, S.Colombano al Lambro (MI)
Reg. n 9912 del 19/1/1999 del Ministero della Salute
Lt. 0,1-0,2-0,5-1-5-10 - Partita n

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che , determinando una facile regressione della sintomatologia può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea, broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina. Controindicazioni: Ossime.
Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO
(tutti i dosaggi sono riferiti a q.le d'acqua salvo diverse indicazione)
Il TOMYL-L è un insetticida sistemico che esplica la propria azione per contatto ed ingestione su larve ed adulti di insetti parassiti e con azione ovicida nei confronti di alcuni lepidotteri. Dotato di forte potere abbattente ed una limitata azione residua che ne permette l'impiego a breve distanza dalla raccolta.
VITE: contro Tignola e Tignoletta a ml. 200-250.Su Vite da tavola: la dose massima è pari a 2 litri/ha per un massimo di 2 applicazioni per anno.
DRUPACEE: contro Cydia molesta, Diaspis pentagona , Tignola, Afidi, Anarsia a ml.200.
OLIVO-AGRUMI: contro Cocciniglia Mezzograno di pepe (Saissetia olee), e Cocciniglie in genere alla dose di ml. 200-250.
PERO-MELO: contro Afidi, le larve di 1ø stadio di Lithocolletis e Leucoptera, larve dei ricamatori (Pandemis, Eulia, Archips, Carpocapsa pomonella, Capua reticulana, Caoeccia podana, Orgia antiqua) a ml. 200-250.
CUCURBITACEE: contro Afidi, Nottue, Aleurodidi a ml. 200.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Afidi, Cleono, Altica, a lt 2,5 per ettaro in 750-1000 litri d'acqua.
POMODORO, MELANZANA, PEPERONE: contro Nottue, Aleurodidi, Cavolaia, Afidi a ml. 200.
GAROFANO IN PIENO CAMPO: contro Bega a ml. 200-250
TABACCO-ORNAMENTALI E FLOREALI: contro Nottue, Tortricidi, Afidi, Tripidi e le larve di lepidotteri alla dose di ml. 200-250.
LATTUGA: contro Nottue e Cavolaie a ml.200.
FAGIOLO-PISELLO: contro larve di Lepidotteri a ml.200.
COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con le poltiglie solfocalciche.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo; devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Non immettere il bestiame da pascolo prima che sia trascorso il periodo di carenza.
NOCIVITA': Tossico per animali domestici, api, insetti utili, pesci e bestiame - Non immettere nel campo trattato pollame e bestiame prima di 14 giorni - Non preparare la soluzione in prossimità di corsi d'acqua.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima dell'ultimo trattamento e la raccolta per le Lattughe, 30 giorni per uva da tavola e 10 giorni per tutte le altre colture.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Attenzione : data l'elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23/04/2001

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

PRODOTTO DISTRIBUITO DA:
SOCOA TRADING SRL, BOLOGNA
AGRISYSTEM SRL, LAMEZIA TERME (CZ)

SOCOA TRADING S.r.l.

BETATRON PLUS wdg

ERBICIDA DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DI PRESEMINA E PRE-EMERGENZA IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione
METAMITRON puro......... g 60
LENACIL puro...................... g 5
Coformulanti ....q.b. a 100

Frasi di Rischio
Nocivo per ingestione; Irritante per gli occhi;
Altamente tossico per gli organismi acquatici

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

SOCOA TRADING s.r.l. - Via Larga, 34/2 - 40138 Bologna

Stabilimento produttore:
STI Solfotecnica Italiana Spa, Cotignola (RA)
Hockley Int. Ltd, 354 Park Lane - Poynton, Stockport, SK12 1RL, (UK)
Reg. n°10512 del 14/06/200 del Ministero della Salute
Contenuto: Kg 1 - 5 - 10 Riferimento partita:

INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO
BETATRON PLUS WDG è un erbicida selettivo in formulazione microgranuli idrodispersibili, che viene impiegato in pre-semina e pre-emergenza ed esplica la propria azione per assorbimento radicale e fogliare; viene indicato per il controllo delle seguenti infestanti: Alopecurus spp., Abutilon theophrasti, Amaranthus spp., Anagallis arvensis, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium spp., Digitaria sanguinalis, Diplotaxis spp., Euphorbia heliscopia, Galeopsis spp., Mercurialis annua, Myagrum spp., Phalaris spp., Poa spp., Polygonum spp., Setaria spp, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, Spergula arvensis, Stachis annua, Stellaria media, Veronica spp., Viola arvensis.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
PRE_SEMINA e PRE_EMERGENZA:
Kg 3 - 5 per HA in relazione al tipo di terreno e delle malerbe da combattere; i dosaggi più bassi vanno impiegati nei terreni sciolti o nel caso di miscela del prodotto con altri prodotti.
AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall' uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

CUPROXAMYL 320

Fungicida ad azione citotropica e translaminare

COMPOSIZIONE
- Cimoxanil puro..g. 3
- Rame metallo (sotto forma di idrossido)...............................g. 20
- Coformulanti .... q.b.a. g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione; Tossico per inalazione; Rischio di gravi lesioni oculari; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza; In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo

SOCOA TRADING srl - Via Larga 34/2 - Bologna

Registrazione n.10402 del 14/06/2000 del Ministero della Salute
Officina di produzione: CHEMIA Spa, S.Agostino, Ferrara / TERRANALISI srl, Via N.Bixio 6 - Cento (Ferrara)
Kg. 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15-20 partita n.

NORME PRECAUZIONALI: conservare la confezione ben chiusa

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 3% e Rame metallo 20% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: CIMOXANIL - derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesione a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il CUPROXAMIL è un fungicida che agisce per contatto e con azione citotropica translaminare, penetrando nei tessuti vegetali entro 6 ore dal trattamento con azione citotropica translaminare. Indicato per combattere la Peronospora, l'Alternaria, l'Antracnosi, la Batteriosi e con effetto secondario contro la Muffa grigia (Botrytis cinerea).
VITE: g. 400 (dose per q.le acqua)
CARCIOFO - PATATA - POMODORO - CIPOLLA - AGLIO - PORRO - GIRASOLE - SOIA - LATTUGA - ROSA - ZUCCHINO - MELONE - PISELLO - SPINACIO - TABACCO: g. 400 (dose per q.le acqua).
Si tratta da quando si hanno i primi sintomi di infezione della malattia e ripetendo ad ogni necessità.
FITOTOSSICITA': non trattare in fioritura.
COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con tutti i prodotti a reazione a neutra o acida, è sconsigliato l'impiego con prodotti a reazione alcalina. AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo . Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto del carciofo, soia e girasole 28 giorni e 20 giorni per tutte le altre colture.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

FITAGIL

FITORMONE - FITOSTIMOLANTE - ALLEGANTE

COMPOSIZIONE:
Acido gibberellico puro .... g 0,150 (1,65 g/l)
NAA (Acido alfa-naftalenacetico) .... g 0,300 (3,3 g/l)
Coformulanti e coadiuvanti .... c.b.a. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande: Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego **del prodotto.**

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
FITAGIL per la sua particolare composizione è un Fitoregolatore con azione di stimolo sullo sviluppo vegetativo, con attività complementari quali l'anticipo della fioritura e della maturazione, maggiore allegagione, pezzatura uniformi, migliore colore della frutta.

CAMPI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
AGRUMI: (Arancio, Limone, Pompelmo, Clementino)
Per una maggiore fioritura e allegagione. Dosi: ml 100-150/hl. Sono consigliati due trattamenti: il primo all'inizio della fioritura; il secondo durante l'allegagione.
Per una più uniforme pezzatura ed una più precoce ed uniforme colorazione. Dosi: ml 150-200/hl. Sono consigliati due trattamenti: il primo dopo l'allegagione, il secondo prima della invaiatura.
PERO E MELO:
per una migliore allegagione Dosi: ml 100-150/hl. Trattamento nella fase della fioritura con 20-30% dei fiori aperti.
Come anticascola. Dosi: ml 150-200/hl ai primi sintomi di cascola
COLTURE ORTICOLE: (Fragola, pomodoro, zucchino, carciofo, spinacio, patata)
Fragola - Per l'anticipo della fioritura ed una più precoce raccolta. Dosi: ml 100-150/hl con due o più trattamenti: il primo 20-30 giorni prima della prevista fioritura; il secondo dopo l'allegagione.
Carciofo - Per anticipare la produzione dei capolini. Dosi: ml 150-200/hl alla formazione del primo abbozzo fiorale.
Ripetere il trattamento ogni 15-20 giorni.
Pomodoro - Per una maggiore fioritura, allegagione, pezzatura e colorazione dei frutti. Dosi: ml 150-200/hl. Sono consigliati due o più trattamenti irrorando tutta la vegetazione. Il primo alla dose di 150 ml/hl prima della fioritura; il secondo ed i successivi dopo la formazione dei primi frutti.
Patata - Per stimolare l'emissione dei germogli. Dosi: ml 150-200/hl. Immergere i tuberi (interi o tagliati) per circa 5 minuti.
Zucchino - Per favorire l'ingrossamento dei frutti ed una più uniforme e anticipata pezzatura. Dosi: ml 150-200/hl. Sono consigliati due o più trattamenti. Il primo appena formati i primi frutticini, irrorando tutte le piante. Ripetere il trattamento ad intervalli di 15-20 giorni appena si sono formati i nuovi frutti.
Spinacio - Per un più precoce sviluppo e dimensione fogliare. Dosi: ml 150-200/hl. Sono consigliati due o più trattamenti distanziati di 15-20 giorni l'uno dall'altro.
COLTURE FLORICOLE IN SERRA E PIENO CAMPO
Per aumentare la fioritura e per la formazione di fiori più grossi. Dosi: ml 150-200/hl. Sono consigliati tre o più trattamenti distanziati di 10-20 giorni l'uno dall'altro a partire dalle prime fasi di piena attività vegetativa.

COMPATIBILITA':
Il prodotto è miscibile con i fertilizzanti fogliari.

AVVERTENZA : In caso di miscele deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto è fitotossico per le pere Decana del Comizio.
Sospendere i trattamenti 27 giorni prima della raccolta della fragola e 20 giorni per le altre colture eduli
ATTENZIONE :impiegare il prodotto esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

SOCOA Trading Srl - Via Larga, 34/2 - 40138 Bologna

Officina di Produzione:
ALTHALLER ITALIA Srl-S.Colombano al Lambro (MI)
IRCA SERVICE SpA Fornovo S.Giovanni (BG)
Registrazione n 12376 del 26/11/2004 del Ministero della Salute
ml 0,02-0,05-0,100-0,250-0,500-1

Distribuito da :SARIAF GOWAN SpA –Via Morgagni, 68 –Faenza (RA) Partita n

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA: DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

NET-RAM

Fungicida a base di Rame Solfato Pentaidrato

Con caratteristiche formulative che determinano l'impiego del rame a dosaggi ridotti

Tipo di formulazione : liquido concentrato

Partita n. :

COMPOSIZIONE
- Rame metallo g. 5,5 (=60 g/l)
(sotto forma di rame solfato pentaidrato)
- coadiuvanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO :
Irritante per gli occhi e la pelle - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Non gettare i residui nelle fognature; Proteggersi gli occhi/la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

SOCOA TRADING srl - Via Larga 34/2 - Bologna

Stabilimento produttore : ALTHALLER Italia srl— S.Colombano (MI) / IRCA SERVICE SpA SS. Cremasca 591 Fornovo S.Giovanni (BG)

Reg. n.11629 del 11/03/03 del Ministero della Salute - lt. 0,1-0,2-0,5-1-5-10-20

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE - DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il NET-RAM è un prodotto a base di rame solfato pentaidrato che, per la particolare formulazione, consente l'utilizzo di dosi d'impiego ridotte. L'applicazione ripetuta esplica un'azione biostimolante sulla pianta. Agisce preventivamente sulle seguenti colture :

Pero e Melo: 150 ml/hl (1,5 lt/ha) contro Ticchiolatura e Maculatura bruna con azione di contenimento verso il colpo di fuoco batterico intervenendo ogni 7-10 giorni dalle prime fasi vegetative fino alla raccolta in base all'andamento climatico.

Vite: contro la Peronospora della vite con trattamenti preventivi e ripetuti ogni 7- 10 giorni alla dose di 150 - 200 ml/hl. In caso di forti attacchi della fitopatia impiegare la dose massima e l'intervallo minimo.

Nocciolo: contro mal dello stacco e Xanthomonas corylina alla dose di 150 ml/hl nei trattamenti primaverili e 200 ml/hl in quelli autunnali

Pomodoro – Peperone – Melanzana – Patata – Fagiolo – Pisello – Spinacio – Lattuga – Insalata – Cardo – Carciofo – Melone – Anguria – Cetriolo – Sedano – Finocchio – Carota – Cipolla – Aglio : contro la peronospora e alla dose di 150 ml/hl trattando al primo manifestarsi delle condizioni della malattia e ripetendo in funzione del clima e dello sviluppo vegetativo

Cavoli – Cavolfiori – Cavoli Di Bruxelles – Broccoli : contro la Peronospora a 150 ml/hl trattando dopo il trapianto e dopo l'emergenza della coltura seminata ogni 10 – 15 giorni a seconda dell'andamento climatico.

Floricoltura (ciclamino, rosa, crisantemo, garofano, bulbose, geranio, ortensia, primula, cineraria, ficus elastica, statice, violaciocche, gipsofila, piante grasse, begonia, poinsettia, orchidea, calla, impatiens, azalea, rhododendro, fiori recisi: 100-150 ml/hl contro peronospora.

COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione alcalina. **AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE : agitare prima dell'uso; non impiegare la miscela dopo 48 ore.

FITOTOSSICITA': Non si deve trattare durante la fioritura.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

PENTA CU 55

Fungicida a base di Rame Solfato Pentaidrato
Con caratteristiche formulative che determinano l'impiego del rame a dosaggi ridotti
Tipo di formulazione : liquido concentrato

Partita n.

PENTA CU 55
COMPOSIZIONE
- Rame metallo g. 5,5 (~60 g/l)
(sotto forma di rame solfato pentaidrato)
- coadiuvanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO :
Rischio di gravi lesioni oculari; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Non gettare i residui nelle fognature; Proteggersi gli occhi/la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

SOCOA TRADING srl - Via Larga 34/2 - Bologna

Stabilimento produttore :
Terranalisi - Cento (FE), ALTHALLER Italia, S.Colombano (MI)
IRCA SERVICE Spa SS.Cremasca 591 Fornovo S.Giovanni (BG)

Reg. n.11164 del 24/01/02 del Ministero della Salute - lt. 0,1-0,2-0,5-1-5-10-20

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE - DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il PENTA CU 55 è un prodotto a base di rame solfato pentaidrato che, per la particolare formulazione, consente l'utilizzo di dosi d'impiego ridotte. Agisce preventivamente sulle seguenti colture :
Pero e Melo: 150 ml/hl (1,5 lt/ha) contro Ticchiolatura e Maculatura bruna con azione di contenimento verso il colpo di fuoco batterico intervenendo ogni 7-10 giorni dalle prime fasi vegetative fino alla raccolta in base all'andamento climatico. L'applicazione ripetuta esplica un'azione biostimolante sulla pianta.
Vite: contro la Peronospora della vite con trattamenti preventivi e ripetuti ogni 7- 10 giorni alla dose di 150 - 200 ml/hl. In caso di forti attacchi della fitopatia impiegare la dose massima e l'intervallo minimo.
Nocciolo: contro mal dello stacco e Xanthomonas corylina alla dose di 150 ml/hl nei trattamenti primaverili e 200 ml/hl in quelli autunnali
Pomodoro – Peperone – Melanzana – Patata – Fagiolo – Pisello – Spinacio – Lattuga – Insalata – Cardo – Carciofo – Melone – Anguria – Cetriolo – Sedano – Finocchio – Carota – Cipolla – Aglio : contro la peronospora e alla dose di 150 ml/hl trattando al primo manifestarsi delle condizioni della malattia e ripetendo in funzione del clima e dello sviluppo vegetativo.
Cavoli – Cavolfiori – Cavoli Di Bruxelles – Broccoli: contro la Peronospora a 150 ml/hl trattando dopo il trapianto e dopo l'emergenza della coltura seminata ogni 10 – 15 giorni a seconda dell'andamento climatico.
Floricoltura (ciclamino, rosa, crisantemo, garofano, bulbose, geranio, ortensia, primula, cineraria, ficus elastica, statice, violaciocche, gipsofila, piante grasse, begonia, poinsettia, orchidea, calla, impatiens, azalea, rhododendro, fiori recisi: 100-150 ml/hl contro peronospora.
COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione alcalina. **AVVERTENZA**: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi si intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE : agitare prima dell'uso; non impiegare la miscela dopo 48 ore.
FITOTOSSICITA': Non si deve trattare durante la fioritura.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

PENTA CU 55

Fungicida a base di Rame Solfato Pentaidrato
Con caratteristiche formulative che determinano l'impiego del rame a dosaggi ridotti
Tipo di formulazione : liquido concentrato

Partita n.

PENTA CU 55
COMPOSIZIONE
- Rame metallo g. 5,5 (=60 g/l)
(sotto forma di rame solfato pentaidrato)
- coadiuvanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO :
Rischio di gravi lesioni oculari; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Non gettare i residui nelle fognature; Proteggersi gli occhi/la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

SOCOA TRADING srl - Via Larga 34/2 - Bologna

Stabilimento produttore :
Terranalisi - Cento (FE), ALTHALLER Italia, S.Colombano (MI)
IRCA SERVICE Spa SS.Cremasca 591 Fornovo S.Giovanni (BG)

Reg. n.11164 del 24/01/02 del Ministero della Salute - **lt.** 0,1-0,2

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

TEPAN 55 CU

Fungicida a base di Rame Solfato Pentaidrato
Con caratteristiche formulative che determinano l'impiego del rame a dosaggi ridotti
Tipo di formulazione : liquido concentrato

Partita n. :

COMPOSIZIONE
- Rame metallo g. 5,5 (60 g/l)
 (sotto forma di rame solfato pentaidrato)
- coadiuvanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO :
Rischio di gravi lesioni oculari; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Non gettare i residui nelle fognature; Proteggersi gli occhi/la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

SOCOA TRADING srl - Via Larga 34/2 - Bologna

Stabilimento produttore :
ALTHALLER Italia, S.Colombano (MI)
IRCA SERVICE Spa SS Cremasca 591 Fornovo S.Giovanni (BG)

Reg. n. 11242 del 13/3/2002 del Ministero della Salute

lt. 0,1-0,2-0,5-1-5-10-20

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE - DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il TEPAN 55 CU è un prodotto a base di rame solfato pentaidrato che, per la particolare formulazione, consente l'utilizzo di dosi d'impiego ridotte. L'applicazione ripetuta esplica un'azione biostimolante sulla pianta. Agisce preventivamente sulle seguenti colture :
Pero e Melo: 150 ml/hl (1,5 lt/ha) contro Ticchiolatura e Maculatura bruna con azione di contenimento verso il colpo di fuoco batterico intervenendo ogni 7-10 giorni dalle prime fasi vegetative fino alla raccolta in base all'andamento climatico.
Vite: contro la Peronospora della vite con trattamenti preventivi e ripetuti ogni 7- 10 giorni alla dose di 150 - 200 ml/hl. In caso di forti attacchi della fitopatia impiegare la dose massima e l'intervallo minimo.
Nocciolo: contro mal dello stacco e Xanthomonas corylina alla dose di 150 ml/hl nei trattamenti primaverili e 200 ml/hl in quelli autunnali
Pomodoro – Peperone – Melanzana – Patata – Fagiolo – Pisello – Spinacio – Lattuga – Insalata – Cardo – Carciofo – Melone – Anguria – Cetriolo – Sedano – Finocchio – Carota – Cipolla – Aglio : contro la peronospora e alla dose di 150 ml/hl trattando al primo manifestarsi delle condizioni della malattia e ripetendo in funzione del clima e dello sviluppo vegetativo.
Cavoli – Cavolfiori – Cavoli Di Bruxelles – Broccoli : contro la Peronospora a 150 ml/hl trattando dopo il trapianto e dopo l'emergenza della coltura seminata ogni 10 – 15 giorni a seconda dell'andamento climatico.
Floricoltura (ciclamino, rosa, crisantemo, garofano, bulbose, geranio, ortensia, primula, cineraria, ficus elastica, statice, violaciocche, gipsofila, piante grasse, begonia, poinsettia, orchidea, calla, impatiens, azalea, rhododendro, fiori recisi: 100-150 ml/hl contro peronospora.
COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione alcalina. **AVVERTENZA**: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi si intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE : agitare prima dell'uso; non impiegare la miscela dopo 48 ore.
FITOTOSSICITA': Non si deve trattare durante la fioritura.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ZOLFO BAGNABILE SOCOA

ZOLFO IN POLVERE BAGNABILE

Partita n°

Composizione:
Zolfo puro (esente da selenio) g 80
Adesivanti, bagnanti, sospensivanti ed inerti q.b.a 100

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

IRRITANTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

SOCOA Trading srl, Via Larga 34/2, 40138 Bologna

Officina di produzione:
STI Solfotecnica italiana Spa, Cotignola (Ravenna)
CHEMIA Spa, S.Agostino (Ferrara)
TERRANALISI srl, Via Bixio 6, Cento (Ferrara)
Registrazione n° 9883 del 11/01/1999 del Ministero della Sanità
Peso netto: kg 0.2 - 0.5 - 1 - 5 - 10 - 20

INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
ZOLFO BAGNABILE SOCOA è un fungicida ad elevata concentrazione in principio attivo, dotato di adesività. Il prodotto viene impiegato contro tutte le forme di Oidio o mal bianco delle pomacee, drupacee, vite, colture ortive (melone, zucchino, cetriolo, cocomero, pomodoro, melanzana) e floreali in pieno campo.
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO (dosi per 100 litri d'acqua)
FRUTTICOLTURA: contro l'Oidio celle pomacee: gr.300 in trattamenti prefiorali, gr. 100-120 nel periodo primaverile-estivo. Contro l'Oidio delle drupacee gr. 120-180. **VITICOLTURA**: contro l'Oidio della vite gr. 100-150. **ORTICOLTURA**: contro l'Oidio del melone, dello zucchino, del
cetriolo, del cardo gr. 120-180. **FLORICOLTURA IN PIENO CAMPO**: gr. 120-180. Le dosi minime si usano nei periodi di caldo intenso. Le dosi indicate si riferiscono ai trattamenti con pompe a volume normale. Quando si effettuano i trattamenti con pompe a volume ridotto, le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti, aggiungere alla miscela un adesivo bagnante. Il prodotto va diluito in acqua fino ad ottenere una densa crema; il resto dell'acqua si aggiunge successivamente.
Compatibilità: lo ZOLFO BAGNABILE SOCOA è miscibile con con i più comuni fitofarmaci. ZOLFO BAGNABILE SOCOA non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacril, con Diclofluanide.
Avvertenza: ZOLFO BAGNABILE SOCOA deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano. In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione avvenuta.
Fitotossicità: ZOLFO BAGNABILE SOCOA può arrecare danno alle seguenti cultivar di: **Melo:** Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renette, Rome Beauty, Stayman red, Winesap. **Pero:** Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser, Alexander, Olibier de Serres, William, Decana del Comizio. **Vite**: Sangiovese. **Cucurbitacee**: può essere fitotossico.
Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro impiego è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ARGCHEMICAL S.n.c.

CUPRIPOL

FUNGICIDA A BASE DI RAME IN POLVERE BAGNABILE

CUPRIPOL

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Rame metallo (sotto forma di ossicloruro) 23 g
Coformulanti e inerti q. b. a 100 g

Xn

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione – Tossico per gli organismi acquatici
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

ARGCHEMICAL S.n.c.
Via Rossini 9/a – Stezzano (BG)

Officine di produzione: STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Cotignola (RA) / **TORRE S.r.l. –** Torrenieri (SI)
TERRANALISI S.r.l. – Cento (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità N° 10.422 del 29/03/2000

Contenuto: 100-150-200-250-300-350-400-500-750 g / 1–5–10–20 kg

Partita N°… del…..

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri – Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

ISTRUZIONI E DOSI D'IMPIEGO
Il prodotto va disperso in poca acqua, poi in agitazione si aggiunge la rimanente acqua per ottenere la dispersione voluta.
CUPRIPOL combatte le malattie fungine come: Peronospora, Ticchiolatura, Ruggine, Cancro, Bolla, Corineo, Lebbra, Mal secco, Occhio di pavone, Fumaggine, Alternariosi, Septoriosi, Cercospora.
Le dosi sotto indicate sono per 100 litri di acqua e per trattamenti a volume normale. Se si opera a volume ridotto le dosi vanno aumentate proporzionalmente in modo che la quantità di prodotto distribuito sia uguale a quello che si avrebbe a volume normale.
POMACEE (melo, pero): contro la Ticchiolatura. All'ingrossamento delle gemme 450-600 g - alla ripresa vegetativa 250-300 g - **DRUPACEE** (pesco, albicocco, susino): contro Corineo, Cancro e Bolla, nel periodo invernale 1200 g - **AGRUMI** (arancio, limone, mandarino, cedro): contro Fumaggine, Mal secco 350 g - **VITE**: contro Peronospora in pre-post fioritura 450 g - alla chiusura 400-500g - **OLIVO**: contro Occhio di pavone, Lebbra, Fumaggine 450-500 g - **ORTICOLTURA** (carciofo, carota, cardo, cavolo, cetriolo, cicoria, cipolla, fagiolo, melanzana, melone, pomodoro, pisello, sedano, spinacio, zucca) contro: Septoriosi, Peronospora e Alternariosi 400 g - **PATATA**: contro la Peronospora, Alternariosi e Septoriosi 400g - **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO**: intervento preventivo contro Cercospora 3,5 – 4,5 – kg/ha
FLORICOLE (rosa, garofano, crisantemo): contro Ticchiolatura, Ruggine e Peronospora 250g
CONCIA DELLE SEMENTI E DEI CEREALI (frumento, orzo, avena): contro la carie del frumento e del sorgo e i carboni nudi del frumento, dell'avena e dell'orzo 400 g per 100 kg di sementi de trattare. I semi trattati non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame; se non sono riutilizzati, per la loro distribuzione si deve operare secondo le norme dei prodotti nocivi.Per la lotta contro **alg**he e molluschi delle risaie: 3 – 4 kg/ha.
COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina.
FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino, le seguenti varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza, Belford, Black Stayman, Calvilla bianca, Golden Delicious, Gravenstein, Jonatan, Commercio, Rome Beauty, Morgeduft, Stayman Red, Stayman, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana e le seguenti varietà di pero cuprosensibili Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Contesa di Parigi, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Trionfo di Vienna, Butirra Giffard, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Da non impiegare su Drupacee (ciliegio escluso) dopo l'allegagione.
NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMNENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo dalle acque dalle aziende agricole e dalle strade).**
- **DA NON VENDERSI SFUSO**

METADION

Esca lumachicida pronta per l'uso per la lotta contro lumache, limacce, chiocciole e gasteropodi in genere
Impiego floreale per piante da appartamento e giardini domestici.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Metaldeide acetica pura 5 g
Coformulanti, inerti ed adescanti q. b. a 100 g
Contiene: Denatonium benzoato

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare il recipiente ben chiuso – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone – In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) – Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione – Evitare la contaminazione delle zone circostanti la vegetazione e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione..

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica uomo circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali.
Terapia: sintomatica
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
METADION viene impiegato per combattere lumache, limacce, chiocciole e gasteropodi in genere. La sua formulazione (granuli) è stata studiata per facilitare la distribuzione del prodotto e la sua attività essendo la sua azione per contatto e ingestione. L'azione disinfestante avviene per contatto e ingestione. La presenza nel formulato del Denatonium benzoato rende il prodotto disgustoso se incidentalmente ingoiato dall'uomo a dagli animali domestici. I granuli resistono per lungo tempo anche in presenza di vento e di pioggia.
MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Spargere METADION in modo uniforme a spaglio, preferibilmente alla sera, sulla superficie da disinfestare o a mucchietti intorno alle piante dove si noti la presenza di lumache, limacce, chiocciole o gasteropodi. E' preferibile che il terreno sia umido o dopo una pioggia o una innaffiatura.
Dosi consigliate: per un vaso da 20 cm di diametro 5-7 g (pari a 25-35 pellet)
Il contenuto della confezione da 100 g serve per il trattamento di 5-6 m2 (20-17 g al m2)
In caso di forti infestazioni è preferibile ripetere l'operazione quando si noti che i granuli stanno per scomparire.

COMPATIBILITA': Il prodotto va usato da solo.
ATTENZIONE: da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione; ogni altro uso è pericoloso – Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato.

ARGCHEMICAL s.n.c.
Via Rossini 9/a - STEZZANO (BG)

Officine di produzione: L.I.F.A S.r.l. – Vigonovo (VE) / **L.I.F.A S.r.l.** – Isola Vicentina (VI) / **IMC Limited** – Naxxar (Malta) / **NUOVA AGRICHIMICA SARDA S.r.l.** – Oristano.

Registrazione del Ministero della Sanità N° 10.774 /PPO del 11.04.2001

Lotto N° .... del ....

CONTENUTO: 100 – 200 – 250 – 500 – 750 g / 1 kg

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE**
- **DA NON VENDERSI SFUSO**

MAYER BRAUN S.r.l.

GRILLOMAYER

Esca pronta all'uso per la lotta contro il grillotalpa

Contiene una sostanza repellente al gusto per l'uomo e gli animali domestici

GRILLOMAYER

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Malation puro	5,00 g
Denatonium benzoato	0,03 g
Coformulanti	q. b. a 100 g

NATURA DEL RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MAYER BRAUN DEUTSCHLAND S.r.l.
Via Brigata Marche, 129 – 31030 CARBONERA (TV)

Officina di produzione: L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI) / **L.I.F.A. S.r.l. -** Vigonovo (VE)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 4.869 del 19.06.1982

Lotto n° ..... del ....

CONTENUTO: 250 – 500 – 750 g / 1 – 2 – 5 – 10 – 20 kg

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone – In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa confezione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo; ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE

E' un'esca insetticida granulare che agisce per contatto e per ingestione contro una vasta gamma di insetti terricoli quali: larve di lepidotteri, larve di ditteri, agrotidi, tignole, grillotalpe che danneggiano le colture floricole intensive in pieno campo o in serra.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Si impiega alla dose di 40-60 g ogni 10 m2 (40-60 kg/Ha) spargendo i granuli uniformemente sul terreno.

COMPATIBILITA': Il prodotto va usato da solo.

RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto e tossico per gli animali domestici, il bestiame, la selvaggina, i pesci e gli insetti utili. E' necessario pertanto far trascorrere 20 giorni dal trattamento prima di far pascolare il bestiame sulle zone trattate ed alimentarlo con vegetali che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto con il prodotto.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Non impiegare su colture destinate ad alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).**
- **DA NON VENDERSI SFUSO**

LIMACEMAYER

Esca lumachicida pronta all'uso
Contiene una sostanza repellente al gusto per l'uomo e gli animali domestici.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Metaldeide acetica pura	5,00 g
Denatonium benzoato	0,03 g
Coformulanti	q. b. a 100 g

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua,solubile in benzene e cloroformio; dose tossica uomo, circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali.
Terapia: sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
E' un'esca lumachicida che agisce per contatto e per ingestione.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Per le coltivazioni in pieno campo:
- Leggere e medie infestazioni 6 - 10 kg/Ha
- Forti infestazioni (40 - 50 individui per m2) 15 kg/Ha.

E' consigliabile spargere il prodotto lungo il perimetro del campo su una striscia larga circa 1,5 metri; internamente a questa striscia il prodotto si sparge più rado.

COMPATIBILITA': Il prodotto si impiega da solo.
RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto é tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.
SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

MAYER BRAUN DEUTSCHLAND S.r.l.
Via Brigata Marche, 129 – 31030 CARBONERA (TV)

Officina di produzione: L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) / **L.I.F.A. S.r.l.** - Isola Vicentina (VI)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 4.870 del 19.06.1982

Lotto N°..... del .....

CONTENUTO: 250 – 500 – 750 g / 1 – 2 – 5 – 10 – 20 kg

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE**

DA NON VENDERSI SFUSO

PANZERA S.a.s

TALPAX

CARTUCCIA FUMOGENA ANTITALPA

TALPAX

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Zolfo esente da selenio	33,75 g
Coformulanti	q. b. a 100 g

COMBURENTE

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare l'accensione di materie combustibili – Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Conservare lontano da fiamme e scintille-Non fumare – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

PANZERA s.a.s.
Regione Olmi 78 – Carignano (TO)

Officina di produzione: PANZERA s.a.s. – Carignano (TO)

Registrazione del Ministero della Sanità N° 6473 del 12/09/1985

CONTENUTO: N° 4 cartucce fumogene (peso netto 100 g)

DISTRIBUITO DA KOLLANT S.p.A. – PADOVA

NORME PRECAUZIONALI: Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone – Usare solo in luogo ben ventilato.
ATTENZIONE: il gas che si libera durante la combustione della cartuccia è irritante e nocivo.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO
La cartuccia deve essere applicata subito dopo che si è constatato la presenza delle prime gallerie o i primi mucchi di terra onde evitare che le talpe si fissino stabilmente. Un'applicazione tardiva causerà un risultato insufficiente. La cartuccia attivata va introdotta completamente nella cavità prodotta dall'animale.
Per attivarla la cartuccia va fregata con la sua testa nera contro la striscia scura posta nella parte inferiore dell'astuccio che la contiene.
Appena attivata la cartuccia va rapidamente introdotta in una delle cavità scavate dalla talpa: si possono usare più cartucce introducendole ciascuna in altre cavità. Dopo l'introduzione delle cartucce racchiudere rapidamente l'apertura in modo tale che i fumi che si sviluppano dalla cartuccia non escano all'esterno dalla tana.
Dopo aver introdotto la cartuccia evitare di sostare nei pressi del luogo di introduzione e soprattutto non respirare i fumi che si liberano dalla combustione della cartuccia.

COMPATIBILITÀ: il prodotto va usato da solo.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA PER GLI USI CONSENTITI. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, ed agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE**

DA NON VENDERSI SFUSO

CERRUS S.a.s.

Etichetta/Foglio illustrativo

DERROT

INSETTICIDA DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI ROTENONE - POLVERE BAGNABILE

DERROT – Insetticida

COMPOSIZIONE:
Rotenone g 4
Coadiuvanti q.b. a g 100

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

CERRUS sas di Ronzoni G. & C. - via Papa Giovanni XXIII, 84 - 21040 Uboldo (VA)
Officina di produzione: DIACHEM S.p.A. - U.p. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
PRO.PHY.M. Sarl - Z.I. Les Attignours - LA CHAMBRE (Francia)
Registrazione Ministero della Sanità n. 11020 del 25/09/2001
Peso netto: g 100-200-500; kg 1-5-10-15-20 Partita n°
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi; irritante oculare e cutaneo, sensibilizzante; nausea, vomito, dolori addominali; tremori e convulsioni, bradicardia, anosmia. Apparato respiratorio: stimolazione seguita da depressione. Terapia sintomatica. AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
DERROT è un insetticida di origine vegetale a base di Rotenone. Agisce energicamente per contatto ed ingestione ed è inoltre dotato di effetto stimolante sulle piante; viene impiegato alla dose di g 300 per ettolitro d'acqua, sulle seguenti colture : AGLIO * ALBICOCCO * CAROTA * CETRIOLO * CIPOLLA * FAGIOLO * FLOREALI ED ORNAMENTALI * LATTUGA * OLIVO * PESCO * RADICCHIO * SOLANACEE * SUSINO * ZUCCHINO * AGRUMI * CARCIOFO * CAVOLI * CILIEGIO * COCOMERO * FINOCCHIO * INDIVIA * MELO * PERO * PORRO * SEDANO * SPINACIO * VITE, per combattere i seguenti parassiti: Aleurodidi, Tripidi, Afidi, Dorifora, Cocciniglie, Tignole, Oplocampa, Altica, Cimici, Tentredini, Antonomo, Criocera, Meligete, Psilla, Formiche, Carpocapsa, Piralide, Nottue, Dacus oleae, Acari, Mosche della frutta, Pandemis, trattando alla prima comparsa, preferibilmente di sera, in presenza degli insetti.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: non e' miscibile con prodotti a reazione alcalina (es. polisolfuri). *Avvertenza*: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITÀ: il prodotto e' tossico per gli insetti utili, gli animali domestici e il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

AVVERTENZE Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 24 ore ed i tempi di carenza del formulato, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso agli animali domestici alle aree trattate prima che siano trascorsi i tempi di carenza.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DERROT

INSETTICIDA DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI ROTENONE - POLVERE BAGNABILE

DERROT – Insetticida

COMPOSIZIONE:
Rotenone g 4
Coadiuvanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CERRUS sas di Ronzoni G. & C. - via Papa Giovanni XXIII, 84 - 21040 Uboldo (VA)
Officina di produzione: DIACHEM S.p.A. - U.p. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
PRO.PHY.M. Sarl - Z.I. Les Attignours - LA CHAMBRE (Francia)
Registrazione Ministero della Sanità n. 11020 del 25/09/2001
Peso netto: g 100-200-500; kg 1-5-10-15-20 Partita n°
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ATTENZIONE: PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta/Foglio illustrativo

FLORAPIR

INSETTICIDA A BASE DI PIRETRO NATURALE - POLVERE BAGNABILE

FLORAPIR – Insetticida

COMPOSIZIONE:
Piretrine g 1
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CERRUS sasdi Ronzoni G. & C. - via Papa Giovanni XXIII, 84 - 21040 Uboldo (VA)
Registrazione n. 10561 del 01/08/2000 del Ministero della Sanità
Stabilimenti di produzione: STI - SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.a. - Cotignola (RA)
DIACHEM S.p.a. - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
Peso netto: g 100-200-500, Kg 1-5-10-15-20 Partita n°
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre – post - sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il FLORAPIR è un insetticida a base di Piretro naturale con coformulanti di origine vegetale, che possiede azione prevalentemente per contatto ed in minor misura per ingestione, la sua azione è rapida (forte potere abbattente) e di breve persistenza.
I trattamenti devono essere eseguiti bagnando abbondantemente le piante alla comparsa delle infestazioni e in giornate di tempo buono.
Viene impiegato sulle seguenti colture (**dosi per 100 litri d'acqua**):

AGRUMI: contro ogni tipo di insetto parassita a 280-320g
POMACEE - FICO - MELOGRANO - NOCCIOLO: contro gli Afidi, Pille e Tripidi a 280-320g
DRUPACEE: contro Mosca ed Afidi a 280-320 g
VITE - OLIVO: contro Mosca, Acari ed Afidi a 280-320 g
ORTAGGI (escluso i funghi) - FRAGOLA: contro Afidi, Mosca, Cavolaia, Bemisia, Moscerino, Farfalle di minatori, Psilla, Tripidi e Aleurodidi a 280-400 g
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - GIRASOLE - FORAGGERE: contro tutti gli insetti 280-400 g
TABACCO: contro tutti gli insetti a 200-300 g
CEREALI: per la disinfezione in genere 280-320 g
FLORICOLTURA - ORNAMENTALI: contro gli Afidi, Cicaline, Tingidi, Coleotteri, Lepidotteri defogliatori, Aleurodidi e Tentredini a 280-320 g
PATATA: contro Dorifora a 280-400 g

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': non compatibile con prodotti a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri)
AVVERTENZA: in caso di miscela deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': alle dosi indicate non presente fenomeni di fitotossicità.
Sospendere i trattamenti 2 giorni prima della raccolta
NOCIVITÀ : il prodotto è tossico per le api e gli insetti utili.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

FLORAPIR

INSETTICIDA A BASE DI PIRETRO NATURALE - POLVERE BAGNABILE

FLORAPIR – Insetticida

COMPOSIZIONE:
Piretrine g 1
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CERRUS sas di Ronzoni G. & C. - via Papa Giovanni XXIII, 84 - 21040 Uboldo (VA)
Registrazione n. 10561 del 01/08/2000 del Ministero della Sanità
Stabilimenti di produzione: STI - SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.a. - Cotignola (RA)
DIACHEM S.p.a. - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
Peso netto: g 100-200-500, Kg 1-5-10-15-20 Partita n°
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ATTENZIONE: PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta/Foglio illustrativo

PIRETRO NATURA

INSETTICIDA A BASE DI PIRETRO NATURALE – LIQUIDO EMULSIONABILE

PIRETRO NATURA – Insetticida

COMPOSIZIONE:
Piretrine pure g 2
(da estratto di piretro al 25% g 8)
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CERRUS sasdi Ronzoni G. & C. - via Papa Giovanni XXIII, 84 - 21040 Uboldo (VA)
Registrazione n. 10560 del 01/08/2000 del Ministero della Sanità

Stabilimento di produzione e confezionamento: STI - SOLFOTECNICA ITALIANA spa - Torrenieri (fraz. di Montalcino) (SI)
DIACHEM spa - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI)
Solo confezionamento: PRO.PHY.M. sarl - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)
Contenuto netto: ml 20-50-100-200-500; l1-5-10-15-20 Partita n°
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre – post - sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea: reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica. Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il PIRETRO NATURA è un insetticida a base di Piretro naturale con coformulanti di origine vegetale che possiede azione prevalentemente per contatto ed in minor misura per ingestione. La sua azione è rapida (forte potere abbattente) e di breve persistenza.
I trattamenti devono essere eseguiti bagnando abbondantemente le piante alla comparsa delle infestazioni e in giornate di tempo buono, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche. Possiede limitata azione tossica per l'uomo e gli animali a sangue caldo. PIRETRO NATURA è consigliato nei programmi di difesa sia integrata che biologica.
Viene impiegato sulle seguenti colture (dosi per 100 litri d'acqua) :
AGRUMI: contro ogni tipo di insetto parassita ml 140 – 160, Metcalfa ml 200.
POMACEE - FICO - MELOGRANO – NOCCIOLO - MANDORLO: contro gli Afidi, Psille e Tripidi, Antonomo, Tingide del pero, Pentatomidi (o Cimici Verdi), Cicaline, Tignole, Minatori (adulti) ml 140 - 160, Metcalfa ml 200.
DRUPACEE: contro Mosca, Afidi, Tentredini e Tripidi ml 140 - 160, Metcalfa ml 200.
VITE: contro Tignole, Cicaline, Scafoideo della vite ml 140 – 160, Metcalfa ml 200.
OLIVO: contro Mosca, Acari ed Afidi, Tripidi, Cocciniglie ml 140 – 160, Metcalfa ml 200.
ORTAGGI (escluso i funghi) - FRAGOLA: contro Afidi, Mosca, Cavolaia, Bemisia, Moscerino, Farfalle di minatori, Psilla, Criocera, Tripidi e Aleurodidi ml 140 - 200
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - GIRASOLE - FORAGGERE: contro tutti gli insetti ml 140 - 200
TABACCO: contro tutti gli insetti ml 100 - 150
CEREALI: per la disinfezione in genere ml 140 - 160
FLORICOLTURA - ORNAMENTALI: contro gli Afidi, Cicaline, Tingidi, Coleotteri, Lepidotteri defogliatori, Tripidi, Aleurodidi e Tentredini ml 140 – 160, Larve di Ifantria ml 240.
PATATA: contro Dorifora ml 140 - 200

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': non compatibile con prodotti a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri).
AVVERTENZA: in caso di miscela deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': alle dosi indicate non presente fenomeni di fitotossicità.
Sospendere i trattamenti 2 giorni prima della raccolta
NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per le api e gli insetti utili.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

PIRETRO NATURA

INSETTICIDA A BASE DI PIRETRO NATURALE – LIQUIDO EMULSIONABILE

PIRETRO NATURA – Insetticida

COMPOSIZIONE:
Piretrine pure g 2
(da estratto di piretro al 25% g 8)
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CERRUS sasdi Ronzoni G. & C. - via Papa Giovanni XXIII, 84 - 21040 Uboldo (VA)
Registrazione n. 10560 del 01/08/2000 del Ministero della Sanità

Stabilimento di produzione e confezionamento: STI - SOLFOTECNICA ITALIANA spa - Torrenieri (fraz. di Montalcino) (SI)
DIACHEM spa - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI)
Solo confezionamento: PRO.PHY.M. sarl - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)
Contenuto netto: ml 20-50-100-200-500; l1-5-10-15-20 Partita n°
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ATTENZIONE: PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta/Foglio illustrativo

ROTEMIX

INSETTICIDA DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI ROTENONE – LIQUIDO EMULSIONABILE

ROTEMIX – Insetticida

COMPOSIZIONE:
Rotenone g 4 (=48 g/l)
Coadiuvanti q.b. a g 100

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

CERRUS S.a.s. - Via Papa Giovanni XXIII°, 84 - UBOLDO (VA)
Officina di produzione e confezionamento: DIACHEM S.p.A. - U.p. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI)
Solo confezionamento: PRO.PHY.M. Sarl - Z.I. Les Attignours - LA CHAMBRE (Francia)
Registrazione Ministero della Sanità n. 11019 del 25/09/2001
Contenuto netto: ml 100-200-500; l 1-5-10-15-20 Partita n°
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi; irritante oculare e cutaneo, sensibilizzante: nausea, vomito, dolori addominali; tremori e convulsioni, bradicardia, anosmia. Apparato respiratorio: stimolazione seguita da depressione. Terapia sintomatica. AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
ROTEMIX è un insetticida di origine vegetale a base di Rotenone. Agisce energicamente per contatto ed ingestione ed è inoltre dotato di effetto stimolante sulle piante; viene impiegato alla dose di ml 300 per ettolitro d' acqua, sulle seguenti colture :
AGLIO * ALBICOCCO * CAROTA * CETRIOLO * CIPOLLA * FAGIOLO * FLOREALI ED ORNAMENTALI * LATTUGA * OLIVO * PESCO * RADICCHIO * SOLANACEE * SUSINO * ZUCCHINO * AGRUMI * CARCIOFO * CAVOLI * CILIEGIO * COCOMERO * FINOCCHIO * INDIVIA * MELO * PERO * PORRO * SEDANO * SPINACIO * VITE, per combattere i seguenti parassiti: Aleurodidi, Tripidi, Afidi, Dorifora, Cocciniglie, Tignole, Oplocampa, Altica, Cimici, Tentredini, Antonomo, Criocera, Meligete, Psilla, Formiche, Carpocapsa, Piralide, Nottue, Dacus oleae, Acari, Mosche della frutta, Pandemis, trattando alla prima comparsa, preferibilmente di sera, in presenza degli insetti.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: non e' miscibile con prodotti a reazione alcalina (es. polisolfuri). *Avvertenza*: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITÀ: il prodotto e' tossico per insetti utili, animali domestici, bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

AVVERTENZE: Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 24 ore ed i tempi di carenza del formulato, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso agli animali domestici alle aree trattate prima che siano trascorsi i tempi di carenza.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ROTEMIX

INSETTICIDA DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI ROTENONE – LIQUIDO EMULSIONABILE

ROTEMIX – Insetticida

COMPOSIZIONE:
Rotenone g 4 (=48 g/l)
Coadiuvanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CERRUS S.a.s. - Via Papa Giovanni XXIII°, 84 - UBOLDO (VA)
Officina di produzione e confezionamento: DIACHEM S.p.A. - U.p. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI)
Solo confezionamento: PRO.PHY.M. Sarl - Z.I. Les Attignours - LA CHAMBRE (Francia)
Registrazione Ministero della Sanità n. 11019 del 25/09/2001
Contenuto netto: ml 100-200-500; l 1-5-10-15-20 Partita n°
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ATTENZIONE: PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta/Foglio illustrativo

SULFALIL

FUNGICIDA A BASE DI ZOLFO PER LA LOTTA ALL'OIDIO O MAL BIANCO DI NUMEROSE COLTURE
POLVERE BAGNABILE

SULFALIL – Fungicida

COMPOSIZIONE:
Zolfo puro (esente da Selenio) g 30
Coadiuvanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

CERRUS sas di Ronzoni G. & C. - via Papa Giovanni XXIII, 84 - 21040 Uboldo (VA)
Registrazione n. 10559 del 01/08/2000 del Ministero della Sanità
Stabilimenti di produzione: STI - SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.a. - Cotignola (RA)
DIACHEM S.p.a. - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
Peso netto: g 100-200-500, Kg 1-5-10-20 Partita n°
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME DI SICUREZZA: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni.

CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il SULFALIL è un prodotto a base di Zolfo bagnabile finemente micronizzato, indicato per trattamenti preventivi e curativi contro tutte le forme di Oidio e Mal Bianco con azione collaterale di contenimento nei confronti di altre malattie fungine quali Ticchiolatura, Ruggini, Corineo e anche di alcune specie di Acari, in particolare degli Eriofidi. Agisce per contatto ed il suo impiego deve essere preventivo o alla comparsa dei primi sintomi della malattia.

DOSI (ogni 100 litri di acqua) :

Vite - Pomacee - Agrumi - Drupacee - Ortaggi - Fragola - Olivo - Nocciolo - Patata - Girasole - Soia - Tabacco
Floreali e ornamentali - Forestali - Vivai di pioppo : 350g per q.le acqua preventivamente o alla comparsa dei primi sintomi

Cereali: intervenire alla comparsa dei primi sintomi della malattia sulle foglie apicali alla dose di 6 kg per ettaro.
Barbabietola da zucchero: 6kg/ha. Eseguire 2 applicazioni: uno alla comparsa della malattia ed uno dopo 20 giorni.
Nel periodo estivo trattare soltanto durante le ore più fresche della giornata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese ecc.), con olii minerali, con captano, con DDVP e diclofluanide. Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del captano.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': può arrecare danni alle seguenti cultivar di **Melo:** Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap, e di **Pero:** Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, Williams, Decana del Comizio. **Vite:** Sangiovese. **Cucurbitacee:** può essere fitotossico

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SULFALIL

FUNGICIDA A BASE DI ZOLFO PER LA LOTTA ALL'OIDIO O MAL BIANCO DI NUMEROSE COLTURE
POLVERE BAGNABILE

SULFALIL – Fungicida

COMPOSIZIONE:
Zolfo puro (esente da Selenio) g 30
Coadiuvanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

CERRUS sas di Ronzoni G. & C. - via Papa Giovanni XXIII, 84 - 21040 Uboldo (VA)
Registrazione n. 10559 del 01/08/2000 del Ministero della Sanità
Stabilimenti di produzione: STI - SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.a. - Cotignola (RA)
DIACHEM S.p.a. - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
Peso netto: g 100-200-500, Kg 1-5-10-20 Partita n°
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ATTENZIONE: PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

INTERTEC S.r.l.

ETICHETTA NORMALE E FOGLIO ILLUSTRATIVO

BIOGIB FORTE

ORMONE VEGETALE STIMOLANTE DELLA CRESCITA DELLE PIANTE
POLVERE SOLUBILE

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Acido giberellico (GA 3) puro 9 g
Supporto q. b. a 100 g

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
BIOGIB FORTE è costituente naturale utile alle piante con effetti fisiologici e morfologici sulle stesse a concentrazioni molto basse. BIOGIB FORTE favorisce una più rapida germogliazione e crescita, incremento del volume dei frutti e una maggiore produzione nelle colture.
EPOCA D'IMPIEGO
- **Carciofo:** alla comparsa dell'infioresenza,
- **Patata:** per stimolare un uniforme germogliamento delle patate da seme immergere i tuberi in una soluzione del prodotto per circa 40 minuti prima della semina,
- **Limone e arancio:** per ottenere buccia più liscia e ritardare la maturazione trattare prima che i frutti prendano colore
- **Pero:** per favorire l'allegagione trattare quando il 20-40 % dei fiori è aperto. Sulle varietà a forma allungata si sconsiglia l'uso del prodotto per non avere deformazioni. Per contrastare i danni delle gelate subito dopo l'evento del freddo e non oltre le 48 ore
- **Vite:** nelle uve con semi per ottenere raspi più lunghi con acini più distanziati trattare all'inizio della fioritura; nelle uve senza semi per ottenere produzione precoce con acini più grossi trattare 5-6 giorni prima della fioritura.
- **Pomodoro:** per aumentare l'allegagione spruzzare all'interno di ogni fiore ripetendo il trattamento man mano che sbocciano i fiori.
- **Fragola:** per aumentare il raccolto 30-40 giorni prima della fioritura.
- **Floricoltura:** particolarmente adatto per il trattamento di **Ortensie e Crisantemi** per ottenere, oltre che all'anticipo della fioritura, fiori più grossi e con stelo più lungo ; per **Anemoni, Ciclamini e Fiordalisi** ne anticipa e aumenta la fioritura. I trattamenti vanno fatti alla comparsa dei primi boccioli ripetendoli a distanza di 20-30 giorni.

DOSI D'IMPIEGO (per ettolitro di acqua):
Pero e carciofo: 10-20 g / **Agrumi:** 10-15 g / **Patata:** 1-2 g / **Vite:** 0,5-2 g
Pomodoro, fragola e floricoltura: 0,5-1 g

COMPATIBILITA': Il prodotto va usato da solo in associazione soltanto con concimi fogliari neutri
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali

INTERTEC S.r.l.
Via Modigliani, 4 – AREZZO

Officina di produzione: GRUPO BIOQUIMICO MEXICANO S.A. – Carretera Monterrey – km. 15,5 Saltillo (Messico)

Registrazione del Ministero della Sanità N^ 10.176 del 11/10/1999

CONTENUTO: 10 – 50 – 100 – 200 – 500 g / 1 kg

Partita N° ....

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE**

DA NON VENDERSI SFUSO

ETICHETTA RIDOTTA

BIOGIB FORTE

ORMONE VEGETALE STIMOLANTE DELLA CRESCITA DELLE PIANTE
POLVERE SOLUBILE

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Acido giberellico (GA 3) puro	9 g
Supporto	q. b. a 100 g

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

COMPATIBILITA': Il prodotto va usato da solo in associazione soltanto con concimi fogliari neutri
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali

INTERTEC S.r.l.
Via Modigliani, 4 – AREZZO

Officina di produzione: GRUPO BIOQUIMICO MEXICANO S.A. – Carretera Monterrey – km. 15,5 Saltillo (Messico)

Registrazione del Ministero della Sanità N^ 10.176 del 11/10/1999

CONTENUTO: 10 – 50 – 100 – 200 – 500 g / 1 kg

Partita N° ....

- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

AZF AGRICOLTURA S.r.l.

ACARIN

ACARICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

ACARIN

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Dicofol puro 18,5 g (180 g/litro)
Coformulanti q. b. a 100 g

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle – Rischio di gravi lesioni oculari – Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico – Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7 - PADOVA

Officina di produzione: L.I.F.A. S.r.l. – Vigonovo (VE)

Registrazione del Ministero della Salute N° 10.417 del 29.03.2000

CONTENUTO: 50-100-150-200-250-300-350-500-750 ml / 1 – 5 litri

Partita N°…….. del …….

DISTRIBUITO DA KOLLANT S.p.A. – **Via Trieste 49/53 - Padova**

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa – Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e gli indumenti – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: *cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.*
Terapia: *sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.*
Controindicazioni: *per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino all'eliminazione completa.*
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
ACARIN è un acaricida efficace contro i ragnetti rossi (Panonycus ulmi, Tetranychus urticae) e Ragno giallo che infestano la vite (esclusa la vite per uve da tavola), il limone e l'arancio - l'acaro dell'argentatura degli agrumi. Il prodotto trova inoltre efficace impiego contro gli acari di piante ornamentali, floreali e forestali. **ACARIN** agisce prevalentemente per contatto nei confronti di forme mobili (larve e adulti) ed è dotato di lunga persistenza. L'effetto residuo dell'**ACARIN** uccide anche le larve nate dopo il trattamento, per cui le piante risultano protette per un lungo periodo di tempo.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Nei trattamenti a volume normale l'**ACARIN** si impiega alla dose di 200-250 ml per 100 litri di acqua. La dose minore si impiega nella generalità dei casi nelle fasi iniziali dell'infestazione, mentre la dose maggiore si usa in caso di attacchi massicci e con infestazioni in fase avanzata. Per l'applicazione del prodotto si consiglia di impiegare un forte quantitativo di acqua fino allo sgocciolamento e di usare un comune adesivo bagnante alla dose consigliata dalla ditta produttrice. Quando i trattamenti si effettuano a volume ridotto, le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire la stessa quantità di principio attivo per unità di superficie. Nei trattamenti primaverili-estivi l'**ACARIN** può essere mescolato vantaggiosamente con un acaricida-ovicida. Il prodotto si aggiunge direttamente e lentamente sotto agitazione nel quantitativo di acqua richiesta o nella miscela antiparassitaria già preparata.

COMPATIBILITA': ACARIN non è compatibile con i fitofarmaci a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': il prodotto è fitotossico per la melanzana ed il peperone.
RISCHI DI NOCIVITA': ACARIN è tossico per gli insetti utili.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).**

DA NON VENDERSI SFUSO

ACARIN

ACARICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

ACARIN

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Dicofol puro 18,5 g (180 g/litro)
Coformulanti q. b. a 100 g

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle – Rischio di gravi lesioni oculari – Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico – Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7 - PADOVA

Officina di produzione: L.I.F.A. S.r.l. – Vigonovo (VE)

Registrazione del Ministero della Salute N° 10.417 del 29.03.2000

CONTENUTO: 50-100 ml

Partita N°…….. del …….

DISTRIBUITO DA KOLLANT S.p.A. – **Via Trieste 49/53 - Padova**

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa – Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e gli indumenti – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: *cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.*
Terapia: *sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.*
Controindicazioni: *per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino all'eliminazione completa.*
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

COMPATIBILITA': ACARIN non è compatibile con i fitofarmaci a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRI VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

DA NON VENDERSI SFUSO

BAGNANTE AGRICOLO

BAGNANTE LIQUIDO MISCIBILE

BAGNANTE AGRICOLO

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Diottil Solfosuccinato sodico	9 g
Diluente	q. b. a 100 g

IRRITANTE

Frasi di rischio: Irritante per gli occhi
Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7 - PADOVA

Officine di produzione:
L.I.F.A. S.r.l. – Vigonovo (VE) / **L.I.F.A. S.r.l.** – Isola Vicentina (VI)

Registrazione del Ministero della Sanità n^ 6632 del 18.03.1986

CONTENUTO: 100 ml
1 – 5 – 10 – 20 litri

Riferimento Partita: …………

DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. – Via Trieste, 49/53 - Padova

NORME PRECAUZIONALI: Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone – Conservare il prodotto nel contenitore originale chiuso e in luogo asciutto e fresco.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche: s'impiega come ausiliario nei trattamenti antiparassitari, quando si intende migliorare il potere bagnante, la sospensività e la miscibilità delle poltiglie.
EPOCHE D'IMPIEGO: quelle delle poltiglie a cui viene aggiunto.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
50-100 ml per ettolitro di poltiglia già preparata, rimescolando con cura. Nel caso di impiego con erbicidi, controllare se questi sono compatibili con agenti tensioattivi, in quanto questi ultimi possono modificarne la selettività..

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari, compresi quelli alcalini.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRI VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).**

DA NON VENDERSI SFUSO

BAGNANTE AGRICOLO

BAGNANTE LIQUIDO MISCIBILE

BAGNANTE AGRICOLO

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Diottil Solfosuccinato sodico 9 g
Diluente q. b. a 100 g

IRRITANTE

Frasi di rischio: Irritante per gli occhi
Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7 - PADOVA

Officine di produzione:
L.I.F.A. S.r.l. – Vigonovo (VE) / **L.I.F.A. S.r.l.** – Isola Vicentina (VI)

Registrazione del Ministero della Sanità n^ 6632 del 18.03.1986

CONTENUTO: 100 ml

Riferimento Partita: …………

DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. – Via Trieste, 49/53 - Padova

NORME PRECAUZIONALI: Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone – Conservare il prodotto nel contenitore originale chiuso e in luogo asciutto e fresco.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari, compresi quelli alcalini.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRI VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

DA NON VENDERSI SFUSO

DIREX P

INSETTICIDA IN POLVERE SECCA

DIREX P

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Diazinone puro 7 g
Supporto inerte q. b. a 100 g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non disperdere nell'ambiente riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7 - PADOVA

Officine di produzione:
L.I.F.A. S.r.l. – Vigonovo (VE) / **L.I.F.A. S.r.l.** – Isola Vicentina (VI)

Registrazione del Ministero della Salute N° 11408 del 23/07/2002

CONTENUTO:100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 400 – 500 – 750 g / 1 – 5 – 10 – 20 kg

Partita N°........ del ....

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi preglanghiari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione, sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolare. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, può provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle stremità).Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
Insetticida polivalente con azione anche citotropica che agisce per contatto e ingestione su di una vasta serie di insetti come: cidia, anarsia, tignola, afidi, minatori, cimici, altica, cleono, psilla, mosche, tortrici, nottue, ferretti, formiche, maggiolini.
Trattamenti sulle seguenti colture e al terreno: **Fruttiferi:** melo, pero, ciliegio, arancio, pompelmo, frutta a guscio (nocciolo) – **Barbabietola da zucchero – Floricole e Ornamentali.**

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Per colture erbacee ed arboree, usando opportuni polverizzatori, distribuire il prodotto tal quale sulla vegetazione alla dose di 18 – 30 kg/ha.
Se usato contro formiche o altri insetti del terreno distribuire uniformemente il prodotto sulla superficie da disinfestare nella dose di 30 – 70 kg/ha, interrandolo leggermente.

COMPATIBILITA': il prodotto va usato da solo.
RISCHI DI NOCIVITA': é nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
- PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
- SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
- IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
- NON OPERARE CONTRO VENTO
- IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

DA NON VENDERSI SFUSO

Etichetta ridotta

DIREX P

INSETTICIDA IN POLVERE SECCA

DIREX P

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Diazinone puro	7 g
Supporto inerte	q. b. a 100 g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini –
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare,
né bere, né fumare durante l'impiego – Non disperdere nell'ambiente riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7 - PADOVA

Registrazione del Ministero della Salute N° 11408 del 23/07/2002

CONTENUTO: 100 g

Partita N°…….. del ……..

- SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
- IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
- IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

ETICHETTA NORMALE E FOGLIO ILLUSTRATIVO

G A M E T
INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO IN MICROEMULSIONE
AD IMPIEGO FLOREALE PER PIANTE DA APPARTAMENTO E GIARDINO DOMESTICO.

GAMET

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Diazinone puro 15 g (180 g/l)
Coformulanti e solvente q. b. a 100 g

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHI: Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona 7 – PADOVA

OFFICINA di PRODUZIONE: L.I.F.A. S.r.l. – Vigonovo (VE)

Registrazione del Ministero della Sanità N° 10.866/PPO del 11/04/2001
CONFEZIONI: 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 75 – 100 ml

Lotto N°……..

NORME PRECAUZIONALI: Conservare il recipiente ben chiuso – Non respirare i vapori – Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua – In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – In caso di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) – Conservare soltanto nel recipiente originale – Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione – Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione – Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti sciacquandoli dopo l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici i(di prima comparsa) nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo; ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante) - Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione - Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, si può avere un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità. Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
Formulato praticamente indicato contro afidi, tripodi, ragnetti rossi, bega del garofano, tentredini delle rose, coleotteri, cicaline, aleuroidi.
MODALITA' D'IMPIEGO
Usando l'allegato misurino preparare una soluzione versando 2-3 ml di prodotto ogni litro d'acqua: agitare il recipiente onde ottenere una perfetta dispersione. Versare la soluzione ottenuta in uno spruzzatore manuale o meccanico e trattare uniformemente le piante non appena si nota la presenza di parassiti evitando il gocciolamento. Se occorre ripetere il trattamento dopo 4-5 giorni. E' consigliabile applicare il prodotto alla sera evitando il pieno sole. La confezione così preparata è idonea solo per 24 ore dopo la sua preparazione.
<u>ATTENZIONE:</u> da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione; ogni altro uso è pericoloso – Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE** (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

DA NON VENDERSI SFUSO

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO E ETICHETTA DA APPORSI SUL CONTENITORE PER L'IRRORAZIONE DEL PRODOTTO DILUITO

G A M E T
INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO IN MICROEMULSIONE
AD IMPIEGO FLOREALE PER PIANTE DA APPARTAMENTO E GIARDINO DOMESTICO.

GAMET

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Diazinone puro 15 g (180 g/l)
Coformulanti e solvente q. b. a 100 g

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHI: Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini –
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona 7 – PADOVA

OFFICINA di PRODUZIONE: L.I.F.A. S.r.l. – Vigonovo (VE)

Registrazione del Ministero della Sanità N° 10.866/PPO del 11/04/2001

CONFEZIONI: 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 75 – 100 ml

Lotto N°........

NORME PRECAUZIONALI: Conservare il recipiente ben chiuso – Non respirare i vapori – Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua – In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – In caso di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) – Conservare soltanto nel recipiente originale – Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione – Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione – Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti sciacquandoli dopo l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici i(di prima comparsa) nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo; ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante) - Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione - Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, si può avere un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità. Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

ATTENZIONE: da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione; ogni altro uso è pericoloso – Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE** (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

DA NON VENDERSI SFUSO

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

ERDESAN

INSETTICIDA GRANULARE CONTRO AGROTIDI, GRILLOTALPA, NOTTUE E GRILLI
PER APPLICAZIONI AL TERRENO, IN PRE-SEMINA O PRE-TRAPIANTO

ERDESAN

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:

Foxim puro	1 g
Attrattivi, coloranti ed eccipienti	q. b. a 100 g

(contiene glicole etilenoco)

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi e le vie respiratorie – Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7 – PADOVA

Officina di produzione: L.I.F.A. S.r.l. – Vigonovo (VE)

Registrazione del Ministero della Salute N^ 10.924 del 15.03.2001

CONTENUTO: 250 – 500 – 750 g / 1 – 2 – 5 kg

Partita N° ……. del …….

DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. – Via Trieste, 49/53 - Padova

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: *colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari. le placche neuromuscolari.*
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): *nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).*
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): *astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.*
Sintomi centrali: *confusione, atassia, convulsioni, coma.*
Cause di morte: *generalmente insufficienza respiratoria.*
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, dalle estremità).
Terapia: *atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.*
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
ERDESAN è un insetticida pronto all'uso da impiegare per applicazioni al terreno in pre-semina o pre-trapianto.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Colture ortive (aglio, cipolla, carciofo, finocchio, cavolo, pomodoro, peperone, melanzana):
contro gli insetti terricoli, quali elateridi, grillotalpa, maggiolini, nottue, grilli ed altri coleotteri e lepidotteri:
- 5-7 kg per ettaro distribuito lungo le file; 10-15 kg per ettaro a tutto campo;

Patata:
contro gli insetti terricoli, quali elateridi, grillotalpa, maggiolini, nottue, grilli ed altri coleotteri e lepidotteri:
- 5-7 kg per ettaro distribuito lungo le file; 10-15 kg per ettaro a tutto campo;

Colture floricole (rosa, garofano, dalia, anemone, orchidea, tulipano, crisantemo, gerbera):
contro insetti terricoli (nottue, grillotalpa, grilli, maggiolini ed altri coleotteri e lepidotteri):
- 5-7 kg per ettaro distribuito lungo le file; 10-15 kg per ettaro a tutto campo;

Tabacco:
contro elateridi, grillotalpa, maggiolini, nottue, grillo ed altri coleotteri e lepidotteri, alla dose di:
- 5-7 kg per ettaro distribuito lungo le file; 10-15 kg per ettaro a tutto campo.

COMPATIBILITA': il prodotto si impiega da solo.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è nocivo per gli animali domestici, pesci, bestiame ed insetti utili.
ATTENZIONE: da IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRI VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).**

DA NON VENDERSI SFUSO

GEOFEN

INSETTICIDA MICROGRANULARE

GEOFEN

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Fenitrotion puro 5 g
Coformulanti q. b. a 100 g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7 – PADOVA

Officina di produzione: L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) **/ L.I.F.A. S.r.l. -** Isola Vicentina (VI)

Registrazione del Ministero della Sanità n^ 8.018 del 26.02.1992

CONTENUTO: 500 g / 1 - 5 - 10 - 25 kg

Riferimento partita: ....

NORME PRECAUZIONALI: *Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo; ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. A distanza di 7 - 15 giorni dall'episodio acuto, può provocare un'effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' D'IMPIEGO
GEOFEN si impiega per la disinfestazione dei terreni destinati alle seguenti colture: agrumi, drupacee, pomacee, fragola, castagno, noce, vite, olivo, ortaggi, patata, barbabietola da zucchero, cereali, erba medica, tabacco, floreali, ornamentali, forestali, pioppo.
DOSI D'IMPIEGO PER ETTARO
Terreni di medio impasto 20/25 kg
Terreni torbosi o ricchi di sostanza organica 35/40 kg

COMPATIBILITA': il prodotto va impiegato da solo.

NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame e i pesci. E' necessario pertanto far trascorrere 20 giorni dal trattamento prima di far pascolare il bestiame sulle zone trattate ed alimentarlo con vegetali che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto con il prodotto.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE** (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

DA NON VENDERSI SFUSO

KUPRUM 30 AZF

FUNGICIDA A BASE DI RAME

KUPRUM 30 AZF

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rame metallo puro (sotto forma di ossicloruro) 9 g
Coadiuvanti ed inerti q. b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7 – PADOVA

Officine di produzione: L.I.F.A. S.r.l. – Vigonovo (VE) / **L.I.F.A. S.r.l.** – Isola Vicentina (VI)

Registrazione del Ministero della Sanità n^ 5.097 del 29.11.1982

CONTENUTO: 100 – 125 – 500 g / 1 – 5 – 10 – 25 kg

Riferimento Partita: ....

NORME PRECAUZIONALI: Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminose, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE: KUPRUM 30 AZF è un fungicida rameico caratterizzato da lunga persistenza d'azione ed elevata resistenza al dilavamento. È efficace nei confronti delle più diffuse malattie orticole, fruttiferi, vite, olivo, agrumi e per la concia a secco di semi.

EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO
Le dosi sono riferite a 100 litri d'acqua.
VITE: contro Peronospora effettuare trattamenti preventivi ripetuti: 1,5-2 kg. **MELO, PERO:** contro Ticchiolatura: prima della fioritura 1,2-1,5 kg; dopo la fioritura 0,5-1 kg. **PESCO:** contro Bolla, Corineo effettuare solo trattamenti invernali: 4-5 kg. **OLIVO:** contro Occhio di Pavone 1,5-2 kg. **AGRUMI:** contro Fumaggine, Antracnosi, Mal secco: 2-2,5 kg. **ORTICOLE:** Pomodoro, Patata: contro Peronospora e Alternaria; Sedano: contro Spetoria; Cipolla: contro Peronospora; Asparago: contro Ruggine; Fagiolo, Pisello: contro Antracnosi: 1,2-1,5 kg. **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO:** contro Cercospora 2-2,5 kg. **CONCIA A SECCO DEL GRANO:** contro Carie, mescolare 400 g di prodotto tal quale per quintale di seme, prima della semina.
CONCIA DELLE SEMENTI: i semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.
Sospendere la dose di prodotto in poca acqua e mescolare fino ad ottenere una pasta liquida ed omogenea; versare poi gradualmente questa nel quantitativo di acqua richiesto, agitando ripetutamente. Le dosi soprariportate sono riferite a trattamenti con pompe a volume normale.

COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con la generalità degli antiparassitari.
AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICTA': non di deve trattare durante la fioritura. Su pesco e varietà di mela Abbondanza Belfort, Black Ben Davis, Balck Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, King David, Renetta del Canadà, Rosa Mantovane, e di pera Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clairgeau, Passa Crassandra, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Keiser, Butirra Giffard, cuprosensibili. Il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiago dopo la piena ripresa vegetativa.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).**

DA NON VENDERSI SFUSO

KUPRUM 30 AZF

FUNGICIDA A BASE DI RAME

KUPRUM 30 AZF

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rame metallo puro (sotto forma di ossicloruro) 9 g
Coadiuvanti ed inerti q. b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7 – PADOVA

Officine di produzione: L.I.F.A. S.r.l. – Vigonovo (VE) / **L.I.F.A. S.r.l.** – Isola Vicentina (VI)

Registrazione del Ministero della Sanità n^ 5.097 del 29.11.1982

CONTENUTO: 100 g

Riferimento Partita: ....

NORME PRECAUZIONALI: Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminose, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con la generalità degli antiparassitari.
AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

DA NON VENDERSI SFUSO

LAVIS MICROGRANULARE

DISINFESTANTE DEL TERRENO

LAVIS MICROGRANULARE

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Malation puro 4 g
Coformulanti q. b. a 100 g

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi e le vie respiratorie – Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7 - PADOVA

Officina di produzione: L.I.F.A. S.r.l. – Vigonovo (VE) / **L.I.F.A. S.r.l.** – Isola Vicentina (VI)

Registrazione del Ministero della Salute N° 7349 del 22/12/1987

CONTENUTO: 100 – 250 – 500 g / 1 – 5 – 25 kg

Partita N°…….. del …….

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo; ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, può provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
LAVIS MICROGRANULARE è un insetticida adatto ad essere distribuito con facilità e con uniformità sul terreno sia versandolo dall'apposito contenitore, sia distribuendolo in file utilizzando l'apposito microgranulatore delle seminatrici. E' efficace contro gli insetti del terreno presenti negli orti, nei prati, sulle siepi.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
ORTICOLTURA (Fagiolo, Melanzana, Peperone, Pisello, Sedano, Zucchino, Carota, Cavolo, Patata, Pomodoro) contro larve di Maggiolino, Elateridi, Grillotalpa, Formiche, Agrotidi: 400-600 g/100 m2. Distribuire uniformemente il prodotto sulla superficie da trattare ed incorporarlo eventualmente con una leggera zappatura. Il prodotto può essere distribuito anche sulla coltura già in atto.
PRATI, SIEPI, PIANTE ORNAMENTALI contro Grillotalpa, Formiche, Zabro gobbo: 400-500 g/m2 distribuendo uniformemente il prodotto sulla superficie da trattare.

COMPATIBILITA': Dato il particolare impiego il prodotto va usato da solo.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è nocivo per gli insetti utili, pesci e bestiame.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).**

DA NON VENDERSI SFUSO

LAVIS MICROGRANULARE

DISINFESTANTE DEL TERRENO

LAVIS MICROGRANULARE

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Malation puro 4 g
Coformulanti q. b. a 100 g

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi e le vie respiratorie – Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7 - PADOVA

Officina di produzione: L.I.F.A. S.r.l. – Vigonovo (VE) / **L.I.F.A. S.r.l.** – Isola Vicentina (VI)

Registrazione del Ministero della Salute N° 7349 del 22/12/1987

CONTENUTO: 100 g

Partita N°…….. del …….

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo; ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, può provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

COMPATIBILITA': Dato il particolare impiego il prodotto va usato da solo.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

DA NON VENDERSI SFUSO

LAVIS–P AZF

INSETTICIDA PER POLVERIZZAZIONI A SECCO

LAVIS-P AZF

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Malation puro 4 g
Coformulanti q. b. a 100 g

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7 - PADOVA

Officina di produzione: L.I.F.A. S.r.l. – Vigonovo (VE) / **L.I.F.A. S.r.l.** – Isola Vicentina (VI)

Registrazione del Ministero della Salute N° 6167 del 15/01/1985

CONTENUTO: 100 – 500 g / 1 – 5 – 10 – 25 kg

Partita N°........ del ....

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo; ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, può provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
LAVIS-P AZF è un insetticida adatto per disinfestazioni a mezzo di polverizzaizoni. E' efficace contro gli insetti del terreno presenti negli orti, nei prati, sulle siepi.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
ORTICOLTURA (Fagiolo, Melanzana, Peperone, Pisello, Sedano, Zucchino, Carota, Cavolo, Patata, Pomodoro) contro larve di Maggiolino, Elateridi, Grillotalpa, Formiche, Agrotidi: 400-600 g/100 m2. Distribuire uniformemente il prodotto sulla superficie da trattare ed incorporarlo eventualmente con una leggera zappatura. Il prodotto può essere distribuito anche sulla coltura già in atto.
PRATI, SIEPI, PIANTE ORNAMENTALI contro Grillotalpa, Formiche, Zabro gobbo: 400-500 g/m2 distribuendo uniformemente il prodotto sulla superficie da trattare.

COMPATIBILITA': Dato il particolare impiego il prodotto va usato da solo.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è nocivo per gli insetti utili, pesci e bestiame.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).**

DA NON VENDERSI SFUSO

LAVIS–P AZF

INSETTICIDA PER POLVERIZZAZIONI A SECCO

LAVIS-P AZF

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Malation puro 4 g
Coformulanti q. b. a 100 g

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7 - PADOVA

Officina di produzione: L.I.F.A. S.r.l. – Vigonovo (VE) / **L.I.F.A. S.r.l.** – Isola Vicentina (VI)

Registrazione del Ministero della Salute N° 6167 del 15/01/1985

CONTENUTO: 100 g

Partita N°…….. del …….

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo; ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, può provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

COMPATIBILITA': Dato il particolare impiego il prodotto va usato da solo.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

DA NON VENDERSI SFUSO

MALTEN P.S.

DISINFETTANTE SPECIFICO DI ALCUNE DERRATE IMMAGAZZINATE

MALTEN P.S.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Malation puro 1 g
Adesivanti e inerti q.b. a 100 g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7 – PADOVA

Officina di produzione:
L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) / **L.I.F.A. S.r.l.** - Isola Vicentina (VI)

Registrazione del Ministero della Sanità n^ 2.623 del 02.07.1977

CONTENUTO: 100-200-500 g / 1 kg

Riferimento partita: ....

NORME PRECAUZIONALI: *Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo; ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. A distanza di 7 - 15 giorni dall'episodio acuto, può provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' D'IMPIEGO
Disinfestante su alcune derrate immagazzinate (cereali in granella, leguminose in granella, patate), dotato di attività contro gli insetti parassiti e caratterizzato da: assenza di odori e sapori sgradevoli; assenza di effetti negativi sulla germinazione delle sementi. MALTEN P.S. si impiega preferibilmente a scopo preventivo, cioè al momento dell'immagazzinamento di dette derrate, per combattere efficacemente: calandre, tignole, tonchi, distruggigrano, tribolii e gli altri parassiti maggiormente diffusi.
DOSI D'IMPIEGO
MALTEN P.S. si usa alla dose di 80/100 g per quintale di derrata, su cui deve essere sparso per poi essere incorporato uniformemente con opportune paleggiature. MALTEN P.S. per un'azione più completa, viene impiegato esternamente agli eventuali sacchi e imballaggi in cui le derrate sono conservate in magazzino.

COMPATIBILITA': miscibile con altri formulati idonei ai trattamenti su derrate immagazzinate.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame e i pesci.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della immissione delle derrate al consumo.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE** (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

DA NON VENDERSI SFUSO

MALTEN P.S.

DISINFETTANTE SPECIFICO DI ALCUNE DERRATE IMMAGAZZINATE

MALTEN P.S.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Malation puro	1 g
Adesivanti e inerti	q.b. a 100 g

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7 – PADOVA

Officina di produzione:
L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) / **L.I.F.A. S.r.l.** - Isola Vicentina (VI)

Registrazione del Ministero della Sanità n^ 2.623 del 02.07.1977

CONTENUTO: 100-200-500 g / 1 kg

Riferimento partita: ....

NORME PRECAUZIONALI: *Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo; ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. A distanza di 7 - 15 giorni dall'episodio acuto, può provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

COMPATIBILITA': miscibile con altri formulati idonei ai trattamenti su derrate immagazzinate.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della immissione delle derrate al consumo.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRI VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE** (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

DA NON VENDERSI SFUSO

OYLIR

OLIO MINERALE BIANCO EMULSIONATO

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Olio minerale puro (95 – 96% di R.I.)	80 g
Emulsionanti, disperdenti	q. b. a 100 g

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: *In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.*

CARATTERISTICHE
OYLIR è un olio minerale bianco, efficace per asfissia contro le varie forme di Coccinig1ia fisse e mobili e contro le uova degli acari.
EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO
PERO, MELO, PESCO, CILIEGIO, ALBICOCCO, SUSINO, VITE: contro Aspidiotus perniciosus, Diaspis pentagona, uova di Ragno Rosso:
- Trattamento invernale prima della ripresa vegetativa: litri 2,5-3/hl di acqua.
- Trattamento prima della ripresa vegetativa ("orecchiette di topo" per il melo, "mazzetti affioranti" per il pero, "bottoni rosa" per le drupacee): litri 1,5-2/hl di acqua.

Per un'azione più completa nei confronti di Anarsia, Psilla, Cidia, aggiungere al prodotto un estere fosforico (paration, metil paration).
OLIVO: contro Cocciniglia mezzo grano di pepe, Cocciniglia bianca:
- Intervenire in febbraio – marzo o in estate: litri 1,5-2/hl di acqua.

AGRUMI: contro Iceria e Cocciniglia cotonosa:
- Intervenire tra la raccolta dei frutti e la fioritura: litri 2,5/hl oppure nel periodo estivo: litri 1-1,5/hl di acqua.
- Contro le altre Cocciniglie, intervenire in inverno a litri 2/hl o in estate a litri 1/hl di acqua.

PIANTE ORNAMENTALI: contro le varie forme di Cocciniglie:
- Trattare nelle ore più fresche: litri 1-2/hl di acqua.

Il prodotto può essere impiegato come lucidante fogliare. In questo caso passare sulle foglie, usando allo scopo un batuffolo di cotone e un panno di lana morbida, un leggero strato di prodotto, preventivamente diluito con uguale quantità di acqua e ben agitato. In tutti i casi non trattare in fioritura.
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale.
AGITARE LA CONFEZIONE PRIMA DELL'USO

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli anticrittogamici ed insetticidi ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Non eseguire i trattamenti nei periodi eccessivamente caldi o su piante molto giovani.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
In caso di miscela con esteri fosforici tale periodo è elevato a 30 giorni.
ATTENZIONE: impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone, alle piante e agli animali.

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7 – PADOVA

Officina di produzione: I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG) / **TERRANALISI S.r.l. –** Renazzo di Cento (FE)
Per il solo confezionamento: L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE)

Registrazione del Ministero della Sanità N^5346 del 26.04.1983

CONTENUTO: 250 - 500 ml / 1 - 5 - 10 - 25 litri

Riferimento partita:.............

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE**

DA NON VENDERSI SFUSO

Etichetta normale e foglio illustrativo

TOXOLFLOR

Insetticida liquido emulsionabile
Impiego per piante da appartamento e giardino domestico

TOXOLFLOR

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Malation puro 28,5 g (319 g/l)
Piretrine pure (da 2 g di estratto di piretro) 0,5 g (5,59 g/l)
Coformulanti e solvente q. b. a 100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7 – PADOVA

Officine di produzione: IMC LIMITED - Naxxar (Malta)

Registrazione del Ministero della Salute N° 10.773/PPO del 11.04.2001

CONTENUTO: 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 75 – 100 ml

Lotto N° .... del.......

DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. – Via Trieste, 49/53 - Padova

NORME PRECAUZIONALI: Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione – Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione – La copia di etichetta autoadesiva in formato ridotto va applicata sul contenitore per l'irrorazione del prodotto **–** Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti sciacquandoli dopo l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: malation 28,5 %; piretrine 0,5% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
per il malation: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. - Sintomi muscarinici (di prima comparsa) : nausca, vomito, crampi addominali, diarrca. Broncospasmo; ipcrsecrczionc bronchialc, cdcma polmonarc. Visionc offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolare. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione,
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma, - Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria
A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto può provocare un effetto neorotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
per le piretrine: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici e asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinnorea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Può provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache. Terapia: sintomatica e di rianimazione.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE

Insetticida liquido, agisce per contatto, ingestione e asfissia per la lotta contro molti insetti come: ampion, autonomi, afidi, tortrici, tripidi, tignole, punteruoli, fitonomi, cocciniglie, misurine, rinchiti, tentredini, cimici.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Il prodotto va disperso in acqua; usando un comune spruzzatore manuale o meccanico la soluzione ottenuta va irrorata sulla vegetazione evitando il gocciolamento insistendo sui punti di maggior attacco da parte degli insetti. Le dosi consigliate sono: per tutti gli insetti, ad eccezione della cocciniglia, 4 ml in un litro di acqua. Per la lotta alle cocciniglie 5 – 6 ml per litro d'acqua. Per il dosaggio usare l'allegato misurino volumetrico.
ATTENZIONE: da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione; ogni altro uso è pericoloso – Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRI VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE** (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

DA NON VENDERSI SFUSO

Etichetta in formato ridotto e etichetta autoadesiva da apporsi sul contenitore per l'irrorazione del prodotto

TOXOLFLOR

Insetticida liquido emulsionabile
Impiego per piante da appartamento e giardino domestico

TOXOLFLOR

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Malation puro 28,5 g (319 g/l)
Piretrine pure (da 2 g di estratto di piretro) 0,5 g (5,59 g/l)
Coformulanti e solvente q. b. a 100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7 – PADOVA

Officine di produzione: IMC LIMITED - Naxxar (Malta)

Registrazione del Ministero della Salute N° 10.773/PPO del 11.04.2001

CONTENUTO: 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 75 – 100 ml

Lotto N° .... del.......

DISTRIBUITO DA KOLLANT S.p.A. – Via Trieste, 49/53 - Padova

NORME PRECAUZIONALI: Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione – Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione – La copia di etichetta autoadesiva in formato ridotto va applicata sul contenitore per l'irrorazione del prodotto – Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti sciacquandoli dopo l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: malation 28,5 %; piretrine 0,5% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
per il malation: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. - Sintomi muscarinici (di prima comparsa) : nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo; ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolare. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione,
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma, - Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria
A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto può provocare un effetto neorotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
per le piretrine: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici e asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinnorea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Può provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache. Terapia: sintomatica e di rianimazione.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

ATTENZIONE: da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione; ogni altro uso è pericoloso – Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRI VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE** (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

DA NON VENDERSI SFUSO

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

ZOLFO AZF

FUNGICIDA EFFICACE CONTRO IL MAL BIANCO

ZOLFO AZF

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Zolfo puro 90 g
Coformulanti q. b. a 100 g

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7 – PADOVA

Officine di produzione: L.I.F.A. S.r.l. – Vigonovo (VE) / **L.I.F.A. S.r.l.** – Isola Vicentina (VI) / ZOLFOIN**DUSTRIA S.r.l.** – San Cipriano Po (PV)

Registrazione del Ministero della Sanità n^ 5102 del 29.11.1982

CONTENUTO: 20 – 50 – 100 – 200 – 250 – 500 – 750 g / 1 – 5 – 10 – 20 – 25 kg

Riferimento Partita: ....

DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. – Via Trieste, 49/53 - PADOVA

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
ZOLFO azf è un fungicida in polvere bagnabile indicato per la lotta preventiva e curativa di tutte le forme di Mal bianco della Vite, dei Fruttiferi, delle Orticole e delle Floricole. Esercita altresì un'azione complementare nei confronti degli Eriofidi.
EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO: Le dosi sono riferite a 100 litri di acqua.
VITE: alla ripresa vegetativa 250-300 g; nelle altre fasi 150-200 g.
MELO-PERO: trattamenti pre-floreali 100-150 g; trattamenti post-floreali 80-100 g; contro Acarinosi del pesco 200 g.
COCOMERO, MELONE, CETRIOLO, ZUCCHINO, PISELLO: 80-100 g.
POMODORO: contro Acaro rugginoso 150-200 g.
FLORICOLE (Crisantemo, Cineraria, Begonia, Ortensia): 80-100 g.
Usare le dosi più basse con temperature superiori a 25°C. Operare con pompa ad alto volume distribuendo una quantità di poltiglia per ettaro sufficiente per coprire interamente ed uniformemente la vegetazione delle piante. Stemperare il prodotto in poca acqua, quindi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo d'acqua, mescolando con cura. Effettuare i trattamenti durante le ore più fresche della giornata evitando di trattare subito dopo una pioggia.

COMPATIBILITA': Il prodotto non è compatibile con antiparassitari a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con gli oli minerali, Captan, DDVP, Binapacril, Diclofluanide.
Avvertenza: il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captan.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può arrecare danno alle seguenti colture di:
MELO: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Stayman Winesap.
PERO: Buona Luisa D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.
VITE: Sangiovese.
CURBITACEE: può essere fitotossico.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRI VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).**

DA NON VENDERSI SFUSO

ZOLFO AZF

FUNGICIDA EFFICACE CONTRO IL MAL BIANCO

ZOLFO AZF

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Zolfo puro 90 g
Coformulanti q. b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7 – PADOVA

Officine di produzione: L.I.F.A. S.r.l. – Vigonovo (VE) / **L.I.F.A. S.r.l.** – Isola Vicentina (VI) / ZOLFOIN**DUSTRIA S.r.l.** – San Cipriano Po (PV)

Registrazione del Ministero della Sanità n^ 5102 del 29.11.1982

CONTENUTO: 20 – 50 – 100 g

Riferimento Partita: ....

DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. – Via Trieste, 49/53 - PADOVA

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRI VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

DA NON VENDERSI SFUSO

POLVERE TIPO BORDOLESE

Pronta all'uso, micronizzata

POLVERE TIPO BORDOLESE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rame metallo (da composti di rame e calcio) 20 g
Coformulanti q. b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione – Rischio di gravi lesioni oculari – Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico – Non gettare i residui nelle fognature – Proteggersi gli occhi/la faccia – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7 – PADOVA

Officine di produzione: ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT) / **IMC LIMITED** - Naxxar (Malta)

Registrazione del Ministero della Sanità n^ 6404 del 15.01.1985

CONTENUTO: 100 g / 1 – 5 – 10 – 25 kg

Riferimento Partita: ....

DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. – Via Trieste, 49/53 - PADOVA

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE: s'impiega su: **vite, fruttiferi, colture erbacee e ortive** di seguito indicate, **ornamentali e da fiore** per la lotta contro: peronospora, alternaria, antracnosi, cancri dei rami, cercospora, corineo, mal secco, marciumi radicali, occhio di pavone, septoria, ticchiolatura, vaiolatura.
EPOCHE D'IMPIEGO: sulla vite, preferibilmente dalla fine della fioritura; sulle pomacee, trattamenti autunnali o di fine inverno e prefiorali; sulle pomacee, trattamenti invernali; sulle altre colture, preventivamente od alla prima comparsa delle malattie, ripetendo le applicazioni a seconda dell'andamento stagionale e delle infezioni.
COLTURE E DOSI D'IMPIEGO: (per 100 litri di acqua). Nel caso di **pomacee,** 950-1150 g nei trattamenti autunnali o di fine inverno e 500-600 g nei trattamenti prefiorali. Nel caso di **drupacee,** 950-1150 g nei trattamenti invernali. Nel caso di **colture ortive (melanzana, patata, peperone, pomodoro, fragola, carota, finocchio, sedano, fagiolo, fava, pisello, cetriolo, melone, zucca, zucchino, cocomero, cavolo, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo di Bruxelles, cavolo di rapa, ravanello, spinacio, bietola, carciofo, cardo, indivia, lattuga, radicchio, asparago, aglio, cipolla), ornamenti e floreali** in pieno campo e **vite,** 600-800 g. Nel caso di **agrumi e olivo,** 500-900g. Nel caso di barbabietola, 8-10 kg per ettaro.
MODALITA' D'IMPIEGO: Distribuire il prodotto in modo da coprire interamente ed uniformemente la vegetazione; si consiglia di aggiungere 100 g di Bagnante Agricolo a ogni 100 litri di miscela. Stemperare il prodotto in poca acqua a parte, indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua mescolando con cura. Il prodotto è neutro, pronto all'uso e non richiede l'aggiunta di calce.

COMPATIBILITA': Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari di uso primaverile-estivo.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo e di pero cuprosensibile, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia, pertanto l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza, Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome e Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana. Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fétel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dr. Juliet Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.
Sospendere il trattamento 20 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRI VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE** (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

DA NON VENDERSI SFUSO

POLVERE TIPO BORDOLESE

Pronta all'uso, micronizzata

POLVERE TIPO BORDOLESE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rame metallo (da composti di rame e calcio) 20 g
Coformulanti q. b. a 100 g

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione – Rischio di gravi lesioni oculari – Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico – Non gettare i residui nelle fognature – Proteggersi gli occhi/la faccia – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7 – PADOVA

Officine di produzione: ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT) / **IMC LIMITED** - Naxxar (Malta)

Registrazione del Ministero della Sanità n^ 6404 del 15.01.1985

CONTENUTO: 100 g

Riferimento Partita: ....

DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. – Via Trieste, 49/53 - PADOVA

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

COMPATIBILITA': Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari di uso primaverile-estivo.
Sospendere il trattamento 20 giorni prima del raccolto.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRI VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE** (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

DA NON VENDERSI SFUSO

RAMEPLANT 40 PB

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

RAMEPLANT 40 PB

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rame metallo (sotto forma di ossicloruro) 40 g
Coformulanti q. b. a 100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione – Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7 – PADOVA

Officine di produzione: ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT) / **IMC LIMITED** – Naxxar (Malta)

Registrazione del Ministero della Sanità N° 9.766 del 01/10/1998

CONTENUTO: 250 – 500 g / 1 – 5 – 10 – 20 kg

Riferimento Partita: ....

DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. – Via Trieste, 49/53 - PADOVA

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminose, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
RAMEPLANT 40 PB è un fungicida rameico la cui finezza associa all'ampio spettro d'azione adesività e persistenza. Esplica un'azione di copertura ed agisce per contatto.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
FRUTTICOLTURA: POMACEE: contro Ticchiolatura, Cancro dei rametti; DRUPACEE: contro Bolla, Corineo; - nei trattamenti estivi 300-400 g/hl di acqua – nei trattamenti invernali 800-1000 g/hl d'acqua.
AGRUMICOLTURA: contro Mal secco, Allupatura, Fumaggine e Batteriosi 400-500 g/hl d'acqua.
VITICOLTURA: contro Peronospora 400-500 g/hl d'acqua.
OLIVICOLTURA: contro Occhio di pavone e Lebbra dell'olivo 400/500 g/hl di acqua
ORTICOLTURA: 300-500 g/hl contro Cercospora e Septoriosi del **sedano** 300-400 g/hl d'acqua; contro Peronospora, Alternariosi della **patata** e del **pomodoro** 400-500 g/hl d'acqua.
BIETICOLTURA: contro Cercosporiosi della barbabietola 4-5 kg/ha.
FLORICOLTURA: contro Ruggine, Peronospora, Septoriosi e Ticchiolatura 400-500 g/hl.
Preparazione della poltiglia: diluire il prodotto in poca acqua a parte ed aggiungerlo poi alla quantità di acqua occorrente per il trattamento. Applicare alla parte aerea delle colture, a volume normale o ridotto a mezzo di apposite irroratrici.

COMPATIBILITA': Il prodotto non è miscibile con prodotti a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Roma Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne consiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRI VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE** (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

DA NON VENDERSI SFUSO

ZINAMEX

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE BAGNABILE

LAVIS MICROGRANULARE

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Mancozeb puro 35,2 g
Rame metallo puro 11,0 g
(da solfato di rame e calcio)
Coformulanti q. b. a 100 g

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione – Irritante per le vie respiratorie – Rischio di gravi lesioni oculari – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7 - PADOVA

Officina di produzione: IMC LIMITED – Naxxar (Malta)

Registrazione del Ministero della Salute N° 5962 del 19/07/1984

CONTENUTO: 1 – 10 kg

Partita N°…….. del …….

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici – Conservare il recipiente ben chiuso – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone – Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contento – Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dal calore – Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca) – Divieto di uso in serra – Divieto di uso su colture diverse da quelle indicate.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Mancozeb 35,2% e Rame 11% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
per il Mancozeb: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhi: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Per il Rame: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
CARATTERISTICHE
ZINAMEX è l'associazione di due fungicidi e precisamente il Mancozeb e la poltiglia bordolese essiccata e micronizzata. Questa miscela consente un ottimo risultato nella lotta contro le crittogame.
EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO: le dosi sono riferite a 100 litri di acqua.
VITE: contro Peronospora trattamenti pre-floreali 200 g; trattamenti post-floreali 250-300 g; trattamenti di chiusura 300-350 g. Per un'azione congiunta contro il Mal bianco e Peronospora mescolare con il prodotto ZOLFO AZF alle dosi consigliate.
MELO e PERO: contro la Ticchiolatura trattare all'apertura delle gemme ed alla caduta delle foglie 300-350 g.
POMODORO (solo alla prima fioritura): contro Peronospora 250-300 g.
GAROFANO IN PIENO CAMPO: contro Ruggine 200-250 g.
Le dosi sopra riportate sono riferite a trattamenti effettuati con pompa a volume normale. Stemperare il prodotto in poca acqua a parte, quindi versare la poltiglia così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando con cura.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICTA': non di deve trattare durante la fioritura. Il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione sulle varietà di melo e pero sensibili al Rame ed al Mancozeb sottoindicate: su queste varietà se ne consiglia pertanto l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. MELO: Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana. PERO: Abate Fetel, Armelia, Buona Luigia D'Avranches, Butirra precoce Morettini, Butirra Clairgeau, Butirra Giffard, B.C. William, Conference, Conscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Dott. Jules Cuyot, Favorita di Clapp, Keiser, Mora, Passa Crassana, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadone d'Estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zecchermanna.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE** (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

DA NON VENDERSI SFUSO

CUPRAM

RAME / MANCOZEB 20:8

CUPRAM

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Mancozeb	8 g
Rame metallo (da Rame Solfato e Calcio Solfato)	20 g
Coformulanti	q. b. a 100 g

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione – Rischio di gravi lesioni oculari – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico – Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7 – PADOVA

Officina di produzione: **IMC LIMITED** Naxxar (Malta)

Registrazione del Ministero della Sanità n^ 5026 del 5/11/1982

CONTENUTO: 100 – 150 – 250 – 500 g / 1 – 5 – 10 – 25 kg

Riferimento partita: ....

DESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da umidità e calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: MANCOZEB e RAME SOLFATO e CALCIO SOLFATO le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di essicazione:
MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di conoscenza. Terapia: sintomatica.
RAME SOLFATO e CALCIO SOLFATO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con l'emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche: Fungicida misto a base di rame e mancozeb.
Tipi d'impiego e dosi: Vite: contro la peronospora alla dose di 500-600 g per 100 litri di acqua; pomodoro (solo fino alla prima fioritura): contro la peronospora. In alternariosi septoriosi alla dose di 250-300 g per 100 litri d'acqua.
D'applicazione: Vite: a scopo preventivo a partire dalla fine della fioritura e successivamente secondo il calendario d'incubazione delle malattie; pomodoro: soltanto alla prima fioritura.
Modi d'impiego: Diluire il prodotto in poca acqua, formare una poltiglia e stemperare nell'acqua totale: si consiglia di aggiungere 100 ml di bagnante per ogni 100 litri di miscela. il trattamento va eseguito in modo da coprire interamente ed uniformemente la vegetazione.
DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA
DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA': Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari di uso primaverile-estivo, salvo quelli a reazione alcalina e il dicloran.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotto più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Non trattare durante la fioritura.
RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRI VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).**

DA NON VENDERSI SFUSO

CUPRAM

RAME / MANCOZEB 20:8

CUPRAM

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Mancozeb	8 g
Rame metallo	
(da Rame Solfato e Calcio Solfato)	20 g
Coformulanti	q. b. a 100 g

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione – Rischio di gravi lesioni oculari – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico – Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il su contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7 – PADOVA

Officina di produzione: **IMC LIMITED** Naxxar (Malta)

Registrazione del Ministero della Sanità n^ 5026 del 5/11/1982

CONTENUTO: 100 g

Riferimento partita: ....

DESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da umidità e calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: MANCOZEB e RAME SOLFATO e CALCIO SOLFATO le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di essicazione:
MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di conoscenza. Terapia: sintomatica.
RAME SOLFATO e CALCIO SOLFATO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con l'emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA
DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRI VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

DA NON VENDERSI SFUSO

VITERRACID

ESCA PRONTA ALL'USO

- Contro gli insetti dannosi del terreno -

VITERRACID

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Carbaril puro (esente da b-naftolo) 4 g
Aromi, supporti, adescanti q. b. a 100 g

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO: Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7- PADOVA

Officine di produzione: Chemia S.p.A. – San Agostino (FE); **MC LIMITED** Naxxar (Malta)

Registrazione del Ministero della Sanità n^ 5.074 del 29.11.1982

CONTENUTO: 250 g / 1 – 5 kg

Riferimento Partita: ....

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa – Evitare il contatto con gli occhi e gli indumenti – Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Carbaril: *inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.* ***Sintomi muscarinici:*** *disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.* ***Sintomi nicotinici:*** *tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.* ***Terapia:*** *atropina.* ***Controindicazioni:*** *ossime*
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
Esca pronta all'uso per la lotta contro gli insetti dannosi del terreno: grillotalpe, arvicole, limacce, cavallette ed altri fitofagi in genere. Il prodotto si presenta in forma granulare. I granuli sono prodotti in maniera tale da garantire la loro azione nel tempo: la loro efficacia rimane invariata anche in presenza di vento e di pioggia.
DOSI D'IMPIEGO
Orticoltura (pomodoro, melanzane, peperoni, asparagi, insalate: lattuga, cicoria, indivia, radicchio, scarola, rucola) contro: elateridi, agrotidi, tripule, bibioni, grillotalpe, cavallette, formiche 30/40 kg/ha. **Vite** e **Fruttiferi** (peri, meli, aranci, pesche, albicocche, susine) contro: agrotidi, grilli, grillotalpa, larve di maggiolino e altri coleotteri, tripule, formiche 30/40 kg/ha. **Barbabietola da zucchero** contro: agrotidi, cimici 30/40 kg/ha. **Patata** contro: dorifora 30/35 kg/ha. **Cerali e foraggere** (mais, erba medica, trifoglio) contro: grillotalpe, larve di coleotteri, agrotidi 40/45 kg/ha. **Trattamenti in superficie** contro: piralide del mais 30/35 kg/ha. **Floreali** (garofano, crisantemo, rosa) contro: larve di maggiolino e altri coleotteri, grilli, grillotalpa, arvicole, limacee, cavallette 100 g ogni m^2.
Si consigliano i trattamenti verso sera, rinnovando i granuli man mano che scompaiono.

COMPATIBILITA': non è prevista la miscela con altri prodotti.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo: devono inoltre essere applicate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
RISCHIO DI NOCIVITA': il prodotto è nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici i pesci ed il bestiame.
Attenzione: il prodotto tal quale contiene sostanza molto tossica per gli organismi acquatici.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 7 giorni
ATTENZIONE: *da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.*

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRI VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE(Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).**

DA NON VENDERSI SFUSO

FOGLIASAN 5-P

INSETTICIDA IN POLVERE SECCA

FOGLIASAN 5-P

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Carbaril puro (esente da b-naftolo) 5 g
Eccipienti pulverulenti q. b. a 100 g

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO: Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

AZF AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona, 7 – PADOVA

Officine di produzione:
TORRE S.r.l. – Torrenieri (SI) / **Terranalisi s.r.l.** – Cento (FE) / **DIACHEM S.p.A. U.O. SIFA** – Caravaggio (BG); **IMC LIMITED** Naxxar (Malta)

Registrazione del Ministero della Sanità n^ 5.098 del 29.11.1982

CONTENUTO: 1 – 5 kg

Riferimento Partita: ....

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa – Evitare il contatto con gli occhi e gli indumenti – Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Carbaril: *inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.* ***Sintomi muscarinici:*** *disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.* ***Sintomi nicotinici:*** *tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.*
Terapia: atropina ***Controindicazioni: ossime***
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
FOGLIASAN 5-P combatte molti insetti dannosi come: agrotidi, tipule, dorifora, tignole in genere, larve di maggiolini, elateridi, grilli, grillotalpe, formiche.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
FOGLIASAN 5-P essendo una polvere per trattamento a secco, può essere distribuita con spruzzatori manuali o meccanici cercando che il prodotto vada a colpire la vegetazione e se necessario, interrandolo per combattere gli insetti del terreno. Si consigli di eseguire i trattamenti di primo mattino in presenza di rugiada. Epoche d'impiego: primavera, estate, e primo autunno.
Su **Vite** contro la tignola dell'uva 30/40 kg/Ha. Su **frutta** (mele, pere, pesche, susine ed albicocche) contro: Carpocapsa, cidia del pesco, eulia del melo e del pero, larve di lepidotteri defogliatori in genere 15/20 kg/Ha. In **Orticoltura** (insalate, cavolo, pomodori, asparago, carciofo, peperone, melanzana) contro: afidi, cassida, cavolaie, nottue, altica, agrotidi 18/20 kg/Ha. Su **barbabietola da zucchero** contro: afidi, cimici, agrotidi 18/20 kg/Ha. Su **patate** contro la dorifera 18/20 kg/Ha. Su **mais** contro: piralide e sesamia 30/35 kg/Ha. Su **foraggere** (colza, erba medica, trifoglio) contro: misurino, fitonomo, afidi, meligete 15/20 kg/Ha. Su **floricole in pieno campo e in serra** (garofano, crisantemo, rosa) contro: bega del garofano, tignola, dorifera, tentredini 20/30 kg/Ha. Per il **trattamento del terreno** 30/40 kg/HA.
COMPATIBILITA': FOGLIASAN 5-P è miscibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi, ad eccezione dei prodotti alcalini.
AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHIO DI NOCIVITA': il prodotto è nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici ed il bestiame.
Attenzione: il prodotto tal quale contiene sostanza molto tossica per gli organismi acquatici.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 7 giorni
ATTENZIONE: *da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.*

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRI VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).**

DA NON VENDERSI SFUSO

POLISENIO S.r.l.

POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO

Insetticida – Fungicida in formulazione liquida

POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO
Insetticida - Fungicida liquido
Composizione
- Polisolfuro di calcio puro . . . g. 30 (= 380 g/l)
(pari a g. 22.5 / 23.5 di zolfo)
- Acqua . . . . q.b.a g. 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. A contatto con acidi libera gas tossico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Non mescolare con prodotti diversi dall'acqua.

POLISENIO S.r.l. - Via S.Andrea, 10 – 48022 LUGO (RA)

Officina di produzione e confezionamento: POLISENIO S.r.l. – Via S.Andrea, 10 – LUGO (RA)
Solo confezionamento: PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours LA CHAMBRE (Francia)
Registrazione Ministero della Sanità n. 0909 del 22.02.1973
Contenuto netto: ml 100 pari a gr 125; ml 250 pari a gr 312,5; ml 500 pari a gr 625; lt 1 pari kg 1.25; lt 2 pari a kg 2.5 lt 5 pari a kg 6.25; lt 10 pari a kg 12.5; lt 20 pari a kg 25; lt 200 pari a kg 250
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO Partita n°

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con acqua e sapone. Usare guanti adatti. Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: nausea, vomito, coliche addominali, diarrea,crampi muscolari, convulsioni, bradicardia, dispnea. Exitus per paralisi respiratoria. Terapia: gastrolusi con solfato di sodio o magnesio. X flebo, sintomatici. Ospedalizzare.
Cosultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO è un preparato efficace sia nella lotta anticoccidica su varie colture frutticole, vite ed olivo, sia in impieghi primaverili-estivi come anticrittogamico. Il suo ridotto impatto nei confronti dell'ambiente e delle popolazioni di moltissimi ausiliari, lo rendono rispondente ai moderni principi di lotta integrata e utilizzabile in agricoltura biologica.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:

COLTURE	Trattamenti invernali- primaverili insetticidi e fungicidi	Trattamenti primaverili-estivi fungicidi
Melo, Pero	Cocciniglie, uova di acari Ticchiolatura Kg 20/25 in 80/75 lt di acqua	Ticchiolatura, Oidio *Pre-florali: kg 2 in 98 lt di acqua Post-florali: kg 1,5 in 98,5 lt di acqua Successivi : kg 1 in 99 lt di acqua
Agrumi	Cocciniglie, uova di acari Kg 8/10 in 92/90 lt di acqua	
Pesco, Susino, Ciliegio, Albicocco	Cocciniglie, uova di acari Monilia, Bolla Kg 8/17 in 92/83 lt di acqua	Monilia, Bolla, Oidio *Pre-florali : kg 5 in 95 lt di acqua Post-florali: kg 2-3 in 98/97 lt di acqua Successivi : kg 2 in 98 lt di acqua
Olivo	Cocciniglie, uova di acari Kg 8/10 in 92/90 lt di acqua	
Vite	Cocciniglie, uova di acari Kg 20/25 in 80/75 lt di acqua	
Vivai di fruttiferi e vite	Cocciniglie e uova di acari Ticchiolatura, Monilia, Bolla. Kg 20/25 in 80/75 lt di acqua	Oidio dei fruttiferi *Pre-florali : kg 2 in 98 lt di acqua (Pomacee) kg 5 in 95 lt di acqua (Drupacee) Post-florali: kg 1,5 in 98,5 lt di acqua (Pomacee) kg 2-3 in 98/97 lt di acqua (Drupacee) Successivi : kg 1 in 99 lt di acqua (Pomacee) kg 2 in 98 lt di acqua (Drupacee)

* **Trattamenti primaverili: da ingrossamento gemme a bottoni fiorali.**

AVVERTENZE: I trattamenti primaverili vanno effettuati all'ingrossamento delle gemme prima che queste si aprano. In caso di abbassamenti di temperatura e all'accentuarsi dell'ingrossamento dei bottoni fiorali, attenersi alle dosi più basse. Tale impiego permette di risparmiare il primo trattamento antiticchiolatura su melo e pero.

Nei trattamenti primaverili-estivi, con l'aumento della temperatura, attenersi alle dosi più basse. Non somministrare con temperature superiori a 30° C.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto va impiegato da solo. La sua applicazione deve comunque essere distanziata di almeno 15 giorni da un trattamento con Olii minerali e di 20-25 giorni da un trattamento con prodotti a base di Rame.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto impiegato alle dosi, con le modalità, sulle colture ed alle epoche consigliate, non è fitotossico.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto, se impiegato correttamente, non è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenza: lo stoccaggio del contenitore da parte dell'utilizzatore, dovrà essere effettuato in zona dotata di un bacino di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoriuscite di prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

CHIMIGROUP S.r.l.

DIAZIGROUND

ESCA INSETTICIDA GRANULARE PER L'ELIMINAZIONE DEGLI INSETTI DEL TERRENO DI PIANTE ORNAMENTALI E FIORI DA BALCONE, APPARTAMENTO E GIARDINO DOMESTICO

DIAZIGROUND

COMPOSIZIONE
g 100 di prodotto contengono:
Diazinone puro g 5
Coformulanti, attrattivi e inerti* q.b. a g 100
* Contiene Denatonio Benzoato sostanza repellente che riduce i rischi di avvelenamento per cani, gatti e bambini

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto - Non gettare i residui nelle fognature - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione
CHIMIGROUP S.r.l.
Piazza G. Salvemini, 7 - 35031 Padova - Tel. +39 049 9501667

Stabilimento di produzione e/o confezionamento: **ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.** - Conselve (PD)

Prodotto Fitosanitario per Piante Ornamentali
Registrazione del Ministero della Salute n. 11458/PPO del 09.10.2002

Contenuto netto: g 5-10-20-50-100-200-250-300-400-500-750 / kg 1 **Partita n.** ……………………

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione - Conservare soltanto nel recipiente originale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito , crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi muscarinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: Atropina ad alte dosi fino alla comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
DIAZIGROUND è un'esca insetticida granulare che agisce per contatto ed ingestione su grillotalpe, elateridi, vermi, larve di coleotteri, agrotidi, dorifore, formiche ecc. insediatisi nel terreno di vasi o giardini domestici.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
⇒ Distribuire alla dose di 10 g/mq prima dell'invaso o semina, quindi interrare.
⇒ Distribuire alla dose di 5 g/mq nei trattamenti localizzati a singole piantine o vasi, sia interrato che sparso in superficie.

Durante l'impiego indossare guanti di gomma o PVC sciacquandoli dopo l'uso.

COMPATIBILITA': DIAZIGROUND si usa da solo.

NOCIVITA': Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

FOGLIO ILLUSTRATIVO

DIAZIGROUND

ESCA INSETTICIDA GRANULARE PER L'ELIMINAZIONE DEGLI INSETTI DEL TERRENO DI PIANTE ORNAMENTALI E FIORI DA BALCONE, APPARTAMENTO E GIARDINO DOMESTICO

DIAZIGROUND

COMPOSIZIONE

g 100 di prodotto contengono:

Diazinone puro g 5

Coformulanti, attrattivi e inerti* q.b. a g 100

* Contiene Denatonio Benzoato sostanza repellente che riduce i rischi di avvelenamento per cani, gatti e bambini

FRASI DI RISCHIO

Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto - Non gettare i residui nelle fognature - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione
CHIMIGROUP S.r.l.
Piazza G. Salvemini, 7 - 35031 Padova - Tel. +39 049 9501667

Stabilimento di produzione e/o confezionamento: **ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.** - Conselve (PD)

Prodotto Fitosanitario per Piante Ornamentali
Registrazione del Ministero della Salute n. 11458/PPO del 09.10.2002

Contenuto netto: g 5-10-20-50-100 **Partita n.** ....

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione - Conservare soltanto nel recipiente originale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito , crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi muscarinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: Atropina ad alte dosi fino alla comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE

DIAZIGROUND è un'esca insetticida granulare che agisce per contatto ed ingestione su grillotalpe, elateridi, vermi, larve di coleotteri, agrotidi, dorifore, formiche ecc. insediatisi nel terreno di vasi o giardini domestici.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

⇒ Distribuire alla dose di 10 g/mq prima dell'invaso o semina, quindi interrare.
⇒ Distribuire alla dose di 5 g/mq nei trattamenti localizzati a singole piantine o vasi, sia interrato che sparso in superficie.

Durante l'impiego indossare guanti di gomma o PVC sciacquandoli dopo l'uso.

COMPATIBILITA': DIAZIGROUND si usa da solo.

NOCIVITA': Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO PER LE TAGLIE DI CONFEZIONE DA g 5, 10, 20, 50 e 100

DIAZIGROUND

Esca insetticida granulare per l'eliminazione degli insetti del terreno di piante ornamentali e fiori da balcone, appartamento e giardino domestico

DIAZIGROUND

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Diazinone puro g 5

Coformulanti, attrattivi e inerti* q.b. a g 100

* Contiene Denatorio Benzoato sostanza repellente che riduce i rischi di avvelenamento per cani, gatti e bambini

FRASI DI RISCHIO

Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambeinte acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare,nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non gettare i residui nelle fognature - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione
CHIMIGROUP S.r.l.
Piazza G. Salvemini, 7 - 35031 Padova - **Tel.** +30 019 9501667

Prodotto Fitosanitario per Piante Ornamentali
Registrazione del Ministero della Salute n. 11458/PPO del 09.10.2002

Contenuto netto: g 5-10-20-50-100 **Partita n.** ……………..

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

FUNGISULF

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

FUNGISULF
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Zolfo puro (esente da selenio) g 80
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

IRRITANTE

Titolare della registrazione
CHIMIGROUP S.r.l.
Piazza G. Salvemini, 7 - 35031 Padova - Tel. +39 049 9501667

Officina di produzione: **ZAPI S.p.A.** Via Terza Strada, 12 - Conselve (PD)

Registrazione del Ministero della Salute n. 11459 del 09.10.2002

Contenuto netto: g 10-20-50-100-150-200-250-300-350-400-450-500-550-600-650-700-750-800-850-900-950 / kg 1-1,5-2-2,5-3-4-5-10-15-20-25 **Partita n.** ....

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
FUNGISULF è un anticrittogamico a lunga persistenza d'azione impiegato per combattere prontamente l'Oidio o "Mal bianco" che attacca le sotto indicate colture. Questo prodotto è il risultato di un particolare procedimento chimico che gli conferisce perfetta dispersione in acqua e completa adesività.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
- **VITE:** 200-300 g/hl nelle zone a bassa presenza di oidio; effettuare trattamenti ogni 7-8 giorni a 300-500 g/hl nelle zone e nei periodi maggiormente esposti all'infezione .
- **POMACEE** (Melo e Pero): in trattamenti pre-florali 300-400 g/hl; in trattamenti post-florali: 200-300 g/hl.
- **DRUPACEE:** 200-400 g/hl in pre e post fioritura impiegando le dosi più alte in caso di forte pressione della malattia; trattare alla dose di 400-600 g/hl per trattamenti estintivi di post-raccolta.
- **AGRUMI, OLIVO:** 200-400 g/hl intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
- **FRAGOLA:** 200-500 g/hl. Le dosi più alte vanno impiegate in caso di forte pressione della malattia.
- **NOCCIOLO:** 300-500 g/hl.
- **ORTAGGI, PATATA:** 200-500 g/hl. Impiegare al dosaggio più alto nel periodo primaverile e in caso di forte pressione del patogeno.
- **CEREALI:** 6-8 kg di prodotto in 300-500 litri d'acqua per ettaro, intervenendo alla comparsa del fungo sulle ultime due foglie del culmo.
- **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO:** 6-8 kg di prodotto, in 300-500 litri per ettaro. Effettuare un primo trattamento alla comparsa della malattia ed i successivi ad intervalli di 15-20 giorni.
- **SOIA, GIRASOLE, TABACCO:** 4-6 kg di prodotto, in 300-500 litri d'acqua per ettaro.
- **FLOREALI E ORNAMENTALI (crisantemo, begonia, ortensia):** in pieno campo od in serra: 150-200 g/hl durante tutto l'anno, da ridurre a 100-150 g/hl per trattamenti in serra.
- **FORESTALI:** 150-400 g/hl ai primi accenni della malattia. Trattare ai massimi dosaggi in caso di forte pressione funginea.
- **VIVAI DI PIOPPO:** 200-400 g/hl.

Nel corso dell'estate effettuare i trattamenti alle dosi minime consigliate e soltanto durante le ore più fresche della giornata.
Preparazione della sospensione: stemperare la dose consigliata di prodotto in poca acqua, mescolare fino ad ottenere una poltiglia fluida ed omogenea, quindi versarla nel quantitativo totale d'acqua, semplice o già additivata con altri prodotti, rimescolando accuratamente.

COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile con antiparassitari a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese, ecc.), con Oli minerali, Captano e Diclofluanide. Deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli Oli minerali e del Captano. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico sulle seguenti cultivar:
Mele: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.
Pere: Buona Luigia d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.
Vite: Sangiovese
Può essere fitotossico sulle cucurbitacee.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

FUNGISULF

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

FUNGISULF
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Zolfo puro (esente da selenio) g 80
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

IRRITANTE

Titolare della registrazione
CHIMIGROUP S.r.l.
Piazza G. Salvemini, 7 - 35031 Padova - Tel. +39 049 9501667

Officina di produzione: **ZAPI S.p.A.** Via Terza Strada, 12 - Conselve (PD)
Registrazione del Ministero della Salute n. 11459 del 09.10.2002
Contenuto netto: g 10-20-50-100 **Partita n.** ....

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
FUNGISULF è un anticrittogamico a lunga persistenza d'azione impiegato per combattere prontamente l'Oidio o "Mal bianco" che attacca le sotto indicate colture. Questo prodotto è il risultato di un particolare procedimento chimico che gli conferisce perfetta dispersione in acqua e completa adesività.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
- **VITE:** 200-300 g/hl nelle zone a bassa presenza di oidio; effettuare trattamenti ogni 7-8 giorni a 300-500 g/hl nelle zone e nei periodi maggiormente esposti all'infezione .
- **POMACEE** (Melo e Pero): in trattamenti pre-fiorali 300-400 g/hl; in trattamenti post-fiorali: 200-300 g/hl.
- **DRUPACEE:** 200-400 g/hl in pre e post fioritura impiegando le dosi più alte in caso di forte pressione della malattia; trattare alla dose di 400-600 g/hl per trattamenti estintivi di post-raccolta.
- **AGRUMI, OLIVO:** 200-400 g/hl intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
- **FRAGOLA**: 200-500 g/hl. Le dosi più alte vanno impiegate in caso di forte pressione della malattia.
- **NOCCIOLO:** 300-500 g/hl.
-

FOGLIO ILLUSTRATIVO

- **ORTAGGI, PATATA:** 200-500 g/hl. Impiegare al dosaggio più alto nel periodo primaverile e in caso di forte pressione del patogeno.
- **CEREALI:** 6-8 kg di prodotto in 300-500 litri d'acqua per ettaro, intervenendo alla comparsa del fungo sulle ultime due foglie del culmo.
- **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO:** 6-8 kg di prodotto, in 300-500 litri per ettaro. Effettuare un primo trattamento alla comparsa della malattia ed i successivi ad intervalli di 15-20 giorni.
- **SOIA, GIRASOLE, TABACCO:** 4-6 kg di prodotto, in 300-500 litri d'acqua per ettaro.
- **FLOREALI E ORNAMENTALI (crisantemo, begonia, ortensia):** in pieno campo od in serra: 150-200 g/hl durante tutto l'anno, da ridurre a 100-150 g/hl per trattamenti in serra.
- **FORESTALI:** 150-400 g/hl ai primi accenni della malattia. Trattare ai massimi dosaggi in caso di forte pressione funginea.
- **VIVAI DI PIOPPO:** 200-400 g/hl.

Nel corso dell'estate effettuare i trattamenti alle dosi minime consigliate e soltanto durante le ore più fresche della giornata.
Preparazione della sospensione: stemperare la dose consigliata di prodotto in poca acqua, mescolare fino ad ottenere una poltiglia fluida ed omogenea, quindi versarla nel quantitativo totale d'acqua, semplice o già additivata con altri prodotti, rimescolando accuratamente.

COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile con antiparassitari a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese, ecc.), con Oli minerali, Captano e Diclofluanide. Deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli Oli minerali e del Captano. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico sulle seguenti cultivar:
Mele: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.
Pere: Buona Luigia d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.
Vite: Sangiovese
Può essere fitotossico sulle cucurbitacee.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO PER LE CONFEZIONI DA GRAMMI 10, 20, 50 e 100

FUNGISULF

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

FUNGISULF

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:

Zolfo puro (esente da selenio)	g 80
Coformulanti q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare,né bere, né fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

IRRITANTE

Titolare della registrazione
CHIMIGROUP S.r.l.
Piazza G. Salvemini, 7 - 35031 Padova - Tel. +39 049 9501667

Registrazione del Ministero della Salute n. 11459 del 09.10.2002

Contenuto netto: g 10-20-50-100 **Partita n.** ....

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SLUGMET

ESCA LUMACHICIDA GRANULARE PER L'ELIMINAZIONE DI LUMACHE, LIMACCE, CHIOCCIOLE E GASTEROPODI IN GENERE RICCA DI PROTEINE ATTRATTIVE - DESTINATA AL TERRENO DI PIANTE ORNAMENTALI E FIORI DA BALCONE, APPARTAMENTO E GIARDINO DOMESTICO

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Metaldeide acetica pura	g 5
Coformulanti, attrattivi e inerti * q.b. a	g 100

* Contiene Denatonio Benzoato, sostanza repellente che riduce i rischi di avvelenamento per cani, gatti e bambini

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere né fumare durante l'impiego - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa - Non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione - Conservare soltanto nel recipiente originale.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisme, paralisi respiratorie; irritante per le mucose.
Postumi: danni epatici e renali. **Terapia:** sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
L'esca granulare **SLUGMET** attira, con le proteine ed i supporti speciali LUMACHE, LIMACCE, CHIOCCIOLE e GASTEROPODI in genere e li elimina sia per contatto che per ingestione.
SLUGMET è di facile e pratico impiego; non fermenta, non ammuffisce, non viene dilavato dalle piogge e non viene asportato dal vento.
MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
⇒ Distribuire alla dose di 3-5 grammi mq di superficie;
⇒ Distribuire alla dose di 2-3 g/mq nei trattamenti localizzati a singole piantine o vasi.

Durante l'impiego indossare guanti di gomma o PVC sciacquandoli dopo l'uso

COMPATIBILITÀ
SLUGMET si usa da solo.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI AUTORIZZATI: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

CHIMIGROUP S.r.l.
Piazza G. Salvemini, 7 – 35031 Padova

Officina di produzione: **ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.** - Conselve (PD)

Prodotto Fitosanitario per Piante Ornamentali
Registrazione del Ministero della Salute n° 11467/PPO del 14/10/2002

Contenuto netto: g 5-10-20-50-100-200-250-300-400-500-750 / kg 1 **Partita n.** ....

- SCHEDA DATI DI SICUREZZA DISPONIBILE SU RICHIESTA PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI -

SLUGMET

ESCA LUMACHICIDA GRANULARE PER L'ELIMINAZIONE DI LUMACHE, LIMACCE, CHIOCCIOLE E GASTEROPODI IN GENERE RICCA DI PROTEINE ATTRATTIVE - DESTINATA AL TERRENO DI PIANTE ORNAMENTALI E FIORI DA BALCONE, APPARTAMENTO E GIARDINO DOMESTICO

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Metaldeide acetica pura	g 5
Coformulanti, attrattivi e inerti * q.b. a	g 100

*** Contiene Denatonio Benzoato, sostanza repellente che riduce i rischi di avvelenamento per cani, gatti e bambini**

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere né fumare durante l'impiego - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa - Non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione - Conservare soltanto nel recipiente originale.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisme, paralisi respiratorie; irritante per le mucose.
Postumi: danni epatici e renali. **Terapia:** sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
L'esca granulare **SLUGMET** attira, con le proteine ed i supporti speciali LUMACHE, LIMACCE, CHIOCCIOLE e GASTEROPODI in genere e li elimina sia per contatto che per ingestione.
SLUGMET è di facile e pratico impiego; non fermenta, non ammuffisce, non viene dilavato dalle piogge e non viene asportato dal vento.
MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
⇒ Distribuire alla dose di 3-5 grammi mq di superficie;
⇒ Distribuire alla dose di 2-3 g/mq nei trattamenti localizzati a singole piantine o vasi.

Durante l'impiego indossare guanti di gomma o PVC sciacquandoli dopo l'uso

COMPATIBILITÀ
SLUGMET si usa da solo.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI AUTORIZZATI: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

CHIMIGROUP S.r.l.
Piazza G. Salvemini, 7 – 35031 Padova

Officina di produzione: ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. - Conselve (PD)

Prodotto Fitosanitario per Piante Ornamentali
Registrazione del Ministero della Salute n° 11467/PPO del 14/10/2002

Contenuto netto: g 5-10-20-50-100-200-250-300-400-500-750 / kg 1 **Partita n.** ....

- SCHEDA DATI DI SICUREZZA DISPONIBILE SU RICHIESTA PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI -

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO PER LE TAGLIE DI CONFEZIONE DA g 5, 10, 20, 50 e 100

SLUGMET

ESCA LUMACHICIDA GRANULARE PER LA DISTRUZIONE DI LUMACHE, LIMACCE, CHIOCCIOLE E GASTEROPODI IN GENERE RICCA DI PROTEINE ATTRATTIVE – DESTINATA AL TERRENO DI PIANTE ORNAMENTALI E FIORI DA BALCONE, APPARTAMENTO E GIARDINO DOMESTICO

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Metaldeide g 5
Coformulanti, attrattivi e inerti* q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

* Contiene Denatonio Benzoato, sostanza repellente che riduce i rischi di avvelenamento per cani, gatti e bambini.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

AVVERTENZA: DURANTE L'IMPIEGO INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI ADATTI SCIACQUANDOLI DOPO L'USO

CHIMIGROUP S.r.l.
Piazza G. Salvemini, 7 – 35031 Padova

Prodotto Fitosanitario per Piante Ornamentali
Registrazione del Ministero della Salute n. 11467/PPO del 14/10/2002

Contenuto netto: g 5-10-20-50-100 Partita N:

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IQV ITALIA S.r.l.

BLIN EXA

(Sospensione concentrata)
Fungicida sistemico ad ampio spettro d'azione

BLIN EXA Registrazione Ministero della Salute n. 11771 del 12/11/2003

COMPOSIZIONE
ESACONAZOLO puro g. 4,8 (=50 g/L)
Coformulanti q.b. a g.100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

IQV Italia Srl
Via del Progresso, 2
00065 Fiano Romano (Roma)

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)

CONTENUTO:
ml 250-500 litri 1-5-10-25

Partita n

NORME PRECAUZIONALI:
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalee, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

BLIN EXA è un fungicida ad azione sistemica e translaminare. Esplica un'azione protettiva, curativa ed eradicante, ed inoltre riunisce ad un'attività selettiva una buona persistenza d'azione. Grazie alla sua sistemicita raggiunge la pagina fogliare opposta a quella trattata e si diffonde verso le varie parti della pianta da proteggere. Eventuali piogge successive al trattamento non riducono l'efficacia in quanto il prodotto penetra rapidamente attraverso i tessuti della pianta.
BLIN EXA non favorisce lo sviluppo degli acari e non influisce sulla fermentazione dei mosti e sulle caratteristiche organolettiche dei vini.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Intervenire nei periodi in cui le colture sono sensibili agli attacchi fungini, e comunque tempestivamente e secondo le raccomandazioni tecniche locali. A seconda del clima, della fase fenologica della coltura e del grado di virulenza dell'infezione, la cadenza di intervento può essere compresa tra 10 e 14 giorni. Per le pomacee adottare cadenze d'intervento di 6-8 giorni.
Disperdere la dose prescelta di BLIN EXA in un po' di acqua in un recipiente a parte, quindi procedere alla miscelazione versando il contenuto nel serbatoio della pompa irrorante già riempita per metà con acqua.
Impiegare volumi d'acqua medio-alti (600-2000 l/ha) in relazione alla massa e alla densità della vegetazione da proteggere ed assicurare la completa ed uniforme copertura della stessa.

CAMPO E DOSI D'IMPIEGO

COLTURA	DOSE (ml/hl)	MALATTIA
Melo, pero	50	ticchiolatura, oidio
Vite: uva da vino	35-40	oidio, black-rot (Guignardia)
Uva da tavola	40-50	
Carciofo, pomodoro	30-40	oidio
Rosa, zinnia, astri	50-100	oidio, ticchiolatura
Pioppo	50-70	marssonina
	60 70	ruggini

Adottare le dosi inferiori per gli interventi preventivi ed in presenza di lievi infezioni.
Avvertenza: evitare i trattamenti durante la fioritura.

COMPATIBILITÀ

Nei casi in cui l'esperienza e le esigenze tecniche lo reputino necessario e salvo specifiche controindicazioni, si raccomanda l'impiego di BLIN EXA in miscela con diversi fungicidi ad attività protettiva quali captano, clorotalonil, ditianon, metiram, mancozeb, maneb, bupirimate, rame, folpet e zolfo. Il prodotto non è miscibile con preparati a base di fosetil alluminio.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

MELO: sulle varietà McIntosh e relativi incroci impiegare solo fino alla fioritura. Eventuali miscele con clorotalonil possono provocare rugginosità su Golden Delicious e Granny Smith.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER CARCIOFO, POMODORO; 15 GIORNI PER MELO, PERO, VITE.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PROTEGGERE DAL FREDDO

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CURENOX 40 PB

Fungicida a base di Rame sottoforma di ossicloruro
Polvere bagnabile

CURENOX 40 PB Registrazione del Ministero della Sanità n. 10206 del 02/12/1999

Composizione:
Rame metallo g 40
(sottoforma di ossicloruro)
Coadiuvanti q b. a g 100

Partita n. ………………

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV ITALIA srl
Via del Progresso, 2
Fiano Romano (Roma)

Officine di produzione:
DIACHEM spa
U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
IQV - Industrias Quimicas del Valles
Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)
LIFA srl - Isola Vicentina (VI)

Taglie autorizzate:
100-200-250-500 g 1-5-10-20 Kg

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare in contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO
Il **CURENOX 40 PB** è un formulato in polvere bagnabile che per l'estrema finezza delle sue particelle è dotato di particolari caratteristiche di adesivita' e di uniformita' ridistributiva sulle superfici fogliari.
Tali caratteristiche consentono una maggiore efficacia fungicida e battericida ed una sensibile riduzione delle dosi unitarie di rame con conseguenti vantaggi anche sotto il profilo dell'impatto ambientale.
VITE: 400-500 g/hl contro Peronospora e Marciume nero degli acini. Intervenire dalla formazione degli acini alla vendemmia.
MELO, PERO: 800-1000 g/hl contro cancri del legno (Nectria galligena, Phomopsis mali, Sphaeropsis malorum, Pseudomonas siringae); intervenire alla caduta totale delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme. Contro il colpo di fuoco 250-300 g/hl, intervenire con due trattamenti nelle fasi del rigonfiamento delle gemme e di punte verdi. Contro Phytophtora cactorum 500 g/hl, applicando 15 litri di soluzione alla base di ogni pianta malata; intervenire ogni anno in primavera ed alla fine della raccolta. Contro la Ticchiolatura: 300-400 g/hl prima della fioritura; dopo la fioritura e successivamente 350 g/hl.
ALBICOCCO, SUSINO: 800 g/hl contro Corineo, Monilia, Cytospora leucostoma. Intervenire durante il riposo vegetativo. Non trattare mai dopo la fioritura.
CILIEGIO: 800 g/hl + 1500 g/hl di olio minerale bianco contro Corineo, Monilia, Scopazzi. Intervenire alla caduta totale delle foglie ed all'ingrossamento delle gemme. In frutteti fortemente ammalati ripetere l'applicazione anche in agosto;. Contro Monilia dei fiori 350 g/hl intervenendo subito prima ed immediatamente dopo la fioritura.
PESCO, NETTARINE: 800 g/hl contro Bolla e Corineo con interventi subito dopo la caduta delle foglie ed a fine inverno.
300 g/hl contro la Monilia nella fase dei bottoni rosa. 800-1000 g/hl contro le Batteriosi con trattamenti durante il riposo vegetativo; per applicazioni in post-fioritura usare 300 g/hl
MANDORLO: 800 g/hl contro Corineo, Bolla e Monilia. Intervenire dopo la caduta delle foglie, all'ingrossamento delle gemme e subito prima della fioritura. Per interventi post-fiorali mantenere inalterata la dose.
AGRUMI: 400-500 g/hl contro Mal secco, Allupatura, Fumaggine, Antracnosi e Scabbia del limone e dell'arancio. Intervenire prima e dopo la fioritura in funzione della gravità della malattia.
OLIVO: 400-500 g/hl contro Occhio di pavone, Fumaggine e Lebbra. Intervenire alla fine di settembre - inizio ottobre, dopo la raccolta ed eventualmente dopo la potatura.
NESPOLO: 400 g/hl contro la Ticchiolatura.
PATATA: 400 g/hl contro Peronospora e Alternaria: Iniziare i trattamenti quando le piante hanno raggiunto l'altezza di circa 15 cm proseguendoli in funzione dell'andamento climatico.
POMODORO: 400 g/hl contro Peronospora, Alternaria e Septoria. Intervenire ogni 10 giorni circa ed in funzione dell'andamento climatico.
500-600 g/hl contro Batteriosi (Cancro o Avvizzimento, Maculatura e Picchiettatura) intervenire ad intervalli regolari (10-15 giorni). Si consigliano combinazioni con Mancozeb solo fino alla prima fioritura.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: 4-5 Kg/ha contro la Cercospora. Iniziare i trattamenti alla fine di giugno-inizio di luglio continuandoli ogni 20-25 giorni fino a 20 giorni dalla raccolta.
FRAGOLA: 4-5 Kg/ha contro Vaiolatura. Iniziare a trattare quando le piante hanno attecchito proseguendo ogni settimana per tutta la stagione. Cessare le applicazioni ai primi eventuali segni di fitotossicità.
FAGIOLO, PISELLO: 400 g/hl contro Peronospora, Antracnosi e Ruggine. Intervenire quando si creano le condizioni per lo sviluppo delle malattie e proseguire secondo il caso. Questi interventi controllano pure le Batteriosi.
CAVOLI, CAVOLFIORI, CAVOLI DI BRUXELLES, BROCCOLI: 400 g/hl contro Peronospora e Alternaria. 600 g/hl contro Batteriosi (Xanthomonas). Iniziare le applicazioni dopo il trapianto e dopo l'emergenza nelle coltivazioni seminate ad intervalli di 10-15 giorni in funzione delle condizioni climatiche. Alle dosi piu' alte potrebbero verificarsi, in alcune varietà, dei leggeri arrossamenti delle foglie vecchie dei broccoli e delle macchie sulle foglie esterne dei cavoli.
CAROTA: 400 g/hl contro l'Alternaria. Iniziare le applicazioni al verificarsi delle condizioni per lo sviluppo della malattia.
SEDANO, FINOCCHIO: 300-400 g/hl contro Septoria, Cercospora e Peronospora. Trattare secondo l'andamento stagionale.
MELANZANA: 350 g/hl contro Alternaria, Peronospora. Intervenire ogni 15 giorni circa; in tal modo si controlla pure la Phomopsis vexans.
CETRIOLO: 350 g/hl contro Peronospora, Antracnosi, Cladosporiosi e Batteriosi (Pseudomonas). Intervenire a cadenze fisse in funzione delle condizioni climatiche.
MELONE, ANGURIA: 400 g/hl contro Peronospora, Antracnosi si consigliano interventi cadenzati in funzione delle condizioni climatiche.
CIPOLLA, AGLIO: 400 g/hl contro Peronospora ed Alternaria. Iniziare i trattamenti quando le piante hanno raggiunto l'altezza di circa cm 15.
LATTUGA E SIMILI, CARDO, CARCIOFO: 350 g/hl contro Peronospora ed Alternaria con interventi preventivi in funzione delle condizioni climatiche.
RISO: 5 Kg/ha contro le Alghe verdi. Intervenire alla comparsa dell'attacco con un quantitativo di soluzione sufficiente per coprire l'intera superficie.
ROSA: 250-350 g/hl contro Ticchiolatura, Peronospora e Ruggine.
CICLAMINO: 250-350 g/hl contro Antracnosi e Maculatura fogliare
FILODENDRO: 350 g/hl contro Batteriosi (Erwinia spp.) con applicazioni settimanali ad iniziare prima della comparsa della malattia.
SOIA, GIRASOLE: contro Alternariosi, Sclerotinia, alla dose di g. 350 per q.le acqua, con trattamenti preventivi.
Compatibilità: il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine, susino su alcune varietà di melo (Abbondanza, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) è cupro-sensibile. Il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne

DL 65/2003 Sett. 05

sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Ad eccezione della lotta contro le Batteriosi in cui la fitotossicità può diventare un problema secondario.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti **20 giorni** prima della raccolta.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003 Sett. 05

Etichetta formato ridotto

CURENOX 40 PB

Fungicida a base di Rame sottoforma di ossicloruro
Polvere bagnabile

CURENOX 40 PB Registrazione del Ministero della Sanità n. 10206 del 02/12/1999

Composizione:
Rame metallo g 40
(sottoforma di ossicloruro)
Coadiuvanti q b. a g 100

IQV ITALIA srl
Via del Progresso, 2
Fiano Romano (Roma)

Contenuto: **100 g**

Partita n. ....

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Officine di produzione:
DIACHEM spa - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
IQV - Industrias Quimicas del Valles
Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)
LIFA srl - Isola Vicentina (VI)

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare in contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003 Sett. 05

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CURENOX 40 MICRO

Fungicida a base di Rame sottoforma di ossicloruro
Microgranuli idrodispersibili

CURENOX 40 MICRO Registrazione del Ministero della Sanità n. 10450 del 19/04/00

Composizione:

Rame metallo (sotto forma di ossicloruro)	g 40
Coadiuvanti q b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV ITALIA srl
Via del Progresso, 2 - Fiano Romano RM
Officina di produzione:
IQV - Industrias Quimicas del Valles
Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)
Officina di confezionamento:
ADICA srl - Nera Montoro (TR)
TORRE srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)

Partita n. ....
Contenuto:
0,1 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 - 25 kg

NORME PRECAUZIONALI
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO
Il CURENOX 40 MICRO è un formulato in microgranuli idrodispersibili dotato di particolari caratteristiche di adesivita' e di uniformita' ridistributiva sulle superfici fogliari.
Tali caratteristiche consentono una maggiore efficacia fungicida e battericida ed una sensibile riduzione delle dosi unitarie di rame con conseguenti vantaggi anche sotto il profilo dell'impatto ambientale.
MELO, PERO: 800-1000 g/hl contro cancri del legno (Nectria galligena, Phomopsis mali, Sphaeropsis malorum, Pseudomonas siringae); intervenire alla caduta totale delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme. Contro il colpo di fuoco, g.500 intervenire con due trattamenti nelle fasi del rigonfiamento delle gemme e di punte verdi; sul pero applicare 350 g/hl o 5 kg/Ha, durante la fioritura, ogni 5 giorni. Contro Phytophthora cactorum 350 g/hl applicando 15 litri di soluzione alla base di ogni pianta malata; intervenire ogni anno in primavera ed alla fine della raccolta. Contro la Ticchiolatura: g.300-400/hl prima della fioritura; dopo la fioritura e successivamente 250-350 g/hl.
VITE: 400-500 g/hl contro Peronospora e Marciume nero degli acini. Intervenire dalla formazione degli acini alla vendemmia.
ALBICOCCO; SUSINO: 500-800 g/hl contro Corineo, Monilia, Cytospora leucostoma. Intervenire durante il riposo vegetativo. Non trattare mai dopo la fioritura.
CILIEGIO: 500-800 g/hl contro Corineo, Monilia, Scopazzi. Intervenire alla caduta totale delle foglie ed all'ingrossamento delle gemme. In frutteti fortemente ammalati ripetere l'applicazione anche in agosto; Contro Monilia dei fiori 350 g/hl intervenendo subito prima ed immediatamente dopo la fioritura.
PESCO; NETTARINE: 500-800 g/hl contro Bolla e Corineo con interventi subito dopo la caduta delle foglie ed a fine inverno.
300 g/hl contro la Monilia nella fase dei bottoni rosa. 800-1000 g/hl contro le Batteriosi con trattamenti durante il riposo vegetativo; per applicazioni in post-fioritura usare g.300/hl
MANDORLO: 400 g/hl contro Corineo, Bolla e Monilia. Intervenire dopo la caduta delle foglie, all'ingrossamento delle gemme e subito prima della fioritura. Per interventi post-fiorali mantenere inalterata la dose; 400-500 g/hl contro Batteriosi (Pseudomonas) intervenendo prima della fase dei bottoni rosa.
AGRUMI: 400-500 g/hl contro Mal secco, Allupatura, Melanosi, Fumaggine, Antracnosi e Scabbia del limone e dell'arancio. Intervenire prima e dopo la fioritura in funzione della gravita' della malattia.
OLIVO: 400-500 g/hl contro Occhio di pavone, Fumaggine e Lebbra. Intervenire alla fine di settembre - inizio ottobre, dopo la raccolta ed eventualmente dopo la potatura.
NOCCIOLO: 500 g/hl contro la Batteriosi (Xanthomonas corylina) con due trattamenti in ottobre distanziati di circa 20-25 giorni uno dall'altro.
NOCE: 400 g/hl contro il Mal secco. Intervenire in pre-fioritura; in caso di piogge frequenti sono necessarie applicazioni supplementari. In estate si consiglia di aggiungere 300 g/hl di olio minerale bianco.
NESPOLO: 400 g/hl contro la Ticchiolatura.
PATATA: 400 g/hl contro Peronospora e Alternaria: Iniziare i trattamenti quando le piante hanno raggiunto l'altezza di circa 15 cm proseguendoli in funzione dell'andamento climatico.
POMODORO: 400 g/hl contro Peronospora, Alternaria e Septoria. Intervenire ogni 10 giorni circa ed in funzione dell'andamento climatico.
500-600 g/hl contro Batteriosi (Cancro o Avvizzimento, Maculatura e Picchiettatura) intervenire ad intervalli regolari (10-15 giorni). Si consigliano combinazioni con Mancozeb solo fino alla prima fioritura.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: 4-5 kg/ha contro la Cercospora. Iniziare i trattamenti alla fine di giugno-inizio di luglio continuandoli ogni 20-25 giorni fino a 20 giorni dalla raccolta.
FRAGOLA: 4-5 kg/ha contro Vaiolatura. Iniziare a trattare quando le piante hanno attecchito proseguendo ogni settimana per tutta la stagione. Cessare le applicazioni ai primi eventuali segni di fitotossicità.
FAGIOLO E PISELLO: 400 g/hl contro Peronospora, Antracnosi e Ruggine. Intervenire quando si creano le condizioni per lo sviluppo delle malattie e proseguire secondo il caso. Questi interventi controllano pure le Batteriosi.
CAVOLI-CAVOLFIORI-CAVOLI DI BRUXELLES-BROCCOLI: 400 g/hl contro Peronospora e Alternaria. 600 g/hl contro Batteriosi (Xanthomonas). Iniziare le applicazioni dopo il trapianto e dopo l'emergenza nelle coltivazioni seminate ad intervalli di 10-15 giorni in funzione delle condizioni climatiche. Alle dosi piu' alte potrebbero verificarsi, in alcune varieta', dei leggeri arrossamenti delle foglie vecchie dei broccoli e delle macchie sulle foglie esterne dei cavoli.
CAROTA: 400 g/hl contro l'Alternaria. Iniziare le applicazioni al verificarsi delle condizioni per lo sviluppo della malattia.
SEDANO-FINOCCHIO: 300-400 g/hl contro Septoria, Cercospora e Peronospora. Trattare secondo l'andamento stagionale.
MELANZANA: 350 g/hl contro Alternaria, Peronospora. Intervenire ogni 15 giorni circa; in tal modo si controlla pure la Phomopsis vexans.
CETRIOLO: 350 g/hl contro Peronospora, Antracnosi, Cladosporiosi e Batteriosi (Pseudomonas). Intervenire a cadenze fisse in funzione delle condizioni climatiche.
MELONE-ANGURIA: 400 g/hl contro Peronospora, Antracnosi si consigliano interventi cadenzati in funzione delle condizioni climatiche.
CIPOLLA-AGLIO: 400 g/hl contro Peronospora ed Alternaria. Iniziare i trattamenti quando le piante hanno raggiunto l'altezza di circa cm 15.
INSALATA-CARDO-CARCIOFO : 350 g/hl contro Peronospora ed Alternaria con interventi preventivi in funzione delle condizioni climatiche.
RISO: 5-8 kg/ha contro le Alghe verdi. Intervenire alla comparsa dell'attacco con un quantitativo di soluzione sufficiente per coprire l'intera superficie.
ROSA: 250-350 g/hl contro Ticchiolatura, Peronospora e Ruggine.
CICLAMINO: 250-350 g/hl contro Antracnosi e Maculatura fogliare

DL 65/2003

FILODENDRO: 350 g/hl contro Batteriosi (Erwinia spp.) con applicazioni settimanali ad iniziare prima della comparsa della malattia.
SOIA-GIRASOLE: contro Alternariosi, Sclerotinia, alla dose di 350 gr/q.le di acqua, con trattamenti preventivi.

Compatibilità: il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina (es. polisolfuri)
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine, susino su alcune varieta' di melo (Abbondanza, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta del Canada', Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) il prodotto e' cupro-sensibile e puo' essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Ad eccezione della lotta contro le Batteriosi in cui la fitotossicità può diventare un problema secondario.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 20 GIORNI prima della raccolta.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto

CURENOX 40 PB

Fungicida a base di Rame sottoforma di ossicloruro
Polvere bagnabile

CURENOX 40 PB Registrazione del Ministero della Sanità n. 10206 del 02/12/1999

Composizione:
Rame metallo g 40
(sottoforma di ossicloruro)
Coadiuvanti q b. a g 100

IQV ITALIA srl
Via del Progresso, 2
Fiano Romano (Roma)

Contenuto: **100 g**

Partita n. ……………….

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Officine di produzione:
DIACHEM spa - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
IQV - Industrias Quimicas del Valles
Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)
LIFA srl - Isola Vicentina (VI)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare in contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003 Sett. 05

Etichetta/foglio illustrativo

CURENOX MICRO TINTO

Fungicida microgranulare idrodispersibile ad ampio spettro di azione

CURENOX MICRO TINTO Registrazione Ministero della Salute n. 11910 del 19-12-03

COMPOSIZIONE
RAME metallico g. 50
(sotto forma di ossicloruro tetrarame)
Coformulanti q.b. a g.100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV ITALIA Srl
Via del Progresso, 2
00065 Fiano Romano (Roma)

Stabilimento di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)

CONTENUTO:
g 100-250-500 Kg 1-5-10-25

Partita n

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il **CURENOX MICRO TINTO** è un fungicida che agisce per contatto e si impiega nella lotta preventiva contro un gran numero di parassiti fungini sensibili al rame. Il prodotto inoltre è efficace contro numerose Batteriosi che attaccano le colture frutticole ed orticole. Grazie alla particolare formulazione in microgranuli idrodispersibili il **CURENOX MICRO TINTO** è dotato di elevata efficacia, adesività e persistenza di azione.

MODALITÀ, DOSI E CAMPI D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega con pompe a volume normale, iniziando i trattamenti prima della comparsa della malattia e ripeterli secondo le necessità.
VITE: contro **Peronospora 250 g/hl** di acqua. Effettuare i normali trattamenti sulla base dei calendari di lotta comunemente usati in zona. Impiegare il prodotto preferibilmente dopo la fioritura della vite usando, prima della fioritura ed in fioritura, fungicidi acuprici. In zone ed in annate con forti infezioni di Peronospora si può opportunamente aumentare la dose d'impiego a **300-400 g/hl.** Contro l'**Oidio** aggiungere un antioidico specifico (zolfo bagnabile, ecc.).
MELO, PERO, COTOGNO: contro **Ticchiolatura** e **Cancri rameali 0,5-0,7 Kg/hl** in trattamenti autunnali o di fine inverno, **200-250 g/hl** in trattamenti pre-fiorali.
DRUPACEE in genere e MANDORLO: contro **Bolla**, **Corineo** e **Cancri rameali** (trattamenti invernali) **0,5-0,7 kg/hl**. Su **albicocco** contro **Sclerotinia** nei trattamenti pre-fiorali **200-250 g/hl**, nei trattamenti post-fiorali **250-400 g/hl. Ciliegio**: contro **Sclerotinia**, **Corineo** e **Scopazzi** nei trattamenti pre-fiorali **05-0,7 Kg/hl**.
OLIVO: contro **Occhio di pavone** e **Lebbra 250-400 g/hl.**
AGRUMI: contro **Mal secco, Antracnosi** e **Fumaggine 250-400 g/hl**.
ACTINIDIA: contro **Marciume del colletto 400 g/hl.** Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
FRAGOLA: contro **Maculatura rosso-bruna** e **zonata** (Marssonina e Gnomonia), **Vaiolatura rossa** (Mycosphaerella), intervenire in pre-fioritura e sulla vegetazione autunnale con **300 g/hl.**
FRUTTIFERI MINORI ED A GUSCIO: contro **Cancri rameali** in trattamenti autunnali o di fine inverno **400 g/hl**, in trattamenti primaverili **200 g/hl.**
PATATA: contro **Peronospora** ed altre crittogame parassite (**Alternaria, Septoria**) **400 g/hl.**
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro **Cercospora 3,5 Kg/ha** in 500-600 litri di acqua in trattamenti ripetuti 2-3 volte secondo l'andamento della malattia.
ORTAGGI (cavoli, carciofo, asparago, ortaggi a foglia, cucurbitacee, solanacee, legumi, ortaggi a radice, ortaggi a bulbo):

- contro **Peronospora**, **Alternaria**, **Septoria**, **Cladosporiosi** del pomodoro **300 g/hl**.
- contro **Cercospora** e **Septoria** del sedano e della carota **300 g/hl.**
- contro **Peronospora** ed **Antracnosi** del melone, anguria, zucchino e cetriolo **300 g/hl.**
- contro **Antracnosi** e **Ruggine** del pisello, fagiolo, fagiolino **300 g/hl.**
- contro **Peronospora** del cavolo e di altre crucifere **300 g/hl.**

OLEAGINOSE: contro **Peronospora** e **Antracnosi 300 g/hl.**
TABACCO: contro **Peronospora** e **Antracnosi 300-400 g/hl.**
FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI: contro **Ruggine, Peronospora**, **Ticchiolatura**, **Septoria** di colture floreali (**garofano, rosa, crisantemo**), ornamentali e forestali **250 g/hl.**
Per tutti gli impieghi sopra indicati iniziare i trattamenti prima della comparsa delle malattie e ripetere i trattamenti secondo lo sviluppo delle stesse.
RISO: per la lotta contro **le alghe delle risaie** intervenire alla prima comparsa delle alghe, impiegando **3-3,5 Kg/ha** diluiti in 200-300 o più litri di acqua.
Preparazione della poltiglia: introdurre la dose prestabilita di prodotto nella botte dell'irroratrice parzialmente riempita di acqua, mescolando accuratamente, quindi aggiungere la restante parte d'acqua fino al volume desiderato.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina come polisolfuri e calce.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Avvertenze: per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

FITOTOSSICITÀ

Non devono essere effettuati trattamenti durante la fioritura. Su pesco, susino e alcune varietà di Melo (Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Su tutte le colture orticole e floreali, visto l'elevato numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare un saggio prima dell'impiego su larga scala.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto

CURENOX MICRO TINTO

Fungicida microgranulare idrodispersibile ad ampio spettro di azione

CURENOX MICRO TINTO Registrazione Ministero della Salute n. 11910 del 19-12-03

COMPOSIZIONE
RAME metallico g. 50
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)
Coformulanti q.b. a g.100

IQV ITALIA Srl
Via del Progresso, 2
00065 Fiano Romano (Roma)
Stabilimento di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
CONTENUTO: **g 100** Partita n

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: **Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

Etichetta/foglio illustrativo

FESIL 80 micro

Fungicida sistemico

Tipo di formulazione: microgranuli idrodispersibili

FESIL 80 MICRO Registrazione del Ministero della Salute n. 11751 del 22/10 /2003

Composizione
FOSETIL ALLUMINIO puro g. 80
Coformulanti q.b. a g. 100

Partita n. ….

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE

IQV ITALIA Srl
Via del Progresso, 2
00065 Fiano Romano (Roma)

Stabilimenti di produzione
IQV Industrias Quimetal del Valles s.a.
Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)
A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)

CONTENUTO NETTO:
100-200-500 g 1-5-10-15-20 Kg

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il FESIL 80 Micro è un fungicida dotato di azione sistemica che si manifesta in modo ascendente e discendente che è evidente con vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita, e gli permette di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento, quindi dotato di una notevole mobilità sulle colture trattate.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

__Vite__: viene impiegato contro la Peronospora alla dose di 250 g/hl di acqua trattando sempre in miscela con prodotti di copertura (Rame escluso).
__Melo, Pero, Pesco, Actinidia__: viene impiegato contro la Phytophtora cactorum trattando sulla vegetazione, una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta (per melo e actinidia), con 250 g/hl. Nel caso di colture già debilitate dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida: effettuare un'annaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, con litri 1-2 per pianta di una poltiglia costituita da 5 Kg di prodotto per 100 litri di acqua.
__Melo, Pero__: viene impiegato contro la Ticchiolatura con trattamenti preventivi a 150-250 g/hl; nelle fasi pre-fiorali e subito dopo l'allegagione si consiglia l'associazione con fungicidi di copertura o con Dodina.
__Pero__: viene impiegato contro la Maculatura bruna (Stemphylium sp.), trattamenti preventivi a 250 g/hl di acqua.
__Fragola__: viene impiegato contro la Peronospora (Phytophtora cactorum e fragariae). L'immersione delle piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti, seguita da 2-3 irrorazioni alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immersione delle piante prima del trapianto in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti, seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di 0,5 grammi di formulato per pianta.
__Lattuga__: viene impiegato contro la Bremia lactucae; effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire almeno 3 Kg di prodotto per ettaro). Si consiglia di effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto; se si verificano forti sbalzi termici la lattuga può essere sensibile al prodotto.
__Melone__: viene impiegato contro la Pseudoperonospora cubensis; effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl avendo cura di distribuire, come minimo, 3 Kg di prodotto per ettaro.
__Cocomero, Cetriolo, Spinacio__: viene impiegato contro la Peronospora; effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire, come minimo, 3 Kg di prodotto per ettaro).
__Carciofo__: viene impiegato contro la Bremia lactucae a 200-300 g/hl.
__Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo__: viene impiegato contro Phytophtora spp; effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl, utilizzando 10 litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione possono venire integrati da pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche), pratica indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida.
__Vivai di fruttiferi__: contro Phytophtora effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl con cadenza mensile.
__Vivai di agrumi__: contro Phytophtora impiegare la dose di 400 g/hl ogni 60 giorni.
__Colture Ornamentali in pieno campo e in serra__: viene impiegato contro la Phytophtora cinnamomi di Chamaecyparis e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee, Poinsettia, St. Paulia e Crisantemo, effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con g 5-10 di formulato per mq una volta al mese in primavera.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con i prodotti a base di rame, di Dicofol e con concimi fogliari contenenti azoto. Si consiglia inoltre di non irrorare il prodotto su colture precedentemente trattate con i formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto. Nella miscelazione del prodotto con altri formulati si consigliano comunque saggi preliminari.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU CARCIOFO, CETRIOLO, COCOMERO, MELONE, LATTUGA, SPINACIO; 30 GIORNI SU FRAGOLA: 40 GIORNI SU MELO, PERO, PESCO, ACTINIDIA, VITE; 80 GIORNI SU ARANCIO, LIMONE, MANDARINO, POMPELMO.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DA NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto

FESIL 80 micro

Fungicida sistemico

Tipo di formulazione: microgranuli idrodispersibili

FESIL 80 MICRO Registrazione del Ministero della Salute n. 11751 del 22/10 /2003

Composizione
FOSETIL ALLUMINIO puro g. 80
Coformulanti q.b. a g. 100

CONTENUTO NETTO:
100 g

IRRITANTE

IQV ITALIA Srl
Via del Progresso, 2 - 00065 Fiano Romano (Roma)

Stabilimenti di produzione
IQV Industrias Quimetal del Valles s.a.
Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)
A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)

Partita n. ....

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo per l'ambiente acquatico, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

Etichetta/foglio illustrativo

SOFREVAL 80 MICRO

FUNGICIDA DI CONTATTO CONTRO OIDIO E TICCHIOLATURA
ZOLFO IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

SOFREVAL 80 MICRO Registrazione Ministero della Sanità n. 10141 del 15/09/1999

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
ZOLFO (purezza minima 99% - selenio assente) g. 80
Coformulanti q.b.a g. 100

Partita n. ....

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IQV ITALIA Srl
Via del Progresso, 2
00065 Fiano Romano (Roma)

Officine di produzione
QUIMETAL INDUSTRIAL S.A.
Santa Ester 748, San Miguel, Santiago (Cile)
IQV Industrias Quimetal del Valles s.a.
Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)
LIFA Srl
Via Piave - Z.I. Fossanigo - 36033 Isola Vicentina (VI)

CONTENUTO:
100 - 500 g -1 - 5 - 10 - 20 kg

NORME PRECAUZIONALI
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e ventilato.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il SOFREVAL 80 MICRO è un fungicida di contatto a base di zolfo ad attività preventiva e curativa nei confronti dell'oidio. SOFREVAL 80 MICRO si presenta in una formulazione in granuli idrodispersibili che si distingue per la migliore adesività e uniformità di copertura della vegetazione nonché per la sicurezza e praticità d'impiego.

CAMPI, DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO
SOFREVAL 80 MICRO si applica ad una dose di 200-300 g/hl con apparecchiature a medio-alto volume. Sciogliere la dose di prodotto in un volume di acqua ridotto quindi versare la sospensione nella botte e portare a volume mescolando con cura. Con alte temperature ambientali è consigliabile impiegare la dose più bassa. Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ed evitare i trattamenti subito dopo una pioggia. Irrorare la vegetazione in modo accurato per garantire una omogenea copertura; ripetere i trattamenti con un intervallo di 7-15 giorni dall'inizio della vegetazione in funzione della pressione del patogeno.
POMACEE (melo, pero, cotogno): Oidio e ticchiolatura 200-300 g/hl.
DRUPACEE (pesco, comprese nettarine e percoche, albicocco, susino, ciliegio): Oidio 200-300 g/hl
VITE: Oidio 200-300 g/hl.
FRUMENTO e ORZO: Oidio 4 - 6 kg/ha
TABACCO: Oidio 200-300 g/hl
ORTAGGI A FOGLIA (bietola, finocchio, sedano): Oidio 200g/hl
SOLANACEE (pomodoro, peperone, melanzana): Oidio 200 g/hl
PATATA: Oidio 200 g/hl
BARBABIRTOLA DA ZUCCHERO: Oidio 4 – 6 kg/ha
CUCURBITACEE (cetriolo, zucchino, zucca, cocomero, melone): Oidio 200 g/hl
FAGIOLO e PISELLO: Oidio 200 g/hl
FRAGOLA: Oidio 200 g/hl
FLOREALI E ORNAMENTALI: Oidio 200-300 g/hl.

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

COMPATIBILITÀ
Non miscelare con prodotti a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.) o con oli minerali, captano. SOFREVAL 80 MICRO deve essere impiegato con un intervallo di almeno 3 settimane dall'uso di oli minerali e captano.

FITOTOSSICITÀ
Può arrecare danno alle cultivar di:
MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.
PERE: Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.
VITE: Sangiovese
CUCURBITACEE: Può risultare fitotossico

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura alle dosi e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare il prodotto con temperature superiori a 32° C.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DA NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto

SOFREVAL 80 MICRO

FUNGICIDA DI CONTATTO CONTRO OIDIO E TICCHIOLATURA
ZOLFO IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

SOFREVAL 80 MICRO Registrazione Ministero della Sanità n. 10141 del 15/09/1999

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
ZOLFO (purezza minima 99% - selenio assente) g. 80
Coformulanti q.b.a g. 100

IQV ITALIA Srl
Via del Progresso, 2 00065 Fiano Romano (Roma)

Officine di produzione
QUIMETAL INDUSTRIAL S.A. - Santa Ester 748, San Miguel, Santiago (Cile)
IQV Industrias Quimetal del Valles s.a. - Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)
LIFA Srl - Via Piave - Z.I. Fossanigo - 36033 Isola Vicentina (VI)

IRRITANTE

CONTENUTO: **100 g** Partita n. ....

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e ventilato.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

VALLETILE 48 EC

Insetticida emulsionabile dotato di energica azione di contatto, per ingestione e per inalazione

VALLETILE 48 EC Registrazione Ministero della Salute n. 11914 del 17/02/2004

COMPOSIZIONE
CLORPIRIFOS puro g. 44,53 (=480 g/L)
Coformulanti* q.b. a g.100
**contiene nafta solvente (petrolio) aromatica pesante*

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

IQV Italia Srl
Via del Progresso, 2
00065 Fiano Romano (Roma)

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)

CONTENUTO:
ml 250-500 litri 1-5-10-20

Partita n

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolare. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURE ARBOREE: VALLETILE 48 EC si impiega alla comparsa dei parassiti sulle colture e alle dosi di seguito riportate, che valgono per trattamenti a volume normale. Nei trattamenti a volume ridotto, per poter distribuire su ogni ettaro la stessa quantità di principio attivo, le dosi d'impiego del formulato devono essere proporzionalmente aumentate.
AGRUMI: contro cocciniglie, dialeurodidi (Dialeurodes citri), aleurodidi (Aleurotrixus floccosus) alla dose di 110 ml/hl d'acqua; contro formiche (Formica argentina) alla dose di 220 ml/hl d'acqua, irrorando il terreno con 10 hl/ha.
MELO e PERO: contro cocciniglie, carpocapsa, tortricidi ricamatori, Sesia, alla dose di 85-110 ml/hl.
VITE: contro tignole alla dose di 85-110 ml/hl. Trattare alla comparsa delle prime larve. Contro cicaline alla dose di 110 ml/hl. Trattare alla comparsa del parassita.
PESCO: contro cocciniglie, tignola orientale (Cydia), Anarsia, mosca della frutta, alla dose di 85-110 ml/hl.
PIOPPO: contro Criptorrinco alla dose di 220 ml/hl.
COLTURE ERBACEE: VALLETILE 48 EC si impiega di norma alla comparsa dei parassiti. Salvo quanto diversamente indicato la quantità di acqua da distribuire è di 600-800 litri/ettaro.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro altica e atomaria alla dose di 850-1100 ml/ha.
SOIA: contro cimici (Nezara viridula), lepidotteri fogliari (Vanessa cardui, Choristoneura lafauryana) alla dose di 1,2 l/ha in 800-1000 litri di acqua/ha. Ripetere il trattamento se necessario.
MAIS: contro Piralide, Sesamia e Diabrotica virgifera; il primo trattamento alla dose di 1-1,2 l/ha, contro la prima generazione, quando la coltura si trova tra 60 e 100 cm di altezza; il secondo trattamento, alla dose di 1,2-1,7 l/ha, contro contro la seconda generazione a fine luglio-agosto.
PATATA: contro Dorifora alla dose di 1,2-1,6 l/ha. Ripetere il trattamento se necessario.
POMODORO: contro Dorifora, Piralide e altri lepidotteri alla dose di 850-1100 ml/ha.
FAGIOLO e PISELLO: contro Piralidi e altri lepidotteri alla dose di 850-1100 ml/ha.
TERRENO DESTINATO ALLA COLTURA DEL CAVOLO CAPPUCCIO: contro Cavolaia, nottue e altri lepidotteri alla dose di 850-1100 ml/ha.
CAROTA: contro Tortricidi e altri lepidotteri alla dose di 850-1100 ml/ha.
CIPOLLA: contro Tripidi alla dose di 850-1100 ml/ha.

COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI (in pieno campo e in serra): previo saggio preliminare per accertare la selettività del prodotto sulle varietà e nelle diverse condizioni ambientali (specialmente in serra) contro aleurodidi, tripidi, tortricidi, nottue, cocciniglie e oziorrinchi alle dosi di 100 ml/hl.
LOTTA CONTRO LE NOTTUE: per irrorazione o con esche preparate allo scopo nella lotta contro le nottue che infestano le colture di **mais, barbabietola da zucchero, tabacco, soia, girasole, fagiolo, pisello, patata, asparago, carota, pomodoro, peperone, melanzana e colture ornamentali e floreali.**

- Trattamenti per irrorazione: 850-1100 ml di prodotto per ettaro, distribuito con 800-1000 litri d'acqua.
- Distribuzione di esche: 25 ml di prodotto per kg di esca preparata utilizzando una base di crusca e melasso miscelati. Distribuire 50 kg di esca per ettaro. Trattare o distribuire le esche durante le ore serali o comunque durante le ore più fresche della giornata.

COMPATIBILITÀ

Non miscelare con polisolfuri di calcio.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non effettuare trattamenti sugli agrumi nei mesi compresi tra gennaio e aprile.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, il bestiame, gli animali domestici.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 120 giorni prima della raccolta per soia e girasole; 60 giorni per agrumi, barbabietola da zucchero e tabacco, 30 giorni per melo, pero, vite, pesco, mais e patata, 21 giorni per pomodoro, peperone, carota e cipolla; 15 giorni per le altre colture.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DA NON IMPIEGARE IN SERRA
DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

ALINTRA S.a.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

BORDAGRO

(FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE)
Poltiglia bordolese essiccata

BORDAGRO Registrazione del Ministero della Sanità n. 10286 del 26/01/2000

Composizione
RAME METALLO g. 25
(sotto forma di Solfato di rame neutralizzato con calce Idrossido) g. 100
Coformulanti q.b.a

Contenuto netto:
g. 5-10-20-50-100-250-500 e kg. 1-5-10-20

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

ALINTRA S.A.
Parets del Valles (Spagna)
Distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 - Roma
Stabilimento di produzione:
ALINTRA S.A.
Vilassar de Dalt (Spagna)
Partita n.

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa.Non respirare le polveri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ DI IMPIEGO
La diluizione della poltiglia in acqua è facile in tutte le circostanze. Basta versare la polvere nel totale quantitativo di acqua ed agitare. Il BORDAGRO viene distribuito mediante irroratrice a volume normale impiegando 1000 litri di acqua per ettaro. In caso di impiego di irroratrici a basso volume le dosi prescritte andranno maggiorate in base alle caratteristiche delle macchine.

DOSI DI IMPIEGO
Il BORDAGRO consiste in una preparazione industriale di Poltiglia Bordolese essiccata assolutamente neutra. Viene impiegato alle seguenti dosi in 100 litri di acqua:
VITE: contro Peronospora kg 0,5 fino a kg 1 in caso di forte infezione (in trattamenti primaverili-estivi quando gli acini sono ben formati).
POMACEE (trattamento al bruno): contro Cancri rameali, Marciume bruno o Muffa a circoli del melo, Ticchiolatura del melo e del pero: kg 1.
DRUPACEE (trattamenti al bruno): contro Bolla del pesco, Gommosi, Corineo e Cancri rameali kg 0,8-1.
OLIVO: contro Occhio di Pavone, Lebbra e Fumaggine kg 0,7-1 (nella ripresa vegetativa e verso l'invaiatura).
AGRUMI: contro Mal secco, Gommosi o Allupatura, Fumaggine, Batteriosi kg 0,7-1. Il prodotto può essere applicato, oltre che per irrorazione come descritto in precedenza, anche per spennellature al tronco e alle grosse branche alla dose di kg 3/hl.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Peronospora, Cercospora e Ruggine kg 6/ha.
PATATA e POMODORO: contro Alternariosi, Peronospora, Septoriosi, Cladosporiosi e Batteiosi kg 0,5-1.
FRAGOLA: contro Vaiolatura rossa (vegetazione autunnale) kg 0,5-1.
SEDANO, CAROTA, PREZZEMOLO: contro Septoriosi kg 0,5-1.
CUCURBITACEE (COCOMERO, MELONE, ZUCCA, ZUCCHINO, CETRIOLO): contro Peronospora e Antracnosi kg 0,5-1.
CARCIOFO, CARDO, CAVOLI (CAVOLFIORE, CAVOLO BROCCOLO, CAVOLO VERZA, CAVOLO BIANCO, CAVOLO ROSSO, CAVOLO CAPPUCCIO, CAVOLO CINESE, CAVOLO DI BRUXELLES, CAVOLO RAPA, CAVOLO NERO), CICORIA, CIPOLLA, MELANZANA e SPINACIO: contro Peronospora kg 0,5-1.
FAGIOLO e PISELLO: contro Antracnosi kg 0,5-1.
RISO: per la lotta contro le Alghe intervenire al formarsi delle prime colonie alla dose di kg 4-5/ha.
ROSA e COLTURE FLOREALI/ORNAMENTALI: contro Ruggine, Septoria, Ticchiolatura, Peronospora e Corineo kg 0,5-0,6 Kg.
NB: Laddove non specificato intervenire al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia e proseguire i trattamenti secondo i tradizionali calendari di zona.

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine e susino e varietà di melo (Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero (quali Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 05/2003

Etichetta formato ridotto

BORDAGRO

(FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE)
Poltiglia bordolese essiccata

BORDAGRO Registrazione del Ministero della Sanità n. 10286 del 26/01/2000

Composizione
RAME METALLO g. 25
(sotto forma di Solfato di rame neutralizzato con calce Idrossido)
Coformulanti q.b.a g. 100

ALINTRA S.A.
Parets del Valles (Spagna)

Distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 - Roma

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Stabilimento di produzione:
ALINTRA S.A.
Vilassar de Dalt (Spagna)

Partita n. Contenuto netto: **g. 5-10-20-50-100**

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa.Non respirare le polveri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003 Sett. 05

IQV - INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.a.

AGROFEN

Insetticida liquido emulsionabile

AGROFEN Registrazione del Ministero della Sanità n. 7249 del 26/11/1987

COMPOSIZIONE
FENITROTION puro g. 45 (=473,4 g/l)
Coformulanti* q.b.a g. 100
**contiene nafta solvente (petrolio) aromatica pesante*

Partita n

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'am biente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

Stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (Bergamo)

CONTENUTO: L 0,5-1-5-10-20

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

AGROFEN agisce per contatto ed ingestione, dotato di buona azione ovicida, ha un notevole potere penetrante nei tessuti (azione citotropica). Viene inoltre impiegato per la disinfestazione di magazzini destinati alla conservazione dei prodotti agrari.
AGROFEN si impiega alle seguenti dosi:
AGRUMI: contro Tripidi, Cocciniglie, Aleurodidi, Tignola, Mosca 150-200 ml/hl.
DRUPACEE (Albicocco, Ciliegio, Pesco, Susino): contro Cocciniglie, Afidi verdi, Tripide, Mosca, Cidia 150-200 ml/hl.
POMACEE (Melo e Pero): contro Afidi, Aleurodidi, Carpocapsa, Cocciniglie, Psilla, Tripidi, Antonomo 130-150 ml/hl.
VITE: contro Tignole, Cicaline, Cocciniglie, Tripide, Sigaraio 130-150 ml/hl.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cleono, Altica, Afidi 200-250 ml/hl.
OLIVO: contro Mosca, Tignola, Cocciniglia 150 ml/hl.
NOCCIOLO, NOCE, CASTAGNO: contro Cocciniglie, Cimici, Tortrice della castagna, Balanino 150-180 ml/hl.
FRAGOLA: contro Afidi, Oziorrinchi 150 ml/hl.
PATATA: contro Afidi, Tignola, Dorifora, Tripide 120-160 ml/hl.
ORTAGGI A RADICE E TUBERO, ORTAGGI A BULBO, ORTAGGI A FRUTTO, CAVOLI, ORTAGGI A FOGLIA e ERBE FRESCHE, LEGUMI FRESCHI, ORTAGGI A STELO: contro Afidi, Tripidi, Nottue fogliari, Pieridi, Altiche, Tentredine, Depressaria 120-160 ml/hl.
CEREALI: contro Afidi e Zabro gobbo 1,5 l/ha.
ERBA MEDICA: contro Afidi, Apion, Fitonomo 1,2 l/ha.
TABACCO: contro Afidi, Tripidi 1,2-1,5 l/ha.
PIOPPO: contro Afide lanigero 200 ml/hl.
PIANTE FLOREALI e ORNAMENTALI in pieno campo e in serra: contro Afidi, Cocciniglie, Mosca, Tentredini, Bega 100 ml/hl.
PIANTE FORESTALI e VIVAI: contro Afidi, Cocciniglie, Cicaline, Tingide, Galerucella 150-180 ml/hl.

Tali dosi si intendono per i trattamenti ad alto volume. Quando si effettuano trattamenti con pompe a volume ridotto, le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate, in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Per aumentare l'efficacia del trattamento, aggiungere alla miscela un adesivo bagnante.

COMPATIBILITÀ

AGROFEN non è miscelabile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli animali domestici, il bestiame, la selvaggina e gli insetti utili. È necessario pertanto far trascorrere 20 giorni dal trattamento prima di far pascolare il bestiame sulle zone trattate e alimentarlo con vegetali che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto con il prodotto.
SOSPENDERE I TRATTAMENTO 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

AGROFOL L

Fungicida organico per trattamenti in viticoltura in sospensione acquosa

AGROFOL L Registrazione del Ministero della Sanità n. 8844 del 16/05/1996

COMPOSIZIONE
FOLPET puro g. 40,5 (=490 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

CONTENUTO: **L 1-5-20**

Partita n

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 - Roma
Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
Stabilimento di confezionamento:
DIACHEM SpA
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (Bergamo)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

L'AGROFOL L è un fungicida organico indicato per i trattamenti contro Peronospora e Muffa grigia (Botrytis cinerea) della vite con inizio da fine fioritura, particolarmente indicato per una azione di penetrazione all'interno del grappolo dove più difficile è la difesa dalle crittogame.

DOSI DI IMPIEGO

Su **Vite**, contro Peronospora e Muffa grigia: ml 200-250 per ettolitro di acqua

COMPATIBILITÀ

L'AGROFOL L non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con oli minerali e prodotti a base di zolfo.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LE UVE DA TAVOLA; PER LE UVE DA VINO SOSPENDERE I TRATTAMENTI 40 GIORNI PRIMA DELLA VENDEMMIA PER NON OSTACOLARE LA FERMENTAZIONE DEI MOSTI.

AVVERTENZA: Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Per lavorazioni agricole da effettuare entro 10 giorni, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

AGROPTAN

Polvere bagnabile anticrittogamica

AGROPTAN Registrazione del Ministero della Sanità n. 0152 del 02/12/1971

COMPOSIZIONE
CAPTANO puro g. 45
Coformulanti q.b.a g. 100

CONTENUTO: Kg. 1-5-20

Partita n

TOSSICO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

Stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
TORRE Srl
Torrenieri, fraz. di Montalcino (Siena)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA
Cotignola (Ravenna)
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA
Caravaggio (Bergamo)

FRASI DI RISCHIO: Tossico per inalazione. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ DI IMPIEGO

g. 200-300 in 100 litri di acqua su **MELO** e **PERO** contro Ticchiolatura, Marciume lenticellare delle mele.
g. 300 per 100 Kg di semente per la concia delle sementi di **mais, sorgo, ortive**.
Avvertenza: I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili, devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

COMPATIBILITÀ

L'AGROPTAN non è miscibile con prodotti alcalini (Poltiglia bordolese, Polisolfuri, ecc.), con oli e con zolfi. La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di oli e zolfi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious, Winesap, Stayman, Renetta del Canada) e di pero (Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

Etichetta/foglio illustrativo

BLIN FRE

(POLVERE BAGNABILE)

Fungicida sistemico e di contatto con azione preventiva, curativa e bloccante

BLIN FRE Registrazione del Ministero della Salute n. 11259 del 04/04/2002

Composizione

PENCONAZOLO puro g. 1,5
ZOLFO puro (esente da Selenio) g. 40
Coformulanti q.b a g. 100

Partita n.

Contenuto netto: 100-250-500 g 1-5-10-15-20 Kg

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV ITALIA Srl - Fiano Romano (Roma)

Stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
TORRE Srl
Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Cotignola (RA)
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
ZOLFINDUSTRIA Srl - S. Cipriano Po (PV)

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Penconazolo 1,5% e Zolfo 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
PENCONAZOLO: Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione fecale avviene in 72 ore.
ZOLFO: ---
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Fungicida sistemico e di contatto che può essere utilizzato come preventivo, curativo e come bloccante; agisce all'interno della pianta e l'assorbimento del prodotto avviene velocemente (poche ore).

VITE
Oidio (Uncinula necator)
Trattamenti preventivi: 150-200 g/hl in pre e post-fioritura intervenendo ogni 14-15 giorni e 100-150 g/hl in pre e post-fioritura effettuando il trattamento ogni 7-10 giorni. Possiede azione collaterale contro l'erinosi.

MELO
Ticchiolatura (Venturia inaequalis)
Trattamenti preventivi: 200-250 g/hl ogni 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce, poi ogni 10-15 giorni.
Trattamenti curativi: 250-300 g/hl; si può intervenire entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): 250-300 g/hl facendo 2 applicazioni ogni 5-7 giorni e poi continuando con le dosi normali.
Oidio (Podosphaera leucotricha)
Trattamenti preventivi: in primavera 220-250 g/hl ogni 10 giorni; nei trattamenti estivi ogni 10-14 giorni con dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia.
Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): 200-230 g/hl ogni settimana, con un totale di 3-4, che consentono il controllo delle infezioni in atto.
Malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp.): fare in totale 2-3 trattamenti a cadenza settimanale in pre-raccolta alla dose di 250-300 g/hl;

PESCO (comprese le NETTARINE ed IBRIDI SIMILI)
Oidio
Trattamenti preventivi: in zone dove il rischio di infezione è alto e con cultivar particolarmente sensibili trattare a 250-340 g/hl dalla caduta petali ed ogni 10-14 giorni. In zone a minor rischio intervenire ogni 14-21 giorni.
Malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp.): fare 2-3 interventi a cadenza settimanale in pre-raccolta alla dose di 340 g/hl.

TABACCO
Oidio: 240-340 g/hl facendo da 2 a 4 trattamenti in modo preventivo, iniziando dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.

MELONE, ZUCCHINO, ZUCCA, CETRIOLO, CARCIOFO, POMODORO in pieno campo, PEPERONE in pieno campo, PISELLO
Oidio: in pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione fare da 2 a 4 trattamenti ogni 14-16 giorni a 170-340 g/hl a seconda della coltura e del rischio di infezione. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.

COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE
Oidio e Ruggini: 170-340 g/hl ogni 10-14 giorni a seconda della coltura e della incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con la generalità degli antiparassitari ad eccezione di quelli alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), oli minerali, captano, diclorvos.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può risultare fitotossico sulle seguenti varietà di:
MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap;
PERE: Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser, Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio;
VITE: Sangiovese;
CUCURBITACEE: può essere fitotossico.
Irrorare a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del captano.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

DL 65/2003 Sett. 05

Etichetta formato ridotto

BLIN FRE

(POLVERE BAGNABILE)

Fungicida sistemico e di contatto con azione preventiva, curativa e bloccante

BLIN FRE Registrazione del Ministero della Salute n. 11259 del 04/04/2002

Composizione

PENCONAZOLO puro	**g.**	**1,5**
ZOLFO puro (esente da Selenio)	**g.**	**40**
Coformulanti q.b a	**g.**	**100**

Partita n.

Contenuto netto:
100 g

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)

distribuito da:
IQV ITALIA Srl - Fiano Romano (Roma)

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
TORRE Srl
Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Cotignola (RA)
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA
Caravaggio (BG)
ZOLFINDUSTRIA Srl - S. Cipriano Po (PV)

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Penconazolo 1,5% e Zolfo 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
PENCONAZOLO: Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione fecale avviene in 72 ore.
ZOLFO: ---
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003 Sett. 05

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

BLIN PEN

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante per la lotta contro la Ticchiolatura e l'Oidio del melo, la Ticchiolatura del pero e l'Oidio del pesco, della vite, del tabacco e di alcune colture ortive ed ornamentali

Registrazione del Ministero della Salute n. 11262 del 04/04/2002

Composizione
PENCONAZOLO puro g. 10,20 (=100 g/l)
Coformulanti q.b a g. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)

Stabilimenti di produzione
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a. - Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
ALTHALLER ITALIA Srl – S. Colombano al Lambro (Milano)
TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

distribuito da: IQV ITALIA Srl – Fiano Romano (Roma)

Partita n.

Contenuto netto: 25-50-100-250-500 ml 1 - 5 Litri

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il BLIN PEN è un fungicida sistemico ad ampio spettro d'azione ad attività di tipo preventivo, curativo e bloccante con alcune differenze nell'importanza relativa ai suddetti meccanismi d'azione in riferimento ai diversi patogeni e alle condizioni ambientali.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
VITE: contro Oidio (Uncinula necator)
Trattamenti preventivi: 25-30 ml/hl in pre e post-fioritura intervenendo ogni 14-16 giorni; 15-20 ml/hl in pre e post-fioritura effettuando i trattamenti alla cadenza di 7-10 giorni. Con attacchi di Oidio in atto (primi sintomi) effettuare 2 trattamenti ad intervallo di 5-7 giorni con BLIN PEN alla dose di 50 ml/hl, quindi continuare con trattamenti di tipo preventivo. Il prodotto esplica un'attività collaterale su Guignardia spp. e in minor misura su Pseudopeziza spp.
MELO: contro Ticchiolatura (Venturia inaequalis)
Trattamenti preventivi: 30-40 ml/hl alla cadenza di 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce; successivamente si tratta ogni 10-15 giorni. In entrambe le epoche utilizzare gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli alla malattia. I normali trattamenti antiticchiolatura con BLIN PEN sono sufficienti per controllare efficacemente anche l'Oidio.
Trattamenti curativi: 40-45 ml/hl intervenendo entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): 40-45 ml/hl effettuando 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali. Si raccomanda l'impiego di BLIN PEN in miscela con un prodotto di copertura.
Contro Oidio (Podosphaera leucotricha)
Trattamenti preventivi: interventi primaverili alla dose di 30-40 ml/hl alla cadenza di 10 giorni. Nei trattamenti estivi trattare alla cadenza di 10-14 giorni. Impiegare le dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia.
Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): trattamenti alla dose di 30-35 ml/hl a cadenza settimanale in numero di 3-4 permettono il controllo delle infezioni in atto e la protezione della nuova vegetazione.
Contro malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp.) effettuare 2-3 trattamenti a cadenza settimanale in pre-raccolta alla dose di 40-45 ml/hl.
PERO: contro Ticchiolatura (Venturia pirina)
Trattamenti preventivi: 25-35 ml/hl alla cadenza di 10-12 giorni per tutta la stagione. Usare la dose maggiore e gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo della malattia.
Trattamenti curativi: 30-40 ml/hl intervenendo entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): 30-40 ml/hl effettuando 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali. Si raccomanda l'impiego di BLIN PEN in miscela con un prodotto di copertura.
PESCO: contro Oidio
Trattamenti preventivi: in zone ad alta pressione di infezione e in presenza di varietà particolarmente sensibili effettuare i trattamenti alla dose di 40-50 ml/hl dalla caduta petali ad intervalli di 10-14 giorni. In zone a bassa pressione di infezione trattare ogni 14-21 giorni. Qualora sia necessario intervenire in presenza dei primi sintomi utilizzare il dosaggio più elevato.
Contro Monilia, Bolla, Corineo il BLIN PEN esplica un'attività collaterale che può essere sufficiente in zone dove sono stati effettuati i normali trattamenti invernali.
Contro malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp.) effettuare 2-3 trattamenti a cadenza settimanale in pre-raccolta alla dose di 50 ml/hl.
TABACCO: contro Oidio 35-50 ml/hl effettuando 2-4 trattamenti preventivi a partire dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.
COLTURE ORTICOLE (MELONE, ZUCCHINO, ZUCCA, CETRIOLO, CARCIOFO, POMODORO in pieno campo, PEPERONE in pieno campo, PISELLO): contro Oidio in pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione effettuare 2-4 trattamenti ad intervalli di 14-16 giorni alla dose di 25-50 ml/hl a seconda della coltura e della pressione di infezione. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.
COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE: contro Oidio e Ruggini utilizzare 25-50 ml/hl ad intervalli di 10-14 giorni a seconda della coltura e dell'incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.
N.B. Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale. Il prodotto va diluito in una quantità di acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione evitando lo sgocciolamento.

COMPATIBILITÀ - Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

DL 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

BLIN PEN

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante per la lotta contro la Ticchiolatura e l'Oidio del melo, la Ticchiolatura del pero e l'Oidio del pesco, della vite, del tabacco e di alcune colture ortive ed ornamentali

Registrazione del Ministero della Salute n. 11262 del 04/04/2002

Composizione
PENCONAZOLO puro g. 10,20 (=100 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

Stabilimenti di produzione
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
ALTHALLER ITALIA Srl – S. Colombano al Lambro (Milano)
TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

distribuito da:
IQV ITALIA Srl – Fiano Romano (Roma)

Partita n.

Contenuto netto: 25-50-100 ml

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

BORDO 13

(POLVERE BAGNABILE)

Poltiglia bordolese

BORDO 13 Registrazione del Ministero della Salute n. 11573 del 03/02/2003

Composizione
RAME METALLO g. 13
(sotto forma di solfato di rame neutralizzato con calce idrata)
Coformulanti q.b.a g. 100

Partita n.
Contenuto netto:
g 100-200-250-300-500 e kg 1-5

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV Italia Srl - Fiano Romano (Roma)
Stabilimenti di produzione
(formulazione e confezionamento o sola formulazione):
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
STI Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (RA)
TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)
Stabilimenti di confezionamento:
LIFA Srl - Isola Vicentina (VI)
LIFA Srl - Vigonovo (VE)

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
BORDO 13 è un formulato in polvere bagnabile pronto all'uso, pertanto si impiega direttamente sospendendolo in acqua senza l'aggiunta di calce. Il suo contenuto in rame metallico conferisce al prodotto un'azione fungicida contro le seguenti malattie crittogamiche sensibili al rame come sotto specificato.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
VITE: contro Peronospora 1-2 Kg/hl d'acqua (100-200 g/10 litri); applicare secondo i calendari di lotta specialmente nel periodo di "chiusura".
POMACEE: contro la Ticchiolatura e Cancri da 2 a 3 Kg/hl d'acqua (200-300 g/10 litri) nei trattamenti "eradicanti" alla caduta delle foglie.
DRUPACEE: contro Bolla, Corineo, Sclerotinia, Marciume bruno del mandorlo da 2 a 3,5 Kg/hl di acqua (200-350 g/10 litri) nei trattamenti autunnali e invernali "al bruno".
OLIVO: contro Occhio di Pavone, Lebbra, Fumaggine 2-3 Kg/hl (200-300 g/10 litri) d'acqua nei trattamenti primaverili e autunnali.
AGRUMI: contro Allupatura, Gommosi, Batteriosi, Fumaggine, Mal secco 1,5-3,5 Kg/hl d'acqua (150-350 g/10 litri).
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cercosporiosi 10-15 Kg per ettaro con 5-8 hl di acqua.
PATATA, POMODORO, ORTAGGI, CEREALI, OLEAGINOSE, TABACCO, FORESTALI, COLTURE ORNAMENTALI in pieno campo: contro Alternariosi, Septoriosi, Antracnosi 1-2 Kg/hl d'acqua (100-200 g/10 litri).

Sospendere in poca acqua la dose di prodotto, mescolare sino ad ottenere una poltiglia fluida, aggiungere altra acqua e versare nel totale quantitativo d'acqua richiesto.

COMPATIBILITÀ
BORDO 13 è miscibile con i principali antiparassitari, con gli zolfi bagnabile e colloidale, con i fertilizzanti fogliari. Sono sconsigliabili le miscele con i prodotti a base di Maneb.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego.
(*) Meli cuprosensibili: Abbondanza (Belfort), Black Stayman, Black Ben Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana
(**) Peri cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto

BORDO 13

(POLVERE BAGNABILE)
Poltiglia bordolese

BORDO 13 Registrazione del Ministero della Salute n. 11573 del 03/02/2003

Composizione
RAME METALLO g. 13
(sotto forma di solfato di rame neutralizzato con calce idrata)
Coformulanti q.b.a g. 100

Partita n.

Contenuto netto: **g 100**

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV Italia Srl
Fiano Romano (Roma)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimenti di produzione
(formulazione e confezionamento o sola formulazione):
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
STI Solfotecnica Italiana SpA – Cotignola (RA)
TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
A.D.I.C.A. Srl – Nera Montoro (TR)
Stabilimenti di confezionamento:
LIFA Srl – Isola Vicentina (VI)
LIFA Srl – Vigonovo (VE)

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003 sett. 05

BORDO 20

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

BORDO 20 Registrazione del Ministero della Salute n. 11290 del 12/04/02

Composizione
RAME metallico g. 20,2
(sotto forma di Solfato di rame)
Coformulanti q.b.a g. 100

Partita n.

Contenuto netto: kg. 1-5-10-20-25

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV Italia Srl – Fiano Romano (Roma)
Stabilimenti di produzione
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM S.p.A. – U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)
TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

BORDO 20 è essiccata e preparata con procedimento industriale e formulata in polvere bagnabile pronta per l'uso. BORDO 20 pertanto si impiega sospendendola direttamente in acqua senza l'aggiunta di calce. Il contenuto in rame metallo attivo conferisce al prodotto un'azione fungicida, contro le seguenti malattie crittogamiche sensibili al rame come sotto specificato.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE: contro Peronospora 700-1200 g/hl d'acqua; applicare secondo i tradizionali calendari di lotta, specialmente nel periodo di "chiusura".

POMACEE: contro Ticchiolatura e cancri g 1000-1500/hl d'acqua nei trattamenti "eradicanti" alla caduta delle foglie.

DRUPACEE: contro Bolla, Corineo, Sclerotinia, Marciume bruno del mandorlo g 1200-2000/hl d'acqua nei trattamenti autunnali e invernali "al bruno".

OLIVO: contro Occhio di Pavone, Lebbra, Fumaggine g 1000-1500/hl d'acqua nei trattamenti primaverili e autunnali.

AGRUMI: contro Allupatura, Gommosi, Batteriosi, Fumaggine, Mal secco g 800-1500-3000/hl d'acqua.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cercosporiosi Kg 7,5-10 ad ettaro con 5-8/hl d'acqua.

PATATA, POMODORO E COLTURE ORNAMENTALI in pieno campo: contro Alternariosi, Septoriosi, Antracnosi, Peronospora g 700-1200/hl d'acqua.

Sospendere in poca acqua la dose di prodotto, mescolare sino ad ottenere una poltiglia fluida, aggiungere altra acqua e versare nel totale quantitativo d'acqua richiesto.

COMPATIBILITÀ

BORDO 20 è miscibile con i principali prodotti fitosanitari ed in particolare con lo Zolfo bagnabile e colloidale, con i fertilizzanti fogliari. Sono sconsigliabili le miscele con i prodotti a base di Maneb.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego.

(*) Meli cuprosensibili: Abbondanza (Belfort), Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana

(**) Peri cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 05/2003

BORDO 25

(FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE)

Poltiglia bordolese essiccata **Etichetta/foglio illustrativo**

BORDO 25 Registrazione del Ministero della Salute n. 5588 del 15/11/1983

Composizione

RAME METALLO g. 25

(sotto forma di Solfato di rame neutralizzato con calce idrossido) g. 100

Coformulanti q.b.a

distribuito da:

IQV Italia Srl – Fiano Romano (Roma)

Contenuto netto:

g. 5-10-20-50-100-250-500 e kg. 1-5-10-20

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.

Av. Rafael Casanova, 81

08100 Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)

Partita n.

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimenti di produzione

(formulazione e confezionamento o sola formulazione)

DIACHEM S.p.A. - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (Bergamo)

STI-SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (Ravenna)

TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (Siena)

MANICA S.p.A. - Rovereto (TN)

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.

Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)

Stabilimento di confezionamento:

ZAPI SpA – Conselve (PD)

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Non respirare le polveri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ DI IMPIEGO

La diluizione della poltiglia in acqua è facile in tutte le circostanze. Basta versare la polvere nel totale quantitativo di acqua ed agitare. Il BORDO 25 viene distribuito mediante irroratrice a volume normale impiegando 1000 litri di acqua per ettaro. In caso di impiego di irroratrici a basso volume le dosi prescritte andranno maggiorate in base alle caratteristiche delle macchine.

DOSI DI IMPIEGO

Il BORDO 25 consiste in una preparazione industriale di Poltiglia Bordolese essiccata assolutamente neutra. Viene impiegato alle seguenti dosi in 100 litri di acqua:

VITE: contro Peronospora kg 0,5 fino a kg 1 in caso di forte infezione (in trattamenti primaverili-estivi quando gli acini sono ben formati).

POMACEE (trattamento al bruno): contro Cancri rameali, Marciume bruno o Muffa a circoli del melo, Ticchiolatura del melo e del pero: kg 1.

DRUPACEE (trattamenti al bruno): contro Bolla del pesco, Gommosi, Corineo e Cancri rameali kg 0,8-1.

OLIVO: contro Occhio di Pavone, Lebbra e Fumaggine kg 0,7-1 (nella ripresa vegetativa e verso l'invaiatura).

AGRUMI: contro Mal secco, Gommosi o Allupatura, Fumaggine, Batteriosi kg 0,7-1. Il prodotto può essere applicato, oltre che per irrorazione come descritto in precedenza, anche per spennellature al tronco e alle grosse branche alla dose di kg 3/hl.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Peronospora, Cercospora e Ruggine kg 6/ha.

PATATA e POMODORO: contro Alternariosi, Peronospora, Septoriosi, Cladosporiosi e Batteiosi kg 0,5-1.

FRAGOLA: contro Vaiolatura rossa (vegetazione autunnale) kg 0,5-1.

SEDANO, CAROTA, PREZZEMOLO: contro Septoriosi kg 0,5-1.

CUCURBITACEE (COCOMERO, MELONE, ZUCCA, ZUCCHINO, CETRIOLO): contro Peronospora e Antracnosi kg 0,5-1.

CARCIOFO, CARDO, CAVOLI (CAVOLFIORE, CAVOLO BROCCOLO, CAVOLO VERZA, CAVOLO BIANCO, CAVOLO ROSSO, CAVOLO CAPPUCCIO, CAVOLO CINESE, CAVOLO DI BRUXELLES, CAVOLO RAPA, CAVOLO NERO), CICORIA, CIPOLLA, MELANZANA e SPINACIO: contro Peronospora kg 0,5-1.

FAGIOLO e PISELLO: contro Antracnosi kg 0,5-1.

RISO: per la lotta contro le Alghe intervenire al formarsi delle prime colonie alla dose di kg 4-5/ha.

ROSA e COLTURE FLOREALI/ORNAMENTALI: contro Ruggine, Septoria, Ticchiolatura, Peronospora e Corineo kg 0,5-0,6 Kg.

NB: Laddove non specificato intervenire al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia e proseguire i trattamenti secondo i tradizionali calendari di zona.

COMPATIBILITÀ

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine e susino e varietà di melo (Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero (quali Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

Etichetta confezioni in sacchetti idrosolubili/foglio illustrativo

BORDO 25

(FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Poltiglia bordolese essiccata

BORDO 25 Registrazione del Ministero della Salute n. 5588 del 15/11/1983

Composizione
RAME METALLO g. 25
(sotto forma di Solfato di rame neutralizzato con calce Idrossido) g. 100
Coformulanti q.b.a

distribuito da:
IQV Italia Srl – Fiano Romano (Roma)

Partita n.

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

Contenuto:
10 g (1 s.i. x 10 g) - 20 g (1 s.i. x 20 g)
50 g (1 s.i. x 50 g) - 100 g (1 s.i. x 100 g)
100 g (2 s.i. x 50 g) - 250 g (1 s.i. x 250 g)
500 g (5 s.i. x 100 g) - 1 Kg (1 s.i. x 1 Kg)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimenti di produzione
DIACHEM S.p.A.
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (Bergamo)
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.
Cotignola (Ravenna)
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ DI IMPIEGO

La diluizione della poltiglia in acqua è facile in tutte le circostanze. Basta versare la polvere nel totale quantitativo di acqua ed agitare. Il BORDO 25 viene distribuito mediante irroratrice a volume normale impiegando 1000 litri di acqua per ettaro. In caso di impiego di irroratrici a basso volume le dosi prescritte andranno maggiorate in base alle caratteristiche delle macchine.

DOSI DI IMPIEGO

Il BORDO 25 consiste in una preparazione industriale di Poltiglia Bordolese essiccata assolutamente neutra. Viene impiegato alle seguenti dosi in 100 litri di acqua:
VITE: contro Peronospora kg 0,5 fino a kg 1 in caso di forte infezione (in trattamenti primaverili-estivi quando gli acini sono ben formati).
POMACEE (trattamento al bruno): contro Cancri rameali, Marciume bruno o Muffa a circoli del melo, Ticchiolatura del melo e del pero: kg **1**.
DRUPACEE (trattamenti al bruno): contro Bolla del pesco, Gommosi, Corineo e Cancri rameali kg 0,8-1.
OLIVO: contro Occhio di Pavone, Lebbra e Fumaggine kg 0,7-1 (nella ripresa vegetativa e verso l'invaiatura).
AGRUMI: contro Mal secco, Gommosi o Allupatura, Fumaggine, Batteriosi kg 0,7-1. Il prodotto può essere applicato, oltre che per irrorazione come descritto in precedenza, anche per spennellature al tronco e alle grosse branche alla dose di kg 3/hl.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Peronospora, Cercospora e Ruggine kg 6/ha.
PATATA e POMODORO: contro Alternariosi, Peronospora, Septoriosi, Cladosporiosi e Batteiosi kg 0,5-1.
FRAGOLA: contro Vaiolatura rossa (vegetazione autunnale) kg 0,5-1.
SEDANO, CAROTA, PREZZEMOLO: contro Septoriosi kg 0,5-1.
CUCURBITACEE (COCOMERO, MELONE, ZUCCA, ZUCCHINO, CETRIOLO): contro Peronospora e Antracnosi kg 0,5-1.
CARCIOFO, CARDO, CAVOLI (CAVOLFIORE, CAVOLO BROCCOLO, CAVOLO VERZA, CAVOLO BIANCO, CAVOLO ROSSO, CAVOLO CAPPUCCIO, CAVOLO CINESE, CAVOLO DI BRUXELLES, CAVOLO RAPA, CAVOLO NERO), CICORIA, CIPOLLA, MELANZANA e SPINACIO: contro Peronospora kg 0,5-1.
FAGIOLO e PISELLO: contro Antracnosi kg 0,5-1.
RISO: per la lotta contro le Alghe intervenire al formarsi delle prime colonie alla dose di kg 4-5/ha.
ROSA e COLTURE FLOREALI/ORNAMENTALI: contro Ruggine, Septoria, Ticchiolatura, Peronospora e Corineo kg 0,5-0,6 Kg.
NB: Laddove non specificato intervenire al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia e proseguire i trattamenti secondo i tradizionali calendari di zona.

AVVERTENZE D'USO

Nel caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

COMPATIBILITÀ

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine e susino e varietà di melo (Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero (quali Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

MODO DI UTILIZZO DEI SACCHETTI IDROSOLUBILI

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto per confezioni in sacchetti idrosolubili

BORDO 25

(FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI)
Poltiglia bordolese essiccata

BORDO 25 Registrazione del Ministero della Salute n. 5588 del 15/11/1983

Composizione
RAME METALLO g. 25
(sotto forma di Solfato di rame neutralizzato con calce Idrossido)
Coformulanti q.b.a g.100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV Italia Srl – Fiano Romano (Roma)
Partita n.

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

CONTENUTO:
10 g (1 s.i. x 10 g) - 20 g (1 s.i. x 20 g)
50 g (1 s.i. x 50 g) - 100 g (1 s.i. x 100 g)
100 g (2 s.i. x 50 g)

Stabilimenti di produzione
DIACHEM S.p.A.
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (Bergamo)
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.
Cotignola (Ravenna)
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DT. 65/2003

Etichetta formato ridotto

BORDO 25

(FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE)
Poltiglia bordolese essiccata

BORDO 25 Registrazione del Ministero della Salute n. 5588 del 15/11/1983

Composizione
RAME METALLO g. 25
(sotto forma di Solfato di rame neutralizzato con calce Idrossido)
Coformulanti q.b.a g. 100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

distribuito da: **IQV Italia Srl** – Fiano Romano (Roma)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Partita n.

Stabilimenti di produzione
(formulazione e confezionamento o sola formulazione)
DIACHEM S.p.A. - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (Bergamo)
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (Ravenna)
TORRE Srl
Torrenieri, fraz. di Montalcino (Siena)
MANICA S.p.A. - Rovereto (TN)
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
Stabilimento di confezionamento:
ZAPI SpA - Conselve (PD)

Contenuto netto: **g. 5-10-20-50-100**

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Non respirare le polveri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

Etichetta sacchetti idrosolubili

BORDO 25

(FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI)
Poltiglia bordolese essiccata

BORDO 25 Registrazione del Ministero della Salute n. 5588 del 15/11/1983

Composizione
RAME METALLO g. 25
(sotto forma di Solfato di rame neutralizzato con calce Idrossido)
Coformulanti q.b.a g.100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV Italia Srl – Fiano Romano (Roma)

Partita n.

CONTENUTO: 10 - 20 - 50 - 100 - 250 g 1 Kg

Stabilimenti di produzione
DIACHEM S.p.A. - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (Bergamo)
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (Ravenna)
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a. - Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

AVVERTENZA:
LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE L'INVOLUCRO

DL 65/2003 set. 05

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CIDONEX

(POLVERE BAGNABILE)

Anticrittogamico particolarmente efficace nei confronti dei marciumi che possono colpire numerose colture orto-florofrutticole.

Registrazione del Ministero della Salute n.11261 del 4/04/2002

Composizione

PROCIMIDONE puro g. 50

Coformulanti q.b.a g. 100

Partita n.

Contenuto netto: 50-100-250-500 g 1-5-25 Kg

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV Italia Srl – Fiano Romano (Roma)
Stabilimenti di produzione
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA
Cotignola (Ravenna)
TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il CIDONEX è caratterizzato da una specifica ed elevata attività preventiva e bloccante nei confronti di vari marciumi che possono colpire le più importanti colture orticole, frutticole e floricole.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE: contro Muffa grigia 80-150 g/hl. In relazione all'andamento climatico ed alle caratteristiche varietali sono consigliati 3-4 trattamenti nelle seguenti epoche: a) fine fioritura; b) quando gli acini hanno un diametro di circa 3 mm; c) all'invaiatura (7-8 settimane prima della raccolta); d) 3-4 settimane prima della raccolta.

Distribuire una adeguata quantità di miscela per ottenere una completa ed uniforme copertura della vegetazione. Utilizzare la dose più alta sulle varietà più sensibili alla malattia, particolarmente quando l'andamento stagionale è piovoso. Il prodotto non interferisce con il regolare andamento della fermentazione dei mosti e non altera il gusto dei vini.

PESCO, ALBICOCCO, SUSINO: contro Monilia dei fiori e dei frutti 150-200 g/hl negli interventi dall'inizio a fine fioritura e 100-150 g/hl nei trattamenti durante la maturazione dei frutti, fino a 2-3 settimane prima della raccolta.

MANDORLO: contro Monilia dei fiori 150-200 g/hl. Intervenire fino alla piena fioritura.

NOCCIOLO: contro Marciume bruno 75-100 g/hl. Interventi preventivi in prossimità dell'allegagione.

ACTINIDIA: contro Muffa grigia e Sclerotinia:

nei trattamenti in campo 75-100 g/hl, intervenendo nelle seguenti epoche: a) piena fioritura; b) fine fioritura-inizio allegagione; c) ingrossamento dei frutti; d) 15 giorni prima della raccolta;

nei trattamenti post raccolta impiegare una soluzione allo 0,012% (12 g in 100 litri di acqua) sia per interventi a doccia che per immersione.

PERO: contro Maculatura bruna 100-150 g/hl. Effettuare trattamenti ripetuti a partire dalla sfioritura.

FRAGOLA: contro Muffa grigia 80-100 g/hl. Effettuare 3 trattamenti nelle seguenti epoche: a) alla apertura dei petali; b) quando i fiori sono schiusi per circa il 20%; c) alla sfioritura.

Bagnare abbondantemente la pianta.

LATTUGA, INDIVIA: contro Muffa grigia e Sclerotinia 1,5-2 Kg/ha. Effettuare non più di 2 interventi per stagione.

POMODORO: contro Muffa grigia 80-100 g/hl. Iniziare i trattamenti al termine della fioritura del primo palco fiorale e ripeterli ogni 15 giorni fino a due settimane prima della raccolta.

PEPERONE, MELANZANA: contro Muffa grigia e Sclerotinia 80-100 g/hl. Effettuare non più di 1 (peperone) e 3 (melanzana) trattamenti a stagione.

CETRIOLO, FAGIOLINO: contro Muffa grigia e Sclerotinia 100-150 g/hl. Effettuare trattamenti a partire dalla prima comparsa dei sintomi.

AGLIO: contro Muffa grigia e Sclerotinia 100-200 g/hl. Effettuare trattamenti a partire dalla prima comparsa dei sintomi.

CIPOLLA: contro Muffa grigia 100-150 g/hl di prodotto. Intervenire alla prima comparsa dei sintomi.

GIRASOLE: contro Muffa grigia e Sclerotinia 100 g/hl. Effettuare un trattamento preventivo prima della fioritura.

COLZA: contro Sclerotinia 1-1,5 Kg/ha. Intervenire all'inizio della fioritura.

TABACCO: contro Muffa grigia e Sclerotinia 1,5-2 Kg/ha. Intervenire al superamento della crisi di trapianto.

FLOREALI ED ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (ROSA, GERBERA, GERANIO, CRISANTEMO, GAROFANO): contro Muffa grigia 40-80 g/hl. Trattamenti ripetuti al verificarsi di andamenti climatici favorevoli allo sviluppo della malattia. Contro le infezioni di Rizoctonia e Sclerotinia 4 g/mq.

Avvertenza: Nei trattamenti post raccolta su actinidia, la soluzione eccedente ai trattamenti dovrà essere prelevata da ditte specializzate per la sua depurazione (fisica o microbiologica).

Preparazione della miscela: Diluire la giusta dose di prodotto in poca acqua versare quindi nel serbatoio della irroratrice aggiungendo il resto dell'acqua per raggiungere la concentrazione desiderata.

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Nei trattamenti alle colture floricole e orticole, soprattutto in serra, eseguire saggi preliminari in quanto alcune varietà potrebbero risultare sensibili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER ACTINIDIA, PESCO, ALBICOCCO, PERO, POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, FRAGOLA, LATTUGA, INDIVIA, CETRIOLO, FAGIOLINO; 21 GIORNI PER VITE, SUSINO, GIRASOLE; 45 GIORNI PER COLZA.

NEI TRATTAMENTI POST RACCOLTA SU ACTINIDIA NON IMMETTERE I FRUTTI AL CONSUMO PRIMA CHE SIANO TRASCORSI 60 GIORNI.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CIDONEX

(POLVERE BAGNABILE)

Anticrittogamico particolarmente efficace nei confronti dei marciumi che possono colpire numerose colture orto-florofrutticole.

Registrazione del Ministero della Salute n.11261 del 4/04/2002

Composizione
PROCIMIDONE puro g. 50
Coformulanti q.b.a g. 100

Partita n.

Contenuto netto: 50-100 g

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)

distribuito da:
IQV Italia Srl – Fiano Romano (Roma)

Stabilimenti di produzione
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA
Cotignola (Ravenna)
TORRE Srl
Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

C-M 4-40

Fungicida in polvere bagnabile contro la peronospora della vite, del pomodoro, del tabacco e della rosa

C-M 4-40 Registrazione Ministero della Sanità n. 9817 del 18/11/1998

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
CIMOXANIL puro g. 4
MANCOZEB puro g. 40
Coformulanti q.b. a g. 100

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
ZAPI SpA - Conselve (Padova)
DIACHEM SpA
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (Bergamo)

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via R. Gigante, 18/20 – 00143 Roma
CONTENUTO:
g 100-250-500 Kg 1-5-10-25
Partita n

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4% e Mancozeb 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Durante l'impiego può causare congiuntivite, riniti nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il C-M 4-40 è un fungicida formulato in polvere bagnabile efficace contro la Peronospora della VITE, del POMODORO, del TABACCO e della ROSA che agisce sia per penetrazione fogliare che per contatto. Il C-M 4-40 può essere utilizzato per tutta la stagione secondo il calendario antiperonosporico.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE: contro Peronospora impiegare g 200-300 di C-M 4-40 per ettolitro di acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infestazioni peronosporiche e proseguire con intervalli di 8-10 giorni fino a quando persistono condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. In condizioni particolarmente critiche gli intervalli possono essere accorciati.

POMODORO (fino alla prima fioritura): contro Peronospora impiegare g 250-300 di C-M 4-40 per ettolitro di acqua. In presenza di attacchi di Peronospora ed Alternaria aumentare la dose fino a g 300-350 per ettolitro di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere della malattia, ripetendoli ogni 6-10 giorni o in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo.

TABACCO: contro Peronospora impiegare g 300-350 di C-M 4-40 per ettolitro di acqua. La dose più alta è consigliabile in caso di forti attacchi su varietà particolarmente sensibili. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere della malattia, ripetendoli ogni 6-10 giorni o in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo.

ROSA: contro Peronospora impiegare g 250-300 di C-M 4-40 per ettolitro di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere della malattia, ripetendoli ogni 6-10 giorni o in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo.

COMPATIBILITÀ

Il C-M 4-40 è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. Non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. SU POMODORO TRATTAMENTI CONSENTITI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

Etichetta confezioni in sacchetti idrosolubili/foglio illustrativo

C-M 4-40

(SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Fungicida in polvere bagnabile contro la peronospora della vite, del pomodoro, del tabacco e della rosa

C-M 4-40 Registrazione Ministero della Sanità n. 9817 del 18/11/1998

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono

CIMOXANIL puro	g. 4
MANCOZEB puro	g. 40
Coformulanti q.b. a	g. 100

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
ZAPI SpA - Conselve (Padova)
DIACHEM SpA
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (Bergamo)

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via R. Gigante, 18/20 – 00143 Roma

Partita n

CONTENUTO: 100 g (1 s.i. x 100 g) - 200 g (2 s.i. x 100 g) - 250 g (1 s.i. x 250 g) - 300 g (3 s.i. x 100 g) - 500 g (5 s.i. x 100 g) - 500 g (2 s.i. x 250 g) - 700 g (1 s.i. x 500 g e 2 s.i. x 100 g) - 750 g (3 s.i. x 250 g) - 1 Kg (4 s.i. x 250 g) - 1 Kg (2 s.i. x 500 g) - 1 Kg (1 s.i. x 1000 g) - 2,5 Kg (10 s.i. x 250 g) - 5 Kg (20 s.i. x 250 g) - 5 Kg (5 s.i. x 1 Kg) - 10 Kg (10 s.i. x 1 Kg) - 20 Kg (20 s.i. x 1 Kg)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4% e Mancozeb 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Durante l'impiego può causare congiuntivite, riniti nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il C-M 4-40 è un fungicida formulato in polvere bagnabile efficace contro la Peronospora della VITE, del POMODORO, del TABACCO e della ROSA che agisce sia per penetrazione fogliare che per contatto. Il C-M 4-40 può essere utilizzato per tutta la stagione secondo il calendario antiperonosporico.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE: contro Peronospora impiegare g 200-300 di C-M 4-40 per ettolitro di acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infestazioni peronosporiche e proseguire con intervalli di 8-10 giorni fino a quando persistono condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. In condizioni particolarmente critiche gli intervalli possono essere accorciati.

POMODORO (fino alla prima fioritura): contro Peronospora impiegare g 250-300 di C-M 4-40 per ettolitro di acqua. In presenza di attacchi di Peronospora ed Alternaria aumentare la dose fino a g 300-350 per ettolitro di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere della malattia, ripetendoli ogni 6-10 giorni o in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo.

TABACCO: contro Peronospora impiegare g 300-350 di C-M 4-40 per ettolitro di acqua. La dose più alta è consigliabile in caso di forti attacchi su varietà particolarmente sensibili. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere della malattia, ripetendoli ogni 6-10 giorni o in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo.

ROSA: contro Peronospora impiegare g 250-300 di C-M 4-40 per ettolitro di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere della malattia, ripetendoli ogni 6-10 giorni o in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo.

AVVERTENZE D'USO

Nel caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

COMPATIBILITÀ

Il C-M 4-40 è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. Non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. SU POMODORO TRATTAMENTI CONSENTITI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

MODO DI UTILIZZO DEI SACCHETTI IDROSOLUBILI

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto per confezioni in sacchetti idrosolubili

C-M 4-40

(SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Fungicida in polvere bagnabile contro la peronospora della vite, del pomodoro, del tabacco e della rosa

C-M 4-40 Registrazione Ministero della Sanità n. 9817 del 18/11/1998

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono

CIMOXANIL puro	g. 4
MANCOZEB puro	g. 40
Coformulanti q.b. a	g. 100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)

distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via R. Gigante, 18/20 – 00143 Roma

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
ZAPI SpA - Conselve (Padova)
DIACHEM SpA
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (Bergamo)

CONTENUTO: 100 g (1 s.i. x 100 g)

Partita n

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4% e Mancozeb 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

C-M 4-40

Fungicida in polvere bagnabile contro la peronospora della vite, del pomodoro, del tabacco e della rosa

C-M 4-40 Registrazione Ministero della Sanità n. 9817 del 18/11/1998

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
CIMOXANIL puro g. 4
MANCOZEB puro g. 40
Coformulanti q.b. a g. 100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via R. Gigante, 18/20 – 00143 Roma

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONTENUTO: **g 100** Partita n

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
ZAPI SpA - Conselve (Padova)
DIACHEM SpA
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (Bergamo)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare al riparo dall'umidità. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4% e Mancozeb 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

etichetta per sacchetti idrosolubili

C-M 4-40

(SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Fungicida in polvere bagnabile contro la peronospora della vite, del pomodoro, del tabacco e della rosa

C-M 4-40 Registrazione Ministero della Sanità n. 9817 del 18/11/1998

Composizione
100 grammi di prodotto contengono
CIMOXANIL puro g. 4
MANCOZEB puro g. 40
Coformulanti q.b. a g. 100

CONTENUTO: 100-250-500-1000 g

Partita n.

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via R. Gigante, 18/20 – 00143 Roma

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a. - Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
ZAPI SpA - Conselve (Padova)
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (Bergamo)

AVVERTENZA:
LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE L'INVOLUCRO

DL 65/2003 set. 05

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CUPRAFOR

(POLVERE BAGNABILE)

Fungicida agricolo per trattamenti liquidi

CUPRAFOR Registrazione del Ministero della Salute n.11430 del16/09/2002

COMPOSIZIONE
RAME METALLO g. 50
(sotto forma di Ossicloruro Tetraramico)
Coformulanti q.b. a g. 100

Partita n

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV ITALIA Srl – Fiano Romano (Roma)

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)

CONTENUTO:
Kg. 0,100-0,250-0,5-1-5-10-20

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il **CUPRAFOR** è un fungicida che agisce per contatto e si impiega nella lotta preventiva contro un gran numero di parassiti fungini sensibili al rame. Il prodotto inoltre è efficace contro numerose Batteriosi che attaccano le colture frutticole ed orticole. Il **CUPRAFOR** è dotato di elevata efficacia, adesività e persistenza di azione.

MODALITÀ, DOSI E CAMPI D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega con pompe a volume normale, iniziando i trattamenti prima della comparsa della malattia e ripeterli secondo le necessità.
VITE: contro **Peronospora 200-250 g/hl** di acqua. Effettuare i normali trattamenti sulla base dei calendari di lotta comunemente usati in zona. Impiegare il prodotto preferibilmente dopo la fioritura della vite usando, prima della fioritura ed in fioritura, fungicidi acuprici. In zone ed in annate con forti infezioni di Peronospora si può opportunamente aumentare la dose d'impiego a **300-400 g/hl**. Contro l'**Oidio** aggiungere un antioidico specifico (zolfo bagnabile, ecc.).
MELO, PERO, COTOGNO: contro **Ticchiolatura** e **Cancri rameali 0,5-0,7 Kg/hl** in trattamenti autunnali o di fine inverno, **200-250 g/hl** in trattamenti pre-fiorali.
DRUPACEE in genere e MANDORLO: contro **Bolla**, **Corineo** e **Cancri rameali** (trattamenti invernali) **0,5-0,7 kg/hl**. Su **albicocco** contro **Sclerotinia** nei trattamenti pre-fiorali **200-250 g/hl**, nei trattamenti post-fiorali **250-400 g/hl**. **Ciliegio**: contro **Sclerotinia**, **Corineo** e **Scopazzi** nei trattamenti pre-fiorali **05-0,7 Kg/hl**.
OLIVO: contro **Occhio di pavone** e **Lebbra 300-400 g/hl**.
AGRUMI: contro **Mal secco, Antracnosi** e **Fumaggine 400 g/hl**.
ACTINIDIA: contro **Marciume del colletto 400 g/hl** con trattamenti al colletto distribuendo 10-15 litri per pianta.
FRAGOLA: contro **Maculatura rosso-bruna** e **zonata** (Marssonina e Gnomonia), **Vaiolatura rossa** (Mycosphaerella), intervenire in pre-fioritura e sulla vegetazione autunnale con **300 g/hl**.
FRUTTIFERI MINORI ED A GUSCIO: contro **Cancri rameali** in trattamenti autunnali o di fine inverno **400 g/hl**, in trattamenti primaverili **200 g/hl**.
PATATA: contro **Peronospora** ed altre crittogame parassite (**Alternaria, Septoria**) **250 g/hl**.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro **Cercospora 3,5 Kg/ha** in 500-600 litri di acqua in trattamenti ripetuti 2-3 volte secondo l'andamento della malattia.
ORTAGGI (cavoli, carciofo, asparago, ortaggi a foglia, cucurbitacee, solanacee, legumi, ortaggi a radice, ortaggi a bulbo):
- contro **Peronospora**, **Alternaria**, **Septoria**, **Cladisporiosi** del pomodoro **300 g/hl**.
- contro **Cercospora** e **Septoria** del sedano e della carota **250 g/hl**.
- contro **Peronospora** ed **Antracnosi** del melone, anguria, zucchino e cetriolo **250 g/hl**.
- contro **Antracnosi** e **Ruggine** del pisello, fagiolo, fagiolino **300 g/hl**.
- contro **Peronospora** del cavolo e di altre crucifere **300 g/hl**.

OLEAGINOSE: contro **Peronospora** e **Antracnosi 300 g/hl**.
TABACCO: contro **Peronospora** e **Antracnosi 300-400 g/hl**.
FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI: contro **Ruggine, Peronospora, Ticchiolatura, Septoria** di colture floreali (**garofano, rosa, crisantemo**), ornamentali e forestali **250 g/hl**.
Per tutti gli impieghi sopra indicati iniziare i trattamenti prima della comparsa delle malattie e ripetere i trattamenti secondo lo sviluppo delle stesse.
RISO: per la lotta contro le **alghe delle risaie** intervenire alla prima comparsa delle alghe, impiegando **3-3,5 Kg/ha** diluiti in 200-300 o più litri di acqua.
Preparazione della poltiglia: diluire il prodotto in poca acqua a parte, quindi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

COMPATIBILITÀ

Il CUPRAFOR è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari ed è indicato anche per la miscela con olio bianco nei trattamenti primaverili sulle pomacee alla dose di g. 200-250 per 100 litri di acqua. Il CUPRAFOR si usa senza aggiunta di calce.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (Abbondanza Belfort - Black Stayman - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winesap - Black Davis - King David - Renetta del Canada - Rosa Mantovana) e di pero quali Abate Fetel - Buona Luigia d'Avranches - Butirra Giffard, cuprosensibili, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto

CUPRAFOR

(POLVERE BAGNABILE)

Fungicida agricolo per trattamenti liquidi

CUPRAFOR Registrazione del Ministero della Salute n.11430 del16/09/2002

COMPOSIZIONE **Partita n.**

RAME METALLO g. 50
(sotto forma di Ossicloruro Tetraramico)
Coformulanti q.b. a g. 100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV ITALIA Srl – Fiano Romano (Roma)
STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)

NOCIVO

CONTENUTO: **g. 100**

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003 Sett. 05

Etichetta/foglio illustrativo

CURENOX

(POLVERE BAGNABILE)

Fungicida agricolo per trattamenti liquidi

CURENOX Registrazione del Ministero della Salute n. 3069 del 19/04/1979

COMPOSIZIONE
RAME METALLO g. 50
(sotto forma di Ossicloruro Tetraramico)
Coformulanti q.b. a g. 100

distribuito da:
IQV ITALIA Srl - Fiano Romano (Roma)

CONTENUTO:
Kg. 0,100-0,250-0,5-1-5-10-20

Partita n

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
Stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA – U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
STI Solfotecnica Italiana SpA – Cotignola (RA)
TORRE Srl
Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il **CURENOX** è un fungicida che agisce per contatto e si impiega nella lotta preventiva contro un gran numero di parassiti fungini sensibili al rame. Il prodotto inoltre è efficace contro numerose Batteriosi che attaccano le colture frutticole ed orticole. Il **CURENOX** è dotato di elevata efficacia, adesività e persistenza di azione.

MODALITÀ, DOSI E CAMPI D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega con pompe a volume normale, iniziando i trattamenti prima della comparsa della malattia e ripeterli secondo le necessità.
VITE: contro **Peronospora 200-250 g/hl** di acqua. Effettuare i normali trattamenti sulla base dei calendari di lotta comunemente usati in zona. Impiegare il prodotto preferibilmente dopo la fioritura della vite usando, prima della fioritura ed in fioritura, fungicidi acuprici. In zone ed in annate con forti infezioni di Peronospora si può opportunamente aumentare la dose d'impiego a **300-400 g/hl**. Contro l'**Oidio** aggiungere un anticidico specifico (zolfo bagnabile, ecc.).
MELO, PERO, COTOGNO: contro **Ticchiolatura** e **Cancri rameali 0,5-0,7 Kg/hl** in trattamenti autunnali o di fine inverno. **200-250 g/hl** in trattamenti pre-fiorali.
DRUPACEE in genere e MANDORLO: contro **Bolla**, **Corineo** e **Cancri rameali** (trattamenti invernali) **0,5-0,7 kg/hl**. Su **albicocco** contro **Sclerotinia** nei trattamenti pre-fiorali **200-250 g/hl**, nei trattamenti post-fiorali **250-400 g/hl**. **Ciliegio**: contro **Sclerotinia**, **Corineo** e **Scopazzi** nei trattamenti pre-fiorali **05-0,7 Kg/hl**.
OLIVO: contro **Occhio di pavone** e **Lebbra 300-400 g/hl**.
AGRUMI: contro **Mal secco, Antracnosi** e **Fumaggine 400 g/hl**.
ACTINIDIA: contro **Marciume del colletto 400 g/hl** con trattamenti al colletto distribuendo 10-15 litri per pianta.
FRAGOLA: contro **Maculatura rosso-bruna** e **zonata** (Marssonina e Gnomonia), **Vaiolatura rossa** (Mycosphaerella), intervenire in pre-fioritura e sulla vegetazione autunnale con **300 g/hl**.
FRUTTIFERI MINORI ED A GUSCIO: contro **Cancri rameali** in trattamenti autunnali o di fine inverno **400 g/hl**, in trattamenti primaverili **200 g/hl**.
PATATA: contro **Peronospora** ed altre crittogame parassite (**Alternaria, Septoria**) **250 g/hl**.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro **Cercospora 3,5 Kg/ha** in 500-600 litri di acqua in trattamenti ripetuti 2-3 volte secondo l'andamento della malattia.
ORTAGGI (cavoli, carciofo, asparago, ortaggi a foglia, cucurbitacee, solanacee, legumi, ortaggi a radice, ortaggi a bulbo):
- contro **Peronospora**, **Alternaria**, **Septoria**, **Cladisporiosi** del pomodoro **300 g/hl**.
- contro **Cercospora** e **Septoria** del sedano e della carota **250 g/hl**.
- contro **Peronospora** ed **Antracnosi** del melone, anguria, zucchino e cetriolo **250 g/hl**.
- contro **Antracnosi** e **Ruggine** del pisello, fagiolo, fagiolino **300 g/hl**.
- contro **Peronospora** del cavolo e di altre crucifere **300 g/hl**.

OLEAGINOSE: contro **Peronospora** e **Antracnosi 300 g/hl**.
TABACCO: contro **Peronospora** e **Antracnosi 300-400 g/hl**.
FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI: contro **Ruggine**, **Peronospora**, **Ticchiolatura**, **Septoria** di colture floreali (**garofano, rosa, crisantemo**), ornamentali e forestali **250 g/hl**.
Per tutti gli impieghi sopra indicati iniziare i trattamenti prima della comparsa delle malattie e ripetere i trattamenti secondo lo sviluppo delle stesse.
RISO: per la lotta contro **le alghe delle risaie** intervenire alla prima comparsa delle alghe, impiegando **3-3,5 Kg/ha** diluiti in 200-300 o più litri di acqua.

Preparazione della poltiglia: diluire il prodotto in poca acqua a parte, quindi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

COMPATIBILITÀ

Il CURENOX è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari ed è indicato anche per la miscela con olio bianco nei trattamenti primaverili sulle pomacee alla dose di g. 200-250 per 100 litri di acqua. Il CURENOX si usa senza aggiunta di calce.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (Abbondanza Belfort - Black Stayman - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winesap - Black Davis - King David - Renetta del Canada - Rosa Mantovana) e di pero quali Abate Fetel - Buona Luigia d'Avranches - Butirra Giffard, cuprosensibili, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

Etichetta formato ridotto

CURENOX

(POLVERE BAGNABILE)

Fungicida agricolo per trattamenti liquidi

CURENOX Registrazione del Ministero della Salute n. 3069 del 19/04/1979

COMPOSIZIONE
RAME METALLO g. 50
(sotto forma di Ossicloruro Tetraramico)
Coformulanti q.b. a g. 100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

distribuito da:
IQV ITALIA Srl - Fiano Romano (Roma)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONTENUTO:
g. 100

Partita n

Stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a. - Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA – U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
STI Solfotecnica Italiana SpA – Cotignola (RA)
TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta/foglio illustrativo

CURENOX 50 MICRO

Fungicida microgranulare idrodispersibile ad ampio spettro di azione

CURENOX 50 MICRO Registrazione Ministero della Salute n. 11481 del 22-10-02

COMPOSIZIONE
RAME metallico g. 50
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)
Coformulanti q.b. a g.100

Partita n.

CONTENUTO:
g 100-250-500 Kg 1-5-10-20

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV ITALIA Srl - Fiano Romano RM
STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il **CURENOX 50 MICRO** è un fungicida che agisce per contatto e si impiega nella lotta preventiva contro un gran numero di parassiti fungini sensibili al rame. Il prodotto inoltre è efficace contro numerose Batteriosi che attaccano le colture frutticole ed orticole. Grazie alla particolare formulazione in microgranuli idrodispersibili il **CURENOX 50 MICRO** è dotato di elevata efficacia, adesività e persistenza di azione.

MODALITÀ, DOSI E CAMPI D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega con pompe a volume normale, iniziando i trattamenti prima della comparsa della malattia e ripeterli secondo le necessità.
VITE: contro **Peronospora 250 g/hl** di acqua. Effettuare i normali trattamenti sulla base dei calendari di lotta comunemente usati in zona. Impiegare il prodotto preferibilmente dopo la fioritura della vite usando, prima della fioritura ed in fioritura, fungicidi acuprici. In zone ed in annate con forti infezioni di Peronospora si può opportunamente aumentare la dose d'impiego a **300-400 g/hl**. Contro l'**Oidio** aggiungere un antioidico specifico (zolfo bagnabile, ecc.).
MELO, PERO, COTOGNO: contro **Ticchiolatura** e **Cancri rameali 0,5-0,7 Kg/hl** in trattamenti autunnali o di fine inverno, **200-250 g/hl** in trattamenti pre-fiorali.
DRUPACEE in genere e MANDORLO: contro **Bolla**, **Corineo** e **Cancri rameali** (trattamenti invernali) **0,5-0,7 kg/hl**. Su **albicocco** contro **Sclerotinia** nei trattamenti pre-fiorali **200-250 g/hl**, nei trattamenti post-fiorali **250-400 g/hl**. **Ciliegio**: contro **Sclerotinia**, **Corineo** e **Scopazzi** nei trattamenti pre-fiorali **05-0,7 Kg/hl**.
OLIVO: contro **Occhio di pavone** e **Lebbra 250-400 g/hl**.
AGRUMI: contro **Mal secco, Antracnosi** e **Fumaggine 250-400 g/hl**.
ACTINIDIA: contro **Marciume del colletto 400 g/hl**. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
FRAGOLA: contro **Maculatura rosso-bruna** e **zonata** (Marssonina e Gnomonia), **Vaiolatura rossa** (Mycosphaerella), intervenire in pre-fioritura e sulla vegetazione autunnale con **300 g/hl**.
FRUTTIFERI MINORI ED A GUSCIO: contro **Cancri rameali** in trattamenti autunnali o di fine inverno **400 g/hl**, in trattamenti primaverili **200 g/hl**.
PATATA: contro **Peronospora** ed altre crittogame parassite (**Alternaria, Septoria**) **400 g/hl**.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro **Cercospora 3,5 Kg/ha** in 500-600 litri di acqua in trattamenti ripetuti 2-3 volte secondo l'andamento della malattia.
ORTAGGI (cavoli, carciofo, asparago, ortaggi a foglia, cucurbitacee, solanacee, legumi, ortaggi a radice, ortaggi a bulbo):
- contro **Peronospora**, **Alternaria**, **Septoria**, **Cladosporiosi** del pomodoro **300 g/hl**.
- contro **Cercospora** e **Septoria** del sedano e della carota **300 g/hl**.
- contro **Peronospora** ed **Antracnosi** del melone, anguria, zucchino e cetriolo **300 g/hl**.
- contro **Antracnosi** e **Ruggine** del pisello, fagiolo, fagiolino **300 g/hl**.
- contro **Peronospora** del cavolo e di altre crucifere **300 g/hl**.

OLEAGINOSE: contro **Peronospora** e **Antracnosi 300 g/hl**.
TABACCO: contro **Peronospora** e **Antracnosi 300-400 g/hl**.
FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI: contro **Ruggine**, **Peronospora**, **Ticchiolatura**, **Septoria** di colture floreali (**garofano**, **rosa**, **crisantemo**), ornamentali e forestali **250 g/hl**.
Per tutti gli impieghi sopra indicati iniziare i trattamenti prima della comparsa delle malattie e ripetere i trattamenti secondo lo sviluppo delle stesse.
RISO: per la lotta contro le **alghe delle risaie** intervenire alla prima comparsa delle alghe, impiegando **3-3,5 Kg/ha** diluiti in 200-300 o più litri di acqua.
Preparazione della poltiglia: introdurre la dose prestabilita di prodotto nella botte dell'irroratrice parzialmente riempita di acqua, mescolando accuratamente, quindi aggiungere la restante parte d'acqua fino al volume desiderato.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina come polisolfuri e calce.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenze: per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

FITOTOSSICITÀ
Non devono essere effettuati trattamenti durante la fioritura. Su pesco, susino e alcune varietà di Melo (Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Su tutte le colture orticole e floreali, visto l'elevato numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare un saggio prima dell'impiego su larga scala.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003 Sett. 05

Etichetta formato ridotto

CURENOX 50 MICRO

Fungicida microgranulare idrodispersibile ad ampio spettro di azione

CURENOX 50 MICRO Registrazione Ministero della Salute n. 11481 del 22-10-02

COMPOSIZIONE

RAME metallico g. 50
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)
Coformulanti q.b. a g.100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV ITALIA Srl - Fiano Romano RM
STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n.

CONTENUTO: **g 100**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003 Sett. 05

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CURENOX FLOW 38

Ossicloruro di Rame colorato ad azione fungicida in formulazione flowable

CURENOX FLOW 38 Registrazione del Ministero della Sanità n. 1849 del 30/07/1975

COMPOSIZIONE
RAME METALLO g. 25,65 (=379,62 g/l)
(sotto forma di Ossicloruro)
Coformulanti q.b. a g.100

CONTENUTO:
litri 0,100-0,250-0,500-1-5-10-20

Partita n

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV ITALIA Srl – Fiano Romano (Roma)
Stabilimento di produzione
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
Stabilimenti di confezionamento:
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA
Caravaggio (Bergamo)
TORRE Srl
Torrenieri, fraz. di Montalcino (Siena)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ DI IMPIEGO
È un anticrittogamico rameico in forma colloidale ad azione adesiva e persistente. Il suo impiego viene raccomandato per interventi preventivi nella lotta contro tutte le crittogame sensibili ai sali di rame.

DOSI DI IMPIEGO
POMACEE (Melo e Pero): contro Cancri e Disseccamenti rameali 600-700 ml/hl intervenendo al 30% ed al 70% della caduta delle foglie; contro Batteriosi e Ticchiolatura 500-600 ml/hl allo stadio di gemma ingrossata.
DRUPACEE (Pesco, Susino, Albicocco) e MANDORLO: contro Cancro batterico 700 ml/hl alla caduta delle foglie; contro Fusicocco e Corineo 800 ml/hl durante il riposo vegetativo.
OLIVO: contro Rogna 400 ml/hl durante il riposo vegetativo; contro Occhio di pavone 400 ml/hl in pre-fioritura e a frutto ingrossato.
VITE: contro Peronospora 400 ml/hl.
AGRUMI: contro Mal secco, Antracnosi e Fumaggine 400 ml/hl.
ACTINIDIA: contro Batteriosi 400 ml/hl alla caduta delle foglie.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cercospora 3 l/ha.
TABACCO: contro Peronospora e Batteriosi 400 ml/hl.
PATATA, ORTAGGI A FRUTTO (Melanzana, Peperone, Cocomero, Melone, Zucca, Zucchino, Cetriolo, Fagiolo, Pisello), ORTAGGI A FOGLIA (Cavolo, Insalate, Spinacio, Sedano, Bieta a coste, Carciofo, Cardo, Finocchio, Asparago), ORTAGGI A BULBO O A RADICE (Carota, Cipolla, Aglio, Porro): contro Ticchiolatura, Peronospora, Alternaria, Septoria, Ruggine e Antracnosi 400 ml/hl.
POMODORO: contro Peronospora, Alternaria e Batteriosi 400 ml/hl
FLOREALI, ORNAMENTALI e FORESTALI: contro Ruggini, Ticchiolatura e Peronospora 300-400 ml/hl.
Lotta contro ALGHE e MOLLUSCHI delle RISAIE: 4 l/ha alla prima comparsa delle alghe.

COMPATIBILITÀ
È miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto

CURENOX FLOW 38

Ossicloruro di Rame colorato ad azione fungicida in formulazione flowable

CURENOX FLOW 38 Registrazione del Ministero della Sanità n. 1849 del 30/07/1975
COMPOSIZIONE
RAME METALLO g. 25,65 (=379,62 g/l)
(sotto forma di Ossicloruro)
Coformulanti q.b. a g.100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV ITALIA Srl – Fiano Romano (Roma)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Stabilimento di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a. - Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
Stabilimenti di confezionamento:
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (Bergamo)
TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (Siena)

CONTENUTO: **100 ml**

Partita n

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003 Set. 05

Etichetta/foglio illustrativo

CYMOXANIL COMBI

Fungicida a base di Cimoxanil, Mancozeb e Rame ossicloruro in polvere bagnabile

CYMOXANIL COMBI Registrazione Ministero della Sanità n. 8391 del 07/08/1993

COMPOSIZIONE
CIMOXANIL puro g. 3
MANCOZEB puro g. 8
RAME METALLO g. 20
(sotto forma di Ossicloruro)
Coformulanti q.b. a g.100

CONTENUTO: **g 100-250-500- 700 Kg 1-5-10-15-20**

Partita n

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 - Roma

Stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA
Caravaggio (Bergamo)
TORRE Srl
Torrenieri, fraz. di Montalcino (Siena)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA
Cotignola (Ravenna)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 3%, Rame metallo 20% (da ossicloruro) e Mancozeb 8% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
RAME - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
MANCOZEB - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Il CYMOXANIL COMBI è un fungicida in polvere bagnabile, con azione preventiva e curativa, con effetto penetrante e di contatto, in grado di bloccare infezioni già in atto se si tratta entro le 48 ore da una pioggia infettante. L'ottima micronizzazione del prodotto permette una distribuzione omogenea, garanzia di uniforme copertura delle parti trattate.

VITE - POMODORO (solo fino alla prima fioritura) - TABACCO: contro la Peronospora, l'Escoriosi, l'Alternaria, l'Antracnosi e le Batteriosi. Viene impiegato alla dose di 300-350 g/hl con trattamenti al momento dello sviluppo delle condizioni che possono provocare l'infezione fungina.

COMPATIBILITÀ

Il CYMOXANIL COMBI non è compatibile con prodotti a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. SU POMODORO TRATTAMENTI CONSENTITI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DA NON IMPIEGARE IN SERRA
DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 05/2003

Etichetta confezioni in sacchetti idrosolubili/foglio illustrativo

CYMOXANIL COMBI

(SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Fungicida a base di Cimoxanil, Mancozeb e Rame ossicloruro in polvere bagnabile

CYMOXANIL COMBI Registrazione Ministero della Sanità n. 8391 del 07/08/1993

COMPOSIZIONE
CIMOXANIL puro g. 3
MANCOZEB puro g. 8
RAME METALLO g. 20
(sotto forma di Ossicloruro)
Coformulanti q.b. a g.100

Partita n….

CONTENUTO: 100 g (10 s.i. x 10 g) - 100 g (1 s.i. x 100 g) - 250 g (1 s.i. x 250 g) - 350 g (1 s.i. x 350 g) - 500 g (5 s.i. x 100 g) - 500 g (1 s.i. x 500 g 1 Kg (10 s.i. x 100 g) - 1 Kg (4 s.i. x 250 g) - 1,050 Kg (3 s.i. x 350 g)

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 - Roma
Stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA
Caravaggio (Bergamo)
TORRE Srl
Torrenieri, fraz. di Montalcino (Siena)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA
Cotignola (Ravenna)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 3%, Rame metallo 20% (da ossicloruro) e Mancozeb 8% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
RAME - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
MANCOZEB - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Il CYMOXANIL COMBI è un fungicida in polvere bagnabile, con azione preventiva e curativa, con effetto penetrante e di contatto, in grado di bloccare infezioni già in atto se si tratta entro le 48 ore da una pioggia infettante. L'ottima micronizzazione del prodotto permette una distribuzione omogenea, garanzia di uniforme copertura delle parti trattate.

VITE - POMODORO (solo fino alla prima fioritura) - TABACCO: contro la Peronospora, l'Escoriosi, l'Alternaria, l'Antracnosi e le Batteriosi. Viene impiegato alla dose di 300-350 g/hl con trattamenti al momento dello sviluppo delle condizioni che possono provocare l'infezione fungina.

AVVERTENZE D'USO

Nel caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

COMPATIBILITÀ

Il CYMOXANIL COMBI non è compatibile con prodotti a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. SU POMODORO TRATTAMENTI CONSENTITI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DA NON IMPIEGARE IN SERRA
DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

MODO DI UTILIZZO DEI SACCHETTI IDROSOLUBILI

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa a solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto per confezioni in sacchetti idrosolubili

CYMOXANIL COMBI

(SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Fungicida a base di Cimoxanil, Mancozeb e Rame ossicloruro in polvere bagnabile

CYMOXANIL COMBI Registrazione Ministero della Sanità n. 8391 del 07/08/1993

COMPOSIZIONE
CIMOXANIL puro g. 3
MANCOZEB puro g. 8
RAME METALLO g. 20
(sotto forma di Ossicloruro)
Coformulanti q.b. a g.100

Partita n....

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)
distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 - Roma

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

CONTENUTO: **100 g (10 s.i. x 10 g) - 100 g (1 s.i. x 100 g)**

Stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA
Caravaggio (Bergamo)
TORRE Srl
Torrenieri, fraz. di Montalcino (Siena)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA
Cotignola (Ravenna)

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 3%, Rame metallo 20% (da ossicloruro) e Mancozeb 8% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Durante l'impiego può causare congiuntivite, riniti nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
RAME - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
MANCOZEB - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DT. 65/2003

Etichetta formato ridotto

CYMOXANIL COMBI

Fungicida a base di Cimoxanil, Mancozeb e Rame ossicloruro in polvere bagnabile

CYMOXANIL COMBI Registrazione Ministero della Sanità n. 8391 del 07/08/1993

COMPOSIZIONE
CIMOXANIL puro g. 3
MANCOZEB puro g. 8
RAME METALLO g. 20
(sotto forma di Ossicloruro)
Coformulanti q.b. a g.100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl - Via Riccardo Gigante, 18/20 - Roma

CONTENUTO:
g 100

Partita n

Stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a. - Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (Bergamo)
TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (Siena)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Cotignola (Ravenna)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 3%, Rame metallo 20% (da ossicloruro) e Mancozeb 8% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
RAME - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
MANCOZEB - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

Etichetta per sacchetti idrosolubili

CYMOXANIL COMBI

(SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Fungicida a base di Cimoxanil, Mancozeb e Rame ossicloruro in polvere bagnabile

CYMOXANIL COMBI Registrazione Ministero della Sanità n. 8391 del 07/08/1993

COMPOSIZIONE
CIMOXANIL puro g. 3
MANCOZEB puro g. 8
RAME METALLO g. 20
(sotto forma di Ossicloruro)
Coformulanti q.b. a g.100

Partita n.

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via R. Gigante, 18/20 – 00143 Roma

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONTENUTO: **10-100–250–350-500 g**

Stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a. - Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (Bergamo)
TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (Siena)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Cotignola (Ravenna)

AVVERTENZA:
LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE L'INVOLUCRO

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CYMOXANIL R

Fungicida citotropico in polvere bagnabile

CYMOXANIL R Registrazione Ministero della Sanità n. 9363 del 25/09/1997

COMPOSIZIONE
RAME METALLO g. 20
(sotto forma di Ossicloruro)
CIMOXANIL puro g. 3
Coformulanti q.b. a g.100

CONTENUTO:
g 100-250-500 Kg 1-5-10-20

Partita n

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 - Roma
Stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (Bergamo)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame metallo 20% e Cimoxanil 3% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
RAME METALLO - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il CYMOXANIL R è un fungicida che agisce per contatto e per assorbimento citotropico. Si impiega in trattamenti preventivi al verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, cadenzando, in situazioni normali, gli interventi ogni 6-8 giorni; si consigliano trattamenti più ravvicinati in presenza di forte pressione della malattia. Il CYMOXANIL R presenta inoltre attività curativa ed eradicante entro tre giorni dalla avvenuta infezione peronosporica. È efficace nella lotta a Peronospora, Alternaria, Septoria e Antracnosi.

DOSI D'IMPIEGO

VITE: contro Peronospora alla dose di 300-350 g/hl.
POMODORO, PATATA, TABACCO, CARCIOFO: contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi alla dose di 350-400 g/hl.
LATTUGA, SPINACIO: contro Peronospora della lattuga e dello spinacio alla dose di 350 g/hl.
MELONE, ZUCCHINO: contro Peronospora delle cucurbitacee alla dose di 350 g/hl.
PISELLO: contro Peronospora ed Antracnosi alla dose di 350 g/hl.
CIPOLLA, AGLIO, PORRO: contro Peronospora della cipolla e del porro e Alternaria alla dose di 350 g/hl.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare in fioritura.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER CARCIOFO; 20 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto

CYMOXANIL R

Fungicida citotropico in polvere bagnabile

CYMOXANIL R Registrazione Ministero della Sanità n. 9363 del 25/09/1997

COMPOSIZIONE
RAME METALLO g. 20
(sotto forma di Ossicloruro)
CIMOXANIL puro g. 3
Coformulanti q.b. a g.100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 - Roma

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a. -
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (Bergamo)
CONTENUTO: **g 100** Partita n

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame metallo 20% e Cimoxanil 3% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

RAME METALLO - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003 Set. 05

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

COMBI COP

Fungicida sistemico e di contatto in sospensione concentrata

COMBI COP Registrazione Ministero della Sanità n. 10175 del 11/10/1999

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
METALAXIL, puro g. 3,5 (= 49 g/l)
RAME METALLO g. 18,5 (=259 g/l)
(da idrossido di rame)
Coformulanti q.b. a g.100

CONTENUTO:
ml 100-250-500 litri 1-5-10-20

Partita n

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via G. Verdi, 12 - Bergamo
Stabilimento di produzione:
IQV industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles – Barcellona (Spagna)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL 3,5% e Rame metallo 18,5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL - Irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
RAME - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il COMBI COP è un fungicida sistemico e di contatto ad azione sia preventiva che curativa nei confronti delle seguenti colture:
VITE: contro Peronospora impiegare 400 ml/hl effettuando 2-4 trattamenti ogni 14 giorni dall'epoca di pre-fioritura.
MELO: contro Fitoftora impiegare 100-150 ml/pianta, con l'aggiunta di un bagnante alla dose di 200 ml/ha. Bagnare bene la zona del colletto ed il terreno sottostante oppure distribuire con fertirrigazione. In caso di forti attacchi effettuare spennellature al tronco con soluzione al 20%.
SOIA: contro Peronospora e Fitoftora impiegare 4 l/ha effettuando 2-3 trattamenti ogni 10-14 giorni.
POMODORO: contro Peronospora impiegare 400 ml/hl effettuando 4 trattamenti ogni 14 giorni.
PATATA: contro Peronospora impiegare 3-4 l/ha effettuando 2-3 trattamenti ogni 10-14 giorni.
FRAGOLA: contro Fitoftora impiegare 3-4 l/ha effettuando 2 trattamenti 15-20 giorni dopo l'impianto e 30 giorni dopo. Eventualmente immergere le piantine prima dell'impianto in una soluzione al 3%.
ALTRE ORTICOLE (LATTUGA, CARCIOFO, CAVOLO VERZA, MELONE, COCOMERO): contro Peronospora, Alternaria, Bremia impiegare 3-4 l/ha effettuando 2-3 trattamenti ogni 10-14 giorni .

COMPATIBILITÀ

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare durante la fioritura. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER MELO, CARCIOFO, POMODORO, LATTUGA, PATATA, COCOMERO, MELONE; 28 GIORNI PER VITE; 40 GIORNI PER FRAGOLA; 60 GIORNI PER CAVOLO VERZA; 150 GIORNI PER SOIA.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto

COMBI COP

Fungicida sistemico e di contatto in sospensione concentrata

COMBI COP Registrazione Ministero della Sanità n. 10175 del 11/10/1999

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
METALAXIL, puro g. 3,5 (= 49 g/l)
RAME METALLO g. 18,5 (=259 g/l)
(da idrossido di rame)
Coformulanti q.b. a g.100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)

distribuito da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl –
Via G. Verdi, 12 - Bergamo

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Stabilimento di produzione:
IQV industrias Quimicas del Valles s.a. - Mollet del Valles – Barcellona (Spagna)

CONTENUTO: **ml 100**

Partita n

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL 3,5% e Rame metallo 18,5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL - Irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
RAME - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, **emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.**
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003 Sett. 05

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FESIL

(POLVERE BAGNABILE) Fungicida sistemico

FESIL Registrazione del Ministero della Salute n. 11264 del 04-04-2002

Composizione

FOSETIL ALLUMINIO puro g. 80

Coformulanti q.b. a g. 100

Partita n.

Contenuto netto: 50-100-150-200-500 g 1-5 Kg

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'igestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)

distribuito da:
IQV ITALIA Srl – Fiano Romano RM

Stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA
Cotignola (Ravenna)
TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
DIACHEM SpA
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in cAso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il FESIL è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante. La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente. Tale attività è tanto più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita. La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

ORTICOLTURA

Fragola: contro Peronospora (Phytophtora cactorum e fragariae). L'immersione delle piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 irrorazioni alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immersione delle piante prima del trapianto in una poltiglia a 250 g/hl d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di 0,5 grammi di formulato per pianta.

Lattuga: contro Bremia lactucae effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl di acqua (avendo cura di distribuire almeno 3 Kg di prodotto per ettaro). Su lattuga romana effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici la lattuga può essere sensibile al prodotto.

Melone: contro Pseudoperonospora cubensis effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl di acqua ogni 14 giorni.

Cocomero, Cetriolo, Spinacio: contro Peronospora, effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl di acqua (avendo cura di distribuire come minimo 3 Kg di prodotto per ettaro).

Carciofo: contro Bremia lactucae a 200-300 g/hl di acqua.

FRUTTICOLTURA

Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo: contro Phytophtora spp. effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl di acqua, utilizzando 10 litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione possono venire integrati da pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche). Questa pratica diventa indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida.

Melo e Pero: contro Ticchiolatura, trattamenti preventivi a 150-250 g/hl di acqua; particolarmente nelle fasi pre-fiorali e immediatamente successive all'allegagione, si consiglia l'associazione con fungicidi di copertura (rame escluso) o con Dodina.

Pero: contro Maculatura bruna (Stemphylium sp.) trattamenti preventivi a 250 g/hl di acqua.

Melo, Pero, Pesco, Actinidia: contro Phytophtora cactorum.

a) effettuare un trattamento sulla vegetazione, una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta (per melo e actinidia), con 250 g/hl di acqua.

b) su pianta già debilitata dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida: effettuare un'annaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, con litri 1-2 per pianta di una poltiglia costituita da 5 Kg di FESIL per 100 litri di acqua.

Su vivai di fruttiferi: effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl di acqua con cadenza mensile.

Su vivai di agrumi: impiegare la dose di 400 g/hl di acqua ogni 60 giorni.

Vite: contro Peronospora, a 250 g/hl di acqua. Si consiglia sempre l'associazione con formulati di copertura (rame escluso).

COLTURE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO E IN SERRA

Contro Phytophtora spp. di Chamaecyparis e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee, Poinsettia, St. Paulia e Crisantemo, effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con g 5-10 di formulato per mq. una volta al mese in primavera.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con i prodotti a base di rame, di dicofol e con concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Non effettuare miscele con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta. Si consiglia inoltre di non irrorare il prodotto su colture precedentemente trattate con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU CARCIOFO, CETRIOLO, COCOMERO, MELONE, LATTUGA, SPINACIO; 30 GIORNI SU FRAGOLA: 40 GIORNI SU MELO, PERO, PESCO, ACTINIDIA, VITE; 80 GIORNI SU ARANCIO, LIMONE, MANDARINO, POMPELMO.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

DL 65/2003

Etichetta confezioni in sacchetti idrosolubili

FESIL

(POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Fungicida sistemico

FESIL Registrazione del Ministero della Salute n. 11264 del 04-04-2002

Composizione

FOSETIL ALLUMINIO puro g. 80

Coformulanti q.b. a g. 100

Partita n....

Contenuto netto: 1 Kg (10 s.i. x 100 g) - 1 Kg (5 s.i. x 200 g) - 1 Kg (4 s.i. x 250 g) - 1 Kg (2 s.i. x 500 g) - 1 Kg (1 s.i. x 1000 g)

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

distribuito da:

IQV ITALIA Srl – Fiano Romano RM

Stabilimenti di produzione:

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)

S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA
Cotignola (Ravenna)

TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)

DIACHEM SpA
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il FESIL è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante. La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente. Tale attività è tanto più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita. La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

ORTICOLTURA

Fragola: contro Peronospora (Phytophtora cactorum e fragariae). L'immersione delle piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 irrorazioni alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immersione delle piante prima del trapianto in una poltiglia a 250 g/hl d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di 0,5 grammi di formulato per pianta.

Lattuga: contro Bremia lactucae effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl di acqua (avendo cura di distribuire almeno 3 Kg di prodotto per ettaro). Su lattuga romana effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici la lattuga può essere sensibile al prodotto.

Melone: contro Pseudoperonospora cubensis effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl di acqua ogni 14 giorni.

Cocomero, Cetriolo, Spinacio: contro Peronospora, effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl di acqua (avendo cura di distribuire come minimo 3 Kg di prodotto per ettaro).

Carciofo: contro Bremia lactucae a 200-300 g/hl di acqua.

FRUTTICOLTURA

Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo: contro Phytophtora spp. effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl di acqua, utilizzando 10 litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione possono venire integrati da pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche). Questa pratica diventa indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida.

Melo e Pero: contro Ticchiolatura, trattamenti preventivi a 150-250 g/hl di acqua; particolarmente nelle fasi pre-fiorali e immediatamente successive all'allegagione, si consiglia l'associazione con fungicidi di copertura (rame escluso) o con Dodina.

Pero: contro Maculatura bruna (Stemphylium sp.) trattamenti preventivi a 250 g/hl di acqua.

Melo, Pero, Pesco, Actinidia: contro Phytophtora cactorum.

a) effettuare un trattamento sulla vegetazione, una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta (per melo e actinidia), con 250 g/hl di acqua.

b) su pianta già debilitata dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida: effettuare un'annaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, con litri 1-2 per pianta di una poltiglia costituita da 5 Kg di FESIL per 100 litri di acqua.

Su vivai di fruttiferi: effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl di acqua con cadenza mensile.

Su vivai di agrumi: impiegare la dose di 400 g/hl di acqua ogni 60 giorni.

Vite: contro Peronospora, a 250 g/hl di acqua. Si consiglia sempre l'associazione con formulati di copertura (rame escluso).

COLTURE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO E IN SERRA

Contro Phytophtora spp. di Chamaecyparis e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee, Poinsettia, St. Paulia e Crisantemo, effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con g 5-10 di formulato per mq. una volta al mese in primavera.

AVVERTENZE D'USO: Nel caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con i prodotti a base di rame, di dicofol e con concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Non effettuare miscele con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta. Si consiglia inoltre di non irrorare il prodotto su colture precedentemente trattate con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU CARCIOFO, CETRIOLO, COCOMERO, MELONE, LATTUGA, SPINACIO; 30 GIORNI SU FRAGOLA: 40 GIORNI SU MELO, PERO, PESCO, ACTINIDIA, VITE; 80 GIORNI SU ARANCIO, LIMONE, MANDARINO, POMPELMO.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

MODO DI UTILIZZO DEI SACCHETTI IDROSOLUBILI

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

DL 65/2003 Nov. 05

Etichetta formato ridotto

FESIL

(POLVERE BAGNABILE)

Fungicida sistemico

FESIL Registrazione del Ministero della Salute n. 11264 del 04-04-2002

Composizione

FOSETIL ALLUMINIO puro g. 80

Coformulanti q.b. a g. 100

Partita n.

Contenuto netto:

50-100 g

IRRITANTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.

Av. Rafael Casanova, 81

08100 Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)

distribuito da:

IQV ITALIA Srl – Fiano Romano RM

FRASI DI RISCHIO: **Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'igestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

Stabilimenti di produzione:

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)

S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA
Cotignola (Ravenna)

TORRE Srl
Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)

DIACHEM SpA
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

NORME PRECAUZIONALI: **Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

etichetta per sacchetti idrosolubili

FESIL

(POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Fungicida sistemico

FESIL Registrazione Ministero della Sanità n. 11264 del 04/04/2002

Composizione
FOSETIL ALLUMINIO puro g. 80
Coformulanti q.b. a g. 100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV ITALIA Srl – Fiano Romano RM

IRRITANTE

CONTENUTO:
100 g - 200 g - 250 g - 500 g - 1000 g

Partita n.

Stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.- Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Cotignola (Ravenna)
TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

AVVERTENZA:
LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE L'INVOLUCRO

Etichetta/foglio illustrativo

FOLMAK COMBI

Fungicida specifico per la lotta contro la peronospora della vite in polvere bagnabile

FOLMAK COMBI Registrazione Ministero della Salute n. 11041 del 11/10/2001

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
METALAXIL, puro g. 10
FOLPET, puro g. 40
Coformulanti q.b. a g.100

Stabilimento di produzione:
IQV industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles – Barcellona (Spagna)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via G. Verdi, 12 - Bergamo
CONTENUTO:
g 100-250-500 Kg 1-5-10-20
Partita n

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL 10% e FOLPET 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL - Irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
FOLPET - Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardio-circolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il **FOLMAK COMBI** è un fungicida ad azione preventiva e curativa indicato per la lotta contro la **peronospora della vite** (da vino e da tavola). È dotato di azione bloccante ed impedisce lo sviluppo del micelio fungino se applicato subito dopo le infezioni. L'uso regolare del **FOLMAK COMBI** consente di prevenire e contenere in misura apprezzabile gli attacchi di *Botrytis cinerea*, Escoriosi e Black-rot grazie alla presenza del Folpet.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il primo trattamento deve essere eseguito dopo il verificarsi della prima pioggia infettante; per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permetterà di mantenere delle cadenze fisse sganciate dalle piogge. Infatti anche le piogge abbondanti e ripetute non diminuiscono l'efficacia del trattamento. La traslocazione acropeta del **FOLMAK COMBI** consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo tra un trattamento e l'altro.
Intervenire con **200 g/hl** di acqua fino ad allegagione avvenuta con intervalli cadenzati di 12 giorni.
Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione.
Per la lotta contemporanea contro l'oidio, miscelare il prodotto agli anticrittogamici previsti per questo scopo.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con polisolfuri, Tiram ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con oli minerali e polisolfuri.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

SU UVA DA TAVOLA SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. SULLE UVE DA VINO SOSPENDERE I TRATTAMENTI 40 GIORNI PRIMA DELLA VENDEMMIA PER NON OSTACOLARE LA FERMENTAZIONE DEI MOSTI.

Avvertenze: Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 24 e i tempi di carenza del formulato, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003 Set. 05

Etichetta confezioni sacchetti idrosolubili

FOLMAK COMBI

(SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Fungicida specifico per la lotta contro la peronospora della vite in polvere bagnabile

FOLMAK COMBI Registrazione Ministero della Salute n. 11041 del 11/10/2001

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
METALAXIL, puro g. 10
FOLPET, puro g. 40
Coformulanti q.b. a g.100

CONTENUTO:
Kg 1 (10 s.i. x 100 g) - Kg 1 (5 s.i. x 200 g) - Kg 1 (2 s.i. x 500 g) - Kg 1 (1 s.i. x 1 Kg) - Kg 2 (20 s.i. x 100 g) - Kg 2 (10 s.i. x 200 g) - Kg 2 (4 s.i. x 500 g) - Kg 2 (2 s.i. x 1 Kg) - Kg 5 (50 s.i. x 100 g) - Kg 5 (25 s.i. x 200 g) - Kg 5 (10 s.i. x 500 g) - Kg 5 (5 s.i. x 1 Kg)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via G. Verdi, 12 – Bergamo
Stabilimento di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA – U.P. SIFA – Caravaggio (Bergamo)
STI Solfotecnica Italiana SpA – Cotignola (RA)
TORRE Srl Torrenieri fraz. di Montalcino (SI)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL 10% e FOLPET 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL - Irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
FOLPET - Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardio-circolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il **FOLMAK COMBI** è un fungicida ad azione preventiva e curativa indicato per la lotta contro la **peronospora della vite** (da vino e da tavola). È dotato di azione bloccante ed impedisce lo sviluppo del micelio fungino se applicato subito dopo le infezioni. L'uso regolare del **FOLMAK COMBI** consente di prevenire e contenere in misura apprezzabile gli attacchi di *Botrytis cinerea*, Escoriosi e Black-rot grazie alla presenza del Folpet.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il primo trattamento deve essere eseguito dopo il verificarsi della prima pioggia infettante; per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permetterà di mantenere delle cadenze fisse sganciate dalle piogge. Infatti anche le piogge abbondanti e ripetute non diminuiscono l'efficacia del trattamento. La traslocazione acropeta del **FOLMAK COMBI** consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo tra un trattamento e l'altro.
Intervenire con **200 g/hl** di acqua fino ad allegagione avvenuta con intervalli cadenzati di 12 giorni.
Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione.
Per la lotta contemporanea contro l'oidio, miscelare il prodotto agli anticrittogamici previsti per questo scopo.

AVVERTENZE D'USO

Nel caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con polisolfuri, Tiram ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con oli minerali e polisolfuri.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

SU UVA DA TAVOLA SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. SULLE UVE DA VINO SOSPENDERE I TRATTAMENTI 40 GIORNI PRIMA DELLA VENDEMMIA PER NON OSTACOLARE LA FERMENTAZIONE DEI MOSTI.

Avvertenze: Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 24 e i tempi di carenza del formulato, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

MODO DI UTILIZZO DEI SACCHETTI IDOSOLUBILI

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

DL 65/2003 Sct. 05

Etichetta formato ridotto

FOLMAK COMBI

Fungicida specifico per la lotta contro la peronospora della vite in polvere bagnabile

FOLMAK COMBI Registrazione Ministero della Salute n. 11041 del 11/10/2001

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
METALAXIL, puro g. 10
FOLPET, puro g. 40
Coformulanti q.b. a g.100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

CONTENUTO: **g 100** Partita n

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

distribuito da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via G. Verdi, 12 - Bergamo

Stabilimento di produzione:
IQV industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles – Barcellona (Spagna)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL 10% e FOLPET 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL - Irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
FOLPET - Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardio-circolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003 Set. 05

ETICHETTA PER SACCHETTI IDROSOLUBILI

FOLMAK COMBI

(SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Fungicida specifico per la lotta contro la peronospora della vite in polvere bagnabile

FOLMAK COMBI **Registrazione Ministero della Salute n. 11041 del 11/10/2001**

Composizione
100 grammi di prodotto contengono
METALAXIL, puro g. 10
FOLPET, puro g. 40
Coformulanti q.b. a g.100

CONTENUTO:
100 – 200 – 500 – 1000 g

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via G. Verdi, 12 – Bergamo

Partita n.

Stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a. - Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA – U.P. SIFA – Caravaggio (Bergamo)
STI Solfotecnica Italiana SpA – Cotignola (RA)
TORRE Srl - Torrenieri fraz. di Montalcino (SI)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

AVVERTENZA:
LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE L'INVOLUCRO

DL 65/2003 set. 05

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

KASKO MZ

Fungicida sistemico e di contatto in polvere bagnabile

KASKO MZ Registrazione Ministero della Sanità n. 10174 del 11/10/1999

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
METALAXIL, puro g. 8
MANCOZEB, puro g. 64
Coformulanti q.b. a g.100

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)

IRRITANTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

distribuito da:
SARIAF SpA - Via Morgagni, 68 – Faenza RA

Partita n.

CONTENUTO: **g 100-250-500 Kg 1-5-10-25**

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL 8% e MANCOZEB 64% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL - Irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
MANCOZEB - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il KASKO MZ è un fungicida sistemico e di contatto con effetto sia preventivo che curativo nei confronti di varie colture; esso consente un impiego a cadenze fisse ed anche piogge infettanti ripetute non ne diminuiscono l'azione anticrittogamica.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE: contro Peronospora, Escoriosi, Black-rot impiegare 250 g/hl di acqua; intervenire alle prime piogge infettanti e proseguire con intervalli cadenzati di 14-18 giorni a seconda dell'andamento climatico.
TABACCO: contro Peronospora impiegare 300 g/hl di acqua dopo che la coltura ha superato la crisi post-trapianto con trattamenti cadenzati di 10 giorni l'uno dall'altro.
Si consiglia di trattare in semenzaio 1-2 giorni prima della messa a dimora al fine di evitare eventuali infezioni.
POMODORO: contro Peronospora impiegare 250 g/hl di acqua; intervenire solo fino alla prima fioritura con intervalli di 15 giorni tra i trattamenti.

Rispettare rigorosamente le norme di impiego anche per contrastare i ceppi resistenti. Qualora insorga la resistenza ricorrere all'impiego di un fungicida di copertura.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SU VITE E TABACCO SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. SU POMODORO TRATTAMENTI CONSENTITI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON IMPIEGARE SU VIVAI DI VITE
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

DT/65/2003

Etichetta confezioni sacchetti idrosolubili/foglio illustrativo

KASKO MZ

(SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Fungicida sistemico e di contatto in polvere bagnabile

KASKO MZ Registrazione Ministero della Sanità n. 10174 del 11/10/1999

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
METALAXIL, puro g. 8
MANCOZEB, puro g. 64
Coformulanti q.b. a g.100

Partita n.

CONTENUTO: 100 g (1 s.i x 100 g) – 200 g (2 s.i. x 100 g) - 200 g (1 s.i. x 200 g) – 250 g (1 s.i. x 250 g) – 500 g (5 s.i. x 100 g) 500 g (2 s.i. x 250 g) - 500 g (1 s.i. x 500 g) – 1 Kg (10 s.i. x 100 g) 1 Kg (5 s.i. x 200 g) – 1 Kg (4 s.i. x 250 g) – 1 Kg (2 s.i. x 500 g)

IRRITANTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
SARIAF SpA - Via Morgagni, 68 – Faenza RA
stabilimento di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (Bergamo)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: **Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL 8% e MANCOZEB 64% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL - Irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
MANCOZEB - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il KASKO MZ è un fungicida sistemico e di contatto con effetto sia preventivo che curativo nei confronti di varie colture; esso consente un impiego a cadenze fisse ed anche piogge infettanti ripetute non ne diminuiscono l'azione anticrittogamica.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE: contro Peronospora, Escoriosi, Black-rot impiegare 250 g/hl di acqua; intervenire alle prime piogge infettanti e proseguire con intervalli cadenzati di 14-18 giorni a seconda dell'andamento climatico.
TABACCO: contro Peronospora impiegare 300 g/hl di acqua dopo che la coltura ha superato la crisi post-trapianto con trattamenti cadenzati di 10 giorni l'uno dall'altro.
Si consiglia di trattare in semenzaio 1-2 giorni prima della messa a dimora al fine di evitare eventuali infezioni.
POMODORO: contro Peronospora impiegare 250 g/hl di acqua; intervenire solo fino alla prima fioritura con intervalli di 15 giorni tra i trattamenti.

AVVERTENZE D'USO

Nel caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.
Rispettare rigorosamente le norme di impiego anche per contrastare i ceppi resistenti. Qualora insorga la resistenza ricorrere all'impiego di un fungicida di copertura.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SU VITE E TABACCO SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. SU POMODORO TRATTAMENTI CONSENTITI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON IMPIEGARE SU VIVAI DI VITE
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

MODO DI UTILIZZO DEI SACCHETTI IDROSOLUBILI

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua asciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

DT/65/2003

Etichetta ridotta per confezioni in sacchetti idrosolubili

KASKO MZ

(SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Fungicida sistemico e di contatto in polvere bagnabile

KASKO MZ Registrazione Ministero della Sanità n. 10174 del 11/10/1999

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono

METALAXIL, puro g. 8

MANCOZEB, puro g. 64

Coformulanti q.b. a g.100

Partita n.

CONTENUTO: 100 g (1 s.i x 100 g)

IRRITANTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

distribuito da:
SARIAF SpA
Via Morgagni, 68 – Faenza RA

stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (Bergamo)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL 8% e MANCOZEB 64% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

METALAXIL - Irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.

MANCOZEB - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DT. 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

KASKO MZ

Fungicida sistemico e di contatto in polvere bagnabile

KASKO MZ Registrazione Ministero della Sanità n. 10174 del 11/10/1999

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
METALAXIL, puro g. 8
MANCOZEB, puro g. 64
Coformulanti q.b. a g.100

Partita n.

CONTENUTO: **g 100**

IRRITANTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
SARIAF SpA - Via Morgagni, 68 – Faenza RA
Stabilimento di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)

FRASI DI RISCHIO: **Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.**

NORME PRECAUZIONALI: **Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL 8% e MANCOZEB 64% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL - **Irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.**
MANCOZEB - **Cute**: **eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.**
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DT 65/2003

Etichetta per sacchetti idrosolubili

KASKO MZ

(SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Fungicida sistemico e di contatto in polvere bagnabile

KASKO MZ Registrazione Ministero della Sanità n. 10174 del 11/10/1999

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
METALAXIL, puro g. 8
MANCOZEB, puro g. 64
Coformulanti q.b. a g.100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

CONTENUTO: **100-200-250-500 g**
Partita n.

distribuito da:
SARIAF SpA - Via Morgagni, 68 – Faenza RA

IRRITANTE

Stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a. - Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (Bergamo)

AVVERTENZA:
LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE L'INVOLUCRO

DL 65/2003

Etichetta/foglio illustrativo

MANEZINE

(POLVERE BAGNABILE)

Fungicida organico per la difesa delle colture agricole

MANEZINE Registrazione Ministero della Sanità n. 0356 del 15/01/1972

Composizione

MANCOZEB puro g. 80

Coformulanti q.b.a g. 100

Partita n. ....

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)

Stabilimenti di produzione
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (Bergamo)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA
Cotignola (Ravenna)
TORRE Srl
Torrenieri, fraz. di Montalcino (Siena)

CONTENUTO: **g 5-10-20-50-100-250-500 Kg 1-5-10-25**

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il MANEZINE combatte la maggioranza delle crittogame come:
POMACEE: contro Ticchiolatura alla dose di 200 g/hl;
VITE: contro Peronospora, Antracnosi, alla dose di 200-250 g/hl;
POMODORO (solo fino alla prima fioritura): contro Peronospora, Alternaria, Septoria, alla dose di 200 g/hl;
CEREALI (frumento, orzo, segale, avena) in campo: contro Ruggine, Septoria 2,5-3 Kg/ha;
TABACCO: contro Peronospora e Antracnosi in pieno campo 200-250 g/hl.
GAROFANO: contro Ruggine, alla dose di 200 g/hl;
PIOPPO: contro Marssonina 400 g/hl.

EPOCA DI IMPIEGO

L'epoca di impiego non differisce da quella dei normali fungicidi e segue i calendari già in uso. Per preparare la poltiglia, stemperare la dose necessaria di MANEZINE in poca acqua e, rimestando continuamente, portare a volume.

COMPATIBILITÀ

Il MANEZINE è compatibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari comunemente impiegati. Risulta incompatibile con la poltiglia solfocalcica, con i prodotti ad alto tenore di boro e con poltiglie alcaline in genere.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto è fitotossico per le varietà di pero sensibili al Mancozeb come: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. SU POMODORO TRATTAMENTI CONSENTITI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DA NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

DL 65/2003

Etichetta confezioni in sacchetti idrosolubili/foglio illustrativo

MANEZINE

Fungicida organico per la difesa delle colture agricole in polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

MANEZINE Registrazione Ministero della Sanità n. 0356 del 15/01/1972

Composizione

MANCOZEB puro	g. 80	Partita n. ....
Coformulanti q.b.a	g. 100	

CONTENUTO: 10 g (1 s.i. x 10 g) – 20 g (2 s.i. x 20 g) – 50 g (1 s.i. x 50 g) - 100 g (1 s.i. x 100 g) - 100 g (2 s.i. x 50 g) - 250 g (1 s.i. x 250 g) - 500 g (5 s.i. x 100 g) – 1 Kg (4 s.i. x 250 g)

IRRITANTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)

Stabilimenti di produzione
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (Bergamo)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA
Cotignola (Ravenna)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il MANEZINE combatte la maggioranza delle crittogame come:
POMACEE: contro Ticchiolatura alla dose di 200 g/hl;
VITE: contro Peronospora, Antracnosi, alla dose di 200-250 g/hl;
POMODORO (solo fino alla prima fioritura): contro Peronospora, Alternaria, Septoria, alla dose di 200 g/hl;
CEREALI (frumento, orzo, segale, avena) in campo: contro Ruggine, Septoria 2,5-3 Kg/ha;
TABACCO: contro Peronospora e Antracnosi in pieno campo 200-250 g/hl.
GAROFANO: contro Ruggine, alla dose di 200 g/hl;
PIOPPO: contro Marssonina 400 g/hl.

EPOCA DI IMPIEGO
L'epoca di impiego non differisce da quella dei normali fungicidi e segue i calendari già in uso. Per preparare la poltiglia, stemperare la dose necessaria di MANEZINE in poca acqua e, rimestando continuamente, portare a volume.

AVVERTENZE D'USO
Nel caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

COMPATIBILITÀ
Il MANEZINE è compatibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari comunemente impiegati. Risulta incompatibile con la poltiglia solfocalcica, con i prodotti ad alto tenore di boro e con poltiglie alcaline in genere.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto è fitotossico per le varietà di pero sensibili al Mancozeb come: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. SU POMODORO TRATTAMENTI CONSENTITI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DA NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

MODO DI UTILIZZO DEI SACCHETTI IDOSOLUBILI

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto

MANEZINE

(POLVERE BAGNABILE)

Fungicida organico per la difesa delle colture agricole

MANEZINE Registrazione Ministero della Sanità n. 0356 del 15/01/1972

Composizione
MANCOZEB puro g. 80
Coformulanti q.b.a g. 100

CONTENUTO:
g 5-10-20-50-100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)

Stabilimenti di produzione
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a. - Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (Bergamo)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Cotignola (Ravenna)
TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (Siena)

IRRITANTE

Partita n. ....

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto per confezioni in sacchetti idrosolubili

MANEZINE

Fungicida organico per la difesa delle colture agricole in polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

MANEZINE Registrazione Ministero della Sanità n. 0356 del 15/01/1972

Composizione
MANCOZEB puro g. 80
Coformulanti q.b.a g. 100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)

IRRITANTE

Stabilimenti di produzione
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a. - Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (Bergamo)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Cotignola (Ravenna)
Partita n. ....

CONTENUTO: 10 g (1 s.i. x 10 g)–20 g (2 s.i. x 20 g) –50 g (1 s.i. x 50 g)-100 g (1 s.i. x 100 g)-100 g (2 s.i. x 50 g)
FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

Etichetta per sacchetti idrosolubili

MANEZINE

Fungicida organico per la difesa delle colture agricole in polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

MANEZINE Registrazione Ministero della Sanità n. 0356 del 15/01/1972

COMPOSIZIONE
MANCOZEB puro g. 80
Coformulanti q.b.a g. 100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

IRRITANTE

CONTENUTO: **10-20-50-100–250 g**

Partita n.

Stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a. - Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (Bergamo)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Cotignola (Ravenna)

AVVERTENZA:
LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE L'INVOLUCRO

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

MEVAXIL COMBI

Fungicida specifico per la lotta contro la peronospora della vite in polvere bagnabile

MEVAXIL COMBI Registrazione Ministero della Salute n. 11138 del 08/01/2002

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono

METALAXIL, puro	g. 10
FOLPET, puro	g. 40
Coformulanti q.b. a	g.100

CONTENUTO:
g 100-250-500 Kg 1-5-10-20

Partita n

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV ITALIA Srl - Fiano Romano (Roma)
Stabilimenti di produzione:
IQV industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles – Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA – UP SIFA – Caravaggio (BG)
STI Solfotecnica Italiana SpA – Cotignola (RA)
TORRE Srl - Torrenieri fraz. di Montalcino (SI)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL 10% e FOLPET 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL - Irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
FOLPET - Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); Interessamento dell'apparato cardio-circolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il **MEVAXIL COMBI** è un fungicida ad azione preventiva e curativa indicato per la lotta contro la **peronospora della vite** (da vino e da tavola). È dotato di azione bloccante ed impedisce lo sviluppo del micelio fungino se applicato subito dopo le infezioni. L'uso regolare del **MEVAXIL COMBI** consente di prevenire e contenere in misura apprezzabile gli attacchi di *Botrytis cinerea*, Escoriosi e Black-rot grazie alla presenza del Folpet.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il primo trattamento deve essere eseguito dopo il verificarsi della prima pioggia infettante; per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permetterà di mantenere delle cadenze fisse sganciate dalle piogge. Infatti anche le piogge abbondanti e ripetute non diminuiscono l'efficacia del trattamento. La traslocazione acropeta del **MEVAXIL COMBI** consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo tra un trattamento e l'altro.
Intervenire con **200 g/hl** di acqua fino ad allegagione avvenuta con intervalli cadenzati di 12 giorni.
Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione.
Per la lotta contemporanea contro l'oidio, miscelare il prodotto agli anticrittogamici previsti per questo scopo.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con polisolfuri, Tiram ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con oli minerali e polisolfuri.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

SU UVA DA TAVOLA SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. SULLE UVE DA VINO SOSPENDERE I TRATTAMENTI 40 GIORNI PRIMA DELLA VENDEMMIA PER NON OSTACOLARE LA FERMENTAZIONE DEI MOSTI.

Avvertenze: Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 24 e i tempi di carenza del formulato, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

Etichetta confezioni in sacchetti idrosolubili

MEVAXIL COMBI

(SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Fungicida specifico per la lotta contro la peronospora della vite in polvere bagnabile

MEVAXIL COMBI Registrazione Ministero della Salute n. 11138 del 08/01/2002

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
METALAXIL, puro g. 10
FOLPET, puro g. 40
Coformulanti q.b. a g.100

CONTENUTO:
Kg 1 (10 s.i. x 100 g)-Kg 1 (5 s.i. x 200 g)-Kg 1 (2 s.i. x 500 g)-Kg 1 (1 s.i. x 1 Kg)-Kg 2 (20 s.i. x 100 g)-Kg 2 (10 s.i. x 200 g)-Kg 2 (4 s.i. x 500 g)-Kg 2 (2 s.i. x 1 Kg)-Kg 5 (50 s.i. x 100 g)-Kg 5 (25 s.i. x 200 g)-Kg 5 (10 s.i. x 500 g)-Kg 5 (5 s.i. x 1 Kg)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV ITALIA Srl - Fiano Romano (Roma)
Stabilimenti di produzione:
IQV industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles – Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA – UP SIFA – Caravaggio (BG)
STI Solfotecnica Italiana SpA – Cotignola (RA)
TORRE Srl - Torrenieri fraz. di Montalcino (SI)

Partita n

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL 10% e FOLPET 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL - Irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
FOLPET - Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardio-circolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il **MEVAXIL COMBI** è un fungicida ad azione preventiva e curativa indicato per la lotta contro la **peronospora della vite** (da vino e da tavola). È dotato di azione bloccante ed impedisce lo sviluppo del micelio fungino se applicato subito dopo le infezioni. L'uso regolare del **MEVAXIL COMBI** consente di prevenire e contenere in misura apprezzabile gli attacchi di *Botrytis cinerea*, Escoriosi e Black-rot grazie alla presenza del Folpet.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il primo trattamento deve essere eseguito dopo il verificarsi della prima pioggia infettante; per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permetterà di mantenere delle cadenze fisse sganciate dalle piogge. Infatti anche le piogge abbondanti e ripetute non diminuiscono l'efficacia del trattamento. La traslocazione acropeta del **MEVAXIL COMBI** consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo tra un trattamento e l'altro.
Intervenire con **200 g/hl** di acqua fino ad allegagione avvenuta con intervalli cadenzati di 12 giorni.
Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione.
Per la lotta contemporanea contro l'oidio, miscelare il prodotto agli anticrittogamici previsti per questo scopo.

AVVERTENZE D'USO

Nel caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con polisolfuri, Tiram ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con oli minerali e polisolfuri.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

SU UVA DA TAVOLA SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. SULLE UVE DA VINO SOSPENDERE I TRATTAMENTI 40 GIORNI PRIMA DELLA VENDEMMIA PER NON OSTACOLARE LA FERMENTAZIONE DEI MOSTI.

Avvertenze: Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 24 e i tempi di carenza del formulato, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

MODO DI UTILIZZO DEI SACCHETTI IDROSOLUBILI

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

DL 65/2003 Set. 05

Etichetta formato ridotto

MEVAXIL COMBI

Fungicida specifico per la lotta contro la peronospora della vite in polvere bagnabile

MEVAXIL COMBI Registrazione Ministero della Salute n. 11138 del 08/01/2002

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
METALAXIL, puro g. 10
FOLPET, puro g. 40
Coformulanti q.b. a g.100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV ITALIA Srl - Fiano Romano (Roma)

CONTENUTO: **g 100** Partita n

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

Stabilimenti di produzione:
IQV industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles – Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA – UP SIFA – Caravaggio (BG)
STI Solfotecnica Italiana SpA – Cotignola (RA)
TORRE Srl – Torrenieri fraz. di Montalcino (SI)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL 10% e FOLPET 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL - Irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
FOLPET - Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardio-circolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003 Set. 05

Etichetta per sacchetti idrosolubili

MEVAXIL COMBI

(SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Fungicida specifico per la lotta contro la peronospora della vite in polvere bagnabile

MEVAXIL COMBI **Registrazione Ministero della Salute n. 11138 del 08/01/2002**

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
METALAXIL, puro g. 10
FOLPET, puro g. 40
Coformulanti q.b. a g. 100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

Partita n.
CONTENUTO: 100-200-500 g Kg 1

distribuito da:
IQV Italia Srl
Fiano Romano RM

Stabilimenti di produzione:
IQV industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles – Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA – UP SIFA **–** Caravaggio (BG)
STI Solfotecnica Italiana SpA – Cotignola (RA)
TORRE Srl - Torrenieri fraz. di Montalcino (SI)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

AVVERTENZA:
LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE L'INVOLUCRO

DL 65/2003 nov

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

MEVAXIL M

Fungicida sistemico e di contatto in polvere bagnabile

MEVAXIL M Registrazione Ministero della Salute n. 10985 del 12/07/2001

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
METALAXIL, puro g. 8
MANCOZEB, puro g. 64
Coformulanti q.b. a g.100

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
TORRE Srl – Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
STI Solfochimica Italiana SpA – Cotignola (RA)

IRRITANTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV ITALIA Srl – Fiano Romano RM

Partita n.

CONTENUTO: **g 100-250-500 Kg 1-5-10-25**

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL 8% e MANCOZEB 64% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL - Irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
MANCOZEB - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il MEVAXIL M è un fungicida sistemico e di contatto con effetto sia preventivo che curativo nei confronti di varie colture; esso consente un impiego a cadenze fisse ed anche piogge infettanti ripetute non ne diminuiscono l'azione anticrittogamica.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
VITE: contro Peronospora, Escoriosi, Black-rot impiegare 250 g/hl di acqua; intervenire alle prime piogge infettanti e proseguire con intervalli cadenzati di 14-18 giorni a seconda dell'andamento climatico.
TABACCO: contro Peronospora impiegare 300 g/hl di acqua dopo che la coltura ha superato la crisi post-trapianto con trattamenti cadenzati di 10 giorni l'uno dall'altro.
Si consiglia di trattare in semenzaio 1-2 giorni prima della messa a dimora al fine di evitare eventuali infezioni.
POMODORO: contro Peronospora impiegare 250 g/hl di acqua; intervenire solo fino alla prima fioritura con intervalli di 15 giorni tra i trattamenti.

Rispettare rigorosamente le norme di impiego anche per contrastare i ceppi resistenti. Qualora insorga la resistenza ricorrere all'impiego di un fungicida di copertura.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SU VITE E TABACCO SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. SU POMODORO TRATTAMENTI CONSENTITI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON IMPIEGARE SU VIVAI DI VITE
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

DL 65/2003

Etichetta confezioni in sacchetti idrosolubili/foglio illustrativo

MEVAXIL M

(SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Fungicida sistemico e di contatto in polvere bagnabile

MEVAXIL M Registrazione Ministero della Salute n. 10985 del 12/07/2001

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
METALAXIL, puro g. 8
MANCOZEB, puro g. 64
Coformulanti q.b. a g.100

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a. Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
TORRE Srl – Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
STI Solfochimica Italiana SpA – Cotignola (RA)

IRRITANTE

Partita n.

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)

distribuito da:
IQV ITALIA Srl – Fiano Romano RM

CONTENUTO:
100 g (1 s.i. x 100 g) - 200 g (2 s.i. x 100 g) - 200 g (1 s.i. x 200 g) -250 g (1 s.i. x 250 g) - 500 g (5 s.i. x 100 g) 500 g (2 s.i. x 250 g) - 500 g (1 s.i. x 500 g)–1 Kg (10 s.i. x 100 g) 1 Kg (5 s.i. x 200 g) -1 Kg (4 s.i. x 250 g) - 1 Kg (2 s.i. x 500 g) - 5 Kg (10 s.i. x 500 g)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL 8% e MANCOZEB 64% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL - Irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
MANCOZEB - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il MEVAXIL M è un fungicida sistemico e di contatto con effetto sia preventivo che curativo nei confronti di varie colture; esso consente un impiego a cadenze fisse ed anche piogge infettanti ripetute non ne diminuiscono l'azione anticrittogamica.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE: contro Peronospora, Escoriosi, Black-rot impiegare 250 g/hl di acqua; intervenire alle prime piogge infettanti e proseguire con intervalli cadenzati di 14-18 giorni a seconda dell'andamento climatico.
TABACCO: contro Peronospora impiegare 300 g/hl di acqua dopo che la coltura ha superato la crisi post-trapianto con trattamenti cadenzati di 10 giorni l'uno dall'altro.
Si consiglia di trattare in semenzaio 1-2 giorni prima della messa a dimora al fine di evitare eventuali infezioni.
POMODORO: contro Peronospora impiegare 250 g/hl di acqua; intervenire solo fino alla prima fioritura con intervalli di 15 giorni tra i trattamenti.

AVVERTENZE D'USO

Nel caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

Rispettare rigorosamente le norme di impiego anche per contrastare i ceppi resistenti. Qualora insorga la resistenza ricorrere all'impiego di un fungicida di copertura.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SU VITE E TABACCO SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. SU POMODORO TRATTAMENTI CONSENTITI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON IMPIEGARE SU VIVAI DI VITE
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

MODO DI UTILIZZO DEI SACCHETTI IDROSOLUBILI

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

DL 65/2003 Set. 05

Etichetta formato ridotto per confezioni in sacchetti idrosolubili

MEVAXIL M

(SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Fungicida sistemico e di contatto in polvere bagnabile

MEVAXIL M Registrazione Ministero della Salute n. 10985 del 12/07/2001

COMPOSIZIONE
100 grammi di procotto contengono
METALAXIL, puro g. 8
MANCOZEB, puro g. 64
Coformulanti q.b. a g.100

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
TORRE Srl – Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
STI Solfochimica Italiana SpA – Cotignola (RA)

IRRITANTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV ITALIA Srl – Fiano Romano RM

CONTENUTO:
100 g (1 s.i. x 100 g)
Partita n.

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL 8% e MANCOZEB 64% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL - Irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
MANCOZEB - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003 Set. 05

Etichetta formato ridotto

MEVAXIL M

Fungicida sistemico e di contatto in polvere bagnabile

MEVAXIL M Registrazione Ministero della Salute n. 10985 del 12/07/2001

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
METALAXIL, puro g. 8
MANCOZEB, puro g. 64
Coformulanti q.b. a g.100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

Partita n.

CONTENUTO:
g 100

distribuito da:
IQV ITALIA Srl
Fiano Romano RM

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA
U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
TORRE Srl
Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
STI Solfochimica Italiana SpA
Cotignola (RA)

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL 8% e MANCOZEB 64% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL - Irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
MANCOZEB - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003 Set 05

Etichetta per sacchetti idrosolubili

MEVAXIL M

(SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Fungicida sistemico e di contatto in polvere bagnabile

MEVAXIL M Registrazione Ministero della Salute n. 10985 del 12/07/2001

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono	
METALAXIL, puro	g. 8
MANCOZEB, puro	g. 64
Coformulanti q.b. a	g. 100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

IRRITANTE

CONTENUTO:
100 g - 200 g - 250 g - 500 g

Partita n.

distribuito da:
IQV Italia Srl
Fiano Romano RM

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a. - Mollet del Valles Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
TORRE Srl – Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
STI Solfochimica Italiana SpA – Cotignola (RA)

AVVERTENZA:
LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE L'INVOLUCRO

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

MEVAXIL R

Fungicida sistemico e di contatto in sospensione concentrata

MEVAXIL R Registrazione Ministero della Sanità n. 10989 del 12/07/2001

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
METALAXIL, puro g. 3,5 (= 49 g/l)
RAME METALLO g. 18,5 (=259 g/l)
(da idrossido di rame)
Coformulanti q.b. a g.100

CONTENUTO:
ml 100-250-500 litri 1-5-10-20

Partita n

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV ITALIA Srl - Fiano Romano RM
Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
Stabilimenti di confezionamento:
DIACHEM SpA
U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
ALTHALLER ITALIA Srl
San Colombano al Lambro (MI)
TORRE Srl
Torrenieri, fraz.di Montalcino (SI)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL 3,5% e Rame metallo 18,5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL - Irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
RAME - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il MEVAXIL R è un fungicida sistemico e di contatto ad azione sia preventiva che curativa nei confronti delle seguenti colture:
VITE: contro Peronospora impiegare 400 ml/hl effettuando 2-4 trattamenti ogni 14 giorni dall'epoca di pre-fioritura.
MELO: contro Fitoftora impiegare 100-150 ml/pianta, con l'aggiunta di un bagnante alla dose di 200 ml/ha. Bagnare bene la zona del colletto ed il terreno sottostante oppure distribuire con fertirrigazione. In caso di forti attacchi effettuare spennellature al tronco con soluzione al 20%.
SOIA: contro Peronospora e Fitoftora impiegare 4 l/ha effettuando 2-3 trattamenti ogni 10-14 giorni.
POMODORO: contro Peronospora impiegare 400 ml/hl effettuando 4 trattamenti ogni 14 giorni.
PATATA: contro Peronospora impiegare 3-4 l/ha effettuando 2-3 trattamenti ogni 10-14 giorni.
FRAGOLA: contro Fitoftora impiegare 3-4 l/ha effettuando 2 trattamenti 15-20 giorni dopo l'impianto e 30 giorni dopo. Eventualmente immergere le piantine prima dell'impianto in una soluzione al 3%.
ALTRE ORTICOLE (LATTUGA, CARCIOFO, CAVOLO VERZA, MELONE, COCOMERO): contro Peronospora, Alternaria, Bremia impiegare 3-4 l/ha effettuando 2-3 trattamenti ogni 10-14 giorni.

COMPATIBILITÀ

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare durante la fioritura. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER MELO, CARCIOFO, POMODORO, LATTUGA, PATATA, COCOMERO, MELONE; 28 GIORNI PER VITE; 40 GIORNI PER FRAGOLA; 60 GIORNI PER CAVOLO VERZA; 150 GIORNI PER SOIA.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DT 65/2003

Etichetta formato ridotto

MEVAXIL R

Fungicida sistemico e di contatto in sospensione concentrata

MEVAXIL R Registrazione Ministero della Sanità n. 10989 del 12/07/2001

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
METALAXIL, puro g. 3,5 (= 49 g/l)
RAME METALLO g. 18,5 (=259 g/l)
(da idrossido di rame)
Coformulanti q.b. a g.100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV ITALIA Srl – Fiano Romano RM

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

CONTENUTO: **ml 100** Partita n

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
Stabilimenti di confezionamento:
DIACHEM SpA
U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
ALTHALLER ITALIA Srl
San Colombano al Lambro (MI)
TORRE Srl
Torrenieri, fraz.di Montalcino (SI)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL 3,5% e Rame metallo 18,5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL - Irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
RAME - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003 Set. 05

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PROCARB

(CONCENTRATO SOLUBILE)

Fungicida ad azione sistemica

Registrazione del Ministero della Salute n. 11298 del 24/04/2002

Composizione
PROPAMOCARB cloroidrato g. 66,5 (=722 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

Contenuto netto: **0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-20 L**
Partita n.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a. Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)
TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA – Caravaggio (BG)
ALTHALLER ITALIA srl - S. Colombano al Lambro (MI)

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)

distribuito da:
IQV ITALIA Srl
Via del Progresso, 2 - Fiano Romano (Roma)

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Fungicida sistemico indicato nella difesa di numerose colture nel combattere i seguenti ficomiceti: Pythium spp., Phytophtora sp., Peronospora, Pseudoperonospora, Aphanomices sp., Bremia.
Viene assorbito prevalentemente dalle radici e poi traslocato nell'apparato fogliare, caratterizzato da una lunga e completa protezione ed elevata selettività sulle colture manifestando, su esse, uno stimolo nei confronti della radicazione e sullo sviluppo vegetativo.
Il prodotto ha la caratteristica di poter essere impiegato con numerose tecniche quali: trattamenti fogliari, concia delle sementi, bagno dei bulbi e delle talee, disinfezione dei terricciati e dei letti di semina, trattamenti al terreno in pre e post-trapianto delle colture.
Viene impiegato sulle seguenti colture: **agrumi, melo, pero, fragola, cavoli, lattuga, cicoria, indivia, radicchio, spinacio, bietola da foglia e da costa, sedano, prezzemolo, basilico, cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo), solanacee (pomodoro, peperone, melanzana), carota, bietola da orto, rapa, cipolla, aglio, porro, tabacco, floreali, forestali, ornamentali, nei vivai, nei semenzai, nella concia delle sementi e bulbi, campi da golf e prati ornamentali**.
Interventi:
Trattamenti fogliari: viene impiegato alla dose di litri 1,5-3 per ettaro di coltura in circa 15-20 ettolitri di acqua, sulle colture sopra menzionate.
Concia delle sementi: la dose d'impiego è di ml 1-4 per kg di seme di piccole dimensioni e ml 10-40 per kg di seme di dimensioni maggiori.
Preparazione dei terricciati: impiegare 300 ml di prodotto per metro cubo di terriccio, disciolti in circa 20 litri di acqua.
Trattamenti ai semenzai: impiegare ml 8-12 per metro quadro di superficie disciolti in 4-5 litri di acqua con l'avvertenza di ripetere il trattamento cinque giorni prima del trapianto con l'utilizzo di 6-8 litri di acqua per metro quadrato.
Trattamenti al terreno
- pre-trapianto: impiegare ml 8-12 per metro quadro in 3-5 litri di acqua;
- post-trapianto: impiegare 100-200 ml per pianta di una soluzione ottenuta diluendo 200 ml di prodotto per hl d'acqua: trattare ogni 10-15 giorni con un massimo di 3-4 interventi.

Colture floreali in generale: Informazioni particolareggiate per le seguenti colture: Garofano - Gerbera: si impiega il prodotto specificatamente contro Pythium e Phytophtora alla dose di ml 12-15 per metro quadro disciolto in circa 2-4 litri di acqua, trattando due giorni prima dell'impianto e quindi procedendo all'incorporamento. Successivamente impiegare 200 ml per hl d'acqua, con trattamento fogliare, bagnando abbondantemente con 400-500 litri ogni 1000 metri quadri, ad intervalli inizialmente di circa 8-10 giorni e successivamente ogni 15-25 giorni.
Bulbose: per controllare Pythium ultimum e Phytophtora si immergono i bulbi per 20-30 minuti in una soluzione contenente 300 ml di prodotto per hl d'acqua, poi, prima della messa a dimora, si tratta il terreno con 10-12 ml di prodotto per metro quadrato in 2-4 litri di acqua e successivo incorporamento a circa 10-12 cm di profondità.
Piante forestali (vivai): contro Phytophtora cactorum, Phytophtora cinnamoni e Pythium, intervenendo trattando il substrato colturale con 300 ml di prodotto per metro cubo, disciolto in 8-10 litri di acqua; si deve intervenire, in caso di necessità, ogni 15-18 giorni con 200 ml di prodotto in 4-5 litri di acqua per metro quadro.
Campi da golf, tappeti erbosi e prati ornamentali: per il controllo di Pythium aphanidermatum ed altre specie, trattare con interventi fogliari a ml 1-1,5 per metro quadro, impiegando non meno di 100-200 litri di soluzione per 1000 mq. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia ripetendo i trattamenti ogni 14-15 giorni.

Avvertenza: I semi trattati o residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e/o del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

COMPATIBILITÀ

Non compatibile con i prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, poltiglia bordolese) e gli olii minerali.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto

PROCARB

(CONCENTRATO SOLUBILE)
Fungicida ad azione sistemica

Registrazione del Ministero della Salute n. 11298 del 24/04/2002

Composizione
PROPAMOCARB clorcidrato g. 66,5 (=722 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

Contenuto netto: **100 ml**
Partita n.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)

distribuito da:
IQV ITALIA Srl
Via del Progresso, 2 - Fiano Romano (Roma)

Stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)
TORRE Srl
Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
DIACHEM SpA
Unità Produttiva SIFA – Caravaggio (BG)
ALTHALLER ITALIA srl
S. Colombano al Lambro (MI)

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003 Set. 05

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

SEET

(EMULSIONE CONCENTRATA)

Fungicida organico per la lotta contro l'oidio (mal bianco), della vite, del melo, contro l'oidio e le ruggini dei cereali (grano, orzo) e degli ortaggi (peperone, pomodoro, cetriolo, melone, zucchino).

Registrazione del Ministero della Salute n. 11263 del 04/04/2002

Composizione
Triadimenol puro g 22,9 (=249,61 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a. - Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
ALTHALLER ITALIA Srl – S. Colombano al Lambro (Milano)
TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV ITALIA Srl – Fiano Romano (Roma)
SARIAF SpA – Via Morgagni, 68 – Faenza (RA)
Partita n. ..
Contenuto netto: 25-50-100-250-500 ml 1-5 Litri

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Norme precauzionali: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallegico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Avvertenze: Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
SEET è un fungicida sistemico ad azione preventiva, curativa ed eradicante. È efficace contro l'oidio di vite, melo e colture orticole (peperone, pomodoro, cetriolo, melone e zucchino) e contro l'oidio e le ruggini dei cereali (grano, orzo).
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Vite: contro l'oidio 0,008-0,015% (8-15 ml in 100 litri di acqua).
Melo: contro l'oidio 0,01-0,02% (10-20 ml in 100 litri di acqua).
Melone, Cetriolo, Zucchino, Peperone e Pomodoro: contro mal bianco 0,01-0,02% (10-20 ml in 100 litri di acqua).
N.B. Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione (normalmente 10-15 hl/ha per vite). Usare la dose più elevata nei casi di maggiore sensibilità varietale, in zone particolarmente soggette agli attacchi di Oidio e quando gli intervalli tra i trattamenti sono superiori a 10 giorni.
Cereali (grano e orzo): contro mal bianco e ruggini 0,4-0,5 l/ha diluiti in 600-800 litri di acqua. Intervenire preventivamente dalla fase di spigatura fino alla fioritura oppure alla comparsa dei primi sintomi.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è miscibile con fungicidi ed insetticidi a reazione neutra.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto per zucchino, 14 giorni prima del raccolto per altri ortaggi, vite e melo, 30 giorni prima del raccolto per cereali.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto

SEET

(EMULSIONE CONCENTRATA)

Fungicida organico per la lotta contro l'oidio (mal bianco), della vite, del melo, contro l'oidio e le ruggini dei cereali (grano, orzo) e degli ortaggi (peperone, pomodoro, cetriolo, melone, zucchino).

Registrazione del Ministero della Salute n. 11263 del 04/04/2002

Composizione
Triadimenol puro g 22,9 (=249,61 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Partita n….

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

Stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
ALTHALLER ITALIA Srl – S. Colombano al Lambro (Milano)
TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

distribuito da:
IQV ITALIA Srl – Fiano Romano (Roma)
SARIAF SpA - Via Morgagni, 68 – Faenza (RA)

Contenuto netto: **25-50-100 ml**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Norme precauzionali: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallegico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Avvertenze: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003 sett. 05

SICURAM 50 WDG Etichetta/foglio illustrativo

Fungicida microgranulare idrodispersibile ad ampio spettro di azione

SICURAM 50 WDG Registrazione Ministero della Sanità n. 11567 del 22/01/2003

COMPOSIZIONE
RAME metallico g. 50
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)
Coformulanti q.b. a g.100

Partita n

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 - Roma

Stabilimento di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)

CONTENUTO: **g 100-250-500 Kg 1-5-10-25**

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il **SICURAM 50 WDG** è un fungicida che agisce per contatto e si impiega nella lotta preventiva contro un gran numero di parassiti fungini sensibili al rame. Il prodotto inoltre è efficace contro numerose Batteriosi che attaccano le colture frutticole ed orticole. Grazie alla particolare formulazione in microgranuli idrodispersibili il **SICURAM 50 WDG** è dotato di elevata efficacia, adesività e persistenza di azione.

MODALITÀ, DOSI E CAMPI D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega con pompe a volume normale, iniziando i trattamenti prima della comparsa della malattia e ripeterli secondo le necessità.

VITE: contro **Peronospora 250 g/hl** di acqua. Effettuare i normali trattamenti sulla base dei calendari di lotta comunemente usati in zona. Impiegare il prodotto preferibilmente dopo la fioritura della vite usando, prima della fioritura ed in fioritura, fungicidi acuprici. In zone ed in annate con forti infezioni di Peronospora si può opportunamente aumentare la dose d'impiego a **300-400 g/hl**. Contro l'**Oidio** aggiungere un antioidico specifico (zolfo bagnabile, ecc.).

MELO, PERO, COTOGNO: contro **Ticchiolatura** e **Cancri rameali 0,5-0,7 Kg/hl** in trattamenti autunnali o di fine inverno, **200-250 g/hl** in trattamenti pre-fiorali.

DRUPACEE in genere e **MANDORLO**: contro **Bolla**, **Corineo** e **Cancri rameali** (trattamenti invernali) **0,5-0,7 kg/hl**. Su **albicocco** contro **Sclerotinia** nei trattamenti pre-fiorali **200-250 g/hl**, nei trattamenti post-fiorali **250-400 g/hl**. **Ciliegio**: contro **Sclerotinia**, **Corineo e Scopazzi** nei trattamenti pre-fiorali **05-0,7 Kg/hl**.

OLIVO: contro **Occhio di pavone** e **Lebbra 250-400 g/hl**.

AGRUMI: contro **Mal secco**, **Antracnosi** e **Fumaggine 250-400 g/hl**.

ACTINIDIA: contro **Marciume del colletto 400 g/hl**. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.

FRAGOLA: contro **Maculatura rosso-bruna** e **zonata** (Marssonina e Gnomonia), **Vaiolatura rossa** (Mycosphaerella), intervenire in pre-fioritura e sulla vegetazione autunnale con **300 g/hl**.

FRUTTIFERI MINORI ED A GUSCIO: contro **Cancri rameali** in trattamenti autunnali o di fine inverno **400 g/hl**, in trattamenti primaverili **200 g/hl**.

PATATA: contro **Peronospora** ed altre crittogame parassite (**Alternaria**, **Septoria**) **400 g/hl**.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro **Cercospora 3,5 Kg/ha** in 500-600 litri di acqua in trattamenti ripetuti 2-3 volte secondo l'andamento della malattia.

ORTAGGI (cavoli, carciofo, asparago, ortaggi a foglia, cucurbitacee, solanacee, legumi, ortaggi a radice, ortaggi a bulbo):

- contro **Peronospora**, **Alternaria**, **Septoria**, **Cladosporiosi** del pomodoro **300 g/hl**.
- contro **Cercospora** e **Septoria** del sedano e della carota **300 g/hl**.
- contro **Peronospora** ed **Antracnosi** del melone, anguria, zucchino e cetriolo **300 g/hl**.
- contro **Antracnosi** e **Ruggine** del pisello, fagiolo, fagiolino **300 g/hl**.
- contro **Peronospora** del cavolo e di altre crucifere **300 g/hl**.

OLEAGINOSE: contro **Peronospora** e **Antracnosi 300 g/hl**.

TABACCO: contro **Peronospora** e **Antracnosi 300-400 g/hl**.

FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI: contro **Ruggine**, **Peronospora**, **Ticchiolatura**, **Septoria** di colture floreali (**garofano, rosa, crisantemo**), ornamentali e forestali **250 g/hl**.

Per tutti gli impieghi sopra indicati iniziare i trattamenti prima della comparsa delle malattie e ripetere i trattamenti secondo lo sviluppo delle stesse.

RISO: per la lotta contro le **alghe delle risaie** intervenire alla prima comparsa delle alghe, impiegando **3-3,5 Kg/ha** diluiti in 200-300 o più litri di acqua.

Preparazione della poltiglia: introdurre la dose prestabilita di prodotto nella botte dell'irroratrice parzialmente riempita di acqua, mescolando accuratamente, quindi aggiungere la restante parte d'acqua fino al volume desiderato.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina come polisolfuri e calce.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenze: per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

FITOTOSSICITÀ

Non devono essere effettuati trattamenti durante la fioritura. Su pesco, susino e alcune varietà di Melo (Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Su tutte le colture orticole e floreali, visto l'elevato numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare un saggio prima dell'impiego su larga scala.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

Etichetta formato ridotto

SICURAM 50 WDG

Fungicida microgranulare idrodispersibile ad ampio spettro di azione

SICURAM 50 WDG Registrazione Ministero della Sanità n. 11567 del 22/01/2003

COMPOSIZIONE
RAME metallico g. 50
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)
Coformulanti q.b. a g.100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 - Roma

CONTENUTO: **g 100**

Partita n

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Stabilimento di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

VIRONEX 30 MICRO

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Fungicida citotropico translaminare impiegato su vite, carciofo, pomodoro, patata e tabacco contro la Peronospora

VIRONEX 30 BORDO Registrazione del Ministero della Salute n. 11297 del 24/04/2002

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
CIMOXANIL puro g. 30
Coformulanti q.b. a g. 100

Stabilimenti di produzione:
IQV industrias Quìmicas del Valles s.a.
Mollet del Valles – Barcellona (Spagna)
A.D.I.C.A. srl – Nera Montoro (TR)
STI Solfotecnica Italiana SpA
Cotignola (RA)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV ITALIA Srl
Fiano Romano (Roma)
CONTENUTO:
0,1–0,2–0,25–0,5–1–5–10-15-20 Kg
Partita n

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI, CAMPI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il VIRONEX 30 WDG è un fungicida in formulazione di microgranuli idrodispersibili ad azione citotropica translaminare indicato per il trattamento contro la Peronospora; possiede una persistenza d'azione di circa 5 giorni.

VITE: contro la Peronospora alla dose di g 65-80 per hl di acqua trattando da quando si hanno le infezioni della malattia e fino alla fine della fioritura. Quindi dall'allegagione impiegare g 30-40 per hl di acqua miscelato con i prodotti di copertura quali i rameici, i ditiocarbammati ed il Folpet a un dosaggio pari al 60-70% della dose comunemente impiegata.

CARCIOFO, PATATA, POMODORO, CIPOLLA, AGLIO, PORRO, GIRASOLE, SOIA, LATTUGA, ROSA, ZUCCHINO, MELONE, PISELLO, SPINACIO, TABACCO: contro la Peronospora a g 65-80 per hl di acqua, iniziando al verificarsi delle condizioni di infezioni e proseguendo. Nel caso di infezioni in atto effettuare due trattamenti ravvicinati alla dose più alta (5-7 giorni l'uno dall'altro). Si può ridurre la dose a g 30-40 per hl di acqua se si effettuano trattamenti in miscela con rameici o ditiocarbammati, comunque tenere presente che la dose minima riferita ad ettaro non deve essere inferiore ai 400 g/ettaro.

COMPATIBILITÀ

Non compatibile con i prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese) e gli olii minerali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Quando si tratta tenere lontano gli animali domestici e il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO DI GIRASOLE E SOIA; 21 GIORNI PER IL CARCIOFO; 10 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto

VIRONEX 30 MICRO

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Fungicida citotropico translaminare impiegato su vite, carciofo, pomodoro, patata e tabacco contro la Peronospora

VIRONEX 30 BORDO Registrazione del Ministero della Salute n. 11297 del 24/04/2002

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
CIMOXANIL puro g. 30
Coformulanti q.b. a g. 100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV ITALIA Srl - Fiano Romano (Roma)

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

CONTENUTO: **100 g** Partita n.......

Stabilimenti di produzione:
IQV industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles – Barcellona (Spagna)
A.D.I.C.A. srl – Nera Montoro (TR)
STI Solfotecnica Italiana SpA
Cotignola (RA)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003 Set. 05

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

VIRONEX MZ

Fungicida in polvere bagnabile contro la peronospora della vite, del pomodoro, del tabacco e della rosa

VIRONEX MZ Registrazione Ministero della Salute n. 11285 del 12/04/2002

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
CIMOXANIL puro g. 4
MANCOZEB puro g. 40
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

distribuito da:
IQV ITALIA Srl
Fiano Romano (Roma)

STABILIMENTI DI PRODUZIONE (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a. Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA Cotignola (Ravenna)
TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
A.D.I.C.A. Srl – Nera Montoro (TR)
STABILIMENTO DI CONFEZIONAMENTO: **LIFA srl** – Isola Vicentina (VI)

CONTENUTO:
g 100-250-500-750 Kg 1-5-10-20-25

Partita n

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4% e Mancozeb 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il VIRONEX MZ è un fungicida formulato in polvere bagnabile efficace contro la Peronospora della **VITE**, del **POMODORO**, del **TABACCO** e della **ROSA** che agisce sia per penetrazione fogliare che per contatto. Il VIRONEX MZ può essere utilizzato per tutta la stagione secondo il calendario antiperonosporico.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE: contro Peronospora impiegare g 200-300 di VIRONEX MZ per ettolitro di acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infestazioni peronosporiche e proseguire con intervalli di 8-10 giorni fino a quando persistono condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. In condizioni particolarmente critiche gli intervalli possono essere accorciati.

POMODORO (fino alla prima fioritura): contro Peronospora impiegare g 250-300 di VIRONEX MZ per ettolitro di acqua. In presenza di attacchi di Peronospora ed Alternaria aumentare la dose fino a g 300-350 per ettolitro di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere della malattia, ripetendoli ogni 6-10 giorni o in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo.

TABACCO: contro Peronospora impiegare g 300-350 di VIRONEX MZ per ettolitro di acqua. La dose più alta è consigliabile in caso di forti attacchi su varità particolarmente sensibili. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere della malattia, ripetendoli ogni 6-10 giorni o in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo.

ROSA: contro Peronospora impiegare g 250-300 di VIRONEX MZ per ettolitro di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere della malattia, ripetendoli ogni 6-10 giorni o in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo.

COMPATIBILITÀ

Il VIRONEX MZ è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. Non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. SU POMODORO TRATTAMENTI CONSENTITI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

Etichetta confezioni in sacchetti idrosolubili/foglio illustrativo

VIRONEX MZ

(SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Fungicida in polvere bagnabile contro la peronospora della vite, del pomodoro, del tabacco e della rosa

VIRONEX MZ Registrazione Ministero della Salute n. 11285 del 12/04/2002

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
CIMOXANIL puro g. 4
MANCOZEB puro g. 40
Coformulanti q.b. a g. 100

distribuito da:
IQV ITALIA Srl - Fiano Romano (Roma)

Partita n

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81 - 08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA
Cotignola (Ravenna)
TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
DIACHEM SpA
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

CONTENUTO: 100 g (1 s.i. x 100 g) - 200 g (2 s.i. x 100 g) - 250 g (1 s.i. x 250 g) - 300 g (3 s.i. x 100 g) - 500 g (5 s.i. x 100 g) - 500 g (2 s.i. x 250 g) - 700 g (1 s.i. x 500 g e 2 s.i. x 100 g) - 750 g (3 s.i. x 250 g) - 1 Kg (10 s.i. x 100 g) – 1 Kg (4 s.i. x 250 g) - 1 Kg (2 s.i. x 500 g) - 1 Kg (1 s.i. x 1000 g) – 2,5 Kg (10 s.i. x 250 g) – 5 K g (20 s.i. x 250 g) - 5 Kg (5 s.i. x 1 Kg) - 10 Kg (10 s.i. x 1 Kg) - 20 Kg (20 s.i. x 1 Kg)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4% e Mancozeb 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il VIRONEX MZ è un fungicida formulato in polvere bagnabile efficace contro la Peronospora della **VITE**, del **POMODORO**, del **TABACCO** e della **ROSA** che agisce sia per penetrazione fogliare che per contatto. Il VIRONEX MZ può essere utilizzato per tutta la stagione secondo il calendario antiperonosporico.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE: contro Peronospora impiegare g 200-300 di VIRONEX MZ per ettolitro di acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infestazioni peronosporiche e proseguire con intervalli di 8-10 giorni fino a quando persistono condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. In condizioni particolarmente critiche gli intervalli possono essere accorciati.

POMODORO (fino alla prima fioritura): contro Peronospora impiegare g 250-300 di VIRONEX MZ per ettolitro di acqua. In presenza di attacchi di Peronospora ed Alternaria aumentare la dose fino a g 300-350 per ettolitro di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere della malattia, ripetendoli ogni 6-10 giorni o in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo.

TABACCO: contro Peronospora impiegare g 300-350 di VIRONEX MZ per ettolitro di acqua. La dose più alta è consigliabile in caso di forti attacchi su varietà particolarmente sensibili. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere della malattia, ripetendoli ogni 6-10 giorni o in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo.

ROSA: contro Peronospora impiegare g 250 300 di VIRONEX MZ per ettolitro di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere della malattia, ripetendoli ogni 6-10 giorni o in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo.

AVVERTENZE D'USO

Nel caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

COMPATIBILITÀ

Il VIRONEX MZ è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. Non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. SU POMODORO TRATTAMENTI CONSENTITI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

MODO DI UTILIZZO DEI SACCHETTI IDROSOLUBILI

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

DL 65/2003 Set. 05

Etichetta ridotta per confezioni in sacchetti idrosolubili

VIRONEX MZ

(SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Fungicida in polvere bagnabile contro la peronospora della vite, del pomodoro, del tabacco e della rosa

VIRONEX MZ Registrazione Ministero della Salute n. 11285 del 12/04/2002

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
CIMOXANIL puro g. 4
MANCOZEB puro g. 40
Coformulanti q.b. a g. 100

Partita n

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81 - 08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV ITALIA Srl - Fiano Romano (Roma)

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA
Cotignola (Ravenna)
TORRE Srl
Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
DIACHEM SpA
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

CONTENUTO: **100 g (1 s.i. x 100 g)**

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4% e Mancozeb 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003 Set. 03

Etichetta formato ridotto

VIRONEX MZ

Fungicida in polvere bagnabile contro la peronospora della vite, del pomodoro, del tabacco e della rosa

VIRONEX MZ Registrazione Ministero della Salute n. 11285 del 12/04/2002

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
CIMOXANIL puro g. 4
MANCOZEB puro g. 40
Coformulanti q.b. a g. 100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

distribuito da: **IQV ITALIA Srl** - Fiano Romano (Roma)

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONTENUTO: **g 100** Partita n. …

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

STABILIMENTI DI PRODUZIONE (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA
Cotignola (Ravenna)
TORRE Srl
Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
DIACHEM SpA
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
A.D.I.C.A. Srl – Nera Montoro (TR)
STABILIMENTO DI CONFEZIONAMENTO:
LIFA srl – Isola Vicentina (VI)

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4% e Mancozeb 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003 Set. 05

Etichetta per sacchetti idrosolubili

VIRONEX MZ

(SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Fungicida in polvere bagnabile contro la peronospora della vite, del pomodoro, del tabacco e della rosa

VIRONEX MZ Registrazione Ministero della Salute n. 11285 del 12/04/2002

COMPOSIZIONE

CIMOXANIL puro	g. 4
MANCOZEB puro	g. 40
Coformulanti q.b.a	g. 100

Partita n.

CONTENUTO: 100-250-500-1000 g

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

distribuito da:
IQV Italia Srl - Fiano Romano RM

IRRITANTE

Stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.- Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Cotignola (RA)

AVVERTENZA:
LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE L'INVOLUCRO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

DL 65/2003 nov

FESIL R micro

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Fungicida sistemico e di copertura

FESIL R micro Registrazione Ministero della Salute n. 11429 del 16/09/2003

COMPOSIZIONE
FOSETIL ALLUMINIO puro g 25
RAME METALLO puro g 25
(da rame idrossido)
Coformulanti q.b. a g 100

CONTENUTO: **0,250 ,0,500 - 1 - 5 - 10 - 25 Kg** Partita n....

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV ITALIA Srl – Fiano Romano (Roma)
Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
Stabilimenti di confezionamento:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA
Cotignola (Ravenna)
A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (Terni)

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: - Fosetil alluminio 25% - Rame 25%, le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: FOSETIL ALLUMINIO: sedazione, dispnea, depressione. RAME: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
TERAPIA: Sintomatica
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

FESIL R micro è un fungicida antiperonosporico ad ampio spettro di azione dotato sia di azione sistemica, in grado di proteggere anche la vegetazione che si forma successivamente ai trattamenti, che di copertura. La presenza di rame conferisce al prodotto una apprezzabile attività di contenimento delle batteriosi. Grazie a queste sue caratteristiche il prodotto può venire normalmente impiegato ad intervalli più ampi rispetto ai fungicidi tradizionali di contatto.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega in trattamenti preventivi per la difesa di:
Vite: contro Peronospora, Escoriosi, Antracnosi, Blackrot intervenendo preventivamente ogni 10-14 giorni 400-500 g/hl.
Pesco: contro Bolla, Corineo, Cancri rameali, Batteriosi 400-500 g/hl nei trattamenti autunnali alla caduta delle foglie e di fine inverno prima del rigonfiamento delle gemme.
Agrumi (arancio, mandarino, limone, pompelmo): contro Phytophtora spp. (Gommosi parassitaria del colletto e Allupatura dei frutti), Antracnosi e Mal secco, Fumaggini irrorazioni fogliari a 500 g/hl.
Melo, pero: contro Antracnosi e Alternaria, Cancri rameali, Batteriosi in trattamenti primaverili-estivi 3-5 Kg/Ha.
Actinidia: contro Peronospora 4-5 Kg/Ha.
Fragola: contro Vaiolatura rossa, Batteriosi 150-200 g/hl.
Pomodoro: contro Peronospora, Alternaria, contenimento delle Batteriosi 4-5 Kg/Ha.
Carciofo: contro Peronospora e contenimento delle Batteriosi 4-5 Kg/Ha.
Lattuga: contro Antracnosi, Alternaria, Cladosporiosi, Ascochita 150-200 g/hl.
Intervenire alla prima comparsa dei sintomi.
Melone, cocomero, cetriolo: contro Peronospora 5 Kg/Ha.
Spinacio: contro Peronospora, Antracnosi, Cladosporiosi 150-200 g/hl.
Vivai di fruttiferi e ornamentali: contro Peronospora, Alternarie, Antracnosi, Batteriosi, Cancri rameali 400-600 g/hl.
Si consiglia di trattare ad intervalli di 8-10 giorni, se si impiega la dose inferiore, e 12 giorni con il dosaggio più elevato

Preparazione della poltiglia: sciogliere la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con i prodotti a forte reazione acida o alcalina, i prodotti in formulazione oleosa, i concimi fogliari a base azotata e i formulati a base di Dicofol. In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela, preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego. AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare la vite in fioritura.

Sospendere i trattamenti: 30 giorni prima della raccolta su fragola; 40 giorni prima della raccolta su melo, pero, actinidia, pesco, vite e tabacco; 80 giorni prima della raccolta su arancio, mandarino, limone, pompelmo; 20 giorni prima della raccolta su altre colture.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.
Avvertenza: Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle; non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento; non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

Etichetta/foglio illustrativo

VIRONEX R

Fungicida citotropico in polvere bagnabile

VIRONEX R Registrazione Ministero della Salute n. 11134 del 08/02/2002

COMPOSIZIONE
RAME METALLO g. 20
(sotto forma di Ossicloruro)
CIMOXANIL puro g. 3
Coformulanti q.b. a g.100

Partita n.

CONTENUTO:
g 100-250-500 Kg 1-5-10-20

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

distribuito da:
IQV Italia Srl – Fiano Romano RM

STABILIMENTI DI PRODUZIONE (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA – U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
STI Solfotecnica Italiana SpA – Cotignola (RA)
TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
STABILIMENTO DI CONFEZIONAMENTO:
LIFA Srl – Isola Vicentina (VI)

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame metallo 20% e Cimoxanil 3% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
RAME METALLO - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il VIRONEX R è un fungicida che agisce per contatto e per assorbimento citotropico. Si impiega in trattamenti preventivi al verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, cadenzando, in situazioni normali, gli interventi ogni 6-8 giorni; si consigliano trattamenti più ravvicinati in presenza di forte pressione della malattia. Il VIRONEX R presenta inoltre attività curativa ed eradicante entro tre giorni dalla avvenuta infezione peronosporica. È efficace nella lotta a Peronospora, Alternaria, Septoria e Antracnosi.

DOSI D'IMPIEGO
VITE: contro Peronospora alla dose di 300-350 g/hl.
POMODORO, PATATA, TABACCO, CARCIOFO: contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi alla dose di 350-400 g/hl.
LATTUGA, SPINACIO: contro Peronospora della lattuga e dello spinacio alla dose di 350 g/hl.
MELONE, ZUCCHINO: contro Peronospora delle cucurbitacee alla dose di 350 g/hl.
PISELLO: contro Peronospora ed Antracnosi alla dose di 350 g/hl.
CIPOLLA, AGLIO, PORRO: contro Peronospora della cipolla e del porro e Alternaria alla dose di 350 g/hl.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare in fioritura.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER CARCIOFO; 20 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

DL 65/2003 Set. 05

Etichetta per confezioni in sacchetti idrosolubili/foglio illustrativo

VIRONEX R

(SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Fungicida citotropico in polvere bagnabile

VIRONEX R Registrazione Ministero della Salute n. 11134 del 08/02/2002

COMPOSIZIONE
RAME METALLO g. 20
(sotto forma di Ossicloruro)
CIMOXANIL puro g. 3
Coformulanti q.b. a g.100

Partita n.

distribuito da:
IQV Italia Srl – Fiano Romano RM

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA – U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
STI Solfotecnica Italiana SpA – Cotignola (RA)
TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)

CONTENUTO: 100 g (1 s.i. x 100 g) - 250 g (1 s.i. x 250 g) - 350 g (1 s.i. x 350 g) - 400 g (1 s.i. x 400 g) - 500 g (5 s.i. x 100 g) - 500 g (2 s.i. x 250 g) - 700 g (2 s.i. x 350 g) - 800 g (2 s.i. x 400 g) - 1 Kg (10 s.i. x 100 g) - 1 Kg (4 s.i. x 250 g) - 1,050 Kg (3 s.i. x 350 g) – 1,2 Kg (3 s.i. x 400 g) - 2 Kg (5 s.i. x 400 g)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame metallo 20% e Cimoxanil 3% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
RAME METALLO - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il VIRONEX R è un fungicida che agisce per contatto e per assorbimento citotropico. Si impiega in trattamenti preventivi al verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, cadenzando, in situazioni normali, gli interventi ogni 6-8 giorni; si consigliano trattamenti più ravvicinati in presenza di forte pressione della malattia. Il VIRONEX R presenta inoltre attività curativa ed eradicante entro tre giorni dalla avvenuta infezione peronosporica. È efficace nella lotta a Peronospora, Alternaria, Septoria e Antracnosi.

DOSI D'IMPIEGO
VITE: contro Peronospora alla dose di 300-350 g/hl.
POMODORO, PATATA, TABACCO, CARCIOFO: contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi alla dose di 350-400 g/hl.
LATTUGA, SPINACIO: contro Peronospora della lattuga e dello spinacio alla dose di 350 g/hl.
MELONE, ZUCCHINO: contro Peronospora delle cucurbitacee alla dose di 350 g/hl.
PISELLO: contro Peronospora ed Antracnosi alla dose di 350 g/hl.
CIPOLLA, AGLIO, PORRO: contro Peronospora della cipolla e del porro e Alternaria alla dose di 350 g/hl.

AVVERTENZE D'USO
Nel caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

FITOTOSSICITÀ - Non trattare in fioritura.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER CARCIOFO; 20 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

MODO DI UTILIZZO DEI SACCHETTI IDROSOLUBILI

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

DL 65/2003 Set. 05

Etichetta formato ridotto per confezioni in sacchetti idrosolubili

VIRONEX R

(SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Fungicida citotropico in polvere bagnabile

VIRONEX R Registrazione Ministero della Salute n. 11134 del 08/02/2002

COMPOSIZIONE
RAME METALLO g. 20
(sotto forma di Ossicloruro)
CIMOXANIL puro g. 3
Coformulanti q.b. a g.100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV Italia Srl – Fiano Romano RM

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO: **Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA
U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
STI Solfotecnica Italiana SpA
Cotignola (RA)
TORRE Srl
Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
Partita n.
CONTENUTO: 100 g (1 s.i. x 100 g)

NORME PRECAUZIONALI: **Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame metallo 20% e Cimoxanil 3% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
RAME METALLO - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003 Set. 05

Etichetta formato ridotto

VIRONEX R

Fungicida citotropico in polvere bagnabile

VIRONEX R Registrazione Ministero della Salute n. 11134 del 08/02/2002

COMPOSIZIONE
RAME METALLO g. 20
(sotto forma di Ossicloruro)
CIMOXANIL puro g. 3
Coformulanti q.b. a g.100

Partita n.

CONTENUTO:
g 100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)

distribuito da: IQV Italia Srl – Fiano Romano RM

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

STABILIMENTI DI PRODUZIONE (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA
U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
STI Solfotecnica Italiana SpA
Cotignola (RA)
TORRE Srl
Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
STAB L MENTO DI CONFEZIONAMENTO:
LIFA Srl – **Isola Vicentina (VI)**

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame metallo 20% e Cimoxanil 3% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
RAME METALLO - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003 Set. 05

Etichetta per sacchetti idrosolubili

VIRONEX R

(SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Fungicida citotropico in polvere bagnabile

VIRONEX R Registrazione Ministero della Salute n. 11134 del 08/02/2002

COMPOSIZIONE
RAME METALLO g. 20
(sotto forma di Ossicloruro)
CIMOXANIL puro g. 3
Coformulanti q.b. a g. 100

Partita n.

CONTENUTO:
100 g - 250 g - 350 g - 400 g

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

distribuito da:
IQV Italia Srl
Fiano Romano RM

NOCIVO

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.- Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA – U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
STI Solfotecnica Italiana SpA – Cotignola (RA)
TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)

AVVERTENZA:
LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE L'INVOLUCRO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

VIRONEX TRIPLE

Fungicida a base di Cimoxanil, Mancozeb e Rame ossicloruro in polvere bagnabile

VIRONEX TRIPLE Registrazione Ministero della Salute n. 11180 del 05/02/2002

COMPOSIZIONE
CIMOXANIL puro g. 3
MANCOZEB puro g. 8
RAME METALLO g. 20
(sotto forma di Ossicloruro)
Coformulanti q.b. a g.100

CONTENUTO:
g 100-250-500- 700 Kg 1-5-10-15-20

Partita n

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV ITALIA Srl – Fiano Romano (Roma)
Stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
TORRE Srl
Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA
Cotignola (RA)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 3%, Rame metallo 20% (da ossicloruro) e Mancozeb 8% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
RAME - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
MANCOZEB - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Il VIRONEX TRIPLE è un fungicida in polvere bagnabile, con azione preventiva e curativa, con effetto penetrante e di contatto, in grado di bloccare infezioni già in atto se si tratta entro le 48 ore da una pioggia infettante. L'ottima micronizzazione del prodotto permette una distribuzione omogenea, garanzia di uniforme copertura delle parti trattate.
VITE - POMODORO (solo fino alla prima fioritura) - TABACCO: contro la Peronospora, l'Escoriosi, l'Alternaria, l'Antracnosi e le Batteriosi. Viene impiegato alla dose di 300-350 g/hl con trattamenti al momento dello sviluppo delle condizioni che possono provocare l'infezione fungina.

COMPATIBILITÀ

Il VIRONEX TRIPLE non è compatibile con prodotti a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. SU POMODORO TRATTAMENTI CONSENTITI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA
DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 05/2003

Etichetta confezioni in sacchetti idrosolubili/foglio illustrativo

VIRONEX TRIPLE

(SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Fungicida a base di Cimoxanil, Mancozeb e Rame ossicloruro in polvere bagnabile

VIRONEX TRIPLE Registrazione Ministero della Salute n. 11180 del 05/02/2002

COMPOSIZIONE
CIMOXANIL puro g. 3
MANCOZEB puro g. 8
RAME METALLO g. 20
(sotto forma di Ossicloruro)
Coformulanti q.b. a g.100

distribuito da:
IQV ITALIA Srl – Fiano Romano (Roma)

Partita n

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

Stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a. Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA Cotignola (RA)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

CONTENUTO: 100 g (10 s.i. x 10 g) - 100 g (1 s.i. x 100 g) - 250 g (1 s.i. x 250 g) - 350 g (1 s.i. x 350 g) - 500 g (5 s.i. x 100 g) 500 g (1 s.i. x 500 g) - 1 Kg (10 s.i. x 100 g) - 1 Kg (4 s.i. x 250 g) - 1,050 Kg (3 s.i. x 350 g)

NORME PRECAUZIONALI Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 3%, Rame metallo 20% (da ossicloruro) e Mancozeb 8% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
RAME - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
MANCOZEB - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Il VIRONEX TRIPLE è un fungicida in polvere bagnabile, con azione preventiva e curativa, con effetto penetrante e di contatto, in grado di bloccare infezioni già in atto se si tratta entro le 48 ore da una pioggia infettante. L'ottima micronizzazione del prodotto permette una distribuzione omogenea, garanzia di uniforme copertura delle parti trattate.
VITE - POMODORO (solo fino alla prima fioritura) - TABACCO: contro la Peronospora, l'Escoriosi, l'Alternaria, l'Antracnosi e le Batteriosi. Viene impiegato alla dose di 300-350 g/hl con trattamenti al momento dello sviluppo delle condizioni che possono provocare l'infezione fungina.

AVVERTENZE D'USO

Nel caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

COMPATIBILITÀ

Il VIRONEX TRIPLE non è compatibile con prodotti a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. SU POMODORO TRATTAMENTI CONSENTITI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA
DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

MODO DI UTILIZZO DEI SACCHETTI IDROSOLUBILI

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa a solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

DL 65/2003 Set. 05

Etichetta confezioni in sacchetti idrosolubili/foglio illustrativo

VIRONEX TRIPLE

(SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Fungicida a base di Cimoxanil, Mancozeb e Rame ossicloruro in polvere bagnabile

VIRONEX TRIPLE Registrazione Ministero della Salute n. 11180 del 05/02/2002

COMPOSIZIONE
CIMOXANIL puro g. 3
MANCOZEB puro g. 8
RAME METALLO g. 20
(sotto forma di Ossicloruro)
Coformulanti q.b. a g.100

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81 - 08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV ITALIA Srl – Fiano Romano (Roma)

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare duran te l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA
Cotignola (RA)

CONTENUTO:
100 g (10 s.i. x 10 g) - 100 g (1 s.i. x 100 g)

Partita n

NORME PRECAUZIONALI Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 3%, Rame metallo 20% (da ossicloruro) e Mancozeb 8% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
RAME - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
MANCOZEB - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL.65/2003 Set. 05

Etichetta formato ridotto

VIRONEX TRIPLE

Fungicida a base di Cimoxanil, Mancozeb e Rame ossicloruro in polvere bagnabile

VIRONEX TRIPLE Registrazione Ministero della Salute n. 11180 del 05/02/2002

COMPOSIZIONE
CIMOXANIL puro g. 3
MANCOZEB puro g. 8
RAME METALLO g. 20
(sotto forma di Ossicloruro)
Coformulanti q.b. a g.100

CONTENUTO: **g 100**

Partita n

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)
distribuito da:
IQV ITALIA Srl – Fiano Romano (Roma)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
TORRE Srl
Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA
Cotignola (RA)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione con sultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 3%, Rame metallo 20% (da ossicloruro) e Mancozeb 8% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
RAME - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
MANCOZEB - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003 Set. 05

Etichetta per sacchetti idrosolubili

VIRONEX TRIPLE

(SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Fungicida a base di Cimoxanil, Mancozeb e Rame ossicloruro in polvere bagnabile

VIRONEX TRIPLE Registrazione Ministero della Salute n. 11180 del 05/02/2002

COMPOSIZIONE

CIMOXANIL puro	g. 3
MANCOZEB puro	g. 8
RAME METALLO (sotto forma di Ossicloruro)	g. 20
Coformulanti q.b.a	g. 100

Partita n.

CONTENUTO: 10-100-250-350-500 g

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles
Barcellona (Spagna)

distribuito da:
IQV Italia Srl
Fiano Romano RM

Stabilimenti di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a. - Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Cotignola (RA)

AVVERTENZA:
LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE L'INVOLUCRO

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

DL 65/2003 nov

GREEN TRADE S.r.l.

GIVER TOP 70 WG

Erbicida selettivo della barbabietola da zucchero
in formulazione di microgranuli dispersibili

Composizione:
- METAMITRON puro g. 70
- Coformulanti qb a 100

Frasi di Rischio
Nocivo per ingestione; Altamente tossico per gli organismi acquatici

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

green trade srl - Via Ormelle, 23 – San Polo di Piave (Treviso)
Stabilimento di produzione : A.D.I.C.A. srl – Nera Montori (TR) / AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd., / ASHDOD – ISRAELE / SCHIRM AG Division Sideco –Lubecca (Germania)
Stabilimento di confezionamento : Terranalisi srl – Cento (FE) / DIACHEM spa – U.P. SIFA – Caravaggio (BG) / STI-SOLFOTECNICA ITALIANA - Cotignola (RA)/ SULPHUR MILLS – Gujarat - INDIA
Registrazione n.11469 del 22-10-2002 del Ministero della Salute
Partita n. ….. Kg. 0,5-1-3-5-10-15-20

INFORMAZIONI MEDICHE
In casi di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni

CAMPI DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il GIVER TOP 70 WG è un erbicida che agisce per assorbimento radicale e fogliare, in formulazione di microgranuli disperdibili. Viene applicato per combattere le seguenti malerbe: Alopecurus (Coda di volpe), Amaranthus (Amaranto comune), Capsella (Borsa del pastore), Chenopodium (Farinaccio), Echinochloa (Giavone), Fumaria (Fumaria), Galinsoga (Galinsoga), Matricaria (Camomilla), Papaver (Papavero), Poa (Fienarola), Polygonum aviculare (Correggiola), Polygonum persicaria (Persicaria), Solanum (Erba morella), Stellaria (Centocchio), Veronica (Veronica), Polygonum convolvolus (Convolvolo falso).
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
intervento di:
- pre-semina anticipata (autunno-inverno)
Kg.6 per ettaro in 600 lt. di acqua con terreno perfettamente preparato e senza infestanti presenti.
- pre-semina
Kg.4 per ettaro in 600 lt. di acqua con interramento del prodotto e dose maggiore in terreni tendenzialmente pesanti.
- post-emergenza
Kg.2-3 per ettaro miscelato con il p.a. Fenmedifam (= 4Kg. di formulato al 19%) in 400 lt. d'acqua e trattando con piantine di bietole nello stadio delle 2-4 foglie vere.
Nel caso si debba intervenire in trattamenti più tardivi impiegare 3-4 Kg. di prodotto in miscela con lt.5-6 di Fenmedifam al 19%, con l'aggiunta di lt. 1,5-2 di olio bianco.
Attenzione: si raccomanda di effettuare il trattamento con assenza di vento e con terreno ben lavorato e quindi sminuzzato.

AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
Fitotossicità : il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

\DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

GLOW 80 WDG

Fungicida sistemico

tipo di formulazione : microgranuli idrodisperdibili

Composizione:
-Fosetil Alluminio puro g. 80
-Coformulanti qb a 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Rischio di gravi lesioni oculari; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

green trade srl - Via Ormelle, 23 – San Polo di Piave (Treviso)

Officina di produzione: A.D.I.C.A. srl - Nera Montoro (Terni)/ ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT) / Zhenjiang Jiangnan Chemical Co. Ltd- Zhenjiang Jiangsu-China
Officina di confezionamento : A.D.I.C.A. srl – Faenza (RA)
Registrazione n.. 11468 del 22-10-2002 del Ministero della Salute
Partita n. ..... - kg 0,1-0,2-0,5-1-3-5-10-15-20

INFORMAZIONI MEDICHE : in caso di intossicazione informare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

MODALITA' D'IMPIEGO
GLOW 80 WDG è un fungicida dotato di azione sistemica che si manifesta in modo ascendente e discendente che è evidente con vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita, e gli permette di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento; quindi dotato di una notevole mobilità sulle colture trattate.
Vite : viene impiegato contro la Peronospora alla dose di g. 250 per q.le acqua trattando sempre in miscela con prodotti di copertura (Rame escluso)
Melo, Pero, Pesco, Actinidia : viene impiegato contro la Phytophthora cactorum trattando sulla vegetazione, una volta al mese, dalla sfioritura fino a quaranta giorni dalla raccolta (per melo e actinidia), con 250 g/hl. Nel caso di colture già debilitate dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida: effettuare un'innaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, con litri 1-2 per pianta di una poltiglia costituita da Kg. 5 di prodotto per 100 litri d'acqua.
Melo - Pero : viene impiegato contro la Ticchiolatura con trattamenti preventivi a g. 150 - 250, nelle fasi pre - fiorali e subito dopo l'allegagione si consigli l'associazione con fungicidi di copertura o con Dodina.**Pero** : viene impiegato contro la Maculatura bruna (Stemphyllium sp.), trattamenti preventivi a 250 g. per q.le acqua. **Fragola** : viene impiegato contro la Peronospora (Phytophthora cactorum e fragariae). L'immersione delle piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti, seguita da 2-3 irrorazioni alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immersione delle piante prima del trapianto in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti, seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di g. 0,5 di formulato per pianta. **Lattuga** : viene impiegato contro la Bremia lactucae effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire almeno 3 Kg. di prodotto per ettaro). Si consiglia di effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto; se si verificano forti sbalzi termici la lattuga può essere sensibile al prodotto. **Melone** : viene impiegato contro la Pseudoperonospora cubensis effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl avendo cura di distribuire, come minimo, 3 Kg. di prodotto per ettaro. **Cocomero, Cetriolo, Spinacio** : viene impiegato contro la Peronospora, effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire, come minimo, 3 Kg. di prodotto per ettaro). **Carciofo** : viene impiegato contro la Bremia lactucae a 200-300 g/hl. **Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo** : viene impiegato contro Phytophthora spp. effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl, utilizzando dieci litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione possono venire integrati da pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche); pratica indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida. **Vivai di fruttiferi** : contro Phytophthora effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl con cadenza mensile. **Vivai di agrumi** : contro Phytophthora impiegare la dose di 400 g/hl ogni 60 giorni. **Colture Ornamentali in pieno campo ed in serra :** Viene impiegato contro la Phytophthora cinnamoni di Chamaecyparis e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee. Poinsettia, St.Paulia e Crisantemo, effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con g. 5-10 di formulato per mq. una volta al mese in primavera.

COMPATIBILITA' : Il prodotto non é compatibile con i prodotti a base di rame, di Dicofol e con concimi fogliari contenenti azoto. Si consiglia inoltre di non irrorare il prodotto su colture precedentemente trattate con i formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto. Nella miscelazione del prodotto con altri formulati si consigliano comunque saggi preliminari. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti: 15 giorni prima del raccolto su carciofo, cetriolo, cocomero, melone, lattuga, spinacio; 30 giorni prima del raccolto su fragola; 40 giorni prima del raccolto su melo, pero, pesco, actinidia e vite; 80 giorni prima della raccolta di arancio, limone, mandarino, pomplemo.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

SHARE 50 WG

Fungicida a largo spettro d'azione che agisce in modo preventivo e curativo
tipo di formulazione : microgranuli idrodisperdibili

Composizione
-Procimidone puro g. 50
-coformulanti qb a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

green trade srl - Via Ormelle, 23 – San Polo di Piave (Treviso)
Officina di produzione : A.D.I.C.A. srl – Nera Montoro (TR) / STI SOLFOTECNICA ITALIANA - Cotignola (RA); COLLAG ltd / COLLAG Technology Centre, Hazel Road, Woolston, Southampton – Inghilterra/ ISAGRO S.p.A. prilia (LT)/Zhejiang Heyi Pesticide& Chemicals Co. Ltd- Zhejiang-County- China
Registrazione n.10562 del 01-08-2000 del Ministero della Sanità
kg. 0.1/0,2//0,5/1/5/10/15/20 - Partita n.

***Informazioni mediche** : in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza : consultare un centro antiveleni*

MODALITA' D'IMPIEGO
Lo SHARE 50 WG è un fungicida che esplica la propria azione in modo preventivo con inibizione della germinazione delle spore, e in modo curativo, bloccando lo sviluppo del micelio nelle prime fasi di incubazione, ha una moderata attività sistemica.
DOSI D'IMPIEGO
VITE : impiegato contro la Muffa grigia alla dose di g. 100 - 150 per hl , effettuando 3-4 trattamenti nei periodi di fine fioritura, poi quando gli acini hanno il diametro di ca. 3 mm (in coincidenza della chiusura del grappolo), poi si prosegue all'invaiatura, circa 7-8 settimane prima del raccolto ed infine 3-4 settimane prima della raccolta.
E' consigliabile bagnare bene affinchè vi sia una distribuzione uniforme del prodotto, la dose più alta impiegarla su varietà più sensibili all'attacco della malattia.
POMODORO : impiegato contro la Muffa grigia g. 80-100 per q.le acqua, iniziando a trattare a fine fioritura del primo palco fiorale e ripetendo ogni 15 giorni sino a concludere 28 giorni prima della raccolta
PESCO - NETTARINE - PERCOCHE : impiegato contro il Marciume bruno (Monilia) sia dei fiori e dei rami (g. 150 - 200 per q.le acqua, con un primo trattamento ai bottoni fiorali ed un altro con il 25% dei fiori aperti ed un successivo in piena fioritura) ede i frutti (g. 100 - 150 per q.le acqua, trattando 30-35 gg e 15-20 gg prima della raccolta.
PERO : impiegato contro la Maculatura bruna g. 100 - 150 per q.le acqua con trattamenti a partire dalla fioritura e ripetuti.
GIRASOLE : impiegato contro la Sclerotinia a g. 100/hl prima della fioritura, e g. 100 - 200 per q.le di seme nella concia
COLZA : impiegato contro la Sclerotinia alla dose di kg. 1 - 1,5 per ettaro all'inizio della fioritura.
LATTUGA : impiegato contro il Mal dello Sclerozio alla dose di kg. 1,5 - 2 per ettaro
INDIVIA : impiegato contro il Mal dello Sclerozio e la Muffa grigia alla dose di kg 1,5 - 2 per ettaro
TABACCO : impiegato contro i Marciumi da Botrytis e Marciumi da Sclerotini alla dose di kg. 1,5 - 2 per ettaro
ALBICOCCO - SUSINO : impiegato contro la Muffa grigia e Marciumi da Sclerotinia alla dose di 100 - 200 g. per q.le acqua
MANDORLO : impiegato contro la Monilia alla dose di 150 - 200 g. per q.le acqua
PEPERONE - MELANZANA : impiegato contro la Muffa grigia e Marciumi da Sclerotinia alla dose di 80 - 100 g. per q.le acqua
AGLIO : impiegato contro la Muffa grigia e Mal dello Sclerozio alla dose di g. 30 per 100 kg di seme
CIPOLLA : impiegato contro la Muffa grigia e Marciume bianco dei bulbi alla dose di 100 - 150 g/hl
FRAGOLA : impiegato contro la Muffa grigia a g. 80 - 100 per q.le acqua con 3 trattamenti alle seguenti epoche : alla schiusura dei petali, poi con circa il 10-20% dei fiori aperti ed alla completa sfioritura. Bagnare bene sia la pianta che il terreno circostante.
CETRIOLO : impiegato contro la Marcescenza dei semi e morte delle plantule, Marciumi da Botrytis a g. 100 - 150 / hl
FAGIOLINO : impiegato contro la Muffa grigia e Mal dello Sclerozio a g. 100 - 150 per q.le acqua
ACTINIDIA : impiegato contro i Marciumi da Botrytis e Marciumi da Sclerotinia, a g. 75 - 100/hl alla caduta dei petali ed eventualmente in pre - raccolta; in post - raccolta con doccia (drencher) 12 g/hl; trattamenti per immersione : 12 g/hl
NOCCIOLO : impiegato contro la maculatore fogliare del nocciolo a g. 75 - 100 / hl
ORNAMENTALI : impiegato contro i Marciumi da Botrytis a g. 40 - 80 / hl
COLTURE FLOREALI IN PIENO CAMPO ED IN SERRA : impiegato contro la Muffa grigia della rosa a g. 40-80 per q.le acqua, effettuando almeno 3 trattamenti iniziando dal germogliamento sino ad inizio fioritura, bagnando molto bene tutta al vegetazione. Impiegato contro la Muffa grigia della Gerbera, Geranio, Crisantemo, Garofano g. 40 - 80 per q.le acqua trattando con presenza della malattia a ripetuti interventi. Impiegato contro la Rhizoctonia del garofano ed altri ornamentali g. 4 dispersi in 5-10 litri di acqua per mq. di superfice, intervenendo 10 gg circa dopo la messa a dimora, quando è superata la crisi del trapianto e con comparsa dei primi sintomi della malattia ed eventualmente ripetendo l'intervento dopo circa un mese.
COMPATIBILITA' : miscibile con la maggior parte degli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : sui trattamenti alle colture orticole e floricole, specie se in serra, fare saggi preliminari.
sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto della vite, girasole, susino, 60 giorni per l'actinidia (derrata), 45 giorni per il colza e 14 giorni prima del raccolto sulle altre colture.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

SHARE 50 WP

Fungicida a largo spettro d'azione che agisce in modo preventivo e curativo

Composizione
-Procimidone puro g. 50
-coformulanti qb a 100

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande: Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Green Trade srl - Via Ormelle, 23 – San Polo di Piave (Treviso)
Officina di produzione : AGROCHIMICA FAENTINA Spa - Faenza (RA); A.D.I.C.A. S.r.l. – Nera Monitoro (TR); STI SOLFOTECNICA ITALIANA – Cotignola (RA); CHEMIA Spa- S.Agostino (FE); TERRANALISI S.r.l. – Cento (FE)/ISAGRO S.p.A. Aprilia (LT) / ZHEJIANG HEYI Pesticide & Chemicals Co.Ltd – Zhejiang County - China
Registrazione n. 10495 del 31 maggio 2000 del Ministero della Salute
kg. 0.1/0,2//0,5/1/5/10/15/20 - Partita n.

Informazioni mediche : in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO
Lo SHARE 50 WP è un fungicida che esplica la propria azione in modo preventivo con inibizione della germinazione delle spore, e in modo curativo, bloccando lo sviluppo del micelio nelle prime fasi di incubazione, ha una moderata attività sistemica.
DOSI D'IMPIEGO
VITE : impiegato contro la Muffa grigia alla dose di g. 100 - 150 per hl , effettuando 3-4 trattamenti nei periodi di fine fioritura, poi quando gli acini hanno il diametro di ca. 3 mm (in coincidenza della chiusura del grappolo), poi si prosegue all'invaiatura, circa 7-8 settimane prima del raccolto ed infine 3-4 settimane prima della raccolta.
E' consigliabile bagnare bene affinchè vi sia una distribuzione uniforme del prodotto, la dose più alta impiegarla su varietà più sensibili all'attacco della malattia.
POMODORO : impiegato contro la Muffa grigia g. 80-100 per q.le acqua, iniziando a trattare a fine fioritura del primo palco fiorale e ripetendo ogni 15 giorni sino a concludere 28 giorni prima della raccolta
PESCO - NETTARINE - PERCOCHE : impiegato contro il Marciume bruno (Monilia) sia dei fiori e dei rami (g. 150 - 200 per q.le acqua, con un primo trattamento ai bottoni fiorali ed un altro con il 25% dei fiori aperti ed un successivo in piena fioritura) ede i frutti (g. 100 - 150 per q.le acqua, trattando 30-35 gg e 15-20 gg prima della raccolta.
PERO : impiegato contro la Maculatura bruna g. 100 - 150 per q.le acqua con trattamenti a partire dalla fioritura e ripetuti.
GIRASOLE : impiegato contro la Sclerotinia a g. 100/hl prima della fioritura, e g. 100 - 200 per q.le di seme nella concia
COLZA : impiegato contro la Sclerotinia alla dose di kg. 1 - 1,5 per ettaro all'inizio della fioritura.
LATTUGA : impiegato contro il Mal dello Sclerozio alla dose di kg. 1,5 - 2 per ettaro
INDIVIA : impiegato contro il Mal dello Sclerozio e la Muffa grigia alla dose di kg 1,5 2 per ettaro
TABACCO : impiegato contro i Marciumi da Botrytis e Marciumi da Sclerotini alla dose di kg. 1.5 - 2 per ettaro
ALBICOCCO - CILIEGIO DOLCE E ACIDO - SUSINO : impiegato contro la Muffa grigia e Marciumi da Sclerotinia alla dose di 100 - 200 g. per q.le acqua
MANDORLO : impiegato contro la Monilia alla dose di 150 - 200 g. per q.le acqua
PEPERONE - MELANZANA : impiegato contro la Muffa grigia e Marciumi da Sclerotinia alla dose di 80 - 100 g. per q.le acqua
AGLIO : impiegato contro la Muffa grigia e Mal dello Sclerozio alla dose di g. 30 per 100 kg di seme
CIPOLLA : impiegato contro la Muffa grigia e Marciume bianco dei bulbi alla dose di 100 - 150 g/hl
FRAGOLA : impiegato contro la Muffa grigia a g. 80 - 100 per q.le acqua con 3 trattamenti alle seguenti epoche : alla schiusura dei petali, poi con circa il 10-20% dei fiori aperti ed alla completa sfioritura. Bagnanre bene sia la pianta che il terreno circostante.
CETRIOLO : impiegato contro la Marcescenza dei semi e morte delle plantule, Marciumi da Botrytis a g. 100 - 150 / hl
FAGIOLO - FAGIOLINO : impiegato contro la Muffa grigia e Mal dello Sclerozio a g. 100 - 150 per q.le acqua
ACTINIDIA : impiegato contro i Marciumi da Botrytis e Marciumi da Sclerotinia, a g. 75 - 100/hl alla caduta dei petali ed eventualmente in pre - raccolta; in post - raccolta con doccia (drencher) 12 g/hl; trattamenti per immersione : 12 g/hl
NOCCIOLO : impiegato contro la maculatore fogliare del nocciolo a g. 75 - 100 / hl
ORNAMENTALI : impiegato contro i Marciumi da Botrytis a g. 40 - 80 / hl
COLTURE FLOREALI IN PIENO CAMPO ED IN SERRA : impiegato contro la Muffa grigia della rosa a g. 40-80 per q.le acqua, effettuando almeno 3 trattamenti iniziando dal germogliamento sino ad inizio fioritura, bagnando molto bene tutta al vegetazione. Impiegato contro la Muffa grigia della Gerbera, Geranio, Crisantemo, Garofano g. 40 - 80 per q.le acqua trattando con presenza della malattia a ripetuti interventi. Impiegato contro la Rhizoctonia del garofano ed altri ornamentali g. 4 dispersi in 5-10 litri di acqua per mq. di superfice, intervenendo 10 gg circa dopo la messa a dimora, quando è superata la crisi del trapianto e con comparsa dei primi sintomi della malattia ed eventualmente ripetendo l'intervento dopo circa un mese.
COMPATIBILITA' : miscibile con la maggior parte degli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : sui trattamenti alle colture orticole e floricole, specie se in serra, fare saggi preliminari.
sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto della vite, ciliegio, girasole, susino, 60 giorni per l'actinidia (derrata), 45 giorni per il girasole e 14 giorni prima del raccolto sulle altre colture.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

SMALL AG

Fitoregolatore - Fitormone

Tipo di formulazione : compressi effervescenti solubili in acqua

Composizione
100 grammi di prodotto contengono :
- Acido gibberellico puro .... g. 20
- Coformulanti ....q.b. a g. 100
(una compressa contiene 1 g. di p.a. puro)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande: Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI MEDICHE : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO
Lo SMALL AG è un fitoregolatore di crescita a base di una sostanza vegetale naturale che influenza molti processi biologici delle piante (sviluppo, fioritura, anticipo produzione). Questa sostanza somministrata alle piante in determinati momenti e dosi produce effetti positivi ai fini desiderati (allegagione, precocità).
VITE - Uva da tavola senza semi : trattare per allungare il rachide in pre - fioritura con tralcio di 4 - 8 cm alla dose di 2 compresse per hl; per diradare il grappolo trattare al 30 - 40% della fioritura alla dose di 2 compresse per ettolitro; per aumentare le dimensioni degli acini trattare dopo l'allegagione con acini di 3 - 4 mm di diametro, alla dose di 3 compresse. Uva da vino con semi : per allungare il rachide sulle varietà a grappolo compatto tipo Tocai, Picolit, Chardonnay ecc. si tratta prima della fioritura con tralci di 10 - 15 cm alla dose di 0,5 - 1 compresse per ettolitro ed impiegando 200 - 300 litri di acqua per ettaro.
PERO - Per favorire la partenocarpia e stimolare lo sviluppo della fruttificazione normale, si deve trattare nel periodo compreso fra l'inizio (20-30%) di fiori aperti e la piena fioritura. alla dose di 1-2 compresse / Hl di acqua, impiegando non meno di 10 Hl di soluzione per ettaro.
CARCIOFO - Per anticipare la produzione, trattare al momento in cui si nota la formazione delle infiorescenze trattare alla dose di 1-2 compresse / Hl di acqua.
FRAGOLA IN COLTURA PROTETTA - Per stimolare l'allegagione applicare il prodotto 15-20 giorni prima della fioritura, trattare alla dose di 2-3 compresse /Hl di acqua impiegando 5-8 Hl di soluzione per ettaro.
FLOREALI - Per anticipare ed aumentare la fioritura e migliorare talvolta la qualità dei fiori stessi, tracciare quando compaiono i boccioli trattare alla dose di 1-2 compresse / Hl di acqua.
PATATA - per stimolare l'emissione regolare dei germogli nei tuberi da seme, s'immergono per 10 minuti in una soluzione di 1/10 di compressa per ettolitro in caso di tuberi selezionati e 1/2 di compressa per ettolitro per tuberi interi. asciugando e seminando subito dopo; nel caso di tuberi provenienti da magazzino di conservazione, lasciare trascorrere 3 - 4 settimane di pre germinazione.
ARANCIO - Per avere la buccia liscia e un ritardo di maturazione sulla varietà Moro, Tarocco e Sanguinella, trattare poco prima della colorazione dei frutti trattare alla dose di 2-4 compresse / Hl d'acqua, avendo cura di bagnare abbondantemente.
CLEMENTINE - MANDARINI - Per favorire l' allegagione trattare quando la maggior parte dei fiori è in piena fioritura o inizia a perdere petali, trattare alla dose di 1-2 compresse / Hl di acqua.
LIMONI - per aumentare colore e pezzatura dei frutti e per uniformare le raccolte usare 1 - 2 compresse per Hl circa 5 - 7 settimane prima della prima raccolta e con il colore della maggioranza dei frutti che comincia a virare al giallo - argenteo.
CILIEGIO DOLCE - per aumentare la consistenza e la pezzatura impiegare 1 - 2 compresse per ettolitro all'epoca dell'invaiatura
CILIEGIO ACIDO - per la riduzione dei danni provocati dal Giallume virotico, per la scarsa vigoria e bassa produzione, trattare 10 - 14 giorni dopo la caduta dei petali con 1 - 2 compresse per ettolitro.
SEDANO - POMODORO - SPINACIO - ZUCCHINO - per la stimolazione dello sviluppo e limitare lo stress da freddo, impiegare 2 - 4 compresse per ettolitro in 300 - 500 lt/ha, 4 - 5 settimane prima della raccolta.
AVVERTENZE E NOTE: E' molto importante aggiungere sempre 50 ml/Hl di un bagnante. In linea generale il prodotto deve essere impiegato in giornate di tempo buono e stabile (evitare l'impiego quando si prevedono piogge imminenti).
COMPATIBILITA': non compatibile con prodotti a reazione alcalina
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

green trade srl - Via Ormelle, 23 - San Polo di Piave (Treviso)
Stabilimento di produzione : SIEGFRIED AGRO AG/SA - Zofingen (Svizzera), Chun Woo Mool San Co Ltd.-Seul Corea
registrazione n.10580 del 06-09-2000 del Ministero della Salute
Contenuto : g.50 (pari a 10 compresse da 5 g. e 50 compresse da g. 1)

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

SWEEL WDG

Fungicida a base di Zolfo per la lotta all'oidio ed al mal bianco di numerose colture
TIPO DI FORMULAZIONE : microgranuli idrodispersibili

Composizione:
Zolfo puro (esente da Selenio) g. 80
Coadiuvanti q b. a g 100

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

IRRITANTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

Green Trade srl - Via Ormelle, 23 – San Polo di Piave - TV

Officina di produzione : COLLAG TECHNOLOGY CENTRE – Hazel Road, Woolston, Southampton – INGHILTERRA / STI SOLFOTECNICA ITALIANA – Cotignola (RA) / INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO – Aprilia- (LT) / SAPEC AGRO S.A.- Setubal- PORTOGALLO ;QUIMETAL INDUSTRIAL S.A. Maipù- Santiago CHILE/ SULPHUR MILLS – Gujarat - INDIA
Officina di confezionamento: A.D.I.C.A. S.r.l. – Faenza – (RA)
0,1-0,2-0,5-1-5-10-20-25 Kg Partita n. ………….
Registrazione n. 10563 del 01-08-2000 del Ministero della Sanità

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
Lo SWEEIL WDG è un prodotto a base di Zolfo bagnabile finemente micronizzato, indicato per trattamenti preventivi e curativi contro tutte le forme di Oidio e Mal Bianco con azione collaterale di contenimento nei confronti di altre malattie fungine quali Ticchiolatura, Ruggini, Corineo e anche degli Acari in genere ed in particolare degli Eriofidi. Agisce per contatto ed il suo impiego deve essere preventivo od alla comparsa dei primi sintomi della malattia.
Dosi (ogni 100 litri di acqua) :

Vite - Pomacee - Agrumi - Drupacee - Ortaggi - Fragola - Olivo - Nocciolo - Patata - Girasole - Soia - Tabacco - Floreali e ornamentali - Forestali - Vivai di pioppo : 250 - 300 per q.le acqua preventivamente o alla comparsa dei primi sintomi

Cereali: intervenire alla comparsa dei primi sintomi della malattia sulle foglie apicali alla dose di 7 kg per ettaro.

Barbabietola da zucchero: 7 kg/ha. Eseguire 2 applicazioni: uno alla comparsa della malattia ed uno dopo 20 giorni.
Nel periodo estivo trattare soltanto durante le ore più fresche della giornata alle dosi minime consigliate.

COMPATIBILITÀ: non è compatibilie con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese ecc.), con olii minerali, con captano, con DDVP e diclofluanide. Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del captano.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': può arrecare danni alle seguenti cultivar di **Melo:** Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap, e di Pero: Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, Williams, Decana del Comizio. **Vite:** Sangiovese. **Cucurbitacee:** può essere fitotossico

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ZAPHIR 10 EC

Fungicida sistemico con azione preventiva, curativa e bloccante sulle colture di VITE, PERO, MELO, PESCO, ORTIVE ,TABACCO, ORNAMENTALI E FLOREALI

Composizione
- Penconazolo puro g. 10,20 (100 g/l)
- coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi e la pelle; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

IRRITANTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

green trade **srl - Via Ormelle, 23 – San Polo di Piave (Treviso)**
Registrazione n.11336 del 22-05-2002 del Ministero della Salute
Stabilimenti di produzione : A.D.I.C.A. srl - Faenza (RA) / ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI)/SULPHUR MILLS Limited – Gujarat - INDIA
Litri 0,1-0,2-1-5-10-20 Partita n° ....

***Informazioni per il medico** : sintomi e organi interessati : occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato , reni. -Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). -Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. -Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acute ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergenico. -in caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del S.N.C.. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Consultare un centro antiveleni.*

MODALITÀ D'IMPIEGO
Fungicida sistemico che può essere utilizzato come preventivo, curativo e come bloccante; agisce all'interno della pianta e l'assorbimento del prodotto avviene velocemente (poche ore).
VITE
Oidio (Uncinula necator)
- Trattamenti preventivi: : ml 25 - 30 hl in pre post-fioritura intervenendo ogni 14-16 giorni e ml 15 - 20 hl in pre e post-fioritura effettuando i trattamenti ogni 7-10 giorni. Con attacchi in atto (primi sintomi) fare 2 trattamenti ogni 5 - 7 giorni alla dose di ml 50 hl, poi continuare con trattamenti di tipo preventivo. Il prodotto esplica un' attività collaterale su Guignardia spp. e in minor misura su Pseudopezia spp.
MELO
Ticchiolatura (Venturia inaequalis)
-Trattamenti preventivi: ml 30 - 40 hl ogni 6 - 8 giorni fino alla fase di frutto noce, poi ogni 10 15 giorni. I trattamenti contro la Ticchiolatura sono sufficienti per controllare efficacemente anche l'Oidio.
-Trattamenti curativi : ml 40 - 50 hl, si può intervenire entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
-Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi) : ml 40 - 45 hl effettuando 2 applicazioni ogni 5 - 7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali. E' bene aggiungere un prodotto di copertura.
Oidio (Podosphaera leucotricha)
-Trattamenti preventivi : in primavera ml 30 - 40 hl ogni 10 giorni; nei trattamenti estivi ogni 10 - 14 giorni con dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia.
-Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): ml 30 - 35 hl ogni settimana, con un totale di 3 - 4, che consentono il controllo delle infezioni in atto e la protezione della nuova vegetazione.
Malattie da conservazione :(Monilia fructigena, Penicillium spp.)
- fare in totale 2 - 3 trattamenti a cadenza settimanale in pre raccolta alla dose di 40-45 ml/hl.
PERO
Ticchiolatura (Venturia pirina):
-Trattamenti preventivi: ml 25 - 35 hl ogni 10 - 12 giorni, impiegando la dose maggiore e gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli all sviluppo della malattia.
-Trattamenti curativi: ml 30 - 40 hl trattando entro massimo 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
-Trattamenti bloccanti:(in presenza di sintomi) ml 30 - 40 hl con 2 trattamenti ogni 5 - 7 giorni, proseguire con cadenze e dosi normali. E' bene aggiungere un prodotto di copertura.
PESCO
Oidio
-Trattamenti preventivi: In zone dove il rischio di infezione è alto e con cultivar particolarmente sensibili trattare a ml 40 - 50 hl dalla caduta petali ed ogni 10 - 14 giorni. In zone a minor rischio intervenire ogni 14-21 giorni.
Malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp.)
- fare 2 - 3 interventi a cadenza settimanale in pre-raccolta alla dose di 50 ml/hl.
TABACCO
Oidio : ml 35 - 50 hl facendo da 2 a 4 trattamenti in modo preventivo, iniziando dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.
MELONE - ZUCCHINO - ZUCCA - CETRIOLO - CARCIOFO – PEPERONE non in serra – POMODORO non in serra - PISELLO
Oidio : In pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione, fare da 2 a 4 trattamenti ogni 14 - 16 giorni a ml 25 - 50 hl a seconda della coltura e del rischio di infezione. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.
COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE:
Oidio e ruggini : ml 25 - 50 ml/hl ogni 10 - 14 giorni a seconda della coltura e della incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.
Data di scadenza in normali condizioni di conservazione del preparato (se la durata dello stesso è inferiore a due anni)
attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro utilizzo è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall' uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

CO.NA.S. S.r.l.

BENIL 60 DF

(granuli idrodispersibili)

DISERBANTE PER LE INFESTANTI NON GRAMINACEE DEL RISO

BENIL 60 DF Registrazione Ministero della Salute n. 11.608 del 20-02-2003

COMPOSIZIONE
BENSULFURON-METILE puro g 60
Coformulanti q.b.a g 100

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
KING TECH. CORPORATION – Shenzhen P.R. – Cina
SIPCAM SpA – Salerano sul Lambro (LO)
Stabilimento di confezionamento: **CHEMIA SpA** – S. Agostino (FE)

Partita n.

CO.NA.S. Srl
Via Concordia, 15
20090 Assago (Mi)

Contenuto: 500 g 1–2–5 Kg

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il BENIL 60 DF è un diserbante specifico per la lotta contro le più diffuse infestanti non graminacee del riso. La sua azione, al pari delle altre sulfoniluree, si manifesta con l'arresto della crescita delle piante ad esso sensibili le quali, poi, lentamente disseccano.
Il BENIL 60 DF è molto efficace o semplicemente efficace verso un gran numero di specie infestanti della risaia tra le quali si comprendono: Alisma plantago acquatica, Butomus umbellatus, Heleocharis spp., Marsilea quadrifolia, Potamogeton spp., Sagittaria spp., Sparganium erectum, Typha angustifolia, Ammania coccinea, Bidens frondosa, Cyperus difformis, Cyperus esculentus, Cyperus serotinus, Heteranthera rotundifolia, Leersia oryzoides (da seme), Alisma lanceolata, Scirpus maritimus, Scirpus mucronatus, Lindernia spp. e un buon controllo iniziale di Heteranthera reniformis.
Per la maggior parte delle infestanti, tuttavia, l'efficacia ottimale si ha allorché queste sono nella fase giovanile e in attiva crescita.

DOSI D'IMPIEGO
Di norma la dose d'impiego è di 100 g/ha. Tuttavia, specie in miscela con altri prodotti e nei trattamenti di pre-semina, essa può ridursi a 50-60 g/ha.

MODALITÀ ED EPOCHE D'IMPIEGO
Il BENIL 60 DF si impiega disciolto in acqua mediante uniforme distribuzione della poltiglia ottenuta sulla superficie dell'acqua o sul terreno utilizzando le normali attrezzature usate per il diserbo. Il trattamento può essere eseguito prima della semina o dopo la semina del riso su risaia sommersa o su risaia asciutta. Dopo la semina l'epoca migliore si ha tra i 20 e i 40 giorni dopo allorché il riso ha raggiunto lo stadio vegetativo di 1-2 foglie e fino alla fine dell'accestimento.

Trattamenti di pre-semina
Nei trattamenti di pre-semina il BENIL 60 DF è per lo più addizionato ad altri diserbanti di volta in volta utilizzati per il problema prevalente di lotta contro il riso crodo (Dalapon), contro le eterantere (Oxadiazon), contro i giavoni precoci (Tiobencarb).
In questo caso la dose di impiego del BENIL 60 DF è ridotta rispetto alla norma e varia, a seconda del grado di presenza delle infestanti, dai 50 ai 60 g/ha.

Trattamenti dopo la semina

a) risaia sommersa
Il BENIL 60 DF deve essere distribuito, con infestanti in fase di pre-emergenza o di post-emergenza precoce, con un livello d'acqua non superiore agli 8-10 cm. dopo aver chiuso le bocchette di alimentazione; dopo il trattamento non eseguire manovre d'acqua per almeno 5 giorni. Nei terreni che tendono ad asciugarsi, lasciare asciugare la risaia prima di introdurre nuova acqua.
Il trattamento può essere eseguito in combinazione con prodotti specifici contro il giavone o in sequenza a questi:

trattamento unico con prodotti in miscela	**BENIL 60 DF 100 g/ha + Giavonicida (Molinate, Tiocarbazil, ecc.)**	
trattamenti in sequenza	**1° intervento**	**Giavonicida**
	2° intervento	**BENIL 60 DF 100 g/ha**

b) risaia in asciutta
Per il controllo contemporaneo dei giavoni e delle altre infestanti non graminacee della risaia il BENIL 60 DF può essere addizionato con il propanil o con il quindorac alle dosi standard. In caso di doppio intervento con propanil, impiegare il BENIL 60 DF nella prima applicazione.
Ristabilire il livello dell'acqua nella camera 2-4 giorni dopo il trattamento.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Quando il BENIL 60 DF si impiega da solo è sufficiente sciogliere direttamente il BENIL 60 DF nel serbatoio già riempito per metà e poi aggiungere altra acqua fino a portare a volume, mantenendo la miscela in costante agitazione. Quando il BENIL 60 DF si impiega in miscela con altri prodotti è necessario prima disciogliere il BENIL 60 DF nel serbatoio riempito a metà e poi aggiungere l'altro prodotto portando a volume con l'agitatore in funzione.
Avvertenza: non applicare il BENIL 60 DF su colture sotto stress per anormali condizioni climatiche, malattie, insetti o eventualmente già danneggiate da altri erbicidi.

COMPATIBILITÀ
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare di colpire direttamente o tramite deriva colture o piante arboree. Non lavare l'attrezzatura vicino a colture o piante sensibili.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

BENIL 60 DF

(granuli idrodispersibili in sacchetti idrosolubili)

DISERBANTE PER LE INFESTANTI NON GRAMINACEE DEL RISO

BENIL 60 DF Registrazione Ministero della Salute n. 11608 del 20-02-2003

COMPOSIZIONE

BENSULFURON-METILE puro g 60

Coformulanti q.b.a g 100

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):

KING TECH. CORPORATION – Shenzhen P.R. – Cina

SIPCAM SpA – Salerano sul Lambro (LO)

Stabilimento di confezionamento: **CHEMIA SpA – S. Agostino (FE)**

Partita n.

CO.NA.S. Srl
Via Concordia, 15
20090 Assago (Mi)

Contenuto 1 Kg (10 s.i. x 100 g)-1 Kg (4 s.i. x 250 g)-1 Kg (2 s.i. x 500 g)-1 Kg (1 s.i. x 1 Kg)-2 Kg (4 s.i. x 500 g)-5 Kg (5 s.i. x 1 Kg)-5 Kg (10 s.i. x 500 g)

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE - Il BENIL 60 DF è un diserbante specifico per la lotta contro le più diffuse infestanti non graminacee del riso. La sua azione, al pari delle altre sulfoniluree, si manifesta con l'arresto della crescita delle piante ad esso sensibili le quali, poi, lentamente disseccano. Il BENIL 60 DF è molto efficace o semplicemente efficace verso un gran numero di specie infestanti della risaia tra le quali si comprendono: Alisma plantago acquatica, Butomus umbellatus, Heleocharis spp., Marsilea quadrifolia, Potamogeton spp., Sagittaria spp., Sparganium erectum, Typha angustifolia, Ammania coccinea, Bidens frondosa, Cyperus difformis, Cyperus esculentus, Cyperus serotinus, Heteranthera rotundifolia, Leersia oryzoides (da seme), Alisma lanceolata, Scirpus maritimus, Scirpus mucronatus, Lindernia spp. e un buon controllo iniziale di Heteranthera reniformis.

Per la maggior parte delle infestanti, tuttavia, l'efficacia ottimale si ha allorché queste sono nella fase giovanile e in attiva crescita.

DOSI D'IMPIEGO - Di norma la dose d'impiego è di 100 g/ha. Tuttavia, specie in miscela con altri prodotti e nei trattamenti di pre-semina, essa può ridursi a 50-60 g/ha.

MODALITÀ' ED EPOCHE D'IMPIEGO - Il BENIL 60 DF si impiega disciolto in acqua mediante uniforme distribuzione della poltiglia ottenuta sulla superficie dell'acqua o sul terreno utilizzando le normali attrezzature usate per il diserbo. Il trattamento può essere eseguito prima della semina o dopo la semina del riso su risaia sommersa o su risaia asciutta. Dopo la semina l'epoca migliore si ha tra i 20 e i 40 giorni dopo allorché il riso ha raggiunto lo stadio vegetativo di 1-2 foglie e fino alla fine dell'accestimento.

Assicurare la completa pulizia della botte e riempire il serbatoio con il 25% di acqua.

Trattamenti di pre-semina

Nei trattamenti di pre-semina il BENIL 60 DF è per lo più addizionato ad altri diserbanti di volta in volta utilizzati per il problema prevalente di lotta contro il riso crodo (Dalapon), contro le eterantere (Oxadiazon), contro i giavoni precoci (Tiobencarb).

In questo caso la dose di impiego del BENIL 60 DF è ridotta rispetto alla norma e varia, a seconda del grado di presenza delle infestanti, dai 50 ai 60 g/ha.

Trattamenti dopo la semina

a) risaia sommersa

Il BENIL 60 DF deve essere distribuito, con infestanti in fase di pre-emergenza o di post-emergenza precoce, con un livello d'acqua non superiore agli 8-10 cm. dopo aver chiuso le bocchette di alimentazione; dopo il trattamento non eseguire manovre d'acqua per almeno 5 giorni. Nei terreni che tendono ad asciugarsi, lasciare asciugare la risaia prima di introdurre nuova acqua.

Il trattamento può essere eseguito in combinazione con prodotti specifici contro il giavone o in sequenza a questi:

trattamento unico con prodotti in miscela	**BENIL 60 DF 100 g/ha + Giavonicida (Molinate, Tiocarbazil, ecc.)**	
trattamenti in sequenza	**1° intervento**	**Giavonicida**
	2° intervento	**BENIL 60 DF 100 g/ha**

b) risaia in asciutta

Per il controllo contemporaneo dei giavoni e delle altre infestanti non graminacee della risaia il BENIL 60 DF può essere addizionato con il propanil o con il quinclorac alle dosi standard. In caso di doppio intervento con propanil, impiegare il BENIL 60 DF nella prima applicazione.

Ristabilire il livello dell'acqua nella camera 2-4 giorni dopo il trattamento.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA - Quando il BENIL 60 DF si impiega da solo è sufficiente sciogliere direttamente il BENIL 60 DF nel serbatoio già riempito per un quarto/metà e poi aggiungere altra acqua fino a portare a volume, mantenendo la miscela in costante agitazione. Quando il BENIL 60 DF si impiega in miscela con altri prodotti è necessario prima disciogliere il BENIL 60 DF nel serbatoio riempito a metà e poi aggiungere l'altro prodotto portando a volume con l'agitatore in funzione.

Avvertenza: non applicare il BENIL 60 DF su colture sotto stress per anormali condizioni climatiche, malattie, insetti o eventualmente già danneggiate da altri erbicidi.

AVVERTENZE D'USO - Nel caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ' - Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare di colpire direttamente o tramite deriva colture o piante arboree. Non lavare l'attrezzatura vicino a colture o piante sensibili.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

MODO DI UTILIZZO DEI SACCHETTI IDROSOLUBILI

25% — Assicurare la completa pulizia della pompa e riempire il serbatoio con acqua al 25%

Con mani/guanti asciutti prelevare il numero di sacchetti idrosolubili, chiusi, previsti

Introdurre i sacchetti nel serbatoio e mettere in funzione l'agitatore

Attendere qualche minuto fino a completa solubilizzazione

Aggiungere la restante parte di acqua necessaria ed eventuali altri prodotti da miscelare

DL 65/2003

ETICHETTA PER SACCHETTI IDROSOLUBILI

BENIL 60 DF

(granuli idrodispersibili in sacchetti idrosolubili)
DISERBANTE PER LE INFESTANTI NON GRAMINACEE DEL RISO

BENIL 60 DF Registrazione Ministero della Salute n. 11608 del 20-02-2003
COMPOSIZIONE
BENSULFURON-METILE puro g 60
Coformulanti q.b.a g 100

CO.NA.S. Srl
Via Concordia, 15 - 20090 Assago (Mi)

Partita n.

Contenuto: **100-250-500 g e 1 kg**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

AVVERTENZA: leggere l'etichetta riportata sulla confezione

Stabilimenti di produzione
(formulazione e confezionamento o solo formulazione):
KING TECH. CORPORATION – Shenzhen P.R. – Cina
SIPCAM SpA – Salerano sul Lambro (LO)

Stabilimento di confezionamento:
CHEMIA SpA – S.Agostino (FE)

DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE

Da sciogliere in acqua senza rompere l'involucro

DIXIL 25 FL

(Sospensione concentrata)

DISERBANTE PER RISO ED ALTRE COLTURE

DIXIL 25 FL Registrazione Ministero della Salute n. 11667 del 07-05-2003

COMPOSIZIONE

OXADIAZON puro g 23 (=250 g/l)

Coformulanti q.b.a g 100

contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one: può provocare una reazione allergica

CO.NA.S. Srl

Via Concordia, 15 - 20090 Assago (MI)

Stabilimenti di produzione:

KING TECH. CORPORATION – Shenzhen P.R. – Cina

CHEMIA SpA – S. Agostino (FE)

TERRANALISI Srl – Cento (FE)

SIPCAM SpA – Salerano sul Lambro (LO)

Contenuto: 0,250-1-5-10-20 L

Partita n.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare l'ingestione, l'inalazione e il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

DIXIL 25 FL è un erbicida ad ampio spettro d'azione da impiegarsi in trattamenti di pre-emergenza delle infestanti nelle colture di riso, soia, girasole, ortaggi, fruttiferi, ornamentali, pioppo e per il trattamento delle aree incolte. DIXIL 25 FL è caratterizzato da una notevole durata d'azione nel terreno ed agisce sulle infestanti in germinazione per contatto diretto con il sottile strato di erbicida formatosi sulla superficie.

Tra le infestanti controllate si ricordano:

monocotiledoni annuali: Avena selvatica (*Avena fatua*), Ciperi (*Cyperus spp.*), Eterantera bianca (*Heteranthera reniformis*), Eterantera blu (*Heteranthera limosa*), Falso panico (*Setaria viridis*), Giavone (*Echinochloa spp.*), Loietto (*Lolium multiflorum*);

monocotiledoni perennanti: Eterantera (*Heteranthera rotundifolia*), Fienarola dei prati (*Poa pratensis*), contenimento delle emergenze precoci di Ciperacee della risaia;

dicotiledoni annuali: Amaranto (*Amaranthus spp.*), Atriplice maggiore (*Atriplex patula*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Caglio asprello (*Galium aparine*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Euforbia (*Euphorbia spp.*), Farinello (*Chenopodium album*), Fumaria comune (*Fumaria officinalis*), Galinsoga comune (*Galinsoga parviflora*), Mercorella comune (*Mercurialis annua*), Papavero comune (*Papaver rhoeas*), Poligono (*Polygonum spp.*), Porcellana comune (*Portulaca oleracea*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Senecione comune (*Senecio vulgaris*), Veronica (*Veronica spp.*);

dicotiledoni perennanti: Romice (*Rumex spp.*), Vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

RISO

a) seminato in acqua: contro le eterantere (*Heteranthera spp.*) e contenimento delle emergenze precoci di giavoni, alisma da seme e Ciperacee **1-1,5 l/ettaro** nei terreni argillosi; **1,5-2 l/ettaro** nei terreni di medio impasto, leggeri. Il trattamento deve essere eseguito 6-7 giorni prima della semina del riso:
- su risaia ancora in asciutta, su terreno già livellato pronto per l'immissione dell'acqua;
- oppure su risaia già allagata, ma dopo la slottatura e con l'acqua a livello normale (10-12 cm) previa sedimentazione delle particelle terrose in sospeso.

Dopo la semina, qualora si rendessero necessarie, si possono effettuare le asciutte.

b) seminato in asciutta o a semina diretta: **2,5 – 4 l/ettaro** in pre-emergenza.

GIRASOLE E SOIA: contro infestanti graminacee e dicotiledoni annuali (esclusa *Stellaria media*): **2-2,5 l/ettaro** in pre-emergenza della coltura e delle infestanti.

AGLIO: contro infestanti graminacee e dicotiledoni annuali: **1,5-3 l/ettaro** in pre-emergenza della coltura e delle infestanti.

CARCIOFO, CAVOLFIORE, FINOCCHIO, CICORIA, INDIVIA, LATTUGA, MELANZANA, PEPERONE, POMODORO, TABACCO: contro infestanti graminacee e dicotiledoni annuali: **1,5-3 l/ettaro** in pre-trapianto e in pre-emergenza delle infestanti.

ASPARAGO: contro infestanti annuali **1,5-3 l/ettaro**, contro convolvolo e vilucchione **7,5-10 l/ettaro**; intervenire in pre-emergenza dei turioni, dopo la messa a dimora delle zampe e dopo la raccolta.

CARCIOFO: contro infestanti annuali **1,5-3 l/ettaro**, contro acetosella (*Oxalis spp*) **7,5-10 l/ettaro**, intervenire dopo l'ultima lavorazione in pre-emergenza delle infestanti.

COLTURE LEGNOSE (vivai ed impianti in produzione), ALBICOCCO, PESCO, ARANCIO, CLEMENTINO, LIMONE, MANDARINO, MELO, PERO, NOCCIOLO, OLIVO, SUSINO, VITE, ACTINIDIA: contro infestanti annuali **3-5 l/ettaro**, contro convolvolo ed altre perennanti **7,5-10 l/ettaro** intervenendo da caduta foglie a inizio ripresa vegetativa, in pre-emergenza delle infestanti.

VIVAI DI ORNAMENTALI, PIOPPO: contro infestanti graminacee e dicotiledoni annuali **3-5 l/ettaro**; intervenire da caduta foglie a inizio ripresa vegetativa in pre-emergenza delle infestanti.

GAROFANO: contro infestanti graminacee e dicotiledoni annuali **2,4-3 l/ettaro** qualche giorno dopo la messa a dimora delle talee ed in pre-emergenza delle infestanti.

TAPPETI ERBOSI DI GRAMINACEE: 1,3-2,5 l/ettaro in primavera.

AREE INCOLTE (argini di canali, fossi e scoline, sedi ferroviarie, bordi stradali, aree industriali): **10-12 l/ettaro**.

Negli impieghi non risicoli, se non piove effettuare un'irrigazione dopo 10-12 giorni dal trattamento. Operare a bassa pressione, massimo 2-3 atmosfere, utilizzando volumi di acqua compresi tra i 300 e 500 litri/ettaro. Dopo il trattamento non lavorare il terreno.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i diserbanti, quali ad es. Pendimetalin, Tiobencarb, Molinate, Bensulfuron metile, usati sulle colture menzionate.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Avvertenze: Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

MANCOS

FUNGICIDA DI CONTATTO IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI A VASTO SPETTRO D'AZIONE

MANCOS Registrazione Ministero della Salute n. 11.906 del 17-02-2004

COMPOSIZIONE	
MANCOZEB puro	g. 75
Coformulanti q.b. a	g.100

CO.NA.S. Srl
Via Concordia, 15 - 20090 Assago (Mi)

Contenuto
200-250-500 g 1-5-10-20 Kg

SIMAR srl
Sede legale: **Via della Tromba, 15 - Garlasco (PV)**
Sede amm.va: **Via Industria, 6 - Tromello (PV)**
Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
KING TECH. CORPORATION – Shenzhen P.R. – Cina
SIPCAM SpA – Salerano sul Lambro (Lodi)

Partita n.
Stabilimento di confezionamento:
CHEMIA SpA – S. Agostino (Ferrara)

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare il recipiente ben chiuso. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il **Mancos** è un fungicida ad azione preventiva in granuli idrodispersibili dotato di vasto spettro d'azione. È pertanto indicato per la lotta contro la ticchiolatura delle pomacee, la peronospora della vite, del pomodoro e del tabacco, la marssonina del pioppo, le ruggini del garofano e dei cereali vernini, nonché per la concia delle sementi di cereali, patata, girasole e sementi orticole. La formulazione microgranulare consente inoltre un'apprezzabile praticità d'impiego in quanto non fa polvere, si scioglie prontamente e direttamente nel serbatoio dell'irroratrice, si dosa facilmente al pari di un liquido.

SETTORI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il **Mancos** si impiega diluito in acqua con le seguenti modalità:

Colture	Avversità	Dosi d'impiego	Epoche d'impiego
MELO, PERO	**Ticchiolatura, Alternaria, Glomerella**	**200 g/hl**	**Interventi preventivi o dopo bagnature infettanti**
VITE	**Peronospora, Escoriosi, Antracnosi**	**200 g/hl**	**Contro l'Escoriosi, negli interventi a gemme chiuse e con germogli a 5 cm: 300-350 g/hl**
POMODORO	**Peronospora, Alternaria, Septoria, Cladosporiosi**	**200-300 g/hl**	**Trattamenti preventivi fino alla fioritura del primo palco fiorale**
TABACCO	**Peronospora in semenzaio** **Peronospora in post-trapianto** Peronospora in pieno campo	**100-150 g/hl** **200 g/hl** **200 g/hl**	**Trattare quando le piantine sono di cm 1,5 di diametro.** **Trattare due volte la settimana.** **Trattare una volta la settimana oppure al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.**
PIOPPO	**Marssonina**	**400-500 g/hl** **250-350 g/hl**	**Intervenire secondo la necessità con almeno 4 Kg/ha** **Con pioppelle in vivaio**
GAROFANO (in pieno campo)	**Ruggine, Alternaria**	**200-250 g/hl**	**Intervenire secondo la necessità**
CEREALI (frumento, orzo, segale, avena)	**Ruggini, Septoria, Fusariosi**	**2,5 Kg/ha**	**All'emissione della spiga**

Preparazione della poltiglia: Versare la dose stabilita di prodotto in poca acqua a parte oppure direttamente nel serbatoio dell'irroratrice parzialmente riempito di acqua, mantenendo il liquido in agitazione sino a completa dissoluzione dei granuli.

Il prodotto è inoltre indicato per la concia umida delle sementi. Il Mancos, dopo diluizione in poca acqua, deve essere mescolato uniformemente con le sementi da conciare; tale operazione è agevolata dall'impiego di un apposito recipiente cilindrico rotante.

CONCIA SEMENTI	Avversità	Dosi d'impiego per 100 Kg di seme
Frumento	**Carie, Fusariosi**	**200 g**
Riso	**Brusone, Fusariosi**	**250 g**
Mais	**Carbone, Elmintosporiosi, Fusariosi, Gibberella**	**300 g**
Girasole	**Fusariosi, Pythium**	**300 g**
Sementi orticole	**Fusariosi, Rhizoctonia, Pythium**	**300-600 g**
Patata	**Fusariosi, Rhizoctonia, Alternaria**	**300 g per 100 Kg di tuberi**

Avvertenze: I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione dell'uomo e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme sui rifiuti tossici o nocivi.
Nell'impiego delle sementi trattate utilizzare indumenti protettivi e guanti adatti.
COMPATIBILITÀ - Il prodotto non è miscibile con poltiglia solfocalcica, con formulati alcalini e con concimi fogliari contenenti boro.
Avvertenza: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ - Non impiegare su varietà di pero Mancozeb-sensibili: Spadona, Scipiona, S. Giovanni, Gentile, Gentilona, Armella, Coscia, Curato, Conference, Santa Maria, Spina Carpi, Giardina, Butirra precoce, Morettini, Zecchermanna, Principessa di Gonzaga, Mora.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO. SU POMODORO TRATTAMENTI CONSENTITI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - NON IMPIEGARE IN SERRA - NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

PROPIL FL

(Sospensione concentrata)

DISERBANTE SELETTIVO DI POST-EMERGENZA CONTRO IL GIAVONE ED ALTRE INFESTANTI DELLA RISAIA

PROPIL FL Registrazione Ministero della Salute n.11.590 del 14-02-2003

COMPOSIZIONE

PROPANIL puro g. 35 (=370 g/l)

Coformulanti q.b.a g. 100

Stabilimenti di produzione:

CHEMIA SpA – S. Agostino (Ferrara)

KING TECH CORPORATION – Shenzhen, P.R. Cina

SIPCAM SpA – Salerano sul Lambro (Lodi)

CO.NA.S. Srl
Via Concordia, 15
20090 Assago (Mi)

Contenuto: 10-20-50* L

Partita n.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urina scura.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il PROPIL FL è un diserbante selettivo del riso ad azione principalmente per contatto, ma anche per successiva traslocazione, che si impiega in post-emergenza del riso e delle infestanti. È un formulato in sospensione concentrata prontamente solubile in acqua.

Il PROPIL FL viene impiegato nella lotta contro i giavoni (*Echinochloa spp*) e contro le ciperacee e le alismatacee provenienti da seme, comunque solo nei primi stadi del loro sviluppo.

ERBE INFESTANTI SENSIBILI

Attività piena: *Echinochloa spp.* (Giavone), *Digitaria spp.* (Digitaria), *Setaria spp.* (Setaria).

Attività solo nei primi stadi: *Alisma spp.* (Cucchiaio), *Bidens spp.* (Forbicina o Pidocchio del lupo), *Cyperus difformis* (Porro), *Heleocharis spp.* (Porretta), *Polygonum hydropiper* (Poligono pepe d'acqua), *Polygonum amphibium* (Poligono anfibio), *Sagittaria sagittaefolia* (Erba saetta), *Scirpus* o *Bolboschoenus maritimus* (Cipollino), *Scirpus o Schoenoplectus mucronatus* (Quadrettone).

Attività solo parziale, ma con il miglioramento dell'attività degli altri erbicidi (Solfoniluree e/o fitormonici) impiegati in miscela con il PROPIL FL: *Butomus umbellatus* (Giunco fiorito), *Heteranthera spp.* (Eterantera), *Potamogeton spp.* (Lingua d'acqua), *Sparganium spp.* (Palmassa), *Typha spp.* (Mazza sorda).

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

La distribuzione dell'erbicida va eseguita con la risaia in asciutta operando in giornate soleggiate e dopo che la rugiada è scomparsa dalle piantine di giavone. Effettuato il trattamento la risaia deve rimanere in asciutta per almeno 24 ore, dopo di che si dovrà ripristinare il livello dell'acqua e mantenerlo per 6-8 giorni il più alto possibile, naturalmente in relazione allo sviluppo del riso. Non eseguire il trattamento nel caso in cui si preveda una pioggia a distanza di 3-6 ore, in quanto se dovesse piovere entro tale periodo l'attività erbicida risulterebbe compromessa.

Il PROPIL FL va applicato con le comuni irroratrici portate o trainate da mezzi meccanici, previa diluizione in acqua, in un volume sufficiente da consentire una perfetta copertura delle infestanti da combattere; è buona norma aggiungere un bagnante adesivante per migliorare l'attività di contatto.

DOSI D'IMPIEGO

Le dosi d'impiego variano a seconda dello stadio vegetativo del giavone e più precisamente:

- 9-10 litri/ha con giavoni allo stadio di 1-3 foglie, ma in maggioranza con 2 foglie
- 12-13 litri/ha con giavoni a 3-4 foglie
- 14-18 litri/ha con giavoni dalla 4ª foglia all'inizio dell'accestimento.

Il PROPIL FL è maggiormente efficace quando le infestanti sono in rapido accrescimento. Quando il giavone cresce con temperature più basse è necessario aumentare convenientementre le dosi.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non deve essere usato in miscela con fertilizzanti o con altri prodotti fitosanitari non diserbanti e non deve essere distribuito dai 5 giorni prima ai 5 giorni dopo l'impiego di questi prodotti in quanto il riso potrebbe subire danni da fitotossicità. Il PROPIL FL risulta compatibile con i bagnanti adesivanti che consentono di migliorarne l'attività di contatto.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ - Alle dosi d'impiego più elevate, in particolari condizioni (temperature più elevate, piante del riso giovani e filate), si potrebbero verificare parziali necrosi o ingiallimento degli apici delle foglie di riso, che si risolvono comunque nello spazio di 6-7 giorni al massimo, senza pregiudizio alcuno per le giovani piante di riso. Trattare in giornate con assenza di vento per evitare che la nube irrorante giunga a contatto con qualunque altra coltura adiacente.

RISCHI DI NOCIVITÀ - Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

***Attenzione: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Non disperdere nell'ambiente.**

**** Non applicabile per le confezioni da 50 L.**

PROPIL 35

(Concentrato emulsionabile)

DISERBANTE SELETTIVO DI POST-EMERGENZA CONTRO IL GIAVONE DEL RISO

PROPIL 35 Registrazione Ministero della Salute n. 12.082 del 11-05-2004

COMPOSIZIONE

PROPANIL puro g 35 (=369,25 g/l)
Coformulanti* q.b.a g 100

*contiene Xilene e Isoforone

CO.NA.S. Srl
Via Concordia, 15
20090 Assago (Mi)

Stabilimenti di produzione:
- **ALTHALLER ITALIA srl** – San Colombano al Lambro (MI)
- **CHEMIA SpA** – S. Agostino (FE)
- **INQUIPORT** – Caracas (Venezuela)
- **SIPCAM SpA** – Salerano sul Lambro (LO)

Contenuto
10 - 20 – 50* L

Partita n.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Il PROPIL 35 è un diserbante selettivo di post-emergenza del riso efficace contro *Echinochloa crus-galli* (giavone) ed anche contro lo *Scirpus mucronatus* (giunco nudo) nei primi stadi del loro sviluppo. La distribuzione dell'erbicida va eseguita con la risaia asciutta; di norma è pertanto sufficiente togliere l'acqua dalle camere 24-36 ore prima del trattamento avendo cura che anche le piantine di giavone siano asciutte. La risaia deve rimanere tale per almeno 24 ore, dopo di che si dovrà ripristinare il livello dell'acqua e mantenerlo il più alto possibile per 6-8 giorni. Trascorso questo periodo l'acqua potrà essere mantenuta ad un livello più basso, ma tale da non favorire nuove infestazioni di giavone. Nel caso di riso trapiantato, effettuare la distribuzione del prodotto, tenendo gli ugelli o spruzzatori molto bassi, quasi a livello degli apici delle foglie di riso in modo da colpire meglio le piantine di giavone altrimenti coperte e protette dalla vegetazione del riso già piuttosto espansa. Eseguire il trattamento nelle ore più calde della giornata.

Il PROPIL 35 va distribuito previa diluizione in acqua in un volume compreso tra 300 e 600 litri per ettaro, in funzione del mezzo di distribuzione e delle dosi di prodotto. Le dosi di impiego variano a seconda dello stadio vegetativo del giavone:
- 9 - 9,5 l/ha con giavone tra la 1ª e la 2ª foglia
- 11,4 l/ha con giavone tra la 2ª e la 4ª foglia
- 14-18 l/ha con giavone tra la 4ª foglia e l'inizio dell'accestimento.

Non eseguire il trattamento nel caso in cui si preveda una pioggia a distanza di 3-6 ore.

Per un controllo più completo di alcune ciperacee e di malerbe a foglia larga si consiglia di aggiungere al prodotto, alle dosi precedentemente indicate, 1-2 litri/ha di un formulato a base di MCPA al 25%; in questo caso l'asciutta della risaia non deve essere completa, per non lasciare scoperte eventuali radici superficiali del riso.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non deve essere usato in miscela con fertilizzanti, insetticidi od altri antiparassitari non consigliati e non deve essere distribuito 5 giorni prima o dopo l'impiego di questi prodotti, altrimenti il riso può subire delle bruciature.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Alle dosi di impiego più elevate il PROPIL 35, in particolari condizioni, può causare parziale necrosi od ingiallimento degli apici delle foglie del riso che si risolvono però nello spazio di 6-7 giorni al massimo, senza pregiudizio alcuno per lo sviluppo delle giovani piantine di riso.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.
Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

***Attenzione**: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Non disperdere nell'ambiente.**

**** Non applicabile per le confezioni da 50 L**

PROCHIMAG

BETAMYN

DISERBANTE SELETTIVO IN POLVERE BAGNABILE
PER IL DISERBO DELLE BIETOLE DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono
Cloridazon puro g 67,2
Coformulanti q.b. a 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PROCHIMAG di Mandrioli Rag. Giuseppe
Via Byron n. 10 – Bologna Tel. 051 703202

Stabilimenti di produzione:
- SARIAF S.P.A., Via S. Silvestro n. 1, Faenza (RA)
- SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164, Modena
Taglie delle confezioni: Kg 1
Registrazione del Ministero della Sanità n. 5246 del 23/02/1983
Riferimento partita:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega in pre-semina, pre-emergenza e post-emergenza a dosi variabili da 3 a 6 Kg/ha, a seconda della natura del terreno:
- su terreni leggeri: Kg 3/ha
- su terreni medio impasto: Kg 4/ha
- su terreni pesanti, argillosio torbosi: Kg 5-6/ha

Diluire la presetabilita quantià di prodotto in 3-8 ettolitri di acqua per ettro irrorando con pompe a volume normale. Il terreno deve essere finemente preparato, fresco e umido per permettere al prodotto di distribuirsi uniformementesullo strato superficiale e venire assorbito dai semi in germinazione e dalle prime radici delle infestanti. Qualoroa si operi su terreno asciutto e non si abbiano successive piogge è necessario procedere a una irrigazione entro 8/10 giorni dal diserbo.
Preparazione della poltiglia: disperdere la quantità di prodotto richiesta in poca acqua e versare nel quantitativototale di acqua da spargere.
COMPATIBILITA': Il prodotto è miscelabile con gli altri diserbanti per bietole impiegati in pre e post emergenza. E' miscelabile pure con gli insetticidi per la lotta contro gli insetti della bietola.
AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Quando si usa in post-emergenza si consiglia il trattamento nel periodo che va dall'emergenza della bietola fino all'emissione della seconda foglia vera. La selettività del BETAMYN può essere compromessa da attacchi di insetti o di funghi che determinano lesioni sulle radici o sulle foglie aprendo vie alla penetrazione del prodotto. Evitare che la miscela erbicida giunga a contatto con colture sensibili vicine.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 gioni prima del raccolto.
ATTENZIONE ad impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante oculare e cutaneo; per ingestione: scialorrea, vomito e diarrea. **Terapia:** sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
CAMBER è un erbicida di post-emergenza, che agisce sulle infestanti sia per assorbimento radicale che fogliare e viene traslocato in tutta la pianta tramite la circolazione linfatica.
Dato il rapido assorbimento da parte delle piante, eventuali piogge che avvengono dopo poche ore dal trattamento non influiscono sulla sua attività erbicida.
Controlla le seguenti infestanti: Amaranto comune (Amaranthus retroflexus), Borsa del pastore (Capsella bursa pastoris), Caglio asprello (Galium aparine), Camomilla comune (Matricaria camomilla), Canapa selvatica (Galeopsis tetrahit), Cencio molle grande (Abutilon theophrasti), Centocchio comune (Stellaria media), Centocchio dei campi (Anagallis arvensis), Erba corregiola (Atriplex patula), Erba morella (Solanum nigrum), Erba storna comune (Thlaspi arvense), Farinello comune (Chenopodium album), Fiordaliso vero (Centaurea cyanus), Fumaria comune (Fumaria officinalis), Galinsoga comune (Galinsoga parviflora), Iva (Ajuga spp.), Ortica minore (Urtica urens), Papavero comune (Papaver rhoeas), Poligono centinodia (Polygonum aviculare), Poligono convolvolo (Fallopia convolvulus), Poligono persicaria (Polygonum persicaria), Ravanello selvatico (Raphanus raphanistrum), Renaiola comune (Spergula arvensis), Senape selvatica (Sinapis arvensis), Senecione Comune (Senecione vulgaris), Veccia (Vicia spp.) Veronica spp., Stoppione (Cirsium arvense), Vilucchio bianco (Calystegia sepium), Vilucchio comune (Convolvolus arvensis), Sicio o zucchina selvatica (Sycios angulatus), Assenzio selvatico (Artemisia vulgaris), Stramonio (Datura stramonium), Fitolacca (Phytolacca decardra), Ranuncolo (Ranunculus spp.), romice (Rumex spp.), Lappola (Xantium spp.).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

C A M B E R

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA LIQUIDO

COMPOSIZIONE - 100 g di prodotto contengono:
Dicamba puro g 21,2 (g/l 222,6)
Coadiuvanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione; Provoca ustioni

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

CORROSIVO

PROCHIMAG di Mandrioli Rag. Giuseppe
Via Byron n. 10 – Bologna Tel. 051 703202
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE)
-ALTHALLER ITALIA S.R.L., Strada Comunale per Campagna n. 5, San Colombano al Lambro (MI)
-INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A., Via Nettunese Km 23,400, Aprilia (LT)
-CHEMIA S.P.A., Strada Statale n. 255 Km 46, Sant'Agostino (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 9706 del 28/07/1998
CONTENUTO: ml 500 ℓ 1-5-10-20
Riferimento partita:

Viene impiegato sulle seguenti colture:

colture	epoche	dosi / ha	note
FRUMENTO E CEREALI minori (orzo, avena, segale)	post-emergenza intervenendo il più precocemente possibile con coltura a 5-6 foglie	ml 600	
MAIS	post-emergenza intervenendo dalle prime due foglie vere della coltura in poi, quando la maggior parte delle infestanti è già emersa e si trova nei primi stadi di sviluppo.	litri 0,8-1,2	
ASPARAGO	prima della fuoriuscita dei turioni	ml 200-500	con terreno sarchiato e leggermente umido
RISO	post-emergenza	ml 375-550	
MELO		ml 500-650	in miscela con l'MCPA con presenza di infestanti
PRATI PASCOLI	durante la stagione vegetativa	ml 450-900	

AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Non applicare il prodotto su colture di Mais in terreni sabbiosi e poveri di sostanza organica (meno del 2%) in qunto potrebbe risultare fitotossico.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore; non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto per il melo e 20 giorni per tutte le altre colture.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

CITRIN EC

Insetticida a largo spettro d'efficacia - formulazione : liquido emulsionabile

Composizione
-Cipermetrina pura g. 5 (= 45 g/l)
-Coadiuvanti qb a 100

Frasi di Rischio
Tossico per organismi acquatici: Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare. né bere, né fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature;Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PROCHIMAG di Mandrioli G. - via Byron 10 - Bologna

officina di produzione : Diachem spa - Unità produttiva SIFA (Caravaggio) / Torre srl - Torrenieri (fraz. Montalcino) - Siena Terranalisi srl - Via IV Novembre - Renazzo (FE) / AL THALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI)
Registrazione n. 10581 Ministero della Sanità del 06/09/2000
lt. 0.020-0.05-0.1-0.5-1-5-10 Partita n.

INFORMAZIONE PER IL MEDICO : Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione - Avvertenza : consultare un centro antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il CYMETRIN 5 EC è un prodotto che agisce per contatto ed ingestione sugli insetti parassiti con notevole potere abbattente e residuo ed effetto repellente. Viene indicato sulle seguenti colture :
- patata - cavolo verza - cavolo cappuccio - cipolla - cavolfiore - cavolo broccolo - pomodoro - fagiolino - pisello ; ml 100 - 125 contro la Dorifora, ml 100 - 150 contro le Nottue allo scoperto, Afidi, Cavolaia, Tripidi e Piralide, ml 75 - 100 contro la Mosca bianca. - pesco - ciliegio : ml 100 - 150 contro Anarsia, Cydia, tripidi, mosca, lepidotteri in genere e Cocciniglie contro le neanidi in trattamenti estivi: ml 75 - 10 su Afidi con foglie non accartocciate.
Se si vuole controllare gli insetti svernanti e uova di acari trattare alla dose di ml 100 - 150 con un olio bianco lt 1.5 allo stadio vegetativo dei bottoni rosa arancio - limone : ml 100 - 150 contro le Cocciniglie (neanidi in trattamenti estivi) e Mosca degli agrumi, ml 75 - 100 contro Afidi e Mosca bianca. vite : ml 100 - 150 contro Tignola e Tignoletta e ml 100 - 125 contro Sigaraio e Cocciniglia
pero : ml 100 - 150 contro la Psilla con trattamento di fine inverno contro gli adulti svernanti, ml 150 (come secondo trattamento) con prime neanidi, quindi eventuale terzo trattamento a ml 200 - 300 contro la terza generazione; ml 75 - 100 contro gli Afidi e ml 100 - 150 contro Cemiostoma, Litocollete, Nepticula trattando alla prima generazione allo stadio di uova mature, contro Ricamatrici estive e Lepidotteri in genere, Carpocapsa, Cocciniglie (contro neanidi nei trattamenti estivi).
Se si vuole controllare gli insetti svernanti e uova di acari trattare alla dose di ml 100 - 150 con un olio bianco lt 2-3 tra le orecchiette di topo e la differenziazione dei mazzetti fiorali.
barbabietola da zucchero . lt 1 - 1.2 per ettaro contro l'Altica, ml 500 - 800 contro gli Afidi e lt 0:8 - 1 contro Nottue, Cleono, Lisso, Casside.- tabacco : ml 75 - 100 contro Afidi e Mosca bianca, ml 100 - 150 contro Nottue e Tripidi
mais : ml 75 - 100 contro Afidi e ml 100 - 150 contro Piralide
frumento : ml 75 - 100 contro Afidi e Lema
soia : ml 100 - 150 contro Cimice verde, Afidi e Tripidi
floreali, ornamentali . ml 75 - 100 contro Afidi, Mosca bianca; ml 150 - 200 contro Bega del garofano e Lepidotteri in genere; ml 100 - 150 contro Tripidi, Maggiolino e Nottue
- pioppo : ml 75 - 100 contro Afidi e ml 100 - 150 contro Saperda e Criptorrinco
Avvertenze : i dosaggi sono riferiti a q.le acqua salvo diversa indicazione; trattare con dosi più alte con infestazioni forti e bagnare bene tutta la pianta, non trattare durante la fioritura.
Compatibilità : eseguire prima delle prove parcellari. AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA' : è tossico per insetti utili e pesci
"Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle" - "Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento"- "Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza" Sospendere i trattamenti prima della raccolta : soia 3 giorni, fagiolino, pisello, cavolo broccolo e cavolfiore 7 giorni, arancio, pesco: ciliegio, pero, cavolo verza e cappuccio, limone, cipolla, patata 14 giorni, pomodoro e barbabietola da zucchero 21 giorni, vite, mais 28 giorni, frumento 42 giorni e tabacco 60 giorni
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI: PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO: NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA: DA NON VENDERSI SFUSO: SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI: IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE: NON OPERARE CONTRO VENTO: IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO: NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE, NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

CITRIN EC

Insetticida a largo spettro d'efficacia - formulazione : liquido emulsiona

Composizione
-Cipermetrina pura g 5 (= 45 g/l)
-Coadiuvanti qb a 100

Frasi di Rischio
Tossico per organismi acquatici; Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature;Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PROCHIMAG di Mandrioli G. - via Byron 10 - Bologna

officina di produzione : Diachem spa - Unità produttiva SIFA (Caravaggio) / Torre srl - Torrenieri (fraz. Montalcino) - Siena / Terranalisi srl - Via IV Novembre - Renazzo (FE) / ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI)
Registrazione n. 10581 Ministero della Sanità del 06/09/2000
lt. 0,020-0,05-0,1 Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ENOTHIRAM 50

POLVERE BAGNABILE PER LA LOTTA CONTRO LE MALATTIE CRITTOGAME DELLE PIANTE

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono
TIRAM puro g 47,5
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO -
Nocivo per inalazione e ingestione; Irritante per gli occhi e la pelle; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PROCHIMAG di Mandrioli Rag. Giuseppe
Via Byron n. 10 – Bologna Tel. 051 703202
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6, Cento (FE) - DIACHEM S.P.A., Unità produttiva SIFA, S.S. Padana Superiore, Caravaggio (BG) - SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164, Modena
Registrazione del Ministero della Sanità n. 1160 del 28/05/1974
Riferimento partita N.: CONTENUTO: Kg 1-5

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - **Sintomi: cute:** eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. **Terapia:** sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
ENOTHIRAM 50 è un anticrittogamico in polvere bagnabile con azione contro:
Vite - contro la Muffa grigia (Botrytis) e Peronospora g 250-300
Tulipano – Gladiolo – contro Marciume g 250-300
Fragola – contro la Vaiolatura g 250-300
Pero – Melo – contro la Ticchiolatura g 300-400
Pesco – **Susino** – **Albicocco** – contro Corineo, Bolla, Gommosi e Vaiolatura con trattamenti primaverili-estivi g 200-250
Disinfestazione del terreno semenzai – g 4 per metro quadro. Effettuare i trattamenti in base alla gravità delle infezioni ed a scopo preventivo.
Tutte le dosi sono riferite a quintale acqua salvo diversa indicazione.

COMPATIBILITA' - Non è miscibile con prodotti alcalini quali la Poltiglia Bordolese e Polisolfuri; con Metidation, Chinometionato, Rame, Thioquinox. Si sconsigliano pure miscele con Parathion e Metil parathion.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' – E' sconsigliabile impiegarlo nelle cultivar di pero: Trionfo di Vienna, Butirra Clargeau, Contessa di Parigi e Butirra d'Anjou e sulle piante precedentemente trattate con sali di rame.
NOCIVITA' – Il prodotto è nocivo per i pesci, gli insetti utili, il bestiame e gli animali domestici.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.
"Attenzione, il prodotto tal quale contiene sostanza molto tossica per gli organismi acquatici."
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

FALTEX

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE A BASE DI FOLPET

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono
Folpet puro g 47,5
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione; Irritante per gli occhi; Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PROCHIMAG di Mandrioli Rag. Giuseppe
Via Byron n. 10 – Bologna Tel. 051 703202

Stabilimento di produzione: CHEMIA S.P.A., Strada Statale n. 255 Km 46, Sant'Agostino (FE) / SCAM S.R.L., Via Bellaria n. 164, Modena
Registrazione del Ministero della Sanità n. 5877 del 25/04/1984
CONTENUTO: Kg 1
Riferimento partita:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione: possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Vite - contro la Muffa grigia e la Peronospora alle dosi di g 200-250 per ettolitro di acqua.

COMPATIBILITA' - FALTEX è miscelabile con tutti i prodotti di comune impiego. Non è miscelabile con poltiglia bordolese, polisolfuri e olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e prodotti a base di zolfo.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA'- Il prodotto è tossico per gli insetti utili e i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto
Avvertenza - **Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.**
ATTENZIONE ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli evnetuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

FENITER 50

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE: 100 g. di prodotto contengono
Fenitrotion puro g 47,5 (g/l 510)
Coformulanti q.b. a g 100
(contiene nafta solvente)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione; Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione; L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle; L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza; In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

PROCHIMAG di Mandrioli Giuseppe
Via Byron n. 10 - Bologna

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L., Via IV Novembre n.19/1, Renazzo di Cento (FE) - ALTHALLER ITALIA S.R.L., Strada Comunale Per Campagna, San Colombano Al Lambro (MI) - CHEMIA S.P.A., Strada Statale n. 255 Km 46, Sant'Agostino (FE) - SCAM S.R.L., Via Bellaria n. 164, Modena - INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A., Via Nettunese Km 23,400, Aprilia (LT)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 6069 del 08/10/1984
CONTENUTO: ℓ 1-5
Riferimento partita:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsione, coma. **Cause di morte:** generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).**Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO **Preparazione dell'emulsione:** diluire in poca acqua e sotto agitazione versare nel totale quantitativo di acqua.

colture	parassiti	dose/hl di acqua
VITE	Tignole	ml 140-150
	Cicaline, Sigaraio, Cocciniglie	ml 150-165
POMACEE	Carpocapsa, Afidi, Psilla, Rodilegni	ml 140-165
FRAGOLA	Eulia, Pandemis, Afidi	ml 140-165
DRUPACEE	Anarsi, Cidia, Cocciniglie, Mosca	ml 140-165
AGRUMI	Mosca, Cocciniglie, Tripidi	ml 140-165
CASTAGNO	Afidi, Carpocapsa	ml 110-140
NOCE - NOCCIOLO	Afidi, Carpocapsa, Lecanio, Altica	ml 140-165
OLIVO	Mosca, Tignola, Liotripide, Margaronia	ml 140-165
ORTAGGI: CAVOLI	Afidi, Cavolaie	ml 110-140
CARCIOFO	Afidi, Casside, Vanessa, Depressaia	ml 110-165
ASPARAGO	Afidi, Criocera	ml 110-140 (aggiungendo bagnante adesivo)
ORTAGGI A FOGLIA	Afidi, Tipule, Nottue, Mamestra, Piralide	ml 110-140
SOLANACEE	Afidi, Nottue	ml 140-165
PATATA	Dorifora	ml 140-165
LEGUMI	Afidi, Calocoride	ml 110-140
ORTAGGI A RADICE	Afidi, Punteruolo	ml 110-140
CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO, PORRO	Tignola, Mosca, Cosside	ml 110-140 (aggiungendo bagnante adesivo)
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Altica, Cleono, Lisso, Casside	ℓ 1,100-1,650/ha
CEREALI	Afidi, Lema, Coppette, Chironomi	ℓ 1,100-1,350/ha
ERBA MEDICA	Misurino	ml 110-140
TABACCO	Afidi, Nottue	ml 110-140
FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI	Afidi, Tripidi, Tingidi	ml 110-140
PIOPPO	Saperda, Tarlo vespa	ml 140-200

COMPATIBILITA' - Il prodotto non è miscibile con fitofarmaci a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, pesci e bestiame. E' necessario pertanto far trascorrere 20 giorni dal trattamento prima di far pascolare il bestiame sulle zone trattate od alimentarlo con prodotti che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto con il prodotto. **INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto. Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Fitex

Fungicida sistemico e di contatto
Tipo di formulazione polvere bagnabile

COMPOSIZIONE:
-MICLOBUTANIL puro 1 %
-ZOLFO puro 30%
(esente da Selenio)

IRRITANTE

Frasi di rischio : Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

Consigli di prudenza : Conservare fuori dalla portata dei bambini: Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande: Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego: Usare indumenti protettivi e guanti adatti: 40Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare molta acqua.

PROCHIMAG di Mandrioli G. - via Byron, 10 - Bologna (Italia)

Officina di produzione : AGROCHIMICA FAENTINA spa - Faenza (RA)
Peso netto: kg 0.1-0.2-0.5-1-5-10
Registrazione Ministero della Sanità N. 10965 del 08/06/2001 - PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi- organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo irrimunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di. gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. - Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un: Centro Antiveleni.

Campi e Modalità d'impiego
Il FITEX è un fungicida ad azione sistemica e di copertura, dato dall'unione di due p.a., il Miclobutanil e lo Zolfo Viene impiegato sulle seguenti colture:
Vite - contro l'Oidio e il Marciume nero (Black-rot) alla dose di 200-300 g/hl d'acqua ad intervallo di 10-14 giorni a seconda della intensità delle malattie e della differente suscettibilità varietale.
Pesco - contro l'Oidio alla dose di 350-400 g hl iniziando alla scamiciatura del frutto e proseguendo ad intervalli di 10-14 giorni
Melo - contro l'Oidio alla dose di 350-400 g hl ad intervalli di 7-14 giorni in funzione dello sviluppo vegetativo e della intensità della malattia. Contro la Ticchiolatura alla dose di 400 g/hl in miscela con un fungicida di contatto. Inoltre possiede azione cosmetica nei confronti delle varietà sensibili alla rugginosità dei frutti.
Melone, Cocomero, Zucchino, Cetriolo - trattare in pieno campo contro l'Oidio alla dose di 350 - 400 g/hl d'acqua, alla prima comparsa della malattia e proseguire ad intervalli di 8 - 10 giorni. Non impiegare su coltura sotto serra o tunnel.- lo zolfo contenuto nella miscela potrebbe provocare fitotossicità.
Nota: le dosi sopra riferite sono per trattamenti a volume normale, con bagnatura accurata delle parti suscettibili di malattia: in caso di trattamenti a basso volume impiegare la stessa dose per ettaro di prodotto impiegato in trattamenti a volume normale.
COMPATIBILITA': compatibile con i fungicidi, compresi gli antiperonosporici sistemici, nonchè con gli insetticidi fosforganici o carbammati. Avvertenza, in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta -
Nocività : il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per gli organismi acquatici
sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta su melone, cocomero, zucchino, cetriolo, 7 giorni per il pesco e 15 giorni prima della raccolta sulle altre colture.
attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro utilizzo è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

GIANT

Geodisinfestante granulare del terreno

COMPOSIZIONE
- CARBOSULFAN puro g. 5
- Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO :
Nocivo per inalazione e ingestione: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle: Tossico per gli organismi acquatici. può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande: Non mangiare. nè bere. nè fumare durante l'impiego: Usare indumenti protettivi e guanti adatti: Non gettare i residui nelle fognature: In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta: Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

PROCHIMAG di Mandrioli G. - via Byron 10 - Bologna

officina di produzione : A.D.I.C.A. srl - Nera Montoro (TR) / DIACHEM spa - Albano S.Alessandro (BG)
officina di confezionamento : DIACHEM spa - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
Registrazione n. 10211 del 02 12/1999 Ministero della Sanità
kg 0.5-1-3-5-10-15-20 partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi : inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che. determinando una facile regressione della sintomatologia. può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici : disturbi dell'accomodazione. ambliopia. miosi. lacrimazione. scialorrea e broncorrea con broncospasmo: vomito. diarrea. bradicardia. Sintomi nicotinici : tremori e fibrillazioni muscolari. convulsioni. Ipertensione. tachicardia. paralisi flaccida generalizzata. collasso cardiocircolatorio. Terapia atropina - Controindicazioni : ossime - Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Insetticida sistemico che agisce per contatto ed ingestione. con ampio spettro d'azione e persistenza notevole: viene impiegato sulle seguenti colture per combattere gli insetti indicati
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
contro altica. elateridi. nottue e cleono alla dose di kg. 12 per ettaro. localizzato sulla fila al momento della semina: kg 35 - 40 per ettaro. a pieno campo. con leggero interramento subito prima della semina.
MAIS
contro nottue. elateridi. grillotalpa ed altri insetti presenti nel terreno. alla dose di kg. 10 per ettaro. localizzato sulla fila al momento della semina: kg. 35 - 40 per ettaro a pieno campo. con leggero interramento prima della semina.
FLOREALI - ORNAMENTALI IN SERRA E PIENO CAMPO
alla dose di kg. 50 - 60 per ettaro (5 - 6 g/mq in serra) a pieno campo. subito prima della semina con leggero interramento.
Compatibilità : il prodotto deve essere impiegato da solo
"Durante la fase di caricamento del prodotto nel macchinario di distribuzione, utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie"
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE. ALIMENTI. BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

KANGY

Fungicida sistemico con azione preventiva, curativa e bloccante sulle colture di VITE, PERO, MELO, PESCO, ORTIVE, TABACCO, ORNAMENTALI E FLOREALI

Composizione
- Penconazolo puro g. 10
- Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

PROCHIMAG - via Byron 10 - Bologna

Registrazione n. 10.155 del 20/9/1999 Ministero della Sanità
Officina di produzione : SIT SOL FOTECNICA ITALIANA spa - Cotignola (RA) DIACHEM spa - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
A.D.I.C.A. srl - Nera Montoro (TR)
kg. 0.1.-0.2-0.25-0.5-1-5-10-15-20 - Partita n.:*

Informazioni per il medico : sintomi e organi interessati : occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. -Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti) - Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale - Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acute ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergenico. -In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del S. N. C.. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Fungicida sistemico che può essere utilizzato come preventivo, curativo e come bloccante: agisce all'interno della pianta e l'assorbimento del prodotto avviene velocemente (poche ore).

VITE
Oidio (Uncinula necator)
- Trattamenti preventivi: : g. 25 - 30 hl in pre post-fioritura intervenendo ogni 14-16 giorni e g. 15 - 20 hl in pre e post-fioritura effettuando trattamenti ogni 7-10 giorni. Con attacchi in atto (primi sintomi) fare 2 trattamenti ogni 5 - 7 giorni alla dose di ml 50 hl, poi continuare con trattamenti di tipo preventivo. Il prodotto esplica un' attività collaterale su Guignardia spp. e in minor misura su Pseudopezia spp.

MELO
Ticchiolatura (Venturia inaequalis)
-Trattamenti preventivi: g. 30 - 40 hl ogni 6 - 8 giorni fino alla fase di frutto noce, poi ogni 10-15 giorni. I trattamenti contro la Ticchiolatura sono sufficienti per controllare efficacemente anche l'Oidio.
-Trattamenti curativi : g. 40 - 45 hl, si può intervenire entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
- Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi) : g. 40 - 45 hl effettuando 2 applicazioni ogni 5 - 7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali. E' bene aggiungere un prodotto di copertura.
Oidio (Podosphaera leucotricha)
- Trattamenti preventivi : in primavera g. 30 - 40 hl ogni 10 giorni: nei trattamenti estivi ogni 10 - 14 giorni con dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia.
-Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): g. 30 - 35 hl ogni settimana, con un totale di 3 - 4, che consentono il controllo delle infezioni in atto e la protezione della nuova vegetazione. **Malattie da conservazione : (Monilia fructigena, Penicillium spp., Muffa grigia)** - fare in totale 2 - 3 trattamenti a cadenza settimanale in pre raccolto alla dose di 40-45 g.l/hl.

PERO
Ticchiolatura (Venturia pirina):
- Trattamenti preventivi: g. 25 - 35 hl ogni 10 - 12 giorni, impiegando la dose maggiore e gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo della malattia. - Trattamenti curativi: g. 30 - 40 hl trattando entro massimo 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante. - Trattamenti bloccanti: (in presenza di sintomi) g. 30 - 40 hl con 2 trattamenti ogni 5 - 7 giorni, proseguire con cadenze e dosi normali. E' bene aggiungere un prodotto di copertura. **PESCO (comprese le NETTARINE e IBRIDI SIMILI) Oidio**
-Trattamenti preventivi: In zone dove il rischio di infezione è alto e con cultivar particolarmente sensibili trattare a g. 40 - 50 hl dalla caduta petali ed ogni 10 - 14 giorni. In zone a minor rischio intervenire ogni 14 -21 giorni.
Malattie da **conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp., Gloesporium, Muffa grigia)** - fare 2 - 3 interventi a cadenza settimanale in pre-raccolta alla dose di 50 g hl.

TABACCO
Oidio 35 - 50 hl facendo da 2 a 4 trattamenti in modo preventivo, iniziando dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.

MELONE - ZUCCHINO -ZUCCA - CETRIOLO - CARCIOFO - PEPERONE (solo in pieno campo) - POMODORO (solo in pieno campo) - PISELLO - Oidio : In pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione, fare da 2 a 4 trattamenti ogni 14 - 16 giorni a g. 25 - 50 hl a seconda della coltura e del rischio di infezione. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.

COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE: Oidio e ruggini : g. 25 - 50 ml hl ogni 10 - 14 giorni a seconda della coltura e della **incidenza della** malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varieta con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfiei prima di passare ad applicazioni su larga scala.

Avvertenza, in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro utilizzo è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall' uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI: PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO: NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA: DA NON VENDERSI SFUSO: SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI: IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE : NON OPERARE CONTRO VENTO: IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO: NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

KLASS - DUO

Fungicida sistemico e di contatto con azione preventiva. curativa e bloccante

Composizione
- Penconazolo puro g. 1.5
- Zolfo puro (esente da Selenio) g. 40
- coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi. le vie respiratorie e la pelle

IRRITANTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini: Conservare lontano
da alimenti o mangimi e da bevande: Non mangiare. nè bere. nè fumare durante l'impiego: Usare indumenti protettivi e guanti adatti: In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

PROCHIMAG di Mandrioli G.- Via Byron 10 - Bologna
registrazione n. 11166 del 31-1 2002 Ministero della Sanità
Officina di produzione: ADICA srl - Faenza (RA)
kg 0,1.-0.5-1-5-10-15-20 - **Partita n.**

Informazioni per il medico : sintomi e organi interessati : occhi. cute. mucose del tratto respiratorio. fegato . reni. -Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). -Provoca tosse. broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale - Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acute ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergenico. -in caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea. vomito. diarrea) e cefalea. oltre naturalmente a segni di del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del S.N.C.. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica. Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Fungicida sistemico e di contatto che può essere utilizzato come preventivo. curativo e come bloccante: agisce all'interno della pianta e l'assorbimento del prodotto avviene velocemente (poche ore).

VITE
Oidio (Uncinula necator)
- Trattamenti preventivi: : g. 150 - 200 hl in pre post-fioritura intervenendo ogni 14-16 giorni e g. 100 - 150 hl in pre e post-fioritura effettuando il trattamento ogni di 7-10 giorni. Possiede azione collaterale contro l'erinosi.

MELO
Ticchiolatura (Venturia inaequalis)
-Trattamenti preventivi: g. 200 - 250 hl ogni 6 - 8 giorni fino alla fase di frutto noce. poi ogni 10-15 giorni.
-Trattamenti curativi : g. 250 - 300 hl e si può intervenire entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
-Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi) : g. 250 - 300 hl. facendo 2 applicazioni ogni 5 - 7 giorni e poi continuando con le dosi normali.
Oidio (Podosphaera leucotricha)
- Trattamenti preventivi : in primavera g. 220 - 250 hl ogni 10 giorni: nei trattamenti estivi ogni 10 - 14 giorni con dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia.
- Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): g. 200 - 230 hl ogni settimana. con un totale di 3 - 4. che consentono il controllo delle infezioni in atto.
Malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp.)
- fare in totale 2 - 3 trattamenti a cadenza settimanale in pre raccolto alla dose di 250 - 300 g/hl.

PESCO (COMPRESO NETTARINE ED IBRIDI SIMILI)
Oidio
-Trattamenti preventivi: in zone dove il rischio di infezione è alto e con cultivar particolarmente sensibili trattare a g. 250 - 340 hl dalla caduta petali ed ogni 10 - 14 giorni. In zone a minor rischio intervenire ogni 14-21 giorni.
Malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp.)
- fare 2 - 3 interventi a cadenza settimanale in pre-raccolta alla dose di 340 g/hl.

TABACCO
Oidio : g. 240 - 340 hl facendo da 2 a 4 trattamenti in modo preventivo. iniziando dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10 - 14 giorni.

MELONE - ZUCCHINO - ZUCCA - CETRIOLO - CARCIOFO - PEPERONE (solo in pieno campo) - POMODORO (solo in pieno campo) - PISELLO
Oidio : In pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione. fare da 2 a 4 trattamenti ogni 14 - 16 giorni a g. 170 - 340 hl a seconda della coltura e del rischio di infezione. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.

COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE:
Oidio e ruggini : g. 170 - 340 hl ogni 10 - 14 giorni a seconda della coltura e della incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità. si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.

Compatibilità : Il prodotto è compatibile con la generalità degli antiparassitari ad eccezione eccezione di quelli alcalini (polisolfuri. poltiglia bordolese. ecc.) olii minerali. captano. diclorvos. Avvertenza. in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il **periodo di carenza** più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità : il prodotto può risultare fitotossico sulle seguenti varietà di
mele : Balck Ben Davis. Black Stayman. Calvilla Bianca. Coomercio. Golden Delicious. Jonathan. Imperatore. Renetta. Rome Beauty. Stayman Red. Winesap - **pere** : Buona Luisa d'Avranches. Contessa di Parigi. Kaiser Alexander. Oliver de Serres. William. Decana del Comizio - **vite** : Sangiovese. **Cucurbitacee** : può essere fitotossico. Irrorare a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.
attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro utilizzo è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall' uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

LITAR

Fungicida sistemico con azione preventiva, curativa e bloccante
sulle colture di VITE, PERO, MELO, PESCO, ORTIVE, TABACCO, ORNAMENTALI E FLOREALI

Composizione
- Penconazolo puro g. 10,20 (= 100 g/lt)
- coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi e la pelle; Nocivo per gli organismi acquatici.
può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PROCHIMAG di Mandrioli Giuseppe - via Byron 10 - Bologna
Stabilimento di Produzione: AGROCHIMICA FAENTINA spa - via S.Silvestro, 1 - Faenza (RA)
Registrazione n 10.275 del 10/01/2000 del Ministero della Sanità
Litri 0,1-0,2-1-5-10-20 - Partita n°

Informazioni per il medico : sintomi e organi interessati : occhi, cute, mucose del tratto respiratorio iratorio, fegato, reni. -Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). - Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale -Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acute ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergenico. -in caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del S.N.C.. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Fungicida sistemico che può essere utilizzato come preventivo, curativo e come **bloccante: agisce all'interno** della pianta e l'assorbimento del prodotto avviene velocemente (poche ore).
VITE
Oidio (Uncinula necator)
- Trattamenti **preventivi:** . ml 25 - 30 hl in pre post-fioritura intervenendo ogni 14-16 giorni e ml 15 - 20 hl in pre e postfioritura effettuando i trattamenti ogni 7-10 giorni. Con attacchi in atto (primi sintomi) fare 2 trattamenti ogni 5 - 7 giorni alla dose di ml 50 hl, poi continuare con trattamenti di tipo preventivo. Il prodotto esplica un' attività collaterale su Guignardia spp. e in minor misura su Pseudopezia spp.
MELO
Ticchiolatura (Venturia inaequalis)
-Trattamenti preventivi: ml 30 - 40 hl ogni 6 - 8 giorni fino alla fase di frutto noce, poi ogni 10-15 giorni. I trattamenti contro la Ticchiolatura sono sufficienti per controllare efficacemente anche l'Oidio.
-Trattamenti curativi : ml 40 - 50 hl, si può intervenire entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
-Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi) : ml 40 - 45 hl effettuando 2 applicazioni ogni 5 - 7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali. E' bene aggiungere un prodotto di copertura
Oidio (Podosphaera leucotricha)
-Trattamenti preventivi : in primavera ml 30 - 40 hl ogni 10 giorni; nei trattamenti estivi ogni 10 - 14 giorni con dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia.
-Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): ml 30 - 35 hl ogni settimana, con un totale di 3 - 4, che consentono il controllo delle infezioni in atto e la protezione della nuova vegetazione.
Malattie da conservazione :(Monilia fructigena, Penicillium spp.,
fare in totale 2 - 3 trattamenti a cadenza settimanale in pre raccolta alla dose di 40-45 ml/hl.
PERO
Ticchiolatura (Venturia pirina):
-Trattamenti preventivi: ml 25 - 35 hl ogni 10 - 12 giorni, impiegando la dose maggiore e gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli all sviluppo della malattia. -Trattamenti curativi: ml 30 - 40 hl trattando entro massimo 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante -Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi) ml 30 - 40 hl con 2 trattamenti ogni 5 - 7 giorni, proseguire con cadenze e dosi normali. E' bene aggiungere un prodotto di copertura **PESCO**
Oidio
-Trattamenti preventivi: In zone dove il rischio di infezione è alto e con cultivar particolarmente sensibili trattare a ml 40 - 50 hl dalla caduta petali ed ogni 10 - 14 giorni. In zone a minor rischio intervenire ogni 14-21 giorni.
Malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp.)
- fare 2 - 3 interventi a cadenza settimanale in pre-raccolta alla dose di 50 ml/hl
TABACCO
Oidio : ml 35 - 50 hl facendo da 2 a 4 trattamenti in modo preventivo, iniziando dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.
MELONE - ZUCCHINO - ZUCCA - CETRIOLO - CARCIOFO - PEPERONE (solo in pieno campo) **- POMODORO (solo in pieno campo) - PISELLO**
Oidio : in pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione, fare da 2 a 4 trattamenti ogni 14 - 16 giorni a ml 25 - 50 hl a seconda della coltura e del rischio di infezione. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi. **COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE:**
Oidio e ruggini : ml 25 - 50 ml/hl ogni 10 - 14 giorni a seconda della coltura e della incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.
attenzione:' da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro utilizzo è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall' uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREE PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO: NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA: DA NON VENDERSI SFUSO: SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI: IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE: NON OPERARE CONTRO VENTO: IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO: NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

LITAR

Fungicida sistemico con azione preventiva, curativa e bloccante
sulle colture di VITE, PERO, MELO, PESCO, ORTIVE, TABACCO, ORNAMENTALI E FLOREALI

Composizione
- Penconazolo puro g. 10.20 (= 100 g/lt)
- coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi e la pelle: Nocivo per gli organismi acquatici.
può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini: Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande: Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego: In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta: Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PROCHIMAG di Mandrioli Giuseppe - via Byron 10 – Bologna

Stabilimento di Produzione: AGROCHIMICA FAENTINA spa - via S.Silvestro, 1 - Faenza (RA)
Registrazione n. 10.275 del 10/01/2000 del Ministero della Sanità
Litri 0.1 - Partita n°

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

METIOL B

ESCA GRANULARE INSETTICIDA - LUMACHICIDA A BASE DI METIOCARB

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono
METIOCARB puro g 1
Coformulanti q. b. a g 100

Frasi di Rischio
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per 'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PROCHIMAG di Mandrioli Giuseppe
Via Byron n. 10 - Bologna

Stabilimento di produzione :
L.I.F.A. S.R.L. – Via Piave (Zona Industriale) – Isola Vicentina (VI)
L.I.F.A. S.R.L. – Via C. Colombo n. 7/7A – Vigonovo (VE)
INDUSTRIALCHIMICA S.R.L. – Via Lion n. 9 – Maserà di Padova (PD)
ZAPI Industrie Chimiche S.P.A. – Z.I. III Strada n. 12 – Conselve (PD)
Stabilimento, limitatamente al confezionamento: TERRANALISI S.R.L. – Via Nino Bixio n. 6 – Cento (FE)
Registrazione del Ministero Sanità n. 10374 del 08/03/2000
CONTENUTO: g 50-100-250-500 Kg 1-5-10-15-20
Riferimento partita:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi : inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici : disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo, vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici : tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia : atropina. Controindicazione : ossime
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
Il METIOL B è un insetticida - lumachicida che agisce sugli insetti per contatto ed ingestione ed esercita azione contro: lumache, limacce, nottue, maggiolino, grillotalpa, chiocciole, tipule, blaniuli, zabro gobbo, agrotidi e grilli.
Viene impiegato sulle seguenti colture : **asparago, barbabietola da zucchero, cardo, carota, cavoli, cicoria, colture floreali, colture forestali, colture ornamentali, cucurbitacee, drupacee, erbe fresche, erba medica, fagiolino, fagiolo, finocchio, fragola, lattuga e simili, mandorlo, patata, pisello, pomacee, ravanello, sedano, solanacee, spinacio e simili, tabacco, trifoglio, vite.**
Si impiega alla dose di kg. 6 - 10 per ettaro a seconda della gravità dell'attacco, si distribuisce il prodotto nel modo più uniforme possibile, solo sul terreno sottostante la coltura e preferibilmente al mattino o alla sera. Per evitare le infestazioni dall'esterno si deve distribuire il prodotto in quantità abbondante lungo i bordi dell'appezzamento per circa una striscia larga 1 - 2 metri.
Compatibilità : il prodotto deve essere impiegato da solo
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile dagli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

MICROSEV 50 PB

INSETTICIDA AGRICOLO IN POLVERE BAGNABILE A BASE DI CARBARIL

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono
CARBARIL puro (esente da beta-naftolo) g 47,5
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione; Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti; Altamente tossico per gli organismi acquatici

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PROCHIMAG di Mandrioli Giuseppe
Via Byron n. 10 - Bologna

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6, Cento (FE) - DIACHEM S.P.A., Unità produttiva SIFA, S.S. Padana Superiore, Caravaggio (BG) - SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164, Modena
Registrazione del Ministero della Sanità n. 2086 del 02/01/1976
Riferimento partita N.: CONTENUTO: Kg 1-5

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - **Carbaril:** inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; sciallorea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. **Terapia**: Atropina. **Controindicazioni**: Ossime. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Viene impiegato alla dose di g 150-200 per q.le di acqua sulle seguenti colture:
Agrumi (Arancio, Limone, Mandarino, Cedro, Bergamotto) e Olivo: nella lotta contro Saissetia oleae (mezzograno di pepe) e Tignola.
Nocciolo: nella lotta contro la Carpocapsa. **Pesco:** nella lotta contro la Cydia e l'Anarsia. **Pero – Melo:** nella lotta contro la Carpocapsa.
Frutticoltura in pieno campo: contro la Bega del garofano, inoltre può essere impiegato per la lotta contro: Larve ricamatrici della fragola, Tignola della vite, Dorifora della patata, Crisomela del pioppo, Fitodecta e Fitonomo dei medicai.
COMPATIBILITA' – Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari in commercio eccezion fatta per quelli alcalini.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA' – Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

MICROSEV - LF

INSETTICIDA IN EMULSIONE FLUIDA

COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
CARBARIL puro (esente da beta-naftolo) g 47,5 (g/l 545)
Coformulanti q. b. a g 100

NATURA DI RISCHIO
Nocivo per ingestione; Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti; Altamente tossico per gli organismi acquatici

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

PROCHIMAG di Mandrioli Giuseppe
Via Byron n. 10 - Bologna

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L., Via Nino Bixio n. 6, Cento (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 7544 del 06/10/1988
CONTENUTO: ℓ 1
Riferimento partita N.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - **Carbaril**: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: Atropina. **Controindicazioni**: Ossime.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
MICROSEV – LF è un insetticida carbammato che agisce per contatto ed ingestione su un numero notevole di insetti delle colture agricole. Impiegarlo alla prima comparsa dei parassiti ripetendo eventualmente i trattamenti in corrispondenza di nuovi attacchi. Non trasmette odori e sapori sgradevoli alle colture trattate.
DOSI D'IMPIEGO
Pomacee (melo, pero) - ml 130-180/q.le acqua contro la Carpocapsa o Verme delle pomacee, Cacoecia, Capua, Eulia, Pandemis e Orgya.
Noce – ml 130-180/q.le acqua contro Carpocapsa e Cocciniglia.
Drupacee (pesco, ciliegio, susino, albicocco, mandorlo) – ml 180-230/q.le acqua contro Cydia molesta, Anarsa, Eulia, Capua, Cacoecia. Campa del mandorlo, Tignola, Tentredine del susino.
Vite – ml 130-180/q.le acqua contro Tignola, Tignoletta, Eulia e Cicalina.
Olivo – ml 130-180/q.le acqua contro Cocciniglia mezzo grano di pepe, Tignola e Fleotribo.
Agrumi (arancio, limone, cedro, mandarino, clementino, pompelmo) – ml 130-180/q.le acqua contro Tignola, Cocciniglia mezzo grano di pepe, Cocciniglia cotonosa, Cocciniglia bianca, Cocciniglia rossa, Cocciniglia grigia.
Nocciolo – ml 130-180/q.le acqua contro Balanino.
Pioppo – ml 180-230/q.le acqua contro Crisomela, Farfalla bianca.
Colture forestali (conifere: pino, abete, larice, cedro, cipresso) – ml 180-230/q.le acqua contro Limantria, Processionaria, Tortricidi e Coleotteri vari.
Patata, melanzana, peperone, pomodoro – ml 130-220/q.le acqua contro Dorifora, Tignola, Nottue.
Carciofo, cardo – ml 130-220/q.le acqua contro Nottue, Vermi grigi, Vanessa, Depressaria.
Cavolo, cavolfiore – ml 130-220/q.le acqua contro Cavolaia e Nottua.
Asparago, carota, finocchio, cipolla, aglio, fagiolo, pisello, insalata, spinacio, cucurbitacee – ml 130-220/q.le acqua contro Agrotidi, Altiche, Tignole, Crisomeli.
Barbabietola da zucchero – ml 180-220/q.le acqua contro Mosca, Altica, Cassida e Nottue.
Foraggere – ml 180-220/q.le acqua contro Fitonomo, Apion, Misurino, Crisomela, Bombice, Nottue e Piralide.
Garofano (in pieno campo) – ml 180-220/q.le acqua contro Bega verde, Nottue e Tripidi.

COMPATIBILITA' - Il prodotto è compatibile con tutti i principali antiparassitari eccezion fatta dei prodotti a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, calce).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, il pesce ed il bestiame. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' D'IMPIEGO - Caratteristiche: la natura colloidale e di finezza dell' OSSIRAM 20 FLOW permettono: ricoprimento uniforme e completo - adesività utile - resistenza ai dilavamenti. Per questa proprietà OSSIRAM 20 FLOW consente una lotta anticrittogamica efficace, riducendo il carico di rame metallico sulla parte vegetativa delle colture, le quali non vengono pertanto ostacolate nel loro sviluppo.
DOSI - EPOCHE - MODALITA' D'IMPIEGO
Agitare energicamente la confezione prima dell'uso.
Dosi per 100 litri di acqua usando pompe a volume normale.
Vite - peronospora della vite: ml 370-460
Melo e pero - ticchiolatura e cancri rameali:
- ml 740-926 in trattamenti autunnali e di fine inverno
- ml 280-370 in trattamenti pre-fiorali.
E' consigliabile non usarlo durante il periodo vegetativo sulle varietà sensibili al rame.
Pesco - susino - ciliegio - bolla e corineo: ml 740-926 in trattamenti invernali.
Olivo - occhio del pavone e lebbra dell'ulivo: ml 460.
Agrumi - mal secco, antracnosi, fumaggine degli agrumi: ml 460.
Pomodoro e patata - peronospora, alternaria, septoria, cladosporiosi: ml 550.
Barbabietola da zucchero - cercospora delle barbabietole: litri 3,7/ha in 500-600 litri di acqua, 2-3 trattamenti distanziati di 15-20 giorni.
Sedano e carota - septoria e cercospora: ml 460.
Melone - anguria - zucchine - cavolo ed altre crucifere - peronospora e antracnosi: ml 460.
Pisello - fagiolo - fagiolino - antracnosi e ruggine: ml 460.
Garofano - rosa - crisantemo - ruggine, peronospora, ticchiolatura, septoria: ml 460.
Riso - per la lotta contro le alghe delle risaie intervenire alla prima comparsa delle alghe, impiegando litri 3-4 per ettaro diluiti in 200-300 o più litri di acqua.

OSSIRAM 20 FLOW

FUNGICIDA - LIQUIDO SOTTO FORMA DI SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE: 100 g. di prodotto contengono
Rame (sotto forma di Ossicloruro) g 20 (g/l 270)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione;
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini;
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta;
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi;
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

PROCHIMAG di Mandrioli Giuseppe
Via Byron n. 10 - Bologna

Stabilimento di produzione:
TERRANALISI S.R.L., Via Nino Bixio n. 6, Cento (FE)
-CHEMIA S.P.A., Strada Statale n. 255 Km 46, Sant'Agostino (FE)
-L.I.F.A. S.R.L., Via C. Colombo n. 7/7A, Vigonovo (VE)
-SCAM S.R.L., Via Bellaria n. 164, Modena
Registrazione del Ministero della Sanità n. 9420 del 05/11/1997
CONTENUTO: ml 100-200-250-300-500 litri 1-5-10-20
Riferimento partita:

Preparazione della poltiglia - la sospensibilità dell' OSSIRAM 20 FLOW facilita la preparazione della poltiglia. Si consiglia di stemperare la prevista quantità di OSSIRAM 20 FLOW in poca acqua. In modo da ottenere una sospensione uniforme a cui andrà aggiunto il rimanente quantitativo di acqua, agitando lentamente.
COMPATIBILITA'- Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione fortemente alcalina (Polisolfuri e calce) e con prodotti a base di Thiram.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e alcune varietà di melo (Abbondanza "Belford", Black Stayman, Commercio. Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta Del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passa Crassana, B.C.William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibile, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

POLAK - PB

Fungicida sistemico con azione preventiva, curativa e bloccante sulle colture di
VITE, PERO, MELO, PESCO, ORTIVE, TABACCO, ORNAMENTALI E FLOREALI

Composizione
-Penconazolo puro g. 10
-coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio : Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PROCHIMAG di Mandrioli Giuseppe - via Byron 10 Bologna

Registrazione n. 11198 del 5/2/2002 del Ministero della Sanità
Officina di produzione: A.D.I.C.A. srl - FAENZA (RA)
kg. 0.1.-0.5-1-5-10-15-20 - Partita n.:

Informazioni per il medico : sintomi e organi interessati : occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. -Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti) - Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acute ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergenico. -in caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di del possibile interessamento epatico e / o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del S.N.C.. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Fungicida sistemico che può essere utilizzato come preventivo, curativo e come bloccante: agisce all'interno della pianta e l'assorbimento del prodotto avviene velocemente (poche ore).
VITE
Oidio (Uncinula necator)
- Trattamenti preventivi:: g. 25 - 30 hl in pre post-fioritura intervenendo ogni 14-16 giorni e g.15 - 20 hl in pre e post-fioritura effettuando trattamenti ogni 7-10 giorni. Con attacchi in atto (primi sintomi) fare 2 trattamenti ogni 5 - 7 giorni alla dose di ml 50 hl, poi continuare con trattamenti di tipo preventivo. Il prodotto esplica un' attività collaterale su Guignardia spp. e in minor misura su Pseudopezia spp.
MELO
Ticchiolatura (Venturia inaequalis)
-Trattamenti preventivi: g. 30 - 40 hl ogni 6 - 8 giorni fino alla fase di frutto noce, poi ogni 10-15 giorni. I trattamenti contro la Ticchiolatura sono sufficienti per controllare efficacentente anche l'Oidio.
-Trattamenti curativi : g. 40 - 45 hl, si può intervenire entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
-Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi) : g. 40 - 45 hl effettuando 2 applicazioni ogni 5 - 7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali. E' bene aggiungere un prodotto di copertura.
Oidio (Podosphaera leucotricha)
-Trattamenti preventivi : in primavera g. 30 - 40 hl ogni 10 giorni; nei trattamenti estivi ogni 10 - 14 giorni con dosi più alte e gli intervalli più brevi con varieta sensibili e forte incidenza della malattia.
-Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi), g. 30 - 35 hl ogni settimana, con un totale di 3 - 4, che consentono il controllo delle infezioni in atto e la protezione della nuova vegetazione.
Malattie da conservazione . (Monilia fructigena, Penicillium spp., Muffa grigia)
- fare in totale 2 - 3 trattamenti a cadenza settimanale in pre raccolta alla dose di 40-45 g./hl.
PERO
Ticchiolatura (Venturia pirina)
-Trattamenti preventivi: g. 25 - 35 hl ogni 10 - 12 giorni, impiegando la dose maggiore e gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli ali sviluppo della malattia.
-Trattamenti curativi: g. 30 - 40 hl trattando entro massimo 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
-Trattamenti bloccanti: (in presenza di sintomi) g. 30 - 40 hl con 2 trattamenti ogni 5 - 7 giorni, proseguire con cadenze e dosi normali. E' bene aggiungere un prodotto di copertura.
PESCO (COMPRESE LE NETTARINE E IBRIDI SIMILI)
Oidio
-Trattamenti preventivi: In zone dove il rischio di infezione è alto e con cultivar particolarmente sensibili trattare a g. 40 - 50 hl dalla caduta petali ed ogni 10 - 14 giorni. In zone a minor rischio intervenire ogni 14 -21 giorni.
Malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp., Gleosporium, Muffa grigia)
- fare 2 - 3 interventi a cadenza settimanale in pre-raccolta alla dose di 50 g/hl.
TABACCO
Oidio : g 35 - 50 hl facendo da 2 a 4 trattamenti in modo preventivo, iniziando dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni. MELONE - ZUCCHINO -ZUCCA - CETRIOLO - CARCIOFO - PEPERONI (solo in pieno campo) - POMODORO (solo in pieno campo) - PISELLO
Oidio : In pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione, fare da 2 a 4 trattamenti ogni 14 - 16 giorni a g. 25 - 50 hl a seconda della coltura e del rischio di infezione. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.
COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE:
Oidio e ruggini : g. 25 - 50 ml/hl ogni 10 - 14 giorni a seconda della coltura e della incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.
Avvertenza, in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.
attenzione, da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro utilizzo è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall' uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREE PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE: SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO: NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA: DA NON VENDERSI SFUSO: SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTE IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE: NON OPERARE CONTRO VENTO: IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO: NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

POLAK

Fungicida sistemico con azione preventiva, curativa e bloccante
sulle colture di VITE, PERO, MELO, PESCO, ORTIVE, TABACCO, ORNAMENTALI E FLOREALI

Composizione
Penconazolo puro g. 10,20 (= 100 g/lt)
coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi e la pelle: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

IRRITANTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini: Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande: Non mangiare, nè bere, nè fumare **durante l'impiego: In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il** contenitore o l'etichetta: Non disperdere nell'ambiente. **Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza**

PROCHIMAG di Mandrioli Giuseppe - via Byron 10 - Bologna
Stabilimento di Produzione: ALTHALLER ITALIA srl -S.Colombano al Lambro (MI)
Registrazione n. 11165 del 31-1-2002 del Ministero della Sanità
Litri 1-5-10-20 Partita n°

Informazioni per il medico : sintomi e organi interessati : occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato , reni. -Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). -Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. -Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acute ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergenico. -in caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del S.N.C.. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Fungicida sistemico che può essere utilizzato come preventivo, curativo e come bloccante: agisce all'interno della pianta e l'assorbimento del prodotto avviene velocemente (poche ore).

VITE

Oidio (**Uncinula necator**)

- Trattamenti preventivi: · ml 25 - 30 hl in pre post-fioritura intervenendo ogni 14-16 giorni e ml 15 - 20 hl in pre e post-fioritura effettuando : trattamenti ogni 7-10 giorni. Con attacchi in atto (primi sintomi) fare 2 trattamenti ogni 5 - 7 giorni alla dose di ml 50 hl, poi continuare con trattamenti di tipo preventivo. Il prodotto esplica un' attività collaterale su Guignardia spp. e in minor misura su Pseudopezia spp. MELO

Ticchiolatura (Venturia inaequalis)

-Trattamenti preventivi: ml 30 - 40 hl ogni 6 - 8 giorni fino alla fase di frutto noce, poi ogni 10-15 giorni I trattamenti contro la Ticchiolatura sono sufficienti per controllare efficacemente anche l'Oidio. -Trattamenti curativi : ml 40 - 50 hl si può intervenire entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.

-Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi) · ml 40 - 45 hl effettuando 2 applicazioni ogni 5 - 7 giorni quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali. E' bene aggiungere un prodotto di copertura Oidio (Podosphaera leucotricha)

-Trattamenti preventivi : in primavera ml 30 - 40 hl ogni 10 giorni: nei trattamenti estivi ogni 10 - 14 giorni con dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia. -Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): ml 30 - 35 hl ogni settimana, con un totale di 3 - 4, che consentono il controllo delle infezioni in atto e la protezione della nuova vegetazione. Malattie da conservazione :(Monilia fructigena, Penicillium spp.) - fare in totale 2 - 3 trattamenti a cadenza settimanale in pre raccolto alla dose di 40-45 ml/hl.

PERO

Ticchiolatura (Venturia pirina):

- Trattamenti preventivi: ml 25 - 35 hl ogni 10 - 12 giorni, impiegando la dose maggiore e gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli all sviluppo della malattia.

-Trattamenti curativi: ml 30 - 40 hl trattando entro massimo 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.

-Trattamenti bloccanti: (in presenza di sintomi) ml 30 - 40 hl con 2 trattamenti ogni 5 - 7 giorni, proseguire con cadenze e dosi normali. E' bene aggiungere un prodotto di copertura. PESCO

Oidio

-Trattamenti preventivi: In zone dove il rischio di infezione è alto e con cultivar particolarmente sensibili trattare a ml 40 - 50 hl dalla caduta petali ed ogni 10 - 14 giorni. In zone a minor rischio intervenire ogni 1421 giorni. Malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp.)

- fare 2 - 3 interventi a cadenza settimanale in pre-raccolto alla dose di 50 ml hl

TABACCO

Oidio : ml 35 - 50 hl facendo da 2 a 4 trattamenti in modo preventivo, iniziando dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni

MELONE - ZUCCHINO -ZUCCA - CETRIOLO - CARCIOFO - PEPERONE (solo in pieno campo) - POMODORO (solo in pieno campo) - PISELLO

Oidio : In pieno campo e dopo la rimozione del telo di protezione, fare da 2 a 4 trattamenti ogni 14 - 16 giorni a ml 25 - 50 hl a seconda della coltura e del rischio di infezione. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi. COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE: Oidio e ruggini : ml 25 - 50 ml/hl ogni 10 - 14 giorni a seconda della coltura e della incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro utilizzo è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall' uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO: NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI: IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO: IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

PRODIT

Fungicida polivalente
tipo di formulazione : polvere bagnabile

Composizione:
Ditianon puro g. 75
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di rischio : Nocivo per ingestione: Altamente tossico per gli organismi acquatici. **può provocare a lungo** termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di prudenza : Conservare fuori dalla portata dei bambini: Conservare **lontano da alimenti o mangimi** e da bevande: Non mangiare, nè bere, nè fumare **durante l'impiego: Non gettare** i residui nelle fognature: In caso di ingestione consultare **immediatamente il medico e mostrargli il contenitore** o l'etichetta: Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti **pericolosi: Non disperdere nell'ambiente.** Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PROCHIMAG di Mandrioli G. - via Byron 10 - Bologna

Registrazione Ministero della Sanità N. 10166 del 5 10 1999
Stabilimento di produzione : Diachem spa - **Unità produttiva SIFA (Caravaggio) A.D.I.C.A. srl** - Nera Montoro (TR)
Contenuto netto: Kg. 0.1-0.2-0.5-1-5-10-15 Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: irritante oculare e cutaneo, per ingestione: scialorrea, vomito e diarrea. Trattamento topico **delle manifestazioni cutanee con pomate antistaminiche o cortisoniche.**
Terapia sintomatica consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Fungicida che agisce preventivamente e in modo curativo, **per contatto fogliare, con attività fungina più energica con** temperature ed umidità **elevate, possiede** azione stimolante sulla vegetazione e potere **cicatrizzante sui tessuti lesionati dalla grandine** o altre cause: è dotato di resistenza **al dilavamento** e da massima tollerabilità da parte della pianta.
MELO : contro Ticchiolatura, Gloeosporium, Cancri rameali **alla dose di g.** 100 - 120, con **trattamenti** preventivi in zone ad alta virulenza della **malattia e g. 80 - 90** in zone e nei periodi meno favorevoli
PERO : contro Ticchiolatura e Cancri del legno **alla dose di g. 80 - 150**
PESCO : contro Bolla, Corineo o Fusicoccum (Cancro), **Monilia a g. 100 - 150**
VITE : contro Peronospora a g. 100 - 120
POMODORO : contro Phythophtora a g 150
PATATA : contro Peronospora a g. 150
FRAGOLA : contro Vaiolatura a g. 100
PEPERONE : contro Peronospora a g. 120
SPINACIO : contro Peronospora fogliare a g. 100
PISELLO : contro Antracnosi e d'Endrosporiosi a g. 120
FLORICOLTURA IN PIENO CAMPO : contro Ticchiolatura e ruggine della rosa, vaiolo e ruggine del garofano, Botrytis e Antracnosi del ciclamino, Botrytis, ruggine delle Azalee e dell'erica, antracnosi dei ficus, septoria de l'oleandro, ruggine del Rododendro a g. 80 – 100
COMPATIBILITA' : non è miscibile con gli olii minerali, la miscela deve essere impiegata subito dopo la preparazione. Per trattamenti nei mesi estivi è indispensabile aggiungere un bagnante.
AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
"Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle" - "Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento"-"Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza"
FITOTOSSICITA' : Evitare di trattare su melo Golden Delicious in prossimità della raccolta, causa il potere marcante del prodotto.
NOCIVITA' : nocivo verso pesci, animali domestici, bestiame ed insetti utili: nocivo per le api.
Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta dell'uva é 21 giorni per tutte le altre colture
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle pi persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI: PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO: NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA: DA NON VENDERSI SFUSO: IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE: NON OPERARE CONTRO VENTO: IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO: NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

PROVIDER

Acaricida in formulazione di sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
-Clofentezine puro g. 42 (= 500 g/l)
-Coformulanti qb a 100

Frasi di Rischio
Irritante per la pelle: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle:
Altamente tossico per gli organismi acquatici. può provocare a lungo termine
effetti negativi per l'ambiente acquatico

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini: Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande: Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego: Non gettare i residui nelle fognature: Usare indumenti protettivi e guanti adatti: In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta: Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi: Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PROCHIMAG di Mandrioli G. -via Byron 10 - Bologna
officina di confezionamento : DIACHEM spa - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
Registrazione n. 10648 del 13/12/2000 del Ministero della Sanità
Litri 0.1-0.2-0.25-0.5-1-5-10

INFORMAZIONI PER IL MEDICO . in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il PROVIDER è un acaricida in formulazione di sospensione concentrata che agisce per contatto sulle uova (sia invernali che estive) e nei primi stadi (larve) degli Acari Tetranichidi (Panonychus ulmi, Panonychus citri. Tetranychus urticae. Eotetranichus carpini), con azione translaminare e duratura nel tempo.'
Il prodotto può essere miscelato con acaricidi adulticidi nel caso, al momento del trattamento, vi siano popolazioni di acari in diversi stadi di sviluppo: il prodotto non interferisce negativamente sugli insetti ed acari utili (antocoridi, crisopidi, coccinellidi, sirfidi, imenotteri, fitoseidi) per cui è consigliato nei programmi di lotta guidata.
VITE DA VINO
trattare alla dose di ml 20 - 25 / hl. in miscela con un prodotto avente azione adulticida in presenza di forme mobili di Panonychus ulmi, (con germogli lunghi 5-30 cm), nel caso di successive infestazioni di Ragno rosso e giallo trattare subito con pochissimi ragni per foglia. Se si vuole combattere l' Eotetranichus carpini trattare a ml. 25 - 30 ml/hl.
MELO-PERO-PRUGNE
il trattamento sulle uova invernali di Panonychus ulmi, viene effettuato alla dose di ml. 40/hl. ogni 10 - 15 giorni e prima della schiusura delle uova: se si aggiunge olio bianco su può diminuire la dose a ml 30/hl. oppure trattare, sulle forme mobili (Ragno Rosso), impiegando il prodotto alla dose di 30 ml/hl in miscela con un prodotto adulticida, nell'epoca della post - fioritura o al massimo quando vi sono da 1 a 3 acari per foglia.
AGRUMI
contro il P.citri, intervenire all'inizio dell'infestazione alla dose di ml 30 ml/hl in miscela con un adulticida: se si ha T. urticae elevare ai dose a 40 ml/hl più un prodotto adulticida
MELONE - FRAGOLA - POMODORO - FLORICOLE ED ORNAMENTALI IN SERRA ED IN CAMPO
contro T.urticae in pre - fioritura a ml 40/hl insieme ad un prodotto adulticida: se si tratta precocemente, a ml 50 - 60/hl. non si ha la diffusione del litofago sino all'epoca della maturazione
AVVERTENZE : rispettare le norme d'impiego anche per contrastare i ceppi resistenti. In caso di presenza di ceppi resistenti si deve ricorrere all'impiego di un prodotto acaricida alternativo
Quando si tratta la pianta deve essere completamente bagnata (impiegare 1500 - 2000 litri di acqua per ettaro con pompe a volume normale e litri 500 nei trattamenti a basso volume, ovviamente in questo caso la dose del prodotto deve essere diminuita, ma non oltre alla dose di 400 - 500 ml per ettaro). Non trattare in presenza di vento e con alte temperature e bassa umidità.
COMPATIBILITA' : compatibile con olio bianco e rame ossicloruro e una precedente irrorazione di polisolfuro non compromette l'azione acaricida del prodotto. Non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : su qualunque cultivar poco note o da poco introdotta effettuare saggi preventivi.
sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto di pomodoro, melone, e fragola, 30 giorni prima del raccolto delle altre colture.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ROBOCUP

INSETTICIDA - LIQUIDO EMULSIONABILE

ROBOCUP
COMPOSIZIONE – g 100 di prodotto contengono:
DIMETOATO puro g 37,6 (g/l 390)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile; Nocivo per inalazione, contatto
Con la pelle e per ingestione Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

NOCIVO

PROCHIMAG di Mandrioli Rag. Giuseppe
Via Byron n. 10 – Bologna Tel. 051 703202

Stabilimento di produzione: ALTHALLER ITALIA S.R.L., Strada Comunale Per Campagna, San Colombano Al Lambro (MI) - CHEMIA S.P.A., Strada Statale n. 255 Km 46, Sant'Agostino (FE)
Registrazione del Ministero della Salute n. 12146 del 14.06.2004
CONTENUTO: ℓ 1-5
Riferimento partita:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsione, coma. **Cause di morte:** generalmente insufficienza respiratoria. A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO - Caratteristiche: ROBOCUP è un prodotto ad azione citotropica, penetra nei tessuti vegetali eliminando le forme di insetti ed esplica inoltre una azione tossica per contatto.

DOSI - EPOCHE - MODALITA' D'IMPIEGO - Dosi per ettolitro di acqua

Colture	Parassiti	Dosi	Note
Agrumi	cocciniglie allo stadio di neanidi, mosca della frutta (ceratitis capitata), afidi, tignola, acaro delle meraviglie	ml 125	Trattare piante non ancora in produzione
Olivo	mosca dell'olivo	ml 140	In trattamenti preventivi o curativi da Giugno ad Ottobre – massimo 2 trattamenti
	tignola dell'olivo	ml 95-140	Da Marzo a Giugno contro le tre generazioni dell'insetto. Non irrorare a bsso volume sulle varietà di olivo Coratina, Simona, Canin, Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana, Bosana, Terza grande e la Dritta.
Pero	afide, tripidi, tingidi, tentredini, psilla, acari e maggiolini	ml 70	Quando compaiono le prime infestazioni. Trattare piante non ancora in produzione.
Melo	cemiostoma	ml 70	Quando le mine hanno raggiunto mezzo centimetro di diametro. Trattare piante non ancora in produzione.
	acaro, afidi	ml 75-150	
Frumento, segale, triticale	afidi	l 0,8-1/ha	
Asparago	mosca, afidi, tortricidi e aleurodidi	ml 100	Trattamenti in estate solamente dopo la raccolta dei turioni
Barbabietola da zucchero, cotone (non da olio), tabacco	afidi e nottue	ml 75-150	
Floreali, ornamentali, forestali, pioppo	mosca e striscino	ml 75-100	

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale; effettuando i trattamenti con pompe a volume ridotto (somministrando cioè un minor quantitativo di acqua per ettaro), le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate, in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti, aggiungere alla miscela ml 50/hl di bagnante adesivo (LIOSOL). **Preparazione del prodotto:** versare il ROBOCUP a poco a poco nell'acqua agitando energicamente. Lavare accuratamente le pompe prima dell'uso, soprattutto se contengono residui di calce e di altri prodotti alcalini. Il prodotto deve essere conservato in ambiente fresco.
- Non trattare in fioritura perche' il prodotto e' tossico per le api
COMPATIBILITA'- ROBOCUP non è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese). **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, pesci e bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 35 giorni su olivo, 20 giorni prima del raccolto sulle altre colture eduli, per asparago trattare solamente dopo la raccolta dei turioni
"**Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso". "Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato". "Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ".

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI,PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO;NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

TETRACAP

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE
PER LA LOTTA CONTRO LE MALATTIE FUNGINE DELLE POMACEE

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono
Captano puro g 50
Coformulanti q.b. a g 00

FRASI DI RISCHIO
Tossico per inalazione; Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti; Rischio di gravi lesioni oculari; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza; In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo

PROCHIMAG di Mandrioli Giuseppe - Via Byron n. 10 – Bologna

Stabilimento di produzione: CHEMIA S.P.A., Strada Statale n. 255 Km 46, Sant'Agostino (FE) / SCAM S.R.L., Via Bellaria n. 164, Modena
Registrazione del Ministero della Sanità n. 6093 del 24/10/1984
CONTENUTO: Kg 1 - Riferimento partita:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
TETRACAP si usa alla dose di g 200-300 per ettolitro di acqua contro le seguenti malattie:
melo e pero - contro ticchiolatura e marciume bruno.

COMPATIBILITA' Non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.), con olii e con zolfi; la sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA'- Può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo: (Stark Delicious, Winesap, Stayman, Renetta del Canadà) e di pero: (Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto
ATTENZIONE ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli evnetuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

AGHIR - CB

Fungicida sistemico e di contatto con azione preventiva, curativa e bloccante

IRRITANTE

Composizione

- Penconazolo puro g. 1.5%
- Zolfo puro (esente da Selenio) g. 40
- Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio : Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

Consigli di Prudenza . Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

PROCHIMAG di Mandrioli G.- Via Byron 10 - Bologna

registrazione n. 10157 del 20/09/1999 Ministero della Sanità

Officina di produzione: SARIAF - Faenza (RA) / STI-SOLFOTECNICA ITALIANA spa - Cotignola (RA) / DIACHEM spa - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

kg 0.1.-0.2-0.25-0.5-1-5-10-15-20 Partita n.

Informazioni per il medico : sintomi e organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. -Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). -Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale - Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acute ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergenico. -in caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del S.N.C..
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica. Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Fungicida sistemico e di contatto che può essere utilizzato come preventivo, curativo e come bloccante: agisce all'interno della pianta e l'assorbimento del prodotto avviene velocemente (poche ore).

VITE

Oidio (Uncinula necator)
- Trattamenti preventivi: : g. 150 - 200 hl in pre post-fioritura intervenendo ogni 14-16 giorni e g. 100 - 150 hl in pre e post-fioritura effettuando il trattamento ogni di 7-10 giorni. Possiede azione collaterale contro l'erinosi. **MELO**

Ticchiolatura (Venturia inaequalis)
-Trattamenti preventivi: g. 200 - 250 hl ogni 6 - 8 giorni fino alla fase di frutto noce, poi ogni 10-15 giorni. -Trattamenti curativi : g. 250 - 300 hl, si può intervenire entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
-Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi) : g. 250 - 300 hl facendo 2 applicazioni ogni 5 - 7 giorni e poi continuando con le dosi normali.

Oidio (Podosphaera leucotricha)
-Trattamenti preventivi : in primavera g. 220 - 250 hl ogni 10 giorni: nei trattamenti estivi ogni 10 - 14 giorni con dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia.
-Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): g. 200 - 230 hl ogni settimana, con un totale di 3 - 4, che consentono il controllo delle infezioni in atto.

Malattie da conservazione (Monilia fructigena, Pinicillium spp.)
- fare in totale 2 - 3 trattamenti a cadenza settimanale in pre raccolta alla dose di 250 - 300 g/hl.

PESCO (comprese le NETTARINE ed IBRIDI SIMILI) Oidio
-Trattamenti preventivi: in zone dove il rischio di infezione è alto e con cultivar particolarmente sensibili trattare a g. 250 - 340 hl dalla caduta petali ed ogni 10 - 14 giorni. In zone a minor rischio intervenire ogni 14-21 giorni. **Malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp.)**
- fare 2 - 3 interventi a cadenza settimanale in pre-raccolta alla dose di 340 g/hl.

TABACCO

Oidio : g. 240 - 340 hl facendo da 2 a 4 trattamenti in modo preventivo, iniziando dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10 - 14 giorni.

MELONE - ZUCCHINO - ZUCCA - CETRIOLO - CARCIOFO - PEPERONE (solo in pieno campo) -

POMODORO (solo in pieno campo) - PISELLO

Oidio : In pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione, fare da 2 a 4 trattamenti ogni 14 - 16 giorni a g. 170 - 340 hl a seconda della coltura e del rischio di infezione. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.

COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE:

Oidio e ruggini : g. 170 - 340 hl ogni 10 - 14 giorni a seconda della coltura e della incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.

Compatibilità : Il prodotto è compatibile con la generalità degli antiparassitari ad eccezione di quelli alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) olii minerali, captano, diclorvos. **Avvertenza** : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. **Fitotossicità : il prodotto può risultare** fitotossico sulle seguenti varietà di
mele : Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap **pere** : Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Oliver de Serres, William, Decana del Comizio, **vite** : Sangiovese, **Cucurbitacee** : può essere fitotossico. Irrorare a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta. Data di scadenza in normali condizioni di conservazione del preparato (se la durata dello stesso è inferiore a due anni) attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro utilizzo è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall' uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio**: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparto respiratorio**: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Lo ZAR 27 si impiega nei trattamenti primaverili-estivi nelle seguenti dosi per ettolitro di acqua:
melo e pero - contro Ticchiolatura: ml 500-600
peschi e susini - contro Bolla e Gommosi: ml 300-400
colture orticole (fagioli, sedani, patate, pomodori) - contro Septoria e Alternaria: ml 400-500
colture floreali (rose, garofani, crisantemi, gladioli, fiori di pesco) - contro Ticchiolatura e Peronospora delle rose, Botritis e Peronospora del Crisantemo, Botritis e Septoria del gladiolo, Alternaria del garofano, Bolla e Gommosi del fiore di pesco: ml 400-500.

Nei trattamenti autunno-inverno alle seguenti dosi per ettolitro di acqua:
peschi, susini, ciliegi, albicocchi - contro Gommosi parassitaria e Bolla: ml 1200-1400.

ZAR 27

ANTICRITTOGAMICO LIQUIDO A BASE DI ZIRAM

COMPOSIZIONE: 100 g. di prodotto contengono
Ziram puro g 27 (g/l 300)
Coformulanti q.b. a 100

MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione; Molto tossico per inalazione; Irritante per le vie respiratorie; Rischio di gravi lesioni oculari; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PROCHIMAG di Mandrioli Giuseppe
Via Byron n. 10 – Bologna
Stabilimento di produzione: CHEMIA S.P.A., Strada Statale n. 255 Km 46, Sant'Agostino (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 8901 del 08/07/1996
CONTENUTO: ml 100-250-500 ℓ 1-5-10-20
Riferimento partita N.:

Miscibilità: non è miscibile con prodotti a reazione alcalina (poltiglia bordolese e polisolfuri) e con olii minerali.
AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono anche essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può arrecare qualche danno ai giovani rametti delle CV di pesco: Dixired, Cardinal e Red Haven. Sono inoltre sensibili allo Ziram le seguenti varietà di pero: Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona d'estate.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Attenzione : data l'elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23/04/2001

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

IDRORAM 24 L

FUNGICIDA A BASE DI IDROSSIDO DI RAME
SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono
Rame metallo g 24 (g/l 350)
(sotto forma di idrossido)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione; Tossico per inalazione, Rischio di gravi lesioni oculari; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Proteggersi gli occhi/la faccia; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza; In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

PROCHIMAG di Mandrioli Giuseppe
Via Byron n. 10 - Bologna

Stabilimento di produzione CHEMIA S.P.A., Strada Statale n. 255 Km 46, Sant'Agostino (FE) - Registrazione del Ministero della Sanità n. 9121 del 29/01/1997
CONTENUTO: ml 50-100-200-250-500 ℓ 1-5-10 - Riferimento partita:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - **Sintomi:** denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.**Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO – **IDRORAM** 24 L è un anticrittogamico polivalente da impiegarsi nella lotta alle malattie fungine, sulle seguenti colture:
Vite - ml 300-400 per hl contro Peronospora e Marciume nero degli acini, intervenendo dalla formazione degli acini alla vendemmia.
Melo e pero - ml 400-500/hl contro cancri del legno (Nectria Galligena, Phomopsis mali, Spaeropsis malorum, Pseudomonas syringae). Intervenire alla caduta totale delle foglie ed al ringonfiamento delle gemme, ml 300-400/hl contro il colpo di fuoco. Intervenire con due trattamenti nelle fasi di rigonfiamento delle gemme e delle punte verdi. Sul pero applicare ml 50 o litri 0,9/ha, durante la fioritura ogni 5 giorni. ml 400/hl contro Phutophtora cactorum applicando 15 litri di soluzione alla base di ogni pianta ammalata. intervenire ogni anno in primavera e alla fine della raccolta.
Contro la Ticchiolatura: ml 230-280/hl prima della fioritura; ml 160-200/hl dopo la fioritura e successivamente ml 160/hl.
Albicocco e susino - ml 350-400/hl contro Corineo, Monilia e Cytospora leucostoma. Intervenire durante il riposo vegetativo. Non trattare mai dopo la fioritura.
Ciliegio - ml 450/hl più ml 150 di olio minerale bianco contro Corineo, Monilia, Scopazzi. In frutteti fortemente ammalati ripetere l'applicazione anche in Agosto. ml 200/hl contro la Monilia dei fiori, intervenendo subito prima ed immediatamente dopo la fioritura.
Pesco - nettarine - ml 400-500/hl contro Bolla e Corineo con interventi subito dopo la caduta delle foglie ed a fine inverno. ml 200-250/hl contro la Monilia nella fase dei bottoni rosa. ml 400-500/hl contro la Batteriosi con trattamenti durante il riposo vegetativo; per applicazioni in post-fioritura usare ml 60/hl per due trattamenti. Non trattare nelle tre settimane che precedono la raccolta nè usare dosaggi superiori.
Mandorlo - ml 350/hl contro Corineo, Bolla e Monilia con interventi alla caduta delle foglie, all'ingrossamento delle gemme e subito prima della fioritura. Per interventi post-fiorali mantenere inalterata la dose. ml 300-400/hl contro Batteriosi (Pseudomonas) intervenendo prima della fase dei bottoni rosa.
Agrumi - ml 250-325/hl contro Mal secco, Allupatura, Melanosi, Fumaggine, Antracnosi e Scabbia del limone e dell'arancio. Intervenire prima e dopo la fioritura in funzione della gravità della malattia.
Olivo - ml 250-350/hl contro Occhio di pavone, Fumaggine e Lebbra. Intervenire alla fine di Settembre - inizio Ottobre, dopo la raccolta ed eventualmente dopo la potatura.
Nocciolo - ml 350/hl contro la Batteriosi (Xanthomonas corylina) con due trattamenti in Ottobre distanziati di circa 20-25 giorni uno dall'altro.
Noce - ml 260/hl contro Antracnosi. Intervenendo in pre-fioritura; in caso di piogge frequenti sono necessarie applicazioni supplementari, in estate si consiglia di aggiungere ml 125/hl di olio minerale bianco.
Nespolo - ml 200/hl contro la Ticchiolatura.
Cipresso - ml 400/hl contro il cancro (Corineum cardinale) intervenire in pieno inverno
Patata - ml 300-400/hl contro Peronospora e Alternaria. Iniziare i trattamenti quando le piante hanno raggiunto l'altezza di circa 15 cm proseguendoli in funzione dell'andamento climatico.
Pomodoro - ml 300-400/hl contro Peronospora, Alternaria e Septoria. Intervenire ogni 10 giorni circa ed in funzione dell'andamento climatico.
ml 400/hl contro le Batteriosi (Cancro o Avvizzimento, Maculatura e Picchiettatura) intervenire a intervalli regolari (10-15 giorni).
Si consigliano combinazioni con Mancozeb solo fino alla prima fioritura.
Barbabietola da zucchero - l 3/ha contro la Cercospora. Iniziare i trattamenti alla fine di Giugno inizio Luglio continuandoli ogni 20-25 giorni fino a 20 giorni dalla raccolta.
Fragola - l 2/ha contro Vaiolatura. Iniziare a trattare quando le piante hanno attecchito proseguendo ogni settimana per tutta la stagione. Cessare le applicazioni ai primi eventuali segni di fitotossicità.
Fagiolo-pisello - ml 200-260/hl contro Peronospora, Antracnosi e Ruggine. Intervenire quando si creano le condizioni per lo sviluppo delle malattie e proseguire secondo il caso. Questi interventi controllano pure le Batteriosi.
Cavoli-cavolfiori-cavoli di bruxelles-broccoli - ml 130-160/hl contro Peronospora e Alternaria. ml 280/hl contro Batteriosi (Xanthomonas). Iniziare le applicazioni dopo il trapianto e dopo l'emergenza delle coltivazioni seminate a intervalli di 10-15 giorni in funzione delle condizioni climatiche. Alle dosi più alte potrebbero verificarsi, in alcune varietà, leggeri arrossamenti
delle foglie vecchie dei broccoli e macchie sulle foglie esterne dei cavoli.
Carota - ml 200-280/hl contro l'Alternaria. Iniziare le applicazioni al verificarsi delle condizioni per lo sviluppo della malattia.
Sedano e finocchio - ml 200-280/hl contro Septoria, Cercospora e Peronospora. Trattare secondo l'andamento stagionale.
Melanzana - ml 200/hl contro Alternaria, Peronospora, intervenire ogni 15 giorni circa; in tal modo si controlla pure la Phomopsis vexans.
Cetriolo - ml 160-200/hl contro Peronospora, Antracnosi, Cladosporiosi e Batteriosi (Pseudomonas). Intervenire a cadenze fisse in funzione delle condizioni climatiche.
Melone-anguria - ml 200/hl contro Peronospora, Antracnosi. Si consigliano interventi cadenzati in funzione delle condizioni climatiche.
Cipolla-aglio - ml 230/hl contro Peronospora e Alternaria. Iniziare i trattamenti quando le piante hanno raggiunto l'altezza di circa cm 15.
Insalata-cardo-carciofo - ml 160-200/hl contro Peronospora e Alternaria con trattamenti preventivi in funzione delle condizioni climatiche.
Riso - l 4/ha contro le alghe verdi. Intervenire alla comparsa dell'attacco con un quantitativo di soluzione sufficiente per coprire l'intera superficie.
Rosa - ml 200-250/hl contro Ticchiolatura, Peronospora e Ruggine. **Ciclamino** - ml 200/hl contro Antracnosi e Maculatura fogliare. **Filodendro** - ml 200/hl contro le Batterisi (Erwinia spp.) con applicazioni settimanali ad iniziare prima della comparsa della malattia.

COMPATIBILITA'- Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Non si deve trattare durante la fioritura ad eccezione dei casi menzionati nel capitolo "MODALITA' D'IMPIEGO". Su pesco, nettarine, susino e alcune varietà di melo (Abbondanza "Belford", Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta Del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibile il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la ripresa vegetativa. Ad eccezione della lotta contro le Batteriosi menzionate nel capitolo "MODALITA' D'IMPIEGO"; in cui la fitotossicità può diventare un problema secondario.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

TECNITERRA S.r.l.

AGROCILLINA

FUNGICIDA AD AZIONE CITOTROPICA PER COMBATTERE LE TRACHEOMICOSI DELLE BARBATELLE DI VITE E LA BOTRYTIS DELLE TALEE

POLVERE BAGNABILE

AGROCILLINA

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
8-idrossichinolina solfato puro g 70,5
Coformulanti q. b. a g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO : Nocivo per ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

TECNITERRA srl - via Bronzino, 19 - Milano

Officina di produzione : STI - SOLFOTECNICA TALIANA spa - Cotignola (RA) / CHEMIA spa - .Agostino (FE)
Registrazione n° 3109 del Ministero della Sanità del 25/05/1979
Kg 0,100 - 0,500 - 1 partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
8-idrossichiolina solfato: sintomi: sostanza irritante per cute e mucose; nell'animale da esperimento grave stimolazione del SNC, dispnea, convulsioni. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Fungicida in polvere bagnabile valido contro le affezioni delle talee e barbatelle di vite.
Dosi: 100 g in 100 litri di acqua.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Sciogliere l'**AGROCILLINA** nella quantità di acqua prescritta e immergere per 7-8 ore.

AVVERTENZA

- In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
- Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
- Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
- Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso,
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ALYTEC

Fungicida in polvere bagnabile

Composizione:
-Fosetil Alluminio puro g. 80
-Coformulanti qb a 100

IRRITANTE

Frasi di rischio
Rischio di gravi lesioni oculari.; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi
Per l'ambiente acquatico

Consigli di prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Proteggersi gli occhi/la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

TECNITERRA srl - Via Bronzino, 19 – MILANO

Registrazione n. 9842 del 30.11.1998 Ministero della Sanità
Officina di produzione : STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - Cotignola (RA) / CHEMIA spa - S.Agostino (FE) / DIACHEM spa - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG) / SCAM srl - Modena / TERRANALISI srl - Cento (FE) / ADICA srl – Nera Montoro (TR) / SINOCHEM NINGBO Corp – Ningbo (Cina) / Sinapak S.n.c. – Strabella (Pv)
Partita n. ..... - kg 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15-20

INFORMAZIONI MEDICHE : in caso di intossicazione informare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

MODALITA' D'IMPIEGO
Fungicida che possiede azione sistemica che si manifesta in modo ascendente e discendente che è evidente con vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita, e gli permette di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento;, quindi dotato di una notevole mobilità sulle colture trattate.
Vite : viene impiegato contro la Peronospora alla dose di g. 250 per q.le acqua trattando sempre in miscela con prodotti di copertura.
Melo, Pero, Pesco, Actinidia : viene impiegato contro la Phytophthora cactorum trattando sulla vegetazione, una volta al mese, dalla sfioritura fino a quaranta giorni dalla raccolta (per melo e actinidia), con 250 g/hl. Nel caso di colture già debilitate dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida: effettuare un'innaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, con litri 1-2 per pianta di una poltiglia costituita da Kg. 5 di prodotto per 100 litri d'acqua.
Melo - Pero : viene impiegato contro la Ticchiolatura con trattamenti preventivi a g. 150 - 250, nelle fasi pre - fiorali e subito dopo l'allegagione si consigli l'associazione con fungicidi di copertura o con Dodina.
Pero : *viene impiegato contro la Maculatura bruna (Stemphyllium sp.), trattamenti preventivi a 250 g. per q.le acqua.*
Fragola : viene impiegato contro la Peronospora (Phytophthora cactorum e fragariae). L'immersione delle piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti, seguita da 2-3 irrorazioni alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immersione delle piante prima del trapianto in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti, seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di g. 0,5 di formulato per pianta.
Lattuga : viene impiegato contro la Bremia lactucae effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire almeno 3 Kg. di prodotto per ettaro). Si consiglia di effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto; se si verificano forti sbalzi termici la lattuga può essere sensibile al prodotto.
Melone : viene impiegato contro la Pseudoperonospora cubensis effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl avendo cura di distribuire, come minimo, 3 Kg. di prodotto per ettaro.
Cocomero, Cetriolo, Spinacio : viene impiegato contro la Peronospora, effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire, come minimo, 3 Kg. di prodotto per ettaro).
Carciofo : viene impiegato contro la Bremia lactucae a 200-300 g/hl.
Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo : viene impiegato contro Phytophthora spp. effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl, utilizzando dieci litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione possono venire integrati da pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche); pratica indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida.
Vivai di fruttiferi : effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl con cadenza mensile.
Vivai di agrumi : impiegare la dose di 400 g/hl ogni 60 giorni.
Colture Ornamentali in pieno campo ed in serra : Viene impiegato contro la Phytophthora cinnamoni di Chamaecyparis e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee. Poinsettia, St.Paulia e Crisantemo, effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con g. 5-10 di formulato per mq. una volta al mese in primavera.
COMPATIBILITA' : Il prodotto non é compatibile con i prodotti a base di rame, di Dicofol e con concimi fogliari contenenti azoto. Si consiglia inoltre di non irrorare il prodotto su colture precedentemente trattate con i formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto. Nella miscelazione del prodotto con altri formulati si consigliano comunque saggi preliminari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti: 15 giorni prima del raccolto su carciofo, cetriolo, cocomero, melone, lattuga, spinacio; 30 giorni prima del raccolto su fragola; 40 giorni prima del raccolto su melo, pero, pesco, actinidia e vite; 80 giorni prima della raccolta di arancio, limone, mandarino, pompelmo.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso é pericoloso.
Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ *DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E* DALLE STRADE.

CHLORTEC WDG

Fungicida ad ampio spettro d'azione in granuli idrodispersibili

CHLORTEC WDG
Composizione
- CLOROTALONIL puro gr. 75
- Coformulanti q.b. a gr. 100

MOLTO TOSSICO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO: Molto tossico per inalazione; Irritante per le vie respiratorie; Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti; Rischio di gravi lesioni oculari; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici; Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Proteggersi gli occhi/la faccia; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

TECNITERRA srl
Via Bronzino 19 - Milano

Stabilimento di produzione : A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (Terni) / STI SOLFOTECNICA ITALIANA spa – Cotignola (RA)/SINOCHEM NINGBO Corp.- Ningbo (Cina)
Registrazione n. 10693 del 31.01.2001 del Ministero della Sanità
Kg. 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15 Partita n.: ....

AVVERTENZE: Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante . Può provocare danni renali ed atassia. Terapia sintomatica.
AVVERTENZA : Consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO : Il CHLORTEC WDG è un fungicida ad ampio spettro di efficacia e con alta persistenza d'azione contro le malattie fungine in frutticoltura, orticoltura in pieno campo. Possiede azione residua e resiste al dilavamento.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO : Si impiega a scopo preventivo a seconda del calendario di incubazioni delle malattie:
- Pesco - Susino: (impiego previsto solo in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici) contro Bolla, Corineo, Ruggine, Nerume, Monilia, Cancri rameali alla dose di Kg.1 - 1,250 per ettaro e per applicazione con massimo 4 interventi annuali.
- Melo - Pero :(impiego previsto solo in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici) contro Alternaria, Ruggine, Septoria, Ticchiolatura, Cancri rameali e Marciumi alla dose di Kg. 0,750 - 1,250 per ettaro e per applicazione.
Sono consentite quattro applicazioni massimo all'anno.
- Cocomero - Melone - Cetriolo: Kg. 1,250 - 1,850 per ettaro e per applicazione. Sono consentite tre applicazioni massimo all'anno sia in serra che in campo.
- Cipolla: Kg. 1,250 - 1,850 per ettaro e per applicazione con 2 trattamenti in pieno campo contro Peronospora, Alternaria, Muffa grigia e bianca.
- Sedano: contro Septoria, Cercospora e Sclerotinia alla dose di Kg. 1,250 - 1,850 per ettaro e per applicazione. Sono consentite un massimo di tre applicazioni all'anno sia in campo che in serra.
- Pomodoro: contro Peronospora, Alternaria, Cladosporiosi, Botrite, Septoriosi, Rizoctonia e Sclerotinia alla dose di Kg. 1,250 - 1,850 per ettaro e per applicazione. Sono consentite un massimo di tre applicazioni all'anno in campo e cinque applicazioni all'anno in serra.
- Fagiolo - Fagiolino - Pisello: Kg. 1,250 - 1,500 per ettaro e per applicazione, con un massimo di 2 applicazioni anno ed in pieno campo contro Peronospora, Antracnosi e Ruggine; sul fagiolo e pisello massimo 2 trattamenti da effettuarsi fino alla fioritura; sul Fagiolino massimo 2 trattamenti fino alla fioritura esclusa.
Versare la dose del prodotto in poca acqua, mescolare fino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea, versare gradualmente questa poltiglia nel quantitativo di acqua richiesto, agitando ripetutamente.

COMPATIBILITA' : il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri, ecc.) e gli oli minerali. Il prodotto non deve essere miscelato con prodotti emulsionabili.
AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
TEMPI DI RIENTRO : 12 ore (in campo) - 24 ore (in serra).
FITOTOSSICITA': il prodotto è fitotossico per alcune varietà di mele: Golden Delicious, (Golden, Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Red Delicious, Jonathan, Renetta Champagna, Rome Beauty) sulle quali può provocare rugginosità.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di sedano, pomodoro, cocomero, melone, cetriolo, cipolla; 21 giorni prima della raccolta di melo, pero, pesco e 35 giorni prima della raccolta del susino.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Attenzione : data l'elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23/04/2001

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

CYMOTEC M440

Antiperonosporico in polvere bagnabile

CYMOTEC M440
Composizione
- Cimoxanil puro g. 4
- Mancozeb puro g. 40

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO :
Irritante per le vie respiratorie; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impieg; Evitare il contatto con la pelle; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

TECNITERRA srl – Via Bronzino 19 - Milano
Registrazione n. 10677 del 22.01.2001 del Ministero della Sanità
officina di produzione : ADICA srl - Nera Montoro (Terni) / STI SOLFOTECNICA ITALIANA spa – Cotignola (RA) / CHEMIA spa - S.Agostino (FE) / DIACHEM spa - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG) / SCAM srl – Modena / TERRANALISI srl – Cento (FE)
kg. 0,1 - 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1-5 - 10 - 15 - 20 partita n.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI : una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto - conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da umidità e calore - durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive : Cimoxanil 4% e Mancozeb 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :
CIMOXANIL - derivato dell'urea. Sintomi : durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia : sintomatica.
MANCOZEB - Sintomi: Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; Occhio : congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; Apparato respiratorio : irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC : atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. EFFETTO ANTABUSE : si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. – Avvertenza : consultare un centro antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
Il CYMOTEC M440 è un fungicida in polvere bagnabile costituito da due principi attivi che agiscono sia per contatto che con azione endoterapica; il Cimoxanil penetra completamente nei tessuti vegetali entro le 6 ore successive al trattamento con azione citotropica translaminare; viene impiegato sulle seguenti colture :
VITE : Contro Peronospora ed Escoriosi (azione complementare) alla dose di g. 200 - 300 per q.le acqua, iniziando a trattare quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni fungine e continuando fino a che vi sono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
POMODORO (solo fino alla prima fioritura) : contro la Peronospora alla dose di g. 250 - 300 per q.le acqua, ed in caso di presenza anche di Alternaria e Septoria elevare la dose a g. 300 - 350.
TABACCO : contro la Peronospora alla dose di g. 300 - 350 per q.le acqua, con dose più alta in caso di forte attacco su varietà sensibili.
- DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA
- DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
COMPATIBILITA' : il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida; si sconsiglia di impiegarlo con i prodotti a reazione alcalina. **AVVERTENZA** : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA' : quando si tratta tenere lontano gli animali domestici e il bestiame.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

CYMATE WDG

Fungicida citotropico translaminare impiegato su Vite, Carciofo, Pomodoro, Patata e Tabacco contro la Peronospora

COMPOSIZIONE
- Cimoxanil puro gr. 30
- Coformulanti q.b. a gr. 100

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

Frasi di Rischio
Nocivo per ingestione; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con la pelle; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

TECNITERRA srl – Via Bronzino 19 – Milano
Stabilimento di produzione : ADICA srl - Nera Montoro (TR) / SINOCHEM NINGBO CORP.- Ningbo (Cina)
Registrazione n.11976 del 04.0 2.2004 del Ministero della Salute
Kg. 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-15-20 Partita n. : ......

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché, irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il CYMATE WDG è un fungicida in formulazione di microgranuli idrodisperdibili ad azione citotropica translaminare indicato per il trattamento contro la Peronospora, possiede una persistenza d'azione di circa 5 giorni.

VITE
contro la Peronospora alla dose di gr. 65-80 per q.le acqua trattando da quando si hanno le infezioni della malattia, e fino alla fine della fioritura.
Quindi dall'allegagione impiegare gr. 30-40 per q.le acqua miscelato con i prodotti di copertura quali i rameici, i ditiocarbammati ed il Folpet a un dosaggio pari al 60 – 70% della dose comunemente impiegata.

CARCIOFO - PATATA - POMODORO - CIPOLLA - AGLIO - PORRO - GIRASOLE - SOIA - LATTUGA - ROSA - ZUCCHINO - MELONE - PISELLO - SPINACIO - TABACCO
contro la Peronospora a gr. 65-80 per q.le acqua, iniziando al verificarsi delle condizioni di infezioni e proseguendo. Nel caso di infezioni in atto effettuare due trattamenti ravvicinati alla dose più alta (5-7 giorni l'uno dall'altro). Si può ridurre la dose a gr. 30-40 per q.le acqua se si effettuano trattamenti in miscela con rameici o ditiocarbammati, comunque tenere presente che la dose minima riferita ad ettaro non deve essere inferiore ai 400 gr/ettaro.

COMPATIBILITA' : non compatibile con i prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese) e gli olii minerali.
AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA' : quando si tratta tenere lontano gli animali domestici e il bestiame; tossico per i pesci
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto di girasole e soia; 21 giorni per il carciofo; 10 giorni per le altre colture
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

COSILEX WDG

Fungicida che agisce in modo preventivo e curativo a largo spettro d'azione
Formulazione: microgranuli idrodispersibili

Composizione:
-Procimidone puro g. 50
-Coformulanti qb a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

TECNITERRA srl - Via Bronzino, 19 – MILANO
Registrazione n.12071 del 30.03.2004 Ministero della Salute
Officina di produzione : STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - Cotignola (RA) / Torre srl – Torrenieri (SI) / ADICA srl – Nera Montoro (TR)/SINOCHEM NINGBO Corp.-Ningbo (Cina)
Partita n. ..... - kg 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15-20

INFORMAZIONI MEDICHE : in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

MODALITA' D'IMPIEGO
Fungicida in microgranuli idrodispersibili che agisce in modo preventivo con inibizione della germinazione delle spore e in modo curativo, bloccando lo sviluppo del micelio nelle prime fasi di incubazione dell'infezione. Viene indicato sulle seguenti colture:
Vite : impiegato contro la Muffa grigia alla dose di g. 100 – 150 per hl, effettuando 3-4 trattamenti nei periodi di fine fioritura, poi quando gli acini hanno il diametro di ca.3 mm (in coincidenza della chiusura del grappolo) si prosegue, all'invaiatura, circa 7 – 8 settimane prima del raccolto ed infine 3 – 4 settimane prima della raccolta.
E' consigliabile bagnare bene affinché vi sia una distribuzione uniforme del prodotto, la dose più alta impiegarla su varietà più sensibili all' attacco della malattia.
Pomodoro: impiegato contro la Muffa grigia g 80 – 100 per q.le acqua, iniziando a trattare a fine fioritura del primo palco fiorale e ripetendo ogni 15 giorni sino a concludere 28 giorni prima della raccolta.
Pesco – Nettarine - Percoche: impiegato contro il Marciume bruno (Monilia) sia dei fiori e dei rami (g 150 – 200 per q.le acqua, con un primo trattamento ai bottoni fiorali ed un altro con il 25% dei fiori aperti ed un successivo in piena fioritura) ed i frutti (g 100 – 150 per q.le acqua, trattando 30 – 35 gg e 15 – 20 gg prima della raccolta.
Pero : impiegato contro la Maculatura bruna g 100 – 150 per q.le acqua con trattamenti a partire dalla fioritura e ripetuti.
Girasole : impiegato contro la Sclerotinia a g 100/hl prima della fioritura e g 100 –200 per q.le di seme nella concia.
Colza : impiegato contro la Sclerotinia alla dose di Kg 1 – 1,5 per ettaro all'inizio della fioritura.
Lattuga : impiegato contro il Mal dello Sclerozio alla dose di Kg 1,5 – 2 per ettaro.
Indivia: impiegato contro il Mal dello Sclerozio e la Muffa grigia alla dose di Kg 1,5 – 2 per ettaro.
Tabacco : impiegato contro i marciumi da Botrytis e Marciumi da Sclerotinia alla dose di Kg 1,5 – 2 per ettaro.
Albicocco - Susino : impiegato contro la Muffa grigia e Marciumi da Sclerotinia alla dose di 100 – 200 g per q.le acqua.
Mandorlo : impiegato contro la Monilia alla dose di 150 – 200 g per q.le acqua.
Peperone - Melanzana : impiegato contro la Muffa grigia e Marciumi da Sclerotinia alla dose di 80 – 100 g per q.le acqua.
Aglio : impiegato contro la Muffa grigia e Mal dello Sclerozio alla dose di g 100 – 200 per ettolitro.
Cipolla : impiegato contro la Muffa grigia e Marciume dei bulbi alla dose di 100 – 150 g/hl.
Fragola : impiegato contro la Muffa grigia a g 80 – 100 per q.le acqua con 3 trattamenti alle seguenti epoche: alla schiusura dei petali, poi con circa il 10 – 20% dei fiori aperti ed alla completa sfioritura. Bagnare bene sia la pianta che il terreno circostante.
Cetriolo : impiegato contro Marciumi da Botrytis e Sclerotinia a g 100 – 150 /hl.
Fagiolino : impiegato contro la Muffa grigia e Mal dello Sclerozio a g 100 – 150 per q.le acqua.
Actinidia : impiegato contro i Marciumi da Botrytis e Marciumi da Sclerotinia a g 75 – 100 /hl alla caduta dei petali ed eventualmente in pre-raccolta.
Nocciolo : impiegato contro la Monilia delle nocciole a g 75 – 100 /hl.
Colture floreali in pieno campo ed in serra : impiegato contro la Muffa grigia della rosa a g 40 – 80 per q.le acqua, effettuando almeno 3 trattamenti iniziando dal germogliamento sino ad inizio fioritura, bagnando molto bene tutta la vegetazione. Impiegato contro la Muffa grigia di Gerbera, Geranio, Crisantemo, Garofano, g 40 – 80 q.le acqua trattando con presenza della malattia a ripetuti interventi. Impiegato contro la Rhizoctonia del garofano ed altri ornamentali g 4 dispersi in 5 – 10 litri di acqua per mq di superficie, intervenendo 10 gg. circa dopo la messa a dimora, quando è superata la crisi del trapianto e con comparsa dei primi sintomi della malattia ed eventualmente ripetendo l'intervento dopo circa un mese.

COMPATIBILITA' : miscibile con antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : sui trattamenti alle colture orticole e floricole, specie se in serra, fare saggi preliminari.
Sospendere i trattamenti 45 giorni prima del raccolto della colza, 21 giorni prima del raccolto della vite, girasole, susino e 14 giorni prima del raccolto sulle altre colture.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

C-MAX 75 WP

Insetticida regolatore di crescita
Tipo di formulazione : polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
- Ciromazina pura g. 75
- Coformulanti qb a 100

FRASI DI RISCHIO : Irritante per gli occhi e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

IRRITANTE

TECNITERRA srl - Via Bronzino, 19 – MILANO
Stabilimento di Produzione : CHEMIA SPA – S. Agostino (FE)
Registrazione n 12195 del 08/09/2004 Ministero della Salute
Taglie : g. 25-50-100-250-500 kg 1-5-10 Partita n. : ...

INFORMAZIONI MEDICHE
Sintomi di intossicazione: non si conoscono casi di avvelenamento dell'uomo. In condizioni sperimentali si sono osservati i seguenti sintomi di avvelenamento aspecifici: sedazione, dispnea, esoftalmo, posizione curva e pelo arruffato. Terapia: sintomatica. Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

CAMPO D'IMPIEGO
Insetticida regolatore della crescita con effetto inibitorio sullo sviluppo delle larve dei Ditteri e con azione prolungata. E' dotato di proprieta' sistemiche: applicato sulla vegetazione penetra rapidamente nei tessuti fogliari (effetto transalminare) dove agisce sulle larve minatrici inibendone la crescita; somministrato al terreno viene assorbito dalle radici e traslocato all'interno, per via sistemica, della pianta proteggendone la parte aerea.
Insetticida per la difesa di ortaggi (carciofo, sedano, cocomero, melone, zucchino, cetriolo, pomodoro, melanzana, lattuga (solo applicazioni in campo)), patata, funghi, tabacco, floreali.
Specifico per il controllo delle larve di ditteri (comprese le popolazioni resistenti ai carbammati e piretroidi). In particolare risulta indicato contro i minatori del genere Liriomyza che colpiscono le piante ortive e floreali in serra e in pieno campo. Nei trattamenti delle fungaie è invece indicato per il controllo dei ditteri fitofagi Sciaridi e Foridi. La dose di applicazione del C-MAX 75 WP è di g. 25 – 30 in serra in un q.le di acqua e di g. 30 – 40 in pieno campo che corrispondono a 300 – 400 grammi per ettaro, trattando alla comparsa delle prime mine ed eventualmente ripetendo il trattamento dopo circa 7-14 giorni. Quando l'applicazione al terreno impiegare kg. 1 per ettaro e può avvenire anche con irrigatori a goccia o a manichetta.

COMPATIBILITA' : non miscibile con antiparassitari a reazione alcalina
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : sulle varietà di melo Mcintosh e relativi incroci impiegare solo fino alla fioritura; miscele con clorotalonil possono provocare rugginosità su Golden Delicious e Granny Smith
NOCIVITA' : Il prodotto è tossico per i pesci
Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta della patata e 14 giorni per le altre colture
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

DIRADO

DIRADANTE DEI FRUTTICINI DEL MELO A BASE DI ORMONI

COMPOSIZIONE
gr 100 di prodotto contengono
NAA puro gr 1,40 (= 14 g/lt)
Diluenti ed emulsionanti q. b. a gr 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia i dispnea. Terapia: sintomatica.

Il **DIRADO** regola la fruttificazione, migliora la qualità dei frutti, ostacola l'alternanza di produzione del melo. Il diradamento chimico eseguito nell'anno di carica (es. Golden Delicious) evita una produzione sovrabbondante e edi qualità scadente e consente una buona produzione anche nel successivo anno «di scarica».

EPOCA DI IMPIEGO
Si esegue un solo trattamento esattamente 15-18 giorni dopo la caduta della maggior parte dei petali. Preferire una giornata nuvolosa, umida e con temperatura intorno ai 20° C.
È necessario aggiungere gr. 40 di **TECNIL IRREVERSIBILE** per ettolitro di soluzione di **DIRADO,** per favorirne l'assorbimento uniforme oltre che rapido. Nel corso delle due settimane successive si ha la caduta di una parte di frutticini, particolarmente di quelli più deboli e meno alimentati. L'entità del diradamento dipende dalle condizioni fisiologiche delle piante e può leggermente variare anche da pianta a pianta.
DOSI
ml. 50 in 100 litri di acqua
MODALITÀ D'IMPIEGO
Stemperare in poca acqua la dose prescritta e portare alla concentrazione voluta. La soluzione va irrorata uniformemente sulla chioma senza bagnare eccessivamente, possibilmente verso sera ed in assenza di vento.

COMPATIBILITÀ : Non e compatibile con altri antiparassitari.
AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso, Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.

TECNITERRA srl - via Bronzino, 19 - Milano

Officina di produzione : Torre srl - Torrenieri (fraz. di Montalcino) Siena / CHEMIA spa - S.Agostino (FE) / ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI) / SINOCHEM NINGBO Corp – Ningbo (Cina)
Registrazione n° 5845 del Ministero della Sanità del 25/04/1984
Lt 0,250 - 0,500 partita n°

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Enocarb fl

Insetticida in Emulsione Fluida

Partita n. *

Composizione:
Carbaril puro .... g 47,5 (546 g/l)
(esente da β naftolo)
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio
Nocivo per ingestione; Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

TECNITERRA S.r.l. – Via Bronzino 19 – Milano
Officina di produzione : Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) / Terranalisi S.r.l. - Cento (FE) /
I.R.C.A. Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)
Contenuto netto : lt 0,2 - 0,5 – 1 - 5 – 10 - Registrazione n. 6212 Ministero della Salute del 31/01/1985

NOCIVO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Carbaril : Inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo, vomito, diarrea e bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. **Terapia : atropina. Controindicazioni: ossime - Consultare un Centro Antiveleni**

MODALITÀ D'IMPIEGO
L' Enocarb è un insetticida in emulsione fluida che si impiega facilmente e svolge la sua attività per contatto e per ingestione. Non trasmette né odori, né sapori sgradevoli alle colture trattate e inoltre abbina alla prontezza d'azione una lunga persistenza.

- Melo, Pero : ml 130 – 180 per quintale d'acqua contro Carpocapsa o Verme della pomacee, Cacoecia, Capua, Eulia, Pandemis, Orgya antica.
- Noce : ml 130 – 180 per quintale di acqua contro Carpocapsa e Cocciniglia.
- Drupacee (pesco, ciliegio, susino, albicocco, mandorlo) : ml 180 – 230 per quintale d'acqua contro Cydia molesta, Anarsia, Eulia, Capua, Cacoecia, Campa del mandorlo, Tignola, Tentredine del susino.
- Vite : ml 130 – 180 per quintale d'acqua contro Tignola, Tignoletta, Eulia, Cicalina.
- Olivo : ml 130 – 180 per quintale d'acqua contro Cocciniglia mezzo grano di pepe, Tignola, Fleotribo.
- Agrumi (arancio, limone, cedro, mandarino, Clementino, pompelmo) : ml 130 – 180 per quintale d'acqua contro Tignola, Cocciniglia mezzo grano di pepe, Cocciniglia cotonosa, Cocciniglia bianca, Cocciniglia rossa, Cocciniglia grigia.
- Nocciolo : ml 130 – 180 per quintale d'acqua contro Balanino.
- Pioppo : ml 180 – 230 per quintale d'acqua contro Crisomela, Farfalla bianca.
- Forestali (conifere : pino, abete, larice, cedro, cipresso) : ml 180 – 230 per quintale d'acqua contro Limantria, Processionaria, Tortricidi, Coleotteri vari.
- Patata, Melanzana, Peperone, Pomodoro : ml 130 – 220 per quintale d'acqua contro Dorifora, Tignola, Nottue.
- Carciofo, Cardo : ml 130 – 220 per quintale d'acqua contro Nottue, Vermi grigi, Vanessa, Depressaria.
- Cavolo, Cavolfiore : ml 130 – 220 per quintale d'acqua contro Cavolaia e Nottua.
- Asparago, Carota, Finocchio, Cipolla, Aglio, Fagiolo, Pisello, Insalate, Spinacio, Cucurbitacee : ml 130-220 per quintale d'acqua contro Agrotidi, Altiche, Tignole, Crisomelidi.
- Barbabietola da zucchero : ml 180 – 220 contro Altica, Cassida, Nottue.
- Foraggere (prati, pascoli, leguminose, graminacee) : ml 180 – 220 per quintale d'acqua contro Fitonomo, Apion, Misurino, Crisomela, Bombice, Nottue, Piralide.
- Garofano, in pieno campo : ml 180 – 220 per quintale d'acqua contro Bega verde, Nottue, Tripidi.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

COMPATIBILITÀ : il prodotto è compatibile con tutti i principali antiparassitari eccezion fatta dei prodotti a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, calce). **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ : il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.Attenzione ! Da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

FUNGISAN L

FUNGICIDA LIQUIDO A BASE DI ZIRAM MICRONIZZATO

FUNGISAN L

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Ziram puro micronizzato g 27 (= 310,5 g/l)
Supporti e disperdenti q.b. a 100

MOLTO TOSSICO PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione; Molto tossico per inalazione; Irritante per le vie respiratorie; Rischio di gravi lesioni oculari; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocarea lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Proteggersi gli occhi/la faccia; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

TECNITERRA srl - via Bronzino, 19 - Milano

Officina di produzione : CHEMIA spa - S.Agostino (FE)
Registrazione n° 4168 del Ministero della Salute del 20/12/1980
Lt 1 - 5 - 10 partita n°

NORME PRECAUZIONALI; Conservare la confezione ben chiusa

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Ziram: Sintomi cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia , visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Grazie alla tecnica di preparazione, presenta rispetto ai prodotti acuprici in polvere bagnabile:
- maggior facilità e prontezza di preparazione della miscela;
- maggior adesività e resistenza al dilavamento operato dalle pioggie;
- maggior attività anticrittogamica dovuta al grado di micronozzazione del principio attivo.

CAMPI DI IMPIEGO

Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio: contro Bolla, Corineum e marciumi, muffe. **Melo e Pero**: controTicchiolatura. **Pomodoro, Patata, Fagiolo, Lattuga, Asparago, Cocomeri, Melanzane, Cipolle, Sedano, Meloni, Cetrioli, Piselli**: contro alternaria, antracnosi, septoriosi. **Vite**: contro Muffe (Botrytis, Monilia e Sclerotinia). **Garofano**: contro Ruggine. **Rosa**: contro Ticchiolatura. Il **FUNGISAN L** esercita azione preventiva e curativa. Non produce ustioni o rugginosità sui frutti.

DOSI DI IMPIEGO

Pesco ed altre drupacee (albicocco, susino, ciliegio):
Trattamenti durante al vegetazione (500 ml in 100 l acqua).
Trattamenti autunno-invernali (1400 ml in 100 l acqua)
Melo e Pero:
Trattamenti pre-fiorali (600 ml in 100 l acqua)
Trattamenti post-florali (500 ml in 100 l acqua)
Viti, ortaggi (pomodoro, patata, fagiolo, lattuga, asparago, cocomeri, melanzane, cipolle, sedano, meloni, cetrioli, piselli), colture floreali (500 ml in 100 l acqua)

MODALITÀ DI IMPIEGO

Stemperare in poca acqua la dovuta quantità di **FUNGISAN L** indi portare alla giusta diluizione, agitando.

COMPATIBILITÀ

È compatibile con tutti gli antiparassitari non alcalini e con gli integratori fogliari.

TEMPO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.

FITOTOSSICITÀ

Cultivars di pero sensibili allo Ziram: Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona d'estate.

AVVERTENZA

- In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
- Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
- Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
- Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.

Attenzione : data l'elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego é consentito esclusivamente al personale qualificato munito di autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23/04/2001

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

GLIFONE

Erbicida di post-emergenza

COMPOSIZIONE
- Glifosate puro g. 30,6 (= 360 g/l)
  (pari a sale isopropilamminico g 41)
- Coadiuvanti e disperdenti q.b.a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

TECNITERRA srl – Via Bronzino 19 – Milano

Stabilimento di produzione : Torre srl – Torrenieri (SI) / ALTHALLER ITALIA srl –S.Colombano al Lambro (MI) / CHEMIA spa - S.Agostino (FE) / DIACHEM spa Unità produttiva SIFA – CARAVAGGIO (BG) / TERRANALISI srl - Cento (FE)/CHEMINOVA A/S – Thyboronvej 78-Harboore (Danimarca)
Registrazione n° 5193 del 01.02.1983 del Ministero della Sanità
Litri 0,1-0,25-0,5-1-5-20 Partita n°........

INFORMAZIONI MEDICHE : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il GLIFONE controlla le infestanti monocotiledoni e dicotiledoni sia perenni che annuali.
Il trattamento con GLIFONE deve essere eseguito in post-emergenza delle malerbe quando queste sono ben sviluppate ed in attiva crescita. Il prodotto viene assorbito dalle parti aeree di monocotiledoni e dicotiledoni e viene traslocato entro breve tempo alla parte ipogea (radici, rizomi, tuberi, stoloni e bulbi).
A contatto con il terreno si degrada molto rapidamente non lasciando alcun residuo. Le alte temperature, la forte intensità luminosa, l'elevata umidità dell'aria, favoriscono la rapidità d'azione del prodotto.
Il GLIFONE non agisce sui semi delle infestanti, questi vanno distrutti con un idoneo erbicida ad azione residuale.
- Diserbo di colture arboree (vite, agrumi, melo, pero) : il GLIFONE, impiegato alla dose compresa tra 6-12 litri per ettaro, controlla la quasi totalità dalle malerbe annuali ed è particolarmente indicato per le infestanti perenni tipo Agropyron repens, Artemisia vulgaris, Cannucce, Cirsium arvense, Convolvolus arvensis, Cynodon dactylon, Cyperus spp, Daucus carota, Felci, Plantago spp, Potentilla spp, Rumex spp, Sonchus arvensis, Sorghum halepense, Taraxacum officinalis, Tussilago fanfara.
Nel caso sia necessario combattere le infestanti annuali provenienti da seme, si deve impiegare un erbicida ad azione residuale ad un intervallo minimo di 15 giorni dopo la distribuzione del GLIFONE.
La soluzione erbicida non danneggia le parti legnose delle arboree, ma per evitare fenomeni di fitotossicità, si consiglia di non irrorare le parti verdi (foglie, tralci e rami erbacei, polloni).
Durante il trattamento evitare che la soluzione colpisca altre colture vicine pertanto trattare in assenza assoluta di vento impiegando ugelli appropriati e schermi protettivi, onde evitare fenomeni di deriva.
- Eliminazione di infestanti perenni dopo la raccolta di colture agricole : il GLIFONE permette di combattere Sorghum halepense, Cynodon dactylon, Cirsium spp ed altre infestanti perenni ed annuali presenti dopo la raccolta. Per ottenere il miglior controllo occorre che le malerbe siano al massimo del loro ricaccio vegetativo non ricoperte dai residui della raccolta e che il terreno non venga lavorato prima del trattamento onde evitare ricacci incompleti.
Il GLIFONE va impiegato nella dose di 6-12 litri per ettaro a seconda della flora infestante. Dopo il diserbo il terreno non deve essere lavorato per almeno 2-3 settimane o fino a quando le foglie delle infestanti non siano imbrunite o disseccate. Dopo il trattamento con GLIFONE è possibile seminare mais, girasole, grano, orzo, avena.
- Diserbo canali : il GLIFONE agisce solo sulle malerbe che hanno la parte aerea ben sviluppata e al di sopra del livello dell'acqua. Il prodotto va impiegato alla dose di 6-12 litri per ettaro intervenendo nella tarda estate o all'inizio dell'autunno (fine agosto-settembre).
- Diserbo industriale : il GLIFONE, distribuito alla dose di 6-12 litri per ettaro durante il periodo estivo ed autunnale consente di combattere le infestanti perenni, in pieno stadio vegetativo, presenti in aree non agricole come sedi di binari ed aree ferroviarie, autostrade, bordi stradali, depositi ed impianti industriali, aeroporti, canali e rive dei fiumi.

COMPATIBILITA': il prodotto va impiegato da solo
FITOTOSSICITA' : *il prodotto non deve arrivare a contatto con le foglie, tralci, rami erbacei, polloni e colture erbacee vicine alla zona trattata.* Per il trattamento usare pompe a bassa pressione onde evitare il danno da deriva, in casi particolari usare ugelli a cono e schermi protettivi. Dopo l'irrorazione lavare accuratamente tutto il materiale impiegato prima di utilizzarlo per altri interventi antiparassitari. Non impiegare gli imballaggi vuoti e le acque di lavaggio per irrorazioni diverse.
NOCIVITA' : il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

IPER

Insetticida a largo spettro d'efficacia - formulazione : liquido emulsionabile

IPER
composizione
- Cipermetrina pura g. 5 (= 45 g/l)
- coadiuvanti qb a 100

NATURA DEL RISCHIO :
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

TECNITERRA S.r.l. – Via Bronzino, 19 - MILANO
officina di produzione : Diachem spa - Unità produttiva SIFA (Caravaggio) / Torre srl – Torrenieri (fraz. Montalcino) – Siena / ALTHALLER ITALIA srl – S.Colombano al Lambro (MI) / SCAM srl – Modena / CHEMIA Spa – S. Agostino (FE) / REA S.r.l. –Marcianise (Ce)
Registrazione n. 10730 del 16.02.2001 del Ministero della Sanità
lt. 0,01-0,020-0,05-0,1-0,5-1-5-10 Partita n.

***INFORMAZIONE PER IL MEDICO** : Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione - Avvertenza : consultare un centro antiveleni.*

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
IPER è un prodotto che agisce per contatto ed ingestione sugli insetti parassiti con notevole potere abbattente e residuo ed effetto repellente. Viene indicato sulle seguenti colture :
- **patata - cavolo verza - cavolo cappuccio - cipolla - cavolfiore - cavolo broccolo - pomodoro - fagiolino - pisello** : ml 100 - 125 contro la Dorifora, ml 100 - 150 contro le Nottue allo scoperto, Afidi, Cavolaia, Tripidi e Piralide, ml 75 - 100 contro la Mosca bianca.
- **pesco - ciliegio** : ml 100 - 150 contro Anarsia, Cydia, tripidi, mosca, lepidotteri in genere e Cocciniglie contro le neanidi in trattamenti estivi; ml 75 - 10 su Afidi con foglie non accartocciate.
Se si vuole controllare gli insetti svernanti e uova di acari trattare alla dose di ml 100 - 150 con un olio bianco lt 1,5 allo stadio vegetativo dei bottoni rosa
- **arancio - limone** : ml 100 - 150 contro le Cocciniglie (neanidi in trattamenti estivi) e Mosca degli agrumi, ml 75 - 100 contro Afidi e Mosca bianca.
- **vite** : ml 100 - 150 contro Tignola e Tignoletta e ml 100 - 125 contro Sigaraio e Cocciniglia
- **pero** : ml 100 - 150 contro la Psilla con trattamento di fine inverno contro gli adulti svernanti, ml 150 (come secondo trattamento) con prime neanidi, quindi eventuale terzo trattamento a ml 200 - 300 contro la terza generazione; ml 75 - 100 contro gli Afidi e ml 100 - 150 contro Cemiostoma, Litocollete, Nepticula trattando alla prima generazione allo stadio diuova mature, contro Ricamatrici estive e Lepidotteri in genere, Carpocapsa, Cocciniglie (contro neanidi nei trattamenti estivi).
Se si vuole controllare gli insetti svernanti e uova di acari trattare alla dose di ml 100 - 150 con un olio bianco lt 2-3 tra le orecchiette di topo e la differenziazione dei mazzetti fiorali.
- **barbabietola da zucchero** : lt 1 - 1,2 per ettaro contro l'Altica, ml 500 - 800 contro gli Afidi e lt 0,8 - 1 contro Nottue, Cleono, Lisso, Casside.
- **tabacco** : ml 75 - 100 contro Afidi e Mosca bianca, ml 100 - 150 contro Nottue e Tripidi
- **mais** : ml 75 - 100 contro Afidi e ml 100 - 150 contro Piralide
- **frumento** : ml 75 - 100 contro Afidi e Lema
- **soia** : ml 100 - 150 contro Cimice verde, Afidi e Tripidi
- **floreali, ornamentali** : ml 75 - 100 contro Afidi, Mosca bianca; ml 150 - 200 contro Bega del garofano e Lepidotteri in genere; ml 100 - 150 contro Tripidi, Maggiolino e Nottue
- **pioppo** : ml 75 - 100 contro Afidi e ml 100 - 150 contro Saperda e Criptorrinco

Avvertenze : i dosaggi sono riferiti a q.le acqua salvo diversa indicazione, trattare con dosi più alte con infestazioni forti e bagnare bene tutta la pianta, non trattare durante la fioritura.
Compatibilità : eseguire prima delle prove parcellari. AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA' : è tossico per insetti utili e pesci
"Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle" – "Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento" – "Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza"
Sospendere i trattamenti prima della raccolta : soia 3 giorni, fagiolino, pisello, cavolo broccolo e cavolfiore 7 giorni, arancio, pesco, ciliegio, pero, cavolo verza e cappuccio, limone, cipolla, patata 14 giorni, pomodoro e barbabietola da zucchero 21 giorni, vite, mais 28 giorni, frumento 42 giorni e tabacco 60 giorni
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

NEPTAN

INSETTICIDA - LIQUIDO EMULSIONABILE

NEPTAN

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Diclorvos puro g 45 (=483 g/l)
Emulsionanti e disperdenti q. b. a g 100
(contiene Xilene)

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Tossico a contatto con la pelle e per ingestione; Molto tossico per inalazione; Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini; Altamente tossico per gli organismi acquatici

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con la pelle; In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

TECNITERRA srl - via Bronzino, 19 - Milano

Officina di produzione : Torre srl - Torrenieri (fraz. di Montalcino) Siena / CHEMIA spa - S.Agostino (FE) / ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI) / SINOCHEM NINGBO Corp – Ningbo (Cina)
Registrazione n° 2237 del Ministero della Sanità del 26/05/1976
Lt 1 - 5 partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Diclorvos: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Brachicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia, e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida in seguito spastica delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima
Consultare un centro antiveleni.

CAMPI D'IMPIEGO
Melo e Pero: contro tortricidi, minatrici (Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardella), ricamatrici, Stigmella malella.
Pesco, Susino, Albicocco, Ciliegio: contro tortricidi, minatrici, ricamatrici, tignole.
Vite: contro tortricidi varie.
Garofano: contro Cacoecia pronubana (bega del garofano), aleurodidi, tripidi.
Rosa, Ciclamino, Gerbera: contro tripidi, aleurodidi, minatrici, nottue, afidi.

Dosi d'impiego:
100-150 ml in 100 litri di acqua e in caso di forti infestazioni aumentare la dose a 200 ml.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Sciogliere in poca acqua la dose prescritta, indi sempre rimescolando portare alla concentrazione voluta.
Va irrorato nelle ore calde ed in assenza di vento. Trattare alle prime manifestazioni, ripetere il trattamento dopo 10-15 giorni.

COMPATIBILITÀ
NEPTAN è compatibile con i comuni antiparassitari non alcalini.

RISCHIO DI NOCIVITÀ
–È tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
–Impiego: È VIETATO L'IMPIEGO IN SERRE, FUNGAIE E MAGAZZINI.
–È molto velenoso per le api pertanto è consigliabile tenere lontano il più possibile le arnie dai luoghi trattati e non effettuare trattamenti alle piante durante la fioritura.

TEMPO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta. Far trascorrere lo stesso periodo (7 gg) prima di far pascolare il bestiame in zone trattate od alimentarlo con prodotti che direttamente od accidentalmente siano venuti a contatto con il prodotto.

AVVERTENZA

- In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
- Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
- Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
- Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso,
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.

Attenzione : data l'elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23/04/2001

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

RUBRUM

ostacola la cascola pre-raccolta

COMPOSIZIONE
g 100 di prodotto contengono:
NAA purog 8 (= 82,7 g/lt)
Diluenti ed emulsionanti q. b. a g 100

ATTENZIONE :
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

Il **RUBRUM**, preparato a base di fitoregolatori, è caratterizzato da pronta efficacia, lunga durata della azione anticascola (due settimane) estesa ad un vasto numero di varietà di pero e melo

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Melo e Pero: ml 50 per 100 litri d'acqua. Eseguire il trattamento al momento della cascola dei primi frutti. Sulle varietà molto soggette alla cascola è opportuno ripetere il trattamento dopo 15 giorni.
È consigliabile bagnare foglie e frutti come per un normale trattamento antiparassitario, ed aggiungere il bagnante **TECNIL IRREVERSIBILE.** Si consiglia di eseguire il trattamento solo su piante sane nelle ore del tardo pomeriggio

COMPATIBILITÀ
É compatibile con i normali esteri fosforici

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso,
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.

TECNITERRA srl - via Bronzino, 19 - Milano

Officina di produzione : Torre srl - Torrenieri (fraz. di Montalcino) Siena / CHEMIA spa - S.Agostino (FE) / ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI) / SINOCHEM NINGBO Corp – Ningbo (Cina) / TERRANALISI srl – Cento (FE)
Registrazione n° 5592 del Ministero della Sanità del 28/12/1983
lt 0,250 - 0,500 - partita n°

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

SINERVIS

FITORMONE – FITOSTIMOLANTE – ALLEGANTE

COMPOSIZIONE:
Acido gibberellico puro:...g 0,150 (1,65 g/l)
NAA (Acido alfa-naftalenacetico)..g 0,300 (3,3 g/l)
Coformulanti e coadiuvanti ....q.b.a. 100

ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
SINERVIS per la sua particolare composizione è un fitoregolatore con azione di stimolo sullo sviluppo vegetativo, con attività complementari quali l'anticipo della fioritura e della maturazione, maggiore allegagione, pezzature uniformi, migliore colore della frutta.
CAMPI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
AGRUMI: (Arancio, Limone, Pompelmo, Clementino)
Per una maggiore fioritura e allegagione. Dosi: ml 100 – 150/hl. Sono consigliati due trattamenti: il primo all'inizio della fioritura; il secondo durante l'allegagione.
Per una più uniforme pezzatura ed una più precoce ed uniforme colorazione. Dosi: ml 150 – 200/hl. Sono consigliati due trattamenti: il primo dopo l'allegagione, il secondo prima della invaiatura.
PERO E MELO:
Per una migliore allegagione. Dosi: ml 100 – 150/hl. Trattamento nella fase della fioritura con 20-30% dei fiori aperti.
Come anticascola. Dosi: ml 150 – 200/hl ai primi sintomi di cascola.
COLTURE ORTICOLE: (Fragola, pomodoro, zucchino, carciofo, sedano, spinacio, patata)
Fragola – Per l'anticipo della fioritura ed una più precoce raccolta. Dosi: ml 100–150/hl con due o più trattamenti: il primo 20–30 giorni prima della prevista fioritura; il secondo dopo l'allegagione.
Carciofo - Per anticipare la produzione dei capolini.
Dosi: ml 150-200/hl alla formazione del primo abbozzo fiorale.
Ripetere il trattamento ogni 15–20 giorni.
Pomodoro – Per una maggiore fioritura, allegagione, pezzatura e colorazione dei frutti. Dosi: ml 150–200/hl.
Sono consigliati due o più trattamenti irrorando tutta la vegetazione. Il primo alla dose di 150 ml/hl prima della fioritura; il secondo ed i successivi dopo la formazione dei primi frutti.
Patata – Per stimolare l'emissione dei germogli.
Dosi: ml 150–200/hl. Immergere i tuberi (interi o tagliati) per circa 5 minuti.
Zucchino - Per favorire l'ingrossamento dei frutti ed una più uniforme e anticipata pezzatura. Dosi: ml 150 –200/hl. Sono consigliati due o più trattamenti . Il primo appena formati i primi frutticini, irrorando tutte le piante. Ripetere il trattamento ad intervalli di 15-20 giorni appena si sono formati i nuovi frutti.
Spinacio - Per un più precoce sviluppo e dimensione fogliare. Dosi: ml 150-200/hl. Sono consigliati due o più trattamenti distanziati di 15-20 giorni l'uno dall'altro.
Sedano – Per una maggiore ed uniforme pezzatura.
Dosi: ml 150-200/hl. Sono consigliati due o più trattamenti distanziati di 15 – 20 giorni l'uno dall'altro.
COLTURE FLORICOLE IN SERRA E PIENO CAMPO
Per aumentare la fioritura e per la formazione di fiori più grossi. Dosi: ml 150-200/hl. Sono consigliati tre o più trattamenti distanziati di 10–20 giorni l'uno dall'altro a partire dalle prime fasi di piena attività vegetativa.
COMPATIBILITA': il prodotto è miscibile con i fertilizzanti fogliari.
AVVERTENZA : In caso di miscele deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : Il prodotto è fitotossico per le pere Decana del Comizio.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
ATTENZIONE : Impiegare il prodotto esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

TECNITERRA SRL – Via Bronzino 19 - MILANO
Officine di Produzione:CHEMIA SpA – S.Agostino (Fe) - ALTHALLER ITALIA Srl–S.Colombano al Lambro (Mi)
Registrazione n° 11891 del 22 Ottobre 2003 del Ministero della Salute
ml 20 – 100 – 250 – 500 Partita n°

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

SOGIBER

Fitormone – stimolante vegetativo
Tipo di preparazione: liquido

COMPOSIZIONE
- Acido gibberellico puro g 2 (21 g/l). (isomero G. A3)
- Coformulanti q.b. a 100

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un centro antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
Il SOGIBER è un fitoregolatore con azione di stimolo sullo sviluppo vegetativo con azioni complementari quali l'anticipo delle fioritura, della maturazione, maggior allegagione ed aumento dell'allegagione, pezzature uniformi, miglior colore della frutta,
Viene impiegato su (le dosi sono riferite a q.le acqua salvo diversa indicazione):
Agrumi: ml 50-100 su arancio, limone e pompelmo trattando all'inizio della invaiatura; su clementino prima della fioritura a ml 70-120. Il trattamento è effettuato per migliorare la qualità della buccia e per ridurre la cascola.
Fragola: per l'anticipo della fioritura ed una precoce raccolta con due trattamenti ad un mese ed un mese e mezzo dalla prevista fioritura, alla dose di ml 100-140.
Pero: con i fiori aperti al 20-30% per una migliore allegagione alla dose di ml 50-90; nel caso di gelate trattare entro 48 ore per limitare il danno.
Carciofo: quando si forma il primo abbozzo fiorale e non oltre la sesta foglia, ml 50-100 per anticipare la produzione di capolini.
Vite: trattamento pre-fiorale per una migliore allegagione ed uno post-fiorale contro l'acinellatura alla dose di ml 150-250.
Patata: immergere i tuberi prima di metterli a dimora per qualche minuto; per interrompere la dormienza in una soluzione di 5 cc/hl per tuberi tagliati e 20 cc/hl per tuberi interi.
Colture floricole: ml 40-70, per aumentare la fioritura e con formazione di fiori più grossi.
Alla dose minima si può intervenire ogni 20-30 giorni iniziando alla comparsa dei primi boccioli.
COMPATIBILITA': Miscibile con i fertilizzanti fogliari.
AVVERTENZA: In caso di miscela deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto è fitotossico per le pere Decana del Comizio. Per le varietà di pero, fragola non citate in etichetta fare prove preliminari.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.

TECNITERRA S.r.l. – Via Bronzino 19 – Milano

Officina di produzione: ALTHALLER ITALIA S.r.l.- S.Colombano al Lambro (MI)/CHEMIA S.p.A. – S. Agostino (FE) – REA Industria Chimica S.r.l. – Marcianise (CE)
Registrazione n° 8873 del 10/6/1996 del Ministero della Sanità
Litri 0,100 – 0,200 – 0,500 – 1.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

SOLFOTEC 90

ZOLFO MICRONIZZATO IN POLVERE BAGNABILE

Partita n.:

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Zolfo micronizzato puro g 90
(esente da Selenio)
Supporti e disperdenti q.b. a 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

TECNITERRA srl - via Bronzino, 19 – Milano

Officina di produzione :
STI - SOLFOTECNICA ITALIANA spa - Cotignola (RA)
CHEMIA spa - S.Agostino (FE)
SULPHUR MILLS LTD. GUJARAT INDIA/ZOLFINDUSTRIA Srl - S.Cipriano Po (Pv)
Registrazione n° 6654 del Ministero della Sanità del 18/03/1986 - Kg 1 - 5 - 10 - 25

INFORMAZIONI MEDICHE In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

VITICOLTURA
Contro l'oidio della vite: gr 200-400 in 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti quando i germogli hanno la lunghezza di pochi cm. e ripeterli, opportunamente distanziati, secondo l'andamento stagionale. Durante la fioritura effettuare solforazioni polverulente.

FRUTTICOLTURA
Contro il mal bianco del melo e del pesco: prima della fioritura, gr 400-500 in 100 litri di acqua: durante la vegetazione, gr 300-400 in 100 litri di acqua.

ORTICOLTURA
Contro l'oidio dei cocomeri, dei piselli, del pomodoro, contro la nebbia delle fragole, il mal bianco dei meloni, gr 300-400 in 100 litri di acqua.

FLORICOLTURA
Contro l'oidio (mal bianco) delle rose, delle begonie, dei crisantemi, gr 300-400 in 100 litri di acqua.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Stemperare in poca acqua la dose prescritta, indi sempre rimescolando portare alla giusta diluizione.

COMPATIBILITÀ
È compatibile con i fungicidi e insetticidi non alcalini e con gli integratori fogliari (IRALDRAL e IRRALFLOR). Non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacril, Diclofluanide.
AVVERTENZA: Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerale e del Captano
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
Mele: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla Bianca - Commercio - Golden Delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap.
Vite: Sangiovese.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta.

«Attenzione, da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso».
«Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato».

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

SOLFUM 40

GEODISINFESTANTE - LIQUIDO FUMIGANTE

SOLFUM 40

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Metam Sodium puro g 32,5 (= 319 g/lt)
Supporti e disperdenti q.b. a 100

CORROSIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione; A contatto con acidi libera gas tossico; Provoca ustioni; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti mnegativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Proteggersi gli occhi/la faccia; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

TECNITERRA srl - via Bronzino, 19 - Milano

Officina di produzione : TORRE SRL - Torrenieri (fraz. di Montalcino) Siena / CHEMIA spa - S.Agostino (FE) / ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI) – AKZO NOBEL CHEMICALS SPA – Marano Ticino (NO)
Registrazione n° 0692 del Ministero della Sanità del 19/09/1972
Lt 1 - 5 - 50 - 110 partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Metam Sodium: sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aere, broncopatie asmtiformi, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporiflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Prodotto per la disinfestazione del terreno prima della semina o del trapianto.
Il **SOLFUM 40** ha azione fumigante per svolgere la sua azione ha quindi bisogno di una temperatura non inferiore a 14° C e non superiore ai 30° C.

CAMPI DI IMPIEGO

Garofani, Pomodoro, Peperone, Melanzane, Fragole, Melone, Tabacco: contro i funghi che causano marciumi radicali e provocano avvizimenti e morie delle piante (Phitophotora, Fusarium, Verticillium, Sclerotinia, Amillaria, Rosellinia, Phitium, Rhizoctonia).
Anche nelle minimi dosi svolge azione erbicida eliminando le erbe annuali e i semi germinanti.
Come insetticida svolge azione efficace contro lumache, grillo talpa, maggiolini e le forme libere dei nematodi esistenti nel terreno.

DOSI D'IMPIEGO

100-150 lt per 1000 mq. superficie - in terreni infestati da fusariosi o verticillosi o da phitophtora sarà opportuno portare la dose a 200 lt

MODALITÀ DI IMPIEGO

È consigliabili preparare il terreno con una lavorazione profonda 25 cm circa e renderlo il più fine possibile per evitare che parte del medesimo non venga raggiunto dal gas. Subito dopo la distribuzione del prodotto la suèperficie trattata va bagnata per favorire la formazione di una crosta che impedisca la dispersione dei vapori.
Dopo 10-15 giorni il terreno deve essere lavorato per consentire la dispersione dei vapori; dopo altri 8-10 giorni è possibile la semina o il trapianto previa altra lavorazione del terreno (fresatura).
Il SOLKFUM 40 può essere distribuito con le normali pompe con macchine fumiganti o con il palo iniettore.

COMPATIBILITÀ

Non è compatibile con gli altri prodotti.

FITOTOSSICITÀ : È fitotossico e deve essere usato sul terreno nudo almeno 20 - 30 giorni prima della semina o trapianto

AVVERTENZA

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.

In caso di fuoriuscita accidentale di prodotto, impiegare materiale assorbente come segatura o sabbia, raccogliere e porre in un contenitore e trattare come rifiuto nocivo secondo quanto previsto dal DPR N° 915/1982.

Contenitore da restituire al produttore

(limitatamente alla taglia da Lt 110)

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

STARTEC

Insetticida - Aficida sistemico con breve persistenza ed azione pronta

STARTEC
composizione:
- Eptenofos puro g. 50 (= 550 g/l)
- Coformulanti e solventi q.b a g. 100
(contiene xilene)

FRASI DI RISCHIO :
Infiammabile; Nocivo per inalazione e contatto con la pelle, Tossico per ingestione; Irritante per la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli
l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

TECNITERRA srl - Via Bronzino, 19 - Milano

Registrazione n 9811 del 18/11/1998 Ministero della Sanità
Officina di produzione : Torre srl - Torrenieri (fraz. di Montalcino) (SI) / CHEMIA spa - S.Agostino (FE) / SCAM srl - Modena / TERRANALISI srl - Renazzo (FE) / ADICA Srl - Faenza (RA) / ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI)
partita numero: Contenuto lt 0,1-0,2-0,5-1-5-10

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. Consultare un centro antiveleni.

CAMPI E MODALITA' DI IMPIEGO
Lo STARTEC è un insetticida - aficida sistemico che esplica la propria azione sia per ingestione che per contatto in fase di vapore sugli insetti in fase di riposo penetrando rapidamente nei tessuti vegetali e con breve persistenza. E' indicato nei programmi di lotta integrata e guidata. Viene indicato per essere impiegato sulle seguenti colture :
LATTUGA – CAVOLI – FAGIOLINO - contro ogni tipo di afide a ml 75 - 100/hl
Da non applicare con mezzi aerei
Compatibilità: il prodotto non è miscibile con gli antiparassitari a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
***Nocività**: il prodotto e' nocivo per gli insetti utili, animali domestici e bestiame.*
Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto
"Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle" - "Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore - "Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza"
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

TECNICID

INSETTICIDA - POLVERE BAGNABILE

TECNICID

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Carbaril puro g 47,5
(esente da β-naftolo)
Supporti e disperdenti q.b. a 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione; Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti; Altamente tossico per gli organismi acquatici

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

TECNITERRA srl - via Bronzino, 19 - Milano

Officina di produzione : STI - SOLFOTECNICA ITALIANA spa - Cotignola (RA) / CHEMIA spa -S.Agostino (FE) / ADICA srl – Nera Montoro (TR) / SCAM srl – S.M. Mugnano (MO) / SINOCHEM NINGBO Corp – Ningbo (Cina)

Registrazione n° 0670 del Ministero della Sanità del 12/09/1972

Kg 0,250 - 1 - 5 - 10 partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Carbaril: Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo, vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni ossime.
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Insetticida agente per contatto e per ingestione contro le larve dei lepidotteri dannosi alle colture.

CAMPI DI IMPIEGO

Melo e Pero: contro carpocapsa - 150 g in 100 litri di acqua - ricamatrice della frutta (Pandemis) 200-250 g in 100 litri di acqua.
Pesco, Albicocco: contro cidia e anarsia - 200-250 g in 100 litri di acqua.
Uva: contro tignola.
Patata: contro dorifora.
Garofano: contro tortrici.

DOSI D'IMPIEGO

150-200 g in 100 litri di acqua.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Sciogliere in poca acqua la dose prescritta indi, sempre rimescolando, portare alla giusta diluizione. È consigliabile ripetere il trattamento dopo 10-14 giorni.

COMPATIBILITÀ

È compatibile con i comuni antiparassitari non alcalini e con gli integratori fogliari.

RISCHIO DI NOCIVITÀ

Tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
"Attenzione, il prodotto tal quale contiene sostanza molto tossica per gli organismi acquatici"

TEMPO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

AVVERTENZA

- In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
- Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
- Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
- Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.
-

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

TECNIKUR

Fungicida ad azione sistemica

Composizione
- PROPAMOCARB cloroidrato g. 66,5 (= 722 g/l)
- Coadiuvanti qb a 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.**Avvertenza** : consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Fungicida sistemico indicato nella difesa di numerose colture nel combattere i seguenti ficomiceti: Pythium spp., Phytophthora sp., Peronospora, Pseudoperonospora, Aphanomices sp., Bremia.
Viene assorbito prevalentemente dalle radici e poi traslocato nell'apparato fogliare, caratterizzato da una lunga e completa protezione ed elevata selettività sulle colture manifestando, su esse, uno stimolo nei confronti della radicazione e sullo sviluppo vegetativo.
Il prodotto ha la caratteristica di poter essere impiegato con numerose tecniche quali: trattamenti fogliari, concia delle sementi, bagno dei bulbi e delle talee, disinfezione dei terricciati e dei letti di semina, trattamenti al terreno in pre e post - trapianto delle colture.
Viene impiegato sulle seguenti colture : agrumi, melo, pero, fragola, cavoli, lattuga, cicoria, indivia, radicchio, spinacio, bietola da foglia e da costa, sedano, prezzemolo, basilico, cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo), solanacee (pomodoro, peperone, melanzana), *carota, bietola da orto, rapa, cipolla, aglio, porro, tabacco, floreali, forestali, ornamentali, nei vivai, nei semenzai, nella concia delle sementi* e bulbi, campi da golf e prati ornamentali.
INTERVENTI
- **TRATTAMENTI FOGLIARI** : viene impiegato alla dose di litri 1,5 - 3 per ettaro di coltura in circa 15 - 20 ettolitri di acqua, sulle colture sopramenzionate.
- **CONCIA DELLE SEMENTI** : la dose d'impiego è di ml 1 - 4 per kg di seme di piccole dimensione e ml. 10 - 40 per kg. di seme di dimensioni maggiori.
- **PREPARAZIONE DEI TERRICCIATI** : impiegare 300 ml di prodotto per metro cubo di terriccio, disciolti in circa 20 litri di acqua.
- **TRATTAMENTI AI SEMENZAI** : impiegare ml. 8 - 12 per metro quadro di superfice disciolti in 4 - 5 litri di acqua con l'avvertenza di ripetere il trattamento cinque giorni prima del trapianto con l'utilizzo di 6 - 8 litri di acqua per metro quadrato.
- **TRATTAMENTI AL TERRENO** : - pre - trapianto : impiegare ml 8 - 12 per metro quadro in 3 - 5 litri di acqua.
- post - trapianto : impiegare 100 - 200 ml per pianta di una soluzione ottenuta diluendo 200 ml di prodotto per q.le acqua: trattare ogni 10 - 15 giorni con un massimo di 3 - 4 interventi.
- **COLTURE FLOREALI IN GENERALE**
informazioni particolareggiate per le seguenti colture :
- **Garofano – Gerbera** : si impiega il prodotto specificatamente contro Pythium e Phytophtora alla dose di ml 12 - 15 per metro quadro, disciolto in circa 2 - 4 litri di acqua, trattando due giorni prima dell'impianto e quindi procedendo all'incorporamento.
Successivamente impiegare 200 ml per q.le acqua, con trattamento fogliare, bagnando abbondantemente con 400 - 500 litri ogni 1000 metri quadri, ad intervalli inizialmente di circa 8 - 10 giorni e successivamente ogni 15 - 25 giorni.
- **BULBOSE** : per controllare Pythium ultimum e Phytophthora si immergono i bulbi per 20 - 30 minuti in una soluzione contenente 300 ml di prodotto per q.le acqua, poi, prima della messa a dimora, si tratta il terreno con 10 - 12 ml di prodotto, per metro quadrato in 2 - 4 litri di acqua e successivo incorporamento a circa 10 - 12 cm di profondità.
- **PIANTE FORESTALI (VIVAI)** : contro Phytophthora cactorum, Phytophtora cinnamomi e Pythium, intervenendo trattando il substrato colturale con 300 ml di prodotto per metro cubo, disciolto in 8 - 10 litri di acqua; si deve intervenire, in caso di necessità ogni 15 - 18 giorni con 200 ml di prodotto in 4 - 5 litri di acqua per metro quadro.
- **CAMPI DA GOLF – TAPPETI ERBOSI – PRATI ORNAMENTALI** : per il controllo di Phytium sp. ed altre specie, trattare con interventi fogliari a ml 1-1,5 per metro quadro, impiegando non meno di 100 – 200 litri di soluzione per 1000 mq. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia ripetendo i trattamenti ogni 14-15 giorni.
COMPATIBILITA' : non compatibile con i prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese) e gli olii minerali.
AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

TECNITERRA srl - Via Bronzino, 19 - Milano
Stabilimento di produzione : Torre srl –Torrenieri (fraz. di Montalcino) (SI) / CHEMIA spa - S.Agostino (FE) / DIACHEM spa - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG) / SCAM srl - Modena / ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI) / REA S.r.l. Marcianise (Ce) -
Registrazione n. 10731 del 16.02.2001 del Ministero della Sanita'
Partita n° Lt 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-20-25

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

TECNOMIL

insetticida sistemico

TECNOMIL
COMPOSIZIONE
-Metomil puro g 18,4 (= 195 g/l)
-Coadiuvanti q.b. a g 100

MOLTO TOSSICO — PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO :
Molto tossico per ingestione; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

TECNITERRA srl - Via Bronzino, 19 - MILANO

Registrazione n. 9990 del 17.03.1999 Ministero della Sanità
Officina di produzione : Torre srl - Torrenieri (fraz. di Montalcino) (SI) / CHEMIA spa - S.Agostino (FE) / DIACHEM spa - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG) / SCAM srl - Modena / ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI) / SINOCHEM NINGBO Corp – Ningbo (Cina)
partita numero: Contenuto lt 0,2-0,250-0,5-1-5-10-15

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione ; scialorrea e broncorrea con broncospasmo, vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori, fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina. Controindicazioni : ossime. - Consultare un centro antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il **TECNOMIL** è un Insetticida sistemico a base di Metomil, efficace per contatto ed ingestione nei confronti di numerosi insetti parassiti delle colture: Tisanotteri, Emitteri, Lepidotteri, Coleotteri. Il prodotto manifesta un forte potere abbattente ed in virtù della sua sistemicità consente un rapido ed esteso controllo delle infestazioni. Per la limitata azione residua, può impiegarsi a breve distanza dalla raccolta.
Melo e Pero : contro larve dei ricamatori, (Pandemis, Eulia, Archips), larve di 1^ stadio di Lithocolletis e Leucoptera, Afidi, Carpocapsa pomonella, Capua reticulana, Cacoecia podana, Orgya antigua, ml. 200-250.
Drupacee: contro Afidi, Anarsia, Cydia molesta, Diaspis pentagona e Tignola ml. 200.
Vite: contro Tignola e Tignoletta ml. 200-250. Su **vite da tavola** dose massima di 400 g di sostanza attiva per ettaro e con numero 2 massimo di applicazioni:.
Olivo - Agrumi : contro Cocciniglia Mezzograno di pepe (Saissetia oleae) e Cocciniglie in genere ml. 200-250.
Pomodoro, Melanzana, Peperone, : contro Nottue, Aleurodidi e Cavolaia ed Afidi ml. 200.
Cucurbitacee: contro Afidi, Nottue e Aleurodidi ml. 200.
Barbabietola da zucchero: contro Afidi, Cleono e Altica lt. 2,5 per Ha dispersi in 800-1000 litri d'acqua.
Lattuga: contro Nottue e Cavolaie ml. 200.
Fagiolo, Pisello : contro larve di Lepidotteri ml 200
Garofano in pieno campo: contro la Bega ml. 200-250.
Tabacco - Ornamentali e Floreali : contro afidi, nottue, tortricidi, tripidi e larve di lepidotteri ml. 200 - 250.
Esche per Nottue : l'esca deve essere costituita da 1 litro di prodotto + 5 kg di crusca + 1 kg di zucchero, mescolando a secco la crusca e lo zucchero, inumidire ed aggiungere il prodotto; distribuire a spaglio sul terreno od a mucchietti.
Le dosi sopra indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale.
Impiegare le dosi più basse per trattamenti ravvicinati e quelle più alte per trattamenti a più lunga distanza.
COMPATIBILITA': è incompatibile con le poltiglie solfocalciche - AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
"Durante l'applicazione del prodotto utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie" - "Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle"
NOCIVITA': è tossico per animali domestici, insetti utili, pesci e bestiame. Non immettere nel campo trattato pollame e bestiame prima di 14 giorni, non preparare la soluzione in prossimità di corsi d'acqua.
Sospendere i trattamenti 14 gg. prima dell'ultimo trattamento e la raccolta per la lattuga, 30 giorni per la vite da tavola e 10 giorni per tutte le altre colture.
"Non immettere nelle zone trattate il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza"
Data di scadenza in normali condizioni di conservazione del preparato (se la durata dello stesso è inferiore a due anni)
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Attenzione : data l'elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23/04/2001

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

TELGOR 40

INSETTICIDA - LIQUIDO EMULSIONABILE

TELGOR 40

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono :
-Dimetoato puro g 37,6 (=363 g/l)
-Emulsionanti e disperdenti q. b. a g 100
(contiene Xilene)

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO

Infiammabile; Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione; Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

TECNITERRA srl - via Bronzino, 19 - Milano

Officina di produzione : Torre srl - Torrenieri (Fraz. di Montalcino) Siena / CHEMIA spa - S.Agostino (FE) / DIACHEM spa, unità produttiva SIFA, Caravaggio (BG) - S. S. Padana Superiore - ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI) / SINOCHEM NINGBO Corp – Ningbo (Cina)
Registrazione n° 0784 del Ministero della Sanità del 01/09/1972
Lt 0,100 - 0,250 - 0,500 - 1 - 5 - 10 partita n°

NORME PRECAUZIONALI

Conservare la confezione ben chiusa- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Dimeotoato: Sintomi colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuro muscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, Broncospasmo. Iperscrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, Ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali confusione, atassia, convulsioni, coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida in seguito spastica delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino alla comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Insetticida dotato di potere citotropico, penetra nell'interno dei tessuti distruggendo anche gli insetti protetti e difficilmente raggiungibili con i normali insetticidi.

CAMPI DI IMPIEGO

Melo (piante non in produzione): contro cecidomia, crisorrea, rinchite, afidi, mosca della frutta (Ceratitis capitata).
Pero (piante non in produzione): contro cecidomia, crisorrea, rinchite, afidi, psilla del pero, mosca della frutta (Ceratitis).
Barbabietola da zucchero: contro casside, pegomya, nottua, mamestra.
Garofano, Rosa, Ciclamino, Gerbera: contro aleurodidi, tripidi, bega del garofano.
Olivo: contro tignola, mosca dell'olivo, effettuare massimo 2 trattamenti

DOSI D'IMPIEGO

100-150 ml in 100 litri di acqua. Sull'olivo a fine settembre contro la mosca usare la dose massima. Contro larve minatrici del pero, melo, colture ortive, e floreali e psilla: 75 ml in 100 litri di acqua.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Sciogliere in poca acqua la dose prescritta, indi sempre rimescolando portare alla concentrazione voluta .

COMPATIBILITÀ : Il TELGOR 40 va impiegato preferibilmente da solo.

RISCHIO DI NOCIVITÀ : È nocivo agli insetti utili, agli animali domestici, pesce e bestiame.

TEMPO DI SICUREZZA : Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta su Barbabietola da zucchero, 35 giorni sulle altre Olivo.

AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

- Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
- Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
- Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso,
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

TRADE 125

Erbicida graminicida di post-emergenza selettivo per numerose colture sia erbacee sia arboree
tipo di formulazione : liquido emulsionabile

TRADE 125
Composizione:
- Fluazifop - p - butile puro g 13,3 (=125 g/l)
- Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO : Infiammabile; Irritante per la pelle; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico; Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati; Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione; L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle; L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

TECNITERRA srl – Via Bronzino 19 – Milano
Stabilimento di produzione : Althaller Italia srl - S.Colombano al Lambro (MI) / CHEMIA spa - S.Agostino (FE)
Registrazione n. 11988 del 26.04.2004 del Ministero della Salute
lt. 0,1-0,2-0,25-0,5-1-2-5-10-15 partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi, Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporiflessia neviti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. ipertensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fasciColazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica . Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO
Il TRADE 125 è un erbicida selettivo specifico per il controllo delle infestanti graminacee, assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato per via sistemica, sia verso gli apici vegetativi che verso le radici, i rizomi e gli stoloni. Il prodotto è assorbilo rapidamente (entro 3 ore dal trattamento) ed i primi sintomi appaiono nell'ambito di una settimana. Si distribuisce con attrezzature a bassa pressione, impiegando ugelli a ventaglio o a specchio. Intervenire durante le ore fresche del giorno, su infestanti in attiva crescita impiegando volumi d'acqua medi (200-400 lt / ha) onde consentire la uniforme copertura della vegetazione ed aggiungendo 500 ml di un bagnante. Trattare quando le infestanti graminacee si trovano nello stadio di 1/3 foglie / accestimento per le annuali e le poliennali quali avena (Avena spp.), bromo (Bromus spp.), coda di volpe (Alopecurus spp.), digitaria (Digitaria sanguinalis), giavone (Echinochloa spp.), setaria (Setaria spp.), sorghetta da seme (Sorghum halepense), loglio (Lolium spp.), falaride (Phalaris spp.), ricacci di frumento ed orzo. Trattare con infestanti di sorghetta da rizoma (Sorghum halepense) alta 30 – 50 cm., per l'erba fienarola (Poa annua) la resistenza è media.
CAMPI D'IMPIEGO : **Arancio, Arancio amaro, Barbabietola da zucchero, Carciofo, Carota, Cavoli, Cedro, Cetriolo, Chinotto, Cicoria, *Cicoria da radice, Ciliegio, Cipolla, Clementino, Cocomero, Colza, Fagiolino, Fagiolo, Fava, Finocchio,***
Floreali (in pieno campo, e in serra: Rosa, Garofano, Liliacee, Bulbose, Gerbera, Geranio, Viola, Petunia, Crisantemo, Sterlizia), Girasole, Kumquat, Lattuga, Limone, Mandarino, Melo, Melone, Nocciolo, Olivo, Patata, Pero, Pesco, Pisello, Pompelmo, Ravanello, Sedano, Soia, Solanacee, Susino, Tabacco, Tangerino, Trifoglio, Vite.
DOSI D'IMPIEGO
-contro graminacee annuali e biennali sino all'inizio dell'accestimento : litri 1,25 – 1,5 per ettaro
-contro graminacee annuali e biennali in accestimento : litri 1,5 – 2 per ettaro
- contro sorghetta da seme : litri 2 per ettaro
AVVERTENZA : impiegare la dose minore con malerbe giovani, l'impiego di dosaggi il trattamenti localizzati deve essere di litri 2 in 100 litri di acqua; non trattare con infestanti stressate da varie cause quali siccità, danneggiamento, basse temperature o da pascolo; l'efficacia del prodotto in presenza di terreno secco ed umidità relativa inferiore al 60% può essere ridotta.

COMPATIBILITA' : il prodotto và impiegato da solo
Sospendere i trattamenti 90 giorni prima della raccolta per la soia, 60 giorni per barbabietola da zucchero, girasole, colza, trifoglio, tabacco, 50 giorni per patata e 30 giorni per tutte le altre colture
"Da non usare su terreni grossolanamente sabbiosi - Da non usare sullo stesso appezzamento più di due volte all'anno" - "Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto e siano ad esse professionalmente esposte" - "Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore" - "Impedire l'accesso agli animali domestici nelle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza"
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

TRIBUTE

MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE:
Metribuzin puro gr. 35
Coformulanti q.b. a gr. 100

Frasi di Rischio
Nocivo per ingestione; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a Lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

TECNITERRA srl – Via Bronzino 19 - Milano
Stabilimento di produzione : SIDECO Dr Schirm GmbH Mecklenburger Strasse, 229 – 23568 Luebeck – Germania / A.D.I.C.A. srl - Via dello stabilimento 11 – 05027 Nera Montoro (Terni) / STI SOLFOTECNICA ITALIANA spa – Cotignola (RA) / SINOCHEM NINGBO Corp – Ningbo (Cina)/ SULPHUR MILLS Ltd – Gujarat (India)
Registrazione n° 10 343 del 28.02.2000 del Ministero della Sanità
Peso netto kg 0,1-0,2-0,3-0,5-1-5-10 - **Partita n°.......**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti erimatose a dermatiti necrotizzanti) Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulo-necrosi renale acuta ed epato-necrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito e diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo l'ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata, l'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica. AVVERTENZA: consultare un centro anti-veleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Erbicida in formulazione di microgranuli idrodispersibili che agisce sia per via radicale che fogliare sulle seguenti infestanti: Alopecurus, Amaranthus, Anagallis, Atriplex, Capsella, Centaurea, Chenopodium, Digitaria, Fumaria, Geranium, Lamium, Lolium, Matricaria, Mercurialis, Mollugo, Panicum, Poa annua, Polygonum, Portulaca, Raphanus, Senecio, Sinapis, Sonchus, Spergula, Stellaria, Thiaspis, Urtica, Veronica. Viene indicato sulle seguenti colture :
PATATA: trattamento in pre-emergenza : *1 -1,5 kg/ha in 500 - 700 litri d' acqua*. Impiegando la dose minore nei terreni leggeri e quella maggiore in quelli pesanti, escludendo i terreni sabbiosi. Trattamenti in postemergenza: 0,5-0,6 kg/ha in 500-700 lt di acqua, riservando la dose maggiore ai terreni pesanti.
N.B.: il prodotto si è dimostrato perfettamente tollerato dalle seguenti varietà di patata: Admirandus, Alkamaria, Apollo, Arsy, Bea, Bintje, Cardinal, Desiree, Favorita, Humalda, Kennebec, Majestic, Monnalisa, Primura, Resj, Rosanna, Saxia,, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal.
POMODORO: trattamento in pre-semina : 0,5 - 0,6 kg/ha in 500-700 litri d'acqua intervenendo 7 - 14 giorni prima della semina sul terreno già preparato senza interrare. Trattamenti di post-emergenza e post-trapianto : 0,7-1,5 kg/ha riservando la dose maggiore ai terreni pesanti e intervenendo dopo il diradamento o dopo che le piantine hanno superato la crisi di trapianto. Al momento del trattamento le piantine devono aver differenziato almeno 8-9 foglie (pre-fioritura).
SOIA: 0,5-0,7 kg/ha in pre-semina/pre-emergenza. Non impiegare in terreni molto leggeri o torbosi.
ASPARAGO: 1-1,5 kg/ha in pre-emergenza con 600 lt di soluzione, in asparagiaie di almeno 2 anni.
MEDICA: 1 kg/ha in terreni leggeri; 1,5 kg/ha in terreni di medio impasto, pesanti e molto pesanti sempre in 500 - 700 litri d' acqua intervenendo in autunno dopo l'ultimo sfalcio, quando la coltura è entrata in riposo vegetativo a seguito delle prime brinate.
AVVERTENZE: *eseguire il trattamento in giornate senza vento, avendo cura di distribuire uniformemente la soluzione su tutta la superficie da* trattare, evitando sovrapposizioni e di raggiungere altre colture adiacenti. A lavoro ultimato lavare accuratamente pompe e recipienti usati per la preparazione della soluzione.
COMPATIBILITÀ: per la medica il prodotto può essere miscelato solamente con diserbanti a reazione neutra (per esempio metabenztiazuron) per aumentare il campo di azione contro le infestanti. **AVVERTENZA**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: non effettuare il diserbo su pomodoro in serra e sotto tunnel e nei terreni molto leggeri; non intervenire in pre-semina del pomodoro nei seguenti casi :
a) qualora si usi un quantitativo di seme inferiore a 2,5 kg/ha in quanto la coltura risulterebbe più sensibile in caso di repentini abbassamenti di temperatura;
b) nei cosidetti "terreni bianchi" che formano la crosta al momento della emergenza delle piantine. Per l'intervento in post-emergenza o post-trapianto attenersi alle seguenti :
a) in caso di necessità di irrigazione al momento del diserbo, eseguirla almeno 6-7 giorni prima del trattamento
b) non diserbare una coltura sofferente (ad esempio per siccità, alte o basse temperature, ristagni d'acqua etc.);
c) le eventuali fresature devono essere superficiali per non danneggiare l'apparato radicale del pomodoro e devono essere eseguite 5 - 10 giorni prima del trattamento. Per quanto riguarda la patata non effettuare il trattamento su: Draga, Jarla e Vivax in quanto si sono dimostrate sensibili al prodotto.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto per pomodoro e 60 giorni prima del raccolto per le altre colture.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

TECNOMETA M 8 - 64

POLVERE BAGNABILE

Fungicida specifico per la lotta contro la Peronospora della Vite, del Pomodoro e del Tabacco

COMPOSIZIONE
- Metalaxil puro .... g 8
- Mancozeb puro.................. g 64
- Coformulanti q.b. a .... g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO : Irritante per le vie respiratorie; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

TECNITERRA S.r.l. – Via Bronzino 19 Milano

Officina di produzione :SINAPAK SNC – Stradella (PV)
Registrazione Ministero della Salute n° 9911 del 18/01/1999
1 Kg Partita n.

Prescrizioni particolari: *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL 8% e MANCOZEB 64%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL: Sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
MANCOZEB: Sintomi-cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore pre-cordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
TECNOMETA M 8-64 è un fungicida ad azione preventiva e curativa specificatamente indicato per la lotta contro le Peronosporacee delle colture di VITE, TABACCO e POMODORO.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il primo trattamento verrà eseguito dopo il verificarsi della prima pioggia infettante; per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permetterà di mantenere delle cadenze fisse sganciate dalle piogge. Infatti anche le piogge abbondanti e ripetute non diminuiscono l'efficacia del trattamento. La traslocazione acropeta di TECNOMETA M 8-64 consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo che intercorre tra un trattamento ed un altro.
- **PERONOSPORA DELLA VITE** (Plasmopara Viticola): 250 g/hl di acqua fino ad allegagione avvenuta eseguendo i trattamenti ad intervalli di 14 giorni. Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare la buona copertura della vegetazione. Per la lotta contemporanea contro l'Oidio, miscelare il prodotto agli anticrittogamici previsti per questo scopo. L'impiego di TECNOMETA M 8-64 è particolarmente indicato nelle zone e condizioni in cui il rame può dare luogo a fitotossicità o comunque a fenomeni secondari negativi a carico della vite.
- **PERONOSPORA DEL TABACCO** (Peronospora tabacina): 300 g/hl di acqua. Iniziare i trattamenti non appena la coltura abbia superato la crisi del trapianto con cadenza di 10 giorni. Ciò consentirà la protezione totale della coltura anche nei periodi di elevata pressione di infezione. Onde evitare la comparsa di infezioni durante la fase della crisi di trapianto, eseguire un trattamento in semenzaio 1-2 giorni prima della messa a dimora delle piantine in campo alla dose di 300 g/hl di acqua.
- **PERONOSPORA DEL POMODORO** (Phytophtora infestans): 250 g/hl di acqua ad intervalli di 14 giorni. Sospendere i trattamenti con la prima fioritura del pomodoro.

NON IMPIEGARE IN SERRA – NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ
AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
SU VITE E TABACCO SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.
SU POMODORO SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALLA PRIMA FIORITURA.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

TECNOGIB AGR

ACIDO GIBBERELLICO IN COMPRESSE

Composizione
Acido gibberellico puro g. 9
Inerti, bagnanti, disperdenti. q.b.a g. 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: TECNOGIB AGR è un ormone naturale delle piante che, somministrato su esse, esplica molteplici effetti: stimolo della crescita; interruzione dormienza gemme, semi, tuberi; anticipo fioritura e stimolo allegagione (partenocarpia); stimolo germinazione semi ed attività amilasica in quelli di orzo; diminuzione delle esigenze in freddo di alcune colture. L'effetto TECNOGIB AGR è influenzato dai fattori ambientali, dallo stato nutrizionale e sanitario della coltura, dalla varietà; sono quindi consigliate verifiche preliminari nelle diverse situazioni colturali. Il prodotto è formulato in compresse effervescenti da 10 grammi, contenenti ciascuna 1 grammo di Acido Gibberellico tecnico.

EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO:

		n. compresse/hl acqua
PERO	**Per stimolare l'allegagione e la partenocarpia** Trattare quando il 20-30% dei fiori è aperto. Le varietà che rispondono positivamente sono: Butirra Giffard, Coscia, Trionfo di Vienna, Conference, William, Spadona, Buona Luisa d'Avranches, Passacrassana, Kaiser. Si sconsiglia l'impiego su Decana del Comizio e Abate.	1 - 2
	Per ridurre i danni da gelo Trattare entro le 48 ore successive alla gelata.	1,5 - 2,5
CARCIOFO	**Per anticipare e concentrare lo sviluppo dei capolini** Due trattamenti; il primo alla comparsa del capolino centrale ed il secondo 15-20 giorni dopo, oppure immediatamente dopo la prima raccolta. Su coltivazioni non forzate è consigliabile eseguire due trattamenti; il primo a 40-60 giorni dall'epoca di raccolta del "cimarolo" ed il secondo 20 giorni dopo. Le varietà che rispondono positivamente sono: Violetto di Provenza, Carciofo di Mola, Masedu, Spinoso sardo, Castellammare, Carciofo di ogni mese.	1 - 2
AGRUMI	**Per stimolare l'allegagione** Trattare in piena fioritura.	1
	Per ritardare la maturazione, la cascola ed i fenomeni di senescenza della buccia	
	Su arancio: trattare dopo l'invaiolatura, con frutti "commerciabili"	0,5 - 1
	Su limone: trattare appena prima dell'inizio invaiolatura	0,5 - 1
FRAGOLA	**Per stimolare la fioritura, anticipare e concentrare la maturazione** Trattare 4-6 settimane prima della fioritura. Le varietà che rispondono positivamente sono: Cambridge favourite, Pocahontas, Tioga, Red-Gauntlet, Gorella.	2 - 3
SPECIE FLORICOLE IN PIENO CAMPO (ciclamino, fiordaliso, anemone, ortensia)	**Per stimolare e uniformare la fioritura, allungare lo stelo fiorale** Più trattamenti, a distanza di 25-30 giorni, dallo stadio di bocciolo.	1 - 2

MODALITÀ D'USO: La soluzione si prepara facendo sciogliere le compresse in poca acqua fredda e successivamente aggiungendo il quantitativo totale d'acqua richiesto. La soluzione si deve impiegare subito dopo la preparazione.
AVVERTENZE: Distribuire la soluzione finemente nebulizzata ed operare nel tardo pomeriggio. Nei carciofeti trattati con TECNOGIB AGR è consigliabile irrigare prima o subito dopo l'applicazione ed aumentare la concimazione. Su fragola in pien'aria, l'impiego è da sconsigliare nelle zone con repentini abbassamenti di temperatura. In caso di trattamenti ripetuti impiegare le dosi minori. Conservare il prodotto in luogo asciutto e nella confezione originale ben chiusa, ad una temperatura non superiore ai 30°C.
COMPATIBILITÀ: Il prodotto deve essere impiegato da solo.
FITOTOSSICITÀ: Non trattare le piante malate o con carenze nutrizionali.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi im-piega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TECNITERRA S.r.l. - Via Bronzino, 19 – MILANO
Stabilimenti di produzione: SIEGFRIED AGRO AG/SA - Zofingen (Svizzera) / OXYTABS GmbH – Mooshorner Weg - Owschlag (Germania)
Registrazione Ministero della Sanità n. 10729 del 16.02.2001
Contenuto: g.100 (10 compresse da 10 g.) – g. 200 (20 compresse da 10 g.) – g. 300 (30 compresse da 10 g.)
Peso netto …………… Partita n°

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

TECNOLIO

OLIO BIANCO PER LA DIFESA INVERNALE E PRIMAVERILE
DELLE PIANTE DA FRUTTO E ORNAMENTALI
Insetticida - Liquido emulsionato

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Olio minerale bianco (Residuo insulfonabile 90-95%) g 80 (= 688 g/lt)
Emulsionanti e disperdenti q. b. a g 100

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Olio minerale bianco raffinato dotato di basso indice di volatilità e stabile a temperature varianti da -10° a + 50° C. Per la difesa invernale e primaverile delle piante da frutto *(pomacee, drupacee, agrumi, olivi)* e ornamentali *(ficus, sanseveria, aralie, musacee, palme)*
Efficace contro: cocciniglie, uova e larve di lepidotteri, psillidi, e tingidi del pero e del melo, cemiostoma e altre minatrici.
Dosi d'impiego:
Nei trattamenti invernali (a gemme ferme fino alla vigilia del rigonfiamento) lt 2,5-3 in 100 litri d'acqua.
Come coadiuvante nei trattamenti insetticidi ml 200-300 in 100 litri d'acqua

MODALITÀ DI IMPIEGO
Si versi il **TECNOLIO** in poca acqua agitando fino alla formazione dell'emulsione, indi versare nel totale quantitativo d'acqua mescolando accuratamente. Nel caso di miscela con polveri bagnabili per la difesa anticrittogamica preparare prima l'emulsione con olio indi aggiungere, già stemprata a parte in acqua, la polvere da miscelare.

COMPATIBILITÀ
É miscelabile con **APATON RAMATO, APATON MICRONIZZATO** e con **OSSICLOR** per combattere la ticchiolatura del Melo e del Pero; con **FUNGISAN** contro le crittogame del pesco.
Non è miscelabile con zolfi, polisolfuri e poltiglia bordolese. Nel caso le piante fossero state trattate con prodotti a base di zolfo attendere circa tre settimane ad irrorare **TECNOLIO**

RISCHIO DI NOCIVITÀ
É tossico agli insetti utili, agli animali domestici, pesci e bestiame.

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

TEMPO DI SICUREZZA : Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.
TECNITERRA srl - via Bronzino, 19 – Milano
Officina di produzione : Torre srl - Torrenieri (fraz. di Montalcino) Siena / CHEMIA spa - S.Agostino (FE) / ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI) / REA S.r.l.- Marcianise (Ce)
Registrazione n° 3044 del Ministero della Sanità del 06/04/1979
Lt 1 - 5 - 6 - 20 - 30 - 50 - 60 - 180 - 200 partita n°

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

TOPTEC

Fungicida sistemico con azione preventiva, curativa e bloccante
sulle colture di VITE, PERO, MELO, PESCO, ORTIVE, TABACCO, ORNAMENTALI E FLOREALI

TOPTEC
Composizione
- Penconazolo puro g. 10,20 (100 g/lt)
- coformulanti q.b. a g 100

NATURA DEL RISCHIO *:*
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA *:*
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

TECNITERRA srl – Via Bronzino 19 – Milano
Stabilimento di Produzione: -DIACHEM SPA - Unità produttiva SIFA (Caravaggio) / TORRE SRL – Torrenieri (fraz Montalcino) – Siena / ALTHALLER ITALIA srl – S.Colombano al Lambro (MI) /CHEMIA SPA – S. Agostino (FE)/REA SRL – Marcianise (CE)
Registrazione n. 10759 del 19.03.2001 del Ministero della Sanità
Litri 0,1-0,2-1-5-10-20 Partita n° .....

Informazioni per il medico : sintomi e organi interessati : occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato , reni. -Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). -Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. -Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acute ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergenico. -In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del S.N.C. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Fungicida sistemico che può essere utilizzato come preventivo, curativo e come bloccante; agisce all'interno della pianta e l'assorbimento del prodotto avviene velocemente (poche ore).

VITE
Oidio (Uncinula necator)
- Trattamenti preventivi: : ml 25 - 30 hl in pre post-fioritura intervenendo ogni 14-16 giorni e ml 15 - 20 hl in pre e post-fioritura effettuando i trattamenti ogni 7-10 giorni. Con attacchi in atto (primi sintomi) fare 2 trattamenti ogni 5 - 7 giorni alla dose di ml 50 hl, poi continuare con trattamenti di tipo preventivo. Il prodotto esplica un' attività collaterale su Guignardia spp. e in minor misura su Pseudopezia spp.

MELO
Ticchiolatura (Venturia inaequalis)
-Trattamenti preventivi: ml 30 - 40 hl ogni 6 - 8 giorni fino alla fase di frutto noce, poi ogni 10-15 giorni. I trattamenti contro la Ticchiolatura sono sufficienti per controllare efficacemente anche l'Oidio.
-Trattamenti curativi : ml 40 - 50 hl, si può intervenire entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
-Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi) : ml 40 - 45 hl effettuando 2 applicazioni ogni 5 - 7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali. E' bene aggiungere un prodotto di copertura.
Oidio (Podosphaera leucotricha)
-Trattamenti preventivi : in primavera ml 30 - 40 hl ogni 10 giorni, nei trattamenti estivi ogni 10 - 14 giorni con dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia.
-Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): ml 30 - 35 hl ogni settimana, con un totale di 3 - 4, che consentono il controllo delle infezioni in atto e la protezione della nuova vegetazione.
Malattie da conservazione :(Monilia fructigena, Penicillium spp.)
- fare in totale 2-3 trattamenti a cadenza settimanale in pre raccolta alla dose di 40-45 ml/hl.

PERO
Ticchiolatura (Venturia pirina):
-Trattamenti preventivi: ml 25 - 35 hl ogni 10 - 12 giorni, impiegando la dose maggiore e gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli all sviluppo della malattia.
-Trattamenti curativi: ml 30 - 40 hl trattando entro massimo 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
-Trattamenti bloccanti:(in presenza di sintomi) ml 30 - 40 hl con 2 trattamenti ogni 5-7 giorni, proseguire con cadenze e dosi normali. E' bene aggiungere un prodotto di copertura.

PESCO
Oidio
-Trattamenti preventivi: In zone dove il rischio di infezione è alto e con cultivar particolarmente sensibili trattare a ml 40 - 50 hl dalla caduta petali ed ogni 10 - 14 giorni. In zone a minor rischio intervenire ogni 14-21 giorni.
Malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp.)
- fare 2 - 3 interventi a cadenza settimanale in pre-raccolta alla dose di 50 ml/hl.

TABACCO
Oidio : ml 35 - 50 hl facendo da 2 a 4 trattamenti in modo preventivo, iniziando dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.

MELONE - ZUCCHINO - ZUCCA - CETRIOLO - CARCIOFO - PEPERONE (in pieno campo)- POMODORO (in pieno campo)- PISELLO
Oidio : In pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione, fare da 2 a 4 trattamenti ogni 14 - 16 giorni a ml 25 - 50 hl a seconda della coltura e del rischio di infezione. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.

COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE:
Oidio e ruggini : ml 25 - 50 ml/hl ogni 10 - 14 giorni a seconda della coltura e della incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.
attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro utilizzo è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall' uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

TRIOIDIOL

fungicida a base di Triadimenol e Zolfo
Tipo di formulazione : polvere bagnabile

IRRITANTE

Composizione
- Triadimenol puro .... g. 2,5
- Zolfo puro...................... g. 50
(esente da Selenio)
- coformulanti qb a g. 100

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle ; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

TECNITERRA srl – Via Bronzino 19 - Milano

stabilimento produttore : *STI SOLFOTECNICA ITALIANA - Cotignola (RA); CHEMIA spa - S.Agostino (FE); DIA-*CHEM spa - Unità Produttiva SIFA Caravaggio (BG); COMERCIAL QUIMICA MASSO, S.A. – S.Pere Molanta (Barcellona - Spagna)
Registrazione n. 11096 del 29.11.2001 del Ministero della Salute
Kg. 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1- 5 – 10 - 15

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive : TRIADIMENOL 2,5%, ZOLFO 50% le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione :
TRIADIMENOL : Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su basa allergica (da semplici dermatiti a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica.
ZOLFO : --
Terapia : sintomatica. - Consultare un centro antiveleni.

CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
Fungicida sistemico e di contatto con attività preventiva, curativa ed eradicante contro numerose malattie fungine; indicato sulle seguenti colture per combattere l'Oidio o Mal Bianco e le Ruggini di :
VITE - CETRIOLO - MELONE - PEPERONE - POMODORO - CEREALI (limitatamente a frumento, orzo, avena, segale, triticale) - *ZUCCHINO - MELO - PIANTE ORNAMENTALI* : g *100 - 200* per q.le acqua
Impiegare la dose più alta in caso di maggiore sensibilità varietale in zone soggette ad attacchi di Oidio o con intervalli, tra i trattamenti, superiori ai 10 giorni. Non trattare durante le ore più calde.

COMPATIBILITA' : tra il trattamento con il prodotto e l'impiego di olii minerali attendere 2 settimane
AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di vite, melo, peperone, cetriolo, melone, pomodoro, 7 giorni per lo zucchino, 30 giorni per i cereali.
Fitotossicità : il prodotto può risultare fitotossico sulle seguenti varietà di mele : Stayman (Winesap), Granny Smith, Starking, Renetta. Sulla Vite è fitotossico sulla Cv. Sangiovese.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ALTHALLER ITALIA S.r.l.

GLIFOSIM

Erbicida di post-emergenza liquido

Composizione:
-Glifosate acido puro g 30,4 (*)
-Coformulanti q.b. a 100
(*) Il contenuto di p.a. acido equivalente corrisponde a 360 g/l pari a g 41 di p.a. sale isopropilamminico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Althaller Italia S.r.l.
Strada Comunale per Campagna 5 20078 San Colombano al Lambro Mi

Officina di produzione:
Althaller Italia S.r.l. Strada Comunale per Campagna 5 20078 San Colombano al Lambro Mi
Stähler Agrochemie Gmbh & Co KG Steder Elbstraße 21683 Stade DE
Registrazione nr 8377 del 7 agosto 1993 del Ministero della Sanità
Litri 0,2 – 1 – 5 – 10 – 20 Partita n°

Informazioni mediche : in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Campi d'impiego: erbicida sistemico impiegato in post-emergenza. Agisce per assorbimento fogliare e viene traslocato sino alle radici ed agli organi di propagazione con inibizione della sintesi proteica, con effetto visivo dopo alcuni giorni con ingiallimento ed arrossamento delle infestanti e successivo disseccamento. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, è inefficace.
Viene impiegato per il diserbo di:
AGRUMI (Arancio, Mandarino, Clementino, Limone, Cedro, Pompelmo); POMACEE (Melo e Pero); NOCE; OLIVO; VITE; DRUPACEE (Albicocco, Ciliegio, Mandorlo, Nettarina, Pesco, Susino); CARCIOFO; POMODORO; MELANZANA; FAGIOLINO; FAVA; PISELLO; CAROTA; PATATA; MAIS (Consentito solo nell'interfila; da non impiegare in pre-raccolta); SOIA; ERBA MEDICA; PRATI; BARBABIETOLA DA ZUCCHERO; ROSA; VIVAI E SEMENZAI FLOREALI; ORNAMENTALI; FORESTALI E PIOPPO; ASPARAGO (prima dell'emergenza); SU TERRENI IN ASSENZA DI COLTURE e destinati alla coltivazione di: fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, grano, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai, con trattamenti prima della semina trattando con malerbe emerse ed effettuando il trapianto o la semina non prima di 48 ore;
AREE NON DESTINATE ALLA COLTIVAZIONE (aree industriali, ruderi storici, cimiteri, banchine stradali, piazzole, ferrovie, argini di canali, scoline e fossi, aree urbane e agricole non coltivate, viali, parchi e giardini). Non spruzzare le parti legnose e verdi in quanto il prodotto non è selettivo.

Dosi: Impiegare 2 – 3 ettolitri di acqua per ettaro con le seguenti dosi:

- INFESTANTI ANNUALI E BIENNALI: veronica sp., stellaria sp., sinapis sp., senecio sp., riso crodo, raphanus sp., portulaca sp., orobanche sp., mercurialis sp., lolium sp., chenopodium sp., calendula sp., avena sp., amaranthus sp., alopecurus spp., alla dose di litri 1,5 – 3,5 per ettaro.
- INFESTANTI PERENNI ED ARBUSTIVE quali agropyrum repens, carex sp., cirsium sp., euphorbia sp., glyceria sp., hipericum sp., laersia oryzoides, phalaris sp., rumex sp., sonchus sp., sorghum halepense, alisma sp., butomus sp., cyperus sp., ferula sp., juncus sp., nerdus sp., scirpus sp., sparganium sp., tussilago sp., agristis sp., allium sp., artemisia sp., cynodon sp., gleochoma sp., oxalis sp., paspalum sp., phragmites sp., raninculus sp., tigha sp., urtica sp., clematis sp., convolvulus sp., rubia sp., alla dose di litri 5 – 10 per ettaro a seconda della infestante.

L'addizione di solfato ammonico, in ragione di 8 10 kg per ettaro consente di impiegare le dosi inferiori prescritte. Con presenza di infestanti nate da seme, far seguire un trattamento con un prodotto residuale (es. simazina, diuron) lasciando trascorrere almeno 2 settimane. Se dopo il trattamento entro massimo 8 ore vi fosse una pioggia essa ridurrebbe l'efficacia del trattamento; evitare la deriva; togliere i succhioni e ricacci sulle colture arboree prima del trattamento; non lavorare il terreno per 3 settimane dopo il trattamento.
Compatibilità: Il prodotto non si impiega con gli antiparassitari a reazione alcalina. AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità : Il prodotto è fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Dopo il trattamento lavare accuratamente tutte le attrezzature impiegate.
Avvertenza: non impiegare materiali zincati o in ferro se non protetti da vernici plastiche.
Nocività: durante il trattamento tenere lontano animali domestici e bestiame.
Attenzione: da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi indicati: ogni latro impiego è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

LINFA S.p.a.

Biotiol®

FUNGICIDA A BASE DI ZOLFO BAGNABILE MICRONIZZATO IN FORMULAZIONE MICROGRANULARE

COMPOSIZIONE: Zolfo puro gr. 80,0; coformulanti e inerti quanto basta a grammi 100.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini; conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; usare indumenti protettivi e guanti adatti; in caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE - ***BIOTIOL*** è un fungicida specifico per il controllo dell'Oidio della vite e di numerose altre colture agrarie, floricole ed ornamentali. *BIOTIOL*, grazie alla sua formulazione microgranulare si disperde facilmente in acqua; inoltre la micronizzazione delle particelle costituenti il granulo assicura una copertura uniforme della vegetazione, con conseguente elevata efficacia e senza pericolo di danni alle piante, anche a dosi elevate.

MODALITÀ, DOSI E CAMPI D'IMPIEGO - *BIOTIOL* si impiega diluito in acqua con le seguenti modalità:

Colture	Parassiti combattuti	Dosi (grammi in 100 litri d'acqua)	Epoche d'impiego
VITE	Oidio	200-400	*Utilizzare le dosi maggiori nei trattamenti curativi e in zone ad alta pressione di Oidio*
MELO E PERO	Oidio	500 200-300	*in pre-fioritura* *in post-fioritura*
PESCO	Oidio	200-400	*Utilizzare le dosi più alte in pre-fioritura e dopo la raccolta*
NOCCIOLO	Oidio, Eriofide	200-400	*Contro l'Eriofide eseguire almeno 3-4 interventi a distanza di 15 giorni a partire dal germogliamento*
FRAGOLA	Oidio	200-400	*Intervenire alla comparsa dei primi sintomi della malattia*
ORTIVE, FLORICOLE ORNAMENTALI	Oidio, Acaro rugginoso	200-400	*Intervenire alla comparsa dei primi sintomi della malattia*
		Dosi (Kg/ha)	
BARBABIETOLA	Oidio	8	*Intervenire alla comparse della Malattia ripetendo il trattamento 20 giorni più tardi*
CEREALI	Oidio	8	*Intervenire alla comparsa della malattia sull'ultima foglia*

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: stemperare in poca acqua la prestabilita dose di prodotto e versare poi nel totale quantitativo di acqua mescolando accuratamente.
COMPATIBILITÀ : il prodotto non può essere associato a prodotti fitosanitari a reazione alcalina o a base di oli minerali e Captano.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
AVVERTENZE AGRONOMICHE: impiegare BIOTIOL a distanza di almeno 20 giorni dagli interventi con oli minerali e Captano. Non effettuare i trattamenti nelle ore più calde della giornata.
FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar di **Mele**: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla Bianca - Commercio - Golden Delicious – Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap; **Pere**: Buona Luigia D'Avranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio; **Vite**: Sangiovese; il prodotto può inoltre essere fitotossico sulle **Cucurbitacee**.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un suo uso improprio. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Linfa

LINFA spa *Cura del Verde*
Via Mattei, 6
42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Salute N. 11534 del 15/01/03

Officine di produzione: ***Rag Additive*** GmbH – Werksweg. 2 – D 95221 – Stulln (Germania); **Scam** srl – Strada Bellaria, 164 – Modena; ***STI Solfotecnica Italiana*** SpA – Via Evangelista Torricelli, 2 – Cotignola (RA).

Officine di confezionamento: ***L.I.F.A.*** srl – Via Piave (Zona Industriale) – Isola Vicentina (VI); ***Sinapack*** snc – Via dell'industria e dell'Artigianato, 7 – Stradella (PV).

Peso netto: Kg 0.1 - 0.25 - 0.5 - 0.75 - 1 - 2 - 5 – 10 – 15 - 20 – 25

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

Biotiol®

FUNGICIDA A BASE DI ZOLFO BAGNABILE MICRONIZZATO
IN FORMULAZIONE MICROGRANULARE

COMPOSIZIONE: Zolfo puro gr. 80,0; coformulanti e inerti quanto basta a grammi 100.

FRASI DI RISCHIO: irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini; conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; usare indumenti protettivi e guanti adatti; in caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

IRRITANTE

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un suo uso improprio. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Linfa

LINFA spa *Cura del Verde*
Via Mattei, 6
42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Salute n.11534 del 15/01/03

Officine di produzione: ***Rag Additive*** GmbH – Werksweg, 2 – D 95221 – Stulln (Germania); **Scam** srl – Strada Bellaria, 164 – Modena; ***STI Solfotecnica Italiana*** SpA – Via Evangelista Torricelli, 2 – Cotignola (RA).

Officine di confezionamento: ***L.I.F.A.*** srl – Via Piave (Zona Industriale) – Isola Vicentina (VI); ***Sinapack*** snc – Via dell'industria e dell'Artigianato, 7 – Stradella (PV).

Peso netto: Kg 0.1 - 0.25 - 0.5 - 0.75 - 1 - 2 - 5 – 10 – 15 - 20 – 25

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

FOGLIO ILLUSTRATIVO PER CONFEZIONI FORMATO RIDOTTO

Biotiol®

FUNGICIDA A BASE DI ZOLFO BAGNABILE MICRONIZZATO IN FORMULAZIONE MICROGRANULARE

COMPOSIZIONE: Zolfo puro gr. 80,0; coformulanti e inerti quanto basta a grammi 100.

CARATTERISTICHE - ***BIOTIOL*** è un fungicida specifico per il controllo dell'Oidio della vite e di numerose altre colture agrarie, floricole ed ornamentali. *BIOTIOL*, grazie alla sua formulazione microgranulare si disperde facilmente in acqua; inoltre la micronizzazione delle particelle costituenti il granulo assicura una copertura uniforme della vegetazione, con conseguente elevata efficacia e senza pericolo di danni alle piante, anche a dosi elevate.

MODALITÀ, DOSI E CAMPI D'IMPIEGO - *BIOTIOL* si impiega diluito in acqua con le seguenti modalità:

Colture	Parassiti combattuti	Dosi (grammi in 100 litri d'acqua)	Epoche d'impiego
VITE	Oidio	200-400	*Utilizzare le dosi maggiori nei trattamenti curativi e in zone ad alta pressione di Oidio*
MELO E PERO	Oidio	500 200-300	*in pre-fioritura* *in post-fioritura*
PESCO	Oidio	200-400	*Utilizzare le dosi più alte in pre-fioritura e dopo la raccolta*
NOCCIOLO	Oid o, Eriofide	200-400	*Contro l'Eriofide eseguire almeno 3-4 interventi a distanza di 15 giorni a partire dal germogliamento*
FRAGOLA	Oidio	200-400	*Intervenire alla comparsa dei primi sintomi della malattia*
ORTIVE, FLORICOLE ORNAMENTALI	Oid o, Acaro rugginoso	200-400	*Intervenire alla comparsa dei primi sintomi della malattia*
		Dosi (Kg/ha)	
BARBABIETOLA	Oidio	8	*Intervenire alla comparsa della Malattia ripetendo il trattamento 20 giorni più tardi*
CEREALI	Oidio	8	*Intervenire alla comparsa della malattia sull'ultima foglia*

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: stemperare in poca acqua la prestabilita dose di prodotto e versare poi nel totale quantitativo di acqua mescolando accuratamente.
COMPATIBILITÀ : il prodotto non può essere associato a prodotti fitosanitari a reazione alcalina o a base di oli minerali e Captano.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
AVVERTENZE AGRONOMICHE: impiegare BIOTIOL a distanza di almeno 20 giorni dagli interventi con oli minerali e Captano. Non effettuare i trattamenti nelle ore più calde della giornata.
FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar di **Mele**: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla Bianca - Commercio - Golden Delicious – Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap; **Pere**: Buona Luigia D'Avranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio; **Vite**: Sangiovese; il prodotto può inoltre essere fitotossico sulle **Cucurbitacee**.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un suo uso improprio. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Linfa

LINFA spa *Cura del Verde*
Via Mattei, 6
42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Salute N. 11534 del 15/01/03

Officine di produzione: ***Rag Additive*** GmbH – Werksweg, 2 – D 95221 – Stulln (Germania); **Scam** srl – Strada Bellaria, 164 – Modena; ***STI Solfotecnica Italiana*** SpA – Via Evangelista Torricelli, 2 – Cotignola (RA).

Officine di confezionamento: ***L.I.F.A.*** srl – Via Piave (Zona Industriale) – Isola Vicentina (VI); ***Sinapack*** snc – Via dell'industria e dell'Artigianato, 7 – Stradella (PV).

Peso netto: Kg 0.1 - 0.25 - 0.5 - 0.75 - 1 - 2 - 5 – 10 – 15 - 20 – 25

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CLORIDRAL®

FUNGICIDA CONTRO IL PYTHIUM E ALTRI FICOMICETI

EFFICACIA PREVENTIVA E CURATIVA

COMPOSIZIONE: Propamocarb cloridrato gr.66,5 (=722 g/L) - coaudivanti q.b. a 100

SOLUZIONE ACQUOSA

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini; conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: *carbammato che non presenta un'evidente inibizione della colinesterasi.* ***Terapia:*** *nei casi d'intossicazione è sufficiente dare al paziente una sospensione acquosa di carbone attivo. Praticare eventualmente una lavanda gastrica. Nei casi di maggiore gravità somministrare atropina solfato per iniezione, facendo attenzione a non eccedere nelle dosi, specialmente nei bambini. Sono inoltre possibili altri trattamenti di supporto da stabilire in base ai sintomi.* ***Avvertenza:*** *consultare un Centro Antiveleni.*

CARATTERISTICHE - ***Cloridral*** è un fungicida sistemico in soluzione acquosa indicato per il controllo, preventivo e curativo, dei marciumi provocati da diversi ficomiceti tra i quali *Pythium, Phytophthora, Peronospora, Pseudoperonospora, Aphanomyces, Bremia.* Distribuito nel terreno è assorbito rapidamente dalle radici e traslocato nell'apparato fogliare tramite la corrente linfatica; applicato alla chioma è assorbito dalle foglie, distribuendosi uniformemente al loro interno. ***Cloridral*** garantisce una lunga e completa protezione.

CAMPI D'IMPIEGO - agrumi, melo, pero, fragola, cavoli, lattuga, cicoria, indivia, radicchio, spinacio, bietola da foglia e da costa, sedano, prezzemolo, basilico, cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo), solanacee (pomodoro, peperone, melanzana), carota, bietola rossa, rapa, cipolla, aglio, porro, tabacco, floreali, vivai e piante forestali, ornamentali, semenzai, campi da golf e prati ornamentali, concia delle sementi e dei bulbi.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO - ***Cloridral*** si caratterizza per le numerose tecniche applicative adottabili: trattamenti al terreno, nebulizzazioni fogliari, concia delle sementi e dei bulbi. Diluire la dose nel volume d'acqua necessario ed applicare come di seguito descritto.

Trattamenti al substrato: la massima efficacia è ottenuta quando il terreno o il substrato colturale siano già umidi al momento del trattamento.

- **Preparazione dei terricciati:** 300 ml. per metro cubo in 20 litri d'acqua;
- **Semenzai:** 10÷12 ml. per metro quadrato, diluiti in 3÷5 litri d'acqua;
- **Pre-trapianto:** immergere le piante per circa 20 minuti in una soluzione ottenuta diluendo 300 ml. di prodotto in 100 litri d'acqua oppure, un giorno prima del trapianto, distribuire 10÷12 ml. per metro quadrato diluiti in 3÷5 litri di acqua;
- **Post-trapianto:** 200 ml. per q.le d'acqua (concentrazione 0,2%), somministrando ad ogni pianta 100÷200 ml. della soluzione, ponendo attenzione di assicurare una particolare concentrazione nella zona radicale. Ripetere il trattamento ogni 10-15 giorni, con un massimo di 3÷4 interventi;

Trattamenti fogliari: 1,5÷3 litri per ettaro in circa 15 ettolitri di acqua (pari a 15-30 ml. per 100 mq. in 15 litri d'acqua), nebulizzando uniformemente sulla vegetazione. I trattamenti devono iniziare quando le condizioni climatiche favoriscono le infezioni o, al limite, ai primi sintomi della malattia. In funzione dell'andamento climatico, ripetere ogni 7÷14 giorni;

Concia delle sementi: 1÷4 ml. per kg. di semente di piccole dimensioni; 10÷40 ml. per kg. di semente di grandi dimensioni. Per migliorare l'uniformità del trattamento si consiglia di diluire la dose indicata in poca acqua e l'impiego di sistemi rotativi;

Concia dei bulbi: per il controllo di *Pythium ultimum* e *Phytophthora*, immergere i bulbi per 20-30 minuti in una soluzione di 30 ml. in 10 litri d'acqua. Prima della messa a dimora trattare il terreno con 10÷12 ml. per metro quadrato in 3÷5 litri d'acqua.

Informazioni particolareggiate per le seguenti colture:

Campi da golf e prati ornamentali (stabilizzati o di nuova semina)**:** azione preventiva e curativa per lo specifico controllo del *Pythium*. Le condizioni più favorevoli allo sviluppo della malattia sono la tarda primavera-estate con temperature superiori a 17°C, temperature diurne intorno ai 26°C e umidità elevata. Sui tappeti erbosi di nuovo impianto il *Pythium* è la malattia fungina più frequente a causa delle elevate condizioni di umidità necessarie per la germinazione. Sui tappeti erbosi stabilizzati si effettua il trattamento nei periodi più favorevoli allo sviluppo del patogeno; dopo la germinazione sui tappeti erbosi di nuovo impianto. Distribuire uniformemente 120 ml. in 10÷20 litri d'acqua per 100 mq. Se le condizioni climatiche rimangono favorevoli allo sviluppo del fungo, si consiglia di ripetere i trattamenti ogni 10÷20 giorni. Con forti infestazioni utilizzare secondo gli intervalli temporali più brevi;

Vivai e piante forestali contro *Pythium, Phytophthora cactorum e Phytophtora cinnamoni.* Distribuire 300 ml. per metro cubo di substrato colturale diluiti in 20 litri d'acqua. Dopo l'emergenza delle piantine, intervenire ogni 15÷18 giorni distribuendo 4÷5 litri per metro quadrato di una soluzione allo 0,2%;

Garofano – gerbera: contro *Pythium* e *Phytophtora*. Due giorni prima dell'impianto distribuire 12÷15 ml. per metro quadro diluiti in circa 2-4 litri di acqua. 8-10 giorni dopo l'impianto e, successivamente, dopo 15-20 giorni, nebulizzare sulle foglie una soluzione ottenuta diluendo 20 ml. in 10 litri d'acqua;

Fragola: prima dell'impianto immergere le piantine per circa 20 minuti in una soluzione allo 0,3%. Dopo l'impianto distribuire 200 ml. per pianta di una soluzione allo 0,2%.

COMPATIBILITA': non compatibile con i prodotti a reazione alcalina (es. polisolfuri) e gli oli minerali.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Per i campi da golf e prati ornamentali segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate per le 24 ore successive al trattamento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile dei danni che possono derivare da un suo uso improprio.

Linfa

LINFA spa *Cura del Verde*
Via Mattei, 6
42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Sanità N. 11123 del 17/12/01

Officine di produzione: **Althaller Italia srl** – S.Colombano al Lambro (MI); **Irca Service spa** – Fornovo San Giovanni (BG); **Scam srl** – Strada Bellaria, 164 – Modena; **Sipcam spa** – Salerano sul Lambro (LO); **STI Solfotecnica Italiana spa** – Torrenieri – Frazione di Montalcino (SI);

Volume netto: litri 0.025; 0.05; 0.1; 0.25; 0.5; 0.75; 1; 2; 5; 10; 15; 20;

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

SOLUZIONE ACQUOSA

CLORIDRAL®

FUNGICIDA CONTRO IL PYTHIUM E ALTRI FICOMICETI

EFFICACIA PREVENTIVA E CURATIVA

COMPOSIZIONE: Propamocarb cloridrato gr.66,5 (=722 g/L) - coaudivanti q.b. a 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini; conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

***INFORMAZIONI PER IL MEDICO**: carbammato che non presenta un'evidente inibizione della colinesterasi. **Terapia**: nei casi d'intossicazione è sufficiente dare al paziente una sospensione acquosa di carbone attivo. Praticare eventualmente una lavanda gastrica. Nei casi di maggiore gravità somministrare atropina solfato per iniezione, facendo attenzione a non eccedere nelle dosi, specialmente nei bambini. Sono inoltre possibili altri trattamenti di supporto da stabilire in base ai sintomi. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.*

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile dei danni che possono derivare da un suo uso improprio.

Linfa

LINFA spa ***Cura del Verde***
Via Mattei, 6
42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Sanità N. 11123 del 17/12/01

Officine di produzione: **Althaller Italia srl –** S.Colombano al Lambro (MI); **Irca Service spa –** Fornovo San Giovanni (BG); **Scam srl** – Strada Bellaria, 164 – Modena; **Sipcam spa** – Salerano sul Lambro (LO); **STI Solfotecnica Italiana spa** – Torrenieri – Frazione di Montalcino (SI);

Volume netto: litri 0.025; 0.05; 0.1; 0.25; 0.5; 0.75; 1; 2; 5; 10; 15; 20;

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

FOGLIO ILLUSTRATIVO PER CONFEZIONI FORMATO RIDOTTO

CLORIDRAL®

SOLUZIONE ACQUOSA

FUNGICIDA CONTRO IL PYTHIUM E ALTRI FICOMICETI

EFFICACIA PREVENTIVA E CURATIVA

COMPOSIZIONE: Propamocarb cloridrato gr.66,5 (=722 g/L) - coaudivanti q.b. a 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CARATTERISTICHE - ***Cloridral*** è un fungicida sistemico in soluzione acquosa indicato per il controllo, preventivo e curativo, dei marciumi provocati da diversi ficomiceti tra i quali *Pythium, Phytophthora, Peronospora, Pseudoperonospora, Aphanomyces, Bremia*. Distribuito nel terreno è assorbito rapidamente dalle radici e traslocato nell'apparato fogliare tramite la corrente linfatica; applicato alla chioma è assorbito dalle foglie, distribuendosi uniformemente al loro interno. ***Cloridral*** garantisce una lunga e completa protezione.

CAMPI D'IMPIEGO - agrumi, melo, pero, fragola, cavoli, lattuga, cicoria, indivia, radicchio, spinacio, bietola da foglia e da costa, sedano, prezzemolo, basilico, cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo), solanacee (pomodoro, peperone, melanzana), carota, bietola rossa, rapa, cipolla, aglio, porro, tabacco, floreali, vivai e piante forestali, ornamentali, semenzai, campi da golf e prati ornamentali, concia delle sementi e dei bulbi.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO - ***Cloridral*** si caratterizza per le numerose tecniche applicative adottabili: trattamenti al terreno, nebulizzazioni fogliari, concia delle sementi e dei bulbi. Diluire la dose nel volume d'acqua necessario ed applicare come di seguito descritto.

Trattamenti al substrato: la massima efficacia è ottenuta quando il terreno o il substrato colturale siano già umidi al momento del trattamento.

- **Preparazione dei terricciati:** 300 ml. per metro cubo in 20 litri d'acqua;
- **Semenzai:** 10÷12 ml. per metro quadrato, diluiti in 3÷5 litri d'acqua;
- **Pre-trapianto**: immergere le piante per circa 20 minuti in una soluzione ottenuta diluendo 300 ml. di prodotto in 100 litri d'acqua oppure, un giorno prima del trapianto, distribuire 10÷12 ml. per metro quadrato diluiti in 3÷5 litri di acqua;
- **Post-trapianto**: 200 ml. per q.le d'acqua (concentrazione 0,2%), somministrando ad ogni pianta 100÷200 ml. della soluzione, ponendo attenzione di assicurare una particolare concentrazione nella zona radicale. Ripetere il trattamento ogni 10-15 giorni, con un massimo di 3÷4 interventi;

Trattamenti fogliari: 1,5÷3 litri per ettaro in circa 15 ettolitri di acqua (pari a 15-30 ml. per 100 mq. in 15 litri d'acqua), nebulizzando uniformemente sulla vegetazione. I trattamenti devono iniziare quando le condizioni climatiche favoriscono le infezioni o, al limite, ai primi sintomi della malattia. In funzione dell'andamento climatico, ripetere ogni 7÷14 giorni;

Concia delle sementi: 1÷4 ml. per kg. di semente di piccole dimensioni; 10÷40 ml. per kg. di semente di grandi dimensioni. Per migliorare l'uniformità del trattamento si consiglia di diluire la dose indicata in poca acqua e l'impiego di sistemi rotativi;

Concia dei bulbi: per il controllo di *Pythium ultimum* e *Phytophthora*, immergere i bulbi per 20-30 minuti in una soluzione di 30 ml. in 10 litri d'acqua. Prima della messa a dimora trattare il terreno con 10÷12 ml. per metro quadrato in 3÷5 litri d'acqua.

Informazioni particolareggiate per le seguenti colture:

Campi da golf e prati ornamentali (stabilizzati o di nuova semina)**:** azione preventiva e curativa per lo specifico controllo del *Pythium*. Le condizioni più favorevoli allo sviluppo della malattia sono la tarda primavera-estate con temperature notturne superiori a 17°C, temperature diurne intorno ai 26°C e umidità elevata. Sui tappeti erbosi di nuovo impianto il *Pythium* è la malattia fungina più frequente a causa delle elevate condizioni di umidità necessarie per la germinazione. Sui tappeti erbosi stabilizzati si effettua il trattamento nei periodi più favorevoli allo sviluppo del patogeno; dopo la germinazione sui tappeti erbosi di nuovo impianto. Distribuire uniformemente 120 ml. in 10÷20 litri d'acqua per 100 mq. Se le condizioni climatiche rimangono favorevoli allo sviluppo del fungo, si consiglia di ripetere i trattamenti ogni 10÷20 giorni. Con forti infestazioni utilizzare secondo gli intervalli temporali più brevi;

Vivai e piante forestali contro *Pythium, Phytophthora cactorum e Phytophtora cinnamoni*. Distribuire 300 ml. per metro cubo di substrato colturale diluiti in 20 litri d'acqua. Dopo l'emergenza delle piantine, intervenire ogni 15 ÷18 giorni distribuendo 4÷5 litri per metro quadrato di una soluzione allo 0,2%;

Garofano – gerbera: contro *Pythium* e *Phytophtora*. Due giorni prima dell'impianto distribuire 12÷15 ml. per metro quadro diluiti in circa 2-4 litri di acqua. 8-10 giorni dopo l'impianto e, successivamente, dopo 15-20 giorni, nebulizzare sulle foglie una soluzione ottenuta diluendo 20 ml. in 10 litri d'acqua;

Fragola: prima dell'impianto immergere le piantine per circa 20 minuti in una soluzione allo 0,3%. Dopo l'impianto distribuire 200 ml. per pianta di una soluzione allo 0,2%.

COMPATIBILITA': non compatibile con i prodotti a reazione alcalina (es. polisolfuri) e gli oli minerali.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Per i campi da golf e prati ornamentali segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate per le 24 ore successive al trattamento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile dei danni che possono derivare da un suo uso improprio.

Linfa

LINFA spa ***Cura del Verde***
Via Mattei, 6
42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Sanità N. 11123 del 17/12/01

Officine di produzione: **Althaller Italia srl** – S.Colombano al Lambro (MI); **Irca Service spa** – Fornovo San Giovanni (BG); **Scam srl** – Strada Bellaria, 164 – Modena; **Sipcam spa** – Salerano sul Lambro (LO); **STI Solfotecnica Italiana spa** – Torrenieri – Frazione di Montalcino (SI);

Volume netto: litri 0.025; 0.05; 0.1; 0.25; 0.5; 0.75; 1; 2; 5; 10; 15; 20;

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Linfa AntiCocciniglia

TRATTAMENTI INVERNALI E IN VEGETAZIONE

ATTIVO SULLE UOVA SVERNANTI E FORME ADULTE
PER PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO E GIARDINO DOMESTICO

COMPOSIZIONE: Olio minerale raffinato (residuo insolfonabile superiore al 95%) g. 81,5 (=700 g/l); Malathion puro g. 3,5 (=30 g/l); coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini; conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; non gettare i residui nelle fognature; non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO – trattasi di associazione di sostanze attive le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: • **Olio minerale:** - • **Malathion – Sintomi**: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione, sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali**: confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte:** generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione e comunque prima di soggiornarvi nuovamente; evitare l'irrorazione delle zona circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Applicare l'apposita etichetta sul recipiente contenente l'emulsione pronta all'uso.

PREMESSA: esistono in natura molti tipi di cocciniglie. Le forme adulte si caratterizzano tutte per la presenza di una protezione più o meno dura che riveste il loro corpo e formano delle colonie molto evidenti sugli steli e sulle pagine inferiori delle foglie. Le cocciniglie si nutrono della linfa provocando il veloce deperimento della pianta. Le loro uova sono protette da sacchi ovigeri o, in alcuni casi, dal corpo della madre. Nelle serre e nelle abitazioni si susseguono diverse generazioni nel corso dell'anno che rendono le infestazioni molto ravvicinate e pericolose.
CARATTERISTICHE: ***Linfa Anticocciniglia*** è un insetticida liquido emulsionabile specifico che si caratterizza per la contemporanea presenza di due componenti attivi:

- *l'olio minerale ad alta raffinazione*, particolarmente attivo contro le forme immobili. Rivestendo gli scudetti protettivi determina la morte dell'insetto per soffocamento. L'elevata raffinazione dell'olio ne consente l'impiego anche in piena vegetazione (com'è ricordato dalla sua colorazione verde brillante) oltre, naturalmente, nelle applicazioni invernali tipiche degli oli bianchi tradizionali;
- *il malathion* che, oltre ad esaltare l'efficacia dell'olio minerale, è particolarmente attivo sulle forme mobili.

La combinazione di oli minerali con insetticidi fosforganici è una pratica agronomica molto comune: ***Linfa Anticocciniglia***, contenendo già nella giusta proporzione i due principi attivi, previene i rischi delle miscelazioni al momento dell'impiego e gli errori di dosaggio.
MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO: stemperare in poca acqua le dosi sotto indicate e, sempre sotto agitazione, portare al volume richiesto. Irrorare uniformemente tutta la vegetazione, anche all'interno della chioma, con spruzzatore, pompa a spalla o altro irroratore idoneo.
Si utilizza nei seguenti dosaggi:

- **trattamenti in vegetazione:** ml. 10 ÷15 diluiti in 1 litro d'acqua;
- **trattamenti invernali**: ml. 15÷25 diluiti in 1 litro d'acqua.

Contiene dosatore

Si applica per irrorazione con spruzzatore o con pompa a spalla

Le dosi più elevate sono consigliate in presenza di forti infestazioni. Si precisa che le cocciniglie morte possono aderire alla vegetazione anche per alcune settimane.
COMPATIBILITA': non compatibile con formulati a base di zolfo (compresi i polisolfuri) i cui trattamenti devono essere distanziati di almeno 2 settimane.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non applicare quando la temperatura è inferiore a 5°C e superiore a 30°C, quando ci sia rischio di pioggia e quando sia attesa una umidità superiore al 90% nelle successive 36-48 ore. Irrorare su foglie asciutte. Non applicare quando la coltura si trova in uno stato di stress idrico: in tal caso, annaffiare prima dell'irrorazione. Durante la stagione estiva è conveniente osservare intervalli di almeno 2 settimane fra i trattamenti. Non applicare in fioritura. Dato il gran numero di specie e varietà, si consigliano saggi preliminari; in ogni caso si sconsigliano le applicazioni su acero in vegetazione (particolarmente quello rosso), felci, conifere (in particolare quelle grigio-bluastre – come Picea Pungens "Glauca") perchè potrebbero perdere irreversibilmente la loro caratteristica colorazione. Su queste colture "sensibili" si consiglia d'intervenire con ***Linfa Floralia***.
TOSSICITA': il prodotto è tossico per le api e gli insetti utili; nocivo per i pesci e gli animali domestici.
ATTENZIONE: chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un suo uso improprio. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione fondamentale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON IMPIEGARE IN AGRICOLTURA O COMUNQUE SU PIANTE DESTINATE ALLA ALIMENTAZIONE.

LINFA spa *Cura del Verde*
Via Mattei, 6 – 42043 Gattatico (RE)
Registrazione Ministero della Sanità n. 11091/PPO del 13.11.01
Officina di produzione: *Althaller Italia srl* – 20078 San Colombano (MI); *Irca Service spa* – 24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Volume netto: ml. 50 – 100

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore – Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

Linfa **AntiCocciniglia**

TRATTAMENTI INVERNALI E IN VEGETAZIONE

ATTIVO SULLE UOVA SVERNANTI E FORME ADULTE
PER PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO E GIARDINO DOMESTICO

COMPOSIZIONE: Olio minerale raffinato (residuo insolfonabile superiore al 95%) g. 81,5 (=700 g/l); Malathion puro g. 3,5 (=30 g/l); coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini; conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; non gettare i residui nelle fognature; non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO – trattasi di associazione di sostanze attive le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: • **Olio minerale: -** • **Malathion – Sintomi**: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione, sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali**: confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte**: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

NORME PRECAUZIONALI: se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione e comunque prima di soggiornarvi nuovamente; evitare l'irrorazione delle zona circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Applicare l'apposita etichetta sul recipiente contenente l'emulsione pronta all'uso.

ATTENZIONE: chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un suo uso improprio. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione fondamentale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON IMPIEGARE IN AGRICOLTURA O COMUNQUE SU PIANTE DESTINATE ALLA ALIMENTAZIONE.

LINFA spa *Cura del Verde*
Via Mattei, 6 – 42043 Gattatico (RE)
Registrazione Ministero della Sanità n. 11091/PPO del 13.11.01

Officina di produzione: *Althaller Italia srl* – 20078 San Colombano (MI); *Irca Service spa* – 24040 Fornovo San Giovanni (BG)

Volume netto: ml. 50 – 100

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore – Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

FOGLIO ILLUSTRATIVO PER CONFEZIONI FORMATO RIDOTTO

Linfa AntiCocciniglia

TRATTAMENTI INVERNALI E IN VEGETAZIONE

ATTIVO SULLE UOVA SVERNANTI E FORME ADULTE
PER PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO E GIARDINO DOMESTICO

COMPOSIZIONE: Olio minerale raffinato (residuo insolfonabile superiore al 95%) g. 81,5 (=700 g/l); Malathion puro g. 3,5 (=30 g/l); coformulanti q.b. a g. 100

PREMESSA: esistono in natura molti tipi di cocciniglie. Le forme adulte si caratterizzano tutte per la presenza di una protezione più o meno dura che riveste il loro corpo e formano delle colonie molto evidenti sugli steli e sulle pagine inferiori delle foglie. Le cocciniglie si nutrono della linfa provocando il veloce deperimento della pianta. Le loro uova sono protette da sacchi ovigeri o, in alcuni casi, dal corpo della madre. Nelle serre e nelle abitazioni si susseguono diverse generazioni nel corso dell'anno che rendono le infestazioni molto ravvicinate e pericolose.

CARATTERISTICHE: ***Linfa Anticocciniglia*** è un insetticida liquido emulsionabile specifico che si caratterizza per la contemporanea presenza di due componenti attivi:

- *l'olio minerale ad alta raffinazione*, particolarmente attivo contro le forme immobili. Rivestendo gli scudetti protettivi determina la morte dell'insetto per soffocamento. L'elevata raffinazione dell'olio ne consente l'impiego anche in piena vegetazione (com'è ricordato dalla sua colorazione verde brillante) oltre, naturalmente, nelle applicazioni invernali tipiche degli oli bianchi tradizionali;
- *il malathion* che, oltre ad esaltare l'efficacia dell'olio minerale, è particolarmente attivo sulle forme mobili.

La combinazione di oli minerali con insetticidi fosforganici è una pratica agronomica molto comune: ***Linfa Anticocciniglia***, contenendo già nella giusta proporzione i due principi attivi, previene i rischi delle miscelazioni al momento dell'impiego e gli errori di dosaggio.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO: stemperare in poca acqua le dosi sotto indicate e, sempre sotto agitazione, portare al volume richiesto. Irrorare uniformemente tutta la vegetazione, anche all'interno della chioma, con spruzzatore, pompa a spalla o altro irroratore idoneo.

Si utilizza nei seguenti dosaggi:

- **trattamenti in vegetazione:** ml. 10 ÷15 diluiti in 1 litro d'acqua;
- **trattamenti invernali**: ml. 15÷25 diluiti in 1 litro d'acqua.

Le dosi più elevate sono consigliate in presenza di forti infestazioni. Si precisa che le cocciniglie morte possono aderire alla vegetazione anche per alcune settimane.

Contiene dosatore

Si applica per irrorazione con spruzzatore o con pompa a spalla

COMPATIBILITA': non compatibile con formulati a base di zolfo (compresi i polisolfuri) i cui trattamenti devono essere distanziati di almeno 2 settimane.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non applicare quando la temperatura è inferiore a 5°C e superiore a 30°C, quando ci sia rischio di pioggia e quando sia attesa una umidità superiore al 90% nelle successive 36-48 ore. Irrorare su foglie asciutte. Non applicare quando la coltura si trova in uno stato di stress idrico: in tal caso, annaffiare prima dell'irrorazione. Durante la stagione estiva è conveniente osservare intervalli di almeno 2 settimane fra i trattamenti. Non applicare in fioritura. Dato il gran numero di specie e varietà, si consigliano saggi preliminari; in ogni caso si sconsigliano le applicazioni su acero in vegetazione (particolarmente quello rosso), felci, conifere (in particolare quelle grigio-bluastre – come Picea Pungens "Glauca") perchè potrebbero perdere irreversibilmente la loro caratteristica colorazione. Su queste colture "sensibili" si consiglia d'intervenire con ***Linfa Floralia***.

TOSSICITA': il prodotto è tossico per le api e gli insetti utili; nocivo per i pesci e gli animali domestici.

ATTENZIONE: chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un suo uso improprio. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione fondamentale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON IMPIEGARE IN AGRICOLTURA O COMUNQUE SU PIANTE DESTINATE ALLA ALIMENTAZIONE.

LINFA spa *Cura del Verde*
Via Mattei, 6 – 42043 Gattatico (RE)
Registrazione Ministero della Sanità n. 11091/PPO del 13.11.01
Officina di produzione: *Althaller Italia srl* – 20078 San Colombano (MI); *Irca Service spa* – 24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Volume netto: ml. 50 – 100

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore – Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato.

Linfa AntiLumaca

resistente alla pioggia

ESCA LUMACHICIDA PRONTA ALL'USO
PER PIANTE ORNAMENTALI

COMPOSIZIONE: Metaldeide acetica pura grammi 4,0; coformulanti attrattivi e inerti quanto basta a grammi 100.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini; conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO – Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica per l'uomo circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. **Postumi**: danni epatici e renali. **Terapia**: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: *Linfa AntiLumaca* è un'esca lumachicida pronta all'uso efficace contro chiocciole, limacce e gasteropodi in genere. Per contatto o ingestione, agisce iperstimolando la secrezione di muco con conseguente paralisi del mollusco e successiva morte per disidratazione. Resistente alla pioggia, alle fermentazioni e alle muffe, *Linfa AntiLumaca* è ideale per la protezione delle piante e dei semenzai di colture floreali e ornamentali.

Linfa AntiLumaca, per la presenza di un particolare dissuasore di sapore amaro che lo rende poco appetibile ai bambini e agli animali d'affezione, è di più sicura applicazione negli spazi domestici.

PIU' SICURO PER GLI ANIMALI DOMESTICI
CON DISSUASORE* DALL'INGERIRE
* denatonium benzoate

DOSI: 30÷50 grammi per 10 mq. Utilizzare la dose più elevata in caso di forti infestazioni o superfici irregolari.

MODALITA' D'IMPIEGO: distribuire l'esca a piccoli mucchietti o a file, preferibilmente alla sera dopo una pioggia o una buona irrigazione. Non irrigare, o irrigare solo moderatamente, per almeno 2-3 giorni dopo il trattamento. Localizzare l'esca preferibilmente in zone ombreggiate o comunque riparate dai raggi solari diretti. Verificare periodicamente (ogni 3-4 giorni) lo stato dell'esca e reintegrarla se mancante. Nelle piccole superfici o nei trattamenti localizzati, si consiglia di rimuovere manualmente le lumache morte o paralizzate: oltre ad aumentare la sicurezza per gli animali domestici, si evita la reviviscenza dei molluschi che potrebbe verificarsi in condizioni di elevata umidità, riducendo l'efficacia del trattamento.

COMPATIBILITA': non è prevista la miscela con altri antiparassitari.

EVENTUALI RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.

ATTENZIONE: chi impiega il prodotto è responsabile dei danni che possono derivare da un suo uso improprio. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione fondamentale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON IMPIEGARE IN AGRICOLTURA O COMUNQUE SU PIANTE DESTINATE ALLA ALIMENTAZIONE

LINFA spa *Cura del Verde*
Via Mattei, 6 – 42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Sanità n. 11090/PPO del 13/11/2001

Officine di produzione: ***Industrialchimica*** srl – Via Lion, 9 – 35020 Maserà (PD); ***L.I.F.A.*** srl – Via C.Colombo, 7/A – 30030 Vigonovo (VE); ***L.I.F.A.*** srl Via Piave 36033 Isola Vicentina (VI); ***Sipcam*** spa Via Vittorio Veneto, 81 26857 Salerano sul Lambro (LO).

Officine di confezionamento: ***Sinapack*** snc – Via dell'industria e dell'Artigianato, 7 – 27049 Stradella (PV); ***Scam*** srl – Strada Bellaria, 164 – 41010 S.Maria di Mugnano (MO)

Peso netto: Kg 0.1 - 0.25 - 0.5 - 0.75 – 1.0

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente – Il contenitore non può essere riutilizzato - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

Linfa AntiLumaca

ESCA LUMACHICIDA PRONTA ALL'USO
PER PIANTE ORNAMENTALI

resistente alla pioggia

COMPOSIZIONE: Metaldeide acetica pura grammi 4,0; coformulanti attrattivi e inerti quanto basta a grammi 100.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini; conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO – Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica per l'uomo circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. **Postumi**: danni epatici e renali. **Terapia**: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE: chi impiega il prodotto è responsabile dei danni che possono derivare da un suo uso improprio. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione fondamentale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON IMPIEGARE IN AGRICOLTURA O COMUNQUE SU PIANTE DESTINATE ALLA ALIMENTAZIONE

LINFA spa *Cura del Verde*
Via Mattei, 6 – 42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Sanità n. 11090/PPO del 13/11/2001

Officine di produzione: ***Industrialchimica*** srl – Via Lion, 9 – 35020 Maserà (PD); ***L.I.F.A.*** srl – Via C.Colombo, 7/A – 30030 Vigonovo (VE); ***L.I.F.A.*** srl – Via Piave – 36033 Isola Vicentina (VI); ***Sipcam*** spa – Via Vittorio Veneto, 81 – 26857 Salerano sul Lambro (LO).

Officine di confezionamento: ***Sinapack*** snc – Via dell'industria e dell'Artigianato, 7 – 27049 Stradella (PV); ***Scam*** srl – Strada Bellaria, 164 – 41010 S.Maria di Mugnano (MO)

Peso netto: Kg 0.1 - 0.25 - 0.5 - 0.75 – 1.0

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente – Il contenitore non può essere riutilizzato - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

FOGLIO ILLUSTRATIVO PER CONFEZIONI FORMATO RIDOTTO

Linfa AntiLumaca

resistente alla pioggia

ESCA LUMACHICIDA PRONTA ALL'USO
PER PIANTE ORNAMENTALI

COMPOSIZIONE: Metaldeide acetica pura grammi 4,0; coformulanti attrattivi e inerti quanto basta a grammi 100.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CARATTERISTICHE: *Linfa AntiLumaca* è un'esca lumachicida pronta all'uso efficace contro chiocciole, limacce e gasteropodi in genere. Per contatto o ingestione, agisce iperstimolando la secrezione di muco con conseguente paralisi del mollusco e successiva morte per disidratazione. Resistente alla pioggia, alle fermentazioni e alle muffe, *Linfa AntiLumaca* è ideale per la protezione delle piante e dei semenzai di colture floreali e ornamentali.
Linfa AntiLumaca, per la presenza di un particolare dissuasore di sapore amaro che lo rende poco appetibile ai bambini e agli animali d'affezione, è di più sicura applicazione negli spazi domestici.

PIU' SICURO PER GLI ANIMALI DOMESTICI
CON DISSUASORE* DALL'INGERIRE
* denatonium benzoato

DOSI: 30÷50 grammi per 10 mq. Utilizzare la dose più elevata in caso di forti infestazioni o superfici irregolari.

MODALITA' D'IMPIEGO: distribuire l'esca a piccoli mucchietti o a file, preferibilmente alla sera dopo una pioggia o una buona irrigazione. Non irrigare, o irrigare solo moderatamente, per almeno 2-3 giorni dopo il trattamento. Localizzare l'esca preferibilmente in zone ombreggiate o comunque riparate dai raggi solari diretti. Verificare periodicamente (ogni 3-4 giorni) lo stato dell'esca e reintegrarla se mancante. Nelle piccole superfici o nei trattamenti localizzati, si consiglia di rimuovere manualmente le lumache morte o paralizzate: oltre ad aumentare la sicurezza per gli animali domestici, si evita la reviviscenza dei molluschi che potrebbe verificarsi in condizioni di elevata umidità, riducendo l'efficacia del trattamento.

COMPATIBILITA': non è prevista la miscela con altri antiparassitari.

EVENTUALI RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.

ATTENZIONE: chi impiega il prodotto è responsabile dei danni che possono derivare da un suo uso improprio. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione fondamentale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON IMPIEGARE IN AGRICOLTURA O COMUNQUE SU PIANTE DESTINATE ALLA ALIMENTAZIONE

LINFA spa *Cura del Verde*
Via Mattei, 6 – 42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Sanità n. 11090/PPO del 13/11/2001

Officine di produzione: ***Industrialchimica*** srl – Via Lion, 9 – 35020 Maserà (PD); ***L.I.F.A.*** srl – Via C.Colombo, 7/A – 30030 Vigonovo (VE); ***L.I.F.A.*** srl – Via Piave – 36033 Isola Vicentina (VI); ***Sipcam*** spa – Via Vittorio Veneto, 81 – 26857 Salerano sul Lambro (LO).

Officine di confezionamento: ***Sinapack*** snc – Via dell'industria e dell'Artigianato, 7 – 27049 Stradella (PV); ***Scam*** srl – Strada Bellaria, 164 – 41010 S.Maria di Mugnano (MO)

Peso netto: Kg 0.1 - 0.25 - 0.5 - 0.75 – 1.0

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente – Il contenitore non può essere riutilizzato - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

Linfa Floralia®

AD AZIONE CITOTROPICA

INSETTICIDA AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE

PER PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO E GIARDINO DOMESTICO

COMPOSIZIONE: Dimetoato puro grammi 7,5 (= 74 g/l); coformulanti quanto basta a grammi 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini; conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI: se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione e comunque prima di soggiornarvi nuovamente; evitare l'irrorazione delle zona circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione; applicare l'apposita etichetta sul recipiente contenente l'emulsione pronta all'uso.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - **Sintomi**: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali**: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE: *Linfa Floralia* è un insetticida liquido emulsionabile efficace contro gli insetti più dannosi delle piante ornamentali dell'appartamento, del terrazzo e del giardino. In particolare è attivo, per contatto e ingestione, contro *Tisanotteri* (tripidi), *Rincoti* (afidi, mosca bianca, cocciniglie, cicaline, cimici), *Lepidotteri* (bega del garofano, minatori fogliari), *Coleotteri*, *Imenotteri* (tentredini), *Acari* (ragnetto rosso, ragnetto giallo, ragnetto verde ed Eriofidi). *Linfa Floralia* penetra velocemente nei tessuti vegetali (azione citotropica) e pertanto sfugge al dilavamento delle piogge anche dopo poche ore dal trattamento. Importante è la caratteristica di essere parzialmente traslocato per via sistemica perché consente di combattere anche gli insetti non direttamente colpiti con le irrorazioni in quanto protetti entro follicoli (es. cocciniglie) oppure riparati dai tessuti vegetali (es. afidi, minatori fogliari, ecc.).
DOSE: 5-7 ml. per litro d'acqua. Utilizzare la dose più elevata in caso di forte infestazione.
MODALITA' D'IMPIEGO: stemperare la dose indicata in poca acqua e, sempre sotto agitazione, portare al volume richiesto. Si applica con spruzzatore, pompa a spalla o altro irroratore idoneo. Intervenire subito al primo apparire dell'infestazione, irrorando uniformemente la vegetazione. In ambiente esterno le applicazioni devono essere effettuate in giornate poco ventose, all'ombra o nelle ore più fresche. Se necessario, ripetere il trattamento dopo 15-20 giorni.
COMPATIBILITA': non compatibile con formulati a base di zolfo (compresi i polisolfuri) o a reazione alcalina.

Contiene dosatore

Si applica per irrorazione con spruzzatore o con pompa a spalla

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': dato il gran numero di specie e varietà di piante, si consigliano saggi preliminari; se ne sconsiglia comunque l'impiego sul crisantemo.
ATTENZIONE: chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare dal suo uso improprio. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione fondamentale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON IMPIEGARE IN AGRICOLTURA O COMUNQUE SU PIANTE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE.

LINFA spa Cura del Verde
Via Mattei, 6 – 42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10876/PPO del 11.04.01

Officine di produzione: *Althaller Italia srl* – 20078 San Colombano (MI) – *Irca Service spa* – 24040 Fornovo San Giovanni (BG)

Volume netto: ml. 50 – 100

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

Linfa Floralia® AD AZIONE CITOTROPICA

INSETTICIDA AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE

PER PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO E GIARDINO DOMESTICO

COMPOSIZIONE: Dimetoato puro grammi 7,5 (= 74 g/l); coformulanti quanto basta a grammi 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini; conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione e comunque prima di soggiornarvi nuovamente; evitare l'irrorazione delle zona circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione; applicare l'apposita etichetta sul recipiente contenente l'emulsione pronta all'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - **Sintomi**: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali**: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

FITOTOSSICITA': dato il gran numero di specie e varietà di piante, si consigliano saggi preliminari; se ne sconsiglia comunque l'impiego sul crisantemo.

ATTENZIONE: chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare dal suo uso improprio. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione fondamentale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON IMPIEGARE IN AGRICOLTURA O COMUNQUE SU PIANTE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE.

LINFA spa Cura del Verde
Via Mattei, 6 – 42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10876/PPO del 11.04.01

Officine di produzione: Althaller Italia srl – 20078 San Colombano (MI) – Irca Service spa – 24040 Fornovo San Giovanni (BG)

Volume netto: ml. 50 – 100

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

FOGLIO ILLUSTRATIVO PER CONFEZIONI FORMATO RIDOTTO

Linfa Floralia®

AD AZIONE CITOTROPICA

INSETTICIDA AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE

PER PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO E GIARDINO DOMESTICO

COMPOSIZIONE: Dimetoato puro grammi 7,5 (= 74 g/l); coformulanti quanto basta a grammi 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CARATTERISTICHE: *Linfa Floralia* è un insetticida liquido emulsionabile efficace contro gli insetti più dannosi delle piante ornamentali dell'appartamento, del terrazzo e del giardino. In particolare è attivo, per contatto e ingestione, contro *Tisanotteri* (tripidi), *Rincoti* (afidi, mosca bianca, coccinigllie, cicaline, cimici), *Lepidotteri* (bega del garofano, minatori fogliari), *Coleotteri*, *Imenotteri* (tentredini), *Acari* (ragnetto rosso, ragnetto giallo, ragnetto verde ed Eriofidi). *Linfa Floralia* penetra velocemente nei tessuti vegetali (azione citotropica) e pertanto sfugge al dilavamento delle piogge anche dopo poche ore dal trattamento. Importante è la caratteristica di essere parzialmente traslocato per via sistemica perché consente di combattere anche gli insetti non direttamente colpiti con le irrorazioni in quanto protetti entro follicoli (es. coccinigIie) oppure riparati dai tessuti vegetali (es. afidi, minatori fogliari, ecc.).

DOSE: 5-7 ml. per litro d'acqua. Utilizzare la dose più elevata in caso di forte infestazione.

MODALITA' D'IMPIEGO: stemperare la dose indicata in poca acqua e, sempre sotto agitazione, portare al volume richiesto. Si applica con spruzzatore, pompa a spalla o altro irroratore idoneo. Intervenire subito al primo apparire dell'infestazione, irrorando uniformemente la vegetazione. In ambiente esterno le applicazioni devono essere effettuate in giornate poco ventose, all'ombra o nelle ore più fresche. Se necessario, ripetere il trattamento dopo 15-20 giorni.

Contiene dosatore

Si applica per irrorazione con spruzzatore o con pompa a spalla

COMPATIBILITA': non compatibile con formulati a base di zolfo (compresi i polisolfuri) o a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': dato il gran numero di specie e varietà di piante, si consigliano saggi preliminari; se ne sconsiglia comunque l'impiego sul crisantemo.

ATTENZIONE: chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare dal suo uso improprio. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione fondamentale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON IMPIEGARE IN AGRICOLTURA O COMUNQUE SU PIANTE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE.

LINFA spa Cura del Verde
Via Mattei, 6 – 42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10876/PPO del 11.04.01

Officine di produzione: *Althaller Italia srl* – 20078 San Colombano (MI) – *Irca Service spa* – 24040 Fornovo San Giovanni (BG)

Volume netto: ml. 50 – 100

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Necolim®

ESCA LUMACHICIDA PRONTA ALL'USO

CONTRO CHIOCCIOLE E LIMACCE

resistente alla pioggia

COMPOSIZIONE: Metaldeide acetica pura gr. 5; coformulanti attrattivi e inerti q.b. a gr. 100.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini; conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO – Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica per l'uomo circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. **Postumi**: danni epatici e renali. **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE: *Necolim* è un'esca lumachicida pronta all'uso efficace contro chiocciole, limacce e gasteropodi in genere. Agisce per contatto e ingestione; ipertstimolando la secrezione del muco provoca la paralisi del mollusco e la sua morte per disidratazione. Resistente alla pioggia, alle fermentazioni e alle muffe, *Necolim* è ideale per la protezione dei semenzai, colture orticole, floreali e ornamentali, sia in serra che in pieno campo. Per la presenza di un particolare dissuasore di sapore amaro, *Necolim* è poco appetibile ai bambini e agli animali d'affezione, rendendo più sicura la sua applicazione anche negli spazi domestici.

PIU' SICURO PER GLI ANIMALI DOMESTICI

CON DISSUASORE* DALL'INGERIRE

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: in ragione di 250-400 grammi per 100 mq. (25-40 grammi per 10 mq.), distribuire l'esca a piccoli mucchietti o a file, preferibilmente alla sera dopo una pioggia o una buona irrigazione; non irrigare, o irrigare solo moderatamente, per almeno 2-3 giorni dopo il trattamento; localizzare l'esca preferibilmente in una zona ombreggiata o comunque riparata dai raggi solari diretti. Verificare periodicamente lo stato dell'esca e reintegrarla se mancante. Nelle piccole superfici o nei trattamenti localizzati si consiglia di rimuovere manualmente le lumache morte o paralizzate: oltre ad una maggiore sicurezza per gli animali domestici, si evita che condizioni climatiche favorevoli possano riabilitare i molluschi vanificando parzialmente l'efficacia del trattamento.

COMPATIBILITA': non è prevista la miscela con altri antiparassitari.

EVENTUALI RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile dei danni che possono derivare da un suo uso improprio. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione fondamentale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Linfa

LINFA spa ***Cura del Verde***
Via Mattei, 6
42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Salute N. 10970 del 12/07/01

Officine di produzione: ***Industrialchimica*** srl – Via Lion, 9 – 35020 Maserà (PD); ***Frunol Delicia*** GmbH – Dubener Straβe, 145 – D 04509 Delitzsch; ***Sipcam*** spa – Via Vittorio Veneto, 81 – 20090 Salerano sul Lambro (LO);

Officine di confezionamento: ***Sinapack*** snc – Via dell'industria e dell'Artigianato, 7 – 27049 Stradella (PV); ***Scam*** srl – Strada Bellaria, 164 – 41010 S.Maria di Mugnano (MO)

Peso netto: Kg 0.1 - 0.25 - 0.5 - 0.75 - 1 - 2 - 5 – 10 – 15 - 20 – 25

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

Necolim®

resistente alla pioggia

ESCA LUMACHICIDA PRONTA ALL'USO

CONTRO CHIOCCIOLE E LIMACCE

COMPOSIZIONE: Metaldeide acetica pura gr. 5; coformulanti attrattivi e inerti q.b. a gr. 100.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini; conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO – Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica per l'uomo circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. **Postumi**: danni epatici e renali. **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile dei danni che possono derivare da un suo uso improprio. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione fondamentale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Linfa

LINFA spa ***Cura del Verde***
Via Mattei, 6
42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Salute n. 10970 del 12/07/01

Officine di produzione: ***Industrialchimica*** srl – Via Lion, 9 – 35020 Maserà (PD); ***Frunol Delicia*** GmbH – Dubener Straβe, 145 – D 04509 Delitzsch; ***Sipcam*** spa – Via Vittorio Veneto, 81 – 20090 Salerano sul Lambro (LO);

Officine di confezionamento: ***Sinapack*** snc – Via dell'industria e dell'Artigianato, 7 – 27049 Stradella (PV); ***Scam*** srl – Strada Bellaria, 164 – 41010 S.Maria di Mugnano (MO)

Peso netto: Kg 0.1 - 0.25 - 0.5 - 0.75 - 1 - 2 - 5 – 10 – 15 - 20 – 25

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

FOGLIO ILLUSTRATIVO PER CONFEZIONI FORMATO RIDOTTO

Necolim®

ESCA LUMACHICIDA PRONTA ALL'USO

resistente alla pioggia

CONTRO CHIOCCIOLE E LIMACCE

COMPOSIZIONE: Metaldeide acetica pura gr. 5; coformulanti attrattivi e inerti q.b. a gr. 100.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CARATTERISTICHE: *Necolim* è un'esca lumachicida pronta all'uso efficace contro chiocciole, limacce e gasteropodi in genere. Agisce per contatto e ingestione; ipertstimolando la secrezione del muco provoca la paralisi del mollusco e la sua morte per disidratazione. Resistente alla pioggia, alle fermentazioni e alle muffe, *Necolim* è ideale per la protezione dei semenzai, colture orticole, floreali e ornamentali, sia in serra che in pieno campo.

Per la presenza di un particolare dissuasore di sapore amaro, *Necolim* è poco appetibile ai bambini e agli animali d'affezione, rendendo più sicura la sua applicazione anche negli spazi domestici.

PIU' SICURO PER GLI ANIMALI DOMESTICI
CON DISSUASORE*
DALL'INGERIRE

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: in ragione di 250-400 grammi per 100 mq. (25-40 grammi per 10 mq.), distribuire l'esca a piccoli mucchietti o a file, preferibilmente alla sera dopo una pioggia o una buona irrigazione; non irrigare, o irrigare solo moderatamente, per almeno 2-3 giorni dopo il trattamento; localizzare l'esca preferibilmente in una zona ombreggiata o comunque riparata dai raggi solari diretti. Verificare periodicamente lo stato dell'esca e reintegrarla se mancante. Nelle piccole superfici o nei trattamenti localizzati si consiglia di rimuovere manualmente le lumache morte o paralizzate: oltre ad una maggiore sicurezza per gli animali domestici, si evita che condizioni climatiche favorevoli possano riabilitare i molluschi vanificando parzialmente l'efficacia del trattamento.

COMPATIBILITA': non è prevista la miscela con altri antiparassitari.

EVENTUALI RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile dei danni che possono derivare da un suo uso improprio. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione fondamentale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Linfa

LINFA spa *Cura del Verde*
Via Mattei, 6
42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Salute N. 10970 del 12/07/01

Officine di produzione: ***Industrialchimica*** srl – Via Lion, 9 – 35020 Maserà (PD); ***Frunol Delicia*** GmbH – Dubener Straβe, 145 – D 04509 Delitzsch; ***Sipcam*** spa – Via Vittorio Veneto, 81 – 20090 Salerano sul Lambro (LO);

Officine di confezionamento: ***Sinapack*** snc – Via dell'industria e dell'Artigianato, 7 – 27049 Stradella (PV); ***Scam*** srl – Strada Bellaria, 164 – 41010 S.Maria di Mugnano (MO)

Peso netto: Kg 0.1 - 0.25 - 0.5 - 0.75 - 1 - 2 - 5 – 10 – 15 - 20 – 25

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

OLOVER®

ANCHE IN PIENA VEGETAZIONE

OLIO INSETTICIDA VERDE

AD ELEVATA RAFFINAZIONE

COMPOSIZIONE - olio minerale raffinato (residuo insolfonabile superiore al 95%) g. 95 (= 810 g/l); coformulanti q.b. a grammi 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini; conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO – in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se ingerito non indurre vomito, chiamare immediatamente il medico. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE - OLOVER è un olio insetticida liquido emulsionabile che agisce per contatto contro le uova e le forme adulte; ricoprendo il corpo dell'insetto con una leggera pellicola oleosa, occlude i condotti tracheali causandone la morte per asfissia. OLOVER agisce anche come repellente contro alcuni insetti masticatori. Per il suo alto grado di raffinazione (elevato residuo insolfonabile e ristretto intervallo di distillazione) e la conseguente ridotta fitotossicità. *OLOVER può essere impiegato anche in piena vegetazione oltre, naturalmente, nelle applicazioni invernali tipiche degli olii bianchi tradizionali.* L'elevata stabilità dell'emulsione garantisce l'uniforme distribuzione scongiurando il rischio di accumuli localizzati.

MODALITA' D'IMPIEGO - versare nel serbatoio dell'irroratore ¾ dell'acqua richiesta e diluire, sotto agitazione, le dosi di seguito indicate; portare a volume sempre sotto agitazione. Irrorare uniformemente con spruzzatore, pompa a spalla o con altro irroratore idoneo.

CAMPI D'IMPIEGO – ne è autorizzato l'impiego su **ortaggi** (carciofo, sedano, finocchio, cucurbitacee, pomodoro, peperone, fagiolo), **patata, agrumi, pomacee** (melo, pero, cotogno), **drupacee** (pesco – compresi nettarine e percoche – albicocco, ciliegio, susino), **mandorlo, caco, fico, ribes, noce, nocciolo, vite, olivo, colture ornamentali, floreali e forestali** contro i seguenti parassiti: *cocciniglie, minatori fogliari, afidi, acari, coleotteri, lepidotteri, aleurodidi, tripidi, tignole, psille, eriofidi, ditteri e ditteri minatori, tingidi, cotonello, mosca bianca, cimice verde, iceria, cicaline, metcalfa, uova (di afidi, acari, lepidotteri, dorifora e coleotteri in genere).*

DOSI D'IMPIEGO (riferite a 10 litri d'acqua) - ***Trattamenti in vegetazione***: 100-200 grammi; ***Trattamenti invernali***: 200-300 grammi.

COMPATIBILITA': OLOVER non è compatibile con formulati a base di zolfo (compresi i polisolfuri) i cui trattamenti devono essere distanziati di almeno 2 settimane.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo e, inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non applicare quando la temperatura è inferiore a 5°C e superiore a 30°C, quando ci sia rischio di pioggia e quando è attesa una umidità superiore al 90% nelle successive 36-48 ore. Irrorare su foglie asciutte. Non applicare quando la coltura si trova in uno stato di stress idrico: annaffiare prima dell'irrorazione. Durante la stagione estiva è conveniente distanziare i trattamenti ad intervalli di almeno 2 settimane. Non applicare in fioritura. Per le piante ornamentali, floreali e forestali, dato il gran numero di specie e varietà, si consigliano saggi preliminari; in ogni caso si sconsigliano le applicazioni su acero (particolarmente quello rosso), felci, conifere (in particolare quelle grigio-bluastre – es. Picea Pungens "Glauca") perchè potrebbero perdere irreversibilmente la loro caratteristica colorazione. In piena vegetazione si sconsiglia l'impiego sulla varietà di pero Anjou e di melo Newtown.

TOSSICITA': il prodotto è tossico per le api e gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione fondamentale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Linfa

LINFA spa *Cura del Verde*
Via Mattei, 6
42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Sanità N. 10471 del 19/04/00

Officina di produzione: **Althaller Italia** srl - S.Colombano al Lambro (MI); **Irca Service** spa – Fornovo San Giovanni (BG); **Scam** srl – Strada Bellaria, 164 – 41010 S.Maria di Mugnano (MO); **Sipcam** spa – Via Vittorio Veneto, 81 – 20090 Salerano sul Lambro (LO) – **STI Solfotecnica Italiana** spa – Via Pian d'Asso – 53028 Torrenieri (fraz. di Montalcino – SI)

Volume netto: litri 0.05 - 0.1 - 0.25 - 0.5 – 0.75 - 1 - 2 – 3 - 5 - 10 - 15 – 20 – 25

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

OLOVER®

ANCHE IN PIENA VEGETAZIONE

OLIO INSETTICIDA VERDE

AD ELEVATA RAFFINAZIONE

COMPOSIZIONE - olio minerale raffinato (residuo insolfonabile superiore al 95%) g. 95 (= 810 g/l); coformulanti q.b. a grammi 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini; conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO – in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se ingerito non indurre vomito, chiamare immediatamente il medico. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione fondamentale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Linfa

LINFA spa ***Cura del Verde***
Via Mattei, 6
42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Sanità N. 10471 del 19/04/00

Officina di produzione: **Althaller Italia** srl - S.Colombano al Lambro (MI); **Irca Service** spa – Fornovo San Giovanni (BG); **Scam** srl – Strada Bellaria, 164 – 41010 S.Maria di Mugnano (MO); **Sipcam** spa – Via Vittorio Veneto, 81 – 20090 Salerano sul Lambro (LO) – **STI Solfotecnica Italiana** spa – Via Pian d'Asso – 53028 Torrenieri (fraz. di Montalcino – SI)

Volume netto: litri 0.05 - 0.1 - 0.25 - 0.5 – 0.75 - 1 - 2 – 3 - 5 - 10 - 15 – 20 – 25

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

FOGLIO ILLUSTRATIVO PER CONFEZIONI FORMATO RIDOTTO

OLOVER®

ANCHE IN PIENA VEGETAZIONE

OLIO INSETTICIDA VERDE

AD ELEVATA RAFFINAZIONE

COMPOSIZIONE - olio minerale raffinato (residuo insolfonabile superiore al 95%) g. 95 (= 810 g/l); coformulanti q.b. a grammi 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CARATTERISTICHE - OLOVER è un olio insetticida liquido emulsionabile che agisce per contatto contro le uova e le forme adulte; ricoprendo il corpo dell'insetto con una leggera pellicola oleosa, occlude i condotti tracheali causandone la morte per asfissia. OLOVER agisce anche come repellente contro alcuni insetti masticatori. Per il suo alto grado di raffinazione (elevato residuo insolfonabile e ristretto intervallo di distillazione) e la conseguente ridotta fitotossicità, *OLOVER può essere impiegato anche in piena vegetazione oltre, naturalmente, nelle applicazioni invernali tipiche degli olii bianchi tradizionali.* L'elevata stabilità dell'emulsione garantisce l'uniforme distribuzione scongiurando il rischio di accumuli localizzati.

MODALITA' D'IMPIEGO - versare nel serbatoio dell'irroratore ¾ dell'acqua richiesta e diluire, sotto agitazione, le dosi di seguito indicate; portare a volume sempre sotto agitazione. Irrorare uniformemente con spruzzatore, pompa a spalla o con altro irroratore idoneo.

CAMPI D'IMPIEGO – ne è autorizzato l'impiego su **ortaggi** (carciofo, sedano, finocchio, cucurbitacee, pomodoro, peperone, fagiolo), **patata, agrumi, pomacee** (melo, pero, cotogno), **drupacee** (pesco – compresi nettarine e percoche – albicocco, ciliegio, susino), **mandorlo, caco, fico, ribes, noce, nocciolo, vite, olivo, colture ornamentali, floreali e forestali** contro i seguenti parassiti: *cocciniglie, minatori fogliari, afidi, acari, coleotteri, lepidotteri, aleurodidi, tripidi, tignole, psille, eriofidi, ditteri e ditteri minatori, tingidi, cotonello, mosca bianca, cimice verde, iceria, cicaline, metcalfa, uova (di afidi, acari, lepidotteri, dorifora e coleotteri in genere).*

DOSI D'IMPIEGO (riferite a 10 litri d'acqua) - ***Trattamenti in vegetazione***: 100-200 grammi; ***Trattamenti invernali***: 200-300 grammi.

COMPATIBILITA': OLOVER non è compatibile con formulati a base di zolfo (compresi i polisolfuri) i cui trattamenti devono essere distanziati di almeno 2 settimane.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo e, inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non applicare quando la temperatura è inferiore a 5°C e superiore a 30°C, quando ci sia rischio di pioggia e quando è attesa una umidità superiore al 90% nelle successive 36-48 ore. Irrorare su foglie asciutte. Non applicare quando la coltura si trova in uno stato di stress idrico: annaffiare prima dell'irrorazione. Durante la stagione estiva è conveniente distanziare i trattamenti ad intervalli di almeno 2 settimane. Non applicare in fioritura. Per le piante ornamentali, floreali e forestali, dato il gran numero di specie e varietà, si consigliano saggi preliminari; in ogni caso si sconsigliano le applicazioni su acero (particolarmente quello rosso), felci, conifere (in particolare quelle grigio-bluastre – es. Picea Pungens "Glauca") perchè potrebbero perdere irreversibilmente la loro caratteristica colorazione. In piena vegetazione si sconsiglia l'impiego sulla varietà di pero Anjou e di melo Newtown.

TOSSICITA': il prodotto è tossico per le api e gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione fondamentale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Linfa

LINFA spa *Cura del Verde*
Via Mattei, 6
42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Sanità N. 10471 del 19/04/00

Officina di produzione: **Althaller Italia** srl - S.Colombano al Lambro (MI); **Irca Service** spa – Fornovo San Giovanni (BG); **Scam** srl – Strada Bellaria, 164 – 41010 S.Maria di Mugnano (MO); **Sipcam** spa – Via Vittorio Veneto, 81 – 20090 Salerano sul Lambro (LO) – **STI Solfotecnica Italiana** spa – Via Pian d'Asso – 53028 Torrenieri (fraz. di Montalcino – SI)

Volume netto: litri 0.05 - 0.1 - 0.25 - 0.5 – 0.75 - 1 - 2 – 3 - 5 - 10 - 15 – 20 – 25

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

OLOVER® plus

OLIO INSETTICIDA AD ELEVATA RAFFINAZIONE

ATTIVATO CON MALATHION

TRATTAMENTI INVERNALI E IN VEGETAZIONE

CONTRO GLI ADULTI E LE FORME SVERNANTI

COMPOSIZIONE: Olio minerale raffinato (residuo insolfonabile superiore al 95%) g. 81,5 (=700 g/l); Malathion puro g. 3,5 (=30 g/l); coformulanti q.b. a g. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini; conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; non gettare i residui nelle fognature; non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO – trattasi di associazione di sostanze attive le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: * **Olio minerale: -** * **Malathion – Sintomi**: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione, sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali**: confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte**: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE: ***Olover Plus*** è un insetticida liquido emulsionabile ad ampio spettro d'azione costituito da olio minerale ad alta raffinazione attivato con Malathion. L'elevata raffinazione dell'olio minerale ne consente l'impiego anche in piena vegetazione (volutamente ricordato dalla sua colorazione verde brillante) oltre, naturalmente, nelle applicazioni invernali tipiche degli oli bianchi tradizionali. L'attivazione con Malathion, oltre ad esaltare l'azione per contatto tipica dell'olio minerale (*ovicida*), conferisce al prodotto un'elevata azione per ingestione (*adulticida*). La combinazione di oli minerali con insetticidi fosforganici è una comune pratica agronomica. ***Olover Plus*** evita i rischi di problematiche miscelazioni al momento dell'impiego, evitando ogni possibilità di errore.

CAMPI D'IMPIEGO: ne è autorizzato l'impiego su **ortaggi** (carciofo, sedano, finocchio, cucurbitacee, pomodoro, peperone, fagiolo), **patata**, **agrumi**, **pomacee** (melo, pero, cotogno), **drupacee** (pesco, compresi nettarine e percoche, albicocco, ciliegio, susino), **mandorlo**, **olivo, vite, noce, barbabietola da zucchero, mais, piante ornamentali, floreali e forestali**, contro i seguenti parassiti: *cocciniglie, minatori fogliari, afidi, acari, coleotteri, lepidotteri, aleurodidi, tripidi, tignole, psille, eriofidi, ditteri e ditteri minatori, tingidi, cotonello, mosca bianca, cimice verde, iceria, cicaline, metcalfa, cleono, lisso, altica, pegonia betae, casside, atomaria, piralide, nottue, uova (di afidi, acari, lepidotteri, dorifora e coleotteri in genere).*

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO: versare nel serbatoio dell'irroratore ¾ dell'acqua richiesta e diluire, sotto agitazione, le dosi di seguito indicate; sempre sotto agitazione portare a volume. Irrorare uniformemente con spruzzatore, pompa a spalla o con altro irroratore idoneo.
Olover Plus si utilizza ai seguenti dosaggi:

- **Trattamenti in vegetazione**: ml. 80 ÷160 diluiti in 10 litri d'acqua (lt. 0,8 ÷ 1,6 diluiti in 100 litri d'acqua);
- **Trattamenti invernali**: ml. 160÷240 diluiti in 10 litri d'acqua (lt. 1,6 ÷ 2,4 diluiti in 100 litri d'acqua);

COMPATIBILITA': *Olover Plus* non è compatibile con formulati a base di zolfo (compresi i polisolfuri) i cui trattamenti devono essere distanziati di almeno 2 settimane.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo e, inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non applicare quando la temperatura è inferiore a 5°C e superiore a 30°C, quando ci sia rischio di pioggia e quandoè attesa una umidità superiore al 90% nelle successive 36-48 ore. Irrorare su foglie asciutte. Non applicare quando la coltura si trova in stato di stress idrico: annaffiare prima dell'irrorazione. Durante la stagione estiva è conveniente distanziare i trattamenti ad intervalli di almeno 2 settimane. Non applicare in fioritura. Per le piante ornamentali, floreali e forestali, dato il gran numero di specie e varietà, si consigliano saggi preliminari; in ogni caso si sconsigliano le applicazioni su acero (particolarmente quello rosso), felci, conifere (in particolare quelle grigio-bluastre – es. Picea Pungens "Glauca") perchè potrebbero perdere irreversibilmente la loro caratteristica colorazione. In piena vegetazione si sconsiglia l'impiego sulla varietà di pero Anjou e di melo Newtown.

TOSSICITA': il prodotto è tossico per le api e gli insetti utili. Nocivo per gli animali domestici e i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un suo uso improprio. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione fondamentale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Linfa

LINFA spa ***Cura del Verde***
Via Mattei, 6 - 42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Sanità n.10704 del 15.02.01

Officina di produzione: **Althaller Italia** srl - S.Colombano al Lambro (MI); **Irca Service** spa – Fornovo San Giovanni (BG); **Scam** srl – Strada Bellaria, 164 – 41010 S.Maria di Mugnano (MO); **Sipcam** spa – Via Vittorio Veneto, 81 – 20090 Salerano sul Lambro (LO) – **STI Solfotecnica Itallana** spa – Via Pian d'Asso – 53028 Torrenieri (frazione di Montalcino – SI)

Volume netto: litri 0.05 - 0.1 - 0.25 - 0.5 – 0.75 - 1 - 2 – 3 - 5 - 10 - 15 – 20 – 25

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore – Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

OLOVER® plus

INSETTICIDA AD ELEVATA RAFFINAZIONE

ATTIVATO CON MALATHION

CONTRO GLI ADULTI E LE FORME SVERNANTI

COMPOSIZIONE: Olio minerale raffinato (residuo insolfonabile superiore al 95%) g. 81,5 (=700 g/l); Malathion puro g. 3,5 (=30 g/l); coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini; conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; non gettare i residui nelle fognature; non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO – trattasi di associazione di sostanze attive le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: • **Olio minerale: -** • **Malathion** – **Sintomi**: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione, sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali**: confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte**: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un suo uso improprio. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione fondamentale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Linfa

LINFA spa ***Cura del Verde***
Via Mattei, 6 - 42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Sanità n.10704 del 15.02.01

Officina di produzione: **Althaller Italia** srl - S.Colombano al Lambro (MI); **Irca Service** spa – Fornovo San Giovanni (BG); **Scam** srl – Strada Bellaria, 164 – 41010 S.Maria di Mugnano (MO); **Sipcam** spa – Via Vittorio Veneto, 81 – 20090 Salerano sul Lambro (LO) – **STI Solfotecnica Italiana** spa – Via Pian d'Asso – 53028 Torrenieri (frazione di Montalcino – SI)

Volume netto: litri 0.05 - 0.1 - 0.25 - 0.5 – 0.75 - 1 - 2 – 3 - 5 - 10 - 15 – 20 – 25

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore – Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

FOGLIO ILLUSTRATIVO PER CONFEZIONI FORMATO RIDOTTO

OLOVER®plus

TRATTAMENTI INVERNALI E IN VEGETAZIONE

INSETTICIDA AD ELEVATA RAFFINAZIONE

ATTIVATO CON MALATHION

CONTRO GLI ADULTI E LE FORME SVERNANTI

COMPOSIZIONE: Olio minerale raffinato (residuo insolfonabile superiore al 95%) g. 81,5 (=700 g/l); Malathion puro g. 3,5 (=30 g/l); coformulanti q.b. a g. 100

CARATTERISTICHE: ***Olover Plus*** è un insetticida liquido emulsionabile ad ampio spettro d'azione costituito da olio minerale ad alta raffinazione attivato con Malathion. L'elevata raffinazione dell'olio minerale ne consente l'impiego anche in piena vegetazione (volutamente ricordato dalla sua colorazione verde brillante) oltre, naturalmente, nelle applicazioni invernali tipiche degli oli bianchi tradizionali. L'attivazione con Malathion, oltre ad esaltare l'azione per contatto tipica dell'olio minerale (*ovicida*), conferisce al prodotto un'elevata azione per ingestione (*adulticida*). La combinazione di oli minerali con insetticidi fosforganici è una comune pratica agronomica. ***Olover Plus*** evita i rischi di problematiche miscelazioni al momento dell'impiego, evitando ogni possibilità di errore.

CAMPI D'IMPIEGO: ne è autorizzato l'impiego su **ortaggi** (carciofo, sedano, finocchio, cucurbitacee, pomodoro, peperone, fagiolo), **patata**, **agrumi**, **pomacee** (melo, pero, cotogno), **drupacee** (pesco, compresi nettarine e percoche, albicocco, ciliegio, susino), **mandorlo**, **olivo, vite, noce, barbabietola da zucchero, mais, piante ornamentali, floreali e forestali**, contro i seguenti parassiti: *cocciniglie, minatori fogliari, afidi, acari, coleotteri, lepidotteri, aleurodidi, tripidi, tignole, psille, eriofidi, ditteri e ditteri minatori, tingidi, cotonello, mosca bianca, cimice verde, iceria, cicaline, metcalfa, cleono, lisso, altica, pegonia betae, casside, atomaria, piralide, nottue, uova (di afidi, acari, lepidotteri, dorifora e coleotteri in genere).*

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO: versare nel serbatoio dell'irroratore ¾ dell'acqua richiesta e diluire, sotto agitazione, le dosi di seguito indicate; sempre sotto agitazione portare a volume. Irrorare uniformemente con spruzzatore, pompa a spalla o con altro irroratore idoneo. *Olover Plus* si utilizza ai seguenti dosaggi:

- **Trattamenti in vegetazione**: ml. 80 ÷160 diluiti in 10 litri d'acqua (lt. 0,8 ÷ 1,6 diluiti in 100 litri d'acqua);
- **Trattamenti invernali**: ml. 160÷240 diluiti in 10 litri d'acqua (lt. 1,6 ÷ 2,4 diluiti in 100 litri d'acqua);

COMPATIBILITA': *Olover Plus* non è compatibile con formulati a base di zolfo (compresi i polisolfuri) i cui trattamenti devono essere distanziati di almeno 2 settimane.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo e, inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non applicare quando la temperatura è inferiore a 5°C e superiore a 30°C, quando ci sia rischio di pioggia e quandoè attesa una umidità superiore al 90% nelle successive 36-48 ore. Irrorare su foglie asciutte. Non applicare quando la coltura si trova in stato di stress idrico: annaffiare prima dell'irrorazione. Durante la stagione estiva è conveniente distanziare i trattamenti ad intervalli di almeno 2 settimane. Non applicare in fioritura. Per le piante ornamentali, floreali e forestali, dato il gran numero di specie e varietà, si consigliano saggi preliminari; in ogni caso si sconsigliano le applicazioni su acero (particolarmente quello rosso), felci, conifere (in particolare quelle grigio-bluastre – es. Picea Pungens "Glauca") perchè potrebbero perdere irreversibilmente la loro caratteristica colorazione. In piena vegetazione si sconsiglia l'impiego sulla varietà di pero Anjou e di melo Newtown.

TOSSICITA': il prodotto è tossico per le api e gli insetti utili. Nocivo per gli animali domestici e i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un suo uso improprio. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione fondamentale per assicurare l'efficacia del trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Linfa

LINFA spa *Cura del Verde*
Via Mattei, 6 - 42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Sanità n.10704 del 15.02.01

Officina di produzione: **Althaller Italia** srl - S.Colombano al Lambro (MI); **Irca Service** spa – Fornovo San Giovanni (BG); **Scam** srl – Strada Bellaria, 164 – 41010 S.Maria di Mugnano (MO); **Sipcam** spa – Via Vittorio Veneto, 81 – 20090 Salerano sul Lambro (LO) – **STI Solfotecnica Italiana** spa – Via Pian d'Asso – 53028 Torrenieri (frazione di Montalcino – SI)

Volume netto: litri 0.05 - 0.1 - 0.25 - 0.5 – 0.75 - 1 - 2 – 3 - 5 - 10 - 15 – 20 – 25

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore – Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato.

POLTIGLIA BORDOLESE

CONTRO LA PERONOSPORA, TICCHIOLATURA, OCCHIO DI PAVONE E TUTTE LE CRITTOGAME SENSIBILI AL RAME

FORMULAZIONE NEUTRA PRONTA ALL'USO

COMPOSIZIONE: Rame metallo g. 20 (da solfato neutralizzato alla calce) ; coformulanti q.b. a g. 100.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: nocivo per inalazione; rischio di gravi lesioni oculari; altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini; conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande; non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico; non gettare i residui nelle fognature; proteggersi gli occhi e la faccia in caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; non disperdere nell'ambiente; riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO – Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** gastrolusi con soluzione latteo albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE: la Poltiglia Bordolese, detta anche *acqua celeste* o *miscela cuprocalcica*, è un fungicida impiegato da lungo tempo contro la peronospora, ticchiolatura, occhio di pavone e numerose altre malattie fungine sensibili al rame. Esplica anche una buona azione battericida nei confronti delle principali batteriosi (es. Erwinia Amylovora o colpo di fuoco batterico). Nella tradizione era preparata neutralizzando il solfato di rame con calce idrata al momento dell'impiego; questa operazione riduceva il rischio di effetti fitotossici, oltre a garantire persistenza d'azione e resistenza al dilavamento. *La Poltiglia Bordolese Linfa, pur rispettando la tradizione, è un formulato già neutralizzato ed è pertanto pronto all'uso per semplice diluizione.* Il preparato è ammesso per l'impiego in *agricoltura biologica* (regolamento CEE 2092/91).

MODALITA' D'IMPIEGO: aggiungere in "poca" acqua, lentamente e sotto agitazione, la dose necessaria, sino ad ottenere una poltiglia cremosa, uniforme e senza grumi. Sempre sotto agitazione, portare al volume richiesto. Irrorare uniformemente con spruzzatore, pompa a spalla o altro idoneo irroratore. **In fase vegetativa curare particolarmente il trattamento sulla pagina inferiore delle foglie.**

CAMPI, PERIODI E DOSI D'IMPIEGO

COLTURE	MALATTIE COMBATTUTE	PERIODI D'IMPIEGO	DOSI Kg. in 100 litri
VITE	Peronospora, Cancri rameali, Botrytis	fase prefiorale	0,5 ÷ 0,7
		dopo l'allegagione (acini ben formati)	0,8 ÷ 1,2
MELO	Ticchiolatura, Fumaggine, Cancri rameali, Gommosi del colletto	autunno o fine inverno (prima della ripresa vegetativa)	1,0 ÷ 1,3
		fase prefiorale (gemma rigonfia)	0,5 ÷ 0,7
PERO	Ticchiolatura, Ruggine, Fumaggine, Maculatura bruna, Marciumi del colletto, Cancri rameali	autunno o fine inverno (prima della ripresa vegetativa)	1,0 ÷ 1,3
		fase prefiorale (gemma rigonfia)	0,5 ÷ 0,7
DRUPACEE	Maculatura fogliare, Gommosi del colletto, Fumaggine, Corineo, Cladosporosi, Monilia, Cancri rameali, Bolla, Batteriosi	dalla caduta delle foglie a fine inverno	1,0 ÷ 1,3
OLIVO	Gommosi del colletto, Occhio di pavone, Allupatura, Rogna, Lebbra	alla ripresa vegetativa ed alla invaiatura dei frutti	1,0 ÷ 1,3
AGRUMI	Mal secco, Antracnosi, Allupatura, Gommosi del colletto, Fumaggine	ne inverno/inizio primavera e in autunno (invaiatura dei frutti)	0,7 ÷ 0,9
POMODORO	Septoriosi, Peronospora, Cladosporiosi, Botrytis, Batteriosi, Alternariosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,6 ÷ 0,7
FAGIOLO, PISELLO	Peronospora, Antracnosi, Ruggine, Batteriosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,5 ÷ 0,6
CAROTA	Alternariosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,5 ÷ 0,6
SEDANO, FINOCCHIO	Peronospora, Septoriosi, Cercospora	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,5 ÷ 0,6
CETRIOLO	Peronospora, Antracnosi, Cladosporiosi, Batteriosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,5 ÷ 0,6
MELONE, ANGURIA	Peronospora, Antracnosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,5 ÷ 0,6
PATATA, CIPOLLA, AGLIO, LATTUGA E SIMILI, CARDO, CARCIOFO, MELANZANA, CAVOLI, CAVOLFIORI, CAVOLI DI BRUXELLES, BROCCOLI	Peronospora, Alternariosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,5 ÷ 0,6
FRAGOLA	Vaiolatura, Phytophtora, Maculatura fogliare, Colletotrichum, Botrytis, Antracnosi, Batteriosi, Alternariosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,7 ÷ 0,8
COLTURE FLOREALI	Ticchiolatura, Peronospora, Antracnosi, Maculatura fogliare, Ruggine, Fumaggine, Cladosporiosi, Botrytis, Batteriosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,6 ÷ 0,7
COLTURE FORESTALI	Fumaggine, Cancri rameali	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,8 ÷ 1,0
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Ruggine, Cercospora, Alternariosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,7 ÷ 0,8
SOIA, GIRASOLE, COLZA	Peronospora, Alternariosi, Sclerotinia	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,7 ÷ 0,8
TABACCO	Peronospora, Alternariosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,6 ÷ 0,7
CEREALI	Septoriosi, Ruggine, Puccinia	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,7 ÷ 0,8

Le applicazioni dovranno essere ripetute in funzione dell'andamento climatico e della virulenza delle infezioni.

COMPATIBILITA': il formulato è compatibile con i più comuni insetticidi e fungicidi; incompatibile con i prodotti a reazione fortemente acida o fortemente alcalina. Nei trattamenti autunno invernali può essere miscelato agli olii minerali.

AVVERTENZA: la pioggia entro le successive 24 48 ore dal trattamento potrebbe comprometterne l'efficacia. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo e, inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non trattare durante la fioritura. Non trattare in condizioni estreme di umidità e temperatura: in particolare, non trattare su vite quando la temperatura è inferiore ai 6 8 °C. Si sconsiglia l'impiego in piena vegetazione su pesco, susino e le varietà di melo e pero sensibili al rame di seguito indicate: MELO - Abbondanza, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Wine-sap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana; PERO: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

TOSSICITA': il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione fondamentale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Linfa

LINFA spa ***Cura del Verde***
Via Mattei, 6
42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10511 del 14/06/2000

Officina di produzione: **Manica** spa – Rovereto (TN); **Scam** srl – Strada Bellaria, 164 – 41010 S.Maria di Mugnano (MO); **Scarmagnan** sas – Via Roma, 29 – 37046 Minerbe (VR); **Sinapack** snc – Via dell'Industria e dell'Artigianato, 7 – 27049 Stradella (PV) – **STI Solfotecnica Italiana** spa – Via Pian d'Asso – 53028 Torrenieri (fraz. di Montalcino – SI)

Peso netto: Kg. 0.05; 0.1; 0.25; 0.5; 0.70; 0.75; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore – Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

POLTIGLIA BORDOLESE

FORMULAZIONE NEUTRA PRONTA ALL'USO

CONTRO LA PERONOSPORA, TICCHIOLATURA, OCCHIO DI PAVONE E TUTTE LE CRITTOGAME SENSIBILI AL RAME

COMPOSIZIONE: Rame metallo g. 20 (da solfato neutralizzato alla calce) ; coformulanti q.b. a g. 100.

FRASI DI RISCHIO: nocivo per inalazione; rischio di gravi lesioni oculari; altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini; conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande; non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico; non gettare i residui nelle fognature; proteggersi gli occhi e la faccia; in caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; non disperdere nell'ambiente; riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO — PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO – Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia**: gastrolusi con soluzione latteo-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure Ca-EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione fondamentale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Linfa

LINFA spa ***Cura del Verde***
Via Mattei, 6
42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10511 del 14/06/2000

Officina di produzione: **Manica** spa – Rovereto (TN); **Scam** srl – Strada Bellaria, 164 – 41010 S.Maria di Mugnano (MO); **Scarmagnan** sas – Via Roma, 29 – 37046 Minerbe (VR); **Sinapack** snc – Via dell'Industria e dell'Artigianato, 7 – 27049 Stradella (PV) – **STI Solfotecnica Italiana** spa – Via Pian d'Asso – 53028 Torrenieri (fraz. di Montalcino – SI)

Peso netto: Kg. 0.05; 0.1; 0.25; 0.5; 0.70; 0.75; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore – Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

FOGLIO ILLUSTRATIVO PER CONFEZIONI FORMATO RIDOTTO

POLTIGLIA BORDOLESE

FORMULAZIONE NEUTRA PRONTA ALL'USO

CONTRO LA PERONOSPORA, TICCHIOLATURA, OCCHIO DI PAVONE E TUTTE LE CRITTOGAME SENSIBILI AL RAME

COMPOSIZIONE: Rame metallo g. 20 (da solfato neutralizzato alla calce) ; coformulanti q.b. a g. 100.

CARATTERISTICHE: la Poltiglia Bordolese, detta anche *acqua celeste* o *miscela cuprocalcica*, è un fungicida impiegato da lungo tempo contro la peronospora, ticchiolatura, occhio di pavone e numerose altre malattie fungine sensibili al rame. Esplica anche una buona azione battericida nei confronti delle principali batteriosi (es. Erwinia Amylovora o colpo di fuoco batterico). Nella tradizione era preparata neutralizzando il solfato di rame con calce drata al momento dell'impiego; questa operazione riduceva il rischio di effetti fitotossici, oltre a garantire persistenza d'azione e resistenza al dilavamento. *La Poltiglia Bordolese Linfa, pur rispettando la tradizione, è un formulato già neutralizzato ed è pertanto pronto all'uso per semplice diluizione.* Il preparato è ammesso per l'impiego in *agricoltura biologica* (regolamento CEE 2092/91).

MODALITA' D'IMPIEGO: aggiungere in "poca" acqua, lentamente e sotto agitazione, la dose necessaria, sino ad ottenere una poltiglia cremosa, uniforme e senza grumi. Sempre sotto agitazione, portare al volume richiesto. Irrorare uniformemente con spruzzatore, pompa a spalla o altro idoneo irroratore. In fase vegetativa curare particolarmente il trattamento sulla pagina inferiore delle foglie.

CAMPI, PERIODI E DOSI D'IMPIEGO

COLTURE	MALATTIE COMBATTUTE	PERIODI D'IMPIEGO	DOSI Kg. in 100 litri
VITE	Peronospora, Cancri rameali, Botrytis	fase prefiorale	0,5 ÷ 0,7
		dopo l'allegagione (acini ben formati)	0,8 ÷ 1,2
MELO	Ticchiolatura, Fumaggine, Cancri rameali, Gommosi del colletto	autunno o fine inverno (prima della ripresa vegetativa)	1,0 ÷ 1,3
		fase prefiorale (gemma rigonfia)	0,5 ÷ 0,7
PERO	Ticchiolatura, Ruggine, Fumaggine, Maculatura bruna, Marciumi del colletto, Cancri rameali	autunno o fine inverno (prima della ripresa vegetativa)	1,0 ÷ 1,3
		fase prefiorale (gemma rigonfia)	0,5 ÷ 0,7
DRUPACEE	Maculatura fogliare, Gommosi del colletto, Fumaggine, Corineo, Cladosporosi, Monilia, Cancri rameali, Bolla, Batteriosi	dalla caduta delle foglie a fine inverno	1,0 ÷ 1,3
OLIVO	Gommosi del colletto, Occhio di pavone, Allupatura, Rogna, Lebbra	alla ripresa vegetativa ed alla invaiatura dei frutti	1,0 ÷ 1,3
AGRUMI	Mal secco, Antracnosi, Allupatura, Gommosi del colletto, Fumaggine	ne inverno/inizio primavera e in autunno (invaiatura dei frutti)	0,7 ÷ 0,9
POMODORO	Septoriosi, Peronospora, Cladosporiosi, Botrytis, Batteriosi, Alternariosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,6 ÷ 0,7
FAGIOLO, PISELLO	Peronospora, Antracnosi, Ruggine, Batteriosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,5 ÷ 0,6
CAROTA	Alternariosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,5 ÷ 0,6
SEDANO, FINOCCHIO	Peronospora, Septoriosi, Cercospora	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,5 ÷ 0,6
CETRIOLO	Peronospora, Antracnosi, Cladosporiosi, Batteriosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,5 ÷ 0,6
MELONE, ANGURIA	Peronospora, Antracnosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,5 ÷ 0,6
PATATA, CIPOLLA, AGLIO, LATTUGA E SIMILI, CARDO, CARCIOFO, MELANZANA, CAVOLI, CAVOLFIORI, CAVOLI DI BRUXELLES, BROCCOLI	Peronospora, Alternariosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,5 ÷ 0,6
FRAGOLA	Vaiolatura, Phytophtora, Maculatura fogliare, Colletotrichum, Botrytis, Antracnosi, Batteriosi, Alternariosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,7 ÷ 0,8
COLTURE FLOREALI	Ticchiolatura, Peronospora, Antracnosi, Maculatura fogliare, Ruggine, Fumaggine, Cladosporiosi, Botrytis, Batteriosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,6 ÷ 0,7
COLTURE FORESTALI	Fumaggine, Cancri rameali	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,8 ÷ 1,0
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Ruggine, Cercospora, Alternariosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,7 ÷ 0,8
SOIA, GIRASOLE, COLZA	Peronospora, Alternariosi, Sclerotinia	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,7 ÷ 0,8
TABACCO	Peronospora, Alternariosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,6 ÷ 0,7
CEREALI	Septoriosi, Ruggine, Puccinia	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,7 ÷ 0,8

Le applicazioni dovranno essere ripetute in funzione dell'andamento climatico e della virulenza delle infezioni.

COMPATIBILITA': il formulato è compatibile con i più comuni insetticidi e fungicidi; incompatibile con i prodotti a reazione fortemente acida o fortemente alcalina. Nei trattamenti autunno-invernali può essere miscelato agli olii minerali.

AVVERTENZA: la pioggia entro le successive 24-48 ore dal trattamento potrebbe comprometterne l'efficacia. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo e, inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non trattare durante la fioritura. Non trattare in condizioni estreme di umidità e temperatura; in particolare, non trattare su vite quando la temperatura è inferiore ai 6-8 °C. Si sconsiglia l'impiego in piena vegetazione su pesco, susino e le varietà di melo e pero sensibili al rame di seguito indicate: MELO - Abbondanza, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Wine-sap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana; PERO: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

TOSSICITA': il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione fondamentale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Linfa

LINFA spa ***Cura del Verde***
Via Mattei, 6
42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10511 del 14/06/2000

Officina di produzione: **Manica** spa – Rovereto (TN); **Scam** srl – Strada Bellaria, 164 – 41010 S.Maria di Mugnano (MO); **Scarmagnan** sas – Via Roma, 29 – 37046 Minerbe (VR); **Sinapack** snc – Via dell'Industria e dell'Artigianato, 7 – 27049 Stradella (PV) – **STI Solfotecnica Italiana** spa – Via Pian d'Asso – 53028 Torrenieri (fraz. di Montalcino – SI)

Peso netto: Kg. 0.05; 0.1; 0.25; 0.5; 0.70; 0.75; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore – Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato.

POLTIGLIA BORDOLESE

CONTRO LA PERONOSPORA, TICCHIOLATURA, OCCHIO DI PAVONE E TUTTE LE CRITTOGAME SENSIBILI AL RAME

FORMULAZIONE NEUTRA PRONTA ALL'USO

IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE: Rame metallo g. 20 (da solfato neutralizzato alla calce) ; coformulanti quanto basta a grammi 100

FRASI DI RISCHIO: nocivo per inalazione; rischio di gravi lesioni oculari: altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini; conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande; non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico; non gettare i residui nelle fognature; proteggersi gli occhi e la faccia; in caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; non disperdere nell'ambiente; riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO – Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** gastrolusi con soluzione latteo-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure Ca-EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

CARATTERISTICHE: la Poltiglia Bordolese, detta anche *acqua celeste* o *miscela cuprocalcica*, è un fungicida impiegato da lungo tempo contro la peronospora, ticchiolatura, occhio di pavone e numerose altre malattie fungine sensibili al rame. Esplica anche una buona azione battericida nei confronti delle principali batteriosi (es. Erwinia Amylovora o colpo di fuoco batterico). Nella tradizione era preparata neutralizzando il solfato di rame con calce idrata al momento dell'impiego; questa operazione riduceva il rischio di effetti fitotossici, oltre a garantire persistenza d'azione e resistenza al dilavamento. *La Poltiglia Bordolese Linfa, pur rispettando la tradizione, è un formulato già neutralizzato ed è pertanto pronto all'uso per semplice diluizione.* Il preparato è ammesso per l'impiego in *agricoltura biologica* (regolamento CEE 2092/91). Il formulato è confezionato in comodi sacchetti idrosolubili predosati.

MODALITA' D'IMPIEGO: aggiungere in "poca" acqua, lentamente e sotto agitazione, la dose necessaria, sino ad ottenere una poltiglia cremosa, uniforme e senza grumi. Sempre sotto agitazione, portare al volume richiesto. Irrorare uniformemente con spruzzatore, pompa a spalla o altro idoneo irroratore. In fase vegetativa curare particolarmente il trattamento sulla pagina inferiore delle foglie.

CAMPI, PERIODI E DOSI D'IMPIEGO

COLTURE	MALATTIE COMBATTUTE	PERIODI D'IMPIEGO	DOSI Kg. in 100 litri
VITE	Peronospora, Cancri rameali, Botrytis	fase prefiorale	0,5 ÷ 0,7
		dopo l'allegagione (acini ben formati)	0,8 ÷ 1,2
MELO	Ticchiolatura, Fumaggine, Cancri rameali, Gommosi del colletto	autunno o fine inverno (prima della ripresa vegetativa)	1,0 ÷ 1,3
		fase prefiorale (gemma rigonfia)	0,5 ÷ 0,7
PERO	Ticchiolatura, Ruggine, Fumaggine, Maculatura bruna, Marciumi del colletto, Cancri rameali	autunno o fine inverno (prima della ripresa vegetativa)	1,0 ÷ 1,3
		fase prefiorale (gemma rigonfia)	0,5 ÷ 0,7
DRUPACEE	Maculatura fogliare, Gommosi del colletto, Fumaggine, Corineo, Cladosporiosi, Monilia, Cancri rameali, Bolla, Batteriosi	dalla caduta delle foglie a fine inverno	1,0 ÷ 1,3
OLIVO	Gommosi del colletto, Occhio di pavone, Allupatura, Rogna, Lebbra	alla ripresa vegetativa ed alla invaiatura dei frutti	1,0 ÷ 1,3
AGRUMI	Mal secco, Antracnosi, Allupatura, Gommosi del colletto, Fumaggine	fine inverno/inizio primavera e in autunno (invaiatura dei frutti)	0,7 ÷ 0,9
POMODORO	Septoriosi, Peronospora, Cladosporiosi, Botrytis, Batteriosi, Alternariosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,6 ÷ 0,7
FAGIOLO, PISELLO	Peronospora, Antracnosi, Ruggine, Batteriosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,5 ÷ 0,6
CAROTA	Alternariosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,5 ÷ 0,6
SEDANO, FINOCCHIO	Peronospora, Septoriosi, Cercospora	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,5 ÷ 0,6
CETRIOLO	Peronospora, Antracnosi, Cladosporiosi, Batteriosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,5 ÷ 0,6
MELONE, ANGURIA	Peronospora, Antracnosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,5 ÷ 0,6
PATATA, CIPOLLA, AGLIO, LATTUGA E SIMILI, CARDO, CARCIOFO, MELANZANA, CAVOLI, CAVOLFIORI, CAVOLI DI BRUXELLES, BROCCOLI	Peronospora, Alternariosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,5 ÷ 0,6
FRAGOLA	Vaiolatura, Phytophtora, Maculatura fogliare, Colletotrichum, Botrytis, Antracnosi, Batteriosi, Alternariosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,7 ÷ 0,8
COLTURE FLOREALI	Ticchiolatura, Peronospora, Antracnosi, Maculatura fogliare, Ruggine, Fumaggine, Cladosporiosi, Botrytis, Batteriosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,6 ÷ 0,7
COLTURE FORESTALI	Fumaggine, Cancri rameali	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,8 ÷ 1,0
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Ruggine, Cercospora, Alternariosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,7 ÷ 0,8
SOIA, GIRASOLE, COLZA	Peronospora, Alternariosi, Sclerotinia	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,7 ÷ 0,8
TABACCO	Peronospora, Alternariosi	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,6 ÷ 0,7
CEREALI	Septoriosi, Ruggine, Puccinia	preventivamente o alla comparsa delle prime infezioni	0,7 ÷ 0,8

Le applicazioni dovranno essere ripetute in funzione dell'andamento climatico e della virulenza delle infezioni. **NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

COMPATIBILITA': il formulato è compatibile con i più comuni insetticidi e fungicidi; incompatibile con i prodotti a reazione fortemente acida o fortemente alcalina. Nei trattamenti autunno-invernali può essere miscelato agli olii minerali.

AVVERTENZA: la pioggia entro le successive 24-48 ore dal trattamento potrebbe comprometterne l'efficacia. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo e, inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non trattare durante la fioritura. Non trattare in condizioni estreme di umidità e temperatura; in particolare, non trattare su vite quando la temperatura è inferiore ai 6-8 °C. Si sconsiglia l'impiego in piena vegetazione su pesco, susino e le varietà di melo e pero sensibili al rame di seguito indicate: MELO - Abbondanza, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Wine-sap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana; PERO: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

TOSSICITA': il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione fondamentale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Linfa

LINFA spa ***Cura del Verde***
Via Mattei, 6
42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10511 del 14/06/2000

Officina di produzione: **AgroChimica Faentina** spa – Via San Silvestro, 1 – 48018 Faenza (RA); **Manica** spa – Rovereto (TN); **Scam** srl – Strada Bellaria, 164 – 41010 S.Maria di Mugnano (MO); **Scarmagnan** sas – Via Roma, 29 – 37046 Minerbe (VR); **Sinapack** snc – Via dell'Industria e dell'Artigianato, 7 – 27049 Stradella (PV) – **STI Solfotecnica Italiana** spa – Via Pian d'Asso – 53028 Torrenieri (fraz. di Montalcino – SI)

Peso netto: Kg. 1 (n.1 sacchetto da Kg.1; n.2 sacchetti da Kg. 0,5; n.4 sacchetti da Kg.0,25; n.10 sacchetti da Kg.0,1) – Kg.0,5 (n.1 sacchetto da Kg.0,5; n.2 sacchetti da Kg. 0,25; n.5 sacchetti da Kg.0,1)

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore – Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato.

MONODOSE IDROSOLUBILE – ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

POLTIGLIA BORDOLESE

CONTRO LA PERONOSPORA, TICCHIOLATURA, OCCHIO DI PAVONE
E TUTTE LE CRITTOGAME SENSIBILI AL RAME

FORMULAZIONE NEUTRA PRONTA ALL'USO IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE: Rame metallo g. 20 (da solfato neutralizzato alla calce); coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: nocivo per inalazione; rischio di gravi lesioni oculari; altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini; conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande; non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico; non gettare i residui nelle fognature; proteggersi gli occhi e la faccia; in caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; non disperdere nell'ambiente; riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO – Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia**: gastrolusi con soluzione latteo-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure Ca-EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

Linfa

LINFA spa ***Cura del Verde***
Via Mattei, 6
42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10511 del 14/06/2000

SCIOGLIERE LA BUSTA IN ACQUA SENZA ROMPERLA

Officina di produzione: **AgroChimica Faentina** spa – Via San Silvestro, 1 – 48018 Faenza (RA); **Manica** spa – Rovereto (TN); **Scam** srl – Strada Bellaria, 164 – 41010 S.Maria di Mugnano (MO); **Scarmagnan** sas – Via Roma, 29 – 37046 Minerbe (VR); **Sinapack** snc – Via dell'Industria e dell'Artigianato, 7 – 27049 Stradella (PV) – **STI Solfotecnica Italiana** spa – Via Pian d'Asso – 53028 Torrenieri (fraz. di Montalcino – SI)

Peso netto: Kg. 0,1; 0,25; 0,5; 1

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore – Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato.

DA NON VENDERE, NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE ORIGINALE

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE

Pittogrammi per la confezione (raggruppamento di uno o più sacchetti idrosolubili)

1 — 20 - 25%

Assicurarsi della completa pulizia dell'atomizzatore e riempirlo con il 20-25% dell'acqua totale necessaria.

2

Con mani e guanti asciutti prelevare il numero necessario di sacchetti idrosolubili. Richiudere la confezione e conservarla in luogo asciutto.

3

Mantenendo in funzione l'agitatore, introdurre i sacchetti idrosolubili nell'atomizzatore senza romperli.

4

Attendere qualche minuto sino a completo scioglimento dei sacchetti, ottenendo una poltiglia cremosa, uniforme e senza grumi.

5

Completare il riempimento dell'atomizzatore con il volume d'acqua necessario, aggiungendo eventuali prodotti complementari.

PROPYDOR®

MICROEMULSIONE ACQUOSA

FUNGICIDA A LARGO SPETTRO
AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA

COMPOSIZIONE: Propiconazolo puro gr.10,70 (=110 g/L – rapporto isomerico cis-trans 1,42); coformulanti q.b. a gr. 100

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini; conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; non gettare i residui nelle fognature; usare indumenti protettivi e guanti adatti; in caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi - organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renali acute ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immuno-allergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea oltre, naturalmente, a segni di possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del S.N.C. **Metabolismo**: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CARATTERISTICHE: ***Propydor*** è un formulato in microemulsione acquosa di nuovissima concezione. Fungicida preventivo e curativo a largo spettro d'azione, è assorbito rapidamente dai tessuti vegetali e trasportato dalla corrente linfatica ascendente a tutte le parti della pianta, fino all'apice (sistemicità acropeta). Il veloce assorbimento rende il prodotto poco soggetto ai dilavamenti causati dalle piogge che dovessero sopraggiungere dopo il trattamento. Propydor si caratterizza inoltre per la sua lunga persistenza d'azione, consentendo di ottenere un più lungo controllo dei patogeni con un minor numero di trattamenti e per l'azione collaterale in fase vapore che permette l'efficace distribuzione anche all'interno di folte vegetazioni.

MODALITA' D'IMPIEGO: diluire alle dosi di seguito indicate e distribuire la soluzione irrorando uniformemente la vegetazione con spruzzatore o pompa a spalla.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO RIFERITE A 100 LITRI D'ACQUA

- **Vite**: contro l'Oidio. Con trattamenti distanziati di due settimane, si consiglia il seguente calendario di interventi: ***Pre-fioritura*** alla dose di **ml. 20**; ***Post-fioritura*** alla dose di **ml.35**. Metà dose con trattamenti settimanali;
- **Pesco:** contro l'Oidio alla dose di **ml. 35-45**, iniziando dalla caduta dei residui florali (scamiciatura) e ripetendo gli interventi ogni 10-12 giorni, in relazione alla sensibilità varietale, alla posizione del pescheto e all'andamento meteorologico. Per combattere la Bolla effettuare due interventi alla dose di **ml. 70-90**: in autunno dopo la caduta delle foglie e alla fine dell'inverno. Nella fase dei bottoni rosa e nei trattamenti successivi il dosaggio consigliato è di **ml. 45-55**;
- **Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino:** contro la Monilia effettuando una o due applicazioni in pre e post fioritura secondo l'andamento stagionale e contro il Marciume dei Frutti in prossimità della raccolta rispettando il tempo di carenza, alla dose di **ml. 60**;
- **Carciofo:** contro l'Oidio alla dose di **ml. 5 per 100 mq.** (lt 0,5 per ettaro), trattando dalla comparsa delle primissime infezioni e ripetendo il trattamento ogni 12-14 giorni;
- **Melone**: contro l'Oidio in pieno campo e dopo la rimozione del telo di protezione, alla dose di **ml. 30 – 35** con trattamenti ogni due settimane;
- **Rosa:** contro l'Oidio alla dose di **ml. 25-35** ogni 12-14 giorni. Si tenga presente che, a seguito dei trattamenti, le colture protette possono subire fenomeni di rallentamento della crescita;
- **Tappeti erbosi:** contro le malattie che provocano deperimenti e diradamenti dei manti erbosi, in particolare Sclerotinia homeocarpa (Dollarspot), Helminthosporium spp., Oidio, Ruggini. Le dosi e la frequenza dei trattamenti variano a seconda della patogeno, delle condizioni ambientali e del tipo di pratica di mantenimento adottate. Indicativamente si consiglia di impiegare **ml. 40-100 per 100 mq.**, bagnando abbondantemente la vegetazione ogni 2-3 settimane.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Per i tappeti erbosi segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate per le 24 ore successive al trattamento.

FITOTOSSICITA': sulle colture orticole, floreali ed ornamentali, dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare una prova preliminare per rilevare eventuali sensibilità. In alcuni casi sono stati osservati sintomi di fitotossicità sulla vite.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile dei danni che possono derivare da un suo uso improprio.

Linfa

LINFA spa *Cura del Verde*
Via Mattei, 6
42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Sanità n. 11157 del 18.01.2002

Officine di produzione: **Althaller Italia srl** – Strada Comunale per Campagna - S.Colombano al Lambro (MI); **Irca Service spa** – Strada Statale Cremasca 591, 10 - Fornovo San Giovanni (BG); **Scam srl** – Strada Bellaria, 164 – Modena; **Sipcam spa** – Salerano sul Lambro (LO); **STI Solfotecnica Italiana spa** – Via Pian d'Asso - Torrenieri – frazione di Montalcino (SI).

Volume netto : litri 0.025; 0.05; 0.1; 0.25; 0.75; 1; 2; 5; 10; 15; 20

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore – Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

PROPYDOR®

MICROEMULSIONE ACQUOSA

FUNGICIDA A LARGO SPETTRO

AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA

COMPOSIZIONE: Propiconazolo puro gr.10,70 (=110 g/L – rapporto isomerico cis-trans 1,42); coformulanti q.b. a gr. 100

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini; conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; non gettare i residui nelle fognature; usare indumenti protettivi e guanti adatti; in caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO **Sintomi** - organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renali acute ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immuno-allergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea oltre, naturalmente, a segni di possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del S.N.C. **Metabolismo**: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile dei danni che possono derivare da un suo uso improprio.

Linfa

LINFA spa ***Cura del Verde***
Via Mattei, 6
42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Sanità n. 11157 del 18.01.2002

Officine di produzione: **Althaller Italia srl** – Strada Comunale per Campagna - S. Colombano al Lambro (MI); **Irca Service spa** – Strada Statale Cremasca 591, 10 - Fornovo San Giovanni (BG); **Scam srl** – Strada Bellaria, 164 – Modena; **Sipcam spa** – Salerano sul Lambro (LO); **STI Solfotecnica Italiana spa** – Via Pian d'Asso - Torrenieri – frazione di Montalcino (SI).

Volume netto : litri 0.025; 0.05; 0.1; 0.25; 0.75; 1; 2; 5; 10; 15; 20

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore – Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

FOGLIO ILLUSTRATIVO PER CONFEZIONI FORMATO RIDOTTO

PROPYDOR®

MICROEMULSIONE ACQUOSA

FUNGICIDA A LARGO SPETTRO

AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA

COMPOSIZIONE: Propiconazolo puro gr.10,70 (=110 g/L – rapporto isomerico cis-trans 1,42); coformulanti q.b. a grammi 100

CARATTERISTICHE: ***Propydor*** è un formulato in microemulsione acquosa di nuovissima concezione. Fungicida preventivo e curativo a largo spettro d'azione, è assorbito rapidamente dai tessuti vegetali e trasportato dalla corrente linfatica ascendente a tutte le parti della pianta, fino all'apice (sistemicità acropeta). Il veloce assorbimento rende il prodotto poco soggetto ai dilavamenti causati dalle piogge che dovessero sopraggiungere dopo il trattamento. Propydor si caratterizza inoltre per la sua lunga persistenza d'azione, consentendo di ottenere un più lungo controllo dei patogeni con un minor numero di trattamenti e per l'azione collaterale in fase vapore che permette l'efficace distribuzione anche all'interno di folte vegetazioni.

MODALITA' D'IMPIEGO: diluire alle dosi di seguito indicate e distribuire la soluzione irrorando uniformemente la vegetazione con spruzzatore o pompa a spalla.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO RIFERITE A 100 LITRI D'ACQUA

- **Vite:** contro l'Oidio. Con trattamenti distanziati di due settimane, si consiglia il seguente calendario di interventi: ***Pre-fioritura*** alla dose di **ml. 20**; ***Post-fioritura*** alla dose di **ml.35**. Metà dose con trattamenti settimanali:
- **Pesco:** contro l'Oidio alla dose di **ml. 35-45**, iniziando dalla caduta dei residui fiorali (scamiciatura) e ripetendo gli interventi ogni 10-12 giorni, in relazione alla sensibilità varietale, alla posizione del pescheto e all'andamento meteorologico. Per combattere la Bolla effettuare due interventi alla dose di **ml. 70-90**: in autunno dopo la caduta delle foglie e alla fine dell'inverno. Nella fase dei bottoni rosa e nei trattamenti successivi il dosaggio consigliato è di **ml. 45-55**;
- **Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino:** contro la Monilia effettuando una o due applicazioni in pre e post fioritura secondo l'andamento stagionale e contro il Marciume dei Frutti in prossimità della raccolta rispettando il tempo di carenza, alla dose di **ml. 60**;
- **Carciofo:** contro l'Oidio alla dose di **ml. 5 per 100 mq.** (lt 0,5 per ettaro), trattando dalla comparsa delle primissime infezioni e ripetendo il trattamento ogni 12-14 giorni;
- **Melone**: contro l'Oidio in pieno campo e dopo la rimozione del telo di protezione, alla dose di **ml. 30 – 35** con trattamenti ogni due settimane;
- **Rosa:** contro l'Oidio alla dose di **ml. 25-35** ogni 12-14 giorni. Si tenga presente che, a seguito dei trattamenti, le colture protette possono subire fenomeni di rallentamento della crescita;
- **Tappeti erbosi:** contro le malattie che provocano deperimenti e diradamenti dei manti erbosi, in particolare Sclerotinia homeocarpa (Dollarspot), Helminthosporium spp., Oidio, Ruggini. Le dosi e la frequenza dei trattamenti variano a seconda della patogeno, delle condizioni ambientali e del tipo di pratica di mantenimento adottate. Indicativamente si consiglia di impiegare **ml. 40-100 per 100 mq.**, bagnando abbondantemente la vegetazione ogni 2-3 settimane.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Per i tappeti erbosi segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate per le 24 ore successive al trattamento.

FITOTOSSICITA': sulle colture orticole, floreali ed ornamentali, dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare una prova preliminare per rilevare eventuali sensibilità. In alcuni casi sono stati osservati sintomi di fitotossicità sulla vite.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile dei danni che possono derivare da un suo uso improprio.

Linfa

LINFA spa ***Cura del Verde***
Via Mattei, 6
42043 Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Sanità n. 11157 del 18.01.2002

Officine di produzione: **Althaller Italia srl** – Strada Comunale per Campagna - S.Colombano al Lambro (MI); **Irca Service spa** – Strada Statale Cremasca 591, 10 - Fornovo San Giovanni (BG); **Scam srl** – Strada Bellaria, 164 – Modena; **Sipcam spa** – Salerano sul Lambro (LO); **STI Solfotecnica Italiana spa** – Via Pian d'Asso - Torrenieri – frazione di Montalcino (SI).

Volume netto : litri 0.025; 0.05; 0.1; 0.25; 0.75; 1; 2; 5; 10; 15; 20

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore – Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato.

SVELLER®

DISERBANTE TOTALE SISTEMICO DI POST-EMERGENZA

CONTRO LE MALERBE ANNUALI E PERENNI

COMPOSIZIONE: Glifosate acido puro g 30,4 (= 360 g/l) corrispondente a g.41 di sale isopropilammonico; inerti e coadiuvanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO: tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini; conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; non gettare i residui nelle fognature; non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO – in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CARATTERISTICHE: Sveller è un diserbante totale da impiegarsi in post-emergenza. Efficace su tutte le infestanti mono e dicotiledoni, siano esse annuali, biennali o perenni, è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica fino alle radici e agli organi di propagazione, causando l'inibizione della sintesi proteica. L'effetto visivo si verifica dopo alcuni giorni con ingiallimento, arrossamento e disseccamento delle infestanti. Sveller non ha attività residuale in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi dell'ambiente. Il prodotto teme il gelo.
MODALITA' D'IMPIEGO: Sveller deve essere impiegato per irrorazione su infestanti in crescita attiva, ossia quando la linfa discendente è in grado di facilitare la sua traslocazione agli organi sotterranei. L'intervento ha minore efficacia sulle infestanti sofferenti per una qualsiasi causa (siccità, freddo, attacchi parassitari) o quando sono poco sviluppate causa la fase di crescita o recenti falciature. Anche le piogge che dovessero cadere entro 8 ore dal trattamento ne ridurrebbero l'efficacia. Non impiegare in pre-raccolto e non lavorare il terreno per 3 settimane dopo il trattamento. Non impiegare attrezzature di ferro o zincate che non siano protette da vernici plastiche. Prima dell'uso agitare bene sia la confezione che la miscela erbicida. Durante l'impiego tenere lontano gli animali domestici e il bestiame. Dopo il trattamento lavare accuratamente tutte le attrezzature impiegate.
CAMPI D'IMPIEGO:

- SU TERRENI IN PRESENZA DELLE SEGUENTI COLTURE: Agrumi (arancio, mandarino, clementino, limone, cedro, pompelmo), Pomacee (melo, pero), Noce, Olivo, Vite, Drupacee (albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino), Carciofo, Pomodoro, Melanzana, Fagiolino, Fava, Pisello, Carota, Patata, Soia, Erba medica, Prati, Barbabietola da zucchero, Rosa, Vivai e semenzai di floreali, Ornamentali, Forestali e Pioppo. L'impiego su Mais è consentito solo nell'interfila.
- SU TERRENI IN ASSENZA DI COLTURE E DESTINATI ALLA COLTIVAZIONE DI: Fragola, Ortaggi, Barbabietola da zucchero, Grano, Orzo, Segale, Avena, Mais, Riso, Soia, Prati. Vivai, effettuando il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento;
- SU AREE NON DESTINATE ALLA COLTIVAZIONE: aree rurali e industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, scoline e fossi.

DOSI D'IMPIEGO		DOSE in 2-3 litri d'acqua per 100 mq.	DOSE in 2-3 q.li d'acqua per ettaro
MALERBE ANNUALI E BIENNALI	Alopecurus, Avena, Hordeum murinum, Lolium, Mercurialis, Poa, Riso Crodo, Amni majus, Amaranthus. Calendula, Chenopodium. Orobanche, Portulaca, Raphanus. Senecio, Sinapis. Stellaria, Veronica;	15 ÷ 40 ml.	1,5 ÷ 4,0 lt.
MALERBE PERENNANTI	Agropyron repens, Carex, Cirsium, Euphorbia. Glyceria, Hipericum, Laersia cryzcides, Phalaris, Rumex, Sonchus, Sorghum halepense;	40 ÷ 50 ml.	4 ÷ 5 lt.
	Alisma, Asfodelus, Butomus, Cyperus, Ferula, Juncus, Nardus, Scirpus, Sparganium, Tussilago;	50 ÷ 70 ml.	5 ÷ 7 lt.
	Agrostis, Allium, Artemisia , Arundo , Cynodon, Eracleum , Glechoma, Oxalis, Paspalum, Phragmites , Pteridium, Ranunculus, Rubus, Tipha, Urtica;	80 ÷ 100 ml.	8 ÷ 10 lt.
	Aristolochia, Clematis, Convolvulus, Rubia peregrina;	120 ml.	12 lt.
MALERBE ARBUSTIVE	Acer, Fraxinus, Genista, Salix, Sambucus, Vaccinium;	40 ÷ 60 ml.	4 ÷ 6 lt.
	Calluna. Cistus, Erica, Lonicera.	100 ÷ 120 ml.	10 ÷ 12 lt.
L'addizione di solfato ammonico, in ragione di 80÷100 gr. per 100 mq. (8-10 kg. per ettaro). consente di impiegare le dosi inferiori indicate.			

Nel caso dovesse verificarsi la nascita di infestanti dopo il trattamento con Sveller, si consiglia un ulteriore intervento con prodotti residuali quando siano trascorse almeno 1-2 settimane.
FITOTOSSICITA': il prodotto non è selettivo. Per evitare il contatto con le parti verdi e legnose delle colture da diserbare è necessario impiegare pompe a bassa pressione (massimo 3 atmosfere) e attrezzature selettive (a sgocciolamento o di tipo umettante-lambente) in grado di evitare le formazione di deriva e di goccioline troppo nebulizzate. In ogni caso. non irrorare in presenza di vento. Togliere i succhioni e i ricacci dalle colture arboree prima del trattamento.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': il prodotto si impiega da solo. Tuttavia in caso di miscele verificare prima la compatibilità e l'efficacia erbicida.
AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Linfa

LINFA spa Cura del Verde
Via Mattei, 6 - Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9989 del 17/03/1999

Officine di produzione: **ALTHALLER ITALIA** s.r.l. - S.Colombano al Lambro (MI); **CHEMIA** s.p.a. – S.S. 255 km. 46 – S.Agostino (FE); **I.R.C.A. *Service*** s.p.a. – Strada Statale Cremasca 591 n°10– 24040 Fornovo San Giovanni (BG); **SCAM** s.r.l. – Strada Bellaria, 164 – 41010 S.Maria di Mugnano (MO); STI **Solfotecnica Italiana** s.p.a. – Via Pian d'Asso – 53028 Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

Volume netto: litri 0.05 - 0.1 - 0.25 - 0.5 -1 - 2 - 5 - 15 – 20 – 25

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore – Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

SVELLER®

DISERBANTE TOTALE SISTEMICO DI POST-EMERGENZA

CONTRO LE MALERBE ANNUALI E PERENNI

COMPOSIZIONE: Glifosate acido puro g 30,4 (= 360 g/l) corrispondente a grammi 41 di sale isopropilammonico; inerti e coadiuvanti quanto basta .b. a 100

FRASI DI RISCHIO: tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini; conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; non gettare i residui nelle fognature; non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO – in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Linfa

LINFA spa Cura del Verde
Via Mattei, 6 - Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9989 del 17/03/1999

Officine di produzione: **ALTHALLER ITALIA** s.r.l. - S.Colombano al Lambro (MI); **CHEMIA** s.p.a. – S.S. 255 km. 46 – S.Agostino (FE); **I.R.C.A.** ***Service*** s.p.a. – Strada Statale Cremasca 591 n°10– 24040 Fornovo San Giovanni (BG); **SCAM** s.r.l. – Strada Bellaria, 164 – 41010 S.Maria di Mugnano (MO); **STI Solfotecnica Italiana** s.p.a. – Via Pian d'Asso – 53028 Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

Volume netto: litri 0.05 - 0.1 - 0.25 - 0.5 -1 - 2 - 5 - 15 – 20 – 25

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore – Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

FOGLIO ILLUSTRATIVO PER CONFEZIONI FORMATO RIDOTTO

SVELLER®

DISERBANTE TOTALE SISTEMICO DI POST-EMERGENZA

CONTRO LE MALERBE ANNUALI E PERENNI

COMPOSIZIONE: Glifosate acido puro g 30,4 (= 360 g/l) corrispondente a g.41 di sale isopropilammonico; inerti e coadiuvanti q.b. a grammi 100

CARATTERISTICHE: Sveller è un diserbante totale da impiegarsi in post-emergenza. Efficace su tutte le infestanti mono e dicotiledoni, siano esse annuali, biennali o perenni, è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica fino alle radici e agli organi di propagazione, causando l'inibizione della sintesi proteica. L'effetto visivo si verifica dopo alcuni giorni con ingiallimento, arrossamento e disseccamento delle infestanti. Sveller non ha attività residuale in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi dell'ambiente. Il prodotto teme il gelo.

MODALITA' D'IMPIEGO: Sveller deve essere impiegato per irrorazione su infestanti in crescita attiva, ossia quando la linfa discendente è in grado di facilitare la sua traslocazione agli organi sotterranei. L'intervento ha minore efficacia sulle infestanti sofferenti per una qualsiasi causa (siccità, freddo, attacchi parassitari) o quando sono poco sviluppate causa la fase di crescita o recenti falciature. Anche le piogge che dovessero cadere entro 8 ore dal trattamento ne ridurrebbero l'efficacia. Non impiegare in pre-raccolto e non lavorare il terreno per 3 settimane dopo il trattamento. Non impiegare attrezzature di ferro o zincate che non siano protette da vernici plastiche. Prima dell'uso agitare bene sia la confezione che la miscela erbicida. Durante l'impiego tenere lontano gli animali domestici e il bestiame. Dopo il trattamento lavare accuratamente tutte le attrezzature impiegate.

CAMPI D'IMPIEGO:

- SU TERRENI IN PRESENZA DELLE SEGUENTI COLTURE: Agrumi (arancio, mandarino, clementino, limone, cedro, pompelmo), Pomacee (melo, pero), Noce, Olivo, Vite, Drupacee (albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino), Carciofo, Pomodoro, Melanzana, Fagiolino, Fava, Pisello, Carota, Patata, Soia, Erba medica, Prati, Barbabietola da zucchero, Rosa, Vivai e semenzai di floreali, Ornamentali, Forestali e Pioppo. L'impiego su Mais è consentito solo nell'interfila.
- SU TERRENI IN ASSENZA DI COLTURE E DESTINATI ALLA COLTIVAZIONE DI: Fragola, Ortaggi, Barbabietola da zucchero, Grano, Orzo, Segale, Avena, Mais, Riso, Soia, Prati, Vivai, effettuando il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento;
- SU AREE NON DESTINATE ALLA COLTIVAZIONE: aree rurali e industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, scoline e fossi.

DOSI D'IMPIEGO		DOSE in 2-3 litri d'acqua per 100 mq.	DOSE in 2-3 q.li d'acqua per ettaro
MALERBE ANNUALI E BIENNALI	Alopecurus, Avena, Hordeum murinum, Lolium, Mercurialis, Poa, Riso Crodo, Amni majus, Amaranthus, Calendula, Chenopodium, Orobanche, Portulaca, Raphanus, Senecio, Sinapis, Stellaria, Veronica;	15 ÷ 40 ml.	1,5 ÷ 4,0 lt.
MALERBE PERENNANTI	Agropyron repens, Carex, Cirsium, Euphorbia, Glyceria, Hipericum, Laersia oryzoides, Phalaris, Rumex, Sonchus, Sorghum halepense;	40 : 50 ml.	4 : 5 lt.
	Alisma, Asfodelus, Butomus, Cyperus, Ferula, Juncus, Nardus, Scirpus, Sparganium, Tussilago;	50 ÷ 70 ml.	5 ÷ 7 lt.
	Agrostis, Allium, Artemisia , Arundo , Cynodon, Eracleum , Glechoma, Oxalis, Paspalum, Phragmites , Pteridium, Ranunculus, Rubus, Tipha, Urtica;	80 ÷ 100 ml.	8 ÷ 10 lt.
	Aristolochia, Clematis, Convolvulus, Rubia peregrina;	120 ml.	12 lt.
MALERBE ARBUSTIVE	Acer, Fraxinus, Genista, Salix, Sambucus, Vaccinium;	40 ÷ 60 ml.	4 ÷ 6 lt.
	Calluna, Cistus, Erica, Lonicera.	100 ÷ 120 ml.	10 ÷ 12 lt.
L'addizione di solfato ammonico, in ragione di 80÷100 gr. per 100 mq. (8-10 kg. per ettaro), consente di impiegare le dosi inferiori indicate.			

Nel caso dovesse verificarsi la nascita di infestanti dopo il trattamento con Sveller, si consiglia un ulteriore intervento con prodotti residuali quando siano trascorse almeno 1-2 settimane.

FITOTOSSICITA': il prodotto non è selettivo. Per evitare il contatto con le parti verdi e legnose delle colture da diserbare è necessario impiegare pompe a bassa pressione (massimo 3 atmosfere) e attrezzature selettive (a sgocciolamento o di tipo umettante-lambente) in grado di evitare le formazione di deriva e di goccioline troppo nebulizzate. In ogni caso, non irrorare in presenza di vento. Togliere i succhioni e i ricacci dalle colture arboree prima del trattamento.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il prodotto si impiega da solo. Tuttavia in caso di miscele verificare prima la compatibilità e l'efficacia erbicida.

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Linfa

LINFA spa Cura del Verde
Via Mattei, 6 - Gattatico (RE)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9989 del 17/03/1999

Officine di produzione: **ALTHALLER ITALIA** s.r.l. - S.Colombano al Lambro (MI); **CHEMIA** s.p.a. – S.S. 255 km. 46 – S.Agostino (FE); **I.R.C.A.** ***Service*** s.p.a. – Strada Statale Cremasca 591 n°10– 24040 Fornovo San Giovanni (BG); **SCAM** s.r.l. – Strada Bellaria, 164 – 41010 S.Maria di Mugnano (MO); **STI Solfotecnica Italiana** s.p.a. – Via Pian d'Asso – 53028 Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

Volume netto: litri 0.05 - 0.1 - 0.25 - 0.5 -1 - 2 - 5 - 15 – 20 – 25

Da non applicare con mezzi aerei - Non operare contro vento - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore – Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Da non vendersi sfuso – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato.

P. M. CHEMICALS S.r.l.

METABROM 100

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
100 g di Bromuro di Metile puro (99,5%) CAS n. 74-83-9 pari a 99,5 g di principio attivo

FRASI DI RISCHIO
R 23/25 Tossico per inalazione e ingestione
R 36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
R 48/20 **Nocivo:** pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione
R 68 Possibilità effetti irreversibili
R 50 Altamente tossico per gli organismi acquatici
R 59 Pericoloso allo stato di ozono

CONSIGLI DI PRUDENZA
S 1/2 Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
S 15 Conservare lontano dal calore
S 20/21 Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
S 27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
S 29 Non gettare i residui nelle fognature
S 36/39 Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi / la faccia
S 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
S 59 Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero / riciclaggio degli imballi
S 61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza
S63 In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo

CLASSE TOSSICOLOGICA I A

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

P. M. Chemicals Srl

Via Monteverdi 11 - Milano
Autorizzazione del Ministero della Sanità
Registrazione n. 4236 del 18 maggio 1981

Officina di produzione:
BROMINE COMPOUNDS Ltd - BEERSHEVA (ISRAELE)

La bombola completamente svuotata deve essere rispedita al fornitore

Contenuto netto Kg

Partita N.

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI DI PRUDENZA
Conservare questo prodotto in locale idoneo per immagazzinare gas tossici (R.D. 9-1-1927 n° 147 e successivi aggiornamenti), con aperture di areazione anche a livello del suolo, inaccessibile anche agli animali domestici.
Usare per le bombole vuote, le stesse precauzioni relative alla custodia delle bombole piene.
Dopo la manipolazione e in caso di contatto con la pelle, lavarsi accuratamente con abbondante acqua e sapone.
A seconda delle circostanze usate guanti e calzature in plastica. (Non usare guanti e calzature di cuoio o gomma).

INDICAZIONI PER IL MEDICO
BROMURO DI METILE
Sintomi: avvelenamento grave per inalazione o per contatto con la pelle Veleno neurotropo provoca lesioni encefaliche di tipo paralitico: tempo di latenza anche parecchie ore; cefalea, vertigini, sonnolenza, stato di ebrezza con disturbi della deambulazione, disturbi della parola, iperacusia dolorosa, ambliopia. I disturbi neurologici sono tardivi e costituiscono prognosi grave: lesioni cutanee da contatto.
Terapia: Sintomatica. Trattare l'acidosi metabolica in caso di ischemia polmonare con cortisone endovena, se convulsioni diazepam monitoraggio emogas analisi, quadro elettrolitico, ECG, EEG Esame delle urine. Ospedalizzare.
Controindicazioni: Sedativi a base di bromo
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

INSETTICIDA, NEMATOCIDA, GERMICIDA FUMIGANTE GASSOSO

CARATTERISTICHE
Liquido gassificabile a temperatura ambiente, praticamente non infiammabile, non esplosivo.

IMPIEGO:
Per trattamenti di quarantena già previsti da la normativa vigente:
Per trattamenti di disinfestazione delle sementi in condizioni di concentrazione, umidità e temperatura tali da non influire sulla germinabilità.

MODALITÀ D'IMPIEGO
La dose di impiego ottimale è di 30 g. per metro cubo con durata dell'esposizione di 24 ore. I locali o gli Ambienti da disinfestare devono essere isolati e chiusi ermeticamente per impedire qualsiasi fuga di gas.
Areare a fondo l'ambiente dopo la riapertura per almeno 24 ore.

NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Il trattamento a forti dosi distrugge la totalità delle forme di vita parassitarie presenti nell'ambiente.

NON È COMPATIBILE O MISCIBILE CON ALTRI PRINCIPI ATTIVI.

AVVERTENZA
All'esterno dei locali trattati devono essere posti dei cartelli con la dicitura:
"Vietato l'ingresso alle persone estranee - pericolo di morte". (Circolare ACIS n. 52 del 9.8.54)

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.
Il rispetto delle istruzioni in etichetta, è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone, agli animali e alle piante.

ATTENZIONE
Data la elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del DPR 1255/68.
L'utilizzo del prodotto è inoltre riservato agli operatori autorizzati a norma del R.D. 9/1/1927 n° 147 (e successive modifiche) sull'impiego dei gas tossici.

TAGLIE AUTORIZZATE
Kg 9, Kg 35, Kg 50, Kg 100

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

In caso di emergenza telefonare a: 0031-1150-89000

METABROM 980

Fumigante da impiegare esclusivamente per i trattamenti dei terreni in assenza di colture e per itrattamenti di vivai e semenza per la lotta contro erbe infestanti - funghi del terreno - orobanche - nematodi - insetti del terreno.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA (in peso)
Metile bromuro puro 97,51%
Cloropicrina 2,49%

L'utilizzo del prodotto è riservato solo agli operatori autorizzati a norma del R.D. 9-1-1927 N. 147 (e successive modifiche) sull'impiego dei gas tossici.

CLASSE TOSSICOLOGICA I A

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
R 23/25 Tossico per inalazione e ingestione
R 36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
R 48/20 **Nocivo:** pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione
R 68 Possibilità effetti irreversibili
R 50 Altamente tossico per gli organismi acquatici
R 59 Pericoloso allo stato di ozono

CONSIGLI DI PRUDENZA
S 1/2 Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
S 15 Conservare lontano dal calore
S 20/21 Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
S 27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
S 29 Non gettare i residui nelle fognature
S 36/39 Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi / la faccia
S 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
S 59 Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero / riciclaggio degli imballi
S 61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza
S63 In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo

Titolare della registrazione
P. M. Chemicals Srl
Via Monteverdi 11 - Milano
Registrazione n. 0849 del 6-6-1972
del Ministero della Sanità

Officina di produzione:
BROMINE COMPOUNDS Ltd - BEERSHEVA (ISRAELE)

Il contenitore deve essere restituito al produttore

In bombole di acciaio da Kg 100- 120 netti di prodotto

Partita N.

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare altre colture, alimenti o bevande o corsi d'acqua;
Non operare contro vento;
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: avvelenamento grave per inalazione e per contatto con la pelle. Veleno neurotropo: provoca lesioni encefaliche di tipo paralitico. Tempo di latenza: anche parecchie ore, cefalea, vertigini, sonnolenza, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, disturbi della parola, iperacusia dolorosa, ambliopia. I disturbi neurologici sono tardivi e costituiscono prognosi grave, lesione da contatto
Terapia: sintomatica. Trattare l'acidosi metabolica: in caso di edema polmonare cortisonici endovena; se convulsioni diazepam, monitoraggio emogas analisi, quadro elettrolitico. **ECG, EEG**, esame urine, ospedalizzare.

DOSI, EPOCHE, MODALITÀ DI IMPIEGO

a) il trattamento deve essere effettuato prima della semina o della piantagione. Si prepara il terreno ben lavorato e livellato e con sufficiente grado di umidità. Prima della fumigazione si devono applicare fertilizzanti organici.
b) La fumigazione deve essere effettuata solo se il terreno ha una temperatura di 8°C o superiore.
NON si deve eseguire il trattamento quando il terreno è troppo bagnato o troppo asciutto.
c) Metodo di applicazione: si ricopre la superfice preparata per il trattamento con un foglio di plastica intero ed in perfetto stato (polietilene o PVC dello spessore di 0.1 mm) e si interrano i bordi nel terreno. La superfice da fumigare nei frutteti per la piantagione di piante di sostituzione è di metri 2 x 2.
d) Il prodotto è venduto in bombole di metallo allo stato liquido sotto pressione e si trasforma in gas mediante appositi evaporatori.
Il gas è immesso sotto la copertura di plastica a mezzo di un tubo di plastica.
e) Il **METABROM 980** pur anche essere iniettato nel terreno a mezzo di iniettore pacciamatore portato che contemporaneamente distende il telo e lo rincalza.
f) La dose di impiego non deve essere superiore a 60 g/m² per impieghi al terreno, assicurando l'adozione di tecniche di applicazione, incluso l'uso di adeguate plastiche di copertura, che consentano di ridurre ulteriormente le dosi.
g) L'operazione di trattamento e quella di scopertura delle aree trattate, la quale ultima non deve avvenire prima di sette giorni dal trattamento, devono essere effettuate solo da operatori specializzati, autorizzati ai sensi del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e successive modifiche, nonchè muniti del patentino di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255/1968.
h) Per il trattamento deve essere rispettata la distanza minima di cinquanta metri dalle abitazioni, salvo espressa diversa autorizzazione delle autorità sanitarie locali; i trattamenti al terreno possono essere effettuati ad anni alterni.
i) L'intervallo da rispettare prima della messa a coltura (semina o trapianto) va fissato in relazione alla natura del terreno e delle condizioni climatiche e, comunque , non deve essere inferiore a 10 giorni e dopo conveniente arieggiamento del terreno trattato.
m) Terreno destinato alle seguenti colture per le quali il trattamento è possibile: pomodoro, melanzana, peperone, fragola, zucchino, melone, cocomero, cetriolo, fagiolo, sedano, finocchio, lattuga, cicoria cipolla, aglio, radicchio, cavolfiore, cavolrapa, spinacio, carciofo, ravanello, cardo, lampone, mirtillo, barbabietola, patata, bietola, vite, pesco, albicocco, arancio,limone, ciliegio, olivo, anemone, azalea, begonia, crisantemo, ciclamino, dalia, geranio, rododendro, iris, crocus ,fresia, garofano, gerbera, gladiolo, ortensia, rosa, giacinto, mughetto, narciso, petunia, robinia, tulipano, tabacco.
Semenzai e vivai.

Dal trattamento alla semina occorre un intervallo da 10 a 21 giorni a seconda delle colture come segue:

COLTURE	Parassiti e Patogeni Erbe infestanti	DOSI g per m²	Aereazione
TUTTE	Erbe infestanti annuali e poliennali	35-50	10-21
TUTTE	NEMATODI	35-50	10-21
TUTTE	Funghi patogeni del terreno	50-60	10-21
POMODORI, MELANZANE IN TERRENI MEDI	Orobanche	50-60	10-15
FRUTTETI Per sostituzione di piante su superfici di m. 2x2	In generale	mass. 60	14
SEMENZAI DI ORTICOLE FLORICOLE E TABACCO	In generale	35 50	10 14

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: non è compatibile con altri principi attivi.

FITOTOSSICITÀ: è fortemente fitotossico e perciò deve essere usato solamente per trattamenti prima della semina o trapianto.

RISCHI DI NOCIVITÀ: è tossico per gli animali domestici, i pesci, il bestiame.
È tossico per gli insetti utili solamente nel caso in cui detti insetti siano rimasti sotto la copertura di plastica che copre il terreno da sterilizzare.

ATTENZIONE:
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e pericoloso.
Avvertenza: da usarsi solo per la disinfestazione del terreno.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

In caso di emergenza telefonare a : 0031-1150-89000

ISK BIOSCIENCES EUROPE S.a.

CHIKARA 25 WG

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Erbicida per il diserbo di aree non coltivate nonché per vite, agrumi e olivo.

CHIKARA 25 WG
Registrazione Ministero della Sanità N. 10929 del 15/05/2001

Composizione:
FLAZASULFURON puro g. 25
Coformulanti q.b.a g. 100

ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A.
480 Avenue Louise - Bte 12
B-1050 - Bruxelles (Belgio)

Distributo da: **Belchim Crop Protection Italia** – (PADOVA)
Stabilimento di produzione:
ISHIHARA SANGYO KAISHA
Yokkaichi Factory (Giappone)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Partita n° Contenuto 50 g – 200 g (4x50g) – 250 g – 1 Kg - 1 Kg (5x200g) – 5 Kg – 10 Kg

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa in un luogo fresco e asciutto. Dopo la manipolazione, ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il CHIKARA 25 WG è un erbicida sistemico a base di Flazasulfuron, per il diserbo di aree non coltivate nonché per vite, agrumi e olivo. Viene assorbito per via fogliare e radicale e prontamente traslocato nei tessuti meristematici delle infestanti.
Si impiega nei trattamenti di post-emergenza precoce delle infestanti quando queste presentano un'altezza massima fino a 10 cm., inoltre, grazie alla sua attività residuale, svolge un efficace controllo anche in pre-emergenza.
È efficace contro numerose infestanti graminacee e dicotiledoni tra le quali:
Graminacee: *Echinochloa crus galli* (giavone comune), *Lolium multiflorum* (loglio), *Lolium perenne* (loietto), *Lolium rigidum* (loglio rigido), *Setaria verticillata* (panicastrella);
Dicotiledoni: *Amaranthus retroflexus* (amaranto comune), *Chenopodium album* (farinello comune), *Diplotaxis erucoides* (ruchetta violacea), *Erigeron canadensis* (impia), *Erodium ciconium* (cicuta), *Geranium dissectum* (geranio rosso), *Geranium rotundifolium*, *Matricaria chamomilla* (camomilla comune), *Mercurialis annua* (mercurella comune), *Picris echioides* (aspraggine volgare), *Polygonum aviculare* (correggiola), *Polygonum persicaria* (persicaria), *Portulaca oleracea* (erba porcellana), *Senecio vulgaris* (erba calderina), *Sinapis arvensis* (senape selvatica), *Stellaria media* (centocchio comune), *Allium vineale* (aglio selvatico).
Inoltre controlla il *Cyperus rotundus* (zigolo).

EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
Vite
Intervenire nell'interfila effettuando il primo trattamento a fine inverno-inizio primavera nei primi stadi di sviluppo delle infestanti (massimo 10 cm di altezza). Eseguire un secondo trattamento, nel caso di nuove emergenze di infestanti, nel periodo primaverile-estivo.
Agrumi
Effettuare il primo trattamento tra le piante da aprile a giugno su infestanti in attiva crescita nel primo stadio dello sviluppo (massimo 10 cm di altezza). Intervenire successivamente, in estate, tra giugno e agosto, in post-emergenza delle infestanti (cipero compreso).
Olivo
Effettuare il primo trattamento tra le piante nel periodo gennaio-marzo quando le infestanti si trovano nel primo stadio dello sviluppo (massimo 10 cm di altezza). Intervenire successivamente in pre-emergenza o in post-emergenza precoce delle infestanti.
Aree non destinate alle colture agrarie: aree industriali, ruderi storici, cimiteri, piazzali, banchine stradali, strade ferrate, aree urbane e agricole non coltivate.
Effettuare il trattamento nel periodo marzo-aprile, quando le infestanti si trovano nel primo stadio dello sviluppo (massimo 10 cm di altezza).

DOSI D'IMPIEGO
160 g/ha per **vite, agrumi** e **olivo; 200 g/ha** per aree non destinate alle colture agrarie.
Utilizzare volumi d'acqua di 200-400 litri/ha.
Tra il primo ed un eventuale secondo trattamento rispettare un intervallo di 30-120 giorni per agrumi; 120-180 giorni per olivo.

AVVERTENZE AGRONOMICHE: Intervenire solo su infestanti in attiva crescita. Il trattamento di post-emergenza è efficace se le infestanti si presentano nei primi stadi dello sviluppo (altezza max 10 cm). L'impiego su infestanti a foglia larga ben sviluppate potrebbe risultare inefficace. Irrigazioni o piogge cadute entro le 2 ore dal trattamento possono ridurre l'efficacia e l'attività erbicida del prodotto sulle infestanti già emerse. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse quali siccità, freddo, ecc., potrebbe risultare inefficace.

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare la giusta dose di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà con acqua, mantenendo in agitazione la massa, aggiungere il restante quantitativo di acqua fino al volume desiderato. Addizionare un tensioattivo non ionico (es. Frigate).

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli erbicidi in commercio e con tensioattivi non ionici.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: Usare ad una distanza non inferiore a 5 metri da corsi d'acqua. Per l'uso su strade ferrate mediante spraying train usare indumenti protettivi e guanti adatti. Per usi non agricoli tabellare l'area trattata con appositi cartelli.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con le colture limitrofe anche sotto forma di deriva. Non trattare direttamente l'apparato fogliare di vite, agrumi e olivo.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta su OLIVO e AGRUMI e 60 giorni prima della raccolta su VITE.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto

CHIKARA 25 WG

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Erbicida per il diserbo di aree non coltivate nonché per vite, agrumi e olivo

CHIKARA 25 WG Registrazione Ministero della Sanità N. 10929 del 15/05/2001

Composizione:		
FLAZASULFURON puro		g. 25
Coformulanti	q.b.a	g. 100

Partita n°

Contenuto **50 g**

ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A.
480 Avenue Louise - Bte 12
B-1050 - Bruxelles (Belgio)

Distributo da: **Belchim Crop Protection Italia –** (PADOVA)

Stabilimento di produzione:
ISHIHARA SANGYO KAISHA - Yokkaichi Factory (Giappone)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa in un luogo fresco e asciutto. Dopo la manipolazione, ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

NEMATHORIN 10 G

(GRANULARE FINE)

Nematocida per contatto per patata e pomodoro

MATORIN 10 G Registrazione Ministero de la Sanità N. 10324 del 08/02/2000

Composizione:	
FOSTHIAZATE puro	g 10
Coformulanti q.b.a	g 100

SK BIOSCIENCES EUROPE S.A.
480, Avenue Louise - Bte. 12
B-1050 Bruxelles (Belgio)
distributo da
SYNGENTA CROP PROTECTION SpA
Via Gallarate, 139 – 20151 Milano

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

ASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e gestione. Può provocare sensibilizzazione r contatto con la pelle. Tossico per gli ganismi acquatici, può provocare a lungo mine effetti negativi per l'ambiente quatico.
ONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori lla portata dei bambini. Conservare ntano da alimenti o mangimi e da bevande. n mangiare, nè bere, nè fumare durante mpiego. Evitare il contatto con la pelle. In so d'ingestione consultare immediatamen- il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere ll'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in ateria di sicurezza.

Stabilimento di produzione: Partita n° ....
CALLIOPE S.A. - Nogueres (Francia) Contenuto **4-5-10-15-25 Kg**

ORME PRECAUZIONALI: In caso di contatto con la pelle lavarsi mediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Durante pplicazione con attrezzature trainate o montate su trattore, usare dumenti protettivi adatti. Durante la manipolazione del prodotto, il ricamento, la pulizia delle attrezzature ed in caso di sversamenti cidentali usare indumenti protettivi e guanti adatti, un facciale rante con filtro combinato antipolvere ed antigas FFAP3 (EN 405); oteggersi gli occhi/la faccia.

FORMAZIONI PER IL MEDICO
ntomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi e-gangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di ma comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, oncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione uscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino alla comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il NEMATHORIN 10 G è un nematocida per contatto dotato di azione rapida e persistente. È attivo contro i nematodi cistiformi *(Globodera rostochiensis, Globodera pallida)*, galligeni (*Meloidogyne spp.*) e altri nematodi che attaccano le colture di patata e pomodoro.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto è destinato ad un uso esclusivo con attrezzature montate o trainate su trattore.
Il prodotto si applica una sola volta l'anno su terreno nudo.
La distribuzione del prodotto seguita dall'immediato incorporamento nel terreno (10-15 cm) può essere effettuata contemporaneamente al trapianto o alla semina o prima del trapianto o della semina per mezzo di idonei microgranulatori opportunamente tarati in modo da assicurarne la giusta ed uniforme distribuzione. In questo caso è consigliabile effettuare il trapianto entro le 24 ore.
N.B. L'incorporamento del prodotto nel terreno a profondità maggiori di 10-15 cm può ridurne l'efficacia.

DOSI D'IMPIEGO
Patata contro nematodi cistiformi (*Globodera rostochiensis, Globodera pallida*) ed altri nematodi: **30 Kg/ha**.
Pomodoro (in pieno campo e in serra) contro nematodi galligeni (*Meloidogyne spp.*) ed altri nematodi: **30 Kg/ha**.

Avvertenza: Conservare il prodotto al riparo dall'umidità.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si usa da solo.

Avvertenze:
Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli uccelli e tossica per la fauna selvatica e le api.
Usare ad una distanza non inferiore a 5 metri dai corsi d'acqua. Non usare in terreni situati in aree vulnerabili al percolamento.
Il prodotto va incorporato nel terreno. Ricoprire eventuali fuoriuscite di prodotto.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

55/2003

NISSHIN

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
SOSPENSIONE CONCENTRATA

NISSHIN Registrazione del ministero della Sanità n. 8843 del 16/05/1996

Composizione:
NICOSOLFURON puro g 4,18 (40 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A.
480, Avenue Louise - Bte. 12
B-1050 Bruxelles (Belgio)

Distributo da:
SYNGENTA CROP PROTECTION SpA
Via Gallarate, 139 – 20151 Milano

Contenuto 0,500 - 1 - 3 - 5 L Partita n°

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle tognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimenti di produzione:
ISK (Ishihara Sangyo Kaisha) Ltd - Yokkaichi (Giappone)
CALLIOPE S.A. - Nogueres (Francia)

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi abbondantemente con acqua. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
NISSHIN è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS
- INFESTANTI SENSIBILI
Graminacee: Avena spp (Avena), Agropyron repens (Agropiro), Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Echinochloa crus galli (Giavone comune), Lolium spp. (Loglio), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum halepense da seme e rizoma (Sorghetta).
Dicotiledoni: Amaranthus spp. (Amaranto), Ambrosia artemisifolia (Ambrosia), Ammi majus (Rindimolo), Bidens tripartita (Forbicina comune), Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), Diplotaxis erucoides (Rucola selvatica), Fumaria officinalis (Fumaria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Matricaria chamomilla (Camomilla), Mercurialis annua (Mercurella), Picris echioides (Soffione minore), Polygonum persicaria (Persicaria), Polygonum lapathifolium (Persicaria maggiore), Portulaca oleracea (Porcellana), Raphanus raphanistrum (Ramolaccio selvatico), Rapistrum rugosum (Rapistro rugoso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus oleraceus (Crespigno), Stellaria media (Centocchio).
- INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
Graminacee: Panicum spp. (Panico), Digitaria sanguinalis (Sanguinella).
Dicotiledoni: Datura stramonium (Stramonio), Helianthus tuberosus (Topirambur), Phitolacca americana (Fitolacca), Fallopia convolvulus (Poligono convolvolo), Solanum nigrum (Erba morella), Xanthium spp. (Lappola).

MODALITÀ D'IMPIEGO
NISSHIN si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
INFESTANTI DICOTILEDONI: 2-4 foglie
INFESTANTI GRAMINACEE: da 2 foglie ad inizio accestimento
SORGHETTA DA RIZOMA: 10-20 cm di altezza.
NISSHIN si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici.
NISSHIN si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio.
Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.
Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
1-1,5 l/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
1+0,5 l/ha: in caso di malerbe a crescita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.
Per completare l'azione di NISSHIN su infestanti sensibili o mediamente resistenti (Abutilon theophrasti, Chenopodium spp.) si consiglia la miscela con prodotti specifici a base di Bentazone, Dicamba, Piridate, Fluroxipir.

Avvertenze:

- Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
- I geoinsetticidi a base di Teflurin, Carbosulan e Carbofuran distribuiti in precedenza all'applicazione di NISSHIN non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico.
- Al termine dei trattamenti diserbanti con NISSHIN è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.
  Operare come segue:
  - Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
  - Riempire il serbatoio con acqua pulita: addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.
  - Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.
  - Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con formulati a base di Bentazone, Dicamba, Piridate, Fluroxipir.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PROTEGGERE DAL FREDDO
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

OHAYO
(SOSPENSIONE CONCENTRATA)
Fungicida

OHAYO Registrazione Ministero della Sanità N. 9286 del 17/7/97

Composizione:
FLUAZINAM puro g 39,5 (=500 g/l)
Coformulanti q.b.ag. 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè nere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d' ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Contenuto 0,5 - 1 - 5 Litri Partita n

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A.
480 Avenue Louise - Bte 12
B-1050 - Bruxelles (Belgio)

distribuito da
SYNGENTA CROP PROTECTION SpA
Via Gallarate, 139 – 20151 Milano

Stabilimenti di produzione: **OMNICHEM n.v. - Balen (Belgio)**
ORGACHIM - Oissel (Francia)

NORME PRECAUZIONALI: Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito mangimi. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per la cute e gli occhi; irritante per le mucose dell'apparato respiratorio. Terapia: sintomatica.
Avvertenze: Se ingerito accidentalmente bere 1-2 bicchieri d'acqua ed indurre vomito se la persona è cosciente; non indurre il vomito o somministrare alcunché per via orale se la persona è incosciente.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
OHAYO è un prodotto efficace nei confronti della **Ticchiolatura del melo, della Botrite della Vite** e **della Peronospora della Patata**. La formulazione in sospensione concentrata consente una notevole semplicità nella preparazione della miscela, una notevole uniformità di copertura della vegetazione ed un incremento nella resistenza al dilavamento rispetto alle formulazioni tradizionali, rendendone così possibile l'impiego in concentrazioni contenute.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Le quantità indicate si riferiscono ad irrorazioni a volume normale (1000-1800 litri/ha per melo e vite e 600-1000 litri/ha per la patata).
Melo contro Ticchiolatura (Venturia inaequalis): intervenire, alla dose di 100 ml per 100 litri di acqua, nelle condizioni di maggiore pericolosità per la malattia, iniziando gli interventi dopo la ripresa vegetativa e ripetendoli ad intervalli di 6-10 giorni in funzione della piovosità, della pressione infettiva e della suscettibilità varietale. Dopo la fase di frutto noce ed/o in periodi senza piogge, l'intervallo tra i trattamenti potrà essere ampliato a 12-14 giorni.
Vite contro Muffa grigia (Botrytis cinerea): intervenire, alla dose di 100-150 ml per 100 litri di acqua, nelle fasi di maggiore suscettibilità della malattia:
A - fine fioritura
B - pre-chiusura del grappolo
C - invaiatura
D - 28 giorni prima della raccolta.
In situazioni normali sono sufficienti due trattamenti nelle fasi in cui le condizioni sono maggiormente favorevoli alla malattia (periodi di elevata umidità relativa, piogge, grandinate, attacchi oidici o di insetti), tenendo presente che nelle varietà a grappolo compatto è indispensabile l'effettuazione del trattamento in B (pre-chiusura del grappolo). Nel caso di infezioni particolarmente gravi è possibile alternare i trattamenti effettuati con il prodotto ad interventi a base di antibotritici dicarbossimmidici (contenenti ad esempio Procimidone).
Patata contro Peronospora (Phytophtora infestans): intervenire preventivamente, alla dose di 300-500 ml per ettaro, iniziando i trattamenti quando si verificano le condizioni per l'infezione, normalmente quando le piante hanno raggiunto l'altezza di 10-15 cm., e ripetendoli ogni 6-10 giorni, in funzione della piovosità.

PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA MISCELA
Versare la quantità consigliata di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà e mescolare bene durante il completamento del riempimento. Bagnare abbondantemente ed uniformemente le superfici vegetali da proteggere onde ottenere una perfetta copertura.
Avvertenza: Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con la Dodina. In ogni caso è opportuno consultare il personale tecnico prima di effettuare miscele non sperimentate precedentemente.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cv di Vite (Moscato dei colli, Riesling Renano, Trebbiano) per cui è consigliabile, prima di effettuare applicazioni su larga scala, l'effettuazione di saggi preliminari su piccole superfici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI SU VITE 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA, 21 GIORNI PER MELO, 7 GIORNI PER LA PATATA

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

VISCHIM S.r.l.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

VISCLOR 40 L

Fungicida flowable per la difesa di pomacee, drupacee, ortaggi, patata, colture floreali ed ornamentali.

COMPOSIZIONE
- Clorotalonil puro g 40 (=500 g/l)
- Coadiuvanti e inerti q. b. a g 100

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

VISCHIM Srl
Via Friuli, 55 - 20031 Cesano Maderno (MI)

Registrazione N. 8912 del 06.08.1996 - Ministero della Sanità

Officina di produzione:
Industrie Chimiche CAFFARO SpA Adria Cavanella Po (RO)
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)

Contenuto litri 0,1-0,2-0,5-1-5-10

Partita N.:

FRASI DI RISCHIO

Molto tossico per inalazione. Irritante per le vie respiratorie. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

NORME PRECAUZIONALI

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in appositi contenitori, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi.

Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi di acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è efficace per la difesa preventiva di pomacee, drupacee, ortaggi, patata e colture floreali ed ornamentali, da Peronospora, Cladosporiosi, Septoria, Botrite, Cercospora, Sclerotinia, Alternaria, Antracnosi, Ruggine, Ticchiolatura.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle seguenti dosi per ettolitro di acqua e per ettaro con pompe a volume normale sulle seguenti colture.

COLTURE ORTICOLE

Pomodoro 200-300 ml/hl pari a 2-3 l/ha. Contro Peronospora, Alternaria, Cladosporiosi e Septoria intervenire effettuando 3 trattamenti ad intervalli regolari nel corso della stagione iniziandoli prima della comparsa dei sintomi della malattia. Per i trattamenti in serra contro le stesse malattie sono consigliati 5 trattamenti.

Sedano 200-300 ml/hl pari a 2-3 l/ha. Contro Septoria, Cercospora, Altarnaria, Sclerotinia intervenire prima della comparsa dei sintomi ripetendo il trattamento altre 2 volte in caso di necessità.

Cucurbitacee (Melone, Anguria, Cetriolo) 200-300 ml/hl pari a 2-3 l/ha. Contro Peronospora, Botrite, Alternaria, Antracnosi, Cladosporiosi effettuare 3 trattamenti sia in serra sia in pieno campo ad intervalli regolari iniziando i trattamenti prima della comparsa dei sintomi.

Cipolla: 200-300 ml/hl pari a 2-3 l/ha. Contro Peronospora, Ruggine, Botrite intervenire tempestivamente prima della comparsa dei sintomi, ripetendo il trattamento in caso di necessità.

Leguminose (fagiolo, fagiolino, pisello) 200-250 ml/hl pari a 2 /ha. Contro Antracnosi, Ruggine, Septoria, Botrite, intervenire prima della comparsa dei sintomi. Ripetere il trattamento in caso di necessità.

Patata 2.3 l/ha. Contro Peronospora ed Alternaria intervenire, effettuando il trattamento prima della comparsa dei sintomi e ripetendolo in caso di necessità.

FRUTTIFERI

Melo, Pero 100-200 ml/hl pari a 1,2-2,0 l/ha. Contro Ticchiolatura, Cancri rameali ed Alternaria del pero intervenire solo in pieno campo, sempre in miscela con altri fungicidi sistemici, quali triazoli, o di contatto quali rame, al massimo 4 volte per stagione. In caso di miscele con prodotti rameici occorre seguire le avvertenze sulla sensibilità al rame di alcune cultivars di Melo e di Pero

Pesco, Susino 100-200 ml/hl pari a 1,5-2,0 l/ha. Contro Botrytis, Bolla, Sclerotinia, Rhizopus, Gloeosporium, Penicillium, Monilia intervenire sempre in miscela con altri fungicidi sistemici, quali triazoli, benzimidazolici o dicarbossimidici al massimo 4 volte per stagione.

COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI (rosa, garofano, crisantemo, gladiolo) 250-350 ml/hl.

Contro Peronospora, Septoria, Ruggini, Alternaria, Antracnosi, Cladosporiosi e Ticchiolatura intervenire prima della comparsa dei sintomi, ripetendo il trattamento in caso di necessità. Si consiglia di effettuare saggi preliminari di sensibilità varietale prima di trattare tutta la superficie, soprattutto nel caso di colture in serra.

Preparazione della poltiglia: diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua, rimescolando con cura.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con la maggior parte dei prodotti, ad eccezione dei prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri).

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservare le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: nel caso di colture da fiore effettuare saggi preliminari su piccole superfici. Può indurre rugginosità su mele del gruppo Golden.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prime della raccolta su colture orticole e patata; 21 giorni prima della raccolta su pomacee e su Pesco, 35 giorni prima della raccolta su susino.

Tempo di rientro nell'appezzamento trattato: 12 ore in pieno campo; 24 ore in serra.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

VISCLOR 40 L

Fungicida flowable per la difesa di pomacee, drupacee, ortaggi, patata, colture floreali ed ornamentali.

COMPOSIZIONE
- Clorotalonil puro g 40 (=500 g/l)
- Coadiuvanti e inerti q. b. a g 100

VISCHIM Srl
Via Friuli, 55 - 20031 Cesano Maderno (MI)

Registrazione N. 8912 del 06.08.1996 - Ministero della Sanità

Officina di produzione:
Industrie Chimiche CAFFARO SpA Adria Cavanella Po (RO)
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)

Contenuto litri 0,1

Partita N.:

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Molto tossico per inalazione. Irritante per le vie respiratorie. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

VISCLOR 54 L

Fungicida flowable per la difesa di pomacee, drupacee, ortaggi, patata, colture floreali ed ornamentali.

COMPOSIZIONE
- Clorotalonil puro .... g 54,0 (720 g/l)
- Coadiuvanti ed inerti q. b. a ....g 100,0

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

VISCHIM Srl
Via Friuli, 55 - 20031 Cesano Maderno (MI)

Registrazione N. 7502 del 07.06.1988 - Ministero della Sanità

Officina di produzione:
Industrie Chimiche CAFFARO SpA Adria Cavanella Po (RO)
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)

Contenuto litri 0,2-0,5-1-5-10

Partita N.:

FRASI DI RISCHIO

Molto tossico per inalazione. Irritante per le vie respiratorie. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

NORME PRECAUZIONALI

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in appositi contenitori, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi.
Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi di acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è efficace per la difesa preventiva di pomacee, drupacee, ortaggi, patata e colture floreali ed ornamentali, da Peronospora, Cladosporiosi, Septoria, Botrite, Cercospora, Sclerotinia, Alternaria, Antracnosi, Ruggine, Ticchiolatura.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle seguenti dosi con pompe a volume normale sulle sottoelencate colture.

COLTURE ORTICOLE

Pomodoro: 150-225 ml/hl (1,5-2 l/ha)
Contro Peronospora, Alternaria, Cladosporiosi e Septoria intervenire effettuando 3 trattamenti ad intervalli regolari nel corso della stagione, iniziandoli prima della comparsa dei sintomi della malattia. Per i trattamenti in serra contro le stesse malattie sono consigliati 5 trattamenti.

Sedano: 150-225 ml/hl (1,5-2 l/ha)
Contro Septoria, Cercospora, Alternaria, Sclerotinia intervenire prima della comparsa dei sintomi, ripetendo il trattamento altre 2 volte in caso di necessità.

Cucurbitacee (Melone, Anguria, Cetriolo): 150-225 ml/hl (1,5-2 l/ha)
Contro Peronospora, Botrite, Alternaria, Antracnosi, Cladosporiosi effettuare 3 trattamenti, sia in serra, sia in pieno campo ad intervalli regolari, iniziandoli prima della comparsa dei sintomi.

Cipolla: 150-225 ml/hl (1,5-2 l/ha)
Contro Peronospora, Ruggine, Septoria, Botrite intervenire tempestivamente prima della comparsa dei sintomi, ripetendo il trattamento in caso di necessità.

Leguminose (Pisello, Fagiolo, Fagiolino): 150-200 ml/hl (1,5 l/ha)
Contro Antracnosi, Ruggine, Septoria, Botrite intervenire tempestivamente prima della comparsa dei sintomi, ripetendo il trattamento in caso di necessità.

PATATA: 1,5-2 l/ha
Contro Peronospora, Alternaria intervenire tempestivamente prima della comparsa dei sintomi, ripetendo il trattamento in caso di necessità.

FRUTTIFERI

Melo, Pero: 70-150 ml/hl (0,8-1,2 l/ha)
Contro Ticchiolatura, Cancri rameali ed Alternaria del pero intervenire solo in pieno campo, sempre in miscela con altri fungicidi sistemici quali triazoli, o di contatto quali rame, al massimo 4 volte per stagione. In caso di miscela con prodotti rameici occorre seguire le avvertenze sulla sensibilità al rame di alcune cultivars di Melo e di Pero.

Pesco, Susino: 70-150 ml/hl (1-1,2 l/ha)
Contro Botrite, Bolla, Sclerotinia, Rhizopus, Gloesporium, Penicillium, Monilia intervenire sempre in miscela con altri fungicidi sistemici quali triazoli, benzimidazolici o dicarbossimidici al massimo 4 volte per stagione.

COLTURE FLOREALI ed ORNAMENTALI

(rosa, garofano, crisantemo, gladiolo): 200-250 ml/hl
Contro Peronospora, Septoria, Ruggine, Alternaria, Antracnosi, Cladosporiosi e Ticchiolatura intervenire prima della comparsa dei sintomi, ripetendo il trattamento in caso di necessità. Si consiglia di effettuare saggi preliminari di sensibilità varietale prima di trattare tutta la superficie, soprattutto nel caso di colture in serra.

Preparazione della poltiglia: diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua, rimescolando con cura.

Compatibilità: il prodotto non è compatibile con i prodotti alcalini (poltiglie bordolesi, polisolfuri).

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: nel caso delle colture da fiore effettuare saggi preliminari su piccole superficie. Può indurre rugginosità su mele del gruppo Golden.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta: 14 giorni su colture orticole e patata; 21 giorni su pomacee e su Pesco; 35 giorni su Susino.

Tempo di rientro nell'appezzamento trattato: 12 ore in pieno campo; 24 ore in serra.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

VISCLOR 75 WG

Granuli idrodispersibili
Fungicida per il controllo di numerose malattie crittogamiche di melo, pero, pesco, susino, pomodoro, patata, cocomero, melone, cetriolo, cipolla, sedano, fagiolo, fagiolino

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)
- Clortalonil puro g. 75
- Coformulanti q. b. a g. 100

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

VISCHIM Srl
Via Friuli, 55 - 20031 Cesano Maderno (MI)

Registrazione Ministero della Sanità n° 9750 del 16.09.1998

Stabilimento di produzione: Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. – Divisione SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna).

Stabilimento di confezionamento: Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Aprilia (Latina).

Contenuto: 0,25-0,5-1-5-10 Kg

Partita N.:

FRASI DI RISCHIO
Molto tossico per inalazione. Irritante per le vie respiratorie. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi di acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il VISCLOR 75 WG è dotato di azione preventiva ed alta resistenza al dilavamento.
Il particolare meccanismo d'azione, non specifico, ne rende idoneo l'utilizzo per il controllo di quasi tutte le affezioni crittogamiche della parte aerea di origine non tracheomicotica, ad eccezione dell'Oidio.
Il VISCLOR 75 WG è dotato di effetto frenante nei confronti delle popolazioni degli acari fitofagi. La particolare formulazione in granuli idrodispersibili garantisce la massima semplicità d'uso e sicurezza per l'operatore, in quanto il prodotto non produce spolveramento durante le operazioni di preparazione della sospensione.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con attrezzature a volume normale (2000 l/ha per pomacee e drupacee, 600-1000 l/ha per le colture erbacee, in funzione dello sviluppo vegetativo). Nel caso di trattamenti a volume ridotto le dosi vanno opportunamente modificate in modo da somministrare il medesimo quantitativo di prodotto per unità di superficie.
MELO E PERO: Contro Ticchiolatura, Alternaria, Septoria: intervenire alla dose di 40-65 g per 100 litri di acqua (pari a 800-1300 g/ha) in miscela ad un fungicida sistemico nel periodi di maggiore suscettibilità alle malattie.
PESCO E SUSINO: Contro Bolla, Corineo, Monilla, Ruggine, Nerume, Cancri rameali: intervenire alla dose di 50-65 g per 100 litri di acqua (pari a 1050-1300 g/ha) in miscela ad un fungicida sistemico nei periodi di migliore suscettibilità alle malattie.
POMODORO E PATATA: Contro Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Cladosporiosi, Fusariosi non vascolari, Septoria, Rhizoctonia, Cercosporiosi, Muffa grigia e Muffa bianca: intervenire alla dose di 1,3-2 Kg/ha (130-200 g per 100 litri di acqua) nel periodi di maggiore sensibilità alle malattie. In caso di forti attacchi di Botrytis su pomodoro è consigliabile l'alternanza con SIALEX o SIALEX PASTA alla dose di 80-100 g/hl.
COCOMERO, MELONE E CETRIOLO: Contro. Antracnosi, Vaiolatura, Alternaria, Cladosporiosi, Rhizoctonia e Fusariosi non vascolari: intervenire alla dose di 1,3-2 Kg/ha (130-200 g per 100 litri di acqua) nei periodi di maggiore suscettibilità alle malattie.
CIPOLLA: Contro Peronospora, Alternaria, Muffa bianca e grigia: intervenire alla dose di 1,3-2 Kg/ha (130-200 g per 100 litri di acqua) nel periodi di maggiore sensibilità alle malattie.
SEDANO: Contro Septoria, Rhizoctonia, Cercospora e Sclerotinia: intervenire alla dose di 1 ,3-2 Kg/ha (130-200 g per 100 litri di acqua) nei periodi di maggiore sensibilità alle malattie.
FAGIOLO, FAGIOLINO E PISELLO: Contro Peronospora, Antracnosi e Ruggine: intervenire alla dose di 1,3-1,6 Kg/ha (130-160 g per 100 litri di acqua) nei periodi di maggiore sensibilità alle malattie.
COLTURE FLOREALI: Contro Ticchiolatura, Botrite, Ruggini, Antracnosi, Septoriosi, Fusalriosi non vascolari, Alternaria, ecc.: 130-250 g per 100 litri di acqua.

COMPATIBILITÀ: Non miscelare con oli, prodotti contenenti ferro, antiparassitari a reazione alcalina e con liquidi emulsionabili.
In generale è consigliabile evitare la concomitanza di trattamenti con olio, differendoli di almeno 20 giorni.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservare le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
AVVERTENZA: su pomodoro in serra non superare le cinque applicazioni annue. Su melo, pero, pesco e susino non superare le quattro applicazioni annue. Su sedano (in campo ed in serra), pomodoro (in campo), cocomero (in campo ed in serra), melone (in campo ed in serra), cetriolo (in campo ed in serra) non superare le tre applicazioni annue. Su fagiolo, pisello, fagiolino. cipolla e patata non superare le due applicazioni annue.
RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per gli insetti utili.
Sospendere i trattamenti 21 giorni per melo, pero, pesco, 35 giorni per susino e 14 giorni prima del raccolto per le altre colture.
Tempo di rientro dopo l'impiego: in campo (12 ore) ed in serra (24 ore).
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

06A05235

SEGUE II ELENCO

Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 162 del 14 luglio 2006 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 luglio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

MINISTERO DELLA SALUTE

Etichette di prodotti fitosanitari riclassificati ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, con decreti dirigenziali del Ministero della salute.

ELENCO II

S O M M A R I O

MINISTERO DELLA SALUTE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo alle etichette di prodotti fitosanitari riclassificati ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 con decreti dirigenziali del Ministero della salute. (II Elenco)

Si pubblica il secondo elenco di etichette di prodotti fitosanitari riclassificati ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65.

Il presente comunicato raccoglie le etichette, fornite dalle Imprese, dei prodotti fitosanitari riclassificati con decreti dirigenziali i cui allegati sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

La vendita e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in questione, confezionati con le etichette precedentemente autorizzate, è consentito fino al 30 gennaio 2007.

INDICE

SECONDO ELENCO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

KENYATOX VERDE

Insetticida liquido concentrato a base di Piretro naturale

Kenyatox Verde - Composizione
100 g di prodotto contengono

Estratto di Piretro 25%	g 16,00 (=g 150 /lt)
(pari a g 4 di piretrine attive)	
Piperonil Butossido	g 12,80 (=g 120 /lt)
Coformulanti	q.b. a g 100

N

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Reg. N° 0485 del 12.5.73 del Ministero della Salute
COPYR s.p.a. - Lgt. A. da Brescia, 9 - Roma
Officine di produzione:
Althaller Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)

Contenuto netto: ml 50 - 100 – 250 – 500; litri 1 – 5 – 10 – 20 Partita n.

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
KENYATOX VERDE è un insetticida che può essere impiegato su moltissime colture agrarie in qualsiasi stagione. KENYATOX VERDE è un insetticida di contatto con persistenza d'azione prolungata per la presenza di sostanze antiossidanti del Piretro. KENYATOX VERDE è compatibile con fertilizzanti fogliari. Non è miscelabile con la poltiglia bordolese.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

- **FRUTTICOLE**

Drupacee (susine, ciliegie, albicocche, pesche, prugne) contro Afidi, Tentredini, Tripidi: ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua;
Pomacee (mele, pere, cotogne) contro Afidi (all'inizio dell'infestazione) compreso Afide grigio del melo (in prefioritura), Tripidi, Antonomo, Psilla (prima della melata), Tentredini, Minatori (adulti) compreso Minatore delle foglie del melo, Tingide del pero: ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua;
Agrumi (pompelmi, limoni, mandarini, arance) contro Afidi, Formica argentina, Aleurodidi (adulti): ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua;
Olivo contro Cocciniglie, Tripidi: ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua;
Frutta a guscio (Mandorle e Nocciole) contro Pentatomidi (o cimici verdi), Afidi (all'inizio dell'infestazione), Tingide del mandorlo: ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua;
Frutta varia: **Vite** contro Tignola dell'uva e della vite, Cicaline, Scafoideo della vite: ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua; **Fragola** contro Afidi, Psille: ml 70-80/hl d'acqua; **Melograno** contro Afidi, Cocciniglie, Tignole: ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua; **Fico** contro Cicaline, Psilla, Cocciniglie, Tignole: ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua;

- **ORTICOLE** (esclusi i funghi)

Carciofo, Fagiolo, Lattuga, Fava, Cipolla, Carota, Cavolo contro Afidi: ml 70-80/hl d'acqua; **Cavolo** contro Cavolaia: ml 80-100/hl d'acqua; **Pomodoro** contro Moscerino bianco (adulti): ml 80/hl d'acqua; **Asparago** contro Criocera: ml 70-80/hl d'acqua; **Melanzana, Patata** contro Dorifora: ml 80-100/hl d'acqua; **Tabacco** contro Aleurodidi (Mosca Bianca), Afidi: ml 70-80/hl d'acqua;

- **FLORICOLE IN PIENO CAMPO**

Crisantemo, Garofano, Rosa contro Afidi, Aleurodidi, Tentredini: ml 70-80/hl d'acqua; contro larve di Ifantria al di sopra di 2 cm: ml 125/hl d'acqua;

- **FLOREALI E ORNAMENTALI** contro Cicaline, Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Tingidi (*Corythuca ciliata*), Coleotteri e Lepidotteri defogliatori: ml 70-80/hl d'acqua (nel caso di larve di Ifantria al di sopra di 2 cm: ml 125/hl d'acqua).

I trattamenti alle colture devono essere eseguiti bagnando abbondantemente le piante al manifestarsi delle infestazioni ed in giornate di tempo buono, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche.

FITOTOSSICITÁ: il prodotto è fitotossico su *Poinsettia* (Stella di Natale). Pertanto se ne sconsiglia l'impiego. Su varietà sensibili di floricole ed ornamentali non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari.
Intervallo di sicurezza: 2 giorni.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. NON OPERARE CONTRO VENTO. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. (NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE). 01.05

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

KENYATOX VERDE

Insetticida liquido concentrato a base di Piretro naturale

Kenyatox Verde - Composizione
100 g di prodotto contengono

Estratto di Piretro 25%	g 16,00 (=g 150 /lt)
(pari a g 4 di piretrine attive)	
Piperonil Butossido	g 12,80 (=g 120 /lt)
Coformulanti	q.b. a g 100

N

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Reg. N° 0485 del 12.5.73 del Ministero della Salute
COPYR s.p.a. - Lgt. A. da Brescia, 9 - Roma

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.
PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

01.05

BIOLIO

Olio bianco insetticida - concentrato emulsionabile (EC)

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono
Olio minerale raffinato (U.R. min. 96%) g 95,0 (788 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

AVVERTENZE
Attenzione: manipolare con prudenza.
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande.
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
BIOLIO è un insetticida liquido concentrato emulsionabile a base di olio paraffinico altamente raffinato, con insolfonabilità minima 96%. Agisce per contatto formando una sottile pellicola che avvolge l'insetto e le uova impedendone la respirazione, causandone di conseguenza la morte per asfissia.
BIOLIO è efficace per la lotta contro tutti gli insetti succhiatori (cocciniglie, psille, tingidi, tripidi, aleurodidi, metcalfa, afidi, cicaline) e contro le uova di acari. BIOLIO grazie alla sua elevata selettività può essere utilizzato per trattamenti sia invernali che primaverili-estivi su colture arboree ed erbacee, ornamentali e sempreverdi, in serra e in pieno campo.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Colture	Dosi d'impiego: campo/serra	orti / giardini
AGRUMI (arancio, mandarino, limone, cedro, pompelmo, bergamotto, chinotto, anche ornamentali)		
contro cocciniglie, afidi, acari, cimice verde, aleurodidi, uova di afidi	primavera-estate: 1,5 l/100 l d'acqua;	150 ml/10 l d'acqua;
	fine inverno: 2,5 l/100 l d'acqua;	250 ml/10 l d'acqua
POMACEE (melo, pero, nespolo, cotogno)		
contro cocciniglie, psilla, uova di afidi, cicaline, acari, metcalfa, eriofidi	primavera-estate: 1,5 l/100 l d'acqua;	150 ml/10 l d'acqua
	fine inverno: 2,5 l/100 l d'acqua;	250 ml/10 l d'acqua
DRUPACEE (pesco, susino, albicocco, ciliegio dolce e acido)		
contro cocciniglie, afidi, ragnetto rosso, cicaline, eriofidi, metcalfa, tingide	tutto l'anno: 1 - 1,5 l/100 l d'acqua;	
	tutto l'anno: 100 150 ml/10 l d'acqua	
FICO, RIBES, NOCE, NOCCIOLO, MANDORLO, CACO		
contro cocciniglie, psilla, metcalfa, cicaline, afidi, uova di afidi	tutto l'anno: 1 - 1,5 l/100 l d'acqua;	
	tutto l'anno: 100 – 150 ml/10 l d'acqua	
UVA DA VINO E DA TAVOLA		
contro cocciniglie, acari, uova di acari, cicaline, metcalfa	tutto l'anno: 1,5 l/100 l d'acqua;	150 ml/10 l d'acqua
OLIVO		
contro cocciniglie	tutto l'anno: 1,5 l/100 l d'acqua;	150 ml/10 l d'acqua
POMODORO, PEPERONE, PATATA		
contro afidi, acari, aleurodidi, ditteri agrizomidi	tutto l'anno: 1 l/100 l d'acqua;	100 ml/10 l d'acqua
FAGIOLO		
contro afidi, acari, tripidi	tutto l'anno: 1 l/100 l d'acqua;	100 ml/10 l d'acqua
CUCURBITACEE (melone, cetriolo, zucchino, zucca, cocomero)		
contro afidi, aleurodidi, tripidi, acari, ditteri agrizomidi	tutto l'anno: 1 l/100 l d'acqua;	100 ml/10 l d'acqua
CARCIOFO, SEDANO, FINOCCHIO		
contro afidi, aleurodidi, acari, ditteri agrizomidi	tutto l'anno: 1 l/100 l d'acqua;	100 ml/10 l d'acqua
FLOREALI, ORNAMENTALI		
contro afidi, uova di afidi, aleurodidi, ditteri agrizomidi, psille, cocciniglie, cicaline, acari, tripidi, tingidi, metcalfa	tutto l'anno: 1 - 1,5 l/100 l d'acqua;	
	tutto l'anno: 100 – 150 ml/10 l d'acqua	

Come coadiuvante nei trattamenti insetticidi BIOLIO può essere utilizzato alla dose di 200-300 ml / 100 l d'acqua.

Modalità d'impiego: diluire BIOLIO nel serbatoio della pompa in poca acqua; quindi portare a volume con la restante quantità d'acqua. L'emulsione così ottenuta deve essere applicata per irrorazione con una pompa a volume normale.

COMPATIBILITÀ: non è compatibile con dimetoato, captano, folpet, dinocap, polisolfuri, poltiglia bordolese e qualsiasi altro prodotto contenente zolfo. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: non effettuare trattamenti durante la fioritura. Dopo trattamenti a base di zolfo, attendere almeno 2 settimane prima di applicare BIOLIO.

Intervallo di sicurezza: 20 giorni.

Registrazione n° 9657 del 3.06.1998 del Ministero della Sanità
Copyr s.p.a.
Lgt. Della Vittoria, 9 - Roma
Officine di Produzione:
Althaller Italia S.r.L. S. Colombano al Lambro (MI)
IRCA Service S.p.A.– Fornovo S. Giovanni (BG)

Contenuto: ml 50 – 100 – 200 - 250 – 500; litri 1 – 5 – 20 Partita N.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. NON OPERARE CONTRO VENTO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

01.05

KENYATOX GRAIN PROTECTANT

Insetticida liquido concentrato emulsionabile a base di Piretro per la protezione dei cereali

Kenyatox Grain Protectant - Composizione
100 g di prodotto contengono

Estratto di Piretro 25%	g 16 (=g 150 /lt)
Piperonil Butossido tec. 80%	g 32 (=g 300,8 /lt)
Coformulanti	q.b. a g 100

N

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Reg. N° 3681 del 17.6.1980 del Ministero della Salute
COPYR s.p.a. - Lgt. A. da Brescia, 9 - Roma
Officine di produzione:
Althaller Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)

Contenuto netto: litri 1 – 5 – 10 – 20 per uso professionale Partita n.

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
KENYATOX GRAIN PROTECTANT è un insetticida liquido, concentrato emulsionabile, a base di Piretro per la protezione dei cereali. Non lascia né odore né sapore sui grani, non altera le proprietà germinative dei cereali. Non è infiammabile. KENYATOX GRAIN PROTECTANT è un concentrato da diluire in acqua ottenendo così un insetticida per la protezione dei cereali.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Pulire accuratamente magazzini e ripostigli. Preparare la soluzione sciogliendo 1 lt di KENYATOX GRAIN PROTECTANT in 19 lt d'acqua, mescolando bene il tutto. Spruzzare 1 lt di prodotto pronto all'uso su 12 q di cereali, ossia 20 lt di prodotto pronto all'uso sono sufficienti per trattare 24 t di cereali. La soluzione pronta all'uso deve essere erogata proporzionalmente al flusso di cereali. Tutta la massa del cereale deve venire a contatto con KENYATOX GRAIN PROTECTANT e pertanto occorre fare i trattamenti quando il cereale è in movimento, sia che tale movimento avvenga con nastri trasportatori o convogliatori.
Le partite dei cereali destinati all'alimentazione, una volta trattate con KENYATOX GRAIN PROTECTANT, devono essere sottoposte a prolungata ventilazione ed idonea pulitura.
Se conservato nella confezione originale l'efficacia di KENYATOX GRAIN PROTECTANT dura per parecchi anni. Il prodotto diluito, invece, deve essere usato entro 48 ore dalla preparazione.

Intervallo di sicurezza: 2 giorni.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. (NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE).

01.05

LUMAKIDIN 5G

Esca a base di Metaldeide per la lotta contro le lumache e le limacce

contiene sostanza amara anti-ingestione

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Metaldeide Acetica pura g **4**,9
Coformulanti q.b.a. g 100

AVVERTENZE
Attenzione: manipolare con prudenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande.
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego.

CARATTERISTICHE
LUMAKIDIN 5G è un formulato granulare indicato per la lotta ai molluschi gasteropodi (limacce e lumache) nocivi alla ortofrutticoltura e arboricoltura in genere. La sua natura glomerulare lo rende adatto all'uso per spargimento. LUMAKIDIN 5G agisce per ingestione, non viene asportato dal vento, né sciolto o reso inefficace dalla pioggia.

DOSI D'IMPIEGO
In orticoltura: negli orti, nei letti caldi e nelle serre LUMAKIDIN 5G va distribuito a mucchietti in ragione di ca. 10 - 15 granuli per metro quadrato.
Colture in pieno campo: i granuli di LUMAKIDIN 5G vanno sparsi su una striscia (larga metri 1,5-2) lungo il perimetro del campo onde formare degli sbarramenti protettivi. Nell'interno del campo è consigliabile collocare LUMAKIDIN 5G in mucchietti vicino alle piante da proteggere. In tutto occorrono ca. 70-100 grammi di prodotto per ogni 100 metri quadrati.

COMPATIBILITÀ
LUMAKIDIN 5G è compatibile con tutti gli antiparassitari in commercio eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero dei casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni.

Registrazione N. 5574 del 15/11/1983 del Ministero della Salute
COPYR s.p.a.
Via Lgt. A. Da Brescia, 9 – ROMA

Officina di produzione:
INDUSTRIALCHIMICA S.r.l. Via Sorgaglia – Z.I. Sorgaglia, Arre (PD)

Contenuto netto: 0,5-1-1,5 kg Lotto N. del

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

01.05

LIMAVAL

Esca lumachicida granulare per la distruzione di lumache, limacce, chiocciole e gasteropodi in genere

contiene sostanza amara anti-ingestione

COMPOSIZIONE:
100 g.di prodotto contengono:
Metaldeide acetica pura 5 g
Supporto proteico q.b.a. 100 g

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande.
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA'DI APPLICAZIONE
LIMAVAL si può impiegare per la difesa delle seguenti colture:
Ortaggi, Patata, Fragola, Floreali ed Ornamentali: contro le infestazioni da lumache, limacce, chiocciole e gasteropodi in genere.
DOSI D'IMPIEGO
5-10 kg/ha (100 grammi per 100 metri quadrati) a seconda del grado di infestazione.
MODO D'IMPIEGO
Spargere LIMAVAL, esca granulare, a spaglio o a file lungo i margini dell'area da proteggere o a mucchietti attorno alle piante, possibilmente di sera con terreno umido o dopo una eventuale pioggia. LIMAVAL agisce per ingestione e per contatto; non viene asportato dal vento né reso inefficace dalla pioggia; nell'impiego i granuli non si sfaldano, non ammuffiscono e raggiungono la migliore morbidezza e tenerezza per una efficace ingestione.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto deve essere distribuito da solo
INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni.

Registrazione N. 7101 del 26/05/1987 del Ministero della Salute
COPYR s.p.a.
Via Lgt. A. Da Brescia, 9 - ROMA
Officina di produzione:
INDUSTRIALCHIMICA S.r.l. Via Sorgaglia – Z.I. Sorgaglia, Arre (PD)

CONTENUTO NETTO: 0.2 - 1 – 5 - 25 kg Lotto N. del

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

01.05

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PIRETRO VERDE

Insetticida liquido concentrato emulsionabile a base di Piretro naturale

Piretro Verde - Composizione
100 g di prodotto contengono

Estratto di Piretro 25%	g	8,00
(pari a g 2 di piretrine attive)		
Coformulanti	q.b. a g	100

N

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Reg. N° 8558 del 3.12.94 del Ministero della Salute
COPYR s.p.a. Lgt. A da Brescia, 9 - Roma
Officine di produzione:
Althaller Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)
Diachem S.p.A. - Unità prod. Sifa - Caravaggio (BG)

Contenuto netto: ml 15 - 25 - 50 - 100 – 500; litri 1 – 5 Partita n.

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
PIRETRO VERDE è un insetticida a base di solo Piretro naturale in supporto liquido di origine vegetale e può essere impiegato su moltissime colture agrarie in qualsiasi stagione.
PIRETRO VERDE è un insetticida di contatto che agisce rapidamente contro i parassiti delle orticole, frutticole e floricole, quali Afidi, Aleurodidi (Mosca Bianca), Metcalfa, Psille, Cocciniglie, Tignole, Cavolaia, Tripidi, Tentredini, Criocera dell'asparago, Moscerino del pomodoro, Dorifora della patata e della melanzana, nonché contro gli insetti defogliatori della vegetazione, come Ifantria americana e *Galerucella luteola* o succhiatori come *Corythuca ciliata*. PIRETRO VERDE è compatibile con fertilizzanti fogliari. Non è miscelabile con la poltiglia bordolese.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

- **FRUTTICOLE**

Drupacee (susine, ciliegie, albicocche, pesche, prugne) contro Afidi, Tentredini, Tripidi: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;
Pomacee (mele, pere, cotogne) contro Afidi (all'inizio dell'infestazione) compreso Afide grigio del melo (in prefioritura), Tripidi, Antonomo, Psilla (prima della melata), Tentredini, Minatori (adulti) compreso Minatore delle foglie del melo, Tingide del pero: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;
Agrumi (pompelmi, limoni, mandarini, arance) contro Afidi, Formica argentina, Aleurodidi (**adulti**): ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;
Olivo contro Cocciniglie, Tripidi: **ml** 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 **ml/hl** d'acqua;
Frutta a guscio (Mandorle e Nocciole) contro Pentatomidi (o cimici verdi), Afidi (all'inizio dell'infestazione), Tingide del mandorlo: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;
Vite contro Tignola dell'uva e della vite, Cicaline, Scafoideo della vite: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua; **Fragola** contro Afidi, Psille: ml 140-160/hl d'acqua; **Melograno** Contro Afidi, Cocciniglie, Tignole: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua; **Fico** contro Cicaline, Psilla, Cocciniglie, Tignole: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;

- **ORTICOLE** (esclusi i funghi)

Carciofo, Fagiolo, Lattuga, Fava, Cipolla, Carota, Cavolo contro Afidi: ml 140-160/hl d'acqua; **Cavolo** contro Cavolaia: ml 160-200/hl d'acqua; **Pomodoro** contro Moscerino bianco (adulti): ml 160/hl d'acqua; **Asparago** contro Criocera: ml 140-160/hl d'acqua; **Melanzana, Patata** contro Dorifora: ml 160-200/hl d'acqua; **Tabacco** contro Aleurodidi (Mosca Bianca), Afidi: ml 140-160/hl d'acqua;

- **FLORICOLE IN PIENO CAMPO**

Crisantemo, Garofano, Rosa contro Afidi, Aleurodidi, Tentredini: ml 140-160/hl d'acqua;

- **FLOREALI E ORNAMENTALI** contro Cicaline, Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Tingidi (*Corythuca ciliata*), Coleotteri e Lepidotteri defogliatori: ml 140-160/hl d'acqua (nel caso di larve di **Ifantria** al di sopra di 2 cm: ml 250/hl d'acqua);

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata. Utilizzare volumi d'acqua e pressioni adeguate per ottenere una buona copertura della coltura. Curare in modo particolare la pagina inferiore delle foglie nel caso di Aleurodidi (mosca bianca), Tripidi e Tingidi (*Corythuca ciliata*).
Intervallo di sicurezza: 2 giorni.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. NON OPERARE CONTRO VENTO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. (NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE). 01.05

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

PIRETRO VERDE

Insetticida liquido concentrato emulsionabile a base di Piretro naturale

Piretro Verde - Composizione
100 g di prodotto contengono

Estratto di Piretro 25%	g	8,00
(pari a g 2 di piretrine attive)		
Coformulanti	q.b. a g	100

N

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Reg. N° 8558 del 3.12.94 del Ministero della Sanità
COPYR s.p.a. Lgt. A da Brescia, 9 - Roma

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

01.05

DISERBELLO

Erbicida sistemico liquido solubile

Diserbello - Composizione
100 g di prodotto contengono

GLIFOSATE* acido puro	g	30,4 (=360 g/l)
(da sale isopropilamminico)		
Coformulanti	q.b. a g	100

Xi — IRRITANTE

N — PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Rischio di gravi lesioni oculari.
Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Proteggersi gli occhi/la faccia. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Registrazione N. 9049 del 23/12/1996 del Ministero della Sanità
COPYR SPA
Lgt. A. Da Brescia, 9 - Roma
Officine di Produzione:
CHEMIA SPA - S.Agostino (FE)
DIACHEM SPA - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
L.I.F.A. SRL - Vigonovo (VE) e Isola Vicentina (VI)
ALTHALLER SRL - S. Colombano al Lambro (MI)

Contenuto: 0,100 - 0,250 - 0,5- 1 - 10- 20 - 30 - 50 litri Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

AVVERTENZE
L'efficacia erbicida puo' essere ridotta da piogge cadute entro 6 ore dal trattamento. Impiegare su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura e che non siano sofferenti per qualsiasi causa (siccità, freddo, parassiti, ecc.) che possa rendere difficoltosa la traslocazione del prodotto nelle parti ipogee della pianta. Non impiegare recipienti ed attrezzature galvanizzati o di ferro, se non protetti da vernici plastiche. Al termine del trattamento lavare accuratamente le pompe e i recipienti prima di riutilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni sensibili. L'impiego di attrezzature a sgocciolamento, tipo umettante o lambente, o munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono in prossimità della coltura.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Terreni a frutticole: pero, melo, pesco, ciliegio, albicocco, susino, mandorlo, olivo, vite, agrumi
Infestanti annuali: 2 – 4 litri/ha = 2 – 4 ml/10 mq
Gramigna (*Agropyrum r.*), Ranuncolo (*Ranunculus* spp.), Romice (*Rumex* spp.), Tarassaco (*Taraxacum o.*): 6 – 7 litri/ha = 6 - 7 ml/10 mq
Gramigna rampicante (*Cynodon* d.), Ortica (*Urtica* spp.), Cannuccia di palude (*Phragmites* spp.), Grespino (*Sonchus* spp.): 9 – 10 litri/ha = 9 – 10 ml/10 mq
Convolvolo (*Convolvulus a.*) trattamento in fioritura: 9-10 litri/ha = 9-10 ml/10 mq
Convolvolo (*Convolvulus a.*) fino a 30 cm: 12 litri/ha = 12 ml/10 mq.
I trattamenti vanno effettuati con pompe a bassa pressione (max 3 atm), impiegando 400 litri di acqua/ha = 4 litri per 100 mq. Evitare fenomeni di deriva.

Terreni destinati a colture agrarie (prima o dopo la coltivazione): ortaggi, barbabietole da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, vivai e prati.
Loglio (*Lolium* spp.), Coda di topo (*Alopecurus* spp.), Riso crodo: 2 – 3 litri/ha = 2 – 3 ml/10 mq
Riso selvatico (*Laersia o.*), Gramigna (*Agropyrum r.*): 4 – 5 litri/ha = 4 – 5 ml/10 mq
Sorghetto (*Sorghum h.*), trattamento all'inizio della fioritura: 4 – 5 litri/ha = 4 – 5 ml/10 mq
Zigolo (*Cyperus r.*): 2 trattamenti 5- 6 litri/ha = 5 – 6 ml/10 mq Gramigna rampicante (*Cynodon d.*): 10 litri/ha = 10 ml/10 mq
Convolvolo (*Convolvulus a.*): 12 litri / ha = 12 ml/10 mq.
Trattare prima o dopo la coltivazione con le infestanti emerse; effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.

Terreni incolti non destinati a colture: sedi ferroviarie, canali, fossi e scoline, aree rurali e indistriali, aree ed opere civili.
Canna (*Arundo* spp.), Giungo (*Juncus* spp.), Cannuccia (*Phragmites* spp.), Rovo (*Rubus* spp.), Lisca (*Tipha* spp.), Assenzio (*Artemisia* sp.), Gramigna (*Cynodon* spp.), Carice (*Carex* spp.), Sorghetto (*Sorghum* h.), Gramignone (*Glyceria* spp.), Convolvolo (Convolvulus spp.), Scagliola (Phalaris spp.), Panico (Paspalum spp.), Zigolo (Cyperus spp.): 6 – 12 litri/ha = 12 ml/10 mq.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. NON OPERARE CONTRO VENTO. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. (NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE). * prodotto originale Monsanto 01.05

ZOLFOSAN

Fungicida a base di zolfo e rame in polvere bagnabile finemente micronizzata

Zolfosan - Composizione
100 g di prodotto contengono

Zolfo puro (esente da selenio)	g	35
Rame metallo (da ossicloruro)	g	22
Coformulanti	q.b. a g	100

Xn — NOCIVO
N — PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Nocivo per ingestione.
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e per la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Registrazione N. 9236 del 29/5/1997 del Ministero della Salute
COPYR S.p.a.
Lgt. A. Da Brescia, 9 - Roma
Officine di Produzione:
DIACHEM SPA - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
STI SOLFOTECNICA IT S.p.a. – Cotignola (RA)
STI SOLFOTECNICA IT S.p.a. – Torrenieri – Montalcino (SI)

Contenuto: g 50 – 100 – 500 / kg 1 – 5 – 10 e 25 per uso professionale Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.
COMPATIBILITÀ: Non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con olii minerali, con Captano, DDPV, Binapacryl, Diclofluanide. Deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli olii minerali e del captano. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: Non si deve trattare durante la fioritura. Il prodotto puo' essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione su pesco, susino e alcune varietà di melo cuprosensibili (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgendult, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero cuprosensibili (Abate Fatel, Buona Luigia D'avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser Butirra Giffard). Su queste varietà di sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
CARATTERISTICHE
ZOLFOSAN è un anticrittogamico ad ampio spettro d'azione poiché associa la ben nota azione antioidica dello zolfo elementare all'azione antifungina dei composti del rame. Grazie alle sue caratteristiche ZOLFOSAN puo' essere usato per una vastissima gamma di affezioni crittogamiche delle colture orticole, frutticole, floricole ed ornamentali.
EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Si versa nella quantità di acqua stabilita, agitando per alcuni minuti fino alla formazione di una poltiglia omogenea.
Frutticole: VITE: contro peronospora ed oidio con azione collaterale contro botrite: 400-600 g/hl = 40-60 g x 10 l d'acqua
DRUPACEE: contro bolla, corineo, oidio e moniliosi: 600-800 g/hl = 60-80 g x 10 l d'acqua
MELO, PERO: contro oidio, ticchiolatura (*Venturia inequalis*) e cancri rameali del melo e ticchiolatura (*Venturia pirina)*, maculatura bruna e necrosi batterica del pero: in pre-fioritura (gemma rigonfia): 400-600 g/hl = 40-60 g x 10 l d'acqua; nei trattamenti autunno-invernali: 600-800 g/hl = 60-80 g x 10 l d'acqua
AGRUMI: contro mal secco (*Phoma tracheiphyla*), batteriosi (*Pseudomonsa siringae*) e allupatura (*Phytophtora* spp.): 400-600 g/hl = 40-60 g x 10 l d'acqua
OLIVO: contro occhio di pavone (*Cicloconium* – lebbra): 400-600 g/hl = 40-60 g x 10 l d'acqua
Orticole: ORTAGGI: carciofo, cavolo, cetriolo, cicoria, cipolla, erba cipollina, fava, fagiolo, fagiolino, finocchio, melanzana, melone, cocomero, peperone, pisello, pomodoro, porro, prezzemolo, indivia, lattuga, radicchio, rucola, scarola, rapa, ravanello, sedano, spinaci, zucca, zucchino: contro peronospora (*Phytophtora infestans)*, alternaria (*Alternaria alternata*) e oidio: 400-600 g/hl = 40-60 g x 10 l d'acqua
PATATA: contro peronospora (*Phytophtora infestans*), alternaria (*Alternaria solani)*: 400-600 g/hl = 40-60 g x 10 l d'acqua.
Intervallo di sicurezza: 20 giorni.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. NON OPERARE CONTRO VENTO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. (NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE).
01.05

OLIOVAL

EMULSIONE LIQUIDA DI OLIO BIANCO

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
Olio minerale bianco paraffinico puro g 80 (insolfonabilità minima 95%)
Coformulanti e Solvente q.b. a g 100

AVVERTENZE
Attenzione: manipolare con prudenza.
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande.
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
OLIOVAL si usa principalmente nella lotta alle cocciniglie, uova di acari, afidi, forme svernanti di psilla, lepidotteri minatori, tingidi.
Le dosi espresse per 100 litri d'acqua sono le seguenti:
Pomacee: 3.5-4.5 l (trattamenti invernali); 1.2 l (trattamenti primaverili-estivi). Nel trattamento di fine inverno, per la lotta a lepidotteri, psillidi, tingidi, cocciniglie, aggiungere ml 250 di un presidio sanitario a base di parathion al 20%.
Drupacee: 2.5-3.5 l (trattamenti di fine inverno.) Aggiungere ml 250 di un presidio sanitario a base di parathion al 20% per la lotta a lepidotteri, afidi e 450 g di un presidio sanitario a base di ziram o tiram all'80% per la lotta al Corineo ed alla Bolla;
Agrumi: 1.2 l (durante il periodo vegetativo)
Olivo: 1.2- l (in pre – fioritura)
Piante ed arbusti ornamentali: 1.2 l (durante il periodo vegetativo). Con piante più sensibili, tipo Taxus, Oleandro, Lauro abbassare le dosi.
OLIOVAL è usato comunemente alla dose di 8-10 l/ha, in miscela con diserbanti selettivi triazinici nel diserbo in post-emergenza del mais.
OLIOVAL deve essere emulsionato in poca acqua e successivamente aggiunto alla quantità d'acqua necessaria, agitando bene.

COMPATIBILITA'
E' miscelabile con gli antiparassitari di uso comune ad eccezione di quelli contenenti calce, zolfo, dinocap, zineb, captano, mancozeb, e derivati. Non usare i prodotti anzidetti 2-3 settimane prima o dopo il trattamento con OLIOVAL.
Per lo zolfo è sufficiente un intervallo di 1-2 settimane.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: in caso di miscele, attenzione alle eventuali limitazioni per i formulati aggiunti.
Intervallo di sicurezza: 20 giorni.

Registrazione N. 9357 del 17.9.97 del Ministero della Salute
COPYR S.p.a.
Via Lgt. A. Da Brescia, 9 - Roma
Officine di Produzione:
CHEMIA S.p.a. - S. Agostino (FE)
DIACHEM S.p.a. - Albano S. Alessandro (BG)
L.I.F.A. s.r.l.- Vigonovo (VE)

PARTITA N.
Contenuto netto: litri 0.5 - 1 - 10 - 30 200

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

01.05

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PIRETRUM 40

Insetticida liquido concentrato a base di Piretro naturale

Piretrum 40 - Composizione
100 g di prodotto contengono

Estratto di Piretro 25% (pari a g 4 di piretrine attive)	g 16,00 (=g 150 /lt)
Piperonil Butossido	g 12,80 (=g 120 /lt)
Coformulanti	q.b. a g 100

N

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Reg. N° 10489 del 10.05.2000 del Ministero della Salute
COPYR s.p.a. - Lgt. A. da Brescia, 9 - Roma
Officine di produzione:
Althaller Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)

Contenuto netto: ml 50 - 100 – 250 – 500; litri 1 – 5 – 10 – 20 Partita n.

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
PIRETRUM 40 è un insetticida che può essere impiegato su moltissime colture agrarie in qualsiasi stagione. PIRETRUM 40 è un insetticida di contatto con persistenza d'azione prolungata per la presenza di sostanze antiossidanti del Piretro. PIRETRUM 40 è compatibile con fertilizzanti fogliari. Non è miscelabile con la poltiglia bordolese.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

- **FRUTTICOLE**

Drupacee (susine, ciliegie, albicocche, pesche, prugne) contro Afidi, Tentredini, Tripidi: ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua;
Pomacee (mele, pere, cotogne) contro Afidi (all'inizio dell'infestazione) compreso Afide grigio del melo (in prefioritura), Tripidi, Antonomo, Psilla (prima della melata), Tentredini, Minatori (adulti) compreso Minatore delle foglie del melo, Tingide del pero: ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua;
Agrumi (pompelmi, limoni, mandarini, arance) contro Afidi, Formica argentina, Aleurodidi (adulti): ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua;
Olivo contro Cocciniglie, Tripidi: ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua;
Frutta a guscio (Mandorle e Nocciole) contro Pentatomidi (o cimici verdi), Afidi (all'inizio dell'infestazione), Tingide del mandorlo: ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua;
Frutta varia: **Vite** contro Tignola dell'uva e della vite, Cicaline, Scafoideo della vite: ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua; **Fragola** contro Afidi, Psille: ml 70-80/hl d'acqua; **Melograno** contro Afidi, Cocciniglie, Tignole: ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua; **Fico** contro Cicaline, Psilla, Cocciniglie, Tignole: ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua;

- **ORTICOLE** (esclusi i funghi)

Carciofo, Fagiolo, Lattuga, Fava, Cipolla, Carota, Cavolo contro Afidi: ml 70-80/hl d'acqua; **Cavolo** contro Cavolaia: ml 80-100/hl d'acqua; **Pomodoro** contro Moscerino bianco (adulti): ml 80/hl d'acqua; **Asparago** contro Criocera: ml 70-80/hl d'acqua; **Melanzana, Patata** contro Dorifora: ml 80-100/hl d'acqua; **Tabacco** contro Aleurodidi (Mosca Bianca), Afidi: ml 70-80/hl d'acqua;

- **FLORICOLE IN PIENO CAMPO**

Crisantemo, Garofano, Rosa contro Afidi, Aleurodidi, Tentredini: ml 70-80/hl d'acqua; contro larve di Ifantria al di sopra di 2 cm: ml 125/hl d'acqua;

- **FLOREALI E ORNAMENTALI** contro Cicaline, Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Tingidi (*Corythuca ciliata*), Coleotteri e Lepidotteri defogliatori: ml 70-80/hl d'acqua (nel caso di larve di Ifantria al di sopra di 2 cm: ml 125/hl d'acqua).

I trattamenti alle colture devono essere eseguiti bagnando abbondantemente le piante al manifestarsi delle infestazioni ed in giornate di tempo buono, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche.

FITOTOSSICITÁ: il prodotto è fitotossico su *Poinsettia* (Stella di Natale). Pertanto se ne sconsiglia l'impiego. Su varietà sensibili di floricole ed ornamentali non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari.

Intervallo di sicurezza: 2 giorni.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. NON OPERARE CONTRO VENTO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. (NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE).

01.05

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

PIRETRUM 40

Insetticida liquido concentrato a base di Piretro naturale

Piretrum 40 - Composizione
100 g di prodotto contengono

Estratto di Piretro 25% (pari a g 4 di piretrine attive)	g 16,00 (=g 150 /lt)
Piperonil Butossido	g 12,80 (=g 120 /lt)
Coformulanti	q.b. a g 100

N

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Reg. N° 10489 del 10.05.2000 del Ministero della Salute
COPYR s.p.a. - Lgt. A. da Brescia, 9 - Roma

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

01.05

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PIR-NATURE

Insetticida liquido concentrato a base di Piretro naturale

Pir-Nature - Composizione
100 g di prodotto contengono

Estratto di Piretro 25%	g 16,00 (=g 150 /lt)
(pari a g 4 di piretrine attive)	
Piperonil Butossido	g 12,80 (=g 120 /lt)
Coformulanti	q.b. a g 100

N

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Reg. N° 10510 del 14.06.2000 del Ministero della Salute
COPYR s.p.a. - Lgt. A. da Brescia, 9 - Roma
Officine di produzione:
Althaller Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)

Contenuto netto: ml 50 - 100 – 250 – 500; litri 1 – 5 – 10 – 20 Partita n.

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
PIR-NATURE è un insetticida che può essere impiegato su moltissime colture agrarie in qualsiasi stagione. PIR-NATURE è un insetticida di contatto con persistenza d'azione prolungata per la presenza di sostanze antiossidanti del Piretro. PIR-NATURE è compatibile con fertilizzanti fogliari. Non è miscelabile con la poltiglia bordolese.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

- **FRUTTICOLE**

Drupacee (susine, ciliegie, albicocche, pesche, prugne) contro Afidi, Tentredini, Tripidi: ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua;
Pomacee (mele, pere, cotogne) contro Afidi (all'inizio dell'infestazione) compreso Afide grigio del melo (in prefioritura), Tripidi, Antonomo, Psilla (prima della melata), Tentredini, Minatori (adulti) compreso Minatore delle foglie del melo, Tingide del pero: ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua;
Agrumi (pompelmi, limoni, mandarini, arance) contro Afidi, Formica argentina, Aleurodidi (adulti): ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua;
Olivo contro Cocciniglie, Tripidi: ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua;
Frutta a guscio (Mandorle e Nocciole) contro Pentatomidi (o cimici verdi), Afidi (all'inizio dell'infestazione), Tingide del mandorlo: ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua;
Frutta varia: **Vite** contro Tignola dell'uva e della vite, Cicaline, Scafoideo della vite: ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua; **Fragola** contro Afidi, Psille: ml 70-80/hl d'acqua; **Melograno** contro Afidi, Cocciniglie, Tignole: ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua; **Fico** contro Cicaline, Psilla, Cocciniglie, Tignole: ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua;

- **ORTICOLE** (esclusi i funghi)

Carciofo, Fagiolo, Lattuga, Fava, Cipolla, Carota, Cavolo contro Afidi: ml 70-80/hl d'acqua; **Cavolo** contro Cavolaia: ml 80-100/hl d'acqua; **Pomodoro** contro Moscerino bianco (adulti): ml 80/hl d'acqua; **Asparago** contro Criocera: ml 70-80/hl d'acqua; **Melanzana, Patata** contro Dorifora: ml 80-100/hl d'acqua; **Tabacco** contro Aleurodidi (Mosca Bianca), Afidi: ml 70-80/hl d'acqua;

- **FLORICOLE IN PIENO CAMPO**

Crisantemo, Garofano, Rosa contro Afidi, Aleurodidi, Tentredini: ml 70-80/hl d'acqua; contro larve di Ifantria al di sopra di 2 cm: ml 125/hl d'acqua;

- **FLOREALI E ORNAMENTALI** contro Cicaline, Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Tingidi (*Corythuca ciliata*), Coleotteri e Lepidotteri defogliatori: ml 70-80/hl d'acqua (nel caso di larve di Ifantria al di sopra di 2 cm: ml 125/hl d'acqua).

I trattamenti alle colture devono essere eseguiti bagnando abbondantemente le piante al manifestarsi delle infestazioni ed in giornate di tempo buono, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto è fitotossico su *Poinsettia* (Stella di Natale). Pertanto se ne sconsiglia l'impiego. Su varietà sensibili di floricole ed ornamentali non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari.

Intervallo di sicurezza: 2 giorni.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. NON OPERARE CONTRO VENTO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. (NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE).

01.05

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

PIR-NATURE

Insetticida liquido concentrato a base di Piretro naturale

Pir-Nature - Composizione
100 g di prodotto contengono

Estratto di Piretro 25%	g 16,00 (=g 150 /lt)
(pari a g 4 di piretrine attive)	
Piperonil Butossido	g 12,80 (=g 120 /lt)
Coformulanti	q.b. a g 100

N

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Reg. N° 10510 del 14.06.2000 del Ministero della Salute
COPYR s.p.a. - Lgt. A. da Brescia, 9 - Roma

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

01.05

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PIRESAN PLUS

Insetticida liquido concentrato a base di Piretro naturale

Piresan Plus - Composizione
100 g di prodotto contengono

Estratto di Piretro 25% (pari a g 4 di piretrine attive)	g 16,00 (=g 150 /lt)
Piperonil Butossido	g 12,80 (=g 120 /lt)
Coformulanti	q.b. a g 100

N

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Reg. N° 10518 del 14.06.2000 del Ministero della Salute
COPYR s.p.a. - Lgt. A. da Brescia, 9 - Roma
Officine di produzione:
Althaller Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)
Diachem S.p.A. u.p. SIFA – Caravaggio (BG)

Contenuto netto: ml 50 - 100 – 250 – 500; litri 1 – 5 – 10 – 20 Partita n.

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
PIRESAN PLUS è un insetticida che può essere impiegato su moltissime colture agrarie in qualsiasi stagione. PIRESAN PLUS è un insetticida di contatto con persistenza d'azione prolungata per la presenza di sostanze antiossidanti del Piretro. PIRESAN PLUS è compatibile con fertilizzanti fogliari. Non è miscelabile con la poltiglia bordolese.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

- **FRUTTICOLE**

Drupacee (susine, ciliegie, albicocche, pesche, prugne) contro Afidi, Tentredini, Tripidi: ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua;
Pomacee (mele, pere, cotogne) contro Afidi (all'inizio dell'infestazione) compreso Afide grigio del melo (in prefioritura), Tripidi, Antonomo, Psilla (prima della melata), Tentredini, Minatori (adulti) compreso Minatore delle foglie del melo, Tingide del pero: ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua;
Agrumi (pompelmi, limoni, mandarini, arance) contro Afidi, Formica argentina, Aleurodidi (adulti): ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua;
Olivo contro Cocciniglie, Tripidi: ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua;
Frutta a guscio (Mandorle e Nocciole) contro Pentatomidi (o cimici verdi), Afidi (all'inizio dell'infestazione), Tingide del mandorlo: ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua;
Frutta varia: Vite contro Tignola dell'uva e della vite, Cicaline, Scafoideo della vite: ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua; **Fragola** contro Afidi, Psille: ml 70-80/hl d'acqua; **Melograno** contro Afidi, Cocciniglie, Tignole: ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua; **Fico** contro Cicaline, Psilla, Cocciniglie, Tignole: ml 70-80/hl d'acqua; Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua;

- **ORTICOLE** (esclusi i funghi)

Carciofo, Fagiolo, Lattuga, Fava, Cipolla, Carota, Cavolo contro Afidi: ml 70-80/hl d'acqua; **Cavolo** contro Cavolaia: ml 80-100/hl d'acqua; **Pomodoro** contro Moscerino bianco (adulti): ml 80/hl d'acqua; **Asparago** contro Criocera: ml 70-80/hl d'acqua; **Melanzana, Patata** contro Dorifora: ml 80-100/hl d'acqua; **Tabacco** contro Aleurodidi (Mosca Bianca), Afidi: ml 70-80/hl d'acqua;

- **FLORICOLE IN PIENO CAMPO**

Crisantemo, Garofano, Rosa contro Afidi, Aleurodidi, Tentredini: ml 70-80/hl d'acqua; contro larve di Ifantria al di sopra di 2 cm: ml 125/hl d'acqua;

- **FLOREALI E ORNAMENTALI** contro Cicaline, Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Tingidi (*Corythuca ciliata*), Coleotteri e Lepidotteri defogliatori: ml 70-80/hl d'acqua (nel caso di larve di Ifantria al di sopra di 2 cm: ml 125/hl d'acqua).

I trattamenti alle colture devono essere eseguiti bagnando abbondantemente le piante al manifestarsi delle infestazioni ed in giornate di tempo buono, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche.

FITOTOSSICITÁ: il prodotto è fitotossico su *Poinsettia* (Stella di Natale). Pertanto se ne sconsiglia l'impiego. Su varietà sensibili di floricole ed ornamentali non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari.
Intervallo di sicurezza: 2 giorni.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. NON OPERARE CONTRO VENTO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. (NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE). 01.05

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

PIRESAN PLUS

Insetticida liquido concentrato a base di Piretro naturale

Piresan Plus - Composizione
100 g di prodotto contengono

Estratto di Piretro 25%	g 16,00 (=g 150 /lt)
(pari a g 4 di piretrine attive)	
Piperonil Butossido	g 12,80 (=g 120 /lt)
Coformulanti	q.b. a g 100

N

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Reg. N° 10518 del 14.06.2000 del Ministero della Salute
COPYR s.p.a. - Lgt. A. da Brescia, 9 - Roma

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

01.05

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

BIOPIREN PLUS

Insetticida liquido concentrato emulsionabile a base di Piretro naturale

Biopiren Plus - Composizione
100 g di prodotto contengono

Estratto di Piretro 25%	g	8,00
(pari a g 2 di piretrine attive)		
Coformulanti	q.b. a g	100

N

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Reg. N° 10588 del 6/9/2000 del Ministero della Salute
COPYR s.p.a. Lgt. A da Brescia, 9 - Roma
Officine di produzione:
Althaller Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
IRCA Service s.p.a. - Fornovo S. Giovanni (BG)
Diachem s.p.a. - Unità prod. Sifa - Caravaggio (BG)

Contenuto netto: ml 15 - 25 - 50 - 100 – 500; litri 1 – 5 Partita n.

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE
BIOPIREN PLUS è un insetticida a base di solo Piretro naturale in supporto liquido di origine vegetale e può essere impiegato su moltissime colture agrarie in qualsiasi stagione.
BIOPIREN PLUS è un insetticida di contatto che agisce rapidamente contro i parassiti delle orticole, frutticole e floricole, quali Afidi, Aleurodidi (Mosca Bianca), Metcalfa, Psille, Cocciniglie, Tignole, Cavolaia, Tripidi, Tentredini, Criocera dell'asparago, Moscerino del pomodoro, Dorifora della patata e della melanzana, nonché contro gli insetti defogliatori della vegetazione, come Ifantria americana e *Galerucella luteola* o succhiatori come *Corythucha ciliata*. BIOPIREN PLUS è compatibile con fertilizzanti fogliari. Non è miscelabile con la poltiglia bordolese.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

- **FRUTTICOLE**

Drupacee (susine, ciliegie, albicocche, pesche, prugne) contro Afidi, Tentredini, Tripidi: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;
Pomacee (mele, pere, cotogne) contro Afidi (all'inizio dell'infestazione) compreso Afide grigio del melo (in prefioritura), Tripidi, Antonomo, Psilla (prima della melata), Tentredini, Minatori (adulti) compreso Minatore delle foglie del melo, Tingide del pero: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;
Agrumi (pompelmi, limoni, mandarini, arance) contro Afidi, Formica argentina, Aleurodidi (**adulti**): ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;
Olivo contro Cocciniglie, Tripidi: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;
Frutta a guscio (Mandorle e Nocciole) contro Pentatomidi (o cimici verdi), Afidi (all'inizio dell'infestazione), Tingide del mandorlo: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;
Vite contro Tignola dell'uva e della vite, Cicaline, Scafoideo della vite: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua; **Fragola** contro Afidi, Psille: ml 140-160/hl d'acqua; **Melograno** Contro Afidi, Cocciniglie, Tignole: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua; **Fico** contro Cicaline, Psilla, Cocciniglie, Tignole: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;

- **ORTICOLE** (esclusi i funghi)

Carciofo, Fagiolo, Lattuga, Fava, Cipolla, Carota, Cavolo contro Afidi: ml 140-160/hl d'acqua; **Cavolo** contro Cavolaia: ml 160-200/hl d'acqua; **Pomodoro** contro Moscerino bianco (adulti): ml 160/hl d'acqua; **Asparago** contro Criocera: ml 140-160/hl d'acqua; **Melanzana, Patata** contro Dorifora: ml 160-200/hl d'acqua; **Tabacco** contro Aleurodidi (Mosca Bianca), Afidi: ml 140-160/hl d'acqua;

- **FLORICOLE IN PIENO CAMPO**

Crisantemo, Garofano, Rosa contro Afidi, Aleurodidi, Tentredini: ml 140-160/hl d'acqua;

- **FLOREALI E ORNAMENTALI** contro Cicaline, Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Tingidi (*Corythuca ciliata*), Coleotteri e Lepidotteri defogliatori: ml 140-160/hl d'acqua (nel caso di larve di Ifantria al di sopra di 2 cm: ml 250/hl d'acqua).

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata. Utilizzare volumi d'acqua e pressioni adeguate per ottenere una buona copertura della coltura. Curare in modo particolare la pagina inferiore delle foglie nel caso di Aleurodidi (mosca bianca), Tripidi e Tingidi (*Corythuca ciliata*).
Intervallo di sicurezza: 2 giorni.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. NON OPERARE CONTRO VENTO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. (NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE).
1.05

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

BIOPIREN PLUS

Insetticida liquido concentrato emulsionabile a base di Piretro naturale

Biopiren Plus - Composizione
100 g di prodotto contengono

Estratto di Piretro 25% (pari a g 2 di piretrine attive)	g	8,00
Coformulanti	q.b. a g	100

N

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Reg. N° 10588 del 6/9/2000 del Ministero della Salute
COPYR s.p.a. Lgt. A da Brescia, 9 - Roma

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATONON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

01.05

FITOGREEN

Insetticida liquido concentrato emulsionabile a base di Piretro naturale

Fitogreen - Composizione
100 g di prodotto contengono

Estratto di Piretro 25%	g	8,00
(pari a g 2 di piretrine attive)		
Coformulanti	q.b. a g	100

N

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Reg. N° 10589 del 6/9/2000 del Ministero della Salute
COPYR s.p.a. Lgt. A da Brescia, 9 - Roma
Officine di produzione:
Althaller Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)
Diachem S.p.A. - Unità prod. Sifa - Caravaggio (BG)

Contenuto netto: ml 15 - 25 - 50 - 100 – 500; litri 1 – 5 Partita n.

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE
FITOGREEN è un insetticida a base di solo Piretro naturale in supporto liquido di origine vegetale e può essere impiegato su moltissime colture agrarie in qualsiasi stagione.
FITOGREEN è un insetticida di contatto che agisce rapidamente contro i parassiti delle orticole, frutticole e floricole, quali Afidi, Aleurodidi (Mosca Bianca), Metcalfa, Psille, Cocciniglie, Tignole, Cavolaia, Tripidi, Tentredini, Criocera dell'asparago, Moscerino del pomodoro, Dorifora della patata e della melanzana, nonché contro gli insetti defogliatori della vegetazione, come Ifantria americana e *Galerucella luteola* o succhiatori come *Corythuca ciliata*. FITOGREEN è compatibile con fertilizzanti fogliari. Non è miscelabile con la poltiglia bordolese.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

- **FRUTTICOLE**

Drupacee (susine, ciliegie, albicocche, pesche, prugne) contro Afidi, Tentredini, Tripidi: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;
Pomacee (mele, pere, cotogne) contro Afidi (all'inizio dell'infestazione) compreso Afide grigio del melo (in prefioritura), Tripidi, Antonomo, Psilla (prima della melata), Tentredini, Minatori (adulti) compreso Minatore delle foglie del melo, Tingide del pero: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;
Agrumi (pompelmi, limoni, mandarini, arance) contro Afidi, Formica argentina, Aleurodidi (**adulti**): ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;
Olivo contro Cocciniglie, Tripidi: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;
Frutta a guscio (Mandorle e Nocciole) contro Pentatomidi (o cimici verdi), Afidi (all'inizio dell'infestazione), Tingide del mandorlo: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;
Vite contro Tignola dell'uva e della vite, Cicaline, Scafoideo della vite: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua; **Fragola** contro Afidi, Psille: ml 140-160/hl d'acqua; **Melograno** Contro Afidi, Cocciniglie, Tignole: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua; **Fico** contro Cicaline, Psilla, Cocciniglie, Tignole: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;

- **ORTICOLE** (esclusi i funghi)

Carciofo, Fagiolo, Lattuga, Fava, Cipolla, Carota, Cavolo contro Afidi: ml 140-160/hl d'acqua; **Cavolo** contro Cavolaia: ml 160-200/hl d'acqua; **Pomodoro** contro Moscerino bianco (adulti): ml 160/hl d'acqua; **Asparago** contro Criocera: ml 140-160/hl d'acqua; **Melanzana, Patata** contro Dorifora: ml 160-200/hl d'acqua; **Tabacco** contro Aleurodidi (Mosca Bianca), Afidi: ml 140-160/hl d'acqua;

- **FLORICOLE IN PIENO CAMPO**

Crisantemo, Garofano, Rosa contro Afidi, Aleurodidi, Tentredini: ml 140-160/hl d'acqua;

- **FLOREALI E ORNAMENTALI** contro Cicaline, Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Tingidi (*Corythuca ciliata*), Coleotteri e Lepidotteri defogliatori: ml 140-160/hl d'acqua (nel caso di larve di Ifantria al di sopra di 2 cm: ml 250/hl d'acqua);

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata. Utilizzare volumi d'acqua e pressioni adeguate per ottenere una buona copertura della coltura. Curare in modo particolare la pagina inferiore delle foglie nel caso di Aleurodidi (mosca bianca), Tripidi e Tingidi (*Corythuca ciliata*).
Intervallo di sicurezza: 2 giorni.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. NON OPERARE CONTRO VENTO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. (NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE). 1.05

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

FITOGREEN

Insetticida liquido concentrato emulsionabile a base di Piretro naturale

Fitogreen - Composizione
100 g di prodotto contengono

Estratto di Piretro 25%	g	8,00
(pari a g 2 di piretrine attive)		
Coformulanti	q.b. a g	100

N

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Reg. N° 10589 del 6/9/2000 del Ministero della Salute
COPYR s.p.a. Lgt. A da Brescia, 9 - Roma

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

01.05

PIRETRO GARDEN
Insetticida pronto all'uso a base di Piretro naturale
per piante ornamentali e fiori da balcone, appartamento e giardino domestico

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono

Piretrine		g 0,075
(pari a g 0,3 di Estratto di Piretro 25%)		
Piperonil Butossido		g 0,564
Coformulanti	q.b. a	g 100

AVVERTENZE
Attenzione: manipolare con prudenza.
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande.
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego.

PRECAUZIONI D'USO
Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
PIRETRO GARDEN è un insetticida di contatto a base di Piretro naturale, che protegge le piante fiorite (come Rosa, Azalea, Begonia, Geranio, Ortensia, Oleandro), le piante verdi da appartamento (come Ficus, Dracaena, Filodendro, Felce) e le piante ornamentali in genere dall'azione dannosa di insetti come afidi, aleurodidi (mosche bianche), tentredini, tripidi, tingidi, ragnetti rossi, coleotteri e lepidotteri defogliatori e larve di Ifantria.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Agitare bene prima dell'uso ed irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm bagnando in modo uniforme tutta la superficie, compresa la pagina inferiore delle foglie. Trattare al manifestarsi delle infestazioni e, se occorre, ripetere l'operazione 8-10 giorni dopo il primo trattamento.

Prodotto Fitosanitario PPO
Reg. N° 10816/PPO del 11/2/2001 del Ministero della Salute
Copyr s.p.a. - Lgt. A. da Brescia, 9 - Roma
Officine di produzione:
Althaller Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)

Contenuto netto: ml 200 – 350 - 500 – 750 - 1000
Partita n. Validità: 2 anni

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

01.05

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

KENYAGREEN

Insetticida liquido concentrato a base di Piretro naturale
per piante ornamentali e fiori da balcone, appartamento e giardino domestico

Kenyagreen - Composizione
100 g di prodotto contengono

Estratto di Piretro 25% (pari a g 4 di piretrine attive)	g 16,00 (=g 150 /lt)
Piperonil Butossido	g 12,80 (=g 120 /lt)
Coformulanti	q.b. a g 100

N

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Prodotto Fitosanitario PPO
Reg. N° 10818/PPO del 11/4/2001del Ministero della Salute
COPYR s.p.a. - Lgt. A. da Brescia, 9 - Roma
Officine di produzione:
Althaller Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)
Diachem S.p.A. - Unità prod. SIFA - Caravaggio (BG)

Contenuto netto: ml 10 - 50 - 100
Partita N. Validità: 2 anni

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
KENYAGREEN è un insetticida di contatto ad azione rapida e prolungata in virtù della particolare formulazione, è inodore e non è infiammabile.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il KENYAGREEN va impiegato diluito in acqua alla percentuale dello 0,1% c.a (pari ad esempio a 5 ml per 5 lt d'acqua).

- Floreali ed ornamentali

contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Cicaline, Tingidi, Tentredini	ml 10	pari a 1/3 del misurino per 10 lt acqua
contro Coleotteri e Lepidotteri defogliatori	ml 10	pari a 1/3 del misurino per 10 lt acqua
contro larve di Ifantria	ml 15	pari a 1/2 del misurino per 10 lt acqua

I trattamenti devono essere eseguiti bagnando abbondantemente le piante al manifestarsi delle infestazioni senza giungere a far gocciolare le foglie.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

01.05

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

KENYAGREEN

Insetticida liquido concentrato a base di Piretro naturale
per piante ornamentali e fiori da balcone, appartamento e giardino domestico

Kenyagreen - Composizione
100 g di prodotto contengono

Estratto di Piretro 25%	g 16,00 (=g 150 /lt)
(pari a g 4 di piretrine attive)	
Piperonil Butossido	g 12,80 (=g 120 /lt)
Coformulanti	q.b. a g 100

N

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Prodotto Fitosanitario PPO
Reg. N° 10818/PPO del 11/4/2001del Ministero della Salute
COPYR s.p.a. - Lgt. A. da Brescia, 9 – Roma

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

01.05

BLOW

Insetticida aerosol a base di Piretro naturale
per piante ornamentali e fiori da balcone, appartamento giardino domestico

Blow - Composizione
100 g di prodotto contengono:

Piretrine	g 0,1875
(pari a g 0,75 di estratto di Piretro 25%)	
Piperonil Butossido	g 0,880
Coformulanti	q.b. a 100

F+

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

Frasi R – Estremamente infiammabile.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille – non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Prodotto Fitosanitario PPO
Registrazione N°10819 /PPO del 11/4/2001 del Ministero della Salute
Copyr s.p.a. - Lgt. A. da Brescia, 9 - Roma
Officina di produzione:
Tosvar s.a.s. - Pozzo d'Adda (MI)

Contenuto netto: ml 250 - 300 - 400 – 500
Lotto n. Validità: 3 anni

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.

PRECAUZIONI D'USO
Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
L'aerosol insetticida BLOW è a base di Piretro naturale, dalla ben nota azione abbattente ed insetto repellente.
BLOW è formulato in modo da garantire il controllo rapido e totale di tutti gli insetti nocivi quali afidi, tripidi, aleurodidi, tentredini, coleotteri e lepidotteri defogliatori, larve di Ifantria, che colpiscono piante fiorite (Rosa, Azalea, Begonia, Geranio, Ortensia, Oleandro), piante verdi da appartamento (Ficus, Dracaena, Filodendro, Felce) e piante ornamentali in genere.

AGITARE PRIMA DELL'USO

MODALITÀ D'IMPIEGO
Nebulizzare il prodotto sul fogliame con moto uniforme alla comparsa dei parassiti, senza giungere a far gocciolare le foglie (5 secondi c.a per una pianta di medie dimensioni).
Limitare l'applicazione alla pianta; dirigere il getto lontano dalle persone e non disperdere il preparato nell'aria per evitare eventuali accumuli di gas infiammabile. Evitare di sostare in locali chiusi ed angusti. È consigliabile tenere bambini ed animali domestici lontani dalle piante irrorate, finché la vegetazione non sia asciutta. Areare il locale prima di soggiornarvi nuovamente.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. NON OPERARE CONTRO VENTO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. 01.05

ACC

NON CONTIENE PROPELLENTI RITENUTI DANNOSI PER L'OZONO

LIMATER

Esca lumachicida granulare con sostanze attrattive per combattere lumache, limacce, chiocciole e gasteropodi in genere per piante ornamentali e fiori da balcone, appartamento e giardino domestico

contiene sostanza amara anti-ingestione

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Metaldeide acetica pura g 5
Supporto proteico q.b.a g 100

AVVERTENZE
Attenzione: manipolare con prudenza.
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande.
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego.

PRECAUZIONI D'USO
Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
L'esca lumachicida granulare LIMATER attira lumache, limacce, chiocciole e gasteropodi in genere, grazie alle proteine ed i supporti adescanti e li distrugge agendo per contatto e per ingestione.
LIMATER è di facile e pratico impiego; non fermenta, non ammuffisce, non viene dilavato dalle piogge e non viene asportato dal vento.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Spargere i granuli di LIMATER in modo uniforme a spaglio sulla superficie da disinfestare lungo il perimetro o tra i filari delle colture o a mucchietti attorno alle piante, dopo una pioggia, annaffiatura e preferibilmente di sera.
La dose è di 30/50 grammi per 10 m^2 di superficie da distribuire a spaglio o lungo i margini del terreno da proteggere (la confezione da 100 grammi serve per 20-30m^2).
Per trattamenti localizzati 2-3 g (pari a 10-15 granuli) intorno alle singole piante sono sufficienti per un'efficace protezione.

Prodotto Fitosanitario / PPO
Registrazione n. 10832 del 19.04.01del Ministero della Salute
Copyr s.p.a.
Lgt. A. Da Brescia, 9 - Roma
Officine di produzione
L.I.F.A. s.r.l. - Vigonovo (VE)
L.I.F.A. s.r.l. - Isola Vicentina (VI)
INDUSTRIALCHIMICA S.r.l. Via Sorgaglia – Z.I. Sorgaglia, Arre (PD)

Contenuto netto: g 100-200-250-500-750; kg 1 Lotto n° del

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

01.05

LUMAKIDIN ESCA

Esca a base di metaldeide per la lotta contro lumache e limacce per piante ornamentali e fiori da balcone, appartamento e giardino domestico

contiene sostanza amara anti-ingestione

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Metaldeide acetica pura g 2,9
Coformulanti, inerti ed adescanti q.b.a. g 100

AVVERTENZE
Attenzione: manipolare con prudenza.
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande.
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego.

PRECAUZIONI D'USO
Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
LUMAKIDIN ESCA è un formulato granulare indicato per la lotta ai molluschi gasteropodi (lumache, limacce). LUMAKIDIN ESCA agisce per ingestione, non viene asportato dal vento né reso inefficace dalla pioggia.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Va distribuito sul terreno a mucchietti. Il contenuto della confezione da 100 grammi serve per 2,5 - 3, 5 m^2.
La dose consigliata per un vaso da 20 cm è di 6 - 8 g (30 - 40 granuli).

Prodotto Fitosanitario / PPO
Registrazione n. 10839/PPO del 11.04.01del Ministero della Salute
Copy s.p.a.
Lgt. A. Da Brescia, 9 - Roma
Officine di produzione:
L.I.F.A. s.r.l. - Vigonovo (VE)
L.I.F.A. s.r.l. - Isola Vicentina (VI)
INDUSTRIALCHIMICA S.r.l. Via Sorgaglia – Z.I. Sorgaglia, Arre (PD)

CONTENUTO NETTO: g 100 - 200 - 250 - 500 – 750; kg 1 Lotto n. del

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

01.05

CARBOTIN ESCA

Esca granulare insetticida pronta all'uso per piante ornamentali e fiori da balcone, da appartamento e giardino domestico

Carbotin Esca - Composizione
100 grammi di prodotto contengono:

Endosulfan puro	g	3,75
Supporti assorbenti q.b .a.	g	100

N

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Prodotto Fitosanitario / PPO
Registrazione n. 10840 del 11/04/01 del Ministero della Salute
Copyr s.p.a. - Lgt. A. da Brescia, 9 - Roma
Officine di produzione:
L.I.F.A. s.r.l. - Vigonovo (VE)
L.I.F.A. s.r.l. - Isola Vicentina (VI)
INDUSTRIALCHIMICA S.r.l.
Via Sorgaglia – Z.I. Sorgaglia, Arre (PD)

Contenuto: g 100 - 200 - 250 - 500 - 750; kg 1 Lotto n. del

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.

PRECAUZIONI D'USO
Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
CARBOTIN ESCA viene impiegato per il controllo degli insetti del terreno quali: grillotalpa, maggiolini, agrotidi, elateridi, nottuidi.
La forma granulare agevola l'uniformità della distribuzione. Oltre che essere di rapido effetto ha una lunga durata di efficacia.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
CARBOTIN ESCA si applica nel terreno prima del trapianto.
La dose consigliata è: per un vaso da 20 cm di diametro 2 - 3 g (pari a 25 - 30 granuli)
Il contenuto della confezione da 100 g serve per 25 - 20 m^2 (4 - 5 g/m^2).
Dopo aver sparso sul terreno il prodotto, interrarlo leggermente usando una zappetta o un rastrello.

COMPATIBILITA'
E' miscelabile al momento dell'impiego con i fertilizzanti in polvere e granulari.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. 01.05

NEODORIL

Insetticida granulare pronto all'uso per la lotta agli insetti del terreno per piante ornamentali e fiori da balcone, appartamento e giardino domestico

Neodoril - Composizione
100 grammi di prodotto contengono:

Diazinone puro	g 10
Supporti inerti ed adescanti q.b.a.	g 100

N

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Prodotto Fitosanitario / PPO
Registrazione n. 10917/PPO del 10.05.01 del Ministero della Salute
Copyr s.p.a.
Lgt. A. Da Brescia, 9 - Roma
Officine di produzione
L.I.F.A. s.r.l. - Vigonovo (VE)
L.I.F.A. s.r.l. - Isola Vicentina (VI)
INDUSTRIALCHIMICA S.r.l. Via Sorgaglia – Z.I. Sorgaglia, Arre (PD)

Contenuto: g 100 - 200 - 250 - 500 – 750; kg 1 Lotto n. del

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.

PRECAUZIONI D'USO
Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
NEODORIL è un insetticida granulare che agisce per contatto e ingestione contro gli insetti infestanti il terreno come: grillotalpa, elateridi, larve di coleotteri, agrotidi, dorifore, formiche ecc.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
NEODORIL si applica sul terreno. La dose consigliata è: per un vaso da 20 cm di diametro 2,5 - 4 g (pari a 13 - 20 granuli).
Il contenuto della confezione da 100 g serve per 16 - 20 m^2 (5 - 6 g/m^2).
Dopo aver sparso sul terreno il prodotto, interrarlo leggermente usando una zappetta o un rastrello.

COMPATIBILITÀ: il prodotto va usato da solo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

01.05

LUMAGRIL ESCA

Esca granulare insetticida lumachicida pronta all'uso per piante ornamentali e fiori da balcone, appartamento e giardino domestico

contiene sostanza amara anti-ingestione

Lumagril Esca - Composizione
100 grammi di prodotto contengono:

Diazinone puro	g 2,40
Metaldeide acetica pura	g 2,97
Coformulanti, inerti ed adescanti q.b. a	g 100

N

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Prodotto Fitosanitario / PPO
Registrazione n. 10918/PPO del 10/05/01 del Ministero della Salute
Copyr s.p.a.
Lgt. A. da Brescia, 9 - Roma
Officine di produzione
L.I.F.A. s.r.l. - Vigonovo (VE)
L.I.F.A. s.r.l. - Isola Vicentina (VI)
INDUSTRIALCHIMICA S.r.l. Via Sorgaglia – Z.I. Sorgaglia, Arre (PD)

Contenuto: g 100 - 200 - 250 - 500 – 750; kg 1 Lotto N. del

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.

PRECAUZIONI D'USO
Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto si presenta come pellets idonei alla lotta contro: grillotalpa, maggiolini, lumache, limacce.
Agisce per ingestione e contatto; non viene asportato dal vento, né dilavato o reso inefficace dalla pioggia.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Si consiglia di spargere l'esca a spaglio o in maniera localizzata intorno alle piante la sera, meglio dopo una pioggia o irrigazione.
La dose consigliata è: per un vaso da 20 cm di diametro 2,5 g di prodotto (pari a 13 - 20 granuli).
Il contenuto della confezione da 100 g serve per 20 - 16 m^2 (5 - 6 g/m^2).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

01.05

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FITOPYR

Liquido emulsionabile insetticida per contatto ed ingestione ad ampio spettro d'azione

Fitopyr - Composizione
100 g di prodotto contengono

Piretrine	g	3,00
(pari a g 12 di Estratto di Piretro 25%)		
Piperonil Butossido	g	9,60
Coformulanti	q.b. a g	100

N

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Reg. N° 10933 del 17/5/2001 del Ministero della Salute
COPYR s.p.a. - Lgt. A. da Brescia, 9 - Roma
Officine di produzione:
Althaller Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
Irca Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)
Diachem S.p.A. - Un. Prod. Sifa - Caravaggio (BG)

Contenuto netto: ml 10 - 25 - 50 - 100 – 250; lt 0,500 – 1 – 5 - 10 –20 Partita n.

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE
FITOPYR è un insetticida che agisce per contatto ed ingestione nei confronti di una vasta gamma d'insetti parassiti delle colture arboree, frutticole, orticole e floricole; è caratterizzato inoltre da un elevato potere abbattente nei confronti degli insetti.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
FITOPYR va impiegato bagnando accuratamente tutte le parti della pianta, alle seguenti dosi:

- *melo, pero* 100-120 ml/hl acqua
  (contro psilla, cemiostoma, litocollete, afidi, tentredini, tingidi, tortricidi, ricamatori, antonomo, carpocapsa, orgia, tignole, cocciniglie, metcalfa)
- *pesco, ciliegio, susino, albicocco, pruno* (contro, afidi, cydia, anarsia, tripidi, mosca, cocciniglie) 100-120 ml/hl acqua
- *vite (*contro tignola e tignoletta, cicaline, sigaraio, tripidi, metcalfa) 100-120 ml/hl acqua
- *arancio, limone, mandarino, pompelmo* 100-120 ml/hl acqua
  (contro mosca, tignole, afidi, cocciniglie, formica argentina, aleurodidi, metcalfa)
- *olivo* (contro cocciniglie, tripidi, mosca dell'olivo) 100-120 ml/hl acqua
- *fico, melograno* (contro afidi, cocciniglie, tignole, metcalfa) 100-120 ml/hl acqua
- *mandorlo e nocciolo* (contro afidi, cimici,tingide del mandorlo, metcalfa) 100-120 ml/hl acqua
- *fragola (*contro afidi, tortricidi, tripidi, metcalfa) 100-120 ml/hl acqua
- *pomodoro, melanzana,patata, cavoli, cucurbitacee, lattuga, spinaci,* 100-120 ml/hl acqua
  porri, carota, fava, asparago, carciofo (contro cavolaia, nottue, afidi, tripidi, aleurodidi, dorifora, vanessa, criocera)
- *cereali (*contro afidi) 100-120 ml/hl acqua
  foraggere leguminose (contro afidi, misurino, cimici, miridi) 100-120 ml/hl acqua
- *tabacco (*contro afidi, aleurodidi, tripidi) 100-120 ml/hl acqua
- *floreali e ornamentali* (in pieno campo ed in serra) (contro afidi, aleurodidi, bega, tripidi) 100-120 ml/hl acqua

Si consiglia di attenersi alle seguenti avvertenze:
Impiegare le dosi maggiori in caso di forti infestazioni. Nel trattamento contro la psilla del pero e delle colture ortive si consiglia di aggiungere un bagnante alla dose di 50 ml/hl d'acqua. Contro la psilla intervenire durante il periodo tra uova color arancio e inizio della melata. Contro la tignola della vite, microlepidotteri minatori, ecc. è necessario trattare prima che le larve penetrino nei tessuti vegetali. Contro le cocciniglie trattare nel periodo di massima schiusa delle uova ed in presenza del maggior numero di forme giovanili. Contro nottue trattare nelle ore serali. Nel caso d'impiego sulle ornamentali floricole, se coltivate in ambiente protetto, eseguire saggi preliminari per accertare la selettività. Conservare il prodotto al riparo dal gelo.
COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con la poltiglia bordolese e gli antiparassitari a reazione alcalina.
FITOTOSSICITÀ: non trattare durante la fioritura.
Intervallo di sicurezza: 2 giorni.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. NON OPERARE CONTRO VENTO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. (NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE).
01.05

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

FITOPYR

Liquido emulsionabile insetticida per contatto ed ingestione ad ampio spettro d'azione

Fitopyr - Composizione
100 g di prodotto contengono

Piretrine	g 3,00
(pari a g 12 di Estratto di Piretro 25%)	
Piperonil Butossido	g 9,60
Coformulanti	q.b. a g 100

N

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Reg. N° 10933 del 17/5/2001 del Ministero della Salute
COPYR s.p.a. - Lgt. A. da Brescia, 9 - Roma

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

01.05

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PIRECO

Insetticida pronto all'uso a base di Piretro naturale per piante ornamentali e fiori da balcone, appartamento e giardino domestico

Pireco - Composizione
100 g di prodotto contengono

Estratto di Piretro 25%		g	8
(pari a g 2 di piretrine attive)			
Coformulanti	q.b. a	g	100

N

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Prodotto Fitosanitario PPO
Reg. N° 11005/PPO del 1/8/2001 del Ministero della Salute
COPYR s.p.a. - Lgt. A. da Brescia, 9 - Roma
Officine di produzione:
Althaller Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)
Diachem S.p.A. - Unità prod. SIFA - Caravaggio (BG)

Contenuto netto: ml 15 - 30 - 50 - 100
Partita n. Validità: 2 anni

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.

PRECAUZIONI D'USO
Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
PIRECO è un insetticida di contatto ad azione rapida. La formulazione, a base di solo Piretro naturale in supporto liquido di origine vegetale, garantisce il controllo rapido e completo dei parassiti della vegetazione (principalmente afidi) delle piante fiorite (come Rosa, Azalea, Begonia, Geranio, Ortensia, Oleandro), delle piante verdi da appartamento (come Ficus, Dracaena, Filodendro, Felce) e delle piante ornamentali in genere.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
PIRECO va impiegato diluito in acqua a percentuali comprese tra 0,15% e 0,25% (pari a 1,5 - 2,5 ml per 1 lt d'acqua).

- contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Cicaline, Tingidi, Tentredini ml 1,5 per 1 lt acqua
- contro Coleotteri e Lepidotteri defogliatori ml 1,5 - 2 per 1 lt acqua
- contro larve di Ifantria ml 2,5 per 1 lt acqua

La soluzione ottenuta va nebulizzata sulle piante da trattare con nebulizzatori a mano da una distanza di 30-40 cm.
I trattamenti devono essere eseguiti bagnando abbondantemente le piante al manifestarsi delle infestazioni senza giungere a far gocciolare le foglie. Per uso in giardino, trattare preferibilmente la sera.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

01.05

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

PIRECO

Insetticida pronto all'uso a base di Piretro naturale
per piante ornamentali e fiori da balcone, appartamento e giardino domestico

Pireco - Composizione
100 g di prodotto contengono

Estratto di Piretro 25%	g	8,00
(pari a g 2 di piretrine attive)		
Coformulanti	q.b. a	g 100

N

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Prodotto Fitosanitario PPO
Reg. N° 11005/PPO del 1/8/2001 del Ministero della Salute
COPYR s.p.a. - Lgt. A. da Brescia, 9 - Roma

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.
PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

01.05

FRANTIC

Insetticida aerosol a base di Piretro naturale
per piante ornamentali e fiori da balcone, appartamento giardino domestico

Frantic - Composizione
100 g di prodotto contengono:

Piretrine	g	0,1875
(pari a g 0,75 di estratto di Piretro 25%)		
Piperonil Butossido	g	0,880
Coformulanti	q.b. a g 100	

F+

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

Frasi R – Estremamente infiammabile.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille – non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Prodotto Fitosanitario PPO
Registrazione N° 11421 del 30/7/02 del Ministero della Salute
Copyr s.p.a. - Lgt. A. da Brescia, 9 - Roma
Officina di produzione:
Tosvar s.a.s. - Pozzo d'Adda (MI)
Nuova Tecnosol s.r.l. - Assago (MI)

Contenuto netto: ml 250 - 300 - 400 - 500
Lotto n. Validità: 3 anni

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.

PRECAUZIONI D'USO
Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
L'aerosol insetticida FRANTIC è a base di Piretro naturale, dalla ben nota azione abbattente ed insetto repellente.
FRANTIC è formulato in modo da garantire il controllo rapido e totale di tutti gli insetti nocivi quali afidi, tripidi, aleurodidi, tentredini, coleotteri e lepidotteri defogliatori, larve di Ifantria, che colpiscono piante fiorite (Rosa, Azalea, Begonia, Geranio, Ortensia, Oleandro), piante verdi da appartamento (Ficus, Dracaena, Filodendro, Felce) e piante ornamentali in genere.

AGITARE PRIMA DELL'USO

MODALITÀ D'IMPIEGO
Nebulizzare il prodotto sul fogliame con moto uniforme alla comparsa dei parassiti, senza giungere a far gocciolare le foglie (5 secondi c.a per una pianta di medie dimensioni).
Limitare l'applicazione alla pianta; dirigere il getto lontano dalle persone e non disperdere il preparato nell'aria per evitare eventuali accumuli di gas infiammabile. Evitare di sostare in locali chiusi ed angusti. È consigliabile tenere bambini ed animali domestici lontani dalle piante irrorate, finché la vegetazione non sia asciutta. Areare il locale prima di soggiornarvi nuovamente.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. 01.05

ACC

NON CONTIENE PROPELLENTI RITENUTI DANNOSI PER L'OZONO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

DICOSAR

Erbicida di post-emergenza liquido

DICOSAR
Composizione
100 g di prodotto contengono:

Dicamba puro	g 21,2 (=222,6 g/l)
Coformulanti	q.b. a 100

Xi

IRRITANTE

Frasi di rischio Irritante per gli occhi.
Consigli di prudenza Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Reg. n° 11460 del 9.10.02 del Ministero della Salute
Copyr s.p.a. - Lgt. A. da Brescia 9 - Roma
Officina di produzione:
ADICA s.r.l. – Faenza (RA)

Confezioni: ml 100 – 200 – 250 – 500; litri 1 – 5 – 10 - 20 Partita N°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
sintomi: irritante oculare e cutaneo; per ingestione: scialorrea, vomito e diarrea. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità d'impiego
DICOSAR è un erbicida di post-emergenza che agisce sulle infestanti sia per assorbimento radicale che fogliare e viene traslocato in tutta la pianta tramite la circolazione linfatica. Dato il rapido assorbimento da parte delle piante, eventuali piogge che avvengono dopo poche ore dal trattamento non influiscono sulla sua attività erbicida. Controlla le seguenti infestanti: Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Caglio asprello (*Galium aparine*), Camomilla comune (*Matricaria camomilla*), Canapa selvatica (*Galeopsis tetrahit*), Cencio molle grande (*Abutilon theophrasti*), Centocchio comune (*Stellaria media*), Centonchio dei campi (*Anagallis arvensis*), Erba correggiola (*Atriplex patula*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Erba storna comune (*Thlaspi arvense*), Farinello comune (*Chenopodium album*), Fiordaliso vero (*Centaurea cyanus*), Fumaria comune (*Fumaria officinalis*), Galinsoga comune (*Galinsoga parviflora*), Iva (*Ajuga* spp.), Ortica minore (*Urtica urens*), Papavero comune (*Papaver rhoeas*), Poligono centinodia (*Polygonum aviculare*), Poligono convolvolo (*Fallopia convolvulus*), Poligono persicaria (*Polygomun persicaria*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Renaiola comune (*Spergula arvensis*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Senecione comune (*Senecione vulgaris*), Veccia (*Vicia* spp.), Veronica spp., Stoppione (*Cirsium arvense*), Vilucchio bianco (*Calystegia sepium*), Vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*), Sicio o zucchina selvatica (*Sycios vulgaris*), Assenzio selvatico (*Artemisia vulgaris*), Stramonio (*Datura stramonium*), Fitolacca (*Phytolacca decandra*), Ranuncolo (*Ranunculus* spp.), Romice (*Rumex* spp.), Lappola (*Xantium* spp.).
Viene impiegato sulle seguenti colture:
FRUMENTO E CEREALI MINORI (ORZO, AVENA, SEGALE): il trattamento si effettua in post-emergenza alla dose di 0,6 litri per ettaro intervenendo il più precocemente possibile con coltura a 5-6 foglie.
MAIS: il trattamento si effettua in post-emergenza alla dose di litri 0,8-1,2 intervenendo dalle prime due foglie vere della coltura in poi, quando la maggior parte delle infestanti è già emersa e si trova nei primi stadi di sviluppo.
ASPARAGO: il trattamento si effettua prima della fuoriuscita dei turioni con litri 0,2-0,5 per ettaro con terreno sarchiato e leggermente umido.
RISO: si impiega alla dose di litri 0,375-0,550 per ettaro in post-emergenza.
MELO: si impiega alla dose di litri 0,500-0,650 per ettaro in miscela con MCPA con presenza di infestanti.
PRATI-PASCOLI: impiegare il prodotto durante la stagione vegetativa alla dose di litri 0,450-0,900 per ettaro.
Fitotossicità: non applicare il prodotto su colture di mais in terreni sabbiosi e poveri di sostanza organica (meno del 2%) in quanto potrebbe risultare fitotossico.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto per il melo e 20 giorni per tutte le altre colture.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispetto il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. NON OPERARE CONTRO VENTO. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. 01.05

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

DICOSAR

Erbicida di post-emergenza liquido

DICOSAR
Composizione
100 g di prodotto contengono:

Dicamba puro	g 21,2 (=222,6 g/l)
Coformulanti	q.b. a 100

Xi

IRRITANTE

Frasi di rischio Irritante per gli occhi.
Consigli di prudenza Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Reg. n° 11460 del 9.10.02 del Ministero della Salute
Copyr s.p.a. - Lgt. A. da Brescia 9 - Roma
Officina di produzione:
ADICA s.r.l. – Faenza (RA)

Confezioni: ml 100 – 200 – 250 – 500; litri 1 – 5 – 10 - 20 Partita N°

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.
PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

01.05

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

PEROXAN

Fungicida citotropico translaminare impiegato su Vite, Carciofo, Pomodoro, Patata, Tabacco contro la Peronospora

Peroxan - Composizione
100 g di prodotto contengono
Cimoxanil puro g 30
Coformulanti q.b. a g 100

Xn — NOCIVO

N — PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Nocivo per ingestione.
Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Registrazione n. 11462 del 9.10.2002 del Ministero della Salute
COPYR S.p.a.
Lgt. A. da Brescia, 9 - Roma
Stabilimento di produzione:
ADICA SRL – Nera Montoro (TR)

Contenuto: g 10 - 15 - 20 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500 / kg 1 – 5 – 10 per uso professionale Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. Consultare un centro antiveleni. Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI, CAMPI E MODALITÀ D'IMPIEGO
PEROXAN è un fungicida in formulazione in microgranuli idrodispersibili ad azione citotropica indicato per il trattamento contro la Peronospora, possiede una persistenza d'azione di circa 5 giorni.
Vite: contro la Peronospora alla dose di 65-80 grammi per quintale d'acqua trattando da quando si hanno le infezioni della malattia e fino alla fine della fioritura.
Quindi dall'allegagione impiegare 30-40 grammi per quintale d'acqua miscelando con i prodotti di copertura quali i rameici, i ditiocarbammati e di Folpet ad un dosaggio pari al 60-70% della dose comunemente impiegata.
Carciofo, Patata, Pomodoro, Cipolla, Aglio, Porro, Girasole, Soia, Lattuga, Rosa, Zucchino, Melone, Pisello, Spinacio, Tabacco: contro la Peronospora alla dose di 65-80 grammi per quintale d'acqua iniziando al verificarsi delle condizioni di infezione e proseguendo. Nel caso di infezioni in atto effettuare due trattamenti ravvicinati alla dose più alta (5-7 giorni l'uno dall'altro). Si può ridurre la dose a 30-40 grammi per quintale d'acqua se si effettuano trattamenti in miscela con rameici o ditiocarbammati, comunque tenendo presente che la dose minima riferita ad ettaro non deve essere inferiore a 400 grammi / ettaro.
COMPATIBILITA': non compatibile con i prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese) e gli oli minerali.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto di girasole e soia; 21 giorni per il carciofo; 10 giorni per le altre colture.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
NON OPERARE CONTRO VENTO. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. (NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE).

01.05

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

PEROXAN

Fungicida citotropico translaminare impiegato su Vite, Carciofo, Pomodoro, Patata, Tabacco contro la Peronospora

Peroxan - Composizione
100 g di prodotto contengono
Cimoxanil puro g 30
Coformulanti q.b. a g 100

Xn
NOCIVO

N
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Nocivo per ingestione.
Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Registrazione n. 11462 del 9.10.2002 del Ministero della Salute
COPYR S.p.a.
Lgt. A. da Brescia, 9 - Roma
Stabilimento di produzione:
ADICA SRL – Nera Montoro (TR)

Contenuto: g 10 - 15 - 20 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500 / kg 1 – 5 – 10 per uso professionale Partita N.

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.
PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

01.05

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

MICOCARB

Fungicida ad azione sistemica

MICOCARB
Composizione
100 g di prodotto contengono:
Propamocarb cloridrato g 66,5 (= 722 g/l)
Coadiuvanti q.b. a 100 g

Xi

IRRITANTE

Frasi di rischio Irritante per gli occhi e per la pelle.
Consigli di prudenza Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Registrazione n. 11472 del 22.10.02 del Ministero della Salute
Copyr s.p.a.
Lgt. A. da Brescia, 9 - Roma
Stabilimento di produzione:
ADICA s.r.l. - Faenza (RA)

Confezioni: ml 10 - 15 - 20 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500; litri 1 – 5 – 10 Partita N°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

MICOCARB è un fungicida sistemico indicato nella difesa di numerose colture nel combattere i seguenti fitomiceti: *Phytium* spp., *Phytophthora* sp., *Peronospora*, *Pseudoperonospora*, *Aphanomices* sp., *Bremia*.

Viene assorbito prevalentemente dalle radici e poi traslocato nell'apparato fogliare, caratterizzato da una lunga e completa protezione ed elevata selettività sulle colture, manifestando su esse uno stimolo nei confronti della radicazione e sullo sviluppo vegetativo.

Il prodotto ha la caratteristica di poter essere impiegato con numerose tecniche quali: trattamenti fogliari, concia delle sementi, bagno dei bulbi e delle talee, disinfezione dei terricciati e dei letti di semina, trattamenti al terreno in pre- e post-trapianto delle colture.

Viene impiegato sulle seguenti colture: Agrumi, Melo, Pero, Fragola, Cavoli, Lattuga, Cicoria, Indivia, Radicchio, Spinacio, Bietola da foglia e da costa, Sedano, Prezzemolo, Basilico, Cucurbitacee (Cocomero, Melone, Zucca, Zucchino, Cetriolo), Solanacee (Pomodoro, Peperone, Melanzana), Carota, Bietola da orto, Rapa, Cipolla, Aglio, Porro, Tabacco, floreali, forestali, ornamentali, nei vivai, nei semenzai, nella concia delle sementi e di bulbi, campi da golf e prati ornamentali.

Interventi:

Trattamenti fogliari: viene impiegato alla dose di litri 1,5-3 per ettaro di coltura in circa 15-20 ettolitri d'acqua, sulle colture sopramenzionate.

Concia delle sementi: la dose di impiego è di ml 1-4 per kg di seme di piccole dimensioni e ml 10-40 per kg di seme di dimensioni maggiori.

Preparazione dei terricciati: impiegare 300 ml di prodotto per metro cubo di terriccio, disciolti in circa 20 litri d'acqua.

Trattamenti ai semenzai: impiegare ml 8-12 per metro quadrato di superficie disciolti in 4-5 litri d'acqua con l'avvertenza di ripetere il trattamento 5 giorni prima del trapianto con l'utilizzo di 6-8 litri d'acqua per metro quadrato.

Trattamenti al terreno: pre-trapianto: impiegare ml 8-12 per metro quadrato in 3-5 litri d'acqua; post-trapianto: impiegare 100-200 ml per pianta di una soluzione ottenuta diluendo 200 ml di prodotto per quintale d'acqua: trattare ogni 10-15 giorni con un massimo di 3-4 interventi.

Colture floreali in genere: informazioni particolareggiate per le seguenti colture: Garofano - Gerbera, si impiega il prodotto specificatamente contro *Phytium* e *Phytophthora* alla dose di ml 12-15 per metro quadrato, disciolti in circa 2-4 litri d'acqua, trattando 2 giorni prima dell'impianto e quindi procedendo all'incorporamento. Successivamente impiegare 200 ml per quintale d'acqua con trattamento fogliare, bagnando abbondantemente con 400-500 litri d'acqua ogni 1000 metri quadrati ad intervalli inizialmente di circa 8-10giorni e successivamente ogni 15-25 giorni.

Bulbose: per controllare *Phytium ultimum* e *Phytophthora* si immergono i bulbi per 20-30minuti in una soluzione contenete 300 ml di prodotto per quintale d'acqua poi, prima della messa a dimora, si tratta il terreno con 10-12ml di prodotto per metro quadrato in 2-4 litri d'acqua e successivo incorporamento a circa 10-12 cm di profondità.

Piante forestali (vivai): contro *Phytophthora cactorum*, *Phytophthora cinnamomi* e *Phytium* trattare il substrato colturale con 300 ml di prodotto per metro cubo disciolti in 8-10 litri d'acqua: si deve intervenire, in caso di necessità, ogni 15-18 giorni con 200 ml di prodotto in 4-5 litri d'acqua per metro quadrato.

Campi da Golf – Tappeti Erbosi – Prati Ornamentali: per il controllo di *Phytium* spp. Ed altre specie trattare con interventi fogliari a ml 1-1.5 per metro quadrato, impiegando non meno di 100-200 litri di soluzione per 1000 metri quadrati. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia e ripetendo i trattamenti ogni 14-15 giorni.

COMPATIBILITA': non compatibile con i prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese) e gli oli minerali.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. NON OPERARE CONTRO VENTO. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

01.05

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

MICOCARB

Fungicida ad azione sistemica

MICOCARB
Composizione
100 g di prodotto contengono:
Propamocarb cloridrato g 66,5 (= 722 g/l)
Coadiuvanti q.b. a 100 g

Xi

IRRITANTE

Frasi di rischio Irritante per gli occhi e per la pelle.
Consigli di prudenza Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Registrazione n. 11472 del 22.10.02 del Ministero della Salute
Copyr s.p.a.
Lgt. A. da Brescia, 9 - Roma
Stabilimento di produzione:
ADICA s.r.l. - Faenza (RA)

Confezioni: ml 10 - 15 - 20 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500; litri 1 – 5 – 10 Partita N°

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

01.05

SUNFLOWER

Insetticida pronto all'uso a base di Piretro naturale per piante ornamentali e fiori da balcone, appartamento e giardino domestico

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono		
Piretrine		g 0,075
(pari a g 0,3 di Estratto di Piretro 25%)		
Piperonil Butossido		g 0,564
Coformulanti	q.b. a	g 100

AVVERTENZE
Attenzione: manipolare con prudenza.
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande.
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego.

PRECAUZIONI D'USO
Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
SUNFLOWER è un insetticida di contatto a base di Piretro naturale, che protegge le piante fiorite (come Rosa, Azalea, Begonia, Geranio, Ortensia, Oleandro), le piante verdi da appartamento (come Ficus, Dracaena, Filodendro, Felce) e le piante ornamentali in genere dall'azione dannosa di insetti come afidi, aleurodidi (mosche bianche), tentredini, tripidi, tingidi, ragnetti rossi, coleotteri e lepidotteri defogliatori e larve di Ifantria.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Agitare bene prima dell'uso ed irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm bagnando in modo uniforme tutta la superficie, compresa la pagina inferiore delle foglie. Trattare al manifestarsi delle infestazioni e, se occorre, ripetere l'operazione 8-10 giorni dopo il primo trattamento.

Prodotto Fitosanitario PPO
Reg. N° 11662/PPO del 18/4/2003 del Ministero della Salute
Copyr s.p.a. - Lgt. A. da Brescia, 9 - Roma
Officine di produzione:
Althaller Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)

Contenuto netto: ml 200 – 350 - 500 – 750 - 1000
Partita n. Validità: 2 anni

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

01.05

BROMOSICULA S.a.s.

BROMOSIL

INSETTICIDA,NEMATOCIDA,GERMICIDA FUMIGANTE GASSOSO.

COMPOSIZIONE: 100g. di prodotto contengono:
Bromuro di metile g. 98 - CAS n. 74-83-9
Cloropicrina g. 2 - CAS n. 76 - 06 - 2

T — TOSSICO

N — NOCIVO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO (R)

R23/25 : Tossico per inalazione e ingestione
R36/37/38: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
R48/20 : Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione
R50 : Altamente tossico per gli organismi acquatici
R59 : Pericoloso per lo strato di ozono
R68 : Possibilità di effetti irreversibili

CONSIGLIO DI PRUDENZA (S)

S1/2 : Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini
S13 : Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
S20/21 : Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
S36/37 : Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
S45 : In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
S59 : Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio
S60 : Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
S61 : Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

BROMOSICULA S.a.s.
SEDE LEGALE: Via Empedocle, 22 Int. B - Ragusa
Officina di produz: VITTORIA (RG) C.da Sughero Torto - S.P. n.16 Km 5
Registrazione Ministero della Sanità n. 4273 del 5 Marzo 1981

Data scadenza autorizzazione: come da Decreto Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO — CONFEZIONE CONTENUTO NETTO **Kg.** — PARTITA N.

Taglie autorizzate da Kg.80 / 100 / 120

- La bombola completamente svuotata deve essere rispedita al fornitore.
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
- Smaltire secondo le norme vigenti.

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI DI PRUDENZA	- Conservare questo prodotto in locale idoneo per immagazzinare gas tossici (R.D. 9.1. 1927.n°147 e successivi aggiornamenti), con aperture di areazione anche a livello del suolo, inaccessibile anche agli animali domestici. - Usare, per le bombole vuote, le stesse precauzioni relative alla custodia delle bombole piene. - Non operare controvento. - Non contaminare le altre colture alimenti-bevande ed i corsi d'acqua. - Dopo la manipolazione e in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con abbondante acqua e sapone. - A seconda delle circostanze usare guanti e calzature in plastica.(Non usare guanti e calzature di cuoio o gomma). - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
MISURE DI PRONTO SOCCORSO	**Occhi:** - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico **Pelle:** - Togliere di dosso immediatamente gli abiti, le scarpe e ogni altro oggetto contaminato che si trovi a contatto con la pelle. - In caso con contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Consultare un medico. - Non indossare indumenti e scarpe che non siano completamente decontaminati. **Inalazione:** - Spostarsi all'aria fresca. - Qualora l'infortunato non respiri, praticare la respirazione artificiale, preferibilmente bocca a bocca. - Qualora la respirazione sia difficile, insufflare ossigeno. Non somministrare alcuna sostanza ad una persona priva di sensi. Consultare un medico.
CARATTERISTICHE	Liquido gassificabile a temperatura ambiente; praticamente non infiammabile, non esplosivo, molto attivo contro i nematodi, i germi dei funghi, gli insetti, le erbe infestanti.
MODALITA' DI IMPIEGO	- Fumigante da impiegare esclusivamente per i trattamenti dei terreni in assenza di colture e per i trattamenti di vivai e semenzai. - L'operazione di trattamento e quella di scopertura delle aree trattate, devono essere effettuate solo da operatori specializzati, autorizzati ai sensi del regio decreto 9 gennaio 1927, n° 147 e successive modifiche, nonché muniti del patentino di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n.1255/1968.Per il trattamento deve essere rispettata la distanza minima di cinquanta metri dalle abitazioni, salvo espressa autorizzazione delle autorità sanitarie locali. - Terreno: L'intervallo da rispettare prima della messa a coltura (semina o trapianto) va fissato in relazione alla natura del terreno e delle condizioni climatiche e, comunque, non deve essere inferiore a 10 giorni e dopo conveniente arieggiamento del terreno trattato. - Il trattamento di sterilizzazione deve essere effettuato prima della semina o della piantagione delle seguenti colture: aglio, barbabietola, bietola, carciofo, cardo, carota, cavolfiore, cavolrapa, cetriolo, cicoria, cipolla, cocomero, fagiolo, finocchio, fragola, lampone, lattuga, melanzana, melone, mirtillo, patata, peperone, pomodoro, radicchio, ravanello, sedano, zucchino, albicocco, arancio, ciliegio, limone, melo, olivo, pesco, vite, anemone, azalea, begonia, ciclamino, crisantemo, crocus, dalia, fresia, garofano, geranio, gerbera, giacinto, gladiolo, iris, mughetto, narciso, ortensia, petunia, rubinia, rododendro, rosa, tulipano, tabacco. Il terreno deve essere asciutto, né troppo umido, va lavorato finemente e poi ricoperto con un velo di plastica, che va rimosso non prima di sette giorni dal trattamento. - Non ripetere il trattamento sullo stesso terreno prima di 24 mesi. - La fumigazione deve essere effettuata solo se il suolo ha una temperatura di almeno 10°C, alla profondità di 15-20 cm. - Dosi suggerite: contro i nematodi di 30-50 g/m2; contro i funghi patogeni 40-60 g/m2; contro le erbe infestanti 30-50 g/m2; la dose di impiego non deve essere superiore a 60 g/m2 per impieghi al terreno, assicurando l'adozione di tecniche di applicazione, incluso l'uso di adeguati plastiche di copertura, che consentano di ridurre ulteriormente le dosi.
FITOTOSSICITA'	E' fortemente fitotossico, perciò deve essere usato solamente per trattamenti prima della semina o trapianto.
NOCIVITA'	Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame, il trattamento, a forti dosi, distrugge la totalità delle forme di vita parassitarie presenti nel terreno, lasciando però in vita parte della flora microbatterica che al termine del trattamento si ristabilisce nel suolo.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON E' COMPATIBILE O MISCELABILE CON ALTRI PRINCIPI ATTIVI

ATTENZIONE	- Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO	- Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. - Conservare al riparo dall'umidità. - Sorvegliare l'aria a mezzo di una adeguata apparecchiatura di rivelazione del bromuro di metile. - Conservare a temperatura non superiore a 175°C. **Sostanze / condizioni da evitare** - Umidità. - Ambienti umidi. - Si raccomanda una ventilazione meccanica. - Una aspirazione locale è necessaria alla fonte dei vapori. - Evitare il contatto con l'alluminio, il magnesio, le leghe di zinco o di alluminio e di magnesio, con l'acciaio galvanizzato e con l'acqua.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO

Il rispetto delle istruzioni in etichetta, è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone, agli animali e alle piante.

ATTENZIONE data la elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 1255 / 68.

- **L'utilizzo del prodotto è inoltre riservato solo agli operatori, autorizzati a norma del R.D. 9 / 1 / 1927 n. 147 (e successive modifiche) sull'impiego dei gas tossici.**

RHIZOPON b.v.

RHIZOPON® B-POLVERE 0,1%

FITOREGOLATORE PER LA FORMAZIONE DELLE RADICI NELLE TALEE ERBACEE E LEGNOSE

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione: NAA puro g 0,1
Sostanza inerte q.b. a 100

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

1-Conservazione della polvere: La polvere di Rhizopon B polvere 0,1% si conserva indefinitamente nel suo flacone originale utilizzato. La conservazione risulterà perfetta se si avrà cura di richiudere bene il tappo e conservare l'imballaggio in ambiente secco e fresco ed al riparo dalla luce. 2- Modalità d'impiego: a) E' raccomandabile per ciascun impiego di depositare una piccola quantità di polvere in un contenitore a forma di astuccio, tubo o vetro stretto. b) Se necessario inumidire la parte inferiore della talea ed agitarla successivamente per eliminare l'eccesso di acqua. c) Immergere la base della talea per una profondità di 1 – 2 cm nella polvere facendola roteare leggermente per ottenere una completa impregnazione. d) Scuotere la talea ma lontano dalla polvere, che deve rimanere più secca possibile. e) Prima del trapianto preparare un buco od un solco in modo che possa contenere la talea senza asportarne la polvere che andrebbe a concentrarsi formando un anello alla superficie del substrato. Con 100 g di prodotto si possono trattare da 1.000 a 10.000 talee.

ISTRUZIONI COMPLEMENTARI: per avere istruzioni più particolareggiate consultare la "Guida alla radicazione RHIZOPON".

SCELTA DEL METODO E DEL PRODOTTO: in generale per le talee non lignificate si utilizza il trattamento a secco con la polvere, mentre per le talee legnose si preferisce il trattamento per assorbimento con le compresse. Una eventuale fallanza indica una scelta non idonea del prodotto oppure una concentrazione troppo debole del principio attivo; per contro un superdosaggio provoca l'arricciamento delle foglie ed in alcuni casi la morte della talea stessa.
COMPATIBILITA': in considerazione dell'uso si sconsiglia la miscela con altri formulati.

ATTENZIONE DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del trattamento. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

RHIZOPON b.v.
Rijndijk 263a 2394 CE Hazerswoude
OLANDA

Importatore per l'Italia
CRIADO srl
Via pr. Orchidea 6/4
RECCO GE

Registrazione del Ministero della Sanità N° 6941 del 22-1-1987
CONTENUTO **100 g - 500 g**

- DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
- PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
- DA NON VENDERSI SFUSO
- SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
- IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
- NON OPERARE CONTRO VENTO
- IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acqua di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

RHIZOPON® B-POLVERE 0,2%

FITOREGOLATORE PER LA FORMAZIONE DELLE RADICI NELLE TALEE ERBACEE E LEGNOSE

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione: NAA puro g 0,2
Sostanza inerte q.b. a 100

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

1-Conservazione della polvere: La polvere di Rhizopon B polvere 0,2% si conserva indefinitamente nel suo flacone originale utilizzato. La conservazione risulterà perfetta se si avrà cura di richiudere bene il tappo e conservare l'imballaggio in ambiente secco e fresco ed al riparo dalla luce. 2- Modalità d'impiego: a) E' raccomandabile per ciascun impiego di depositare una piccola quantità di polvere in un contenitore a forma di astuccio, tubo o vetro stretto. b) Se necessario inumidire la parte inferiore della talea ed agitarla successivamente per eliminare l'eccesso di acqua. c) Immergere la base della talea per una profondità di 1 – 2 cm nella polvere facendola roteare leggermente per ottenere una completa impregnazione. d) Scuotere la talea ma lontano dalla polvere, che deve rimanere più secca possibile. e) Prima del trapianto preparare un buco od un solco in modo che possa contenere la talea senza asportarne la polvere che andrebbe a concentrarsi formando un anello alla superficie del substrato. Con 100 g di prodotto si possono trattare da 1.000 a 10.000 talee.

ISTRUZIONI COMPLEMENTARI: per avere istruzioni più particolareggiate consultare la "Guida alla radicazione RHIZOPON".

SCELTA DEL METODO E DEL PRODOTTO: in generale per le talee non lignificate si utilizza il trattamento a secco con la polvere, mentre per le talee legnose si preferisce il trattamento per assorbimento con le compresse. Una eventuale fallanza indica una scelta non idonea del prodotto oppure una concentrazione troppo debole del principio attivo; per contro un superdosaggio provoca l'arricciamento delle foglie ed in alcuni casi la morte della talea stessa.
COMPATIBILITA': in considerazione dell'uso si sconsiglia la miscela con altri formulati.

ATTENZIONE DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del trattamento. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

RHIZOPON b.v.
Rijndijk 263a 2394 CE Hazerswoude
OLANDA

Importatore per l'Italia
CRIADO srl
Via pr. Orchidea 6/4
RECCO GE

Registrazione del Ministero della Sanità N° 6922 del 18-12-1986
CONTENUTO **100 g - 500 g**

- DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
- PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
- DA NON VENDERSI SFUSO
- SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
- IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
- NON OPERARE CONTRO VENTO
- IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acqua di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

RHIZOPON® B-COMPRESSE

FITOREGOLATORE PER LA FORMAZIONE DELLE RADICI NELLE TALEE ERBACEE E LEGNOSE

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione: NAA puro g 10
Sostanza inerte q.b. a 100

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
1 – Conservazione delle compresse e della soluzione.
Le compresse si conservano a condizione che esse siano tenute nei blister originali in ambiente secco, fresco ed al riparo dalla luce. E' consigliabile utilizzare la soluzione il più rapidamente possibile. Tuttavia si può conservare una soluzione fresca per qualche giorno, purchè mantenuta in ambiente fresco ed in penombra.

2- Preparazione della soluzione
Si introducono le compresse o parti di esse in una bottiglia (preferibilmente di vetro scuro) e quindi si aggiunge acqua fino ad un litro. Si agita vigorosamente fino al completo scioglimento delle compresse.

3- Modalità d' impiego
Immergere la base della talea, per una profondità di 2 cm nella soluzione, per un periodo da 4 a 24 ore.
Le talee andranno successivamente trapiantate e curate nel modo usuale.
Importante: Al fine di evitare l'insorgenza di marciumi radicali o del colletto, prima del trapianto disinfettare le talee.

ISTRUZIONI COMPLEMENTARI:Per avere indicazioni più particolareggiate consultare la "Guida alla radicazione RHIZOPON".

SCELTA DEL METODO E DEL PRODOTTO: in generale per le talee non lignificate si utilizza il trattamento a secco con la polvere, mentre per le talee legnose si preferisce il trattamento per assorbimento con le compresse. Una eventuale fallanza indica una scelta non idonea del prodotto oppure una concentrazione troppo debole del principio attivo; per contro un superdosaggio provoca l'arricciamento delle foglie ed in alcuni casi la morte della talea stessa.

COMPATIBILITA': in considerazione dell'uso si sconsiglia la miscela con gli altri formulati

ATTENZIONE DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del trattamento. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

RHIZOPON b.v.
Rijndijk 263a 2394 CE Hazerswoude
OLANDA

Importatore per l'Italia
CRIADO srl
Via pr. Orchidea 6/4
RECCO GE

Registrazione del Ministero della Sanità N° 6954 del 28-1-1987

CONTENUTO **20 compresse da 25 mg ciascuna**

- DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
- PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
- DA NON VENDERSI SFUSO
- SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
- IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
- NON OPERARE CONTRO VENTO
- IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acqua di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

RHIZOPON® B-COMPRESSE

FITOREGOLATORE PER LA FORMAZIONE DELLE RADICI NELLE TALEE ERBACEE E LEGNOSE

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione: NAA puro g 10
Sostanza inerte q.b. a 100

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

RHIZOPON b.v.
Rijndijk 263a 2394 CE Hazerswoude
OLANDA

Importatore per l'Italia
CRIADO srl
Via pr. Orchidea 6/4
RECCO GE

Registrazione del Ministero della Sanità N° 6954 del 28-1-1987
CONTENUTO **20 compresse da 25 mg ciascuna**

- PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
- SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
- IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
- IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

AAKO B.V.

OVNI XL
(SOSPENSIONE CONCENTRATA)
DISERBANTE PER VITE, MELO, PERO, DRUPACEE, OLIVO E PER AREE NON COLTIVATE

Registrazione Ministero della Salute n. 011769 del 07/12/2005

Aako B.V. – P.O. Box 205 – 3830 AE LEUSDEN (OLANDA)

COMPOSIZIONE

- GLIFOSATE acido puro (da sale isopropilamminico)		gr. 30	(= 360 g/l)
- OXIFLUORFEN puro		gr. 2,5	(= 30 g/l)
- Coformulanti	q.b. a	gr. 100	

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Stabilimento di produzione:
Aako B.V. – Arnhemeseweg 87 – 3832 GK LEUSDEN (OLANDA)

Contenuto **0,2-0,25-0,5-1-5-10-20 L** Partita n.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
OVNI XL è una miscela contenente Glifosate, caratterizzato da azione di contatto, elevata sistemia e ampio spettro d'azione ed Oxifluorfen, a effetto di contatto. Il formulato consente un rapido contenimento di molte delle malerbe normalmente presenti in frutteto e vigneto e una sensibile riduzione delle rinascite. La miscela può essere applicata anche per il diserbo di aree industriali, civili, bordi stradali, argini

COLTURE, DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONI

Vite e frutteti (melo, pero e drupacee).
Interventi autunnali contro tutte le graminacee e dicotiledoni annuali e le nascite delle principali infestanti invernali, quali: Centocchio (*Stellaria media*), Veronica (*Veronica spp.*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Senape (*Sinapis spp.*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Borsa del Pastore (*Capsella bursa pastoris*) e altre Crucifere, Poe (*Poa spp.*), Loietto (*Lolium perenne*), Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*) e Avene (*Avena spp.*) alla dose di 1,5-2 litri/ha da aumentare fino a 3 litri/ha nel caso di forti infestazioni o con infestanti adulte e non in attiva crescita.
In primavera si può intervenire precocemente, con vegetazione ancora ferma e infestanti non eccessivamente sviluppate, sia nei confronti delle annuali già emerse quali le principali Crucifere, Veronica (*Veronica spp.*), Papavero (*Papaver roheas*), le prime nascite di Poligoni (*Polygonum spp.*), sia verso le perennanti quali Romice (*Rumex spp.*), Stoppione (*Cirsium spp.*), Ortiche (*Urtica spp.*), Malva (*Malva sylvestris*) e Artemisia (*Artemisia vulgaris*) alla dose di 2 litri/ha di formulato che deve essere aumentato a 3 litri/ha soprattutto in presenza delle perennanti più difficili.
Se si posticipa l'intervento alla piena primavera, si ottengono ottimi risultati su Vilucchio (*Convolvulus arvensis*) e sulle infestanti tipicamente estive, quali Amaranto (*Amaranthus spp.*), Farinaccio comune (*Chenopodium album*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Erba morella (*Solanum nigrum*) alla dose di 1,5-2 litri/ha.
Olivo: intervenire fino a una settimana prima della raccolta su vegetazione sviluppata o su ricacci da sfalci precedenti alla dose di 2 litri/ha. In caso di forti infestazioni o con infestanti adulte e non in attiva crescita innalzare la dose a 3 litri/ha.

Utilizzare il prodotto con volumi d'acqua di 200-600 litri/ha di acqua impiegando i volumi maggiori in presenza di infestanti sviluppate.

Diserbo totale degli incolti (aree industriali e civili, bordi stradali, argini e sedi ferroviarie). Intervenire con OVNI XL alla dose di 3 litri/ha per il controllo della maggior parte della flora presente.

Avvertenze: Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, oppure quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, ha efficacia ridotta.

L'efficacia del prodotto può venire ridotta se intervengono piogge entro 6 ore dal trattamento o se le malerbe vengono falciate prematuramente prima che il principio attivo abbia avuto modo di essere traslocato negli organi sotterranei delle infestanti in specie perennanti. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o di ferro se non protetti da vernici plastiche. Teme il gelo. Da non impiegare in pre-raccolto.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
E' necessario evitare che eventuali spruzzi della soluzione colpiscano l'apparato fogliare delle colture. Asportare, se necessario, prima del trattamento, i ricacci alla base delle piante. Impiegare pompe a bassa pressione (3 atm. al massimo) utilizzando ugelli che formino gocce di grosse dimensioni allo scopo di evitare fenomeni di deriva.

- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
- NON OPERARE CONTRO VENTO
- PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
- SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE OLIVE

COMPATIBILITÀ
OVNI XL si usa da solo.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare, rami non lignificati, succhioni del tronco e del portainnesto delle colture indicate, poiché la vegetazione, se inavvertitamente bagnata, potrebbe mostrare scottature localizzate. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente, con tre risciacqui consecutivi di acqua, le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

- DA NON VENDERSI SFUSO

- IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

- ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO E DELL'IMBALLAGGIO: SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI.

DU PONT S.r.l.

ADODIN

Fungicida ad azione preventiva e curativa - Polvere bagnabile

ADODIN
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Dodina pura g 65
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R22). Irritante per gli occhi e per la pelle (R36/38). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Siemens 12, Bolzano
Registrazione n. 3482 del 07.02.1980 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1   PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardio-circolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione resistenti a terapia.**Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
ADODIN è un fungicida azotorganico particolarmente indicato per la lotta alla ticchiolatura. Preventivo e bloccante per contatto, curativo per translaminarita', Adodin agisce su spore, conidi e micelio dei funghi patogeni ad azione preventiva e in parte bloccante.

Dosi - Epoche - Modalità d'impiego
Dosi per 100 litri d'acqua:
Melo, pero: contro Ticchiolatura trattamenti preventivi g 80, trattamenti curativi g 100.
Ciliegio ed altre drupacee: contro Antracnosi, Cilindrosporiosi, Bolla e cancro dei rami g 60.
Nespolo: contro la Ticchiolatura g 60-120.
Vite: contro Peronospora ed Antracnosi g 80-120.
Pioppo: contro Marssonnina g 100-120.
Fragola: contro Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Alternariosi, Fusariosi, Septoriosi. Ruggini g 80-150.
Cipolla: contro Peronospora g 80-150.
Rosa: contro Ticchiolatura, Alternariosi, Peronospora, Septoriosi, Ruggini g 80-150.
Garofano: contro Fusariosi g 80-150.
Distribuire Adodin uniformemente. Non impiegare acque troppo fredde e non trattare con temperature esterne prossime a 0°C.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

COMPATIBILITA'
ADODIN non è compatibile con i prodotti alcalini (Poltiglia bordolese, Polisolfuri). Sono inoltre sconsigliate le miscele con carbaril, dimetoato, azinfos metile, DDVP. Le miscele con esteri fosforici emulsionabili e con olii minerali possono dar luogo a scarsa sospensibilita'.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' tossico per animali domestici, ed il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura-ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Altre taglie autorizzate: kg 5 - 10

AGHERUD® DICAMBA

Erbicida ormonico di post-emergenza - Liquido miscibile

AGHERUD DICAMBA
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Dicamba sale dimetilamminico
g 3,07 corrispondente ad acido libero
g 2,56 (= 27,904 g/l)
MCPA sale dimetilamminico g 35,8
corrispondente ad acido libero g 29,1
(=317,19 g/l)
Coformulanti q. b. a 100
FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione (R20/21/22).

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46).
Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Isagro S.p.A. - Via Nettunense Km 23,400, Aprilia (LT)
Registrazione N. 0227 del 06.09.1971 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: Litri 1 PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: DICAMBA SALE 3,07% e MCPA SALE 35,8%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
DICAMBA - Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. **Terapia:** sintomatica.
MCPA - Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea: irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica. Ospedalizzare.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118.

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
AGHERUD DICAMBA è un erbicida ormonico ad impiego di post-emergenza precoce, attivo anche a temperature relativamente basse (non inferiori a 8 °C).
La ridotta tensione di vapore (prodotto non volatile) riduce al minimo il rischio di danneggiare le colture sensibili limitrofe all'area di trattamento.
AGHERUD DICAMBA agisce per assorbimento fogliare e radicale. Controlla numerose infestanti annuali e perenni a foglia larga, quali: *Anagallis arvensis, Atriplex* spp., *Brassica* spp., *Capsella bursa pastoris, Cardemine hirsuta, Centaurea* spp., *Chenopodium album, Cirsium* spp., *Convolvulus arvensis, Delphinium consolida, Fumaria officinalis, Galinsoga parviflora, Galium aparine, Matricaria* spp., *Papaver rhoeas, Geranium, Polygonum* spp., *Portulaca oleracea, Plantago* spp., *Ranunculus* spp., *Raphanus raphanistrum, Rumex* spp., *Senecio vulgaris, Sinapis* spp., *Spergula arvensis, Sonchus arvensis, Stellaria media, Taraxacum officinale, Thlaspi arvense, Veronica* spp., *Vicia sativa, Viola* spp.

Dosi - Epoche - Modalità d'impiego
Cereali: dall'inizio dell'accestimento all'inizio della levata su:
- frumento: 2,5 - 3,3 L/ha in 400 - 600 litri d'acqua
- orzo, avena, segale: 2,5 - 4 L/ha in 400 - 600 litri d'acqua
- mais: 0,8 - 1 L/ha in 400 - 600 litri d'acqua
Avvertenza: trattare nelle ore più fresche della giornata. Su mais non più alto di 25 cm ridurre la quantità d'acqua a 300 - 400 litri per ettaro.
Frutticoltura: quando le infestanti sono in attiva crescita su:
- melo: 5 - 6 L/ha in 1200 - 1500 litri d'acqua
Bagnare accuratamente la vegetazione affinché il prodotto si distribuisca uniformemente sulle infestanti.
AGHERUD DICAMBA non è volatile per cui si può impiegare anche in vicinanza di colture sensibili quali, orticole, alberi da frutto, vite, evitando però di investirle direttamente anche sotto forma di vapori portati dal vento.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria o nella poltiglia diserbante già preparata.

COMPATIBILITA'
AGHERUD DICAMBA non deve essere miscelato con insetticidi e anticrittogamici.
Avvertenza: in caso di miscela con altri erbicidi deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non diserbare le colture arboree in fioritura.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta delle mele e 20 giorni prima della raccolta dei cereali.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

® Marchio registrato Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.

Altre Officine autorizzate:
Inagra S.A. - 46410 Sueca, Valencia (Spagna)
Hermania Dr. Schirm – 39218 Schoenebeck - Germania
Altre taglie autorizzate: Litri 5 - 10 - 20

ALLUM R

Fungicida sistemico e di copertura
Granuli Idrodispersibili

ALLUM R
Composizione:
Fosetil alluminio puro g 25
Rame metallo puro g 25
(da rame idrossido)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per inalazione (R23). Rischio di gravi lesioni oculari (R41). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini (S1/2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21).
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua (S26). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Proteggersi gli occhi/la faccia (S39). In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S45). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61). In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo (S63).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officine di produzione
SIDECO Dr. Schirm GmbH – Lubecca, Germania
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.a. – Cotignola, (RA)
F. Joh. Kwizda GmbH – Leobendorf bei Korneuburg, Austria
Officine di solo confezionamento:
Isagro S.p.a. – via Nettunense km 23,400, Aprilia (LT)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. – Z.I. Les Attignours, La Chambre, Francia

Registrazione n° 10501 del 31.05.2000 del Ministero della Sanità

Contenuto netto g 100 – 250 –500 kg 1 – 5 – 10 - 25 Partita n°

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: - Fosetil alluminio 25% - Rame 25%, le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: FOSETIL ALLUMINIO: sedazione, dispnea, depressione. RAME: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **TERAPIA**. Sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE: ALLUM R è un fungicida antiperonosporico ad ampio spettro di azione dotato sia di azione sistemica, in grado di proteggere anche la vegetazione che si forma successivamente ai trattamenti, che di copertura. La presenza di rame conferisce al prodotto una apprezzabile attività di contenimento delle batteriosi. Grazie a queste sue caratteristiche il prodotto può venire normalmente impiegato ad intervalli più ampi rispetto ai fungicidi tradizionali di contatto.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: il prodotto si impiega in trattamenti preventivi per la difesa di:

Vite	contro Peronospora, Escoriosi, Antracnosi, Black rot intervenendo preventivamente ogni 10-14 giorni	400-500 g/hl
Pesco	contro Bolla, Corineo, Cancri rameali, Batteriosi nei trattamenti autunnali alla caduta delle foglie e di fine inverno prima del rigonfiamento delle gemme	400-500 g/hl
Agrumi	(Arancio, Mandarino, Limone, Pompelmo) contro Phytophtora spp. (gommosi parassitaria del colletto e allupatura dei frutti) Antracnosi e Mal secco, Fumaggini irrorazioni fogliari a	500 g/hl
Melo, Pero	contro Antracnosi e Alternaria, Cancri rameali, Batteriosi in trattamenti primaverili-estivi	3-5 kg/ha
Actinidia	contro Peronospora	4-5 kg/ha
Fragola	contro Vaiolatura rossa, Batteriosi	150-200 g/hl
Pomodoro	contro Peronospora, Alternaria, contenimento delle Batteriosi	4-5 kg/ha
Carciofo	contro Peronospora e contenimento delle Batteriosi	4-5 kg/ha
Lattuga	contro Antracnosi, Alternaria, Cladosporiosi, Ascochita intervenire alla prima comparsa dei sintomi	150-200 g/hl
Melone, Cocomero, Cetriolo	contro Peronospora	5 kg/ha
Spinacio	contro Peronospora, Antracnosi, Cladosporiosi	150-200 g/hl
Vivai di Fruttiferi ed Ornamentali	contro Peronospora, Alternarie, Antracnosi, Batteriosi, Cancri rameali Si consiglia di trattare ad intervalli di 8-10 giorni, se si impiega la dose inferiore, e 12 giorni con il dosaggio più elevato	400-600 g/hl

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Sciogliere la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con i prodotti a forte reazione acida o alcalina, i prodotti in formulazione oleosa, i concimi fogliari a base azotata e i formulati a base di Dicofol. In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela, preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Durante i trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

FITOTOSSICITÀ: Non trattare la vite in fioritura.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti: 30 giorni prima della raccolta su fragola; 40 giorni prima della raccolta su melo, pero, actinidia, pesco, vite e tabacco; 80 giorni prima della raccolta su arancio, mandarino, limone, pompelmo; 20 giorni prima della raccolta su tutte le altre colture.

ATTENZIONE: da **impiegare esclusivamente in agricoltura – ogni altro uso è pericoloso**. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

AVVERTENZA: Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle; non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento; non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

ALUSIL MZ

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro la Peronospora ed Escoriosi della vite - Polvere bagnabile

ALUSIL MZ
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Mancozeb puro g 24
Fosetil alluminio puro g 40
Coformulanti q. b. a 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie (R37). Rischio di gravi lesioni oculari (R41). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Nocivo per gli organismi acquatici, puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R52/53).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26). Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi la faccia (S36/37/39). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. – Via Siemens 12, Bolzano

Registrazione N. 7574 del 25.10.1988 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: kg 1 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso ed al riparo dall'umidita'. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi dell'associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO 40% e MANCOZEB 24%.
Il MANCOZEB, separatamente, provoca i seguenti sintomi d'intossicazione:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino a collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
ALUSIL MZ è un fungicida sistemico formato da due principi attivi che, completandosi a vicenda, combattono la Peronospora e svolgono anche azione contro l'Escoriosi.
Si consiglia l'impiego del prodotto per prevenire soprattutto la malattia, anche se questo è dotato di capacità curative.
Dosi ed epoche d'impiego
Peronospora: g 350 per 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti quando i germogli della vite hanno raggiunto la lunghezza di cm 10. Ripetere il trattamento dopo 10 giorni e poi trattare ogni 15 giorni fino alla fase di allegagione compresa. Dopodiché' proseguire la lotta con prodotti rameici.
Escoriosi: g 350 per 100 litri d'acqua. Per la lotta contro questa malattia effettuare due trattamenti: il primo nella fase di «gemma mossa» (fase D del Baggiolini) ed il secondo quando le foglie sono formate (fase E del Baggiolini).

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile in via di massima con altri antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, calce).
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

Altre taglie autorizzate: kg 5 - 10

ASSORAM® 40 WDG

Fungicida a base di idrossido di rame
Granuli idrodispersibili

ASSORAM® 40 WDG
Composizione
100 gr di prodotto contengono:
Rame metallo.g 40
(sotto forma di idrossido)
Coformulanti q.b.a 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione (R22). Rischio di gravi lesioni oculari (R41). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA:.
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia (S36/37/39). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di produzione:
E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) - 12701 Almeda Road, Houston Texas (USA)

Officine di solo confezionamento:
Scam S.r.l. – Str. Bellaria 164, S. Maria di Mugnano (MO)
Ital-Agro S.a.s. – Via Cravero 110, Grugliasco (TO)
Chemia S.p.A. – S.S. 255 km 46, S. Agostino (FE)
Bayer CropScience S.r.l. – Via delle Industrie, 9 Filago (BG)
Lifa S.r.l. – Via Colombo n.7/7°, Vigonovo (VE)
Lifa S.r.l. – Via Piave, Isola Vicentina (VI)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. – Z.I. Les Attignours, La Chambre (Francia)

Distribuito da:
Sariaf S.p.A. via Morgani 68, Faenza (RA)

Registrazione n. 9167 del 17.03.1997 del Ministero della Sanità
Contenuto netto g 100 - 500 - kg 1 – 5 – 10 - 20 Partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE: ASSORAM® 40 WDG è un fungicida a base di Rame idrossido in granuli idrodispersibili. Tale formulazione garantisce un'ottima fluidità del prodotto, nonché elevata adesività e persistenza sulle colture trattate.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Introdurre i granuli nel serbatoio dell'irroratrice, parzialmente riempita d'acqua, e mescolare sino a completa dissoluzione del preparato. Le dosi indicate si riferiscono a 100 lt d'acqua e per trattamenti con pompe a volume normale.

Melo, Pero	contro Ticchiolatura e Cancro nei trattamenti autunno-invernali	g 500-1000
	nei trattamenti primaverili	g 200-300
Drupacee e mandorlo	contro Sclerotinia, Corineo, Bolla nei trattamenti autunno-invernali	g 500-1000
Vite	contro Peronospora, Black-rot, Antracnosi	g 200-300
Agrumi	contro Fumaggine, Mal secco, Allupatura, Gommosi del colletto, Batteriosi	g 200-300
Orticole	(carciofo, cardo, carota, cavolo, cetriolo, cicoria, cipolla, fagiolo, lattuga, melanzana, melone, patata pomodoro, peperone, pisello, rapa, ravanello, sedano, spinacio, prezzemolo, zucca): contro Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Cercospora, Batteriosi, Septoriosi	g 200-300
Olivo	contro Fumaggine, Occhio di Pavone	g 200-300
Barbabietola da zucchero	contro Peronospora, Cercospora	kg 3-3,5/ha
Fragola	contro Vaiolatura	g 200-300
Floreali in pieno campo	contro Ruggine, Peronospora	gr 200-300
Riso	contro Alghe verdi, intervenire alla comparsa dell'attacco con un quantitativo di soluzione sufficiente a coprire l'intera superficie	kg 2,80-3,65/ha

COMPATIBILITA': ASSORAM® 40 WDG non è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina e con Tiram.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Su varietà di Melo (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard), su Drupacee sensibili ai prodotti cuprici, il prodotto può essere fitotossico, se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Non trattare durante la fioritura per l'azione caustica sui fiori.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere I trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato Sariaf S.p.A

AZURAM®

Fungicida a base di ossicloruro di rame
Polvere bagnabile

AZURAM®
Composizione
100 gr di prodotto contengono:
Rame metallo g 40
(sotto forma di ossicloruro)
Coformulanti q.b.a 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione e ingestione (R20/22). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di produzione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.
Stabilimento di Bolzano – Via Siemens 12
Registrazione n. 4161 del 20.12.1980 del Ministero della Sanità
Contenuto netto kg 1 Partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE:
AZURAM e' un fungicida rameico ad ampio spettro la cui micronizzazione consente massima adesivita' e persistenza.
Agisce per contatto ed esplica protezione di copertura.

DOSI - EPOCHE - MODALITA' DI IMPIEGO
Dosi per 100 litri di acqua.
Melo e Pero: contro Cancri dei rami, Ticchiolatura, durante il riposo vegetativo g 500.
Pesco, Albicocco, Ciliegio: contro Bolla, Corineo, Cancri dei rami, Moniliosi, durante il periodo vegetativo g 500.
Vite: contro Peronospora, Muffa grigia, Mal dell'esca g 500.
Olivo: contro Occhi di pavone, Fumaggini, Lebbra, Batteriosi g 500-700.
Agrumi: contro Mal secco, Fumaggini, Allupatura g 500-700.
Barbabietola da zucchero: contro Cercospora g 600.
Patata: contro Peronospora, Alternariosi g 600-700.
Colture orticole e da fiore: contro Peronospora, Alternariosi g 200-500.
A seconda della sensibilita' delle piante floricole ed ornamentali al rame impiegare g 150-400.
Impiegare AZURAM a scopo preventivo a seconda dell'andamento stagionale e seguendo il calendario d'incubazione delle malattie.
Bagnare con cura la vegetazione affinche' il prodotto si distribuisca uniformemente sulle superfici da proteggere.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e portare a volume mescolando bene.

COMPATIBILITA'
Il prodotto e' compatibile in via di massima con i piu' comuni fitofarmaci fatta eccezione di quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco e le varieta' di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto puo' essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' tossico per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato DuPont de Nemours

Altra officina autorizzata: Isagro S.p.A. - Stabilimento di Adria Cavanella Po (Rovigo)
Altre taglie autorizzate: kg 5 - 10 - 25

AZURAM® *Ultra* IDRO

Fungicida a base di Idrossido di Rame neutro per la lotta contro malattie fungine di Fruttiferi, Vite, Olivo, Ortaggi, Patata, Pomodoro, Barbabietola da zucchero, Oleaginose, Tabacco, Floreali, Ornamentali, Forestali e per la lotta contro le alghe delle risaie – Polvere Bagnabile

AZURAM *Ultra* IDRO
Composizione
Rame metallo puro g. 25
(sotto forma di idrossido)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione (R22). Tossico per inalazione (R23). Rischio di gravi lesioni oculari (R41). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini (S1/2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua (S26). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Proteggersi gli occhi/la faccia (S39). In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S45). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61). In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo (S63).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officine di produzione
Sipcam S.p.A. – Salerano Sul Lambro (LO)
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l - Via Siemens 12, Bolzano
Chemia Spa - S.S. 255 Km 46, S. Agostino, (FE)
Scam S.r.l.- Strada Bellaria 164, S. Maria di Mugnano (MO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10652 del 29.12.2000
Contenuto netto g 100 – 200 – 500 kg 1 – 5 – 10 – 20 - 25
Partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO: Il prodotto si impiega alle seguenti dosi riferite a 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale. Effettuando i trattamenti con pompe a volume ridotto, le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate, per distribuire la stessa quantità di prodotto per unità di superficie, che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti, aggiungere alla miscela 50 g/hl di bagnante.
FRUTTIFERI:
Pesco: contro Bolla e Corineo in trattamenti autunnali: kg. 1-2, in trattamenti di fine inverno: g. 400-600.
Albicocco: contro Sclerotinia, Marciume bruno, Corineo e Bozzacchioni in trattamenti invernali: kg. 1-2, in trattamenti pre-fiorali e post-fiorali: g. 400-600.
Ciliegio: contro Sclerotinia, Corineo, Scopazzi: kg. 1-2
Nespolo: contro il Brusone: g. 400-600.
Melo e Pero: contro Cancri rameali e ticchiolatura nei trattamenti invernali: in un unico trattamento alla caduta delle foglie kg. 1-2 oppure in due applicazioni a metà dose di cui la prima ad un terzo della caduta delle foglie e la seconda alla completa caduta.. Ticchiolatura: alla ripresa vegetativa/ingrossamento delle gemme: g. 700-800, dopo la ripresa vegetativa (orecchiette di topo): g. 400-600. Da non usare durante il periodo vegetativo sulle varietà di melo e pero sensibili ai prodotti rameici.
OLIVO: contro Occhio di pavone e Lebbra: g. 400-600
AGRUMI: contro Mal secco, Antracnosi, Fumaggine, Allupatura: g. 400-600; iniziare i trattamenti prima della comparsa od all'inizio della malattia, ripetendoli secondo necessità.
VITE: contro la Peronospora: g. 400-600; effettuare i normali trattamenti sulla base dei calendari comunemente impiegati in zona. Impiegare di preferenza il prodotto dopo la fioritura della vite, usando fungicidi acuprici prima della fioritura. In zone ed in annata con forti infezioni di Peronospora, si può opportunamente aumentare la dose di impiego a g. 600-800; per la lotta contemporanea contro l'Oidio o Mal bianco aggiungere un prodotto antioidico specifico. Il prodotto può essere impiegato nella preparazione di zolfi ramati per trattamenti polverulenti mescolando kg. 6-8/ha di prodotto con kg 50-60/ha di zolfo in polvere.
FRAGOLE: contro la Maculatura rosso-bruna e zonata (Marsonnina e Gnomonia), Vaiolatura rossa (Mycospaerella), intervenire in pre-fioritura e sulla vegetazione autunnale: g. 400-600.
PATATA: contro la Peronospora della patata: g. 400-600
POMODORO: contro Peronospora, Septoria, Alternaria, Batteriosi: g. 400-600
TABACCO: contro la Peronospora: g. 400-600
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro la Cercospora: kg. 6-7 per ettaro con trattamenti ripetuti.
ORTAGGI: Cavoli, Carciofo, Asparago, Ortaggi a foglia, Cucurbitacee, Solanacee, Legumi, Ortaggi a radice, Ortaggi a bulbo: contro Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Septoria e Ruggine: g. 400-600
OLEAGINOSE: contro Peronospora, Septoria, Antracnosi: g. 400-600
FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI: contro Peronospora, Ticchiolatura, Septoria, Antracnosi, Ruggine: g 400-600.
Per tutti gli impieghi sopra indicati iniziare i trattamenti prima della comparsa delle malattie, ripetendoli secondo lo sviluppo delle stesse.
RISO: per la lotta contro le alghe delle risaie intervenire alla prima comparsa delle alghe, impiegando kg 3-4 per ettaro diluiti in 200-300 o più litri di acqua ripetendo i trattamenti secondo necessità.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: stemperare il prodotto in poca acqua a parte e versare poi nel totale quantitativo di acqua mantenendo in agitazione.

COMPATIBILITA': il prodotto può essere associato con i più comuni anticrittogamici ed insetticidi di impiego primaverile-estivo (purché non alcalini, quali Poltiglia Bordolese, Polisolfuri, Calce) impiegando la miscela entro una o due ore dalla preparazione.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (Abbondanza "Belford", Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dottor Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

BACIDE

Insetticida biologico selettivo a base di Bacillus thuringiensis var. Kurstaki, sierotipo H-3A3B
Agisce per ingestione contro le larve dei Lepidotteri
Polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Bacillus thuringiensis var. Kurstaki, sierotipo H-3A3B g 5
Coformulanti q. b. a 100
POTENZA : 16000 UI/mg di formulato

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego (S20/21). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di produzione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. – Via Siemens 12, Bolzano
Registrazione N. 8245 del 23.03.1993 del Ministero della Sanità

Contenuto netto : kg 1 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare in luogo fresco. Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti di protezione individuale e con relativa marcatura CE per la protezione da agenti biologici, e guanti, quali dispositivi di protezione individuale con relativa marcatura CE e conformita' alla EN 374. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
BACIDE e' un'insetticida biologico, il cui principio attivo e' composto da spore e cristalli endotossici prodotti durante il processo di sporulazione del batterio Bacillus thuringiensis Kurstaki e che esplica un'azione letale specifica nei confronti delle larve dei Lepidotteri, mentre non agisce sulle uova, sulle pupe (o ninfe) e sugli insetti adulti. BACIDE deve essere impiegato immediatamente dopo la comparsa delle larve di Lepidotteri ed agisce per ingestione quando esse cominciano a nutrirsi.
Intervenire con attrezzature che, munite di pompa a volume, distribuiscano volumi medio alti di acqua.
Dosi e campi d'impiego
BACIDE si impiega alla dose di 0,5-1 kg/ha, diluita in 500-1000 litri di acqua per ettaro.
-**Colture Forestali** : contro Limantrie e Processionarie, Malacosoma e Tortricidi.
-**Pioppo** : contro Limantrie, Stilpnotie, Lepidotteri defogliatori in genere.
-**Mais** : contro la Piralide.
-**Pomacee** : contro Limantrie, Operophtere.
-**Cavoli, Rape, Rapanello** : contro Cavolaie e Mamestre.
-**Vite** : contro le Tignole.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA ED ISTRUZIONI PER L'USO
Disciogliere BACIDE in poca acqua a parte e quindi versare nel serbatoio dell'apparecchiatura di distribuzione portando a livello. Si raccomanda di preparare ed usare la diluizione nel medesimo giorno.
E' preferibile effettuare l'applicazione nel primo mattino o nel tardo pomeriggio per evitare l'influenza negativa dell'irradiazione solare. La dose da impiegarsi dipende dalla diffusione e dallo stadio di sviluppo delle larve.
Si consiglia di ripetere il trattamento una seconda volta dopo 10-12 giorni in relazione al grado di infestazione, alla densita' della coltura, alle condizioni climatiche.

COMPATIBILITA'
BACIDE e' compatibile con un gran numero di insetticidi, acaricidi, fungicidi ed adesivanti, purche' non a reazione alcalina, se mescolato con questi in fase liquida ed usato immediatamente.
Avvertenze : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta.

Attenzione : Da impiegare esclusivamente in agricoltura - Ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE
BACIDE deve essere conservato in luogo fresco, asciutto e ventilato. A temperatura ambiente (2° - 24° C) il prodotto e' stabile per due anni. Chiudere ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

Altre taglie autorizzate: kg 5 - 10

BALANCE®

Erbicida – Granuli idrodispersibili

BALANCE
COMPOSIZIONE
Clorsulfuron puro 75 g
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Distribuito da: Siapa S.r.l. – Via Caldera 21, Milano

Registrazione N. 10958 del 18.06.2001 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: g 10 PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
BALANCE è un erbicida selettivo idoneo per il diserbo autunnale del frumento tenero e duro. BALANCE è efficace per il controllo della maggior parte delle malerbe dicotiledoni e di diverse graminacee annuali quali:
- **tra le più sensibili** *Alopecurus myosuroides, Anthemis aestivalis, Apera spica-venti, Capsella bursa pastoris, Fumaria officinalis, Lamium* spp., *Lolium multiflorum, Matricaria chamomilla, Myagrum perfoliatum, Phalaris* spp., *Ranunculus* spp., *Rumex* spp., *Stellaria media, Veronica* spp., *Viola arvensis*;
- **molto sensibili** sono anche: *Bifora radians, Chrysanthemum segetum, Cirsium arvense, Equisetum* spp., *Galium aparine, Papaver rhoeas, Poa annua, Polygonum* spp., *Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis*.
BALANCE è caratterizzato sia da una azione di contatto, sia da una attività residua con assorbimento attraverso l'apparato radicale.
BALANCE, subito dopo l'assorbimento, blocca l'accrescimento delle malerbe sensibili, con sintomi visibili (decolorazione e successiva morte) che possono anche manifestarsi solo dopo una-tre settimane: condizioni di caldo ed umido dopo il trattamento favoriscono l'attività erbicida.
DOSI D'IMPIEGO
BALANCE può essere usato su frumento in pre- o in post-emergenza precoce autunnale della coltura. In post-emergenza precoce il BALANCE controlla le avventizie mono- e dicotiledoni. L'epoca migliore d'applicazione è quella compresa tra gli stadi cotiledonare e delle prime due foglie vere delle infestanti.
In condizioni di siccità prolungata, non appena si ripristina un sufficiente grado di umidità nel terreno, vengono controllate anche le avventizie che germinano in tempi successivi. BALANCE si usa alla dose di 20 g/ha, da distribuire con 300-600 litri d'acqua (la dose di acqua maggiore con terreno zolloso, non ben lavorato o particolarmente secco). Il contenuto di questa confezione e' sufficiente per trattare ha 0,5.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
BALANCE, nella dose necessaria, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa a metà, mantenendo l'agitatore in movimento (eventuali erbicidi in miscela devono essere aggiunti successivamente): riempire poi il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.
AVVERTENZE
- Si raccomanda un'accurata preparazione del letto di semina ed una copertura uniforme del seme.
- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale: in caso tale sofferenza si verificasse successivamente al trattamento lo stato di debilitazione della coltura può essere temporaneamente aggravato.
- Da non applicare su frumento da traseminare con essenze foraggere.
- Non usare il prodotto in terreni soggetti a forti ristagni d'acqua o su terreno gelato o in presenza di brina.
- Non usare il prodotto in terreni soggetti ad inondazioni.
- In caso di necessità di **risemina** nei terreni già trattati, ricorrere **solo a frumento od orzo**; per la risemina di orzo si consiglia un'aratura profonda.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
d) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.

- Sulle varietà Lontra, Libellula, Valle d'Oro e Cona, si consiglia di applicare il prodotto in post-emergenza precoce. Su varietà di frumento di nuova introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività.
- Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo di azione.
RESTRIZIONI DI IMPIEGO
BALANCE è soggetto ad una degradazione rallentata in terreni alcalini ed in climi siccitosi. Alcune colture in rotazione al frumento sono danneggiate da tracce che in tali condizioni potrebbero rimanere nel terreno anche a distanza di 15-24 mesi dal trattamento.
In Italia settentrionale possono essere seminate le seguenti colture:
- frumento ed orzo in monosuccessione;
- soia, granoturco e sorgo nell'anno successivo alla raccolta del frumento trattato con BALANCE;
- tutte le altre colture soltanto 20 mesi dopo l'applicazione del BALANCE.
In Italia centrale, meridionale e isole, invece, il BALANCE dovrà essere impiegato soltanto in caso di mono-successione di frumento. In queste zone e' raccomandato comunque di considerare con attenzione il piano colturale per i due-tre anni successivi al trattamento. Nell'anno precedente la semina di una coltura diversa da frumento od orzo su terreno trattato con BALANCE, l'agricoltore dovrà coltivare una parcella della coltura prescelta al fine di accertare l'assenza di fitotossicità.
Per la procedura da seguire, rivolgersi alla Direzione Tecnica della Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.
Evitare, durante il trattamento, che la miscela erbicida possa arrivare su colture limitrofe o su terreni da seminare con colture sensibili (ad esempio barbabietola).
Nello svuotare e lavare l'attrezzatura porre la massima attenzione affinchè il prodotto non arrivi direttamente o per dilavamento a contatto di colture vicine o delle loro radici.
BALANCE in particolari situazioni (ad es. abbondanti piogge successive al trattamento) può determinare un leggero, temporaneo ingiallimento del frumento.
COMPATIBILITA'
BALANCE può essere usato in miscela con altri diserbanti selettivi, ove necessario per il controllo di malerbe non sensibili. Il BALANCE è compatibile fisicamente con i più comuni erbicidi del frumento: comunque si consiglia di verificare la compatibilità prima dell'uso. BALANCE, salvo il caso di miscele con altri erbicici selettivi ove necessario, non è da impiegare in miscela con altri antiparassitari o concimi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO-NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altre taglie autorizzate: g 20 - 50 - 100 - 200

FOGLIO ILLUSTRATIVO

BALANCE®

Erbicida – Granuli idrodispersibili

BALANCE
COMPOSIZIONE
Clorsulfuron puro 75 g
Coformulanti q. b. a 100
FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Distribuito da: Siapa S.r.l. – Via Caldera 21, Milano

Registrazione N. 10958 del 18.06.2001 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: g 10 PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
BALANCE è un erbicida selettivo idoneo per il diserbo autunnale del frumento tenero e duro. BALANCE è efficace per il controllo della maggior parte delle malerbe dicotiledoni e di diverse graminacee annuali quali:
- **tra le più sensibili** *Alopecurus myosuroides, Anthemis aestivalis, Apera spica-venti, Capsella bursa pastoris, Fumaria officinalis, Lamium* spp., *Lolium multiflorum, Matricaria chamomilla, Myagrum perfoliatum, Phalaris* spp., *Ranunculus* spp., *Rumex* spp., *Stellaria media, Veronica* spp., *Viola arvensis*;
- **molto sensibili** sono anche: *Bifora radians, Chrysanthemum segetum, Cirsium arvense, Equisetum* spp., *Galium aparine, Papaver rhoeas, Poa annua, Polygonum* spp., *Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis.*
BALANCE caratterizzato sia da una azione di contatto, sia da una attività residua con assorbimento attraverso l'apparato radicale.
BALANCE, subito dopo l'assorbimento, blocca l'accrescimento delle malerbe sensibili, con sintomi visibili (decolorazione e successiva morte) che possono anche manifestarsi solo dopo una-tre settimane: condizioni di caldo ed umido dopo il trattamento favoriscono l'attivita' erbicida.
DOSI D'IMPIEGO
BALANCE può essere usato su frumento in pre- o in post-emergenza precoce autunnale della coltura. In post-emergenza precoce BALANCE controlla le avventizie mono- e dicotiledoni. L'epoca migliore d'applicazione è quella compresa tra gli stadi cotiledonare e delle prime due foglie vere delle infestanti.
In condizioni di siccità prolungata, non appena si ripristina un sufficiente grado di umidità nel terreno, vengono controllate anche le avventizie che germinano in tempi successivi. BALANCE si usa alla dose di 20 g/ha, da distribuire con 300-600 litri d'acqua (la dose di acqua maggiore con terreno zolloso, non ben lavorato o particolarmente secco). Il contenuto di questa confezione e' sufficiente per trattare ha 0,5.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
BALANCE, nella dose necessaria, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa a metà, mantenendo l'agitatore in movimento (eventuali erbicidi in miscela devono essere aggiunti successivamente): riempire poi il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.
AVVERTENZE
- Si raccomanda un'accurata preparazione del letto di semina ed una copertura uniforme del seme.
- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale: in caso tale sofferenza si verificasse successivamente al trattamento lo stato di debilitazione della coltura può essere temporaneamente aggravato.
- Da non applicare su frumento da traseminare con essenze foraggere.
- Non usare il prodotto in terreni soggetti a forti ristagni d'acqua o su terreno gelato o in presenza di brina.
- Non usare il prodotto in terreni soggetti ad inondazioni.
- In caso di necessità di **risemina** nei terreni già trattati, ricorrere **solo a frumento od orzo;** per la risemina di orzo si consiglia un'aratura profonda.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
c) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
d) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
d) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
e) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
f) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.

- Sulle varietà Lontra, Libellula, Valle d'Oro e Cona, si consiglia di applicare il prodotto in post-emergenza precoce. Su varietà di frumento di nuova introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività.
- Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo di azione.
RESTRIZIONI DI IMPIEGO
BALANCE è soggetto ad una degradazione rallentata in terreni alcalini ed in climi siccitosi. Alcune colture in rotazione al frumento sono danneggiate da tracce che in tali condizioni potrebbero rimanere nel terreno anche a distanza di 15-24 mesi dal trattamento.
In Italia settentrionale possono essere seminate le seguenti colture:
- frumento ed orzo in monosuccessione;
- soia, granturco e sorgo nell'anno successivo alla raccolta del frumento trattato con BALANCE;
- tutte le altre colture soltanto 20 mesi dopo l'applicazione di BALANCE.
In Italia centrale, meridionale e isole, invece, BALANCE dovrà essere impiegato soltanto in caso di mono-successione di frumento. In queste zone e' raccomandato comunque di considerare con attenzione il piano colturale per i due-tre anni successivi al trattamento. Nell'anno precedente la semina di una coltura diversa da frumento od orzo su terreno trattato con BALANCE, l'agricoltore dovrà coltivare una parcella della coltura prescelta al fine di accertare l'assenza di fitotossicità.
Per la procedura da seguire, rivolgersi alla Direzione Tecnica della Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.
Evitare, durante il trattamento, che la miscela erbicida possa arrivare su colture limitrofe o su terreni da seminare con colture sensibili (ad esempio barbabietola). Nello svuotare e lavare l'attrezzatura porre la massima attenzione affinché il prodotto non arrivi direttamente o per dilavamento a contatto di colture vicine o delle loro radici.
BALANCE in particolari situazioni (ad es. abbondanti piogge successive al trattamento) può determinare un leggero, temporaneo ingiallimento del frumento.
COMPATIBILITA'
BALANCE può essere usato in miscela con altri diserbanti selettivi, ove necessario per il controllo di malerbe non sensibili. BALANCE è compatibile fisicamente con i più comuni erbicidi del frumento: comunque si consiglia di verificare la compatibilità prima dell'uso. BALANCE, salvo il caso di miscele con altri erbicidi selettivi ove necessario, non e' da impiegare in miscela con altri antiparassitari o concimi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO-NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Taglie autorizzate: g 20 - 50 - 100 - 200

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

BALANCE®

Erbicida – Granuli idrodispersibili

BALANCE

COMPOSIZIONE
Clorsulfuron puro 75 g
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Distribuito da: Siapa S.r.l. – Via Caldera 21, Milano

Registrazione N. 10958 del 18.06.2001 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 10 PARTITA N.

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altre taglie autorizzate: g 20 - 50 - 100 - 200

BENAMON 50 P.B.

Acaricida a lunga persistenza d'azione
Polvere bagnabile

BENAMON 50 P.B.
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Fenbutatin ossido puro g 50
Coformulanti q. b. a 100

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Molto tossico per inalazione (R26). Irritante per gli occhi e la pelle (R36/38). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini (S1/2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua (S28). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S45). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61). In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo (63).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di produzione:
Chemia S.p.A. – S.S. 255 Km 46, Sant'Agostino (FE),
Distribuito da:
Agrimport S.p.a. - Via Piani 1 - Bolzano

Registrazione N. 5770 del 23.2.1984 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: kg 1 PARTITA N.:

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 03.08.1968 n. 1255

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose, cefalea, tinnitus, vertigini, dolori lombari e addominali, insufficienza respiratoria e circolatoria, interessamento del SNC e periferico con nevralgie e paralisi. **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
BENAMON 50 P.B. agisce per contatto sulle neanidi e gli adulti. L'attività acaricida del principio attivo aumentando progressivamente dopo il trattamento, consente al prodotto di mantenersi efficace per 3-4 settimane, controllando anche I ceppi resistenti ad altri acaricidi come Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini ed Eotetranychus pomi.
Dosi - Epoche - Modalità d'impiego
Dosi per 100 litri d'acqua:
60-80 grammi di prodotto formulato contro le forme mobili dei ragni rossi, le uova alla schiusura e nei periodi successivi su: **melo, pero, vite, agrumi, pomodoro, cetriolo, colture floricole ed ornamentali in pieno campo.**

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e portare a volume mescolando bene.

COMPATIBILITA'
BENAMON 50 P.B. è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari normalmente impiegati sulle colture citate.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato Il periodo di carenza piu' lungo. Devono Inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
In applicazione su colture di rose è raccomandabile eseguire dei saggi preliminari, poichè alcune varietà potrebbero risultare sensibili all'acaricida.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta per pomacee, pomodoro, cetriolo; 45 giorni per la vite; 60 giorni per gli agrumi.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura – ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Altra officina autorizzata
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. – Via Siemens 12, Bolzano
Altra taglia autorizzata: kg 5

BENZAFLO

Insetticida fosforganico ad ampio spettro d'azione
Pasta fluida

BENZAFLO
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Azinfos metile puro g 18
(= 203,4 g/l)
Coformulanti q.b.a 100

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo a contatto con la pelle (R21). Molto tossico per inalazione e per ingestione (R26/28). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini (S1/2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua (S28). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37) In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S45). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61). In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo (S63).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. -Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione
Makhteshim Chemical Works Ltd-S Beer-Sheva (Israele)

Registrazione n. 7444 del 09.03.1988 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: Litri 1 PARTITA N.:

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego é consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 03.08.1968 n. 1255.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare i vapori. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali**: confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte:** generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita'). **Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
BENZAFLO agisce per contatto, ingestione ed asfissia colpendo numerosi insetti nocivi. Penetra nei tessuti fogliari ed e' dotato di buona persistenza.
Dosi - Epoche - Modalità d'impiego
Dosi per 100 litri d'acqua.
Melo e Pero: contro Carpocapsa, Tortrice, Ricamatrici, Cicaline, Fillominatori, Cocciniglie ml 270-350; Psilla del Pero ml 350-400; Tentredini ml 270-350.
Drupacee: contro Tignole e Tentredini ml 270-350.
Vite: contro Tignole, Ricamatrici, Cicaline, Ragnetti ml 270.
Agrumi: contro Cocciniglie, Tignole, Mosca ml 270-350.
Barbabietola da zucchero: contro Cleono, Altica, Punteruolo, Nottue ml 350.
Cavolo, carciofo, asparago, sedano, zucca, cetriolo, solanacee, fagiolo, pisello, carota, patata: contro Dorifora della patata, Nottue, Afidi, Mamestra, Ricamatrici ml 270-350.
Fragola: contro Oziorrinco ml 270-350.
Pioppo: contro Punteruolo, Tripidi, Afidi ml 270-400.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare il prodotto direttamente nella quantita' di acqua necessaria, mescolando bene.
COMPATIBILITA'
Il prodotto e' compatibile in via di massima con i piu' comuni fitofarmaci.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora di verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
BENZAFLO e' tossico per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

Altre officine autorizzate:
Isagro S.p.A. – Stabilimento di Aprilia (Latina),
Chemia S.p.A. – Stabilimento di Sant'Agostino (FE)
Bayer S.p.A. – Stabilimento di Filago (Bergamo)
Bayer AG – Stabilimento di Dormagen (Germania)
Altre taglie autorizzate: litri 2,5 - 5 - 10

BORDOCRITT®

Fungicida ad azione antiperonosporica con effetto collaterale contro muffa grigia, oidio, alternaria e septoria - Polvere Bagnabile

COMPOSIZIONE
Cimoxanil puro g 2
Rame metallico g 13,6
(sotto forma di solfato neutralizzato con calce spenta)
Coformulanti q. b. a 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione (R20). Rischio di gravi lesioni oculari (R41). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43) Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e/la faccia (S36/37/39). In caso di incidenteconsultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officine di Produzione
Isagro S.p.A. – via Nettunense km 23,400, Aprilia (LT);

Distribuito da
Siapa via Caldera 21, Milano
Registrazione n° 3545 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: kg 1 - 5 - 25 **Partita n°**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 2%, Rame 13,6%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL: Derivato dell'Urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
RAME. Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE
BORDOCRITT è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della vite, della patata, del pomodoro, della lattuga, dello spinacio, del zucchino, del pisello, della cipolla, dell'aglio, del porro, della soia, del tabacco, del girasole, del carciofo, della rosa e del melone, con effetto collaterale contro altre malattie fungine di dette colture. BORDOCRITT è una miscela di 2 fungicidi di cui la poltiglia bordolese industriale possiede una lunga persistenza di azione, mentre il secondo ha prontezza d'azione ed effetto bloccante, in quanto penetra nelle foglie.

DOSI E MODALITÀ D'AZIONE
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con attrezzature a volume normale (1000 l/ha per vite, 600-1700 l/ha per le colture erbacee, ornamentali ed orticole, in funzione dello sviluppo vegetativo). Nel caso di trattamenti a volume ridotto le dosi vanno opportunamente modificate in modo da somministrare il medesimo quantitativo di prodotto per unità di superficie.
VITE - Contro Peronospora (azione collaterale nei confronti di Muffa Grigia ed Escoriosi). Dose di impiego: 400-600 g per 100 litri di acqua. I trattamenti possono essere effettuati a partire da quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fintanto che permangono tali condizioni favorevoli. Data la presenza del Rame, il prodotto è indicato per trattamenti post-allegagione. In condizioni normali i trattamenti possono effettuati ogni 8-10 giorni od in funzione delle piogge infettanti. In condizioni particolarmente critiche le cadenze di intervento possono essere accorciate.
TABACCO, POMODORO, CARCIOFO e PATATA - Contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose di impiego: 600 g per 100 litri di acqua (dose massima per ettaro: 8-10 kg.). Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, oppure in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.
LATTUGA, SPINACIO, ZUCCHINO, PISELLO, CIPOLLA, AGLIO, PORRO - Contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose di impiego: 400-600 g per 100 litri di acqua (dose massima per ettaro: 8-10 kg.). Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, oppure in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.
MELONE - Contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose di impiego: 400-600 g per 100 litri di acqua (dose massima per ettaro: 8-10 kg.). Effettuare i trattamenti ogni 6-10 giorni in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.
SOIA E GIRASOLE - Contro Peronospora (azione anche contro Septoria, attività collaterale anche contro Sclerotinia). Dose di impiego: 400-600 g per 100 litri di acqua (dose massima per ettaro: 8-10 kg.).
ROSA - Contro Peronospora (Peronospora sparsa), azione collaterale anche contro Ticchiolatura e Ruggine: Dose di impiego: 400-600 g per 100 litri di acqua (dose massima per ettaro: 8-10 kg.). Effettuare i trattamenti ogni 6-10 giorni in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

COMPATIBILITÀ
BORDOCRITT può essere mescolato a tutti gli antiparassitari a reazione neutra od acida. Si sconsiglia l'impiego del prodotto in miscela con formulati a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare la vite durante la fioritura. Sulle colture ornamentali ed orticole, data la molteplicità delle varietà coltivate, è sempre consigliabile adottare prudenza (adottare le dosi minori od ancor meglio effettuare saggi preliminari su piccole superfici) nei primi interventi su cultivar non conosciute o di recente introduzione.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

®Marchio Isagro S.p.A.

CLORIMID 45

Fungicida organico per combattere le malattie crittogamiche delle pomacee - Polvere bagnabile

CLORIMID 45
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Captano puro g 45
Coformulanti q. b. a 100

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Tossico per inalazione (R23). Possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti (R40). Rischio di gravi lesioni oculari (R41). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici (R50).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini (S1/2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia (S36/37/39). In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S45). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61). In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo (S63).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. – via Siemens ' 2, Bolzano
Registrazione n. 3294 del 27.11.1979 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: kg 1 PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
In frutticoltura CLORIMID 45 e' efficace contro la Ticchiolatura (anche di magazzino) e il Gloeosporium.

Dosi - Epoche - Modalità di impiego
Frutticoltura (melo e pero): g 200 - 250 ogni 100 litri d'acqua contro Ticchiolatura del melo e del pero. Non usare CLORIMID 45 su alcune cultivars di **melo** (Stark Delicious, Winesap, Stayman, Renetta del Canada) e di **pero** (Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienne) sensibili al captano.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese, etc.), olii e zolfi.
Il trattamento con CLORIMID 45 deve essere distanziato di almeno 3 settimane da quello con olio minerale e con zolfo.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
CLORIMID 45 puo' risultare fitotossico su alcune cultivars di melo (Stark Delicious, Winesap, Stayman, Renetta del Canada) e di pero (Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienne).

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Altre taglie autorizzate: kg 5-10-20
Altra Officina autorizzata:
Makhteshim Chemical Works Ltd., Beer-Sheva 84100, Israele

CONAL

Fungicida organico per la lotta contro le più comuni malattie fungine del Melo, Pero, Pesco, Fragola, Vite, Spinacio, Pomodoro, Peperone, Pisello, Patata, Floreali ed Ornamentali - Polvere bagnabile

CONAL
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Ditianon puro g 75
Coformulanti q. b. a 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R22). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. – via Siemens 12, Bolzano

Registrazione n. 6803 del 01.10.1986 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 0,5 – 1 – 5 PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultate immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante oculare e cutaneo; per ingestione: scialorrea, vomito e diarrea **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
CONAL è un fungicida organico ad azione preventiva e in parte bloccante. Combatte varie malattie fungine come Ticchiolatura, Peronospora, Bolla, Corineo, Monilia, Ruggine, A1ternaria, Septoria, Antracnosi, Vaiolatura ed è dotato di buona persistenza al dilavamento

Dosi - Epoche - Modalità d'impiego
Dosi per 100 litri d'acqua:
Pomacee (melo, pero): contro Ticchiolatura trattamenti preventivi prefiorali g 70 -120, trattamenti preventivi postfiorali g 60 -100.
Pesco: contro Bolla, Corineo, Monilia g 100 -150. Applicare la dose più alta per le varietà più soggette all'attacco delle malattie.
Vite: contro Peronospora ed Escoriosi: trattamenti preventivi g 80, trattamenti bloccanti g 100.
Fragola: contro la Vaiolatura g 100.
Pomodoro, Peperone, Pisello: contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi: g 100 -150.
Colture ornamentali e floreali: contro Ruggine, Septoria, Alternaria, Botrite, Antracnosi e Vaiolo g 100 -150.
Ripetere i trattamenti ad intervalli di 8- 10 giorni; ridurre gli intervalli in caso di piogge violente e dilavanti a 4 -5 gg.
Ridurre con alte temperature le dosi consigliate ed evitare ripetuti trattamenti quando le temperature si stabilizzano su valori elevati (maggio -luglio). E' consigliabile impiegare per la distribuzione della poltiglia atomizzatori o altre apparecchiature che permettano un alto grado di nebulizzazione.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

COMPATIBILITA'
Il CONAL è miscibile in via di massima con i più comuni prodotti fitosanitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltig1ia bordolese).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta dell'uva e 21 giorni prima della raccolta delle altre colture.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

COPRANTOL® ULTRAMICRON

Fungicida a base di idrossido di rame
Granuli Idrodispersibili

COPRANTOL ULTRAMICRON
Composizione
100 g di prodotto contengono:
Rame metallo g 35
(sotto forma di idrossido)
Coformulanti q.b.a 100
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione (R22). Rischio di gravi lesioni oculari (R41). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia (S36/37/39). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di produzione:
E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) – 12701 Almeda Road – Houston, Texas (USA)
Officine di solo confezionamento:
BAYER S.p.A. – Via delle Industrie 9 - Stabilimento di Filago (BG)
PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours – La Chambre (Francia)
CHEMIA S.p.A. – S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)
L.I.F.A. S.r.l. –Via Colombo, 7/7A – Stabilimento di Vigonovo (VE)
L.I.F.A. S.r.l. – Via Piave - Stabilimento di Isola Vicentina (VI)
SCAM S.r.l. – Str. Bellaria 164 - S. Maria di Mugnano (MO)
Distribuito da:
Syngenta Crop Protection S.p.A. – via Gallarate 139 - Milano
Registrazione n. 10630 del 06.12.2000 del Ministero della Sanità
Contenuto netto kg 1- 5 – 10 – 20 - 25

Partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC. emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE: COPRANTOL ULTRAMICRON è un fungicida a base di Rame idrossido in granuli idrodispersibili. L'estrema finezza delle particelle e l'elevata qualità del processo produttivo garantiscono una particolare fluidità ed adesività del formulato sulla superficie fogliare delle colture trattate. Tali caratteristiche consentono una maggiore attività fungicida e battericida e di conseguenza una notevole riduzione dei dosaggi unitari di rame.
EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Introdurre i granuli nel serbatoio dell'irroratrice, parzialmente riempita d'acqua, e mescolare sino a completa dissoluzione del preparato. Effettuare i trattamenti con pompe a volume normale sulle seguenti colture

Vite	contro Peronospora e Marciume nero degli acini	g 150-200/hl
Melo, Pero	contro Ticchiolatura in pre e post fioritura: contro Cancri del legno (Nectria galligena, Phomopsis mali, Sphaeropsis malorum, Pseudomonas syringae) trattare alla caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme	g 150/hl g 200-250/hl
	contro il Colpo di fuoco. Effettuare due trattamenti nella fase di rigonfiamento delle gemme e punte verdi	g 250/hl
	contro il Colpo di fuoco del pero applicare ogni 5 gg. durante la fioritura	g 500/ha
Albicocco, Susino	contro Corineo, Sclerotinia, Monilia, (Intervenire durante il riposo vegetativo. Evitare il trattamento dopo la fioritura)	g 250/hl
Ciliegio	contro Corineo, Monilia, Scopazzi (per trattamenti invernali) Aggiungere gr. 120/hl di olio minerale bianco (intervenire durante il riposo vegetativo)	g 300/hl
Pesco, Nettarine	contro Bolla e Corineo (per trattamenti a caduta foglie ed a fine inverno)	g 250/hl
	contro Monilia (nella fase dei bottoni rosa)	g 150/hl
	contro Batteriosi (per trattamenti invernali, a caduta foglie ed a fine inverno)	g 250/hl
Agrumi	contro Mal secco, Allupatura, Fumaggine, Lebbra, Antracnosi e Scabbia del limone e dell'arancio (intervenire prima o dopo la fioritura a seconda della pressione della malattia	g 150/hl
Olivo:	contro Occhio di Pavone, Fumaggine e Lebbra (intervenire dopo la raccolta ed eventualmente dopo la potatura)	g 200/hl
Mandorlo	contro Corineo, Bolla, Monilia (intervenire dopo la caduta delle foglie e all'ingrossamento delle gemme) contro Batteriosi (intervenire prima della fase di bottoni rosa)	g 200/hl
Nocciolo	contro Batteriosi (Xanthomonas corylina) con due trattamenti in Ottobre, distanziati di 20-25 giorni	g 200/hl
Noce	contro Xanthomonas campestris (in pre-fioritura)	g 200/hl
Nespolo	contro Ticchiolatura	g 150/hl
Patata, Pomodoro, Peperone:	contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Batteriosi	g 150-200/hl
Barbabietola da Zucchero	contro Cercospora Iniziare i trattamenti a fine giugno, ripeterli ogni 20-25 giorni, fino a 20 giorni dalla raccolta	kg 1,70/ha
Orticole	(fagiolo, pisello, cavolo, cavolfiore, cavoli di Bruxelles, broccoli, insalate, cardo, carciofo, rapa, carota, ravanello, spinacio, prezzemolo, sedano, finocchio, melanzana, cetriolo, cipolla, aglio, melone, anguria, zucca) contro Peronospora, Alternaria, Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Antracnosi, Septoria, Cercospora.	g 150/hl
Fragola	contro Vaiolatura	kg 1,250/ha
Soia, Girasole:	contro Alternaria, Sclerotinia	g 150/hl
Floreali in pieno campo	contro Ticchiolatura, Peronospora, Ruggine, Antracnosi Batteriosi	g 150/hl
Ornamentali	contro Antracnosi e Maculatura fogliare, Batteriosi, Ticchiolatura, Peronospora	g 150/hl
Riso	contro Alghe verdi Intervenire alla comparsa dell'attacco con un quantitativo di soluzione sufficiente a coprire l'intera superficie	kg 2,5/ha

COMPATIBILITA': **COPRANTOL ULTRAMICRON** non è miscibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina e con Tiram.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Su varietà di Melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard), su Pesco, Nettarine e Susino sensibili ai prodotti cuprici, il prodotto può essere tossico, se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Non trattare durante la fioritura per l'azione caustica sui fiori, ad eccezione del pero per il Colpo di fuoco batterico.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

® Marchio registrato Syngenta Crop Protection

CRIORAM F® COMBI

Fungicida ad azione antiperonosporica con effetto collaterale contro la Muffa grigia, l'Escoriosi e l'Oidio della vite - Polvere bagnabile

CRIORAM F COMBI
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Cimoxanil puro	g	5
Rame metallo (sotto forma di solfato neutralizzato con calce spenta)	g	9
Folpet puro	g	24
Coformulanti q. b. a		100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione (R20). Possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti (R40). Rischio di gravi lesioni oculari (R41). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia (S36/37/39). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60) Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione
Isagro S.p.A. – Via Nettunese km 23.400, Aprilia (LT)
Distribuito da:
Siapa S.r.l. - via Caldera 21, Milano

Registrazione N. 3536 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 - 5 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 5%, FOLPET 24% e RAME METALLO DA OSSICLORURO 9% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** Sintomatica.
FOLPET
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). **Terapia:** sintomalica.
RAME METALLO DA OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE
Il CRIORAM F COMBI è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la Peronospora della vite e con un effetto collaterale contro le altre malattie fungine di tale coltura. Il CRIORAM F COMBI è una miscela di 3 fungicidi, di cui uno dotato di prontezza di azione ed effetto bloccante, in quanto penetra nelle foglie, mentre gli altri due, il rame ed il Folpet, possiedono una lunga persistenza d'azione.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il CRIORAM F COMBI si impiega alla dose di 200-250 g in 100 litri di acqua; iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fintanto che permangono tali condizioni favorevoli. In condizioni normali, trattare ogni 8-10 giorni. In caso di forte attacco o di rapido accrescimento della pianta l'intervallo può essere ridotto a 6-8 giorni.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Formare una pasta semi-liquida mescolando la giusta dose di CRIORAM F COMBI in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e continuando a mescolare.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto può essere mescolato a tutti gli antiparassitari a reazione neutra od acida. Si sconsiglia l'impiego del CRIORAM F COMBI in miscela con prodotti a reazione alcalina (Poltiglia bordolese, Polisolfuri, ecc.) ed Olio bianco.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare la vite durante la fioritura.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto delle uve da tavola, 40 giorni per le uve da vino, per non ostacolare la fermentazione dei mosti

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

® Marchio registrato Isagro S.p.A.

CRIORAM® MIX

Fungicida ad azione antipernosporica – Polvere Bagnabile

CRIORAM MIX
COMPOSIZIONE
Cimoxanil puro g. 3,5
Rame metallico g. 9
(sotto forma di solfato neutralizzato con calce spenta)
Mancozeb puro g. 24
Coformulanti q.b. a 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione (R20). Irritante per le vie respiratorie (R37). Rischio di gravi lesioni oculari (R41). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia (S36/37/39). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60) Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. -Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Isagro S.p.A. – Via Nettunense km 23,400, Aprilia (LT)
Distribuito da:
Siapa S.r.l. - via Caldera 21, Milano
Registrazione Ministero della Sanità n° 3541 del 20.02.1980
Contenuto netto: kg 1 - 5 – 25 **PARTITA N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidita'. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4%, Rame 9%, Mancozeb 24%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL. Derivato dell'Urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
RAME. Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
MANCOZEB. Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia**: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE
CRIORAM MIX è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la Peronospora della VITE, del POMODORO (da trattare fino alla prima fioritura), del TABACCO e della ROSA. Il prodotto è una miscela di tre fungicidi di cui il MANCOZEB ed il RAME possiedono una più lunga persistenza di azione, mentre il CIMOXANIL è dotato di una prontezza d'azione ed effetto bloccante in quanto penetra nelle foglie.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con attrezzature a volume normale (1000 l/ha per vite, 600-1500 l/ha per le colture erbacee ed ornamentali, in funzione dello sviluppo vegetativo). Nel caso di trattamenti a volume ridotto le dosi vanno opportunamente modificate in modo da somministrare il medesimo quantitativo di prodotto per unità di superficie.
VITE - Contro Peronospora (*Plasmopara viticola*): Impiegare 300-350 g di prodotto in 100 litri di acqua. I trattamenti possono essere effettuati a partire da quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fintanto che permangono tali condizioni favorevoli. In condizioni normali, i trattamenti possono essere effettuati ogni 8-10 giorni od in funzione delle piogge infettanti. In condizioni particolarmente critiche le cadenze di intervento possono essere accorciate.

POMODORO (fino alla prima fioritura) e **TABACCO** - Contro Peronospora: Impiegare 300-400 g di prodotto in 100 litri di acqua (dose massima per ettaro 4,5-6 kg.). Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, oppure in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

ROSA - Contro Peronospora: Impiegare 300-350 g di prodotto in 100 litri di acqua. Il prodotto è dotato di efficacia collaterale nei confronti della ruggine e della ticchiolatura. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ
Il prodotto può essere mescolato con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra od acida. Si sconsiglia l'impiego del prodotto in miscela con formulati a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto è normalmente selettivo sulle colture indicate in etichetta. Sulle colture orticole ed ornamentali, almeno sulle varietà di recente introduzione, è sempre consigliabile effettuare saggi preliminari su piccole superfici prima di estendere il trattamento all'intera coltura.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

®Marchio ISAGRO S.p.A.

CUPRAVIT IDRO SC

Fungicida polivalente a base di rame idrossido in formulazione liquida (Flowable)

CUPRAVIT IDRO SC
Composizione
Rame metallo g 15 (= 190 g/l)
(sotto forma di idrossido)
Coformulanti q.b. a 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione (R20). Rischio di gravi lesioni oculari (R41).Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S'3). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26). Non gettare i residui nelle fognature (S29). In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta (46). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano telefono 8003/8337

Officine di Produzione
E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) - 12701 Almeda Road, Houston Texas (USA)
Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
Scam S.r.l. – S. Maria di Mugnano (MO)
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)
Officine di solo confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. – Via delle Industrie, 9 Filago (BG)
STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Torrenieri Fraz. di Montalcino (SI)

Registrazione n. 8635 del 14.01.1995 del Ministero della Sanità
Contenuto netto ml 100 –250 – 500 Litri 1 – 5 – 10- 20
Partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con 100 litri d'acqua utilizzando pompe a volume normale.

Coltura	Avversità	Dose
Vite	contro Peronospora e Marciume nero degli acini	ml 400-600
Melo, Pero	contro Cancri rameali contro Ticchiolatura in pre-fioritura contro ticchiolatura in post-fioritura	lt 0,85 ml 350-450 ml 250-300
Drupacee	contro Corineo, Monilia (intervenire durante il riposo vegetativo)	lt 0,85 – 1,1
Mandorlo	contro Corineo, Bolla, Monilia per trattamenti alla caduta delle foglie, ingrossamento gemme e in pre-fioritura	ml 550-600
Agrumi	contro Mal secco, Allupatura, Melanosi, Fumaggine, Antracnosi	ml 450-500
Olivo	contro Fumaggine, Occhio di Pavone, Lebbra (trattare inizio autunno)	ml 550
Noce	contro Malsecco in pre-fioritura	ml 450
Nocciolo	contro Batteriosi	ml 550
Nespolo	contro Ticchiolatura	ml 250-300
Patata, Pomodoro	contro Alternaria, Peronospora, Septoria	ml 500
Fagilo, Pisello	contro Peronospora, Antracnosi, e Ruggine	ml 300- 450
Barbabietola da zucchero	contro Cercospora	lt 5,5 – 6,5/ha
Fragola	contro Vaiolatura	lt 4/ha
Cavolo, Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavoli di Bruxelles	contro Peronospora e Alternaria	ml 300-400
Carota, Sedano, Finocchio	contro Alternaria, Septoria, Peronospora	ml 340-480
Melanzana	contro Peronospora e Alternaria	ml 330
Melone,Cocomero, Cetriolo	contro Peronospora, Antracnosi, Batteriosi e Cladosporiosi	ml 330
Cipolla, Aglio	contro Peronospora e Alternaria	ml 400
Lattuga, Cardo, Carciofo	contro Peronospora e Alternaria, per trattamenti preventivi e a seconda delle condizioni climatiche	ml 250 - 340
Riso	contro Alghe verdi	lt 6,8/ha
Floreali in pieno campo (rosa, ciclamino):	contro Ticchiolatura, Peronospora e Ruggine	ml 340-450
Cipresso	contro Cancro, per trattamenti invernali	ml 950

COMPATIBILITA': Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Non trattare durante la fioritura su Pesco, Nettarine, Susino e sulle seguenti varietà di Melo: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonhatan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana e Pero: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere I trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

CUPROSSIL-IDRO DF

Fungicida a base di idrossido di rame
Granuli idrodispersibili

CUPROSSIL-IDRO DF
Composizione
100 gr di prodotto contengono:
Rame metallo g 40
(sotto forma di idrossido)
Coformulanti q.b.a 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione (R22). Rischio di gravi lesioni oculari (R41). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia (S36/37/39). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di produzione:
E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) - 12701 Almeda Road, Houston Texas (USA)
Officina di solo confezionamento:
Scam S.r.l. – Str. Bellaria 164, S. Maria di Mugnano (MO)
Distribuito da:
Scam S.r.l. – Str. Bellaria 164, S. Maria di Mugnano (MO)

Registrazione n. 9223 del 28.04.1997 del Ministero della Sanità
Contenuto netto kg 1- 5 – 10 – 20 –25 Partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE: CUPROSSIL-IDRO DF è un fungicida a base di Rame idrossido in granuli idrodispersibili. Tale formulazione garantisce un'ottima fluidità del prodotto, nonché elevata adesività e persistenza sulle colture trattate.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Introdurre i granuli nel serbatoio dell'irroratrice, parzialmente riempita d'acqua, e mescolare sino a completa dissoluzione del preparato. Le dosi indicate si riferiscono a 100 lt d'acqua e per trattamenti con pompe a volume normale.

Melo, Pero	contro Ticchiolatura e Cancro nei trattamenti autunno-invernali	g 500-1000
	nei trattamenti primaverili	g 200-300
Drupacee e mandorlo	contro Sclerotinia, Corineo, Bolla nei trattamenti autunno-invernali	g 500-1000
Vite	contro Peronospora, Black-rot, Antracnosi	g 200-300
Agrumi	contro Fumaggine, Mal secco, Allupatura, Gommosi del colletto, Batteriosi	g 200-300
Orticole	(carciofo, cardo, carota, cavolo, cetriolo, cicoria, cipolla, fagiolo, lattuga, melanzana, melone, patata pomodoro, peperone, pisello, rapa, ravanello, sedano, spinacio, prezzemolo, zucca): contro Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Cercospora, Batteriosi, Septoriosi	g 200-300
Olivo	contro Fumaggine, Occhio di Pavone	g 200-300
Barbabietola da zucchero	contro Peronospora, Cercospora	kg 3-3,5/ha
Fragola	contro Vaiolatura	g 200-300
Floreali in pieno campo	contro Ruggine, Peronospora	gr 200-300
Riso	contro Alghe verdi, intervenire alla comparsa dell'attacco con un quantitativo di soluzione sufficiente a coprire l'intera superficie	kg 2,80-3,65/ha

COMPATIBILITA': CUPROSSIL-IDRO DF non è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina e con Tiram.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Su varietà di Melo (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard), su Drupacee sensibili ai prodotti cuprici, il prodotto può essere fitotossico, se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Non trattare durante la fioritura per l'azione caustica sui fiori.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere I trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO-NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

CURZATE® COMBI DF

Fungicida cupro-organico per la lotta contro la Peronospora e con effetto collaterale contro la Muffa grigia e l'Escoriosi - Granuli idrodispersibili

CURZATE COMBI DF
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Cimoxanil puro	g	5
Folpet puro	g	24
Rame metallo (da ossicloruro tetraramico)	g	9
Coformulanti q. b. a		100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione (R20). Irritante per gli occhi (R36). Possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti (R40). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 8446 del 16.11.1993 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 **PARTITA N.:**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 5%, FOLPET 24% e RAME METALLO DA OSSICLORURO 9% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** Sintomatica.
FOLPET
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). **Terapia:** sintomatica.
RAME METALLO DA OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
CURZATE COMBI DF è una miscela di tre principi attivi, efficace contro la Peronospora della vite con un effetto collaterale contro la Muffa grigia e l'Escoriosi.
Dosi - Epoche - Modalità di impiego
Viticoltura:g 200-250 per 100 litri d'acqua.
Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fino a che ci sono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
In condizioni normali ripetere il trattamento ogni 8-10 giorni. In caso di forti attacchi o di rapido accrescimento della pianta ridurre l'intervallo a 6-8 giorni.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Sciogliere il prodotto in poca acqua, indi versare nella botte contenente metà dell'acqua necessaria e portare a volume tenendo la miscela in costante agitazione.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con i fitofarmaci a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri) degli oli ed altri prodotti oleosi.

AVVERTENZA: CURZATE COMBI DF non deve essere usato 20 giorni prima o dopo l'applicazione gli oli minerali e polisolfuri.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Non trattare la vite durante la fioritura.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta e 40 giorni prima della vendemmia delle uve da vino per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altre taglie autorizzate: kg 5-10

CURZATE® COMBI

Fungicida cupro-organico per la lotta contro la Peronospora e con effetto collaterale contro la Muffa grigia e l'Escoriosi - Polvere bagnabile

CURZATE COMBI
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Cimoxanil puro	g	5
Folpet puro	g	24
Rame metallo	g	9
(da solfato neutralizzato)		
Coformulanti q. b. a		100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione (R20). Possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti (R40). Rischio di gravi lesioni oculari (R41). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia (S36/37/39). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. – via Siemens '2, Bolzano
Registrazione N. 6926 del 14.01.1987 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 5%, FOLPET 24% e RAME METALLO DA OSSICLORURO 9% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** Sintomatica.
FOLPET
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). **Terapia:** sintomatica.
RAME METALLO DA OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
CURZATE COMBI è una miscela di tre principi attivi, efficace contro la Peronospora della vite con un effetto collaterale contro la Muffa grigia e l'Escoriosi.

Dosi - Epoche - Modalità di impiego
Viticoltura:g 200-250 per 100 litri d'acqua.
Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fino a che ci sono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
In condizioni normali ripetere il trattamento ogni 8-10 giorni. In caso di forti attacchi o di rapido accrescimento della pianta ridurre l'intervallo a 6-8 giorni.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e poi portare a volume mescolando bene.

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile in via di massima con i più comuni filofarmaci fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri) degli oli ed altri prodotti oleosi.
Avvertenza: CURZATE COMBI non deve essere usato 20 giorni prima o dopo l'applicazione gli olii minerali e polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' - Non trattare la vite durante la fioritura.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta e 40 giorni prima per le uve da vino per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altra officina autorizzata:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Altra taglia autorizzata: kg 10

CURZATE® COMBI

Fungicida cupro-organico per la lotta contro la Peronospora e con effetto collaterale contro la Muffa grigia e l'Escoriosi.
Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

CURZATE COMBI
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 5
Folpet puro g 24
Rame metallo g 9
(da solfato neutralizzato)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione (R20). Possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti (R40). Rischio di gravi lesioni oculari (R41). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia (S36/37/39). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours France S.A.S – Cernay, Francia
Registrazione N. 6926 del 14.01.1987 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 PARTITA N.:
(contiene 4 sacchetti idrosolubili da g 250)

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 5%, FOLPET 24% e RAME METALLO DA OSSICLORURO 9% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** Sintomatica.
FOLPET
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). **Terapia:** sintomatica.
RAME METALLO DA OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
CURZATE COMBI è una miscela di tre principi attivi, efficace contro la Peronospora della vite con un effetto collaterale contro la Muffa grigia e l'Escoriosi.
Dosi - Epoche - Modalità di impiego
Viticoltura: g 200-250 per 100 litri d'acqua.
Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fino a che ci sono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
In condizioni normali ripetere il trattamento ogni 8-10 giorni. In caso di forti attacchi o di rapido accrescimento della pianta ridurre l'intervallo a 6-8 giorni.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e poi portare a volume mescolando bene.

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri) degli oli ed altri prodotti oleosi.

Avvertenza: CURZATE COMBI non deve essere usato 20 giorni prima o dopo l'applicazione gli olii minerali e polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' - Non trattare la vite durante la fioritura.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta e 40 giorni prima per le uve da vino per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altre officine autorizzate:
STI – Solfotecnica Italiana – via Torricelli 2, Cotignola (RA)
Isagro S.p.A. – via Nettunese km 23.400, Aprilia (LT)

Altre taglie autorizzate:
kg 2,5 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da g 250)
kg 2,5 (contiene 5 sacchetti idrosolubili da g 500)
kg 5 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da g 500)
kg 10 (contiene 20 sacchetti idrosolubili da g 500)
kg 10 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da g 1000)

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

CURZATE® COMBI

Fungicida in sacchetto idrosolubile per la lotta contro la Peronospora e con effetto collaterale contro la Muffa grigia e l'Escoriosi

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 5
Folpet puro g 24
Rame metallo g 9
(da solfato neutralizzato)
Coformulanti q. b. a 100

Contenuto netto del sacchetto: 250 g

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 6926 del 14.01.1987 del Ministero della Sanità

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

AVVERTENZA: Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

Altre officine autorizzate:
STI – Solfotecnica Italiana – via Torricelli 2, Cotignola (RA)
Isagro S.p.A. – via Nettunese km 23.400, Aprilia (**LT**)
Altre taglie autorizzate:
g 500 – g 1000

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO (Inc.)

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1. Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua
2. Assicurarsi di avere le mani asciutte
3. Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo
4. Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte
5. Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)
6. Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni soprariportate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

CURZATE® DF

Fungicida citotropico translaminare impiegato su Vite, Carciofo, Pomodoro, Patata, Tabacco, Girasole, Soia, Rosa, Lattuga, Spinacio, Melone, Zucchino, Pisello, Cipolla, Aglio, Porro contro la Peronospora – Granuli idrodispersibili

CURZATE DF
COMPOSIZIONE
Cimoxanil puro g 40
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R22). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officine di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione n° 10596 del 06.09.2000 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

DOSI, CAMPI E MODALITÀ D'IMPIEGO
CURZATE DF è un fungicida in formulazione di microgranuli idrodisperdibili ad azione citotropica translaminare indicato per il trattamento contro la Peronospora; possiede una persistenza d'azione di circa 4-5 giorni a seconda della stagione.
Vite: contro la Peronospora alla dose di g 50-60 per q.le acqua trattando da quando si verificano le condizioni per le infezioni della malattia, e proseguendo fino alla fine della fioritura.
Quindi dall'allegagione impiegare g 30-35 per q.le acqua miscelato con i prodotti di copertura quali i rameici, i ditiocarbammati e folpet a metà della dose comunemente impiegata.
Carciofo – Patata – Pomodoro – Tabacco – Lattuga – Spinacio – Zucchino – Pisello – Cipolla – Aglio – Porro – Soia – Girasole – Melone: contro la Peronospora a g 50-60 per hl di acqua, iniziando al verificarsi delle condizioni di infezione e proseguendo. Nel caso di infezione in atto effettuare due trattamenti ravvicinati alla dose più alta. Si può ridurre la dose a g 25-30 per hl di acqua se si effettuano trattamenti in miscela con rameici o ditiocarbammati, comunque tenere presente che la dose minima riferita ad ettaro non deve essere inferiore ai 300 g/ha.

COMPATIBILITÀ: non compatibile con i prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese) e gli oli minerali.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA': quando si tratta tenere lontano gli animali domestici e il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto di girasole e soia; 21 giorni per il carciofo; 10 giorni per tutte le altre colture.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altre Officine autorizzate:
Sideco Dr. Schirm AG – Lubecca, Germania
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola, Ravenna
Altre taglie autorizzate:
kg 0,1 - 0,5 - 5 - 10

FOGLIO ILLUSTRATIVO

CURZATE® DF

Fungicida citotropico translaminare impiegato su Vite, Carciofo, Pomodoro, Patata, Tabacco, Girasole, Soia, Rosa, Lattuga, Spinacio, Melone, Zucchino, Pisello, Cipolla, Aglio, Porro contro la Peronospora – Granuli idrodispersibili

CURZATE DF
COMPOSIZIONE
Cimoxanil puro g 40
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R22). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officine di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione n° 10596 del 06.09.2000 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

DOSI, CAMPI E MODALITÀ D'IMPIEGO
CURZATE DF è un fungicida in formulazione di microgranuli idrodisperdibili ad azione citotropica translaminare indicato per il trattamento contro la Peronospora; possiede una persistenza d'azione di circa 4-5 giorni a seconda della stagione.
Vite: contro la Peronospora alla dose di g 50-60 per q.le acqua trattando da quando si verificano le condizioni per le infezioni della malattia, e proseguendo fino alla fine della fioritura.
Quindi dall'allegagione impiegare g 30-35 per q.le acqua miscelato con i prodotti di copertura quali i rameici, i ditiocarbammati e folpet a metà della dose comunemente impiegata.
Carciofo – Patata – Pomodoro – Tabacco – Lattuga – Spinacio – Zucchino – Pisello – Cipolla – Aglio – Porro – Soia – Girasole – Melone: contro la Peronospora a g 50-60 per hl di acqua, iniziando al verificarsi delle condizioni di infezione e proseguendo. Nel caso di infezione in atto effettuare due trattamenti ravvicinati alla dose più alta. Si può ridurre la dose a g 25-30 per hl di acqua se si effettuano trattamenti in miscela con rameici o ditiocarbammati, comunque tenere presente che la dose minima riferita ad ettaro non deve essere inferiore ai 300 g/ha.

COMPATIBILITÀ: non compatibile con i prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese) e gli oli minerali.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA': quando si tratta tenere lontano gli animali domestici e il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto di girasole e soia; 21 giorni per il carciofo; 10 giorni per tutte le altre colture.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altre Officine autorizzate:
Sideco Dr. Schirm AG – Lubecca, Germania
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola, Ravenna
Altre taglie autorizzate:
kg 0,1 - 0,5 - 5 - 10

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

CURZATE® DF

Fungicida citotropico translaminare impiegato su Vite, Carciofo, Pomodoro, Patata, Tabacco, Girasole, Soia, Rosa, Lattuga, Spinacio, Melone, Zucchino, Pisello, Cipolla, Aglio, Porro contro la Peronospora – Granuli idrodispersibili

CURZATE DF
COMPOSIZIONE
Cimoxanil puro g 40
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R22). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337

Officine di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione n° 10596 del 06.09.2000 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 PARTITA N.:

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altre Officine autorizzate:
Sideco Dr. Schirm AG – Lubecca, Germania
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola, Ravenna
Altre taglie autorizzate:
kg 0,1 - 0,5 - 5 - 10

CURZATE® F

Fungicida citotropico translaminare contro la Peronospora e altre crittogame della vite efficace anche ad infezione peronosporica avvenuta.
Polvere Bagnabile

CURZATE F
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Cimoxanil puro	g	8,4
Folpet puro	g	64
Coformulanti q. b. a		100

Contiene: Paraformaldeide

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione (R20). Irritante per gli occhi (R36). Possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti (R40). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21) Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. – via Siemens 12, Bolzano

Registrazione N. 3554 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 **PARTITA N.:**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 8,4% e FOLPET 64% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** Sintomatica.
FOLPET
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
CURZATE F è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora e altre crittogame della vite. CURZATE F agisce sia penetrando nella foglia che per contatto diretto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti.
CURZATE F può essere impiegato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione non producendo fenomeni di fitotossicità o rallentamenti e riduzioni vegetative.

Dosi - Epoche - Modalità di impiego
Vite – Peronospora ed Escoriosi: usare il prodotto alla dose di 100-150 g per 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti preventivi non appena la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire per il resto della stagione.
In qualunque caso la dose minima riferita a ettaro non deve essere inferiore a 1,5 kg/ha.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di CURZATE F in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

COMPATIBILITA'
CURZATE F è compatibile con i più comuni antiparassitari esclusi quelli a reazione alcalina (es. Poltiglia bordolese alcalina, Poltiglia solfocalcica) e olio bianco. I trattamenti con CURZATE F devono essere distanziati di almeno 20 giorni dai trattamenti con prodotti a base di olii minerali e prodotti a base di zolfo.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Durante il trattamento si consiglia di tenere lontani gli animali domestici ed il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta per le uve da tavola; sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO-NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altra officina autorizzata:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S - Cernay, Francia
Altre taglie autorizzate: kg 5 - 10

CURZATE® F DF

Antiperonosporico per la vite - Granuli idrodispersibili

CURZATE F DF
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 6,1
Folpet puro g 45
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione (R20). Irritante per gli occhi (R36). Possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti (R40). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21) Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60) Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 8441 del 16.11.1993 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 6,1% e FOLPET 45% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** Sintomatica.
FOLPET
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
CURZATE F DF è un fungicida formulato in granuli idrodispersibili efficace contro la peronospora della vite.
CURZATE F DF agisce sia penetrando nella foglia che per contatto diretto combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. CURZATE F DF può essere impiegato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione non producendo fenomeni di fitotossicità o rallentamenti e riduzioni vegetative.
Dosi - Epoche - Modalità di impiego
Peronospora della vite: usare 150-200 g di prodotto ogni 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti preventivi non appena la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire per il resto della stagione.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Sciogliere il prodotto in poca acqua, indi versare nella botte contenente metà dell'acqua necessaria e portare a volume tenendo la miscela in costante agitazione.

COMPATIBILITA'
Non è miscibile con poltiglia bordolese, polisolfuri e olio bianco. CURZATE F DF è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra e acida. Si sconsiglia di usare CURZATE F DF in associazione a prodotti con reazione alcalina ed oli minerali. I trattamenti con CURZATE F DF devono essere distanziati di almeno 20 giorni dai trattamenti con prodotti a base di oli minerali e prodotti a base di zolfo.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Durante il trattamento si consiglia di tenere lontani gli animali domestici ed il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta per le uve da tavola; sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altre taglie autorizzate: kg 5-10

CURZATE® M DF BIANCO

Antiperonosporico per Vite, Tabacco e Pomodoro.
Granuli idrodispersibili

CURZATE M DF BIANCO
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 4
Mancozeb puro g 40
Coformulanti q. b. a 100
Contiene: Esametilentetrammina

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie (R37). Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 8443 del 16.11.1993 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4% e MANCOZEB 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** Sintomatica.
MANCOZEB - **Sintomi:** cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino a collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia: Sintomatica**

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
CURZATE M DF BIANCO è un fungicida formulato in granuli idrodispersibili efficace contro la peronospora della vite, del tabacco e, solo fino alla prima fioritura, del pomodoro. CURZATE M DF BIANCO agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. CURZATE M DF BIANCO può essere usato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione.

Dosi - Epoche - Modalità di impiego
VITE:
contro la peronospora ed escoriosi (azione complementare) usare 200-300 g di prodotto ogni 100 litri d'acqua. I trattamenti devono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.

POMODORO:
contro peronospora solo fino alla prima fioritura usare 250-300 g di prodotto ogni 100 litri d'acqua. Usare la dose di 300-350 g ogni 100 litri di acqua in presenza di attacchi di peronospora e di alternaria.

TABACCO:
contro peronospora usare 300-350 g di prodotto ogni 100 litri d'acqua. Usare la dose più alta in situazione di forte attacco su varietà particolarmente sensibili.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Sciogliere il prodotto in poca acqua, indi versare nella botte contenente metà dell'acqua necessaria e portare a volume tenendo la miscela in costante agitazione.

DIVIETO DI IMPIEGO
- divieto di impiego in serra
- divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'
CURZATE M DF BIANCO è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare CURZATE M DF BIANCO in associazione a prodotti con reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONTIENE CIMOXANIL
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altre taglie autorizzate: kg 5 - 10

CURZATE® M DF

Antiperonosporico per Vite, Tabacco e Pomodoro.
Granuli idrodispersibili

CURZATE M DF
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 4
Mancozeb puro g 40
Coformulanti q. b. a 100
Contiene Esametilentetrammina

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie (R37). Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 8642 del 31.01.1995 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4% e MANCOZEB 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** Sintomatica.
MANCOZEB - Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino a collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia: Sintomatica**

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
CURZATE M DF è un fungicida formulato in granuli idrodispersibili efficace contro la peronospora della vite, del tabacco e, solo fino alla prima fioritura, del pomodoro. CURZATE M DF agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. CURZATE M DF può essere usato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione.

Dosi - Epoche - Modalità di impiego
VITE:
contro la peronospora ed escoriosi (azione complementare) usare 200-300 g di prodotto ogni 100 litri d'acqua. I trattamenti devono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.

POMODORO:
contro peronospora solo fino alla prima fioritura usare 250-300 g di prodotto ogni 100 litri d'acqua. Usare la dose di 300-350 g ogni 100 litri di acqua in presenza di attacchi di peronospora e di alternaria.

TABACCO:
contro peronospora usare 300-350 g di prodotto ogni 100 litri d'acqua. Usare la dose più alta in situazione di forte attacco su varietà particolarmente sensibili.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Sciogliere il prodotto in poca acqua, indi versare nella botte contenente metà dell'acqua necessaria e portare a volume tenendo la miscela in costante agitazione.

DIVIETO DI IMPIEGO
- divieto di impiego in serra
- divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'
CURZATE M DF è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare CURZATE M DF in associazione a prodotti con reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONTIENE CIMOXANIL
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altre taglie autorizzate: kg 5 - 10

CURZATE® M

Antiperonosporico per Vite, Tabacco, Pomodoro.
Polvere bagnabile

CURZATE M
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 4
Mancozeb puro g 40
Coformulanti q. b. a 100
Contiene Esametilentetrammina

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie (R37). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S 13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l - Via Siemens 12, Bolzano
Registrazione N. 3555 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4% e MANCOZEB 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** Sintomatica.
MANCOZEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino a collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia:** Sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
CURZATE M è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la peronospora della vite, del tabacco e, solo fino alla prima fioritura, del pomodoro. CURZATE M agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. CURZATE M può essere usato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione.
Dosi - Epoche - Modalità di impiego
VITE: contro la peronospora usare 200-300 g di prodotto ogni 100 litri d'acqua. I trattamenti devono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
POMODORO: contro la peronospora solo fino alla prima fioritura usare 250-300 g di prodotto ogni 100 litri d'acqua. Usare la dose di 300-350 g ogni 100 litri di acqua in presenza di attacchi di peronospora e di alternaria.
TABACCO: contro la peronospora usare 300-350 g di prodotto ogni 100 litri d'acqua. Usare la dose più alta in situazione di forte attacco su varietà particolarmente sensibili.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di CURZATE M in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

DIVIETO DI IMPIEGO
- divieto di impiego in serra
- divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'
CURZATE M è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare CURZATE M in associazione a prodotti con reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altra officina di produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Altra taglia autorizzata: kg 10

CURZATE® M

Antiperonosporico per Vite, Tabacco, Pomodoro.
Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

CURZATE M
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 4
Mancozeb puro g 40
Coformulanti q. b. a 100
Contiene Esametilentetrammina

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie (R37). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, ne fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione N. 3555 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: Kg 1 (contiene 4 sacchetti idrosolubili da 250 g)
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4% e MANCOZEB 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** Sintomatica.
MANCOZEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino a collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia:** Sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
CURZATE M è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la peronospora della vite, del tabacco e, solo fino alla prima fioritura, del pomodoro. CURZATE M agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. CURZATE M può essere usato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione.
Dosi - Epoche - Modalità di impiego
VITE: contro la peronospora usare 200-300 g di prodotto ogni 100 litri d'acqua. I trattamenti devono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
POMODORO: contro la peronospora solo fino alla prima fioritura usare 250-300 g di prodotto ogni 100 litri d'acqua. Usare la dose di 300-350 g ogni 100 litri di acqua in presenza di attacchi di peronospora e di alternaria.
Tabacco: contro la peronospora usare 300-350 g di prodotto ogni 100 litri d'acqua. Usare la dose più alta in situazione di forte attacco su varietà particolarmente sensibili.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di CURZATE M in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

DIVIETO DI IMPIEGO
- divieto di impiego in serra
- divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'
CURZATE M è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare CURZATE M in associazione a prodotti con reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altre Officine autorizzate:
STI-Solfotecnica Italiana – Stab. di Cotignola (RA) – Via Torricelli 2
Isagro S.p.A.–Stabilimento di Aprilia (LT)– Via Nettunense Km 23,400

Altre taglie autorizzate:
kg 5 (Contiene 10 sacchetti idrosolubili da 500 g)
kg 10 (Contiene 20 sacchetti idrosolubili da 500 g)
kg 10 (Contiene 10 sacchetti idrosolubili da 1000 g)

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

CURZATE® M

Antiperonosporico per Vite, Tabacco, Pomodoro.
Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 4
Mancozeb puro g 40
Coformulanti q. b. a 100
Contiene Esametilentetrammina

Contenuto netto del sacchetto: 250 g

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano

telefono 800378337

Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 3555 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità

AVVERTENZA: Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

Altre Officine autorizzate:
STI-Solfotecnica Italiana – Stab. di Cotignola (RA) – Via Torricelli 2
Isagro S.p.A. – Stabilimento di Aprilia (LT) – Via Nettunense Km 23,400

Altre taglie autorizzate: g 500 - g 1000

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1	2	3	4	5	6
Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua	Assicurarsi di avere le mani asciutte	Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo	Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte	Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)	Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni sopraríportate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

CURZATE® R BIANCO

Fungicida citotropico translaminare contro le Peronospore ed altre crittogame, efficace anche ad infezione avvenuta, per la vite, colture orticole (carciofo, lattuga, spinacio, pomodoro, zucchini, pisello, cipolla, aglio, porro, melone, patata), tabacco e rosa - Polvere bagnabile

CURZATE R BIANCO
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Cimoxanil puro	g	4,2
Rame metallo	g	39.75
(da ossicloruro tetraramico)		
Coformulanti q. b. a		100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi (R36). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S'3). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l - Via Siemens 12, Bolzano

Registrazione N. 8299 del 04.06.1993 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4,2% e RAME METALLO DA OSSICLORURO 39,75% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** Sintomatica.
RAME METALLO DA OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** gastrolusi con soluzione lattoalbuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
CURZATE R BIANCO è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro le malattie da pernospora e altre crittogame di varie colture. CURZATE R BIANCO agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Si consiglia di non applicare CURZATE R BIANCO in concomitanza con la fioritura.
Dosi - Epoche - Modalità d'impiego
VITE: contro la Peronospora usare g 200-300 di prodotto ogni 100 litri di acqua. I trattamenti devono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Non trattare durante il periodo della fioritura.
COLTURE ORTICOLE (carciofo, lattuga, spinacio, pomodoro, zucchini, pisello, cipolla, aglio, porro, melone, patata), TABACCO e ROSA: contro Peronospora: usare g 200-300 di prodotto ogni 100 litri d'acqua. Iniziare gli interventi prima della comparsa dei sintomi della malattia e proseguire secondo l'andamento climatico. Nel caso siano comparsi i primi sintomi della malattia, intervenire con due trattamenti ravvicinati (distanziati non più di 4-5 giorni l'uno dall'altro) impiegando la dose più alta. Il prodotto ha anche una certa efficacia contro Antracnosi, Septoria, Batteriosi e Cercosporiosi. In ogni caso la dose minima riferita ad ettaro non deve essere inferiore a 3 kg.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di CURZATE R BIANCO in poca acqua: indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente, tenendo la miscela in costante agitazione.

COMPATIBILITA'
CURZATE R BIANCO è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare CURZATE R BIANCO in associazione con prodotti a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta della vite, colture orticole, tabacco e 21 giorni prima della raccolta del carciofo.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altra officina autorizzata:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Altre taglie autorizzate: kg 3-5-6-9-10-12

CURZATE® R BIANCO

Fungicida citotropico translaminare contro le Peronospore ed altre crittogame, efficace anche ad infezione avvenuta, per la vite, colture orticole (carciofo, lattuga, spinacio, pomodoro, zucchini, pisello, cipolla, aglio, porro, melone, patata), tabacco e rosa - Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

CURZATE R BIANCO
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 4,2
Rame metallo g 39.75
(da ossicloruro tetraramico)
Coformulanti q. b. a 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi (R36). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours France S.A.S – Cernay, Francia

Registrazione N. 8299 del 04.06.1993 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 PARTITA N.:
(contiene 4 sacchetti idrosolubili da g 250)

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4,2% e RAME METALLO DA OSSICLORURO 39,75% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** Sintomatica.
RAME METALLO DA OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
CURZATE R BIANCO è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro le malattie da pernospora e altre crittogame di varie colture. CURZATE R BIANCO agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Si consiglia di non applicare CURZATE R BIANCO in concomitanza con la fioritura.
Dosi - Epoche - Modalità d'impiego
VITE: contro la Peronospora usare g 200-300 di prodotto ogni 100 litri di acqua. I trattamenti devono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Non trattare durante il periodo della fioritura.
COLTURE ORTICOLE (carciofo, lattuga, spinacio, pomodoro, zucchini, pisello, cipolla, aglio, porro, melone, patata), TABACCO e ROSA: contro Peronospora: usare g 200-300 di prodotto ogni 100 litri d'acqua.
Iniziare gli interventi prima della comparsa dei sintomi della malattia e proseguire secondo l'andamento climatico. Nel caso siano comparsi i primi sintomi della malattia, intervenire con due trattamenti ravvicinati (distanziati non più di 4-5 giorni l'uno dall'altro) impiegando la dose più alta. Il prodotto ha anche una certa efficacia contro Antracnosi, Septoria, Batteriosi e Cercosporiosi. In ogni caso la dose minima riferita ad ettaro non deve essere inferiore a 3 kg.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di CURZATE R BIANCO in poca acqua: indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente, tenendo la miscela in costante agitazione.

COMPATIBILITA'
CURZATE R BIANCO è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare CURZATE R BIANCO in associazione con prodotti a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta della vite, colture orticole, tabacco e 21 giorni prima della raccolta del carciofo.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altre officine autorizzate:
STI – Solfotecnica Italiana – Via Torricelli 2, Cotignola (RA)
Isagro S.p.A. – Via Nettunese km 23.400, Aprilia (LT)

Altre taglie autorizzate:
kg 2,5 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da g 250)
kg 2,5 (contiene 5 sacchetti idrosolubili da g 500)
kg 5 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da g 500)
kg 10 (contiene 20 sacchetti idrosolubili da g 500)
kg 10 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da g 1000)

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

CURZATE® R BIANCO

Fungicida citotropico translaminare da impiegarsi contro le Peronospore ed altre crittogame, efficace anche ad infezione avvenuta, per la vite, colture orticole (carciofo, lattuga, spinacio, pomodoro, zucchini, pisello, cipolla, aglio, porro, melone, patata), tabacco e rosa - Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 4,2
Rame metallo g 39,75
(da ossicloruro tetraramico)
Coformulanti q. b. a 100

Contenuto netto del sacchetto: 250 g

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 8299 del 04.06.1993 del Ministero della Sanità

AVVERTENZA: Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Altre officine autorizzate:
STI – Solfotecnica Italiana – Via Torricelli 2, Cotignola (RA)
Isagro S.p.A. – Via Nettunese km 23.400, Aprilia (LT)

Altre taglie autorizzate:
kg 2,5 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da g 250)
kg 2,5 (contiene 5 sacchetti idrosolubili da g 500)
kg 5 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da g 500)
kg 10 (contiene 20 sacchetti idrosolubili da g 500)
kg 10 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da g 1000)

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1. Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua
2. Assicurarsi di avere le mani asciutte
3. Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo
4. Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte
5. Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)
6. Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni sopranportate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

CURZATE® R DF BIANCO

Fungicida citotropico translaminare contro le Peronospore ed altre crittogame, efficace anche ad infezione avvenuta, per la Vite, colture orticole (Carciofo, Lattuga, Endivia, Spinacio, Pomodoro, Zucchini, Pisello, Cipolla, Aglio, Porro, Melone, Patata), Tabacco e Rosa - Granuli idrodispersibili

CURZATE R DF BIANCO
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Cimoxanil puro	g	4,2
Rame metallo	g	39.75
(da ossicloruro tetraramico)		
Coformulanti q. b. a		100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione (R20/22). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione N. 8461 del 31.12.1993 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)..

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4,2% e RAME METALLO DA OSSICLORURO 39,75% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** Sintomatica.
RAME METALLO DA OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118.

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
CURZATE R DF BIANCO è un fungicida in granuli idrodispersibili, efficace contro le malattie da peronospora ed altre crittogame di varie colture. CURZATE R DF BIANCO agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Si consiglia di non applicare CURZATE R DF BIANCO in concomitanza della fioritura.
Dosi - Epoche - Modalità d'impiego
VITE: contro Peronospora usare g 200-300 di prodotto ogni 100 litri di acqua. I trattamenti devono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Non trattare durante il periodo della fioritura.
COLTURE ORTICOLE (carciofo, lattuga, endivia, spinacio, pomodoro, zucchini, pisello, cipolla, aglio, porro, melone, patata), TABACCO e ROSA: contro Peronospora usare 200-300 g di prodotto ogni 100 litri d'acqua. Iniziare gli interventi prima della comparsa dei sintomi della malattia e proseguire secondo l'andamento climatico. Nel caso siano comparsi i primi sintomi della malattia, intervenire con due trattamenti ravvicinati (distanziati non più di 4-5 giorni l'uno dall'altro) impiegando la dose più alta. Il prodotto ha anche una certa efficacia contro Antracnosi, Septoria, Batteriosi e Cercosporiosi. In ogni caso la dose minima riferita ad ettaro non deve essere inferiore a 3 kg.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Formare una pasta semiliquida sciogliendo la dose di CURZATE R DF BIANCO in poca acqua: indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente, tenendo la miscela in costante agitazione.
COMPATIBILITA'
CURZATE R DF BIANCO è compatibile con tutti gli altri antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare CURZATE R DF BIANCO in associazione con prodotti a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta della vite, colture orticole, tabacco e 21 giorni prima della raccolta del carciofo.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONTIENE CIMOXANIL
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altre taglie autorizzate: kg 5 - 10

CURZATE® R DF

Antiperonosporico per Vite, Tabacco, Pomodoro, Carciofo e Patata - Granuli idrodispersibili

CURZATE R DF
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Cimoxanil puro	g	4,2
Rame metallo	g	39.75
(da ossicloruro tetraramico)		
Coformulanti q. b. a		100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione (R20/22). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione N. 8178 del 03.03.1993 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4,2% e RAME METALLO DA OSSICLORURO 39,75% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CIMOXANIL
Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite, nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** Sintomatica.
RAME METALLO DA OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
CURZATE R DF è un fungicida efficace contro la peronospora della vite, della patata, del pomodoro, del carciofo e del tabacco.
CURZATE R DF agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Per evitare interferenze nella fecondazione o rallentamenti dello sviluppo vegetativo, si consiglia di non applicare CURZATE R DF in concomitanza della fioritura. In tale periodo sono consigliate le miscele di CURZATE con: Zineb, Mancozeb (NB: questi due principi attivi sono applicabili sul pomodoro soltanto fino alla prima fioritura) e Folpet (soltanto sulla vite).
Dosi - Epoche - Modalità d'impiego
VITE: contro Peronospora usare g 200-300 di prodotto ogni 100 litri di acqua. I trattamenti devono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Non trattare durante il periodo della fioritura.
TABACCO, POMODORO, CARCIOFO, PATATA: contro Peronospora usare g 200 - 300 di prodotto ogni 100 litri d'acqua. In ogni caso la dose minima riferita ad ettaro non deve essere inferiore a 3 kg.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Sciogliere il prodotto in poca acqua, indi versare nella botte contenente metà dell'acqua necessaria e portare a volume tenendo la miscela in costante agitazione.
COMPATIBILITA'
CURZATE R DF è compatibile con tutti gli altri antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare CURZATE R DF in associazione con prodotti a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta e 21 giorni prima sul carciofo.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONTIENE CIMOXANIL
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altra taglie autorizzate: kg 5 - 10

CURZATE® R

Antiperonosporico per Vite, Tabacco, Pomodoro e Patata - Polvere bagnabile

CURZATE R
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Cimoxanil puro	g	4,2
Rame metallo	g	39.75
(da ossicloruro tetraramico)		
Coformulanti q. b. a		100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi (R36). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l - Via Siemens 12, Bolzano

Registrazione N. 3532 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4,2% e RAME METALLO 39,75% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** Sintomatica.
RAME METALLO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
CURZATE R è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della vite, della patata, del pomodoro e del tabacco.
CURZATE R agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Per evitare interferenze nella fecondazione o rallentamenti dello sviluppo vegetativo, si consiglia di non applicare CURZATE R in concomitanza con la fioritura. In tale periodo sono consigliate le miscele di CURZATE con Mancozeb (NB: per il pomodoro il mancozeb è applicabile solo fino alla prima fioritura) e con Folpet.
Dosi - Epoche - Modalità d'impiego
Peronospora della vite: usare g 200-300 di prodotto ogni 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fino al persistere delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Non trattare durante il periodo della fioritura.
Peronospora del tabacco, della patata e del pomodoro: usare g 300 di prodotto ogni 100 litri d'acqua.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di CURZATE R in poca acqua: indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente, tenendo la miscela in costante agitazione.
COMPATIBILITA'
CURZATE R è compatibile con tutti gli altri antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare CURZATE R in associazione ad antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altra officina autorizzata:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Altre taglie autorizzate: kg 3-5-6-9-10-12

CURZATE® R

Antiperonosporico per Vite, Tabacco, Pomodoro e Patata - Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

CURZATE R
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Cimoxanil puro	g	4,2
Rame metallo	g	39.75
(da ossicloruro tetraramico)		
Coformulanti q. b. a		100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi (R36). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours France S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 3532 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 (contiene 4 sacchetti idrosolubili da g 250)
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4,2% e RAME METALLO 39,75% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** Sintomatica.
RAME METALLO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
CURZATE R è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della vite, della patata, del pomodoro e del tabacco.
CURZATE R agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Per evitare interferenze nella fecondazione o rallentamenti dello sviluppo vegetativo, si consiglia di non applicare CURZATE R in concomitanza con la fioritura. In tale periodo sono consigliate le miscele di CURZATE con Mancozeb (NB: per il pomodoro il mancozeb è applicabile solo fino alla prima fioritura) e con Folpet.

Dosi - Epoche - Modalità d'impiego
Peronospora della vite: usare g 200-300 di prodotto ogni 100 litri di acqua. **Iniziare i trattamenti** quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fino al persistere delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Non trattare durante il periodo della fioritura.
Peronospora del tabacco, della patata e del pomodoro: usare g 300 di prodotto ogni 100 litri d'acqua.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di CURZATE R in poca acqua: indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente, tenendo la miscela in costante agitazione.

COMPATIBILITA'
CURZATE R è compatibile con tutti gli altri antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare CURZATE R in associazione ad antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altre officine autorizzate:
STI – Solfotecnica Italiana – Via Torricelli 2, Cotignola (RA)
Isagro S.p.A. – Via Nettunese km 23.400, Aprilia (LT)

Altre taglie autorizzate:
kg 2,5 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da g 250)
kg 2,5 (contiene 5 sacchetti idrosolubili da g 500)
kg 5 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da g 500)
kg 10 (contiene 20 sacchetti idrosolubili da g 500)
kg 10 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da g 1000)

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

CURZATE® R

Antiperonosporico per Vite, Tabacco, Pomodoro e Patata.
Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 4,2
Rame metallo g 39.75
(da ossicloruro tetraramico)
Coformulanti q. b. a 100

Contenuto netto del sacchetto: 250 g

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

IRRITANTE

Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 3532 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità

AVVERTENZA:
Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE' CONSERVARE
FUORI DALLA CONFEZIONE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Altre officine autorizzate:
STI – Solfotecnica Italiana – Via Torricelli 2, Cotignola (RA)
Isagro S.p.A. – Via Nettunese km 23.400, Aprilia (LT)

Altre taglie autorizzate: 500 g - 1000 g

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1	2	3	4	5	6
Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua	Assicurarsi di avere le mani asciutte	Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo	Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte	Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)	Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni soprariportate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

CYMOXAN DUO

Fungicida indicato per la lotta contro la peronospora della Vite, Patata, Pomodoro e Tabacco.
Polvere bagnabile

CYMOXAN DUO
COMPOSIZIONE
Cimoxanil puro g 3
Rame metallo g 20
(sotto forma di idrossido)
Coformulanti q. b. a 100

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R22). Tossico per inalazione (R23). Rischio di gravi lesioni oculari (R41). Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini (S1/2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia (S36/37/39). In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S45). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61). In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo (S63).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officine di produzione
Bayer CropScience S.p.a. - Via delle Industrie 9, Filago (BG)
Chemia S.p.A. – S.S. 255 km 46, S. Agostino (FE)

Registrazione N. 7829 del 15.06.1989

Contenuto netto: g 100 – 200 kg 1 – 5- 10 - 20 **Partita N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 3%; RAME METALLO 20% (Da Idrossido), le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione: CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito, diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose danno epatico e renale e del SNC, emolisi.Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali; ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO:
CYMOXAN DUO è un fungicida in polvere bagnabile costituito dall'unione di due principi attivi, Cimoxanil e Rame, che esercita la propria azione sia per contatto sugli elementi di propagazione della peronospora, sia all'interno dei tessuti vegetali colpiti (azione endoterapica) inibendo lo sviluppo dei miceli. Effettuare i trattamenti con pompe a volume normale.
CYMOXAN DUO viene impiegato sulle seguenti colture:
VITE: contro Peronospora: g 400/hl di acqua. Iniziare i trattamenti quando si verifica la possibilità di attacchi peronosporici proseguendo con il persistere delle condizioni che favoriscono lo sviluppo della malattia.
PATATA, POMODORO: contro Peronospora e Alternaria, Cladiosporosi, Batteriosi: g 400/hl di acqua
TABACCO: contro Peronospora: g 400/hl di acqua

COMPATIBILITA'
Non impiegare il prodotto in associazione con prodotti fitosanitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non trattare in fioritura.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: **Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.** Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONTIENE CIMOXANIL
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

CYMOXAN DUO

Fungicida indicato per la lotta contro la peronospora della Vite, Patata, Pomodoro e Tabacco.
Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

CYMOXAN DUO
COMPOSIZIONE
Cimoxanil puro g 3
Rame metallo g 20
(Sotto forma di idrossido)
Coformulanti q. b. a 100

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R22). Tossico per inalazione (R23). Rischio di gravi lesioni oculari (R41). Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini (S1/2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia (S36/37/39). In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S45). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61). In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo (S63).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano telefono 02253021
Officine di produzione
Bayer CropScience S.p a. - Via delle Industrie 9, Filago (BG)
STI Solfotecnica Italiana SpA via Torricelli 2, Cotignola (RA)
Registrazione N. 7829 del 15.06.1989

Contento netto: kg 1 **Partita N.**
(contiene 1 sacchetto idrosolubile da g 1000)

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 3%; RAME METALLO 20% (Da Idrossido), le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL : Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito, diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
RAME : Sintomi denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose danno epatico e renale e del SNC, emolisi.Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali; ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO:
CYMOXAN DUO è un fungicida in polvere bagnabile costituito dall'unione di due principi attivi, Cimoxanil e Rame, che esercita la propria azione sia per contatto sugli elementi di propagazione della peronospora, sia all'interno dei tessuti vegetali colpiti (azione endoterapica) inibendo lo sviluppo dei miceli. Effettuare i trattamenti con pompe a volume normale. CYMOXAN DUO viene impiegato sulle seguenti colture:
VITE: contro Peronospora: g 400/hl di acqua. (pari ad 1 sacchetto da kg 1 in 250 Litri di acqua)* Iniziare i trattamenti quando si verifica la possibilità di attacchi peronosporici proseguendo con il persistere delle condizioni che favoriscono lo sviluppo della malattia.
PATATA, POMODORO: contro Peronospora e Alternaria, Cladiosporosi, Batteriosi: g 400/hl di acqua (pari ad 1 sacchetto da kg 1 in 250 Litri di acqua)*
TABACCO: contro Peronospora: g 400/hl di acqua (pari ad 1 sacchetto da kg 1 in 250 Litri di acqua)*

COMPATIBILITA'
Non impiegare il prodotto in associazione con prodotti fitosanitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non trattare in fioritura.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONTIENE CIMOXANIL
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
[Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

***oppure**
-pari a un sacchetto da g 500 in 125 litri di acqua
-pari a un sacchetto da g 250 in 62 litri di acqua
-pari a un sacchetto da g 200 in 50 litri di acqua
-pari a un sacchetto da g 100 in 25 litri di acqua

Altre taglie autorizzate
kg 1 (contiene 10 sacchetti da g 100)
kg 1 (contiene 5 sacchetti da g 200)
kg 1 (contiene 4 sacchetti da g 250)
kg 1 (contiene 2 sacchetti da g 500)
kg 3 (contiene 3 sacchetti da g 1000)
kg 5 (contiene 5 sacchetti da g 1000)
kg 8 (contiene 8 sacchetti da g 1000)
kg 8 (contiene 4 sacchetti da g 2000)

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

CYMOXAN DUO

Fungicida indicato per la lotta contro la peronospora della Vite, Patata, Pomodoro e Tabacco
Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 3
Rame metallo g 20
(sotto forma di idrossido)
Coformulanti q. b. a 100

Contenuto netto del sacchetto: 100 g

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano

Officina di produzione
Bayer CropScience S.p a. - Via delle Industrie 9, Filago (BG)

Registrazione N. 7829 del 15.06.1989 del Ministero della Sanità

AVVERTENZA: Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Altra officina autorizzate:
STI – Solfotecnica Italiana – via Torricelli 2, Cotignola (RA)
Altre taglie autorizzate:
g 200 – 250 – 500 – 1000 - 2000

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1. Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua
2. Assicurarsi di avere le mani asciutte
3. Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo
4. Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte
5. Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)
6. Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni soprariportate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

CYMOXAN M 8-60

Antiperonosporico citotropico - Polvere bagnabile

CYMOXAN M 8-60
Composizione
Cimoxanil puro ....g 8
Mancozeb puro............g 60
Coformulanti q.b.a 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie (R37). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officine di produzione:
Sipcam S.p.A. – Via V.Veneto 81, Salerano sul Lambro (LO)
STI Solfotecnica Italiana S.p.a. - Via Torricelli, 2, Cotignola (RA)
STI Solfotecnica Italiana S.p.a. - Via Pian d'Asso, Torrenieri (SI)
Scam S.r.l. – Via Bellaria 164, S. Maria di Mugnano (MO)
Bayer CropSience S.p.A. – Via delle Industrie, 9, Filago (BG)

Registrazione n. 8807 del 04.04.1996 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 50 – 100 – 250 – 500 Kg 1 – 2 –5 – 10 –20
Partita n.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidita'.Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 8% - Mancozeb 60% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CYMOXANIL
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE: CYMOXAN M 8-60 trova impiego nella lotta antiperonosporica nelle colture di vite, pomodoro e tabacco. Esplica la sua azione per via translaminare nelle foglie e per contatto.

MODALITÀ D'IMPIEGO:
Vite: contro Peronospora 150-170 g/hl di acqua. Effettuare i trattamenti quando inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguirli sino a che permangono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
Pomodoro: (solo fino alla prima fioritura): contro Peronospora e Alternaria 150-200 g/hl di acqua.
Tabacco: contro Peronospora e Alternaria 150 g/hl di acqua.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

FITOTOSSICITÀ':
Non risulta essere fitotossico alle dosi proposte.

COMPATIBILITÀ'
Il prodotto non è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Su pomodoro sono ammessi i trattamenti solo fino alla prima fioritura.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Attenzione : il prodotto fitosanitario contiene una sostanza attiva che può essere nociva per l'acaro-entomofauna

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

CYMOZATE® M

Fungicida organico per la lotta contro la peronospora e con effetto collaterale, contro l'escoriosi della vite - Polvere bagnabile

CYMOZATE M
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 4
Mancozeb puro g 40
Coformulanti q. b. a 100
Contiene Esametilentetrammina

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie (R37). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S 13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l - Via Siemens 12, Bolzano
Officina di Confezionamento
Zapi Industrie Chimiche S.p.A.–Via Terza Strada 12, Conselve (PD)

Registrazione N. 7103 del 26.05.1987 del Ministero della Sanità
DISTRIBUITO DA: Zapi Industrie Chimiche S.p.A. – Conselve (PD)
Contenuto netto: g 250 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4% e MANCOZEB 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** Sintomatica.
MANCOZEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino a collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia:** Sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
CYMOZATE M è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la peronospora della vite, del pomodoro e del tabacco. Il prodotto puo', in via eccezionale, essere impiegato per combattere il parassita anche quando e' gia' penetrato da 1-3 giorni nella foglia.
Dosi - Epoche - Modalità di impiego
VITE: 200-300 g per 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e ripetere fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
POMODORO (solo fino alla prima fioritura): 250-300 g per 100 litri d'acqua. In caso di presenza di Alternaria o di forti attacchi di Peronospora, aumentare la dose a 300-350 g/hl.
TABACCO: 300-350 g per 100 litri d'acqua. Impiegare la dose piu' alta in caso di forte attacco su varieta' particolarmente sensibili

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e poi portare a volume mescolando bene.
DIVIETO DI IMPIEGO
- divieto di impiego in serra
- divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'
Il prodotto e' miscibile in via di massima con i piu' comuni antiparassitari fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri).
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

® Marchio Registrato ZAPI Industrie Chimiche SpA

Altra officina di produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Altre taglie autorizzate: kg 0.5 – 1 – 5 – 10 – 20 - 25

CYMOZATE® M

Fungicida organico per la lotta contro la peronospora e con effetto collaterale contro l'escoriosi della vite.
Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

CYMOZATE M
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 4
Mancozeb puro g 40
Coformulanti q. b. a 100
Contiene Esametilentetrammina

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie (R37). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, ne fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 7103 del 26.05.1987 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: Kg 1 (contiene 4 sacchetti idrosolubili da g 250)
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4% e MANCOZEB 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** Sintomatica.
MANCOZEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino a collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia:** Sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
CYMOZATE M è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la peronospora della vite, del pomodoro e del tabacco. Il prodotto puo', in via eccezionale, essere impiegato per combattere il parassita anche quando e' gia' penetrato da 1-3 giorni nella foglia.
Dosi - Epoche - Modalità di impiego
VITE: 200-300 g per 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e ripetere fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
POMODORO (solo fino alla prima fioritura): 250-300 g per 100 litri d'acqua. In caso di presenza di Alternaria o di forti attacchi di Peronospora, aumentare la dose a 300-350 g/hl.
TABACCO: 300-350 g per 100 litri d'acqua. Impiegare la dose piu' alta in caso di forte attacco su varieta' particolarmente sensibili

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e poi portare a volume mescolando bene.

DIVIETO DI IMPIEGO
- divieto di impiego in serra
- divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'
Il prodotto e' miscibile in via di massima con i piu' comuni antiparassitari fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri).
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Altre Officine autorizzate:
STI-Solfotecnica Italiana – Stab. di Cotignola (RA) – Via Torricelli 2
Isagro S.p.A.–Stabilimento di Aprilia (LT) –Via Nettunense Km 23,400
Altre taglie autorizzate:
kg 2.5 (Contiene 10 sacchetti idrosolubili da 250 g)
kg 2.5 (Contiene 5 sacchetti idrosolubili da 500 g)
kg 5 (Contiene 10 sacchetti idrosolubili da 500 g)
kg 10 (Contiene 20 sacchetti idrosolubili da 500 g)
kg 10 (Contiene 10 sacchetti idrosolubili da 1000 g)

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

CYMOZATE® M

Fungicida organico per la lotta contro la peronospora e con effetto collaterale, contro l'escoriosi della vite.
Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 4
Mancozeb puro g 40
Coformulanti q. b. a 100
Contiene Esametilentetrammina

Contenuto netto del sacchetto: 250 g

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 7103 del 26.05.1987 del Ministero della Sanità

AVVERTENZA: Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Altre Officine autorizzate:
STI-Solfotecnica Italiana – Stab. di Cotignola (RA) – Via Torricelli 2
Isagro S.p.A. – Stabilimento di Aprilia (LT) – Via Nettunense Km 23,400

Altre taglie autorizzate:
kg 2.5 (Contiene 10 sacchetti idrosolubili da 250 g)
kg 2.5 (Contiene 5 sacchetti idrosolubili da 500 g)
kg 5 (Contiene 10 sacchetti idrosolubili da 500 g)
kg 10 (Contiene 20 sacchetti idrosolubili da 500 g)
kg 10 (Contiene 10 sacchetti idrosolubili da 1000 g)

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1. Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua
2. Assicurarsi di avere le mani asciutte
3. Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo
4. Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte
5. Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)
6. Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni soprariportate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

CYMOZATE R

Antiperonosporico per Vite, Tabacco, Pomodoro e Patata - Polvere bagnabile

CYMOZATE R
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Cimoxanil puro	g	4,2
Rame metallo (da ossicloruro tetraramico)	g	39.75
Coformulanti q. b. a		100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi (R36). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43) Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l - Via Siemens 12, Bolzano
Officina di Confezionamento
ZAPI Industrie Chimiche Spa – via Terza Strada 12, Conselve (PD)
Distribuito da:
ZAPI Industrie Chimiche Spa – via Terza Strada 12, Conselve (PD)
Registrazione N. 8819 del 19.04.1996 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 0,250 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4,2% e RAME METALLO 39,75% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** Sintomatica.
RAME METALLO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
CYMOZATE R è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della vite, della patata, del pomodoro e del tabacco.
CYMOZATE R agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Per evitare interferenze nella fecondazione o rallentamenti dello sviluppo vegetativo, si consiglia di non applicare CYMOZATE R in concomitanza con la fioritura. In tale periodo sono consigliate le miscele di CYMOZATE R con Mancozeb (NB: per il pomodoro il mancozeb è applicabile solo fino alla prima fioritura) e con Folpet.
Dosi - Epoche - Modalità d'impiego
Peronospora della vite: usare g 200-300 di prodotto ogni 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fino al persistere delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Non trattare durante il periodo della fioritura.
Peronospora del tabacco, della patata e del pomodoro: usare g 300 di prodotto ogni 100 litri d'acqua.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di CYMOZATE R in poca acqua: indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente, tenendo la miscela in costante agitazione.

COMPATIBILITA'
CYMOZATE R è compatibile con tutti gli altri antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare CYMOZATE R in associazione ad antiparassitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

® Marchio registrato ZAPI Industrie Chimiche SpA

Altra officina autorizzata:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Altre taglie autorizzate: kg 0,5 - 1 –10 - 25

DEBUT®

Erbicida di post-emergenza selettivo per la barbabietola da zucchero - Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Triflusulfuron metile p.a. puro 50 g
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia
Registrazione n. 8887 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 100 **PARTITA N.:**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.
Terapia: Sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche tecniche
DEBUT blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi (ingiallimenti,necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 15 giorni dalla applicazione.
EFFICACIA ERBICIDA
DEBUT, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani (entro le 2-4 foglie vere) ed in attiva crescita e, poiché non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Infestanti sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Centonchio), *Bidens spp* (Forbicina), *Bifora radians* (Coriandolo fetido), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Daucus carota* (Carota selvatica), *Galium aparine* (Attaccamani), *Mercurialis annua* (Mercorella comune), *Myagrum perfoliatum* (Miagro liscio), *Poligonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Poligono nodoso), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio), *Veronica persica* (Veronica comune),*Veronica arvensis* (Veronica).
Alcune infestanti (*Abutilon t., Myagrum p., Stellaria m.*) se trattate ad uno stadio superiore alle 3 - 4 foglie vere, possono subire solo un arresto di sviluppo che non ne determina la successiva morte.
DOSE D'IMPIEGO:
30 - 40 g/ha in 150-300 litri d'acqua addizionato con bagnante Trend alla dose di 250 cc per ogni 100 l di acqua oppure con olio bianco a 0,5 lt/ha, su coltura allo stadio compreso tra i cotiledoni e le 6 foglie. La dose maggiore é consigliata quando il prodotto é impiegato da solo per il controllo di *Polygonum lapathifolium, Solanum nigrum, Mercurialis annua, Myagrum perfoliatum, Capsella bursa pastoris ed Abutilon theophrasti.*
DEBUT va utilizzato con due interventi distanziati di 10 - 12 gg tra di loro.
Su terreni torbosi ed in presenza di infestanti ad emergenza ritardata o scalare (es. *Abutilon theophrasti*), può rendersi necessaria una terza applicazione, comunque effettuata entro lo stadio di 6 foglie della coltura.
Per completare lo spettro d'azione di DEBUT su alcune infestanti meno sensibili (*Amaranthus hibridus, Chenopodium album, Polygonum convolvulus, Polygonum aviculare*) é opportuna la miscela con uno o più formulati contenenti sostanze ad attività erbicida complementare.
EPOCA D'IMPIEGO: Post emergenza.
PREPARAZIONE DELLA MISCELA: DEBUT, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratrice riempito circa a 1/4, mantenendo in movimento l'agitatore. Portare al volume desiderato il serbatoio ed aggiungere il bagnante Trend. Eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate. La sospensione deve essere preparata poco prima dell'applicazione in campo.
E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare DEBUT. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
Subito dopo il trattamento con DEBUT è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita addizionata di una soluzione detergente (0.5 lt di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 lt di acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa,barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Si sconsigliano le miscele di DEBUT con formulati contenenti Ethofumesate e Clopiralid. Non effettuare i trattamenti in presenza di brina o gelo o a temperature superiori a 23 C. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacco di parassiti, asfissia radicale o per effetto di precedenti interventi antiparassitari.
DEBUT e' poco persistente nel suolo; la sua utilizzazione non comporta alcuna restrizione per le colture che rientrano nel normale avvicendamento della barbabietola da zucchero.
Si sconsiglia l'impianto di colture floricole, ornamentali ed arbustive nei 12 mesi successivi al trattamento effettuato con DEBUT.
In caso di distruzione accidentale o volontaria della coltura precedentemente trattata con DEBUT, e' possibile la risemina della sola barbabietola da zucchero; tale raccomandazione non tiene conto degli eventuali altri erbicidi impiegati sulla medesima coltura.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

COMPATIBILITA': DEBUT è compatibile con i più comuni antiparassitari impiegati sulla barbabietola da zucchero, ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) -U.S.A.

Altre taglie autorizzate: g 120 - 200 - 250

FOGLIO ILLUSTRATIVO

DEBUT®

Erbicida di post-emergenza selettivo per la barbabietola da zucchero - Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Triflusulfuron metile p.a. puro 50 g
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia
Registrazione n. 8887 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 100 **PARTITA N.:**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.
Terapia: Sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche tecniche
DEBUT blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi (ingiallimenti,necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 15 giorni dalla applicazione.
EFFICACIA ERBICIDA
DEBUT, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani (entro le 2-4 foglie vere) ed in attiva crescita e, poiché non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Infestanti sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Centonchio), *Bidens spp* (Forbicina), *Bifora radians* (Coriandolo fetido), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Daucus carota* (Carota selvatica), *Galium aparine* (Attaccamani), *Mercurialis annua* (Mercorella comune), *Myagrum perfoliatum* (Miagro liscio), *Poligonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Poligono nodoso), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio), *Veronica persica* (Veronica comune),*Veronica arvensis* (Veronica).
Alcune infestanti (*Abutilon t., Myagrum p., Stellaria m.*) se trattate ad uno stadio superiore alle 3 - 4 foglie vere, possono subire solo un arresto di sviluppo che non ne determina la successiva morte.
DOSE D'IMPIEGO:
30 - 40 g/ha in 150-300 litri d'acqua addizionato con bagnante Trend alla dose di 250 cc per ogni 100 l di acqua oppure con olio bianco a 0,5 lt/ha, su coltura allo stadio compreso tra i cotiledoni e le 6 foglie. La dose maggiore é consigliata quando il prodotto é impiegato da solo per il controllo di *Polygonum lapathifolium, Solanum nigrum, Mercurialis annua, Myagrum perfoliatum, Capsella bursa pastoris ed Abutilon theophrasti.*
DEBUT va utilizzato con due interventi distanziati di 10 - 12 gg tra di loro.
Su terreni torbosi ed in presenza di infestanti ad emergenza ritardata o scalare (es. *Abutilon theophrasti*), può rendersi necessaria una terza applicazione, comunque effettuata entro lo stadio di 6 foglie della coltura.
Per completare lo spettro d'azione di DEBUT su alcune infestanti meno sensibili (*Amaranthus hibridus, Chenopodium album, Polygonum convolvulus, Polygonum aviculare*) é opportuna la miscela con uno o più formulati contenenti sostanze ad attività erbicida complementare.
EPOCA D'IMPIEGO: Post emergenza.
PREPARAZIONE DELLA MISCELA: DEBUT, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratrice riempito circa a 1/4, mantenendo in movimento l'agitatore. Portare al volume desiderato il serbatoio ed aggiungere il bagnante Trend. Eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate. La sospensione deve essere preparata poco prima dell'applicazione in campo.
E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare DEBUT. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
Subito dopo il trattamento con DEBUT è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita addizionata di una soluzione detergente (0.5 lt di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 lt di acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa,barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Si sconsigliano le miscele di DEBUT con formulati contenenti Ethofumesate e Clopiralid. Non effettuare i trattamenti in presenza di brina o gelo o a temperature superiori a 23 C. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacco di parassiti, asfissia radicale o per effetto di precedenti interventi antiparassitari.
DEBUT e' poco persistente nel suolo; la sua utilizzazione non comporta alcuna restrizione per le colture che rientrano nel normale avvicendamento della barbabietola da zucchero.
Si sconsiglia l'impianto di colture floricole, ornamentali ed arbustive nei 12 mesi successivi al trattamento effettuato con DEBUT.
In caso di distruzione accidentale o volontaria della coltura precedentemente trattata con DEBUT, e' possibile la risemina della sola barbabietola da zucchero; tale raccomandazione non tiene conto degli eventuali altri erbicidi impiegati sulla medesima coltura.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

COMPATIBILITA': DEBUT è compatibile con i più comuni antiparassitari impiegati sulla barbabietola da zucchero, ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) -U.S.A.

Altre taglie autorizzate: g 120 - 200 - 250

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

DEBUT®

Erbicida di post-emergenza selettivo per la barbabietola da zucchero
Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Triflusulfuron metile p.a. puro 50 g
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia
Registrazione n. 8886 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 100 **PARTITA N.:**

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DEBUT®

Erbicida di post-emergenza selettivo per la barbabietola da zucchero.
Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Triflusulfuron metile p.a. puro 50 g
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia
Registrazione n. 8887 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 30 **PARTITA N.:**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.
Terapia: Sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche tecniche
DEBUT blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi (ingiallimenti,necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 15 giorni dalla applicazione.
EFFICACIA ERBICIDA
DEBUT, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani (entro le 2-4 foglie vere) ed in attiva crescita e, poiché non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Infestanti sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Centonchio), *Bidens spp* (Forbicina), *Bifora radians* (Coriandolo fetido), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Daucus carota* (Carota selvatica), *Galium aparine* (Attaccamani), *Mercurialis annua* (Mercorella comune), *Myagrum perfoliatum* (Miagro liscio), *Poligonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Poligono nodoso), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella) *Stellaria media* (Centocchio), *Veronica persica* (Veronica comune),*Veronica arvensis* (Veronica).
Alcune infestanti (*Abutilon t., Myagrum p., Stellaria m.*) se trattate ad uno stadio superiore alle 3 - 4 foglie vere, possono subire solo un arresto di sviluppo che non ne determina la successiva morte.
DOSE D'IMPIEGO:
30 - 40 g/ha in 150-300 litri d'acqua addizionato con bagnante Trend alla dose di 250 cc per ogni 100 l di acqua oppure con olio bianco a 0,5 lt/ha, su coltura allo stadio compreso tra i cotiledoni e le 6 foglie. La dose maggiore é consigliata quando il prodotto é impiegato da solo per il controllo di *Polygonum lapathifolium, Solanum nigrum, Mercurialis annua, Myagrum perfoliatum, Capsella bursa pastoris ed Abutilon theophrasti*.
DEBUT va utilizzato con due interventi distanziati di 10 - 12 gg tra di loro.
Su terreni torbosi ed in presenza di infestanti ad emergenza ritardata o scalare (es. *Abutilon theophrasti*), puó rendersi necessaria una terza applicazione, comunque effettuata entro lo stadio di 6 foglie della coltura.
Per completare lo spettro d'azione di DEBUT su alcune infestanti meno sensibili (*Amaranthus hibridus, Chenopodium album, Polygonum convolvulus, Polygonum aviculare*) é opportuna la miscela con uno o piú formulati contenenti sostanze ad attività erbicida complementare.
EPOCA D'IMPIEGO: Post emergenza.
PREPARAZIONE DELLA MISCELA: DEBUT, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratrice riempito circa a 1/4, mantenendo in movimento l'agitatore. Portare al volume desiderato il serbatoio ed aggiungere il bagnante Trend. Eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate. La sospensione deve essere preparata poco prima dell'applicazione in campo.
E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare DEBUT. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
Subito dopo il trattamento con DEBUT è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita addizionata di una soluzione detergente (0.5 lt di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 lt di acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa,barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Si sconsigliano le miscele di DEBUT con formulati contenenti Ethofumesate e Clopiralid. Non effettuare i trattamenti in presenza di brina o gelo o a temperature superiori a 23 C. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacco di parassiti, asfissia radicale o per effetto di precedenti interventi antiparassitari.
DEBUT e' poco persistente nel suolo; la sua utilizzazione non comporta alcuna restrizione per le colture che rientrano nel normale avvicendamento della barbabietola da zucchero.
Si sconsiglia l'impianto di colture floricole, ornamentali ed arbustive nei 12 mesi successivi al trattamento effettuato con DEBUT.
In caso di distruzione accidentale o volontaria della coltura precedentemente trattata con DEBUT, e' possibile la risemina della sola barbabietola da zucchero; tale raccomandazione non tiene conto degli eventuali altri erbicidi impiegati sulla medesima coltura.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

COMPATIBILITA': DEBUT è compatibile con i più comuni antiparassitari impiegati sulla barbabietola da zucchero, ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) -U.S.A.

Altre taglie autorizzate:
g 40 (contiene 1 sacchetto da g 40)
g 120 (contiene 4 sacchetti da g 30)
g 300 (contiene 10 sacchetti da g 30)

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

DEBUT®

Erbicida di post-emergenza selettivo per la barbabietola da zucchero
Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Triflusulfuron metil p.a. puro 50 g
coformulanti q. b. a 100

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. -Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia

Registrazione N. 8887 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto netto del sacchetto: 30 g

AVVERTENZA: Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

Altre taglie autorizzate:
g 40 (contiene 1 sacchetto da g 40)
g 120 (contiene 4 sacchetti da g 30)
g 300 (contiene 10 sacchetti da g 30)

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1. Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua
2. Accicurarsi di avere le mani asciutte
3. Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo
4. Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte
5. Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)
6. Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni sopraripotate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti

DIMON

Diserbante di post-emergenza per cereali (frumento, orzo, segale, avena) e mais Soluzione miscibile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
30 g di dicamba sale dimetilamminico puro
(corrispondenti a 25 g di dicamba acido) (=260 g/l)
Coformulanti q. b. a 100

NOCIVO

NATURA DEL RISCHIO
Nocivo per ingestione (R22). Rischio di gravi lesioni oculari (R41). Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R52/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26). Usare indumenti protettivi adatti (S36) Proteggersi gli occhi/la faccia (S39) In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l Via Siemens 12, Bolzano

Registrazione n. 7557 del 25.10.1988 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: Litri 1 **PARTITA N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE
DIMON e' un erbicida da impiegarsi in post-emergenza dei cereali per la lotta contro le infestanti annuali e perennanti a foglia larga, fra le quali ***Taraxacum officinalis, Trifolium repens, Achillea millefolium, Cerastium triviale, Stellaria media, Polygonum spp., Chenopodium spp., Amaranthus retroflexus, Abutilon teophrasti, Heliantus annuus, Portulaca oleracea***. Svolge una certa attivita' di controllo anche contro ***Cirsium spp. e Convolvolus spp.***
Lo spettro d'azione è notevolmente allargato in miscela con altri erbicidi quali per esempio MCPA e MCPP.

MODALITA' DI IMPIEGO
Cereali (frumento, orzo, segale, avena) e mais : il prodotto, se impiegato da solo, va distribuito alla dose di lt 0,7-0,8 per ettaro in 400-600 litri di acqua. Il trattamento può essere effettuato in post-emergenza da quando la coltura ha differenziato la 3a-4a foglia vera (inizio accestimento) fino all'inizio della levata per I cereali e su mais prima che la coltura abbia superato i 35-40 cm di altezza.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria o nella poltiglia erbicida già preparata.

COMPATIBILITA'
DIMON può essere miscelato con altri erbicidi. Si sconsiglia la miscela con insetticidi, anticrittogamici e concimi.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Altre taglie autorizzate: litri 5 - 10

DISTOR WP

Insetticida a base di metomil per combattere Lepidotteri, Coleotteri ed Afidi nei frutteti, vigneti, colture ornamentali ed industriali, colture orticole - Polvere bagnabile

DISTOR WP
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Metomil puro g 25
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione (R20). Tossico per ingestione (R25). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini (S1/2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S45). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione n. 5055 del 27.11.1982 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 **PARTITA N.:**

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 D.P.R. 23.04.2001 n. 290.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare le polveri. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Metomil: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. **Sintomi muscarinici:** disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. **Terapia:** atropina. **Controindicazioni:** ossime.
INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO: rimuovere la persona intossicata dall'area contaminata. Non somministrare liquidi per bocca. Se il paziente presenta disturbi respiratori trasportarlo in ospedale. In caso di contatto cutaneo lavare abbondantemente con acqua e sapone di Marsiglia; se è interessata anche la testa lavare anche i capelli. In caso di ingestione può essere utile provocare il vomito nelle seguenti circostanze: solo se la persona è cosciente, entro 30 minuti dall'ingestione, se non presenta crisi convulsive.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
DISTOR WP è un insetticida che agisce per contatto e grazie alla sua azione translaminare è in grado di combattere anche quei parassiti di difficile controllo come gli afidi resistenti. L'efficacia migliore si ottiene comunque intervenendo con tempestività e colpendo gli insetti nei loro primi stadi di sviluppo. Fra i parassiti sensibili al prodotto ricordiamo : Minatori, Afidi, Verme e Ricamatrici della frutta, Tignola, Anarsia, Cocciniglie, Cavolaia, Nottue, Aleurodidi, Tripidi, Cleono, Altica.
Dosi - Epoche - Modalità d'impiego (Dosi per 100 litri di acqua):
MELO e PERO: 200 g contro Ricamatrici (Capua e Cacoecia), Verme delle mele e pere (Carpocapsa) e Afidi intervenendo alla prima comparsa dei parassiti. Contro Litocollete intervenire contro le larve di primo stadio; contro Cemiostoma intervenire sulle mine con diametro inferiore a 4-5 mm. Contro Tentredine (*Hoplocampa testudinea, Hoplocampa brevis*) : 200 g applicando a caduta petali.
VITE: 150-200 g contro Tignole (*Clysia ambiguella* e *Lobesia botrana*) intervenendo alla schiusura delle uova e bagnando bene tutta la vegetazione, basta in genere un trattamento per controllare efficacemente l'insetto. Contro *Scaphoideus titanus* 180-200 g applicando alla comparsa delle prime forme adulte. Contro Parthenolecanium corni 180-200 g mediante 1-2 interventi distanziati tra loro di 10-15 giorni nel momento di sgusciamento delle neanidi. Su Vite da tavola la dose massima applicabile è pari a 1.6 kg/ha per un massimo di 2 applicazioni per anno.
PESCO: 200 g contro Afidi, *Anarsia lineatella, Cydia molesta* e *Recurvaria nanella* eseguire un trattamento all'inizio dell'infestazione curando particolarmente di bagnare tutta la vegetazione ed in caso di reinfestazione ripetere l'intervento. Contro Tripidi (*Thrips major, Thrips meridionalis*) : 200 g che in caso di forti attacchi devono essere applicati mediante due trattamenti di cui uno in pre-fioritura ed il secondo alla caduta dei petali; in caso di infestazione normale applicare 200 g in un solo trattamento a caduta petali.
AGRUMI e OLIVO: g 150-180 contro Cocciniglie (*Pseudococcus citri* e *Saissetia oleae*) effettuare il trattamento in presenza del massimo numero delle neanidi : contro Tignola (*Prays oleaellus*) basta un trattamento in tempo debito per eliminare il parassita.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: 180 g contro Afidi, Altica, Cleono eseguire il trattamento alla prima comparsa degli insetti e ripeterlo eventualmente a distanza di 10-15 giorni.
ORTAGGI: (Pomodoro- Melanzana – Cucurbitacee – Lattuga – Peperoni – Fagiolo - Pisello): 200 g contro Afidi, Nottue, Cavolaie, Tripide della Lattuga eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione e ripeterlo in caso di reinfestazione. E' consigliabile l'aggiunta di un bagnante non ionico.
GAROFANO (in pieno campo)
200-250 g contro afidi e bega (*Tortrix pronubana*) iniziare i trattamenti all'inizio dell'infestazione e ripeterli in caso di reinfestazione.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Immettere acqua nel serbatoio della pompa pari ad un quarto-metà del volume necessario. Mettere in moto l'agitatore meccanico od idraulico (non usare agitatori ad aria). Aggiungere la quantità stabilita di DISTOR WP e, sempre con l'agitatore in moto, portare a volume. Continuare l'agitazione della miscela per alcuni minuti prima dell'inizio del trattamento.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è compatibile con prodotti fitosanitari aventi reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per le api. Evitare i trattamenti nel periodo della fioritura e quando le api frequentano l'area trattata. Si consiglia di tenere lontano dalle zone trattate animali domestici e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta su vite da tavola, 14 giorni prima su lattuga e 10 giorni prima su tutte le altre colture.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altra taglia autorizzata: kg 5

EDITOR® CONTACT

Antiperonosporico per vite e pomodoro - Granuli idrodispersibili

EDITOR CONTACT

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Famoxadone puro	g	6,25
Mancozeb puro	g	62,5
Coformulanti q. b. a	100	

Contiene: Esametilentetrammina

FRASI DI RISCHIO

Irritante per le vie respiratorie (R37) Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA.

Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S46). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione

Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano

telefono 800378337

Officina di Produzione

Du Pont de Nemours (France) S.A.S – Cernay, Francia

Registrazione N. 10610 del 27.10.2000 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: kg 0,4–0,8-1,6- 8 **PARTITA N.:**

NORME PRECAUZIONALI

Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FAMOXADONE 6.25% e MANCOZEB 62.5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: **FAMOXADONE:** Non sono noti casi d'intossicazione nell'uomo.

ATTENZIONE: Si segnala la potenziale pericolosità per soggetti talassemici e soggetti carenti di glucosio-6-fosfatodeidrogenasi. Terapia: Sintomatica.

MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino a collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia:** Sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche d'azione

EDITOR CONTACT è un fungicida organico di contatto per il controllo della peronospora (*Plasmopara viticola*) ed escoriosi (*Phomopsis viticola*) della vite e della peronospora del pomodoro (*Phytophtora infestans*).

EDITOR CONTACT contiene famoxadone, principio attivo inibitore della respirazione mitocondriale appartenente alla famiglia dei fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I) il quale svolge un'azione preventiva sulla germinazione delle spore. A questa famiglia appartengono altri antiperonosporici dei seguenti gruppi chimici: strobilurine, ossazolidinedioni, imidazolinoni.

DOSI ED EPOCA D'IMPIEGO:

VITE (da vino e da tavola): EDITOR CONTACT si applica per un massimo di 3 trattamenti per ciclo colturale, di cui non più di 2 consecutivi.

EDITOR CONTACT s'impiega alla dose di 80 g/hl (avendo cura di applicare comunque 800 g/ha in caso di volumi d'acqua inferiori a 10 hl per ettaro) durante le prime fasi del ciclo vegetativo della vite.

Contro l'escoriosi: effettuare 2 applicazioni alla ripresa vegetativa della vite, di cui la prima alla schiusura delle gemme e la seconda allo stadio delle due foglioline distese. Contro la peronospora: intervenire a partire dalla regola dei "tre dieci" o in base al rischio d'infezione indicato dagli organismi di controllo competenti per il territorio d'appartenenza. Effettuare le applicazioni ad intervalli di 7-8 giorni avendo cura di rispettare l'intervallo minore in caso di condizioni che comportino rischi di gravi infezioni e brevi periodi d'incubazione della peronospora.

POMODORO (da mensa e da industria):

EDITOR CONTACT si può applicare fino all'emissione del primo palco fiorale. Si applica in ragione del 50% dei trattamenti fungicidi (1 su 2), con un massimo di 3 interventi per ciclo colturale.

La dose d'impiego di EDITOR CONTACT su pomodoro è di 800 gr/ha e le applicazioni vanno effettuate ad intervalli di 7-8 giorni.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Si consiglia di non effettuare il trattamento in caso di pioggia imminente; in caso di precipitazioni superiori a 20 mm sopraggiunte entro due ore dall'applicazione si consiglia di ripetere il trattamento.

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di fenomeni di resistenza ai fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I) è consigliabile adottare i seguenti accorgimenti:

- I prodotti contenenti famoxadone devono essere applicati preventivamente
- Il numero totale consentito di applicazioni con formulati contenenti famoxadone per ogni ciclo colturale è di 3 su vite, 6 su pomodoro
- I suddetti numeri rappresentano anche il numero massimo consigliato di applicazioni con il complesso dei fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I) registrati contro la Peronospora della vite e la Fitoftora del pomodoro (strobilurine, ossazolidinedioni e imidazolinoni). Su pomodoro il limite si riduce a soli 3 trattamenti per ciclo colturale qualora si applichino fungicidi Qo-I non miscelati ad un altro antiperonosporico
- In un corretto programma di difesa, i trattamenti con antiperonosporici inibitori del chinolo (Qo-I) devono essere alternati con applicazioni di antiperonosporici a diverso meccanismo d'azione, utilizzati secondo le indicazioni di etichetta

Nei programmi di difesa che prevedono il numero massimo consentito di interventi con formulati a base di famoxadone, sono utilizzabili anche altri fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I), purchè registrati unicamente per la lotta a malattie fungine diverse da Peronospora e Fitoftora secondo le rispettive indicazioni di etichetta.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Dopo aver riempito per circa un terzo della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la quantità desiderata di EDITOR CONTACT direttamente sulla superficie dell'acqua, mantenendo costantemente l'agitatore in funzione.

Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Distaccare ed eliminare eventuali depositi visibili. Smontare e pulire separatamente filtri ed ugelli. Risciacquare di nuovo con acqua pulita ogni parte dell'attrezzatura. Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

COMPATIBILITA'

EDITOR CONTACT è fisicamente compatibile con tutti gli altri prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. Si consiglia di non usare EDITOR CONTACT in associazione con prodotti a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si consiglia di effettuare dei saggi preliminari nei casi di :

- applicazioni su nuove varietà
- applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta della vite.

Attenzione: adoperare ad una distanza non inferiore a 3 metri dai corpi idrici.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

CONTIENE MANCOZEB
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

EDITOR® PRO

Fungicida antiperonosporico per vite, pomodoro, patata, melone, zucchino e cetriolo - Granuli idrodispersibili

EDITOR PRO
COMPOSIZIONE

Famoxadone puro	g	22,5
Cymoxanil puro	g	30,0
Coformulanti q.b.	a	100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R22). Irritante per le vie respiratorie (R37). Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione (R48/22). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). in caso d'ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S46). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. – Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina diProduzione: Du Pont de Nemours (France) S.A.S Cernay, Francia

Registrazione N. 10611 del 27.10.2000 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 0,1–0,4–0,8–2-4 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Durante tutte le fasi di manipolazione ed applicazione del prodotto adoperare tuta e guanti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: cymoxanil 30% e famoxadone 22,5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi:
Cymoxanil: Derivato dell'urea.
Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, ronché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** sintomatica.
Famoxadone: non sono noti casi d'intossicazione nell'uomo.
ATTENZIONE: Si segnala la potenziale pericolosità per soggetti talassemici e soggetti carenti di glucosio-6-fosfatodeidrogenasi. Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO:
a) Inalazione: se inalato, portare immediatamente il paziente all'aria fresca. Se non respira, praticare la respirazione artificiale. Se la respirazione è difficoltosa, somministrare ossigeno. Consultare un medico.
b) Contatto con la pelle: in caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone. Gli indumenti contaminati dovranno essere lavati prima del loro riutilizzo.
c) Contatto con gli occhi: in caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Consultare un medico.
d) Ingestione: se il prodotto viene ingerito, non indurre il vomito. Somministrare immediatamente due bicchieri di acqua; non somministrare mai niente per via orale ad un paziente in stato di incoscienza. Consultare un medico.

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche d'azione
EDITOR PRO è un fungicida organico formulato in granuli idrodispersibili efficace nella lotta ai seguenti patogeni: peronospora della vite (*Plasmopara viticola*), peronospora del pomodoro e della patata (*Phythophtora infestans*), alternaria del pomodoro e della patata (*Alternaria licopersici e Alternaria solani*) e contro la pseudoperonospora delle cucurbitacee (*Pseudoperonospora cubensis*).
EDITOR PRO è dotato di attività di contatto sulle spore germinanti e di attività endoterapica sul micelio nei primissimi stadi di sviluppo.
EDITOR PRO contiene famoxadone, principio attivo inibitore della respirazione mitocondriale appartenente alla famiglia dei fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I) che svolge un'azione preventiva sulla germinazione delle spore. A questa famiglia appartengono altri antiperonosporici dei seguenti gruppi chimici: strobilurine, ossazolidinedioni, imidazolinoni.

DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO:
<u>VITE (da vino e da tavola)</u>: EDITOR PRO si può applicare per un massimo di 3 trattamenti per ciclo colturale, di cui massimo 2 consecutivi.
Contro la Peronospora EDITOR PRO si impiega alla dose di 40 g di prodotto ogni 100 litri di acqua (avendo cura di applicare comunque 400 g/ha in caso di volumi di acqua inferiori a 10 hl per ettaro). EDITOR PRO può essere applicato da inizio fioritura alla prechiusura del grappolo, secondo due criteri di intervento:
- <u>Lotta ad intervalli regolari</u>: eseguire il primo trattamento ad inizio fioritura e ripetere dopo 8-10 giorni per un massimo di 2 trattamenti consecutivi. Allo scopo di ottenere una protezione ottimale delle foglie, adottare l'intervallo più breve tra i trattamenti se le condizioni metereologiche comportano rischi di gravi infezioni e brevi periodi d'incubazione della peronospora.
- <u>Lotta guidata</u>: applicare EDITOR PRO prima degli eventi infettanti. L'adozione di questo criterio presuppone la disponibilità di un sistema di rilevazione delle infezioni peronosporiche mediante centraline microclimatiche aziendali o servizi comprensoriali di segnalazione delle infezioni e di previsioni meteorologiche. Anche in assenza d'infezioni peronosporiche, si consiglia di eseguire un trattamento quando la vite raggiunge ognuna delle seguenti fasi fenologiche critiche: inizio fioritura, allegagione, prechiusura grappolo.
<u>POMODORO (in pieno campo e in coltura protetta) e PATATA</u>:
Su pomodoro in pieno campo e su patata, EDITOR PRO si può applicare in ragione del 50% dei trattamenti fungicidi (1 su 2), con un massimo di 3 interventi consecutivi e di 6 interventi per ciclo colturale; su pomodoro in coltura protetta, EDITOR PRO si può applicare in ragione del 33% dei trattamenti fungicidi (1 su 3), evitando di fare 2 interventi consecutivi, per un massimo di 3 interventi per ciclo colturale.
Contro la Peronospora e l'Alternaria EDITOR PRO si impiega alla dose di 40 g di prodotto ogni 100 litri di acqua (avendo cura di applicare comunque 400 g/ha in caso di volumi di acqua inferiori a 10 hl per ettaro). Iniziare gli interventi prima dello sviluppo della malattia e proseguire ad intervalli di 7-10 giorni in funzione della gravità delle infezioni.
<u>MELONE, ZUCCHINO E CETRIOLO (in pieno campo e in coltura protetta)</u>:
EDITOR PRO si può applicare in ragione del 33% dei trattamenti fungicidi (1 su 3), evitando di fare 2 applicazioni consecutive, per un massimo di 3 interventi per ciclo colturale
Contro la Pseudoperonospora delle cucurbitacee EDITOR PRO si impiega alla dose di 50 g di prodotto ogni 100 litri di acqua (avendo cura di applicare comunque 500 g/ha in caso di volumi di acqua inferiori a 10 hl per ettaro). Iniziare gli interventi prima dello sviluppo della malattia e proseguire ad intervalli di 7-10 giorni in funzione della gravità delle infezioni.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di fenomeni di resistenza ai fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I) è consigliabile adottare i seguenti accorgimenti:
- In un corretto programma di difesa, i trattamenti con antiperonosporici inibitori del chinolo (Qo-I) devono essere alternati con applicazioni di antiperonosporici a diverso meccanismo d'azione
- I prodotti contenenti famoxadone devono essere applicati preventivamente
- Il numero totale di applicazioni consentite con formulati contenenti famoxadone per ogni ciclo colturale è di: 3 su vite, 6 su pomodoro e patata in pieno campo, 3 su pomodoro in coltura protetta, 3 su melone, zucchino e cetriolo.
- I suddetti numeri rappresentano anche il numero massimo consigliato di applicazioni con tutti i fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I) registrati contro la Peronospora della vite, la Fitoftora del pomodoro e la Pseudoperonospora delle cucurbitacee (strobilurine, ossazolidinedioni e imidazolinoni). Su pomodoro di pieno campo, il limite si riduce a soli 3 trattamenti per ciclo colturale qualora si applichino fungicidi Qo-I non miscelati ad un altro antiperonosporico.

Nei programmi di difesa che impiegano il massimo numero consentito di interventi con formulati a base di famoxadone sono utilizzabili in miscela estemporanea altri fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I) purchè registrati unicamente per la lotta a malattie fungine diverse dalle peronosporacee.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Dopo aver riempito per circa un terzo della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la quantità desiderata di EDITOR PRO direttamente sulla superficie dell'acqua, mantenendo costantemente l'agitatore in funzione.
Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Distaccare ed eliminare eventuali depositi visibili. Smontare e pulire separatamente filtri ed ugelli. Risciacquare di nuovo con acqua pulita ogni parte dell'attrezzatura. Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.
COMPATIBILITA': EDITOR PRO è fisicamente compatibile con tutti gli altri prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. Si consiglia di non usare EDITOR PRO in associazione con prodotti a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei casi di:
- applicazioni su nuove varietà
- applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari
- applicazioni in miscela con fertilizzanti fogliari e attivatori
INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta della vite, 14 giorni prima della raccolta della patata, 10 giorni prima della raccolta del pomodoro, del melone, dello zucchino e del cetriolo.
Attenzione: adoperare ad una distanza non inferiore a 3 metri dai corpi idrici.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

CONTIENE CIMOXANIL -PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

EKORAM® 40 DF

Fungicida a base di idrossido di rame
Granuli idrodispersibili

EKORAM® 40 DF

Composizione

100 gr di prodotto contengono:
Rame metallo.g 40
(sotto forma di idrossido)
Coformulanti q.b.a 100

FRASI DI RISCHIO:

Nocivo per ingestione (R22). Rischio di gravi lesioni oculari (R41). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA:.

Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia (S36/37/39). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione

Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di produzione:

E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) - 12701 Almeda Road, Houston Texas (USA)

Officine di solo confezionamento:

Bayer CropScience S.r.l. – Via delle Industrie, 9 Filago (BG)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. – Z.I. Les Attignours, La Chambre, Francia
Chemia S.p.A. – S.S. 255 km 46, S. Agostino (FE)
Lifa S.r.l. – Via Colombo n.7/7°, Vigonovo (VE)
Lifa S.r.l. – Via Piave, Isola Vicentina (VI)
Scam S.r.l. – Str. Bellaria 164, S. Maria di Mugnano (MO)

Distribuito da : Agrimport S.r.l. – Via Piani 1 - Bolzano

Registrazione n. 9920 del 26.01.1999 del Ministero della Sanità

Contenuto netto kg 1- 5 – 10 – 20 - 25 Partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno eapatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione dei metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE: EKORAM® 40 DF è un fungicida a base di Rame idrossido in granuli idrodispersibili. Tale formulazione garantisce un'ottima fluidità del prodotto, nonché elevata adesività e persistenza sulle colture trattate.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Introdurre i granuli nel serbatoio dell'irroratrice, parzialmente riempita d'acqua, e mescolare sino a completa dissoluzione del preparato. Le dosi indicate si riferiscono a 100 lt d'acqua e per trattamenti con pompe a volume normale.

Melo, Pero	contro Ticchiolatura e Cancro nei trattamenti autunno-invernali	g 500-1000
	nei trattamenti primaverili	g 200-300
Drupacee e mandorlo	contro Sclerotinia, Corineo, Bolla nei trattamenti autunno-invernali	g 500-1000
Vite	contro Peronospora, Black-rot, Antracnosi	g 200-300
Agrumi	contro Fumaggine, Mal secco, Allupatura, Gommosi del colletto, Batteriosi	g 200-300
Orticole	(carciofo, cardo, carota, cavolo, cetriolo, cicoria, cipolla, fagiolo, lattuga, melanzana, melone, patata pomodoro, peperone, pisello, rapa, ravanello, sedano, spinacio, prezzemolo, zucca): contro Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Cercospora, Batteriosi, Septoriosi	g 200-300
Olivo	contro Fumaggine, Occhio di Pavone	g 200-300
Barbabietola da zucchero	contro Peronospora, Cercospora	kg 3-3,5/ha
Fragola	contro Vaiolatura	g 200-300
Floreali in pieno campo	contro Ruggine, Peronospora	gr 200-300
Riso	contro Alghe verdi, intervenire alla comparsa dell'attacco con un quantitativo di soluzione sufficiente a coprire l'intera superficie	kg 2,80-3,65/ha

COMPATIBILITA': EKORAM® 40 DF non è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina e con Tiram.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Su varietà di Melo (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard), su Drupacee sensibili ai prodotti cuprici, il prodotto può essere fitotossico, se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Non trattare durante la fioritura per l'azione caustica sui fiori.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere I trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: **Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.** Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato Agrimport

ENDAMON

Insetticida selettivo per la lotta contro i principali insetti nocivi agli agrumi, vite, pomacee, pesco, alcune colture orticole ed alcune colture industriali – Polvere bagnabile

ENDAMON
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Endosulfan puro g 35
Coformulanti q. b. a 100

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Tossico a contatto con la pelle e per ingestione (R24/25). Irritante per gli occhi (R36). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini (S1/2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13) Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego (S20/21). Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati (S27). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S45). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.. - Via Siemens 12, Bolzano

Registrazione N. 0219 del 01.12.1971 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 PARTITA N.:

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 03.08.1968 n. 1255.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare le polveri. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni. **Terapia:** sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni. **Controindicazioni:** per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
ENDAMON agisce per contatto e per ingestione contro gli insetti nocivi alle colture agricole.
Fra i parassiti sensibili al prodotto ricordiamo: afidi, psille, cicadelle, minatrici, maggiolino, tentredini, antonomo del melo e del pero, afide lanigero, eriofide del nocciolo, dorifora della patata, altiche, cleono della barbabietola, tignola del melo.
ENDAMON svolge pure una certa azione secondaria contro il Ragno rosso.
Dosi - Modalita' d'impiego
Agrumi: dose massima pari a 3 kg/ha per un massimo di 2 applicazioni;
Pesco : dose massima pari a 2.25 kg/ha per un massimo di 3 applicazioni;
Vite : dose massima pari a 3 kg/ha per un massimo di 2 applicazioni.
Pomacee, mandorlo, nocciolo, pomodoro, melone, cocomero: contro afidi, psilla, larve di lepidotteri g 150-200 per 100 litri di acqua.
Colture industriali : kg 1,2 - ´,5 di ENDAMON per ettaro su:
Patata: contro dorifora.
Barbabietola da zucchero: contro altiche e cleono.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

COMPATIBILITA'
ENDAMON e' miscibile in via di massima con i piu' comuni fitofarmaci fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese). La miscela con i prodotti emulsionabili non e' consigliabile.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora di verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
ENDAMON e' tossico per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta su vite, e 25 giorni prima della raccolta sulle altre colture.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Altre Officine Autorizzate:
Baslini S.p.A. - P.zza E. Baslini 1, Treviglio (BG),
Chemia S.p.A. - Stabilimento di Sant'Agostino (FE), S.S. 255 km 46
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via Torricelli 2, Cotignola (RA)
Isagro S.p.A. - Via Nettunense km 23,400 Aprilia (LT)
Makhteshim Chemical Works Ltd - Beer-Sheva (Israele)
Altre taglie autorizzate: kg 5 - 10 - 20

EQUATION® CONTACT

Antiperonosporico per vite e pomodoro - Granuli idrodispersibili

EQUATION CONTACT
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Famoxadone puro	g	6,25
Mancozeb puro	g	62,5
Coformulanti q. b. a		100

Contiene: Esametilentetrammina

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie (R37) Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S46). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S – Cernay, Francia
Registrazione N. 10120 del 02.09.1999 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 0,4–0,8-1,6- 8 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FAMOXADONE 6.25% e MANCOZEB 62.5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: **FAMOXADONE:** Non sono noti casi d'intossicazione nell'uomo.
ATTENZIONE: Si segnala la potenziale pericolosità per soggetti talassemici e soggetti carenti di glucosio-6-fosfatodeidrogenasi. Terapia: Sintomatica.
MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino a collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia:** Sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche d'azione
EQUATION CONTACT è un fungicida organico di contatto per il controllo della peronospora (*Plasmopara viticola*) ed escoriosi (*Phomopsis viticola*) della vite e della peronospora del pomodoro (*Phytophtora infestans*).
EQUATION CONTACT contiene famoxadone, principio attivo inibitore della respirazione mitocondriale appartenente alla famiglia dei fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I) il quale svolge un'azione preventiva sulla germinazione delle spore. A questa famiglia appartengono altri antiperonosporici dei seguenti gruppi chimici: strobilurine, ossazolidinedioni, imidazolinoni.

DOSI ED EPOCA D'IMPIEGO:
VITE (da vino e da tavola): EQUATION CONTACT si applica per un massimo di 3 trattamenti per ciclo colturale, di cui non più di 2 consecutivi.
EQUATION CONTACT s'impiega alla dose di 80 g/hl (avendo cura di applicare comunque 800 g/ha in caso di volumi d'acqua inferiori a 10 hl per ettaro) durante le prime fasi del ciclo vegetativo della vite.
Contro l'escoriosi: effettuare 2 applicazioni alla ripresa vegetativa della vite, di cui la prima alla schiusura delle gemme e la seconda allo stadio delle due foglioline distese. Contro la peronospora: intervenire a partire dalla regola dei "tre dieci" o in base al rischio d'infezione indicato dagli organismi di controllo competenti per il territorio d'appartenenza. Effettuare le applicazioni ad intervalli di 7-8 giorni avendo cura di rispettare l'intervallo minore in caso di condizioni che comportino rischi di gravi infezioni e brevi periodi d'incubazione della peronospora.
POMODORO (da mensa e da industria):
EQUATION CONTACT si può applicare fino all'emissione del primo palco fiorale. Si applica in ragione del 50% dei trattamenti fungicidi (1 su 2), con un massimo di 3 interventi per ciclo colturale.
La dose d'impiego di EQUATION CONTACT su pomodoro è di 800 gr/ha e le applicazioni vanno effettuate ad intervalli di 7-8 giorni.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Si consiglia di non effettuare il trattamento in caso di pioggia imminente; in caso di precipitazioni superiori a 20 mm sopraggiunte entro due ore dall'applicazione si consiglia di ripetere il trattamento.

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di fenomeni di resistenza ai fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I) è consigliabile adottare i seguenti accorgimenti:
- I prodotti contenenti famoxadone devono essere applicati preventivamente
- Il numero totale consentito di applicazioni con formulati contenenti famoxadone per ogni ciclo colturale è di 3 su vite, 6 su pomodoro
- I suddetti numeri rappresentano anche il numero massimo consigliato di applicazioni con il complesso dei fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I) registrati contro la Peronospora della vite e la Fitoftora del pomodoro (strobilurine, ossazolidinedioni e imidazolinoni). Su pomodoro il limite si riduce a soli 3 trattamenti per ciclo colturale qualora si applichino fungicidi Qo-I non miscelati ad un altro antiperonosporico
- In un corretto programma di difesa, i trattamenti con antiperonosporici inibitori del chinolo (Qo-I) devono essere alternati con applicazioni di antiperonosporici a diverso meccanismo d'azione, utilizzati secondo le indicazioni di etichetta

Nei programmi di difesa che prevedono il numero massimo consentito di interventi con formulati a base di famoxadone, sono utilizzabili anche altri fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I), purché registrati unicamente per la lotta a malattie fungine diverse da Peronospora e Fitoftora secondo le rispettive indicazioni di etichetta.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Dopo aver riempito per circa un terzo della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la quantità desiderata di EQUATION CONTACT direttamente sulla superficie dell'acqua, mantenendo costantemente l'agitatore in funzione.
Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Distaccare ed eliminare eventuali depositi visibili. Smontare e pulire separatamente filtri ed ugelli. Risciacquare di nuovo con acqua pulita ogni parte dell'attrezzatura. Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

COMPATIBILITA'
EQUATION CONTACT è fisicamente compatibile con tutti gli altri prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. Si consiglia di non usare EQUATION CONTACT in associazione con prodotti a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si consiglia di effettuare dei saggi preliminari nei casi di :
- applicazioni su nuove varietà
- applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta della vite.
Attenzione: adoperare ad una distanza non inferiore a 3 metri dai corpi idrici.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

CONTIENE MANCOZEB
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

EQUATION® PRO

Fungicida antiperonosporico per vite, pomodoro, patata, melone, zucchino e cetriolo - Granuli idrodispersibili

EQUATION PRO
COMPOSIZIONE

Famoxadone puro	g	22,5
Cymoxanil puro	g	30,0
Coformulanti q.b.	a	100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R22). Irritante per le vie respiratorie (R37). Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione (R48/22). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). in caso d'ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S46). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. – Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina diProduzione: Du Pont de Nemours (France) S.A.S Cernay, Francia
Registrazione N. 10119 del 02.09.1999 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 0,1–0,4–0,8–2–4 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Durante tutte le fasi di manipolazione ed applicazione del prodotto adoperare tuta e guanti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: cymoxanil 30% e famoxadone 22,5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi:
Cymoxanil: Derivato dell'urea.
Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** sintomatica.
Famoxadone: non sono noti casi d'intossicazione nell'uomo.
ATTENZIONE: **Si segnala la potenziale pericolosità per soggetti talassemici e soggetti carenti di glucosio-6-fosfatodeidrogenasi. Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO:
a) Inalazione: se inalato, portare immediatamente il paziente all'aria fresca. Se non respira, praticare la respirazione artificiale. Se la respirazione è difficoltosa, somministrare ossigeno. Consultare un medico.
b) Contatto con la pelle: in caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone. Gli indumenti contaminati dovranno essere lavati prima del loro riutilizzo.
c) Contatto con gli occhi: in caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Consultare un medico.
d) Ingestione: se il prodotto viene ingerito, non indurre il vomito. Somministrare immediatamente due bicchieri di acqua; non somministrare mai niente per via orale ad un paziente in stato di incoscienza. Consultare un medico.

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche d'azione
EQUATION PRO è un fungicida organico formulato in granuli idrodispersibili efficace nella lotta ai seguenti patogeni: peronospora della vite (*Plasmopara viticola*), peronospora del pomodoro e della patata (*Phythophtora infestans*), alternaria del pomodoro e della patata (*Alternaria licopersici e Alternaria solani*) e contro la pseudoperonospora delle cucurbitacee (*Pseudoperonospora cubensis*).
EQUATION PRO è dotato di attività di contatto sulle spore germinanti e di attività endoterapica sul micelio nei primissimi stadi di sviluppo.
EQUATION PRO contiene famoxadone, principio attivo inibitore della respirazione mitocondriale appartenente alla famiglia dei fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I) che svolge un'azione preventiva sulla germinazione delle spore. A questa famiglia appartengono altri antiperonosporici dei seguenti gruppi chimici: strobilurine, ossazolidinedioni, imidazolinoni.

DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO:
VITE (da vino e da tavola): EQUATION PRO si può applicare per un massimo di 3 trattamenti per ciclo colturale, di cui massimo 2 consecutivi.
Contro la Peronospora EQUATION PRO si impiega alla dose di 40 g di prodotto ogni 100 litri di acqua (avendo cura di applicare comunque 400 g/ha in caso di volumi di acqua inferiori a 10 hl per ettaro). EQUATION PRO può essere applicato da inizio fioritura alla prechiusura del grappolo, secondo due criteri di intervento:
- Lotta ad intervalli regolari: eseguire il primo trattamento ad inizio fioritura e ripetere dopo 8-10 giorni per un massimo di 2 trattamenti consecutivi. Allo scopo di ottenere una protezione ottimale delle foglie, adottare l'intervallo più breve tra i trattamenti se le condizioni metereologiche comportano rischi di gravi infezioni e brevi periodi d'incubazione della peronospora.
- Lotta guidata: applicare EQUATION PRO prima degli eventi infettanti. L'adozione di questo criterio presuppone la disponibilità di un sistema di rilevazione delle infezioni peronosporiche mediante centraline microclimatiche aziendali o servizi comprensoriali di segnalazione delle infezioni e di previsioni meteorologiche. Anche in assenza d'infezioni peronosporiche, si consiglia di eseguire un trattamento quando la vite raggiunge ognuna delle seguenti fasi fenologiche critiche: inizio fioritura, allegagione, prechiusura grappolo.

POMODORO (in pieno campo e in coltura protetta) e PATATA:
Su pomodoro in pieno campo e su patata, EQUATION PRO si può applicare in ragione del 50% dei trattamenti fungicidi (1 su 2), con un massimo di 3 interventi consecutivi e di 6 interventi per ciclo colturale; su pomodoro in coltura protetta, EQUATION PRO si può applicare in ragione del 33% dei trattamenti fungicidi (1 su 3), evitando di fare 2 interventi consecutivi, per un massimo di 3 interventi per ciclo colturale.
Contro la Peronospora e l'Alternaria EQUATION PRO si impiega alla dose di 40 g di prodotto ogni 100 litri di acqua (avendo cura di applicare comunque 400 g/ha in caso di volumi di acqua inferiori a 10 hl per ettaro). Iniziare gli interventi prima dello sviluppo della malattia e proseguire ad intervalli di 7-10 giorni in funzione della gravità delle infezioni.

MELONE, ZUCCHINO E CETRIOLO (in pieno campo e in coltura protetta):
EQUATION PRO si può applicare in ragione del 33% dei trattamenti fungicidi (1 su 3), evitando di fare 2 applicazioni consecutive, per un massimo di 3 interventi per ciclo colturale
Contro la Pseudoperonospora delle cucurbitacee EQUATION PRO si impiega alla dose di 50 g di prodotto ogni 100 litri di acqua (avendo cura di applicare comunque 500 g/ha in caso di volumi di acqua inferiori a 10 hl per ettaro). Iniziare gli interventi prima dello sviluppo della malattia e proseguire ad intervalli di 7-10 giorni in funzione della gravità delle infezioni.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di fenomeni di resistenza ai fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I) è consigliabile adottare i seguenti accorgimenti:
- In un corretto programma di difesa, i trattamenti con antiperonosporici inibitori del chinolo (Qo-I) devono essere alternati con applicazioni di antiperonosporici a diverso meccanismo d'azione
- I prodotti contenenti famoxadone devono essere applicati preventivamente
- Il numero totale di applicazioni consentite con formulati contenenti famoxadone per ogni ciclo colturale è di: 3 su vite, 6 su pomodoro e patata in pieno campo, 3 su pomodoro in coltura protetta, 3 su melone, zucchino e cetriolo.
- I suddetti numeri rappresentano anche il numero massimo consigliato di applicazioni con tutti i fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I) registrati contro la Peronospora della vite, la Fitoftora del pomodoro e la Pseudoperonospora delle cucurbitacee (strobilurine, ossazolidinedioni e imidazolinoni). Su pomodoro di pieno campo, il limite si riduce a soli 3 trattamenti per ciclo colturale qualora si applichino fungicidi Qo-I non miscelati ad un altro antiperonosporico

Nei programmi di difesa che impiegano il massimo numero consentito di interventi con formulati a base di famoxadone sono utilizzabili in miscela estemporanea altri fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I) purchè registrati unicamente per la lotta a malattie fungine diverse dalle peronosporacee.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Dopo aver riempito per circa un terzo della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la quantità desiderata di EQUATION PRO direttamente sulla superficie dell'acqua, mantenendo costantemente l'agitatore in funzione.
Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Distaccare ed eliminare eventuali depositi visibili. Smontare e pulire separatamente filtri ed ugelli. Risciacquare di nuovo con acqua pulita ogni parte dell'attrezzatura. Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

COMPATIBILITA': EQUATION PRO è fisicamente compatibile con tutti gli altri prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. Si consiglia di non usare EQUATION PRO in associazione con prodotti a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei casi di:
- applicazioni su nuove varietà
- applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari
- applicazioni in miscela con fertilizzanti fogliari e attivatori

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta della vite, 14 giorni prima della raccolta della patata, 10 giorni prima della raccolta del pomodoro, del melone, dello zucchino e del cetriolo.
Attenzione: adoperare ad una distanza non inferiore a 3 metri dai corpi idrici.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

CONTIENE CIMOXANIL -PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

EQUATION® R

Fungicida antiperonosporico per vite in granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Famoxadone puro g 2
Rame (sotto forma di solfato) g 20
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione (R20). Rischio di gravi lesioni oculari (R41). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Proteggersi gli occhi/la faccia (S39). In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta (46). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Cerexagri S.A. – Mourenx, Francia
Registrazione n. 11342 del 22.05.2002 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: kg 1 – 2.5 –5 –10 –20 Partita N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Durante tutte le fasi di manipolazione ed applicazione del prodotto adoperare tuta e guanti. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
EQUATION R è una associazione delle seguenti sostanze attive: Rame metallo 20%, e Famoxadone 2%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
Rame metallo: Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia**: sintomatica
Famoxadone: non sono noti casi d'intossicazione nell'uomo. **Terapia**: sintomatica
Attenzione: si segnala la potenziale pericolosità per soggetti talassemici e soggetti carenti di glucosio-6-fosfoidrogenasi.
INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO
a) Inalazione: se inalato, portare immediatamente il paziente all'aria fresca. Se non respira, praticare la respirazione artificiale. Se la respirazione è difficoltosa, somministrare ossigeno. Consultare un medico. b) Contatto con la pelle: in caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone. Gli indumenti contaminati dovranno essere lavati prima del loro riutilizzo. c) contatto con gli occhi: in caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Consultare un medico. d) Ingestione: se il prodotto viene ingerito, non incurre il vomito. Somministrare immediatamente due bicchieri d'acqua; non somministrare mai niente per via orale ad un paziente in stato di incoscienza. Consultare un medico

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITÀ D'IMPIEGO
EQUATION R è un fungicida organico formulato in granuli idrodispersibili efficace per la protezione di foglie e grappoli dalla peronospora della vite (*Plasmopara viticola*). Il prodotto è dotato di attività di contatto sulle spore germinanti di *Plasmopara viticola*. Si raccomanda di seguire sempre un criterio di intervento preventivo rispetto al verificarsi delle infezioni peronosporiche.
EQUATION R contiene il rame nella forma di Brocantite associata al gesso. Il rame completa e potenzia l'attività di Famoxadone.
EQUATION R contiene famoxadone, principio attivo inibitore della respirazione mitocondriale appartenente alla famiglia dei fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I), il quale svolge un'azione preventiva sulla germinazione delle spore. A questa famiglia appartengono altri antiperonosporici dei seguenti gruppi chimici: strobilurine, ossazolidinedioni, imidazolinoni.

DOSE ED EPOCA D'IMPIEGO
VITE (da vino e da tavola): EQUATION R **si applica per un massimo di 3 trattamenti per ciclo colturale, di cui massimo 2 consecutivi.** Contro la Peronospora EQUATION R si impiega alla dose di 250 g ogni 100 litri di acqua (avendo cura di applicare comunque 2,5 kg/ha in caso di volumi di acqua inferiori a 10hl per ettaro). EQUATION R può essere applicato dopo l'allegagione, secondo due criteri d'intervento:
lotta ad intervalli regolari: intervenire ogni 7-8 giorni nel periodo che va dall'allegagione fino a 28 gg prima della vendemmia. Adottare l'intervallo più breve nelle condizioni più favorevoli allo sviluppo della malattia.
lotta guidata: applicare EQUATION R prima degli eventi infettanti. L'adozione di questo criterio presuppone la disponibilità di un sistema di rilevazione delle infezioni peronosporiche mediante centraline microclimatiche aziendali o servizi comprensoriali di segnalazione delle infezioni e di previsioni meteorologiche. Anche in assenza d'infezioni peronosporiche, si consiglia di eseguire un trattamento quando la vite raggiunge la fase fenologica critica di pre-chiusura grappolo.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Si consiglia di non effettuare il trattamento in caso di pioggia imminente; in caso di precipitazioni superiori a 20 mm sopraggiunte entro due ore dal l'applicazione si consiglia di ripetere il trattamento.

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di fenomeni di resistenza ai fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I) è consigliabile adottare i seguenti accorgimenti:
- I prodotti contenenti famoxadone devono essere applicati preventivamente
- Il numero totale consentito di applicazioni con formulati contenenti famoxadone su vite è di 3 per ogni ciclo colturale
- Il numero totale di applicazion consigliate con fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I) registrati contro la peronospora della vite (strobilurine, ossazolidinedioni e imidazolinoni) è di 3 per ciclo colturale
- In un corretto programma di difesa, i trattamenti con antiperonosporici inibitori del chinolo (Qo-I) devono essere alternati con applicazioni di antiperonosporici a diverso meccanismo d'azione, utilizzati secondo le indicazioni di etichetta
- Nei programmi di difesa che prevedono 3 interventi con formulati contenenti famoxadone sono utilizzabili anche altri fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I), purchè registrati unicamente per la lotta all'oidio della vite secondo le rispettive indicazioni di etichetta

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Dopo aver riempito per 2/3 della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la quantità desiderata di EQUATION R direttamente sulla superficie dell'acqua, mantenendo costantemente l'agitatore in funzione, quindi completare il riempimento. In caso di miscela estemporanea con altri prodotti, aggiungere EQUATION R solo dopo avere disciolto gli altri prodotti. Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice

COMPATIBILITA'
EQUATION R è fisicamente compatibile con tutti gli altri prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. Si consiglia di non usare EQUATION R in associazione con prodotti a reazione alcalina. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' Il prodotto può risultare fitotossico per gli impieghi e le colture non indicati in etichetta. Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei casi di applicazioni su nuove varietà o di miscela con altri prodotti fitosanitari

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: il formulato contiene una sostanza molto tossica per gli organismi acquatici. Adoperare ad una distanza non inferiore a 3 metri dai corpi idrici.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

EQUATION® SYSTEM

Fungicida antiperonosporico per vite da vino e da tavola
Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE:

Famoxadone puro	g	4
Fosetil Alluminio puro	g	60
Coformulanti q.b.a	g	100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie (R37). Tossico per gli organismo acquatici (R51) Puo' provocare alungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S46). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.
Via Portaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione n. 10969 del 25.06.2001 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 2.5 Partita N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: famoxadone 4% e fosetil alluminio 60%, le quali separatamente danno i seguenti sintomi.
Famoxadone: non sono noti casi d'intossicazione nell'uomo.
Attenzione: si segnala la potenziale pericolosità per soggetti talassemici e soggetti carenti di glucosio-6-fosfatodeidrogenasi.
Fosetil Alluminio: non sono noti casi d'intossicazione nell'uomo. **Terapia**: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO:
a)Inalazione: se inalato, portare immediatamente il paziente all'aria fresca. Se non respira, praticare la respirazione artificiale. Se la respirazione è difficoltosa, somministrare ossigeno. Consultare un medico.
b)Contatto con la pelle: in caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone. Gli indumenti contaminati dovranno essere lavati prima del loro riutilizzo.
c)Contatto con gli occhi: in caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Consultare un medico.
d)Ingestione: se il prodotto viene ingerito, non indurre il vomito. Somministrare immediatamente due bicchieri di acqua; non somministrare mai niente per via orale ad un paziente in stato di incoscienza. Consultare un medico.

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche di azione
EQUATION SYSTEM è un fungicida organico formulato in granuli idrodispersibili efficace contro la peronospora della vite (*Plasmopara viticola*).
EQUATION SYSTEM è dotato di attività di contatto e di attività sistemica ascendente e discendente. EQUATION SYSTEM contiene famoxadone, principio attivo inibitore della respirazione mitocondriale appartenente alla famiglia dei fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I) il quale svolge un'azione preventiva sulla germinazione delle spore. A questa famiglia appartengono altri antiperonosporici dei seguenti gruppi chimici: strobilurine, ossazolidinedioni, imidazolinoni.

DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO:
VITE (da vino e da tavola): EQUATION SYSTEM si applica per un massimo di 3 trattamenti per ciclo colturale, anche consecutivi. Contro la Peronospora, EQUATION SYSTEM s'impiega alla dose di 250 g di prodotto ogni 100 litri di acqua (avendo cura di applicare comunque 2.5 kg/ha in caso di volumi di acqua inferiori a 10 hl per ettaro).
EQUATION SYSTEM può essere applicato tra la differenziazione dei grappolini e la chiusura del grappolo secondo due criteri di intervento:
<u>Lotta ad intervalli regolari</u>:
Intervenire ogni 10-12 giorni nelle fasi fenologiche comprese tra la differenziazione dei grappolini e la chiusura del grappolo. Adottare l'intervallo più breve tra i trattamenti se le condizioni metereologiche comportano rischi di gravi infezioni e brevi periodi di incubazione della peronospora.
<u>Lotta guidata</u>:
Applicare EQUATION SYSTEM prima degli eventi infettanti. L'adozione di questo criterio presuppone la disponibilità un sistema di rilevazione delle infezioni peronosporiche mediante centraline microclimatiche in azienda o servizi comprensoriali di segnalazione delle infezioni e di previsioni meteorologiche. Anche in assenza di infezioni peronosporiche, si consiglia di eseguire un trattamento quando la vite raggiunge ognuna delle seguenti fasi fenologiche critiche: differenziazione dei grappolini, inizio fioritura, allegagione, prechiusura grappolo.

AVVERTENZE AGRONOMICHE :
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di fenomeni di resistenza ai fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I) è consigliabile adottare i seguenti accorgimenti:
- I prodotti contenenti famoxadone devono essere applicati preventivamente
- Il numero totale consentito di applicazioni con formulati contenenti famoxadone su vite è di 3 per ciclo colturale
- Il numero totale di applicazioni consigliate con fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I) registrati contro la peronospora della vite (strobilurine, ossazolidinedioni e imidazolinoni) è di 3 per ciclo colturale
- In un corretto programma di difesa, i trattamenti con antiperonosporici inibitori del chinolo (Qo-I) devono essere alternati con applicazioni di antiperonosporici a diverso meccanismo d'azione, utilizzati secondo le indicazioni di etichetta
- Nei programmi di difesa che prevedono 3 interventi con formulati contenenti famoxadone, sono utilizzabili altri fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I), purché registrati unicamente per la lotta all'oidio della vite, secondo le rispettive indicazioni di etichetta.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Dopo aver riempito per circa un terzo della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la quantità desiderata ci EQUATION SYSTEM direttamente sulla superficie dell'acqua, mantenendo costantemente l'agitatore in funzione.
Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Distaccare ed eliminare eventuali depositi visibili. Smontare e pulire separatamente filtri ed ugelli. Risciacquare di nuovo con acqua pulita ogni parte dell'attrezzatura. Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

COMPATIBILITA'
EQUATION SYSTEM è fisicamente compatibile con tutti gli altri prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. Si consiglia di non usare EQUATION SYSTEM in associazione con prodotti a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei casi di:
- applicazioni su nuove varietà
- applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta della vite.

Attenzione: adoperare ad una distanza non inferiore a 10 metri dai corpi idrici.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Altre taglie autorizzate: kg 0,5 – kg 1 – kg 5 – kg 10 – kg 12,5

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

ERBIL

Erbicida selettivo per la Barbabietola da Zucchero
Microgranuli Idrodispersibili

Composizione:
Metamitron puro g 70
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R22) Altamente tossico per gli organismi acquatici (R50)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione :
Du pont de Nemours (France) SAS – Cernay, Francia

Registrazione n. 9735 del 03.09.1998 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: kg 0,5 **Partita n.:**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CAMPI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Erbil è un erbicida che agisce per assorbimento radicale e fogliare, in formulazione di microgranuli idrodispersibili. Viene applicato per combattere le seguenti malerbe: *Alopecurus myosuroides* (erba codina), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Anagallis arvensis* (centocchio dei campi), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa pastore), *Chenopodium vulvaria* (Brinaiola), *Chenopodium album* (Farinello comune), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Matricaria spp.* (Camomilla), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Poa annua* (Fienarola annua), *Polygonum spp.* (Poligono), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Veronica spp.* (Veronica), *Diplotaxis erucoides* (Ruchetta violacea), *Stachys annua* (Stregona annuale).
Barbabietola da zucchero
Intervento di:
– pre-semina anticipata (autunno-inverno): 5-7 kg/ha in 600 litri d'acqua con terreno perfettamente preparato e senza infestanti presenti. Impiegare la dose maggiore nei terreni pesanti.
– pre-semina e pre-emergenza: 3 - 5 kg/ha in 600 litri di acqua con interramento del prodotto e dose maggiore in terreni tendenzialmente pesanti.
post-emergenza: 1 - 2 kg/ha miscelato con il p.a. Fenmedifam in 400 litri di acqua e trattando con piantine di bietole nello stadio delle 2-4 foglie vere. Nel caso si debba intervenire in trattamenti più tardivi impiegare 2-2,5 kg/ha di prodotto in miscela con 2-4 kg/ha di Fenmedifam e con l'aggiunta di 0,5 litri/ha di olio bianco.
Attenzione:
si raccomanda di effettuare il trattamento in assenza di vento e con terreno ben lavorato e sminuzzato.

COMPATIBILITÀ
Si può miscelare con prodotti diserbanti consigliati.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO-NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Altre officine autorizzate
Agan Chemical Manufactures – Ashdod, Israele
STI Solfotecnica Italiana Spa - Cotignola (RA)
Dr. Schirm A.G. - Lubecca (Germania)
A.D.I.C.A. Srl – Faenza (RA)
A.D.I.C.A. Srl – Nera Montoro (Terni)

Altre taglie autorizzate: kg 1 - 5 – 10

ETIFOS® M

Insetticida liquido per la difesa di alcuni fruttiferi, della vite, della fragola, di alcune colture orticole, del mais, del pioppo ed alcune colture ornamentali

ETIFOS M
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Clorpirifos metile puro g 22,1
(=225 g/l)
Coformulanti q. b. a 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari (R41). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53). L'esposizione ripetuta puo' provocare secchezza e screpolature della pelle (R66). L'inalazione dei vapori puo' provocare sonnolenza e vertigini (R67).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26). Proteggersi gli occhi/la faccia (S39). In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta) (S46). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Siemens 12, Bolzano

Registrazione N. 4056 del 12.11.1980 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: Litri 1 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare i vapori. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
ETIFOS M e' un insetticida fosforganico, formulato come "liquido emulsionabile". Esso agisce per contatto, per ingestione ed in parte per azione di vapore. ETIFOS M e' particolarmente indicato per combattere le larve di Lepidotteri e neanidi di Cocciniglie. Inoltre ETIFOS M esplica un'azione frenante allo sviluppo delle popolaizoni di Acari Tetranichidi, tali come Panonychus, Tetranychus, Eotetranychus.
Dosi - Epoche - Modalità d'impiego
Dosi per 100 litri d'acqua:
Melo, Pero e Pesco: - ml 200 contro Lepidotteri (Capua, Cacoecia, Pandemis, Eulia), Tignola orientale (Laspeyresia), Anarsia (Anarsia);
- ml 200-250 contro neanidi di Cocciniglie (Aspidiotus ed altre).
Arancio, Limone, Mandarino, Clementino: - ml 250 contro neanidi di Cocciniglie (Saissetia, Ceroplastes, Pseudococcus).
Viticoltura: ml 100 - 150 contro Tignole (Polycrosis, Clysia).
Il prodotto potrebbe risultare fitotossico per alcune varieta' sensibili; si raccomandano pertanto saggi zonali e varietali.
Fragola : 300 – 400 ml/hl contro Frankliniella o., nottue ed afidi.
Orticoltura: pomodoro, peperone, melanzana, pisello, ravanello, patata: - litri 1,5 - 2 per ettaro contro le Nottue (Agrotis, Mamestra edaltre),Cavolaia(Pieris),Macaone (Papillo), Dorifora (Leptinotarsa).
Mais: ml 300 contro Nottue (Agrotis), Piralide (Ostrinia) ed Elateridi.
Pioppo: ml 400 - 500 contro Saperda e Criptorrinco.
Ornamentali (garofano, crisantemo, azalea, ciclamino):200 ml/hl contro Bega, tortricidi, cocciniglie, Oziorrinco).

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

COMPATIBILITA'
ETIFOS M non e' miscibile con i vari formulati fungicidi, acaricidi ed insetticidi a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Avvertenza: non impiegare il prodotto sulle varieta' di melo Stayman Red, Stayman Winesap, Gloster, Gallia Beauty.
In post-fioritura sul melo non eseguire piu' di due trattamenti. Non effettuare trattamenti su arancio nei mesi compresi tra gennaio ed aprile.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONTIENE CLORPIRIFOS METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altre taglie autorizzate: litri 5 - 10

EXPRESS® COMPRESSE

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo

EXPRESS COMPRESSE
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tribenuron metile p.a. puro g 50
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r. l. - Via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione n. 8368 del 07.08.1993 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 75
(contiene 10 compresse da g 7,5) **PARTITA N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea. **Terapia**: sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

EPOCA DI IMPIEGO
In post-emergenza: del frumento tenero e duro e dell'orzo.
Il principio attivo contenuto nelle compresse viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento, EXPRESS COMPRESSE blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocità di azione.
Dosi d'impiego: da 15 a 30 g/ha (corrispondente a 2 o 4 compresse da g. 7.5); da distribuire con 200-400 litri d'acqua dallo stadio di tre foglie fino a quello di botticella delle colture.
SPETTRO D'AZIONE: E' attivo su: Aneto *(Anethum gravelescens)*, Coriandolo *(Bifora radians)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Ruchetta *(Diplotaxis spp.)*, Camomilla *(Matricaria chamomilla)*, Miagra *(Myagrum perfoliatum)*, Acetosella *(Oxalis cernua)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Correggiola *(Polygonum aviculare)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvulus)*, Rapistro *(Rapistrum rugosum)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Centocchio *(Stellaria media)*. Elevare la dose a 22.5 g/ha (corrispondente a 3 compresse da g. 7.5) in presenza di infestanti molto sviluppate. Per il controllo di Fiordaliso *(Centaurea cyanus)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Geranio *(Geranium dissectum)*, Falsa ortica *(Lamium purpureum)*, Ranuncoli *(Ranunculus spp.)*, Romice *(Rumex spp.)*, Pettine di Venere *(Scandix pecten veneris)*, Veronica *(Veronica persica)*, Veccia *(Vicia spp.)*, Viola *(Viola tricolor)*, si consiglia la dose di 22.5 g/ha (corrispondente a 3 compresse da g. 7.5) con l'aggiunta di bagnante allo 0,1%.
In caso di forti infestazioni di Crisantemo delle messi *(Chrisanthemum segetum)* e Ravanello selvatico *(Raphanus raphanistrum)* applicare EXPRESS COMPRESSE alla dose di 30 g/ha (corrispondente a 4 compresse da g. 7.5) con Bagnante allo 0,1%.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Le compresse devono essere disciolte nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.
AVVERTENZE
- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
d) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.
- Su varietà di frumento ed orzo di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività.
- Dopo un trattamento con EXPRESS COMPRESSE si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.
- Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo di azione.

COMPATIBILITA'
EXPRESS COMPRESSE è compatibile con Platform (s.a. carfentrazone etile), Starane (s.a. fluroxipyr), Gralit Max (s.a. fenoxaprop-p-etile) e con Topik (s.a. clodinafop-propargil). In caso di miscela versare nella botte prima EXPRESS COMPRESSE e successivamente gli altri formulati.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONTIENE TRIBENURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO– NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altre officine autorizzate:
Siegfried Agro AG – CH-4800 Zofingen (Svizzera)
Altre taglie autorizzate :
g 15 – 30 - 45
(pari a 2-4-6 compresse da g 7.5 e 1-2-3 compresse da g 15)

FOGLIO ILLUSTRATIVO

EXPRESS® COMPRESSE

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo

EXPRESS COMPRESSE
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tribenuron metile p.a. puro g 50
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione n. 8368 del 07.08.1993 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 75
(contiene 10 compresse da g 7,5) **PARTITA N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea. **Terapia**: sintomatica
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

EPOCA DI IMPIEGO
In post-emergenza: del frumento tenero e duro e dell'orzo.
Il principio attivo contenuto nelle compresse viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento, EXPRESS COMPRESSE blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocità di azione.
Dosi d'impiego: da 15 a 30 g/ha (corrispondente a 2 o 4 compresse da g. 7.5); da distribuire con 200-400 litri d'acqua dallo stadio di tre foglie fino a quello di botticella delle colture.
SPETTRO D'AZIONE: E' attivo su: Aneto *(Anethum gravelescens)*, Coriandolo *(Bifora radians)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Ruchetta *(Diplotaxis spp.)*, Camomilla *(Matricaria chamomilla)*, Miagra *(Myagrum perfoliatum)*, Acetosella *(Oxalis cernua)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Correggiola *(Polygonum aviculare)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvulus)*, Rapistro *(Rapistrum rugosum)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Centocchio *(Stellaria media)*. Elevare la dose a 22.5 g/ha (corrispondente a 3 compresse da g. 7.5) in presenza di infestanti molto sviluppate. Per il controllo di Fiordaliso *(Centaurea cyanus)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Geranio *(Geranium dissectum)*, Falsa ortica (Lamium purpureum), Ranuncoli *(Ranunculus spp.)*, Romice *(Rumex spp.)*, Pettine di Venere *(Scandix pecten veneris)*, Veronica *(Veronica persica)*, Veccia *(Vicia spp.)*, Viola *(Viola tricolor)*, si consiglia la dose di 22.5 g/ha (corrispondente a 3 compresse da g. 7.5) con l'aggiunta di bagnante allo 0,1%.
In caso di forti infestazioni di Crisantemo delle messi *(Chrisanthemum segetum)* e Ravanello selvatico *(Raphanus raphanistrum)* applicare EXPRESS COMPRESSE alla dose di 30 g/ha (corrispondente a 4 compresse da g. 7.5) con Bagnante allo 0,1%.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Le compresse devono essere disciolte nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.
AVVERTENZE
- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
d) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.
- Su varietà di frumento ed orzo di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività.
- Dopo un trattamento con EXPRESS COMPRESSE si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.
- Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo di azione.

COMPATIBILITA'
EXPRESS COMPRESSE è compatibile con Platform (s.a. carfentrazone etile), Starane (s.a. fluroxipyr), Gralit Max (s.a. fenoxaprop-p-etile) e con Topik (s.a. clodinafop-propargil). In caso di miscela versare nella botte prima EXPRESS COMPRESSE e successivamente gli altri formulati.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONTIENE TRIBENURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altre officine autorizzate:
Siegfried Agro AG – CH-4800 Zofingen (Svizzera)
Altre taglie autorizzate :
g 15 – 30 – 45
(pari a 2-4-6 compresse da g 7.5 e 1-2-3 compresse da g 15)

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

EXPRESS® COMPRESSE

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza
del frumento tenero e duro e dell'orzo

EXPRESS COMPRESSE
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tribenuron metile p.a. puro g 50
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r. l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione n. 8368 del 07.08.1993 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 75
(contiene 10 compresse da g 7,5) **PARTITA N.**

CONTIENE TRIBENURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA
PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altre officine autorizzate:
SIEGFRIED AGRO AG – CH-4800 Zofingen (Svizzera)
Altre taglie autorizzate :
g 15 – 30 - 45 (pari a 2-4-6 compresse da g 7.5 e 1-2-3 compresse da g 15)

EXPRESS®

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo - Granuli idrodispersibili

EXPRESS
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tribenuron metile p.a. puro g 75
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Registrazione n. 7996 del 24.01.1992 del Ministero della Sanita'

Contenuto netto: g 50 **PARTITA N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea. **Terapia**: sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

EPOCA DI IMPIEGO
In post-emergenza: del frumento tenero e duro e dell'orzo contro infestanti a foglia larga.
EXPRESS viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento, EXPRESS blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento,necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocita' di azione.

Dosi d'impiego: 10-15 g/ha; da distribuire con 200-400 litri d'acqua dallo stadio di tre foglie fino a quello di botticella delle colture. E' attivo su:Aneto (*Anethum gravelescens*), Coriandolo (*Bifora radians*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Ruchetta (*Diplotaxis spp.*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Miagra (*Myagrum perfoliatum*), Acetosella (*Oxalis cernua*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Rapistro (*Rapistrum rugosum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*).
Per il controllo di Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Geranio (*Geranium dissectum*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Ranuncoli (*Ranunculus* spp.), Romice (*Rumex* spp.), Pettine di Venere (*Scandix pecten veneris*), Veronica (*Veronica persica*), Veccia (*Vicia* spp.), Viola (*Viola tricolor*), si consiglia la dose di 15 g/ha con l'aggiunta di bagnante allo 0,1%.
In caso di forti infestazioni di Crisantemo delle messi (*Chrisanthemum segetum*) e Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*) applicare EXPRESS alla dose di 20 g/ha con Bagnante allo 0,1%.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Il EXPRESS, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento;portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE
- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Subito dopo il trattamento e' importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
d) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.
- Su varieta' di frumento ed orzo di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettivita'.
- Dopo un trattamento con EXPRESS si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.
- Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo di azione.

COMPATIBILITA'
EXPRESS e' compatibile con Platform (s.a. carfentrazone etile), Starane (s.a. fluroxipyr), Gralit Max (s.a. fenoxaprop-p-etile) e con Topik (s.a. clodinafop-propargil). In caso di miscela versare nella botte prima EXPRESS e successivamente gli altri formulati.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONTIENE TRIBENURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO– NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altra taglia autorizzata: g 100

FOGLIO ILLUSTRATIVO

EXPRESS®

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo - Granuli idrodispersibili

EXPRESS
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tribenuron metile p.a. puro g 75
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Registrazione n. 7996 del 24.01.1992 del Ministero della Sanita'
Contenuto netto: g 50 PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea. **Terapia**: sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

EPOCA DI IMPIEGO
In post-emergenza: del frumento tenero e duro e dell'orzo contro infestanti a foglia larga.
EXPRESS viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento, EXPRESS blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento,necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocita' di azione.

Dosi d'impiego: 10-15 g/ha; da distribuire con 200-400 litri d'acqua dallo stadio di tre foglie fino a quello di botticella delle colture. E' attivo su:Aneto (*Anethum gravelescens*), Coriandolo (*Bifora radians*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Ruchetta (*Diplotaxis spp.*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Miagra (*Myagrum perfoliatum*), Acetosella (*Oxalis cernua*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Rapistro (*Rapistrum rugosum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*).
Per il controllo di Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Geranio (*Geranium dissectum*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Ranuncoli (*Ranunculus* spp.), Romice (*Rumex* spp.), Pettine di Venere (*Scandix pecten veneris*), Veronica (*Veronica persica*), Veccia (*Vicia* spp.), Viola (*Viola tricolor*), si consiglia la dose di 15 g/ha con l'aggiunta di bagnante allo 0,1%.
In caso di forti infestazioni di Crisantemo delle messi (*Chrisanthemum segetum*) e Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*) applicare EXPRESS alla dose di 20 g/ha con Bagnante allo 0,1%.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Il EXPRESS, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento;portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE
- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Subito dopo il trattamento e' importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
d) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.
- Su varieta' di frumento ed orzo di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettivita'.
- Dopo un trattamento con EXPRESS si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.
- Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo di azione.

COMPATIBILITA'
EXPRESS e' compatibile con Platform (s.a. carfentrazone etile), Starane (s.a. fluroxipyr), Gralit Max (s.a. fenoxaprop-p-etile) e con Topik (s.a. clodinafop-propargil). In caso di miscela versare nella botte prima EXPRESS e successivamente gli altri formulati.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONTIENE TRIBENURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO– NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altra taglia autorizzata: g 100

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

EXPRESS®

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo - Granuli idrodispersibili

EXPRESS
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tribenuron metile p.a. puro g 75
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione n. 7996 del 24.01.1992 del Ministero della Sanita'

Contenuto netto: g 50 **PARTITA N.**

CONTIENE TRIBENURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA
PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altra taglia autorizzata: g 100

EXPRESS®

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo.
Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

EXPRESS
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tribenuron metile p.a. puro g 75
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
telefono 800378337

Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione n. 7996 del 24.01.1992 del Ministero della Sanita'

Contenuto netto: g 10 **PARTITA N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea. **Terapia:** sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

EPOCA DI IMPIEGO
In post-emergenza: del frumento tenero e duro e dell'orzo contro infestanti a foglia larga.
EXPRESS viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento, EXPRESS blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento,necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocita' di azione.
Dosi d'impiego: 10-15 g/ha; da distribuire con 200-400 litri d'acqua dallo stadio di tre foglie fino a quello di botticella delle colture. E' attivo su:Aneto (*Anethum gravelescens*), Coriandolo (*Bifora radians*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Ruchetta (*Diplotaxis spp.*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Miagra (*Myagrum perfoliatum*), Acetosella (*Oxalis cernua*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Rapistro (*Rapistrum rugosum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*).
Per il controllo di Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Geranio (*Geranium dissectum*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Ranuncoli (*Ranunculus* spp.), Romice (*Rumex* spp.), Pettine di Venere (*Scandix pecten veneris*), Veronica (*Veronica persica*), Veccia (*Vicia* spp.), Viola (*Viola tricolor*), si consiglia la dose di 15 g/ha con l'aggiunta di bagnante allo 0,1%.
In caso di forti infestazioni di Crisantemo delle messi (*Chrisanthemum segetum*) e Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*) applicare EXPRESS alla dose di 20 g/ha con Bagnante allo 0,1%.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Il EXPRESS, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento;portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE
- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Subito dopo il trattamento e' importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
d) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.
- Su varieta' di frumento ed orzo di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettivita'.
- Dopo un trattamento con EXPRESS si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.
- Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo di azione.
COMPATIBILITA'
EXPRESS e' compatibile con Platform (s.a. carfentrazone etile), Starane (s.a. fluroxipyr), Gralit Max (s.a. fenoxaprop-p-etile) e con Topik (s.a. clodinafop-propargil). In caso di miscela versare nella botte prima EXPRESS e successivamente gli altri formulati.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONTIENE TRIBENURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altra taglia autorizzata:
g 15 (contiene 1 sacchetto idrosolubile da g 15)
g 100 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da g 10)
g 150 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da 15 g)

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

EXPRESS®

Erbicida in sacchetto idrosolubile selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tribenuron metile p.a. puro g 75
Coformulanti q. b. a 100

Contenuto netto: g 10

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione n. 7996 del 24.01.1992 del Ministero della Sanità

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

AVVERTENZA: Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

Altra taglia autorizzata:
g 15 (contiene 1 sacchetto idrosolubile da g 15)
g 100 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da g 10)
g 150 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da 15 g)

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1	2	3	4	5	6
Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua	Assicurarsi di avere le mani asciutte	Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo	Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte	Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)	Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni sopraríportate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

FOLCARB® COMBI

Fungicida Organico ad azione Antiperonosporica con effetto collaterale contro la muffa grigia - Polvere Bagnabile

FOLCARB® COMBI
COMPOSIZIONE
Cymoxanil puro g 8,4
Folpet puro g 64
Coformulanti q. b. a 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione (R20). Irritante per gli occhi (R36). Possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti (R40). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione
Isagro S.p.A. – Via Nettunese km 23.400, Aprilia (**LT**)
Distribuito da:
Siapa S.r.l. - Via Caldera 21, Milano

Registrazione n. 3538 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: 1 - 5 - 20 Kg. Partita n°......

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 8,4%, FOLPET 64%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Conservare il recipiente ben chiuso. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. **Terapia**: sintomatica.
FOLPET: Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntivite, rinofaringite) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). **Terapia**: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE
FOLCARB COMBI è un fungicida efficace contro la peronospora della vite, con effetto collaterale nei confronti della Muffa grigia.
FOLCARB COMBI è una miscela di 2 fungicidi, di cui uno è dotato di prontezza d'azione ed effetto bloccante in quanto penetra nelle foglie e nel grappolo, mentre il Folpet possiede una persistenza d'azione.
FOLCARB COMBI può essere usato contro la peronospora in tutto il periodo vegetativo.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Contro la peronospora della vite FOLCARB COMBI si impiega alla dose di 100-150 g in 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fintanto che permangono le condizioni favorevoli alla malattia. In condizioni normali trattare ogni 8-10 giorni. In caso di forte attacco o di rapido accrescimento della pianta l'intervallo può essere ridotto a 7-9 giorni.
Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere alla miscela 50 ml per ettolitro di bagnante-adesivo IROL.
Preparazione della poltiglia: Formare una pasta semi-liquida mescolando la giusta dose di FOLCARB COMBI in poca acqua; indi portare a volume, aggiungendo la rimanente acqua e continuando a mescolare.

COMPATIBILITÀ
Il FOLCARB COMBI può essere mescolato con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Non miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con oli minerali e prodotti a base di zolfo.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto per le uve da tavola; 40 giorni per le uve da vino per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

® Marchio registrato Isagro S.p.A.

FOLTAMIN®

Fungicida organico per combattere alcune malattie crittogamiche della vite - Polvere Bagnabile

FOLTAMIN
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Folpet puro g 45
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione (R20). Irritante per gli occhi (R36). Possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti (R40). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici (R50).

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta (46). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. – Via Siemens 12, Bolzano

Registrazione N. 3785 del 15.09.1980 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 – 10 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
FOLTAMIN è un fungicida organico, valido contro le malattie crittogamiche in viticoltura

Dosi - Epoche - Modalità di impiego
Dosi per 100 litri d'acqua
Vite: contro Peronospora e Botrite g 200 -250 Impiegare FOLTAMIN a scopo preventivo a seconda dell'andamento stagionale e seguendo il ciclo delle malattie. Bagnare accuratamente la vegetazione affinché il prodotto si distribuisca uniformemente e totalmente

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene

COMPATIBILITA'
FOLTAMIN non va miscelato né con prodotti alcalini (calce, polisolfuri, poltiglia bordolese, etc.) né con oli o prodotti oleosi.
Avvertenza: inoltre il FOLTAMIN non deve essere usato 20 giorni prima o dopo l'applicazione di oli minerali e prodotti a base di zolfo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto. Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

GAIO®

Erbicida - Granuli idrodispersibili

GAIO
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Metsulfuron metile puro 20 g
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione N. 7947 del 06.02.1991 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 60 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo.
Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale.
Terapia: sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
GAIO è un erbicida selettivo idoneo per il **diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo.**
Tra le infestanti più sensibili risultano: *Stellaria media, Papaver rhoeas, Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum, Capsella bursa pastoris, Ranunculus acer, Chrisantemum segetum, Adonis aestivalis, Centaurea cyanus, Viola tricolor, Matricaria chamomilla, Veronica persica, Cirsium spp., Rumex spp., Lamium purpureum, Apera spica venti;*
Risultano mediamente sensibili: *Fumaria officinalis, Polygonum convolvulus, Polygonum aviculare;*
Risultano scarsamente sensibili: *Veronica hederaefolia e Galium aparine.*
GAIO svolge un'ottima azione di controllo di *Apera agrostis spica-venti* e un'interessante azione collaterale su *Lolium spp. e Alopecurus myosuroides.*

Dosi - Epoche - Modalità di impiego
Frumento tenero e duro, orzo: GAIO si usa in post-emergenza della coltura dallo stadio di inizio accestimento sino allo stadio di botticella.
Il controllo delle infestanti è più efficace se l'applicazione di GAIO è effettuata quando le infestanti sono allo stadio di plantula e in fase di attiva crescita. GAIO si usa alla dose di 15-20 g/ha su frumento ed orzo,la dose più bassa su infestanti e colture poco sviluppate, la dose più alta nei trattamenti tardivi. Distribuire con 300-600 litri d'acqua.
Attività per assorbimento radicale: si ottiene una migliore attivazione del prodotto quando piove entro due settimane dal trattamento.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
GAIO, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa a un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; riempire poi il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE: - Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali attacchi di parassiti, asfissia radicale: nel caso che tale sofferenza si verificasse successivamente al trattamento lo stato di debilitazione della coltura può essere temporaneamente aggravato.
Da non applicare su frumento od orzo da traseminare con essenze foraggere.
- Non usare il prodotto in terreni soggetti a forti ristagni d'acqua o su terreni soggetti ad inondazioni. - In caso di necessità di risemina nei terreni già trattati ricorrere, dopo un'aratura profonda, a frumento o ad orzo.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dall'irroratore attraverso ripetuti lavaggi (almeno 2) delle singole parti separatamente impiegando soluzioni di ipoclorito di sodio (ad esempio candeggina per uso domestico) allo 0,5 - 1% per 15 minuti e successivamente acqua pura per eliminare ogni residuo di cloro. - Su varietà di frumento od orzo di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività.

RESTRIZIONI NELL'IMPIEGO
Nel Centro e nel Sud d'Italia non effettuare colture a semina estiva nei terreni trattati nella primavera precedente; non seminare barbabietola nella stagione successiva. In Italia Settentrionale, dopo un'aratura profonda, e' possibile seminare mais e soia in secondo raccolto. Evitare durante il trattamento che la miscela erbicida possa arrivare su colture limitrofe o su terreni da seminare con colture sensibili (ad esempio barbabietola). Nello svuotare e lavare l'attrezzatura porre la massima attenzione affinché il prodotto non arrivi direttamente o per dilavamento a contatto con colture vicine o con le loro radici.

COMPATIBILITA'
GAIO è compatibile con i più comuni erbicidi del frumento e dell'orzo: si consiglia tuttavia di verificare la compatibilità prima dell'uso. Da non usare in miscela con fertilizzanti.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altra taglia autorizzata: g 150

FOGLIO ILLUSTRATIVO

GAIO®

Erbicida - Granuli Idrodispersibili

GAIO
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Metsulfuron metile puro 20 g
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione N. 7947 del 06.02.1991 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 60 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo.
Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale.
Terapia: sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
GAIO è un erbicida selettivo idoneo per il **diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo.**
Tra le infestanti più sensibili risultano: *Stellaria media, Papaver rhoeas, Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum, Capsella bursa pastoris, Ranunculus acer, Chrisantemum segetum, Adonis aestivalis, Centaurea cyanus, Viola tricolor, Matricaria chamomilla, Veronica persica, Cirsium spp., Rumex spp., Lamium purpureum, Apera spica venti;*
Risultano mediamente sensibili: *Fumaria officinalis, Polygonum convolvulus, Polygonum aviculare;*
Risultano scarsamente sensibili: *Veronica hederaefolia e Galium aparine.*
GAIO svolge un'ottima azione di controllo di *Apera agrostis spica-venti* e un'interessante azione collaterale su *Lolium spp.* e *Alopecurus myosuroides.*

Dosi - Epoche - Modalità di impiego
Frumento tenero e duro, orzo: GAIO si usa in post-emergenza della coltura dallo stadio di inizio accestimento sino allo stadio di botticella.
Il controllo delle infestanti è più efficace se l'applicazione di GAIO è effettuata quando le infestanti sono allo stadio di plantula e in fase di attiva crescita. GAIO si usa alla dose di 15-20 g/ha su frumento ed orzo,la dose più bassa su infestanti e colture poco sviluppate, la dose più alta nei trattamenti tardivi. Distribuire con 300-600 litri d'acqua.
Attività per assorbimento radicale: si ottiene una migliore attivazione del prodotto quando piove entro due settimane dal trattamento.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
GAIO, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa a un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; riempire poi il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE: - Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali attacchi di parassiti, asfissia radicale: nel caso che tale sofferenza si verificasse successivamente al trattamento lo stato di debilitazione della coltura può essere temporaneamente aggravato.
Da non applicare su frumento od orzo da traseminare con essenze foraggere.
- Non usare il prodotto in terreni soggetti a forti ristagni d'acqua o su terreni soggetti ad inondazioni. - In caso di necessità di risemina nei terreni già trattati ricorrere, dopo un'aratura profonda, a frumento o ad orzo.

- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dall'irroratore attraverso ripetuti lavaggi (almeno 2) delle singole parti separatamente impiegando soluzioni di ipoclorito di sodio (ad esempio candeggina per uso domestico) allo 0,5 - 1% per 15 minuti e successivamente acqua pura per eliminare ogni residuo di cloro. - Su varietà di frumento od orzo di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività.

RESTRIZIONI NELL'IMPIEGO
Nel Centro e nel Sud d'Italia non effettuare colture a semina estiva nei terreni trattati nella primavera precedente; non seminare barbabietola nella stagione successiva. In Italia Settentrionale, dopo un'aratura profonda, e' possibile seminare mais e soia in secondo raccolto. Evitare durante il trattamento che la miscela erbicida possa arrivare su colture limitrofe o su terreni da seminare con colture sensibili (ad esempio barbabietola). Nello svuotare e lavare l'attrezzatura porre la massima attenzione affinché il prodotto non arrivi direttamente o per dilavamento a contatto con colture vicine o con le loro radici.

COMPATIBILITA'
GAIO è compatibile con i più comuni erbicidi del frumento e dell'orzo: si consiglia tuttavia di verificare la compatibilità prima dell'uso. Da non usare in miscela con fertilizzanti.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altra taglia autorizzata: g 150

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

GAIO®

Erbicida - Granuli idrodispersibili

GAIO
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Metsulfuron metile puro 20 g
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione N. 7947 del 06.02.1991 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 60 PARTITA N.:

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altra taglia autorizzata: g 150

GAIO®

Erbicida

Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

GAIO
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Metsulfuron metile puro 20 g
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione N. 7947 del 06.02.1991 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: g 15 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale.
Terapia: sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
GAIO è un erbicida selettivo idoneo per il **diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo.**
Tra le infestanti più sensibili risultano: *Stellaria media, Papaver rhoeas, Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum, Capsella bursa pastoris, Ranunculus acer, Chrisantemum segetum, Adonis aestivalis, Centaurea cyanus, Viola tricolor, Matricaria chamomilla, Veronica persica, Cirsium* spp., *Rumex* spp., *Lamium purpureum, Apera spica venti;*
Risultano mediamente sensibili: *Fumaria officinalis, Polygonum convolvulus, Polygonum aviculare;*
Risultano scarsamente sensibili: *Veronica hederaefolia e Galium aparine.*
GAIO svolge un'ottima azione di controllo di *Apera agrostis spica-venti* e un'interessante azione collaterale su *Lolium spp.* e *Alopecurus myosuroides.*

Dosi - Epoche - Modalità di impiego

Frumento tenero e duro, orzo: GAIO si usa in post-emergenza della coltura dallo stadio di inizio accestimento sino allo stadio di botticella.
Il controllo delle infestanti è più efficace se l'applicazione di GAIO è effettuata quando le infestanti sono allo stadio di plantula e in fase di attiva crescita. GAIO si usa alla dose di 15-20 g/ha su frumento ed orzo,la dose più bassa su infestanti e colture poco sviluppate, la dose più alta nei trattamenti tardivi. Distribuire con 300-600 litri d'acqua.
Attività per assorbimento radicale: si ottiene una migliore attivazione del prodotto quando piove entro due settimane dal trattamento.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
GAIO, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa a un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; riempire poi il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE: - Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali attacchi di parassiti, asfissia radicale: nel caso che tale sofferenza si verificasse successivamente al trattamento lo stato di debilitazione della coltura può essere temporaneamente aggravato.
Da non applicare su frumento od orzo da traseminare con essenze foraggere.
- Non usare il prodotto in terreni soggetti a forti ristagni d'acqua o su terreni soggetti ad inondazioni. - In caso di necessità di risemina nei terreni già trattati ricorrere, dopo un'aratura profonda, a frumento o ad orzo.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dall'irroratore attraverso ripetuti lavaggi (almeno 2) delle singole parti separatamente impiegando soluzioni di ipoclorito di sodio (ad esempio candeggina per uso domestico) allo 0,5 - 1% per 15 minuti e successivamente acqua pura per eliminare ogni residuo di cloro. - Su varietà di frumento od orzo di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività.

RESTRIZIONI NELL'IMPIEGO
Nel Centro e nel Sud d'Italia non effettuare colture a semina estiva nei terreni trattati nella primavera precedente; non seminare barbabietola nella stagione successiva. In Italia Settentrionale, dopo un'aratura profonda, e' possibile seminare mais e soia in secondo raccolto. Evitare durante il trattamento che la miscela erbicida possa arrivare su colture limitrofe o su terreni da seminare con colture sensibili (ad esempio barbabietola). Nello svuotare e lavare l'attrezzatura porre la massima attenzione affinchè il prodotto non arrivi direttamente o per dilavamento a contatto con colture vicine o con le loro radici.
COMPATIBILITA'
GAIO è compatibile con i più comuni erbicidi del frumento e dell'orzo: si consiglia tuttavia di verificare la compatibilità prima dell'uso. Da non usare in miscela con fertilizzanti.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altre taglie autorizzate :
g 30 (2x15 g) – g 60 (4x15 g)
g 18 (1x18 g) – g 36 (2x18 g) – g 54 (3x18 g)
g 20 (1x20 g) – g 40 (2x20 g) – g 60 (3x20 g)

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

GAIO®

Erbicida - Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Metsulfuron metil puro g 20
Coformulanti q. b. a 100

Contenuto netto : g 15

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. –Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Registrazione N. 7947 del 06.02.1991 del Ministero della Sanità

AVVERTENZA:
LEGGERE ATTENTAMENTE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

Altre taglie autorizzate:
g 30 (2x15 g) – g 60 (4x15 g)
g 18 (1x18 g) – g 36 (2x18 g) – g 54 (3x18 g)
g 20 (1x20 g) – g 40 (2x20 g) – g 60 (3x20 g)

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1. Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua
2. Assicurarsi di avere le mani asciutte
3. Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo
4. Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte
5. Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)
6. Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni sopranriportate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

GLEAN® 75 DF

Erbicida – Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
Clorsulfuron puro 75 g
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 6/38 del 19.06.1986 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 10 PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
GLEAN 75 DF è un erbicida selettivo idoneo per il diserbo autunnale del frumento tenero e duro. GLEAN 75 DF è efficace per il controllo della maggior parte delle malerbe dicotiledoni e di diverse graminacee annuali quali:
- **tra le più sensibili** *Alopecurus myosuroides, Anthemis aestivalis, Apera spica-venti, Capsella bursa pastoris, Fumaria officinalis, Lamium* spp., *Lolium multiflorum, Matricaria chamomilla, Myagrum perfoliatum, Phalaris* spp., *Ranunculus* spp., *Rumex* spp., *Stellaria media, Veronica* spp., *Viola arvensis*;
- **molto sensibili** sono anche: *Bifora radians, Chrysanthemum segetum, Cirsium arvense, Equisetum* spp., *Galium aparine, Papaver rhoeas, Poa annua, Polygonum* spp., *Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis.*
GLEAN 75 DF è caratterizzato sia da una azione di contatto, sia da una attività residua con assorbimento attraverso l'apparato radicale.
GLEAN 75 DF, subito dopo l'assorbimento, blocca l'accrescimento delle malerbe sensibili, con sintomi visibili (decolorazione e successiva morte) che possono anche manifestarsi solo dopo una-tre settimane: condizioni di caldo ed umido dopo il trattamento favoriscono l'attività erbicida.
DOSI D'IMPIEGO
GLEAN 75 DF può essere usato su frumento in pre- o in post-emergenza precoce autunnale della coltura. In post-emergenza precoce il GLEAN 75 DF controlla le avventizie mono- e dicotiledoni. L'epoca migliore d'applicazione è quella compresa tra gli stadi cotiledonare e delle prime due foglie vere delle infestanti.
In condizioni di siccità prolungata, non appena si ripristina un sufficiente grado di umidità nel terreno, vengono controllate anche le avventizie che germinano in tempi successivi. GLEAN 75 DF si usa alla dose di 20 g/ha, da distribuire con 300-600 litri d'acqua (la dose di acqua maggiore con terreno zolloso, non ben lavorato o particolarmente secco).
Il contenuto di questa confezione e' sufficiente per trattare ha 0,5.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
GLEAN 75 DF, nella dose necessaria, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa a metà, mantenendo l'agitatore in movimento (eventuali erbicidi in miscela devono essere aggiunti successivamente): riempire poi il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.
AVVERTENZE
- Si raccomanda un'accurata preparazione del letto di semina ed una copertura uniforme del seme.
- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale: in caso tale sofferenza si verificasse successivamente al trattamento lo stato di debilitazione della coltura può essere temporaneamente aggravato.
- Da non applicare su frumento da traseminare con essenze foraggere.
- Non usare il prodotto in terreni soggetti a forti ristagni d'acqua o su terreno gelato o in presenza di brina.
- Non usare il prodotto in terreni soggetti ad inondazioni.
- In caso di necessità di **risemina** nei terreni già trattati, ricorrere **solo a frumento od orzo**; per la risemina di orzo si consiglia un'aratura profonda.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
d) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.

- Sulle varietà Lontra, Libellula, Valle d'Oro e Cona, si consiglia di applicare il prodotto in post-emergenza precoce. Su varietà di frumento di nuova introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività.
- Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo di azione.
RESTRIZIONI DI IMPIEGO
GLEAN 75 DF è soggetto ad una degradazione rallentata in terreni alcalini ed in climi siccitosi. Alcune colture in rotazione al frumento sono danneggiate da tracce che in tali condizioni potrebbero rimanere nel terreno anche a distanza di 15-24 mesi dal trattamento.
In Italia settentrionale possono essere seminate le seguenti colture:
- frumento ed orzo in monosuccessione;
- soia, granturco e sorgo nell'anno successivo alla raccolta del frumento trattato con GLEAN 75 DF;
- tutte le altre colture soltanto 20 mesi dopo l'applicazione del GLEAN 75 DF.
In Italia centrale, meridionale e isole, invece, il GLEAN 75 DF dovrà essere impiegato soltanto in caso di mono-successione di frumento. In queste zone e' raccomandato comunque di considerare con attenzione il piano colturale per i due-tre anni successivi al trattamento. Nell'anno precedente la semina di una coltura diversa da frumento od orzo su terreno trattato con GLEAN 75 DF, l'agricoltore dovrà coltivare una parcella della coltura prescelta al fine di accertare l'assenza di fitotossicità.
Per la procedura da seguire, rivolgersi alla Direzione Tecnica della Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.
Evitare, durante il trattamento, che la miscela erbicida possa arrivare su colture limitrofe o su terreni da seminare con colture sensibili (ad esempio barbabietola).
Nello svuotare e lavare l'attrezzatura porre la massima attenzione affinché il prodotto non arrivi direttamente o per dilavamento a contatto di colture vicine o delle loro radici.
GLEAN 75 DF in particolari situazioni (ad es. abbondanti piogge successive al trattamento) può determinare un leggero, temporaneo ingiallimento del frumento.
COMPATIBILITA'
GLEAN 75 DF può essere usato in miscela con altri diserbanti selettivi, ove necessario per il controllo di malerbe non sensibili. Il GLEAN 75 DF è compatibile fisicamente con i più comuni erbicidi del frumento: comunque si consiglia di verificare la compatibilità prima dell'uso. GLEAN 75 DF, salvo il caso di miscele con altri erbicidi selettivi ove necessario, non è da impiegare in miscela con altri antiparassitari o concimi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO-NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altre taglie autorizzate: g 20 - 50 - 100 - 200

FOGLIO ILLUSTRATIVO

GLEAN® 75 DF

Erbicida – Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
Clorsulfuron puro 75 g
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 6/38 del 19.06.1986 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 10 PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
GLEAN 75 DF è un erbicida selettivo idoneo per il diserbo autunnale del frumento tenero e duro. GLEAN 75 DF è efficace per il controllo della maggior parte delle malerbe dicotiledoni e di diverse graminacee annuali quali:
- **tra le più sensibili** *Alopecurus myosuroides*, *Anthemis aestivalis*, *Apera spica-venti*, *Capsella bursa pastoris*, *Fumaria officinalis*, *Lamium* spp., *Lolium multiflorum*, *Matricaria chamomilla*, *Myagrum perfoliatum*, *Phalaris* spp., *Ranunculus* spp., *Rumex* spp., *Stellaria media*, *Veronica* spp., *Viola arvensis*;
- **molto sensibili** sono anche: *Bifora radians*, *Chrysanthemum segetum*, *Cirsium arvense*, *Equisetum* spp., *Galium aparine*, *Papaver rhoeas*, *Poa annua*, *Polygonum* spp., *Raphanus raphanistrum*, *Sinapis arvensis*.
GLEAN 75 DF è caratterizzato sia da una azione di contatto, sia da una attività residua con assorbimento attraverso l'apparato radicale.
GLEAN 75 DF, subito dopo l'assorbimento, blocca l'accrescimento delle malerbe sensibili, con sintomi visibili (decolorazione e successiva morte) che possono anche manifestarsi solo dopo una-tre settimane: condizioni di caldo ed umido dopo il trattamento favoriscono l'attività erbicida.
DOSI D'IMPIEGO
GLEAN 75 DF può essere usato su frumento in pre- o in post-emergenza precoce autunnale della coltura. In post-emergenza precoce GLEAN 75 DF controlla le avventizie mono- e dicotiledoni. L'epoca migliore d'applicazione è quella compresa tra gli stadi cotiledonare e delle prime due foglie vere delle infestanti.
In condizioni di siccità prolungata, non appena si ripristina un sufficiente grado di umidità nel terreno, vengono controllate anche le avventizie che germinano in tempi successivi. GLEAN 75 DF si usa alla dose di 20 g/ha, da distribuire con 300-600 litri d'acqua (la dose di acqua maggiore con terreno zolloso, non ben lavorato o particolarmente secco). Il contenuto di questa confezione e' sufficiente per trattare ha 0,5.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
GLEAN 75 DF, nella dose necessaria, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa a metà, mantenendo l'agitatore in movimento (eventuali erbicidi in miscela devono essere aggiunti successivamente): riempire poi il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.
AVVERTENZE
- Si raccomanda un'accurata preparazione del letto di semina ed una copertura uniforme del seme.
- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale: in caso tale sofferenza si verificasse successivamente al trattamento lo stato di debilitazione della coltura può essere temporaneamente aggravato.
- Da non applicare su frumento da traseminare con essenze foraggere.
- Non usare il prodotto in terreni soggetti a forti ristagni d'acqua o su terreno gelato o in presenza di brina.
- Non usare il prodotto in terreni soggetti ad inondazioni.
- In caso di necessità di **risemina** nei terreni già trattati, ricorrere **solo a frumento od orzo**; per la risemina di orzo si consiglia un'aratura profonda.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
c) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
d) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
d) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
e) Rimuovere le tracce ci ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
f) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.
- Sulle varietà Lontra, Libellula, Valle d'Oro e Cona, si consiglia di applicare il prodotto in post-emergenza precoce. Su varietà di frumento di nuova introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività.
- Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo di azione.
RESTRIZIONI DI IMPIEGO
GLEAN 75 DF è soggetto ad una degradazione rallentata in terreni alcalini ed in climi siccitosi. Alcune colture in rotazione al frumento sono danneggiate da tracce che in tali condizioni potrebbero rimanere nel terreno anche a distanza di 15-24 mesi dal trattamento.
In Italia settentrionale possono essere seminate le seguenti colture:
- frumento ed orzo in monosuccessione;
- soia, granoturco e sorgo nell'anno successivo alla raccolta del frumento trattato con GLEAN 75 DF;
- tutte le altre colture soltanto 20 mesi dopo l'applicazione di GLEAN 75 DF.
In Italia centrale, meridionale e isole, invece, GLEAN 75 DF dovrà essere impiegato soltanto in caso di mono-successione di frumento. In queste zone e' raccomandato comunque di considerare con attenzione il piano colturale per i due-tre anni successivi al trattamento. Nell'anno precedente la semina di una coltura diversa da frumento od orzo su terreno trattato con GLEAN 75 DF, l'agricoltore dovrà coltivare una parcella della coltura prescelta al fine di accertare l'assenza di fitotossicità.
Per la procedura da seguire, rivolgersi alla Direzione Tecnica della Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.
Evitare, durante il trattamento, che la miscela erbicida possa arrivare su colture limitrofe o su terreni da seminare con colture sensibili (ad esempio barbabietola).
Nello svuotare e lavare l'attrezzatura porre la massima attenzione affinché il prodotto non arrivi direttamente o per dilavamento a contatto di colture vicine o delle loro radici.
GLEAN 75 DF in particolari situazioni (ad es. abbondanti piogge successive al trattamento) può determinare un leggero, temporaneo ingiallimento del frumento.
COMPATIBILITA'
GLEAN 75 DF può essere usato in miscela con altri diserbanti selettivi, ove necessario per il controllo di malerbe non sensibili. GLEAN 75 DF è compatibile fisicamente con i più comuni erbicidi del frumento: comunque si consiglia di verificare la compatibilità prima dell'uso. GLEAN 75 DF, salvo il caso di miscele con altri erbicidi selettivi ove necessario, non e' da impiegare in miscela con altri antiparassitari o concimi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso.Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO-NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altre taglie autorizzate: g 20 - 50 - 100 - 200

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

GLEAN® 75 DF

Erbicida – Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
Clorsulfuron puro 75 g
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 6738 del 19.06.1986 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 10 PARTITA N.

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altre taglie autorizzate: g 20 - 50 - 100 - 200

GRALIT® MAX

Diserbante graminicida di post-emergenza per frumento.
Emulsione olio/acqua

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Fenoxaprop-p-etile puro 5,24 g
(pari a 55 g/l)
Mefenpir-dietile (HOE107892) 2,86 g
(pari a 30 g/l)
Coformulanti q. b. a 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile (R10). Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53). Nocivo: puo' causare danni ai polmoni in caso d'ingestione (R65). L'esposizione ripatuta puo' provocare secchezza e screpolature della pelle (R66). L'inalazione dei vapori puo' provocare sonnolenza e vertigini (R67).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare (S16). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta (S46). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61). In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta (S62).

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione:
Bayer CropScience GmbH, Francoforte sul Meno (Germania)

Registrazione N. 8535 del 30.11.1994 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: Litri 0,5 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive FENOXAPROP-P-ETILE 5,24% e MEFENPIR-DIETILE (HOE 107892) 2,86%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Fenoxaprop-p-etile (nell'animale da esperimento): passivita', sonnolenza, assenza di equilibrio, posizione prona.
Mefenpir-dietile (HOE 107892) (nell'animale da esperimento): sintomi aspecifici. Alterazioni dei globuli rossi e della funzione epatica. In caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico; togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con abbondante acqua e sapone; risciacquare immediatamente gli occhi con acqua abbondante per 15 minuti; non provocare il vomito. **Trattamenti specifici:** in caso di ingestione non provocare il vomito, somministrare prima di tutto 200 ml di olio di paraffina ed eseguire poi la lavanda gastrica con circa 4 litri di acqua, terminare con carbone e solfato di sodio. Evitare l'aspirazione polmonare.
Trattamenti sintomatici. Controindicazioni: derivati dell'adrenalina.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE D'AZIONE
GRALIT MAX viene assorbito per via fogliare e traslocato fino ai tessuti del meristema apicale. I primi sintomi d'azione si manifestano con macchie clorotiche su foglie e germogli che poi evolvono in necrosi: dopo circa 2-4 settimane (in funzione delle condizioni climatiche) si ha la morte dell'infestante. Condizioni sfavorevoli di crescita, stress da siccità delle infestanti possono influenzare negativamente l'efficacia del GRALIT MAX.
Erbe infestanti sensibili: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Avena spp.* (avena), *Phalaris spp.* (scagliola), *Poa trivialis* (fienarola comune), *Apera spica venti* (capellini dei campi).
Erbe infestanti resistenti: *Lolium spp.* (Loglio).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Frumento: 1- 1,5 l/ha contro *Avena spp., Phalaris spp., Poa trivialis, Apera spica-venti*; 0,75 - 1,25 l/ha contro *Alopecurus myosuroides*.
La dose inferiore è indicata per gli stadi precoci delle infestanti.

EPOCA DI IMPIEGO: Post-emergenza dalla terza foglia alla levata del frumento con le infestanti graminacee negli stadi compresi tra la seconda foglia ed il secondo nodo; in presenza di *Phalaris spp.* intervenire entro la fine accestimento della stessa.

VOLUME DI IRRORAZIONE
Utilizzare 200-400 litri/ha di acqua.

COMPATIBILITA'
La miscela con ormonici sotto forma di sale, nonche' con Dicamba, Bifenox e Bentazone, puo' causare riduzione di efficacia.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

AGITARE PRIMA DELL'USO

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Contiene una miscela di (1) 5-cloro-2metil-2H-isotiazolo-3-one e di (2) 2-metil-2H-isotiazolo-3-one; contine Fenoxaprop-p-etile. PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

®Marchio registrato Bayer CropScience A.G.

Altra officina autorizzata:
S.B.M. Formulation - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)

Altre taglie autorizzate: Litri 1 - 2,5 - 5

GRANSTAR® COMPRESSE

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo.

GRANSTAR COMPRESSE
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tribenuron metile p.a. puro g 50
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r. l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione n. 8369 del 07.08.1993 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 75
(contiene 10 compresse da g 7,5) **PARTITA N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea. **Terapia**: sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

EPOCA DI IMPIEGO
In post-emergenza: del frumento tenero e duro e dell'orzo.
Il principio attivo contenuto nelle compresse viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento, GRANSTAR COMPRESSE blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocità di azione.
Dosi d'impiego: da 15 a 30 g/ha (corrispondente a 2 o 4 compresse da g. 7.5); da distribuire con 200-400 litri d'acqua dallo stadio di tre foglie fino a quello di botticella delle colture.
SPETTRO D'AZIONE: E' attivo su: Aneto *(Anethum gravelescens)*, Coriandolo *(Bifora radians)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Ruchetta *(Diplotaxis spp.)*, Camomilla *(Matricaria chamomilla)*, Miagra *(Myagrum perfoliatum)*, Acetosella *(Oxalis cernua)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Correggiola *(Polygonum aviculare)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvulus)*, Rapistro *(Rapistrum rugosum)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Centocchio *(Stellaria media)*. Elevare la dose a 22.5 g/ha (corrispondente a 3 compresse da g. 7.5) in presenza di infestanti molto sviluppate. Per il controllo di Fiordaliso *(Centaurea cyanus)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Geranio *(Geranium dissectum)*, Falsa ortica *(Lamium purpureum)*, Ranuncoli *(Ranunculus spp.)*, Romice *(Rumex spp.)*, Pettine di Venere *(Scandix pecten veneris)*, Veronica *(Veronica persica)*, Veccia *(Vicia spp.)*, Viola *(Viola tricolor)*, si consiglia la dose di 22.5 g/ha (corrispondente a 3 compresse da g. 7.5) con l'aggiunta di bagnante allo 0,1%.
In caso di forti infestazioni di Crisantemo delle messi *(Chrisanthemum segetum)* e Ravanello selvatico *(Raphanus raphanistrum)* applicare GRANSTAR COMPRESSE alla dose di 30 g/ha (corrispondente a 4 compresse da g. 7.5) con Bagnante allo 0,1%.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Le compresse devono essere disciolte nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.
AVVERTENZE
- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
d) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.
- Su varietà di frumento ed orzo di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività.
- Dopo un trattamento con GRANSTAR COMPRESSE si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.
- Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo di azione.

COMPATIBILITA'
GRANSTAR COMPRESSE è compatibile con Platform (s.a. carfentrazone etile), Starane (s.a. fluroxipyr), Gralit Max (s.a. fenoxaprop-p-etile) e con Topik (s.a. clodinafop-propargil). In caso di miscela versare nella botte prima GRANSTAR COMPRESSE e successivamente gli altri formulati.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONTIENE TRIBENURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO– NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altre officine autorizzate:
Siegfried Agro AG – CH-4800 Zofingen (Svizzera)
Altre taglie autorizzate :
g 15 – 30 - 45
(pari a 2-4-6 compresse da g 7.5 e 1-2-3 compresse da g 15)

FOGLIO ILLUSTRATIVO

GRANSTAR® COMPRESSE

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo

GRANSTAR COMPRESSE
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tribenuron metile p.a. puro g 50
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r. l. - Via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione n. 8369 del 07.08.1993 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: g 75
(contiene 10 compresse da g 7,5) **PARTITA N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea. **Terapia**: sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

EPOCA DI IMPIEGO
In post-emergenza: del frumento tenero e duro e dell'orzo.
Il principio attivo contenuto nelle compresse viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento, GRANSTAR COMPRESSE blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocità di azione.
Dosi d'impiego: da 15 a 30 g/ha (corrispondente a 2 o 4 compresse da g. 7.5); da distribuire con 200-400 litri d'acqua dallo stadio di tre foglie fino a quello di botticella delle colture.
SPETTRO D'AZIONE: E' attivo su: Aneto *(Anethum gravelescens)*, Coriandolo *(Bifora radians)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Ruchetta *(Diplotaxis spp.)*, Camomilla *(Matricaria chamomilla)*, Miagra *(Myagrum perfoliatum)*, Acetosella *(Oxalis cernua)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Correggiola *(Polygonum aviculare)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvulus)*, Rapistro *(Rapistrum rugosum)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Centocchio *(Stellaria media)*. Elevare la dose a 22.5 g/ha (corrispondente a 3 compresse da g. 7.5) in presenza di infestanti molto sviluppate. Per il controllo di Fiordaliso *(Centaurea cyanus)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Geranio *(Geranium dissectum)*, Falsa ortica (Lamium purpureum), Ranuncoli *(Ranunculus spp.)*, Romice *(Rumex spp.)*, Pettine di Venere *(Scandix pecten veneris)*, Veronica *(Veronica persica)*, Veccia *(Vicia spp.)*, Viola *(Viola tricolor)*, si consiglia la dose di 22.5 g/ha (corrispondente a 3 compresse da g. 7.5) con l'aggiunta di bagnante allo 0,1%.
In caso di forti infestazioni di Crisantemo delle messi *(Chrisanthemum segetum)* e Ravanello selvatico *(Raphanus raphanistrum)* applicare GRANSTAR COMPRESSE alla dose di 30 g/ha (corrispondente a 4 compresse da g. 7.5) con Bagnante allo 0,1%.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Le compresse devono essere disciolte nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.
AVVERTENZE
- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
d) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.
- Su varietà di frumento ed orzo di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività.
- Dopo un trattamento con GRANSTAR COMPRESSE si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.
- Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo di azione.

COMPATIBILITA'
GRANSTAR COMPRESSE è compatibile con Platform (s.a. carfentrazone etile), Starane (s.a. fluroxipyr), Gralit Max (s.a. fenoxaprop-p-etile) e con Topik (s.a. clodinafop-propargil). In caso di miscela versare nella botte prima GRANSTAR COMPRESSE e successivamente gli altri formulati.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONTIENE TRIBENURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altre officine autorizzate:
Siegfried Agro AG – CH-4800 Zofingen (Svizzera)
Altre taglie autorizzate :
g 15 – 30 – 45
(pari a 2-4-6 compresse da g 7.5 e 1-2-3 compresse da g 15)

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

GRANSTAR® COMPRESSE

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo

GRANSTAR COMPRESSE
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tribenuron metile p.a. puro g 50
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r. l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione n. 8369 del 07.08.1993 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 75
(contiene 10 compresse da g 7,5) **PARTITA N.**

CONTIENE TRIBENURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA
PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altre officine autorizzate:
SIEGFRIED AGRO AG – CH-4800 Zofingen (Svizzera)
Altre taglie autorizzate :
g 15 – 30 - 45 (pari a 2-4-6 compresse da g 7.5 e 1-2-3 compresse da g 15)

GRANSTAR®

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo - Granuli idrodispersibili

GRANSTAR
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tribenuron metile p.a. puro g 75
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Registrazione n. 7997 del 24.01.1992 del Ministero della Sanita'

Contenuto netto: g 50 **PARTITA N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea. **Terapia**: sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

EPOCA DI IMPIEGO
In post-emergenza: del frumento tenero e duro e dell'orzo contro infestanti a foglia larga.
GRANSTAR viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento, GRANSTAR blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento,necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocita' di azione.

Dosi d'impiego: 10-15 g/ha; da distribuire con 200-400 litri d'acqua dallo stadio di tre foglie fino a quello di botticella delle colture. E' attivo su:Aneto (*Anethum gravelescens*), Coriandolo (*Bifora radians*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Ruchetta (*Diplotaxis spp.*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Miagra (*Myagrum perfoliatum*), Acetosella (*Oxalis cernua*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum avicuiare*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Rapistro (*Rapistrum rugosum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*).
Per il controllo di Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Geranio (*Geranium dissectum*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Ranuncoli (*Ranunculus* spp.), Romice (*Rumex* spp.), Pettine di Venere (*Scandix pecten veneris*), Veronica (*Veronica persica*), Veccia (*Vicia* spp.), Viola (*Viola tricolor*), si consiglia la dose di 15 g/ha con l'aggiunta di bagnante allo 0,1%.
In caso di forti infestazioni di Crisantemo delle messi (*Chrisanthemum segetum*) e Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*) applicare GRANSTAR alla dose di 20 g/ha con Bagnante allo 0,1%.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Il GRANSTAR, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento;portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE
- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Subito dopo il trattamento e' importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
d) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.
- Su varieta' di frumento ed orzo di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettivita'.
- Dopo un trattamento con GRANSTAR si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.
- Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo di azione.

COMPATIBILITA'
GRANSTAR e' compatibile con Platform (s.a. carfentrazone etile), Starane (s.a. fluroxipyr), Gralit Max (s.a. fenoxaprop-p-etile) e con Topik (s.a. clodinafop-propargil). In caso di miscela versare nella botte prima GRANSTAR e successivamente gli altri formulati.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONTIENE TRIBENURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO– NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altra taglia autorizzata: g 100

FOGLIO ILLUSTRATIVO

GRANSTAR®

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo - Granuli idrodispersibili

GRANSTAR
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tribenuron metile p.a. puro g 75
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Registrazione n. 7997 del 24.01.1992 del Ministero della Sanita'

Contenuto netto: g 50 **PARTITA N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea. **Terapia**: sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

EPOCA DI IMPIEGO
In post-emergenza: del frumento tenero e duro e dell'orzo contro infestanti a foglia larga.
GRANSTAR viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento, GRANSTAR blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento,necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocita' di azione.

Dosi d'impiego: 10-15 g/ha; da distribuire con 200-400 litri d'acqua dallo stadio di tre foglie fino a quello di botticella delle colture. E' attivo su:Aneto (*Anethum gravelescens*), Coriandolo (*Bifora radians*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Ruchetta (*Diplotaxis spp.*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Miagra (*Myagrum perfoliatum*), Acetosella (*Oxalis cernua*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Rapistro (*Rapistrum rugosum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*).
Per il controllo di Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Geranio (*Geranium dissectum*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Ranuncoli (*Ranunculus* spp.), Romice (*Rumex* spp.), Pettine di Venere (*Scandix pecten veneris*), Veronica (*Veronica persica*), Veccia (*Vicia* spp.), Viola (*Viola tricolor*), si consiglia la dose di 15 g/ha con l'aggiunta di bagnante allo 0,1%.
In caso di forti infestazioni di Crisantemo delle messi (*Chrisanthemum segetum*) e Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*) applicare GRANSTAR alla dose di 20 g/ha con Bagnante allo 0,1%.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Il GRANSTAR, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento;portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE
- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Subito dopo il trattamento e' importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
d) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.
- Su varieta' di frumento ed orzo di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettivita'.
- Dopo un trattamento con GRANSTAR si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.
- Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo di azione.

COMPATIBILITA'
GRANSTAR e' compatibile con Platform (s.a. carfentrazone etile), Starane (s.a. fluroxipyr), Gralit Max (s.a. fenoxaprop-p-etile) e con Topik (s.a. clodinafop-propargil). In caso di miscela versare nella botte prima GRANSTAR e successivamente gli altri formulati.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONTIENE TRIBENURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO– NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altra taglia autorizzata: g 100

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

GRANSTAR®

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza
del frumento tenero e duro e dell'orzo .
Granuli idrodispersibili

GRANSTAR
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tribenuron metile p.a. puro g 75
Coformulanti q. b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione n. 7997 del 24.01.1992 del Ministero della Sanita'

Contenuto netto: g 50 PARTITA N.

CONTIENE TRIBENURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA
PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altra taglia autorizzata: g 100

GRANSTAR®

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo.
Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

GRANSTAR
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tribenuron metile p.a. puro g 75
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Registrazione n. 7997 del 24.01.1992 del Ministero della Sanita'

Contenuto netto: g 10 PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea. **Terapia**: sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

EPOCA DI IMPIEGO
In post-emergenza: del frumento tenero e duro e dell'orzo contro infestanti a foglia larga.
GRANSTAR viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento, GRANSTAR blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento,necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocita' di azione.

Dosi d'impiego: 10-15 g/ha; da distribuire con 200-400 litri d'acqua dallo stadio di tre foglie fino a quello di botticella delle colture. E' attivo su:Aneto (*Anethum graveloscens*), Coriandolo (*Bifora radians*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Ruchetta (*Diplotaxis spp.*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Miagra (*Myagrum perfoliatum*), Acetosella (*Oxalis cernua*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Rapistro (*Rapistrum rugosum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*).
Per il controllo di Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Geranio (*Geranium dissectum*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Ranuncoli (*Ranunculus* spp.), Romice (*Rumex* spp.), Pettine di Venere (*Scandix pecten veneris*), Veronica (*Veronica persica*), Veccia (*Vicia* spp.), Viola (*Viola tricolor*), si consiglia la dose di 15 g/ha con l'aggiunta di bagnante allo 0,1%.
In caso di forti infestazioni di Crisantemo delle messi (*Chrisanthemum segetum*) e Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*) applicare GRANSTAR alla dose di 20 g/ha con Bagnante allo 0,1%.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Il GRANSTAR, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento;portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE
- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Subito dopo il trattamento e' importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio: risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
d) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.
- Su varieta' di frumento ed orzo di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettivita'.
- Dopo un trattamento con GRANSTAR si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.
- Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo di azione.

COMPATIBILITA'
GRANSTAR e' compatibile con Platform (s.a. carfentrazone etile), Starane (s.a. fluroxipyr), Gralit Max (s.a. fenoxaprop-p-etile) e con Topik (s.a. clodinafop-propargil). In caso di miscela versare nella botte prima GRANSTAR e successivamente gli altri formulati.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONTIENE TRIBENURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altra taglia autorizzata:
g 15 (contiene 1 sacchetto idrosolubile da g 15)
g 100 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da g 10)
g 150 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da 15 g)

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

GRANSTAR®

Erbicida in sacchetto idrosolubile selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tribenuron metile p.a. puro g 75
Coformulanti q. b. a 100

Contenuto netto: g 10

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione n. 7997 del 24.01.1992 del Ministero della Sanità

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

AVVERTENZA: Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

Altra taglia autorizzata:
g 15 (contiene 1 sacchetto idrosolubile da g 15)
g 100 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da g 10)
g 150 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da 15 g)

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1	2	3	4	5	6
Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua	Assicurarsi di avere le mani asciutte	Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo	Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte	Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)	Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni soprariportate fa' sì che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato, pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

GRID®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il mais
Granuli idrodispersibili

GRID
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron puro g 50
Tifensulfuron-metile puro g 25
Coformulanti q. b. 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21).Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60) Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay Francia

Registrazione N. 9237 del 31.05.1997 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 20 **Partita N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono noti casi di intossicazione. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche d'azione
GRID blocca la crescita delle infestanti sensibili con sintomi visibili (ingiallimenti, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5-10 giorni dall'applicazione.
GRID, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiché GRID non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento dell'accrescimento.
Infestanti graminacee sensibili: *Avena spp.* (Avena selvatica), *Digitaria spp.* (Sanguinella), *Echinochloa spp.* (Giavone), *Panicum dichotomiflorum* (Panico delle risaie), *Panicum miliaceum* (Panico coltivato), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum bicolor e Sorghum halepense da seme e da rizoma* (Sorghetta).
Infestanti a foglia larga sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Ambrosia spp.* (Ambrosia), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Bidens bipinnata* (Forbicine), *Capsella bursa-pastoris* (Borsapastore), *Chenopodium spp.* (Chenopodio), *Cirsium spp.* (Stoppione), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio), *Calystegia sepium* (Vilucchio bianco), *Datura stramonium* (Stramonio), *Diplotaxis spp.* (Rucola violacea), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Helianthus tuberosus* (Topinanbur), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Mentha arvensis* (Menta campestre), *Picris echioides* (Aspraggine comune), *Portulaca olearacea* (Erba porcellana), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Rapistrum rugosum* (Miagro peloso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus spp.* (Crespino), *Stachis annua* (Stachis) e *Xanthium spp.* (Nappola).
EPOCA – DOSI – MODALITA' D'IMPIEGO
GRID si applica in post-emergenza, allo stadio compreso tra le 2 e le 6 foglie della coltura.
Dosi d'impiego: 20-25 g/ha addizionati con bagnante non ionico allo 0.2-0.3%. La dose minore è consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali; la dose maggiore è consigliata su infestanti perenni, annuali già sviluppate e Digitaria spp.
Nei terreni torbosi o contro infestanti a nascita scalare ed in genere contro infestanti perennanti può essere utile frazionare gli interventi, trattando con 15 g/ha seguiti da una seconda applicazione a 10 g/ha circa 10-15 giorni dopo.
In ogni caso è necessario aggiungere un bagnante non ionico allo 0.2-0.3%.
Eventuali sarchiature alla coltura trattata devono essere effettuate, in presenza di infestanti perenni, non prima di 8-10 giorni dal trattamento.
In presenza di Solanum nigrum è consigliata la miscela con un erbicida ad attività specifica.
Volumi di irrorazione: 200-400 litri/ha.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
GRID, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.
AVVERTENZE AGRONOMICHE
- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C.
-Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Non applicare GRID su foglie bagnate dalla rugiada.
- Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione del prodotto possono compromettere l'attività erbicida.
- Si raccomanda di usare l'attrezzatura di distribuzione perfettamente pulita da applicazioni di altri prodotti fitosanitari.
Subito dopo il trattamento con GRID è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere una volta le istruzioni indicate al punto b).
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione. Le pratiche colturali come le lavorazioni e l'alternanza di erbicidi con diverso meccanismo d'azione, possono aiutare nel ritardare la comparsa di biotipi resistenti.

COMPATIBILITA'
GRID può essere miscelato con prodotti a base di dicamba, piridate, terbutilazina, bromoxinil. In caso di miscele con altri prodotti, versare nella botte prima GRID e successivamente gli altri formulati.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione effettuata.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si sconsiglia l'impiego di GRID su mais dolce, mais a cariossidi bianche, mais vitreo, mais da pop corn , linee pure di mais per la produzione ci seme e mais di secondo raccolto in successione a cereali.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi :
-applicazione su nuove varietà;
-applicazioni in miscela con nuovi prodotti fitosanitari.
Si sconsiglia l'impiego di GRID su colture precedentemente trattate con gli insetticidi organofosforici : forate, terbufos, isofenfos, parathion, usati localizzati alla semina.
Trattamenti insetticidi all'apparato fogliare con prodotti organofosforici devono essere distanziati di almeno 7 giorni dall'applicazione di GRID. In caso di necessità la risemina nei terreni già precedentemente trattati con GRID è possibile solo con mais.
Trascorsi 90 giorni dall'applicazione di GRID, non vi è limitazione alcuna per le colture in rotazione.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 80 giorni prima della raccolta del mais.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altre taglie autorizzate: g 25 – g 50 – g 100
Altra officina autorizzata: E.I. Du Pont de Nemours – El Paso – Illinois (USA)

FOGLIO ILLUSTRATIVO

GRID®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il mais
Granuli idrodispersibili

GRID
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron puro g 50
Tifensulfuron-metile puro g 25
Coformulanti q. b. 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21).Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60) Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337

Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay Francia

Registrazione N. 9237 del 31.05.1997 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 20 **Partita N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono noti casi di intossicazione. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Terapia**: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche d'azione
GRID blocca la crescita delle infestanti sensibili con sintomi visibili (ingiallimenti, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5-10 giorni dall'applicazione.
GRID, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiché GRID non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento dell'accrescimento.
Infestanti graminacee sensibili: *Avena spp.* (Avena selvatica), *Digitaria spp.* (Sanguinella), *Echinochloa spp.* (Giavone), *Panicum dichotomiflorum* (Panico delle risaie), *Panicum miliaceum* (Panico coltivato), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum bicolor e Sorghum halepense da seme e da rizoma* (Sorghetta).
Infestanti a foglia larga sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Ambrosia spp.* (Ambrosia), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Bidens bipinnata* (Forbicine), *Capsella bursa-pastoris* (Borsapastore), *Chenopodium spp.* (Chenopodio), *Cirsium spp.* (Stoppione), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio), *Calystegia sepium* (Vilucchio bianco), *Datura stramonium* (Stramonio), *Diplotaxis spp.* (Rucola violacea), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Helianthus tuberosus* (Topinambur), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Mentha arvensis* (Menta campestre), *Picris echioides* (Aspraggine comune), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Rapistrum rugosum* (Miagro peloso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus spp.* (Crespino), *Stachis annua* (Stachis) e *Xanthium spp.* (Nappola).
EPOCA – DOSI – MODALITA' D'IMPIEGO
GRID si applica in post-emergenza, allo stadio compreso tra le 2 e le 6 foglie della coltura.
Dosi d'impiego: 20-25 g/ha addizionati con bagnante non ionico allo 0.2-0.3%.
La dose minore è consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali; la dose maggiore è consigliata su infestanti perenni, annuali già sviluppate e Digitaria spp.
Nei terreni torbosi o contro infestanti a nascita scalare ed in genere contro infestanti perennanti può essere utile frazionare gli interventi, trattando con 15 g/ha seguiti da una seconda applicazione a 10 g/ha circa 10-15 giorni dopo.
In ogni caso è necessario aggiungere un bagnante non ionico allo 0.2-0.3%.
Eventuali sarchiature alla coltura trattata devono essere effettuate, in presenza di infestanti perenni, non prima di 8-10 giorni dal trattamento.
In presenza di Solanum nigrum è consigliata la miscela con un erbicida ad attività specifica.
Volumi di irrorazione: 200-400 litri/ha.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
GRID, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.
AVVERTENZE AGRONOMICHE
- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C.
-Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Non applicare GRID su foglie bagnate dalla rugiada.
- Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione del prodotto possono compromettere l'attività erbicida.
- Si raccomanda di usare l'attrezzatura di distribuzione perfettamente pulita da applicazioni di altri prodotti fitosanitari.
Subito dopo il trattamento con GRID è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere una volta le istruzioni indicate al punto b).
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione. Le pratiche colturali come le lavorazioni e l'alternanza di erbicidi con diverso meccanismo d'azione, possono aiutare nel ritardare la comparsa di biotipi resistenti.

COMPATIBILITA'
GRID può essere miscelato con prodotti a base di dicamba, piridate, terbutilazina, bromoxinil. In caso di miscele con altri prodotti, versare nella botte prima GRID e successivamente gli altri formulati.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione effettuata.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si sconsiglia l'impiego di GRID su mais dolce, mais a cariossidi bianche, mais vitreo, mais da pop corn , linee pure di mais per la produzione di seme e mais di secondo raccolto in successione a cereali.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi :
-applicazione su nuove varietà;
-applicazioni in miscela con nuovi prodotti fitosanitari.
Si sconsiglia l'impiego di GRID su colture precedentemente trattate con gli insetticidi organofosforici : forate, terbufos, isofenfos, parathion, usati localizzati alla semina.
Trattamenti insetticidi all'apparato fogliare con prodotti organofosforici devono essere distanziati di almeno 7 giorni dall'applicazione di GRID. In caso di necessità la risemina nei terreni già precedentemente trattati con GRID è possibile solo con mais.
Trascorsi 90 giorni dall'applicazione di GRID, non vi è limitazione alcuna per le colture in rotazione.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 80 giorni prima della raccolta del mais.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altre taglie autorizzate: g 25 – g 50 – g 100
Altra officina autorizzata: E.I. Du Pont de Nemours – El Paso – Illinois (USA)

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

GRID®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il mais
Granuli idrodispersibili

GRID
COMPOSIZIONE
Rimsulfuron puro g 50
Tifensulfuron-metile puro g 25
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21).Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60) Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337

Officina di Produzione:
DuPont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione N. 9237 del 31.05.1997 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: g 20

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altre taglie autorizzate: g 25 – g 50 – g 100
Altra officina autorizzata: E.I. DuPont de Nemours – El Paso – Illinois

GULLIVER®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il riso
Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Azimsulfuron puro g 50
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione N. 9181 del 27.03.1997 del Ministero della Sanita'
Contenuto netto: g 80 - 100 **Partita N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: Possibile irritazione di occhi, pelle e membrane mucose; se inalato può causare irritazione al sistema respiratorio; **sintomi di successiva comparsa:** vomito, salivazione, indebolimento generale ed eccitazione.
Informazioni di pronto soccorso: allontanare la persona intossicata dall'area contaminata; provvedere a lavare occhi e pelle con una grande quantità di acqua; in caso di ingestione e se la persona intossicata è cosciente, provocarne il vomito; in ogni caso non lasciare mai da sola la persona intossicata.
Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche d'azione
GULLIVER è un erbicida di post-emergenza che viene assorbito dalle foglie e dalle radici delle infestanti e traslocato verso i punti di accrescimento delle stesse. Immediatamente dopo l'assorbimento di GULLIVER le infestanti arrestano il loro sviluppo e la loro competizione nei confronti della coltura del riso; i sintomi visibili appaiono circa 10-15 giorni dopo l'applicazione, tipicamente come ingiallimenti, necrosi e successiva morte.
Poiché GULLIVER non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Risultano essere sensibili a GULLIVER le seguenti infestanti tipiche della coltura del riso: *Echinochloa spp.* (giavoni), *Bolboschoenus (scirpus) maritimus* (cipollino), *Schoenoplectus (scirpus) mucronatus* (quadrettone), *Cyperus difformis* (zigolo delle risaie), *Cyperus serotinus* (porro), *Alisma plantago-acquatica* (cucchiaio), *Alisma lanceolatum* (cucchiaio stretto), *Ammania coccinea* (ammania), *Butomus umbellatus* (giunco fiorito), *Heteranthera reniformis* (eterantera), *Heteranthera limosa* (eterantera) *Lindernia dubia* (falso anagallide), *Typha latifolia* (tifa), *Potamogetum nodosus* (lingua d'acqua), *Selenastrum capricornutum* (alga), *Lemna gibba* (lemna).
Epoca d'impiego
GULLIVER si applica in post-emergenza della coltura e delle infestanti su terreni sommersi da almeno 10 cm di acqua.
GULLIVER deve essere applicato su riso allo stadio compreso tra le 3 foglie e l'accestimento.
Per quanto riguarda lo stadio delle infestanti, il momento ottimale di intervento è, per le specie sottoindicate, il seguente:
- *Echinochloa* spp. (giavoni): dallo stadio di 1 a 4 foglie, comunque prima dell'inizio accestimento.
- Altre monocotiledoni non graminacee e dicotiledoni:
da seme: dallo stadio di 1 a 4-6 foglie; da rizoma: da plantula sino allo stadio che precede l'emissione dello scapo florale.
Dose di impiego: 40-50 g/ha addizionato ad un bagnante non ionico allo 0,1% utilizzando il dosaggio più elevato nel caso in cui *Echinochloa* spp. (giavoni) abbiano 4 foglie.
Volume di irrorazione: 200-400 litri/ha utilizzando ugelli a ventaglio e pressioni di esercizio medio-basse (1-2 atmosfere).

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Dopo l'applicazione di GULLIVER, al fine di assicurare un'efficace controllo delle infestanti, è necessaria una corretta gestione delle acque di risaia come indicata qui di seguito:
- in condizioni di risaia sommersa da 10 cm di acqua questa, senza ulteriori immissioni, deve rimanere ferma all'interno delle camere per un periodo di almeno 7 giorni. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali ed attacchi di parassiti.
Dopo l'impiego di GULLIVER, eventuali trattamenti con erbicidi contenenti Propanil, dovranno essere effettuati non prima di 10 giorni.
Su terreni precedentemente trattati con GULLIVER, si raccomanda di seminare nella stagione successiva solo riso, soia, mais o loietto.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.
Non scaricare le acque provenienti dagli appezzamenti trattati in canali distanti meno di 1 km da corsi d'acqua permanenti
- Subito dopo il trattamento con GULLIVER è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
c) Ripetere una volta le istruzioni indicate al punto b).
d)Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto b). Risciacquare con acqua pulita.
Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
GULLIVER, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento.portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante non ionico nella quantità necessaria solo dopo avere versato GULLIVER nell'irroratore.
COMPATIBILITA'
GULLIVER non è compatibile con gli erbicidi comunemente impiegati in risaia.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione effettuata.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:
- applicazioni su nuove varietà
- applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altra officina autorizzata:
Du Pont Australia Ltd – Girraween, NSW

FOGLIO ILLUSTRATIVO

GULLIVER®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il riso
Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Azimsulfuron puro g 50
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, ne bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione N. 9181 del 27.03.1997 del Ministero della Sanita'
Contenuto netto: g 80 - 100 **Partita N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: Possibile irritazione di occhi, pelle e membrane mucose; se inalato può causare irritazione al sistema respiratorio; **sintomi di successiva comparsa:** vomito, salivazione, indebolimento generale ed eccitazione.
Informazioni di pronto soccorso: allontanare la persona intossicata dall'area contaminata; provvedere a lavare occhi e pelle con una grande quantità di acqua; in caso di ingestione e se la persona intossicata è cosciente, provocarne il vomito; in ogni caso non lasciare mai da sola la persona intossicata.
Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche d'azione
GULLIVER è un erbicida di post-emergenza che viene assorbito dalle foglie e dalle radici delle infestanti e traslocato verso i punti di accrescimento delle stesse. Immediatamente dopo l'assorbimento di GULLIVER le infestanti arrestano il loro sviluppo e la loro competizione nei confronti della coltura del riso; i sintomi visibili appaiono circa 10-15 giorni dopo l'applicazione, tipicamente come ingiallimenti, necrosi e successiva morte.
Poiché GULLIVER non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Risultano essere sensibili a GULLIVER le seguenti infestanti tipiche della coltura del riso: *Echinochloa spp.* (giavoni), *Bolboschoenus (scirpus) maritimus* (cipollino), *Schoenoplectus (scirpus) mucronatus* (quadrettone), *Cyperus difformis* (zigolo delle risaie), *Cyperus serotinus* (porro), *Alisma plantago-acquatica* (cucchiaio), *Alisma lanceolatum* (cucchiaio stretto), *Ammania coccinea* (ammania), *Butomus umbellatus* (giunco fiorito), *Heteranthera reniformis* (eterantera), *Heteranthera limosa* (eterantera) *Lindernia dubia* (falso anagallide), *Typha latifolia* (tifa), *Potamogetum nodosus* (lingua d'acqua), *Selenastrum capricornutum* (alga), *Lemna gibba* (lemna).
Epoca d'impiego
GULLIVER si applica in post-emergenza della coltura e delle infestanti su terreni sommersi da almeno 10 cm di acqua.
GULLIVER deve essere applicato su riso allo stadio compreso tra le 3 foglie e l'accestimento.
Per quanto riguarda lo stadio delle infestanti, il momento ottimale di intervento è, per le specie sottoindicate, il seguente:
- *Echinochloa* spp. (giavoni): dallo stadio di 1 a 4 foglie, comunque prima dell'inizio accestimento.
- Altre monocotiledoni non graminacee e dicotiledoni:
da seme: dallo stadio di 1 a 4-6 foglie; da rizoma: da plantula sino allo stadio che precede l'emissione dello scapo fiorale.
Dose di impiego: 40-50 g/ha addizionato ad un bagnante non ionico allo 0,1% utilizzando il dosaggio più elevato nel caso in cui *Echinochloa* spp. (giavoni) abbiano 4 foglie.
Volume di irrorazione: 200-400 litri/ha utilizzando ugelli a ventaglio e pressioni di esercizio medio-basse (1-2 atmosfere).

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Dopo l'applicazione di GULLIVER, al fine di assicurare un'efficace controllo delle infestanti, è necessaria una corretta gestione delle acque di risaia come indicata qui di seguito:
- in condizioni di risaia sommersa da 10 cm di acqua questa, senza ulteriori immissioni, deve rimanere ferma all'interno delle camere per un periodo di almeno 7 giorni. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali ed attacchi di parassiti.
Dopo l'impiego di GULLIVER, eventuali trattamenti con erbicidi contenenti Propanil, dovranno essere effettuati non prima di 10 giorni.
Su terreni precedentemente trattati con GULLIVER, si raccomanda di seminare nella stagione successiva solo riso, soia, mais o loietto.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.
Non scaricare le acque provenienti dagli appezzamenti trattati in canali distanti meno di 1 km da corsi d'acqua permanenti
- Subito dopo il trattamento con GULLIVER è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
c) Ripetere una volta le istruzioni indicate al punto b).
d)Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto b). Risciacquare con acqua pulita.
Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
GULLIVER, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento;portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante non ionico nella quantità necessaria solo dopo avere versato GULLIVER nell'irroratore.
COMPATIBILITA'
GULLIVER non è compatibile con gli erbicidi comunemente impiegati in risaia.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione effettuata.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:
- applicazioni su nuove varietà
- applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altra officina autorizzata:
Du Pont Australia Ltd – Girraween, NSW

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

GULLIVER®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il riso
Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Azimsulfuron puro g 50
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione N. 9181 del 27.03.1997 del Ministero della Sanita'
Contenuto netto: g 80 **Partita N.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altra officina autorizzata:
Du Pont Australia Ltd – Girraween, NSW
Altra taglia autorizzata: g 100

GULLIVER®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il riso
Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Azimsulfuron puro g 50
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione N. 9181 del 27.03.1997 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: g 40 **Partita N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: Possibile irritazione di occhi, pelle e membrane mucose; se inalato può causare irritazione al sistema respiratorio; **sintomi di successiva comparsa:** vomito, salivazione, indebolimento generale ed eccitazione.
Informazioni di pronto soccorso: allontanare la persona intossicata dall'area contaminata; provvedere a lavare occhi e pelle con una grande quantità di acqua; in caso di ingestione e se la persona intossicata è cosciente, provocarne il vomito; in ogni caso non lasciare mai da sola la persona intossicata.
Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche d'azione
GULLIVER è un erbicida di post-emergenza che viene assorbito dalle foglie e dalle radici delle infestanti e traslocato verso i punti di accrescimento delle stesse. Immediatamente dopo l'assorbimento di GULLIVER le infestanti arrestano il loro sviluppo e la loro competizione nei confronti della coltura del riso; i sintomi visibili appaiono circa 10-15 giorni dopo l'applicazione, tipicamente come ingiallimenti, necrosi e successiva morte.
Poiché GULLIVER non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Risultano essere sensibili a GULLIVER le seguenti infestanti tipiche della coltura del riso: *Echinochloa spp.* (giavoni), *Bolboschoenus (scirpus) maritimus* (cipollino), *Schoenoplectus (scirpus) mucronatus* (quadrettone),*Cyperus difformis* (zigolo delle risaie),*Cyperus serotinus* (porro), *Alisma plantago-acquatica* (cucchiaio), *Alisma lanceolatum* (cucchiaio stretto), *Ammania coccinea* (ammania), *Butomus umbellatus* (giunco fiorito), *Heteranthera reniformis* (eterantera), *Heteranthera limosa* (eterantera) *Lindernia dubia* (falso anagallide), *Typha latifolia* (tifa), *Potamogetum nodosus* (lingua d'acqua), *Selenastrum capricornutum* (alga), *Lemna gibba* (lemna).
Epoca d'impiego
GULLIVER si applica in post-emergenza della coltura e delle infestanti su terreni sommersi da almeno 10 cm di acqua.
GULLIVER deve essere applicato su riso allo stadio compreso tra le 3 foglie e l'accestimento.
Per quanto riguarda lo stadio delle infestanti, il momento ottimale di intervento è, per le specie sottoindicate, il seguente:
- *Echinochloa spp.* (giavoni): dallo stadio di 1 a 4 foglie, comunque prima dell'inizio accestimento.
- Altre monocotiledoni non graminacee e dicotiledoni:
da seme: dallo stadio di 1 a 4-6 foglie; da rizoma: da plantula sino allo stadio che precede l'emissione dello scapo fiorale.
Dose di impiego: 40-50 g/ha addizionato ad un bagnante non ionico allo 0,1% utilizzando il dosaggio più elevato nel caso in cui *Echinochloa spp.* (giavoni) abbiano 4 foglie.
Volume di irrorazione: 200-400 litri/ha utilizzando ugelli a ventaglio e pressioni di esercizio medio-basse (1-2 atmosfere).

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Dopo l'applicazione di GULLIVER, al fine di assicurare un'efficace controllo delle infestanti, è necessaria una corretta gestione delle acque di risaia come indicata qui di seguito:
- in condizioni di risaia sommersa da 10 cm di acqua questa, senza ulteriori immissioni, deve rimanere ferma all'interno delle camere per un periodo di almeno 7 giorni. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali ed attacchi di parassiti.
Dopo l'impiego di GULLIVER, eventuali trattamenti con erbicidi contenenti Propanil, dovranno essere effettuati non prima di 10 giorni.
Su terreni precedentemente trattati con GULLIVER, si raccomanda di seminare nella stagione successiva solo riso, soia, mais o loietto.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.
Non scaricare le acque provenienti dagli appezzamenti trattati in canali distanti meno di 1 km da corsi d'acqua permanenti
- Subito dopo il trattamento con GULLIVER è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
c) Ripetere una volta le istruzioni indicate al punto b).
d) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto b). Risciacquare con acqua pulita.
Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
GULLIVER, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento;portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante non ionico nella quantità necessaria solo dopo avere versato GULLIVER nell'irroratore.
COMPATIBILITA'
GULLIVER non è compatibile con gli erbicidi comunemente impiegati in risaia.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione effettuata.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:
- applicazioni su nuove varietà
- applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altra taglia autorizzata:
200 g (contiene 5 sacchetti idrosolubili da 40 g)

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

GULLIVER®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il riso
Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Azimsulfuron puro g 50
Coformulanti q. b. a 100

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione N. 9181 del 27.03.1997 del Ministero della Sanità

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto netto: g 40 **Partita N.**

AVVERTENZA: Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

Altra taglia autorizzata:
200 g (contiene 5 sacchetti idrosolubili da 40 g)

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1. Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua
2. Assicurarsi di avere le mani asciutte
3. Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo
4. Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte
5. Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)
6. Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni sopranriportate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

HARMONY®

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di mais, frumento tenero e duro, orzo a semina primaverile, avena e soia
Granuli idrodispersibili

HARMONY
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tifensulfuron metile puro g 75
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Registrazione N. 7946 del 06.02.1991 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 50 **PARTITA N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.
Terapia: Sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
HARMONY è un erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di: mais, frumento tenero e duro, orzo a semina primaverile, avena e soia.
HARMONY viene assorbito dalle foglie delle piante trattate.
La traslocazione, sia acropeta che basipeta, è piuttosto rapida.
HARMONY, subito dopo l'assorbimento, blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Le malerbe non devitalizzate sono drasticamente ridotte nello sviluppo e sono molto meno competitive nei riguardi della coltura. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono l'attività erbicida. HARMONY, ove necessario, puo' essere usato in miscela con altri diserbanti selettivi per il controllo di malerbe non sensibili.
DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO
Dosi da distribuire con 300-600 litri d'acqua in post-emergenza sia della coltura che delle infestanti.
Mais: HARMONY si usa alla dose di 10 g/ha di prodotto formulato addizionato con 100-200 ml di bagrante Trend per 100 litri d'acqua, allo stadio di 4 8 foglie della coltura.
HARMONY risulta attivo su Abutilon, Amaranto, *Ammy maius*, Camomilla, Chenopodio, Poligonacee, *Portulaca oleracea*, *Sonchus arvensis*. Esercita inoltre un'apprezzabile azione di contenimento nei confronti di Xanthium, *Datura stramonium* e Convolvolo. In presenza di infestazioni di *Solanum nigrum* aggiungere un prodotto specifico.
Frumento tenero e duro, orzo a semina primaverile e avena: su colture in post-emergenza, dallo stadio di inizio accestimento sino alla stadio di botticella, HARMONY si usa alla dose di 50-80 g/ha. La dose piu' bassa si applica su infestanti e colture poco sviluppate, la dose piu' alta nei trattamenti tardivi. HARMONY, alle dosi consigliate, e' attivo su: *Adonis aestivalis*, *Allium vineale*, *Amaranthus* spp., *Anthemis cotula*, *Anthriscus* spp., *Bifora radians*, *Brassica* spp., *Capsella bursa pastoris*, *Centaurea cyanus*, *Chenopodium album*, *Cirsium* spp., *Delphinium consolida*, *Galeopsis tetrahit*, *Kochia scoparia*, *Matricaria chamomilla*, *Myosotis* spp., *Papaver rhoeas*, *Polygonum aviculare*, *Polygonum convolvulus*, *Polygonum persicaria*, *Portulaca oleracea*, *Ranunculus acer*, *Rumex* spp., *Sinapis arvensis*, *Stellaria media*, *Thlaspi arvensis*. Il controllo delle infestanti è in ogni caso piu' efficace se l'applicazione di HARMONY è effettuata quando le infestanti sono allo stadio di plantula e in fase di attiva crescita.
Soia: per il controllo di *Amaranthus retroflexus*, applicare HARMONY in post-emergenza della coltura e dell'infestante (allo stadio di 3-4 foglie vere della coltura) alla dose di 10 g/ha senza aggiunta di bagnante.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
HARMONY, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento;portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego.
AVVERTENZE
Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione. Non applicare il prodotto nelle ore più calde della giornata e su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso,carenze nutrizionali, attacchi di parassiti,asfissia radicale: nel caso tale sofferenza si verificasse successivamente al trattamento lo stato di debilitazione della coltura può essere temporaneamente aggravato.
Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio;risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% ca.) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
d) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ipoclorito di sodio al 5% ca.
Su varietà coltivate di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività. Dopo un trattamento con HARMONY si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere. Evitare durante il trattamento che la miscela erbicida possa arrivare su colture limitrofe.
Nello svuotare e lavare l'attrezzatura porre la massima attenzione affinche' il prodotto non arrivi a contatto con colture vicine.
COMPATIBILITA'
HARMONY è fisicamente compatibile con prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive imazethapyr, bentazone e fomesafen. In caso di miscela versare nella botte prima HARMONY e successivamente gli altri formulati.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Non usare HARMONY su orzo a semina autunnale.
Mais: non trattare mais dolce, linee pure di mais per la produzione di seme, colture di mais di secondo raccolto e mais per popcorn; non usare HARMONY su colture sofferenti o nelle ore più calde della giornata.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO– NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altra taglia autorizzata: g 100

FOGLIO ILLUSTRATIVO

HARMONY®

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di mais, frumento tenero e duro, orzo a semina primaverile, avena e soia
Granuli idrodispersibili

HARMONY
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tifensulfuron metile puro g 75
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Registrazione N. 7946 del 06.02.1991 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 50 **PARTITA N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.
Terapia: Sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
HARMONY è un erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di: mais, frumento tenero e duro, orzo a semina primaverile, avena e soia.
HARMONY viene assorbito dalle foglie delle piante trattate.
La traslocazione, sia acropeta che basipeta, è piuttosto rapida.
HARMONY, subito dopo l'assorbimento, blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Le malerbe non devitalizzate sono drasticamente ridotte nello sviluppo e sono molto meno competitive nei riguardi della coltura. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono l'attività erbicida. HARMONY, ove necessario, puo' essere usato in miscela con altri diserbanti selettivi per il controllo di malerbe non sensibili.
DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO
Dosi da distribuire con 300-600 litri d'acqua in post-emergenza sia della coltura che delle infestanti.
Mais: HARMONY si usa alla dose di 10 g/ha di prodotto formulato addizionato con 100-200 ml di bagrante Trend per 100 litri d'acqua, allo stadio di 4 8 foglie della coltura.
HARMONY risulta attivo su Abutilon, Amaranto, *Ammy maius*, Camomilla, Chenopodio, Poligonacee, *Portulaca oleracea*, *Sonchus arvensis*. Esercita inoltre un'apprezzabile azione di contenimento nei confronti di Xanthium, *Datura stramonium* e Convolvolo. In presenza di infestazioni di *Solanum nigrum* aggiungere un prodotto specifico.
Frumento tenero e duro, orzo a semina primaverile e avena: su colture in post-emergenza, dallo stadio di inizio accestimento sino alla stadio di botticella, HARMONY si usa alla dose di 50-80 g/ha. La dose piu' bassa si applica su infestanti e colture poco sviluppate, la dose piu' alta nei trattamenti tardivi. HARMONY, alle dosi consigliate, e' attivo su: *Adonis aestivalis*, *Allium vineale*, *Amaranthus* spp., *Anthemis cotula*, *Anthriscus* spp., *Bifora radians*, *Brassica* spp., *Capsella bursa pastoris*, *Centaurea cyanus*, *Chenopodium album*, *Cirsium* spp., *Delphinium consolida*, *Galeopsis tetrahit*, *Kochia scoparia*, *Matricaria chamomilla*, *Myosotis* spp., *Papaver rhoeas*, *Polygonum aviculare*, *Polygonum convolvulus*, *Polygonum persicaria*, *Portulaca oleracea*, *Ranunculus acer*, *Rumex* spp., *Sinapis arvensis*, *Stellaria media*, *Thlaspi arvensis*. Il controllo delle infestanti è in ogni caso piu' efficace se l'applicazione di HARMONY è effettuata quando le infestanti sono allo stadio di plantula e in fase di attiva crescita.
Soia: per il controllo di *Amaranthus retroflexus*, applicare HARMONY in post-emergenza della coltura e dell'infestante (allo stadio di 3-4 foglie vere della coltura) alla dose di 10 g/ha senza aggiunta di bagnante.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
HARMONY, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento;portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego.
AVVERTENZE
Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione. Non applicare il prodotto nelle ore più calde della giornata e su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso,carenze nutrizionali, attacchi di parassiti,asfissia radicale: nel caso tale sofferenza si verificasse successivamente al trattamento lo stato di debilitazione della coltura può essere temporaneamente aggravato.

Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio;risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% ca.) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
d) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ipoclorito di sodio al 5% ca.
Su varietà coltivate di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività. Dopo un trattamento con HARMONY si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere. Evitare durante il trattamento che la miscela erbicida possa arrivare su colture limitrofe.
Nello svuotare e lavare l'attrezzatura porre la massima attenzione affinche' il prodotto non arrivi a contatto con colture vicine.
COMPATIBILITA'
HARMONY è fisicamente compatibile con prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive imazethapyr, bentazone e fomesafen. In caso di miscela versare nella botte prima HARMONY e successivamente gli altri formulati.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Non usare HARMONY su orzo a semina autunnale.
Mais: non trattare mais dolce, linee pure di mais per la produzione di seme, colture di mais di secondo raccolto e mais per popcorn; non usare HARMONY su colture sofferenti o nelle ore più calde della giornata.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO– NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altra taglia autorizzata: g 100

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

HARMONY®

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di mais, frumento tenero e duro, orzo a semina primaverile, avena e soia - Granuli idrodispersibili

HARMONY
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tifensulfuron metile puro g 75
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Registrazione N. 7946 del 06.02.1991 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 50 **PARTITA N.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altra taglia autorizzata: g 100

HARMONY®

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di mais, frumento tenero e duro, orzo a semina primaverile, avena e soia
Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

HARMONY
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tifensulfuron metile puro g 75
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Registrazione N. 7946 del 06.02.1991 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 10 **PARTITA N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.
Terapia: Sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
HARMONY è un erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di: mais, frumento tenero e duro, orzo a semina primaverile, avena e soia.
HARMONY viene assorbito dalle foglie delle piante trattate.
La traslocazione, sia acropeta che basipeta, è piuttosto rapida.
HARMONY, subito dopo l'assorbimento, blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Le malerbe non devitalizzate sono drasticamente ridotte nello sviluppo e sono molto meno competitive nei riguardi della coltura. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono l'attività erbicida. HARMONY, ove necessario, puo' essere usato in miscela con altri diserbanti selettivi per il controllo di malerbe non sensibili.
DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO
Dosi da distribuire con 300-600 litri d'acqua in post-emergenza sia della coltura che delle infestanti.
Mais: HARMONY si usa alla dose di 10 g/ha di prodotto formulato addizionato con 100-200 ml di bagnante Trend per 100 litri d'acqua, allo stadio di 4-8 foglie della coltura.
HARMONY risulta attivo su Abutilon, Amaranto, *Ammy maius*, Camomilla, Chenopodio, Poligonacee, *Portulaca oleracea*, *Sonchus arvensis*. Esercita inoltre un'apprezzabile azione di contenimento nei confronti di Xanthium, *Datura stramonium* e Convolvolo. In presenza di infestazioni di *Solanum nigrum* aggiungere un prodotto specifico.
Frumento tenero e duro, orzo a semina primaverile e avena: su colture in post-emergenza, dallo stadio di inizio accestimento sino alla stadio di botticella, HARMONY si usa alla dose di 50-80 g/ha. La dose piu' bassa si applica su infestanti e colture poco sviluppate, la dose piu' alta nei trattamenti tardivi. HARMONY, alle dosi consigliate, e' attivo su: *Adonis aestivalis*, *Allium vineale*, *Amaranthus* spp., *Anthemis cotula*, *Anthriscus* spp., *Bifora radians*, *Brassica* spp., *Capsella bursa pastoris*, *Centaurea cyanus*, *Chenopodium album*, *Cirsium* spp., *Delphinium consolida*, *Galeopsis tetrahit*, *Kochia scoparia*, *Matricaria chamomilla*, *Myosotis* spp., *Papaver rhoeas*, *Polygonum aviculare*, *Polygonum convolvulus*, *Polygonum persicaria*, *Portulaca oleracea*, *Ranunculus acer*, *Rumex* spp., *Sinapis arvensis*, *Stellaria media*, *Thlaspi arvensis*. Il controllo delle infestanti è in ogni caso piu' efficace se l'applicazione di HARMONY è effettuata quando le infestanti sono allo stadio di plantula e in fase di attiva crescita.
Soia: per il controllo di *Amaranthus retroflexus*, applicare HARMONY in post-emergenza della coltura e dell'infestante (allo stadio di 3-4 foglie vere della coltura) alla dose di 10 g/ha senza aggiunta di bagnante.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
HARMONY, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento;portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego.
AVVERTENZE
Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione. Non applicare il prodotto nelle ore più calde della giornata e su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso,carenze nutrizionali, attacchi di parassiti,asfissia radicale: nel caso tale sofferenza si verificasse successivamente al trattamento lo stato di debilitazione della coltura può essere temporaneamente aggravato.

Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio;risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% ca.) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
d) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ipoclorito di sodio al 5% ca.
Su varietà coltivate di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività. Dopo un trattamento con HARMONY si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere. Evitare durante il trattamento che la miscela erbicida possa arrivare su colture limitrofe.
Nello svuotare e lavare l'attrezzatura porre la massima attenzione affinche' il prodotto non arrivi a contatto con colture vicine.
COMPATIBILITA'
HARMONY è fisicamente compatibile con prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive imazethapyr, bentazone e fomesafen. In caso di miscela versare nella botte prima HARMONY e successivamente gli altri formulati.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Non usare HARMONY su orzo a semina autunnale.
Mais: non trattare mais dolce, linee pure di mais per la produzione di seme, colture di mais di secondo raccolto e mais per popcorn; non usare HARMONY su colture sofferenti o nelle ore più calde della giornata.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO– NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altre taglie autorizzate
g 20 (contiene 1 sacchetto idrosolubile da g 20)
g 100 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da g 10)
g 100 (contiene 5 sacchetti idrosolubili da g 20)

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

HARMONY®

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di mais, frumento tenero e duro, orzo a semina primaverile, avena e soia
Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

HARMONY
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tifensulfuron metile puro g 75
Coformulanti q. b. a 100

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
telefono 800378337

Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione N. 7946 del 06.02.1991 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 10

AVVERTENZA: Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

Altre taglie autorizzate
g 20 (contiene 1 sacchetto idrosolubile da g 20)
g 100 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da g 10)
g 100 (contiene 5 sacchetti idrosolubili da g 20)

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1. Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua
2. Assicurarsi di avere le mani asciutte
3. Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo
4. Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte
5. Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)
6. Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni sopranportate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

KARMEX®

Erbicida - Polvere Bagnabile

KARMEX
Composizione:
100 grammi di prodotto contengono :
Diuron puro g 80
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R22). Possibilità di effetti irreversibili (R40). Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione (R48/22). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di produzione
Griffin de Colombia S.A. – Barranquilla, Colombia
Registrazione n. 1068 del 09.11.1972 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 0,5 Partita n.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Derivato dell'urea. Sintomi : durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia : Sintomatica.
N.B. - Metaemoglobinemia segnalata; terapia: se è superiore al 30% : blu di metilene, se inferiore vit. C ad alte dosi (3-4 g)

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
Karmex a base di diuron è un erbicida che agisce per assorbimento radicale colpendo tanto le infestanti in via di germinazione quanto quelle in sviluppo.
Dosi - Epoche - Modalità D'impiego
Diserbi selettivi: Karmex elimina erbe annuali ed alcune perennanti allo stadio di giovani piantine. Dà buoni risultati se il terreno, prima del trattamento, è ben lavorato, senza zollosità e libero da erbe. Non lavorare il terreno dopo il trattamento. Agendo per assorbimento radicale è necessario che dopo il trattamento sia portato a contatto con le radici da un certo grado di umidità.
Oliveti: effettuare il trattamento su terreno lavorato, pareggiato e ripulito da erbe nel mese di settembre con 4 kg/ha di prodotto diluiti in 1000 litri d'acqua.
Agrumeti: effettuare il trattamento con kg 2-3/ha nel periodo autunnale (ottobre-novembre) e ripeterlo nel periodo primaverile (marzo-aprile). Il terreno deve essere prima sistemato per l'irrigazione.
Asparagi: di nuovo e vecchio impianto Dosi : kg 0,5/ha in terreni leggeri; kg 0,5/ha in terreni pesanti. Trattare sino a 60 gg prima della raccolta.
Erba medica: su medica di almeno 1 anno di impianto prima della ripresa vegetativa kg 1,5-2 per ettaro in almeno 400 litri d'acqua. Non trattare in terreni sabbiosi o leggeri.
Ribes: su piante di almeno 1 anno di età. Dosi : ottobre - novembre kg 2/ha per il controllo di erbe autunno-invernali. Primavera avanzata : kg 2/ha per il controllo di erbe annuali estive (almeno 60 gg prima dell'inizio della raccolta). Gennaio-Febbraio kg 3/ha per il controllo di erbe invernali ed estive. Meglio i trattamenti separati.
Menta piperita: Dosi :kg 2-3/ha in primavera subito dopo l'ultima lavorazione ma prima dell'emergenza della menta. Irrigare non oltre due settimane dal trattamento. Non trattare la menta già emersa o in terreni sabbiosi o leggeri.
Diserbi totali
Diserbo argini di risaie: effettuare il trattamento dal momento della sistemazione dell'argine o quando le infestanti hanno raggiunto l'altezza non superiore a 5 cm. Sia il terreno umido che la pioggia non pregiudicano la buona riuscita del trattamento. Dosi d'impiego: g 50 per 100 mq con un quantitativo d'acqua di 10 litri (kg 5 per ettaro con 1000 litri d'acqua).
Diserbo totale di aree non coltivate: Dosi: kg 20-60 per ettaro con una quantità di acqua sufficiente ad assicurare una perfetta distribuzione del prodotto sul terreno. I migliori risultati si ottengono eseguendo i trattamenti in primavera all'inizio della ripresa vegetativa o quando si prevede l'inizio di un periodo piovoso.
Contro alghe ed erbe acquatiche Contro alghe, anche di tipo filamentoso e certi tipi di erbe acquatiche sommerse (Najas, Potagemon, Lemna, Utricularia, Carex) in acque non correnti dosi g 1,5 - 2,5 per metro cubo di acqua. Eseguire il trattamento impiegando almeno 500 litri di acqua per ettaro, distribuiti uniformemente sulla superficie da disinfestare. Attenzione: effettuare una distribuzione molto uniforme.

COMPATIBILITÀ : il prodotto va impiegato da solo.
FITOTOSSICITÀ : Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non trattare zone vicine a colture utili o zone dalle quali il prodotto può essere portato a contatto con le radici stesse.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA :
Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altre officine autorizzate :
Hickson & Welch Ltd - Castelford - West Yorkshire (Inghilterra)
Agriformula s.r.l. - Paganica (AQ)
E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)-La Porte, Houston, Texas (USA)
Altre taglie autorizzate : kg 1 - 5 - 10

Sostanza attiva originale Monsanto

KLINAMON® DP

Erbicida sistemico di post-emergenza - Liquido solubile

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE

Glifosate acido puro	g 31 (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico)	g 41.7
Acqua e coadiuvanti	q. b. a 100

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Monsanto Europe N.V. - Antwerp, Scheldelaan 460 (Belgio)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9246 del 12.06.1997

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITÀ D'IMPIEGO
Generalità
KLINAMON DP è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. KLINAMON DP non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microorganismi presenti nell'ambiente.
Attrezzature, volumi d'acqua e miscele
KLINAMON DP consente di ottenere migliori risultati con ugelli a specchio o a ventaglio e ridotti volumi d'acqua. L'addizione alla miscela di 10 kg/ha di solfato ammonico può risultare utile.
Avvertenza: Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse, come siccità, freddo, attacchi parassitari ha efficacia ridotta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento.
Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincato) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

Campi d'impiego.
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: vite, olivo, melo, pero, arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo, kumquat.
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago.
Terreni agrari in assenza della coltura (fragola, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai): prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alle colture agrarie: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi, scoline, aree rurali e industriali, aree ed opere civili.

Dosi d'impiego.
Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata.
In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1 - 2 l / 100 litri d'acqua sulle annuali/bienni e di 2 - 5 l / 100 litri d'acqua sulle perenni.

Dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti.
Annuali e bienni:
1,5 - 4 l/ha: Alopecurus sp., Avena sp., Hordeum murinum, Lolium sp., Mercurialis sp., Poa sp., Riso crodo, Amni majus, Amaranthus sp., Calendula sp., Chenopodium sp., Orobanche sp., Portulaca sp., Raphanus sp., Senecio sp., Sinapis sp., Stellaria sp., Veronica sp..
Perenni:
4 - 5 l/ha: Agropyron repens, Carex sp., Cirsium sp., Euphorbia sp., Glyceria sp., Hipericum sp., Laersia oryzoides, Phalaris sp., Rumex sp., Sonchus sp., Sorghum halepense.
5 - 7 l/ha: Alisma sp., Asfodelus sp., Butomus sp., Cyperus sp., Ferula sp., Juncus sp., Nardus sp., Scirpus sp., Sparganium sp., Tussillago sp.
8 - 10 l/ha: Agrostis sp., Allium sp., Artemisia sp., Arundo sp., Cynodon sp., Eracleum sp., Glechoma sp., Oxalis sp., Paspalum sp., Phragmites sp., Pteridium sp., Ranunculus sp., Rubus sp., Tipha sp., Urtica sp.
12 l/ha: Aristolochia sp., Clematis sp., Convolvulus sp., Rubia peregrina.
Arbusti:
4 - 6 l/ha: Acer sp., Fraxinus sp., Genista sp., Salix sp., Sambucus sp., Vaccinum sp. 10 - 12 l/ha: Calluna sp., Cistus sp., Erica sp., Lonicera sp..

COMPATIBILITA': compatibile con il solfato ammonico.

FITOTOSSICITA': il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati.

Attenzione: da usarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Contenuto netto: Litri 1 **Partita n.**

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altre officine autorizzate:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Siemens 12, Bolzano
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (MI)
ISAGRO S.p.A. - Via Nettunense, km 23.400 Aprilia (LT)

Altre taglie autorizzate:
Litri: 0.25 - 1.5 - 2 - 5 - 10 – 20- 50

KOCIDE® 101

Anticrittogamico Cuprico
Polvere Bagnabile

KOCIDE® 101
Composizione
Rame metallico g 50
(da Rame Idrossido)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione (R22). Tossico per inalazione (R23). Rischio di gravi lesioni oculari (R41). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini (S1/2).
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Proteggersi gli occhi/la faccia (S39).
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S45). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61). In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo (S63).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officine di produzione:
E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) - 12701 Almeda Road, Houston Texas (USA)
STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)
STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Torrenieri (SI)
Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
Scam S.r.l – S. Maria di Mugnano (MO)

Registrazione n. 1389 del 05.10.1973 del Ministero della Sanità
Contenuto netto g 50 – 100 – 200 – 500 kg 1- 5 - 10 Partita n°

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni e collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE: KOCIDE 101 è un anticrittogamico in polvere bagnabile dotato di adesività, persistenza e largo spettro di azione attivo contro varie malattie crittogamiche delle colture arboree ed erbacee di seguito indicate.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: KOCIDE 101 si impiega in poltiglia acquosa nei casi e alle dosi di seguito indicati: g 200-300/hl d'acqua su MELO e PERO: contro cancro delle pomacee e Ticchiolatura nei trattamenti invernali, contro Ticchiolatura alla ripresa vegetativa (ingrossamento gemme) e dopo ripresa vegetativa (orecchiette di topo)
ALBICOCCO: contro Sclerotinia, Marciume bruno, Corineo e Bozzacchioni nei trattamenti autunno-invernali e contro Sclerotinia nei trattamenti pre-fiorali e post-fiorali
NESPOLO: contro il Brusone
ROSA contro Ruggine, Ticchiolatura e Peronospora
CARCIOFO, CARDO, CAVOLO, CICORIA, CIPOLLA, SPINACIO E CUCURBITACEE: contro Peronospora
VITE: contro Peronospora
OLIVO: contro Occhio di pavone e Lebbra
AGRUMI. contro Allupatura e Mal secco
PATATA: contro Peronospora ed Alternaria
POMODORO: contro Peronospora, Septoria, Alternaria e Batteriosi
SEDANO: contro Septoriosi g 500/hl d'acqua
CILIEGIO: contro Sclerotinia, Corineo, Scopazzi alla dose di g 500-1000/hl d'acqua
PISELLO: contro Antracnosi e Peronospora alla dose di g 200-300/hl d'acqua
BARBABIETOLA: contro Cercospora alla dose di kg 2/ha

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale; effettuando i trattamenti con pompe a volume ridotto (somministrando cioè un minore quantitativo d'acqua per ettaro), le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate, in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompa a volume normale. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti, aggiungere alla miscela 50 grammi di bagnante adesivo per ettolitro. Il prodotto può essere impiegato nella preparazione di zolfi ramati per trattamenti polverulenti alla vite mescolando kg 3-4/ha di KOCIDE 101 con kg 25-30 di zolfo in polvere.

COMPATIBILITA': KOCIDE 101 può essere usato in miscela con i più comuni anticrittogamici ed insetticidi impiegando la miscela entro una-due ore dalla preparazione.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Su varietà di melo (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) sensibili ai prodotti cuprici. Il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Non trattare durante la fioritura per l'azione caustica sui fiori.

RISCHI DI NOCIVITA':
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere I trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

KOCIDE® 2000

Fungicida a base di idrossido di rame
Granuli Idrodispersibili

KOCIDE 2000
Composizione
100 g di prodotto contengono:
Rame metallo g 35
(sotto forma di idrossido)
Coformulanti q.b.a 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione (R22). Rischio di gravi lesioni oculari (R41). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia(S36/37/39). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di produzione:
E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) – 12701 Almeda Road – Houston, Texas (USA)
Officine di solo confezionamento:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l – Via Siemens 12 - Bolzano
PRO.PHY.M Sarl - Z.I. Les Attignours – La Chambre (France)
Scam Srl – Strada Bellaria 164, S. Maria di Mugnano (MO)
Lifa S.r.l. – Via Colombo n.7/7°, Vigonovo (VE)
Lifa S.r.l. – Via Piave, Isola Vicentina (VI)
Chemia S.p.A. – Strada Statale 255 Km 46 - S. Agostino (FE)
Alba Milagro International S.p.A. – Reggiolo (RE)
Registrazione n. 10573 del 01.08.2000 del Ministero della Sanità
Contenuto netto g 100–250–500 kg 1-2,5–5–10–20-25 **Partita n°**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE: KOCIDE 2000 è un fungicida a base di Rame idrossido in granuli idrodispersibili. L'estrema finezza delle particelle e l'elevata qualità del processo produttivo garantiscono una particolare fluidità ed adesività del formulato sulla superficie fogliare delle colture trattate. Tali caratteristiche consentono una maggiore attività fungicida e battericida e di conseguenza una notevole riduzione dei dosaggi unitari di rame.
EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Introdurre i granuli nel serbatoio dell'irroratrice, parzialmente riempita d'acqua, e mescolare sino a completa dissoluzione del preparato. Effettuare i trattamenti con pompe a volume normale sulle seguenti colture

Vite	contro Peronospora e Marciume nero degli acini	g 150-200/hl
Melo, Pero	contro Ticchiolatura in pre e post fioritura:	g 150/hl
	contro Cancri del legno (Nectria galligena, Phomopsis mali, Sphaeropsis malorum, Pseudomonas syringae) trattare alla caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme	g 200-250/hl
	contro il Colpo di fuoco. Effettuare due trattamenti nella fase di rigonfiamento delle gemme e punte verdi	g 250/hl
	contro il Colpo di fuoco del pero applicare ogni 5 gg. durante la fioritura	g 500/ha
Albicocco, Susino	contro Corineo, Sclerotinia, Monilia, (Intervenire durante il riposo vegetativo. Evitare il trattamento dopo la fioritura)	g 250/hl
Ciliegio	contro Corineo, Monilia, Scopazzi (per trattamenti invernali) Aggiungere gr. 120/hl di olio minerale bianco (intervenire durante il riposo vegetativo)	g 300/hl
Pesco, Nettarine	contro Bolla e Corineo (per trattamenti a caduta foglie ed a fine inverno)	g 250/hl
	contro Monilia (nella fase dei bottoni rosa)	g 150/hl
	contro Batteriosi (per trattamenti invernali, a caduta foglie ed a fine inverno)	g 250/hl
Agrumi	contro Mal secco, Allupatura, Fumaggine, Lebbra, Antracnosi e Scabbia del limone e dell'arancio (intervenire prima o dopo la fioritura a seconda della pressione della malattia)	g 150/hl
Olivo:	contro Occhio di Pavone, Fumaggine e Lebbra (Intervenire dopo la raccolta ed eventualmente dopo la potatura)	g 200/hl
Mandorlo	contro Corineo, Bolla, Monilia (intervenire dopo la caduta delle foglie e all'ingrossamento delle gemme) e contro Batteriosi (intervenire prima della fase di bottoni rosa)	g 200/hl
Nocciolo	contro Batteriosi (Xanthomonas corylina) con due trattamenti in Ottobre, distanziati di 20-25 giorni.	g 200/hl
Noce	contro Xanthomonas campestris (in pre-fioritura)	g 200/hl
Nespolo	contro Ticchiolatura	g 150/hl
Patata, Pomodoro, Peperone:	contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Batteriosi	g 150-200/hl
Barbabietola da Zucchero	contro Cercospora Iniziare i trattamenti a fine giugno, ripeterli ogni 20-25 giorni, fino a 20 giorni dalla raccolta	kg 1,70/ha
Orticole	(fagiolo, pisello, cavolo, cavolfiore, cavoli di Bruxelles, broccoli, insalate, cardo, carciofo, rapa, carota, ravanello, spinacio, prezzemolo, sedano, finocchio, melanzana, cetriolo, cipolla, aglio, melone, anguria, zucca) contro Peronospora, Alternaria, Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Antracnosi, Septoria, Cercospora,	g 150/hl
Fragola	contro Vaiolatura	kg 1,250/ha
Soia, Girasole:	contro Alternaria, Sclerotinia	g 150/hl
Floreali in pieno campo	contro Ticchiolatura, Peronospora, Ruggine, Antracnosi Batteriosi	g 150/hl
Ornamentali	contro Antracnosi e Maculatura fogliare, Batteriosi, Ticchiolatura, Peronospora	g 150/hl
Riso	contro Alghe verdi Intervenire alla comparsa dell'attacco con un quantitativo di soluzione sufficiente a coprire l'intera superficie	kg 2,5/ha

COMPATIBILITA': **KOCIDE 2000** non è miscibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina e con Tiram.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Su varietà di Melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Rome Beauty, Morgenduft, Staymar Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard), su Pesco, Nettarine e Susino sensibili ai prodotti cuprici, il prodotto può essere tossico, se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Non trattare durante la fioritura per l'azione caustica sui fiori, ad eccezione del pero per il Colpo di fuoco batterico.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

KOCIDE® DF

Fungicida a base di idrossido di rame
Granuli idrodispersibili

KOCIDE® DF
Composizione
100 gr di prodotto contengono:
Rame metallo g 40
(sotto forma di idrossido)
Coformulanti q.b.a 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione (R/22). Rischio di gravi lesioni oculari (R41). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia (S36/37/39). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di produzione:
E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) - 12701 Almeda Road, Houston Texas (USA)
Officine di solo confezionamento:
Ital-Agro S.a.s. – Via Cravero 110, Grugliasco (TO)
Scam S.r.l. – Str. Bellaria 164, S. Maria di Mugnano (MO)
Bayer CropScience S.r.l. – Via delle Industrie, 9 Filago (BG)
Chemia S.p.A. – S.S. 255 km 46, S. Agostino (FE)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. – Z.I. Les Attignours, La Chambre (Francia)
Alba Milagro International S.p.A. – Via dei Bacini, 88 Reggiolo (RE)

Registrazione n. 8505 del 30.04.1994 del Ministero della Sanità
Contenuto netto g 100-500 - kg 1-5-10-20 Partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno eapatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione dei metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione lattoalbuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE: KOCIDE® DF è un fungicida a base di Rame idrossido in granuli idrodispersibili. Tale formulazione garantisce un'ottima fluidità del prodotto, nonché elevata adesività e persistenza sulle colture trattate.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Introdurre i granuli nel serbatoio dell'irroratrice, parzialmente riempita d'acqua, e mescolare sino a completa dissoluzione del preparato. Le dosi indicate si riferiscono a 100 lt d'acqua e per trattamenti con pompe a volume normale.

Melo, Pero	contro Ticchiolatura e Cancro nei trattamenti autunno-invernali	g 500-1000
	nei trattamenti primaverili	g 200-300
Drupacee e mandorlo	contro Sclerotinia, Corineo, Bolla nei trattamenti autunno-invernali	g 500-1000
Vite	contro Peronospora, Black-rot, Antracnosi	g 200-300
Agrumi	contro Fumaggine, Mal secco, Allupatura, Gommosi del colletto, Batteriosi	g 200-300
Orticole	(carciofo, cardo, carota, cavolo, cetriolo, cicoria, cipolla, fagiolo, lattuga, melanzana, melone, patata pomodoro, peperone, pisello, rapa, ravanello, sedano, spinacio, prezzemolo, zucca): contro Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Cercospora, Batteriosi, Septoriosi	g 200-300
Olivo	contro Fumaggine, Occhio di Pavone	g 200-300
Barbabietola da zucchero	contro Peronospora, Cercospora	kg 3-3,5/ha
Fragola	contro Vaiolatura	g 200-300
Floreali in pieno campo	contro Ruggine, Peronospora	gr 200-300
Riso	contro Alghe verdi, intervenire alla comparsa dell'attacco con un quantitativo di soluzione sufficiente a coprire l'intera superficie	kg 2,80-3,65/ha

COMPATIBILITA': KOCIDE®DF non è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina e con Tiram.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Su varietà di Melo (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard), su Drupacee sensibili ai prodotti cuprici, il prodotto può essere fitotossico, se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Non trattare durante la fioritura per l'azione caustica sui fiori.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere I trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: **Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.** Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

LANNATE® 25

Insetticida a base di metomil - Polvere bagnabile

LANNATE 25
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Metomil puro g 25
Sostanze inerti q. b. a100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione (R20). Tossico per ingestione (R25) Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini (S1/2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nella fognatura (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S45). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.
Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione n. 1204 del 03/08/1973 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 PARTITA N.:

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 D.P.R. 23.04.2001 n. 290.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare le polveri. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Metomil: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. **Sintomi muscarinici:** disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia **Sintomi nicotinici:** tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO: rimuovere la persona intossicata dall'area contaminata. Non somministrare liquidi per bocca. Se il paziente presenta disturbi respiratori trasportarlo in ospedale. In caso di contatto cutaneo lavare abbondantemente con acqua e sapone di Marsiglia; se è interessata anche la testa lavare anche i capelli. In caso di ingestione può essere utile provocare il vomito nelle seguenti circostanze: solo se la persona è cosciente, entro 30 minuti dall'ingestione, se non presenta crisi convulsive.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
LANNATE 25 è un insetticida per il controllo di larve ed adulti di alcuni insetti che attaccano fruttiferi, vite, colture industriali ed ortive. Distribuire il prodotto con una quantità sufficiente di acqua per ottenere un'uniforme e completa distribuzione sulle parti trattate. Non applicare con attrezzature a basso volume. In generale la dose d'impiego più bassa, viene consigliata per gli intervalli più brevi fra un trattamento e quello successivo, viceversa la dose più alta si raccomanda per lunghi intervalli. La migliore efficacia si ottiene con la tempestività del trattamento, colpendo gli insetti nei loro primi stadi di sviluppo.
Dosi - Epoche - Modalità d'impiego
AFIDI: applicare g 150-180 di LANNATE 25 per 100 litri d'acqua all'inizio dell'infestazione e ripeterlo in caso di reinfestazione. Il LANNATE 25 è efficace contro gli Afidi di tutte le colture sottomenzionate includendo gli afidi del tabacco, delle piante ornamentali e da fiore in pieno campo e delle drupacee. Il LANNATE 25 in particolare è efficace contro l'Afide verde del pesco (*Myzus persicae*) difficilmente controllabile, specialmente se resistente ai prodotti organofosforici e contro l'Afide farinoso (*Hyalopterus amygdaly*).
MELI e PERI: Minatori: contro larve alla dose di g 200 per 100 litri d'acqua. **Lithocolletis blancardella F.E.:** per un buon controllo dell'insetto si consiglia di trattare in primavera contro le larve di prima generazione. E' strettamente raccomandabile applicare il LANNATE 25 a tempo opportuno, cioè quando il primo stadio delle larve è visibile sulle foglie come "macchie d'olio". Inoltre il controllo delle successive generazioni deve essere principalmente orientato contro le larve di primo stadio. **Leucoptera (cemiostoma) scitella Zell.:** è consigliabile applicare il LANNATE 25 all'inizio di una delle prime generazioni, quando la maggior parte delle "macchie circolari" sulle foglie hanno un diametro inferiore a 5 mm. **Tentredine** (Hoplocampa testudinea, Hoplocampa brevis): 200 g/hl, applicare a caduta petali.
Altri parassiti: *Carpocapsa pomonella, Capua reticulana, Cacoecia podana, Orgya antiqua*: dose g 180 - 200/hl. Intervenire alla comparsa delle prime larve e ripetere in caso di reinfestazione.
PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO E MANDORLO: ***Anarsia lineatella, Cydia molesta e Recurvaria nanella***: dose 180-200 g/hl. Intervenire alla comparsa dei parassiti e ripetere in caso di reinfestazione. ***Diaspis pentagona***: dose 180-200 g/hl con 2 irrorazioni, la prima verso la metà di maggio, la seconda due mesi dopo. **Tripidi** (*Thrips major, Thrips meridionalis*): dose 200 g/hl; in caso di forti attacchi eseguire due interventi, uno in pre-fioritura e l'altro alla caduta dei petali; in caso di infestazione normale applicare 200 g/hl in un solo trattamento a caduta petali. **Mosca della frutta** (*Ceratitis capitata*): dose 180-200 g/hl intervenendo in prossimità della maturazione dei frutti in funzione della presenza del fitofago.
VITE: Tignole (*Lobesia botrana Schiff e Clysia* ambiguella Hb): applicare il LANNATE 25 come curativo e preventivo alla dose di 150-200 g/hl. Intervenire con il trattamento in base allo stadio vegetativo della pianta ed al grado d'infestazione della stessa. Un solo trattamento, eseguito al momento opportuno, può essere sufficiente per il controllo dell'insetto. ***Scaphoideus titanus:*** dose 180-200 g/hl applicare alla comparsa delle prime forme adulte. ***Parthenolecanium corni*** : dose 180-200 g/hl mediante 1-2 interventi distanziati tra loro di 10-15 giorni nel momento di sgusciamento delle neanidi.
Su Vite da tavola la dose massima applicabile è pari a 1.6 kg/ha per un massimo di 2 applicazioni per anno.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: Cleono (*Temnorinus mendicus*): dose g 180 per 100 litri d'acqua. Usare non meno di kg 1,8 per ettaro di LANNATE 25. Eseguire il trattamento alla prima comparsa degli insetti e ripeterlo una o due volte ad intervalli di 12-15 giorni. **Altica** (*Chaetocnema tibialis*): dose g 160 per hl di acqua cuando l'insetto appare sulle foglie.
POMODORO- MELANZANA - PEPERONE e CUCURBITACEE: Nottue: dose g 150 per 100 litri d'acqua. Eseguire il trattamento quando le prime larve dell'insetto appaiono sui frutti e ripeterlo a 5-7 giorni di intervallo, durante il periodo dell'infestazione.
LATTUGA: contro **Nottue** e **Tripidi** g 150-200 per 100 litri d'acqua. Eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione e ripeterlo con un intervallo di 5-7 giorni durante il periodo vegetativo. E' consigliabile l'aggiunta di un bagnante adesivo.
FAGIOLO e PISELLO: Larve di Lepidotteri: dose g 150-180 per 100 litri di acqua. Eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione, ripeterlo in caso di reinfestazione.
AGRUMI e OLIVO: Coccinìglia "mezzo grano di pepe" (***Saissetia oleae***): dose g 150-180 per 100 litri d'acqua. Eseguire il trattamento in estate durante la massima presenza di "neanidi".
GAROFANO (in pieno campo) Bega (***Tortrix pronubana***): dose g 150-200 per 100 litri d'acqua. Trattare ogni 8-10 giorni contro le larve di prima generazione, iniziando i trattamenti alla schiusura delle uova deposte dai primi adulti dell'annata.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Immettere acqua nel serbatoio della pompa pari ad un quarto-metà del volume necessario. Mettere in moto l'agitatore meccanico od idraulico (non usare agitatori ad aria). Aggiungere la quantità stabilita di LANNATE 25 e, sempre con l'agitatore in moto, portare a volume. Continuare l'agitazione della miscela per alcuni minuti prima dell'inizio del trattamento.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è compatibile con prodotti fitosanitari aventi reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per le api. Evitare i trattamenti nel periodo della fioritura e quando le api frequentano l'area trattata. Si consiglia di tenere lontano dalle zone trattate animali domestici e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere il trattamento 30 giorni prima della raccolta su vite da tavola, 14 giorni prima su lattuga e 10 giorni prima su tutte le altre colture.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO. (Inc.)

LANNATE® 25

Insetticida a base di metomil
Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

LANNATE 25
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Metomil puro g 25
Sostanze inerti q. b. a100
FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione (R20). Tossico per ingestione (R25) Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini (S1/2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nella fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S45). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.
Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia
Registrazione n. 1204 del 03/08/1973 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 (contiene 5 sacchetti da g 200) **PARTITA N.:**

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 D.P.R. 23.04.2001 n. 290.
NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare le polveri. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Metomil: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. **Sintomi muscarinici**: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. **Sintomi nicotinici**: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina. **Controindicazioni:** ossime

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO: rimuovere la persona intossicata dall'area contaminata. Non somministrare liquidi per bocca. Se il paziente presenta disturbi respiratori trasportarlo in ospedale. In caso di contatto cutaneo lavare abbondantemente con acqua e sapone di Marsiglia; se è interessata anche la testa lavare anche i capelli. In caso di ingestione può essere utile provocare il vomito nelle seguenti circostanze: solo se la persona è cosciente, entro 30 minuti dall'ingestione, se non presenta crisi convulsive.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
LANNATE 25 è un insetticida per il controllo di larve ed adulti di alcuni insetti che attaccano fruttiferi, vite, colture industriali ed ortive. Distribuire il prodotto con una quantità sufficiente di acqua per ottenere un'uniforme e completa distribuzione sulle parti trattate. Non applicare con attrezzature a basso volume. In generale la dose d'impiego più bassa, viene consigliata per gli intervalli più brevi fra un trattamento e quello successivo, viceversa la dose più alta si raccomanda per lunghi intervalli. La migliore efficacia si ottiene con la tempestività del trattamento, colpendo gli insetti nei loro primi stadi di sviluppo.
Dosi - Epoche - Modalità d'impiego
AFIDI: applicare g 150-180 di LANNATE 25 per 100 litri d'acqua all'inizio dell'infestazione e ripeterlo in caso di reinfestazione. Il LANNATE 25 è efficace contro gli Afidi di tutte le colture sottomenzionate includendo gli afidi del tabacco, delle piante ornamentali e da fiore in pieno campo e delle drupacee. Il LANNATE 25 in particolare è efficace contro l'Afide verde del pesco (*Myzus persicae*) difficilmente controllabile, specialmente se resistente ai prodotti organofosforici e contro l'Afide farinoso (*Hyalopterus amygdaly*).
MELI e PERI: Minatori: contro larve alla dose di g 200 per 100 litri d'acqua. **Lithocolletis blancardella F.E.:** per un buon controllo dell'insetto si consiglia di trattare in primavera contro le larve di prima generazione. E' strettamente raccomandabile applicare il LANNATE 25 a tempo opportuno, cioè quando il primo stadio delle larve è visibile sulle foglie come "macchie d'olio". Inoltre il controllo delle successive generazioni deve essere principalmente orientato contro le larve di primo stadio. **Leucoptera (cemiostoma) scitella Zell.:** è consigliabile applicare il LANNATE 25 all'inizio di una delle prime generazioni, quando la maggior parte delle "macchie circolari" sulle foglie hanno un diametro inferiore a 5 mm. **Tentredine** (Hoplocampa testudinea, Hoplocampa brevis): 200 g/hl, applicare a caduta petali.
Altri parassiti: *Carpocapsa pomonella, Capua reticulana, Cacoecia podana, Orgya antiqua*: dose g 180 - 200/hl. Intervenire alla comparsa delle prime larve e ripetere in caso di reinfestazione.
PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO E MANDORLO: ***Anarsia lineatella, Cydia molesta e Recurvaria nanella***: dose 180-200 g/hl. Intervenire alla comparsa dei parassiti e ripetere in caso di reinfestazione. ***Diaspis pentagona***: dose 180-200 g/hl con 2 irrorazioni, la prima verso la metà di maggio, la seconda due mesi dopo. **Tripidi** (*Thrips major, Thrips meridionalis*): dose 200 g/hl; in caso di forti attacchi eseguire due interventi, uno in pre-fioritura e l'altro alla caduta dei petali; in caso di infestazione normale applicare 200 g/hl in un solo trattamento a caduta petali. **Mosca della frutta** (*Ceratitis capitata*): dose 180-200 g/hl intervenendo in prossimità della maturazione dei frutti in funzione della presenza del fitofago.
VITE: Tignole (*Lobesia botrana Schiff e Clysia* ambiguella Hb): applicare il LANNATE 25 come curativo e preventivo alla dose di 150-200 g/hl. Intervenire con il trattamento in base allo stadio vegetativo della pianta ed al grado d'infestazione della stessa. Un solo trattamento, eseguito al momento opportuno, può essere sufficiente per il controllo dell'insetto. ***Scaphoideus titanus:*** dose 180-200 g/hl applicare alla comparsa delle prime forme adulte. ***Parthenolecanium corni*** : dose 180-200 g/hl mediante 1-2 interventi distanziati tra loro di 10-15 giorni nel momento di sgusciamento delle neanidi.
Su Vite da tavola la dose massima applicabile è pari a 1.6 kg/ha per un massimo di 2 applicazioni per anno.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: Cleono (*Temnorinus mendicus*): dose g 180 per 100 litri d'acqua. Usare non meno di kg 1,8 per ettaro di LANNATE 25.
Eseguire il trattamento alla prima comparsa degli insetti e ripeterlo una o due volte ad intervalli di 12-15 giorni. **Altica** (*Chaetocnema tibialis*): dose g 160 per hl di acqua cuando l'insetto appare sulle foglie.
POMODORO- MELANZANA - PEPERONE e CUCURBITACEE: Nottue: dose g 150 per 100 litri d'acqua. Eseguire il trattamento quando le prime larve dell'insetto appaiono sui frutti e ripeterlo a 5-7 giorni di intervallo, durante il periodo dell'infestazione.
LATTUGA: contro **Nottue** e **Tripidi** g 150-200 per 100 litri d'acqua. Eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione e ripeterlo con un intervallo di 5-7 giorni durante il periodo vegetativo. E' consigliabile l'aggiunta di un bagnante adesivo.
FAGIOLO e PISELLO: **Larve di Lepidotteri:** dose g 150-180 per 100 litri di acqua. Eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione, ripeterlo in caso di reinfestazione.
AGRUMI e OLIVO: Cocciniglia "mezzo grano di pepe" (***Saissetia oleae***): dose g 150-180 per 100 litri d'acqua. Eseguire il trattamento in estate durante la massima presenza di "neanidi".
GAROFANO (in pieno campo) Bega (***Tortrix pronubana***): dose g 150-200 per 100 litri d'acqua. Trattare ogni 8-10 giorni contro le larve di prima generazione, iniziando i trattamenti alla schiusura delle uova deposte dai primi adulti dell'annata.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Immettere acqua nel serbatoio della pompa pari ad un quarto-metà del volume necessario. Mettere in moto l'agitatore meccanico od idraulico (non usare agitatori ad aria). Aggiungere la quantità stabilita di LANNATE 25 e, sempre con l'agitatore in moto, portare a volume. Continuare l'agitazione della miscela per alcuni minuti prima dell'inizio del trattamento.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è compatibile con prodotti fitosanitari aventi reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per le api. Evitare i trattamenti nel periodo della fioritura e quando le api frequentano l'area trattata. Si consiglia di tenere lontano dalle zone trattate animali domestici e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere il trattamento 30 giorni prima della raccolta su vite da tavola, 14 giorni prima su lattuga e 10 giorni prima su tutte le altre colture.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO. (Inc.)

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

LANNATE® 25

Insetticida a base di Metomil
Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

Registrazione n. 1204 del 03/08/1973 del Ministero della Sanità

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Metomil puro g 25
Sostanze inerti q. b. a 100

Contenuto netto del sacchetto : 200 g

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Avvertenza : leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1	2	3	4	5	6
Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua	Assicurarsi di avere le mani asciutte	Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo	Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte	Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)	Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni sopraríportate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

LANNATE® MF

Insetticida liquido a base di metomil.

LANNATE MF
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Metomil puro g 19.34 (= 200 g/l)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per ingestione (R25). Rischio di gravi lesioni oculari (R41). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini (S1/2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico (S26).Non getare i residui nelle fognature (S29). Proteggersi gli occhi/la faccia (S39). In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S45). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. – Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.. - Via Siemens 12, Bolzano
Registrazione n. 1100 del 28/06/1973 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: Litri 1 PARTITA N.:

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25, D.P.R. 23.04.2001, n. 290.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Metomil: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. **Sintomi muscarinici:** disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. **Sintomi nicotinici:** tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina. **Controindicazioni:** ossime.

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO
Rimuovere la persona intossicata dall'area contaminata. Non somministrare liquidi per bocca. Se il paziente presenta disturbi respiratori trasportarlo in ospedale. In caso di contatto cutaneo lavare abbondantemente con acqua e sapone di Marsiglia; se e' interessata anche la testa lavare anche i capelli.
In caso di ingestione può essere utile provocare il vomito nelle seguenti circostanze :
- solo se la persona è cosciente
- entro 30 minuti dall'ingestione
- se non presenta crisi convulsive

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

Caratteristiche
LANNATE MF è un insetticida raccomandato per il controllo di larve ed adulti di alcuni insetti che attaccano fruttiferi, vite, colture industriali, ortive ed ornamentali. Distribuire il prodotto con una quantità sufficiente di acqua per ottenere una uniforme e completa distribuzione sulle parti trattate. Non applicare con attrezzature a basso volume. In generale la dose d'impiego più bassa, viene consigliata per gli intervalli più brevi fra un trattamento e quello successivo, viceversa la dose più alta si raccomanda per lunghi intervalli. La migliore efficacia si ottiene con la tempestività del trattamento, colpendo gli insetti nei loro primi stadi di sviluppo.

Dosi - Epoche - Modalità d'impiego
AFIDI: ml 180 - 220 per 100 litri d'acqua. Eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione e ripeterlo in caso di reinfestazione. LANNATE MF è efficace contro gli Afidi di tutte le colture sottoindicate, inclusi gli Afidi del tabacco e delle drupacee, compreso l'Afide Verde del pesco (*Myzus persicae*).
MELI e PERI: Minatori: contro larve alla dose di ml 250 per ogni 100 litri d'acqua. ***Lithocolletis blancardella* F.E.:** per un buon controllo dell'insetto si consiglia di trattare sempre contro le larve di primo stadio, cioè quando sono appena visibili sulle foglie come "macchia d'olio". ***Leucoptera* (cemiostoma) Scitella zell.:** è consigliabile applicare LANNATE MF all'inizio di una delle prime generazioni, quando la maggior parte delle "macchie circolari" sulle foglie hanno un diametro inferiore a 5 mm. **Tentredine** (*Hoplocampa testudinea, Hoplocampa brevis*): 250 ml/hl, applicare a caduta petali.
PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO E MANDORLO: *Anarsia lineatella, Cydia molesta* e *Recurvaria nanella*: dose ml 225-250/hl. Intervenire alla comparsa dei fitofagi e ripetere in caso di reinfestazione. ***Diaspis pentagona*:** dose ml 225-250 con 2 irrorazioni, la prima verso la metà di maggio, la seconda due mesi dopo.
Tripidi (*Thrips major, Thrips meridionalis*): dose 250 ml/hl; in caso di forti attacchi eseguire due trattamenti, uno in pre-fioritura e l'altro alla caduta dei petali; in caso di infestazione normale applicare 250 ml/hl in un solo trattamento a caduta petali. **Mosca della frutta** (*Ceratitis capitata*): dose 225-250 ml/hl intervenendo in prossimità della maturazione dei frutti in funzione della presenza del fitofago.
VITE: Tignole (*Lobesia botrana* Schiff e *Clysia ambiguella* Hb): applicare il LANNATE MF come curativo o preventivo alla dose di ml 180-250 per 100 litri d'acqua, in base allo stadio vegetativo della pianta ed al grado di infestazione della stessa.Un solo trattamento, eseguito al momento opportuno, può essere sufficiente per il controllo dell'insetto. ***Scaphoideus titanus*:** dose 225-250 ml/hl; applicare alla comparsa delle prime forme adulte. ***Parthenolecanium corni*:** dose 225-250 ml/hl mediante 1-2 interventi distanziati tra loro di 10-15 giorni nel momento di sgusciamento delle neanidi.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: Cleono (*Temnorinus mendicus*): dose ml 225 per 100 litri d'acqua. Eseguire il trattamento alla prima comparsa degli insetti e ripeterlo una o due volte ad intervalli di 12-15 giorni. **Altica** (*Chaetocnema tibialis*): dose ml 200 per 100 litri d'acqua (o 1,3-1,5 litri/ha) quando l'insetto appare sulle foglie.
POMODORO - MELANZANA - PEPERONE- CETRIOLO - COCOMERO- MELONE - ZUCCA - ZUCCHINE: Nottue: dose ml 200 per 100 litri d'acqua. Eseguire il trattamento quando le prime larve dell'insetto appaiono sui frutti e ripeterlo a 5-7 giorni di intervallo durante il periodo vegetativo; è consigliabile l'aggiunta di un buon adesivo.
LATTUGA: contro **Nottue** e **Tripidi** usare ml 180-250 per 100 litri d'acqua. Eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione e ripeterlo con un intervallo di 5-7 giorni durante il periodo vegetativo.E' consigliabile aggiungere un bagnante adesivo.
FAGIOLO e PISELLO: Larve di Lepidotteri: dose ml 180-200 per 100 litri di acqua. Eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione, ripeterlo in caso di reinfestazione.
AGRUMI e OLIVO: Cocciniglia "mezzo grano di pepe" (***Saissetia oleae***): dose ml 180-200 per 100 litri d'acqua. Eseguire il trattamento in estate durante la massima presenza di neanidi.
GAROFANO (in pieno campo) Bega (***Tortrix pronubana***): dose ml 200-250 per 100 litri d'acqua. Trattare ogni 8-10 giorni contro le larve di prima generazione, iniziando i trattamenti alla schiusura delle uova deposte dai primi adulti dell'annata.
Sulle colture di melo, pero, pesco, albicocco, susino, ciliegio, mandorlo, agrumi ed olivo applicare una dose massima per trattamento pari a 2.5 litri/ha; su tutte le altre colture applicare una dose massima per trattamento pari a 2 litri/ha. Su vite da tavola non superare le 2 applicazioni per annata.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Immettere acqua nel serbatoio della pompa pari ad un quarto-metà del volume necessario. Mettere in moto l'agitatore meccanico od idraulico. Aggiungere la quantità stabilita di LANNATE MF e agitando portare a volume desiderato.
COMPATIBILITA'
Il prodotto non è compatibile con prodotti aventi reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Utilizzare un elettrorespiratore a filtro TH3AP a norma UNI EN 12941. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Per lavorazioni agricole fra le 48 ore e l'intervallo di sicurezza del formulato, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per le api. Evitare i trattamenti nel periodo della fioritura e quando le api frequentano l'area trattata. Tenere lontane durante il trattamento le persone non protette, animali e bestiame. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso l'intervallo di sicurezza.
INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta su vite da tavola, 14 giorni prima su lattuga e 10 giorni prima su tutte le altre colture.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altre officine autorizzate:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay , Francia
Agriformula S.r.l. - Paganica (AQ)
Altre taglie autorizzate: litri 0.5 - 5 - 10

LIZAR® 80

Erbicida per il controllo dei giavoni in risaia
Granuli idrodispersibili

LIZAR® 80
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Propanil puro g 80
Coformulanti q. b. a 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione (R20). Irritante per gli occhi e per la pelle (R36/38) Altamente tossico per gli organismi acquatici (R50).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
telefono 800378337
Officina di Produzione
Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
Registrazione n. 9504 del 16.02.1998 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 10-20 Partita n.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondamente con sapone neutro.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure. Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Generalità
LIZAR® 80 è un erbicida in granuli idrodispersibili selettivo per il riso, ad azione prevalentemente per contatto che si impiega in post-emergenza del riso e delle infestanti su risaia asciutta. In queste condizioni LIZAR® 80 controlla *Echinocloa crus galli* e le specie affini (Giavoni), le ciperacee ed alismatacee da seme nei primi stadi di sviluppo.

Dosi ed epoche di impiego
Riso: Applicare LIZAR® 80 quando la maggior parte dei Giavoni ha raggiunto lo stadio di una-tre foglie, alla dose di 5 - 8.5 kg/ha sempre in miscela con un bagnante non ionico alla dose di 1-2 l/ha. Le dosi maggiori si devono impiegare con Giavoni a stadi di sviluppo più avanzato o "invecchiati".
Preparare la miscela stemperando il prodotto in poca acqua, indi versare nella irroratrice riempita a metà, aggiungendo il bagnante non ionico a botte piena. Mantenere sempre in funzione l'agitatore, anche durante eventuali soste. Il volume d'acqua da utilizzare e' compreso tra 300 e 500 l/ha.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
La distribuzione di LIZAR® 80 deve essere eseguita su infestanti asciutte, quindi non operare alle prime ore del mattino o verso sera quando è possibile la presenza di rugiada.
Dopo l'applicazione di LIZAR® 80 la risaia deve rimanere in asciutta per 1-2 giorni; trascorso tale periodo ripristinare il livello dell'acqua e mantenerlo il più alto possibile per 6-8 giorni, comunque in relazione allo sviluppo ed alle esigenze della coltura. Evitare di trattare nel caso si preveda una pioggia a distanza di 6-8 ore.

COMPATIBILITA'
Non miscelare LIZAR® 80 con insetticidi carbammati ed organofosforici e fertilizzanti liquidi. Questi prodotti devono essere applicati almeno 14 giorni prima o dopo l'applicazione di LIZAR® 80.
LIZAR® 80 è antagonista nei confronti di erbicidi contenenti Azimsulfuron; in caso di sequenza dei due prodotti sullo stesso appezzamento, rispettare un'intervallo di tempo di almeno 10 giorni.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': alle dosi di impiego più elevate, in particolari condizioni, LIZAR® 80 può causare parziali necrosi o ingiallimenti degli apici delle foglie del riso che si risolvono nell'arco di 7 giorni, senza pregiudizio alcuno per l'accrescimento della coltura. Effettuare le applicazioni in giornate prive di vento, allo scopo di evitare che la nube possa essere trasportata su colture limitrofe sensibili come: erba medica, trifoglio, pisello, fagiolo, frutteti, vigneti e colture orticole. Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Intervallo di sicurezza: 30 giorni.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Altre officine autorizzate :
DuPont De Nemours (France) - S.A.S. – Cernay (Francia)
Westrade USA Inc. – West Helena (Arkansas) 72390 (USA)
Bold Corporation – Tifton (Georgia) 31793 (USA)
Griffin do Brasil Ltda - Barra Mansa, Rio de Janeiro, Brasile

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

LONDAX® 60 DF

Erbicida solfonilureico specifico contro le infestanti non graminacee delle risaie - Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Bensulfuron metile puro g 60
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 7441 del 09.03.1988 del Ministero della Sanità

Contenuto netto g 100 PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE
LONDAX 60 DF è un erbicida specifico contro infestanti non graminacee delle risaie in grado di controllare efficacemente le seguenti essenze:
Butomus umbellatus (giunco fiorito), *Bolboschenus (Scirpus) maritimus* (cipollino), *Schoenoplectus (Scirpus) mucronatus* (quadrettone), *Alisma plantago aquatica* (cucchiaio), *Alisma lanceolata* (mestolaccia), *Cyperus spp.* (zigolo), *Heteranthera reniformis ed Heteranthera rotundifolia* (eterantere), *Sparganium erectum* (coltellaccio maggiore), *Typha spp* (lisca).
In generale l'effetto erbicida di LONDAX 60 DF è migliore su piante piccole e in attiva crescita.

MODALITA' DI IMPIEGO
LONDAX 60 DF si impiega alla dose di 100 g per ettaro in risaia umida (0-1 cm di acqua) oppure uniformemente sommersa con 5-10 cm d'acqua.
Il trattamento può essere eseguito da 2 a 5 giorni prima della semina del riso oppure in alternativa da 20 a 40 giorni dopo la stessa, in combinazione o meno con prodotti specifici contro il giavone. Su *H. reniformis* ed *H. rotundifolia*, LONDAX 60 DF deve essere distribuito quando tali infestanti sono nello stadio di sviluppo di "foglioline basali".
Utilizzare volumi di acqua compresi tra 300 e 400 litri per ettaro. Il prodotto deve essere distribuito uniformemente con le normali attrezzature usate per il diserbo del riso. Dopo il trattamento su risaia umida attendere 24-48 ore prima di reimmettere acqua, mentre dopo il trattamento su risaia sommersa l'acqua, senza ulteriori immissioni, deve rimanere ferma nelle camere per almeno 5 giorni.
Piogge abbondanti, tali da determinare la fuoriuscita dell'acqua dalle camere nei primi giorni successivi al trattamento possono ridurre l'attività erbicida.
LONDAX 60 DF non è volatile e quindi non costituisce pericolo per le colture adiacenti diverse dal riso, le quali però non devono essere investite direttamente dall'irrorazione.
Avvertenze: non applicare il LONDAX 60 DF su colture sotto stress per anormali condizioni climatiche, malattie, insetti o eventualmente già danneggiate da altri erbicidi.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Sciogliere il prodotto in poca acqua, indi versare nella botte contenente metà dell'acqua necessaria e portare a volume tenendo la miscela in costante agitazione.
COMPATIBILITA'
LONDAX 60 DF è miscibile con erbicidi autorizzati per il diserbo selettivo del riso contenenti le seguenti sostanze attive: propanil, molinate, quinclorac, profoxidin, cyalofop-butil e MCPA.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare di irrorare direttamente o tramite deriva colture o piante arboree.
Non lavare l'attrezzatura vicino a colture o piante sensibili.
Avvertenze: subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% ca) nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
d) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% ca.

AVVERTENZA AGRONOMICA: Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali.

CONTIENE BENSULFURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altra officina autorizzata:
Du Pont Australia Ltd – Girraween , NSW 2145 (Australia)
Altre taglie autorizzate: kg 0,2 - 0,5 - 1

FOGLIO ILLUSTRATIVO

LONDAX® 60 DF

Erbicida solfonilureico specifico contro le infestanti non graminacee delle risaie - Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Bensulfuron metile puro g 60
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 7441 del 09.03.1988 del Ministero della Sanità

Contenuto netto g 100 **PARTITA N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE
LONDAX 60 DF è un erbicida specifico contro infestanti non graminacee delle risaie in grado di controllare efficacemente le seguenti essenze:
Butomus umbellatus (giunco fiorito), *Bolboschenus (Scirpus) maritimus* (cipollino), *Schoenoplectus (Scirpus) mucronatus* (quadrettone), *Alisma plantago aquatica* (cucchiaio), *Alisma lanceolata* (mestolaccia), *Cyperus spp.* (zigolo), *Heteranthera reniformis ed Heteranthera rotundifolia* (eterantere), *Sparganium erectum* (coltellaccio maggiore), *Typha spp* (lisca).
In generale l'effetto erbicida di LONDAX 60 DF è migliore su piante piccole e in attiva crescita.

MODALITA' DI IMPIEGO
LONDAX 60 DF si impiega alla dose di 100 g per ettaro in risaia umida (0-1 cm di acqua) oppure uniformemente sommersa con 5-10 cm d'acqua.
Il trattamento può essere eseguito da 2 a 5 giorni prima della semina del riso oppure in alternativa da 20 a 40 giorni dopo la stessa, in combinazione o meno con prodotti specifici contro il giavone. Su *H. reniformis* ed *H. rotundifolia*, LONDAX 60 DF deve essere distribuito quando tali infestanti sono nello stadio di sviluppo di "foglioline basali".
Utilizzare volumi di acqua compresi tra 300 e 400 litri per ettaro. Il prodotto deve essere distribuito uniformemente con le normali attrezzature usate per il diserbo del riso. Dopo il trattamento su risaia umida attendere 24-48 ore prima di reimmettere acqua, mentre dopo il trattamento su risaia sommersa l'acqua, senza ulteriori immissioni, deve rimanere ferma nelle camere per almeno 5 giorni.
Piogge abbondanti, tali da determinare la fuoriuscita dell'acqua dalle camere nei primi giorni successivi al trattamento possono ridurre l'attività erbicida.
LONDAX 60 DF non é volatile e quindi non costituisce pericolo per le colture adiacenti diverse dal riso, le quali però non devono essere investite direttamente dall'irrorazione.
Avvertenze: non applicare il LONDAX 60 DF su colture sotto stress per anormali condizioni climatiche, malattie, insetti o eventualmente già danneggiate da altri erbicidi.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Sciogliere il prodotto in poca acqua, indi versare nella botte contenente metà dell'acqua necessaria e portare a volume tenendo la miscela in costante agitazione.
COMPATIBILITA'
LONDAX 60 DF è miscibile con erbicidi autorizzati per il diserbo selettivo del riso contenenti le seguenti sostanze attive: propanil, molinate, quinclorac, profoxidin, cyalofop-butil e MCPA.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare di irrorare direttamente o tramite deriva colture o piante arboree.
Non lavare l'attrezzatura vicino a colture o piante sensibili.
Avvertenze: subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% ca) nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
d) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% ca.

AVVERTENZA AGRONOMICA: Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali.

CONTIENE BENSULFURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altra officina autorizzata:
Du Pont Australia Ltd – Girraween , NSW 2145 (Australia)
Altre taglie autorizzate: kg 0,2 - 0,5 - 1

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

LONDAX® 60 DF

Erbicida solfonilureico specifico contro le infestanti non graminacee delle risaie - Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Bensulfuron metile puro g 60
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 7441 del 09.03.1988 del Ministero della Sanità

Contenuto netto g 100 PARTITA N.

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altra officina autorizzata:
Du Pont Australia Ltd – Girraween , NSW 2145 (Australia)
Altre taglie autorizzate: kg 0,2 - 0,5 -

M70® DF

Fungicida organico per la lotta contro la ticchiolatura delle pomacee, peronospora ed escoriosi della vite, peronospora, septoriosi, antracnosi ed alternaria del pomodoro, varie crittogame del frumento, ruggine del garofano, marsonnina del pioppo, peronospora del tabacco e per la concia delle sementi

Granuli idrodispersibili

M70 DF
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Mancozeb puro g 75
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie (R37). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S46).

IRRITANTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione
Griffin de Colombia S.A. – Barranquilla (Colombia)
Officina di Confezionamento
Du Pont De Nemours Italiana S.r.l. – Via Siemens 12, Bolzano

Registrazione N. 9678 del 07.07.1998 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino a collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: Sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Dosi - Epoche - Modalità d'impiego
M70 DF e' usato in trattamenti liquidi, alle dosi sotto consigliate, valide per 100 litri di acqua e in trattamenti a volume normale, nella difesa delle seguenti colture dalle crittogame indicate:
- **Vite:** g 200 - 250, contro peronospora, escoriosi, antracnosi, marciume nero;
- **melo e pero:** g 150 - 250, contro ticchiolatura, septoria, ruggine, alternaria;
- **pomodoro** (solo fino alla prima fioritura): g 200 - 250, contro peronospora, alternaria, septoria, antracnosi;
- **tabacco:** g 100 - 150 in semenzaio e g 200 in pieno campo, contro peronospora;
- **frumento:** kg 2,5 - 3, contro ruggine, septoria, elmintosporio, alternaria, fusarium, cladosporium, ustilago, tilletia, cercosporella, rizoctonia;
- **garofano:** g 200, contro ruggine;
- **pioppo:** g 250 - 350 (o 4 kg/ha), contro marsonnina.

Il M70 DF e' usato anche per la concia dei semi (destinati alla semina), delle seguenti colture, alle dosi indicate valide per quintale di seme:
- **riso**: g 200 - 250, contro piricularia o brusone,elmintosporium, fusarium;
- **frumento:** g 150, contro tilletia o carie, fusariosi;
- **mais**: g 300, contro carbone, fusarium, gibberella, elmintosporium;
- **barbabietola:** g 600, contro mal del piede, fusarium, rizoctonia, cercospora;
- **sementi orticole** (insalate, fagiolo, cucurbitacee, spinacio), **floreali ed ornamentali:** g 250 - 600 a seconda del tipo di seme, contro fusarium, rizoctonia, pythium.

M70 DF puo' essere usato nella concia sia secca che umida: deve essere mescolato uniformemente con tutta la massa di sementi.

<u>Attenzione</u>: i semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana, del bestiame, degli animali domestici e della selvaggina. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portate a volume.

DIVIETO DI IMPIEGO
- divieto di impiego in serra
- divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate

MISCIBILITA'
M70 DF è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci fatta eccezione per quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Si sconsiglia l'impiego del prodotto su alcune varietà di **pero** sensibili al mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentiliona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Su pomodoro trattamenti ammessi solo fino alla prima fioritura.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altre officine autorizzate:
Du Pont De Nemours (France) S.A.S. -Stabilimento di Cernay, Francia
Du Pont De Nemours Italiana S.r.l. – Via Siemens 12, Bolzano
(solo confezionamento)
Altre taglie autorizzate: kg 10 – 25

M70®

Fungicida organico per la lotta contro la ticchiolatura delle pomacee, la peronospora della vite, l'alternariosi e la septoriosi del pomodoro, la marsonnina e la ticchiolatura del pioppo e la peronospora tabacina - Polvere bagnabile

M 70
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Mancozeb puro g 80
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie (R37).
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43).

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S46).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. – Via Siemens 12, Bolzano

Registrazione N. 3322 del 20.11.1979 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: kg 1 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino a collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia:** Sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Dosi ed epoche d'impiego
Dose per 100 litri d'acqua: 150 - 200 g.
Vite: contro la peronospora, nei trattamenti pre-fiorali ed in fioritura. - **Pomacee:** contro ticchiolatura, ruggini, corineo, monilia. – **Pomodoro:** (solo fino alla prima fioritura): contro peronospora, alternariosi, cladosporiosi e septoriosi, antracnosi. - **Pioppo:** contro marsonnina e ticchiolatura.- **Tabacco:** contro la Peronospora tabacina.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portate a volume.

DIVIETO DI IMPIEGO
- divieto di impiego in serra
- divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate

MISCIBILITA'
M 70 è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci fatta eccezione si quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Si sconsiglia l'impiego del prodotto su alcune varietà di **pero** sensibili al mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altre officine autorizzate:
Griffin de Colombia S.A. - Barranquilla (Colombia)
Dow AgroSciences S.A. – Lauterbourg, Francia
Dow AgroSciences B.V.- Strada Statale 11, Mozzanica (BG)
Cerexagri B.V. – Tankhoofd, 3196 KE Vondelingenplaat, Olanda

Altre taglie autorizzate: kg 2,5 - 10 - 25

MANGRIF® 75 DF

Fungicida organico per la lotta contro la ticchiolatura delle pomacee, peronospora ed escoriosi della vite, peronospora, septoriosi, antracnosi ed alternaria del pomodoro, varie crittogame del frumento, ruggine del garofano, marsonnina del pioppo, peronospora del tabacco e per la concia delle sementi.

Granuli idrodispersibili

MANGRIF 75 DF
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Mancozeb puro g 75
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie (R37). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S46).

IRRITANTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Griffin de Colombia S.A. – Barranquilla (Colombia)

Registrazione N. 9/34 del 03.09.1998 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: kg 1 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino a collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: Sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Dosi - Epoche - Modalità d'impiego
MANGRIF 75 DF e' usato in trattamenti liquidi, alle dosi sotto consigliate, valide per 100 litri di acqua e in trattamenti a volume normale, nella difesa delle seguenti colture dalle crittogame indicate:
- Vite: g 200 - 250, contro peronospora, escoriosi, antracnosi, marciume nero;
- melo e pero: g 150 - 250, contro ticchiolatura, septoria, ruggine, alternaria;
- pomodoro (solo fino alla prima fioritura): g 200 - 250, contro peronospora, alternaria, septoria, antracnosi;
- tabacco: g 100 - 150 in semenzaio e g 200 in pieno campo, contro peronospora;
- frumento: kg 2,5 - 3, contro ruggine, septoria, elmintosporio, alternaria, fusarium, cladosporium, ustilago, tilletia, cercosporella, rizoctonia;
- garofano: g 200, contro ruggine;
- pioppo: g 350 - 350 (o 4 kg/ha), contro marsonnina.
MANGRIF 75 DF e' usato anche per la concia dei semi (destinati alla semina), delle seguenti colture, alle dosi indicate valide per quintale di seme:
- riso: g 200 - 250, contro piricularia o brusone,elmintosporium, fusarium;
- frumento: g 150, contro tilletia o carie, fusariosi;
- mais: g 300, contro carbone, fusarium, gibberella, elmintosporium;
-barbabietola: g 600, contro mal del piede, fusarium, rizoctonia, cercospora;
- sementi orticole (insalate, fagiolo, cucurbitacee, spinacio), **floreali** ed **ornamentali:** g 250 - 600 a seconda del tipo di seme, contro fusarium, rizoctonia, pythium.
MANGRIF 75 DF puo' essere usato nella concia sia secca che umida: deve essere mescolato uniformemente con tutta la massa di sementi.
<u>Attenzione</u>: i semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana, del bestiame, degli animali domestici e della selvaggina. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portate a volume.

DIVIETO DI IMPIEGO
- divieto di impiego in serra
- divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate

MISCIBILITA'
MANGRIF 75 DF è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci fatta eccezione per quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Si sconsiglia l'impiego del prodotto su alcune varietà di **pero** sensibili al mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Su pomodoro trattamenti ammessi solo fino alla prima fioritura.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altre officine autorizzate:
Du Pont De Nemours (France) S.A.S. -Stabilimento di Cernay, Francia
Dow AgroSciences S.A. – Lauterbourg, Francia
Altre taglie autorizzate: kg 10 - 25

MANGRIF® 80 WP

Anticrittogamico - Polvere bagnabile

MANGRIF® 80 WP
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Mancozeb puro g 80
Coformulanti q. b. 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie (R37).
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S46).

IRRITANTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Griffin de Colombia S.A. – Barranquilla, Colombia
Registrazione N. 9755 del 16.09.1998 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 **PARTITA N.:**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino a collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: **Sintomatica**
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Dosi - Epoche d'impiego
MANGRIF® 80 WP è usato in trattamenti liquidi, alle dosi sotto consigliate, valide per 100 litri di acqua e in trattamenti a volume normale, nella difesa delle seguenti colture dalle crittogame indicate:
- **vite:** g 200 - 250, contro peronospora, escoriosi, antracnosi, marciume nero;
- **melo e pero:** g 150 - 250, contro ticchiolatura, septoria, ruggine, alternaria;
- **pomodoro** (solo fino alla prima fioritura): g 200 - 250, contro peronospora, alternaria, septoria, antracnosi;
- **tabacco:** g 100 - 150 in semenzaio e g 200 in pieno campo, contro peronospora;
- **frumento:** g 200 - 250, contro ruggine, septoria, elmintosporio, alternaria, fusarium, cladosporium, ustilago, tilletia, cercosporella, rizoctonia;
- **garofano:** g 200, contro ruggine;
- **pioppo:** g 250 (o 4 kg/ha), contro marsonnina.
MANGRIF® 80 WP è usato anche per la concia dei semi (destinati alla semina), delle seguenti colture, alle dosi indicate valide per quintale di seme:
- **riso:** g 200 - 250, contro piricularia o brusone,elmintosporium, fusarium;
- **frumento:** g 150, contro tilletia o carie, fusariosi;
- **mais:** g 300, contro carbone, fusarium, gibberella, elmintosporium;
- **barbabietola:** g 600, contro mal del piede, fusarium, rizoctonia, cercospora;
- **sementi orticole** (insalate, fagiolo, cucurbitacee, spinacio), **floreali** ed **ornamentali:** g 250 - 600 a seconda del tipo di seme, contro fusarium, rizoctonia, pythium.
MANGRIF® 80 WP può essere usato nella concia sia secca che umida: deve essere mescolato uniformemente con tutta la massa di sementi.

Attenzione: i semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana, del bestiame, degli animali domestici e della selvaggina. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA
DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'
MANGRIF® 80 WP è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari in commercio, ad esclusione di prodotti a reazione alcalina (quale poltiglia bordolese). Evitare miscele con concimi fogliari a base di boro.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Sono sensibili al mancozeb le seguenti varietà di **pere**: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O CON IL SUO CONTENITORE

®Marchio registrato E.I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altre officine autorizzate:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Siemens 12 Bolzano
Dow AgroSciences S.A. Lauterbourg, Francia
Altre taglie autorizzate: kg 3 - 5 - 10 – 25

MANTIR® 75 DG

Fungicida organico per la lotta contro la ticchiolatura delle pomacee, peronospora ed escoriosi della vite, peronospora, septoriosi, antracnosi ed alternaria del pomodoro, varie crittogame del frumento, ruggine del garofano, marsonnina del pioppo, peronospora del tabacco e per la concia delle sementi.

Granuli idrodispersibili

MANTIR 75 DG
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Mancozeb puro g 75
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie (R37).
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43).

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S46).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione
Griffin de Colombia S.A. – Barranquilla (Colombia)
Distribuito da: SARIAF S.p.A. – Via Morgagni 68 – Faenza (Ra)

Registrazione N. 8684 del 31.01.1995 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino a collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: Sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Dosi - Epoche - Modalità d'impiego
MANTIR 75 DG e' usato in trattamenti liquidi, alle dosi sotto consigliate, valide per 100 litri di acqua e in trattamenti a volume normale, nella difesa delle seguenti colture dalle crittogame indicate:
- **Vite:** g 200 - 250, contro peronospora, escoriosi, antracnosi, marciume nero;
- **melo e pero:** g 150 - 250, contro ticchiolatura, septoria, ruggine, alternaria;
- **pomodoro** (solo fino alla prima fioritura): g 200 - 250, contro peronospora, alternaria, septoria, antracnosi;
- **tabacco:** g 100 - 150 in semenzaio e g 200 in pieno campo, contro peronospora;
- **frumento:** kg 2,5 - 3, contro ruggine, septoria, elmintosporio, alternaria, fusarium, cladosporium, ustilago, tilletia, cercosporella, rizoctonia;
- **garofano:** g 200, contro ruggine;
- **pioppo:** g 350 - 350 (o 4 kg/ha), contro marsonnina.

Il MANTIR 75 DG e' usato anche per la concia dei semi (destinati alla semina), delle seguenti colture, alle dosi indicate valide per quintale di seme:
- **riso**: g 200 - 250, contro piricularia o brusone,elmintosporium, fusarium;
- **frumento:** g 150, contro tilletia o carie, fusariosi;
- **mais**: g 300, contro carbone, fusarium, gibberella, elmintosporium;
- **barbabietola:** g 600, contro mal del piede, fusarium, rizoctonia, cercospora;
- **sementi orticole** (insalate, fagiolo, cucurbitacee, spinacio), **floreali ed ornamentali:** g 250 - 600 a seconda del tipo di seme, contro fusarium, rizoctonia, pythium.

MANTIR 75 DG puo' essere usato nella concia sia secca che umida: deve essere mescolato uniformemente con tutta la massa di sementi.
Attenzione: i semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana, del bestiame, degli animali domestici e della selvaggina. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portate a volume.

DIVIETO DI IMPIEGO
- divieto di impiego in serra
- divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate

MISCIBILITA'
MANTIR 75 DG è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci fatta eccezione per quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Si sconsiglia l'impiego del prodotto su alcune varietà di **pero** sensibili al mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Su pomodoro trattamenti ammessi solo fino alla prima fioritura.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

® Marchio registrato SARIAF S.p.A

Altre officine autorizzate:
Du Pont De Nemours (France) S.A.S. -Stabilimento di Cernay, Francia
Altre taglie autorizzate: kg 10 – 25

MANZATE® MZ

Anticrittogamico - Polvere bagnabile

MANZATE® MZ
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Mancozeb puro g 80
Coformulanti q. b. 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie (R37). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S46).

IRRITANTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio ´0, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Griffin de Colombia S.A. – Barranquilla, Colombia
Registrazione N. 6928 del 14.01.1987 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 **PARTITA N.:**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino a collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: **Sintomatica.**

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118.

MODALITA' D'IMPIEGO
Dosi - Epoche d'impiego
MANZATE® MZ è usato in trattamenti liquidi, alle dosi sotto consigliate, valide per 100 litri di acqua e in trattamenti a volume normale, nella difesa delle seguenti colture dalle crittogame indicate:
- **vite:** g 200 - 250, contro peronospora, escoriosi, antracnosi, marciume nero;
- **melo e pero:** g 150 - 250, contro ticchiolatura, septoria, ruggine, alternaria;
- **pomodoro** (solo fino alla prima fioritura): g 200 - 250, contro peronospora, alternaria, septoria, antracnosi;
- **tabacco:** g 100 - 150 in semenzaio e g 200 in pieno campo, contro peronospora;
- **frumento:** g 200 - 250, contro ruggine, septoria, elmintosporio, alternaria, fusarium, cladosporium, ustilago, tilletia, cercosporella, rizoctonia;
- **garofano:** g 200, contro ruggine;
- **pioppo:** g 250 (o 4 kg/ha), contro marsonnina.

MANZATE® MZ è usato anche per la concia dei semi (destinati alla semina), delle seguenti colture, alle dosi indicate valide per quintale di seme:
- **riso**: g 200 - 250, contro piricularia o brusone,elmintosporium, fusarium;
- **frumento:** g 150, contro tilletia o carie, fusariosi;
- **mais**: g 300, contro carbone, fusarium, gibberella, elmintosporium;
- **barbabietola:** g 600, contro mal del piede, fusarium, rizoctonia, cercospora;
- **sementi orticole** (insalate, fagiolo, cucurbitacee, spinacio), **floreali** ed **ornamentali:** g 250 - 600 a seconda del tipo di seme, contro fusarium, rizoctonia, pythium.

MANZATE® MZ può essere usato nella concia sia secca che umida: deve essere mescolato uniformemente con tutta la massa di sementi.

Attenzione: i semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana, del bestiame, degli animali domestici e della selvaggina. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'
MANZATE® MZ è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari in commercio, ad esclusione di prodotti a reazione alcalina (quale poltiglia bordolese). Evitare miscele con concimi fogliari a base di boro.

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Sono sensibili al mancozeb le seguenti varietà di **pere**: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

® Marchio registrato E.I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altre officine autorizzate:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Siemens 12 Bolzano
Dequisa S.A. – Sabinanigo, Spagna
Altre taglie autorizzate: kg 3 - 5 - 10 – 25

MAROX® DF

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di frumento tenero e duro, orzo a semina primaverile - Granuli idrodispersibili

MAROX * DF
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tifensulfuron metile p.a. puro g 50
Tribenuron metile p.a. puro g 25
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione n. 8335 del 15.06.1993 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 50 PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive TIFENSULFURON METILE 50% e TRIBENURON METILE 25%. Il Tribenuron metile, separatamente, provoca i seguenti sintomi di intossicazione: **Sintomi:** non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea. **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

EPOCA DI IMPIEGO
Post-emergenza: di frumento tenero e duro,orzo a semina primaverile dallo stadio di tre foglie fino allo stadio di botticella della coltura.
MAROX DF viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento, MAROX DF blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento,necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 2 settimane dall'applicazione. Le malerbe non devitalizzate sono drasticamente ridotte nello sviluppo e sono molto meno competitive nei riguardi della coltura.Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocita' di azione.
Dosi d'impiego: 30-50 g/ha; da distribuire con 200-400 litri d'acqua: la dose piu' bassa si applica su infestanti e colture poco sviluppate, la dose piu' alta nei trattamenti tardivi.
SPETTRO D'AZIONE: Infestanti sensibili: Adonide *(Adonis aestivalis)*, Aglio delle vigne *(Allium vineale)*, Amaranti *(Amaranthus spp.)*, Camomilla bastarda *(Anthemis cotula)*, Coriandolo *(Bifora radians)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvulus)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Farinello comune *(Chenopodium album)*, Erba cornetta *(Consolida regalis)*, Geranio *(Geranium disectum)*, Falsa ortica *(Lamium purpureum)*, Camomilla *(Matricaria chamomilla)*, Miagro liscio *(Myagrum perfoliaium)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Correggiola *(Polygonum aviculare)*, Poligono persicaria *(Polygonum persicaria)*, Porcellana *(Portulaca oleracea)*, Ranuncolo *(Ranunculus acer)*, Ravanello selvatico *(Raphanus raphanistrum)*, Rapistro *(Rapistrum rugosum)*, Romice *(Rumex spp.)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Centocchio *(Stellaria media)*, Veccia *(Vicia sativa)*, Viola *(Viola spp.)*.
In presenza di Fiordaliso *(Centaurea cyanus)*, Crisantemo delle messi *(Chrisanthemum segetum)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Pettine di Venere *(Scandix pecten veneris)*, Veronica *(Veronica spp.)*, e' necessario aggiungere un bagnante alle dosi consigliate.
Infestanti mediamente sensibili: Stoppione *(Cirsium spp.)*, Vilucchio bianco *(Calystegia sepium)* e Vilucchio *(Convolvulus arvensis)*.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
MAROX DF, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento;portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.
AVVERTENZE - Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
Subito dopo il trattamento e' importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
d) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
c) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.

Su varieta' coltivate di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettivita'. Dopo un trattamento con MAROX DF si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.

COMPATIBILITA' – MAROX DF è compatibile con Starane (s.a. fluroxipyr), Gralit Max (s.a. fenoxaprop-p-etile) e con Topik (s.a. clodinafop-propargil).
In caso di miscela versare nella botte prima MAROX DF e successivamente gli altri formulati.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Il prodotto puo' risultare filotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONTIENE TRIBENURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Altre officine autorizzate:
E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) Manati (Portorico)
Altre taglie autorizzate: g 100

FOGLIO ILLUSTRATIVO

MAROX® DF

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di frumento tenero e duro; orzo a semina primaverile - Granuli idrodispersibili

MAROX * DF
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tifensulfuron metile p.a. puro g 50
Tribenuron metile p.a. puro g 25
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione n. 8335 del 15.06.1993 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 50 PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive TIFENSULFURON METILE 50% e TRIBENURON METILE 25%. Il Tribenuron metile, separatamente, provoca i seguenti sintomi di intossicazione: **Sintomi:** non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea. **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

EPOCA DI IMPIEGO
Post-emergenza: di frumento tenero e duro,orzo a semina primaverile dallo stadio di tre foglie fino allo stadio di botticella della coltura.
MAROX DF viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento, MAROX DF blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento,necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 2 settimane dall'applicazione. Le malerbe non devitalizzate sono drasticamente ridotte nello sviluppo e sono molto meno competitive nei riguardi della coltura.Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocita' di azione.
Dosi d'impiego: 30-50 g/ha; da distribuire con 200-400 litri d'acqua: la dose piu' bassa si applica su infestanti e colture poco sviluppate, la dose piu' alta nei trattamenti tardivi.
SPETTRO D'AZIONE: Infestanti sensibili: Adonide *(Adonis aestivalis)*, Aglio delle vigne *(Allium vineale)*, Amaranti *(Amaranthus spp.)*, Camomilla bastarda *(Anthemis cotula)*, Coriandolo *(Bifora radians)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvulus)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Farinello comune *(Chenopodium album)*, Erba cornetta *(Consolida regalis)*, Geranio *(Geranium disectum)*, Falsa ortica *(Lamium purpureum)*, Camomilla *(Matricaria chamomilla)*, Miagro liscio *(Myagrum perfoliatum)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Correggiola *(Polygonum aviculare)*, Poligono persicaria *(Polygonum persicaria)*, Porcellana *(Portulaca oleracea)*, Ranuncolo *(Ranunculus acer)*, Ravanello selvatico *(Raphanus raphanistrum)*, Rapistro *(Rapistrum rugosum)*, Romice *(Rumex spp.)*, Senape selvatica (Sinapis arvensis), Centocchio *(Stellaria media)*, Veccia *(Vicia sativa)*, Viola *(Viola spp.)*.
In presenza di Fiordaliso *(Centaurea cyanus)*, Crisantemo delle messi *(Chrisanthemum segetum)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Pettine di Venere *(Scandix pecten veneris)*, Veronica *(Veronica spp.)*, e' necessario aggiungere un bagnante alle dosi consigliate.
Infestanti mediamente sensibili: Stoppione *(Cirsium spp.)*, Vilucchio bianco *(Calystegia sepium)* e Vilucchio *(Convolvulus arvensis)*.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
MAROX DF, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento;portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.
AVVERTENZE - Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
Subito dopo il trattamento e' importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
d) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.
Su varieta' coltivate di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettivita'. Dopo un trattamento con MAROX DF si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.

COMPATIBILITA' – MAROX DF è compatibile con Starane (s.a. fluroxipyr), Gralit Max (s.a. fenoxaprop-p-etile) e con Topik (s.a. clodinafop-propargil).
In caso di miscela versare nella botte prima MAROX DF e successivamente gli altri formulati.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONTIENE TRIBENURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Altre officine autorizzate:
E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) Manati (Portorico)
Altre taglie autorizzate: g 100

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

MAROX® DF

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di frumento tenero e duro, orzo a semina primaverile.- Granuli idrodispersibili

MAROX * DF
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tifensulfuron metile p.a. puro g 50
Tribenuron metile p.a. puro g 25
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione n. 8335 del 15.06.1993 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 50 PARTITA N.

CONTIENE TRIBENURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA
PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altre officine autorizzate:
E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) Stabilimento di Manati (Portorico)
Altre taglie autorizzate: g 100

MESOZIN® DF

Diserbante selettivo per patata, pomodoro, frumento, orzo, soia, erba medica, carota, asparago – Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Metribuzin puro g 35
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R22). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Bayer CropScience A.G. -Dormagen (Germania)
Registrazione N. 6688 del 24.04.1986 del Ministero della Sanità
Contenuto netto kg 0,500 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Metribuzin: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.

In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo:** dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE
MESOZIN DF è un erbicida selettivo ad assorbimento radicale e fogliare.
Erbe infestanti sensibili: *Alopecurus spp.* (Coda di volpe), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Capsella bursa pastoris* (Borsa pastore comune), *Chenopodium spp.* (Farinello), *Chenopodium album* (Farinaccio), *Digitaria spp* (Sanguinella), *Echinocloa crus-galli* (Giavone), *Fumaria officinalis* (Fumaria comune), *Lamium spp* (Falsa ortica), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Poa annua* (Fienarola comune), *Polygonum spp.* (Poligoni), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Setaria spp* (Pabbio), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespino comune), *Spergula arvensis* (Spergola), *Stellaria media* (Centocchio dei campi), *Veronica spp* (Veronica).

MODALITA' DI IMPIEGO E DOSI
Patata
a) trattamento in pre-emergenza: 0,5 – 0,8 kg/ha in 500-700 litri di acqua, impiegando la dose minore nei terreni limosi e quella maggiore in quelli argillosi, escludendo i terreni sabbiosi.
b) trattamento in post-emergenza: 0,5 – 0,6 kg/ha in 500-700 litri di acqua, riservando la dose maggiore ai terreni argillosi.
N.B.: Il MESOZIN DF si è dimostrato perfettamente tollerato dalle seguenti varietà di patata: Admirandus, Alkmaria, Apollo, Arsy, Bea, Bintje, Cardinal, Desirée, Favorita, Humalda, Kennebec, Majestic, Monnalisa, Primura, Resy, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal.
Pomodoro
a) pre-semina e pre-trapianto: 0,5-0,6 kg/ha in 500-700 litri di acqua intervenendo 7-14 giorni prima della semina su terreno gia' preparato, senza interrare;
b) **post-emergenza e post-trapianto**: 0,5-0,8 kg/ha riservando la dose maggiore ai terreni argillosi ed intervenendo dopo il diradamento o dopo che le piantine hanno superato la crisi di trapianto. Al momento del trattamento le piantine devono avere almeno 8-9 foglie (pre-fioritura).
Frumento ed orzo: in post-emergenza (dallo stadio di due foglie a quello di fine accestimento) impiegare 0,2 kg/ha.
Soia: 0,5 - 0,7 kg/ha in pre-semina/pre-emergenza. Non impiegare in terreni molto sabbiosi o torbosi.
Erba Medica: intervenire in autunno dopo l'ultimo sfalcio, quando la coltura e' entrata in riposo vegetativo a seguito delle prime brinate, utilizzando 1 kg/ha in terreni sabbiosi, 1,5 kg/ha in terreni di medio impasto ed argillosi in 500-700 litri di acqua.
Carota: 0,5 - 0,7 kg/ha a partire dallo stadio di tre foglie vere.
Asparago: 1 - 1,2 kg/ha in 600 litri di acqua in pre-emergenza in asparagiaie di almeno 2 anni.

AVVERTENZE GENERALI
Eseguire il trattamento in giornate senza vento, avendo cura di distribuire uniformemente la soluzione su tutta la superficie da trattare, evitando sovrapposizioni e di raggiungere altre colture adiacenti. A lavoro ultimato lavare accuratamente pompe e recipienti usati per la preparazione della soluzione.

COMPATIBILITA'
Per alcune colture (erba medica) il prodotto può essere miscelato solamente con altri erbicidi a reazione neutra per aumentare lo spettro d'azione sulle infestanti. L'impiego su frumento di MESOZIN DF in miscela con altri erbicidi di post-emergenza quali Grasp (tralkoxydim), Gralit (fenoxaprop-ethyl), Granstar (tribenuron methyl), Starane (fluroxipyr), permette di ampliarne lo spettro d'azione e migliorarne l'efficacia sulle infestanti sopra citate.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Non effettuare il diserbo su pomodoro in serra e sotto tunnel e nei terreni molto limosi o sabbiosi.
Non intervenire in pre-semina del pomodoro nei seguenti casi:
- qualora si usi un quantitativo di seme inferiore a 2,5 kg/ha in quarto la coltura risulterebbe più sensibile in caso di repentini abbassamenti di temperatura
- nei cosiddetti "terreni bianchi" che formano la crosta al momento dell'emergenza delle piantine.
Per l'intervento in post-emergenza o post-trapianto su pomodoro attenersi alle seguenti norme:
- in caso di necessità, anticipare l'irrigazione 7 giorni prima del trattamento con MESOZIN DF;
- non diserbare una coltura sofferente (ad esempio per siccità, alte o basse temperature, ristagni d'acqua ecc, ecc);
- le eventuali fresature devono essere superficiali per non danneggiare l'apparato radicale del pomodoro e devono essere eseguite 5-10 giorni prima del trattamento.
Per quanto riguarda la patata non effettuare il trattamento sulle varieta' Draga, Jarla e Vivax in quanto si sono dimostrate sensibili al prodotto.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta del pomodoro, frumento ed orzo e 60 giorni prima per tutte le altre colture.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altre taglie autorizzate: kg 0,1 - 1 - 5 – 10

FOGLIO ILLUSTRATIVO

MESOZIN® DF

Diserbante selettivo per patata, pomodoro, frumento, orzo, soia, erba medica, carota, asparago – Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Metribuzin puro g 35
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R22). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37) In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46) Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60) Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione
Bayer CropScience A.G. Dormagen (Germania)
Registrazione N. 6688 del 24.04.1986 del Ministero della Sanità
Contenuto netto kg 0,500 Partita n.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Metribuzin: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo**: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia**: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE
MESOZIN DF è un erbicida selettivo ad assorbimento radicale e fogliare.
Erbe infestanti sensibili: *Alopecurus spp.* (Coda di volpe), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Capsella bursa pastoris* (Borsa pastore comune), *Chenopodium spp.* (Farinello), *Chenopodium album* (Farinaccio), *Digitaria spp* (Sanguinella), *Echinocloa crus-galli* (Giavone), *Fumaria officinalis* (Fumaria comune), *Lamium spp* (Falsa ortica), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Poa annua* (Fienarola comune), *Polygonum spp.* (Poligoni), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Setaria spp* (Pabbio), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespino comune), *Spergula arvensis* (Spergola), *Stellaria media* (Centocchio dei campi), *Veronica spp* (Veronica).

MODALITA' DI IMPIEGO E DOSI
Patata
a) trattamento in pre-emergenza: 0,5 – 0,8 kg/ha in 500-700 litri di acqua, impiegando la dose minore nei terreni limosi e quella maggiore in quelli argillosi, escludendo i terreni sabbiosi.
b) trattamento in post-emergenza: 0,5 – 0,6 kg/ha in 500-700 litri di acqua, riservando la dose maggiore ai terreni argillosi.
N.B.: Il MESOZIN DF si è dimostrato perfettamente tollerato dalle seguenti varietà di patata: Admirandus, Alkmaria, Apollo, Arsy, Bea, Bintje, Cardinal, Desirée, Favorita, Humalda, Kennebec, Majestic, Monnalisa, Primura, Resy, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal.
Pomodoro
a) pre-semina e pre-trapianto: 0,5-0,6 kg/ha in 500-700 litri di acqua intervenendo 7-14 giorni prima della semina su terreno gia' preparato, senza interrare;
b) **post-emergenza e post-trapianto**: 0,5-0,8 kg/ha riservando la dose maggiore ai terreni argillosi ed intervenendo dopo il diradamento o dopo che le piantine hanno superato la crisi di trapianto. Al momento del trattamento le piantine devono avere almeno 8-9 foglie (pre-fioritura).
Frumento ed orzo: in post-emergenza (dallo stadio di due foglie a quello di fine accestimento) impiegare 0,2 kg/ha.
Soia: 0,5 - 0,7 kg/ha in pre-semina/pre-emergenza. Non impiegare in terreni molto sabbiosi o torbosi.
Erba Medica: intervenire in autunno dopo l'ultimo sfalcio, quando la coltura e' entrata in riposo vegetativo a seguito delle prime brinate, utilizzando 1 kg/ha in terreni sabbiosi, 1,5 kg/ha in terreni di medio impasto ed argillosi in 500-700 litri di acqua.
Carota: 0,5 - 0,7 kg/ha a partire dallo stadio di tre foglie vere.
Asparago: 1 - 1,2 kg/ha in 600 litri di acqua in pre-emergenza in asparagiaie di almeno 2 anni.

AVVERTENZE GENERALI
Eseguire il trattamento in giornate senza vento, avendo cura di distribuire uniformemente la soluzione su tutta la superficie da trattare, evitando sovrapposizioni e di raggiungere altre colture adiacenti. A lavoro ultimato lavare accuratamente pompe e recipienti usati per la preparazione della soluzione.

COMPATIBILITA'
Per alcune colture (erba medica) il prodotto può essere miscelato solamente con altri erbicidi a reazione neutra per aumentare lo spettro d'azione sulle infestanti. L'impiego su frumento di MESOZIN DF in miscela con altri erbicidi di post-emergenza quali Grasp (tralkoxydim), Gralit (fenoxaprop-ethyl), Granstar (tribenuron methyl), Starane (fluroxipyr), permette di ampliarne lo spettro d'azione e migliorarne l'efficacia sulle infestanti sopra citate.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Non effettuare il diserbo su pomodoro in serra e sotto tunnel e nei terreni molto limosi o sabbiosi.
Non intervenire in pre-semina del pomodoro nei seguenti casi:
- qualora si usi un quantitativo di seme inferiore a 2,5 kg/ha in quarto la coltura risulterebbe più sensibile in caso di repentini abbassamenti di temperatura
- nei cosiddetti "terreni bianchi" che formano la crosta al momento dell'emergenza delle piantine.

Per l'intervento in post-emergenza o post-trapianto su pomodoro attenersi alle seguenti norme:
- in caso di necessità, anticipare l'irrigazione 7 giorni prima del trattamento con MESOZIN DF;
- non diserbare una coltura sofferente (ad esempio per siccità, alte o basse temperature, ristagni d'acqua ecc, ecc);
- le eventuali fresature devono essere superficiali per non danneggiare l'apparato radicale del pomodoro e devono essere eseguite 5-10 giorni prima del trattamento.
Per quanto riguarda la patata non effettuare il trattamento sulle varieta' Draga, Jarla e Vivax in quanto si sono dimostrate sensibili al prodotto.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta del pomodoro, frumento ed orzo e 60 giorni prima per tutte le altre colture.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altre taglie autorizzate: kg 0,1 - 1 - 5 – 10

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

MESOZIN® DF

Diserbante selettivo per patata, pomodoro, frumento, orzo, soia, erba medica, carota, asparago – Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Metribuzin puro g 35
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R22). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37) In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46) Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60) Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337

Officina di Produzione
Bayer CropScience A.G. -Dormagen (Germania)
Registrazione N. 6688 del 24.04.1986 del Ministero della Sanità
Contenuto netto kg 0,500 **Partita n.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altre taglie autorizzate: kg 0,1 - 1 - 5 – 10

PULL® 52 DF

Erbicida specifico contro infestanti non graminacee delle risaie
Granuli idrodispersibili

PULL 52 DF
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Bensulfuron metile puro g 50
Metsulfuron metile puro g 2
Coformulanti q. b. a 100.

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 8360 del 07.08.1993 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 100 **PARTITA N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI MEDICHE
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea. **Terapia**: sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE
PULL 52 DF è un erbicida specifico contro infestanti non graminacee delle risaie. Combatte efficacemente *Butomus umbellatus, Bolboschenus (Scirpus) maritimus, Schoenoplectus (Scirpus) mucronatus, Alisma plantago-aquatica, Alisma lanceolata, Cyperus spp., Heteranthera reniformis, Heteranthera limosa, Sparganium erectum, Typha spp.* PULL 52 DF esercita inoltre un buon contenimento delle infestazioni di *Leersia oryzoides*.
In generale l'effetto erbicida di PULL 52 DF è migliore su piante piccole e in attiva crescita.

MODALITA' DI IMPIEGO
PULL 52 DF si impiega alla dose di 100 g per ettaro in risaia umida (0-1 cm di acqua) oppure uniformemente sommersa (5-10 cm d'acqua). Il trattamento può essere eseguito da 2 a 5 giorni prima della semina del riso oppure in alternativa da 20 a 40 giorni dopo la stessa, in combinazione o meno con prodotti specifici contro il giavone. Su *H. limosa ed H. reniformis* PULL 52 DF deve essere distribuito quando tali infestanti sono in uno stadio di sviluppo compreso tra la comparsa delle prime foglioline basali e le 2 foglie di tipo reniforme. Il prodotto deve essere distribuito uniformemente con le normali attrezzature usate per il diserbo del riso.
Dopo il trattamento su risaia umida attendere 24 ore prima di reimmettere acqua; dopo il trattamento su risaia sommersa, l'acqua, senza ulteriori immissioni, deve rimanere ferma nelle camere per almeno 5 giorni.
Piogge abbondanti tali da determinare fuoriuscita dell'acqua dalle camere nei primi giorni successivi al trattamento, possono ridurre l'attività erbicida di PULL 52 DF.
PULL 52 DF non è volatile e quindi non costituisce pericolo per le colture adiacenti diverse dal riso, le quali però non devono essere investite direttamente dall'irrorazione.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Sciogliere il prodotto in poca acqua, indi versare nella botte contenente metà dell'acqua necessaria e portare a volume tenendo la miscela in costante agitazione.
COMPATIBILITA'
PULL 52 DF è compatibile con prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxadiazon (in pre-semina) e con prodotti contenenti la sostanza attiva propanil (in post-emergenza). In caso di miscela con altri formulati versare nella botte prima PULL 52 DF e poi gli altri prodotti.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
AVVERTENZE AGRONOMICHE
Effettuare una sola applicazione di PULL 52 DF all'anno.
Non applicare PULL 52 DF su colture stressate o sofferenti per anormali condizioni climatiche, malattie, attacchi di insetti od eventualmente già danneggiate da precedenti trattamenti effettuati con altri erbicidi.

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare di colpire direttamente o tramite deriva colture o piante arboree. Non lavare l'attrezzatura vicino a colture o piante sensibili. Non usare l'acqua delle camere trattate per irrigare direttamente colture diverse dal riso.

Avvertenze: subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca di uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
d) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ammoniaca di uso domestico al 6%.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali.

CONTIENE BENSULFURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato: E.I. Du Pont de Nemours & Co., Inc.

Altre taglie autorizzate: kg 0.5 - kg 1

FOGLIO ILLUSTRATIVO

PULL® 52 DF

Erbicida specifico contro infestanti non graminacee delle risaie
Granuli idrodispersibili

PULL 52 DF
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Bensulfuron metile puro g 50
Metsulfuron metile puro g 2
Coformulanti q. b. a 100.

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 8360 del 07.08.1993 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 100 **PARTITA N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI MEDICHE
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea. **Terapia**: sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE
PULL 52 DF è un erbicida specifico contro infestanti non graminacee delle risaie. Combatte efficacemente *Butomus umbellatus, Bolboschenus (Scirpus) maritimus, Schoenoplectus (Scirpus) mucronatus, Alisma plantago-aquatica, Alisma lanceolata, Cyperus spp., Heteranthera reniformis, Heteranthera limosa, Sparganium erectum, Typha spp.* PULL 52 DF esercita inoltre un buon contenimento delle infestazioni di *Leersia oryzoides*.
In generale l'effetto erbicida di PULL 52 DF è migliore su piante piccole e in attiva crescita.

MODALITA' DI IMPIEGO
PULL 52 DF si impiega alla dose di 100 g per ettaro in risaia umida (0-1 cm di acqua) oppure uniformemente sommersa (5-10 cm d'acqua). Il trattamento può essere eseguito da 2 a 5 giorni prima della semina del riso oppure in alternativa da 20 a 40 giorni dopo la stessa, in combinazione o meno con prodotti specifici contro il giavone. Su *H. limosa ed H. reniformis* PULL 52 DF deve essere distribuito quando tali infestanti sono in uno stadio di sviluppo compreso tra la comparsa delle prime foglioline basali e le 2 foglie di tipo reniforme. Il prodotto deve essere distribuito uniformemente con le normali attrezzature usate per il diserbo del riso.
Dopo il trattamento su risaia umida attendere 24 ore prima di reimmettere acqua; dopo il trattamento su risaia sommersa, l'acqua, senza ulteriori immissioni, deve rimanere ferma nelle camere per almeno 5 giorni.
Piogge abbondanti tali da determinare fuoriuscita dell'acqua dalle camere nei primi giorni successivi al trattamento, possono ridurre l'attività erbicida di PULL 52 DF.
PULL 52 DF non è volatile e quindi non costituisce pericolo per le colture adiacenti diverse dal riso, le quali però non devono essere investite direttamente dall'irrorazione.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Sciogliere il prodotto in poca acqua, indi versare nella botte contenente metà dell'acqua necessaria e portare a volume tenendo la miscela in costante agitazione.
COMPATIBILITA'
PULL 52 DF è compatibile con prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxadiazon (in pre-semina) e con prodotti contenenti la sostanza attiva propanil (in post-emergenza). In caso di miscela con altri formulati versare nella botte prima PULL 52 DF e poi gli altri prodotti.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
AVVERTENZE AGRONOMICHE
Effettuare una sola applicazione di PULL 52 DF all'anno.
Non applicare PULL 52 DF su colture stressate o sofferenti per anormali condizioni climatiche, malattie, attacchi di insetti od eventualmente già danneggiate da precedenti trattamenti effettuati con altri erbicidi.

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare di colpire direttamente o tramite deriva colture o piante arboree. Non lavare l'attrezzatura vicino a colture o piante sensibili. Non usare l'acqua delle camere trattate per irrigare direttamente colture diverse dal riso.

Avvertenze: subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca di uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
d) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ammoniaca di uso domestico al 6%.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali.

CONTIENE BENSULFURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato: E.I. Du Pont de Nemours & Co., Inc.

Altre taglie autorizzate: kg 0.5 - kg 1

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

PULL® 52 DF

Erbicida solfonilureico specifico contro le infestanti non graminacee delle risaie - Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Bensulfuron metile puro g 50
Metsulfuron metile puro g 2
Coformulanti q. b. a 100.

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 8360 del 07.08.1993 del Ministero della Sanità

Contenuto netto g 100 **PARTITA N.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

RAIDER® 40 DF

Fungicida a base di idrossido di rame
Granuli idrodispersibili

RAIDER® 40 DF
Composizione
100 gr di prodotto contengono:
Rame metallo g 40
(sotto forma di idrossido)
Coformulanti q.b.a 100
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione (R22). Rischio di gravi lesioni oculari (R41). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).
CONSIGLI DI PRUDENZA:.
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia (S36/37/39). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di produzione:
E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) - 12701 Almeda Road, Houston Texas (USA)
Officine di solo confezionamento:
AGRIFORMULA s.r.l. – Paganica (AQ)
SCAM S.r.l. – Str. Bellaria 164 - S. Maria di Mugnano (MO)
SIPCAM S.p.A. – Via V. Veneto 82 – Salerano sul Lambro (LO)
ITAL-AGRO S.a.s. – Via Cravero 110 – Grugliasco (TO)
CHEMIA S.p.A. – S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)
BAYER S.p.A. – Via delle Industrie, 9 - Filago (BG)
PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours – La Chambre (Francia)
Distribuito da: S.I.V.A.M. S.p.a. Via Scarlatti 30 – Milano
Registrazione n. 8856 del 10.06.1996 del Ministero della Sanità
Contenuto netto g 100 - 500 - kg 1 – 5 – 10 - 20 Partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione dei metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE: RAIDER® 40 DF è un fungicida a base di Rame idrossido in granuli idrodispersibili. Tale formulazione garantisce un'ottima fluidità del prodotto, nonché elevata adesività e persistenza sulle colture trattate.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Introdurre i granuli nel serbatoio dell'irroratrice, parzialmente riempita d'acqua, e mescolare sino a completa dissoluzione del preparato. Le dosi indicate si riferiscono a 100 lt d'acqua e per trattamenti con pompe a volume normale.

Melo, Pero	contro Ticchiolatura e Cancro nei trattamenti autunno-invernali	g 500-1000
	nei trattamenti primaverili	g 200-300
Drupacee e mandorlo	contro Sclerotinia, Corineo, Bolla nei trattamenti autunno-invernali	g 500-1000
Vite	contro Peronospora, Black-rot, Antracnosi	g 200-300
Agrumi	contro Fumaggine, Mal secco, Allupatura, Gommosi del colletto, Batteriosi	g 200-300
Orticole	(carciofo, cardo, carota, cavolo, cetriolo, cicoria, cipolla, fagiolo, lattuga, melanzana, melone, patata pomodoro, peperone, pisello, rapa, ravanello, sedano, spinacio, prezzemolo, zucca): contro Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Cercospora, Batteriosi, Septoriosi	g 200-300
Olivo	contro Fumaggine, Occhio di Pavone	g 200-300
Barbabietola da zucchero	contro Peronospora, Cercospora	kg 3-3,5/ha
Fragola	contro Vaiolatura	g 200-300
Floreali in pieno campo	contro Ruggine, Peronospora	g 200-300
Riso	contro Alghe verdi, intervenire alla comparsa dell'attacco con un quantitativo di soluzione sufficiente a coprire l'intera superficie	kg 2,80-3,65/ha

COMPATIBILITA': RAIDER® 40 DF non è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina e con Tiram.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Su varietà di Melo (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard), su Drupacee sensibili ai prodotti cuprici, il prodotto può essere fitotossico, se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Non trattare durante la fioritura per l'azione caustica sui fiori.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere I trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: **Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.** Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato S.I.V.A..M. S.p.A.

RAMEDIT® COMBI COLORATO

Antiperonosporico per Vite, Tabacco, Pomodoro e Patata - Polvere bagnabile

RAMEDIT COMBI COLORATO
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 4,2
Rame metallo g 39.75
(da ossicloruro tetraramico)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi (R36). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l - Via Siemens 12, Bolzano
Distribuito da: Siapa S.r.l. – Via Caldera 21, Milano

Registrazione N. 11332 del 22.05.2002 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4,2% e RAME METALLO 39,75% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** Sintomatica.
RAME METALLO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
RAMEDIT COMBI COLORATO è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della vite, della patata, del pomodoro e del tabacco.
RAMEDIT COMBI COLORATO agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Per evitare interferenze nella fecondazione o rallentamenti dello sviluppo vegetativo, si consiglia di non applicare RAMEDIT COMBI COLORATO in concomitanza con la fioritura. In tale periodo sono consigliate le miscele di RAMEDIT COMBI COLORATO con Zineb, Mancozeb (NB: per il pomodoro gli ultimi due principi attivi sono applicabili solo fino alla prima fioritura) e con Folpet.
Dosi - Epoche - Modalità d'impiego
Peronospora della vite: usare g 200-300 di prodotto ogni 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fino al persistere delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Non trattare durante il periodo della fioritura.
Peronospora del tabacco, della patata e del pomodoro: usare g 300 di prodotto ogni 100 litri d'acqua.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di RAMEDIT COMBI COLORATO in poca acqua: indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente, tenendo la miscela in costante agitazione.

COMPATIBILITA'
RAMEDIT COMBI COLORATO è compatibile con tutti gli altri antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare RAMEDIT COMBI COLORATO in associazione ad antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato SIAPA S.r.l.

Altre officine autorizzate:
Isagro S.p.A. - Stabilimento di Aprilia (Latina)
AgriFormula S.r.l. – Stabilimento di Paganica (L'Aquila)
Isagro S.p.A. – Stabilimento di Adria Cavanella Po (Rovigo)
Altra taglia autorizzata: kg 10

RAMEDIT® COMBI

Fungicida ad azione antiperonosporica con effetto collaterale contro muffa grigia, alternaria septoria – Polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 4,2
Rame metallico g 40
(sotto forma di ossicloruro di rame)
Coformulanti q.b. a. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi (R36). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43).
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta (46). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Isagro S.p.A.- Adria Cavanella Po (RO)
Distribuito da:
Siapa Srl - via Caldera 21, Milano

Registrazione n° 3537 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 Partita N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4,2%; RAME 40%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da **inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia**: sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE
RAMEDIT COMBI è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della **vite**, della **patata**, del **pomodoro**, della **lattuga**, dello **spinacio**, degli **zucchini**, del **pisello**, della **cipolla**, dell'**aglio**, del **porro**, della **soia**, del **tabacco**, del **girasole**, del **carciofo**, della **rosa** e del **melone**, con effetto collaterale contro altre malattie fungine di dette colture. RAMEDIT COMBI è una miscela di 2 fungicidi di cui l'ossicloruro di rame possiede una lunga persistenza di azione, mentre il secondo ha prontezza d'azione ed effetto bloccante, in quanto penetra nelle foglie.

DOSI E MODALITÀ D'AZIONE
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con attrezzature a volume normale (1000 l/ha per vite, 600-1000 l/ha per le colture erbacee, orticole e la rosa, in funzione dello sviluppo vegetativo). Nel caso di trattamenti a volume ridotto le dosi vanno opportunamente modificate in modo da somministrare il medesimo quantitativo di prodotto per unità di superficie.
VITE - Contro Peronospora (azione collaterale nei confronti di Muffa Grigia ed Escoriosi). Dose di impiego: 200-350 g. per 100 litri di acqua. I trattamenti possono essere effettuati a partire da quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fintanto che permangono tali condizioni favorevoli. Data la presenza del Rame, il prodotto è indicato per trattamenti post-allegagione. In condizioni normali i trattamenti possono essere effettuati ogni 8-10 giorni od in funzione delle piogge infettanti. In condizioni particolarmente critiche le cadenze di intervento possono essere accorciate.
TABACCO, POMODORO, CARCIOFO e PATATA - Contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose di impiego: 300 g. per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, oppure in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.
LATTUGA, SPINACIO, ZUCCHINI, PISELLO, CIPOLLA, AGLIO, PORRO - Contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose di impiego: 200-300 g. per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnatura) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, oppure in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.
MELONE - Contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose di impiego: 200-300 g. per 100 litri di acqua. Effettuare i trattamenti ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.
SOIA e GIRASOLE - Contro Peronospora (azione anche contro Septoria, attività collaterale anche contro Sclerotinia). Dose di impiego: 200-300 g. per 100 litri di acqua (dose massima per ettaro: 4-5 kg).
ROSA - Contro Peronospora (Peronospora sparsa), con azione collaterale anche contro Ticchiolatura e Ruggine. Dose di impiego: 200-300 g. per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

COMPATIBILITÀ
RAMEDIT COMBI può essere mescolato a tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra od acida. Si sconsiglia l'impiego del prodotto in miscela con formulati a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ'
Non trattare la vite durante la fioritura. Sulla rosa ed orticole, data la molteplicità delle varietà coltivate, è sempre consigliabile adottare prudenza (adottare le dosi minori o ancor meglio effettuare saggi preliminari su piccole superfici) nei primi interventi su cultivar non conosciute di recente introduzione.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PER TABACCO, PATATA, VITE, POMODORO, CEREALI, ORTAGGI, 21 GIORNI PER CARCIOFO E 28 GIORNI PER SOIA E GIRASOLE PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE: Impiegare esclusivamente in agricoltura-ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

®Marchio SIAPA S.r.l.

Altre officine autorizzate:
Isagro S.p.A. – via Nettunense km 23,400 Aprilia (LT);
STI Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Altre taglie autorizzate: kg 0,1 - 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 – 10 - 12 - 14 - 15 - 20 – 25

RAMEDIT® COMBI

Fungicida ad azione antiperonosporica con effetto collaterale contro muffa grigia, alternaria septoria.
Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 4,2
Rame metallico g 40
(sotto forma di ossicloruro di rame)
Coformulanti q.b. a. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi (R36). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43).
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta (46). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Isagro S.p.A.- via Nettunense km 23,400 Aprilia (LT);
Distribuito da:
Siapa Srl - via Caldera 21, Milano
Registrazione n° 3537 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 Partita N.
(contiene 5 sacchetti idrosolubili da kg 0,2)

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4,2%; RAME 40%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia: sintomatica**.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE
RAMEDIT COMBI è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della **vite**, della **patata**, del **pomodoro**, della **lattuga**, dello **spinacio**, degli **zucchini**, del **pisello**, della **cipolla**, dell'**aglio**, del **porro**, della **soia**, del **tabacco**, del **girasole**, del **carciofo**, della **rosa** e del **melone**, con effetto collaterale contro altre malattie fungine di dette colture.
RAMEDIT COMBI è una miscela di 2 fungicidi di cui l'ossicloruro di rame possiede una lunga persistenza di azione, mentre il secondo ha prontezza d'azione ed effetto bloccante, in quanto penetra nelle foglie.
DOSI E MODALITÀ D'AZIONE
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con attrezzature a volume normale (1000 l/ha per vite, 600-1000 l/ha per le colture erbacee, orticole e la rosa, in funzione dello sviluppo vegetativo). Nel caso di trattamenti a volume ridotto le dosi vanno opportunamente modificate in modo da somministrare il medesimo quantitativo di prodotto per unità di superficie.
VITE - Contro Peronospora (azione collaterale nei confronti di Muffa Grigia ed Escoriosi). Dose di impiego: 200-350 g. per 100 litri di acqua. I trattamenti possono essere effettuati a partire da quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fintanto che permangono tali condizioni favorevoli. Data la presenza del Rame, il prodotto è indicato per trattamenti post-allegagione. In condizioni normali i trattamenti possono essere effettuati ogni 8-10 giorni od in funzione delle piogge infettanti. In condizioni particolarmente critiche le cadenze di intervento possono essere accorciate.
TABACCO, POMODORO, CARCIOFO e PATATA - Contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose di impiego: 300 g. per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, oppure in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.
LATTUGA, SPINACIO, ZUCCHINI, PISELLO, CIPOLLA, AGLIO, PORRO - Contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose di impiego: 200-300 g. per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnatura) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, oppure in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.
MELONE - Contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose di impiego: 200-300 g. per 100 litri di acqua. Effettuare i trattamenti ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.
SOIA e GIRASOLE - Contro Peronospora (azione anche contro Septoria, attività collaterale anche contro Sclerotinia). Dose di impiego: 200-300 g. per 100 litri di acqua (dose massima per ettaro: 4-5 kg).
ROSA - Contro Peronospora (Peronospora sparsa), con azione collaterale anche contro Ticchiolatura e Ruggine. Dose di impiego: 200-300 g. per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.
COMPATIBILITÀ
RAMEDIT COMBI può essere mescolato a tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra od acida. Si sconsiglia l'impiego del prodotto in miscela con formulati a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ
Non trattare la vite durante la fioritura. Sulla rosa ed orticole, data la molteplicità delle varietà coltivate, è sempre consigliabile adottare prudenza (adottare le dosi minori o ancor meglio effettuare saggi preliminari su piccole superfici) nei primi interventi su cultivar non conosciute di recente introduzione.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PER TABACCO, PATATA, VITE, POMODORO, CEREALI, ORTAGGI, 21 GIORNI PER CARCIOFO E 28 GIORNI PER SOIA E GIRASOLE PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE: Impiegare esclusivamente in agricoltura-ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

®Marchio SIAPA S.r.l.

Altra officina autorizzata:
STI Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Altre taglie autorizzate:
kg 1,5 (contiene 5 sacchetti idrosolubili da g 300)
kg 3 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da g 300)
kg 5 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da g 500)
kg 5 (contiene 20 sacchetti idrosolubili da g 250)
kg 5 (contiene 25 sacchetti idrosolubili da g 200)
kg 5 (contiene 5 sacchetti idrosolubili da g 1000)
kg 10 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da g 1000)
kg 10 (contiene 5 sacchetti idrosolubili da g 2000)
kg 10 (contiene 20 sacchetti idrosolubili da g 500)
kg 20 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da g 2000)

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

RAMEDIT® COMBI

Fungicida ad azione antiperonosporica con effetto collaterale contro muffa grigia, alternaria septoria.
Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Cimoxanil puro	g	4,2
Rame metallo	g	40
(sotto forma di ossicloruro di rame)		
Coformulanti q. b. a		100

Contenuto netto del sacchetto: 200 g

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione
Isagro S.p.A.- via Nettunense km 23,400 Aprilia (LT);

Distribuito da:
Siapa Srl - via Caldera 21, Milano

Registrazione n° 3537 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità

AVVERTENZA:
Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Altra officina autorizzata:
STI Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)

Altre taglie autorizzate: g 250 – 300 – 500 - 1000

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1 Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua

2 Assicurarsi di avere le mani asciutte

3 Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo

4 Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte

5 Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)

6 Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni soprariportate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

RIBEN® 50 EC

Diserbante per la lotta al Giavone nelle risaie
Concentrato emulsionabile

RIBEN 50 EC
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tiobencarb puro g 50 (= 500 g/l)
Coformulanti q. b. a 100
Contiene XILENE

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile (R10). Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione (R20/21/22). Irritante per la pelle (R38). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande (S13). Conservare lontano da da fiamme e scintille (S16). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37) In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46) Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60) Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Isagro S.p.A. – Via Nettunense Km 23,400 Aprilia (LT)

Registrazione N. 7286 del 26.11.1987 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: **Litri 1 PARTITA N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con la pelle. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose, nausea, vomito, ipertermia, depressione del SNC, bronchite. **Terapia:** sintomatica: se ingerito non provocare il vomito, ma effettuare gastrolusi.
N.B. - Molti formulati commerciali contengono solventi i quali possono essere responsabili di variazione e di aggravamento della sintomatologia clinica: in tali casi possono aversi gravi lesioni epatiche, renali ed a carico del SNC e periferico; i derivati del petrolio possono provocare polmoniti chimiche. **Terapia:** sintomatica; non provocare il vomito, ma effettuare gastrolusi.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE
Il RIBEN 50 EC è un erbicida da impiegare nelle risaie per la lotta ai Giavoni *(Echinochloa e Panicum)*. Esplica anche una certa azione contro le *Heteranthera spp.* nonché contro le *Ciperacee* e le *Alismatacee* nate da seme. Il prodotto non e' volatile e viene trattenuto dai colloidi del terreno che ne aumentano la persistenza (5 settimane).

MODALITA' D'IMPIEGO
Distribuire 6 - 8 l/ha di RIBEN 50 EC secondo le seguenti modalità:
- **in pre-semina** con la risaia allagata e con le bocchette chiuse (impiegare la dose più bassa nei terreni sciolti e la più alta nei terreni argillosi). E' anche possibile operare su risaia asciutta, senza interrare il prodotto, evitando una immissione troppo rapida e violenta dell'acqua poiché, a causa del ruscellamento, il prodotto puo' accumularsi nelle camere più a valle. Dopo 5-6 giorni dal trattamento ripristinare il livello e seminare.
- **post-emergenza** a risaia allagata, dopo che il riso ha differenziato 2 foglie e quando il giavone si trova con meno di 2 foglie.
Non impiegare il prodotto su giavone più sviluppato in quanto dopo lo stadio di 3 foglie non e' sufficientemente sensibile.
- **coltura del riso in asciutta** (semina in asciutta): il prodotto deve essere usato in pre-emergenza alla dose di 4-5 litri/ha.
Distribuire il prodotto in una quantità di acqua di 400 - 600 l/ha. Se il trattamento viene effettuato a risaia asciutta, si raccomanda comunque di eseguire il trattamento quando il terreno abbia ancora sufficiente umidità. In terreni pesanti solo il dosaggio più alto garantisce un sufficiente grado di efficacia.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione direttamente nella quantita' di acqua necessaria.

COMPATIBILITA'
Il RIBEN 50 EC non è compatibile con erbicidi a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il RIBEN 50 EC può essere fitotossico per le piantine di riso molto giovani se completamente sommerse da acqua stagnante e calda.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Altre officine autorizzate:
INAGRA S.A. 46410 SUECA - Valencia (Spagna)
HERMANIA Dr. Schirm – 39218 Schoenebeck - Germania

Altre taglie autorizzate: litri 5 - 10

RIBEN® 90 EC

Diserbante per la lotta al Giavone nelle risaie
Concentrato emulsionabile

RIBEN 90 EC
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tiobencarb puro g 90 (= 1050 g/l)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione per ingestione (R22). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37) In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46) Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60) Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. – via Siemens 12, Bolzano

Registrazione N. 8442 del 16.11.1993 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: Litri 1..........PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose, nausea, vomito, ipertermia, depressione del SNC, bronchite.
Terapia: sintomatica: se ingerito non provocare il vomito, ma effettuare gastrolusi.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118.

CARATTERISTICHE D'AZIONE
Il RIBEN 90 EC è un erbicida da impiegare nelle risaie per la lotta all'*Echinochloa spp.* (Giavone) e *Panicum spp.* (Panico). Esplica anche una certa azione contro le *Heteranthera spp.* (Eterantera) nonché contro le *Ciperacee* (Zigolo delle Risaie) e le *Alismatacee* (Mestolaccia) nate da seme. Il prodotto non è volatile e viene trattenuto dai colloidi del terreno che ne aumentano la persistenza (5 settimane).
MODALITA' D'IMPIEGO
Dosi: 3 – 4 l/ha secondo le seguenti modalità:
- **in pre-semina** con la risaia allagata e con le bocchette chiuse impiegare la dose più bassa nei terreni sciolti e la più alta nei terreni argillosi. E' anche possibile operare su risaia asciutta, evitando una successiva immissione dell'acqua troppo rapida e violenta, poiché il prodotto può accumularsi nelle camere più a valle. Seminare dopo 5-6 giorni dal trattamento
- **post-emergenza** a risaia allagata, dopo che il riso ha differenziato 2 foglie e quando il giavone si trova con meno di 2 foglie.
- **coltura del riso con semina in asciutta**: il prodotto deve essere usato in pre-emergenza alla dose di 2-2,5 litri/ha.
VOLUME D'IRRORAZIONE: 400-600 l/ha di acqua
Se il trattamento viene effettuato a risaia asciutta, si raccomanda comunque di eseguire il trattamento quando il terreno abbia ancora sufficiente umidità.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione direttamente nella quantità d'acqua necessaria.
COMPATIBILITA'
Il RIBEN 90 EC è compatibile in via di massima con altri erbicidi, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il RIBEN 90 EC può essere fitotossico per le piantine di riso molto giovani se completamente sommerse da acqua stagnante e calda.
INTERVALLO DI SICUREZZA:
Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Altra officina autorizzata:
INAGRA S.A. 46410 SUECA - Valencia (Spagna)
Altre taglie autorizzate: litri 5 - 10

SAFARI®

Erbicida di post-emergenza selettivo per la barbabietola da zucchero - Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Triflusulfuron metile p.a. puro 50 g
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia
Registrazione n. 8886 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 100 **PARTITA N.:**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.
Terapia: Sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche tecniche
SAFARI blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi (ingiallimenti,necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 15 giorni dalla applicazione.
EFFICACIA ERBICIDA
SAFARI, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani (entro le 2-4 foglie vere) ed in attiva crescita e, poiché non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Infestanti sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Centonchio), *Bidens spp* (Forbicina), *Bifora radians* (Coriandolo fetido), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Daucus carota* (Carota selvatica), *Galium aparine* (Attaccamani), *Mercurialis annua* (Mercorella comune), *Myagrum perfoliatum* (Miagro liscio), *Poligonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Poligono nodoso), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio), *Veronica persica* (Veronica comune),*Veronica arvensis* (Veronica).
Alcune infestanti (Abutilon t., Myagrum p., Stellaria m.) se trattate ad uno stadio superiore alle 3 - 4 foglie vere, possono subire solo un arresto di sviluppo che non ne determina la successiva morte.
DOSE D'IMPIEGO:
30 - 40 g/ha in 150-300 litri d'acqua addizionato con bagnante Trend alla dose di 250 cc per ogni 100 l di acqua oppure con olio bianco a 0,5 lt/ha, su coltura allo stadio compreso tra i cotiledoni e le 6 foglie. La dose maggiore é consigliata quando il prodotto é impiegato da solo per il controllo di *Polygonum lapathifolium, Solanum nigrum, Mercurialis annua, Myagrum perfoliatum, Capsella bursa pastoris ed Abutilon theophrasti.*
SAFARI va utilizzato con due interventi distanziati di 10 - 12 gg tra di loro. Su terreni torbosi ed in presenza di infestanti ad emergenza ritardata o scalare (es. *Abutilon theophrasti*), può rendersi necessaria una terza applicazione, comunque effettuata entro lo stadio di 6 foglie della coltura.
Per completare lo spettro d'azione di SAFARI su alcune infestanti meno sensibili (*Amaranthus hibridus, Chenopodium album, Polygonum convolvulus, Polygonum aviculare*) é opportuna la miscela con uno o più formulati contenenti sostanze ad attività erbicida complementare.
EPOCA D'IMPIEGO: Post emergenza.
PREPARAZIONE DELLA MISCELA: SAFARI, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratrice riempito circa a 1/4, mantenendo in movimento l'agitatore. Portare al volume desiderato il serbatoio ed aggiungere il bagnante Trend. Eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate. La sospensione deve essere preparata poco prima dell'applicazione in campo.
E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare SAFARI. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
Subito dopo il trattamento con SAFARI è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita addizionata di una soluzione detergente (0.5 lt di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 lt di acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa,barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Si sconsigliano le miscele di SAFARI con formulati contenenti Ethofumesate e Clopiralid. Non effettuare i trattamenti in presenza di brina o gelo o a temperature superiori a 23 C. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacco di parassiti, asfissia radicale o per effetto di precedenti interventi antiparassitari.
SAFARI e' poco persistente nel suolo; la sua utilizzazione non comporta alcuna restrizione per le colture che rientrano nel normale avvicendamento della barbabietola da zucchero.
Si sconsiglia l'impianto di colture floricole, ornamentali ed arbustive nei 12 mesi successivi al trattamento effettuato con SAFARI.
In caso di distruzione accidentale o volontaria della coltura precedentemente trattata con SAFARI, e' possibile la risemina della sola barbabietola da zucchero; tale raccomandazione non tiene conto degli eventuali altri erbicidi impiegati sulla medesima coltura.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

COMPATIBILITA': SAFARI è compatibile con i più comuri antiparassitari impiegati sulla barbabietola da zucchero, ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) -U.S.A.

Altre taglie autorizzate: g 120 - 200 - 250

FOGLIO ILLUSTRATIVO

SAFARI®

Erbicida di post-emergenza selettivo per la barbabietola da zucchero - Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Triflusulfuron metile p.a. puro 50 g
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia
Registrazione n. 8886 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 100 **PARTITA N.:**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.
Terapia: Sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche tecniche
SAFARI blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi (ingiallimenti,necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 15 giorni dalla applicazione.
EFFICACIA ERBICIDA
SAFARI, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani (entro le 2-4 foglie vere) ed in attiva crescita e, poiché non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Infestanti sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Centonchio), *Bidens spp* (Forbicina), *Bifora radians* (Coriandolo fetido), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Daucus carota* (Carota selvatica), *Galium aparine* (Attaccamani), *Mercurialis annua* (Mercorella comune), *Myagrum perfoliatum* (Miagro liscio), *Poligonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Poligono nodoso), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio), *Veronica persica* (Veronica comune),*Veronica arvensis* (Veronica).
Alcune infestanti (Abutilon t., Myagrum p., Stellaria m.) se trattate ad uno stadio superiore alle 3 - 4 foglie vere, possono subire solo un arresto di sviluppo che non ne determina la successiva morte.
DOSE D'IMPIEGO:
30 - 40 g/ha in 150-300 litri d'acqua addizionato con bagnante Trend alla dose di 250 cc per ogni 100 l di acqua oppure con olio bianco a 0,5 lt/ha, su coltura allo stadio compreso tra i cotiledoni e le 6 foglie. La dose maggiore é consigliata quando il prodotto é impiegato da solo per il controllo di *Polygonum lapathifolium, Solanum nigrum, Mercurialis annua, Myagrum perfoliatum, Capsella bursa pastoris ed Abutilon theophrasti.*
SAFARI va utilizzato con due interventi distanziati di 10 - 12 gg tra di loro.
Su terreni torbosi ed in presenza di infestanti ad emergenza ritardata o scalare (es. *Abutilon theophrasti*), può rendersi necessaria una terza applicazione, comunque effettuata entro lo stadio di 6 foglie della coltura.
Per completare lo spettro d'azione di SAFARI su alcune infestanti meno sensibili (*Amaranthus hibridus, Chenopodium album, Polygonum convolvulus, Polygonum aviculare*) é opportuna la miscela con uno o più formulati contenenti sostanze ad attività erbicida complementare.
EPOCA D'IMPIEGO: Post emergenza.
PREPARAZIONE DELLA MISCELA: SAFARI, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratrice riempito circa a 1/4, mantenendo in movimento l'agitatore. Portare al volume desiderato il serbatoio ed aggiungere il bagnante Trend. Eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate. La sospensione deve essere preparata poco prima dell'applicazione in campo.
E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare SAFARI. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
Subito dopo il trattamento con SAFARI è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita addizionata di una soluzione detergente (0.5 lt di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 lt di acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa,barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Si sconsigliano le miscele di SAFARI con formulati contenenti Ethofumesate e Clopiralid. Non effettuare i trattamenti in presenza di brina o gelo o a temperature superiori a 23 C. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacco di parassiti, asfissia radicale o per effetto di precedenti interventi antiparassitari.
SAFARI e' poco persistente nel suolo; la sua utilizzazione non comporta alcuna restrizione per le colture che rientrano nel normale avvicendamento della barbabietola da zucchero.
Si sconsiglia l'impianto di colture floricole, ornamentali ed arbustive nei 12 mesi successivi al trattamento effettuato con SAFARI.
In caso di distruzione accidentale o volontaria della coltura precedentemente trattata con SAFARI, e' possibile la risemina della sola barbabietola da zucchero; tale raccomandazione non tiene conto degli eventuali altri erbicidi impiegati sulla medesima coltura.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

COMPATIBILITA': SAFARI è compatibile con i più comuni antiparassitari impiegati sulla barbabietola da zucchero, ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) -U.S.A.

Altre taglie autorizzate: **g 120 - 200 - 250**

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

SAFARI®

Erbicida di post-emergenza selettivo per la barbabietola da zucchero
Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Triflusulfuron metile p.a. puro 50 g
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia
Registrazione n. 8887 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 100 **PARTITA N.:**

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altre taglie autorizzate: g 120 - 200 - 250

SAFARI®

Erbicida di post-emergenza selettivo per la barbabietola da zucchero. Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Triflusulfuron metile p.a. puro 50 g
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia
Registrazione n. 8886 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 30 **PARTITA N.:**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.
Terapia: Sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche tecniche
SAFARI blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi (ingiallimenti,necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 15 giorni dalla applicazione.
EFFICACIA ERBICIDA
SAFARI, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani (entro le 2-4 foglie vere) ed in attiva crescita e, poiché non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Infestanti sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Centonchio), *Bidens spp* (Forbicina), *Bifora radians* (Coriandolo fetido), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Daucus carota* (Carota selvatica), *Galium aparine* (Attaccamani), *Mercurialis annua* (Mercorella comune), *Myagrum perfoliatum* (Miagro liscio), *Poligonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Poligono nodoso), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio), *Veronica persica* (Veronica comune),*Veronica arvensis* (Veronica).
Alcune infestanti (Abutilon t., Myagrum p., Stellaria m.) se trattate ad uno stadio superiore alle 3 - 4 foglie vere, possono subire solo un arresto di sviluppo che non ne determina la successiva morte.
DOSE D'IMPIEGO:
30 - 40 g/ha in 150-300 litri d'acqua addizionato con bagnante Trend alla dose di 250 cc per ogni 100 l di acqua oppure con olio bianco a 0,5 lt/ha, su coltura allo stadio compreso tra i cotiledoni e le 6 foglie. La dose maggiore é consigliata quando il prodotto é impiegato da solo per il controllo di *Polygonum lapathifolium, Solanum nigrum, Mercurialis annua, Myagrum perfoliatum, Capsella bursa pastoris ed Abutilon theophrasti.*
SAFARI va utilizzato con due interventi distanziati di 10 - 12 gg tra di loro. Su terreni torbosi ed in presenza di infestanti ad emergenza ritardata o scalare (es. *Abutilon theophrasti*), può rendersi necessaria una terza applicazione, comunque effettuata entro lo stadio di 6 foglie della coltura. Per completare lo spettro d'azione di SAFARI su alcune infestanti meno sensibili (*Amaranthus hibridus, Chenopodium album, Polygonum convolvulus, Polygonum aviculare*) é opportuna la miscela con uno o più formulati contenenti sostanze ad attività erbicida complementare.
EPOCA D'IMPIEGO: Post emergenza.
PREPARAZIONE DELLA MISCELA: SAFARI, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratrice riempito circa a 1/4, mantenendo in movimento l'agitatore. Portare al volume desiderato il serbatoio ed aggiungere il bagnante Trend. Eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate. La sospensione deve essere preparata poco prima dell'applicazione in campo.
E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare SAFARI. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
Subito dopo il trattamento con SAFARI è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita addizionata di una soluzione detergente (0.5 lt di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 lt di acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa,barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Si sconsigliano le miscele di SAFARI con formulati contenenti Ethofumesate e Clopiralid. Non effettuare i trattamenti in presenza di brina o gelo o a temperature superiori a 23 C. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacco di parassiti, asfissia radicale o per effetto di precedenti interventi antiparassitari.
SAFARI e' poco persistente nel suolo; la sua utilizzazione non comporta alcuna restrizione per le colture che rientrano nel normale avvicendamento della barbabietola da zucchero.
Si sconsiglia l'impianto di colture floricole, ornamentali ed arbustive nei 12 mesi successivi al trattamento effettuato con SAFARI.
In caso di distruzione accidentale o volontaria della coltura precedentemente trattata con SAFARI, e' possibile la risemina della sola barbabietola da zucchero; tale raccomandazione non tiene conto degli eventuali altri erbicidi impiegati sulla medesima coltura.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

COMPATIBILITA': SAFARI è compatibile con i più comuri antiparassitari impiegati sulla barbabietola da zucchero, ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) -U.S.A.

Altre taglie autorizzate:
g 40 (contiene 1 sacchetto da g 40)
g 120 (contiene 4 sacchetti da g 30)
g 300 (contiene 10 sacchetti da g 30)

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

SAFARI®

Erbicida di post-emergenza selettivo per la barbabietola da zucchero
Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Triflusulfuron metil p.a. puro 50g
coformulanti q. b. a 100

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. -Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia

Registrazione N. 8886 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto netto del sacchetto: 30 g

AVVERTENZA: Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

Altre taglie autorizzate:
g 300 (contiene 10 sacchetti da g 30)
g 40 (contiene 1 sacchetto da g 40)
g 120 (contiene 4 sacchetti da g 30)

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1. Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua
2. Assicurarsi di avere le mani asciutte
3. Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo
4. Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte
5. Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)
6. Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni soprariportate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato, pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

SIGMA® 52 DF

Erbicida specifico contro infestanti non graminacee delle risaie
Granuli idrodispersibili

SIGMA 52 DF
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Bensulfuron metile puro g 50
Metsulfuron metile puro g 2
Coformulanti q. b. a 100.

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico(R50/53)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 8153 del 30.12.1992 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 100 **PARTITA N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI MEDICHE
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea. **Terapia**: sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE
SIGMA 52 DF è un erbicida specifico contro infestanti non graminacee delle risaie. Combatte efficacemente *Butomus umbellatus, Bolboschenus (Scirpus) maritimus, Schoenoplectus (Scirpus) mucronatus, Alisma plantago-aquatica, Alisma lanceolata, Cyperus spp., Heteranthera reniformis, Heteranthera limosa, Sparganium erectum, Typha spp.* SIGMA 52 DF esercita inoltre un buon contenimento delle infestazioni di *Leersia oryzoides*.
In generale l'effetto erbicida di SIGMA 52 DF è migliore su piante piccole e in attiva crescita.

MODALITA' DI IMPIEGO
SIGMA 52 DF si impiega alla dose di 100 g per ettaro in risaia umida (0-1 cm di acqua) oppure uniformemente sommersa (5-10 cm d'acqua). Il trattamento può essere eseguito da 2 a 5 giorni prima della semina del riso oppure in alternativa da 20 a 40 giorni dopo la stessa, in combinazione o meno con prodotti specifici contro il giavone. Su *H. limosa ed H. reniformis* SIGMA 52 DF deve essere distribuito quando tali infestanti sono in uno stadio di sviluppo compreso tra la comparsa delle prime foglioline basali e le 2 foglie di tipo reniforme. Il prodotto deve essere distribuito uniformemente con le normali attrezzature usate per il diserbo del riso.
Dopo il trattamento su risaia umida attendere 24 ore prima di reimmettere acqua; dopo il trattamento su risaia sommersa, l'acqua, senza ulteriori immissioni, deve rimanere ferma nelle camere per almeno 5 giorni.
Piogge abbondanti tali da determinare fuoriuscita dell'acqua dalle camere nei primi giorni successivi al trattamento, possono ridurre l'attività erbicida di SIGMA 52 DF.
SIGMA 52 DF non è volatile e quindi non costituisce pericolo per le colture adiacenti diverse dal riso, le quali però non devono essere investite direttamente dall'irrorazione.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Sciogliere il prodotto in poca acqua, indi versare nella botte contenente metà dell'acqua necessaria e portare a volume tenendo la miscela in costante agitazione.
COMPATIBILITA'
SIGMA 52 DF è compatibile con prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxadiazon (in pre-semina) e con prodotti contenenti la sostanza attiva propanil (in post-emergenza). In caso di miscela con altri formulati versare nella botte prima SIGMA 52 DF e poi gli altri prodotti.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
AVVERTENZE AGRONOMICHE
Effettuare una sola applicazione di SIGMA 52 DF all'anno.
Non applicare SIGMA 52 DF su colture stressate o sofferenti per anormali condizioni climatiche, malattie, attacchi di insetti od eventualmente già danneggiate da precedenti trattamenti effettuati con altri erbicidi.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare di colpire direttamente o tramite deriva colture o piante arboree. Non lavare l'attrezzatura vicino a colture o piante sensibili. Non usare l'acqua delle camere trattate per irrigare direttamente colture diverse dal riso.

Avvertenze: subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca di uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
d) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ammoniaca di uso domestico al 6%.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali.

CONTIENE BENSULFURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato: E.I. Du Pont de Nemours & Co., Inc.

Altre taglie autorizzate: kg 0.5 - kg 1

FOGLIO ILLUSTRATIVO

SIGMA® 52 DF

Erbicida specifico contro infestanti non graminacee delle risaie
Granuli idrodispersibili

SIGMA 52 DF
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Bensulfuron metile puro g 50
Metsulfuron metile puro g 2
Coformulanti q. b. a 100.

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico(R50/53)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 8153 del 30.12.1992 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 100 **PARTITA N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI MEDICHE
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea. **Terapia**: sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE
SIGMA 52 DF è un erbicida specifico contro infestanti non graminacee delle risaie. Combatte efficacemente *Butomus umbellatus, Bolboschenus (Scirpus) maritimus, Schoenoplectus (Scirpus) mucronatus, Alisma plantago-aquatica, Alisma lanceolata, Cyperus spp., Heteranthera reniformis, Heteranthera limosa, Sparganium erectum, Typha spp.* SIGMA 52 DF esercita inoltre un buon contenimento delle infestazioni di *Leersia oryzoides*.
In generale l'effetto erbicida di SIGMA 52 DF è migliore su piante piccole e in attiva crescita.

MODALITA' DI IMPIEGO
SIGMA 52 DF si impiega alla dose di 100 g per ettaro in risaia umida (0-1 cm di acqua) oppure uniformemente sommersa (5-10 cm d'acqua). Il trattamento può essere eseguito da 2 a 5 giorni prima della semina del riso oppure in alternativa da 20 a 40 giorni dopo la stessa, in combinazione o meno con prodotti specifici contro il giavone. Su *H. limosa ed H. reniformis* SIGMA 52 DF deve essere distribuito quando tali infestanti sono in uno stadio di sviluppo compreso tra la comparsa delle prime foglioline basali e le 2 foglie di tipo reniforme. Il prodotto deve essere distribuito uniformemente con le normali attrezzature usate per il diserbo del riso.
Dopo il trattamento su risaia umida attendere 24 ore prima di reimmettere acqua; dopo il trattamento su risaia sommersa, l'acqua, senza ulteriori immissioni, deve rimanere ferma nelle camere per almeno 5 giorni.
Piogge abbondanti tali da determinare fuoriuscita dell'acqua dalle camere nei primi giorni successivi al trattamento, possono ridurre l'attività erbicida di SIGMA 52 DF.
SIGMA 52 DF non è volatile e quindi non costituisce pericolo per le colture adiacenti diverse dal riso, le quali però non devono essere investite direttamente dall'irrorazione.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Sciogliere il prodotto in poca acqua, indi versare nella botte contenente metà dell'acqua necessaria e portare a volume tenendo la miscela in costante agitazione.
COMPATIBILITA'
SIGMA 52 DF è compatibile con prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxadiazon (in pre-semina) e con prodotti contenenti la sostanza attiva propanil (in post-emergenza). In caso di miscela con altri formulati versare nella botte prima SIGMA 52 DF e poi gli altri prodotti.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
AVVERTENZE AGRONOMICHE
Effettuare una sola applicazione di SIGMA 52 DF all'anno.
Non applicare SIGMA 52 DF su colture stressate o sofferenti per anormali condizioni climatiche, malattie, attacchi di insetti od eventualmente già danneggiate da precedenti trattamenti effettuati con altri erbicidi.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare di colpire direttamente o tramite deriva colture o piante arboree. Non lavare l'attrezzatura vicino a colture o piante sensibili. Non usare l'acqua delle camere trattate per irrigare direttamente colture diverse dal riso.

Avvertenze: subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca di uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
d) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ammoniaca di uso domestico al 6%.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali.

CONTIENE BENSULFURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato: E.I. Du Pont de Nemours & Co., Inc.

Altre taglie autorizzate: kg 0.5 - kg 1

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

SIGMA® 52 DF

Erbicida solfonilureico specifico contro le infestanti non graminacee delle risaie - Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Bensulfuron metile puro g 50
Metsulfuron metile puro g 2
Coformulanti q. b. a 100.

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 8153 del 30.12.1992 del Ministero della Sanità

Contenuto netto g 100 PARTITA N.

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SIGMA® 60 DF

Erbicida specifico contro infestanti non graminacee delle risaie
Granuli idrodispersibili

SIGMA 60 DF
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Bensulfuron metile puro g 58
Metsulfuron metile puro g 2
Coformulanti q. b. a 100.

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 8152 del 30.12.1992 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 100 **PARTITA N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI MEDICHE
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea. **Terapia**: sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE
SIGMA 60 DF è un erbicida specifico contro infestanti non graminacee delle risaie. Combatte efficacemente *Butomus umbellatus, Bolboschenus (Scirpus) maritimus, Schoenoplectus (Scirpus) mucronatus, Alisma plantago-aquatica, Alisma lanceolata, Cyperus spp., Heteranthera reniformis, Heteranthera limosa, Sparganium erectum, Typha spp.* SIGMA 60 **DF** esercita inoltre un buon contenimento delle infestazioni di *Leersia oryzoides*.
In generale l'effetto erbicida di SIGMA 60 DF è migliore su piante piccole e in attiva crescita.

MODALITA' DI IMPIEGO
SIGMA 60 DF si impiega alla dose di 100 g per ettaro in risaia umida (0-1 cm di acqua) oppure uniformemente sommersa (5-10 cm d'acqua). Il trattamento può essere eseguito da 2 a 5 giorni prima della semina del riso oppure in alternativa da 20 a 40 giorni dopo la stessa, in combinazione o meno con prodotti specifici contro il giavone. Su *H. limosa ed H. reniformis* SIGMA 60 DF deve essere distribuito quando tali infestanti sono in uno stadio di sviluppo compreso tra la comparsa delle prime foglioline basali e le 2 foglie di tipo reniforme. Il prodotto deve essere distribuito uniformemente con le normali attrezzature usate per il diserbo del riso.
Dopo il trattamento su risaia umida attendere 24 ore prima di reimmettere acqua; dopo il trattamento su risaia sommersa, l'acqua, senza ulteriori immissioni, deve rimanere ferma nelle camere per almeno 5 giorni.
Piogge abbondanti tali da determinare fuoriuscita dell'acqua dalle camere nei primi giorni successivi al trattamento, possono ridurre l'attività erbicida di SIGMA 60 DF.
SIGMA 60 DF non è volatile e quindi non costituisce pericolo per le colture adiacenti diverse dal riso, le quali però non devono essere investite direttamente dall'irrorazione.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Sciogliere il prodotto in poca acqua, indi versare nella botte contenente metà dell'acqua necessaria e portare a volume tenendo la miscela in costante agitazione.
COMPATIBILITA'
SIGMA 60 DF è compatibile con prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxadiazon (in pre-semina) e con prodotti contenenti la sostanza attiva propanil (in post-emergenza). In caso di miscela con altri formulati versare nella botte prima SIGMA 60 DF e poi gli altri prodotti.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
AVVERTENZE AGRONOMICHE
Effettuare una sola applicazione di SIGMA 60 DF all'anno.
Non applicare SIGMA 60 DF su colture stressate o sofferenti per anormali condizioni climatiche, malattie, attacchi di insetti od eventualmente già danneggiate da precedenti trattamenti effettuati con altri erbicidi.

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare di colpire direttamente o tramite deriva colture o piante arboree. Non lavare l'attrezzatura vicino a colture o piante sensibili. Non usare l'acqua delle camere trattate per irrigare direttamente colture diverse dal riso.

Avvertenze: subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca di uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
d) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ammoniaca di uso domestico al 6%.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali.

CONTIENE BENSULFURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato: E.I. Du Pont de Nemours & Co., Inc.

Altre taglie autorizzate: kg 0.5 - kg 1

FOGLIO ILLUSTRATIVO

SIGMA® 60 DF

Erbicida specifico contro infestanti non graminacee delle risaie
Granuli idrodispersibili

SIGMA 60 DF
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Bensulfuron metile puro g 58
Metsulfuron metile puro g 2
Coformulanti q. b. a 100.

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 8152 del 30.12.1992 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 100 **PARTITA N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI MEDICHE
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea. **Terapia**: sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE
SIGMA 60 DF è un erbicida specifico contro infestanti non graminacee delle risaie. Combatte efficacemente *Butomus umbellatus, Bolboschenus (Scirpus) maritimus, Schoenoplectus (Scirpus) mucronatus, Alisma plantago-aquatica, Alisma lanceolata, Cyperus spp., Heteranthera reniformis, Heteranthera limosa, Sparganium erectum, Typha spp.* SIGMA 60 **DF** esercita inoltre un buon contenimento delle infestazioni di *Leersia oryzoides*.
In generale l'effetto erbicida di SIGMA 60 DF è migliore su piante piccole e in attiva crescita.

MODALITA' DI IMPIEGO
SIGMA 60 DF si impiega alla dose di 100 g per ettaro in risaia umida (0-1 cm di acqua) oppure uniformemente sommersa (5-10 cm d'acqua). Il trattamento può essere eseguito da 2 a 5 giorni prima della semina del riso oppure in alternativa da 20 a 40 giorni dopo la stessa, in combinazione o meno con prodotti specifici contro il giavone. Su *H. limosa ed H. reniformis* SIGMA 60 DF deve essere distribuito quando tali infestanti sono in uno stadio di sviluppo compreso tra la comparsa delle prime foglioline basali e le 2 foglie di tipo reniforme. Il prodotto deve essere distribuito uniformemente con le normali attrezzature usate per il diserbo del riso.
Dopo il trattamento su risaia umida attendere 24 ore prima di reimmettere acqua; dopo il trattamento su risaia sommersa, l'acqua, senza ulteriori immissioni, deve rimanere ferma nelle camere per almeno 5 giorni.
Piogge abbondanti tali da determinare fuoriuscita dell'acqua dalle camere nei primi giorni successivi al trattamento, possono ridurre l'attività erbicida di SIGMA 60 DF.
SIGMA 60 DF non è volatile e quindi non costituisce pericolo per le colture adiacenti diverse dal riso, le quali però non devono essere investite direttamente dall'irrorazione.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Sciogliere il prodotto in poca acqua, indi versare nella botte contenente metà dell'acqua necessaria e portare a volume tenendo la miscela in costante agitazione.
COMPATIBILITA'
SIGMA 60 DF è compatibile con prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxadiazon (in pre-semina) e con prodotti contenenti la sostanza attiva propanil (in post-emergenza). In caso di miscela con altri formulati versare nella botte prima SIGMA 60 DF e poi gli altri prodotti.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
AVVERTENZE AGRONOMICHE
Effettuare una sola applicazione di SIGMA 60 DF all'anno.
Non applicare SIGMA 60 DF su colture stressate o sofferenti per anormali condizioni climatiche, malattie, attacchi di insetti od eventualmente già danneggiate da precedenti trattamenti effettuati con altri erbicidi.

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare di colpire direttamente o tramite deriva colture o piante arboree. Non lavare l'attrezzatura vicino a colture o piante sensibili. Non usare l'acqua delle camere trattate per irrigare direttamente colture diverse dal riso.

Avvertenze: subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca di uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
d) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ammoniaca di uso domestico al 6%.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali.

CONTIENE BENSULFURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato: E.I. Du Pont de Nemours & Co., Inc.

Altre taglie autorizzate: kg 0.5 - kg 1

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

SIGMA® 60 DF

Erbicida specifico contro infestanti non graminacee delle risaie
Granuli idrodispersibili

SIGMA 60 DF
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Bensulfuron metile puro g 58
Metsulfuron metile puro g 2
Coformulanti q. b. a 100.

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 8152 del 30.12.1992 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 100 **PARTITA N.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

STEWARD®

Insetticida selettivo specifico per pomacee, drupacee, vite da vino e da tavola, mais ed alcune colture orticole. Granuli idrodispersibili

STEWARD®
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Indoxacarb g 30
Coformulanti q. b. a 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R22). Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37) In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46) Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Officina di Confezionamento:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l – Via Siemens 12, Bolzano

Registrazione N. 10752 del 19.03.2001 del Ministero della Sanità
Partita N. **Contenuto netto: g 100 – 250 - 500**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultate immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Informazioni di pronto soccorso
- In caso di inalazione: portare all'aria aperta. Se necessario somministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale. Consultare immediatamente il medico. - In caso di prolungato contatto con la pelle: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - In caso di contatto con gli occhi: risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Se necessario, consultare un medico. - In caso di ingestione: bere 1 o 2 bicchieri di acqua. Non provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. In caso di malessere consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118.

MODALITA' D'AZIONE E DI IMPIEGO: Steward è un insetticida appartenente alla classe delle ossadiazine, specifico per la lotta ai più comuni lepidotteri infestanti alcune colture orticole, la vite, il melo, il pero, il pesco, l'albicocco, il mais, il mais dolce e per la lotta alle cicaline della vite. Agisce prevalentemente per ingestione e contatto sulle larve (su alcune specie possiede anche attività ovicida) causando il blocco degli impulsi nervosi e provocandone la paralisi e successiva morte.

SPETTRO D'AZIONE: *Cydia pomonella* (carpocapsa), *Adoxophyes orana* (capua reticulana), *Argyrotaenia pulchellana* (eulia), *Pandemis spp* (tortrice gialloverde), *Archips podana* (cacoecia), *Cydia molesta* (tignola orientale), *Anarsia lineatella* (anarsia), *Lobesia botrana* (tignoletta della vite), *Eupoecilia ambiguella* (tignola della vite), *Empoasca vitis, Scaphoideus titanus, Metcalfa pruinosa* (cicaline della vite), *Spodoptera exigua e Spodoptera littoralis* (nottue delle orticole), *Plusia gamma* (nottua del pomodoro), *Helicoverpa* (Heliotis) *armigera* (nottua del peperone), *Ostrinia nubilalis* (piralide del peperone), *Chrysodeixis chalcites, Mamestra brassicae (nottua dei cavoli), Pieris brassicae* (cavolaia), *Pieris rapae* (rapaiola), *Plutella xylostella, Mythimna unipuncta, Ostrinia nubilalis* (piralide del mais).

DOSI E EPOCA D'IMPIEGO
Steward può essere applicato durante tutto il ciclo vegetativo delle colture preferibilmente a seguito di monitoraggio mediante trappole a feromoni.
Pomacee (melo e pero): per il controllo dei tortricidi ricamatori sopramenzionati intervenire con le seguenti modalità:
-larve svernanti: intervenire alla ripresa dell'attività trofica delle larve svernanti nella fase pre o post-fiorale. Effettuare un trattamento utilizzando 16.5 g/hl di prodotto con volumi di 10-12 hl/ha.
-generazioni estive: valutare l'intensità dell'attacco con l'ausilio di trappole a feromoni specifiche, intervenendo su ogni generazione dopo circa 6-8 giorni dal picco di volo, più propriamente alla schiusura delle uova-nascita delle prime larve. Utilizzare 16.5 g/hl di prodotto con volumi di 12-15 hl/ha. In caso di forte o prolungata presenza larvale effettuare due applicazioni distanziate di 10 giorni. In caso di infestazioni medio-leggere il fitofago può essere controllato con un unico intervento effettuato alla comparsa delle prime larve.
Per il controllo di C. pomonella utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 15 hl/ha intervenendo in prossimità della schiusura delle prime uova. Si raccomanda l'inserimento di Steward in un programma di trattamenti che comprenda anche l'impiego di altri prodotti (ovicidi e/o larvicidi) aventi differente modo d'azione, al fine di controllare il fitofago in tutte le fasi di sviluppo. Si consiglia di porre particolare cura al controllo della prima generazione, al fine di scongiurare infestazioni estive (seconda e terza generazione) di difficile contenimento.
Per il controllo di C. molesta: utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 15 hl/ha, intervenendo in prossimità della schiusura delle prime uova. In situazione di infestazione elevata e/o prolungata, si raccomanda l'inserimento di Steward in uno specifico programma comprendente anche l'uso di prodotti con differente meccanismo d'azione (ovicidi e/o larvicidi), al fine di controllare il fitofago in tutte le fasi del suo sviluppo.
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10 hl/ha, applicare comunque una dose minima di Steward corrispondente a 165 g/ha.
Effettuare massimo 4 applicazioni per stagione colturale.
Pesco, Nettarine: per il controllo di *C. molesta, A. orana e A. lineatella* utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 15 hl/ha, intervenendo in prossimità della schiusura delle uova o sulla generazione svernante *(A. lineatella e A. orana)*. Nei confronti di C. molesta ed A. lineatella, in situazioni di infestazioni elevate e/o prolungate su varietà medio-tardive e tardive, si raccomanda l'inserimento di Steward in uno specifico programma comprendente anche l'uso di prodotti aventi differente meccanismo d'azione (ovicidi e/o larvicidi).
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10hl/ha, applicare comunque una dose minima di Steward corrispondente a 165 g/ha.
Effettuare massimo 4 applicazioni per stagione colturale.
Albicocco: per il controllo di *C. molesta, A. orana e A. lineatella* utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 12 hl/ha, intervenendo in prossimità della schiusura delle uova o sulla generazione svernante (*A. lineatella* e *A. orana*).
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10hl/ha, applicare comunque una dose minima di Steward corrispondente a 165 g/ha.
Effettuare massimo 2 applicazioni per stagione colturale.
Vite da vino: per il controllo di *E. ambiguella e L. botrana* ;
in 1^ generazione utilizzare 15 g/hl con volumi d'acqua compresi tra 10 e 12 hl/ha, effettuando 1 trattamento in pre-fioritura alla comparsa delle prime larvette; in 2^ e 3^ generazione utilizzare 15 g/hl effettuando 1 o 2 applicazioni in funzione del grado di infestazione o della contemporanea presenza di entrambi i fitofagi. L'intervento unico va' effettuato tra la fase di ovideposizione (3-7 giorni dopo l'inizio delle catture) e lo stadio di sviluppo embrionale detto di "testa nera". In caso di doppia applicazione effettuare la prima durante la fase di ovideposizione e la seconda 8-10 giorni dopo.
Vite da tavola: per il controllo di *E. ambiguella e L. botrana* ;
in 1^ generazione utilizzare 15 g/hl con volumi d'acqua di 10 hl/ha, effettuando 1 trattamento in pre-fioritura alla comparsa delle prime larvette; in 2 ^ e 3 ^ generazione utilizzare 15 g/hl effettuando 2 applicazioni, la prima delle quali durante la fase di ovideposizione (3-7 giorni dopo l'inizio delle catture) e la seconda 7-10 giorni dopo.

Cicaline: sia su vite da vino che vite da tavola le applicazioni suggerite per il controllo delle tignole in seconda generazione controllano efficacemente le principali cicaline presenti nel vigneto (*E. vitis, S. titanus, M. pruinosa*).
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10hl/ha, applicare comunque una dose minima di Steward corrispondente a 125 g/ha.
Effettuare massimo 3 applicazioni per stagione colturale.

Pomodoro, peperone e melanzana: per il controllo di P. gamma, utilizzare 85 g/ha, mentre per quello di H. armigera., S. exigua, S.littoralis, O. nubilalis e C. chalcites utilizzare 125 g/ha in 5-10 hl/ha ; iniziare le applicazioni alla fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 8-10 giorni.
Effettuare massimo 4 applicazioni per ciclo colturale .
Cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, zucca: per il controllo di H.armigera, S. littoralis, S. exigua, C. chalcites, M. unipuncta, P. gamma, utilizzare 125 g/ha disciolti in 5-10 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 7-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazione per ciclo colturale.
Cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo verza, cavoletto di Bruxelles, cavolo cinese, cavolo nero, cavolo rapa, broccoli: per il controllo di M. brassicae, P. brassicae, P. rapae e P. xylostella utilizzare 85 g/ha disciolti in 3-7 hl/ha ; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti adottando un intervallo di 8-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazioni per stagione colturale.
Lattuga, cicoria, radicchio, scarola, indivia: per il controllo di H armigera, S. littoralis, C. chalcites e M. unipuncta utilizzare 125 g/ha disciolti in 3-7 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 8-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.
Spinacio: per il controllo di S. littoralis, S. exigua, M. brassicae, P. gamma utilizzare 125 g/ha disciolti in 5-6 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 7-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.
Mais da granella: per il controllo di O. nubilalis e lepidotteri nottuidi utilizzare 125 g/ha disciolti in 4-10 hl/ha bagnando bene la vegetazione. Con riferimento al monitoraggio dei voli, iniziare le applicazioni alla schiusura delle prime uova e prima della penetrazione delle larve.
Effettuare massimo 2 applicazioni di Steward per ciclo colturale, alternandole con insetticidi aventi differente modo d'azione.
Mais Dolce: per il controllo di O. nubilalis utilizzare 125 g/ha disciolti in 700 – 800 l di acqua/ha se si impiegano attrezzature ad alto volume.
Con irroratrici specifiche a manica d'aria e con carica elettrostatica è possibile utilizzare anche volumi più bassi, fino a 400 l/ha.
Si raccomanda in ogni caso di bagnare bene la vegetazione.
Iniziare le applicazioni alla schiusura delle prime uova e prima della penetrazione delle larve.
Effettuare le applicazioni a distanza di circa 8-10 giorni. Si consiglia di inserire i trattamenti con Steward all'interno di un programma di difesa che contempli principi attivi a diverso meccanismo d'azione.
Effettuare massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

AVVERTENZE AGRONOMICHE : Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di fenomeni di resistenza e' consigliabile alternare prodotti aventi differente meccanismo d'azione. Si consiglia di non effettuare il trattamento in caso di pioggia imminente.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Riempire il serbatoio dell'irroratrice da metà a tre quarti quindi aggiungere Steward alla dose stabilita. Mettere in funzione l'agitatore e portare a volume mantenendolo in funzione anche durante eventuali soste. Il prodotto si disperde in 1-2 minuti indipendentemente dalla durezza dell'acqua.
In caso di miscele si consiglia di introdurre Steward per primo, aggiungendo gli altri preparati mentre si porta a volume.
Il contenitore deve essere completamente svuotato e risciacquato con acqua pulita; il liquido di risciacquo deve essere versato direttamente nel serbatoio.

COMPATIBILITA': Steward non è compatibile con i preparati aventi reazione alcalina.
AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscela effettuata.

FITOTOSSICITA': Steward è selettivo per le colture riportate in etichetta. In caso di miscela con altri formulati e/o introduzione di nuove varieta' si consiglia di effettuare dei saggi preliminari.

INTERVALLO DI SICUREZZA
- Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, zucca, cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo verza, cavoletto di Bruxelles, cavolo cinese, cavolo nero, cavolo rapa, broccoli, lattuga, cicoria, radicchio, scarola, indivia: 3 giorni - **Spinacio:** 5 giorni - **Melo, pero, pesco, nettarine, albicocco, mais dolce:** 7 giorni - **Vite:** 10 giorni - **Mais:** 14 giorni

ATTENZIONE: il formulato contiene una sostanza molto tossica per le api. Usare ad una distanza non inferiore a 3 metri dai corsi d'acqua ed evitare i trattamenti durante il periodo della fioritura delle colture.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Altre officine autorizzate :
Officina di produzione:
CHEMCOPACK – Haandorpweg 1 – B-9130- Kallo, Antwerpen L.O. - Belgium (Belgio).
Officina di confezionamento:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. – via Siemens 12, Bolzano

FOGLIO ILLUSTRATIVO

STEWARD®

Insetticida selettivo specifico per pomacee, drupacee, vite da vino e da tavola, mais ed alcune colture orticole.
Granuli idrodispersibili

STEWARD
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Indoxacarb g 30
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R22). Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53).

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Officina di Confezionamento:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l – Via Siemens 12, Bolzano

Registrazione N. 10752 del 19.03.2001 del Ministero della Sanità
Partita N. Contenuto netto: g 100 – 250 - 500

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Informazioni di pronto soccorso
- In caso di inalazione: portare all'aria aperta. Se necessario somministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale. Consultare immediatamente il medico. - In caso di prolungato contatto con la pelle: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - In caso di contatto con gli occhi: risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Se necessario, consultare un medico.
- In caso di ingestione: bere ' o 2 bicchieri di acqua. Non provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. In caso di malessere, consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118.

MODALITA' D'AZIONE E DI IMPIEGO: Steward è un insetticida appartenente alla classe delle ossadiazine, specifico per la lotta ai più comuni lepidotteri infestanti alcune colture orticole, la vite, il melo, il pero, il pesco, l'albicocco, il mais, il mais dolce e per la lotta alle cicaline della vite. Agisce prevalentemente per ingestione e contatto sulle larve (su alcune specie possiede anche attività ovicida) causando il blocco degli impulsi nervosi e provocandone la paralisi e successiva morte.

SPETTRO D'AZIONE: *Cydia pomonella* (carpocapsa), *Adoxophyes orana* (capua reticulana), *Argyrotaenia pulchellana* (eulia), *Pandemis spp* (tortrice gialloverde), *Archips podana* (cacoecia), *Cydia molesta* (tignola orientale), *Anarsia lineatella* (anarsia), *Lobesia botrana* (tignoletta della vite), *Eupoecilia ambiguella* (tignola della vite), *Empoasca vitis, Scaphoideus titanus, Metcalfa pruinosa* (cicaline della vite), *Spodoptera exigua e Spodoptera littoralis* (nottue delle orticole), *Plusia gamma* (nottua del pomodoro), *Helicoverpa* (Heliotis) *armigera* (nottua del peperone), *Ostrinia nubilalis* (piralide del peperone), *Chrysodeixis chalcites, Mamestra brassicae (nottua dei cavoli), Pieris brassicae* (cavolaia), *Pieris rapae* (rapaiola), *Plutella xylostella, Mythimna unipuncta, Ostrinia nubilalis* (piralide del mais).

DOSI E EPOCA D'IMPIEGO
Steward può essere applicato durante tutto il ciclo vegetativo delle colture preferibilmente a seguito di monitoraggio mediante trappole a feromoni.
Pomacee (melo e pero): per il controllo dei tortricidi ricamatori sopramenzionati intervenire con le seguenti modalità:
·larve svernanti: intervenire alla ripresa dell'attività trofica delle larve svernanti nella fase pre o post-fiorale. Effettuare un trattamento utilizzando 16.5 g/hl di prodotto con volumi di 10-12 hl/ha.
·generazioni estive: valutare l'intensità dell'attacco con l'ausilio di trappole a feromoni specifiche, intervenendo su ogni generazione dopo circa 6-8 giorni dal picco di volo, più propriamente alla schiusura delle uova-nascita delle prime larve. Utilizzare 16.5 g/hl di prodotto con volumi di 12-15 hl/ha. In caso di forte o prolungata presenza larvale effettuare due applicazioni distanziate di 10 giorni. In caso di infestazioni medio-leggere il fitofago può essere controllato con un unico intervento effettuato alla comparsa delle prime larve.

Per il controllo di C. pomonella utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 15 hl/ha intervenendo in prossimità della schiusura delle prime uova. Si raccomanda l'inserimento di Steward in un programma di trattamenti che comprenda anche l'impiego di altri prodotti (ovicidi e/o larvicidi) aventi differente modo d'azione, al fine di controllare il fitofago in tutte le fasi di sviluppo. Si consiglia di porre particolare cura al controllo della prima generazione, al fine di scongiurare infestazioni estive (seconda e terza generazione) di difficile contenimento.
Per il controllo di C. molesta: utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 15 hl/ha, intervenendo in prossimità della schiusura delle prime uova. In situazione di infestazione elevata e/o prolungata, si raccomanda l'inserimento di Steward in uno specifico programma comprendente anche l'uso di prodotti con differente meccanismo d'azione (ovicidi e/o larvicidi), al fine di controllare il fitofago in tutte le fasi del suo sviluppo.
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10 hl/ha, applicare comunque una dose minima di Steward corrispondente a 165 g/ha.
Effettuare massimo 4 applicazioni per stagione colturale.
Pesco, Nettarine: per il controllo di *C. molesta, A. orana e A. lineatella* utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 15 hl/ha, intervenendo in prossimità della schiusura delle uova o sulla generazione svernante *(A. lineatella e A. orana)*. Nei confronti di C. molesta ed A. lineatella, in situazioni di infestazioni elevate e/o prolungate su varietà medio-tardive e tardive, si raccomanda l'inserimento di Steward in uno specifico programma comprendente anche l'uso di prodotti aventi differente meccanismo d'azione (ovicidi e/o larvicidi).
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10hl/ha, applicare comunque una dose minima di Steward corrispondente a 165 g/ha.
Effettuare massimo 4 applicazioni per stagione colturale.
Albicocco: per il controllo di *C. molesta, A. orana* e *A. lineatella* utlizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 12 hl/ha, intervenendo in prossimità della schiusura delle uova o sulla generazione svernante (*A. lineatella* e *A. orana*).
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10hl/ha, applicare comunque una dose minima di Steward corrispondente a 165 g/ha.
Effettuare massimo 2 applicazioni per stagione colturale.
Vite da vino: per il controllo di *E. ambiguella e L. botrana* ;
in 1^ generazione utilizzare 15 g/hl con volumi d'acqua compresi tra 10 e 12 hl/ha, effettuando 1 trattamento in pre-fioritura alla comparsa delle prime larvette; in 2^ e 3^ generazione utilizzare 15 g/hl effettuando 1 o 2 applicazioni in funzione del grado di infestazione o della contemporanea presenza di entrambi i fitofagi. L'intervento unico va' effettuato tra la fase di ovideposizione (3-7 giorni dopo l'inizio delle catture) e lo stadio di sviluppo embrionale detto di "testa nera". In caso di doppia applicazione effettuare la prima durante la fase di ovideposizione e la seconda 8-10 giorni dopo.
Vite da tavola: per il controllo di *E. ambiguella e L. botrana* ;
in 1^ generazione utilizzare 15 g/hl con volumi d'acqua di 10 hl/ha, effettuando 1 trattamento in pre-fioritura alla comparsa delle prime larvette; in 2 ^ e 3 ^ generazione utilizzare 15 g/hl effettuando 2 applicazioni, la prima delle quali durante la fase di ovideposizione (3-7 giorni dopo l'inizio delle catture) e la seconda 7-10 giorni dopo. %

Cicaline: sia su vite da vino che vite da tavola le applicazioni suggerite per il controllo delle tignole in seconda generazione controllano efficacemente le principali cicaline presenti nel vigneto (*E. vitis, S. titanus, M. pruinosa*).
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10hl/ha, applicare comunque una dose minima di Steward corrispondente a 125 g/ha.
Effettuare massimo 3 applicazioni per stagione colturale.
Pomodoro, peperone e melanzana: per il controllo di *P. gamma*, utilizzare 85 g/ha, mentre per quello di *H. armigera., S. exigua, S.littoralis, O. nubilalis e C. chalcites* utilizzare 125 g/ha in 5-10 hl/ha ; iniziare le applicazioni alla fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 8-10 giorni.
Effettuare massimo 4 applicazioni per ciclo colturale .
Cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, zucca: per il controllo di *H.armigera, S. littoralis, S. exigua, C. chalcites, M. unipuncta, P. gamma*, utilizzare 125 g/ha disciolti in 5-10 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 7-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazione per ciclo colturale.
Cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo verza, cavoletto di Bruxelles, cavolo cinese, cavolo nero, cavolo rapa, broccoli: per il controllo di *M. brassicae, P. brassicae, P. rapae e P. xylostella* utilizzare 85 g/ha disciolti in 3-7 hl/ha ; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti adottando un intervallo di 8-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazioni per stagione colturale.
Lattuga, cicoria, radicchio, scarola, indivia: per il controllo di *H armigera, S. littoralis, C. chalcites e M. unipuncta* utilizzare 125 g/ha disciolti in 3-7 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 8-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.
Spinacio: per il controllo di *S. littoralis, S. exigua, M. brassicae, P. gamma* utilizzare 125 g/ha disciolti in 5-6 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 7-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.
Mais da granella: per il controllo di *O. nubilalis* e lepidotteri nottuidi utilizzare 125 g/ha disciolti in 4-10 hl/ha bagnando bene la vegetazione. Con riferimento al monitoraggio dei voli, iniziare le applicazioni alla schiusura delle prime uova e prima della penetrazione delle larve.
Effettuare massimo 2 applicazioni di Steward per ciclo colturale, alternandole con insetticidi aventi differente modo d'azione.
Mais Dolce: per il controllo di *O. nubilalis* utilizzare 125 g/ha disciolti in 700 – 800 l di acqua/ha se si impiegano attrezzature ad alto volume.
Con irroratrici specifiche a manica d'aria e con carica elettrostatica è possibile utilizzare anche volumi più bassi, fino a 400 l/ha.
Si raccomanda in ogni caso di bagnare bene la vegetazione.

Iniziare le applicazioni alla schiusura delle prime uova e prima della penetrazione delle larve.
Effettuare le applicazioni a distanza di circa 8-10 giorni. Si consiglia di inserire i trattamenti con Steward all'interno di un programma di difesa che contempli principi attivi a diverso meccanismo d'azione.
Effettuare massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

AVVERTENZE AGRONOMICHE : Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di fenomeni di resistenza e' consigliabile alternare prodotti aventi differente meccanismo d'azione. Si consiglia di non effettuare il trattamento in caso di pioggia imminente.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Riempire il serbatoio dell'irroratrice da metà a tre quarti quindi aggiungere Steward alla dose stabilita. Mettere in funzione l'agitatore e portare a volume mantenendolo in funzione anche durante eventuali soste. Il prodotto si disperde in 1-2 minuti indipendentemente dalla durezza dell'acqua.
In caso di miscele si consiglia di introdurre Steward per primo, aggiungendo gli altri preparati mentre si porta a volume.
Il contenitore deve essere completamente svuotato e risciacquato con acqua pulita; il liquido di risciacquo deve essere versato direttamente nel serbatoio.

COMPATIBILITA': Steward non è compatibile con i preparati aventi reazione alcalina.

AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscela effettuata.

FITOTOSSICITA': Steward è selettivo per le colture riportate in etichetta. In caso di miscela con altri formulati e/o introduzione di nuove varieta' si consiglia di effettuare dei saggi preliminari.

INTERVALLO DI SICUREZZA
- Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, zucca, cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo verza, cavoletto di Bruxelles, cavolo cinese, cavolo nero, cavolo rapa, broccoli, lattuga, cicoria, radicchio, scarola, indivia: 3 giorni **- Spinacio**: 5 giorni **- Melo, pero, pesco, nettarine, albicocco, mais dolce**: 7 giorni **- Vite:** 10 giorni **- Mais:** 14 giorni

ATTENZIONE: il formulato contiene una sostanza molto tossica per le api. Usare ad una distanza non inferiore a 3 metri dai corsi d'acqua ed evitare i trattamenti durante il periodo della fioritura delle colture.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Altre officine autorizzate :
Officina di produzione:
CHEMCOPACK – Haandorpweg 1 – B-9130- Kallo, Antwerpen L.O. - Belgium (Belgio).
Officina di confezionamento:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. – via Siemens 12, Bolzano

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

STEWARD

Insetticida selettivo specifico per pomacee, drupacee, vite da vino e da tavola, mais ed alcune colture orticole.

STEWARD
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Indoxacarb g 30
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R22). Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Officina di Confezionamento:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l – Via Siemens 12, Bolzano

Registrazione N. 10752 del 19.03.2001 del Ministero della Sanità
Partita N. **Contenuto netto: g 100 – 250 - 500**

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altre officine autorizzate :
Officina di produzione:
CHEMCOPACK – Haandorpweg 1 – B-9130- Kallo, Antwerpen L.O. - Belgium (Belgio).
Officina di confezionamento:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. – via Siemens 12, Bolzano

STOCKER

Insetticida selettivo specifico per pomacee, drupacee, vite da vino e da tavola, mais ed alcune colture orticole.
Granuli idrodispersibili

STOCKER
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Indoxacarb g 30
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R22). Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53).

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Officina di Confezionamento:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l – Via Siemens 12, Bolzano

Registrazione N. 11173 del 05.02.2002 del Ministero della Sanità

Partita N. **Contenuto netto: g 100 – 250 - 500**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consulate immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Informazioni di pronto soccorso
- In caso di inalazione: portare all'aria aperta. Se necessario somministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale. Consultare immediatamente il medico. - In caso di prolungato contatto con la pelle: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - In caso di contatto con gli occhi: risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Se necessario, consultare un medico. - In caso di ingestione: bere 1 o 2 bicchieri di acqua. Non provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. In caso di malessere, consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118.

MODALITA' D'AZIONE E DI IMPIEGO: Stocker è un insetticida appartenente alla classe delle ossadiazine, specifico per la lotta ai più comuni lepidotteri infestanti alcune colture orticole, la vite, il melo, il pero, il pesco, l'albicocco, il mais, il mais dolce e per la lotta alle cicaline della vite. Agisce prevalentemente per ingestione e contatto sulle larve (su alcune specie possiede anche attività ovicida) causando il blocco degli impulsi nervosi e provocandone la paralisi e successiva morte.

SPETTRO D'AZIONE: *Cydia pomonella* (carpocapsa), *Adoxophyes orana* (capua reticulana), *Argyrotaenia pulchellana* (eulia), *Pandemis spp* (tortrice gialloverde), *Archips podana* (cacoecia), *Cydia molesta* (tignola orientale), *Anarsia lineatella* (anarsia), *Lobesia botrana* (tignoletta della vite), *Eupoecilia ambiguella* (tignola della vite), *Empoasca vitis, Scaphoideus titanus, Metcalfa pruinosa* (cicaline della vite), *Spodoptera exigue e Spodoptera littoralis* (nottue delle orticole), *Plusia gamma* (nottua del pomodoro), *Helicoverpa* (Heliotis) *armigera* (nottua del peperone), *Ostrinia nubilalis* (piralide del peperone), *Chrysodeixis chalcites, Mamestra brassicae (nottua dei cavoli), Pieris brassicae* (cavolaia), *Pieris rapae* (rapaiola), *Plutella xylostella, Mythimna unipuncta, Ostrinia nubilalis* (piralide del mais).

DOSI E EPOCA D'IMPIEGO
Stocker può essere applicato durante tutto il ciclo vegetativo delle colture preferibilmente a seguito di monitoraggio mediante trappole a feromoni.
Pomacee (melo e pero): per il controllo dei tortricidi ricamatori sopramenzionati intervenire con le seguenti modalità:
·larve svernanti: intervenire alla ripresa dell'attività trofica delle larve svernanti nella fase pre o post-fiorale. Effettuare un trattamento utilizzando 16.5 g/hl di prodotto con volumi di 10-12 hl/ha.
·generazioni estive: valutare l'intensità dell'attacco con l'ausilio di trappole a feromoni specifiche, intervenendo su ogni generazione dopo circa 6-8 giorni dal picco di volo, più propriamente alla schiusura delle uova-nascita delle prime larve. Utilizzare 16.5 g/hl di prodotto con volumi di 12-15 hl/ha. In caso di forte o prolungata presenza larvale effettuare due applicazioni distanziate di 10 giorni. In caso di infestazioni medio-leggere il fitofago può essere controllato con un unico intervento effettuato alla comparsa delle prime larve.

Per il controllo di C. pomonella utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 15 hl/ha intervenendo in prossimità della schiusura delle prime uova. Si raccomanda l'inserimento di Stocker in un programma di trattamenti che comprenda anche l'impiego di altri prodotti (ovicidi e/o larvicidi) aventi differente modo d'azione, al fine di controllare il fitofago in tutte le fasi di sviluppo. Si consiglia di porre particolare cura al controllo della prima generazione, al fine di scongiurare infestazioni estive (seconda e terza generazione) di difficile contenimento.
Per il controllo di C. molesta: utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 15 hl/ha, intervenendo in prossimità della schiusura delle prime uova. In situazione di infestazione elevata e/o prolungata, si raccomanda l'inserimento di Stocker in uno specifico programma comprendente anche l'uso di prodotti con differente meccanismo d'azione (ovicidi e/o larvicidi), al fine di controllare il fitofago in tutte le fasi del suo sviluppo.
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10 hl/ha, applicare comunque una dose minima di Stocker corrispondente a 165 g/ha.
Effettuare massimo 4 applicazioni per stagione colturale.
Pesco, Nettarine: per il controllo di *C. molesta, A. orana e A. lineatella* utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 15 hl/ha, intervenendo in prossimità della schiusura delle uova o sulla generazione svernante *(A. lineatella e A. orana).* Nei confronti di C. molesta ed A. lineatella, in situazioni di infestazioni elevate e/o prolungate su varietà medio-tardive e tardive, si raccomanda l'inserimento di Stocker in uno specifico programma comprendente anche l'uso di prodotti aventi differente meccanismo d'azione (ovicidi e/o larvicidi).
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10hl/ha, applicare comunque una dose minima di Stocker corrispondente a 165 g/ha.
Effettuare massimo 4 applicazioni per stagione colturale.
Albicocco: per il controllo di *C. molesta, A. orana* e *A. lineatella* utlizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 12 hl/ha, intervenendo in prossimità della schiusura delle uova o sulla generazione svernante (*A. lineatella* e *A. orana*).
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10hl/ha, applicare comunque una dose minima di Stocker corrispondente a 165 g/ha.
Effettuare massimo 2 applicazioni per stagione colturale.
Vite da vino: per il controllo di *E. ambiguella e L. botrana* ;
in 1^ generazione utilizzare 15 g/hl con volumi d'acqua compresi tra 10 e 12 hl/ha, effettuando 1 trattamento in pre-fioritura alla comparsa delle prime larvette; in 2^ e 3^ generazione utilizzare 15 g/hl effettuando 1 o 2 applicazioni in funzione del grado di infestazione o della contemporanea presenza di entrambi i fitofagi. L'intervento unico va' effettuato tra la fase di ovideposizione (3-7 giorni dopo l'inizio delle catture) e lo stadio di sviluppo embrionale detto di "testa nera". In caso di doppia applicazione effettuare la prima durante la fase di ovideposizione e la seconda 8-10 giorni dopo.
Vite da tavola: per il controllo di *E. ambiguella e L. botrana* ;
in 1^ generazione utilizzare 15 g/hl con volumi d'acqua di 10 hl/ha, effettuando 1 trattamento in pre-fioritura alla comparsa delle prime larvette; in 2 ^ e 3 ^ generazione utilizzare 15 g/hl effettuando 2 applicazioni, la prima delle quali durante la fase di ovideposizione (3-7 giorni dopo l'inizio delle catture) e la seconda 7-10 giorni dopo.

Cicaline: sia su vite da vino che vite da tavola le applicazioni suggerite per il controllo delle tignole in seconda generazione controllano efficacemente le principali cicaline presenti nel vigneto (*E. vitis, S. titanus, M. pruinosa*).
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10hl/ha, applicare comunque una dose minima di Stocker corrispondente a 125 g/ha.
Effettuare massimo 3 applicazioni per stagione colturale.
Pomodoro, peperone e melanzana: per il controllo di *P. gamma*, utilizzare 85 g/ha, mentre per quello di *H. armigera., S. exigua, S.littoralis, O. nubilalis e C. chalcites* utilizzare 125 g/ha in 5-10 hl/ha ; iniziare le applicazioni alla fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 8-10 giorni.
Effettuare massimo 4 applicazioni per ciclo colturale .
Cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, zucca: per il controllo di *H.armigera, S. littoralis, S. exigua, C. chalcites, M. unipuncta, P. gamma*, utilizzare 125 g/ha disciolti in 5-10 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 7-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazione per ciclo colturale.
Cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo verza, cavoletto di Bruxelles, cavolo cinese, cavolo nero, cavolo rapa, broccoli: per il controllo di *M. brassicae, P. brassicae, P. rapae e P. xylostella* utilizzare 85 g/ha disciolti in 3-7 hl/ha ; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti adottando un intervallo di 8-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazioni per stagione colturale.
Lattuga, cicoria, radicchio, scarola, indivia: per il controllo di *H armigera, S. littoralis, C. chalcites e M. unipuncta* utilizzare 125 g/ha disciolti in 3-7 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 8-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.
Spinacio: per il controllo di *S. littoralis, S. exigua, M. brassicae, P. gamma* utilizzare 125 g/ha disciolti in 5-6 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 7-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.
Mais da granella: per il controllo di *O. nubilalis* e lepidotteri nottuidi utilizzare 125 g/ha disciolti in 4-10 hl/ha bagnando bene la vegetazione. Con riferimento al monitoraggio dei voli, iniziare le applicazioni alla schiusura delle prime uova e prima della penetrazione delle larve.
Effettuare massimo 2 applicazioni di Stocker per ciclo colturale, alternandole con insetticidi aventi differente modo d'azione.
Mais Dolce: per il controllo di *O. nubilalis* utilizzare 125 g/ha disciolti in 700 – 800 l di acqua/ha se si impiegano attrezzature ad alto volume.
Con irroratrici specifiche a manica d'aria e con carica elettrostatica è possibile utilizzare anche volumi più bassi, fino a 400 l/ha.
Si raccomanda in ogni caso di bagnare bene la vegetazione.
Iniziare le applicazioni alla schiusura delle prime uova e prima della penetrazione delle larve.
Effettuare le applicazioni a distanza di circa 8-10 giorni. Si consiglia di inserire i trattamenti con Stocker all'interno di un programma di difesa che contempli principi attivi a diverso meccanismo d'azione.
Effettuare massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

AVVERTENZE AGRONOMICHE : Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di fenomeni di resistenza e' consigliabile alternare prodotti aventi differente meccanismo d'azione. Si consiglia di non effettuare il trattamento in caso di pioggia imminente.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Riempire il serbatoio dell'irroratrice da metà a tre quarti quindi aggiungere Stocker alla dose stabilita. Mettere in funzione l'agitatore e portare a volume mantenendolo in funzione anche durante eventuali soste. Il prodotto si disperde in 1-2 minuti indipendentemente dalla durezza dell'acqua.
In caso di miscele si consiglia di introdurre Stocker per primo, aggiungendo gli altri preparati mentre si porta a volume.
Il contenitore deve essere completamente svuotato e risciacquato con acqua pulita; il liquido di risciacquo deve essere versato direttamente nel serbatoio.

COMPATIBILITA': Stocker non è compatibile con i preparati aventi reazione alcalina.

AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscela effettuata.

FITOTOSSICITA': Stocker è selettivo per le colture riportate in etichetta. In caso di miscela con altri formulati e/o introduzione di nuove varieta' si consiglia di effettuare dei saggi preliminari.

INTERVALLO DI SICUREZZA
- Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, zucca, cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo verza, cavoletto di Bruxelles, cavolo cinese, cavolo nero, cavolo rapa, broccoli, lattuga, cicoria, radicchio, scarola, indivia: 3 giorni **- Spinacio:** 5 giorni **- Melo, pero, pesco, nettarine, albicocco, mais dolce:** 7 giorni **- Vite:** 10 giorni **- Mais:** 14 giorni

ATTENZIONE: il formulato contiene una sostanza molto tossica per per le api. Usare ad una distanza non inferiore a 3 metri dai corsi d'acqua ed evitare i trattamenti durante il periodo della fioritura delle colture.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Altre officine autorizzate :
Officina di produzione:
CHEMCOPACK – Haandorpweg 1 – B-9130- Kallo, Antwerpen L.O. - Belgium (Belgio).
Officina di confezionamento:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. – via Siemens 12, Bolzano

FOGLIO ILLUSTRATIVO

STOCKER

Insetticida selettivo specifico per pomacee, drupacee, vite da vino e da tavola, mais ed alcune colture orticole. Granuli idrodispersibili

STOCKER
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Indoxacarb g 30
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R22). Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Officina di Confezionamento:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l – Via Siemens 12, Bolzano

Registrazione N. 11173 del 05.02.2002 del Ministero della Sanità

Partita N. **Contenuto netto: g 100 – 250 - 500**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consulate immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Informazioni di pronto soccorso
- In caso di inalazione: portare all'aria aperta. Se necessario somministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale. Consultare immediatamente il medico. - In caso di prolungato contatto con la pelle: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - In caso di contatto con gli occhi: risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Se necessario, consultare un medico. - In caso di ingestione: bere 1 o 2 bicchieri di acqua. Non provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. In caso di malessere, consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118.

MODALITA' D'AZIONE E DI IMPIEGO: Stocker è un insetticida appartenente alla classe delle ossadiazine, specifico per la lotta ai più comuni lepidotteri infestanti alcune colture orticole, la vite, il melo, il pero, il pesco, l'albicocco, il mais, il mais dolce e per la lotta alle cicaline della vite. Agisce prevalentemente per ingestione e contatto sulle larve (su alcune specie possiede anche attività ovicida) causando il blocco degli impulsi nervosi e provocandone la paralisi e successiva morte.

SPETTRO D'AZIONE: *Cydia pomonella* (carpocapsa), *Adoxophyes orana* (capua reticulana), *Argyrotaenia pulchellana* (eulia), *Pandemis spp* (tortrice gialloverde), *Archips podana* (cacoecia), *Cydia molesta* (tignola orientale), *Anarsia lineatella* (anarsia), *Lobesia botrana* (tignoletta della vite), *Eupoecilia ambiguella* (tignola della vite), *Empoasca vitis, Scaphoideus titanus, Metcalfa pruinosa* (cicaline della vite), *Spodoptera exigua e Spodoptera littoralis* (nottue delle orticole), *Plusia gamma* (nottua del pomodoro), *Helicoverpa* (Heliotis) *armigera* (nottua del peperone), *Ostrinia nubilalis* (piralide del peperone), *Chrysodeixis chalcites, Mamestra brassicae (nottua dei cavoli), Pieris brassicae* (cavolaia), *Pieris rapae* (rapaiola), *Plutella xylostella, Mythimna unipuncta, Ostrinia nubilalis* (piralide del mais).

DOSI E EPOCA D'IMPIEGO
Stocker può essere applicato durante tutto il ciclo vegetativo delle colture preferibilmente a seguito di monitoraggio mediante trappole a feromoni.
Pomacee (melo e pero): per il controllo dei tortricidi ricamatori sopramenzionati intervenire con le seguenti modalità:
·larve svernanti: intervenire alla ripresa dell'attività trofica delle larve svernanti nella fase pre o post-fiorale. Effettuare un trattamento utilizzando 16.5 g/hl di prodotto con volumi di 10-12 hl/ha.
·generazioni estive: valutare l'intensità dell'attacco con l'ausilio di trappole a feromoni specifiche, intervenendo su ogni generazione dopo circa 6-8 giorni dal picco di volo, più propriamente alla schiusura delle uova-nascita delle prime larve. Utilizzare 16.5 g/hl di prodotto con volumi di 12-15 hl/ha. In caso di forte o prolungata presenza larvale effettuare due applicazioni distanziate di 10 giorni. In caso di infestazioni medio-leggere il fitofago può essere controllato con un unico intervento effettuato alla comparsa delle prime larve.
Per il controllo di C. pomonella utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 15 hl/ha intervenendo in prossimità della schiusura delle prime uova. Si raccomanda l'inserimento di Stocker in un programma di trattamenti che comprenda anche l'impiego di altri prodotti (ovicidi e/o larvicidi) aventi differente modo d'azione, al fine di controllare il fitofago in tutte le fasi di sviluppo. Si consiglia di porre particolare cura al controllo della prima generazione, al fine di scongiurare infestazioni estive (seconda e terza generazione) di difficile contenimento.
Per il controllo di C. molesta: utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 15 hl/ha, intervenendo in prossimità della schiusura delle prime uova. In situazione di infestazione elevata e/o prolungata, si raccomanda l'inserimento di Stocker in uno specifico programma comprendente anche l'uso di prodotti con differente meccanismo d'azione (ovicidi e/o larvicidi), al fine di controllare il fitofago in tutte le fasi del suo sviluppo.
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10 hl/ha, applicare comunque una dose minima di Stocker corrispondente a 165 g/ha.
Effettuare massimo 4 applicazioni per stagione colturale.
Pesco, Nettarine: per il controllo di *C. molesta, A. orana e A. lineatella* utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 15 hl/ha, intervenendo in prossimità della schiusura delle uova o sulla generazione svernante *(A. lineatella e A. orana).* Nei confronti di C. molesta ed A. lineatella, in situazioni di infestazioni elevate e/o prolungate su varietà medio-tardive e tardive, si raccomanda l'inserimento di Stocker in uno specifico programma comprendente anche l'uso di prodotti aventi differente meccanismo d'azione (ovicidi e/o larvicidi).
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10hl/ha, applicare comunque una dose minima di Stocker corrispondente a 165 g/ha.
Effettuare massimo 4 applicazioni per stagione colturale.
Albicocco: per il controllo di *C. molesta, A. orana* e *A. lineatella* utlizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 12 hl/ha, intervenendo in prossimità della schiusura delle uova o sulla generazione svernante (*A. lineatella* e *A. orana*).
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10hl/ha, applicare comunque una dose minima di Stocker corrispondente a 165 g/ha.
Effettuare massimo 2 applicazioni per stagione colturale.
Vite da vino: per il controllo di *E. ambiguella e L. botrana* ;
in 1^ generazione utilizzare 15 g/hl con volumi d'acqua compresi tra 10 e 12 hl/ha, effettuando 1 trattamento in pre-fioritura alla comparsa delle prime larvette; in 2^ e 3^ generazione utilizzare 15 g/hl effettuando 1 o 2 applicazioni in funzione del grado di infestazione o della contemporanea presenza di entrambi i fitofagi. L'intervento unico va' effettuato tra la fase di ovideposizione (3-7 giorni dopo l'inizio delle catture) e lo stadio di sviluppo embrionale detto di "testa nera". In caso di doppia applicazione effettuare la prima durante la fase di ovideposizione e la seconda 8-10 giorni dopo.
Vite da tavola: per il controllo di *E. ambiguella e L. botrana* ;
in 1^ generazione utilizzare 15 g/hl con volumi d'acqua di 10 hl/ha, effettuando 1 trattamento in pre-fioritura alla comparsa delle prime larvette; in 2 ^ e 3 ^ generazione utilizzare 15 g/hl effettuando 2 applicazioni, la prima delle quali durante la fase di ovideposizione (3-7 giorni dopo l'inizio delle catture) e la seconda 7-10 giorni dopo.
Cicaline: sia su vite da vino che vite da tavola le applicazioni suggerite per il controllo delle tignole in seconda generazione controllano

efficacemente le principali cicaline presenti nel vigneto (*E. vitis, S. titanus, M. pruinosa*).
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10hl/ha, applicare comunque una dose minima di Stocker corrispondente a 125 g/ha.
Effettuare massimo 3 applicazioni per stagione colturale.
Pomodoro, peperone e melanzana: per il controllo di *P. gamma* utilizzare 85 g/ha, mentre per quello di *H. armigera., S. exigua, S.littoralis, O. nubilalis e C. chalcites* utilizzare 125 g/ha in 5-10 hl/ha ; iniziare le applicazioni alla fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 8-10 giorni.
Effettuare massimo 4 applicazioni per ciclo colturale .
Cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, zucca: per il controllo di *H.armigera, S. littoralis, S. exigua, C. chalcites, M. unipuncta, P. gamma*, utilizzare 125 g/ha disciolti in 5-10 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 7-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazione per ciclo colturale.
Cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo verza, cavoletto di Bruxelles, cavolo cinese, cavolo nero, cavolo rapa, broccoli: per il controllo di *M. brassicae, P. brassicae, P. rapae e P. xylostella* utilizzare 85 g/ha disciolti in 3-7 hl/ha ; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti adottando un intervallo di 8-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazioni per stagione colturale.
Lattuga, cicoria, radicchio, scarola, indivia: per il controllo di *H armigera, S. littoralis, C. chalcites e M. unipuncta* utilizzare 125 g/ha disciolti in 3-7 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 8-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.
Spinacio: per il controllo di *S. littoralis, S. exigua, M. brassicae, P. gamma* utilizzare 125 g/ha disciolti in 5-6 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 7-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.
Mais da granella: per il controllo di *O. nubilalis* e lepidotteri nottuidi utilizzare 125 g/ha disciolti in 4-10 hl/ha bagnando bene la vegetazione. Con riferimento al monitoraggio dei voli, iniziare le applicazioni alla schiusura delle prime uova e prima della penetrazione delle larve.
Effettuare massimo 2 applicazioni di Stocker per ciclo colturale, alternandole con insetticidi aventi differente modo d'azione.
Mais Dolce: per il controllo di *O. nubilalis* utilizzare 125 g/ha disciolti in 700 – 800 l di acqua/ha se si impiegano attrezzature ad alto volume.
Con irroratrici specifiche a manica d'aria e con carica elettrostatica è possibile utilizzare anche volumi più bassi, fino a 400 l/ha.
Si raccomanda in ogni caso di bagnare bene la vegetazione.

Iniziare le applicazioni alla schiusura delle prime uova e prima della penetrazione delle larve.
Effettuare le applicazioni a distanza di circa 8-10 giorni. Si consiglia di inserire i trattamenti con Stocker all'interno di un programma di difesa che contempli principi attivi a diverso meccanismo d'azione.
Effettuare massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

AVVERTENZE AGRONOMICHE : Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di fenomeni di resistenza e' consigliabile alternare prodotti aventi differente meccanismo d'azione. Si consiglia di non effettuare il trattamento in caso di pioggia imminente.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Riempire il serbatoio dell'irroratrice da metà a tre quarti quindi aggiungere Stocker alla dose stabilita. Mettere in funzione l'agitatore e portare a volume mantenendolo in funzione anche durante eventuali soste. Il prodotto si disperde in 1-2 minuti indipendentemente dalla durezza dell'acqua.
In caso di miscele si consiglia di introdurre Stocker per primo, aggiungendo gli altri preparati mentre si porta a volume.
Il contenitore deve essere completamente svuotato e risciacquato con acqua pulita; il liquido di risciacquo deve essere versato direttamente nel serbatoio.

COMPATIBILITA': Stocker non è compatibile con i preparati aventi reazione alcalina.

AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscela effettuata.

FITOTOSSICITA': Stocker è selettivo per le colture riportate in etichetta. In caso di miscela con altri formulati e/o introduzione di nuove varieta' si consiglia di effettuare dei saggi preliminari.

INTERVALLO DI SICUREZZA
- Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, zucca, cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo verza, cavoletto di Bruxelles, cavolo cinese, cavolo nero, cavolo rapa, broccoli, lattuga, cicoria, radicchio, scarola, indivia: 3 giorni **- Spinacio:** 5 giorni **- Melo, pero, pesco, nettarine, albicocco, mais dolce:** 7 giorni **- Vite:** 10 giorni **- Mais:** 14 giorni

ATTENZIONE: il formulato contiene una sostanza molto tossica per per le api. Usare ad una distanza non inferiore a 3 metri dai corsi d'acqua ed evitare i trattamenti durante il periodo della fioritura delle colture.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Altre officine autorizzate :
Officina di produzione:
CHEMCOPACK – Haandorpweg 1 – B-9130- Kallo, Antwerpen L.O. - Belgium (Belgio).
Officina di confezionamento:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. – via Siemens 12, Bolzano

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

STOCKER

Insetticida selettivo specifico per pomacee, drupacee, vite da vino e da tavola, mais ed alcune colture orticole

STOCKER
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Indoxacarb g 30
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R22). Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Officina di Confezionamento:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l – Via Siemens 12, Bolzano

Registrazione N. 11173 del 05.02.2002 del Ministero della Sanità

Partita N. **Contenuto netto: g 100 – 250 - 500**

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altre officine autorizzate :
Officina di produzione:
CHEMCOPACK – Haandorpweg 1 – B-9130- Kallo, Antwerpen L.O. - Belgium (Belgio).
Officina di confezionamento:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. – via Siemens 12, Bolzano

TASK®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il mais.
Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

TASK
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron s.a. puro g 3.26
Dicamba s.a. puro g 60.87
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari (R41)
Nocivo per gli organismi acquatici (R52). Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R53).

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26) Proteggersi gli occhi/la faccia (S39). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 10038 del 25.05.1999 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 400 in sacchetto idrosolubile
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi adatti. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondamente con sapone neutro.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Rimsulfuron; Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo; **Terapia:** sintomatica.
Dicamba; Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia; **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche d'azione: TASK e' una miscela erbicida contenente Rimsulfuron e Dicamba sale sodico selettiva per il mais. Si applica in post-emergenza della coltura e delle infestanti ed agisce mediante assorbimento fogliare. Le infestanti suscettibili cessano subito l'accrescimento ed il disseccamento avviene circa una-due settimane dopo l'applicazione. Lo stadio della coltura deve essere compreso tra le 2 e le 8 foglie, così come, possibilmente, quello delle piante infestanti. Poiché TASK non ha attività residuale, l'efficacia erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Spettro d'azione: Una applicazione di TASK è in grado di controllare le seguenti infestanti :
Abutilon theophrasti (cencio molle), *Amaranthus retroflexus* (amaranto comune), *Bidens bipinnata* (forbicine), *Calistegia sepium* (vilucchio bianco), *Capsella bursa-pastoris* (borsa del pastore), *Chenopodium album* (farinello comune). *Chenopodium vulvaria* (brinaiola), *Convolvulus arvensis* (vilucchio comune), *Digitaria sanguinalis* (sanguinella comune), *Echinochloa crus-galli* (giavone comune), *Panicum dicotomiflorum* (panico delle risaie), *Polygonum lapathifolium* (poligono nodoso), *Polygonum persicaria* (poligono persicaria), *Rapistrum rugosum* (miagro peloso), *Sinapis arvensis* (senape selvatica), *Sorghum halepense* (sorghetta) da seme e da rizoma, *Solanum nigrum* (erba morella), *Stellaria media* (centocchio comune), *Xanthium spp* (nappola).
Epoca d' impiego: Post-emergenza. **Dosi d'impiego:** TASK si applica alla dose di 400 gr/ha addizionato con bagnante non ionico alla dose di 100-200 ml ogni 100 litri di acqua.
Volumi d'acqua: Utilizzare circa 300-400 litri di acqua per ettaro, ugelli a ventaglio e basse pressioni di esercizio.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25°C.
Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte irroratrice, anche durante eventuali soste.
Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale. Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi :
- applicazioni su nuove varieta'
- applicazioni in miscela o sequenza con nuovi prodotti fitosanitari.

In caso di necessita' di risemina nei terreni precedentemente trattati con TASK, ricorrere solo al mais. Trascorsi 90 giorni dall'applicazione di TASK, non vi e' limitazione alcuna per le colture in rotazione.
Eventuali precipitazioni dilavanti che si verificassero entro 4 ore dall'applicazione possono compromettere l'attivita' erbicida del preparato.
E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare TASK. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
Subito dopo il trattamento con TASK e' importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue :

1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente, lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita: addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri di acqua).
3) Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti, mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
4) Ripetere le indicazioni di cui al punto 2.
5) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti, facendola circolare attraverso pompa e barra.
6) Filtri ed ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente una soluzione detergente alla stessa concentrazione indicata al punto 2. Risciacquare con acqua pulita.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
TASK, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento: portare a volume il serbatoio ed eseguire subito il trattamento.
COMPATIBILITA'
Non miscelare TASK con gli erbicidi bentazone, 2-4D, cyanazina e con gli insetticidi fosforganici.
AVVERTENZE D'USO
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all'introduzione e solubilizzazione dei sacchetti, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti, chiudere bene la scatola.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.Si sconsiglia l'impiego di TASK su mais dolce (Zea mays, ssp. saccharata), mais bianco, mais vitreo (Zea mays, ssp. indurata), mais da pop-corn (Zea mays, ssp. everta) e linee pure di mais destinate alla produzione di seme. Non applicare il prodotto su coltura precedentemente trattata con Forate, Terbufos, Isofenfos, Paration.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 80 giorni prima della raccolta del mais.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

TASK®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il mais.
Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron s.a. pura g 3.26
Dicamba s.a. pura g 60.87
Coformulanti q. b. a 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari (R41) Nocivo per gli organismi acquatici (R52). Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26). Proteggersi gli occhi/la faccia (S39) In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. –Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione:
DuPont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 10038 del 25/5/1999 del Ministero della Sanità

Contenuto netto del sacchetto: 400 g

AVVERTENZA: Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1. Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua
2. Assicurarsi di avere le mani asciutte
3. Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo
4. Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte
5. Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)
6. Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni sopraríportate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

TAURUS®

Erbicida - Granuli idrodispersibili

TAURUS
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Metsulfuron metile puro 20 g
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione N. 10612 del 27.10.2000 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 60 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. **Terapia:** sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
TAURUS è un erbicida selettivo idoneo per il **diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo.**
Tra le infestanti più sensibili risultano: *Stellaria media, Papaver rhoeas, Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum, Capsella bursa pastoris, Ranunculus acer, Chrisantemum segetum, Adonis aestivalis, Centaurea cyanus, Viola tricolor, Matricaria chamomilla, Veronica persica, Cirsium spp., Rumex spp., Lamium purpureum, Apera spica venti;*
Risultano mediamente sensibili: *Fumaria officinalis, Polygonum convolvulus, Polygonum aviculare;*
Risultano scarsamente sensibili: *Veronica hederaefolia e Galium aparine.*
TAURUS svolge un'ottima azione di controllo di *Apera agrostis spica-venti* e un'interessante azione collaterale su *Lolium spp. e Alopecurus myosuroides.*

Dosi - Epoche - Modalità di impiego
Frumento tenero e duro, orzo: TAURUS si usa in post-emergenza della coltura dallo stadio di inizio accestimento sino allo stadio di botticella.
Il controllo delle infestanti è più efficace se l'applicazione di TAURUS è effettuata quando le infestanti sono allo stadio di plantula e in fase di attiva crescita. TAURUS si usa alla dose di 15-20 g/ha su frumento ed orzo,la dose più bassa su infestanti e colture poco sviluppate, la dose più alta nei trattamenti tardivi. Distribuire con 300-600 litri d'acqua.
Attività per assorbimento radicale: si ottiene una migliore attivazione del prodotto quando piove entro due settimane dal trattamento.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
TAURUS, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa a un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; riempire poi il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.
AVVERTENZE: - Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali attacchi di parassiti, asfissia radicale: nel caso che tale sofferenza si verificasse successivamente al trattamento lo stato di debilitazione della coltura può essere temporaneamente aggravato.
Da non applicare su frumento od orzo da traseminare con essenze foraggere.
- Non usare il prodotto in terreni soggetti a forti ristagni d'acqua o su terreni soggetti ad inondazioni. - In caso di necessità di risemina nei terreni già trattati ricorrere, dopo un'aratura profonda, a frumento o ad orzo.

- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dall'irroratore attraverso ripetuti lavaggi (almeno 2) delle singole parti separatamente impiegando soluzioni di ipoclorito di sodio (ad esempio candeggina per uso domestico) allo 0,5 - 1% per 15 minuti e successivamente acqua pura per eliminare ogni residuo di cloro. - Su varietà di frumento od orzo di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività.

RESTRIZIONI NELL'IMPIEGO
Nel Centro e nel Sud d'Italia non effettuare colture a semina estiva nei terreni trattati nella primavera precedente; non seminare barbabietola nella stagione successiva. In Italia Settentrionale, dopo un'aratura profonda, e' possibile seminare mais e soia in secondo raccolto. Evitare durante il trattamento che la miscela erbicida possa arrivare su colture limitrofe o su terreni da seminare con colture sensibili (ad esempio barbabietola). Nello svuotare e lavare l'attrezzatura porre la massima attenzione affinché il prodotto non arrivi direttamente o per dilavamento a contatto con colture vicine o con le loro radici.
COMPATIBILITA'
TAURUS è compatibile con i più comuni erbicidi del frumento e dell'orzo: si consiglia tuttavia di verificare la compatibilità prima dell'uso. Da non usare in miscela con fertilizzanti.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato BAYER CropScience A.G.

Altra taglia autorizzata : g 150

FOGLIO ILLUSTRATIVO

TAURUS®

Erbicida - Granuli idrodispersibili

TAURUS
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Metsulfuron metile puro 20 g
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione N. 10612 del 27.10.2000 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 60 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. **Terapia:** sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
TAURUS è un erbicida selettivo idoneo per il **diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo.**
Tra le infestanti più sensibili risultano: *Stellaria media, Papaver rhoeas, Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum, Capsella bursa pastoris, Ranunculus acer, Chrisantemum segetum, Adonis aestivalis, Centaurea cyanus, Viola tricolor, Matricaria chamomilla, Veronica persica, Cirsium spp., Rumex spp., Lamium purpureum, Apera spica venti;*
Risultano mediamente sensibili: *Fumaria officinalis, Polygonum convolvulus, Polygonum aviculare;*
Risultano scarsamente sensibili: *Veronica hederaefolia e Galium aparine.*
TAURUS svolge un'ottima azione di controllo di *Apera agrostis spica-venti* e un'interessante azione collaterale su *Lolium spp. e Alopecurus myosuroides.*

Dosi - Epoche - Modalità di impiego
Frumento tenero e duro, orzo: TAURUS si usa in post-emergenza della coltura dallo stadio di inizio accestimento sino allo stadio di botticella.
Il controllo delle infestanti è più efficace se l'applicazione di TAURUS è effettuata quando le infestanti sono allo stadio di plantula e in fase di attiva crescita. TAURUS si usa alla dose di 15-20 g/ha su frumento ed orzo,la dose più bassa su infestanti e colture poco sviluppate, la dose più alta nei trattamenti tardivi. Distribuire con 300-600 litri d'acqua.
Attività per assorbimento radicale: si ottiene una migliore attivazione del prodotto quando piove entro due settimane dal trattamento.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
TAURUS, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa a un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; riempire poi il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.
AVVERTENZE: - Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali attacchi di parassiti, asfissia radicale: nel caso che tale sofferenza si verificasse successivamente al trattamento lo stato di debilitazione della coltura può essere temporaneamente aggravato.
Da non applicare su frumento od orzo da traseminare con essenze foraggere.
- Non usare il prodotto in terreni soggetti a forti ristagni d'acqua o su terreni soggetti ad inondazioni. - In caso di necessità di risemina nei terreni già trattati ricorrere, dopo un'aratura profonda, a frumento o ad orzo.

- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dall'irroratore attraverso ripetuti lavaggi (almeno 2) delle singole parti separatamente impiegando soluzioni di ipoclorito di sodio (ad esempio candeggina per uso domestico) allo 0,5 - 1% per 15 minuti e successivamente acqua pura per eliminare ogni residuo di cloro. - Su varietà di frumento od orzo di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività.

RESTRIZIONI NELL'IMPIEGO
Nel Centro e nel Sud d'Italia non effettuare colture a semina estiva nei terreni trattati nella primavera precedente; non seminare barbabietola nella stagione successiva. In Italia Settentrionale, dopo un'aratura profonda, e' possibile seminare mais e soia in secondo raccolto. Evitare durante il trattamento che la miscela erbicida possa arrivare su colture limitrofe o su terreni da seminare con colture sensibili (ad esempio barbabietola). Nello svuotare e lavare l'attrezzatura porre la massima attenzione affinché il prodotto non arrivi direttamente o per dilavamento a contatto con colture vicine o con le loro radici.
COMPATIBILITA'
TAURUS è compatibile con i più comuni erbicidi del frumento e dell'orzo: si consiglia tuttavia di verificare la compatibilità prima dell'uso. Da non usare in miscela con fertilizzanti.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato BAYER CropScience A.G.

Altra taglia autorizzata : g 150

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

TAURUS®

Erbicida - Granuli idrodispersibili

TAURUS
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Metsulfuron metile puro 20 g
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione N. 10612 del 27.10.2000 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 60 PARTITA N.:

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altra taglia autorizzata: g 150

TAURUS®

Erbicida

Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

TAURUS

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Metsulfuron metile puro 20 g
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione N. 10612 del 27.10.2000 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: g 15 PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI

Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. **Terapia:** sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO

Caratteristiche

TAURUS è un erbicida selettivo idoneo per il **diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo.**

Tra le infestanti più sensibili risultano: *Stellaria media, Papaver rhoeas, Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum, Capsella bursa pastoris, Ranunculus acer, Chrisantemum segetum, Adonis aestivalis, Centaurea cyanus, Viola tricolor, Matricaria chamomilla, Veronica persica, Cirsium* spp., *Rumex* spp., *Lamium purpureum, Apera spica venti;*

Risultano mediamente sensibili: *Fumaria officinalis, Polygonum convolvulus, Polygonum aviculare;*

Risultano scarsamente sensibili: *Veronica hederaefolia* o *Galium aparine.*

TAURUS svolge un'ottima azione di controllo di *Apera agrostis spica-venti* e un'interessante azione collaterale su *Lolium spp.* e *Alopecurus myosuroides.*

Dosi - Epoche - Modalità di impiego

Frumento tenero e duro, orzo: TAURUS si usa in post-emergenza della coltura dallo stadio di inizio accestimento sino allo stadio di botticella.

Il controllo delle infestanti è più efficace se l'applicazione di TAURUS è effettuata quando le infestanti sono allo stadio di plantula e in fase di attiva crescita. TAURUS si usa alla dose di 15-20 g/ha su frumento ed orzo,la dose più bassa su infestanti e colture poco sviluppate, la dose più alta nei trattamenti tardivi. Distribuire con 300-600 litri d'acqua.

Attività per assorbimento radicale: si ottiene una migliore attivazione del prodotto quando piove entro due settimane dal trattamento.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

TAURUS, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa a un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; riempire poi il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE: - Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.

- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali attacchi di parassiti, asfissia radicale: nel caso che tale sofferenza si verificasse successivamente al trattamento lo stato di debilitazione della coltura può essere temporaneamente aggravato.

Da non applicare su frumento od orzo da traseminare con essenze foraggere.

- Non usare il prodotto in terreni soggetti a forti ristagni d'acqua o su terreni soggetti ad inondazioni. - In caso di necessità di risemina nei terreni già trattati ricorrere, dopo un'aratura profonda, a frumento o ad orzo.

- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dall'irroratore attraverso ripetuti lavaggi (almeno 2) delle singole parti separatamente impiegando soluzioni di ipoclorito di sodio (ad esempio candeggina per uso domestico) allo 0,5 - 1% per 15 minuti e successivamente acqua pura per eliminare ogni residuo di cloro. - Su varietà di frumento od orzo di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività.

RESTRIZIONI NELL'IMPIEGO

Nel Centro e nel Sud d'Italia non effettuare colture a semina estiva nei terreni trattati nella primavera precedente; non seminare barbabietola nella stagione successiva. In Italia Settentrionale, dopo un'aratura profonda, e' possibile seminare mais e soia in secondo raccolto. Evitare durante il trattamento che la miscela erbicida possa arrivare su colture limitrofe o su terreni da seminare con colture sensibili (ad esempio barbabietola). Nello svuotare e lavare l'attrezzatura porre la massima attenzione affinché il prodotto non arrivi direttamente o per dilavamento a contatto con colture vicine o con le loro radici.

COMPATIBILITA'

TAURUS è compatibile con i più comuni erbicidi del frumento e dell'orzo: si consiglia tuttavia di verificare la compatibilità prima dell'uso. Da non usare in miscela con fertilizzanti.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato BAYER CropScience A.G.

Altre taglie autorizzate :
g 30 (2x15 g) – g 60 (4x15 g)
g 18 (1x18 g) – g 36 (2x18 g) – g 54 (3x18 g)
g 20 (1x20 g) – g 40 (2x20 g) – g 60 (3x20 g)

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

TAURUS®

Erbicida - Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Metsulfuron metil puro g 20
Coformulanti q. b. a 100

Contenuto netto : g 15

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. –Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Registrazione N. 10612 del 27.10.2000 del Ministero della Sanità

AVVERTENZA:
LEGGERE ATTENTAMENTE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

Altre taglie autorizzate:
g 30 (2x15 g) – g 60 (4x15 g)
g 18 (1x18 g) – g 36 (2x18 g) – g 54 (3x18 g)
g 20 (1x20 g) – g 40 (2x20 g) – g 60 (3x20 g)

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1	2	3	4	5	6
Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua	Assicurarsi di avere le mani asciutte	Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo	Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte	Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)	Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni sopranportate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

THIAMON® 80

Zolfo bagnabile micronizzato per la lotta contro gli Oidii in frutticoltura, viticoltura, orticoltura, cerealicoltura, bieticoltura - Polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Zolfo puro (esente da selenio) g 80
Coformulanti q. b. a 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle (R36/37/38).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta (46).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. – via Siemens 12, Bolzano

Registrazione N. 3924 del 16.10.1980 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
THIAMON 80 possiede un'elevata sospensività ed adesività, resistenza al dilavamento ed un'azione pronta anche a basse temperature. E' impiegato per la lotta contro il Mal bianco delle piante da frutto, della vite, delle colture orticole, dei cereali, della barbabietola da zucchero, delle colture forestali.

MODALITA' DI IMPIEGO
Dosi per 100 litri di acqua.
Frutticoltura
Melo, Pero, Pesco: trattamenti pre-fiorali g 700, trattamenti post-fiorali g 300-400. Trattare ogni 8-10 giorni a cominciare dalla liberazione delle gemme. In miscela con M70 (mancozeb) potenzia l'effetto della poltiglia contro la ticchiolatura.
Fragola: g 400-500.
Viticoltura: g 200-400.
Orticoltura (cavolo, insalate, spinacio, bietola da foglia e da costa, sedano, finocchio, prezzemolo, cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, fagiolo, fagiolino, pisello, cece, lenticchia, carota, bietola rossa, rapa, ravanello, cipolla, aglio, porro): g 100-300.
Patata: g 300-500.
Girasole e soia: g 200-300.
Tabacco: intervenendo al manifestarsi della malattia con 2-3 trattamenti distanziati di circa 10 giorni l'uno dall'altro g 300-500.
Forestali: g 150-300.
Barbabietola da zucchero: kg 7-8 per ettaro. Eseguire due trattamenti in corrispondenza dei due primi interventi anticercosporici.
Cereali: kg 6-8 per ettaro. Eseguire il trattamento tra l'inizio della spigatura e la fine della fioritura in miscela con M70 (mancozeb).

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e aggiungerlo alla quantità di acqua o di poltiglia necessaria, mescolando bene.

COMPATIBILITA'
THIAMON 80 non è compatibile (o miscibile) con prodotti fitosanitari a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese), con olii minerali, con Captano, Diclofluanide. Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali o del Captano.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora di verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
THIAMON 80 può arrecare danno alle seguenti cultivars di:
Mele: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla Bianca - Commercio - Golden Delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap.
Pere: Buona Luisa d'Avranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - Williams - Decana del Comizio.
Vite: Sangiovese.
Cucurbitacee: può essere fitotossico.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO-NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altre officine autorizzate:
S.T.I. - Solfotecnica Italiana - Via Torricelli 2, Cotignola (RA)
SYNGENTA AGRO S.A.S. - F-27600 GAILLON, Francia
Altre taglie autorizzate: kg 5 - 10 - 20 - 25

TITUS®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per mais, patata e pomodoro. Granuli idrodispersibili

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron p.a. puro g 25
Coformulanti q. b. a 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21).
NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. **Terapia: sintomatica.**
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione N. 8130 del 30.12.1992 del Ministero della Sanità

CARATTERISTICHE D'AZIONE
TITUS e' un erbicida solfonilureico che blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 10 giorni dall'applicazione. TITUS, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiche' TITUS non ha attivita' residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Infestanti graminacee sensibili: *Avena spp. (Avena selvatica), Digitaria spp. (Sanguinella), Echinochloa spp. (Giavone), Panicum dichotomiflorum (Panico delle risaie), Panicum miliaceum (Panico coltivato), Phalaris spp. (Scagliola), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum bicolor e Sorghum halepense da seme e da rizoma (Sorghetta).*
Infestanti a foglia larga sensibili: *Abutilon theophrasti (Cencio molle), Amaranthus spp. (Amaranto), Ambrosia spp. (Ambrosia), Ammi majus (Visnaga maggiore), Bidens bipinnata (Forbicine), Capsella bursa-pastoris (Borsapastore), Convolvulus arvensis (Vilucchio), Calystegia sepium (Vilucchio bianco), Diplotaxis spp. (Rucola violacea), Fumaria officinalis (Fumaria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Helianthus tuberosus (Topinanbur), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Mentha arvensis (Menta campestre), Picris echioides (Aspraggine comune), Ranunculus spp. (Ranuncolo), Rapistrum rugosum (Miagro peloso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus spp. (Crespino) e Xanthium spp. (Nappola).*
EPOCA DI IMPIEGO: post-emergenza della coltura e delle infestanti.

DOSE D'IMPIEGO:
Mais: 50 - 60 g/ha addizionato con bagnante TREND allo 0,2-0,3% su colture allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie. La dose minore e' consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi di sviluppo; la dose maggiore e' consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali gia' sviluppate e Digitaria. Nei terreni torbosi o contro infestanti a nascita scalare (Abutilon theophrasti, Ciperacee, Digitaria spp., ecc.) e in genere contro infestanti perennanti puo' essere utile un trattamento con 40-50 g/ha seguito, circa due settimane dopo, da un secondo intervento con 30 g/ha. Eventuali sarchiature alla coltura trattata devono essere effettuate in presenza di infestanti perenni non prima di 8-10 giorni dal trattamento. Non applicare TITUS sulla coltura precedentemente trattata con Forate, Terbufos, Isofenfos, Paration. In presenza di Chenopodium spp. (Farinello), Datura stramonium (Stramonio comune), Polygonum spp. (Correggiola) e Solanum nigrum (Erba morella) e' consigliata la miscela con un prodotto ad attivita' specifica.
Pomodoro: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Trend allo 0,2% a partire dallo stadio cotiledonare su coltura seminata e dopo il superamento della crisi di trapianto su coltura trapiantata. In presenza Solanum nigrum applicare 50 g/ha di TITUS + Trend 0,2%, entro e non oltre lo stadio cotiledonare dell'infestante, ripetendo il trattamento dopo 7-10 giorni. In presenza di Chenopodium spp. (Farinello), Polygonum spp. (Correggiola) e Portulaca oleracea (erba porcellana) e' opportuna la miscela con "Mesozin DF" alla dose di 200-500 g/ha. Tale miscela puo' essere applicata, alle dosi piu' basse di Mesozin DF, a partire dalle due foglie vere della coltura. Con infestazione predominante di Echinocloa spp. (Giavone) applicare 50-60 g/ha di TITUS + bagnante Trend 0,2%, effettuando, in caso di reinfestazioni successive, un secondo trattamento con 30 g/ha di TITUS + bagnante Trend 0,2% a distanza di 7-10 giorni.
Patata: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Trend 0,2% quando la coltura ha un'altezza media di 10-20 cm. In caso di reinfestazioni successive il trattamento puo' essere ripetuto utilizzando 30 g/ha di TITUS + bagnante Trend 0,2%.
VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha.
Utilizzare ugelli a ventaglio e medie-basse pressioni di esercizio.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
TITUS, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante Trend nella quantita' necessaria dopo aver inserito TITUS.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C.
-Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare TITUS. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
- Subito dopo il trattamento con TITUS e' importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:
- applicazioni su nuove varieta'
- applicazioni in miscela o in sequenza con nuovi prodotti fitosanitari.
Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.
In caso di necessita' di risemina nei terreni gia' precedentemente trattati con TITUS, ricorrere solo a mais, pomodoro e patata. Trascorsi 90 giorni dall'ultima applicazione di TITUS non vi e' limitazione alcuna per le colture in rotazione.
Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione possono compromettere l'attivita' erbicida.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITA': Non miscelare TITUS con prodotti contenenti bentazone, 2-4D, cyanazina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

FITOTOSSICITA': Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsiglia l'impiego di TITUS su mais dolce, mais bianco, mais vitreo, mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme. Non applicare su colture di patate destinate alla produzione di tuberi da "seme".
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta del pomodoro e della patata ed 80 giorni prima della raccolta del mais.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Contenuto netto: 50 g **PARTITA N.**
®Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & Co., Inc

Altra officina autorizzata:
E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) - Manati, Portorico
Altre taglie autorizzate: g 100 – 110 - 200 – 500

FOGLIO ILLUSTRATIVO

TITUS®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per mais, patata e pomodoro. Granuli idrodispersibili

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron p.a. puro g 25
Coformulanti q. b. a 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21).
NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. **Terapia: sintomatica.**
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione N. 8130 del 30.12.1992 del Ministero della Sanità

CARATTERISTICHE D'AZIONE
TITUS e' un erbicida solfonilureico che blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 10 giorni dall'applicazione. TITUS, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiche' TITUS non ha attivita' residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Infestanti graminacee sensibili: *Avena spp. (Avena selvatica), Digitaria spp. (Sanguinella), Echinochloa spp. (Giavone), Panicum dichotomiflorum (Panico delle risaie), Panicum miliaceum (Panico coltivato), Phalaris spp. (Scagliola), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum bicolor e Sorghum halepense da seme e da rizoma (Sorghetta).*
Infestanti a foglia larga sensibili: *Abutilon theophrasti (Cencio molle), Amaranthus spp. (Amaranto), Ambrosia spp. (Ambrosia), Ammi majus (Visnaga maggiore), Bidens bipinnata (Forbicine), Capsella bursa-pastoris (Borsapastore), Convolvulus arvensis (Vilucchio), Calystegia sepium (Vilucchio bianco), Diplotaxis spp. (Rucola violacea), Fumaria officinalis (Fumaria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Helianthus tuberosus (Topinanbur), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Mentha arvensis (Menta campestre), Picris echioides (Aspraggine comune), Ranunculus spp. (Ranuncolo), Rapistrum rugosum (Miagro peloso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus spp. (Crespino) e Xanthium spp. (Nappola).*
EPOCA DI IMPIEGO: post-emergenza della coltura e delle infestanti.

DOSE D'IMPIEGO:

Mais: 50 - 60 g/ha addizionato con bagnante TREND allo 0,2-0,3% su colture allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie. La dose minore e' consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi di sviluppo; la dose maggiore e' consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali gia' sviluppate e Digitaria. Nei terreni torbosi o contro infestanti a nascita scalare (Abutilon theophrasti, Ciperacee, Digitaria spp., ecc.) e in genere contro infestanti perennanti puo' essere utile un trattamento con 40-50 g/ha seguito, circa due settimane dopo, da un secondo intervento con 30 g/ha. Eventuali sarchiature alla coltura trattata devono essere effettuate in presenza di infestanti perenni non prima di 8-10 giorni dal trattamento. Non applicare TITUS sulla coltura precedentemente trattata con Forate, Terbufos, Isofenfos, Paration. In presenza di Chenopodium spp. (Farinello), Datura stramonium (Stramonio comune), Polygonum spp. (Correggiola) e Solanum nigrum (Erba morella) e' consigliata la miscela con un prodotto ad attivita' specifica.
Pomodoro: 50 60 g/ha con aggiunta di bagnante Trend allo 0,2% a partire dallo stadio cotiledonare su coltura seminata e dopo il superamento della crisi di trapianto su coltura trapiantata. In presenza Solanum nigrum applicare 50 g/ha di TITUS + Trend 0,2%, entro e non oltre lo stadio cotiledonare dell'infestante, ripetendo il trattamento dopo 7-10 giorni. In presenza di Chenopodium spp. (Farinello), Polygonum spp. (Correggiola) e Portulaca oleracea (erba porcellana) e' opportuna la miscela con "Mesozin DF" alla dose di 200-500 g/ha. Tale miscela puo' essere applicata, alle dosi piu' basse di Mesozin DF, a partire dalle due foglie vere della coltura. Con infestazione predominante di Echinocloa spp. (Giavone) applicare 50-60 g/ha di TITUS + bagnante Trend 0,2%, effettuando, in caso di reinfestazioni successive, un secondo trattamento con 30 g/ha di TITUS + bagnante Trend 0,2% a distanza di 7-10 giorni.
Patata: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Trend 0,2% quando la coltura ha un'altezza media di 10-20 cm. In caso di reinfestazioni successive il trattamento puo' essere ripetuto utilizzando 30 g/ha di TITUS + bagnante Trend 0,2%.
VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha.
Utilizzare ugelli a ventaglio e medie-basse pressioni di esercizio.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
TITUS, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante Trend nella quantita' necessaria dopo aver inserito TITUS.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C.
-Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare TITUS. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
- Subito dopo il trattamento con TITUS e' importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:
- applicazioni su nuove varieta'
- applicazioni in miscela o in sequenza con nuovi prodotti fitosanitari.
Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.
In caso di necessita' di risemina nei terreni gia' precedentemente trattati con TITUS, ricorrere solo a mais, pomodoro e patata. Trascorsi 90 giorni dall'ultima applicazione di TITUS non vi e' limitazione alcuna per le colture in rotazione.
Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione possono compromettere l'attivita' erbicida.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITA': Non miscelare TITUS con prodotti contenenti bentazone, 2-4D, cyanazina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

FITOTOSSICITA': Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsiglia l'impiego di TITUS su mais dolce, mais bianco, mais vitreo, mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme. Non applicare su colture di patate destinate alla produzione di tuberi da "seme".
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta del pomodoro e della patata ed 80 giorni prima della raccolta del mais.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Contenuto netto: 50 g **PARTITA N.**

®Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & Co., Inc

Altra officina autorizzata:
E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) - Manati, Portorico
Altre taglie autorizzate: g 100 – 110 - 200 – 500

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

TITUS®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per mais, patata e pomodoro. Granuli idrodispersibili

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron p.a. puro g 25
Coformulanti q. b. a 100

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione N. 8130 del 30.12.1992 del Ministero della Sanità

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21)
NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

Contenuto netto: 50 g **PARTITA N.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altre officine autorizzate:
E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) - Manati, Portorico
Altre taglie autorizzate:
g 100 – 110 - 200 - 500

TITUS®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per mais, patata e pomodoro. Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron p.a. puro g 25
Coformulanti q. b. a 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21).
NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. **Terapia: sintomatica. CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118**

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione N. 8130 del 30.12.1992 del Ministero della Sanità

CARATTERISTICHE D'AZIONE
TITUS e' un erbicida solfonilureico che blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 10 giorni dall'applicazione. TITUS, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiche' TITUS non ha attivita' residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Infestanti graminacee sensibili: *Avena spp. (Avena selvatica), Digitaria spp. (Sanguinella), Echinochloa spp. (Giavone), Panicum dichotomiflorum (Panico delle risaie), Panicum miliaceum (Panico coltivato), Phalaris spp. (Scagliola), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum bicolor e Sorghum halepense da seme e da rizoma (Sorghetta).*
Infestanti a foglia larga sensibili: ***Abutilon theophrasti (Cencio molle), Amaranthus spp. (Amaranto), Ambrosia spp. (Ambrosia), Ammi majus (Visnaga maggiore), Bidens bipinnata (Forbicine), Capsella bursa-pastoris (Borsapastore), Convolvulus arvensis (Vilucchio), Calystegia sepium (Vilucchio bianco), Diplotaxis spp. (Rucola violacea), Fumaria officinalis (Fumaria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Helianthus tuberosus (Topinanbur), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Mentha arvensis (Menta campestre), Picris echioides (Aspraggine comune), Ranunculus spp. (Ranuncolo), Rapistrum rugosum (Miagro peloso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus spp. (Crespino) e Xanthium spp. (Nappola***

EPOCA DI IMPIEGO: post-emergenza della coltura e delle infestanti.
DOSE D'IMPIEGO:
Mais: 50 - 60 g/ha addizionato con bagnante TREND allo 0,2-0,3% su colture allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie. La dose minore e' consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi di sviluppo; la dose maggiore e' consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali gia' sviluppate e Digitaria. Nei terreni torbosi o contro infestanti a nascita scalare (Abutilon theophrasti, Ciperacee, Digitaria spp., ecc.) e in genere contro infestanti perennanti puo' essere utile un trattamento con 40-50 g/ha seguito, circa due settimane dopo, da un secondo intervento con 30 g/ha. Eventuali sarchiature alla coltura trattata devono essere effettuate in presenza di infestanti perenni non prima di 8-10 giorni dal trattamento. Non applicare TITUS sulla coltura precedentemente trattata con Forate, Terbufos, Isofenfos, Paration. In presenza di Chenopodium spp. (Farinello), Datura stramonium (Stramonio comune), Polygonum spp. (Correggiola) e Solanum nigrum (Erba morella) e' consigliata la miscela con un prodotto ad attivita' specifica.
Pomodoro: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Trend allo 0,2% a partire dallo stadio cotiledonare su coltura seminata e dopo il superamento della crisi di trapianto su coltura trapiantata. In presenza Solanum nigrum applicare 50 g/ha di TITUS + Trend 0,2%, entro e non oltre lo stadio cotiledonare dell'infestante, ripetendo il trattamento dopo 7-10 giorni. In presenza di Chenopodium spp. (Farinello), Polygonum spp. (Correggiola) e Portulaca oleracea (erba porcellana) e' opportuna la miscela con "Mesozin DF" alla dose di 200-500 g/ha. Tale miscela puo' essere applicata, alle dosi piu' basse di Mesozin DF, a partire dalle due foglie vere della coltura. Con infestazione predominante di Echinocloa spp. (Giavone) applicare 50-60 g/ha di TITUS + bagnante Trend 0,2%, effettuando, in caso di reinfestazioni successive, un secondo trattamento con 30 g/ha di TITUS + bagnante Trend 0,2% a distanza di 7-10 giorni.
Patata: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Trend 0,2% quando la coltura ha un'altezza media di 10-20 cm. In caso di reinfestazioni successive il trattamento puo' essere ripetuto utilizzando 30 g/ha di TITUS + bagnante Trend 0,2%.
VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha.
Utilizzare ugelli a ventaglio e medie-basse pressioni di esercizio.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
TITUS, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante Trend nella quantita' necessaria dopo aver inserito TITUS.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C.
-Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare TITUS. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
- Subito dopo il trattamento con TITUS e' importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:
- applicazioni su nuove varieta'
- applicazioni in miscela o in sequenza con nuovi prodotti fitosanitari.
Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.
In caso di necessita' di risemina nei terreni gia' precedentemente trattati con TITUS, ricorrere solo a mais, pomodoro e patata. Trascorsi 90 giorni dall'ultima applicazione di TITUS non vi e' limitazione alcuna per le colture in rotazione.
Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione possono compromettere l'attivita' erbicida.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA
COMPATIBILITA': Non miscelare TITUS con prodotti contenenti bentazone, 2-4D, cyanazina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.
FITOTOSSICITA': Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsiglia l'impiego di TITUS su mais dolce, mais bianco, mais vitreo, mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme. Non applicare su colture di patate destinate alla produzione di tuberi da "seme".
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta del pomodoro e della patata ed 80 giorni prima della raccolta del mais.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
Contenuto netto: 50 g **PARTITA N.**
(contiene 1 sacchetto da g 50)
®Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & Co., Inc

Altre taglie autorizzate:
g 50 (5 sacchetti da g 10)
g 100 (2 sacchetti da g 50)
g 100 (5 sacchetti da g 20)

ETICHETTA PER SACCHETTO I DROSOLUBILE

TITUS®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per mais, patata e pomodoro.
Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron p.a. puro g 25
Coformulanti q. b. a 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21)

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 8130 del 30.12.1992 del Ministero della Sanità

Contenuto del sacchetto: 10 g PARTITA N.

AVVERTENZA: Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

Altre taglie autorizzate: g 20 – 50

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1	2	3	4	5	6
Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua	Assicurarsi di avere le mani asciutte	Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo	Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte	Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (3 min)	Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni sopraripertate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti

VALEX DF®

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di frumento tenero e duro, orzo a semina primaverile - Granuli idrodispersibili

VALEX DF *
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tifensulfuron metile p.a. puro g 50
Tribenuron metile p.a. puro g 25
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione n. 8363 del 07.08.1993 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 50 PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive TIFENSULFURON METILE 50% e TRIBENURON METILE 25%. Il Tribenuron metile, separatamente, provoca i seguenti sintomi di intossicazione: **Sintomi:** non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea. **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

EPOCA DI IMPIEGO
Post-emergenza: di frumento tenero e duro,orzo a semina primaverile dallo stadio di tre foglie fino allo stadio di botticella della coltura.
VALEX DF viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento, VALEX DF blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento,necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 2 settimane dall'applicazione. Le malerbe non devitalizzate sono drasticamente ridotte nello sviluppo e sono molto meno competitive nei riguardi della coltura.Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocita' di azione.
Dosi d'impiego: 30-50 g/ha; da distribuire con 200-400 litri d'acqua: la dose piu' bassa si applica su infestanti e colture poco sviluppate, la dose piu' alta nei trattamenti tardivi.
SPETTRO D'AZIONE: Infestanti sensibili: Adonide *(Adonis aestivalis)*, Aglio delle vigne (*Allium vineale*), Amaranti *(Amaranthus spp.)*, Camomilla bastarda *(Anthemis cotula)*, Coriandolo *(Bifora radians)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvulus)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Farinello comune *(Chenopodium album)*, Erba cornetta *(Consolida regalis)*, Geranio *(Geranium disectum)*, Falsa ortica *(Lamium purpureum)*, Camomilla *(Matricaria chamomilla)*, Miagro liscio *(Myagrum perfoliatum)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Correggiola *(Polygonum aviculare)*, Poligono persicaria *(Polygonum persicaria)*, Porcellana *(Portulaca oleracea)*, Ranuncolo *(Ranunculus acer)*, Ravanello selvatico *(Raphanus raphenistrum)*, Rapistro *(Rapistrum rugosum)*. Romice *(Rumex spp.)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*. Centocchio *(Stellaria media)*, Veccia *(Vicia sativa)*, Viola *(Viola spp.)*.
In presenza di Fiordaliso *(Centaurea cyanus)*, Crisantemo delle messi *(Chrisanthemum segetum)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Pettine di Venere *(Scandix pecten veneris)*, Veronica *(Veronica spp.)*, e' necessario aggiungere un bagnante alle dosi consigliate.
Infestanti mediamente sensibili: Stoppione *(Cirsium spp.)*, Vilucchio bianco *(Calystegia sepium)* e Vilucchio *(Convolvulus arvensis)*.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
VALEX DF, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento;portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.
AVVERTENZE - Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
Subito dopo il trattamento e' importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
d) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.

Su varieta' coltivate di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettivita'. Dopo un trattamento con VALEX DF si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.

COMPATIBILITA' – VALEX DF è compatibile con Starane (s.a. fluroxipyr), Gralit Max (s.a. fenoxaprop-p-etile) e con Topik (s.a. clodinafop-propargil).
In caso di miscela versare nella botte prima VALEX DF e successivamente gli altri formulati.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONTIENE TRIBENURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Altre officine autorizzate:
E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) Manati (Portorico)
Altre taglie autorizzate: g 100

FOGLIO ILLUSTRATIVO

VALEX DF®

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di frumento tenero e duro, orzo a semina primaverile - Granuli idrodispersibili

VALEX DF *

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Tifensulfuron metile p.a. puro g 50
Tribenuron metile p.a. puro g 25
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione n. 8363 del 07.08.1993 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 50 PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive TIFENSULFURON METILE 50% e TRIBENURON METILE 25%. Il Tribenuron metile, separatamente, provoca i seguenti sintomi di intossicazione: **Sintomi:** non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea. **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

EPOCA DI IMPIEGO

Post-emergenza: di frumento tenero e duro,orzo a semina primaverile dallo stadio di tre foglie fino allo stadio di botticella della coltura.
VALEX DF viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento, VALEX DF blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento,necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 2 settimane dall'applicazione. Le malerbe non devitalizzate sono drasticamente ridotte nello sviluppo e sono molto meno competitive nei riguardi della coltura.Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocita' di azione.
Dosi d'impiego: 30-50 g/ha; da distribuire con 200-400 litri d'acqua: la dose piu' bassa si applica su infestanti e colture poco sviluppate, la dose piu' alta nei trattamenti tardivi.
SPETTRO D'AZIONE: Infestanti sensibili: Adonide (*Adonis aestivalis*), Aglio delle vigne (*Allium vineale*), Amaranti (*Amaranthus spp.*), Camomilla bastarda (*Anthemis cotula*), Coriandolo (*Bifora radians*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Farinello comune (*Chenopodium album*), Erba cornetta (*Consolida regalis*), Geranio (*Geranium disectum*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Miagro liscio (*Myagrum perfoliatum*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Ranuncolo (*Ranunculus acer*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Rapistro (*Rapistrum rugosum*), Romice (*Rumex spp.*), Senape selvatica (Sinapis arvensis), Centocchio (*Stellaria media*), Veccia (*Vicia sativa*), Viola (*Viola spp.*).
In presenza di Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Crisantemo delle messi (*Chrisanthemum segetum*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Pettine di Venere (*Scandix pecten veneris*), Veronica (*Veronica spp.*), e' necessario aggiungere un bagnante alle dosi consigliate.
Infestanti mediamente sensibili: Stoppione (*Cirsium spp.*), Vilucchio bianco (*Calystegia sepium*) e Vilucchio (*Convolvulus arvensis*).

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

VALEX DF, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento;portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.
AVVERTENZE - Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
Subito dopo il trattamento e' importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
d) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.
Su varieta' coltivate di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettivita'. Dopo un trattamento con VALEX DF si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.

COMPATIBILITA' – VALEX DF è compatibile con Starane (s.a. fluroxipyr), Gralit Max (s.a. fenoxaprop-p-etile) e con Topik (s.a. clodinafop-propargil).
In caso di miscela versare nella botte prima VALEX DF e successivamente gli altri formulati.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONTIENE TRIBENURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Altre officine autorizzate:
E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) Manati (Portorico)
Altre taglie autorizzate: g 100

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

VALEX DF®

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di frumento tenero e duro, orzo a semina primaverile - Granuli idrodispersibili

VALEX DF *

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Tifensulfuron metile p.a. puro g 50
Tribenuron metile p.a. puro g 25
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione

Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337

Officina di Produzione

Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione n. 8363 del 07.08.1993 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 50 PARTITA N.

CONTIENE TRIBENURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA
PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altre officine autorizzate:
E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) Stabilimento di Manati (Portorico)
Altre taglie autorizzate: g 100

VENZAR®

Erbicida - Polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
Lenacil puro g 80
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione n. 7379 del 08.01.1988 del Ministero della Sanità

Contenuto netto kg 0,5 **PARTITA N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.
Terapia: Sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
VENZAR è un erbicida in formulazione di polvere bagnabile ad ampio spettro d'azione, per il diserbo selettivo della barbabietola da zucchero e da foraggio e dello spinacio. Agisce per assorbimento radicale sui germinelli delle infestanti. Il VENZAR, per un controllo anche di erbe resistenti o mediamente resistenti come ad es. *Amaranthus spp* (amaranto), *Galium aparine* (attaccamani), *Veronica spp* (veronica), *Avena spp.* (avena), *Urtica spp* (ortica), *Solanum nigrum* (erba morella) e tutte le perenni, può essere applicato in miscela con altri diserbanti quali: Etofumesate, Fenmedifam, Cloridazon.
Dosi di impiego
- Diserbo barbabietola da zucchero e da foraggio
a) semina primaverile
- pre-semina invernale anticipata: 0,750-1,250 kg/ha di VENZAR, per trattamento entro gennaio, su terreno ben preparato e privo di infestanti che, se presenti, vanno preventivamente eliminate;
- pre-semina, con interramento: 0,5-0,6 kg/ha di VENZAR, interrando a 2-3 cm di profondità con un'erpicatura; per allargare lo spettro d'azione aggiungere 7-8 kg di TCA al 95% p.a.; oppure 3,5-4,5 kg/ha di Cloridazon al 68% p.a.; oppure 5 litri/ha di Etofumesate al 21,1% p.a. senza in questo caso la necessita' dell'interramento;
- pre-emergenza: 0,5-0,6 kg/ha di VENZAR per trattamento subito dopo la semina; per allargare lo spettro d'azione aggiungere 5 litri/ha di Etofumesate al 21,1% p.a.; oppure 9-10 kg/ha di TCA al 95% p.a.; oppure 2-3 kg di Cloridazon al 68% p.a.;
- post-emergenza: 0.5-0,6 kg/ha di VENZAR, in miscela con 3-5 litri /ha di Fenmedifam al 15,9% p.a., quando la bietola e' nello stadio tra i cotiledoni e le 2-4 foglie vere.
b) semina autunnale
- pre-emergenza: 0,750-1 kg/ha di VENZAR; per allargare lo spettro d'azione aggiungere 5 litri/ha di Etofumesate al 21,1% p.a., oppure 9-12 kg/ha TCA al 95% p.a.; oppure 3 kg di Cloridazon al 68% p.a.;
- post-emergenza: 0,5-0,6 kg/ha di VENZAR, in miscela con 5 litri/ha di Fenmedifam al 15,9%, quando la bietola e' nello stadio di 2-4 foglie vere.
- Diserbo spinacio
- pre-semina: 0,8-1 kg/ha di VENZAR, interrando a 2-3 cm di profondità con un'erpicatura;
- pre-emergenza: 1-1,2 kg/ha di VENZAR;
- post-emergenza: 0,5 kg/ha in miscela con 4,6 litri/ha di Fenmedifam al 15,9% p.a.
In tutte le applicazioni impiegare il prodotto alla dose indicata con volumi di acqua compresi tra 300-500 L/ha.
AVVERTENZE
VENZAR permette i migliori risultati, attenendosi alle seguenti norme:
- calcolare bene la dose d'impiego, a seconda del tipo di trattamento e della natura del terreno;
- usare le dosi più basse in terreni di medio impasto e quelle più elevate in terreni pesanti;
- non usare il prodotto in terreni leggeri, sabbiosi, ghiaiosi o comunque filtranti;
- nei trattamenti in pre-semina e in pre-emergenza, il terreno deve essere ben lavorato, amminutato, privo di zollosità e residui vegetali grossolani;
- il terreno deve possedere un buon grado di umidità e qualora si debba operare su terreno asciutto e non si verificano piogge successive, e' utile procedere ad una irrigazione entro due settimane dal trattamento;
- effettuare i trattamenti prima dell'emergenza delle infestanti, o nel caso dei trattamenti di post-emergenza quando sono nelle prime fasi di sviluppo;
- distribuire il prodotto con attrezzatura dotata di agitatore;
- prima del trattamento tarare l'irroratrice in modo da distribuire il prodotto in modo uniforme;
- durante il trattamento procedere a velocità costante evitando qualsiasi manovra che possa far variare la quantità di sospensione distribuita per unità di superficie;
- assicurarsi, prima e durante il trattamento, del buon funzionamento degli ugelli;
- evitare gli sgocciolamenti sul terreno.
VENZAR,nei terreni torbosi,può avere un'efficacia ridotta alle dosi indicate.
COMPATIBILITA'
VENZAR è compatibile con prodotti fitosanitari contenenti le seguenti sostanze attive: Clopiralid, Cloridazon, Desmedifam, Etofumesate, Fenmedifam, Metamitron,Propaquizafop, Propizamide, Triflusulfuron metile e con gli Olii minerali.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. VENZAR non deve essere usato in terreni leggeri, sabbiosi, ghiaiosi. Un terreno trattato, in caso di forzata risemina, può essere riseminato solo con la coltura precedentemente seminata o con le colture per le quali è stato indicato l'impiego su questa etichetta. Evitare l'impiego di geodisinfestanti che possono dar luogo a fenomeni di interazione negativa, quali Forate, Disulfoton.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altre officine autorizzate:
AGRICON-SCHIRM A.G. – Dortmund, Germania
TRAPACO DR. SCHIRM GmbH - Mecklenburger Strasse 229 - IVG GELAENDE, D 23568, LUBECK (Germania)
Altre taglie autorizzate: kg 1- 5

VENZAR®

Erbicida - Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE
Lenacil puro g 80
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione n. 7379 del 08.01.1988 del Ministero della Sanità

Contenuto netto g 100 PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.
Terapia: Sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
VENZAR è un erbicida in formulazione di polvere bagnabile ad ampio spettro d'azione, per il diserbo selettivo della barbabietola da zucchero e da foraggio e dello spinacio. Agisce per assorbimento radicale sui germinelli delle infestanti. Il VENZAR, per un controllo anche di erbe resistenti o mediamente resistenti come ad es. *Amaranthus spp* (amaranto), *Galium aparine* (attaccamani), *Veronica spp* (veronica), *Avena spp.* (avena), *Urtica spp* (ortica), *Solanum nigrum* (erba morella) e tutte le perenni, può essere applicato in miscela con altri diserbanti quali: Etofumesate, Fenmedifam, Cloridazon.
Dosi di impiego
- Diserbo barbabietola da zucchero e da foraggio
a) semina primaverile
- pre-semina invernale anticipata: 0,750-1,250 kg/ha di VENZAR, per trattamento entro gennaio, su terreno ben preparato e privo di infestanti che, se presenti, vanno preventivamente eliminate;
- pre-semina, con interramento: 0,5-0,6 kg/ha di VENZAR, interrando a 2-3 cm di profondità con un'erpicatura; per allargare lo spettro d'azione aggiungere 7-8 kg di TCA al 95% p.a.; oppure 3,5-4,5 kg/ha di Cloridazon al 68% p.a.; oppure 5 litri/ha di Etofumesate al 21,1% p.a. senza in questo caso la necessita' dell'interramento;
- pre-emergenza: 0,5-0,6 kg/ha di VENZAR per trattamento subito dopo la semina; per allargare lo spettro d'azione aggiungere 5 litri/ha di Etofumesate al 21,1% p.a.; oppure 9-10 kg/ha di TCA al 95% p.a.; oppure 2-3 kg di Cloridazon al 68% p.a.;
- post-emergenza: 0,5-0,6 kg/ha di VENZAR, in miscela con 3-5 litri /ha di Fenmedifam al 15,9% p.a., quando la bietola e' nello stadio tra i cotiledoni e le 2-4 foglie vere.
b) semina autunnale
- pre-emergenza: 0,750-1 kg/ha di VENZAR; per allargare lo spettro d'azione aggiungere 5 litri/ha di Etofumesate al 21,1% p.a., oppure 9-12 kg/ha TCA al 95% p.a.; oppure 3 kg di Cloridazon al 68% p.a.;
- post-emergenza: 0,5-0,6 kg/ha di VENZAR, in miscela con 5 litri/ha di Fenmedifam al 15,9%, quando la bietola e' nello stadio di 2-4 foglie vere.
- Diserbo spinacio
- pre-semina: 0,8-1 kg/ha di VENZAR, interrando a 2-3 cm di profondità con un'erpicatura;
- pre-emergenza: 1-1,2 kg/ha di VENZAR;
- post-emergenza: 0,5 kg/ha in miscela con 4,6 litri/ha di Fenmedifam al 15,9% p.a.
In tutte le applicazioni impiegare il prodotto alla dose indicata con volumi di acqua compresi tra 300-500 L/ha.
AVVERTENZE
Il VENZAR permette i migliori risultati, attenendosi alle seguenti norme:
- calcolare bene la dose d'impiego, a seconda del tipo di trattamento e della natura del terreno;
- usare le dosi più basse in terreni di medio impasto e quelle più elevate in terreni pesanti;
- non usare il prodotto in terreni leggeri, sabbiosi, ghiaiosi o comunque filtranti;
- nei trattamenti in pre-semina e in pre-emergenza, il terreno deve essere ben lavorato, amminutato, privo di zollosità e residui vegetali grossolani;
- il terreno deve possedere un buon grado di umidità e qualora si debba operare su terreno asciutto e non si verificano piogge successive, e' utile procedere ad una irrigazione entro due settimane dal trattamento;
- effettuare i trattamenti prima dell'emergenza delle infestanti, o nel caso dei trattamenti di post-emergenza quando sono nelle prime fasi di sviluppo;
- distribuire il prodotto con attrezzatura dotata di agitatore;
- prima del trattamento tarare l'irroratrice in modo da distribuire il prodotto in modo uniforme;
- durante il trattamento procedere a velocità costante evitando qualsiasi manovra che possa far variare la quantità di sospensione distribuita per unità di superficie;
- assicurarsi, prima e durante il trattamento, del buon funzionamento degli ugelli;
- evitare gli sgocciolamenti sul terreno.
VENZAR,nei terreni torbosi,può avere un'efficacia ridotta alle dosi indicate.
COMPATIBILITA'
VENZAR è compatibile con prodotti fitosanitari contenenti le seguenti sostanze attive: Clopiralid, Cloridazon, Desmedifam, Etofumesate, Fenmedifam, Metamitron,Propaquizafop, Propizamide, Triflusulfuron metile e con gli Olii minerali.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Il VENZAR non deve essere usato in terreni leggeri, sabbiosi, ghiaiosi. Un terreno trattato, in caso di forzata risemina, può essere riseminato solo con la coltura precedentemente seminata o con le colture per le quali è stato indicato l'impiego su questa etichetta.
Evitare l'impiego di geodisinfestanti che possono dar luogo a fenomeni di interazione negativa, quali Forate, Disulfoton.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altre officine autorizzate:
AGRICON-SCHIRM A.G. –Dortmund, Germania
TRAPACO DR. SCHIRM GmbH - Mecklenburger Strasse 229 - IVG GELAENDE, D 23568, LUBECK (Germania)
Altre taglie autorizzate:
kg 0,5 (contiene 5 sacchetti da g 100)
kg 1 (contiene 10 sacchetti da g 100)

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

VENZAR®

Erbicida - Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE
Lenacil puro g 80
Sostanze inerti q. b. a 100

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 7379 del 08.01.1988 del Ministero della Sanità

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto netto del sacchetto: g 100

AVVERTENZA: Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

Altre officine autorizzate:
AGRICON-SCHIRM A.G. –Dortmund, Germania
TRAPACO DR. SCHIRM GmbH - Mecklenburger Strasse 229 -
IVG GELAENDE, D 23568, LUBECK (Germania)

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1	2	3	4	5	6
Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua	Assicurarsi di avere le mani asciutte	Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo	Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte	Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)	Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni sopraindicate fa' sì che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti

VITEX® 4/40 COMBI

Fungicida ad azione antiperonosporica con effetto collaterale contro l'escoriosi della vite
Polvere Bagnabile

VITEX® 4/40 COMBI
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 4
Mancozeb puro g 40
Coformulanti q.b. a 100
Contiene: paraformaldeide

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie (R37) Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43) Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso di ingestioneconsultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta (46). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione:
Isagro S.p.A. – via Nettunense km 23,400 Aprilia (LT)

Distribuito da:
Siapa S.r.l. - via Caldera 21 Milano

Registrazione n° 3542 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 - 5 - 25 **Partita n°......**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4%, MANCOZEB 40%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE
VITEX 4/40 COMBI è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la Peronospora della VITE, del TABACCO e del POMODORO (da trattare fino alla prima fioritura). Il prodotto agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo, che le zoospore germinanti. VITEX 4/40 COMBI può essere usato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Peronospora della vite: Impiegare 200-300 g di prodotto in 100 litri di acqua. I trattamenti possono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
I trattamenti effettuati in corrispondenza del germogliamento sono efficaci anche nei confronti dell'Escoriosi.
Peronospora del pomodoro: Impiegare 250-300 g di prodotto in 100 litri di acqua. Impiegare la dose di 300-350 g ogni 100 litri di acqua in presenza di attacchi di peronospora ed Alternaria.
Peronospora del tabacco: Impiegare 300-350 g di prodotto in 100 litri di acqua. Impiegare la dose più alta in situazione di forte attacco su varietà particolarmente sensibili.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA:
Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di VITEX 4/40 COMBI in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra od acida. Si sconsiglia di usare il prodotto in associazione con formulati a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

® Marchio registrato Isagro SpA

VITEX® 4/40 COMBI

Fungicida ad azione antiperonosporica con effetto collaterale contro l'escoriosi della vite
Polvere Bagnabile in sacchetto idrosolubile

VITEX® 4/40 COMBI
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 4
Mancozeb puro g 40
Coformulanti q.b. a 100
Contiene: paraformaldeide

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie (R37) Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43) Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta (46). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione:
Isagro S.p.A. – via Nettunense km 23,400 Aprilia (LT)
Distribuito da:
Siapa S.r.l. - via Caldera 21 Milano

Registrazione n° 3542 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 - **Partita n°......**
(contiene 2 sacchetti idrosolubili da g 500)

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4%, MANCOZEB 40%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE
VITEX 4/40 COMBI è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la Peronospora della VITE, del TABACCO e del POMODORO (da trattare fino alla prima fioritura). Il prodotto agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo, che le zoospore germinanti. VITEX 4/40 COMBI può essere usato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Peronospora della vite: Impiegare 200-300 g di prodotto in 100 litri di acqua. I trattamenti possono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. I trattamenti effettuati in corrispondenza del germogliamento sono efficaci anche nei confronti dell'Escoriosi.
Peronospora del pomodoro: Impiegare 250-300 g di prodotto in 100 litri di acqua. Impiegare la dose di 300-350 g ogni 100 litri di acqua in presenza di attacchi di peronospora ed Alternaria.
Peronospora del tabacco: Impiegare 300-350 g di prodotto in 100 litri di acqua. Impiegare la dose più alta in situazione di forte attacco su varietà particolarmente sensibili.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA:
Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di VITEX 4/40 COMBI in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ'
Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra od acida. Si sconsiglia di usare il prodotto in associazione con formulati a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

® Marchio registrato Isagro SpA

Altre taglie autorizzate:
kg 2.5 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da g 250
kg 5 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da g 500)

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

VITEX® 4/40 COMBI

Fungicida ad azione antiperonosporica con effetto collaterale contro l'escoriosi della vite
Polvere Bagnabile in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Cimoxanil puro	g	4
Mancozeb puro	g	40
Coformulanti q. b. a		100

Contiene: paraformaldeide

Contenuto netto del sacchetto: g 250

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337

Officina di Produzione
Isagro S.p.A.- via Nettunense km 23,400 Aprilia (LT);
Distribuito da:
Siapa Srl - Via Caldera 21, Milano

Registrazione n° 3542 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità

AVVERTENZA:
Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Altra taglia autorizzata: g 500

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1. Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua
2. Assicurarsi di avere le mani asciutte
3. Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo
4. Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte
5. Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)
6. Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni soprariportate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

VITEX® 8/68

Fungicida ad azione antiperonosporica con effetto collaterale contro l'escoriosi della vite
Polvere Bagnabile

VITEX® 8/68
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 8
Mancozeb puro g 68.6
Coformulanti q.b. a 100
Contiene: paraformaldeide

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie (R37) Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43) Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta (46). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione:
Isagro S.p.A. – via Nettunense km 23,400 Aprilia (LT);
Distribuito da:
Siapa S.r.l. - via Caldera 21 Milano

Registrazione n° 3543 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: kg 1 - 5 - 25 **Partita n°......**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 8%; Mancozeb 68,6% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'Urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE
VITEX 8/68 è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la peronospora della vite, del pomodoro (da trattare fino alla prima fioritura) e del tabacco. Il prodotto è una miscela di due fungicidi di cui il Mancozeb possiede una più lunga persistenza di azione, mentre il secondo è dotato di una prontezza d'azione ed effetto bloccante in quanto penetra nelle foglie.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Contro la peronospora della vite il prodotto si impiega alla dose di 130-150 g in 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fintanto che permangono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. In condizioni normali trattare ogni 8-10 giorni. In caso di attacco forte o di rapido accrescimento della pianta l'intervallo può essere ridotto a 6-8 giorni.
Contro la peronospora del pomodoro e del tabacco il prodotto si impiega alla dose di 150-170 g/hl oppure 2,2-2,8 kg/Ha.
Per aumentare l'efficacia dei trattamenti, aggiungere alla miscela 50 ml per ettolitro di bagnante-non ionico.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Formare una pasta semi-liquida mescolando la giusta dose di prodotto in poca acqua, indi portare a volume, aggiungendo la rimanente acqua, continuando a mescolare.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ'
Il prodotto può essere mescolato con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia l'impiego del prodotto in miscela con formulati a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

®Marchio registrato Isagro S.p.A.

VITEX® 8/68

Fungicida ad azione antiperonosporica con effetto collaterale contro l'escoriosi della vite
Polvere Bagnabile in sacchetto idrosolubile

VITEX® 8/68
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 8
Mancozeb puro g 68.6
Coformulanti q.b. a 100
Contiene: paraformaldeide

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie (R37) Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43) Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta (46). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Isagro S.p.A. – via Nettunense km 23,400 Aprilia (LT);
Distribuito da:
Siapa S.r.l. - via Caldera 21 Milano

Registrazione n° 3543 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: kg 1,5 - **Partita n°......**
(contiene 10 sacchetti idrosolubili da g 150)

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 8%; Mancozeb 68,6% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'Urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE
VITEX 8/68 è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la peronospora della vite, del pomodoro (da trattare fino alla prima fioritura) e del tabacco. Il prodotto è una miscela di due fungicidi di cui il Mancozeb possiede una più lunga persistenza di azione, mentre il secondo è dotato di una prontezza d'azione ed effetto bloccante in quanto penetra nelle foglie.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Contro la peronospora della vite il prodotto si impiega alla dose di 130-150 g in 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fintanto che permangono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. In condizioni normali trattare ogni 8-10 giorni. In caso di attacco forte o di rapido accrescimento della pianta l'intervallo può essere ridotto a 6-8 giorni.
Contro la peronospora del pomodoro e del tabacco il prodotto si impiega alla dose di 150-170 g/hl oppure 2,2-2,8 kg/Ha.
Per aumentare l'efficacia dei trattamenti, aggiungere alla miscela 50 ml per ettolitro di bagnante-non ionico.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Formare una pasta semi-liquida mescolando la giusta dose di prodotto in poca acqua, indi portare a volume, aggiungendo la rimanente acqua, continuando a mescolare.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ'
Il prodotto può essere mescolato con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia l'impiego del prodotto in miscela con formulati a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

®Marchio registrato Isagro S.p.A.

Altre taglie autorizzate:
kg 1 (contiene 2 sacchetti idrosolubili da g 500
kg 5 (contiene 10 sacchetti idrosolubili da g 500)

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

VITEX® 8/68

Fungicida ad azione antiperonosporica con effetto collaterale contro l'escoriosi della vite
Polvere Bagnabile in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Cimoxanil puro	g	8
Mancozeb puro	g	68,6
Coformulanti q. b. a		100

Contiene: paraformaldeide

Contenuto netto del sacchetto: g 150

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Isagro S.p.A.- via Nettunense km 23,400 Aprilia (LT);
Distribuito da:
Siapa Srl - Via Caldera 21, Milano

Registrazione n° 3543 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità

AVVERTENZA:
Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Altra taglia autorizzata: g 500

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1. Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua
2. Assicurarsi di avere le mani asciutte
3. Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo
4. Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte
5. Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)
6. Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni soprariportate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

Oxamyl DuPont

VYDATE® 5G

Nematocida –Insetticida in formulazione granulare

VYDATE 5G
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Oxamyl puro g 5
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione (R20). Tossico per ingestione (R25). Irritante per gli occhi e per le vie respiratorie (R36/37). Tossico per gli organismi acquatici, puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53).

TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini (S1/2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S45). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337

Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay - Francia

Registrazione N. 6277 del 06.03.1985 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: kg 10 PARTITA N.:

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25, D.P.R. 23.04.2001, n. 290.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso ed al riparo dell'umidità. Durante il trattamento tenere lontano persone non protette, animali ed il bestiame. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. **Sintomi muscarinici**: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo, vomito, diarrea, bradicardia. **Sintomi nicotinici** : tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. **Terapia:** atropina. **Controindicazioni**: ossime.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
VYDATE 5G e' un nematocida-insetticida in formulazione granulare contenente il 5% di principio attivo Oxamyl dotato di azione sistemica con traslocazione dal basso verso l'alto.
VYDATE 5G, applicato al suolo alle dosi indicate in etichetta, controlla i nematodi presenti nel terreno appartenenti ai generi *Heterodera, Globodera* e *Meloydogine,* esplicando azione nematocida e nematostatica; inoltre, essendo traslocato dalla radice alla parte aerea della pianta, e' in grado di controllare gli insetti ad apparato boccale pungente-succhiatore. VYDATE 5G deve essere distribuito in pre-trapianto, in pre-semina o alla semina, con le comuni attrezzature utilizzate per lo spargimento dei granulari.
I trattamenti in pre-trapianto, pre-semina o durante la semina possono essere effettuati con diverse modalita':
- su tutta la superficie mediante incorporazione al terreno;
- in localizzazione, nel solco di semina o lungo la fila.

Dosi – Epoche -Modalità d'impiego
Barbabietola da zucchero : VYDATE 5G e' attivo contro nematodi radicali cisticoli del tipo *Heterodera schactii* :
- **in pre-semina** con 140-160 kg/ha distribuito su tutta la superficie, avendo cura di interrare il prodotto a qualche centimetro di profondita';
- **durante la semina** con 30-40 kg/ha distribuito sulla fila in localizzazione con il seme.
Patata : contro nematodi radicali cisticoli del tipo *Globodera rostochiensis e Globodera pallida* :
- **in pre-semina** con 90-130 kg/ha distribuiti su tutta la superficie, avendo cura di interrare il prodotto a 10-15 cm, mediante incorporazione meccanica;
- **in pre-semina o alla semina** con 60-70 kg/ha, localizzato lungo il solco di semina.

Si raccomanda l'applicazione in pieno campo in presenza di infestazioni medio-elevate. Utilizzare il dosaggio piu' alto nei terreni piu' pesanti e comunque con infestazioni elevate.
Pomodoro (in coltura protetta) : contro nematodi radicali galligeni del tipo *Meloidogyne incognita* ;
- **in pre-trapianto** con 90-130 kg/ha distribuiti su tutta la superficie, avendo cura di interrare il prodotto a 10-15 cm, mediante incorporazione meccanica;
- **in pre-trapianto** con 60-70 kg/ha localizzato lungo la fila, interrando il prodotto a 10-15 cm, mediante incorporazione meccanica.
In ogni caso prima di iniziare lo spargimento avere cura di tarare l'attrezzatura in modo da distribuire esattamente la dose indicata.

AVVERTENZA AGRONOMICA : si consiglia di seminare o trapiantare le colture di lattughe e simili, cavoli a testa ed a foglia, cipolla, solo trascorsi 120 giorni dall'applicazione di VYDATE 5G.

COMPATIBILITA'
VYDATE 5G va' impiegato da solo.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Non necessario.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altre taglie autorizzate: kg 5 – kg 20

Oxamyl DuPont

VYDATE® 10L

Nematocida - Insetticida

Liquido concentrato solubile in acqua

VYDATE 10L

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Oxamyl puro 10% (100 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

TOSSICO

FRASI DI RISCHIO

Tossico per inalazione e ingestione (R23/25). Altamente tossico per gli organismi acquatici, puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (S50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini (S1/2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S45). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61). In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo (S63).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono: 800378337

Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay – Francia

Registrazione n. 11611 del 20.02.2003 del Ministero della Salute
Contenuto netto: Litri 5 PARTITA N.:

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25, D.P.R. 23.04.2001, n. 290.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare soltanto nel recipiente originale. Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare l'esposizione-procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso. Non respirare i vapori. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo, vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
TERAPIA: atropina. **CONTROINDICAZIONI:** ossime.

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

Rimuovere la persona intossicata dall'area contaminata. Non somministrare liquidi per bocca. Se il paziente presenta disturbi respiratori trasportarlo in ospedale. In caso di contatto cutaneo lavare abbondantemente con acqua e sapone di Marsiglia; se e' interessata anche la testa lavare anche i capelli.
In caso di ingestione può essere utile provocare il vomito nelle seguenti circostanze :

- solo se la persona è cosciente
- entro 30 minuti dall'ingestione
- se non presenta crisi convulsive

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO

VYDATE 10L è un nematocida-insetticida in formulazione di liquido concentrato solubile in acqua contenente il 10% di principio attivo Oxamyl dotato d'azione sistemica con traslocazione dal basso verso l'alto. VYDATE 10L risulta efficace contro nematodi galligeni (*Meloidogyne* spp.) e cistiformi (*Globodera* ed *Heterodera* spp.) e può svolgere un'efficace azione di contenimento di alcuni insetti alati (aleurodidi, afidi, *Liriomyza* spp.). VYDATE 10L disciolto nell'acqua di irrigazione, deve essere distribuito nel terreno mediante impianti a goccia; in talune condizioni la diluizione e la distribuzione del prodotto in acqua irrigua acidificata ad un valore di pH prossimo a 4,5 ne migliorano l'assorbimento e la disponibilità per l'apparato radicale. **VYDATE 10L non si distribuisce mediante irrorazione fogliare e puo' essere utilizzato solo su colture in ambiente protetto.**

DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO

MELONE – COCOMERO - ZUCCHINO - CETRIOLO

VYDATE 10L si applica in ambiente protetto (serre o tunnels) ad una dose di 10-12 l/ha (a seconda della densità d'impianto e dello stadio di sviluppo della coltura), iniziando 8-12 giorni dopo il trapianto e ripetendo gli interventi ad intervalli di 14 giorni, per un massimo di 5 applicazioni per ciclo colturale.

POMODORO – PEPERONE - MELANZANA

VYDATE 10L si applica in ambiente protetto (serre o tunnels) ad una dose di 10 l/ha, iniziando 8-12 giorni dopo il trapianto e ripetendo gli interventi ad intervalli di 14 giorni, per un massimo di 6 applicazioni per ciclo colturale.

COMPATIBILITA'

VYDATE ´0L va distribuito da solo.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

VYDATE 10L è selettivo nei confronti delle piu' comuni cultivar attualmente presenti sul mercato; in caso di introduzione di nuove varieta' si consiglia comunque di effettuare dei test di selettività su scala ridotta.
Sebbene non siano noti casi di resistenza ad Oxamyl, allo scopo di evitare l'insorgenza di popolazioni di nematodi ed insetti con ridotta sensibilità al prodotto, si consiglia di applicare VYDATE 10L strettamente in accordo con la presente etichetta ed in alternanza con altri formulati nematocidi-insetticidi caratterizzati da un differente meccanismo d'azione.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere le applicazioni **3 giorni** prima della raccolta delle colture.
Attenzione: durante le fasi di caricamento/miscelazione del prodotto utilizzare indumenti protettivi completi, guanti di gomma, occhiali di protezione e respiratore con filtro per vapori organici ed evitare la presenza di personale estraneo non dotato di dispositivi di protezione individuale.
Attenzione: per lavorazioni nelle aree trattate entro le 24 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi completi, guanti di gomma ed occhiali di protezione.
Attenzione: **Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso.** Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altre taglie autorizzate : lt 1-10

WONDER® 25

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per mais, patata e pomodoro. Granuli idrodispersibili

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron p.a. puro g 25
Coformulanti q. b. a 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21).

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. **Terapia: sintomatica. CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118**

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione N. 8191 del 16.03.1993 del Ministero della Sanità

CARATTERISTICHE D'AZIONE
WONDER 25 e' un erbicida solfonilureico che blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 10 giorni dall'applicazione. WONDER, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiche' WONDER 25 non ha attivita' residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Infestanti graminacee sensibili: *Avena spp. (Avena selvatica), Digitaria spp. (Sanguinella), Echinochloa spp. (Giavone), Panicum dichotomiflorum (Panico delle risaie), Panicum miliaceum (Panico coltivato), Phalaris spp. (Scagliola), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum bicolor e Sorghum halepense da seme e da rizoma (Sorghetta).*
Infestanti a foglia larga sensibili: *Abutilon theophrasti (Cencio molle), Amaranthus spp. (Amaranto), Ambrosia spp. (Ambrosia), Ammi majus (Visnaga maggiore), Bidens bipinnata (Forbicine), Capsella bursa-pastoris (Borsapastore), Convolvulus arvensis (Vilucchio), Calystegia sepium (Vilucchio bianco), Diplotaxis spp. (Rucola violacea), Fumaria officinalis (Fumaria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Helianthus tuberosus (Topinanbur), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Mentha arvensis (Menta campestre), Picris echioides (Aspraggine comune), Ranunculus spp. (Ranuncolo), Rapistrum rugosum (Miagro peloso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus spp. (Crespino) e Xanthium spp. (Nappola).*
EPOCA DI IMPIEGO: post-emergenza della coltura e delle infestanti.

DOSE D'IMPIEGO:
Mais: 50 - 60 g/ha addizionato con bagnante TREND allo 0,2-0,3% su colture allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie. La dose minore e' consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi di sviluppo; la dose maggiore e' consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali gia' sviluppate e Digitaria. Nei terreni torbosi o contro infestanti a nascita scalare (Abutilon theophrasti, Ciperacee, Digitaria spp., ecc.) e in genere contro infestanti perennanti puo' essere utile un trattamento con 40-50 g/ha seguito, circa due settimane dopo, da un secondo intervento con 30 g/ha. Eventuali sarchiature alla coltura trattata devono essere effettuate in presenza di infestanti perenni non prima di 8-10 giorni dal trattamento. Non applicare WONDER 25 sulla coltura precedentemente trattata con Forate, Terbufos, Isofenfos, Paration. In presenza di Chenopodium spp. (Farinello), Datura stramonium (Stramonio comune), Polygonum spp. (Correggiola) e Solanum nigrum (Erba morella) e' consigliata la miscela con un prodotto ad attivita' specifica.
Pomodoro: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Trend allo 0,2% a partire dallo stadio cotiledonare su coltura seminata e dopo il superamento della crisi di trapianto su coltura trapiantata. In presenza Solanum nigrum applicare 50 g/ha di WONDER 25 + Trend 0,2%, entro e non oltre lo stadio cotiledonare dell'infestante, ripetendo il trattamento dopo 7-10 giorni. In presenza di Chenopodium spp. (Farinello), Polygonum spp. (Correggiola) e Portulaca oleracea (erba porcellana) e' opportuna la miscela con "Mesozin DF" alla dose di 200-500 g/ha. Tale miscela puo' essere applicata, alle dosi piu' basse di Mesozin DF, a partire dalle due foglie vere della coltura. Con infestazione predominante di Echinocloa spp. (Giavone) applicare 50-60 g/ha di WONDER 25 + bagnante Trend 0,2%, effettuando, in caso di reinfestazioni successive, un secondo trattamento con 30 g/ha di WONDER 25 + bagnante Trend 0,2% a distanza di 7-10 giorni.
Patata: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Trend 0,2% quando la coltura ha un'altezza media di 10-20 cm. In caso di reinfestazioni successive il trattamento puo' essere ripetuto utilizzando 30 g/ha di WONDER 25 + bagnante Trend 0,2%.
VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha.
Utilizzare ugelli a ventaglio e medie-basse pressioni di esercizio.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
WONDER 25, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante Trend nella quantita' necessaria dopo aver inserito WONDER 25.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C.
-Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare WONDER 25. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
- Subito dopo il trattamento con WONDER 25 e' importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:
- applicazioni su nuove varieta'
- applicazioni in miscela o in sequenza con nuovi prodotti fitosanitari.
Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.
In caso di necessita' di risemina nei terreni gia' precedentemente trattati con WONDER 25, ricorrere solo a mais, pomodoro e patata. Trascorsi 90 giorni dall'ultima applicazione di WONDER 25 non vi e' limitazione alcuna per le colture in rotazione.
Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione possono compromettere l'attivita' erbicida.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITA': Non miscelare WONDER 25 con prodotti contenenti bentazone, 2-4D, cyanazina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.
FITOTOSSICITA': Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsiglia l'impiego di WONDER 25 su mais dolce, mais bianco, mais vitreo, mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme. Non applicare su colture di patate destinate alla produzione di tuberi da "seme".
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta del pomodoro e della patata ed 80 giorni prima della raccolta del mais.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Contenuto netto: 50 g **PARTITA N.**
®Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & Co., Inc

Altra officina autorizzata:
E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) - Manati, Portorico
Altre taglie autorizzate: g 100 – 110 - 200 – 500

FOGLIO ILLUSTRATIVO

WONDER® 25

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per mais, patata e pomodoro. Granuli idrodispersibili

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron p.a. puro g 25
Coformulanti q. b. a 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21).

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. **Terapia: sintomatica. CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118**

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione N. 8191 del 16.03.1993 del Ministero della Sanità

CARATTERISTICHE D'AZIONE
WONDER 25 e' un erbicida solfonilureico che blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 10 giorni dall'applicazione. WONDER 25, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiche' WONDER 25 non ha attivita' residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Infestanti graminacee sensibili: *Avena spp. (Avena selvatica), Digitaria spp. (Sanguinella), Echinochloa spp. (Giavone), Panicum dichotomiflorum (Panico delle risaie), Panicum miliaceum (Panico coltivato), Phalaris spp. (Scagliola), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum bicolor e Sorghum halepense da seme e da rizoma (Sorghetta).*
Infestanti a foglia larga sensibili: *Abutilon theophrasti (Cencio molle), Amaranthus spp. (Amaranto), Ambrosia spp. (Ambrosia), Ammi majus (Visnaga maggiore), Bidens bipinnata (Forbicine), Capsella bursa-pastoris (Borsapastore), Convolvulus arvensis (Vilucchio), Calystegia sepium (Vilucchio bianco), Diplotaxis spp. (Rucola violacea), Fumaria officinalis (Fumaria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Helianthus tuberosus (Topinanbur), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Mentha arvensis (Menta campestre), Picris echioides (Aspraggine comune), Ranunculus spp. (Ranuncolo), Rapistrum rugosum (Miagro peloso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus spp. (Crespino) e Xanthium spp. (Nappola).*
EPOCA DI IMPIEGO: post-emergenza della coltura e delle infestanti.

DOSE D'IMPIEGO:
Mais: 50 - 60 g/ha addizionato con bagnante TREND allo 0,2-0,3% su colture allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie. La dose minore e' consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi di sviluppo; la dose maggiore e' consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali gia' sviluppate e Digitaria. Nei terreni torbosi o contro infestanti a nascita scalare (Abutilon theophrasti, Ciperacee, Digitaria spp., ecc.) e in genere contro infestanti perennanti puo' essere utile un trattamento con 40-50 g/ha seguito, circa due settimane dopo, da un secondo intervento con 30 g/ha. Eventuali sarchiature alla coltura trattata devono essere effettuate in presenza di infestanti perenni non prima di 8-10 giorni dal trattamento. Non applicare WONDER 25 sulla coltura precedentemente trattata con Forate, Terbufos, Isofenfos, Paration. In presenza di Chenopodium spp. (Farinello), Datura stramonium (Stramonio comune), Polygonum spp. (Correggiola) e Solanum nigrum (Erba morella) e' consigliata la miscela con un prodotto ad attivita' specifica.
Pomodoro: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Trend allo 0,2% a partire dallo stadio cotiledonare su coltura seminata e dopo il superamento della crisi di trapianto su coltura trapiantata. In presenza Solanum nigrum applicare 50 g/ha di WONDER 25 + Trend 0,2%, entro e non oltre lo stadio cotiledonare dell'infestante, ripetendo il trattamento dopo 7-10 giorni. In presenza di Chenopodium spp. (Farinello), Polygonum spp. (Correggiola) e Portulaca oleracea (erba porcellana) e' opportuna la miscela con "Mesozin DF" alla dose di 200-500 g/ha. Tale miscela puo' essere applicata, alle dosi piu' basse di Mesozin DF, a partire dalle due foglie vere della coltura. Con infestazione predominante di Echinocloa spp. (Giavone) applicare 50-60 g/ha di WONDER 25 + bagnante Trend 0,2%, effettuando, in caso di reinfestazioni successive, un secondo trattamento con 30 g/ha di WONDER 25 + bagnante Trend 0,2% a distanza di 7-10 giorni.
Patata: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Trend 0,2% quando la coltura ha un'altezza media di 10-20 cm. In caso di reinfestazioni successive il trattamento puo' essere ripetuto utilizzando 30 g/ha di WONDER 25 + bagnante Trend 0,2%.
VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha.
Utilizzare ugelli a ventaglio e medie-basse pressioni di esercizio.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
WONDER 25, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante Trend nella quantita' necessaria dopo aver inserito WONDER 25.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C.
-Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare WONDER 25. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
- Subito dopo il trattamento con WONDER 25 e' importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:
- applicazioni su nuove varieta'
- applicazioni in miscela o in sequenza con nuovi prodotti fitosanitari.
Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.
In caso di necessita' di risemina nei terreni gia' precedentemente trattati con WONDER 25, ricorrere solo a mais, pomodoro e patata. Trascorsi 90 giorni dall'ultima applicazione di WONDER 25 non vi e' limitazione alcuna per le colture in rotazione.
Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione possono compromettere l'attivita' erbicida.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITA': Non miscelare WONDER 25 con prodotti contenenti bentazone, 2-4D, cyanazina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.
FITOTOSSICITA': Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsiglia l'impiego di WONDER 25 su mais dolce, mais bianco, mais vitreo, mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme. Non applicare su colture di patate destinate alla produzione di tuberi da "seme".
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta del pomodoro e della patata ed 80 giorni prima della raccolta del mais.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Contenuto netto: 50 g **PARTITA N.**

®Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & Co., Inc

Altra officina autorizzata:
E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) - Manati, Portorico
Altre taglie autorizzate: g 100 – 110 - 200 – 500

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

WONDER® 25

Erbicida solfonilureico di post-emergenza
selettivo per mais, patata e pomodoro.
Granuli idrodispersibili

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron p.a. puro g 25
Coformulanti q. b. a 100

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione N. 8191 del 16.03.1993 del Ministero della Sanità

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21)
NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

Contenuto netto: 50 g **PARTITA N.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altre officine autorizzate:
E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) - Manati, Portorico
Altre taglie autorizzate:
g 100 – 110 - 200 - 500

WONDER® 25

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per mais, patata e pomodoro. Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron p.a. puro g 25
Coformulanti q. b. a 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21).
NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. **Terapia: sintomatica.**
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione N. 8191 del 16.03.1993 del Ministero della Sanità

CARATTERISTICHE D'AZIONE
WONDER 25 e' un erbicida solfonilureico che blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 10 giorni dall'applicazione. WONDER 25, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiche' WONDER 25 non ha attivita' residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Infestanti graminacee sensibili: *Avena spp. (Avena selvatica), Digitaria spp. (Sanguinella), Echinochloa spp. (Giavone), Panicum dichotomiflorum (Panico delle risaie), Panicum miliaceum (Panico coltivato), Phalaris spp. (Scagliola), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum bicolor e Sorghum halepense da seme e da rizoma (Sorghetta).*
Infestanti a foglia larga sensibili: ***Abutilon theophrasti (Cencio molle), Amaranthus spp. (Amaranto), Ambrosia spp. (Ambrosia), Ammi majus (Visnaga maggiore), Bidens bipinnata (Forbicine), Capsella bursa-pastoris (Borsapastore), Convolvulus arvensis (Vilucchio), Calystegia sepium (Vilucchio bianco), Diplotaxis spp. (Rucola violacea), Fumaria officinalis (Fumaria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Helianthus tuberosus (Topinanbur), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Mentha arvensis (Menta campestre), Picris echioides (Aspraggine comune), Ranunculus spp. (Ranuncolo), Rapistrum rugosum (Miagro peloso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus spp. (Crespino) e Xanthium spp. (Nappola***

EPOCA DI IMPIEGO: post-emergenza della coltura e delle infestanti.

DOSE D'IMPIEGO:
Mais: 50 - 60 g/ha addizionato con bagnante TREND allo 0,2-0,3% su colture allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie. La dose minore e' consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi di sviluppo; la dose maggiore e' consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali gia' sviluppate e Digitaria. Nei terreni torbosi o contro infestanti a nascita scalare (Abutilon theophrasti, Ciperacee, Digitaria spp., ecc.) e in genere contro infestanti perennanti puo' essere utile un trattamento con 40-50 g/ha seguito, circa due settimane dopo, da un secondo intervento con 30 g/ha. Eventuali sarchiature alla coltura trattata devono essere effettuate in presenza di infestanti perenni non prima di 8-10 giorni dal trattamento. Non applicare WONDER 25 sulla coltura precedentemente trattata con Forate, Terbufos, Isofenfos, Paration. In presenza di Chenopodium spp. (Farinello), Datura stramonium (Stramonio comune), Polygonum spp. (Correggiola) e Solanum nigrum (Erba morella) e' consigliata la miscela con un prodotto ad attivita' specifica.
Pomodoro: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Trend allo 0,2% a partire dallo stadio cotiledonare su coltura seminata e dopo il superamento della crisi di trapianto su coltura trapiantata. In presenza Solanum nigrum applicare 50 g/ha di WONDER 25 + Trend 0,2%, entro e non oltre lo stadio cotiledonare dell'infestante, ripetendo il trattamento dopo 7-10 giorni. In presenza di Chenopodium spp. (Farinello), Polygonum spp. (Correggiola) e Portulaca oleracea (erba porcellana) e' opportuna la miscela con "Mesozin DF" alla dose di 200-500 g/ha. Tale miscela puo' essere applicata, alle dosi piu' basse di Mesozin DF, a partire dalle due foglie vere della coltura. Con infestazione predominante di Echinoclоa spp. (Giavone) applicare 50-60 g/ha di WONDER 25 + bagnante Trend 0,2%, effettuando, in caso di reinfestazioni successive, un secondo trattamento con 30 g/ha di WONDER 25 + bagnante Trend 0,2% a distanza di 7-10 giorni.
Patata: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Trend 0,2% quando la coltura ha un'altezza media di 10-20 cm. In caso di reinfestazioni successive il trattamento puo' essere ripetuto utilizzando 30 g/ha di WONDER 25 + bagnante Trend 0,2%.
VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha.
Utilizzare ugelli a ventaglio e medie-basse pressioni di esercizio.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
WONDER 25, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante Trend nella quantita' necessaria dopo aver inserito WONDER 25.
AVVERTENZE AGRONOMICHE:
- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C.
-Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare WONDER 25. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
- Subito dopo il trattamento con WONDER 25 e' importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:
- applicazioni su nuove varieta'
- applicazioni in miscela o in sequenza con nuovi prodotti fitosanitari.
Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.
In caso di necessita' di risemina nei terreni gia' precedentemente trattati con WONDER 25, ricorrere solo a mais, pomodoro e patata. Trascorsi 90 giorni dall'ultima applicazione di WONDER 25 non vi e' limitazione alcuna per le colture in rotazione.
Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione possono compromettere l'attivita' erbicida.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA
COMPATIBILITA': Non miscelare WONDER 25 con prodotti contenenti bentazone, 2-4D, cyanazina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.
FITOTOSSICITA': Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsiglia l'impiego di WONDER 25 su mais dolce, mais bianco, mais vitreo, mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme. Non applicare su colture di patate destinate alla produzione di tuberi da "seme".
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta del pomodoro e della patata ed 80 giorni prima della raccolta del mais.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Contenuto netto: 50 g
(contiene 1 sacchetto da g 50) **PARTITA N.**
®Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & Co., Inc

Altre taglie autorizzate:
g 50 (5 sacchetti da g10)
g 100 (2 sacchetti da g 50)
g 100 (5 sacchetti da g 20)

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

WONDER® 25

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo
per mais, patata e pomodoro.
Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron p.a. puro g 25
Coformulanti q. b. a 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21)

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 8191 del 16.03.1993 del Ministero della Sanità

Contenuto del sacchetto: 10 g PARTITA N.

AVVERTENZA: Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

Altre taglie autorizzate: g 20 – 50

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1. Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua
2. Assicurarsi di avere le mani asciutte
3. Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo
4. Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte
5. Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)
6. Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni soprariportate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

BAYER CROPSCIENCE S.r.l.

R6 Erresei® M 50

Antiperonosporico indicato nel periodo attorno alla fioritura della vite.
Si impiega inoltre contro la Ticchiolatura delle pomacee, le malattie del pomodoro e del garofano di seguito indicate
Polvere bagnabile

R6 Erresei® M 50

Composizione :

Mancozeb 50 g
Coformulanti q.b. a 100 g

Frasi di Rischio:

Irritante per le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di Prudenza :

Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

IRRITANTE

Titolare dell'Autorizzazione:

Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Registrazione del Ministero della Sanità n. 0403 del 20/11/1971

Officine di Produzione:

Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
AgriFormula S.r.l., Paganica (AQ)
Bayer CropScience France - Villefranche - Francia
SBM Formulation – St. Marcel – Marsiglia – (Francia)
Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)

Contenuto netto : 200 - 500 g / 1 - 5 - 10 - 15 – 25 Kg

Partita n.

Norme precauzionali

Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B.-Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica.
Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni**

MODALITA' DI IMPIEGO

Viticoltura: g 300-400 per 100 litri d'acqua contro Peronospora, come preventivo nel periodo attorno alla fioritura, contro Antracnosi e Marciume nero. Contro Escoriosi g 500 per 100 litri d'acqua. Effettuare due trattamenti: il primo nella fase di "gemma mossa" (fase D Baggiolini) ed il secondo nella fase di "foglie formate" (fase E Baggiolini).
Melo e pero: g 300-400 per 100 litri d'acqua contro Ticchiolatura.
Pomodoro solo alla prima fioritura: g 300-400 per 100 litri d'acqua contro Peronospora, Alternariosi, Septoriosi solo fino alla prima fioritura.
Garofano (in pieno campo): g 250-300 per 100 litri d'acqua contro Ruggine.

Per la preparazione della poltiglia, formare una pasta semiliquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua, indi versare nella irroratrice e portare a volume.

Dove è d'uso o si rende necessario il trattamento polverulento con e senza zolfi, si consiglia l'impiego di kg. 4-4,5 di prodotto per ettaro.

Non impiegare in serra

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con i nostri insetticidi, acaricidi e fungicidi e gli zolfi in polvere.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Bayer CropScience

® Marchio registrato DPD 30.06.05

Mocap®

Nematocida - Insetticida granulare per il terreno destinato a colture floreali, ornamentali, ortaggi, tabacco, agrumi

Mocap®

Composizione :

Etoprofos g 10
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio:
Tossico per inalazione e contatto con la pelle. Nocivo per ingestione.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta).
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 MILANO Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione :
Bayer CropScience France - Villefranche – Francia
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Registrazione n. 0449 Ministero della Sanità del 20/11/1971

Contenuto netto: g 500; Kg 1 - 5 - 10 - 15 - 25
Partita n.: *

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari.
Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione.
Somministrare subito la pralidossima. **Consultare un Centro Antiveleni**

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto possiede attività nematocida ed insetticida per contatto senza azione fumigante o sistemica e quindi va usato alle seguenti dosi per mq. di superficie e secondo le seguenti indicazioni :

- TERRENO DESTINATO A COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI:
distribuire prima dell'impianto della coltura una dose di 8-12 g/mq incorporandolo al terreno e facendo seguire un'irrigazione dopo l'impianto delle colture.

- TERRENO DESTINATO AD ORTAGGI (cavolfiore, cavolo cappuccio, carciofo, asparago, lattughe e simili, rucola, spinacio, cocomero, melone, zucchino, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, fagiolo, pisello, fagiolino, ravanello, cipolla, aglio, porro, patata): impiegare una dose di 6-10 g/mq per impieghi su tutta la superficie e riducendo proporzionalmente la dose per impieghi localizzati nel solco di trapianto. Solo per la lotta contro gli insetti del terreno si può usare una dose di 3-4 g/mq per trattamenti su tutta la superficie.
Incorporare sempre il prodotto al terreno almeno una settimana prima dell'impianto delle colture per applicazioni contro gli insetti del terreno.
Per la lotta contro nematodi incorporare sino a 15 cm di profondità; per la lotta solo contro insetti del terreno incorporare solo a 5-7,5 cm di profondità. Far sempre seguire un'irrigazione all'impianto della coltura.

- TABACCO:
impiegare a strisce larghe 40-50 cm usando una dose di 6 g per metro lineare di striscia oppure usare una dose di 10 g/mq per impiego su tutta la superficie, incorporando alla profondità di 15 cm prima del trapianto e facendo seguire al trapianto un'irrigazione.

- AGRUMI:
per la lotta contro i nematodi il prodotto si può usare alla dose di 20-30 g/mq di superficie e incorporando a 15 cm di profondità e facendo seguire un'irrigazione di 4-5 mm di acqua.

COMPATIBILITA'
Non compatibile con sostanze alcaline. Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITA'
A causa del numero particolarmente elevato di varietà e specie floreali, ornamentali, aventi eventuale diversa sensibilità, si consiglia di effettuare una prova su limitata superficie, prima di passare ad applicazioni su larga scala.

NOCIVITA'
Il prodotto é tossico per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti:
90 giorni prima del raccolto sulla patata
30 giorni prima del raccolto sulle altre colture

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso é pericoloso.
Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

HEDONAL® S

DISERBANTE ORMONICO SELETTIVO PER LA LOTTA CONTRO LE ERBE INFESTANTI DI RISO, GRANO, ORZO, SEGALE, AVENA E CONTRO LE INFESTANTI A FOGLIA LARGA IN MELO E VIGNETI

HEDONAL® S

100 g di Hedonal S contengono:
25 g di MCPA puro (da sale sodico-potassico) (= 280 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: BAYER CropScience AG – Dormagen (Germania)
BAYER CropScience S.r.l. -Filago (BG)
AGROLINZ AGRARCHEMIKALIEN GHES. m.b.h. - Linz/Donau (Austria)
AKZO BEDRISVEN BOTLEK - ROTTERDAM (Olanda)
A.H. MARK 6 CO. Ltd. - WYKE BRADFORD - (GB)
Torre S.r.l. Montalcino - Torrenieri (SI)
BAYER CropScience Hellas SA , Ypaton Theben (Grecia)
DIACHEM: UNITÀ' PRODUTTIVA SIFA - Caravaggio (BG)
IRCA Service S.r.l. – Fornovo S. Giovanni (BG)
Registrazione Ministero Sanità n. 0741 del 29.09.1972
Contenuto netto: l 1 - 5 – 10
Partita n°:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni all SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Modo di impiego:
Riso: contro *Alisma plantago* (cuciara), *Scirpus mucronatus* (beck de sgnepa), *Cyperus difformis*, *Heleocharis sp.* (puretta): 1-1,5 l per ettaro diluiti in 250-400 litri di acqua a seconda del tipo di pompa.
Il trattamento deve essere eseguito nel periodo compreso tra l'emissione della 5ª foglia e l'inizio dell'accestimento; nel caso si debba effettuare il diserbo dopo l'inizio dell'accestimento (comunque sempre prima della fase di "botticella") occorre elevare la dose a 2-3 l per ettaro.
Grano, segale, orzo e avena: contro *Vicia sp.* (veccia), *Centaurea cyanus* (fiordaliso), *Papavers sp.* (papavero), *Chenopodium album* (farinaccio), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Ranunculus sp.* (ranuncolo), *Fumaria officinalis* (fumaria), *Cirsium sp.* (stoppione), *Convolvolus arvensis* (convolvolo), *Capsella bursa pastoris* (borsa del pastore), *Urtica sp.* (ortica), *Sinapis arvensis* (senape selvatica): 2-3,3 l per ettaro diluiti in 250-400 litri di acqua a seconda del tipo di pompa.
Il trattamento deve essere eseguito dopo l'inizio della "levata" (e precisamente a partire dal periodo in cui il culmo del cereale presenta già 5 foglie), e prima della fase di "botticella".
Melo e vigneti: contro il convolvolo ed altre infestanti a foglia larga: 3 l per ettaro diluiti in 1000 litri di acqua; contro l'equiseto: 5 l per ettaro diluiti in 1000 litri di acqua.
Il trattamento si esegue in primavera, quando le infestanti sono giovani.
N.B.: Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Compatibilità: l'Hedonal S è miscibile con altri prodotti ormonici e anche con Tribunil per ampliare lo spettro di azione contro le malerbe.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: la temperatura, al momento del diserbo, non deve essere inferiore ai 12°C o superiore ai 30°C. La dose minima si impiega quando le infestanti sono giovani e si aumenta gradatamente in base allo stadio di sviluppo delle infestanti .
Eseguire il trattamento con Hedonal S preferibilmente in giornate senza vento, avendo cura di distribuire uniformemente su tutta la superficie da trattare.
Evitare che la soluzione giunga a contatto delle colture di ortaggi e di fiori, delle foglie di viti e fruttiferi . A lavoro ultimato lavare accuratamente con acqua bollente e soda le pompe ed i recipienti usati per la preparazione della soluzione e, quindi, risciacquarli ripetutamente con acqua. In genere è consigliabile di non usare per i trattamenti con Hedonal S, le pompe ed i recipienti (soprattutto quelli di legno) destinati ai trattamenti alle piante da frutto ed alle viti.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Conservare al riparo dal gelo.

BAYER Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

TAMARON®

INSETTICIDA
CONCENTRATO SOLUBILE

TAMARON®
COMPOSIZIONE:
100 g di Tamaron contengono :
19,5 g di metamidofos puro (=228,2 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo a contatto con la pelle. Tossico per inalazione ed ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: Bayer CropScience AG-Dormagen (Germania); Bayer CropScience S.r.l.-Filago (BG)
Registrazione Ministero della Sanità n. 0813 del 14.02.72
Contenuto netto: l **1-10**
Partita n.:

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Pomacee: effettuare 1 - 2 trattamenti alla dose di 0,18% utilizzando 1200 l di acqua/ha, contro afidi, larve in stadio di avanzato sviluppo di Cacoecia (Archips) podana e Capua reticulana.
Drupacee (albicocco, pesco, susino): 0,15-0,25% contro afidi, cidia e anarsia. Per albicocco e pesco effettuare 1-2 trattamenti alla dose di 0,22%, utilizzando 1000 litri di acqua/ha.
Bieticoltura: 1,75-2,5 l/ha contro altica, cleono, afidi e nottue.
Pataticoltura: 2,5 l/ha contro afidi e dorifora.
Maiscoltura: 0,375-0,5% impiegando 700-800 litri di acqua per ettaro contro la piralide.
Floricoltura in pieno campo ed in serra: 0,2-0,25% contro tortricidi, minatrici, afidi, tripidi e aleurodidi.

N.B. - Il prodotto presenta una buona azione collaterale contro gli acari.

COMPATIBILITÀ: il Tamaron è miscibile con i fungicidi a reazione neutra; in genere non è necessario aggiungere insetticidi o acaricidi dato il vasto campo di azione del prodotto. Limitatamente alle pomacee il Tamaron non deve essere miscelato con altri antiparassitari.
Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: su peri e meli non effettuare più di un trattamento al mese. In floricoltura, data la molteplicità di specie e varietà coltivate, è consigliabile effettuare prove preliminari su un limitato numero di piante. Non impiegare su crisantemi.
NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima del raccolto per pomacee, albicocco, pesco; 21 giorni prima del raccolto per le altre colture

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Conservare al riparo dal gelo.

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego é consentito esclusivamente al personale qualificato munito di autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23/04/2001

Bayer CropScience

® marchio registrato

SENCOR® WG

Etichetta/foglio illustrativo

DISERBANTE SELETTIVO
per patata, pomodoro, asparago, frumento, orzo, soia, erba medica e carota
MICROGRANULARE IDROSOSPENSIBILE

SENCOR® WG

COMPOSIZIONE
g 100 di Sencor WG contengono:
g 35 di metribuzin puro
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 023972.1
Registrazione Ministero della Sanità n. 0886 del 5.6.72
Officina di produzione: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania)
Officine di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); DIACHEM S.p.A. - Unita' produttiva SIFA - Caravaggio (BG); STI Solfotecnica Italiana-Cotignola (RA); S.I.P.C.A.M.-Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano S.p.A.-Salerano sul Lambro (LO); S.C.B. - Marle sur Serre (Francia)
Officine di produzione e confezionamento: S.I.P.C.A.M.-Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano S.p.A.-Salerano sul Lambro (LO); Torre S.r.l. – Montalcino – Torrenieri (SI)
Contenuto netto: 10-50-100-200-250-500-800 g; 1-3-5-10 kg
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Piante infestanti sensibili al Sencor: Amaranto *(Amaranthus spp.),* Borsa pastore comune *(Capsella bursa-pastoris)*, Centocchio dei campi *(Stellaria m.),* Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Crespino comune *(Sonchus oleraceus*), Falsa ortica *(Lamium spp.),* Farinaccio *(Chenopodium album)*, Farinello *(Chenopodium spp.),* Fienarola *(Poa annua*). Fumaria comune *(Fumaria officinalis),* Giavone (*Echinocloa crus-galli*), Pabbio *(Setaria spp.*), Papavero *(Papaver spp.),* Poligono *(Polygonum spp.),* Ravanello selvatico *(Raphanus raphanistrum),* Sanguinella *(Digitaria spp.)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis),* Spergola (*Spergula arvensis),* Veronica *(Veronica spp.).*
DOSE ED EPOCA D'IMPIEGO
Patata: a) pre-emergenza: 0,5-0,8 kg/ha in 500-700 litri di acqua, impiegando la dose minore nei terreni limosi e quella maggiore in quelli argillosi, escludendo i terreni sabbiosi.
b) post-emergenza: 0,5 - 0,6 kg/ha in 500-700 litri di acqua, riservando la dose maggiore ai terreni argillosi
N.B.: Il Sencor WG si è dimostrato perfettamente tollerato dalle seguenti varietà di patata: Admirandus, Alkmaria, Apollo, Arsy, Bea, Bintje, Cardinal, Desiree, Favorita, Humalda, Kennebec, Majestic, Monnalisa, Primura, Resy, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal.
Pomodoro: a) pre-semina e pre-trapianto: 0,5-0,6 kg/ha in 500-700 litri di acqua intervenendo 7-14 giorni prima della semina su terreno già preparato senza interrare;
b) post-emergenza e post-trapianto: 0,5-0,8 kg/ha riservando la dose maggiore ai terreni argillosi e intervenendo dopo il diradamento o dopo che le piantine hanno superato la crisi di trapianto. Al momento del trattamento le piantine devono avere almeno 8-9 foglie (pre-fioritura).
Asparago: in pre-emergenza: 1-1,2 kg/ha in 600 l di soluzione, in asparagiaie di almeno 2 anni
Frumento ed orzo: in post-emergenza (dallo stadio di due foglie a quello di fine accestimento): 0,2 kg/ha
Soia: in pre-semina o pre-emergenza: 0,5-0,7 kg/ha. Non impiegare in terreni molto sabbiosi o torbosi.

Erba medica: intervenire in autunno dopo l'ultimo sfalcio, quando la coltura è entrata in riposo vegetativo a seguito delle prime brinate: 1 kg/ha in terreni sabbiosi, 1,5 kg/ha in terreni di medio impasto ed argillosi in 500-700 litri di acqua
Carota: 0,5-0,7 kg/ha a partire dallo stadio delle tre foglie vere.

Avvertenza generale: eseguire il trattamento in giornate senza vento, avendo cura di distribuire uniformemente la soluzione su tutta la superficie da trattare, evitando sovrapposizioni e di raggiungere altre colture adiacenti. A lavoro ultimato lavare accuratamente pompe e recipienti usati per la preparazione della soluzione.

COMPATIBILITA': per alcune colture (erba medica) il prodotto può essere miscelato solamente con altri diserbanti a reazione neutra per aumentare il campo di azione contro le infestanti. L'impiego su frumento di Sencor WG in miscela con altri diserbanti di post-emergenza - quali Bi-Hedonal (2,4 D + MCPA), Grasp (tralkoxydim), Gralit (fenoxaprop-ethyl), Granstar (tribenuron-methyl), Starane (fluroxipir), Logran (triasulfuron) - permette di ampliarne lo spettro d'azione e migliorarne l'efficacia sulle infestanti sopra citate.
Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
AVVERTENZE AGRONOMICHE: non effettuare il diserbo su pomodoro in serra e sotto tunnel e nei terreni molto limosi o sabbiosi; non intervenire in pre-semina del pomodoro nei seguenti casi: a) qualora si usi un quantitativo di seme inferiore a 2,5 kg/ha in quanto la coltura risulterebbe più sensibile in caso di repentini abbassamenti di temperatura; b) nei cosiddetti "terreni bianchi" che formano la crosta al momento dell'emergenza delle piantine. Per l'intervento in post-emergenza o post-trapianto su pomodoro attenersi alle seguenti norme: a) in caso di necessità, anticipare l'irrigazione 7 giorni prima del trattamento diserbante; b) non diserbare una coltura sofferente (ad esempio per siccità, alte o basse temperature, ristagni d'acqua ecc.); c) le eventuali fresature devono essere superficiali per non danneggiare l'apparato radicale del pomodoro e devono essere eseguite 5-10 giorni prima del trattamento.
Per quanto riguarda la patata non effettuare il trattamento su Draga, Jarla e Vivax in quanto si sono dimostrate sensibili al prodotto.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto per pomodoro, frumento ed orzo; 60 giorni prima del raccolto per le altre colture

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: Da non applicare con i mezzi aerei. Non operare contro vento. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Conservare al riparo dall'umidità.

Bayer CropScience

® marchio registrato

25.11.2005

Asulox®

Erbicida per la distruzione dei Romici nei prati avvicendati e permanenti

ASULOX®

Composizione
g 100 di prodotto contengono:
g 33,22 Asulame puro (= 400 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Officine di produzione
AgriFormula S.r.l., Paganica (AQ)
Bayer CropScience LTD, Norwich - Inghilterra

Registrazione n. 0929 Ministero della Sanità del 05/06/72

Contenuto Netto : l 1 - 5 - 25
Partita n.:

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibizione della colinesterasi)
Sintomi d'intossicazione: nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
Consigli terapeutici: lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo in caso di contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente ai bambini. Controindicate le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive. Ossigenoterapia in caso di cianosi.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO
L'ASULOX é attivo su *Rumex obtusifolius, Rumex crispus* e *Rumex alpinus*. L'applicazione si può effettuare in due momenti:
1) in primavera, su romici in attiva crescita, allo stadio di "foglie in rosetta" pienamente sviluppate, prima dell'apparizione degli scapi florali;
2) all'inizio dell'autunno, su romici in buone condizioni vegetative, al massimo dello sviluppo fogliare, sempre prima dell'emissione degli scapi florali.
L'efficacia è lenta a manifestarsi, ma la penetrazione del prodotto nelle radici è rapida; di conseguenza si può effettuare un taglio una settimana dopo il trattamento.
L'eliminazione del RUMEX si ottiene mediante un trattamento annuale ripetuto per 2 o 3 anni, soprattutto nei prati fortemente infestati (Rumex impiantati da lunga data o riserve importanti di semi nel terreno).
Il trattamento va effettuato su prati in buone condizioni vegetative.
Non si consiglia l'impiego dell'ASULOX su praterie mal concimate, nè subito dopo forti gelate, né in periodi di siccità.

DOSE D'IMPIEGO
Trattamento generalizzato: 4 l per ha in un volume di poltiglia/ha da 400 a 600 l (goccioline da fini a medie).
Trattamento localizzato: da 300 a 400 ml per 100 l d'acqua.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare direttamente l'ASULOX nel serbatoio del polverizzatore colmo d'acqua, agitare per ben omogeneizzare la poltiglia e, in corso di spargimento, mantenere un'agitazione molto moderata.
Risciacquare accuratamente il polverizzatore dopo lo spargimento.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. L'Erba medica è resistente a qualsiasi stadio.
I Trifogli e la *Dactylis glomerata* sono in qualche caso leggermente frenati nel loro sviluppo, ma ricacciano normalmente dopo il taglio.
Evitare di trattare le colture vicine.

NOCIVITÀ
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del taglio del prato o dell'immissione del bestiame al pascolo.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® Marchio registrato

FARVEL® 25

Erbicida per il diserbo di actinidia, aglio, albicocco, arancio, asparago, carciofo, cavolfiore, cicoria, clementino, finocchio, garofano, girasole, indivia, lattuga, limone, mandarino, melanzana, melo, nocciolo, olivo, peperone, pero, pesco, pioppo, pomodoro, riso, soia, susino, tabacco, vite, vivai di fruttiferi e pioppo.

Concentrato emulsionabile (EC)

FARVEL® 25

COMPOSIZIONE

100 g di Farvel 25 contengono:
25,4 g di oxadiazon puro (250 g/l)
coformulanti quanto basta a 100
Contiene nafta solvente (petrolio) aromatica pesante

FRASI DI RISCHIO:

Infiammabile. Irritante per gli occhi e la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130, 20156 Milano – Tel.02-3972.1

Officine di produzione: Bayer CropScience France – Villefranche – Francia;
Bayer CropScience GmbH – Francoforte s/Meno (Germania); Agriformula S.r.l. – Paganica (AQ);
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG); TORRE S.r.l.– Torrenieri (SI) – ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 0937 del 28.06.1973

Distribuito da: ISAGRO Italia S.p.A. – Via Caldera, 21 – 20153 MILANO
Contenuto netto : 250 ml - 1 – 5 – 10 l

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

SPETTRO D'AZIONE

INFESTANTI SENSIBILI: Acetosella (*Oxalis* spp.), Alisma (*Alisma plantago*), Amaranto (*Amaranthus* spp.), Atriplice maggiore (*Atriplex patula*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Giunco fiorito (*Butomus umbellatus*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Erba calderina (*Senecio vulgaris*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Eterantera (*Heteranthera* spp.), Euforbia (*Euphorbia* spp.), Falso panico (*Setaria viridis*), Farinaccio selvatico (*Chenopodium album*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*), Giavoni (*Echinochloa spp.*), Mercorella (*Mercurialis annua*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Poa (*Poa pratensis*), Poligoni (*Polygonum* spp.), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Romice (*Rumex* spp.), Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), Scirpus (*Scirpus* spp.), Senape (*Sinapis arvensis*), Veronica (*Veronica* spp.), Vilucchio (*Convolvulus arvensis)*.

INFESTANTI MEDIAMENTE RESISTENTI: Avena selvatica (*Avena spp.*), Attaccamani (*Galium aparine*), Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Falsa gramigna (*Agropyrum repens*), Fienarola (*Poa Annua*), Forbicina (*Bidens tripartita*), Lappa (*Xanthium italicum*), Loglio (*Lolium* spp.)

INFESTANTI RESISTENTI: Assenzio selvatico (*Artemisia vulgaris*), Carice (*Carex* spp.), Centocchio (*Stellaria media*), Cipero (*Cyperus rotundus*), Gittaione (*Agrostemma githago*), Gramigna comune (*Cynodon dactylon*), Soffione (*Taraxacum officinale*), Sorghetta (*Sorghum halepense*), Stoppione (*Cirsium arvense*).

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

RISO

Contro Heteranthera 1 - 2 l/ha in funzione della pressione di infestazione, attenendosi al dosaggio più elevato nei terreni di medio impasto.
Il trattamento è in grado di contenere emergenze precoci di Giavone, Alisma da seme, Ciperacee e Giunco fiorito da seme. Il prodotto va applicato in pre-semina del riso sia su risaie ancora asciutte perfettamente livellate, prima dell'immissione di acqua oppure su risaia allagata, dopo la slottatura e con livello di acqua normale (10-12 cm). Dopo l'applicazione lasciare sedimentare per circa 48 ore le particelle limose prima di procedere alle semine. Evitare le semine in presenza di acque torbide. Nelle prime fasi vegetative del riso si consiglia di mantenere nelle camere un livello di acqua moderato (max. 10-12 cm).
FARVEL 25 è selettivo anche su riso coltivato in asciutta; in tal caso il trattamento va effettuato subito dopo la semina, in pre-emergenza della coltura e delle infestanti alla dose di 2-3 l/ha.

GIRASOLE E SOIA

Contro infestanti graminacee e dicotiledoni annuali (esclusa *Stellaria* spp.) 2,5 l/ha, in pre-emergenza della coltura e delle infestanti.
Il trattamento può causare ingiallimenti passeggeri della coltura appena emersa che però non influiscono sulla produzione. Se non piove effettuare una irrigazione dopo 10-12 giorni dal trattamento. Operare a bassa pressione massimo 2-3 atm. Dopo il trattamento non lavorare il terreno.

GAROFANO

2,5-3 l/ha in pre-emergenza delle avventizie, 5-8 giorni dopo la messa a dimora delle talee o dopo una sarchiatura manuale.

AGLIO

1,5 - 3 l/ha in pre-emergenza della coltura e delle infestanti.

COLTURE TRAPIANTATE
carciofo, cavolfiore, cicoria, finocchio, indivia, lattuga, melanzana, peperone, pomodoro, tabacco:
1,5 - 3 l/ha, intervenendo prima del trapianto della coltura, in pre-emergenza delle infestanti.

POST-IMPIANTO:
Asparago, intervenire dopo aver effettuato la rincalzatura, con completa copertura delle zampe. Su asparagiaia, per la lotta contro il Vilucchio (*C. arvensis e C. sepium*) intervenire prima dell'emergenza dei turioni o dopo la totale raccolta degli stessi a 8 - 10 l/ha.
Carciofo: su carciofaia per la lotta contro l'acetosella (*Oxalis* spp.), intervenire a 8 - 10 l/ha in pre-emergenza dell'infestante, evitando di bagnare la vegetazione della coltura.
ACTINIDIA, ALBICOCCO, ARANCIO, CLEMENTINO, LIMONE, MANDARINI, MELO, NOCCIOLO, OLIVO, PERO, PESCO, PIOPPO, SUSINO, VITE

– **vivai**: 8-10 l/ha, intervenendo dopo la messa a dimora e prima della ripresa vegetativa. Non trattare vivai di vite, piante madri o barbatelle appena messe a dimora.

– **Impianti in produzione**: 4 l/ha (infestanti annuali) - 8 l/ha (convolvolo). Su vite intervenire solo su impianti in produzione e con vegetazione sollevata dal terreno.

Su piante a foglia caduca eseguire il trattamento a fine inverno, prima del risveglio vegetativo. Su tutte le colture sopraindicate, evitare di colpire la vegetazione eventualmente presente o parti non lignificate. Dopo il trattamento lavorare il terreno, in caso di siccità praticare un'irrigazione entro 10-12 giorni dall'applicazione. Operare a bassa pressione (1-3 bar) impiegando almeno 300 litri di acqua per ettaro

COMPATIBILITÀ
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
In caso di piogge battenti dopo il trattamento, la vegetazione delle giovani colture può venire colpita da particelle di terreno che hanno adsorbito il prodotto con conseguenti leggere ustioni.
Su lattuga piogge battenti o irrigazioni di forte intensità possono provocare ustioni alle foglie basali e conseguenti ritardi sul ciclo vegetativo. Si consiglia pertanto di evitare l'impiego del prodotto su varietà ad apparato fogliare prostrato a terra e di effettuare saggi di selettività varietale; non impiegare su colture protette nè superare la dose di l 1,5/ha.
Su asparago, in caso di ristagno idrico e con emergenze della coltura rallentata da basse temperature, i turioni possono presentare leggere incurvature apicali. Su terreni con ristagni d'acqua e con basse temperature che rallentano le emergenze della soia possono manifestarsi fallanze nella stessa. Su vivai non intervenire su piante non sufficientemente lignificate. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® Marchio registrato di ISAGRO S.p.A.

DPD 30.06.05/a

RONSTAR® GRANULARE

Diserbante per combattere Heterantera in risaia, infestanti annuali nei vivai e nelle piantagioni delle colture sottocitate

RONSTAR® GRANULARE

COMPOSIZIONE

g 100 di prodotto contengono:
g 2 Oxadiazon puro
coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 023972.1
Officine di produzione:
AgriFormula S.r.l., Paganica (AQ)
Bayer CropScience France, Villefranche - Francia

Reg. n. 0940 del 18/01/73 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: Kg 1, 5, 10 , 20
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Consultare un Centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto ha una persistenza che é in funzione della dose d'impiego, della natura ed umidità del terreno e, in generale, delle condizioni climatiche ed ambientali.

INFESTANTI SENSIBILI

Acetosella (*Oxalis* spp.), Alisma (*Alisma plantago*), Amaranto (*Amaranthus* spp.), Atriplice maggiore (*Atriplex patula*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Giunco fiorito (*Butomus umbellatus*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Erba calderina (*Senecio vulgaris*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Eterantera (*Heteranthera* spp.), Euforbia (*Euphorbia* spp.), Falso panico (*Setaria viridis*), Farinaccio selvatico (*Chenopodium album*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*), Giavoni (*Echinochloa* spp.), Mercorella (*Mercurialis annua)*, Papavero (*Papaver rhoeas*), Poa (*Poa pratensis*), Poligoni (*Polygonum* spp.), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Romice (*Rumex* spp.), Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), Scirpus (*Scirpus* spp.), Senape (*Sinapis arvensis*), Veronica (*Veronica* spp.), Vilucchio (*Convolvolus arvensis*).

INFESTANTI MEDIAMENTE RESISTENTI

Avena selvatica (*Avena* spp.), Attaccamani (*Galium aparine*), Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Falsa gramigna (*Agropyrum repens*), Fienarola (*Poa annua*), Forbicina (*Bidens tripartita*), Lappa (*Xanthium italicum*), Loglio (*Lolium* spp.).

INFESTANTI RESISTENTI

Assenzio selvatico (*Artemisia vulgaris*), Carice (*Carex* spp.), Centocchio (*Stellaria media*), Cipero (*Cyperus rotundus*), Gittaione (*Agrostemma gitago*), Gramigna comune (*Cynodon dactylon*), Soffione (*Taraxacum officinale*), Sorghetta (*Sorghum halepense*), Stoppione (*Cirsium arvense*).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

RISAIA:

terreni di medio impasto: Kg 25/ha - terreni argillosi: Kg 20/ha
Distribuire il prodotto 7 giorni prima della semina del riso, dopo la slottatura e con livello d'acqua normale.
In terreni "laserati" o perfettamente livellati il trattamento può essere eseguito anche 2-3 giorni prima della semina in acqua limpida. Dopo la distribuzione del prodotto, mantenere il livello dell'acqua costante e comunque fermo per almeno 48 ore.
Immediatamente prima della semina effettuare il ricambio dell'acqua della risaia. Dopo il trattamento, qualora si rendano necessarie, si possono effettuare delle asciutte. Il prodotto esplica anche una buona attività contro Giavone, Alisma e Ciperacee.

ACTINIDIA:

Contro infestanti graminacee e dicotiledoni annuali (esclusa stellaria)
Dose: Kg 150/ha, in pre-emergenza delle infestanti.
Al momento del trattamento il terreno deve essere pulito, privo di infestanti, e dotato di un buon grado di umidità; la chioma delle piante deve essere asciutta. Dopo il trattamento non lavorare il terreno.
Non trattare su semenzai.

COLTURE TRAPIANTATE

asparago, carciofo, cavolfiore, melanzana, peperone, pomodoro, tabacco

Intervenire in pre o post-trapianto alla dose di 20-40 Kg/ha, prima dell'emergenza delle erbe infestanti.
Nelle applicazioni di post-trapianto si raccomanda di trattare su colture asciutte e di irrigare entro 24 ore allo scopo di rimuovere i granuli di formulato eventualmente depositatisi sulla vegetazione e per attivare il prodotto nel terreno.

GAROFANO

Intervenire dopo la messa a dimora delle talee, oppure dopo una sarchiatura manuale in pre-emergenza delle infestanti a 50 Kg/ha (infestanti annuali) - 150 Kg/ha (infestanti poliennali, Vilucchio), adattando la dose in funzione della flora infestante da combattere e della durata di efficacia programmata.

IMPIANTI DI COLTURE LEGNOSE

albicocco, pesco, melo, pero, susino, arancio, clementino, limone, mandarino, olivo, nocciolo, pioppo

Intervenire in pre-emergenza delle infestanti, prima della ripresa vegetativa delle colture alla dose di 50 Kg/ha (infestanti annuali) - 150 Kg/ha (infestanti poliennali e Vilucchio), adattando la dose in funzione della flora infestante da combattere e della durata di efficacia programmata.

VITE
Trattare solo impianti in produzione e con vegetazione sollevata rispetto al terreno.
Dosi: 50 Kg /ha (infestanti annuali) - 150 Kg/ha (Vilucchio), adattando il dosaggio in funzione della flora infestante da combattere ed intervenendo prima della ripresa vegetativa.

TAPPETI ERBOSI DI GRAMINACEE
Contro Sanguinella alla dose di 150-180 Kg/ha, in pre-emergenza delle infestanti.

VIVAI DI ALBERI, ARBUSTI E PIANTE ORNAMENTALI
(sia per piante allevate in vaso che in pieno campo): contro Sanguinella, Giavone, Erba calderina, Galinsoga, Acetosella, Erba porcellana, Amaranto alle dosi di 150-180 Kg/ha, in pre-emergenza delle infestanti.

VIVAI DI PIANTE DI PESCO, MELO E PERO, ALBICOCCO, SUSINO, ARANCIO, CLEMENTINO, MANDARINO, LIMONE, OLIVO, PIOPPO
150 Kg/ha intervenendo dopo la messa a dimora, in trattamenti di fine inverno (febbraio) ed in pre-emergenza delle infestanti.

COMPATIBILITA'
Il prodotto va impiegato da solo.
AVVERTENZE: Nel trattamento in vivai non intervenire su piante non sufficientemente lignificate. Non trattare vivai di vite, piante madri o barbatelle appena messe a dimora. Nei terreni secchi il prodotto non è attivo: in caso di siccità praticare un'irrigazione entro 10-12 giorni dalla applicazione.

NOCIVITA'
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze
Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience
® Marchio registrato

DPD 30.06.05/a

Mocap® 20 EC

Nematocida ed insetticida liquido emulsionabile per applicazione al terreno destinato a colture floreali, ornamentali, ortaggi, tabacco, agrumi, mais e in post-trapianto di pomodoro, melanzana e peperone

MOCAP® 20 EC

COMPOSIZIONE

Etoprofos puro 19 g (= 177,5 g/L)
Coformulanti q.b. a 100
Contiene: nafta solvente (petrolio) aromatica pesante

FRASI DI RISCHIO :

Infiammabile. Tossico per ingestione. Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

MOLTO TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA :

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta).
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione: AgriFormula S.r.l., Paganica (AQ); Sipcam, Salerano sul Lambro (LO); SBM Formulation - Beziers (F); Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG); Bayer CropScience France – Villefranche - Francia

Registrazione n. 1004 del 5/12/1972 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: 500 ml / 1 - 5 - 10 - 15 L

Partita n.: *

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto possiede azione nematocida ed insetticida per contatto senza azione fumigante o sistemica e quindi va usato alle seguenti dosi per mq di superficie e secondo le seguenti modalità di applicazione.

TERRENI DESTINATI A COLTURE DI MAIS:
per la lotta contro insetti terricoli impiegare il prodotto in pre-semina o in pre-emergenza, alla dose di 5-6 l/ha. Per la distribuzione impiegare le comuni irroratrici munite di barra, utilizzando 300-500 l/ha d'acqua.

TERRENI DESTINATI A COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI :
distribuire il prodotto prima dell'impianto della coltura alla dose di 4-6 ml/mq dopo averlo sciolto in acqua ed applicando 0,2-1 litro di acqua per mq di superficie da trattare. Far seguire, dopo la distribuzione e prima dell'impianto della coltura, una accurata incorporazione del prodotto al terreno sino ad una profondità di 15 cm per mezzo di una fresatura, o di una irrigazione. Far seguire all'impianto della coltura un'irrigazione. Il prodotto si può usare anche per trattamenti su colture floreali od ornamentali in atto avendo però l'avvertenza di usare una dose di 5-8 ml/mq sciolto in 5-10 litri di acqua in modo da far penetrare nel terreno l'emulsione acquosa del prodotto sino al livello delle radici. Nel caso si bagnino con l'emulsione acquosa le foglie delle colture in atto, lavare subito con acqua le foglie bagnate con il prodotto per evitare eventuali fitotossicità.

TERRENI DESTINATI A CAVOLFIORE, CAVOLO CAPPUCCIO, CARCIOFO, ASPARAGO, LATTUGHE E SIMILI, RUCOLA, SPINACIO, COCOMERO, MELONE, ZUCCHINO, CETRIOLO, POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, FAGIOLO, PISELLO, FAGIOLINO, RAVANELLO, CIPOLLA, AGLIO, PORRO:
Trattamenti in pre-semina o pre-trapianto: distribuire il prodotto alla dose di 4-5 ml/mq per impieghi su tutta la superficie, riducendo proporzionalmente la dose per impieghi localizzati nel solco di trapianto. Distribuire il prodotto miscelato con acqua alla dose di 0,2-1 litro per mq e far seguire alla distribuzione una accurata incorporazione del prodotto nel terreno sino alla profondità di 15 cm per mezzo di fresatura. Far seguire un'irrigazione all'impianto della coltura.
Trattamenti in post-trapianto su colture in atto: POMODORO, MELANZANA, PEPERONE. Contro insetti terricoli e nematodi, una volta superata la crisi di trapianto, distribuire il formulato a 10 l/ha (dose insetticida) oppure a 20 l/ha (dose nematocida) in trattamenti localizzati sulla fila con l'acqua di irrigazione mediante manichetta forata. Distribuire un quantitativo massimo di 50 l/ha di prodotto, frazionato nel corso del ciclo vegetativo delle colture indicate, mediante 3-4 applicazioni distanziate 20-30 giorni l'una dall'altra.

TABACCO :
impiegare prima dell'impianto della coltura una dose di 4-5 ml/mq sciolta in almeno 0,2-1 litri di acqua per mq facendo seguire un'accurata incorporazione nel terreno sino alla profondità di 15 cm per mezzo di una fresatura o di una erpicatura incrociata con erpice che rimescoli in modo idoneo il terreno. Far seguire all'impianto della coltura un'irrigazione. Per trattamenti localizzati sulle file del trapianto ridurre in proporzione le dosi di impiego del prodotto.

AGRUMI :
per la disinfestazione nematocida delle radici prima dell'impianto effettuare il bagno delle radici stesse per la durata di 30 minuti in una miscela acquosa del prodotto alla dose di ml 300-500 per 100 litri d'acqua secondo la minore o la maggiore infestazione di nematodi. Per la lotta contro i nematodi su colture in atto effettuare trattamenti sotto la chioma delle piante con una dose di prodotto pari a 10-15 ml/mq distribuita in circa 10 litri di acqua per mq di superficie onde farlo penetrare a livello delle radici.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non é compatibile con sostanze alcaline. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Su varietà poco note o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte prima di eseguire il trattamento su aree più vaste.
Non impiegare su ombrellifere (carota, sedano, finocchio, prezzemolo) data l'esistenza di sensibilità.

NOCIVITA'
Il prodotto é tossico per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego é consentito esclusivamente al personale qualificato munito di apposita autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 23 Aprile 2001 n.290

Bayer CropScience

® Marchio registrato DPD 30.06.05

POMARSOL® Z WG

Etichetta/foglio illustrativo

MICROGRANULARE IDROSOSPENSIBILE
FUNGICIDA ORGANICO
per trattamenti liquidi in frutticoltura, orticoltura, floricoltura ed agrumicoltura

POMARSOL® Z WG
COMPOSIZIONE
100 g di Pomarsol Z WG contengono:
81 g di ziram puro
coformulanti quanto basta a 100.
FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Molto tossico per inalazione. Irritante per le vie respiratorie. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere ne' fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: BAYER Cropscience AG – Dormagen (Germania); Taminco N.V. Gent (Belgio).
oppure:
Officina di produzione: Bayer CropScience AG –Dormagen (Germania); Taminco N.V. Gent (Belgio)
Operazioni terminali di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l.-Filago (BG); STI Solfotecnica Italiana S.p.A. -Cotignola (RA); DIACHEM S.p.A., u.p. SIFA-Caravaggio (BG)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 1066 del 9/2/73
Contenuto netto: 100-200-500 g; 1-5-10-20 kg
Partita N.

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi di impiego
Melo: contro ticchiolatura; **pero:** contro ticchiolatura, septoriosi e maculatura bruna; **pomodoro**: contro alternariosi e peronospora; **sedano, patata, cipolla, cetriolo**: contro peronospora; **pisello, fagiolo**: contro antracnosi e ruggine; **rosa**: contro ticchiolatura e peronospora; **agrumi**: contro fumaggine e marciume bruno dei frutti: 0,15-0,2 % (150-200 g in 100 l di acqua); **pesco**: contro bolla e corineo (trattamento autunnale alla caduta delle foglie, di fine inverno prima del rigonfiamento delle gemme e a bottoni rosa): 0,3-0,4 % (300-400 g in 100 l di acqua); **N.B**. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
COMPATIBILITÀ: il Pomarsol Z WG è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: solo le varietà di pero Spadona, Gentil Bianca, Gentilona, Camellina, si sono dimostrate sensibili e non devono essere trattate con Pomarsol Z WG.
NOCIVITÀ: evitare che gallinacei ed equini pascolino nei campi trattati per una settimana dopo il trattamento.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il

contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare all'asciutto.

® marchio registrato

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

BBS Procida

FUNGICIDA

POLVERE BAGNABILE tipo BORDOLESE MICRONIZZATA

BBS PROCIDA

Composizione: Rame metallico (sotto forma di solfato di rame neutralizzato nella calce) g 23, coformulanti quanto basta a 100.

Frasi di rischio:
Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 MILANO. Tel. 02/3972.1

Officine di produzione
- Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
- Industrias Quimicas del Vallés S.A. Mollet del Vallés - Barcellona - Spagna
- SBM Formulation – St. Marcel - 13367 Marsiglia - Francia
- Isagro S.p.A. - Aprilia (**LT**)
- Elf Atochem Agri S.A. - 13240 Septemes Les Vallons - Francia
- Manica S.p.A. - Rovereto (TN)

Registrazione n. 1359 del 16/11/1973 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: 1 - 5 - 10 - 25 kg

Partita N.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo, irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

BBS Procida consiste in una preparazione industriale di polvere tipo Bordolese essiccata, assolutamente neutra.
Viene impiegata alle seguenti dosi riferite a 100 litri di acqua:
-**Vite:** contro Peronospora kg 0,5 fino a kg 1 in caso di forte infezione (in trattamenti primaverili-estivi quando gli acini sono ben formati).
-**Pomacee:** (trattamento al bruno) contro cancri rameali, marciume bruno o muffa a circoli del melo, ticchiolatura del melo e del pero kg 1.
-**Drupacee:** (trattamento al bruno): contro bolla del pesco, gommosi, corineo e cancri rameali kg 0,8 - 1.
-**Olivo:** contro occhio di pavone, lebbra e fumaggine kg 0,7-1
-**Agrumi:** contro malsecco, gommosi o allupatura, fumaggine, batteriosi kg 0,5-1 per irrorazione; per spennellature al tronco ed alle grosse branche kg 3.
-**Barbabietola da zucchero:** contro Cercospora della bietola 6 kg/ha.
-**Patata e pomodoro:** contro peronospora, alternariosi, septoriosi, cladosporiosi e batteriosi kg 0,5-1.
-**Orticoltura:** contro septoriosi del sedano, della carota e del prezzemolo: peronospora e antracnosi delle cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo); peronospora del carciofo, del cardo, del cavolo (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo verza, cavolo bianco, cavolo rosso, cavolo cappuccio, cavolo cinese, cavolo di Bruxelles, cavolo rapa, cavolo nero), della cicoria, della cipolla, della melanzana e dello spinacio; antracnosi del fagiolo e del pisello, vaiolatura rossa della fragola: kg 0,5-1.
-**Riso:** per il disalgo, trattamenti preventivi di concia del seme: 1,5-2 kg/q di seme; in post-emergenza sul tappeto algoso: 4-5 kg/ha a seconda dell'intensità e dell'estensione dello strato algoso; in caso di forte attacco è opportuno elevare la dose a 8-10 kg/ha.
-**Rosa e colture floreali-ornamentali:** contro ruggine, septoria, ticchiolatura, peronospora e corineo kg 0,5-0,6.
La diluizione della poltiglia nell'acqua è facile in tutte le circostanze. Basta versare la polvere nel totale quantitativo di acqua ed agitare. BBS Procida viene distribuita mediante irroratrice a volume normale impiegando 1000 litri di acqua per ettaro. In caso di impiego di irroratrici a basso volume, le dosi prescritte saranno maggiorate in base alle caratteristiche delle macchine.

COMPATIBILITÀ

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Da evitare i trattamenti al verde per il pesco e su melo e pero quando le foglie presentano macchie fresche di ticchiolatura. Non si deve trattare durante la fioritura su pesco, susino e sulle seguenti varietà di melo: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada', Rosa Mantovana; e di pero: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.
Il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

BAYER Bayer CropScience

DPD 30.06.05

ANTRACOL®

FUNGICIDA ORGANICO
per irrorazioni su viti, pomacee, pomodoro fino alla prima fioritura, garofano, tabacco e per la concia secca e umida del riso da seme.
Polvere bagnabile

ANTRACOL®
Composizione
100 g di Antracol contengono :
70 g di propineb puro
coformulanti quanto basta a100
Contiene esametilammina: può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Registrazione Ministero della Sanità n.1613 del 29.04.74
Contenuto netto: 1-5-10 kg (solo Bayer CropScience S.r.l. Filago)
Partita n.:

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica.
Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Vite: 0,15-0,2 % contro peronospora.
Pomacee: 0,15-0,2 % contro ticchiolatura.
Pomodoro fino alla prima fioritura: 0,2 % contro alternariosi, peronospora, ticchiolatura e septoriosi.
Garofano: 0,15-0,2 % contro ruggine.
Tabacco: 0,2 % contro peronospora.
Riso: concia della semente: 200-250 g/q contro elmintosporiosi (*Drechslera oryzae*); per la concia umida diluire la dose prescritta di prodotto in acqua (da 500 a 1000 cc a seconda delle apparecchiature usate) e quindi mescolare con la semente il più uniformemente possibile.
400-500 g/q contro alghe
N.B. La semente trattata non deve essere destinata all'alimentazione umana o animale
Divieti di impiego:
- Divieto di impiego in serra
- Divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate

Compatibilità: Antracol è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicita': varietà di pere sensibili al Propineb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentilbianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, S. Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® marchio registrato

DPD 30.06.05/a

THIODAN® 35 EM

INSETTICIDA IN CONCENTRATO EMULSIONABILE

THIODAN® 35 EM

Composizione

Endosulfan puro 32,9 % p/p (=352 g/l)
Contiene nafta solvente (petrolio), aromatica leggera

FRASI DI RISCHIO

Infiammabile. Tossico per ingestione. Irritante per le vie respiratorie e la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può provocare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione:
Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione:
Bayer CropScience GmbH, Francoforte s/Meno – Germania;
SBM Formulation – St. Marcel - 13367 Marsiglia – Francia;
Isagro S.p.A.- Aprilia (LT); Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
Officina di confezionamento: SCB – Marle sur Serre - (Francia)

Reg. n° 1838 del 19/4/1975 del Ministero della Sanità

CONTENUTO NETTO: 1 - 5 - 10 L

PARTITA N°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni. **Terapia:** sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni. **Controindicazioni**: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa. AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Insetticida indicato nella lotta contro diversi insetti ad apparato boccale masticatore e succhiatore.
THIODAN 35 EM agisce per contatto e per ingestione ed è caratterizzato da efficacia iniziale e da una sufficiente persistenza sulle piante irrorate.
THIODAN 35 EM ha un'azione secondaria contro il ragno rosso, dove si eseguono trattamenti ripetuti; con un adeguato impiego di tale prodotto non si sono mai riscontrati danni alle principali piante coltivate, nè alterazioni delle caratteristiche organolettiche dei loro prodotti.
Il prodotto va conservato in un locale fresco, asciutto e protetto dal freddo nel periodo in cui si possono temere le gelate.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

- **Frutticoltura**
- **Pomacee**: contro afidi, minatrici, tentredini, psilla, cicadelle, maggiolino, tignola, aleurodidi, antonomo 100-150 ml/hl;
- **Pesco (comprese nettarine e ibridi simili)**: contro afidi 100-150 ml/hl (eseguire l'irrorazione prima che le foglie comincino ad accartocciarsi); non effettuare più di 3 trattamenti alla dose max. di prodotto (con volumi d'acqua max. di 15 hl/ha).
- **Mandorlo**: contro afidi 100-150 ml/hl, contro afide farinoso 200 ml/hl (eseguire l'irrorazione prima che le foglie comincino ad accartocciarsi).
  Nocciolo: contro eriofide 130-150 ml/hl;
- **Vite**: contro insetti ad apparato boccale masticatore e succhiatore 100-150 ml/hl; non effettuare più di 2 trattamenti alla dose max. di prodotto (con volumi d'acqua max. di 15 hl/ha).
- **Agrumi**: contro insetti ad apparato boccale masticatore e succhiatore 100 ml/hl; non effettuare più di 2 trattamenti (con volumi d'acqua max. di 30 hl/ha).
- **Barbabietola da zucchero**: contro afidi, altiche, e cleono: 1,2-1,8 l/ha in 400-800 litri di acqua.
- **Patata**: contro dorifora e afidi: 100-150 ml/hl.
- **Pomodoro, melone, zucca, cocomero:** contro dorifora, afidi, cavolaia, altiche ed insetti ad apparato boccale masticatore e succhiatore 100-150 ml/hl;
  contro afide o pidocchio nero dei fagioli e delle fave 200 ml/hl (eseguire l'irrorazione prima che le foglie comincino ad accartocciarsi).
- **Medica:** contro afidi 100-150 ml/hl.
- **Soia**: contro afidi, nottue, cicalina, sitona 1,2-1,8 l/ha.
- **Trifoglio, lupinella, sulla, Favino**: contro insetti ad apparato boccale masticatore e succhiatore 1,2-1,8 l/ha.
- **Tabacco**: contro afidi 100-150 ml/hl.
- **Vivai, floreali ed ornamentali in pieno campo e in serra**: contro afidi 100-150 ml/hl.
- **Forestali, pioppo**: contro maggiolino 100-150 ml/hl

COMPATIBILITÀ

Il preparato non è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina. THIODAN 35 EM è miscibile con olii bianchi, per la preparazione al momento dell'impiego di olii attivati (lotta contro le forme svernanti di insetti in frutticoltura, contro le cocciniglie degli agrumi). Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER LA VITE, 25 GIORNI PER TUTTE LE ALTRE COLTURE

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

edizione del 02.11.2005

Aldicarb Bayer CropScience TEMIK® 5G

Insetticida nematocida sistemico in granuli protetti per l'impiego su tabacco, barbabietola da zucchero, vivai di piante legnose e di vite

Aldicarb Bayer CropScience TEMIK® 5G

COMPOSIZIONE
Aldicarb puro 5 g
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo a contatto con la pelle. Molto tossico per inalazione e per ingestione.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta).
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

MOLTO TOSSICO

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1

Officina di produzione:
Bayer CropScience - Woodbine (Georgia) - U.S.A.
Officine di confezionamento:
AgriFormula S.r.l. - Paganica (AQ)
SBM Formulation - Bèziers (Francia)
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Registrazione n. 2001 del 23/03/76 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: 2,5 - 10 - 20 kg

Partita n.: *

Norme precauzionali
Evitare la contaminazione dei corpi idrici.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
TEMIK 5G é un nematocida insetticida sistemico granulare che agisce per contatto ed ingestione. TEMIK 5G è selettivo per le colture registrate. Se applicato su terreno sufficientemente umido viene assorbito rapidamente dall'apparato radicale e traslocato per via linfatica in tutti gli organi della pianta.
RACCOMANDAZIONI GENERALI D'IMPIEGO
Distribuzione del prodotto
Data l'attività sistemica e l'assorbimento per via radicale della sostanza attiva é necessario distribuire il prodotto nella zona dell'apparato radicale della coltura. TEMIK 5G deve essere distribuito esclusivamente con distributore meccanico (esempio microgranulatori). All'atto del trattamento immettere nell'apparecchiatura di distribuzione la quantità effettivamente necessaria per il trattamento. Nel caso che a fine trattamento avanzi del prodotto vuotare e pulire l'attrezzatura di distribuzione e reintrodurre il prodotto nella confezione originale.
Assicurarsi che non vi siano dispersioni di prodotto durante le operazioni di riempimento (o svuotamento) dell'attrezzatura di distribuzione.
Assicurarsi che non vi sia fuoriuscita del prodotto durante le manovre alle testate degli appezzamenti e durante lo spostamento da un campo all'altro.
Assicurarsi che l'attrezzatura di distribuzione sia correttamente tarata. TEMIK 5G non deve essere distribuito con modalità diverse da quelle indicate.
Incorporazione nel terreno
E' indispensabile incorporare nel terreno TEMIK 5G mediante interramento meccanico all'atto della distribuzione o immediatamente dopo per assicurare l'efficacia ed evitare rischi per l'ambiente. Dopo l'incorporazione nel terreno è opportuno effettuare un'irrigazione per aspersione.
Evitare di ripetere l'irrigazione per almeno 72 ore e non eccedere nei quantitativi di acqua nelle irrigazioni successive.
RACCOMANDAZIONI D'IMPIEGO
Tabacco:
contro nematodi galligeni e cistiformi, insetti terricoli (elateridi, nottue) e fogliari (afidi tripidi e pulce), TEMIK 5G si impiega:
- **trattamento in vivaio**
  Dose raccomandata: 6 g/mq
  - in **pre-semina** seguito da incorporazione meccanica alla profondità di 10 - 15 cm;
  - sulle **giovani piantine** (stadio di due foglie vere) seguito da incorporazione per irrigazione;
  - trattamento **pre-trapianto** due settimane prima dell'estirpazione delle piantine, quando si temono forti infestazioni, seguito da incorporazione per irrigazione.
- **trattamento in campo al momento del trapianto**

Distribuire TEMIK 5G mediante microgranulatore montato sulla trapiantatrice alla dose di 80-100 Kg/ha per trattamenti su tutta la superficie, 30-35 kg/ha per trattamenti su una fascia di circa 20-30 cm o 6-12 g/m lineare localizzando il prodotto nel solco di trapianto.
- **trattamento in campo alla rincalzatura**

Distribuire TEMIK 5G (30-35 kg/ha su una fascia di 30 cm circa) mediante microgranulatore montato sulla rotofresatrice dotata di rincalzatori (i microgranulatori devono distribuire il prodotto davanti alla fresatrice).

Barbabietola da zucchero:
contro nematodi cistiformi e galligeni, insetti terricoli (agrotidi), fogliari (afidi, altica, mosca) e miriapodi. Distribuire 30 Kg/ha di TEMIK 5G nel solco di semina mediante microgranulatore applicato alla seminatrice. Per la lotta ai soli insetti è possibile ridurre la dose a 20 Kg/ha.

Vivai di piante legnose (fruttiferi, agrumi, ornamentali, forestali) **e di vite e piante a dimora non ancora in produzione**
contro: nematodi, insetti terricoli (oziorrinco) e fogliari (afidi, cicaline, ecc.).
TEMIK 5G controlla sia i nematodi galligeni che i nematodi mobili responsabili della trasmissione di virus nei vivai di vite, pesco (*Xiphinema index*, ecc.), ed agrumi (*Tylenchus semipenetrans*). Distribuire Temik 5G a pieno campo prima del trapianto alla dose di 100-150 Kg/ha ed incorporare immediatamente il prodotto a 10-15 cm di profondità. Temik 5G può essere applicato anche su bande di 50 cm di larghezza in corrispondenza delle file di trapianto o localizzato nella zona delle piantine riducendo la dose per ettaro in funzione della superficie effettivamente trattata.

COMPATIBILITA'
TEMIK 5G si usa da solo.

FITOTOSSICITA'
TEMIK 5G, se impiegato secondo le modalità raccomandate, non é fitotossico per le colture indicate.

NOCIVITA'
Il prodotto é tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, gli uccelli ed il bestiame. TEMIK 5G deve essere applicato una sola volta all'anno e cioè alla semina od al trapianto od alla ripresa vegetativa della coltura.

Intervallo di sicurezza : Tabacco 80 giorni. Non necessario per le altre colture

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego é consentito esclusivamente al personale qualificato munito di autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23/04/2001.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05/a

® Marchio registrato

VENZAR® WSS

Diserbante per la barbabietola da zucchero e da foraggio e per lo spinacio
Polvere bagnabile

VENZAR® WSS

COMPOSIZIONE
Lenacil puro 80 g,
coformulanti q.b. a 100 g.

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1

Officine di produzione:
- Bayer CropScience Ltd., Hauxton (Cambridge) – (Inghilterra)
- SBM Formulation – St. Marcel - 13367 Marsiglia – (Francia)
- Bayer CropScience GmbH,- Wolfenbüttel - Germania
- Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)
- Du Pont de Nemours (France) S.A. - Stabilimento di Cernay (Francia);
- Trapaco Dr. Schirm GmbH - 23568 Lübeck (Germania).

Registrazione n° 2187 del 12-04-1976 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: 400 - 500 g, 1kg.
Partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il Venzar WSS agisce sulle più comuni infestanti da seme in fase di germinazione e su quelle appena nate. Resistenti si sono dimostrate soprattutto l'Amaranthus, il Galium, la Veronica e l'Euforbia e tutte le perenni. Il Venzar WSS presenta una notevole persistenza nel terreno, nel caso quindi che dopo aver effettuato il trattamento si fosse costretti a cambiare la coltura per sopraggiunte condizioni ad essa sfavorevoli, il terreno trattato può essere destinato solo a barbabietola o a spinacio.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

In pre-semina (subito o qualche giorno prima della semina), incorporando il prodotto a mezzo di un erpice leggero alla profondità di 2-3 cm.
Nei terreni di medio impasto.......................0,750 - 1 kg per ettaro
Nei terreni pesanti.......................................1-1,5 kg per ettaro
Per lo spinacio non superare mai la dose di 1 kg per ettaro

In pre-emergenza (subito o qualche giorno dopo la semina), purché la bietola non sia germinata.
Nei terreni di medio impasto.........................1,5 kg per ettaro
Nei terreni pesanti...2 kg per ettaro
Per lo spinacio nei terreni di medio impasto 1 kg per ettaro
Nei terreni pesanti...1,5 kg per ettaro

In post-emergenza il Venzar WSS può essere convenientemente impiegato alla dose di 0,8-1 kg/ha in associazione al Betanal completandone l'efficacia e conferendogli una maggior persistenza d'azione. In questo caso la bietola al momento del trattamento dovrà aver emesso le prime 2 foglie vere. L'impiego del Venzar WSS è sconsigliabile nei terreni sabbiosi o comunque sciolti ed in quelli di natura torbosa; nel primo caso potrebbe provocare qualche sintomo di fitotossicità, nel secondo i risultati nei confronti delle infestanti potrebbero essere insoddisfacenti.

Avvertenze per l'impiego

Assicurarsi del buon funzionamento e dell'uniformità di distribuzione degli apparecchi impiegati per il diserbo. Evitare di ripassare sul terreno già trattato. Durante la distribuzione mantenere costante la velocità di avanzamento del mezzo irrorante.

A causa della sua scarsa solubilità in acqua il Venzar WSS per poter esplicare la sua attività erbicida ha bisogno che cada una pioggia di 10-15 mm entro due settimane dal trattamento, in caso contrario si deve procedere all'effettuazione di una irrigazione a pioggia.

COMPATIBILITÀ

Non miscelare con sostanze alcaline.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

VENZAR® WSS

Diserbante per la barbabietola da zucchero e da foraggio e per lo spinacio
Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

VENZAR® WSS

COMPOSIZIONE
Lenacil puro 80 g,
coformulanti q.b. a 100 g.

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1

Officine di produzione:
- Bayer CropScience Ltd., Hauxton (Cambridge) – (Inghilterra)
- SBM Formulation – St. Marcel - 13367 Marsiglia – (Francia)
- Bayer CropScience GmbH,- Wolfenbüttel - Germania
- Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)
- Du Pont de Nemours (France) S.A. - Stabilimento di Cernay (Francia);
- Trapaco Dr. Schirm GmbH - 23568 Lübeck (Germania).

Registrazione n° 2187 del 12-04-1976 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: 500 g (5 x 100 g)
Partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il Venzar WSS agisce sulle più comuni infestanti da seme in fase di germinazione e su quelle appena nate. Resistenti si sono dimostrate soprattutto l'Amaranthus, il Galium, la Veronica e l'Euforbia e tutte le perenni. Il Venzar WSS presenta una notevole persistenza nel terreno, nel caso quindi che dopo aver effettuato il trattamento si fosse costretti a cambiare la coltura per sopraggiunte condizioni ad essa sfavorevoli, il terreno trattato può essere destinato solo a barbabietola o a spinacio.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

In pre-semina (subito o qualche giorno prima della semina), incorporando il prodotto a mezzo di un erpice leggero alla profondità di 2-3 cm.
Nei terreni di medio impasto........................0,750 - 1 kg per ettaro
Nei terreni pesanti...1-1,5 kg per ettaro
Per lo spinacio non superare mai la dose di 1 kg per ettaro

In pre-emergenza (subito o qualche giorno dopo la semina), purché la bietola non sia germinata.
Nei terreni di medio impasto..........................1,5 kg per ettaro
Nei terreni pesanti...2 kg per ettaro
Per lo spinacio nei terreni di medio impasto 1 kg per ettaro
Nei terreni pesanti...1,5 kg per ettaro

In post-emergenza il Venzar WSS può essere convenientemente impiegato alla dose di 0,8-1 kg/ha in associazione al Betanal completandone l'efficacia e conferendogli una maggior persistenza d'azione. In questo caso la bietola al momento del trattamento dovrà aver emesso le prime 2 foglie vere. L'impiego del Venzar WSS è sconsigliabile nei terreni sabbiosi o comunque sciolti ed in quelli di natura torbosa; nel primo caso potrebbe provocare qualche sintomo di fitotossicità, nel secondo i risultati nei confronti delle infestanti potrebbero essere insoddisfacenti.

Avvertenze per l'impiego

Assicurarsi del buon funzionamento e dell'uniformità di distribuzione degli apparecchi impiegati per il diserbo. Evitare di ripassare sul terreno già trattato. Durante la distribuzione mantenere costante la velocità di avanzamento del mezzo irrorante.

A causa della sua scarsa solubilità in acqua il Venzar WSS per poter esplicare la sua attività erbicida ha bisogno che cada una pioggia di 10-15 mm entro due settimane dal trattamento, in caso contrario si deve procedere all'effettuazione di una irrigazione a pioggia.

COMPATIBILITÀ

Non miscelare con sostanze alcaline.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI
PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

Bayer CropScience

® Marchio registrato della E.I. Du Pont de Nemours & Co. Inc., U.S.A.

DPD 30.06.05

ZOLFO BAGNABILE BAYER

Etichetta/foglio illustrativo

FUNGICIDA
per irrorazioni in frutticoltura, viticoltura, orticoltura e floricoltura

ZOLFO BAGNABILE BAYER

COMPOSIZIONE
100 g di Zolfo Bagnabile Bayer contengono:
90 g di zolfo puro (esente da selenio);
coformulanti quanto basta a 100.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: BAYER CROPSCIENCE S.r.l. - Filago (BG);
STI - Solfotecnica Italiana - Cotignola (RA);
ZOLFINDUSTRIA S.r.l. - S. Cipriano Po (PV)
Contenuto netto: g 100, kg 1, kg 5, kg 10, kg 25
Registrazione Ministero Sanità n 2449 del 12.02.1977
Partita n.

Informazioni mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Lo Zolfo Bagnabile Bayer si distingue per un'adesività che gli conferisce resistenza all'azione dilavante della pioggia.
Dosi di impiego:
Frutticoltura:
1) contro il mal bianco del melo: 0,3% prima della fioritura; 0,2% dopo la fioritura; 0,15% per i trattamenti al verde.
2) Contro il mal bianco del pesco: 0,1-0,2%.
Viticoltura: contro l'oidio : 0,15-0,3%. Se contro la peronospora si usano prodotti organici è consigliabile aggiungere ad ogni trattamento lo 0,1% di Zolfo Bagnabile Bayer.
Orticoltura: contro il mal bianco o oidio del pomodoro, del pisello, del melone, del cetriolo: 0,15-0,2%.
Floricoltura: contro il mal bianco o oidio della rosa, dell'ortensia, del crisantemo: 0,15-0.2%.
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Compatibilità: lo Zolfo Bagnabile Bayer è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra: non è miscibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con oli minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacryl e Diclofluanide.
Avvertenza: lo Zolfo Bagnabile Bayer deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: può arrecare danno alle seguenti cultivar di MELE: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Steyman Red - Winesap.
VITE: Sangiovese - CUCURBITACEE: può essere fitotossico.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Conservare al riparo dall'umidità

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

MESUROL® M LUMACHE

ESCA LUMACHICIDA A BASE DI METALDEIDE

COMPOSIZIONE
g 100 DI MESUROL M LUMACHE CONTENGONO:
g 4,9 DI METALDEIDE PURA
coformulanti q.b. 100

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica uomo: circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il MESUROL M Lumache costituisce un'esca già pronta all'uso, dotata di potere attrattivante e formulata in modo da consentire un ammorbidimento del granulo senza spappolarsi in breve tempo, permettendo, quindi, una appetibilità a lunga durata.
È efficace contro le lumache e le limacce che danneggiano le piante coltivate.
Per le colture orticole: impiegare circa 10 granuli per ogni m^2 di terreno distribuiti in modo sparso oppure a mucchietti.
Per coltivazioni in pieno campo: impiegare da 6 a 15 kg di prodotto per ettaro a seconda dell'infestazione.

COMPATIBILITÀ: il MESUROL M Lumache è compatibile con tutti gli antiparassitari in commercio eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ: il MESUROL M Lumache è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici e il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. - Conservare al riparo dall'umidità.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Registrazione Ministero della Sanità n. 2549 del 21.06.77
Officine di produzione e confezionamento: BAYER CROPSCIENCE AG - Dormagen - (Germania); BAYER CropScience S.r.l. - Filago (BG); L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI); L.I.F.A. S.r.l. – Vigonovo (VE)
Contenuto netto: g 200-500- 600; kg 1-1,2 -5-10-20
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.
Partita n°

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

Etichetta/Foglio Illustrativo

MORKIT P.B.

PRODOTTO AD AZIONE REPELLENTE PER LA PROTEZIONE DELLE SEMENTI DA DANNI PROVOCATI DAGLI UCCELLI

MORKIT P.B.
Composizione
100 g di Morkit P.B. contengono:
80 g di Antrachinone puro
coformulanti quanto basta a 100.
FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione: Bayer CropScience AG-Dormagen (Germania);
Bayer CropScience S.r.l.-Filago (BG);
STI Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Sanità n. 2631 del 02/07/1977
Contenuto netto: 100 g; 1 kg
Partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi di impiego: da 300 g a 1kg di Morkit PB ogni 100 kg di semente:
per cereali: 300 g/q; per mais:800-1000 g/q; per ortaggi 400-600 g/q.
Modo di impiego: il Morkit PB deve essere miscelato alla semente prima o durante la semina; per assicurarsi l'adesività al seme, inumidire preventivamente la semente.

Avvertenza: i semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana, nè del bestiame.
Compatibilità: il Morkit PB può essere impiegato anche dopo la concia con fungicidi o insetticidi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico sui prodotti usati per la concia.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Conservare al riparo dall'umidità.

BAYER Bayer CropScience

DPD 30.06.05

Kilval®

Aficida sistemico con azione acaricida secondaria

Kilval®

Composizione
g 100 di prodotto contengono :
g 37,38 di Vamidotion puro (= 400 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

Contiene cicloesanone e alchildifenolo etossilato

Frasi di Rischio
Infiammabile.
Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. Tossico per ingestione.
Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

Consigli di prudenza
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta).
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione:
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
AgriFormula S.r.l., Paganica (AQ)
Bayer CropScience France, Elbeuf – Francia
Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)

Registrazione n. 2780 Ministero della Sanità del 29/4/1978

Contenuto netto: l 1 - 5 - 10
Partita n.: *

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D' IMPIEGO
Il prodotto è un insetticida sistemico dotato di una persistenza superiore a tre settimane (e molto spesso a quattro o cinque settimane).
MELO, PERO:
contro tutti gli afidi, in particolare afide lanigero, contro ragnetti rossi, ditteri cecidomidi e cicaline: 125 ml/hl d'acqua con pompe irroratrici a volume normale; con atomizzatori a basso volume aumentare la dose in rapporto alla minor quantità di acqua impiegata.

Diluire la quantità sopra indicata di prodotto in pochi litri di acqua. Versare in seguito, sempre agitando, nella botte della pompa irroratrice precedentemente riempita d'acqua.

COMPATIBILITA'
Non miscelare con sostanze alcaline (poltiglia bordolese, polisolfuri, permanganato di potassio).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23/04/2001

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

CURITAL

Fungicida a base di Dicloran
Composizione su g 100:
dicloran puro 45 g,
coformulanti q.b. a 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Informazioni per il medico:
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un centro antiveleni.**

Caratteristiche e modalità d'impiego:
Il Curital è un fungicida organico per la lotta contro:
- Botrytis e Sclerotinia di lattughe e simili e rucola (marciume del colletto);
- Monilia fructicola e Sclerotinia sp.;
- Marciumi pedali e radicali di colture ortive (pomodori, peperoni, melanzane, carote, aglio, cipolle, basilico), colture industriali (tabacco, fragola), colture ornamentali e da fiore;
- Fusarium e Rizoctonia, che provoca il "mal del colletto" del garofano.

Dosi d'impiego:
Contro Botrytis e Sclerotinia di lattughe e simili e rucola marciumi pedali e radicali di colture ortive, floreali, ornamentali e contro Rizoctonia del garofano:
Trattamenti al terreno (pre-semina o pre-trapianto): g 150-250 sciolti in acqua e irrorati su m² 100 di terreno con 10 hl acqua/ha.
Trattamenti alla coltura (in semenzaio o a dimora): irrorare le piante con g 150-200/hl con 10 hl acqua/ha.
Contro Botrytis e Sclerotinia dei gladioli: irrorare il terreno, lungo il solco destinato a ricevere i bulbi alla dose di g 800 per 100 litri acqua, usando litri 5 di soluzione ogni 20 metri lineari di solco.

Compatibilità
Il Curital è compatibile con i comuni fungicidi ed insetticidi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - 20156 Milano - Viale Certosa 130 – Tel. 02/3972.1

Registrazione n° 2852 del 08.08.1978 del Ministero della Sanità
Officine di produzione: Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG); Bayer CropScience GmbH - Wolfenbüttel - Germania; SBM Formulation – St. Marcel - Marsiglia – (Francia); SBM Formulation – Béziers – Francia; Isagro S.p.A. - Aprilia (LT).

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Contenuto netto: 1 - 5 Kg
Partita n.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

OLIOCIN®

Olio minerale emulsionato ad elevato grado di insulfonabilità (95%) – Emulsione olio in acqua
Insetticida-acaricida per la lotta contro cocciniglie, uova di afidi e di ragnetti rossi degli agrumi, delle piante ornamentali in pieno campo, delle piante da frutto e dell'olivo

COMPOSIZIONE
g 100 di Oliocin® contengono
g 80 di olio minerale al 95% di insulfonabilità (= 696 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

ATTENZIONE
Manipolare
con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi d'impiego: 1,5-2 % (oppure 1% in miscela con E 605 Ft 20 o Bladan M 20) per trattamenti primaverili-estivi agli agrumi (arancio, mandarancio, mandarino, limone, pompelmo) ed alle piante ornamentali in pieno campo.
3-3,5% (oppure 3% in miscela con E 605 Ft 20 o Bladan M 20) per trattamenti di fine inverno per pero e melo (ingrossamento, apertura delle gemme), vite, drupacee (pesco, susino, albicocco e ciliegio) alla fase dell'ingrossamento delle gemme.
3-3,5% per trattamenti a completa caduta foglie contro Cocciniglia di San Josè (*Quadraspidiotus perniciosus*) e cocciniglia bianca del pesco (*Diaspis pentagona*) (pero, melo, pesco, nettarino, percoche, susino, ciliegio, albicocco).
Olivo: 1-1,5 % contro cocciniglie (*Saissetia oleae, Parlatoria oleae, Lichtensia viburnii, Euphilippia olivina*) per trattamenti estivi (agosto-settembre) o in alternativa invernali (oppure 1% in miscela con E 605 Ft 20, Bladan M 20, Gusathion 25 PB, Smart EW, con azione anche contro *Euphyllura olivina, Prays oleae, Phloeotribus scarabaeoides*).
N.B. 1) Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale. 2) I trattamenti con Oliocin in miscela con E 605 ft 20 o Bladan M 20 permettono di distruggere anche uova di afidi, psilla del pero, larve defogliatrici, minatrici delle foglie e verme delle mele e delle pere. 3) Oliocin può essere impiegato su bietole da zucchero e mais in miscela con diserbanti per aumentare l'efficacia, alle dosi di l 1-2/ha per barbabietola da zucchero e l 6-10 / ha per mais.
Momento del trattamento: per gli agrumi si consigliano due trattamenti, il primo in inverno fra l'epoca di raccolta e la fioritura, il secondo in estate fra giugno ed agosto.
Compatibilità: Oliocin è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra, fatta eccezione per la poltiglia bordolese, i polisolfuri e i prodotti a base di captan, zolfo e TMTD; Oliocin, essendo a reazione neutra, è particolarmente indicato per le miscele con esteri fosforici.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Agitare bene il prodotto prima di ogni prelievo.
Fitotossicità: dopo trattamenti con poltiglia bordolese, polisolfuri, prodotti a base di captan, zolfo e TMTD, l'Oliocin deve essere impiegato con un intervallo di tempo di almeno 2 settimane.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Conservare al riparo dal gelo.

Titolare dell'autorizzazione: BAYER CropScience S.r.l. - Milano - Viale Certosa 130 - Tel. 02/3972.1
Registrazione Ministero Sanità n. 3065 del 23/4/79
Officine di produzione: Bayer CropScience S.r.l. - FILAGO (BG) (ml 250; l 1-5-10-15-20-25-30-50-200-1000*)
Bayer CropScience AG – Alte Heerstrasse –41538 Dormagen (Germania) (l 30-200)
I.R.C.A. – Service S.p.A. – Fornovo San Giovanni (BG) (250 ml; l 1-5-15-25-200-1000*)
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.
Contenuto netto: ml 250; l 1-5-10-15-20-25-30-50-200-1000*
Partita n. :

Indicazioni unicamente per la confezione da 1000 litri:
Attenzione: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Non disperdere nell'ambiente. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zone di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto contenere la perdita usando sabbia o segatura o altro materiale inerte per assorbire il prodotto sversato. Trasferire l'inerte contaminato in un contenitore dotato di chiusura avendo cura di etichettare il contenitore indicando il nome del prodotto e la classificazione di pericolo, e trasportare/far trasportare a Bayer CropScience S.r.l. Via Delle Industrie 9, 24040 Filago, telefono per emergenza 035/990111 .
Attenzione: confezione ad esclusivo uso industriale

Bayer CropScience

DPD 30.06.05/a

® marchio registrato

MESUROL® ESCA

LUMACHICIDA - INSETTICIDA GRANULARE
per la distruzione di lumache, chiocciole, limacce, grillotalpa, agrotidi e grilli

MESUROL® ESCA
COMPOSIZIONE:
g 100 di Mesurol Esca contengono:
g 4 metiocarb puro
coformulanti q.b. a 100.

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: BAYER CropScience S.r.l. – 20156 Milano - V.le Certosa 130 – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: BAYER CropScience AG Dormagen - (Germania); BAYER CropScience S.r.l. - Filago (BG)
Officine di confezionamento: S.T.I Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Sanità n. 3076 del 12/5/79
Contenuto netto: g 200; kg 1-5-25
Partita n°

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Dose d'impiego: 3-5 kg/ha a seconda del grado di infestazione.
Modo d'impiego: distribuire il prodotto a spaglio, il più uniformemente possibile. Per evitare invece infestazioni dall'esterno è consigliabile distribuire il prodotto lungo i margini del campo per una larghezza di 1-2 metri.

Compatibilità : il prodotto deve essere distribuito da solo.

Nocività: il prodotto è nocivo per insetti utili, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare al riparo dall'umidità.

BAYER Bayer CropScience

® marchio registrato

DPD 30.06.05

CIRTOXIN

Diserbante selettivo per la barbabietola da zucchero, da orto e da foraggio, per il frumento, orzo, avena, segale, mais, cavoli, rapa, cipolla, colza.
Tipo di formulazione: liquida

CIRTOXIN
COMPOSIZIONE:
g 100 di prodotto contengono:
Clopiralid puro 9,5 g (100 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare occhiali e guanti nella preparazione ed impiego della soluzione diserbante.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, ricorrere al medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità di azione: agisce per assorbimento fogliare e in parte radicale.
Erbe infestanti sensibili: *Anthemis arvensis* (camomilla bastarda), *Ammi majus* (visnaga maggiore), *Bifora spp.* (coriandolo fetido), *Cirsium arvense* (stoppione), *Helianthus spp.* (girasole), *Matricaria chamomilla* (camomilla), *Rumex spp.* (romice), *Sonchus spp.* (crespino), *Vicia spp.* (veccia), *Xantium italicum* (nappola).
Erbe infestanti mediamente sensibili: *Polygonum spp.* (poligoni), *Solanum nigrum* (erba morella).
Epoca di impiego: post-emergenza. E' raccomandabile intervenire sulle erbe infestanti nei primi stadi di sviluppo.
Dosi d'impiego:
Barbabietola da zucchero e da foraggio: in presenza di *Cirsium arvense* e altre infestanti: 0,8-1 l/ha. Con *Matricaria chamomilla* la dose va aumentata: 1,2-1,5 l/ha.
Frumento, orzo, avena e segale: 0,8-1 l/ha tra la fase di accestimento e la fase di botticella.
Mais: 0,8-1 l/ha: applicare con la coltura alta 15-30 cm.
Orticole: cavoli, rapa, cipolla, bietola da orto e colza: 1,2-1,5 l/ha.
Volume di irrorazione: applicare il prodotto con 200-600 l/ha di acqua; il preparato deve essere agitato bene durante il completamento del riempimento. Usare attrezzatura munita di agitatore: distribuire a bassa pressione.

Compatibilità: è perfettamente compatibile con Fenmedifam e con erbicidi fenossiacetici (2,4 D; MCPA; Mecoprop= MCPP, Diclorprop = 2,4 - DP) sottoforma di sali.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenza agronomica: Non seminare soia su terreno sodo dopo il cereale trattato.

INTERVALLO DI SICUREZZA PER IL MAIS: 45 giorni.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione:
- SBM Formulation – St. Marcel - Marsiglia – (Francia)
- Bayer CropScience Ltd. - Hauxton (Cambridge) - Inghilterra
- Isagro S.p.A.- Aprilia (LT)
- Dow AgroSciences Ltd - King's Lynn - Norfolk (Regno Unito)
- Dow AgroSciences B.V. - Rotterdam - Botlek (Olanda)
- Dow AgroSciences S.A. - Drusenheim (Francia)

Registrazione n. 3090 del 5/4/1979 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: 500 ml; 1 - 5 L
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.
Partita n.:

Bayer CropScience DPD 30.06.05

R6 Erresei® SB-R 37

Fungicida cupro organico ad azione biologica per la difesa della vite, del pomodoro e del garofano
Polvere Bagnabile

R6 Erresei® SB-R 37

Composizione :
g 100 di prodotto contengono :
g 5,8 di Mancozeb puro
g 22 di Rame metallo puro
(da Rame Ossicloruro g 37)
Coformulanti q.b. a 100 g

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione. Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione: Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG); AgriFormula s.r.l., Paganica (AQ); S.T.I. Solfotecnica Italiana - Via Torricelli, 2 - Cotignola (RA);
SBM Formulation – St. Marcel - 13367 Marsiglia - Francia; ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT)

Registrazione n. 3284 Ministero della Sanità del 28/11/1979

Contenuto netto: 1 - 5 - 10 - 20 Kg

Partita n.: *

Norme precauzionali
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
MANCOZEB 5,8 %
RAME OSSICLORURO 37 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
MANCOZEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B.- Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
RAME OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi.
Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia : sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni**

MODALITA' DI IMPIEGO
- VITE:
contro peronospora 400 - 500 g/hl.
- POMODORO (solo fino alla prima fioritura):
contro peronospora e alternariosi 400 - 500 g/hl.
- GAROFANO (in pieno campo):
contro ruggine 400 g/hl.
Stemperare il prodotto in poca acqua fino ad ottenere una poltiglia semi liquida e portare a volume con l'acqua occorrente.

Non impiegare in serra

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con Zolfi per la lotta contemporanea contro l'Oidio e la Peronospora.
Può essere miscelato con Dicofol, Malation, Paration e Metil Paration per la lotta contemporanea contro Acari, Tignole, Sigaraio, Zigene.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non trattare durante la fioritura.

NOCIVITA'
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente

svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® Marchio registrato DPD 30.06.05

R6 Erresei® SB-R 37

Fungicida cupro organico ad azione biologica per la difesa della vite, del pomodoro e del garofano
Polvere Bagnabile in sacchetti idrosolubili

R6 Erresei® SB-R 37

Composizione :
g 100 di prodotto contengono :
g 5,8 di Mancozeb puro
g 22 di Rame metallo puro
(da Rame Ossicloruro g 37)
Coformulanti q.b. a 100 g

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione. Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione: Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG); AgriFormula s.r.l., Paganica (AQ);
S.T.I. Solfotecnica Italiana - Via Torricelli, 2 - Cotignola (RA);
SBM Formulation – St. Marcel - 13367 Marsiglia - Francia; ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT)

Registrazione n. 3284 Ministero della Sanità del 28/11/1979
Contenuto netto: kg 2 (5 X 400 g) - 8 (4 X 2 kg) - 10 (5 X 2 kg)

Partita n.: *

Norme precauzionali
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
MANCOZEB 5,8 %
RAME OSSICLORURO 37 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
MANCOZEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B.- Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
RAME OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi.
Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia : sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni**

MODALITA' DI IMPIEGO
- VITE :
contro peronospora 400 - 500 g/hl.
- POMODORO (solo fino alla prima fioritura):
contro peronospora e alternariosi 400 - 500 g/hl.
- GAROFANO (in pieno campo):
contro ruggine 400 g/hl.
Stemperare il prodotto in poca acqua fino ad ottenere una poltiglia semi liquida e portare a volume con l'acqua occorrente.

Non impiegare in serra

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con Zolfi per la lotta contemporanea contro l'Oidio e la Peronospora.
Può essere miscelato con Dicofol, Malation, Paration e Metil Paration per la lotta contemporanea contro Acari, Tignole, Sigaraio, Zigene.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non trattare durante la fioritura.

NOCIVITA'
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO

Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti solubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

CUPRAVIT® MICRO BLU

Etichetta/foglio illustrativo

OSSICLORURO DI RAME MICRONIZZATO

per irrorazioni in frutticoltura, viticoltura, orticoltura, floricoltura, bieticoltura, olivicoltura

CUPRAVIT ® MICRO BLU

composizione:

100 g di Cupravit Micro blu contengono:

30 g di rame metallo (sotto forma di ossicloruro)

coformulanti quanto basta a 100.

FRASI DI RISCHIO:

Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: BAYER CropScience S.r.l. – 20156 Milano - Viale Certosa 130 – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione: Bayer CropScience AG-Dormagen (Germania);
Bayer CropScience S.r.l. Filago (Bg)
Isagro S.p.A. – Adria – Cavanella Po (RO)
STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)
AgriFormula S.r.l. – Paganica (AQ)

Registrazione Ministero della Sanità N. 3356 del 07/01/80

Contenuto netto: g 100; 1 - 5 - 10 - 25 kg

Partita N.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

Frutticoltura: **1) Pomacee:** contro la ticchiolatura: 0,25-0,3% prima della fioritura, 0,2-0,25% dopo la fioritura; 0,15-0,2% per i trattamenti al verde.

2) Drupacee: contro la bolla del pesco, la perforazione delle foglie: 1% solo per i trattamenti invernali.

Viticoltura: contro la peronospora della vite:0,4-0,5%.

Orticoltura: contro la septoriosi del sedano e del pomodoro, l'antracnosi del pisello, la peronospora della patata, del pomodoro e della cipolla, l'alternariosi della patata e del pomodoro: 0,5%.

Floricoltura in pieno campo o in serra: contro la peronospora e la ticchiolatura della rosa, la ruggine del garofano, la septoriosi del garofano e del crisantemo: 0,3-0,5%.

Bieticoltura: contro la cercospora o vaiolatura delle foglie e la peronospora: 0,5%

Olivicoltura: contro il vaiolo o occhio di pavone: 0,5%.

N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

COMPATIBILITA: il Cupravit Micro Blu è miscibile con quasi tutti gli antiparassitari a reazione neutra, ad eccezione di quelli che contengono TMTD (Pomarsol 50).

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino, e varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious,Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana,) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

DPD 30.06.05

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. - Conservare al riparo dall'umidità.

®Marchio registrato

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

DEDEVAP®

INSETTICIDA

per irrorazioni in frutticoltura, floricoltura e per la disinfestazione di cereali immagazzinati

DEDEVAP®

Composizione:
100 g di Dedevap contengono:
50 g di dichlorvos puro (= 585 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

FRASI DI RISCHIO:
Infiammabile. Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. Molto tossico per inalazione. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materie di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania)
Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG);
Registrazione del Ministero della Sanità 3484 del 14/1/1980
Contenuto netto: 1 l
Partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Frutticoltura: Pomacee e Drupacee 0,15-0,2% contro Capua e Cacoecia (Archips podana); 0,15-0,2% contro larve minatrici in tutti gli stadi di sviluppo e contro altre larve e coleotteri.
N B. -L'impiego del Dedevap sulla Golden delicious può essere iniziato 2 mesi dopo la fioritura.
Floricoltura: 0,15-0,2% contro afidi, tripidi, cicaline, aleurodidi, minatrici delle foglie e degli steli.
N.B. -Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Cereali da immagazzinare: 12 ml, 18 ml oppure 24 ml diluiti in 1 litro d'acqua per ogni tonnellata (10 quintali) di cereali, spruzzando la soluzione sul cereale mentre viene immesso con nastro trasportatore nei silos, oppure quando viene trasferito con lo stesso sistema da un magazzino ad un altro.
N.B.: data la sua limitata durata d'azione anche se usato alla dose massima consigliata, il prodotto è indicato solo per la disinfestazione dei cereali e non per la protezione durante la conservazione stessa.

E' vietato l'impiego in serre, fungaie e nei magazzini

Compatibilita': il Dedevap è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocivita': il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto di tutte le colture; per i cereali immagazzinati sospendere i trattamenti 20 giorni prima dell'immissione al consumo

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Conservare al riparo dal gelo.

Bayer CropScience

® marchio registrato

CAPTAN BAYER

Fungicida organico per irrorazioni su pomacee (melo e pero).
Polvere bagnabile

CAPTAN BAYER
COMPOSIZIONE
100 g di CAPTAN BAYER contengono:
45 g di captano puro;
Coformulanti quanto basta a 100.

FRASI DI RISCHIO
Tossico per inalazione. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti.
Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici.

TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta).
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione:
Bayer CropScience S.r.l. - Milano - Viale Certosa 130 – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG);
S.T.I. Solfotecnica Italiana - Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 3848 del 13/10/80
CONTENUTO NETTO: 1-10 kg
PARTITA N.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Pomacee (melo e pero): contro la ticchiolatura ed il marciume bruno dei frutti (*Monilia fructigena*): 0,25% (250 g in 100 l d'acqua).

COMPATIBILITA':
Il Captan Bayer e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. Non e' miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri ecc.) e con olii minerali. La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii minerali e polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': puo' risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious - Winesap - Stayman - Renetta del Canada) e di pero (Butirra d'Anyou - Butirra Clairgeau - Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare all'asciutto.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

CAPTAN BAYER

Fungicida organico per irrorazioni su pomacee (melo e pero)
POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

CAPTAN BAYER
COMPOSIZIONE
100 g di CAPTAN BAYER contengono:
45 g di captano puro;
Coformulanti quanto basta a 100.

FRASI DI RISCHIO
Tossico per inalazione. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti.
Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici.

TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta).
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione:
Bayer CropScience S.r.l. - Milano - Viale Certosa 130 – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l.- Filago (BG); S.T.I. Solfotecnica Italiana-Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Sanità N. 3848 del 13/10/80
Contenuto netto: 1 kg; 1 kg (2 x g 500; 4 x g 250; 5 x g 200); kg 10 (10 x kg 1); kg 12 (12 x kg 1)
PARTITA N.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni .

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Pomacee (melo e pero): contro la ticchiolatura ed il marciume bruno dei frutti (*Monilia fructigena*): 0,25% (250 g in 100 l d'acqua, pari a 1 sacchetto da kg 1 in 400 litri di acqua)*.

COMPATIBILITA':
Il Captan Bayer è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. Non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri ecc.) e con olii minerali. La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii minerali e polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious - Winesap - Stayman - Renetta del Canada) e di pero (Butirra d'Anyou - Butirra Clairgeau - Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare all'asciutto.

oppure:
*
- pari a 1 sacchetto da g 500 in 200 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 250 in 100 litri di acqua
– pari a 1 sacchetto da g 200 in 80 litri di acqua

Bayer CropScience

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

DPD 30.06.05

ILLOXAN®

GRAMINICIDA SELETTIVO
CONCENTRATO EMULSIONABILE

ILLOXAN®

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Diclofop metile puro 27,3% (= 284 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Infiammabile. Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione :
Bayer CropScience S.r.l. - viale Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Registrazione n. 3982 del 3/11/1980 del Ministero della Sanità

Officine di Produzione :
Bayer CropScience GmbH - Francoforte s/ Meno - Germania
Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)
Bayer CropScience GmbH - Wolfenbüttel - Germania
SBM Formulation – St. Marcel – Marsiglia (Francia)

Contenuto netto: 0,5 - 1 - 2,5 - 3 - 5 - 10 L

Partita n.:*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.
Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Frumento e orzo: 2,0-3,0 l/ha in 300 litri d'acqua.
Barbabietola da zucchero: 2,5-3,5 l/ha in 300 litri d'acqua.
Leguminose e colture orticole (pisello, fava, fagiolo, lattuga, spinacio, cavolo, carota, cipolla, patata): 2,5-3,0 l/ha in 300 litri d'acqua.
La dose piu' bassa e' indicata in presenza di infestanti nate uniformemente e allo stadio di 2-4 foglie, mentre la dose piu' alta e' indicata per infestazioni difformi come stadio di sviluppo.

CARATTERISTICHE

ILLOXAN e' un prodotto graminicida per la lotta in particolare contro *Avena* spp., *Setaria* spp., *Echinochloa c., Lolium* spp. e *Phalaris* spp.
E' parzialmente efficace anche contro *Alopecurus* e *Digitaria*.
ILLOXAN esplica la sua azione principalmente per via fogliare. La sua efficacia e' massima contro le infestanti allo stadio di 1-4 foglie; agisce anche per via radicale ma la sua attivita' e' legata all'umidita' del terreno.

COMPATIBILITA'

Il prodotto e' miscibile con phenmedipham e metamitron, mentre esiste un antagonismo nella miscela estemporanea con derivati ormonici che causa una riduzione di efficacia verso l'Avena selvatica. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU CIPOLLA E PATATA, 30 GIORNI SU PISELLO, FAVA, FAGIOLO, LATTUGA, SPINACIO, CAVOLO E CAROTA.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

DECIS®

INSETTICIDA
CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

DECIS®

Composizione:
Deltametrina pura 2,81% (= 25 g/L)
coformulanti quanto basta a 100
Contiene: nafta solvente (petrolio) aromatica leggera

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG);
SBM Formulation – St. Marcel - 13367 Marsiglia – Francia
Bayer CropScience GmbH - Francoforte s/Meno – Germania
SBM Formulation – St. Marcel - 13367 Marsiglia - Francia/ Officine di confezionamento:
Diachem S.p.A.-Unità produttiva SIFA -Caravaggio (BG)
Isagro S.p.A.- Aprilia (LT)

Registrazione n° 4426 del 29/7/1981 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: 10 – 250 mL / 1 - 3 - 5 L

Partita N°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilita' da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
N.B. diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
DECIS e' un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attivita' contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
(ml/hl d'acqua)
Frutticoltura (melo, pero, pesco, albicocco, susino, ciliegio): contro psilla ml 75, afide verde del melo, afide del pesco (Myzus spp., Hyalopterus spp., Brachycaudus persicae) ml 30-50, cocciniglia di S. Jose' ml 50-75 (in trattamenti estivi contro neanidi mobili). Contro carpocapsa ml 30, cidia e anarsia ml 50-70, capua, cacoecia ed altri tortricidi ml 30-50, microlepidotteri del melo e del pero ml 30-50. Contro antonomo, maggiolino, tentredini, tripidi, cecidomidi e mosca della frutta ml 30-50.
Viticoltura: contro tignole ml 40-60, piralide, nottue, cicaline, afidi, sigaraio ml 30-50.
Agrumicoltura: contro afidi ml 40-50, aleurodidi e Saissetia ml 40-60, mosca degli agrumi ml 50.
Olivicoltura: contro Saissetia ml 40-60, tignola (Prays oleae) e tripide ml 50, mosca delle olive ml 50, in trattamento preventivo.
Orticoltura (asparagi, carciofo, cavoli, lattughe e simili, rucola, spinaci, cipolla, porro, cetrioli, melanzane, pomodori, peperoni, piselli, fagioli, fagiolini, fave, carote, sedani, patate, fragole): contro dorifora, altiche, cavolaia, nottue, tripidi e tentredini ml 30, afidi, aleurodidi, cimici, piralide, casside, tignola, mosca e depressaria ml 50.
Cereali:
- mais (trattamenti primaverili-estivi): contro nottue e tripidi ml 30, afidi, cimici, piralide e diabrotica ml 50.
-frumento (trattamenti primaverili-estivi): contro nottue, tripidi e afidi ml 30, cimici ml 50.
-frumento, orzo (trattamenti autunnali): contro afidi vettori del nanismo giallo 0,3-0,5 l/ha, allo stadio di 1-3 foglie, ripetendo, se necessario, il trattamento dopo 15 giorni circa.
Barbabietola da zucchero: contro altiche e nottue ml 30, cleono e lisso ml 50.
Colza: contro altiche e meligete ml 30, afidi e punteruoli ml 50.
Soia: contro nottue, cimici, tortricidi, vanessa e altica ml 30, afidi ml 50.
Tabacco: contro nottue, afidi, tripidi, pulce (Epitrix) 0,3-0,5 l/ha.
Cotone: contro nottue, piralide, tignola, cicalina, tripidi, lygus ml 30.
Funghi coltivati: contro ditteri e collemboli ml 30-50.
Medicai: contro cavallette ml 500/ha, intervenendo sui nuovi ricacci, 5-10 giorni dopo lo sfalcio. **La necessità del trattamento deve venir previamente constatata dall'Autorità regionale preposta e il trattamento deve avvenire sotto il controllo della stessa.**
Floricoltura (in campo o in serra): contro afidi, aleurodidi, tripidi, cetonie, maggiolino ml 50, tortricidi dei garofani (Bega e Epicoristode) ml 50-100.
Vivai e colture ornamentali in campo o in serra: contro afidi, cimice del platano (Corythuca), larve di lepidotteri, maggiolino ml 50.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

Pioppo:

-**in vivaio**: contro gemmaiola e tarlo vespa ml 50, criptorrinco ml 100.

-**in piantagione:** contro criptorrinco ml 100, saperda ml 200, crisomelidi defogliatori (crisomela, crisomelidi minori e stilpnotiae) ml 30-50.

Diluire la dose indicata di DECIS in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo l'agitazione. Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamento a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, cosi' da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro.
DECIS agisce per contatto e ingestione, occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato badando a che la bagnatura sia il piu' uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di Bagnante Adesivo Emelfa (ml 10-20 per 100 litri di miscela). Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti alle foglie.

COMPATIBILITA'

DECIS e' miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile e' necessario aggiungere la dose di DECIS preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicida già preparata, mantenendo l'agitazione. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU COLZA, 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU ERBA MEDICA, SOIA E COTONE, 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU CIPOLLA, PORRO E SEDANO, 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SULLE ALTRE COLTURE.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze

Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

Etichetta/foglio illustrativo

ZOLFO WG BAYER

FUNGICIDA
MICROGRANULARE IDROSOSPENSIBILE

ZOLFO WG BAYER

COMPOSIZIONE
100 g di Zolfo WG Bayer contengono:
80 g di zolfo puro (esente da selenio)
coformulanti quanto basta a 100.

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: Cerexagri S.A. – Marsiglia (Francia); BASF Netzschwefel - Fabrik - Ludwigshafen – Germania;
Officine di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); STI - Solfotecnica Italiana S.p.A.- Cotignola - (RA); Zolfindustria S.r.l. - S. Cipriano PO (PV); Cerexagri S.A. – Marsiglia (Francia)
Contenuto netto: g 100, kg 1, kg 5, kg 10, kg 20, kg 25
Registrazione Ministero Sanità n.4491del 08.10.81
Partita n.

IRRITANTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.
MODALITA' DI IMPIEGO:
Caratteristiche: il tipo della formulazione (microgranulare idrosospensibile) determina una buona attività del prodotto e permette l'impiego a basse dosi.
Colture protette: vite, arboree da frutto (come: pero, melo, pesco, nettarine, albicocco, nocciolo, mandorlo) e forestali, erbacee (come: frumento, tabacco), ortive (come:pomodoro, patata, melanzana, carciofo, asparago, fagiolo, cavolo, cavolfiore, carota, sedano, aglio, cipolla, lattuga, piselli, peperone, spinacio, ornamentali e da fiore in pieno campo.
Malattie combattute: oidio (mal bianco) in genere.
Concentrazione e dosi di impiego: in frutticoltura, g 200-300 per 100 litri di acqua; in cerealicoltura, kg 7-8/ha; in viticoltura, orticoltura e floricoltura, g 200-250 per 100 litri di acqua.
Si usi la dose più bassa in caso di temperature elevate.
Epoche di impiego: preventivamente o alla prima comparsa delle malattie, ripetendo le applicazioni a seconda dell'andamento stagionale e delle infezioni.
Metodi di impiego: distribuire il prodotto in modo da coprire interamente e uniformemente la vegetazione . Effettuare i trattamenti durante le ore fresche della giornata evitando di trattare subito dopo la pioggia.

COMPATIBILITA': lo Zolfo WG Bayer non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Diclofluanide.
Avvertenza: lo Zolfo WG Bayer deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego di olii minerali e del Captano.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': può arrecare danni alle seguenti cultivar di MELE : Black Ben Davis,Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap. PERE: Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Oliver de Serres, William, Decana del Comizio. VITE: Sangiovese. CUCURBITACEE: può essere fitotossico.
Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Conservare al riparo dall'umidità

Bayer CropScience

Edizione del: 20.01.06

Etichetta / Foglio illustrativo

DECIS® BLU

INSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

DECIS® BLU
Composizione:
100 g di prodotto contengono
Deltametrina pura 2,4 g (= 24,84 g/L)
coformulanti quanto basta a 100.

Frasi di Rischio
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione
Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione:
- Bayer CopScience S.r.l. – Filago (BG)
- SBM Formulation – St. Marcel - Marsiglia – (Francia)
- SBM Formulation – St. Marcel - Marsiglia – (Francia) / Officina di confezionamento: Diachem S.p.A. - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione n° 4522 del 2/11/1981 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: 5-10-20–25-50-100-150-250 ml / 1 - 5 L
Partita N°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilita' da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonche' dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree, rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione , edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
DECIS BLU e' un insetticida che agisce per contatto ed ingestione, con ampio spettro di attivita' contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
(ml/hl d'acqua)
- **Frutticoltura** (melo, pero, pesco, albicocco, pruno, ciliegio): contro psilla 90 ml, afide verde del melo, afide del pesco (Myzus spp., Hyalopterus spp., Brachycaudus persicae) 35-60 ml, cocciniglia di S. Jose' 60-90 ml (in trattamenti estivi contro neanidi mobili). Contro carpocapsa 35 ml, cidia e anarsia 60-80 ml, capua, cacoecia e altri tortricidi 35-60 ml, microlepidotteri del melo e del pero 35-60 ml. Contro antonomo, maggiolino, tentredini, tripici, cecidomidi e mosca della frutta 35-60 ml.
- **Viticoltura**: contro tignole 50-70 ml, piralide, nottue, cicaline, afidi, sigaraio 35-60 ml.
- **Agrumicoltura**: contro afidi 50-60 ml, aleurodidi e Saissetia 50-70 ml, mosca degli agrumi 60 ml.
- **Olivicoltura**: contro Saissetia 50-70 ml, tignola (Prays oleae) e tripide 60 ml, mosca delle olive 60 ml, in trattamento preventivo.
- **Orticoltura** (pomodoro, patata, peperone, melanzana, cavolo, cetriolo, lattughe e simili, rucola, spinacio, asparago, carciofo, pisello, fagiolino, fagiolo, fava, cipolla, porro, carota, sedano), fragola: contro dorifora, altiche, cavolaia, nottue, tripidi e tentredini: 35 ml; afidi, aleurodidi, cimici, piralide, casside, tignola, mosca e depressaria: 60 ml.
- **Cereali**
- **frumento, mais** (trattamenti primaverili-estivi): contro nottue, tripidi e afidi del frumento: 35 ml; altri afidi, cimici, piralidi: 60 ml.
- **frumento, orzo** (trattamenti autunnali): contro afidi vettori del nanismo giallo: 0,35-0,6 l/ha, allo stadio di 1-3 foglie, ripetendo, se necessario, il trattamento dopo 15 giorni circa.
- **Barbabietola da zucchero**: contro altiche e nottue 35 ml, cleono e lisso 60 ml.
- **Colza**: contro altiche, meligete, afidi, punteruoli: 0,35-0,6 l/ha.
- **Soia**: contro nottue, cimici, tortricidi, vanessa, altica, afidi: 0,35-0,6 l/ha.
- **Tabacco**: contro nottue, afidi, tripidi, pulce (Epitrix): 0,35-0,6 l/ha.
- **Cotone**: contro nottue, piralide, tignola, cicalina, tripidi, lygus: 0,35 l/ha.
- **Funghi**: contro ditteri, collemboli: 35-60 ml.

- **Medicai**: contro cavallette, intervenendo sui nuovi ricacci 5-10 giorni dopo lo sfalcio: 0,6 l/ha.
- **Pioppicoltura**
- **Pioppo in vivaio**: contro gemmaiola, tarlo vespa: 60 ml; contro criptorrinco, con trattamenti localizzati al tronco: 90-120 ml.
- **Pioppo in piantagione**: contro criptorrinco, con trattamenti localizzati al tronco: 90-120 ml; contro saperda, con trattamenti localizzati al tronco: 180-240 ml; contro crisomelidi defogliatori: crisomela, crisomelidi minori e stilpnotia: 35-60 ml.
- **Floricoltura** (in pieno campo o in serra): contro afidi, aleurodidi, tripidi, cetonie, maggiolino 60 ml, tortrici dei garofani (Bega e Epicoristode) 60-120 ml.
- **Vivai e colture ornamentali** in pieno campo o in serra: contro afidi, cimice del platano (Corythuca), larve di lepidotteri, maggiolino 60 ml.

Per preparare la miscela versare la dose stabilita di DECIS BLU nel quantitativo di acqua previsto, agitando la sospensione acquosa ottenuta.
Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale.
Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, cosi' da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro.
DECIS BLU agisce per contatto e ingestione, occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato badando a che la bagnatura sia il piu' uniforme possibile su tutta la vegetazione.
In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di un bagnante.
Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti delle foglie.

COMPATIBILITA'
DECIS BLU non e' miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile e' necessario aggiungere la dose di DECIS BLU preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicida gia' preparata, mantenendo l'agitazione.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' nocivo per gli insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU COLZA, 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU ERBA MEDICA, SOIA E COTONE, 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU CIPOLLA, SEDANO E PORRO, 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SULLE ALTRE COLTURE.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® marchio registrato

DPD 30.06.05

BITAM® 1,7 EC

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

INSETTICIDA
CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

BITAM® 1,7 EC

Composizione:
Deltametrina pura 1,7% p/p (15 g/L)
coformulanti quanto basta a 100
Contiene: nafta solvente (petrolio) aromatica leggera

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 Milano
Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
SBM Formulation – St. Marcel - 13367 Marsiglia – Francia
Bayer CropScience GmbH - Francoforte s/Meno – Germania
Isagro S.p.A. – Aprili (LT)
Registrazione n° 4523 del 2/11/1981 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: 250 – 500 ml / 1 l
Partita N°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali.
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree, rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
N.B. Diluenti (idrocarburi), possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
BITAM 1,7 EC è un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attività contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
(ml/hl d'acqua)
-**Frutticoltura** (melo, pero, pesco, albicocco, pruno, ciliegio): contro psilla 120 ml, afide verde del melo, afide del pesco (Myzus spp., Hyalopterus spp., Brachycaudus persicae) 50-80 ml, cocciniglia di S. Jose' 80-120 ml (in trattamenti estivi contro neanidi mobili).
Contro carpocapsa 50 ml, cidia e anarsia 80-120 ml, capua, cacoecia e altri tortricidi 50-80 ml, microlepidotteri del melo e del pero 50-80 ml.
Contro antonomo, maggiolino, tentredini, tripidi, cecidomidi e mosca della frutta 50-80 ml.
-**Viticoltura**: contro tignole 60-100 ml, piralide, nottue, cicaline, afidi, sigaraio 50-80 ml.
-**Agrumicoltura**: contro afidi 70-80 ml, aleurodidi e Saissetia 70-100 ml, mosca degli agrumi 80 ml.
-**Olivicoltura**: contro Saissetia 70-100 ml, tignola (Prays oleae) e tripide 80 ml, mosca delle olive 80 ml, in trattamento preventivo.
-**Orticoltura** (pomodoro, patata, peperone, melanzana, cavolo, carota, cetriolo, lattughe e simili, rucola, spinacio, asparago, carciofo, pisello, fagiolino, fagiolo, fava, cipolla, porro, sedano), fragola contro dorifora, altiche, cavolaia, nottue, tripidi, tentredini: 50 ml, contro afidi, aleurodidi, cimici, piralide, casside, tignola, mosca e depressaria: 80 ml.
- **Cereali:**
frumento, mais (trattamenti primaverili-estivi): contro nottue, tripidi e afidi del frumento 50 ml, altri afidi, cimici, piralidi 80 ml.
frumento, orzo (trattamenti autunnali): contro afidi vettori del nanismo giallo 0,5-0,8 l/ha, allo stadio di 1-3 foglie, ripetendo, se necessario, il trattamento dopo 15 giorni circa.
-**Barbabietola da zucchero:** contro altiche e nottue 50 ml, cleono e lisso 80 ml.
- **Colza**: contro altiche, meligete, afidi, punteruoli: 0,5-0,8 l/ha.
- **Soia**: contro nottue, cimici, tortricidi, vanessa, altica, afidi: 0,5-0,8 l/ha.
- **Tabacco**: contro nottue, afidi, tripidi, pulce (Epitrix): 0,5-0,8 l/ha
- **Cotone**: contro nottue, piralide, tignola, cicalina, tripidi, lygus: 0,5 l/ha
- **Funghi:** contro ditteri, collemboli: 50-80 ml
- **Medicai**: contro cavallette, intervenendo sui nuovi ricacci 5-10 giorni dopo lo sfalcio: 0,8 l/ha.
- **Pioppicoltura**
Pioppo in vivaio: contro gemmaiola, tarlo vespa: 80-150 ml; contro criptorrinco, con trattamenti localizzati al tronco: 120-150 ml.

DPD 30.06.05

Pioppo in piantagione: contro criptorrinco, con trattamenti localizzati al tronco: 120-150 ml; contro saperda, con trattamenti localizzati al tronco 225-300 ml; contro crisomelidi defogliatori: crisomela, crisomelidi minori e stilpnotia: 50-80 ml
- Floricoltura (in pieno campo o in serra): contro afidi, aleurodidi, tripidi, cetonie, maggiolino 80 ml, tortrici dei garofani (Bega e Epicoristode): 80-150 ml.
- Vivai e colture ornamentali in pieno campo o in serra: contro afidi, cimice del platano (Corythuca), larve di lepidotteri, maggiolino 80 ml.
Diluire la dose indicata di BITAM 1,7 EC in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo l'agitazione. Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro.
BITAM 1,7 EC agisce per contatto e ingestione, occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato badando a che la bagnatura sia il più uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di Bagnante Adesivo Emelfa (10-20 ml per 100 l di miscela). Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti delle foglie.

COMPATIBILITÀ'
BITAM 1,7 EC, secondo le nostre attuali conoscenze, è miscibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari a reazione neutra. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile è necessario aggiungere la dose di BITAM 1,7 EC preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicida gia' preparata, mantenendo l'agitazione.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU COLZA, 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU ERBA MEDICA, SOIA E COTONE, 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU CIPOLLA, PORRO E SEDANO, 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SULLE ALTRE COLTURE.
Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Conservare al riparo dal gelo.

® Marchio registrato
Bayer CropScience

DPD 30.06.05

POMARSOL® 50 WG

Etichetta/foglio illustrativo

ANTICRITTOGAMICO ACUPRICO - MICROGRANULARE IDROSOSPENSIBILE

POMARSOL® 50 WG
COMPOSIZIONE
100 g di Pomarsol 50 WG contengono:
49 g di tiram puro
coformulanti quanto basta a 100
FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere ne' fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa, 130 – 20156 Milano Tel 02/3972.1
Officina di produzione: Taminco N.V. Gent (Belgio); Bayer CropScience AG-Dormagen (Germania) (solo kg 1-5-10)
oppure: Officina di produzione: Taminco N.V. Gent (Belgio)
Officina di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l.-Filago (BG); STI Solfotecnica Italiana-Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Sanità n.4608 del 30/12/81
Contenuto netto: g 100-200-500; kg 1-5-10; kg 20 (solo Taminco N.V. Gent e confez. Filago)
Partita n.:

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.
ISTRUZIONI PER L'USO
Caratteristiche: fungicida organico ad azione preventiva o curativa. Non contiene metalli per cui può essere usato su colture sensibili, ad esempio, allo zinco ed al rame.
Malattie e parassiti combattuti: bolla, corineo, cancro dei rametti, nerume, ticchiolatura, ruggine, muffa grigia, vaiolatura, moniliosi, maculatura bruna del pero.
Colture: vite, pomacee (melo, pero), drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino), mandorlo, colture ortive (patata, pomodoro, peperone, melanzana, melone, cocomero, cetriolo, zucca, zucchino, cavoli, rapa, ravanello, indivia, lattuga, cicoria, radicchio, cardo carciofo, carota, sedano, finocchio, fagiolo, fava, pisello, cece, lenticchia, cipolla, aglio, porro, spinacio, asparago, fragola, bietola da costa), colture industriali di piante ornamentali e da fiore. Serve inoltre per la disinfezione delle sementi, di bulbi, tuberi, talee e per la disinfezione del terreno.
Dosi di impiego: ogni 100 litri d'acqua:

vite....................g 200-250
drupacee: trattamenti autunnali e di fine inverno.............g 500-800
trattamenti primaverili-estivi....................g 200-300
pomacee....................g 200-300
ortaggi e fiori....................g 250-300
disinfezione del terreno.................... g 5/m²
disinfezione delle sementi.................... g 5/kg

I semi trattati o residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame, ma devono essere distrutti nel rispetto delle norme vigenti sui rifiuti tossici.
Epoche di impiego: ad ogni necessità, a scopo preventivo.
Modalità d'impiego: non trattare quando la temperatura è elevata e su piante con residui di prodotti a base di rame.
COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina, con rame, chinometionato, thioquinox, difolatan. Si sconsigliano miscele con metilparathion e methidathion.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: non deve essere impiegato sulle cultivar di pero: Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna.
Nocività a seguito del trattamento: il prodotto è nocivo per le api e per gli altri insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame in genere
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto
Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco

Bayer CropScience

DPD 30.06.05
® marchio registrato

Rhodax

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro Peronospora ed Escoriosi della vite
Polvere bagnabile

Rhodax

IRRITANTE

Composizione:
Fosetil Alluminio 40 g
Mancozeb 24 g
Coformulanti q.b. a 100 g

Frasi di Rischio:
Irritante per le vie respiratorie. Rischio di gravi lesioni oculari.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'Autorizzazione:
Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione:
AgriFormula s.r.l., Paganica (AQ)
SBM Formulation – St. Marcel – Marsiglia – (Francia)
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Registrazione n. 4705 Ministero della Sanità del 24/2/1982

Contenuto netto: Kg 1 - 5 - 10 – 25

Partita n.: *

Norme precauzionali :
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
FOSETIL ALLUMINIO 40 %
MANCOZEB 24 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Fosetil Alluminio: --
Mancozeb: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B.- Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE
Il prodotto é un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistematicità si manifesta in modo soprattutto ascendente.
Nei confronti della Peronospora se ne consiglia l'impiego come preventivo pur possedendo il prodotto anche efficacia curativa.
Tale attività é più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita.
La grande sistematicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
Queste caratteristiche, unite alla sua grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta contro la Peronospora della vite con interventi distanziati a cadenza fissa. Il prodotto possiede anche azione sulla Escoriosi.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Peronospora: dose g 350 per 100 litri d'acqua; il primo trattamento contro la Peronospora va effettuato quando i germogli della vite sono lunghi cm 10. Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo. Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni, fino alla fase di allegagione compresa.
Dall'allegagione alla raccolta continuare la lotta con prodotti contenenti rame.
Escoriosi: Dose g 350 per 100 litri d'acqua; effettuare due trattamenti: il primo nella fase di "gemma mossa" (fase D del Baggiolini) ed il secondo nella fase di foglie formate (fase E del Baggiolini).

DA NON IMPIEGARE IN SERRA.
DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'

Il prodotto é compatibile con BENLATE, KARATHANE LC, KARATHANE WD, IPRODIAL, SULFOSOL 80, LANNATE 25, LANNATE L, DELFOS M 20, FITOFOS 20, OVOTEK, SUMIFOS, EMMATON 50, ZOLONE 25 PB, ZOLONE L 25.
Per miscele con altri prodotti si consigliano saggi preliminari.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso é pericoloso.
Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

Alstar

Fungicida sistemico

Polvere bagnabile

ALSTAR

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:
g 80 di Fosetil Alluminio puro
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'Autorizzazione
Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa, 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione
AgriFormula S.r.l. - Paganica (AQ)
Bayer CropScience France - Villefranche – Francia
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Registrazione N. 4709 Ministero della Sanità del 24.02.1982

Contenuto Netto: g 100 - 150 - 500 / Kg 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente.
Tale attività è tanto più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita.
La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

ORTICOLTURA :

Fragola: contro Peronospora (*Phytophthora cactorum e fragariae*). L'immersione delle piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 irrorazioni alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immersione delle piante prima del trapianto in una poltiglia a 250 g/hl d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di g 0,5 di formulato per pianta.
Lattuga: contro *Bremia lactucae* effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl d'acqua (avendo cura di distribuire almeno 3 Kg di prodotto per ettaro). Su lattuga romana effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici la lattuga può essere sensibile al prodotto.
Melone: contro *Pseudoperonospora cubensis* effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl d'acqua ogni 14 giorni.
Cocomero, Cetriolo, Spinacio: contro Peronospora, effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl d'acqua (avendo cura di distribuire, come minimo, 3 Kg di prodotto per ettaro).
Carciofo: contro *Bremia lactucae* a 200-300 g/hl d'acqua.

FRUTTICOLTURA :

Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo: contro *Phytophthora* spp. effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl d'acqua, utilizzando dieci litri di poltiglia per pianta.
I trattamenti alla vegetazione possono venire integrati da pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche). Questa pratica diventa indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida.
Melo e Pero: contro Ticchiolatura, trattamenti preventivi a 150-250 g/hl di acqua; particolarmente nelle fasi pre-fiorali e immediatamente successive all'allegagione si consiglia l'associazione con fungicidi di copertura (rame escluso) o con Dodina.
Pero: contro Maculatura bruna (*Stemphyllium* sp), *Erwinia amylovora* (colpo di fuoco), trattamenti preventivi a 250 g/hl d'acqua.
La difesa contro la Maculatura bruna può essere anche attuata con un programma di interventi ripetuti a cadenza settimanale nel periodo aprile-giugno alla dose di g 50/hl in associazione a fungicidi di copertura.
Contro *Pseudomonas syringae* (gemme nere), g 200-250/hl in 3-4 trattamenti nel periodo aprile-giugno, oppure g 50/hl in trattamenti a cadenza settimanale nel medesimo periodo.
Melo, Pero, Pesco, Actinidia: contro *Phytophthora cactorum.*
A) effettuare un trattamento sulla vegetazione, una volta al mese, dalla sfioritura fino a quaranta giorni dalla raccolta, con 250 g/hl d'acqua.
B) su pianta già debilitata dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida: effettuare un'innaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, con litri 1-2 per pianta di una poltiglia costituita da 5 Kg di Alstar per 100 litri d'acqua.
Melo, Cotogno e rosacee ornamentali: contro *Erwinia amylovora* (colpo di fuoco) trattamenti preventivi a g 250/hl d'acqua
Su vivai di fruttiferi: effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl di acqua con cadenza mensile.
Su vivai di agrumi: impiegare la dose di 400 g/hl d'acqua ogni 60 giorni.
Vite: contro Peronospora, a 250 g/hl d'acqua. Si consiglia sempre l'associazione con formulati di copertura (rame escluso).
COLTURE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO ED IN SERRA :
Contro *Phytophthora cinnamoni* di *Chamaecyparis* e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee, Poinsettia, St. Paulia e Crisantemo, effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con g 5 - 10 di formulato per m^2 una volta al mese in primavera.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto può avere dei problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame e alcuni concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Non effettuare miscele con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta.

AVVERTENZA:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti :
15 giorni prima del raccolto su arancio, limone, mandarino, pompelmo, carciofo, cetriolo, cocomero, melone, lattuga, spinacio
30 giorni prima del raccolto su fragola
40 giorni prima del raccolto su melo, pero, cotogno, pesco, actinidia, vite

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze - Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

ALIETTE®

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Fungicida sistemico
Microgranuli Autodispersibili

ALIETTE®

COMPOSIZIONE
g 100 di prodotto contengono:
g 80 di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione:
Bayer CropScience France - Villefranche - France
Bayer CropScience S.A. - Cheste (Valencia) - Spagna

Officine di Confezionamento :
AgriFormula S.r.l. - Paganica (AQ)
Scotts France SAS - Bourth - Francia
I.R.C.A. Service S.r.l. - Fornovo S. Giovanni (BG)
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Torre S.r.l. - Montalcino - Torrenieri (SI)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE)
L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI)
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Registrazione n. 4710 del 24.02.1982 del Ministero della Sanità

Contenuto Netto: g 50 - 150 – 500; Kg 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente.
Tale attività è tanto più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita.
La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
ORTICOLTURA :
Fragola: contro Peronospora (*Phytophthora cactorum* e *fragariae*). L'immersione delle piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 irrorazioni alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immersione delle piante prima del trapianto in una poltiglia a 250 g/hl d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di g 0,5 di formulato per pianta.
Lattuga: contro *Bremia lactucae* effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl d'acqua (avendo cura di distribuire almeno 3 Kg di prodotto per ettaro). Su lattuga romana effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici la lattuga può essere sensibile al prodotto.
Melone: contro *Pseudoperonospora cubensis* effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl d'acqua ogni 14 giorni.
Cocomero, Cetriolo, Spinacio: contro Peronospora, effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl d'acqua (avendo cura di distribuire, come minimo, 3 Kg di prodotto per ettaro).
Carciofo: contro Bremia lactucae a 200-300 g/hl d'acqua.
FRUTTICOLTURA :
Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo: contro *Phytophthora* spp. effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl d'acqua, utilizzando dieci litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione possono venire integrati da pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche). Questa pratica diventa indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida.
Melo e Pero: contro Ticchiolatura, trattamenti preventivi a 150-250 g/hl di acqua; particolarmente nelle fasi pre-fiorali e immediatamente successive all'allegagione si consiglia l'associazione con fungicidi di copertura (rame escluso) o con Dodina.
Pero: contro Maculatura bruna (*Stemphyllium* sp), *Erwinia amylovora* (colpo di fuoco), trattamenti preventivi a 250 g/hl d'acqua.
La difesa contro la Maculatura bruna può essere anche attuata con un programma di interventi ripetuti a cadenza settimanale nel periodo aprile-giugno alla dose di g 50/hl in associazione a fungicidi di copertura (Thiram, Iprodione).
Contro *Pseudomonas syringae* (gemme nere), g 200-250/hl in 3-4 trattamenti nel periodo aprile-giugno, oppure g 50/hl in trattamenti a cadenza settimanale nel medesimo periodo.
Melo, Pero, Pesco, Actinidia: contro *Phytophthora cactorum*.
A) effettuare un trattamento sulla vegetazione, una volta al mese, dalla sfioritura fino a quaranta giorni dalla raccolta, con 250 g/hl d'acqua.
B) su pianta già debilitata dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida: effettuare un'innaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, con litri 1-2 per pianta di una poltiglia costituita da 5 Kg di Aliette per 100 litri d'acqua.
Melo, Cotogno e rosacee ornamentali: contro *Erwinia amylovora* (colpo di fuoco) trattamenti preventivi a g 250/hl d'acqua.
Su vivai di fruttiferi: effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl di acqua con cadenza mensile.

Su vivai di agrumi: impiegare la dose di 400 g/hl d'acqua ogni 60 giorni.
Vite: contro Peronospora, a 250 g/hl d'acqua. Si consiglia sempre l'associazione con formulati di copertura (rame escluso).
COLTURE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO ED IN SERRA :
Contro *Phytophthora cinnamoni* di *Chamaecyparis* e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee, Poinsettia, St. Paulia e Crisantemo, effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con g 5 - 10 di formulato per mq. una volta al mese in primavera.
COMPATIBILITA'
Il prodotto può avere dei problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame e alcuni concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Non effettuare miscele con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta.
AVVERTENZA:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: non distribuire più di 10 Kg di prodotto fitosanitario per ettaro per anno

Sospendere i trattamenti :
15 giorni prima del raccolto su arancio, limone, mandarino, pompelmo, carciofo, cetriolo, cocomero, melone, lattuga, spinacio;
30 giorni prima del raccolto su fragola ;
40 giorni prima del raccolto su melo, pero, cotogno, pesco, actinidia, vite.

Avvertenza:
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® Marchio registrato

PEROPAL®

ACARICIDA SPECIFICO

per irrorazioni in frutticoltura (melo e susino) e su piante ornamentali in pieno campo ed in serra.

PEROPAL®
composizione:
100 g di Peropal contengono:
25 g di azociclotin puro
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per ingestione. Molto tossico per inalazione. Irritante per le vie respiratorie e la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officine di produzione : Bayer CropScience S.r.l Filago (BG);
Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania);
STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 4719 del 3/3/82
Contenuto netto: kg 1-5
Partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose, cefalea, tinnitus, vertigini, dolori lombari e addominali, insufficienza respiratoria e circolatoria, interessamento del SNC e periferico con nevralgie e paralisi.
Terapia: sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Dose d'impiego: 0,1-0,14 % (100-140 g in 100 litri di acqua) contro gli acari in frutticoltura (melo e susino) e su piante ornamentali in pieno campo ed in serra impiegando la dose più elevata in caso di forti attacchi.
Epoca e modo di impiego: intervenire alla prima comparsa degli acari e ripetere il trattamento in caso di reinfestazione. È necessario bagnare uniformemente tutta la vegetazione.
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Compatibilità':il prodotto è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. Non miscelare con antiparassitari a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: non trattare le rose in serra.

NOCIVITÀ: è nocivo per animali domestici, bestiame ed insetti utili.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto per melo e susino.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette

istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. - Conservare al riparo dall'umidità.

Per lavorazioni agricole entro le 96 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore.

Bayer CropScience DPD 30.06.05

® Marchio registrato

PEROPAL®

ACARICIDA SPECIFICO

per irrorazioni in frutticoltura (melo e susino) e su piante ornamentali in pieno campo ed in serra.
POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

PEROPAL®

composizione:
100 g di Peropal contengono:
25 g di azociclotin puro
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per ingestione. Molto tossico per inalazione. Irritante per le vie respiratorie e la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

MOLTO TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Officine di produzione : Bayer CropScience S.r.l Filago (BG);
Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania);
STI - Solfotecnica Italiana S.p.A.- Cotignola (RA)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 4719 del 3/3/82
Contenuto netto: 500 g; 1 kg; 1 kg (2 x 500 g; 4 x 250 g);
5 kg (5 x 1 kg); kg 10 (10 x 1 kg); kg 12 (12 x 1 kg)
Partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante per cute e mucose, cefalea, tinnitus, vertigini, dolori lombari e addominali, insufficienza respiratoria e circolatoria, interessamento del SNC e periferico con nevralgie e paralisi.
Terapia: sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Dose d'impiego: 0,1-0,14 % (100-140 g in 100 litri di acqua, pari a 5-7 sacchetti da 1 kg in 5000 litri di acqua)* contro gli acari in frutticoltura (melo e susino) e su piante ornamentali in pieno campo ed in serra impiegando la dose più elevata in caso di forti attacchi.
Epoca e modo di impiego: intervenire alla prima comparsa degli acari e ripetere il trattamento in caso di reinfestazione. E' necessario bagnare uniformemente tutta la vegetazione.
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Compatibilita': il prodotto è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. Non miscelare con antiparassitari a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non trattare le rose in serra.

NOCIVITA': è nocivo per animali domestici, bestiame ed insetti utili.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto per melo e susino.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. - Conservare al riparo dall'umidità.

Per lavorazioni agricole entro le 96 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore.

* oppure:
- 5-7 sacchetti da g 500 in 2500 litri di acqua
- 5-7 sacchetti da g 250 in 1250 litri di acqua

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI
PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

LEBAYCID®

INSETTICIDA
per applicazioni con esche su olivo

LEBAYCID®
COMPOSIZIONE:
100 g di Lebaycid contengono:
48,7 g di fenthion puro (=500 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.
contiene xilene
Frasi di rischio
Infiammabile. Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Tossico per inalazione. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibilità di effetti irreversibili.
Consigli di prudenza
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – 20156 Milano – Viale Certosa 130 – tel 02 3972.1
Officine di produzione: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
(solo 1-5 l)
Bayer CropScience S.r.l. Filago (BG)
Registrazione Ministero della Sanità n.4749 del 10/05/82
Contenuto netto: 500 ml; 1-5 l
Partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi sintomi di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consulare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Olivo: trattamenti con esche proteiche
Mosca delle olive: si eseguono 3-4 trattamenti, distanziandoli di 20-30 giorni, iniziando alla comparsa degli adulti quando l'oliva comincia ad essere recettiva. È necessario distribuire ml 300 di Lebaycid + ml 600-1000 di esca proteica Buminal per ettaro in 50-300 litri di acqua a seconda dell'apparecchiatura usata, delle dimensioni dell' impianto e della forma di allevamento. Il trattamento deve essere effettuato preventivamente trattando una parte limitata della chioma, a strisce su file alterne. Ripetere il trattamento in caso di pioggia.

COMPATIBILITÀ: il Lebaycid è miscibile oltrechè con esca proteica Buminal, anche con gli antiparassitari a reazione neutra ed alcalina; quando però si tratta di polisolfuri o di poltiglia bordolese è consigliabile usare al più presto possibile la miscela.

NOCIVITÀ: il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per gli insetti utili, gli animali domestici e il bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. - Conservare al riparo dal gelo

BAYER Bayer CropScience

® marchio registrato DPD 30.06.05

Sevin® flow

Insetticida polivalente
Sospensione concentrata (SC)

Sevin® flow

Composizione:
Carbaril puro 43,6 g (= 480 g/l)
(esente da ß-naftolo)
Coformulanti q.b. a 100 g

Frasi di Rischio
Nocivo per ingestione. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.
Altamente tossico per gli organismi acquatici.

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
Non gettare i residui nelle fognature.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Registrazione n. 4972 Ministero della Sanità del 15/10/1982

Officine di Produzione: AgriFormula Srl., Paganica (AQ); Isagro S.p.A. – Aprilia (LT);
Bayer CropScience France, Villefranche – Francia

Officina di Confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Contenuto netto: 250 - 500 ml / 1 - 5 - 10 l

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Carbaril: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.

Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.

Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime. **Consultare un Centro Antiveleni**

MODALITA' DI IMPIEGO

Dosi per 100 litri d'acqua:
Olivo: contro Cocciniglie (Saissetia ed altre), 200-300 ml; contro Liotripide, Rinchite, Oziorrinco, 200-250 ml; contro Tignola, Margaronia, 150-200 ml.
Vite: contro Tignole, Piralide, Sigaraio, Anomala, Cicaline, 150-200 ml.
Agrumi (arancio, mandarino, mandarancio, pompelmo, limone): Cocciniglie (Saissetia ed altre), 200-300 ml; Tignole, 150-200 ml.
Pomacee (melo e pero): Cocciniglie, Antonomo, 200-250 ml; Cacoecia, Eulia, Capua, Ricamatrici, 150-200 ml; Carpocapsa, 125-150 ml; Diradamento (10-25 giorni dopo la piena fioritura), 250 ml.
Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino, mandorlo): contro Cydia, Anarsia, Cocciniglie, 200-250 ml; contro Campa e Capnode del mandorlo, bombice, 150-200 ml.
Granoturco: contro Piralide, Nottua gialla, 200-300 ml; contro Sesamia, Caradrina, 150-200 ml.
Leguminose da foraggio (medica, trifoglio): contro Apion, Sminturo, Fitonomo, Misurino, Oziorrinco, Sputacchine, 200-250 ml.
Barbabietola da zucchero: contro Lisso, Cleono, Altica, Cassida, Nottue, Caradrina, 200-250 ml.
Patata, Pomodoro, melanzana: contro Dorifora, 150-200 ml; contro Nottue 300 ml.
Fagiolo, pisello: contro Fitonomo, Larve di Lepidotteri, 200-250 ml.
Cavoli, Rapa: contro Cavolaia, Tignole, Punteruolo, Altica, 150-200 ml; contro Mamestra, Nottue, 300 ml.
Ravanello, radicchio: contro Altica, 200 ml.
Fragole: contro Antonomo, 250-300 ml.
Aglio: contro Tignola, 200-250 ml.
Asparagi: contro Criocera, 200-250 ml.
Carciofo: contro Apion, Vanessa, Altica, Cassida, 200-250 ml.
Piante ornamentali e da fiore: contro Bega del garofano ed altri tortricidi, 150-200 ml; contro Cocciniglie, 200-250 ml.
Pioppo: contro Stilpnozia, Crisomela, 200 ml.
Selvicoltura: contro Limantria, 200-250 ml.

EPOCHE D'IMPIEGO

Alla prima comparsa dei parassiti e ad ogni eventuale reinfestazione. Il SEVIN FLOW può essere applicato con qualunque tipo di spruzzatore per trattamenti sia ad alto che a basso volume. La formulazione é particolarmente adatta per applicazioni a basso volume diluita in acqua in proporzione non superiore a una parte di prodotto in venti parti d'acqua.

COMPATIBILITA'

Il prodotto é compatibile con i più comuni prodotti fitosanitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto

NOCIVITA'

Il prodotto é tossico per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

Etichetta/Foglio illustrativo

PROCLAIM® COMBI

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

per la lotta contro ticchiolatura delle pomacee e cancri rameali del pesco, con azione collaterale contro mal bianco del melo, contro monilia, bolla, cancro e oidio delle drupacee (pesco, nettarine, percoche, albicocco), ticchiolatura, oidio (mal bianco), ruggini delle piante ornamentali e da fiore in pieno campo ed in serra

PROCLAIM® COMBI
COMPOSIZIONE:
100 g di Proclaim Combi contengono:
8 g di bitertanolo puro
16 g di dodina pura
coformulanti quanto basta a 100.

Frasi di Rischio
Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officina di produzione: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania) (tranne 500 g); Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); STI - Solfotecnica Italiana - Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Sanità n. 5401 del 30.06.83
Contenuto netto: 20-50-100-200-250-500 g ; 1-5-10-25 kg (solo per Bayer CropScience AG-Dormagen)
Partita n.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Bitertanolo 8 %, Dodina 16 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione
BITERTANOLO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
DODINA: Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Drupacee (pesco, nettarine, percoche): contro bolla (Taphrina deformans) 0,25-0,3% (250-300 g in 100 litri d'acqua) effettuando trattamenti in autunno in concomitanza con la caduta foglie e successivamente nelle fasi di ripresa vegetativa, bottoni rosa e scamiciatura-accrescimento frutticini.
Tali trattamenti hanno anche efficacia contro fusicocco e azione collaterale contro Cytospora.
Per pesco, nettarine, percoche e albicocco: contro monilia: 0,2-0,25% (200-250 g in 100 litri d'acqua), effettuando 2-3 trattamenti prima, durante e dopo la fioritura, ripetendoli alla comparsa dei primi sintomi della malattia ad intervalli di 6-8 giorni, impiegando la dose più elevata e gli intervalli più brevi nei periodi climatici più favorevoli allo sviluppo della malattia.
Contro oidio: 0,15-0,2% (150-200 g in 100 litri d'acqua) effettuando trattamenti preventivi con inizio alla fase della scamiciatura dei frutti alla cadenza di 7-10 gg. circa; in caso sia necessario intervenire con infezione in atto, elevare la dose allo 0,22% (220 g in 100 litri di acqua).
Pomacee (melo e pero): contro ticchiolatura con azione collaterale contro mal bianco del melo: 0,25-0,3% (250-300 g in 100 litri d'acqua) eseguendo gli interventi ad intervalli di 7-8 giorni a partire dalla fase di apertura delle gemme fino alla fase di frutto-noce e successivamente ad intervalli di 8-12 giorni in dipendenza dall'andamento climatico. Usare la dose superiore in caso di andamento climatico particolarmente favorevole alla malattia.
Piante ornamentali e da fiore in pieno campo ed in serra: contro ticchiolatura e ruggine della rosa e delle altre piante ornamentali e da fiore: 0,2-0,25% (200-250 g in 100 litri d'acqua). Contro oidio e mal bianco: 0,3% (300 g in 100 litri d'acqua).
N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale. Diluire il prodotto in una quantità d'acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione.

COMPATIBILITÀ: Proclaim Combi è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. Preparare le eventuali miscele poco prima dell'impiego. Non è compatibile con i Clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina; non è consigliabile miscelarlo con Naftene, Dimetoato, Metilazinfos, DDVP; le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con oli minerali possono dar luogo a scarsa sospensività; evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0°C.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: è sconsigliabile l'impiego del prodotto sulle varietà sensibili alla dodina (Golden Delicious per esempio).
Nocività: il prodotto è tossico per gli animali domestici e il bestiame.
Avvertenze: da non impiegare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DPD 30.06.05

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare all'asciutto

Bayer CropScience

® marchio registrato

DPD 30.06.05

PROCLAIM® COMBI

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE
per la lotta contro ticchiolatura delle pomacee e cancri rameali del pesco, con azione collaterale contro mal bianco del melo, contro monilia, bolla, cancro e oidio delle drupacee (pesco, nettarine, percoche, albicocco), ticchiolatura, oidio (mal bianco), ruggini delle piante ornamentali e da fiore in pieno campo ed in serra
POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

PROCLAIM® COMBI
COMPOSIZIONE:
100 g di Proclaim Combi contengono:
8 g di bitertanolo puro
16 g di dodina pura
coformulanti quanto basta a 100.

Frasi di Rischio
Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

IRRITANTE

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento:
- Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
- STI - Solfotecnica Italiana-Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5401 del 30.06.83
Contenuto netto: 20 g; 50 g; 100 g; 100 g (2x50 g; 5x20 g); 150 g; 200 g; 250 g; 500 g; 1 kg;1 kg (5x200 g; 4x250 g; 2x500 g); 5 kg (5x1 kg; 10x500 g); 10 kg (10x1 kg); 12 kg (12x1 kg); 20 kg (20x1 kg)
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Bitertanolo 8 %, Dodina 16 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione
BITERTANOLO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
DODINA: Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Drupacee (pesco, nettarine, percoche): contro bolla (Taphrina deformans) 0,25-0,3% (250-300 g in 100 litri d'acqua, pari a un sacchetto da 1 kg in 400-330 litri d'acqua)* effettuando trattamenti in autunno in concomitanza con la caduta foglie e successivamente nelle fasi di ripresa vegetativa, bottoni rosa e scamiciatura-accrescimento frutticini.
Tali trattamenti hanno anche efficacia contro fusicocco e azione collaterale contro Cytospora.
Per pesco, nettarine, percoche e albicocco: contro monilia: 0,2-0,25% (200-250 g in 100 litri di acqua, pari a un sacchetto da 1 kg in 500-400 litri d'acqua)**, effettuando 2-3 trattamenti prima, durante e dopo la fioritura, ripetendoli alla comparsa dei primi sintomi della malattia ad intervalli di 6-8 gg. impiegando la dose più elevata e gli intervalli più brevi nei periodi climatici più favorevoli allo sviluppo della malattia.

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI
PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

Contro oidio: 0,15-0,2% (150-200 g in 100 litri d'acqua, pari a un sacchetto da 1 kg in 650-500 litri d'acqua)*** effettuando trattamenti preventivi con inizio alla fase della scamiciatura dei frutti alla cadenza di 7-10 gg. circa; in caso sia necessario intervenire con infezione in atto, elevare la dose allo 0,22% (220 g in 100 litri d'acqua, pari a un sacchetto da 1 kg in 450 litri d'acqua)****
Pomacee (melo e pero): contro ticchiolatura con azione collaterale contro mal bianco del melo: 0,25-0,3% (250-300 g in 100 litri d'acqua, pari a un sacchetto da 1 kg in 400-330 litri d'acqua)* eseguendo gli interventi ad intervalli di 7-8 giorni a partire dalla fase di apertura delle gemme fino alla fase di frutto-noce e successivamente ad intervalli di 8-12 giorni in dipendenza dall'andamento climatico. Usare la dose superiore in caso di andamento climatico particolarmente favorevole alla malattia.
Piante ornamentali e da fiore in pieno campo ed in serra: contro ticchiolatura e ruggine della rosa e delle altre piante ornamentali e da fiore: 0,2-0,25% (200-250 g in 100 litri d' acqua, pari a un sacchetto da 1 kg in 500-400 litri d'acqua)**. Contro oidio e mal bianco: 0,3% (300 g in 100 litri di acqua, pari a un sacchetto da 1 kg in 330 litri d'acqua)*****.
N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale. Diluire il prodotto in una quantità d'acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione.
COMPATIBILITA': Proclaim Combi è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. Preparare le eventuali miscele poco prima dell'impiego. Non è compatibile con i Clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina; non è consigliabile miscelarlo con Naftene, Dimetoato, Metilazinfos, DDVP; le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con oli minerali possono dar luogo a scarsa sospensività; evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0°C.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: è sconsigliabile l'impiego del prodotto sulle varietà sensibili alla dodina (Golden Delicious per esempio).
Nocività: il prodotto è tossico per gli animali domestici e il bestiame.
Avvertenze: Da non impiegare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.
Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto
Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare all'asciutto

oppure:
*
- pari a un sacchetto da 20 g in 8-6 7 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da 50 g in 17-20 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da 100 g in 40-33 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da 150 g in 60-50 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da 200 g in 80-65 litri d' acqua
- pari a un sacchetto da 250 g in 100-80 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da 500 g in 200-165 litri d'acqua

**
- pari a un sacchetto da 20 g in 10-8 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da 50 g in 25-20 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da 100 g in 50-40 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da 150 g in 75-60 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da 200 g in 100-80 litri d' acqua
- pari a un sacchetto da 250 g in 125-100 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da 500 g in 250-200 litri d'acqua

***
- pari a un sacchetto da 20 g in 13-10 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da 50 g in 33-25 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da 100 g in 67-50 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da 150 g in 100-75 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da 200 g in 130-100 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da 250 g in 160-125 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da 500 g in 330-250 litri d'acqua

****
- pari a un sacchetto da 20 g in 9 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da 50 g in 23 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da 100 g in 45,5 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da 150 g in 68 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da 200 g in 90 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da 250 g in 110 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da 500 g in 225 litri d'acqua

*****
- pari a un sacchetto da 20 g in 6.7 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da 50 g in 16,7 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da 100 g in 33 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da 150 g in 50 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da 200 g in 65 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da 250 g in 80 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da 500 g in 150 litri d'acqua

Bayer CropScience

DPD 30.06.05
® marchio registrato

BAYCOR®

FUNGICIDA ORGANICO

per la lotta contro ticchiolatura delle pomacee con azione collaterale contro mal bianco del melo, contro monilia ed oidio delle drupacee (pesco, nettarine, percoche, susino, ciliegio, albicocco), cercospora della barbabietola da zucchero, ruggini e mal bianco di alcuni ortaggi (cetriolo e zucchino), ticchiolatura e mal bianco e ruggini delle piante ornamentali e da fiore in pieno campo ed in serra.

Concentrato emulsionabile

BAYCOR®

COMPOSIZIONE:

g 100 di BAYCOR contengono:

g 27,7 di Bitertanolo puro (= 300 g/l)

Coformulanti quanto basta a 100.

FRASI DI RISCHIO

Rischio di gravi lesioni oculari.

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature.

Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – Milano – 02/3972.1

Officine di Produzione: Bayer CropScience AG - Dormagen (GERMANIA) (tranne l 1)
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Registrazione Ministero della Sanità N. 5402 del 30/06/83

Contenuto netto: l 1-5-25

PARTITA N.:

Norme precauzionali

Si raccomanda l'uso di maschere durante l'impiego del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Pomacee (melo e pero): contro ticchiolatura (con azione collaterale contro mal bianco del melo): 0,06-0,08% (60-80 ml in 100 l d'acqua) in miscela con fungicidi tradizionali a dose ridotta, e precisamente con Fungilon D alla dose di 60-75 g/hl, oppure con Pomarsol Zf alla dose di 190-225 g/hl, oppure con Captan Bayer alla dose di 190-225 g/hl, o con Antracol alla dose di 150-180 g/hl, eseguendo gli interventi ad intervalli di 7-8 giorni a partire dalla fase di apertura delle gemme fino alla fase di frutto-noce e successivamente ad intervalli di 8-12 giorni in dipendenza dall'andamento climatico. Usare la dose superiore in caso di andamento climatico particolarmente favorevole alla malattia. Allo scopo di ottenere i migliori risultati, scegliere il fungicida tradizionale da aggiungere al Baycor, tenendo presente l' andamento climatico e le varieta' da difendere.

Drupacee (pesco, nettarine, percoche, susino, ciliegio, albicocco): contro monilia: 0,08-0,1% (80-100 ml in 100 litri di acqua), effettuando 2-3 trattamenti prima, durante e dopo la fioritura, ripetendoli alla comparsa dei primi sintomi della malattia ad intervalli di 6-8 gg. impiegando la dose piu' elevata e gli intervalli piu' brevi nei periodi climatici piu' favorevoli allo sviluppo della malattia.

Conto oidio: 0,04% (40 ml in 100 l di acqua) effettuando trattamenti preventivi con inizio alla fase della scamiciatura dei frutti alla cadenza di 7-10 gg. circa; in caso sia necessario intervenire con infezione in atto, elevare la dose allo 0,06% (60 ml in 100 l di acqua).

Ortaggi (zucchino e cetriolo): contro ruggini e mal bianco:

a) TRATTAMENTI PREVENTIVI: 0,06 % (60 ml in 100 l di acqua);

b) TRATTAMENTI CURATIVI: 0,06-0,08% (60-80 ml in 100 l di acqua) effettuando 2-3 trattamenti ad intervalli di 7-8 gg., effettuando il primo all'inizio dell'attacco.

Barbabietola da zucchero: contro cercospora ed oidio: 1,2-2 l/ha diluiti in 600-800 l di acqua eseguendo 2-4 trattamenti, con inizio alla comparsa dei primi sintomi e distanziandoli ad intervalli non superiori a 3-4 settimane a seconda delle condizioni climatiche piu' o meno favorevoli allo sviluppo della malattia.

Piante ornamentali e da fiore in pieno campo ed in serra: contro oidio (mal bianco), e ruggine della rosa e delle altre piante ornamentali e da fiore: 0,06-0,08% (60-80 ml in 100 l di acqua). Per trattamenti curativi: 0,08-0,12% (80-120 ml in 100 l di acqua).

N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale. Diluire il prodotto in una quantita' d'acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione.

COMPATIBILITA': il Baycor puo' essere miscelato con fungicidi ed insetticidi a reazione neutra.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per ortaggi (cetriolo e zucchino), 21 giorni prima del raccolto per pomacee e drupacee (pesco, nettarine, percoche, susino, ciliegio, albicocco), 30 giorni prima del raccolto per barbabietola da zucchero.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare al riparo dal gelo

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® Marchio registrato

MORKIT CONCIA SEMI

etichetta/foglio illustrativo

prodotto ad azione repellente per la protezione delle sementi di cereali, barbabietola da zucchero ed ortaggi da danni provocati da corvi e passeracei in genere

MORKIT CONCIA SEMI
Composizione
100 g di Morkit Concia Semi contengono:
25 g di Antrachinone puro
coformulanti quanto basta a 100.
FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione: Bayer CropScience AG-Dormagen (Germania)(solo Kg 1)
Bayer CropScience S.r.l.-Filago (BG)
STI Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n 5420 del 14.09.83
Contenuto netto: g 100, 200; kg 1
Partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi di impiego: da 300 g a 800 g di Morkit Concia Semi ogni 100 kg di semente:
per **cereali:** 300-500 g/q; per **mais e barbabietola da zucchero**: 600-800 g/q; per **ortaggi** 300-500 g/q.

Modo di impiego: il Morkit Concia Semi deve essere miscelato alla semente prima o durante la semina; per assicurarsi l'adesività al seme, inumidire preventivamente la semente.

Avvertenza: i semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana, nè del bestiame.
Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

Compatibilità: il Morkit Concia Semi può essere impiegato anche con fungicidi o insetticidi.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Conservare al riparo dall'umidità.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

ANTRACOL® RAMATO MICRO

FUNGICIDA CUPRO ORGANICO
per trattamenti liquidi su vite, pomodoro solo fino alla prima fioritura, e garofano in pieno campo
Polvere Bagnabile

ANTRACOL® RAMATO MICRO
COMPOSIZIONE:
g 100 di ANTRACOL RAMATO MICRO contengono:
g 10 di Propineb puro
g 20 di Rame metallo (sotto forma di ossicloruro)
Coformulanti quanto basta a 100.

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – Milano – 02/3972.1
Officine di Produzione: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
STI Solfotecnica Italiana-Cotignola (RA)(solo kg 1-5)

Registrazione Ministero della Sanità N. 5503 del 3/10/83

Contenuto netto: kg 1-5-10

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
PROPINEB 10 %, RAME METALLO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO) 20 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
PROPINEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione; depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
RAME OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi.
Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi di impiego: 0,3-0,4 % (300-400 g in 100 l di acqua) contro la peronospora della vite, l'alternariosi, la peronospora, la ticchiolatura e la septoriosi del pomodoro (solo fino alla prima fioritura), la ruggine del garofano in pieno campo.
N.B.: a) Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
b) La dose maggiore deve essere usata in caso di sfavorevole andamento stagionale.
Divieti d'impiego:
- Divieto d'impiego in serra.
- Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

COMPATIBILITA': l'Antracol Ramato Micro e' miscibile con quasi tutti gli antiparassitari a reazione neutra.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': in caso di andamento climatico freddo e piovoso e' sconsigliabile impiegare il prodotto su viti in fioritura.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare all'asciutto

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® Marchio registrato

R6 ERRESEI® BORDEAUX

Fungicida sistemico e di copertura ad azione polivalente per la difesa della vite, delle colture orticole e frutticole sottoelencate dalle malattie fungine, con attività complementare di contenimento sulle batteriosi.

Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

R6 ERRESEI® BORDEAUX

Composizione:

g 100 di prodotto contengono :
g 25 di Fosetil Alluminio puro
g 25 di Rame metallo puro
(da Rame Ossicloruro g 42)
Coformulanti q.b. a 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio

Irritante per gli occhi
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
Non gettare i residui nelle fognature.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione: Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG);
Bayer CropScience France - Villefranche - Francia
SBM Formulation – St. Marcel – 13367 Marsiglia Francia;
AgriFormula s.r.l. - Paganica (AQ); Isagro S.p.A. – Aprilia (LT);
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A., Cotignola (RA)

Registrazione n. 5512 Ministero della Sanità del 10/10/1983

Contenuto netto: Kg 1 (200 g x 5), Kg 2 (400 g x 5), Kg 8 (2 Kg x 4), Kg 10 (2 Kg x 5), Kg 10 (1 Kg x 10)
Partita n.: *

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive : FOSETIL ALLUMINIO 25%; RAME 25 %, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: FOSETIL ALLUMINIO : ---
RAME : Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,corvulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

Bayer CropScience

CARATTERISTICHE

R6 ERRESEI BORDEAUX è un formulato antiperonosporico ad ampio spettro contro le crittogame, dotato di azione preventiva, costituito dall'associazione di due principi attivi :

- Fosetil Alluminio, ad azione sistemica, in grado di proteggere anche la vegetazione che si forma successivamente ai trattamenti;
- Ossicloruro di rame, dotato di prolungata azione di copertura, resistenza al dilavamento e ampio spettro fungicida, compresa una apprezzabile attività di contenimento delle batteriosi.

Grazie alle caratteristiche di sistemia e prolungata copertura, **R6 ERRESEI BORDEAUX** può venire normalmente impiegato ad intervalli più ampi rispetto ai fungicidi tradizionali di contatto o penetranti nella difesa delle seguenti colture dalle sottoelencate malattie:

VITE : contro Peronospora: g 250-400 / hl.
Utilizzare la dose minima (min. Kg 2,5/ha) nelle applicazioni sulle cvs Moscato d'Asti e Schiava, sulle uve da tavola, nelle zone soggette a forti sbalzi termici e nelle applicazioni di post-chiusura del grappolo. Il dosaggio di 400 g/hl (Kg 4/ha) va preferito in tutte le altre situazioni.
POMODORO: contro Peronospora, Alternaria, Septoria, attività preventiva di contenimento delle batteriosi, intervenire ogni 8-12 giorni a 4-6 Kg/ha.
PATATA: contro Peronospora, impiegare la dose di 4 Kg/ha con trattamenti preventivi ogni 8-10 giorni (effettuare al massimo 4 interventi per stagione).
CARCIOFO: contro Peronospora intervenire ogni 8-12 giorni, 4-6 Kg/ha.
CUCURBITACEE (cetriolo, melone, cocomero): contro Peronospora, intervenire ogni 8-12 giorni a 6 Kg/ha.

Nelle suddette applicazioni i dosaggi più elevati vanno impiegati qualora si adotti il turno di intervento più lungo e in caso di elevata pressione di malattia.

FRUTTICOLTURA

AGRUMI (arancio, limone, mandarino): contro Phytophtora spp. (gommosi parassitaria del colletto), Antracnosi e Mal secco, irrorazioni fogliari a 500 g/hl. Contro Allupatura (Phytophtora spp.) dei frutti trattamenti preventivi nelle fasi di pre-raccolta a g 250-500 /hl. La dose più elevata è consigliata per impianti fortemente colpiti anche a livello radicale ed in tutte le situazioni predisponenti a forti attacchi sui frutti.
DRUPACEE (pesco): contro Bolla e Corineo, 400-600 g/hl in trattamenti effettuati durante la caduta delle foglie e al rigonfiamento gemme.
PERO: contro Maculatura bruna (Stemphylium vesicarium): trattamenti preventivi a g 200/hl in pre-fioritura e dopo la raccolta; utilizzare la dose di g 100/hl a partire dalla fase di frutti con diametro di 2-3 cm, trattando preventivamente ad intervalli di 7-8 giorni.

COMPATIBILITA'

Il formulato non è compatibile con prodotti a formulazione oleosa, i concimi fogliari a base azotata e i formulati a base di Dicofol.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Su vite non trattare in fioritura; anche su pero evitare trattamenti in tale periodo e nelle prime fasi di sviluppo dei frutticini. Non intervenire su vegetazione bagnata e con abbassamenti di temperatura.

NOCIVITA'

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti :
20 giorni prima della raccolta sugli agrumi
40 giorni prima della raccolta su pesco, vite e pero
20 giorni prima della raccolta su pomodoro, patata, cetriolo, cocomero, melone e carciofo

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

® Marchio registrato DPD 30.06.05

CERTROL® H

Diserbante selettivo per cereali

CERTROL® H

Composizione :

Ioxinil Ottanoato g 14,7 (=160 g/l)
Mecoprop g 33,18 (=360 g/l)
(da Estere Butossietanolico)
Coformulanti q.b. a g. 100
Contiene: nafta solvente (petrolio), aromatica pesante

Frasi di Rischio :

Nocivo per ingestione. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Consigli di Prudenza :

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione :
AgriFormula S.r.l. - Paganica (AQ)
C.F.P.I.-Zone Industrielle Nord-Notre Dame de La Garenne, Gaillon (F)
Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)
SBM Formulation - Bèziers (Francia)
Torre S.r.l - Montalcino - Torrenieri (SI)

Registrazione n. 5566 Ministero della Sanità del 23/11/1983

Contenuto Netto : l 1 - 5 - 10

Partita n.: *

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
IOXINIL OTTANOATO 14,7 %
MECOPROP 33,18 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
IOXINIL OTTANOATO
Sintomi:
- casi lievi: sensazione soggettiva di calore, sudorazione intensa, arrossamento del viso;
- casi gravi: sudorazione e sete intense, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpiressia, nausea, vomito, diarrea;
- casi molto gravi: sudorazione profusa, tremore, coma con convulsioni, edema polmonare, cianosi e disturbi respiratori.

MECOPROP
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC : vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG.
Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica.
Controindicazioni: non provocare il vomito (per il MECOPROP)

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il prodotto può essere impiegato su ogni varietà di cereali: grano, orzo, segale, alle dosi e nelle condizioni raccomandate. Non trattare in nessun caso cereali già traseminati con leguminose.
Il prodotto possiede un ampio periodo di intervento ed é efficace contro le seguenti malerbe, di difficile controllo: Bifora, Gallio, Matricaria, Stellaria, Polygonum, Veronica.
Il prodotto controlla altresì infestanti comuni quali: Fiordalisi, Capsella, Chenopodio, Papavero, Fumaria, Veccia, Ranuncoli.
Il prodotto distrugge allo stadio di plantula il Crisantemum segetum e la Galeopsis tetrahit.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il trattamento può essere eseguito durante la fase di accestimento sino a fine levata. Come caso limite si può già intervenire allo stadio di 4 foglie del cereale.
Trattare in preferenza quando le malerbe sono giovani in fase di attiva crescita, non aspettare che si formino i bottoni fiorali perché sarebbe troppo tardi.
I trattamenti più vantaggiosi sono su infestanti giovani: esse non hanno ancora avuto modo di nuocere al cereale e sono più facili da distruggere.
Con temperatura tra i 15 -20 ° C: impiegare 2,5 l/ha.
Con temperatura tra 8 -14° C e per trattamenti tardivi dalla fine dell'accestimento sino a fine levata: impiegare 2,5-3 l/ha.
Quantitativo di acqua: se il trattamento é effettuato in uno stadio precoce e le malerbe non sono ancora riparate dal cereale, distribuire la dose di CETROL H con 250-400 l/ha. Se il trattamento é tardivo e le malerbe sono sviluppate e riparate dal cereale, impiegare 400-600 l/ha.
Non trattare se la temperatura all'ombra é superiore ai 25° C. Effettuato il trattamento lavare abbondantemente l'apparecchiatura. Le parti in legno o in gomma se fossero venute a contatto con la soluzione erbicida non potranno venire in alcun modo bonificate e perciò andranno adibite al solo diserbo.

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con la generalità dei diserbanti.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

BAYER Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® Marchio registrato

MONCEREN®

FUNGICIDA - POLVERE BAGNABILE

per la lotta contro Rhizoctonia solani della patata, della lattuga (trattamento al terreno in presemina e pretrapianto), del garofano e di altre piante ornamentali in pieno campo e in serra e per la concia delle sementi di patata, lattuga, pisello, pomodoro, peperone, melanzana, asparago, cavoli, fagiolo, fava, carciofo, bietola rossa, bietola da costa, fragola e cotone.

COMPOSIZIONE
g 100 di Monceren® contengono:
g 25 di Pencycuron puro
coformulanti q. b. a 100.

ATTENZIONE
Manipolare
con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi e modalita' di impiego:
Concia per immersione
Patata: immergere i tuberi da seme per 3-5 minuti in una sospensione all'1,5-2% e successivamente porli in ambiente secco ed arieggiato fino a completa asciugatura prima della semina.
Carciofo: immergere gli ovuli per 3-5 minuti in una sospensione all'1,5-2% e successivamente porli in ambiente secco ed arieggiato fino a completa asciugatura prima di essere messi a dimora.
Concia umida: sciogliere il prodotto in un quantitativo di acqua sufficiente per ottenere una sospensione omogenea ed irrorare uniformemente la semente con adeguata attrezzatura.
Patata, asparago, carciofo: 100 g di prodotto per quintale di semente.
Lattuga, pisello, pomodoro, peperone, melanzana, cavoli, fagiolo, fava, bietola rossa, bietola da costa, fragola e cotone: 250-350 g di prodotto per quintale di semente.
Trattamento totale del terreno: incorporare attraverso una leggera lavorazione.
Patata: applicare il prodotto alla dose di 20 kg/ha, prima di mettere a dimora i tuberi.
Lattuga: applicare il prodotto alla dose di 4-8 kg/ha sul letto di semina o prima di effettuare il trapianto.
Garofano e piante ornamentali : 8-12 g/m^2 in pre-trapianto distribuendo il prodotto in polvere o diluito in acqua e quindi interrare.
N.B. : i risultati migliori si ottengono intervenendo in pre-trapianto; comunque, in caso di attacchi già in atto si possono ottenere buoni risultati irrorando la base delle piantine alle dosi su indicate.
Il prodotto può essere applicato localizzato a strisce. In tal caso la quantità di prodotto da impiegare deve essere ridotta in base alla diminuzione della superficie da trattare.

Avvertenza: la semente trattata con Monceren non può essere usata per l'alimentazione umana o animale. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.
COMPATIBILITÀ: il prodotto può essere miscelato con fungicidi a reazione neutra che agiscono contro la fusariosi e contro altre malattie.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITÀ: evitare la contaminazione dei corpi idrici.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Conservare all'asciutto.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel 02/3972.1
Officina di produzione : BAYER CROPSCIENCE S.r.l. - Filago (BG); oppure: BAYER CROPSCIENCE AG – Dormagen (Germania)
Registrazione Ministero della Sanità n 5721 del 27.01.84
Contenuto netto: kg 1
Partita n.:
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

TRAMAT® FLO

Erbicida selettivo per la barbabietola da zucchero e per il tabacco
Formulazione: pasta fluida

TRAMAT® FLO

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
Etofumesate puro 44,25 g (500 g/l)
Coformulanti q. b. a 100 g

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non gettare i residui nelle fognature - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'Autorizzazione:
Bayer CropScience S.r.l. – V.le Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Registrazione n° 5804 del Ministero della Sanità del 27/03/84

Officine di produzione:
- Bayer CropScience GmbH – Wolfenbüttel - Germania
- Bayer CropScience Ltd., Hauxton (Cambridge) - Inghilterra
- SBM Formulation – St. Marcel - Marsiglia (Francia)
- Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)
- AgriFormula S.r.l. – Paganica (AQ)

Contenuto netto: 1 – 3 L
Partita N°

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE

TRAMAT FLO agisce per assorbimento fogliare e radicale.
Efficacia erbicida: il prodotto usato da solo è attivo contro le più comuni infestanti annuali graminacee ad eccezione del *Lolium* spp. (Loiessa) e contro diverse infestanti a foglia larga quali *Stellaria* spp. (Stellaria), *Galium* spp. (Attaccamano), *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Polygonum persicaria* (Persicaria).

DOSI E MODALITÁ D'IMPIEGO

Pre-semina: con leggera incorporazione a 2-3 cm di profondità, in miscela con Cloridazon o Lenacil o Metamitron.
Pre-emergenza: subito dopo la semina e comunque prima dell'emergenza delle infestanti, ancora in associazione con Cloridazon o Lenacil o Metamitron, miscele ancor più polivalenti e complete del TRAMAT FLO impiegato da solo.
Post-emergenza: in miscela con Fenmedifam su infestanti ai primi stadi di sviluppo e con bietole che abbiano già differenziato almeno 2 foglie vere.
Nelle applicazioni di pre-semina e pre-emergenza il prodotto può essere usato su tutti i tipi di terreno ad eccezione di quelli sabbiosi e di quelli con tenore di sostanza organica superiore al 5%. Il pre-semina è preferibile al pre-emergenza soprattutto in coincidenza di semine tardive.
Con le miscele sopra suggerite (TRAMAT FLO + Lenacil o Cloridazon o Metamitron in pre-semina o pre-emergenza e con Fenmedifam in post-emergenza) lo spettro d'azione è più ampio e completo.

DOSI D'IMPIEGO

Bietola di semina autunnale
Pre-semina o pre-emergenza: TRAMAT FLO a 2 l/ha in miscela con Lenacil a 0,7-0,8 kg di p.a./ha.
Post-emergenza: usare TRAMAT FLO alla dose di 1,2-1,5 l/ha in combinazione con 0,8-1 l/ha di Fenmedifam.

Bietola di semina primaverile
Pre-semina o pre-emergenza: usare TRAMAT FLO a 2 l/ha miscelato con Lenacil a 0,4-0,5 kg di p. a./ha o Cloridazon a 2-2,5 kg di p.a./ha o Metamitron a 2,5-3 kg/ha di p.a..
Post-emergenza: TRAMAT FLO in questa epoca può essere miscelato alla dose di 1-1,2 l/ha con Fenmedifam 0,6-0,8 l/ha di p.a., usando la dose più bassa in presenza di temperature relativamente elevate (20-24°C) e la dose più alta con temperature non superiori a 20°C. Usare un volume di acqua di 300-500 l/ha nelle applicazioni di pre-semina e pre-emergenza, mentre si raccomanda di non superare i 300 l/ha in post-emergenza.
Il prodotto può essere distribuito anche localizzato.
Preparazione della miscela: agitare il contenitore diverse volte prima di procedere alla misurazione della quantità di liquido richiesta. Quando si miscela il prodotto con Fenmedifam o insetticidi, mettere il TRAMAT FLO per ultimo tenendo la poltiglia in costante agitazione.
Condizioni di trattamento: un sufficiente grado udometrico del terreno nel periodo successivo al trattamento di pre-emergenza è condizione essenziale per ottenere un buon risultato: in caso di siccità effettuare un intervento irriguo. Nelle applicazioni di post-emergenza con Fenmedifam, è consigliabile non trattare quando la temperatura è superiore ai 25°C, in tal caso è buona norma rimandare il trattamento al tardo pomeriggio.
Se dopo il trattamento di pre-emergenza si dovesse abbandonare la coltivazione della barbabietola, prima di seminare un'altra specie, effettuare una profonda aratura.

Tabacco
Epoca d'intervento: intervenire qualche giorno prima del trapianto, possibilmente in assenza delle infestanti.
Dose in pre-trapianto: 1,5-2 l/ha di TRAMAT FLO associato a Pendimetalin 700-950 g p.a./ha o Difenamide a 2,5-3 kg/ha di p.a. o a Metobromuron alla dose di 750-1000 g/ha di p.a. per il completamento dello spettro d'azione.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con altri formulati che ne completino l'efficacia contenenti i principi attivi Fenmedifam, Lenacil, Cloridazon, Metamitron, Pendimetalin, Difenamide, Metobromuron.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SUL TABACCO L'INTERVALLO DI SICUREZZA È DI 90 GIORNI

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: conservare il prodotto in luogo fresco nel periodo estivo ed evitare il gelo nel periodo invernale.
da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® marchio registrato

CIPOTRIL ®

Erbicida selettivo della cipolla, dell'aglio e del frumento, contro infestanti dicotiledoni
Concentrato Emulsionabile (EC)

CIPOTRIL®
Composizione :
Ioxinil Ottanoato g 28,7 (= 301,5 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene: nafta solvente (petrolio), aromatica leggera.

Frasi di Rischio :
Estremamente infiammabile. Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione :
AgriFormula S.r.l. - Paganica (AQ)
Bayer CropScience Ltd. - Norwich - Inghilterra

Registrazione n. 5864 del 6/4/1984 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: ml 250 - 500 / l 1 - 5 - 10 - 20

Partita n.: *

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi:
- casi lievi: sensazione soggettiva di calore, sudorazione intensa, arrossamento del viso;
- casi gravi: sudorazione e sete intense, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpiressia, nausea, vomito, diarrea;
- casi molto gravi: sudorazione profusa, tremore, coma con convulsioni, edema polmonare, cianosi e disturbi respiratori.

Terapia: sintomatica.
L'iperpiressia va combattuta raffreddando il corpo del paziente applicando compresse fredde alla radice degli arti. Con gli antipiretici non si ottiene l'effetto desiderato.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un erbicida selettivo della cipolla, dell'aglio e del frumento, contro le infestanti dicotiledoni annuali. Agisce per contatto.
PRINCIPALI INFESTANTI SENSIBILI :
- Fino allo stadio di sei foglie:
Amaranthus retroflexus, Anagallis arvensis, Anthemis spp., *Atriplex patula, Capsella bursa-pastoris, Galinsoga parviflora, Matricaria* spp., *Mercurialis annua, Papaver rhoeas, Polygonum convolvulus, Polygonum persicaria, Portulaca oleracea, Raphanus raphanistrum, Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, Stellaria media, Veronica* spp..
- Fino allo stadio di quattro foglie:
Fumaria officinalis, Galeopsis tetrahit, Lamium purpureum, Urtica urens.

DOSI E MODALITA' D' IMPIEGO
Cipolla - aglio:
il prodotto va impiegato allo stadio di 2-4 foglie della coltura, fino a 30 giorni dalla raccolta.
Cipolla trapiantata:
attendere la ripresa della vegetazione, dopo che hanno superato la crisi di trapianto.
Dosi: litri 1,8-2/ha distribuiti con 1.000 litri di acqua.
Evitare di trattare con gocce fini.
Frumento:
il prodotto va impiegato dalla fase di 2-3 foglie della coltura fino all'inizio della levata (2 nodi).
Al momento del trattamento la temperatura media dovrà essere superiore a 10 °C e dovrà essere presente una buona luminosità.
Dosi: litri 1,8-2,5/ha distribuiti con almeno 500 litri di acqua.
Preparazione della poltiglia: versare direttamente il prodotto nell'irroratrice in corso di riempimento.

COMPATIBILITA'
Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Evitare di trattare su colture sofferenti per freddo, siccità, inondazioni, grandine ed attacchi di parassiti.
Cipolla - aglio: il trattamento può dar luogo ad un ingiallimento passeggero delle foglie della coltura senza alcuna incidenza negativa sulla produzione.
Non trattare colture in serra o sotto tunnel.

NOCIVITA'
Il prodotto é tossico per animali domestici e bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso é pericoloso.
Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

Etichetta/foglio illustrativo

PREVICUR®

Fungicida sistemico per la protezione delle colture orticole, vivai ed impianti di melo, pero, agrumi e piante forestali, colture floreali ed ornamentali, campi da golf, tappeti erbosi e prati ornamentali
CONCENTRATO SOLUBILE

PREVICUR®
Composizione
g 100 di Previcur contengono:
g 66,5 di Propamocarb-cloridrato puro (=722 g/l)
coformulanti quanto basta a 100 g

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Registrazione Ministero della Sanità n. 5881 del 27.03.1984

Officine di produzione: Bayer CropScience GmbH - Wolfenbüttel - Germania
SBM Formulation – St. Marcel – Marsiglia – (Francia); Isagro S.p.A. - Aprilia (LT).

Officine di confezionamento: DIACHEM S.p.A. - Unità Produttiva SIFA – Caravaggio (BG);
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG); IRCA Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)

Contenuto netto: 5 - 10 - 20 – 50 - 100 -250 ml; 1 - 5 L

Partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

CATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Il PREVICUR è un fungicida sistemico attivo nei confronti del gruppo dei Ficomiceti (*Pythium spp., Phytophthora spp., Peronospora, Pseudoperonospora, Aphanomyces spp., Bremia*) che arrecano gravi danni alle colture orticole, floreali ed ornamentali, specie nelle zone ove viene attuata una coltivazione intensiva. Il prodotto è assorbito prevalentemente dal sistema radicale delle piante e viene traslocato nell'apparato fogliare, seguendo la corrente traspiratoria, in modo da assicurare una completa protezione delle piante.
Perfettamente tollerato dalle più diffuse colture orticole ed ornamentali, il PREVICUR è un preparato molto versatile in quanto si presta agevolmente ad essere impiegato con tecniche diverse: concia dei semi, bagno dei bulbi e delle talee, disinfezione dei terricciati e dei letti di semina, trattamenti al terreno in pre e post-trapianto delle colture, trattamenti fogliari. I migliori risultati si ottengono tuttavia con gli interventi preventivi volti ad impedire lo sviluppo dei patogeni.
Il PREVICUR è indicato per la difesa delle seguenti colture: pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo, insalate (lattuga, cicoria, indivia, radicchio), spinacio, bietola da foglie e da costa, sedano, prezzemolo, basilico, cavolfiore, cavoli, carota, rapa, bietola rossa, aglio, cipolla, porro, tabacco, fragola, colture floreali ed ornamentali, campi da golf, tappeti erbosi e prati ornamentali in genere. Può essere convenientemente usato per la difesa contro *Pythium spp. e Phytophthora cactorum, P. citrophthora, P. parasitica, P. cinnamomi* delle piante di melo, pero, agrumi e delle piante forestali, sia in vivaio che nei primi anni dopo la messa a dimora in campo. Può inoltre essere utilizzato nella concia dei semi in genere.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Concia dei semi: 1-4 ml/kg di seme per semi di piccola dimensione (es. tabacco, frumento).
10-40 ml/kg di seme per semi leggeri e dotati di elevata superficie (es. girasole).
Preparazione dei terricciati: 300 ml/m^3 di terriccio diluiti in 20 l di acqua.
Trattamenti ai semenzai: 8-12 ml/m^2 di superficie in 4-5 litri di acqua (ripetere il trattamento 5 giorni prima del trapianto in 6-8 l/m^2 di acqua).
Trattamenti al terreno in pre-trapianto: 8-12 ml/m^2 in 3-5 litri di acqua.
Trattamenti in post-trapianto: 100-200 ml/pianta di una soluzione allo 0,2% (200 ml/hl): ripetere il trattamento ogni 10-15 giorni (3-4 trattamenti).
Trattamenti fogliari: 1,5-3 l/ha in 15-20 hl di acqua per ettaro.
Indicazioni specifiche per alcune importanti colture floricole ed ornamentali.
Garofano e Gerbera: contro Pythium e Phytophthora.
Trattamenti iniziali: 12-15 ml/m^2 di PREVICUR in 2-4 litri di acqua due giorni prima dell'impianto, su terreno in tempera, ed incorporare uniformemente.
Trattamenti successivi: 200 ml/hl per via fogliare bagnando abbondantemente (400-500 litri di soluzione ogni 1000 m^2).
Si consiglia di effettuare i primi due trattamenti a distanza di 8-10 giorni e proseguire con interventi ogni 15-25 giorni.
Bulbose: contro Pythium ultimum e Phytophthora.

Immergere i bulbi per 20-30 minuti in una soluzione di 300 ml/hl di acqua.
Trattare quindi il terreno prima della messa a dimora con 10-12 ml/m^2 in 2-4 l di acqua ed incorporare a 10-12 cm di profondità.
Vivai di piante forestali: contro Phytophthora cactorum, Phytophthora cinnamomi e Pythium.
Trattare il substrato colturale con 300 ml/m^3 di PREVICUR in 8-10 litri di acqua; intervenire all'emergenza ogni 15-18 giorni con 4-5 l/m^2 di una soluzione allo 0,2% di PREVICUR.
Campi da golf, tappeti erbosi e prati ornamentali: per il controllo di Pythium aphanidermatum ed eventuali altre specie, intervenire con trattamenti fogliari alla dose di 1-1,5 ml/m^2 di prodotto formulato, avendo cura di irrorare con almeno 100-200 litri di soluzione per 1000 m^2. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni microclimatiche favorevoli allo sviluppo della malattia (caldo umido, con umidità relativa superiore al 70-80%) e, soprattutto nel periodo critico, ripetere i trattamenti ogni 14-15 giorni.

Compatibilità: Il prodotto è compatibile con i fungicidi benzimidazolici (Benomyl, Tiofanate metil, Carbendazim), con TMTD, Clorotalonil, prodotti rameici e Mancozeb.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AVVERTENZE: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Bayer CropScience

® marchio registrato

Edizione del 17/05/06

EFFICAN 2 EFFE

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro Peronospora ed Escoriosi della vite
Polvere bagnabile (WP)

EFFICAN 2 EFFE

Composizione:
Fosetil Alluminio puro 50 g
Folpet puro 25 g
Coformulanti q.b. a 100 g

NOCIVO

Frasi di Rischio
Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione :
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
AgriFormula S.r.l. – Paganica (AQ)
Bayer CropScience S.A. - Cheste (Valencia) - Spagna
SBM Formulation – St. Marcel - Marsiglia – (Francia)
Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)

Registrazione n. 5966 del 27/6/1984 del Ministero della Sanità

CONTENUTO NETTO: 1 - 5 - 10 - 20 Kg
Partita n.: *

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
FOSETIL ALLUMINIO 50%
FOLPET 25%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :
Fosetil Alluminio : --
Folpet: Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
EFFICAN 2 EFFE é un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta soprattutto in modo ascendente.
L'attività del prodotto nei confronti della Peronospora si é rivelata sia preventiva che curativa.
Tale attività é tanto più evidente quanto più la vegetazione é giovane ed in fase di attiva crescita.
La grande sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
Queste caratteristiche, unite alla sua grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta antiperonosporica con interventi distanziati a cadenza fissa.
Il prodotto possiede anche azione sulla Escoriosi ed un'azione frenante sullo sviluppo della Botrite.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Peronospora:
Il primo trattamento con il prodotto si deve effettuare quando i germogli della vite sono lunghi cm 10.
Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo. Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni fino alla fase di allegagione compresa.
Dose: 250 - 300 g per 100 litri d'acqua.
Dall'allegagione alla raccolta continuare la lotta con prodotti contenenti rame.

Escoriosi:
Dose: 300 g per 100 litri d'acqua - effettuare due trattamenti: il primo nella fase di "gemma mossa" (fase D del Baggiolini) e il secondo nella fase di foglie formate (fase E del Baggiolini).

COMPATIBILITA'
Il prodotto é miscibile con i prodotti viticoli della nostra gamma. Non é miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.
Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'
Il prodotto é tossico per gli insetti utili.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

PROCLAIM®

etichetta/foglio illustrativo

FUNGICIDA
SOSPENSIONE CONCENTRATA
per la lotta contro ticchiolatura delle pomacee e cancri rameali del pesco. Svolge inoltre una buona azione collaterale contro mal bianco del melo, monilia, bolla, cancro ed oidio delle drupacee (pesco, nettarine, percoche, susino, ciliegio, albicocco), cercospora della barbabietola da zucchero, ruggine e mal bianco degli ortaggi (zucchino e cetriolo), ticchiolatura, mal bianco e ruggine delle piante ornamentali e da fiore in pieno campo ed in serra

PROCLAIM®
Composizione
100 g di Proclaim contengono:
44,7 g di Bitertanolo puro (500 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 023972.1
Registrazione Ministero della Sanità n. 5973 del 07.06.84
Officine di produzione: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania); Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
Contenuto netto: 5-10-20-50-100-250-500 ml; 1-5 l
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (melo e pero): contro ticchiolatura (con azione collaterale contro mal bianco del melo): 0,03-0,04% (30-40 ml in 100 litri d'acqua) in miscela con fungicidi tradizionali a dose ridotta, e precisamente con Fungilon D alla dose di 50-60 g/hl, oppure con Pomarsol Zf alla dose di 120-150 g/hl, oppure con Captan Bayer alla dose di 120-150 g/hl, o con Antracol alla dose di 120-150 g/hl, eseguendo gli interventi ad intervalli di 7-8 giorni a partire dalla fase di apertura delle gemme fino alla fase di frutto-noce e successivamente ad intervalli di 8-12 giorni in dipendenza dell'andamento climatico. Allo scopo di ottenere i migliori risultati, scegliere il fungicida tradizionale da aggiungere al Proclaim tenendo presente l'andamento climatico e le varietà da difendere. **Per interventi curativi ed eradicativi:** 0,04-0,05% (40-50 ml in 100 litri di acqua) effettuando 1 oppure 2 interventi ravvicinati.
Drupacee (pesco, nettarine, percoche, susino, ciliegio, albicocco): contro monilia: 0,05-0,06% (50-60 ml in 100 litri di acqua), effettuando 2-3 trattamenti (prima, durante e dopo la fioritura), ripetendoli alla comparsa dei primi sintomi della malattia ad intervalli di 6-8 gg. impiegando la dose più elevata e gli intervalli più brevi nei periodi climatici più favorevoli allo sviluppo della malattia.
Contro oidio: 0,03 % (30 ml in 100 litri di acqua) effettuando trattamenti preventivi con inizio alla fase della scamiciatura dei frutti alla cadenza di 7-10 gg. circa; in caso sia necessario intervenire con infezione in atto, elevare la dose allo 0,04% (40 ml in 100 litri di acqua).
Pesco, nettarine, percoche: contro cancri rameali (Fusicoccum) alla dose dello 0,05% (50 ml in 100 litri d'acqua) effettuando 2-3 trattamenti in autunno (da settembre a novembre in concomitanza con la fase di caduta foglie) e nelle fasi comprese fra bottoni rosa e accrescimento frutticini. Questi interventi sono efficaci anche nei riguardi della bolla ed hanno azione collaterale nei confronti dei cancri rameali da Cytospora.
Ortaggi (zucchino e cetriolo): contro ruggine e mal bianco:
a) TRATTAMENTI PREVENTIVI: 0,03 % (30 ml in 100 litri di acqua);
b) TRATTAMENTI CURATIVI: 0,04-0,05 % (40-50 ml in 100 litri di acqua) effettuando 2-3 trattamenti ad intervalli di 7-8 gg., effettuando il primo all'inizio dell' attacco.
Barbabietole da zucchero: contro cercospora ed oidio: 0,6-1 l/ha diluiti in 600-800 litri di acqua eseguendo 2-4 trattamenti, con inizio alla comparsa dei primi sintomi e distanziandoli ad intervalli non superiori a 3-4 settimane a seconda delle condizioni climatiche più o meno favorevoli allo sviluppo della malattia.
Piante ornamentali e da fiore in pieno campo ed in serra: contro oidio (mal bianco) e ruggine della rosa e delle altre piante ornamentali e da fiore: 0,04-0,05% (40-50 ml in 100 litri di acqua). Per trattamenti curativi: 0,05-0,08 % (50-80 ml in 100 litri di acqua).
N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale. Diluire il prodotto in una quantità d'acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione.

COMPATIBILITA': Proclaim può essere miscelato con fungicidi ed insetticidi a reazione neutra.

Avvertenza. in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per zucchino e cetriolo, 21 giorni prima del raccolto per pomacee e drupacee (pesco, nettarine, percoche, susino, ciliegio, albicocco), 30 giorni prima del raccolto per barbabietole da zucchero.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade
Conservare al riparo dal gelo.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® Marchio registrato

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

DECIS® D

INSETTICIDA
CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

DECIS® D
Composizione:
Deltametrina 1,19% (= 12,5 g/l)
Dimetoato 38,02% (= 400 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

Contiene: nafta solvente (petrolio) aromatica leggera

Frasi di Rischio
Infiammabile. Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

NOCIVO

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione:
Bayer CropScience S.r.l. - viale Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione:
- SBM Formulation - Saint Marcel - Marsiglia (Francia)
- ISAGRO S.p.A. - Aprilia (LT)
- Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Registrazione n° 6050 del 5/9/1984 del Ministero della Sanità

CONTENUTO NETTO: 10 - 100 - 250 – 500 ml / 1 - 5 - 10 L
PARTITA N°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Deltametrina 1,19%, Dimetoato 38,02%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilita' da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonche' dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
N.B.: diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Dimetoato: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità)
Terapia: Sintomatica. N.B. Dimetoato: poco efficace la pralidossima. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE
DECIS D agisce per contatto ed ingestione e possiede inoltre un buon potere penetrante. DECIS D è efficace contro una vasta gamma di insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO (ml/hl acqua)
Ciliegio: contro afidi: 50 ml – capua, cacoecia ed altri tortricidi: 50 ml - maggiolino, tentredini, cecidomidi: 50 ml - mosca delle ciliege: 50 ml
Agrumi (piante non ancora in produzione): contro afidi 40-50 ml - aleurodidi e mosca: 50 ml
Olivo: mosca e tignola delle olive: 50 ml
Pomodoro in campo, melanzana in campo, lattuga in campo, asparago: contro dorifora, nottue, tripidi, afidi, aleurodidi, cimici, mosca: 50 ml
Frumento (trattamenti primaverili-estivi): contro afidi, tripidi, cimici: 0,5 l/ha
Frumento (trattamenti autunnali): contro afidi vettori del nanismo giallo allo stadio di 1-3 foglie, ripetendo se necessario il trattamento dopo 15 giorni circa: 0,5 l/ha
Barbabietola da zucchero - contro afidi, mosca: 50 ml
Tabacco - contro nottue, afidi, tripidi, pulce (Epitrix): 0,5 l/ha
Cotone (non da olio) - contro nottue, piralide, tignola, cicalina, tripidi, lygus: 0,5 l/ha
Pioppicoltura
Pioppo in vivaio - contro gemmaiola, tarlo vespa: 75 ml; contro criptorrinco, con trattamenti localizzati al tronco: 120-150 ml
Pioppo in piantagione - contro criptorrinco, con trattamenti localizzati al tronco: 120-150 ml; contro saperda, con trattamenti localizzati al tronco: 225-300 ml; contro crisomelidi defogliatori: crisomela, crisomelidi minori e stilpnotia: 50 ml
Floricoltura (in pieno campo o in serra) - contro afidi, aleurodidi, tripidi, cetonie, maggiolino, altri parassiti: 50 ml - tortrici dei garofani (bega ed epicoristode): 50-100 ml
Colture ornamentali in pieno campo e in serra - contro afidi, cimice del platano (Corythuca), larve di lepidotteri, maggiolino: 50 ml.
Diluire la dose indicata di DECIS D in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo l'agitazione.
Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro.
In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di un bagnante.

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

COMPATIBILITA'
DECIS D secondo le nostre attuali conoscenze, è miscibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari a reazione neutra. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile è necessario aggiungere la dose di DECIS D preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicida già preparata, mantenendo l'agitazione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non impiegare su crisantemo e sulle varietà di olivo: Coratina, Simona, Canino, Vernina, Marsello, Frantoio, Bosana, Terza Grande, La Dritta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU LATTUGA E ASPARAGO, 28 GIORNI SU OLIVO E FRUMENTO, 30 GIORNI SU BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E 21 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze:
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® Marchio registrato DPD 30.06.05

KEMIRON® 500 SC

Erbicida selettivo per la barbabietola da zucchero e per il tabacco.
Formulazione: pasta fluida

KEMIRON® 500 SC

Composizione:
Etofumesate puro 44,25 g (500 g/l)
Coformulanti q. b. a 100 g

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non gettare i residui nelle fognature – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'Autorizzazione:
Bayer CropScience S.r.l. – V.le Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Registrazione n° 6088 del 12/09/1984 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
- Bayer CropScience GmbH – Wolfenbüttel - Germania
- SBM Formulation – St. Marcel - Marsiglia (Francia)
- Bayer CropScience Ltd., Hauxton (Cambridge) – Inghilterra
- Agriformula S.r.l. – Paganica (AQ)
- Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)

Contenuto netto: 0,5 – 1 – 3 – 5 L

Partita N°

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE

KEMIRON 500 SC agisce per assorbimento fogliare e radicale.
Efficacia erbicida: Il prodotto usato da solo è attivo contro le più comuni infestanti annuali graminacee ad eccezione del *Lolium* spp. (Loiessa) e contro diverse infestanti a foglia larga quali *Stellaria* spp. (Stellaria), *Galium* spp. (Attaccamano), *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Polygonum persicaria* (Persicaria).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Epoca d'impiego:
Pre-semina: Con leggera incorporazione a 2-3 cm di profondità, in miscela con Cloridazon o Lenacil o Metamitron.
Pre-emergenza: Subito dopo la semina e comunque prima dell'emergenza delle infestanti, ancora in associazione con Cloridazon o Lenacil o Metamitron, miscele ancor più polivalenti e complete del KEMIRON 500 SC impiegato da solo.
Post-emergenza: In miscela con Fenmedifam su infestanti ai primi stadi di sviluppo e con bietole che abbiano già differenziato almeno 2 foglie vere.
Nelle applicazioni di pre-semina e pre-emergenza il prodotto può essere usato su tutti i tipi di terreno ad eccezione di quelli sabbiosi e di quelli con tenore di sostanza organica superiore al 5%.
Il pre-semina è preferibile al pre-emergenza soprattutto in coincidenza di semine tardive.
Con le miscele sopra suggerite (KEMIRON 500 SC + Lenacil o Cloridazon o Metamitron in pre-semina o pre-emergenza e con Fenmedifam in post-emergenza) lo spettro d'azione è più ampio e completo.

DOSI D'IMPIEGO
Bietola di semina autunnale
Pre semina o pre-emergenza: KEMIRON 500 SC a 2 l/ha in miscela con Lenacil a 0,7-0,8 kg di p.a./ha.
Post-emergenza: Usare KEMIRON 500 SC alla dose di 1,2-1,5 l/ha in combinazione con 0,8-1 l/ha di Fenmedifam.
Bietola di semina primaverile:
Pre-semina o pre-emergenza: Usare KEMIRON 500 SC a 2 l/ha miscelato con Lenacil a 0,4-0,5 kg di p. a./ha o Cloridazon a 2-2,5 kg di p.a./ha o Metamitron a 2,5-3 kg/ha di p.a.
Post-emergenza: KEMIRON 500 SC in questa epoca può essere miscelato alla dose di 1-1,2 l/ha con Fenmedifam 0,6-0,8 l/ha di p.a., usando la dose più bassa in presenza di temperature relativamente elevate (20-24°C) e la dose più alta con temperature non superiori a 20°C. Usare un volume di acqua di 300-500 l/ha nelle applicazioni di pre-semina e pre-emergenza, mentre si raccomanda di non superare i 300 l/ha in post-emergenza.
Il prodotto può essere distribuito anche localizzato.
Preparazione della miscela: Agitare il contenitore diverse volte prima di procedere alla misurazione della quantità di liquido richiesta. Quando si miscela il prodotto con Fenmedifam o insetticidi, mettere il KEMIRON 500 SC per ultimo tenendo la poltiglia in costante agitazione.
Condizioni di trattamento: Un sufficiente grado udometrico del terreno nel periodo successivo al trattamento di pre-emergenza è condizione essenziale per ottenere un buon risultato: in caso di siccità effettuare un intervento irriguo. Nelle applicazioni di post-emergenza con Fenmedifam, è consigliabile non trattare quando la temperatura è superiore ai 25°C, in tal caso è buona norma rimandare il trattamento al tardo pomeriggio.
Se dopo il trattamento di pre-emergenza si dovesse abbandonare la coltivazione della barbabietola, prima di seminare un'altra specie, effettuare una profonda aratura.
Tabacco
Epoca d'intervento: Intervenire qualche giorno prima del trapianto, possibilmente in assenza delle infestanti.
Dose in pre-trapianto: 1,5-2 l/ha di KEMIRON 500 SC associato a Pendimetalin 700-950 g p.a./ha o Difenamide a 2,5-3 kg/ha di p.a. o a Metobromuron alla dose di 750-1000 g/ha di p.a. per completamento dello spettro d'azione.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con altri formulati che ne completino l'efficacia contenenti i principi attivi Fenmedifam, Lenacil, Cloridazon, Metamitron, Pendimetalin, Difenamide, Metobromuron.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SUL TABACCO L'INTERVALLO DI SICUREZZA È DI 90 GIORNI

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: conservare il prodotto in luogo fresco nel periodo estivo ed evitare il gelo nel periodo invernale.
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® marchio registrato

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

BAYFIDAN® EW

FUNGICIDA ORGANICO

per la lotta contro l'oidio (mal bianco) del melo e della vite, e contro l'oidio e le ruggini dei cereali (grano, orzo), ortaggi (peperone, pomodoro, cetriolo, melone, zucchino)

BAYFIDAN® EW

COMPOSIZIONE
g 100 di Bayfidan EW contengono:
g 4,9 di triadimenol puro
coformulanti quanto basta a 100
Contiene cicloesanone

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile.
Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi o da bevande.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare ne' bere ne' fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione: Bayer CropScience AG – DORMAGEN (GERMANIA); Bayer CropScience S.r.l. - FILAGO (BG)
Officina di confezionamento: DIACHEM UNITA' PRODUTTIVA SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione del Ministero della Sanita' N. 6261 del 15/02/85

Contenuto netto: ml 50-100-500; l 1, 5,10
Partita N.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Melo: contro l'oidio: 0,05-0,08 % (50-80 ml in 100 l di acqua) con impiego di 15-20 hl/ha
Vite: contro l'oidio: 0,05 - 0,1% (50-100 ml in 100 l d'acqua) impiegando 10 hl/ha. **Per trattamenti curativi:** 0,1% (100 ml in 100 l d'acqua) effettuando 2-3 trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni, di cui il primo all'inizio dell'attacco.
Ortaggi: (melone, cetriolo, peperone, pomodoro e zucchino): contro mal bianco: 0,05 - 0,1% (50-100 ml in 100 l d'acqua).
N.B.: per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione. Usare la dose più elevata nei casi di maggiore sensibilità varietale, in zone particolarmente soggette agli attacchi di oidio e quando gli intervalli tra i trattamenti siano superiori a 10 giorni.
Cereali (grano, orzo): contro mal bianco e ruggini: 2,5 l/ha diluiti in 600-800 litri d'acqua intervenendo alla comparsa dei primi sintomi.
Compatibilità: il Bayfidan EW e' miscibile con fungicidi o insetticidi a reazione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto per zucchino, 14 giorni prima del raccolto per melo, ortaggi e vite e 30 giorni prima del raccolto per cereali
Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare al riparo dal gelo.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® Marchio registrato

BAYFIDAN® EC

etichetta/foglio illustrativo

FUNGICIDA ORGANICO
per la lotta contro l'oidio (mal bianco) della vite, contro l'oidio e le ruggini dei cereali (grano, orzo) e degli ortaggi (peperone, pomodoro, cetriolo, melone)
EMULSIONE CONCENTRATA

BAYFIDAN® EC
COMPOSIZIONE
100 g di Bayfidan EC contengono:
22,9 g di Triadimenol puro (=250 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania);
S.C.B. Marle sur Serre (Francia);
Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
Registrazione del Ministero della Sanita' n. 6405 del 16/05/85
Contenuto netto: 5-10-50-100-250-500 ml; 1 l
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Vite: contro l'oidio: 0,008-0,015 % (8-15 ml in 100 litri di acqua).
Ortaggi (pomodoro, peperone, cetriolo, melone): contro mal bianco: 0,01-0,02 % (10-20 ml in 100 litri di acqua).
N.B. Per la distribuzione del prodotto impiegare il quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione (normalmente 10-15 hl/ha per vite). Usare la dose più elevata nei casi di maggior sensibilità varietale, in zone particolarmente soggette agli attacchi di oidio e quando gli intervalli tra i trattamenti siano superiori a 10 giorni.
Cereali (grano, orzo): contro mal bianco e ruggini: 0,4-0,5 l/ha diluiti in 600-800 litri di acqua intervenendo preventivamente dalla fase di spigatura fino alla fioritura oppure alla comparsa dei primi sintomi.

COMPATIBILITA': il Bayfidan EC può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per ortaggi e vite, 30 giorni prima del raccolto per cereali.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire

DPD 30.06.05/a

le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.-
Conservare al riparo dal gelo.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05/a

Ethrel®

Fitoregolatore

Concentrato Solubile (SL)

ETHREL®

COMPOSIZIONE:
Etefon puro 39,6 g (= 480 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

Frasi di Rischio
Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Registrazione n. 6437 del 13.06.1985 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
AgriFormula S.r.l. - Paganica (AQ)
SBM Formulation - Bèziers (Francia)
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Contenuto netto : 500 ml / 1 - 5 - 10 l
Partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni.**

MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto é un fitoregolatore di sintesi che dopo essere stato assorbito dalla pianta libera etilene. Questo gas, che la pianta già produce, é in grado di stimolare la maturazione dei frutti.

POMODORO DA INDUSTRIA
3-4 l/ha per anticipare ed uniformare la maturazione dei frutti.
Intervenire quando il 40-60% delle bacche sono mature e con i frutti dell'ultimo palco che abbiano raggiunto la pezzatura ottimale e lo stadio fenologico di "verde maturo". Tale dose, preferibilmente frazionata in due interventi distanziati di 4-5 giorni, è indicata su varietà a maturazione scalare con apparato fogliare molto sviluppato e con basse temperature (12-15°C) al momento dell'applicazione.
Su varietà "determinate" di recente introduzione a maturazione contemporanea e sensibili alle scottature solari, la dose può essere ridotta a 1-2 l/ha.
Si consigliano elevati volumi di acqua (10 hl/ha) ed una fine nebulizzazione dell'irrorato. Non intervenire su colture sofferenti per stress idrici (siccità) o termici, evitando le ore più calde (30-32 °C).

POMODORO DA MENSA
200-250 ml/hl per anticipare ed uniformare la maturazione dei frutti. Irrorare solo i frutti prossimi alla raccolta (invaiatura). Nel caso si voglia far maturare contemporaneamente tutte le bacche, grandi e piccole, per liberare il terreno dalla coltura: trattare tutta la pianta.

MELO
Trattamento pre-raccolta
Cultivar precoci, trattare 10 giorni prima della prevista raccolta: 40-50 ml/hl.
Cultivar medio tardive, trattare 15-20 giorni prima della raccolta: 80-100 ml/hl. Impiegare il prodotto sempre in associazione ad un anticascola.
Raccogliere 10 giorni dopo il trattamento, in quanto il prodotto anticipa la maturazione. Il prodotto può essere distribuito con le normali attrezzature da irrorazione diluito in 15 - 20 ettolitri di acqua ad ettaro.

Trattamento su vegetazione dopo la raccolta dei frutti : 50-70 ml/hl per rallentare la vegetazione della pianta ed accelerarne la lignificazione, favorendo l'evoluzione a fiore delle gemme miste.
Trattamenti per diradamento: 20-50 ml/hl di Ethrel da solo o in miscela con diradanti in fioritura.
Trattamenti in fase di accrescimento : Applicazioni ripetute con Ethrel da solo alla dose di 20-50 ml/hl nella fase di accrescimento, inducono un effetto di riduzione della vegetazione ed un aumento di gemme a fiore nell'anno successivo.
Avvertenze : - Una risposta più o meno accentuata a trattamenti con Ethrel è in funzione delle condizioni ambientali (temperatura, umidità relativa), stadio vegetativo e stato fisiologico della pianta, cultivars.
- Poichè l'Ethrel accelera il processo di maturazione, un suo impiego sui frutti può influire negativamente sulla durata del periodo di conservabilità.
- Non impiegare comunque mai più di 1,6 lt/ha di Ethrel per ciclo vegetativo.
- Data la variabilità delle condizioni operative locali che possono influire sui risultati del trattamento, se ne consiglia l'impiego dopo aver effettuato saggi sperimentali o su consiglio degli Organi Ufficiali preposti.

TABACCO
L'impiego del prodotto risulta particolarmente vantaggioso in quanto é in grado di ridurre il numero delle raccolte manuali, anticipando e uniformando la maturazione della foglia.
- Varietà scalari, non cimate e tradizionalmente raccolte a "foglia" (Burley, Bright ecc.) :
200 - 350 ml/hl d'acqua, intervenendo dopo 1 o 2 raccolte quando le foglie restanti hanno raggiunto il massimo sviluppo e/o dimostrano segni di cambiamento di colore.
- Varietà a maturazione contemporanea o cimate tradizionalmente raccolte a "pianta" (Nostrano del Brenta, Avana, Kentucky ecc.):
200 - 350 ml /hl d'acqua intervenendo su tutta la pianta dopo l'asportazione delle foglie basali. In ogni caso prima di intervenire su una superficie vasta effettuare dei piccoli saggi su poche piante, osservando attentamente l'evoluzione delle foglie trattate.

COMPATIBILITA'
Non miscelarlo ad altri prodotti fitosanitari.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto, su pomodoro, può causare un parziale ingiallimento delle foglie; inoltre i fiori aperti, se bagnati dalla soluzione, cadono.

Sospendere i trattamenti :
10 giorni prima della raccolta su pomodoro
7 giorni su melo

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze
Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

BAYER Bayer CropScience

DPD 30.06.05/a

® Marchio registrato

K-OBIOL® ULV 6

Insetticida pronto all'impiego a lunga durata di protezione per la disinfestazione dei cereali in granella immagazzinati

SOLUZIONE ULV (UBV)

K-OBIOL® ULV 6

COMPOSIZIONE

g 100 di K-Obiol ULV 6 contengono :
g 0,68 di deltametrina pura (=6,1 g/l)
g 6,72 di piperonilbutossido puro (=59,8 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

Frasi di rischio:
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego –
Non gettare i residui nelle fognature - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l - Viale Certosa 130 – 20156 Milano - Tel. 02/3972.1

Reg. N. 6555 del 7.11.1985 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
Bayer CropScience GmbH Francoforte S/Meno (Germania)
SBM Formulation – St. Marcel – Marsiglia (Francia)
Isagro S.p.A. - Aprilia (**LT**)
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
Contenuto netto: 1 - 5 - 10 – 20 - 25 **L**
Partita N. :

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. **Sintomi a carico del SNC**: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree, rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia**: sintomatica e di rianimazione. **Consultare un Centro Antiveleni**.

CARATTERISTICHE

K-OBIOL ULV 6 è un insetticida pronto all'impiego per la protezione e la cura delle infestazioni dei cereali in granella immagazzinati. K-OBIOL ULV 6 agisce per contatto ed ingestione contro tutti gli insetti che infestano i cereali. K-OBIOL ULV 6 assicura una lunga protezione (6-12 mesi). K-OBIOL ULV 6 non trasmette alcun odore alle derrate trattate e non altera la germinabilità dei semi.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Contro *Sitophilus spp* (Calandra), *Oryzaephilus surinamensis* (Silvano), *Tribolium spp* (Tribolio), *Rhizopertha dominica* (Cappuccino), *Sitotroga cerealella, Ephestia kuehniella, Plodia interpunctella* (Tignole), *Tenebroides mauritanicus* (Struggigrano), *Tenebrio molitor* (Tenebrione), *Trogoderma spp* (Trogoderma), *Stegobium paniceum* (Stegobio del pane), *Bruchus spp* (Tonchi), 42-84 ml/tonnellata. La dose più bassa si impiega per ottenere una protezione di 6 mesi circa, la più alta per una protezione di 9-12 mesi.

K-OBIOL ULV 6 deve essere distribuito solo in strutture dotate di idonee attrezzature a basso volume che nebulizzano il prodotto sulla derrata all'atto dell'immagazzinamento alla base dell'elevatore. La quantità di K-OBIOL ULV 6 erogata per ora dall'apparecchiatura viene determinata in base al flusso di grano dell'elevatore. Il sistema deve funzionare, a regime, in assenza dell'operatore

Esempio:

FLUSSO DI GRANO t/ora	Quantità di K-OBIOL ULV 6 da nebulizzare per ora in litri	
	42 ml/t	84 ml/t
10	0,42	0,84
20	0,84	1,68
30	1,27	2,54
40	1,68	3,36
50	2,10	4,20
60	2,52	5,04
70	2,94	5,88
80	3,36	6,72
90	3,78	7,56
100	4,20	8,40
110	4,62	9,24
120	5,04	10,08
130	5,46	10,92
140	5,88	11,76
150	6,30	12,60
160	6,72	13,44
170	7,14	14,28
180	7,56	15,12
190	7,98	15,96
200	8,40	16,80

L'apparecchiatura deve distribuire gocce molto fini (mediamente 20 µm) in un punto ove la derrata passa con forte turbinio (esempio caduta al piede dell'elevatore). Prima di introdurre le derrate si consiglia di effettuare un'accurata pulizia e disinfestazione di silos, magazzini.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili.

COMPATIBILITÀ

K-OBIOL ULV 6 si impiega da solo

INTERVALLO DI SICUREZZA: 2 giorni

AVVERTENZE

I cereali destinati all'alimentazione umana e del bestiame devono essere sottoposti ad adeguato processo di pulitura.

La distribuzione del prodotto sulle derrate da trattare, la movimentazione e l'eventuale confezionamento delle stesse devono essere effettuati con sistemi meccanici sufficientemente protetti in modo da consentire il contenimento della diffusione nell'ambiente di lavoro del prodotto fitosanitario e delle polveri derivanti dalla movimentazione della granella trattata, entro limiti igienicamente accettabili.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScienc

® Marchio registrato DPD 30.06.05

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

K-OBIOL® DP2

Insetticida in polvere secca a lunga durata di protezione per la disinfestazione dei cereali in granella immagazzinati

Composizione:
Deltametrina pura 0,2 g
coformulanti quanto basta a 100

**ATTENZIONE
MANIPOLARE CON
PRUDENZA**

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea: reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione. **Consultare un Centro Antiveleni**.

CARATTERISTICHE
K-OBIOL DP2 è un insetticida per la prevenzione e la cura delle infestazioni dei cereali.
K-OBIOL DP2 agisce per contatto ed ingestione contro tutti gli insetti che infestano i cereali in granella immagazzinati.
K-OBIOL DP2 assicura una lunga protezione (6-12 mesi).
K-OBIOL DP2 non trasmette alcun odore alle derrate trattate e non altera la germinabilità dei semi.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Contro *Sitophilus spp.* (Calandra), *Oryzaephilus surinamensis* (Silvano), *Tribolium spp.* (Tribolio), *Rhisopertha dominica* (Cappuccino), *Sitotroga cerealella, Ephestia Kuehniella, Plodia interpunctella* (Tignole), *Tenebroides mauritanicus* (Struggigrano), *Tenebrio molitor* (Tenebrione), *Trogoderma spp.* (Trogoderma), *Stegobium paniceum* (stegobio del pane), *Bruchus spp.* (Tonchi): 0,5 kg/ton di derrata da disinfestare.
K-OBIOL DP2 deve essere distribuito uniformemente nella massa della derrata all'atto dell'immagazzinaggio, mediante pale e rastrelli. Nei silos distribuire il prodotto sulle coclee e nastri trasportatori all'atto dell'insilamento o nel passaggio da una cella all'altra.

COMPATIBILITA'
K-OBIOL DP2 si impiega da solo.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili.

AVVERTENZE
I cereali destinati all'alimentazione umana e del bestiame devono essere sottoposti ad adeguato processo di pulitura.
La distribuzione del prodotto sulle derrate da trattare, la movimentazione e l'eventuale confezionamento delle stesse devono essere effettuati con sistemi meccanici sufficientemente protetti in modo da consentire il contenimento della diffusione nell'ambiente di lavoro del prodotto fitosanitario e delle polveri derivanti dalla movimentazione della granella trattata, entro limiti igienicamente accettabili.
E' necessario usare indumenti protettivi e un facciale filtrante FFP3 a protezione delle vie respiratorie.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Registrazione N. 6556 del 07.11.1985 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
Bayer CropScience GmbH, Francoforte sul Meno (Germania)
SBM Formulation – St. Marcel – Marsiglia (Francia)
Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Distribuito da: SIAPA S.r.l. – Via Caldera, 21 – 20153 MILANO

Contenuto netto: 0,05 – 0,25 – 0,5 - 1 - 5 - 10 – 25 Kg

Partita N.

Bayer CropScience

® marchio registrato DPD 30.06.05/a

Etichetta/foglio illustrativo

K-OBIOL® EC 25

INSETTICIDA A LUNGA DURATA DI PROTEZIONE PER LA DISINFESTAZIONE DEI CEREALI IN GRANELLA IMMAGAZZINATI (AD ECCEZIONE DEL RISO)

Formulazione: concentrato emulsionabile

K-OBIOL® EC 25

Composizione:
Deltametrina pura 2,66 % p/p (= 25 g/l)
Piperonilbutossido 23,91% p/p (= 225 g/l)
Coformulanti quanto basta a 100
Contiene: nafta solvente (petrolio) aromatica leggera

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO :
Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano- Tel. 02/3972.1
Registrazione N. 6557 del 7/11/1985 del Ministero della Sanità
Officine di produzione : Bayer CropScience GmbH - Francoforte S/Meno (Germania); SBM Formulation – St. Marcel Marsiglia (Francia); Isagro S.p.A. – Aprilia (LT); Diachem S. p. A. – Unità produttiva SIFA – Caravaggio (BG), Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Contenuto netto: 0,1 - 0,25 - 1 - 5 - 10 - 20 L
Partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità' da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del snc: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
N.b. diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
K-OBIOL EC 25 e' un insetticida per la prevenzione e la cura delle infestazioni dei cereali.
K-OBIOL EC 25 agisce per contatto ed ingestione contro tutti gli insetti che infestano i cereali in granella immagazzinati.
K-OBIOL EC 25 assicura una lunga protezione (6-12 mesi).
K-OBIOL EC 25 non trasmette alcun odore sulle derrate trattate e non altera la germinabilità dei semi.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
- trattamento diretto alle derrate
Contro *Sitophilus spp.* (calandra), *Oryzaephilus surinamensis* (silvano), *Tribolium spp.* (tribolio), *Rhizopertha dominica* (cappuccino), *Sitotroga cerealella, Ephestia kuehniella, Plodia interpunctella* (tignole), *Tenebrioides mauritanicus* (struggigrano), *Tenebrio molitor* (tenebrione), *Trogoderma spp* (trogoderma), *Stegobium paniceum* (stegobio del pane), *Bruchus spp* (tonchi), 10-20 ml/tonnellata. La dose più bassa si impiega per ottenere una protezione di 6 mesi circa, la più alta per una protezione di 9-12 mesi. Diluire 1-2 litri di K-OBIOL EC 25 in 100 litri d'acqua e distribuire uniformemente 1 litro di emulsione per ogni tonnellata di cereale (ad eccezione del riso) all'atto dell'immagazzinamento mediante un'attrezzatura idonea alla spruzzatura su nastro trasportatore, coclea, elevatore.
Per ottenere i migliori risultati e' indispensabile una distribuzione uniforme. Prima di introdurre le derrate si consiglia di effettuare un'accurata pulizia e disinfestazione di silos, magazzini.
Il prodotto deve essere distribuito solo in strutture dotate di idonee attrezzature a basso volume che nebulizzano il prodotto sulla derrata all'atto dell'immagazzinamento alla base dell'elevatore. Il sistema deve funzionare, a regime, in assenza dell'operatore.
- trattamento diretto ai sacchi di cereali
Diluire 1 litro di K-OBIOL EC 25 in 100 litri d'acqua e distribuire, mediante pompa a pressione, 1 litro di emulsione ogni 20 mq di superficie da disinfestare.

COMPATIBILITA'
K-OBIOL EC 25 si impiega da solo.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 2 giorni

AVVERTENZE
I cereali destinati all'alimentazione umana e del bestiame devono essere sottoposti ad adeguato processo di pulitura.
La distribuzione del prodotto sulle derrate da trattare, la movimentazione e l'eventuale confezionamento delle stesse devono essere effettuati con sistemi meccanici sufficientemente protetti in modo da consentire il contenimento della diffusione nell'ambiente di lavoro del prodotto fitosanitario e delle polveri derivanti dalla movimentazione della granella trattata, entro limiti igienicamente accettabili.
Usare un facciale filtrante con filtro combinato contro aerosol solidi e liquidi ed antigas FFAP3 SL (EN 405).

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

BAYER Bayer CropScience

® marchio registrato

DPD 30.06.05

Rhodax R

Fungicida sistemico e di contatto ad azione biologica per la lotta contro la Peronospora della vite
Polvere bagnabile

Rhodax R

Composizione:

Fosetil Alluminio 30 g
Rame metallo puro 30 g
(da Rame Ossicloruro)
Coformulanti q.b. a 100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio

Nocivo per inalazione e ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'Autorizzazione:

Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione:

AgriFormula s.r.l. - Paganica (AQ)
SBM Formulation – St. Marcel – Marsiglia – (Francia)
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Registrazione n. 6609 Ministero della Sanità del 4/2/1986

Contenuto netto: 200 - 500 g / 1 - 5 – 10 Kg

Partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
FOSETIL ALLUMINIO 30%
RAME METALLO (da ossicloruro) 30%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Fosetil Alluminio: --
Rame Ossicloruro :
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi.
Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il Rhodax R é un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo soprattutto ascendente. L'attività nei confronti della Peronospora si é rivelata sia preventiva che curativa.
La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
Queste caratteristiche, unite alla persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta contro la Peronospora della vite anche con interventi distanziati a cadenza fissa.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il Rhodax R va impiegato sulla vite dal primo trattamento antiperonosporico fino alla fase di "chiusura del grappolo" compresa.
Il primo trattamento va effettuato quando i germogli della vite sono lunghi cm 10. Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo.
Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni fino alla fase di "chiusura del grappolo" compresa.
Dose: g 400 per 100 litri d'acqua.

COMPATIBILITA'

Il prodotto é miscibile con i prodotti viticoli della nostra gamma.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura.

NOCIVITA'

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

ADIPLANT N

BAGNANTE ADESIVO NEUTRO

ADIPLANT N

COMPOSIZIONE:

g 100 di ADIPLANT N contengono:
g 10,5 di alcool di tipo laurilico propossilato ed etossilato puro
coformulanti quanto basta a 100.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:

Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Registrazione Ministero della Sanità n. 6642 del 18.03.86
Contenuto netto: litri 1 - 5
Partita N.:

Informazioni mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi di impiego: 0,03 - 0,05% (30-50 ml per ettolitro).
La dose maggiore si impiega quando le superfici vegetali sono difficilmente bagnabili (presenza di cera, peli) o quando si deve intervenire contro parassiti che per la loro particolare protezione naturale risultano difficilmente raggiungibili (afide lanigero, cocciniglie).
N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Compatibilità: Adiplant N è miscibile con tutti gli antiparassitari ad eccezione di quelli per i quali è sconsigliabile l'aggiunta di un bagnante.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Poichè il prodotto viene impiegato solo in miscela, attenersi a quanto riportato sull'etichetta del prodotto più tossico per la sospensione dei trattamenti prima della raccolta.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti. bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare al riparo dal gelo.

BAYER Bayer CropScience

DPD 30.06.05

Etichetta/Foglio Illustrativo

BAYFIDAN® WG

FUNGICIDA

MICROGRANULARE IDROSOSPENSIBILE

per la lotta contro l'oidio (mal bianco) del melo e della vite, e contro l'oidio e le ruggini di cereali (grano e orzo), ortaggi (melone, cetriolo, zucchino, peperone, pomodoro)

BAYFIDAN® WG
COMPOSIZIONE
100 g di Bayfidan WG contengono:
5 g di triadimenol puro
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione:
Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officina di produzione e confezionamento:
BAYER CropScience AG – Dormagen (GERMANIA)
Officine di confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. - FILAGO (BG)
STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
DIACHEM S.p.A. - unita' produttiva SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Contenuto netto: 100 g; 1, 5, 10 kg
Registrazione Ministero della Sanita' n. 6663 del 08.04.86
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Melo: contro l'oidio: 0,05-0,08 % (50-80 g in 100 l di acqua) con impiego di 15-20 hl/ha
Vite: contro l'oidio: 0,05 - 0,1% (50-100 g in 100 l d'acqua) impiegando 10 hl/ha. **Per trattamenti curativi:** 0,1% (100 g in 100 l d'acqua) effettuando 2-3 trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni, di cui il primo all'inizio dell'attacco.
Ortaggi: contro mal bianco del melone, cetriolo, zucchino, peperone, pomodoro: 0,05 - 0,1% (50-100 g in 100 l d'acqua).
N.B.: per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione. Usare la dose più elevata nei casi di maggiore sensibilità varietale, in zone particolarmente soggette agli attacchi di oidio e quando gli intervalli tra i trattamenti siano superiori a 10 giorni.
Cereali (grano, orzo): contro mal bianco e ruggini: 2,5 kg/ha diluiti in 600-800 litri d'acqua intervenendo alla comparsa dei primi sintomi.
Avvertenze: per tutte le colture usare la dose più elevata nei casi di maggiore sensibilità varietale, in zone particolarmente soggette agli attacchi di oidio e quando gli intervalli tra i trattamenti siano superiori a 10 giorni.

Compatibilità: il Bayfidan WG è miscibile con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto per zucchino, 14 giorni prima del raccolto per melo, ortaggi e vite e 30 giorni prima del raccolto per cereali

DPD

30.06.05/a

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare al riparo dall'umidità.

Bayer CropScience

® marchio registrato

DPD

30.06.05/a

R6 Erresei® triplo

Fungicida sistemico e di contatto, ad azione preventiva e curativa, contro la Peronospora della vite, del pomodoro e del tabacco.

Polvere bagnabile

R6 Erresei® triplo

Composizione:

g 100 di prodotto contengono :
g 32,5 di Fosetil Alluminio puro
g 2,5 di Cimoxanil puro
g 25 di Mancozeb puro
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio:
Irritante per le vie respiratorie - Rischio di gravi lesioni oculari
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande -
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori -
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico -
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
Non gettare i residui nelle fognature.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel: 02/3972.1
Officine di Produzione: Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG); AgriFormula s.r.l., Paganica (AQ)
SBM Formulation – St. Marcel – Marsiglia – Francia; Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)
Registrazione n. 6891 Ministero della Sanità del 3/12/1986

Contenuto netto: 200 - 500 g / 1 - 5 - 10 - 15 - 25 Kg
Partita n.: *

NORME PRECAUZIONALI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive : Fosetil Alluminio 32,5%, Cimoxanil 2,5%, Mancozeb 25% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

FOSETIL ALLUMINIO: Sintomi : sedazione, dispnea, depressione

CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

MANCOZEB: Sintomi - cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC : atassia, confusione, depressione, iporeflessia.

N.B. - Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia : sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fungicida messo a punto per la lotta contro la Peronospora della vite, del tabacco e del pomodoro.
Esso è costituito da tre principi attivi:- FOSETIL Alluminio ad azione sistemica;- CIMOXANIL ad azione di contatto ed endoterapica;- MANCOZEB ad azione di contatto.
Questa associazione conferisce al prodotto un'attività preventiva e curativa.

MODALITA' D'IMPIEGO
VITE: contro la Peronospora: dose 400 g/hl d'acqua, distribuendo non meno di 4 Kg/ha di formulato nelle fasi di maggior sviluppo vegetativo.
Grazie alla lunga persistenza d'azione il prodotto può essere impiegato a cadenza fissa. Il primo trattamento va effettuato quando si verificano le condizioni di infezione che sono: germogli lunghi 10 cm; pioggia di 10 mm; temperatura di 10°C.
Successivamente intervenire con cadenza non superiore a 14 giorni. Azione curativa: dose 400 g/hl d'acqua. Il prodotto é in grado di stroncare un'infezione in atto se viene irrorato entro 2-3 giorni dall'inizio della pioggia.
TABACCO : contro la Peronospora dose 400 g/hl.
POMODORO : (solo fino alla prima fioritura) contro la Peronospora dose 400 g/hl.
Per la preparazione della miscela mettere la dose occorrente di prodotto in poca acqua, indi mescolare al fine di ottenere una pasta omogenea. Versare nell'irroratrice e portare a volume agitando.
Non impiegare in serra.

COMPATIBILITA'
Non associare ad olii minerali ed in caso di miscela con concimi fogliari si consiglia di procedere a saggi preliminari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.
Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto
Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze - Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05
® Marchio registrato

R6 Erresei® triplo

Fungicida sistemico e di contatto, ad azione preventiva e curativa, contro la Peronospora della vite, del pomodoro e del tabacco.
Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

R6 Erresei® triplo

Composizione:

g 100 di prodotto contengono :
g 32,5 di Fosetil Alluminio puro
g 2,5 di Cimoxanil puro
g 25 di Mancozeb puro
Coformulanti q.b. a 100

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Irritante per le vie respiratorie - Rischio di gravi lesioni oculari.
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel: 02/3972.1
Officine di Produzione: Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG);
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA); AgriFormula s.r.l., Paganica (AQ);
SBM Formulation – St. Marcel – Marsiglia – Francia; Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)
Registrazione n. 6891 Ministero della Sanità del 3/12/1986
Contenuto netto: Kg 1(contiene 1 sacchetto da Kg 1); Kg 2 (contiene 5 sacchetti da 400 g); Kg 5 (contiene 5 sacchetti da Kg 1); Kg 8 (contiene 4 sacchetti da Kg 2) Kg 10 (contiene 5 sacchetti da Kg 2)
Partita n.: *

NORME PRECAUZIONALI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive : Fosetil Alluminio 32,5 %, Cimoxanil 2,5 %, Mancozeb 25 % le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

FOSETIL ALLUMINIO: Sintomi : sedazione, dispnea, depressione

CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

MANCOZEB: Sintomi -cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme. sensibilizzazione; SNC : atassia, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. - Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia : sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fungicida messo a punto per la lotta contro la Peronospora della vite, del tabacco e del pomodoro. Esso è costituito da tre principi attivi:- FOSETIL Alluminio ad azione sistemica;- CIMOXANIL ad azione di contatto ed endoterapica;- MANCOZEB ad azione di contatto. Questa associazione conferisce al prodotto un'attività preventiva e curativa.
MODALITA' D'IMPIEGO
VITE: contro la Peronospora: dose 400 g/hl d'acqua, distribuendo non meno di 4 Kg/ha di formulato nelle fasi di maggior sviluppo vegetativo.
Grazie alla lunga persistenza d'azione il prodotto può essere impiegato a cadenza fissa. Il primo trattamento va effettuato quando si verificano le condizioni di infezione che sono: germogli lunghi 10 cm; pioggia di 10 mm; temperatura di 10°C.
Successivamente intervenire con cadenza non superiore a 14 giorni. Azione curativa: dose 400 g/hl d'acqua. Il prodotto é in grado di stroncare un'infezione in atto se viene irrorato entro 2-3 giorni dall'inizio della pioggia.
TABACCO : contro la Peronospora dose 400 g/hl.
POMODORO : (solo fino alla prima fioritura) contro la Peronospora dose 400 g/hl.
Per la preparazione della miscela mettere la dose occorrente di prodotto in poca acqua, indi mescolare al fine di ottenere una pasta omogenea. Versare nell'irroratrice e portare a volume agitando.
Non impiegare in serra.

COMPATIBILITA'
Non associare ad olii minerali ed in caso di miscela con concimi fogliari si consiglia di procedere a saggi preliminari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DPD 30.06.05

Avvertenze - Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO

Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

Bayer CropScience

® marchio registrato

DPD 30.06.05

R6 Erresei® triplo blu

Fungicida sistemico e di contatto, ad azione preventiva e curativa, contro la Peronospora della vite e del tabacco
Polvere bagnabile

R6 Erresei® triplo blu

Composizione
g 100 di prodotto contengono :
g 32,5 di Fosetil Alluminio puro
g 2,5 di Cimoxanil puro
g 25 di Mancozeb puro
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio:
Irritante per le vie respiratorie - Rischio di gravi lesioni oculari
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande -
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori -
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico -
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
Non gettare i residui nelle fognature.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione:
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
AgriFormula s.r.l., Paganica (AQ)
SBM Formulation – St. Marcel – 13367 Marsiglia – Francia
Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6892 del 3/12/1986

Contenuto netto: 200 - 500 g / 1 - 5 - 10 - 15 – 25 kg

Partita n.:*

Norme precauzionali:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
Fosetil Alluminio 32,5 % ; Cimoxanil 2,5 %, Mancozeb 25 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

FOSETIL ALLUMINIO: Sintomi: sedazione, dispnea, depressione. **CIMOXANIL** : Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

MANCOZEB: Sintomi - cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B.- Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia : sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fungicida messo a punto per la lotta contro la Peronospora della vite e del tabacco.
Esso è costituito da tre principi attivi:
- FOSETIL Alluminio ad azione sistemica; CIMOXANIL ad azione di contatto ed endoterapica; MANCOZEB ad azione di contatto.
Questa associazione conferisce al prodotto un'attività preventiva e curativa.

MODALITA' D'IMPIEGO
VITE: contro la Peronospora: dose 400 g/hl d'acqua, distribuendo non meno di 4 Kg/ha di formulato nelle fasi di maggior sviluppo vegetativo.
Grazie alla lunga persistenza d'azione il prodotto può essere impiegato a cadenza fissa. Il primo trattamento va effettuato quando si verificano le condizioni di infezione che sono: germogli lunghi 10 cm; pioggia di 10 mm; temperatura di 10 °C.
Successivamente intervenire con cadenza non superiore a 14 giorni.
Azione curativa: dose 400 g/hl d'acqua.
Il prodotto é in grado di stroncare un'infezione in atto se viene irrorato entro 2-3 giorni dall'inizio della pioggia.
TABACCO: contro la Peronospora dose 400 g/hl.
Per la preparazione della miscela mettere la dose occorrente di prodotto in poca acqua, indi mescolare al fine di ottenere una pasta omogenea. Versare nell'irroratrice e portare a volume agitando.
Non impiegare in serra.

COMPATIBILITA'
Non associare ad olii minerali ed in caso di miscela con concimi fogliari si consiglia di procedere a saggi preliminari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

R6 Erresei® triplo blu

Fungicida sistemico e di contatto, ad azione preventiva e curativa, contro la Peronospora della vite e del tabacco
Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

R6 Erresei ® triplo blu

Composizione
g 100 di prodotto contengono :
g 32,5 di Fosetil Alluminio puro
g 2,5 di Cimoxanil puro
g 25 di Mancozeb puro
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio:
Irritante per le vie respiratorie - Rischio di gravi lesioni oculari
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
Non gettare i residui nelle fognature.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione:
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 - Cotignola (RA)
AgriFormula s.r.l., Paganica (AQ)
SBM Formulation – St. Marcel – 13367 Marsiglia – Francia
Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6892 del 3/12/1986

CONTENUTO NETTO: Kg 1(contiene 1 sacchetto da Kg 1); Kg 2 (contiene 5 sacchetti da 400 g); Kg 5 (contiene 5 sacchetti da Kg 1); Kg 8 (contiene 4 sacchetti da Kg 2); Kg 10 (contiene 5 sacchetti da Kg 2)

Partita n.:*

Norme precauzionali:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
Fosetil Alluminio 32,5 % ; Cimoxanil 2,5 %, Mancozeb 25 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

FOSETIL ALLUMINIO: Sintomi: sedazione, dispnea, depressione.

CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

MANCOZEB: Sintomi - cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B.-Effetto antabuse : si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia : sintomatica - **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fungicida messo a punto per la lotta contro la Peronospora della vite e del tabacco.
Esso è costituito da tre principi attivi:
- FOSETIL Alluminio ad azione sistemica; CIMOXANIL ad azione di contatto ed endoterapica; MANCOZEB ad azione di contatto.
Questa associazione conferisce al prodotto un'attività preventiva e curativa.

MODALITA' D'IMPIEGO
VITE: contro la Peronospora: dose 400 g/hl d'acqua, distribuendo non meno di 4 Kg/ha di formulato nelle fasi di maggior sviluppo vegetativo.
Grazie alla lunga persistenza d'azione il prodotto può essere impiegato a cadenza fissa. Il primo trattamento va effettuato quando si verificano le condizioni di infezione che sono: germogli lunghi 10 cm; pioggia di 10 mm; temperatura di 10 °C.
Successivamente intervenire con cadenza non superiore a 14 giorni.
Azione curativa: dose 400 g/hl d'acqua.
Il prodotto é in grado di stroncare un'infezione in atto se viene irrorato entro 2-3 giorni dall'inizio della pioggia.
TABACCO : contro la Peronospora dose 400 g/hl.
Per la preparazione della miscela mettere la dose occorrente di prodotto in poca acqua, indi mescolare al fine di ottenere una pasta omogenea. Versare nell'irroratrice e portare a volume agitando.
Non impiegare in serra.

COMPATIBILITA'
Non associare ad olii minerali ed in caso di miscela con concimi fogliari si consiglia di procedere a saggi preliminari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.
Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI
PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti solubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

Bayer CropScience

® Marchio registrato DPD 30.06.05

Targa® Flo

Erbicida selettivo delle colture indicate, efficace contro le infestanti graminacee annuali e poliennali.
Sospensione concentrata (SC)

Targa® Flo

Composizione:
g 100 di prodotto contengono :
Quizalofop etile isomero D 4,93 g (= 50 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego– Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Registrazione n° 6956 del 05/02/1987 del Ministero della Sanità
Officine di Produzione:
Agriformula S.r.l., Paganica (AQ)
Bayer CropScience France, Villefranche – Francia

CONTENUTO NETTO: 250 – 500 ml - 1 - 5 - 10 – 20 L

PARTITA n.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Targa Flo è un erbicida selettivo per il diserbo di post-emergenza delle colture contro le infestanti graminacee annuali e poliennali di seguito riportate.
Il prodotto va applicato sulle infestanti già emerse, che vengono distrutte per azione di contatto e di assorbimento fogliare. Agisce lentamente: occorrono 7-15 giorni, in relazione all'andamento stagionale, per manifestare l'effetto erbicida. Le condizioni climatiche favorevoli alla crescita vegetativa delle infestanti (caldo e buon livello di umidità del terreno) migliorano ed accelerano l'efficacia del prodotto. Per quanto concerne le infestanti perennanti, la frammentazione dei rizomi effettuata con lavorazioni meccaniche migliora l'efficacia del trattamento.

INFESTANTI SENSIBILI
a) Annuali :
Coda di volpe (Alopecurus myosuroides),
Loglio (Lolium spp.),
Giavone comune (Echinochloa crus-galli),
Falso panico (Setaria spp.),
Digitaria (Digitaria sanguinalis),
Avena selvatica (Avena spp.),
Falaride (Phalaris spp.),
ricacci di cereali, riso crodo

b) Poliennali :
Falsa gramigna (Agropyron repens = Elimus repens),
Gramigna comune (Cynodon dactylon),
Sorghetta (Sorghum halepense)

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto risulta selettivo per le colture sottoindicate, sulle quali può venire impiegato in qualsiasi stadio di sviluppo:
aglio, barbabietola da zucchero, carciofo, carota, cavolfiore, cavolo cappuccio, cipolla, colza, erba medica, fagiolino, fragola, girasole, melone, pisello, pomodoro, radicchio, soia, spinacio, tabacco, zucchino.
DOSE D'IMPIEGO:
1 – 1,5 l/ha in 300 - 400 litri di acqua.
La dose minore é da impiegare su graminacee nello stadio di **1 - 3** foglie, la dose maggiore é indicata dallo stadio di accestimento in poi.
Per combattere infestazioni di Sorghum halepense da rizoma si può intervenire:
- trattamento frazionato a 1 l/ha su infestante a 20-30 cm di altezza, seguito da 1,5 l/ha sui ricacci dell'infestante
- trattamento unico a 2,5 l/ha su infestante in fase di levata-inizio botticella.

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ
Trattare in assenza di vento in modo da non danneggiare colture sensibili vicine.
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
NOCIVITÀ
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta
20 giorni per erba medica, fagiolino, spinacio;
30 giorni per aglio, carciofo, carota, fragola, melone, pisello, tabacco, zucchino;
60 giorni per barbabietola da zucchero, cavolfiore, cavolo cappuccio, cipolla, colza, girasole, pomodoro, radicchio, soia;

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze
Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® Marchio registrato Nissan Chemical DPD 30.06.05

FOSECUR BIANCO

Fungicida sistemico e di contatto ad azione preventiva e curativa contro la Peronospora della vite
Polvere bagnabile

FOSECUR BIANCO

Composizione :
g 100 di prodotto contengono:
g 60 Fosetil alluminio puro
g 5 Cimoxanil puro
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio
Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Officine di produzione: Agriformula S.r.l. - Paganica (AQ); Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Registrazione n. 7282 Ministero della Sanità del 26/11/87

Contenuto Netto: g 200 - 500 / Kg 1- 5- 10- 15- 25
Partita n.:*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO 60%; CIMOXANIL 5%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FOSETIL ALLUMINIO: ---
CIMOXANIL: Derivato dell'urea.
Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il FOSECUR BIANCO é un fungicida messo a punto per la lotta contro la Peronospora della vite. Esso é costituito da due principi attivi:
- Fosetil Alluminio ad azione sistemica,
- Cimoxanil ad azione di contatto ed endoterapica.
Questa associazione conferisce al prodotto un'attività preventiva e curativa.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
VITE: contro Peronospora: dose 200 g per 100 l d'acqua.
Grazie alla lunga persistenza d'azione, il prodotto può essere impiegato a cadenza fissa.
Il primo trattamento va effettuato quando si verificano le condizioni di infezione che sono:
- germogli lunghi 10 cm.
- pioggia di 10 mm.
- temperatura di 10 gradi.
Successivamente intervenire a cadenza di 15 giorni fino alla fase di allegagione.
Azione curativa: dose 200 g per 100 l d'acqua.
Il prodotto é in grado di stroncare un'infezione in atto se viene irrorato entro 2 - 3 giorni dall'inizio della pioggia.

COMPATIBILITA'
Il prodotto é compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare il prodotto in associazione a prodotti con reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

CHIPCO® GREEN

Fungicida per la lotta di malattie diverse dei tappeti erbosi
Sospensione Concentrata

CHIPCO® GREEN
COMPOSIZIONE
100 g di Chipco Green contengono:
25 g di Iprodione puro (255 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.
Frasi di Rischio
Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

NOCIVO

Titolare dell'autorizzazione:
Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Registrazione Ministero della Sanità N. 7390 del 02.02.1988
Officine di produzione: Bayer CropScience France – Villefranche (Francia)
Bayer CropScience S.r.l. . Filago (BG)
IRCA Service S.r.l. – Fornovo S. Giovanni (BG)
Distribuito da: AGRICO S.r.l. – Viale Masini, 22 – 40126 BOLOGNA
Contenuto netto: 250 - 500 ml; 1 - 2 - 5 -10 L
Partita n°

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto é una formulazione in sospensione concentrata per combattere malattie diverse dei tappeti erbosi di graminacee, come di seguito indicato.

ISTRUZIONI PER L'USO
TAPPETI ERBOSI DI GRAMINACEE, PER CAMPI DA GOLF E CAMPI DA CALCIO:
contro Corticium fuciforme (fil rouge), Fusarium spp. e Typhula spp. alla dose di 20 l/ha;
contro Helmintosporium, Sclerotinia homeocarpa (dollar spot) e Rhizoctonia alla dose di 10-12 l/ha.
Avvertenza: impedire l'accesso nell'area trattata prima di 12 ore dall'irrorazione e comunque fino a che la vegetazione è completamente asciutta.
COMPATIBILITA': Il prodotto non è miscibile con prodotti a base di Zolfo, Dicofol, Poltiglia Bordolese o Solfocalcica. Il trattamento con CHIPCO GREEN deve essere distanziato di 10-15 giorni dal trattamento con i prodotti sopraindicati.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.
Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze - Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Conservare al riparo dal gelo. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® marchio registrato

DPD 30.06.05/a

BUCTRIL® M

Erbicida selettivo di post-emergenza del frumento tenero e duro, orzo, segale e avena contro le infestanti dicotiledoni.

Concentrato emulsionabile (EC)

BUCTRIL® M
Composizione:
g 100 di prodotto contengono :
g 29,7 di Bromoxinil Ottanoato (= 327 g/l)
g 20,5 di MCPA (da estere isoottilico) (= 225 g/l)
Coformulanti q.b. a 100
Contiene: nafta solvente (petrolio), aromatica pesante

NOCIVO

Frasi di Rischio :
Nocivo per ingestione. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione :
AgriFormula S.r.l. - Paganica (AQ)
Bayer CropScience Ltd. - Norwich - Inghilterra
Bayer CropScience France - Villefranche - Francia
Registrazione n. 7393 del 02/02/1988 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: ml 250 / litri 1 - 5 - 10 - 20
Partita n.: *

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BROMOXINIL OTTANOATO 29,7 %
MCPA (da estere isoottilico) 20,5 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
BROMOXINIL OTTANOATO
Sintomi: irritazione congiuntivale, cutanea e delle vie respiratorie. Per ingestione provoca nausea, scialorrea, vomito, dispnea, cianosi, ipertermia, letargia e coma. Terapia: l'ipertermia va combattuta raffreddando il corpo del paziente con l'applicazione di impacchi freddi alla radice degli arti. Con gli antipiretici non si ottiene l'effetto desiderato.
MCPA (da estere isoottilico)
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni.
Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto é un erbicida di post-emergenza del frumento tenero e duro, dell'orzo, della segale e dell'avena. Esso é costituito dall'associazione di due principi attivi, Bromoxinil ed MCPA, in proporzioni sperimentalmente individuate per fornire un ampio spettro d'azione contro le infestanti dicotiledoni.
INFESTANTI SENSIBILI:
Adonide (*Adonis aestivalis*), Camomilla bastarda (*Anthemis arvensis*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Peverina maggiore (*Cerastium arvense*), Canapa selvatica (*Galeopsis tetrahit*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Poligoni (*Polygonum* spp.), Ranuncoli (*Ranunculus* spp.), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Senape (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*), Veccia (*Vicia* spp.), Lamio (*Lamium* spp.), Erba calderina (*Senecio vulgaris*), Erba storna (*Thlaspi arvense*).
INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI:
Fumaria (*Fumaria officinalis*), Veronica (*Veronica* spp.).
MODALITA' D'IMPIEGO E DOSI
Effettuare il trattamento nel periodo dell'accestimento delle colture sino all'inizio della levata (massimo 2 nodi).
Dosi: 1-1,5 l/ha, distibuiti con 500-600 litri di acqua.
COMPATIBILITA'
Il prodotto si impiega da solo.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta, può danneggiare colture sensibili quali: la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, etc.
Evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Lavare le attrezzature usate per la distribuzione con acqua calda e soda e risciacquare con acqua.
NOCIVITA'
Il prodotto é nocivo per gli insetti utili, animali domestici e bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience
® Marchio registrato

DPD 30.06.05

Larvin®

Insetticida flowable liquido a base di Tiodicarb

LARVIN®

COMPOSIZIONE:
100 g di Larvin contengono:
Tiodicarb g 23, 39 (= 250 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
Contiene formaldeide

TOSSICO

Frasi di rischio
Tossico per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

Consigli di prudenza
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – 20156 Milano – Viale Certosa 130 – tel 02 3972.1
Officine di produzione: AgriFormula S.r.l., Paganica (AQ);
Bayer CropScience France - Villefranche – Francia

Registrazione n. 7413 Ministero della Sanità del 18/2/1988

Contenuto netto: ml 250, l 1 - 5
Partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Avvertenze: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

LARVIN é un insetticida liquido flowable efficace contro un'ampia gamma di insetti parassiti delle colture ed in particolare contro larve o bruchi di Lepidotteri.
Il prodotto esplica un'azione insetticida per ingestione ed in misura molto ridotta per contatto, ed un'azione ovicida specifica sui Lepidotteri. Per le sue caratteristiche di efficacia il prodotto risulta selettivo per un gran numero di predatori e parassiti secondari degli insetti fitoparassiti.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega alla prima comparsa dei parassiti ed a ogni eventuale reinfestazione alle dosi sottoindicate per i parassiti e le colture sottoelencate:
COLTURA PROTETTA, PARASSITA COMBATTUTO E DOSI D'IMPIEGO
Pero: Carpocapsa, Eulia, Ricamatrici (Pandemis, Cacoecia, Capua)**:**
150 - 200 ml per 100 l d'acqua.
Pesco: Tignole (Anarsia lineatella e Grapholita molesta), Ricamatrici (Pandemis, Capua): 120 - 180 ml per 100 l d'acqua.
Garofano in pieno campo: Beghe del garofano (Tortrix pronubana, Epichoristodes acerbella), Nottue: 2 - 4 l con 1000 litri d'acqua per ettaro).

COMPATIBILITA'

Il prodotto é compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto é tossico per gli insetti utili, gli animali domestici e il bestiame.
Evitare di contaminare corsi d'acqua, laghi e stagni. Il prodotto é anche tossico per le api.
Evitare i trattamenti nel periodo della fioritura e quando le api frequentano l'area trattata.
Si consiglia di tenere lontano dalle zone trattate animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti prima del raccolto: 19 giorni per le pesche, 60 giorni per le pere

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Conservare al riparo dal gelo.

BAYER Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

BROMINAL® MAIS

Diserbante di post-emergenza selettivo per la coltura del granoturco
Concentrato emulsionabile (EC)

BROMINAL® MAIS

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Bromoxinil Ottanoato g 31,67 (=327,5 g/l)
Coformulanti q.b. a 100.

Contiene: nafta solvente (petrolio), aromatica pesante.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione e ingestione.
Irritante per gli occhi.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare dell'Autorizzazione :
Bayer CropScience S.r.l. - viale Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione :
AgriFormula S.r.l. - Paganica (AQ)
Bayer CropScience Ltd. - Norwich - Inghilterra
Bayer CropScience France - Villefranche - Francia

Registrazione n. 7696 Ministero della Sanità del 02/02/1989

Contenuto netto: : 1 - 5 L

Partita n.:*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritazione congiuntivale, cutanea e delle vie respiratorie.
Per ingestione provoca nausea, scialorrea, vomito, dispnea, cianosi, ipertermia, letargia e coma.
Terapia: l'ipertermia va combattuta raffreddando il corpo del paziente con l'applicazione di impacchi freddi alla radice degli arti. Con gli antipiretici non si ottiene l'effetto desiderato.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il BROMINAL MAIS é un diserbante di post-emergenza selettivo per la coltura del granturco. È efficace contro un gran numero di infestanti a foglia larga del granturco. Controlla la maggior parte delle dicotiledoni annuali e biennali ed in particolare: Vilucchio, Stoppione, Equiseto, Amaranto, Cirsio, Romice.
I trattamenti più vantaggiosi sono quelli effettuati su infestanti giovani ed in attiva vegetazione in quanto maggiore è l'efficacia erbicida anche alle dosi più basse di prodotto.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega alla dose di 1 - 1,7 l/ha in 300 - 600 l d'acqua/ha quando il granturco è allo stadio di sviluppo di 4 - 6 foglie. Non trattare con BROMINAL MAIS quando la coltura è in condizioni di stress dovute ad eccesso di acqua nel terreno o alla siccità, e per temperature superiori a 28°C.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto può essere miscelato con erbicidi graminicidi, per esempio Atrazina, onde ampliarne lo spettro d'azione. Non miscelare il prodotto con olio bianco, additivi oleosi e concentrati emulsionabili, prodotti erbicidi a base di 2,4 D o altri ormonici fenossiderivati, concimi fogliari, oligoelementi e biostimolanti.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® Marchio registrato

PICADOR® L

Insetticida liquido

Picador® L

COMPOSIZIONE:

100 g di Picador L contengono:
Metomil g 19, 6 (= 184,2 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene alcool metilico.

Frasi di rischio

Facilmente infiammabile. Tossico per inalazione e contato con la pelle. Molto tossico per ingestione. Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici. Puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

MOLTO TOSSICO

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – 20156 Milano – Viale Certosa 130 – tel 02 3972.1
Officine di produzione: AgriFormula S.r.l., Paganica (AQ); Bayer CropScience France - Villefranche – Francia; Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
Registrazione n. 7725 Ministero della Sanità del 17/2/1989
Contenuto netto: ml 250, l 1 - 5
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea. bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

PICADOR L é un insetticida efficace per contatto, ingestione e per via sistemica contro insetti parassiti di svariate colture erbacee ed arboree.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Afidi : applicare 180 - 200 ml di prodotto per 100 l d'acqua all'inizio dell'infestazione e ripeterlo in caso di reinfestazione. Il prodotto é efficace contro gli Afidi di tutte le colture sottomenzionate includendo gli Afidi del tabacco, delle piante ornamentali e da fiore in pieno campo e delle drupacee.Il prodotto in particolare é efficace contro l'Afide verde del pesco (Myzus persicae) difficilmente controllabile, specialmente se resistente ai prodotti organofosforici, e contro l'Afide farinoso (Hyalopterus amygdaly).

MELO E PERO : contro larve minatrici alla dose di 250 ml per 100 l d'acqua. Lithocolletis blancardella F.E.: per un buon controllo dell'insetto si consiglia di trattare in primavera contro le larve di prima generazione.
É strettamente raccomandabile applicare PICADOR L a tempo opportuno, cioé quando il primo stadio delle larve é visibile sulle foglie come "macchia d'olio". Inoltre il controllo delle successive generazioni deve essere principalmente orientato contro le larve di primo stadio. Leucoptera (Cemiostoma) scitella zeli: é consigliabile applicare il prodotto all'inizio di una delle prime generazioni, quando la maggior parte delle "macchie circolari" sulle foglie hanno un diametro inferiore a 5 mm. Altri parassiti: Carpocapsa pomonella, Capua reticulana, Cacoecia podana, Orgya antiqua, dose 200 - 250 ml per 100 l d'acqua. Intervenire alla comparsa delle prime larve e ripetere in caso di reinfestazione.

PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO e MANDORLO: contro Anarsia lineatella e Cydia molesta: dose 200 - 250 ml per 100 l d'acqua. Intervenire alla comparsa dei parassiti e ripetere in caso di reinfestazione. Diaspis pentagona: dose 200 - 250 ml per 100 l d'acqua con due irrorazioni, la prima verso la metà di Maggio, la seconda due mesi dopo.

VITE DA VINO: Tignole (Lobesia botrana Schiff e Clysia ambiguella Hb): applicare il prodotto come curativo e preventivo alla dose di 200 - 250 ml per 100 l d'acqua. Intervenire con il trattamento in base allo stadio vegetativo delle piante ed al grado di infestazione della stessa. Un solo trattamento, eseguito al momento opportuno, può essere sufficiente per il controllo dell' insetto.

VITE DA TAVOLA: utilizzare 200 ml di prodotto per 100 l d'acqua con un massimo di 2 trattamenti per stagione.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO : contro Cleono (Temmorhinus mendicus): dose 200 ml per 100 l d'acqua. Usare non meno di 1,8 l di prodotto per ettaro. Eseguire il trattamento alla prima comparsa degli insetti e ripeterlo una o due volte ad intervalli di 12 - 15 giorni. Altica (Chaetocnema tibialis): dose 200 ml per 100 l d'acqua, quando l'insetto appare sulle foglie.
POMODORO, MELANZANA, PEPERONE e CUCURBITACEE :
contro Nottue: dose 200 ml per 100 l d'acqua. Eseguire il trattamento quando le prime larve dell'insetto appaiono sui frutti e ripeterlo a 5 - 7 giorni di intervallo, durante il periodo dell'infestazione.
CAVOLI (escluso cavolfiore e cavolo cappuccio) e LATTUGA : contro Cavolaie : dose 200 - 250 ml per 100 l d'acqua. Eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione e ripeterlo con un intervallo di 5 - 7 giorni durante il periodo vegetativo. É consigliabile l'aggiunta di un bagnante adesivo.
FAGIOLO e PISELLO : contro larve di Lepidotteri: dose 180 - 200 ml per 100 l d'acqua. Eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione, ripeterlo in caso di reinfestazione.
AGRUMI e OLIVO : contro Coccinigila "mezzo grano di pepe" (Saissetia oleae): dose 180 - 200 ml per 100 l d'acqua. Eseguire il trattamento in estate durante la massima presenza di "neanidi".
GAROFANO in pieno campo : contro Bega (Tortrix pronubana): dose 180 - 250 ml per 100 l d'acqua. Trattare ogni 8 - 10 giorni contro le larve di prima generazione, iniziando i trattamenti alla schiusura delle uova deposte dai primi adulti dell'annata.In tutte le colture indicate in etichetta: ESCHE contro NOTTUE: dose per ettaro: PICADOR L litro 1 + crusca kg 50 + zucchero kg 1. Mescolare a secco la crusca e lo zucchero, indi inumidire e, sempre mescolando, aggiungere PICADOR L. Distribuire sul terreno a spaglio o a mucchietti (a 30 - 40 cm l'uno dall'altro) l'esca così preparata. **Si raccomanda di impiegare esche preparate al momento dell'uso e di tenere lontani dall'esca i bambini e gli animali.**
COMPATIBILITA'
Il prodotto é miscibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari attualmente in commercio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA'
Il prodotto é tossico per gli animali domestici, insetti utili e bestiame. Evitare di contaminare corsi d'acqua, laghi e stagni. Il prodotto é anche tossico per le api. Evitare i trattamenti nel periodo della fioritura e quando le api frequentano l'area trattata. Si consiglia di tenere lontano dalle zone trattate animali domestici e bestiame.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto sulla lattuga, 30 giorni prima su vite da tavola e 10 giorni prima su tutte le altre colture.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Eviytare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Conservare al riparo dal gelo.

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego é consentito esclusivamente al personale qualificato munito di autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23/04/2001.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

BAYTEROID® AL

INSETTICIDA LIQUIDO PRONTO PER L'USO

per la lotta contro gli insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore su alcuni fruttiferi, vite, alcuni ortaggi, colture floreali ed ornamentali

COMPOSIZIONE
g 100 di Bayteroid ® AL contengono:
g 0,005 di ciflutrin puro (= 0,05 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

ATTENZIONE
Manipolare
con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare soltanto nel recipiente originale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilita' da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonche' dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione,
edemi cutanei, collasso vascolare periferico. N.B. - Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Terapia: sintomatica e di rianimazione
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Il prodotto e' una formulazione pronta per l'uso. Impiegare quindi senza diluire in acqua.
Pomacee (melo e pero) e **drupacee** (pesco, nettarino, susino e ciliegio): contro afidi, capua, cacoecia, carpocapsa ed altri tortricidi, larve minatrici, antonomo, maggiolino, tentredini, cecidomici , mosca della frutta e tripidi, cidia, anarsia e cocciniglia (in trattamenti estivi contro neanidi);
psilla del pero;
vite: contro cicaline, afidi, sigaraio, piralide e nottue; tignole;
ortaggi (cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli a foglia, cavoli-rapa, pomodoro, pisello, fagiolo, cetriolo, lattuga, peperone) contro nottue, cavolaia, tripidi, cetonie e maggiolino;
AVVERTENZA: su **peperone, cetriolo, e cavoli a foglia** è ammessa la dose massima di l 0,5 di prodotto/ 10 metri quadri
(l 5 di prodotto/100 metri quadri).
Colture floreali e ornamentali: contro afidi, aleurodidi, larve di lepidotteri, tripidi, cetonie e maggiolino; tortrici del garofano.

Compatibilità: il prodotto e' miscibile con antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocivita' : il prodotto e' molto tossico per i pesci e gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per melo, pesco, nettarino, susino, ciliegio, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli-rapa, pomodoro, pisello, fagiolo, cetriolo, peperone, lattuga; 7 giorni per vite e cavoli a foglia; 21 giorni per pero

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Conservare al riparo dal gelo.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Registrazione Ministero Sanita' n 7789 del 22/5/89
Officine di produzione: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania) l 1-5
Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG) ml 200-500; l 1-5
Diachem S.p.A. Unita' Produttiva - SIFA - Caravaggio (BG) ml 200-500; l 1-5
Torre S.r.l. –Montalcino- Torrenieri (SI) ml 200-500; l 1-5
Officina di confezionamento (per Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
IRCA Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG) ml 200-500; l 1-5
Contenuto netto: ml 200-500; l 1-5
Partita n°

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.2005

R6 Erresei® triplo F

Fungicida sistemico e di contatto, ad azione preventiva e curativa, contro la Peronospora della vite
Polvere bagnabile

R6 Erresei® triplo F

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione:

Fosetil Alluminio	g	32,5
Cimoxanil	g	2,5
Folpet	g	22
Coformulanti	q.b. a g	100

Frasi di Rischio
Rischio di gravi lesioni oculari. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'Autorizzazione:
Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione:
AgriFormula S.r.l., Paganica (AQ)
SBM Formulation – St. Marcel – Marsiglia – (Francia)
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Registrazione n. 7820 Ministero della Sanità del 5/6/1989

Contenuto netto: Kg 1 – 10
Partita n.: *

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Cimoxanil 2,5 %
Folpet 22 %
Fosetil Alluminio 32,5 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute.
L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
FOLPET
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia;
irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea);
interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia);
interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Fosetil Alluminio: ---
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
E' un fungicida messo a punto per la lotta contro la Peronospora della vite.
Esso é costituito da tre principi attivi:
- Fosetil Alluminio ad azione sistemica;
- Cimoxanil ad azione di contatto ed endoterapica;
- Folpet ad azione di contatto.
Questa associazione conferisce al prodotto un'attività preventiva e curativa.

MODALITA' D'IMPIEGO
VITE:
Contro la Peronospora: dose g 400 per 100 litri di acqua.
Grazie alla lunga persistenza d'azione il prodotto può essere impiegato a cadenza fissa.
Il primo trattamento va effettuato quando si verificano le condizioni di infezione che sono:
- germogli lunghi 10 cm;
- pioggia di 10 mm;
- temperatura di 10 gradi.
Successivamente intervenire a cadenza di 15 giorni.
Azione curativa: dose g 400 per 100 litri d'acqua.
Il prodotto é in grado di stroncare un'infezione in atto se viene irrorato entro 2-3 giorni dall'inizio della pioggia.
Per la preparazione della miscela mettere la dose occorrente di prodotto in poca acqua, indi mescolare al fine di ottenere una pasta omogenea.
Versare nell'irroratrice e portare a volume agitando.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non é miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olii minerali. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione di olii minerali e polisolfuri.

NOCIVITA'
Il prodotto é tossico per gli insetti utili.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso é pericoloso.
Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

® Marchio registrato

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

RONSTAR® FL

Erbicida per il diserbo di actinidia, aglio, albicocco, arancio, asparago, carciofo, cavolfiore, cicoria, clementino, finocchio, garofano, girasole, indivia, lattuga, limone, mandarino, melanzana, melo, nocciolo, olivo, peperone, pero, pesco, pioppo, pomodoro, riso, soia, susino, tabacco, vite, vivai di fruttiferi e pioppo.

Sospensione concentrata

RONSTAR® FL

COMPOSIZIONE :
g 100 di prodotto contengono :
g 34,1 di Oxadiazon puro (= 380 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO :
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Officine di produzione:
AgriFormula S.r.l., Paganica (AQ)
Bayer CropScience France, Villefranche - (Francia)
Officina di confezionamento:
S.C.B. - Marle sur Serre (Francia)
Registrazione n. 7958 del 11/02/91 del Ministero della Sanità
Contenuto netto : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 L
Partita N.:

Informazioni per il medico: in caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

SPETTRO D'AZIONE

INFESTANTI SENSIBILI:
Acetosella (*Oxalis* spp.), Alisma (*Alisma plantago*), Amaranto (*Amaranthus* spp.), Atriplice maggiore (*Atriplex patula*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Giunco fiorito (*Butomus umbellatus*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Erba calderina (*Senecio vulgaris*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Eterantera (*Heteranthera* spp.), Euforbia (*Euphorbia* spp.), Falso panico (*Setaria* viridis), Farinaccio selvatico (*Chenopodium album*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*), Giavoni (*Echinochloa* spp.), Mercorella (*Mercurialis annua*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Poa (*Poa pratensis*), Poligoni (*Polygonum* spp.), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Romice (*Rumex* spp.), Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), Scirpus (*Scirpus* spp.), Senape (*Sinapis arvensis*), Veronica (*Veronica* spp.), Vilucchio (*Convolvulus arvensis*).

INFESTANTI MEDIAMENTE RESISTENTI:
Avena selvatica (*Avena* spp.), Attaccamani (*Galium aparine*), Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Falsa gramigna (*Agropyrum repens*), Fienarola (*Poa annua*), Forbicina (*Bidens tripartita*), Lappa (*Xanthium italicum*), Loglio (*Lolium* spp.).

INFESTANTI RESISTENTI:
Assenzio selvatico (*Artemisia vulgaris*), Carice (*Carex* spp.), Centocchio (*Stellaria media*), Cipero (*Cyperus rotundus*), Gittaione (*Agrostemma githago*), Gramigna comune (*Cynodon dactylon*), Soffione (*Taraxacum officinale*), Sorghetta (*Sorghum halepense*), Stoppione (*Cirsium arvense*).

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

Distribuire il prodotto con almeno 500 litri d'acqua.

RISO :
Contro Heteranthera 0,650 - 1,3 l/ha in funzione della pressione di infestazione, attenendosi al dosaggio più elevato nei terreni di medio impasto.
Il trattamento è in grado di contenere emergenze precoci di Giavone, Alisma da seme, Ciperacee e Giunco fiorito da seme. Il prodotto va applicato in pre-semina del riso sia su risaie ancora asciutte perfettamente livellate, prima dell'immissione di acqua oppure su risaia allagata, dopo la slottatura e con livello di acqua normale (10-12 cm).
Dopo l'applicazione lasciare sedimentare per circa 48 ore le particelle limose prima di procedere alle semine.
Evitare le semine in presenza di acque torbide. Nelle prime fasi vegetative del riso si consiglia di mantenere nelle camere un livello di acqua moderato (max. 10-12 cm).
Il RONSTAR FL è selettivo anche su riso coltivato in asciutta; in tal caso il trattamento va effettuato subito dopo la semina, in pre-emergenza della coltura e delle infestanti alla dose di 1,5-2 l/ha.

GIRASOLE E SOIA :
Contro infestanti graminacee e dicotiledoni annuali (esclusa Stellaria spp.)
1,5 l/ha, in pre-emergenza della coltura e delle infestanti.
Il trattamento può causare ingiallimenti passeggeri della coltura appena emersa che però non influiscono sulla produzione. Se non piove effettuare una irrigazione dopo 10-12 giorni dal trattamento. Operare a bassa pressione massimo 2-3 atm. Dopo il trattamento non lavorare il terreno.

GAROFANO :
Intervenire dopo la messa a dimora delle talee, oppure dopo una sarchiatura manuale in pre-emergenza delle infestanti a 1,5-2 l/ha (infestanti annuali); per la lotta contro il Vilucchio elevare la dose a 5-6,5 l/ha.

AGLIO
1 - 2 l/ha in pre-emergenza della coltura e delle infestanti.

COLTURE TRAPIANTATE

carciofo, cavolfiore, cicoria, finocchio, indivia, lattuga, melanzana, peperone, pomodoro, tabacco:

1 - 2 l/ha, intervenendo prima del trapianto della coltura, in pre-emergenza delle infestanti.

Su lattuga non superare la dose di 1 l/ha e non impiegare in caso di coltura sotto serra o tunnel.

POST-IMPIANTO:

Asparago, intervenire dopo aver effettuato la rincalzatura, con completa copertura delle zampe. Su asparagiaia, per la lotta contro il Vilucchio (C. arvensis e C. sepium) intervenire prima dell'emergenza dei turioni o dopo la totale raccolta degli stessi a 5 - 6,5 l/ha.

Carciofo: su carciofaia per la lotta contro l'acetosella (Oxalis spp.), intervenire a 5 - 6,5 l/ha in pre-emergenza dell'infestante, evitando di bagnare la vegetazione della coltura.

ACTINIDIA, ALBICOCCO, ARANCIO, CLEMENTINO, LIMONE, MANDARINO, MELO, NOCCIOLO, OLIVO, PERO, PESCO, PIOPPO, SUSINO, VITE:

- **vivai**: 5 - 6,5 l/ha, intervenendo dopo la messa a dimora e prima della ripresa vegetativa. Non trattare vivai di vite, piante madri o barbatelle appena messe a dimora.
- **Impianti in produzione**: 2,5 l/ha (infestanti annuali) - 6,5 l/ha (convolvolo).
- Su vite intervenire solo su impianti in produzione e con vegetazione sollevata dal terreno.

Su piante a foglia caduca eseguire il trattamento a fine inverno, prima del risveglio vegetativo. Su tutte le colture sopraindicate, evitare di colpire la vegetazione eventualmente presente o parti non lignificate. Dopo il trattamento non lavorare il terreno; in caso di siccità praticare un'irrigazione entro 10 - 12 giorni dall'applicazione. Operare a bassa pressione (1-3 bar) impiegando almeno 300 litri di acqua per ettaro.

COMPATIBILITÀ

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

In caso di piogge battenti dopo il trattamento, la vegetazione delle giovani colture può venire colpita da particelle di terreno che hanno adsorbito il prodotto con conseguenti leggere ustioni.

In caso di piogge battenti o irrigazioni di forte intensità dopo il trattamento, la vegetazione delle giovani colture ed in particolare le lattughe possono essere colpite da particelle di terreno che hanno adsorbito il prodotto, con conseguenti leggere ustioni e ritardi sul ciclo vegetativo.

Su asparago, in caso di ristagno idrico e con emergenza della coltura rallentata da basse temperature, i turioni possono presentare leggere incurvature apicali. Su terreni con ristagni d'acqua e con basse temperature che rallentano le emergenze della soia possono manifestarsi fallanze nella stessa. Su vivai non intervenire su piante non sufficientemente lignificate. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

16.12.05

® Marchio registrato

Ronstar® liquido FG

Erbicida di pre-semina del riso attivo contro Heteranthera spp ed emergenze precoci di Ciperacee ed Alismatacee da seme

Concentrato Emulsionabile (EC)

Ronstar® liquido FG

Composizione:

Oxadiazon puro g 12,6 (= 120 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene nafta solvente (petrolio) aromatica pesante.

NOCIVO

Frasi di Rischio

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Consigli di Prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione:

Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione:

Agriformula S.r.l.- Paganica (AQ)
Bayer CropScience France - Villefranche - Francia

Registrazione n. 7972 Ministero della Sanità del 06/04/1991

Contenuto Netto : l 1- 5 - 10 - 20

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE

L'erbicida Ronstar liquido FG agisce per contatto diretto sulle infestanti in germinazione con il sottile strato erbicida formatosi sulla superficie del suolo. È efficace contro *Heteranthera limosa* e *reniformis* ed emergenze precoci di Ciperacee ed Alismatacee nate da seme. Il prodotto esercita inoltre parziale contenimento delle nascite precoci dei Giavoni (*Echinochloa* spp).

MODALITA' D'IMPIEGO

Riso: il prodotto va impiegato in pre-semina del riso, sia su risaie ancora asciutte perfettamente livellate prima dell'immissione dell'acqua, oppure su risaie allagate, dopo la slottatura e con livello di acqua normale (10-12 cm). Dopo l'applicazione lasciare sedimentare per almeno 48 ore le particelle limose prima di procedere alle semine. Evitare semine in presenza di acque torbide.
Nelle prime fasi vegetative del riso si consiglia di mantenere nelle camere un livello di acqua moderato (max 10-12 cm).

Dosi: litri 2-3/ha nei terreni argillosi
litri 3-4/ha nei terreni di medio impasto

COMPATIBILITA'

Il formulato è compatibile con erbicidi a spettro complementare a base di molinate, dimepiperate, ticarbaril, tiobencarb, pretilaclor, bensulfuron, cinosulfuron, metosulam, MCPA estere, MCPP estere, 2,4 DB, glifosate e pendimetalin.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Evitare i livelli d'acqua eccessivi (massimo cm 10-12) nelle camere di risaia, al momento della semina del riso e nei primi periodi di vegetazione della coltura; mantenere inoltre una normale circolazione dell'acqua.

AVVERTENZE

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso é pericoloso.
Chi impiega il prodotto é responsabile di eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

ZODIAC DICURAN DFF®

Erbicida selettivo di pre e post-emergenza per il frumento (tenero e duro) e l'orzo
Sospensione Concentrata (SC)

ZODIAC DICURAN DFF®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
g 2,2 di diflufenican puro (= 25 g/l)
g 35,5 di clortoluron (=400 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

NOCIVO

Frasi di Rischio
Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02-3972.1

Officine di Produzione:
AgriFormula S.r.l. - Paganica (AQ)
Bayer CropScience France - Villefranche – Francia

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Registrazione n. 7983 del 25/07/91 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: 1 - 5 - 10 - 20 L

Partita n.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE
Lo ZODIAC DICURAN DFF è un formulato erbicida in pasta fluida per l'impiego sia in pre- sia in post-emergenza di frumento (tenero e duro) e orzo.
L'associazione dei due principi attivi ad azione complementare (Diflufenican e Clortoluron) consente il controllo delle più importanti e diffuse infestanti annuali graminacee e dicotiledoni delle colture sopra indicate.
Infestanti sensibili :
a) Graminacee : *Alopecurus, Apera s.v., Avena* spp., *Lolium, Phalaris, Poa.*
b) Dicotiledoni : *Anthemis, Capsella, Cerastium, Lamium, Matricaria, Papaver, Polygonum aviculare* e *persicaria, Ranunculus, Raphanus, Sinapis, Stellaria, Thlaspi, Veronica, Viola.*
N.B. - Le applicazioni di pre-emergenza controllano le Avene a nascita autunnale.
La sensibilità all'erbicida di *Galium, Fumaria, Chrisanthemum, Centaurea, Galeopsis* e *Polygonum convolvulus* è talvolta irregolare.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Lo ZODIAC DICURAN DFF può essere applicato sia in pre- che in post-emergenza della coltura e delle infestanti, secondo le seguenti modalità:
- In pre-emergenza, litri 4,5-5/ha. In questa applicazione, al momento del trattamento il terreno deve essere ben sistemato, livellato e privo di zolle.
  Il seme della coltura deve essere coperto dal terreno e posizionato alla giusta profondità (3-4 cm).
- In post-emergenza, litri 3,5-4/ha. In questa applicazione le infestanti *Avena, Lolium* e *Phalaris* debbono venire trattate entro lo stadio vegetativo delle tre foglie.

Il prodotto va distribuito con un volume d'acqua di 300-500 litri per ettaro.

COMPATIBILITA'
Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ'
Nelle applicazioni di pre-emergenza, particolarmente nei terreni zollosi o filtranti, qualora una abbondante precipitazione cada in coincidenza con l'emergenza delle colture, possono manifestarsi transitori sintomi di sensibilizzazione sotto forma di decolorazione delle plantule del cereale che virano al violaceo e successivamente rinverdiscono.
A questa temporanea sensibilizzazione è particolarmente soggetto l'orzo.
In tutti i casi non si evidenziano tuttavia ripercussioni negative sullo sviluppo vegetativo e sulla produttività delle colture.
Non impiegare il prodotto sulle varietà di frumento Kid, Demar 4 e Brasilia.

Sospendere i trattamenti 84 giorni prima del raccolto.

AVVERTENZA
Non impiegare il prodotto nei terreni sciolti, ciottolosi o comunque filtranti.
Evitare di trattare su terreni gelati o su coltura sofferente per gelo o asfissia radicale.
Nei terreni trattati in post-emergenza non effettuare la trasemina delle Leguminose.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® Marchio registrato (DFF)

BASTA®

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ERBICIDA TOTALE AD AZIONE FOGLIARE
CONCENTRATO SOLUBILE

COMPOSIZIONE
g 100 di Basta® contengono:
g 11,33 di Glufosinate ammonio puro (=120 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Pronto soccorso
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone e togliere gli indumenti contaminati; se necessario chiamare un medico.
In caso di contatto con gli occhi, risciacquarsi immediatamente ed abbondantemente per 15 minuti con acqua, chiamare subito un medico.
In caso di ingestione, o a seguito di prolungata inalazione di polvere o vapori: chiamare subito un medico. In caso di ingestione indurre il vomito se il paziente è cosciente; mantenere libere le vie respiratorie.
Ulteriori informazioni per il medico:
Classe chimica: amminoacido fosfinico
Sintomi di intossicazione: disturbi a livello di coscienza, tremori, spasmi e convulsioni dopo una latenza di diverse ore. Non inibisce le acetilcolinesterasi.
Indicazioni terapeutiche:
in caso di ingestione: lavanda gastrica con acqua, seguita da somministrazione di carbone animale e sodio solfato
in caso di intossicazione, qualunque sia la via di esposizione:
- 1 mg/kg di fenobarbital sodio i.m. o subcut. fino ad un massimo di 5 mg/kg/die. 10 mg/kg di diazepam i.v. al fine di prevenire e/o controllare spasmi e convulsioni
- la diuresi forzata e l'emodialisi sono risultate estremamente efficaci
- trattamenti con Atropina o Ossima (2-PAM o Tossigonina) sono controindicati

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni
DISERBO TOTALE DELLE ERBE INFESTANTI
ERBE INFESTANTI SENSIBILI
erbicida ad azione fogliare indicato per il controllo delle infestanti graminacee e dicotiledoni, annuali e perenni, presenti al momento del trattamento.
EPOCA DI IMPIEGO
post-emergenza delle erbe infestanti
Dose d'impiego: 4-13 l/ha secondo il grado e il tipo di infestazione e lo sviluppo delle erbe. Dosi di 4-5 l/ha sono sufficienti per il controllo delle infestanti negli stadi giovanili di sviluppo, con trattamenti eseguiti a fine estate o in miscela con erbicidi residuali. Dosi di 5-8 l/ha sono indicate contro infestanti annuali o biennali con sviluppo modesto e in buone condizioni di vegetazione. Le dosi superiori sono richieste contro infestanti annuali in avanzato stadio di sviluppo e contro le infestanti perennanti.
Volume di irrorazione: le dosi riportate per ogni settore applicativo, possono essere distribuite con volumi d'acqua compresi fra 200 e 600 litri per ettaro, in funzione dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo delle erbe infestanti, curando la massima omogeneita' di distribuzione sulla superficie fogliare.
Settori di applicazione:
-Erbe infestanti sulla fila o interfila delle colture arboree ed arbustive da frutto (agrumi, drupacee, melo, pero, vite, olivo, noce, nocciolo, actinidia, mora, ribes, lampone, uva spina) nonche' pioppi e vivai di piante arboree. Polloni o germogli radicali.
-Erbe infestanti nell'interfila delle colture erbacee (barbabietola da zucchero, soia, patata, fragola, lattughe e simili e rucola, fagiolino, carota, cavolo rapa, ravanello, cipolla, asparago, mais, frumento e orzo) impiegando apposite attrezzature schermate.
-Piazzole di raccolta di olivo e nocciolo.
-Preparazione del letto di semina o di trapianto, per l'eliminazione delle erbe infestanti già nate. Può essere impiegato anche dopo la semina ma prima della germinazione della coltura.
-Diserbo delle malerbe nate fra le stoppie di cereali.
-Diserbo di sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree archeologiche, industriali e civili da solo o in miscela con erbicida residuale. Per interventi specifici in presenza di Canna palustre (Phragmites communis) intervenire quando l'infestante ha raggiunto un'altezza di 1-1,5 metri (pre-fioritura).
DISSECCAMENTO DELLA PARTE AEREA DELLA PATATA PRIMA DELLA RACCOLTA:
Epoca d'impiego: Inizio ingiallimento delle foglie basali.
Dose d'impiego: 4 - 5 l/ha, in proporzione allo sviluppo delle piante da disseccare.
Volume d'irrorazione: distribuire un volume d'acqua compreso tra 200 e 300 litri per ettaro, in funzione dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo delle piante di patata, curando la massima omogeneità di distribuzione sulle foglie e steli della coltura.
AVVERTENZE AGRONOMICHE
La semina o il trapianto delle colture, puo' avvenire dal giorno successivo al trattamento.
Piogge cadute dopo 5-6 ore dal trattamento non condizionano l'attivita' erbicida. Il prodotto non e' attivo sulle parti lignificate e suberificate.
I primi sintomi dell'effetto del trattamento si manifestano dopo 3-5 giorni con un ingiallimento delle parti verdi e nel volgere di 5-10 giorni (in funzione delle condizioni climatiche) la parte aerea dell'infestante secca completamente. Non usare il prodotto per il disseccamento della parte aerea della patata in concomitanza di periodi eccezionalmente piovosi (più di 40 mm di precipitazioni nei 5 giorni antecedenti l'applicazione) o con terreno saturo d'acqua.
Compatibilità: Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: evitare il contatto con le parti verdi delle colture arboree e con le colture erbacee.
Non impiegare su patate da seme e comunque dove una parte della coltura abbia questo utilizzo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: attendere sette giorni prima della raccolta della patata.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non impiegare in prossimità dei corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel 02/3972.1
Registrazione Ministero della Sanita' No. 7989 del 25/10/1991

Officine di produzione: Bayer CropScience GmbH - Francoforte s/Meno – Germania, SBM Formulation – St. Marcel - 13367 Marsiglia – Francia; Isagro S.p.A. - Aprilia (LT); Agriformula S.r.l. – Paganica (AQ).
Officina di confezionamento: I.R.C.A. Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Contenuto netto: l 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 2,5 - 5 - 10 - 20 - 25 – 50- 100
Partita n°.

Bayer CropScience
® Marchio registrato

DPD 30.06.05

QUARTZ®

Erbicida selettivo di pre-emergenza e post-emergenza precoce per il frumento tenero, duro, orzo e cereali minori
Sospensione Concentrata (SC)

QUARTZ®
Composizione:
100 g di prodotto contengono:
42,73 g di Diflufenican puro (= 500 g/l)
Coformulanti q. b. a 100

Frasi di Rischio
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Registrazione n. 8043 del 16/03/1992 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
AgriFormula s.r.l. , Paganica (AQ)
Bayer CropScience Ltd. - Norwich - Inghilterra

Contenuto netto: 500 ml / 1 - 5 - 10 l

Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE
Il QUARTZ é un diserbante in formulazione flowable per l'impiego in pre-emergenza o in post-emergenza precoce del frumento tenero, duro, orzo e cereali minori, attivo nei confronti delle più diffuse infestanti dicotiledoni quali :
Anthemis sp., *Capsella, Cerastium, Lamium, Papaver, Polygonum aviculare e persicaria, Senecio, Sinapis, Stellaria, Thlaspi, Veronica, Viola*. La suscettibilità all'erbicida di *Fumaria, Galium, Chrisanthemum, Centaurea, Matricaria, Galeopsis* e *Polygonum convolvulus* é irregolare.
Sono resistenti *Bifora radians* e *Scandix pecten-veneris*.
Il prodotto é in grado di esplicare una collaterale attività di contenimento sulle seguenti infestanti graminacee : Alopecurus, *Apera s.v., Lolium, Poa* e *Phalaris*.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto va impiegato in pre-emergenza della coltura e delle infestanti, oppure in post-emergenza precoce su coltura nello stadio di 1-3 foglie, con infestanti allo stadio di plantula.
DOSI :
in pre-emergenza, 200-300 cc/ha; in post emergenza, 300-400 cc/ha.
Il prodotto va distribuito con un volume d'acqua di 300-500 l/ha.
Al momento del trattamento di pre-emergenza il terreno deve essere ben sistemato, livellato e privo di zolle.
Il seme della coltura deve essere coperto dal terreno stesso e posizionato alla giusta profondità (3-4 cm).

COMPATIBILITA'
Nelle applicazioni di pre-emergenza il prodotto può venire associato a formulati a base di Isoproturon, Clortoluron, Neburon e Trifluralin.
In applicazioni di post-emergenza il Diflufenican può essere associato a formulati a base di Ioxinil più MCPP (Actril M), Bromoxinil o Dicamba.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Nelle applicazioni di pre-emergenza, particolarmente nei terreni zollosi, qualora una abbondante precipitazione cada in coincidenza con l'emergenza delle colture, possono manifestarsi transitori sintomi di sensibilizzazione sottoforma di decolorazione delle plantule del cereale che virano al violaceo e successivamente rinverdiscono.
A questa temporanea sensibilizzazione é particolarmente soggetto l'orzo.
In tutti i casi tuttavia non si evidenziano ripercussioni negative sullo sviluppo vegetativo e sulla produttività delle colture.

AVVERTENZE
Sui terreni trattati in post-emergenza non effettuare la trasemina delle Leguminose.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti : 84 giorni prima del raccolto

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® marchio registrato

DPD 30.06.05

Quartz® S

Erbicida selettivo di pre e post-emergenza per il frumento tenero e l'orzo, contro le infestanti graminacee e dicotiledoni
Sospensione concentrata (SC)

Quartz® S

Composizione:
Isoproturon 45,45 g (= 500 g/l)
Diflufenican 4,54 g (= 50 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

Frasi di Rischio
Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Registrazione n. 8044 del 16/03/1992 del Ministero della Sanità

Officine di Produzione :
AgriFormula s.r.l., Paganica (AQ)
Bayer CropScience France - Villefranche - Francia

CONTENUTO NETTO: 1 - 5 - 10 – 20 l

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Isoproturon 45,45 %
Diflufenican 4,54%
le quali , separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :
Isoproturon :
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica.
Diflufenican :
Non si hanno informazioni relative a sintomi specifici.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il QUARTZ S é un formulato erbicida in sospensione concentrata (SC) per l'impiego sia in pre-emergenza, che in post-emergenza di frumento tenero e orzo. L'associazione dei due principi attivi ad azione complementare (Diflufenican e Isoproturon) consente il controllo delle più importanti e diffuse infestanti annuali graminacee e dicotiledoni del frumento tenero e dell'orzo.
Infestanti sensibili :
a) Graminacee : *Alopecurus, Apera s.v., Avena* spp., *Lolium, Phalaris, Poa.*
b) Dicotiledoni : *Anthemis, Capsella, Cerastium, Lamium, Matricaria, Papaver, Polygonum aviculare* e *persicaria, Ranunculus, Raphanus, Sinapis, Stellaria, Thlaspi, Veronica, Viola.*
N.B. - Le applicazioni di pre-emergenza controllano le Avene a nascita autunnale.
La sensibilità all'erbicida di *Galium, Fumaria, Chrisanthemum, Centaurea, Galeopsis* e *Polygonum convolvulus* é talvolta irregolare.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto può essere applicato sia in pre che in post-emergenza della coltura e delle infestanti, secondo le seguenti modalità :
- pre-emergenza: 2,5-3 l/ha. In questa applicazione al momento del trattamento il terreno deve essere ben sistemato, livellato e privo di zolle. Il seme della coltura deve essere coperto dal terreno e posizionato alla giusta profondità (3-4 cm).
- post-emergenza: 3-3,5 l/ha. In questa applicazione le infestanti *Avena, Lolium, Phalaris* debbono venire trattate entro lo stadio vegetativo delle 3 foglie.

Il prodotto va distribuito con un volume d'acqua di 300-500 litri per ettaro.

COMPATIBILITÀ'
Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ
Nelle applicazioni di pre-emergenza, particolarmente nei terreni zollosi o filtranti, qualora un'abbondante precipitazione cada in coincidenza con l'emergenza delle colture, possono manifestarsi transitori sintomi di sensibilizzazione sotto forma di decolorazione delle plantule del cereale che virano al violaceo e successivamente rinverdiscono.
A questa temporanea sensibilizzazione é particolarmente soggetto l'orzo.
In tutti i casi tuttavia non si evidenziano ripercussioni negative sullo sviluppo vegetativo e sulla produttività delle colture.

AVVERTENZE
Non impiegare il prodotto nei terreni sciolti, ciottolosi o comunque filtranti.
Evitare di trattare su terreni gelati o su coltura sofferente per gelo o asfissia radicale.
Nei terreni trattati in post-emergenza non effettuare la trasemina delle Leguminose.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 84 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze
Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

BAYER Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® Marchio registrato

BASTA® 60

ERBICIDA TOTALE AD AZIONE FOGLIARE
CONCENTRATO SOLUBILE

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

BASTA® 60
COMPOSIZIONE
100 g di Basta 60 contengono:
5,84 g di Glufosinate ammonio puro (= 60 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Pronto soccorso
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone e togliere gli indumenti contaminati; se necessario chiamare un medico.

In caso di contatto con gli occhi, risciacquarsi immediatamente ed abbondantemente per 15 minuti con acqua, chiamare subito un medico.

In caso di ingestione, o a seguito di prolungata inalazione di polvere o vapori: chiamare subito un medico. In caso di ingestione indurre il vomito se il paziente e' cosciente; mantenere libere le vie respiratorie.

Ulteriori informazioni per il medico:
Classe chimica: amminoacido fosfinico

Sintomi di intossicazione: disturbi a livello di coscienza, tremori, spasmi e convulsioni dopo una latenza di diverse ore. Non inibisce le acetilcolinesterasi.

Indicazioni terapeutiche:
in caso di ingestione: lavanda gastrica con acqua, seguita da somministrazione di carbone animale e sodio solfato
in caso di intossicazione, qualunque sia la via di esposizione:
- 1 mg/kg di fenobarbital sodio i.m. o subcut. fino ad un massimo di 5 mg/kg/die.
- 10 mg/kg di diazepam i.v. al fine di prevenire e/o controllare spasmi e convulsioni
- la diuresi forzata e l'emodialisi sono risultate estremamente efficaci
- trattamenti con Atropina o Ossima (2-PAM o Tossigonina) sono controindicati

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

Erbe infestanti sensibili:

erbicida ad azione fogliare indicato per il controllo delle infestanti graminacee e dicotiledoni, annuali e perenni, presenti al momento del trattamento.

Epoca d'impiego: post-emergenza delle erbe infestanti

Dose d'impiego: 8-26 l/ha secondo il grado e il tipo di infestazione e lo sviluppo delle erbe. Dosi di 8-10 l/ha sono sufficienti per il controllo delle infestanti negli stadi giovanili di sviluppo, con trattamenti eseguiti a fine estate o in miscela con erbicidi residuali. Dosi di 12-16 l/ha sono indicate contro infestanti annuali o biennali con sviluppo modesto e in buone condizioni di vegetazione. Le dosi superiori sono richieste contro infestanti annuali in avanzato stadio di sviluppo e contro le infestanti perennanti.

Volume di irrorazione: le dosi riportate per ogni settore applicativo, possono essere distribuite con volumi d'acqua compresi fra 200 e 600 litri per ettaro, in funzione dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo delle erbe infestanti, curando la massima omogeneità di distribuzione sulla superficie fogliare.

SETTORI DI APPLICAZIONE

-Erbe infestanti sulla fila o interfila delle colture arboree ed arbustive da frutto (agrumi, drupacee, melo, pero, vite, olivo, noce, nocciolo, actinidia, mora, ribes, lampone, uva spina) nonchè pioppi e vivai di piante arboree. Polloni o germogli radicali.

-Erbe infestanti nell'interfila delle colture erbacee (barbabietola da zucchero, soia, patata, fragola, lattughe e simili e rucola, fagiolino, carota, cavolo rapa, ravanello, cipolla, asparago, mais, frumento e orzo) impiegando apposite attrezzature schermate.

-Piazzole di raccolta di olivo e nocciolo.

-Preparazione del letto di semina o di trapianto, per l'eliminazione delle erbe infestanti già nate. Può essere impiegato anche dopo la semina ma prima della germinazione della coltura.

-Diserbo delle malerbe nate fra le stoppie di cereali.

-Diserbo di sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree archeologiche, industriali e civili: impiegare da solo o in miscela con erbicida residuale. Per interventi specifici in presenza di Canna palustre (*Phragmites communis*) intervenire quando l'infestante ha raggiunto un'altezza di 1-1,5 metri (pre-fioritura).

AVVERTENZE AGRONOMICHE

La semina o il trapianto delle colture, può avvenire dal giorno successivo al trattamento.

Piogge cadute dopo 5-6 ore dal trattamento non condizionano l'attività erbicida. Il prodotto non è attivo sulle parti lignificate e suberificate.

I primi sintomi dell'effetto del trattamento si manifestano dopo 3-5 giorni con un ingiallimento delle parti verdi e nel volgere di 5-10 giorni (in funzione delle condizioni climatiche) la parte aerea dell'infestante secca completamente.

COMPATIBILITÀ

E' generalmente compatibile con i diserbanti ad azione residuale e con formulati a base di sali di MCPA.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Evitare il contatto con le parti verdi delle colture arboree e con le colture erbacee.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Conservare al riparo dal gelo.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa, 130 - 20156 Milano.
Tel. 02/3972.1

Registrazione n. 8047 del 16/3/1992 del Ministero della Sanità

Officine di produzione: Bayer CropScience GmbH - Francoforte s/ Meno - Germania
SBM Formulation – St. Marcel - Marsiglia – (Francia)
Isagro S.p.A.- Aprilia (LT)

Contenuto Netto: 0,5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 25 L

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Partita n.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

IGNITE®

ERBICIDA TOTALE AD AZIONE FOGLIARE **ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO**

CONCENTRATO SOLUBILE

COMPOSIZIONE
g 100 di Ignite® contengono:
g 11,32 di Glufosinate ammonio puro (=120 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Pronto soccorso
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone e togliere gli indumenti contaminati; se necessario chiamare un medico.
In caso di contatto con gli occhi, risciacquarsi immediatamente ed abbondantemente per 15 minuti con acqua, chiamare subito un medico.
In caso di ingestione, o a seguito di prolungata inalazione di polvere o vapori: chiamare subito un medico. In caso di ingestione indurre il vomito se il paziente è cosciente; mantenere libere le vie respiratorie.
Ulteriori informazioni per il medico:
Classe chimica: amminoacido fosfinico
Sintomi di intossicazione: disturbi a livello di coscienza, tremori, spasmi e convulsioni dopo una latenza di diverse ore. Non inibisce le acetilcolinesterasi.
Indicazioni terapeutiche:
in caso di ingestione: lavanda gastrica con acqua, seguita da somministrazione di carbone animale e sodio solfato
in caso di intossicazione, qualunque sia la via di esposizione:
- 1 mg/kg di fenobarbital sodio i.m. o subcut. fino ad un massimo di 5 mg/kg/die. 10 mg/kg di diazepam i.v. al fine di prevenire e/o controllare spasmi e convulsioni
- la diuresi forzata e l'emodialisi sono risultate estremamente efficaci
- trattamenti con Atropina o Ossima (2-PAM o Tossigonina) sono controindicati

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

Erbe infestanti sensibili:

erbicida ad azione fogliare indicato per il controllo delle infestanti graminacee e dicotiledoni, annuali e perenni, presenti al momento del trattamento.

Epoca d'impiego: post-emergenza delle erbe infestanti

Dose d'impiego: 4-13 l/ha secondo il grado e il tipo di infestazione e lo sviluppo delle erbe. Dosi di 4-5 l/ha sono sufficienti per il controllo delle infestanti negli stadi giovanili di sviluppo, con trattamenti eseguiti a fine estate o in miscela con erbicidi residuali. Dosi di 5-8 l/ha sono indicate contro infestanti annuali o biennali con sviluppo modesto e in buone condizioni di vegetazione. Le dosi superiori sono richieste contro infestanti annuali in avanzato stadio di sviluppo e contro le infestanti perennanti.

Volume di irrorazione: le dosi riportate per ogni settore applicativo, possono essere distribuite con volumi d'acqua compresi fra 200 e 600 litri per ettaro, in funzione dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo delle erbe infestanti, curando la massima omogeneita' di distribuzione sulla superficie fogliare.

SETTORI DI APPLICAZIONE

-Diserbo di sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree archeologiche, industriali e civili: impiegare da solo o in miscela con erbicida residuale. Per interventi specifici in presenza di Canna palustre (Phragmites communis) intervenire quando l'infestante ha raggiunto un'altezza di 1-1,5 metri (pre-fioritura).

AVVERTENZE AGRONOMICHE

La semina o il trapianto delle colture, puo' avvenire dal giorno successivo al trattamento.

Piogge cadute dopo 5-6 ore dal trattamento non condizionano l'attivita' erbicida. Il prodotto non e' attivo sulle parti lignificate e suberificate.

I primi sintomi dell'effetto del trattamento si manifestano dopo 3-5 giorni con un ingiallimento delle parti verdi e nel volgere di 5-10 giorni (in funzione delle condizioni climatiche) la parte aerea dell'infestante secca completamente.

COMPATIBILITA'

E' generalmente compatibile con i diserbanti ad azione residuale e con formulati a base di sali di MCPA.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Evitare il contatto con le parti verdi delle colture arboree e con le colture erbacee.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel 02/3972.1
Registrazione n° 8059 del 8/4/1992 del Ministero della Sanità
Officine di produzione:
- Bayer CropScience G.m.b.H - Francoforte s/Meno - Germania
- SBM Formulation - St. Marcel - Marsiglia (Francia)
- Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)

Contenuto netto: 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 2,5 - 5 - 10 - 20 - 25 L
Partita N.
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Bayer CropScience

® marchio registrato

DPD 30.06.05

BASTA® garden

ERBICIDA TOTALE AD AZIONE FOGLIARE
SU SUPERFICI NON COLTIVATE
SOLUZIONE ACQUOSA PRONTA ALL'USO SENZA DILUIZIONE

BASTA® garden
Composizione:
Glufosinate ammonio puro 0,2 g (= 2 g/l),
coformulanti quanto basta a 100 g.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Pronto soccorso
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone e togliere gli indumenti contaminati; se necessario chiamare un medico.
In caso di contatto con gli occhi, risciacquarsi immediatamente ed abbondantemente per 15 minuti con acqua, chiamare subito un medico.
In caso di ingestione, o a seguito di prolungata inalazione di polvere o vapori: chiamare subito un medico. In caso di ingestione indurre il vomito se il paziente è cosciente; mantenere libere le vie respiratorie.
Ulteriori informazioni per il medico:
Classe chimica: amminoacido fosfinico
Sintomi di intossicazione: disturbi a livello di coscienza, tremori, spasmi e convulsioni dopo una latenza di diverse ore. Non inibisce le acetilcolinesterasi.
Indicazioni terapeutiche:
in caso di ingestione: lavanda gastrica con acqua, seguita da somministrazione di carbone animale e sodio solfato
in caso di intossicazione, qualunque sia la via di esposizione:
- 1 mg/kg di fenobarbital sodio i.m. o subcut. fino ad un massimo di 5 mg/kg/die. 10 mg/kg di diazepam i.v. al fine di prevenire e/o controllare spasmi e convulsioni
- la diuresi forzata e l'emodialisi sono risultate estremamente efficaci
- trattamenti con Atropina o Ossima (2-PAM o Tossigonina) sono controindicati

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

ERBE INFESTANTI SENSIBILI
erbicida ad azione fogliare indicato per il controllo delle infestanti graminacee e dicotiledoni, annuali e perenni, presenti al momento del trattamento.

EPOCA DI IMPIEGO
post-emergenza delle erbe infestanti

DOSE DI IMPIEGO
50-100 ml/m^2 secondo il grado e il tipo di infestazione e lo sviluppo delle erbe. Dosi di 50-60 ml/m^2 sono sufficienti per il controllo delle infestanti negli stadi giovanili di sviluppo, con trattamenti eseguiti a fine estate o in miscela con erbicidi residuali. Dosi di 70-90 ml/m^2 sono indicate contro infestanti annuali o biennali con sviluppo modesto e in buone condizioni di vegetazione. Le dosi superiori sono richieste contro infestanti annuali in avanzato stadio di sviluppo e contro le infestanti perennanti.

VOLUME DI IRRORAZIONE
L'irrorazione va eseguita con il prodotto tal quale.
Effettuare il trattamento in giornate senza vento, per evitare fenomeni di deriva.

AGITARE PRIMA DELL'USO

SETTORI DI APPLICAZIONE
La formulazione **BASTA garden** è particolarmente indicata per i trattamenti localizzati su erbe che, nei giardini, infestano vialetti, bordi di cancellate, reti o muretti di cinta, terrazze, porticati, bordure, oppure prima della semina dell'emergenza o dell'impianto di ornamentali, ortaggi: lattughe e simili e rucola, fagiolino, carota, cavolo rapa, ravanello, cipolla, asparago; patata e fragola o tappeti erbosi. **BASTA garden** è anche efficace nel seccare i polloni che si sviluppano alla base degli alberi. Si consiglia di intervenire su polloni di consistenza erbacea (lunghezza inferiore a 15 cm).

AVVERTENZE AGRONOMICHE
La semina o il trapianto delle colture può avvenire dal giorno successivo al trattamento.
Piogge cadute dopo 5-6 ore dal trattamento non condizionano l'attività erbicida. Il prodotto non è attivo sulle parti lignificate e suberificate.
I primi sintomi dell'effetto del trattamento si manifestano dopo 3-5 giorni con un ingiallimento delle parti verdi e nel volgere di 5-10 giorni (in funzione delle condizioni climatiche) la parte aerea dell'infestante secca completamente.

FITOTOSSICITÀ
Evitare il contatto con le parti verdi delle colture arboree e con le colture erbacee.

COMPATIBILITÀ
BASTA garden va impiegato da solo.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Conservare al riparo dal gelo.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa, 130 - 20156 Milano.
Tel. 02/3972.1

Registrazione n. 8087 del 7/8/1992 del Ministero della Sanità

Officine di produzione: - Bayer CropScience GmbH - Francoforte s/ Meno - Germania
- SBM Formulation – St. Marcel - Marsiglia – (Francia)
- Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)
- Diachem S.p.A. - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

Contenuto Netto: 0,4 - 1 - 5 L

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Partita n.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

Etichetta/ foglio illustrativo

BASTA® hobby

ERBICIDA TOTALE AD AZIONE FOGLIARE SU SUPERFICI NON COLTIVATE
CONCENTRATO SOLUBILE

COMPOSIZIONE
g 100 di Basta ® Hobby contengono:
Glufosinate ammonio puro 11,33 g (= 120 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Pronto soccorso
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone e togliere gli indumenti contaminati; se necessario chiamare un medico.
In caso di contatto con gli occhi, risciacquarsi immediatamente ed abbondantemente per 15 minuti con acqua, chiamare subito un medico.
In caso di ingestione, o a seguito di prolungata inalazione di polvere o vapori: chiamare subito un medico. In caso di ingestione indurre il vomito se il paziente è cosciente; mantenere libere le vie respiratorie.
Ulteriori informazioni per il medico:
Classe chimica: amminoacido fosfinico
Sintomi di intossicazione: disturbi a livello di coscienza, tremori, spasmi e convulsioni dopo una latenza di diverse ore. Non inibisce le acetilcolinesterasi.
Indicazioni terapeutiche:
in caso di ingestione: lavanda gastrica con acqua, seguita da somministrazione di carbone animale e sodio solfato
in caso di intossicazione, qualunque sia la via di esposizione:
- 1 mg/kg di fenobarbital sodio i.m. o subcut. fino ad un massimo di 5 mg/kg/die. 10 mg/kg di diazepam i.v. al fine di prevenire e/o controllare spasmi e convulsioni
- la diuresi forzata e l'emodialisi sono risultate estremamente efficaci
- trattamenti con Atropina o Ossima (2-PAM o Tossigonina) sono controindicati

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

ERBE INFESTANTI SENSIBILI
erbicida ad azione fogliare indicato per il controllo delle infestanti graminacee e dicotiledoni, annuali e perenni, presenti al momento del trattamento.

EPOCA DI IMPIEGO
post-emergenza delle erbe infestanti

DOSE DI IMPIEGO
100-150 ml per 150-200 m^2 da diluire in 10 litri di acqua. Le dosi superiori sono richieste contro infestanti annuali in avanzato stadio di sviluppo e contro le infestanti perennanti.

SETTORI DI APPLICAZIONE
BASTA hobby è assorbito per via fogliare da tutte le erbe che infestano vialetti e giardini, viali, piazzali, sentieri, cortili, bordi stradali ed aree industriali. Può essere utilizzato per seccare i polloni di piante arboree, intervenendo finche' questi sono erbacei e non lignificati. Può anche essere utilizzato per seccare le erbe che infestano terreni destinati ad orto, prima della semina o del trapianto delle seguenti colture orticole: lattughe e simili e rucola, fagiolino, carota, cavolo rapa, ravanello, cipolla, asparago, patata e fragola.
BASTA hobby sviluppa la sua azione erbicida solo sulle erbe infestanti presenti al momento del trattamento.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
La semina o il trapianto delle colture può avvenire dal giorno successivo al trattamento.
Piogge cadute dopo 5-6 ore dal trattamento non condizionano l'attività erbicida. Il prodotto non è attivo sulle parti lignificate e suberificate.
I primi sintomi dell'effetto del trattamento si manifestano dopo 3-5 giorni con un ingiallimento delle parti verdi e nel volgere di 5-10 giorni (in funzione delle condizioni climatiche) la parte aerea dell'infestante secca completamente.

FITOTOSSICITÀ
Evitare il contatto con le parti verdi delle colture arboree e con le colture erbacee.

COMPATIBILITÀ

È generalmente compatibile con formulati a base di sali di MCPA.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8088 del 7/8/1992

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Officine di produzione: Bayer CropScience GmbH - Francoforte s/Meno - Germania,
SBM Formulation – St. Marcel - Marsiglia – (Francia),
Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)

Contenuto netto: 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 25 L

Partita n°

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

BASTA® 150

ERBICIDA TOTALE AD AZIONE FOGLIARE
Concentrato solubile (SL)

BASTA® 150

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Glufosinate ammonio puro 13,52 g (= 150 g/l)
Coformulanti q.b. a 100.

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.
Rischio di gravi lesioni oculari.

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare dell'Autorizzazione :
Bayer CropScience S.r.l. - viale Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione :
- Bayer CropScience GmbH - Francoforte sul Meno (Germania)
- SBM Formulation – St. Marcel - Marsiglia – (Francia)
- Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)

Registrazione n. 8090 del 7/8/1992 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: 0,5 - 1 - 2,5 - 5 - 10 - 20 L

Partita n.:*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Pronto soccorso:
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone e togliere gli indumenti contaminati; se necessario chiamare un medico.
In caso di contatto con gli occhi, risciacquarsi immediatamente ed abbondantemente per 15 minuti con acqua, chiamare subito un medico.
In caso di ingestione, o a seguito di prolungata inalazione di polvere o vapori: chiamare subito un medico. In caso di ingestione indurre il vomito se il paziente e' cosciente; mantenere libere le vie respiratorie.
Ulteriori informazioni per il medico:
Classe chimica: amminoacido fosfinico.
Sintomi di intossicazione: disturbi a livello di coscienza, tremori, spasmi e convulsioni dopo una latenza di diverse ore. Non inibisce le acetilcolinesterasi.
Indicazioni terapeutiche:
in caso di ingestione: lavanda gastrica con acqua, seguita da somministrazione di carbone animale e sodio solfato;
in caso di intossicazione, qualunque sia la via di esposizione:
-1 mg/kg di fenobarbital sodio i.m. o subcut. fino ad un massimo di 5 mg/kg/die. 10 mg/kg di diazepam i.v. al fine di prevenire e/o controllare spasmi e convulsioni
-la diuresi forzata e l'emodialisi sono risultate estremamente efficaci
-trattamenti con Atropina o Ossima (2-PAM o Tossigonina) sono controindicati
Consultare un Centro Antiveleni

DISERBO TOTALE DELLE ERBE INFESTANTI:
Erbe infestanti sensibili: erbicida ad azione fogliare indicato per il controllo delle infestanti graminacee e dicotiledoni, annuali e perenni, presenti al momento del trattamento.

Epoca d'impiego: post-emergenza delle erbe infestanti.

Dose d'impiego: 2,5-8 l/ha secondo il grado e il tipo di infestazione e lo sviluppo delle erbe. Dosi di 2,5-3 l/ha sono sufficienti per il controllo delle infestanti negli stadi giovanili di sviluppo, con trattamenti eseguiti a fine estate o in miscela con erbicidi residuali. Dosi di 3,5-5 l/ha sono indicate contro infestanti annuali o biennali con sviluppo modesto e in buone condizioni di vegetazione. Le dosi superiori sono richieste contro infestanti annuali in avanzato stadio di sviluppo e contro le infestanti perennanti.

Volume di irrorazione: le dosi riportate per ogni settore applicativo, possono essere distribuite con volumi d'acqua compresi fra 200 e 600 litri per ettaro, in funzione dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo delle erbe infestanti, curando la massima omogeneita' di distribuzione sulla superficie fogliare.
Settori di applicazione
-Erbe infestanti sulla fila o interfila delle colture arboree ed arbustive da frutto (agrumi, drupacee, melo, pero, vite, olivo, noce, nocciolo, actinidia, mora, ribes, lampone, uva spina) nonche' pioppi e vivai di piante arboree. Polloni o germogli radicali.
-Erbe infestanti nell'interfila delle colture erbacee (barbabietola da zucchero, soia, patata, fragola, lattughe e simili e rucola, fagiolino, carota, cavolo rapa, ravanello, cipolla, asparago, mais, frumento e orzo) impiegando apposite attrezzature schermate.
-Piazzole di raccolta di olivo e nocciolo.
-Preparazione del letto di semina o di trapianto, per l'eliminazione delle erbe infestanti gia' nate. Puo' essere impiegato anche dopo la semina ma prima della germinazione della coltura.
-Diserbo delle malerbe nate fra le stoppie di cereali

-Diserbo di sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree archeologiche, industriali e civili da solo o in miscela con erbicida residuale. Per interventi specifici in presenza di Canna palustre (*Phragmites communis*) intervenire quando l'infestante ha raggiunto un'altezza di 1-1,5 metri (pre-fioritura).

DISSECCAMENTO DELLA PARTE AEREA DELLA PATATA PRIMA DELLA RACCOLTA:
Epoca d'impiego: Inizio ingiallimento delle foglie basali.
Dose d'impiego: 2,5-3 l/ha, in proporzione allo sviluppo delle piante da disseccare.
Volume d'irrorazione: distribuire un volume d'acqua compreso tra 200 e 300 litri per ettaro, in funzione dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo delle piante di patata, curando la massima omogeneità di distribuzione sulle foglie e steli della coltura.
AVVERTENZE AGRONOMICHE
La semina o il trapianto delle colture puo' avvenire dal giorno successivo al trattamento.
Piogge cadute dopo 5-6 ore dal trattamento non condizionano l'attivita' erbicida. Il prodotto non e' attivo sulle parti lignificate e suberificate.
I primi sintomi dell'effetto del trattamento si manifestano dopo 3-5 giorni con un ingiallimento delle parti verdi e nel volgere di 5-10 giorni (in funzione delle condizioni climatiche) la parte aerea dell'infestante secca completamente.
Non usare il prodotto per il disseccamento della parte aerea della patata in concomitanza di periodi eccezionalmente piovosi (più di 40 mm di precipitazioni nei 5 giorni antecedenti l'applicazione) o con terreno saturo d'acqua.
FITOTOSSICITA'
Evitare il contatto con le parti verdi delle colture arboree e con le colture erbacee.
Non impiegare su patate da seme e comunque dove una parte della coltura abbia questo utilizzo.
COMPATIBILITA'
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: attendere sette giorni prima della raccolta della patata.

NON IMPIEGARE IN PROSSIMITA' DEI CORSI D'ACQUA

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non impiegare in prossimita' dei corsi d'acqua.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

BASTA® 60 HOBBY

ERBICIDA TOTALE AD AZIONE FOGLIARE SU SUPERFICI NON COLTIVATE
CONCENTRATO SOLUBILE

COMPOSIZIONE
g 100 di Basta® 60 Hobby contengono:
g 5,8 di Glufosinate ammonio puro (=60 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Pronto soccorso
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone e togliere gli indumenti contaminati; se necessario chiamare un medico.
In caso di contatto con gli occhi, risciacquarsi immediatamente ed abbondantemente per 15 minuti con acqua, chiamare subito un medico.
In caso di ingestione, o a seguito di prolungata inalazione di polvere o vapori: chiamare subito un medico. In caso di ingestione indurre il vomito se il paziente è cosciente; mantenere libere le vie respiratorie.
Ulteriori informazioni per il medico:
Classe chimica: amminoacido fosfinico
Sintomi di intossicazione: disturbi a livello di coscienza, tremori, spasmi e convulsioni dopo una latenza di diverse ore. Non inibisce le acetilcolinesterasi.
Indicazioni terapeutiche:
in caso di ingestione: lavanda gastrica con acqua, seguita da somministrazione di carbone animale e sodio solfato
in caso di intossicazione, qualunque sia la via di esposizione:
- 1 mg/kg di fenobarbital sodio i.m. o subcut. fino ad un massimo di 5 mg/kg/die. 10 mg/kg di diazepam i.v. al fine di prevenire e/o controllare spasmi e convulsioni
- la diuresi forzata e l'emodialisi sono risultate estremamente efficaci
- trattamenti con Atropina o Ossima (2-PAM o Tossigonina) sono controindicati

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

ERBE INFESTANTI SENSIBILI
erbicida ad azione fogliare indicato per il controllo delle infestanti graminacee e dicotiledoni, annuali e perenni, presenti al momento del trattamento.
EPOCA DI IMPIEGO
post-emergenza delle erbe infestanti
DOSE DI IMPIEGO
200-300 ml per 100 m^2 da diluire in 10 litri di acqua.
SETTORI DI APPLICAZIONE
BASTA 60 HOBBY è assorbito per via fogliare da tutte le erbe che infestano vialetti e giardini, viali, piazzali, sentieri, cortili, bordi stradali ed aree industriali. BASTA 60 HOBBY può essere utilizzato per seccare i polloni di piante arboree, intervenendo finche' questi sono erbacei e non lignificati. BASTA 60 HOBBY puo' anche essere utilizzato per seccare le erbe che infestano terreni destinati ad orto, prima della semina o del trapianto delle seguenti colture orticole: insalate, fagiolino, carota, cavolo rapa, ravanello, cipolla, asparago, patata e fragola.
BASTA 60 HOBBY sviluppa la sua azione erbicida solo sulle erbe infestanti presenti al momento del trattamento.
AVVERTENZE AGRONOMICHE
La semina o il trapianto delle colture, può avvenire dal giorno successivo al trattamento.
Piogge cadute dopo 5-6 ore dal trattamento non condizionano l'attivita' erbicida. Il prodotto non è attivo sulle parti lignificate e suberificate.
I primi sintomi dell'effetto del trattamento si manifestano dopo 3-5 giorni con un ingiallimento delle parti verdi e nel volgere di 5-10 giorni (in funzione delle condizioni climatiche) la parte aerea dell'infestante secca completamente.
FITOTOSSICITÀ
Evitare il contatto con le parti verdi delle colture arboree e con le colture erbacee.
COMPATIBILITÀ
È generalmente compatibile con formulati a base di sali di MCPA.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Registrazione Ministero della Sanita' N. 8115 del 09.11.1992

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Officine di produzione: Bayer CropScience GmbH - Francoforte s/Meno – Germania;
SBM Formulation – St. Marcel - 13367 Marsiglia – Francia;
ISAGRO S.p.A. - Aprilia (LT); Bayer CropScience GmbH-Francoforte s/Meno - Germania / officina di confezionamento Diachem S.p.A. - Unità Produttiva SIFA –Caravaggio (BG)
Officina di confezionamento: I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)

Contenuto netto: ml 200 – 500 - l 1 - 2

Partita n°

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

BASTA® 200

ERBICIDA TOTALE AD AZIONE FOGLIARE
Concentrato solubile (SL)

BASTA® 200

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Glufosinate ammonio puro 18,02 g (= 200 g/l)
Coformulanti q.b. a 100.

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.
Irritante per gli occhi.

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare dell'Autorizzazione :
Bayer CropScience S.r.l. - viale Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione :
- Bayer CropScience GmbH - Francoforte sul Meno (Germania)
- SBM Formulation – St. Marcel - Marsiglia – (Francia)
- Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)

Registrazione n. 8117 del 9/11/1992 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: 0,5 - 1 - 2,5 - 5 - 10 - 20 L

Partita n.:*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Pronto soccorso:
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone e togliere gli indumenti contaminati; se necessario chiamare un medico.
In caso di contatto con gli occhi, risciacquarsi immediatamente ed abbondantemente per 15 minuti con acqua, chiamare subito un medico.
In caso di ingestione, o a seguito di prolungata inalazione di polvere o vapori: chiamare subito un medico. In caso di ingestione indurre il vomito se il paziente e' cosciente; mantenere libere le vie respiratorie.
Ulteriori informazioni per il medico:
Classe chimica: amminoacido fosfinico.
Sintomi di intossicazione: disturbi a livello di coscienza, tremori, spasmi e convulsioni dopo una latenza di diverse ore. Non inibisce le acetilcolinesterasi.
Indicazioni terapeutiche:
in caso di ingestione: lavanda gastrica con acqua, seguita da somministrazione di carbone animale e sodio solfato
in caso di intossicazione, qualunque sia la via di esposizione:
-1 mg/kg di fenobarbital sodio i.m. o subcut. fino ad un massimo di 5 mg/kg/die. 10 mg/kg di diazepam i.v. al fine di prevenire e/o controllare spasmi e convulsioni
-la diuresi forzata e l'emodialisi sono risultate estremamente efficaci
-trattamenti con Atropina o Ossima (2-PAM o Tossigonina) sono controindicati
Consultare un Centro Antiveleni

DISERBO TOTALE DELLE ERBE INFESTANTI:

Erbe infestanti sensibili**:** erbicida ad azione fogliare indicato per il controllo delle infestanti graminacee e dicotiledoni, annuali e perenni, presenti al momento del trattamento.
Epoca d'impiego: post-emergenza delle erbe infestanti
Dose d'Impiego: 2,5-8 l/ha secondo il grado e il tipo di infestazione e lo sviluppo delle erbe. Dosi di 2,5-3 l/ha sono sufficienti per il controllo delle infestanti negli stadi giovanili di sviluppo, con trattamenti eseguiti a fine estate o in miscela con erbicidi residuali. Dosi di 3,5-5 l/ha sono indicate contro infestanti annuali o biennali con sviluppo modesto e in buone condizioni di vegetazione. Le dosi superiori sono richieste contro infestanti annuali in avanzato stadio di sviluppo e contro le infestanti perennanti.
Volume di irrorazione: le dosi riportate per ogni settore applicativo, possono essere distribuite con volumi d'acqua compresi fra 200 e 600 litri per ettaro, in funzione dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo delle erbe infestanti, curando la massima omogeneita' di distribuzione sulla superficie fogliare.
Settori di applicazione:
-Erbe infestanti sulla fila o interfila delle colture arboree ed arbustive da frutto (agrumi, drupacee, melo, pero, vite, olivo, noce, nocciolo, actinidia, mora, ribes, lampone, uva spina) nonche' pioppi e vivai di piante arboree. Polloni o germogli radicali.
-Erbe infestanti nell'interfila delle colture erbacee (barbabietola da zucchero, soia, patata, fragola, lattughe e simili e rucola, fagiolino, carota, cavolo rapa, ravanello, cipolla, asparago, mais, frumento e orzo) impiegando apposite attrezzature schermate.
-Piazzole di raccolta di olivo e nocciolo.
-Preparazione del letto di semina o di trapianto, per l'eliminazione delle erbe infestanti gia' nate. Puo' essere impiegato anche dopo la semina ma prima della germinazione della coltura.
-Diserbo delle malerbe nate fra le stoppie di cereali
-Diserbo di sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree archeologiche, industriali e civili da solo o in miscela con erbicida residuale. Per interventi specifici in presenza di Canna palustre (*Phragmites communis*) intervenire quando l'infestante ha raggiunto un'altezza di 1-1,5 metri (pre-fioritura).

DISSECCAMENTO DELLA PARTE AEREA DELLA PATATA PRIMA DELLA RACCOLTA:
Epoca d'impiego: Inizio ingiallimento delle foglie basali.
Dose d'impiego: 2,5-3 l/ha, in proporzione allo sviluppo delle piante da disseccare.
Volume d'irrorazione: distribuire un volume d'acqua compreso tra 200 e 300 litri per ettaro, in funzione dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo delle piante di patata, curando la massima omogeneità di distribuzione sulle foglie e steli della coltura.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
La semina o il trapianto delle colture puo' avvenire dal giorno successivo al trattamento.
Piogge cadute dopo 5-6 ore dal trattamento non condizionano l'attivita' erbicida. Il prodotto non e' attivo sulle parti lignificate e suberificate.
I primi sintomi dell'effetto del trattamento si manifestano dopo 3-5 giorni con un ingiallimento delle parti verdi e nel volgere di 5-10 giorni (in funzione delle condizioni climatiche) la parte aerea dell'infestante secca completamente.
Non usare il prodotto per il disseccamento della parte aerea della patata in concomitanza di periodi eccezionalmente piovosi (più di 40 mm di precipitazioni nei 5 giorni antecedenti l'applicazione) o con terreno saturo d'acqua.

FITOTOSSICITA'
Evitare il contatto con le parti verdi delle colture arboree e con le colture erbacee.
Non impiegare su patate da seme e comunque dove una parte della coltura abbia questo utilizzo.

COMPATIBILITA'
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: attendere sette giorni prima della raccolta della patata.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non impiegare in prossimità dei corsi d'acqua.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

MESUROL® N ESCA

INSETTICIDA LUMACHICIDA
per la lotta contro lumache, chiocciole, limacce, grillotalpa, agrotidi e grilli
ESCA PRONTA ALL'USO

MESUROL® N ESCA
COMPOSIZIONE
100 g di Mesurol N Esca contengono:
1 g di Metiocarb puro
coformulanti quanto basta a 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: BAYER CropScience S.r.l. – 20156 Milano - V.le Certosa 130 – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: BAYER CropScience AG Dormagen - (Germania); Industrialchimica S.r.l. Maserà (PD); LIFA S.r.l.- Isola Vicentina (VI); LIFA S.r.l.- Vigonovo (VE)
Officine di confezionamento: BAYER CropScience S.r.l. - Filago (BG); S.T.I Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Sanità n. 8128 del 30.12.92
Contenuto netto: 250-500 g; 1-5-10-25 kg
Partita n°:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Colture: drupacee, pomacee, fragola, vite, cavoli, asparago, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche, cucurbitacee, solanacee, fagiolo, pisello, fagiolino, carota, ravanello, patata, barbabietola da zucchero, erba medica, trifoglio, tabacco, floreali, ornamentali, forestali.
Dosi di impiego: 6-10 kg/ha a seconda del grado di infestazione.
Modo d'impiego: distribuire il prodotto il più uniformemente possibile, solo sul terreno sottostante le colture. Per evitare anche le infestazioni dall'esterno, distribuire il prodotto in quantità abbondante lungo i margini del campo per una larghezza di 1-2 metri.

COMPATIBILITÀ': il prodotto deve essere distribuito da solo.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare al riparo dall'umidità.

BAYER Bayer CropScience

DPD 30.06.05/a

® marchio registrato

TARGA GOLD

Erbicida selettivo di post-emergenza per le colture sottoindicate, efficace contro le infestanti graminacee annuali e poliennali.
Concentrato emulsionabile (EC)

TARGA GOLD

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
g 5,2 di Quizalofop-Etile isomero D puro (= 50 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

Contiene: nafta solvente (petrolio), aromatica pesante e nafta solvente (petrolio), aromatica leggera.

Frasi di Rischio:
Infiammabile. Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle.
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione :
Bayer CropScience S.r.l. - viale Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione :
AgriFormula S.r.l. - Paganica (AQ)
Bayer CropScience France - Villefranche - Francia

Registrazione n. 8131 del 30/12/92 del Ministero della Sanità

Contenuto netto : ml 250 - 500 - l 1 - 5 - 10

Partita n.:*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.
Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte.
Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il **Targa Gold** é un erbicida selettivo messo a punto per il diserbo di post-emergenza delle colture qui di seguito riportate contro le infestanti graminacee annuali e poliennali. Il prodotto va impiegato sulle infestanti già emerse in fase di attiva crescita e non sofferenti per siccità o basse temperature, che vengano distrutte per assorbimento fogliare. Il prodotto agisce lentamente: occorrono 7-15 giorni in relazione all'andamento stagionale per manifestare l'effetto erbicida. Le condizioni climatiche favorevoli alla crescita vegetativa delle infestanti (caldo e buon livello di umidità del terreno) migliorano ed accelerano l'efficacia del prodotto. Per quanto concerne la lotta contro le infestanti poliennali, la frammentazione dei rizomi a mezzo di lavorazioni meccaniche migliora l'efficacia del trattamento. Il prodotto risulta selettivo per le colture sottoindicate, sulle quali può venire impiegato in qualsiasi stadio di sviluppo.

INFESTANTI SENSIBILI
a) Annuali :
Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*),
Loglio (*Lolium* spp.),
Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*),
Falso panico (*Setaria* spp.),
Digitaria (*Digitaria sanguinalis*),
Avena selvatica (*Avena* spp.),
Falaride (*Phalaris* spp.),
ricacci di cerali, riso crodo

b) Poliennali :
Falsa gramigna (*Agropyron repens =Elimus repens*),
Gramigna comune (*Cynodon dactylon*),
Sorghetta (*Sorghum halepense*)

APPLICAZIONI
Aglio, barbabietola da zucchero, carciofo, carota, cavolfiore, cavolo cappuccio, cipolla, colza, erba medica, fagiolino, fragola, girasole, melone, pisello, pomodoro, radicchio, soia, spinacio, tabacco, zucchino.

DOSE D'IMPIEGO
1-1,5 l/ha in 300-400 litri di acqua.
La dose minore é da impiegare su graminacee nello stadio di 1-3 foglie; quella superiore é indicata dallo stadio di accestimento in poi. Per combattere infestazioni di *Sorghum halepense* da rizoma si può intervenire:

- trattamento frazionato a 1,5 l/ha su infestante a 20-30 cm di altezza, ripetendo l'intervento sugli eventuali ricacci
- trattamento unico a 2 l/ha su infestante in fase di levata-inizio botticella.

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Trattare in assenza di vento in modo da non danneggiare colture sensibili vicine.
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

NOCIVITÀ
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta
20 giorni per erba medica, fagiolino, spinacio;
30 giorni per aglio, carciofo, carota, fragola, melone, pisello, tabacco, zucchino;
60 giorni per barbabietola da zucchero, cavolfiore, cavolo cappuccio, cipolla, colza, girasole, pomodoro, radicchio, soia.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

MONCEREN® 250 FS

FUNGICIDA LIQUIDO

per la concia delle sementi di patata, lattuga, pisello, pomodoro, peperone, melanzana, asparago, cavoli, fagiolo, fava, carciofo, bietola rossa, bietola da costa, fragola e cotone contro la Rhizoctonia solani.

MONCEREN® 250 FS

Composizione

100 g di Monceren 250 FS contengono:

g 22,9 di Pencycuron puro (=250 g/l)

coformulanti quanto basta a 100.

Contiene composti di isotiazolone

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1

Registrazione Ministero della Sanità n. 8149 del 30.12.92

Officine di produzione: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG);

Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)

DIACHEM - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

IRCA - Albano S. Alessandro

Contenuto netto: l 1

Partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi e modalità di impiego:

Patata e carciofo: nebulizzare, con apposita apparecchiatura, 100 ml di prodotto senza diluirlo, ogni 100 kg di semente, avendo cura di trattare uniformemente tutta la superficie.

Lattuga, pisello, pomodoro, peperone, melanzana, asparago, cavoli, fagiolo, fava, bietola rossa, bietola da costa, fragola e cotone: nebulizzare, con apposita apparecchiatura, 250-350 ml di prodotto ogni 100 kg di semente, avendo cura di trattare uniformemente tutta la superficie.

Avvertenza: la semente trattata con Monceren 250 FS non può essere usata per l'alimentazione umana o animale. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

COMPATIBILITÀ: il prodotto può essere miscelato con fungicidi a reazione neutra che agiscono contro la fusariosi e contro altre malattie.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ: evitare la contaminazione dei corpi idrici.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Conservare al riparo dal gelo.

BAYER Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

ALSYSTIN® SC

Etichetta/foglio illustrativo

INSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA
Inibitore della sintesi della chitina

ALSYSTIN® SC
COMPOSIZIONE
100 g di Alsystin SC contengono:
39,4 g di Triflumuron puro (= 480,7 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. N mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare dell'autorizzazione:
Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officina di produzione:
Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania)
Officine di confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); SCB – Marle sur Serre (Francia)
Contenuto netto: 100-500 ml
Registrazione Ministero della Sanità N. 8150 del 30.12.92
Partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Melo e pero: 20-25 ml/hl contro Carpocapsa, Cemiostoma, Litocollete, Psilla, Orgia, Archips, Pandemis, Cydia molesta, Zeuzera.
Pesco: 20-25 ml/hl contro Cydia, Anarsia, Litocollete, Zeuzera.
Cavolo bianco: 20-40 ml/hl contro Cavolaia e Mamestra.
Piante forestali: 20-25 ml/hl contro Processionaria, Limantria ed Ifantria e Orgia.
Floreali ed ornamentali: 20-35 ml/hl contro Limantria, Spodoptera littoralis, Ifantria e Orgia.

MODALITA' DI IMPIEGO
I migliori risultati si ottengono effettuando il trattamento dall'inizio del volo degli adulti all'inizio della schiusura delle uova.
Nota bene: per il suo specifico meccanismo d'azione il prodotto si e' dimostrato selettivo verso numerosi artropodi utili quali: Fitoseidi, Coccinellidi, Orius spp., Anthocoris spp., Chrysopa spp., Calcididi, Icneumonidi e Sirfidi. Non trattare in fioritura.
Avvertenza: è necessario sfalciare le erbe in fiore nei frutteti inerbiti
COMPATIBILITA': il prodotto può essere miscelato con formulati a reazione neutra; escludere la miscela con prodotti a reazione alcalina (polisolfuri ad es.).
Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per melo, pero e pesco, 30 giorni prima del raccolto per cavolo bianco.
Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Conservare al riparo dal gelo

® Marchio registrato

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

CHALLENGE®

Erbicida selettivo per carota, pisello, pomodoro, mais, patata, girasole, sorgo, tabacco
Sospensione Concentrata

CHALLENGE®
Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Aclonifen puro 49,6 g (= 600 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio :
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officine di Produzione :
AgriFormula S.r.l. - Paganica (AQ) - Bayer CropScience France - Villefranche - Francia

Registrazione n. 8184 Ministero della Sanità del 16/03/93

Contenuto netto : 1 - 5 – 10 L

Partita n.:*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
INFESTANTI SENSIBILI :
Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Farinello comune (*Chenopodium* album), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*)
Cencio molle (*Abutilon theofrasti*), Papavero comune (*Papaver rhoeas*), Euforbia (*Euphorbia* spp.), Correggiola (*Polygonum aviculare*)
Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Ravanello selvatico (*Raphanus rafanistrum*), Senape (*Sinapis arvensis*),
Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Mercorella (*Mercurialis annua*), Centocchio (*Stellaria media*), Camomilla bastarda (*Anthemis arvensis*)
Crespino dei campi (*Sonchus arvensis*), Poligono nero (*Polygonum convolvulus*)

INFESTANTI RESISTENTI :
Veronica (*Veronica persica*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Viola del pensiero (*Viola tricolor*), e infestanti graminacee in genere.

MODALITA' D'IMPIEGO
EPOCA D'IMPIEGO
- pre-emergenza per il pisello, pomodoro, carota, mais, girasole e sorgo;
- pre-trapianto per il tabacco e pomodoro;
- dopo l'ultima rincalzatura per la patata;
- post-emergenza precoce del girasole (2-4 foglie vere).

DOSI D'IMPIEGO

carota, patata, pisello, pomodoro, tabacco	2,5 - 3 l/ha	
girasole	2,5 - 3 l/ha	in pre-emergenza della coltura
	1-1,5 l/ha	in post-emergenza precoce (2-4 foglie vere)
mais	1,5 - 2 l/ha	
sorgo	1 - 1,5 l/ha	

VOLUME D'IRRORAZIONE : 300 - 500 l/ha.

COMPATIBILITA'
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE
- Nell'applicazione di post-emergenza precoce del girasole le infestanti dicotiledoni debbono essere in fase di emergenza o, al massimo, allo stadio di dicotiledoni - prima foglia vera.
- Non intervenire su colture in fase di emergenza e su germogli scoperti di patata.
- Nei terreni limosi piogge battenti di forte intensità e ristagni d'acqua possono sensibilizzare le colture in fase di emergenza.
  Su pomodoro seminato, con andamento stagionale molto piovoso e freddo dopo le semine, il prodotto può manifestare interazioni fitotossiche con geoinsetticidi a base di forate, clorpirifos etile, fonofos e furatiocarb, localizzati a contatto con il seme.
  Su carota utilizzare la dose inferiore prevista, qualora le temperature superino i 30 °C.
- In giornate ventose non impiegare il prodotto in prossimità di colture sensibili (pero e cucurbitacee).
- Non impiegare su mais da seme, dolce o da "pop-corn".
  In caso di forzata sostituzione della coltura diserbata è possibile la risemina o il trapianto della coltura stessa, previa lavorazione superficiale a 8 cm.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05/a

® Marchio registrato

ALTO 100 SL

FUNGICIDA SISTEMICO

formulato come concentrato solubile contro le malattie fungine di frumento, orzo, barbabietola da zucchero e contro il Mal dell'Esca della vite

ALTO 100 SL

COMPOSIZIONE

100 g di ALTO 100 SL contengono :
8,8 g di Ciproconazolo puro (=100 g/l)
Coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – Milano – 02/3972.1
Officina di produzione: Syngenta Agro S.A.S - Gaillon (Francia) ; Syngenta Agro S.A. El Prat de Llobregat – Barcellona (Spagna)

Registrazione Ministero della Sanità N. 8213 del 16.03.1993

Contenuto netto: 1 - 5 - 10 litri

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono posssibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo l'ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

Colture, dosi e modalità di impiego

CEREALI (frumento e orzo)

Contro Oidio, Ruggini, Septoria, Rincosporiosi: litri 0,6-0,8 /ha.
ALTO 100 SL è attivo anche contro Cercosporella.
Intervenire alla prima comparsa delle malattie o comunque nel periodo che va dall'inizio spigatura alla fioritura.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Contro Cercospora ed Oidio: litri 0,6 - 0,8/ha.
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi della cercospora e ripetere i trattamenti ogni 3 settimane circa per un totale di 2-4 applicazioni a seconda del ciclo varietale e delle condizioni climatiche.
Nelle aree bieticole del Centro-sud, con minore pressione della Cercospora o su varietà tolleranti si può ridurre la dose a litri 0,4 – 0,6/ha.
Tali trattamenti permettono anche una completa protezione nei confronti dell'Oidio.
Distribuire il prodotto in un volume di acqua sufficiente ad assicurare una completa ed uniforme bagnatura delle suddette colture; per pompe a volume normale, distribuire 600-800 litri d'acqua per ettaro.

VITE

Contro Mal dell'Esca: ml 10 per pianta, diluiti in 10 litri di acqua, per un massimo di 50 piante per ettaro.
Impiegare ALTO 100 SL su piante con sviluppo vegetativo normale che non siano già compromesse dalla malattia e che abbiano un apparato vascolare efficiente.
Intervenire quindi:
- su piante che presentino al massimo il 30% delle foglie colpite da manifestazione classica del mal dell'esca
- su vigneti di non oltre 15 anni di età
- subito dopo la manifestazione della malattia e comunque entro 3 anni dalla prima comparsa della sintomatologia fogliare nel vigneto.

Il prodotto va applicato al terreno col palo iniettore, in corrispondenza delle radici assorbenti, ad una profondità di 10-15 cm.
Epoca di applicazione: alla ripresa vegetativa con germogli di 5-20 cm di lunghezza.
Il trattamento non garantisce il completo risanamento delle piante, ma è in grado, di norma, di produrre un contenimento significativo dei sintomi fogliari ed un prolungamento della vita produttiva della pianta.

Preparazione della poltiglia

Versare il quantitativo necessario del prodotto direttamente nel serbatoio già riempito a metà; completare il riempimento mantenendo agitata la poltiglia.
Per la preparazione delle poltiglie miste diluire in poca acqua il prodotto prima di aggiungerlo alla poltiglia contenente altri prodotti.

Compatibilità: il prodotto è miscibile con tutti i prodotti di uso comune. **Non è compatibile** con prodotti a reazione alcalina come polisolfuri e calce.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta per i cereali e 14 giorni per la barbabietola da zucchero e per la vite

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

BAYER Bayer CropScience

DPD 30.06.05

ATEMI 10 PEPITE

FUNGICIDA SISTEMICO
formulato in granuli disperdibili in acqua contro Oidio, Ruggine, Monilia e Cladosporiosi

ATEMI 10 PEPITE

COMPOSIZIONE
100 g di ATEMI 10 PEPITE contengono :
10 g di Ciproconazolo puro
Coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – Milano – 02/3972.1
Officina di produzione: Syngenta Agro S.A.S Gaillon (Francia)
Officina di confezionamento. STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Sanità N. 8232 del 23.03.1993

Contenuto netto: 250 g

PARTITA N.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo l'ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Colture, dosi e modalità di impiego
Vite: contro Oidio g 10-12,5 per ettolitro ogni 14 giorni. In situazioni di forte pressione della malattia ed in particolare su uva da tavola a partire dalla fioritura la dose può essere aumentata fino a 15 g per ettolitro adottando un intervallo di 10-14 giorni.
Note: in zone di forte pressione della malattia e su uva da tavola utilizzare il prodotto ad una dose non inferiore a 125 g ad ettaro, indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati.
Contro Muffa grigia: g 20 per ettolitro. Effettuare il trattamento in pre-chiusura grappolo ed in pre-raccolta. Ha effetto collaterale contro il marciume acido.
Contro Mal dell'Esca: g 10 per pianta, diluiti in 10 litri di acqua, per un massimo di 50 piante per ettaro.
Impiegare ATEMI 10 PEPITE su piante con sviluppo vegetativo normale, che non siano già compromesse dalla malattia e che abbiano un apparato vascolare efficiente.
Intervenire quindi:
- su piante che presentino al massimo il 30% delle foglie colpite da manifestazione classica del Mal dell 'Esca
-su vigneti di non oltre 15 anni di età
-subito dopo la manifestazione della malattia e comunque entro 3 anni dalla prima comparsa della sintomatologia fogliare nel vigneto.
Il prodotto va applicato al terreno col palo iniettore, in corrispondenza delle radici assorbenti, ad una profondità di 10-15 cm.
Epoca di applicazione: alla ripresa vegetativa con germogli di 5-20 cm di lunghezza.
Il trattamento non garantisce il completo risanamento delle piante, ma è in grado, di norma, di produrre un contenimento significativo dei sintomi fogliari ed un prolungamento della vita produttiva della pianta.
Melo e pero: contro Ticchioltura ed Oidio: g 12,5 per ettolitro da adoperarsi in miscela con prodotti di contatto, intervenendo dall'inizio caduta petali.
Contro Ticchiolatura tardiva e Monilia: impiegare ATEMI 10 PEPITE in funzione delle piogge alla dose di g 15-20 per ettolitro fino a 7 giorni dalla raccolta.
Drupacee (pesco, albicocco, susino, mandorlo)
Contro Oidio: g 10-12,5 per ettolitro ogni 12-14 giorni, iniziando i trattamenti dopo la caduta dei petali.
Contro Monilia: g 10-12,5 per ettolitro.
Nei trattamenti ai bottoni rosa, in fioritura (in caso di piogge persistenti), alla sfioritura, si consiglia di miscelare ATEMI 10 PEPITE con prodotti a base di thiram, benzimidazolici, dithianon, a dosi ridotte.
Nei trattamenti ad 1-2 settimane dalla raccolta impiegare ATEMI 10 PEPITE da solo alla dose di 12,5 g/hl, elevandola a 20 g/hl in condizioni di forte pressione della malattia.
Contro Ruggine (*Tranzschelia pruni-spinosae*): g 12,5 per ettolitro, inziando la difesa alla comparsa dei primi sintomi della malattia.
Asparago: contro Ruggine: g 250-300 per ettaro: iniziare la difesa alla comparsa, dei primi sintomi della malattia sull'apparato aereo delle piante madri, trattando ogni 14-15 giorni.
Carciofo: contro Oidio: g 125-150 per ettaro: intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia.
Pisello: contro Oidio: g 100-125 per ettaro: intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia.
Pomodoro: contro Cladosporiosi e Oidio: g 10-12,5 per ettolitro; intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia.

Fiori ed ornamentali contro Oidio: g 10-15 per ettolitro; contro Ruggini: g 20 -30 per ettolitro.
Tutte le dosi indicate si riferiscono alla distribuzione con pompe a volume normale, tale da assicurare una uniforme e completa bagnatura.
Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione. Per la preparazione delle poltiglie miste diluire in poca acqua il prodotto prima di aggiungerlo alla poltiglia contenente altri prodotti.

Compatibilità: ATEMI 10 PEPITE non è compatibile con prodotti a reazione alcalina come polisolfuri e calce.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta per vite, albicocco, mandorlo e carciofo, 10 giorni prima della raccolta per pomodoro, 7 giorni prima della raccolta per susino, pisello, melo e pero, 3 giorni prima della raccolta per pesco. Per asparago tempo di carenza non richiesto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

WOXA® WG

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA E RESIDUALE PER VIVAI ED AREE INCOLTE
GRANULI AUTODISPERSIBILI IN ACQUA

WOXA® WG
COMPOSIZIONE
100 g di Woxa WG contengono:
10 g di Glifosate puro
20 g di Oxadiazon puro
coformulanti quanto basta a 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione:
Bayer CropScience France – Elbeuf - Francia
Scotts France SAS. - Bourth (Francia)
Exwold Technology Ltd, Billingham, Stockton - on - Tees, UK

Officine di Confezionamento:
AgriFormula S.r.l. - Paganica (AQ)
Torre S.r.l. - Montalcino - Torrenieri (SI)
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
I.R.C.A. SERVICE S.r.l., Fornovo S. Giovanni (BG)
L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE)

Registrazione Ministero della Sanità N. 8290 del 04/06/93

Distribuito da: SCOTTS Italia S.r.l. – Viale Montegrappa, 18 – 31100 TREVISO

Contenuto netto: 50 - 100 -125 - 150 - 200- 250 - 300 - 500 g /1 - 5 - 10 - 15 kg
Partita n.

INFORMZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni
Caratteristiche
Woxa WG è un diserbante di post-emergenza in grado di controllare le infestanti mono e dicotiledoni, annuali e perenni, presenti al momento del trattamento e di impedire le emergenze delle malerbe annuali grazie alla sua azione residuale.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Vivai di ornamentali
6 - 8 kg/ha su infestanti nei primi stadi di sviluppo.
Evitare nella maniera più assoluta di bagnare la coltura.
Aree incolte (sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali e industriali, aree ed opere civili):
Il prodotto va applicato in primavera su infestanti già sviluppate, distribuendo 300-500 l/ha di sospensione in modo da assicurare una adeguata bagnatura.
Dosi di impiego: 8-12 kg/ha, utilizzando il dosaggio più elevato in presenza di infestanti perenni e di difficile controllo.
Compatibilità
Il prodotto si usa da solo. Tuttavia in caso di infestanti in fase di minore sensibilità, l'aggiunta alla soluzione di 10 kg/ha di Solfato d'Ammonio o coadiuvanti specifici (alle dosi riportate in etichetta) migliora l'efficacia dell'erbicida.

Fitotossicità
Evitare che il prodotto giunga a contatto con la vegetazione delle colture.
Trattare in assenza di vento e utilizzare basse pressioni (1 - 3 atm). Intervenire su colture ben lignificate.
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta
Avvertenze
Le piogge che cadono entro 6 ore dall'applicazione possono ridurre l'efficacia del trattamento.
Le lavorazioni del terreno riducono l'efficacia del trattamento.
Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o in acciaio, se non protetti da vernici plastiche, perché il prodotto li può corrodere.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenze: Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. - Conservare al riparo dall'umidità.

Bayer CropScience

®Marchio registrato

DPD 30.06.05/a

RAXIL® TM LIQUIDO

FUNGICIDA ORGANICO PER LA CONCIA DELLE SEMENTI DI GRANO, ORZO, SEGALE E AVENA
FORMULAZIONE: CONCENTRATO FLUIDO PER CONCIA

RAXIL® TM LIQUIDO

Composizione:
100 g di Raxil TM Liquido contengono:
1,24 g di tebuconazolo puro (=15 g/l)
41,32 g di tiram puro (= 500 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania); Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
Registrazione Ministero della Sanità n. 8480 del 30.03.94
Contenuto netto: l 1-5-20-25-50-1000
Partita N.:

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Tebuconazolo 1,24%, Tiram 41,32%
le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
TEBUCONAZOLO:
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
TIRAM:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica.
Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso e alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro antiveleni.
ISTRUZIONI PER L'USO
Caratteristiche: il Raxil TM Liquido è un fungicida ad ampio spettro di azione. In base alla proprietà sistemica del tebuconazolo, possono essere combattuti sia patogeni fungini che si fissano esternamente sul seme, che patogeni che si sviluppano all'interno del seme.
CAMPI E DOSI DI IMPIEGO:
Grano: 200 ml per 100 kg di seme contro
- carie (*Tilletia caries, Tilletia foetida*)
- carbone (*Ustilago tritici, Urocystis tritici*)
- fusario (*Fusarium spp.)*
- elmintosporio (*Cochliobolus sativus*)
- septoria (*Leptosphaeria nodorum)*
Orzo: 200 ml per 100 kg di seme contro
- carbone fisso e volante (*Ustilago hordei, Ustilago nuda*)
- fusario (*Fusarium spp.)*
con buona azione anche contro
-elmintosporiosi (*Helminthosporium gramineum, Pyrenophora teres, Cochliobolus sativus*)
Segale: 200 ml per 100 kg di seme contro
- carbone (*Urocystis occulta*)
- fusario (*Fusarium spp.*)
Avena: 200 ml per 100 kg di seme contro
- carbone (*Ustilago avenae*)
- fusario (*Fusarium spp.*)
MODO DI IMPIEGO
La formulazione del Raxil TM Liquido è particolarmente adatta per la concia umida delle sementi. A seconda delle attrezzature utilizzate, il prodotto può essere impiegato tale e quale oppure diluito in acqua.

DPD 30.06.05

AVVERTENZA - I semi trattati con Raxil TM Liquido non possono essere destinati alla alimentazione umana ed animale. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti nocivi.

AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AVVERTENZE - Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Agitare bene il prodotto prima di ogni prelievo
Conservare al riparo dal gelo

***Attenzione: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Non disperdere nell'ambiente.**
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zone di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto contenere la perdita usando sabbia o segatura o altro materiale inerte per assorbire il prodotto sversato. Trasferire l'inerte contaminato in un contenitore dotato di chiusura avendo cura di etichettare il contenitore indicando il nome del prodotto e la classificazione di pericolo, e trasportare/far trasportare a Bayer CropScience S.r.l., Via Delle Industrie 9, 24040 Filago, telefono per emergenza 035/990111 .

* Attenzione confezione ad esclusivo uso industriale

Bayer CropScience

* indicazioni unicamente per la confezione da 1000 litri

DPD 30.06.05

Etichetta/Foglio Illustrativo

CUPRAVIT® IDRO WG

FUNGICIDA CUPRICO A BASE DI IDROSSIDO DI RAME IN GRANULI IDRODISPERSIBILI

CUPRAVIT® IDRO WG
COMPOSIZIONE
100 g di Cupravit Idro WG contengono:
rame metallo (sotto forma di idrossido) g 25
coformulanti q. b. a g 100

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Tossico per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – 20156 Milano - V.le Certosa 130 – Tel. 02/3972.1
Officina di produzione: Griffin Corporation – Valdosta, Georgia (U.S.A.)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 8487 del 30/03/94
Contenuto netto: 100 - 250 - 500 g; 1 - 5 - 10 - 25 Kg

Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE: CUPRAVIT IDRO WG è un anticrittogamico a base di Rame Idrossido in formulazione di granuli idrodispersibili. CUPRAVIT IDRO WG a contatto con l'acqua si scioglie rapidamente evitando problemi di polverosità, schiuma e depositi nella botte.
ISTRUZIONI PER L'USO
ORTICOLE (carciofo, cardo, carota, cavolo, cetriolo, cicoria, cipolla, fagiolo, lattughe e simili, rucola, melanzana, melone, patata, pomodoro, pisello, rapa, ravanello, sedano, spinacio, zucca) contro Alternariosi, Antracnosi, Peronospora, Ticchiolatura, Batteriosi, Septoriosi: g 400-600
VITE contro Peronospora: g 400-600
PERO, MELO contro Ticchiolatura: prima della fioritura g 500-650, dopo la fioritura g 300
AGRUMI contro Fumaggine, Mal secco, Gommosi, Allupatura: g 500-650
DRUPACEE contro Corineo e Bolla: nei trattamenti autunno-invernali kg 1,6-2,5, nei trattamenti di fine inverno g 900, nei trattamenti post-fiorali g 450-550
OLIVO contro Fumaggine, Occhio di pavone: g 450-550
FLORICOLE per combattere Ticchiolatura, Batteriosi, Antracnosi, Alternariosi, Peronospora, Septoriosi: g 450-550
FRAGOLA contro Vaiolatura: g 450-550
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro Peronospora e Cercospora: kg 7-8,5/ha
Tutte le dosi sono riferite a 100 litri di acqua, utilizzando pompe a volume normale.

COMPATIBILITÀ: Non compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C.William, Dott.Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze - Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare al riparo dall'umidità

BAYER Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® marchio registrato

FOLICUR® WG **Etichetta/foglio illustrativo**

GRANULARE IDROSOSPENSIBILE

Fungicida sistemico per pomacee (melo, pero), drupacee (pesco e nettarino, albicocco, ciliegio, susino), vite, cereali (frumento ed orzo), tappeti erbosi, orticole (pomodoro, peperone, carciofo, asparago, cetriolo, zucchino, cocomero e melone).

FOLICUR® WG

Composizione

100 g di Folicur WG contengono:

25 g di tebuconazolo puro

coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO:

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience s.r.l. – 20156 Milano - Viale Certosa, 130 – Tel. 02/3972.1

Officina di produzione: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania)

Officine di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 8498 del 30.03.94

Contenuto netto: g 50-100; kg 0,25-0,5-1-5

Partita n.:

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.

Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi.

Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.

In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.

Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Pomacee (melo e pero):

- contro ticchiolatura (***Venturia inaequalis, Venturia pirina***)

0,04-0,05% (40-50 g in 100 l di acqua) in miscela con fungicidi di copertura (es.: dodina, captano, propineb, mancozeb, diclofluanide). Intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 gg fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15 gg, oppure curativamente entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione

- contro mal bianco del melo (***Podosphaera leucotricha***)

0,04-0,05% (40-50 g in 100 l di acqua)

- contro maculatura bruna del pero (***Stemphylium vesicarium***)

0,05-0,075% (50-75 g in 100 l di acqua)

Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco e nettarino, susino):

- contro ***Monilia spp.*** e ***Botrytis cinerea***

1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 0,05 - 0,075 % (50-75 g in 100 l di acqua)

1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 gg tra di loro alla dose di 0,05-0,075% (50-75 g in 100 l di acqua)

- contro mal bianco (***Sphaerotheca pannosa***)

0,05-0,075% (50-75 g in 100 l di acqua)

- contro ruggine del susino 1 o 2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 0,05% (50 g in 100 l di acqua)

Vite:

- contro oidio (***Uncinula necator***)

intervenire alla dose di 0,04 % (40 g in 100 l di acqua) ogni 10-14 gg in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (es.: dinocap, zolfo bagnabile, zolfo in polvere).

Cereali (frumento ed orzo):

- intervenire alla dose di 1 kg/ha posizionando il trattamento come di seguito:

- contro le "malattie del piede" (***Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis***) in fase di accestimento-levata

- contro oidio (***Erysiphe graminis***), ruggini (***Puccinia spp.***), ***Pyrenophora teres***, ***Rhynchosporium secalis***, in fase di inizio levata-spigatura

- contro fusariosi della spiga (***Fusarium spp.***) in fase di piena fioritura

- contro Septoria (***Septoria spp.***) in fase di inizio levata-spigatura

Tappeti erbosi: contro ***Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa*** e ***Rhizoctonia solani*** alle dosi di 1,5-2 kg/ha (in 600-800 litri d'acqua) intervenendo alla comparsa dei primi sintomi e successivamente 10-20 giorni dopo in funzione dell'andamento epidemico.

In caso di impiego su tappeti erbosi è obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.

Colture orticole (melone, cocomero, cetriolo, zucchino, pomodoro, peperone, asparago, carciofo):

DPD 30.04.05

- contro oidio (***Erysiphe cichoracearum*, *Sphaeroteca fuliginea*, *Leveillula taurica***) intervenire con intervallo di 7-10 giorni alla dose di 0,05% (50 g in 100 l d'acqua)
- contro ruggini e stemfiliosi dell'asparago (***Puccinia asparagi*, *Stemphylium vesicarium***) intervenire con intervallo di 7-10 giorni alla dose di 0.05% (50 g in 100 litri d'acqua). Trattare esclusivamente dopo la raccolta dei turioni durante la stagione vegetativa.

Coltura	Parassita	Dose max f.c. (g/hl)	Dose max f.c. (g/ha)
Melo	Ticchiolatura e oidio	50	900
Pero	Ticchiolatura Mac. bruna	50 75	800 1200
Albicocco	Monilia Oidio e muffa grigia	75	1125
Ciliegio	Monilia Muffa grigia	75	1125
Pesco e nettarino	Monilia Oidio e muffa grigia	75	1125
Susino	Monilia Muffa grigia Ruggine	75 50	1125 750
Vite	Oidio	40	400
Frumento, orzo	Oidio, septoria, ruggini, fusarium		1000
Tappeti erbosi	*Microdochium nivale* *Sclerotinia homeocarpa* *Rhizoctonia solani*		1500-2000
Colture orticole	Oidio, ruggini, stemfiliosi dell'asparago	50	500

Coltura	N. max. trattamenti	Volume d'acqua utilizzato (litri)
Melo	4	1400 –1800
Pero	4	1400 –1600
Albicocco	2	1200 –1500
Ciliegio	2	1200 –1500
Pesco e nettarino	2	1000 –1500
Susino	2	1000 –1500
Vite	4	1000
Frumento, orzo	1	
Tappeti erbosi	2	600-800
Colture orticole	4	800-1000

Compatibilità: Folicur WG può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per pomodoro, peperone, cetriolo e zucchino, 7 giorni per carciofo, cocomero, melone, pesco e nettarino, ciliegio, albicocco e susino; 14 giorni per vite; 15 giorni per pero, 30 giorni per melo. Per frumento e orzo sospendere i trattamenti a fine fioritura.

Evitare che donne in età fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare al riparo dall'umidità.

Bayer CropScience

® marchio registrato

DPD 30.06.05

FOLICUR® WG

GRANULARE IDROSOSPENSIBILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI
Fungicida sistemico per pomacee (melo, pero), drupacee (pesco e nettarino, albicocco, ciliegio, susino), vite, cereali (frumento ed orzo), tappeti erbosi, orticole (pomodoro,peperone, carciofo, asparago, cetriolo, zucchino, cocomero e melone).

FOLICUR® WG
COMPOSIZIONE
100 g di Folicur WG contengono:
25 g di tebuconazolo puro
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO:
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience s.r.l. – 20156 Milano - Viale Certosa, 130 – Tel. 02/3972.1
Officina di produzione: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania)
Officine di confezionamento: Bayer CropScience s.r.l. Filago (BG); STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Sanità n. 8498 del 30.03.94
Contenuto netto: g 250; g 500; kg 1; kg 1 (10 x g 100; 5 x g 200; 4 x g 250; 2 x g 500); kg 5 (5 x kg 1)
PARTITA N.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro antiveleni.

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Pomacee (melo e pero):
- contro ticchiolatura (***Venturia inaequalis, Venturia pirina***)
0,04-0,05% (40-50 g in 100 l di acqua, pari a 1 sacchetto da g 250 in 625-500 litri di acqua)* in miscela con fungicidi di copertura (es.: dodina, captano, propineb, mancozeb, diclofluanide). Intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 gg fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15 gg, oppure curativamente entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione
- contro mal bianco del melo (***Podosphaera leucotricha***)
0,04-0,05% (40-50 g in 100 l di acqua, pari a 1 sacchetto da g 250 in 625-500 litri di acqua)*
- contro maculatura bruna del pero (***Stemphylium vesicarium***)
0,05-0,075% (50-75 g in 100 l di acqua, pari a un sacchetto da g 250 in 500-330 litri di acqua)**
Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco e nettarino, susino):
- contro ***Monilia spp. e Botrytis cinerea***
1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 0,05 - 0.075 % (50-75 g in 100 l di acqua, pari a un sacchetto da g 250 in 500-330 litri di acqua)**
1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 gg tra di loro alla dose di 0,05-0,075% (50-75 g in 100 l di acqua, pari a un sacchetto da g 250 in 500-330 litri di acqua)**
- contro mal bianco (***Sphaerotheca pannosa***)
0,05-0,075% (50-75 g in 100 l di acqua, pari a un sacchetto da g 250 in 500-330 litri di acqua)**
- contro ruggine del susino 1 o 2 trattamenti preventivi alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 0,05 % (50 g in 100 l di acqua, pari a un sacchetto da g 250 in 500 litri di acqua)§
Vite:
- contro oidio (***Uncinula necator***)
intervenire alla dose di 0,04 % (40 g in 100 l di acqua, pari a un sacchetto da g 250 in 625 litri di acqua)*** ogni 10-14 gg in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (es.: dinocap, zolfo bagnabile, zolfo in polvere).
Cereali (frumento ed orzo):
- intervenire alla dose di 1 kg/ha (pari a 4 sacchetti da g 250/ha)**** posizionando il trattamento come di seguito:
- contro le "malattie del piede" (***Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis***) in fase di accestimento-levata
- contro oidio (***Erysiphe graminis***), ruggini (***Puccinia spp.***), ***Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis***, in fase di inizio levata-spigatura
- contro fusariosi della spiga (***Fusarium spp.***) in fase di piena fioritura
- contro Septoria (***Septoria spp.***) in fase di inizio levata-spigatura
Tappeti erbosi: contro ***Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa*** e ***Rhizoctonia solani*** alle dosi di 1,5-2 kg/ha (in 600-800 l d'acqua) (pari a 7-9 sacchetti da 250 g/ha)***** intervenendo alla comparsa dei primi sintomi e successivamente10-20 giorni dopo in funzione dell'andamento epidemico.
In caso di impiego su tappeti erbosi è obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.
Colture orticole (melone, cocomero, cetriolo, zucchino, pomodoro, peperone, asparago, carciofo):
- contro oidio (***Erysiphe cichoracearum, Sphaeroteca fuliginea, Leveillula taurica***) intervenire con intervallo di 7-10 giorni alla dose di 0,05% (50 g in 100 l d'acqua, pari a un sacchetto da 250 g in 500 l d'acqua)§
- contro ruggini e stemfiliosi dell'asparago (***Puccinia asparagi, Stemphylium vesicarium***) intervenire con intervallo di 7-10 giorni alla dose di 0,05% (50 g in 100 l d'acqua, pari a un sacchetto da 250 g in 500 l d'acqua)§. Trattare esclusivamente dopo la raccolta dei turioni durante la stagione vegetativa.

Coltura	Parassita	Dose max f.c. (g/hl)	Dose max f.c. (g/ha)
Melo	Ticchiolatura e oidio	50	900
Pero	Ticchiolatura Mac. bruna	50 75	800 1200
Albicocco	Monilia Oidio e muffa grigia	75	1125
Ciliegio	Monilia Muffa grigia	75	1125
Pesco e nettarino	Monilia Oidio e muffa grigia	75	1125
Susino	Monilia Muffa grigia Ruggine	75 50	1125 750
Vite	Oidio	40	400
Frumento, orzo	Oidio, septoria, ruggini, fusarium		1000
Tappeti erbosi	*Microdochium nivale Sclerotinia homeocarpa Rhizoctonia solani*		1500-2000
Colture orticole	oidio, ruggini, stemfiliosi dell'asparago	50	500

Bayer CropScience

DPD 30.06.05
® marchio registrato

Coltura	N. max. trattamenti	Volume d'acqua utilizzato (litri)
Melo	4	1400 -1800
Pero	4	1400 -1600
Albicocco	2	1200 -1500
Ciliegio	2	1200 -1500
Pesco e nettarino	2	1000 -1500
Susino	2	1000 -1500
Vite	4	1000
Frumento, orzo	1	
Tappeti erbosi	2	600-800
colture orticole	4	800-1000

Compatibilità: Folicur WG può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per pomodoro, peperone, cetriolo e zucchino, 7 giorni per carciofo, cocomero, melone, pesco e nettarino, ciliegio, albicocco e susino; 14 giorni per vite; 15 giorni per pero, 30 giorni per melo. Per frumento e orzo sospendere i trattamenti a fine fioritura.

Evitare che donne in età fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte.

ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

AVVERTENZE: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Conservare al riparo dall'umidità.

§
- pari a 1 sacchetto da g 100 in 200 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 200 in 400 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 500 in 1000 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 1000 in 2000 litri di acqua

*
- pari a 1 sacchetto da g 100 in 250-200 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 200 in 500-400 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 500 in 1250-1000 litri di acqua
- pari a 1 saccheto da g 1000 in 2500-2000 litri di acqua

**
- pari a 1 sacchetto da g 100 in 200-130 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 200 in 400-260 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 500 in 1000-660 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 1000 in 2000-1320 litri di acqua

***
- pari a 1 sacchetto da g 100 in 250 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 200 in 500 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 500 in 1250 litr di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 1000 in 2500 litri di acqua

****
- pari a 10 sacchetti da g 100/ha
- pari a 5 sacchetti da g 200/ha
- pari a 2 sacchetti da g 500/ha
- pari a 1 sacchetto da g 1000/ha

*****
- pari a 15-20 sacchetti da 100 g/ha
- pari a 15-20 sacchetti da 200 g/2ha
- pari a 3-4 sacchetti ca 500 g/ha
- pari a 3-4 sacchetti ca 1000 g/2ha

Bayer CropScience

DPD 30.06.05
® marchio registrato

ALSYSTIN® 25 PB

INSETTICIDA INIBITORE DELLA SINTESI DELLA CHITINA

Polvere bagnabile

ALSYSTIN® 25 PB

COMPOSIZIONE

g 100 di Alsystin 25 PB contengono:
g 25 di Triflumuron puro
coformulanti quanto basta a 100.

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. N mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione:
Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Officina di produzione:
Bayer CropScience AG – Dormagen (GERMANIA); Bayer CropScience S.r.l. - FILAGO (BG)

Contenuto netto: kg 0,25-0,5-1

Registrazione Ministero della Sanità No. 8514 del 30.04.94

Partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

Melo e pero: 40-60 g/hl contro Lithocolletis, Cemiostoma, Archips, Pandemis, Carpocapsa, Orgia e Psilla, Cydia molesta, Zeuzera.
Pesco: 40-60 g/hl contro Cydia, Anarsia, Lithocollete, Zeuzera
Cavolo bianco: 50-80 g/hl contro larve defogliatrici (Cavolaia e Mamestra).
Piante forestali: 40-50 g/hl contro Processionaria, Limantria ed Ifantria e Orgia.
Floreali e ornamentali: 40-70 g/hl contro Limantria, Spodoptera littoralis e Ifantria e Orgia.
Modalita' di impiego: i migliori risultati si ottengono effettuando il trattamento dall'inizio del volo degli adulti all'inizio della schiusura delle uova.
Non impiegare in fioritura; e' necessario sfalciare le erbe in fiore nei frutteti inerbiti.

Nota Bene : per il suo specifico meccanismo d'azione il prodotto si e' dimostrato selettivo verso numerosi artropodi utili quali: Fitoseidi, Coccinellidi, Orius spp., Anthocoris spp., Chrisopa spp., Calcididi, Icneumonidi e Sirfidi.

COMPATIBILITA': il prodotto puo' essere miscelato con formulati a reazione neutra; escludere la miscela con prodotti a reazione alcalina (polisolfuri ad es.).

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per melo, pero e pesco; 30 giorni prima del raccolto per cavolo bianco.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Conservare al riparo dall'umidità.

® Marchio registrato

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

ALSYSTIN® 25 PB

INSETTICIDA INIBITORE DELLA SINTESI DELLA CHITINA
Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

ALSYSTIN® 25 PB
COMPOSIZIONE
g 100 di Alsystin 25 PB contengono:
g 25 di **Triflumuron** puro
coformulanti quanto basta a 100.
FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione:
Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 Milano. **T**el. 02/3972.1
Officina di produzione:
Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); S.T.I. - Solfotecnica Italiana - Cotignola (RA)
Contenuto netto: kg 1 (4 x g 250); kg 1 (5 x g 200)
Registrazione Ministero della Sanità n° 8514 del 30.04.94
Partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni
ISTRUZIONI PER L'USO
Melo e pero: 40-60 g/hl (pari a un sacchetto da g 250 in 600-400 litri di acqua)* contro Lithocolletis e Cemiostoma, Archips, Pandemis, Carpocapsa, Orgia e Psilla, Cydia molesta, Zeuzera.
Pesco: 40-60 g/hl (pari a 1 sacchetto da g 250 in 600-400 litri di acqua)* contro Cydia, Anarsia, Lithocollete, Zeuzera.
Cavolo bianco: 50-80 g/hl (pari a un sacchetto da g 250 in 500-300 litri di acqua)** contro larve defogliatrici (Cavolaia e Mamestra).
Piante forestali: 40-50 g/hl (pari a un sacchetto da g 250 in 600-500 litri di acqua)*** contro Processionaria, Limantria ed Ifantria e Orgia.
Floreali e ornamentali: 40-70 g/hl (pari a un sacchetto da g 250 in 600-350 litri di acqua)**** contro Limantria, Spodoptera littoralis, Ifantria e Orgia.
MODALITA' DI IMPIEGO
I migliori risultati si ottengono effettuando il trattamento dall'inizio del volo degli adulti all'inizio della schiusura delle uova.
Non impiegare in fioritura; è necessario sfalciare le erbe in fiore nei frutteti inerbiti.
Nota Bene: per il suo specifico meccanismo d'azione il prodotto si è dimostrato selettivo verso numerosi atropodi utili quali: Fitoseidi, Coccinellidi, Orius spp., Anthocoris spp., Chrisopa spp., Calcididi, Icneumonidi e Sirfidi.
COMPATIBILITA': il prodotto può essere miscelato con formulati a reazione neutra; escludere la miscela con prodotti a reazione alcalina (polisolfuri ad es.).
Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per melo, pero e pesco; 30 giorni prima del raccolto per cavolo bianco.
Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Conservare al riparo dall'umidità.

oppure:
* pari a 1 sacchetto da g 200 in 500-350 litri di acqua
** pari a un sacchetto da g 200 in 400-250 litri di acqua
*** pari a 1 sacchetto da g 200 in 500-400 litri di acqua
**** pari a 1 sacchetto da g 200 in 500-300 litri di acqua

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

® Marchio registrato

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

WHIP® S

Diserbante graminicida di post-emergenza per barbabietola da zucchero, carciofo, cavolo bianco e cavolo cinese, cetriolo, cipolla, colza, fagiolino, fava, favino, finocchio, girasole, melanzana, melone, patata, peperone, pisello, pomodoro, ravanello, soia, spinacio, tabacco e zucchino.

FORMULAZIONE: EMULSIONE OLIO/ACQUA

WHIP®S

Composizione:
Fenoxaprop-p-etile puro 6,76% (= 69 g/l)
Coformulanti q.b. a 100
Contiene nafta solvente (petrolio) aromatica pesante.

Frasi di Rischio
Infiammabile. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1

Registrazione n° 8524 del Ministero della Sanità del 30/07/1994

Officine di produzione
-Bayer CropScience GmbH - Francoforte s/ Meno - Germania
-SBM Formulation – St. Marcel – Marsiglia – (Francia)
-Isagro S.p.A. – Aprilia (LT).

Contenuto netto:1– 5 Litri

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi del principio attivo nell'animale da esperimento: passività, sonnolenza, assenza di equilibrio, posizione prona.
-in caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico;
-togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con acqua e sapone;
-risciacquare gli occhi contaminati con acqua per 10-15 minuti;
-non provocare il vomito.

Trattamenti specifici
In caso di ingestione, somministrare prima di tutto 200 ml di olio di paraffina ed eseguire poi la lavanda gastrica con ca. 4 litri d'acqua, terminare con carbone e solfato di sodio. Fare attenzione a prevenire l'aspirazione polmonare per la presenza di solventi organici contenuti nel formulato. Mantenere una adeguata aerazione. Trattamenti sintomatici. **Controindicazioni**: derivati dell'adrenalina.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è assorbito per via fogliare.
Efficacia sulle erbe infestanti
-**infestanti sensibili:** coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), avena selvatica (*Avena* spp.), giavone (*Echinochloa crus-galli*), falaride (*Phalaris* spp.), digitaria (*Digitaria sanguinalis*), pabbio (*Setaria* spp.), sorghetta (*Sorghum halepense*), panico (*Panicum* spp).
Erbe infestanti resistenti: non agisce contro loglio (*Lolium* spp.).

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

DOSI D'IMPIEGO
1,0-1,5 l/ha contro giavone, coda di volpe, avena, pabbio, panico e sorghetta da seme.
1,5-2,0 l/ha contro le altre infestanti.

EPOCA D'IMPIEGO: post-emergenza.
Le infestanti sono particolarmente sensibili negli stadi compresi tra la seconda foglia e l'inizio della levata. In caso di emergenza scalare, in particolare della sorghetta, ripetere il trattamento dopo 20-30 giorni impiegando la dose più bassa. Dopo 2-4 settimane si ha la morte dell'infestante. Non necessita l'aggiunta di olio o di bagnanti. Diluire in 300-500 l/ha di acqua.
Condizioni sfavorevoli di crescita, stress da siccità delle infestanti possono influenzare negativamente l'efficacia di WHIP S.

COMPATIBILITÀ

La miscela con Fenmedifam, Acifluorfen e Fomesafen può causare riduzione di efficacia.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non contaminare colture adiacenti. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ESEGUIRE I TRATTAMENTI ALMENO 90 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER GIRASOLE, COLZA E TABACCO; 75 GIORNI PER SOIA, 40 GIORNI PER RAVANELLO E PISELLO, 30 GIORNI PER FAGIOLINO, POMODORO, 60 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze:
Agitare prima dell'uso.
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® Marchio registrato DPD 30.06.05

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

MIRO®

ACARICIDA

SOSPENSIONE ACQUOSA CONCENTRATA

MIRO®

Composizione:

Fenpiroximate* puro 5,04% (= 51,3 g/l)

coformulanti quanto basta a 100.

Frasi di Rischio

Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

Consigli di Prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione:
- Bayer CropScience GmbH, Francoforte s/Meno - Germania
- SBM Formulation – St. Marcel – Marsiglia – (Francia)
- Nihon Nohyaku, Chuo-Ku, Tokyo 103 - Giappone
- ISAGRO S.p.A. - Aprilia (LT)

Officine di confezionamento:
- Diachem S.p.A. - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
- AgriFormula s.r.l. – Paganica (AQ)
- Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Reg.n°8546 del 30/11/1994 del Ministero della Sanità

CONTENUTO NETTO: 0,01-0,020-0,050-0,100-0,25-0,5 / 1 L

Partita N°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi nell'animale da esperimento: nausea, vomito, atassia, ipopnea, ipoattività, prostrazione, irritazione.

Terapia: sintomatica, con particolare attenzione al sistema respiratorio. **Consultare un centro Antiveleni**.

CARATTERISTICHE

MIRO è un acaricida appartenente alla famiglia dei fenossipirazoli, attivo contro le forme mobili (larve, ninfe, adulti) degli acari fitofagi Tetranichidi (*Panonychus ulmi*, *Panonychus citri*, *Eotetranychus carpini*, *Tetranychus urticae*), Tarsonemidi ed Eriofidi su colture frutticole, vite, agrumi, ortaggi e colture erbacee in genere. MIRO e' caratterizzato da un'azione pronta e duratura che si esplica principalmente per contatto ed ingestione. Alle dosi più alte, manifesta una parziale attività ovicida. Trattandosi di un prodotto che agisce per contatto e' necessario effettuare una bagnatura accurata ed uniforme di tutta la vegetazione.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

FRUTTICOLTURA (melo, pero, pesco, susino): contro *Panonychus ulmi*, 100-130 ml/hl, in interventi tempestivi (3-5 forme mobili per foglia o 50% delle foglie con presenza di acari). Effettuare sempre una bagnatura accurata ed uniforme di tutta la vegetazione.

VITICOLTURA: contro *Panonychus ulmi* ed *Eotetranychus carpini*, 100 ml/hl al primo manifestarsi dell'attacco effettuando una bagnatura accurata ed uniforme anche della pagina inferiore delle foglie.

AGRUMI (arancio, limone, clementino): contro *Panonychus citri* 100 ml/hl. Effettuare sempre una bagnatura accurata ed uniforme.

ORTAGGI (pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, fagiolino): contro *Tetranycus urticae* 150-200 ml/hl effettuando una bagnatura anche della pagina inferiore delle foglie.

FRAGOLA: contro *Tarsonemus pallidus* e *Tetranychus urticae*, 150-200 ml/hl, effettuando una bagnatura accurata ed uniforme anche della pagina inferiore delle foglie.

COLTURE FLORICOLE ED ORNAMENTALI: contro *Tetranychus urticae*, *Panonychus ulmi* 150-200 ml/hl effettuando una bagnatura accurata ed uniforme di tutta la vegetazione.

Il trattamento in serra deve avvenire in assenza di operatori e con tempi di rientro di 48 ore.

Si raccomanda la scrupolosa adozione di dispositivi individuali di protezione della cute e degli occhi.

COMPATIBILITA'

MIRO è miscibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari a reazione neutra. Si consiglia di fare sempre una prova preliminare su poche piante prima di effettuare applicazioni estese. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

FITOTOSSICITA'

Dato l'ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà di colture floricole ed ornamentali, effettuare saggi di selettività' prima di estendere il trattamento su tutto l'impianto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU SUSINO, 28 GIORNI SU MELO E VITE, 30 GIORNI SU AGRUMI E 14 GIORNI SULLE ALTRE COLTURE.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze

Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

* Fenpiroximate: sostanza attiva originale Nihon Nohyaku

® Marchio registrato

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

PROPER ENERGY®

Diserbante graminicida di post-emergenza per frumento
EMULSIONE OLIO/ACQUA (EW)

PROPER ENERGY®

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Fenoxaprop-P-etile puro 5,24 g (= 55 g/l),
Mefenpir-dietile 2,86 g (= 30 g/l).
Coformulanti q.b. a 100.

Contiene una miscela di 5-cloro-2metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one: fenoxaprop p-etile: può provocare una reazione allergica.

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione :
Bayer CropScience S.r.l. - viale Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione :
Bayer CropScience GmbH - Francoforte s/Meno - Germania
S.B.M Formulation - St. Marcel - Marsiglia - (Francia)

Registrazione n.8550 del 30.11.1994 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: 0,5 - 1 - 2,5 - 5 L

Partita n.:*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Fenoxaprop-P-etile puro 5,24% e Mefenpir-dietile puro 2,86%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Fenoxaprop-P-etile (nell'animale da esperimento): passività, sonnolenza, assenza di equilibrio, posizione prona.
Mefenpir-dietile (nell'animale da esperimento): sintomi aspecifici. Alterazioni dei globuli rossi e della funzione epatica.
In caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico; togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con abbondante acqua e sapone; risciacquare immediatamente gli occhi con acqua abbondante per 15 minuti; non provocare il vomito.
Trattamenti specifici: in caso di ingestione non provocare il vomito, somministrare prima di tutto 200 ml di olio di paraffina ed eseguire poi la lavanda gastrica con circa 4 litri di acqua, terminare con carbone e solfato di sodio. Evitare l'aspirazione polmonare. Trattamenti sintomatici.
Controindicazioni: derivati dell'adrenalina.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

PROPER ENERGY viene assorbito per via fogliare e traslocato fino ai tessuti del meristema apicale. I primi sintomi d'azione si manifestano con macchie clorotiche su foglie e germogli che poi evolvono in necrosi: dopo circa 2-4 settimane (in funzione delle condizioni climatiche) si ha la morte dell'infestante.
Condizioni sfavorevoli di crescita, stress da siccità delle infestanti possono influenzare negativamente l'efficacia di PROPER ENERGY.

ERBE INFESTANTI SENSIBILI
Alopecurus myosuroides (coda di volpe), *Avena* spp. (avena), *Phalaris* spp. (scagliola), *Poa trivialis* (fienarola comune), *Apera spica-venti* (capellini dei campi).

ERBE INFESTANTI RESISTENTI: *Lolium* spp. (loglio).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO (Frumento)

Dose:1 - 1,5 l/ha contro *Avena* spp., *Phalaris* spp., *Poa trivialis, Apera spica-venti;*
0,75-1,25 l/ha contro *Alopecurus myosuroides*.
La dose inferiore è indicata per gli stadi precoci delle infestanti.

Epoca: post-emergenza dalla terza foglia alla levata del frumento contro le infestanti graminacee negli stadi compresi tra la seconda foglia ed il secondo nodo; in presenza di *Phalaris* spp. intervenire entro la fine accestimento della stessa.

Volume d'irrorazione: 200-400 l/ha di acqua

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

COMPATIBILITA'

La miscela con ormonici sotto forma di sale, nonché con Dicamba, Bifenox e Bentazone può causare riduzione di efficacia.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:

Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Agitare prima dell'uso.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05/a

OPTION

Diserbante graminicida di post-emergenza per barbabietola da zucchero, carciofo, cavolo bianco e cavolo cinese, cetriolo, cipolla, colza, fagiolino, fava, favino, finocchio, girasole, melanzana, melone, patata, peperone, pisello, pomodoro, ravanello, soia, spinacio, tabacco e zucchino.

FORMULAZIONE: EMULSIONE OLIO/ACQUA (EW)

OPTION

Composizione:
Fenoxaprop-p-etile puro 6,77 g (= 69 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g
Contiene nafta solvente (petrolio) aromatica pesante.

Frasi di Rischio
Infiammabile. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Registrazione n° 8552 del 30/11/1994 del Ministero della Sanità

Officine di produzione
-Bayer CropScience GmbH - Francoforte s/ Meno - Germania
-SBM Formulation – St. Marcel – Marsiglia – (Francia)
-Isagro S.p.A. – Aprilia (LT).

Contenuto netto:1– 5 Litri
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi del principio attivo nell'animale da esperimento: passività, sonnolenza, assenza di equilibrio, posizione prona.
-in caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico;
-togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con acqua e sapone;
-risciacquare gli occhi contaminati con acqua per 10-15 minuti;
-non provocare il vomito.

Trattamenti specifici
In caso di ingestione, somministrare prima di tutto 200 ml di olio di paraffina ed eseguire poi la lavanda gastrica con ca. 4 litri d'acqua, terminare con carbone e solfato di sodio. Fare attenzione a prevenire l'aspirazione polmonare per la presenza di solventi organici contenuti nel formulato. Mantenere una adeguata aerazione. Trattamenti sintomatici. **Controindicazioni**: derivati dell'adrenalina.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è assorbito per via fogliare.
Efficacia sulle erbe infestanti sensibili: coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), avena selvatica (*Avena* spp.), giavone (*Echinochloa crus-galli*), falaride (*Phalaris* spp.), digitaria o sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), pabbio (*Setaria* spp.), sorghetta (*Sorghum halepense*), panico (*Panicum* spp).
Erbe infestanti resistenti: non agisce contro loglio (*Lolium* spp.).

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

DOSI D'IMPIEGO
1,0-1,5 l/ha contro giavone, coda di volpe, avena, pabbio, panico e sorghetta da seme.
1,5-2,0 l/ha contro le altre infestanti.
EPOCA D'IMPIEGO: post-emergenza.
Le infestanti sono particolarmente sensibili negli stadi compresi tra la seconda foglia e l'inizio della levata. In caso di emergenza scalare, in particolare della sorghetta, ripetere il trattamento dopo 20-30 giorni impiegando la dose più bassa. Dopo 2-4 settimane si ha la morte dell'infestante. Non necessita l'aggiunta di olio o di bagnanti. Diluire in 300-500 l/ha di acqua.
Condizioni sfavorevoli di crescita, stress da siccità delle infestanti possono influenzare negativamente l'efficacia di OPTION.

FITOTOSSICITÀ

Non contaminare colture adiacenti. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

COMPATIBILITÀ

La miscela con Fenmedifam, Acifluorfen e Fomesafen può causare riduzione di efficacia.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 90 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU GIRASOLE, COLZA E TABACCO; 75 GIORNI SU SOIA, 40 GIORNI SU RAVANELLO E PISELLO, 30 GIORNI SU FAGIOLINO, POMODORO, 60 GIORNI SULLE ALTRE COLTURE.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze:
Agitare prima dell'uso.
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

BITAM® BLU

INSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

BITAM® BLU

Composizione:
Deltametrina pura 2,4 g (= 24,84 g/L)
coformulanti quanto basta a 100

Frasi di Rischio
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare dell'autorizzazione
Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Registrazione n. 8590 del 3/12/1994 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
-Bayer CropScience GmbH - Francoforte s/Meno - Germania
-SBM Formulation – St. Marcel - Marsiglia – (Francia)
-Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)

Officine di confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
Diachem S.p.A. - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

Distribuito da: SIAPA S.r.l. – Via Caldera, 21 – 20153 MILANO

Contenuto netto: 10 - 20 - 100 - 250 – 500 ml / 1 L

Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree, rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Bitam Blu è un insetticida che agisce per contatto ed ingestione, con ampio spettro di attività contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
(ml/hl d'acqua)
- Frutticoltura (melo, pero, pesco, albicocco, susino, ciliegio): contro psilla 90 ml, afide verde del melo, afide del pesco (Myzus spp., Hyalopterus spp., Brachycaudus persicae) 35-60 ml, cocciniglia di S. Josè 60-90 ml (in trattamenti estivi contro neanidi mobili). Contro carpocapsa 35 ml, cidia e anarsia 60-80 ml, capua, cacoecia e altri tortricidi 35-60 ml, microlepidotteri del melo e del pero 35-60 ml. Contro antonomo, maggiolino, tentredini, tripidi, cecidomidi e mosca della frutta 35-60 ml.
- **Viticoltura:** contro tignole 50-70 ml, piralide, nottue, cicaline, afidi, sigaraio 35-60 ml.
- **Agrumicoltura:** contro afidi 50-60 ml, aleurodidi e Saissetia 50-70 ml, mosca degli agrumi 60 ml.
- **Olivicoltura:** contro Saissetia 50-70 ml, tignola (Prays oleae) e tripide 60 ml, mosca delle olive 60 ml, in trattamento preventivo.
- **Orticoltura:** (pomodoro, patata, peperone, melanzana, cavolo, cetriolo, lattughe e simili, rucola, spinacio, asparago, carciofo, pisello, fagiolino, fagiolo, fava, cipolla, porro, carota, sedano), fragola: contro dorifora, altiche, cavolaia, nottue, tripidi, tentredini: 35 ml; contro afidi, aleurodidi, cimici, piralide, casside, tignola, mosca e depressaria: 60 ml
- **Cereali**
- frumento, mais (trattamenti primaverili-estivi): contro nottue, tripidi, e afidi del frumento 35 ml, altri afidi, cimici, piralidi 60 ml.
- **frumento, orzo** (trattamenti autunnali): contro afidi vettori del nanismo giallo 0,35-0,60 l/ha, allo stadio di 1-3 foglie, ripetendo, se necessario, il trattamento dopo 15 giorni circa.
- **Barbabietola da zucchero:** contro altiche e nottue 35 ml, cleono e lisso 60 ml
- **Colza:** contro altiche, meligete, afidi, punteruoli: 0,35-0,6 l/ha
- **Soia:** contro nottue, cimici, tortricidi, vanessa, altica, afidi: 0,35-0,6 l/ha
- **Tabacco:** contro nottue, afidi, tripidi, pulce (Epitrix): 0,35-0,6 l/ha
- **Cotone:** contro nottue, piralide, tignola, cicalina, tripidi, lygus: 0,35 l/ha
- **Funghi:** contro ditteri, collemboli: 35-60 ml
- **Medicai:** contro cavallette, intervenendo sui nuovi ricacci 5-10 giorni dopo lo sfalcio: 0,6 l/ha.
- **Pioppicoltura**
- **pioppo in vivaio:** contro gemmaiola, tarlo vespa: 60 ml; contro criptorrinco, con trattamenti localizzati al tronco: 90-120 ml
- **pioppo in piantagione:** contro criptorrinco, con trattamenti localizzati al tronco: 90-120 ml; contro saperda, con trattamenti localizzati al tronco: 180-240 ml; contro crisomelidi defogliatori: crisomela, crisomelidi minori e stilpnotia: 35-60 ml
- **Floricoltura** (in pieno campo o in serra): contro afidi, aleurodidi, tripidi, cetonie, maggiolino 60 ml, tortrici dei garofani (Bega e Epicoristode) 60-120 ml.
- Vivai e colture ornamentali (in pieno campo o in serra): contro afidi, cimice del platano (Corythuca), larve di lepidotteri, maggiolino 60 ml.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

Per preparare la miscela versare la dose stabilita di Bitam Blu nel quantitativo di acqua previsto, agitando la sospensione acquosa ottenuta. Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro. Bitam Blu agisce per contatto e ingestione, occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato badando a che la bagnatura sia il più uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di un bagnante. Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti delle foglie.

COMPATIBILITÀ
Bitam Blu è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile è necessario aggiungere la dose di Bitam Blu preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicida già preparata, mantenendo l'agitazione. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati a reazione neutra deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è nocivo per le api e gli insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU CIPOLLA, PORRO, SEDANO; 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU ERBA MEDICA, SOIA, COTONE; 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU COLZA; 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SULLE ALTRE COLTURE.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

DPD 30.06.05/b

Bayer CropScience

® marchio registrato

BETANAL TRIO® WG

DISERBANTE DI POST-EMERGENZA PER LA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
FORMULAZIONE: MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)

BETANAL TRIO® WG

Composizione:
Etofumesate puro 6,5%
Fenmedifam puro 6,5%
Metamitron puro 28,0%
Coformulanti q.b. a 100 g

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione :
Bayer CropScience S.r.l. - viale Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione :
SBM Formulation – St. Marcel - Marsiglia – (Francia)
Bayer CropScience Ltd., Hauxton (Cambridge) - Inghilterra
Bayer CropScience AG – Dormagen - Germania

Registrazione n° 8633 del 14/01/1995 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: 1 - 3 - 5 kg

Partita n.:*

NORME PRECAUZIONALI
Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE
Grazie alla complementarietà dei suoi costituenti, il prodotto si è dimostrato attivo contro un'ampia gamma di infestanti a foglia larga, comprese quelle di più difficile controllo, ad esempio: Poligonacee (*Polygonum* spp.), Amarantacee (*Amaranthus* spp.), Erba morella (*Solanum n.*), Farinello (*Chenopodium* spp.), Camomilla comune (*Matricaria c.*), Mercurella (*Mercurialis a.*), Erba calenzuola (*Euphorbia h.*), Attaccamano (*Galium a.*), Erba strega (*Stachys a.*), Asparaggine (*Picris e.*), Centocchio comune (*Stellaria m.*), Veronica (*Veronica* sp.), Viola dei campi (*Viola* sp.), Borsapastore (*Capsella b.p.*), Crucifere (*Sinapis a., Raphanus r.*), Linaria, Fumaria ed altre dicotiledoni.
Le infestanti vengono devitalizzate prevalentemente per contatto con l'apparato fogliare; se le condizioni di umidità del terreno sono favorevoli, il prodotto caduto sul terreno agisce per assorbimento radicale o come antigerminello, esplicando quindi un'azione residuale sulle infestanti a nascita più tardiva.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
I migliori risultati si ottengono intervenendo su infestanti molto piccole (cotiledoni - 2 foglie vere) e, in modo particolare, ricorrendo agli interventi frazionati, con singole dosi di prodotto molto ridotte.

INTERVENTI CON UNICA APPLICAZIONE
Dose: 4 kg/ha in 300-350 litri d'acqua, quando la bietola ha già differenziato le 2-4 foglie vere. Il prodotto può essere utilizzato anche a completamento di un intervento di pre-semina o di pre-emergenza.

INTERVENTI FRAZIONATI
Qualora fosse necessario intervenire prima, o in caso di nascita scalare delle infestanti, si consiglia di eseguire il diserbo facendo ricorso alla tecnica degli interventi frazionati, secondo una delle seguenti tecniche.
Tecnica 1. Dosi: 1,5-2 kg/ha di prodotto formulato in 100-150 litri d'acqua, allo stadio di massimo sviluppo dei cotiledoni della bietola, ripetendo l'applicazione dopo circa 10 giorni, con 2-2,5 kg/ha in 150-200 litri d'acqua.
Tecnica 2. Nel caso esistano i necessari presupposti (attrezzature idonee, adeguata organizzazione aziendale, ecc.) e sia possibile intervenire con la massima tempestività seguendo lo sviluppo dell'infestazione, si consiglia di intervenire con BETANAL TRIO WG alla dose di 1,3 kg/ha in 100-150 litri di soluzione, alla primissima comparsa delle infestanti e indipendentemente dallo sviluppo della bietola. Il trattamento va ripetuto con 1,3 kg/ha di formulato altre 1-2 volte, orientativamente a cadenza di 7-10 giorni e comunque seguendo l'emergenza delle infestanti.
In generale, l'aggiunta di olio bianco, alla dose di 0,5 l/ha, consente di migliorare i risultati del diserbo e si rende necessaria in modo particolare nel controllo di infestanti sviluppate o in presenza di quelle di più difficile soppressione.

Avvertenze generali per la buona riuscita del trattamento:

- Evitare di intervenire nelle ore più calde del giorno.
- Effettuare il trattamento su bietola in buone condizioni vegetative (senza danni da insetti o altre cause) e in assenza di vento, avendo cura di bagnare in modo uniforme le infestanti utilizzando i volumi d'acqua indicati nelle diverse epoche.
- Assicurarsi che le attrezzature per il diserbo non contengano residui di altri erbicidi, specialmente ormonici; per precauzione lavare le pompe più volte, prima dell'uso, con acqua e soda o con carbone attivato.

COMPATIBILITÀ

BETANAL TRIO WG è compatibile con olio bianco.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

TEMPI DI RIENTRO

Non entrare nell'appezzamento finchè la coltura è bagnata dal liquido di irrorazione.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:

Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® Marchio registrato

MAGIC DUO

Erbicida di post-emergenza per la barbabietola da zucchero
Formulazione: sospensione concentrata (SC)

MAGIC DUO

Composizione:
Fenmedifam puro 8,9 g (= 90 g/l),
Etofumesate puro 7,9 g (= 80 g/l)
coformulanti q.b. a 100.

Frasi di rischio:
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano — Tel. 02/3972.1

Officine di produzione:
- SBM Formulation – St. Marcel - Marsiglia (Francia)
- SIPCAM S.p.A. - 26857 Salerano sul Lambro (LO)

Registrazione n° 8687 del 31/01/1995 del Ministero della Sanità

Distribuito da: DU PONT de Nemours Italiana S.p.A. – Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Contenuto netto: 0,5 - 1 - 3 - 5 - 10 - 20 L

Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un centro antiveleni.**

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il MAGIC DUO è un erbicida che agisce sulle infestanti soprattutto per contatto, ma esplica anche un'azione per via radicale dovuta alla presenza dell'Etofumesate, che garantisce un effetto residuale duraturo.
Il prodotto agisce sulle più importanti infestanti dicotiledoni presenti nei bietolai:
Amaranthus retroflexus (Amaranto spigato), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Atriplex patula* (Atriplice maggiore), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinaccio selvatico), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galium aparine* (Attaccamani), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Polygonum convolvulus* (Poligono convolvolo), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Senecio vulgaris* (Erba calderina), *Sinapis arvensis* (Senape), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus oleraceus* (Cicerbita), *Spergula arvensis* (Spergularia dei campi), *Stellaria media* (Centocchio), *Veronica spp.*.
Controlla anche le seguenti infestanti graminacee annuali se impiegato dalla fase di emergenza fino allo stadio di 1-3 foglie: *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Bromus* spp., *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Setaria viridis* (Falso panico), *Sorghum halepense* (Sorghetta).

MODALITÀ E DOSE D'IMPIEGO

Il prodotto deve essere impiegato in post-emergenza nei modi seguenti:

applicazione unica: intervenire su infestanti ai primi stadi di sviluppo (da foglie cotiledonali a 2-4 foglie) e su barbabietola con almeno 2-4 foglie vere. Impiegare 4-5 l/ha di formulato in 300-350 litri di acqua. Nel caso di trattamenti effettuati su barbabietola seminata in autunno la dose può essere elevata, se necessario, a 5-6 l /ha.

applicazione frazionata: eseguire il 1° intervento su barbabietole allo stadio di massimo sviluppo dei cotiledoni impiegando 2-3 l/ha, facendo poi seguire la seconda applicazione 7-10 giorni dopo alla dose di 3-4 l/ha. Diluire il formulato in 150-250 litri di acqua.
Le applicazioni frazionate sono particolarmente indicate nei seguenti casi:
- assenza di un pre-semina o di un pre-emergenza
- presenza di infestazioni precoci
- presenza di infestanti a nascita scalare
- presenza di infestanti di difficile controllo quali: Amaranto, Erba morella, Mercorella, Poligonacee in genere.

AVVERTENZE: per ottenere un ottimo risultato nell'impiego del prodotto bisogna attenersi a determinate avvertenze quali:
- non trattare con temperature che superino i 23-25°C ed in ogni caso non trattare nel tardo pomeriggio con temperature elevate
- non trattare in presenza di vento
  bagnare le infestanti in modo completo ed uniforme
- rispettare i quantitativi di acqua sopra citati
- non trattare su piante bagnate o nell'imminenza di una pioggia
- non trattare su barbabietole sofferenti per qualsiasi motivo
- impiegare attrezzature ben lavate, onde evitare la presenza di altri prodotti specie se ormonici
  si sconsiglia l'associazione con Olio Bianco.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: riempire la botte per metà, versare il totale quantitativo di prodotto richiesto e portare successivamente a volume agitando di continuo. La temperatura dell'acqua deve essere possibilmente superiore a 10°C.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
PRECAUZIONI: si consiglia di conservare il prodotto in luogo fresco nel periodo estivo cercando di evitare il gelo durante l'inverno.
FITOTOSSICITÀ: l'associazione con Olio Minerale Bianco può provocare sulle barbabietole da zucchero ustioni od altri fenomeni fitotossici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05/a

SUGARBETA® SE

Erbicida selettivo di post-emergenza per il diserbo della barbabietola da zucchero, da orto e da foraggio e dello spinacio in sospensione concentrata (SC)

SUGARBETA® SE

Composizione:
Fenmedifam puro 15,84 g (= 160 g/l)
Coformulanti quanto basta a 100 g

Frasi di rischio:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione: SBM Formulation, St. Marcel - Marsiglia - Francia;
SIPCAM S.p.A. - 20090 Salerano sul Lambro (LO); - Bayer CropScience GmbH - Wolfenbüttel - (Germania).

Registrazione n. 8688 del 31/01/1995 del Ministero della Sanità

Distribuito da: SCAM S.p.A. – Strada Bellaria, 164 – 41050 S. Maria di Mugnano (MODENA)

Contenuto netto: 0,5 – 1 – 3 – 5 – 10 – 20 L
Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE

SUGARBETA SE è un erbicida selettivo di post-emergenza per il controllo delle malerbe che infestano la barbabietola da zucchero, da orto e da foraggio, spinacio ed agisce per assorbimento fogliare di contatto, con conseguente interferenza nel processo di fotosintesi clorofilliana.
Viene impiegato contro le seguenti infestanti:
Anagallis arvensis, Atriplex patula, Capsella bursa-pastoris, Centaurea cyanus, Chenopodium album, Datura stramonium, Fumaria officinalis, Galinsoga parviflora, Lamium purpureum, Linaria minor, Matricaria spp., *Myosotis arvensis, Papaver* spp., *Plantago major, Polygonum aviculare, Polygonum convolvulus, Polygonum lapathifolium, Polygonum persicaria, Raphanus raphanistrum, Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, Spergula arvensis, Stellaria media, Thlaspi arvense, Urtica urens, Veronica persica, Viola tricolor.*

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

BARBABIETOLA A SEMINA PRIMAVERILE
SUGARBETA SE viene impiegato in post-emergenza della coltura con infestanti in attiva crescita e che non abbiano superato lo stadio di due foglie vere, alla dose di 6-8 litri/ha in 250-400 litri di acqua, su infestanti asciutte e con temperatura non superiore ai 25°C in quanto si possono avere ustioni.
Sono inoltre consigliate le seguenti miscele:
SUGARBETA SE litri 5 per ha + KEMIRON 500 SC (Etofumesate) litri 0,950-1,150 per ha in 250-300 litri di acqua in presenza di *Polygonum persicaria, Solanum nigrum, Amaranthus* spp., *Polygonum aviculare* e infestanti graminacee che non siano ancora accestite.
SUGARBETA SE litri 4 per ha + KEMIRON 500 SC (Etofumesate) litri 3 per ha in 250-300 litri di acqua in presenza di infestazioni dominate da graminacee quali *Alopecurus*, Avene, *Digitaria, Panicum, Setaria* purché non siano in fase di accestimento.
NB: le miscele sopra citate sono da effettuarsi solo con barbabietole che abbiano 2-4 foglie vere e con la temperatura che non superi i 20-22°C.

BARBABIETOLA A SEMINA AUTUNNALE
SUGARBETA SE viene impiegato alla dose di 8 litri/ha in 350-400 litri di acqua sulle seguenti infestanti: *Chenopodium, Papaver, Polygonum convolvulus, Raphanus, Sinapis* e tutte le infestanti sensibili.
Sono inoltre consigliate le seguenti miscele:
SUGARBETA SE a 5-6 litri/ha + KEMIRON 500 SC (Etofumesate) a 1,400 litri/ha in 250-300 litri di acqua in presenza di *Galium, Veronica, Fumaria, Stellaria* e graminacee che non siano ancora accestite; trattare con coltura allo stadio minimo di 2 foglie vere. L'assorbimento del prodotto è favorito da temperature sui 15-20°C, se si tratta in giornate particolarmente calde intervenire nel tardo pomeriggio; la sua azione, agendo per assorbimento fogliare non è influenzata dalla natura del terreno, con ottimi risultati anche in terreni torbosi, sabbiosi ed argillosi; l'azione del prodotto può essere diminuita da una pioggia che intervenga entro le sei ore dal trattamento, ma l'attività del prodotto non dipende dall'umidità del suolo non risultando condizionato dalle scarse precipitazioni primaverili. Evitare di trattare colture di barbabietole che siano danneggiate da insetti o sofferenti.

SPINACIO
SUGARBETA SE viene impiegato alla dose di 6-8 litri/ha in 300-400 litri di acqua, con erbe infestanti che siano poco sviluppate, massimo 2-4 foglie vere; nel caso le infestanti siano maggiormente sviluppate intervenire con SUGARBETA SE a 6 litri/ha + prodotti a base di Lenacil all'80% di p.a. a 0,8 kg/ha in 300-350 litri di acqua trattando con spinacio a 2-4 foglie vere minimo.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLO SPINACIO.

COMPATIBILITA'

Non è compatibile con prodotti a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:
da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05/a

® marchio registrato SCAM

GREENEX®

Etichetta / foglio illustrativo

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA PER TAPPETI ERBOSI
FORMULAZIONE: EMULSIONE OLIO/ACQUA

Greenex®

COMPOSIZIONE
g 100 di Greenex contengono:
g 2,74 di Fenoxaprop-p-etile puro (=28 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g
Contiene: nafta solvente (petrolio) aromatica pesante.

Contiene una miscela di 5-cloro-2metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one; fenoxaprop p-etile: può provocare una reazione allergica.

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione:
Bayer CropScience GmbH – Francoforte s/ Meno – Germania;
SBM Formulation —Marsiglia - Francia;
Isagro S.p.A. – Aprilia (LT).

Officine di confezionamento:
Diachem S.p.A. – Unità produttiva SIFA – Caravaggio (BG);
PRO.PHY.M. S.a.r.l. – ZI Les Attignours – 73300 La Chambre (Francia);
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Registrazione n. 8743 del 23/3/1995 del Ministero della Sanità

Distribuito da: AGRICO S.r.l. – Viale Masini, 22 – 40126 BOLOGNA
Contenuto netto: 0,1 – 0,2 – 1 – 5 l
Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi del principio attivo nell'animale da esperimento: passività, sonnolenza, assenza di equilibrio, posizione prona.
In caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico; togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con acqua e sapone; risciacquare gli occhi contaminati con acqua per 10-15 minuti; non provocare il vomito.
Trattamenti specifici
In caso di ingestione, somministrare prima di tutto 200 ml di olio di paraffina ed eseguire poi la lavanda gastrica con ca. 4 litri di acqua, terminare con carbone e solfato di sodio. Fare attenzione a prevenire l'aspirazione polmonare per la presenza di solventi organici contenuti nel formulato.
Mantenere una adeguata aerazione. Trattamenti sintomatici.
Controindicazioni: derivati dell'adrenalina.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
CARATTERISTICHE
GREENEX puo' essere utilizzato contro le erbe infestanti dei tappeti erbosi costituiti da: *Poa pratensis, Lolium perenne, Festuca rubra, Festuca arundinacea, Poa annua, Zoysia* spp., *Agrostis palustris,* tagliata ad altezza non inferiore ai 5 millimetri e solo dopo la prima stagione di crescita.
Caratteristiche d'azione: il prodotto agisce per assorbimento fogliare.
Erbe infestanti sensibili
Sanguinella sottile (*Digitaria ischaemum*), sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), gramigna indiana (*Eleusine indica*), giavone (*Echinochloa crus-galli*), pabbio (*Setaria* spp.), panico (*Panicum* spp.), sorghetta da seme (*Sorghum halepense*); con trattamenti ripetuti gramigna (*Cynodon dactylon*), sorghetta da rizoma (*Sorghum halepense*).
DOSI E MODALITÁ D'IMPIEGO
Utilizzare GREENEX dopo l'emergenza delle erbe infestanti.
contro *Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis, Eleusine indica, Echinochloa crus-galli, Setaria* spp., *Panicum* spp., *Sorghum halepense* da seme:
- 2,5 - 3,5 l/ha da 3 foglie a 2 culmi di accestimento dell'infestante.
- 5,0 l/ha per tappeti costituiti da *Poa pratensis, Zoysia* spp., oltre i 3 culmi di accestimento delle infestanti.
- 7,0 l/ha per tappeti costituiti da *Lolium perenne, Festuca rubra, F. arundinacea, Poa annua,* oltre i 3 culmi di accestimento delle infestanti.

- 3,0-4,0 l/ha contro *Cynodon dactylon, Sorghum halepense* da rizoma: iniziare i trattamenti subito dopo la ripresa vegetativa delle infestanti, ripetendo il trattamento ogni 4-7 settimane per mantenere l'arresto dell'accrescimento.
- 0,5 l/ha contro *Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis,* su tappeti di *Agrostis palustris,* con infestanti a 1-2 foglie; ripetere i trattamenti allo stesso stadio, con intervalli di almeno 3 settimane.

Nei casi di emergenze scalari delle infestanti ripetere il trattamento dopo almeno 2 settimane, su infestanti in attiva crescita; non superare la quantita' totale di 22 l/ha per stagione vegetativa.
Volume di irrorazione
-Trattamenti a pieno campo: 300-600 l/ha di acqua
- Trattamenti localizzati: 50-100 ml di GREENEX in 10 litri di acqua, da 1-4 foglie a 1-2 culmi di accestimento delle infestanti.
L'accurata bagnatura delle infestanti e' determinante per il buon esito del trattamento.
Non distribuire il prodotto con sistemi di irrigazione.
Avvertenze agronomiche
Trattare prima del taglio quando e' presente la massima superficie fogliare e con infestanti in attiva fase di crescita. Evitare i trattamenti su tappeti erbosi sofferenti. In caso di siccità, irrigare 1-7 giorni prima del trattamento; dopo l'applicazione, attendere almeno 1-3 ore prima di irrigare.
Non tagliare il tappeto erboso per almeno 24 ore dopo il trattamento, per permettere l'azione dell'erbicida. Intervenire su plantule di *Poa pratensis, Festuca rubra, F. arundinacea, Lolium perenne* emerse da un mese o accestite, con intervalli di 2 mesi tra applicazioni successive.
La semina di rinfoltimento (overseeding) di tappeti di *Lolium perenne, Festuca rubra, F. arundinacea* puo' essere effettuata subito dopo il trattamento; per altre specie attendere 3 settimane.
Evitare il trattamento di zolle da trapiantare, un mese prima e un mese dopo la loro rimozione e trapianto.

FITOTOSSICITA'
Evitare il contatto con specie non indicate nei settori di applicazione.
COMPATIBILITA'
Su tappeti costituiti da *Agrostis palustris* non miscelare con altri prodotti fitosanitari o fertilizzanti. GREENEX non è compatibile con prodotti a base di 2,4 D, MCPA.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non puo' essere riutilizzato. Conservare all'asciutto.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

BAYER Bayer CropScience

® Marchio registrato DPD 30.06.05/a

MIKADO™

erbicida selettivo di post-emergenza per il mais
Sospensione concentrata

MIKADO™
COMPOSIZIONE
100 g di Mikado contengono
26,6 g di Sulcotrione puro (300 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

Contiene sulcotrione: puo' provocare una reazione allergica

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento:
Torre S.r.l. – Montalcino - Torrenieri (SI)
I.R.C.A. Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)
Syngenta - Yalding Kent – Inghilterra
Bayer CropScience GmbH,– Francoforte sul Meno (Germania)
Registrazione Ministero della Sanità n° 8835 del 30.04.96
Contenuto netto: litri 1-3-5
Partita n.

Informazioni per il medico:
in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
MIKADO è un erbicida selettivo di post emergenza del mais attivo contro numerose dicotiledoni ed alcune importanti graminacee. MIKADO agisce prevalentemente per via fogliare, con un complementare assorbimento radicale. I sintomi sulle malerbe appaiono dopo 3-4 giorni e si manifestano come imbianchimenti, seguiti dal completo disseccamento delle infestanti.
CAMPI DI IMPIEGO
MAIS
INFESTANTI SENSIBILI
Abutilon theophrasti (Cencio molle), *Bidens tripartita* (Forbicina comune) *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinaccio), *Datura stramonium* (Stramonio), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Helianthus annuus* (Girasole), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus oleraceus* (Crespino), *Veronica spp* (Veronica), *Xanthium spp* (Lappola).
INFESTANTI SENSIBILI NEI PRIMI STADI DI SVILUPPO
Amaranthus spp (Amaranto), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (Giavone), *Panicum spp* (Panico)

MODALITÀ DI IMPIEGO
MIKADO si impiega in post-emergenza con la coltura e le infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:

MAIS:	da 2-3 fino a 7-8 foglie
INFESTANTI DICOTILEDONI:	2-4 foglie
INFESTANTI GRAMINACEE:	2-3 foglie

Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo: non applicare il prodotto su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per freddo, ristagni d'acqua o siccità.
MIKADO si distribuisce impiegando volumi di acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.

DPD 30.06.05

DOSI DI IMPIEGO

1-1,5 l/ha: la dose maggiore è indicata per il controllo di malerbe più sviluppate (dicotiledoni oltre la quarta foglia) o quando vi sia presenza di graminacee (2-4 foglie). Con elevate infestazioni miste o infestanti non sensibili si consiglia di miscelare MIKADO con prodotti specifici:

- presenza di sorghetta da rizoma: graminicidi specifici.
- presenza di dicotiledoni perenni o poco sensibili a MIKADO: dicamba (vari).

AVVERTENZE

• Non impiegare su linee pure utilizzate per la produzione di mais da seme
• Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto.
• Al termine dell'applicazione di MIKADO è necessario lavare accuratamente l'attrezzatura con una soluzione di acqua e detersivo.
• Dopo il trattamento, prima di rientrare in campo, attendere l'asciugatura della vegetazione.
• In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Alcuni giorni dopo il trattamento si possono manifestare sulla coltura alcuni sintomi transitori rappresentati da decolorazioni o imbianchimenti fogliari, che non hanno conseguenze sullo sviluppo e la produzione del mais. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta .

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. - Conservare al riparo dal gelo
Agitare bene prima dell'uso.

BAYER Bayer CropScience

TM Trade Mark

DPD 30.06.05

SOUND®

Erbicida selettivo per frumento, orzo, avena, segale
SOSPENSIONE EMULSIONATA

COMPOSIZIONE

100 g di Sound® contengono :
1,36 g di METOSULAM puro (15 g/l)
49,26 g di 2,4 D etilesilestere puro (541,2 g/l) corrispondente a 2,4 D a.e. g 32,7 (360 g/l)
coformulanti quanto basta a 100
Contiene 2,4 D etilesilestere: può provocare una reazione allergica.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - v.le Certosa 130 - 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento:
Bayer CropScience Ltd., Norwich - Inghilterra
Torre S.r.l., Montalcino - Torrenieri (SI).
Dow AgroSciences BP 20 - Zona Industriale -Drusenheim/France
Registrazione del Ministero della Sanità n. 8889 del 19.06.96
Contenuto netto: 1 - 5 l
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
1,36 g di METOSULAM puro (15 g/l)
49,26 g di 2,4 D etilesilestere puro (541,2 g/l) corrispondente a 2,4 D a.e. g 32,7 (360 g/l)
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
METOSULAM
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
2,4 D
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Volume di irrorazione: le dosi consigliate vanno diluite in 200 - 500 l/ha di acqua.
Frumento duro e tenero, orzo, avena e segale: dose ed epoca di impiego: 0,7 - 1,0 l/ha dall'accestimento fino all'inizio della levata.
Erbe infestanti sensibili: *Matricaria chamomilla* (camomilla comune) *Anthemis arvensis* (camomilla bastarda), *Centaurea cyanus* (fiordaliso), *Artemisia spp.* (assenzio), *Chrisanthemum segetum* (crisantemo), *Sonchus arvensis* (crespino dei campi), *Stellaria media* (centocchio) *Daucus carota* (carota selvatica), *Galium aparine* (attaccamani) *Sinapis arvensis* (senape), *Raphanus raphanistrum* (ravanello selvatico), *Thlaspi arvense* (erba storna), *Capsella bursa - pastoris* (borsa pastore), *Vicia spp.* (veccia), *Arabidopsis thaliana* (arabidopsis), *Papaver spp.* (papavero), *Fumaria officinalis* (fumaria), *Fallopia convolvolus* (poligono convolvolo).
Erbe infestanti mediamente sensibili: *Bifora radians* (coriandolo fetido), *Cirsium arvense* (stoppione), *Polygonum aviculare* (correggiola), *Veronica spp., Viola spp.* (viola), *Lamium spp.* (Lamio).
Nota: utilizzare le dosi più basse per infestazioni prevalenti di Crucifere, *Stellaria media*; aumentare la dose per *Papaver spp., Bifora spp.*. Il controllo agronomico di *Fumaria officinalis*, *Galium aparine*, *Fallopia convolvolus* e *Compositae* può essere ottenuto solo con la dose più alta sopra indicata (1 l/ha).
Compatibilità: SOUND è miscibile con le sospensioni concentrate ed i concentrati emulsionabili utilizzati per la protezione delle colture in etichetta.
Avvertenza: prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. Si raccomanda di seguire la seguente procedura:
1) vuotare completamente l'attrezzatura di distribuzione; riempire un terzo della botte con acqua pulita e sciacquare per 10 minuti, quindi vuotare l'attrezzatura;
2) riempire un terzo della botte con soluzione di acqua ed ipoclorito di sodio (p.e. candeggina per uso domestico) nella misura di 0,5 litri di candeggina/hl di acqua; sciacquare per 10 minuti quindi vuotare l'attrezzatura;
3) per eliminare ogni residuo di ipoclorito di sodio sciacquare con acqua pura;
4) filtri ed ugelli vanno rimossi e lavati separatamente con soluzione di acqua ed ipoclorito di sodio.
Fitotossicità: evitare che il prodotto venga in contatto con la vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi e le colture floreali in genere.
Sospendere i trattamenti 70 giorni prima della raccolta.

Attenzione: il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per gli insetti utili, gli animali domestici e il bestiame.

DPD 30.06.05

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare al riparo dal gelo.

Bayer CropScience

® marchio registrato Dow Agroscience

DPD 30.06.05

ECLIPSE® 100

Erbicida selettivo per riso, frumento, orzo, avena e segale
SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE

100 g di Eclipse® 100 contengono :
9,52 g di metosulam puro (=100 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO:
Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione e confezionamento:
Bayer CropScience Ltd., Norwich - Inghilterra
Torre S.r.l., Montalcino - Torrenieri (SI).
Dow Agro Sciences-BP 20 Zona Industriale-67410 Drusenheim/France

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8890 del 19.06.96

Contenuto netto: 0,250 - 0,500 - 1 - 2 - 3 - 4- 5 litri
Partita n.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
ECLIPSE 100 può essere impiegato nelle colture di riso, frumento duro e tenero, orzo, avena, segale.
Volume di irrorazione: le dosi consigliate vanno diluite in 300 - 500 l/ha di acqua.
Riso: dose ed epoca di impiego : 0,6-0,8 l/ha in post-emergenza allo stadio di 1-4 foglie in risaia asciutta o sommersa (altezza acqua circa 5 cm)
Erbe infestanti sensibili: *Heteranthera limosa*, *Butomus umbellatus* (fiorone), *Alisma lanceolata*, *Alisma plantago* (mestolaccia o cucchiaio), *Scirpus maritimus* (cipollino), *Scirpus mucronatus* (quadrettone), *Marsilea quadrifolia*, *Bidens spp.* (forbicine), *Polygonum hydropiper* (idropepe), *Ammania coccinea*, *Lindernia pyxidaria*; Erbe infestanti mediamente sensibili: *Sparganium erectum* (spadone), *Typha latifolia*.
Frumento duro e tenero, orzo, avena e segale: dose ed epoca di impiego: 0,1 - 0,2 l/ha dall'inizio dell'accestimento fino all'inizio della levata.
Erbe infestanti sensibili: *Matricaria chamomilla* (camomilla comune) *Anthemis arvensis* (camomilla bastarda), *Centaurea cyanaus* (fiordaliso), *Artemisia spp.* (assenzio), *Chrisanthemum segetum* (crisantemo), *Sonchus arvensis*, *Stellaria media* (centocchio), *Daucus carota* (carota selvatica), *Galium aparine* (attaccamani), *Sinapis arvensis* (senape), *Raphanus raphanistrum* (ravanello selvatico), *Thlaspi arvense* (erba storna), *Capsella bursa-pastoris* (borsa pastore), *Vicia spp.* (veccia);
Erbe infestanti *mediamente sensibili:* *Cirsium arvense* (stoppione), *Polygonum aviculare* (correggiola), *Fallopia convolvulus* (poligono convolvolo), *Lamium spp.* (lamio), *Veronica* spp. (veronica)
Compatibilità: ECLIPSE 100 è miscibile con le sospensioni concentrate ed i concentrati emulsionabili utilizzati per la protezione delle colture in etichetta.
Avvertenza: a) In risaia le miscele estemporanee possono essere distribuite sia su terreno asciutto che sommerso. b) In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. c) Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. Si raccomanda di seguire la seguente procedura:
1) vuotare completamente l'attrezzatura di distribuzione; riempire un terzo della botte con acqua pulita e sciacquare per 20 minuti, quindi vuotare l'attrezzatura;
2) riempire un terzo della botte con soluzione di acqua ed ipoclorito di sodio (p.e. candeggina per uso domestico) nella misura di 0,5 litri di candeggina/hl di acqua; sciacquare per 10 minuti quindi vuotare l'attrezzatura;
3) per eliminare ogni residuo di ipoclorito di sodio sciacquare con acqua pura;
4) filtri ed ugelli vanno rimossi e lavati separatamente con soluzione di acqua ed ipoclorito di sodio.
Sospendere i trattamenti 70 giorni prima della raccolta
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare al riparo dal gelo.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® marchio registrato Dow Agrosciences

GAUCHO® 70 WS

INSETTICIDA - AFICIDA SISTEMICO
per la concia industriale delle sementi della barbabietola da zucchero (confettatura)
POLVERE BAGNABILE PER CONCIA

COMPOSIZIONE
100 g di GAUCHO® 70 WS contengono:
70 g di Imidacloprid puro
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Officina di produzione: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Officina di confezionamento: S.C.B - Marle sur Serre (Francia)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 8905 del 25/07/96
Contenuto netto: kg 1-3-5-10-20-25
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi d' impiego :
Barbabietola da zucchero:
65-130 g per unità di seme contro Elateridi (*Agriotes spp.*), Altica (*Chaetocnema tibialis*), Atomaria (*Atomaria linearis*), blaniuli (*Blaniulus spp.*), tipula (*Tipula spp.*), mosca della bietola (*Pegomya hyoscyami*). Utilizzare la dose più alta quando si voglia garantire anche il controllo di afidi (es. *Aphis fabae, Myzus persicae*).
NOCIVITA': il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per le api.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Il prodotto è esclusivamente destinato ad uso industriale.

Avvertenze: da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
- Conservare al riparo dall'umidità.

Bayer CropScience

® marchio registrato

DPD 30.06.05/a

GAUCHO® 350 FS

INSETTICIDA - AFICIDA SISTEMICO
per la concia delle sementi di mais.
CONCENTRATO FLUIDO PER CONCIA

GAUCHO® 350 FS
COMPOSIZIONE
100 g di GAUCHO 350 FS contengono :
30 g di IMIDACLOPRID puro (350 g/l)
coformulanti quanto basta a 100
Contiene benzilemiformale: può provocare una reazione allergica per contatto

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione. Nocivo per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 – 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officina di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG); Torre S.r.l.-Montalcino-Torrenieri (SI)
Officina di produzione: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Officina di confezionamento: S.C.B - Marle sur Serre (Francia)
Registrazione n. 8906 del 25/07/96 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: ml 100-250-500; l 1-3-4-5-10-20-1000
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi d'impiego
Mais: 1-2 litri di Gaucho 350 FS/100 kg di seme, contro elateridi (*Agriotes spp.*), afidi (tra cui *Rhopalosiphum maydis, R. padi*), cicaline (tra cui *Cicadulina spp.*).
Avere l'avvertenza di seminare ad almeno 4-5 cm di profondità.

Nocività: il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per le api.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. - Conservare al riparo dal gelo.

***Attenzione: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Non disperdere nell'ambiente. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effetuato in zone di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**
In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto contenere la perdita usando sabbia o segatura o altro materiale inerte per assorbire il prodotto sversato. Trasferire l'inerte contaminato in un contenitore dotato di chiusura avendo cura di etichettare il contenitore indicando il nome del prodotto e la classificazione di pericolo, e trasportare/far trasportare a Bayer CropScience S.r.l., Via delle Industrie 9, 24040 Filago, telefono per emergenza 035/990111
***Attenzione: confezione ad esclusivo uso industriale**

Bayer CropScience

DPD 30.06.05/a
® marchio registrato

*** indicazioni unicamente per la confezione da 1000 litri**

LEGION®

GRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)
ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERBO IN POST-EMERGENZA DEL FRUMENTO TENERO E DURO, DELL'ORZO, DELLA SEGALE ED AVENA

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
Amidosulfuron puro 75 g
Coformulanti quanto basta a 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Amidosulfuron viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante infestanti trattate: subito dopo l'assorbimento Amidosulfuron blocca la crescita delle malerbe sensibili. Si evidenziano quindi ingiallimenti e necrosi seguiti poi dalla morte delle piante colpite che può avvenire in 3-6 settimane dall'intervento. Condizioni ambientali favorevoli ad una buona crescita dell'infestante e della coltura accelerano il buon esito dell'intervento erbicida.

EPOCA D'IMPIEGO
In post-emergenza del frumento tenero e duro, dell'orzo e di segale ed avena.

DOSI D'IMPIEGO: 20-40 g/ha con 200-400 litri d'acqua.

EFFICACIA ERBICIDA
LEGION è particolarmente attivo nei confronti dell' Attaccamano (*Galium aparine*) allo stadio di sviluppo compreso tra i 3 e i 20 cm di lunghezza delle ramificazioni. Risultano inoltre sensibili a LEGION le seguenti importanti dicotiledoni: Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Senape bianca (*Sinapis alba*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Romice comune (*Rumex obtusifolius*), Ranuncolo dei campi (*Ranunculus arvensis*), Grespino spinoso (*Sonchus asper*), Pettine di venere (*Scandix pecten veneris*), Galinsoga comune (*Galinsoga parviflora*), rinascite di colza e girasole. Mediamente sensibili risultano essere: Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Crisantemi selvatici (*Chrysanthemum spp.*), Miagro (*Myagrum perfoliatum*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Coriandolo (*Bifora radians*), Peverina (*Cerastium arvense*), Centocchio (*Stellaria media*).

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
LEGION alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa a un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.
AVVERTENZE
- nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.

subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
- svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente;
- riempire il serbatoio con acqua pulita, addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca di uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora;
- ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al secondo punto;
- rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita;
- filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca di uso domestico al 6%.

COMPATIBILITA'
LEGION è compatibile con i più comuni erbicidi del frumento e dell'orzo. In caso di miscela versare nella botte prima LEGION e successivamente gli altri formulati.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su varietà di frumento e orzo di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività.
In caso di fallimento della coltura principale, si sconsiglia la semina di barbabietola da zucchero, colza, girasole e spinacio anche se preceduta da aratura profonda. Con semina su sodo o dopo fresatura superficiale, è possibile seminare mais (come secondo raccolto a semina estiva), fagiolini (con semina a 45 giorni dall'intervento con LEGION) e soia (con semina a 45 giorni dall'intervento con LEGION, o come secondo raccolto a semina estiva).
Si sconsiglia la semina di spinacio in rotazione a colture trattate con LEGION. Dopo un trattamento con LEGION si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze:
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Registrazione n° 8932 del 01/10/1996 del Ministero della Sanità

Officine di produzione
- Bayer CropScience GmbH - Francoforte s/Meno - Germania
- Bayer CropScience GmbH - Francoforte s/ Meno – Germania /Officina di confezionamento STI Solfotecnica Italiana S.p.A., Stabilimento di Cotignola (RA); SBM Formulation – St. Marcel – Marsiglia – (Francia)
- SBM Formulation – St. Marcel – Marsiglia – (Francia) /Officina di confezionamento STI Solfotecnica Italiana S.p.A., Stabilimento di Cotignola (RA);

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Contenuto netto: bustine da 20 g; barattoli da 20 - 40 - 80 g; 20 - 40 g in sacchetti idrosolubili da 10 g

Partita N°

® Marchio registrato DPD 30.06.05

Bayer CropScience

LEGION®

SACCHETTI IDROSOLUBILI

GRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)

ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERBO IN POST-EMERGENZA DEL FRUMENTO TENERO E DURO, DELL'ORZO, DELLA SEGALE ED AVENA

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
Amidosulfuron puro 75 g
Coformulanti quanto basta a 100.

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Amidosulfuron viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante infestanti trattate: subito dopo l'assorbimento Amidosulfuron blocca la crescita delle malerbe sensibili. Si evidenziano quindi ingiallimenti e necrosi seguiti poi dalla morte delle piante colpite che può avvenire in 3-6 settimane dall'intervento. Condizioni ambientali favorevoli ad una buona crescita dell'infestante e della coltura accelerano il buon esito dell'intervento erbicida.

EPOCA D'IMPIEGO
In post-emergenza del frumento tenero e duro, dell'orzo e di segale ed avena.

DOSI D'IMPIEGO: 20-40 g/ha con 200-400 litri d'acqua.

EFFICACIA ERBICIDA
LEGION è particolarmente attivo nei confronti dell' Attaccamano (*Galium aparine*) allo stadio di sviluppo compreso tra i 3 e i 20 cm di lunghezza delle ramificazioni. Risultano inoltre sensibili a LEGION le seguenti importanti dicotiledoni: Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Senape bianca (*Sinapis alba*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Romice comune (*Rumex obtusifolius*), Ranuncolo dei campi (*Ranunculus arvensis*), Grespino spinoso (*Sonchus asper*), Pettine di venere (*Scandix pecten veneris*), Galinsoga comune (*Galinsoga parviflora*), rinascite di colza e girasole. Mediamente sensibili risultano essere: Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Crisantemi selvatici (*Chrysanthemum spp.*), Miagro (*Myagrum perfoliatum*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Coriandolo (*Bifora radians*), Peverina (*Cerastium arvense*), Centocchio (*Stellaria media*).

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
LEGION alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa a un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.
AVVERTENZE
nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
  - svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente;
  - riempire il serbatoio con acqua pulita, addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca di uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora;
  - ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al secondo punto;
  - rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita;
  - filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca di uso domestico al 6%.

COMPATIBILITA'
LEGION è compatibile con i più comuni erbicidi del frumento e dell'orzo. In caso di miscela versare nella botte prima LEGION e successivamente gli altri formulati.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su varietà di frumento e orzo di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività.
In caso di fallimento della coltura principale, si sconsiglia la semina di barbabietola da zucchero, colza, girasole e spinacio anche se preceduta da aratura profonda. Con semina su sodo o dopo fresatura superficiale, è possibile seminare mais (come secondo raccolto a semina estiva), fagiolini (con semina a 45 giorni dall'intervento con LEGION) e soia (con semina a 45 giorni dall'intervento con LEGION, o come secondo raccolto a semina estiva).
Si sconsiglia la semina di spinacio in rotazione a colture trattate con LEGION. Dopo un trattamento con LEGION si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:

Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Registrazione n° 8932 del 01/10/1996 del Ministero della Sanità

Officine di produzione

- Bayer CropScience GmbH - Francoforte s/Meno - Germania
  Bayer CropScience GmbH - Francoforte s/ Meno – Germania /Officina di confezionamento STI Solfotecnica Italiana S.p.A., Stabilimento di Cotignola (RA);
- SBM Formulation – St. Marcel – Marsiglia – (Francia)
- SBM Formulation – St. Marcel – Marsiglia – (Francia) /Officina di confezionamento STI Solfotecnica Italiana S.p.A., Stabilimento di Cotignola (RA);

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Contenuto netto: 20 - 40 g in sacchetti idrosolubili da 10 g
Partita N°

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI
PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti solubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

Bayer CropScience

® Marchio registrato DPD 30.06.05

CONFIDOR® 200 SL

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE

Composizione:

g 100 di Confidor® 200 SL contengono :
g 17,1 di principio attivo IMIDACLOPRID puro (200 g/l)
coformulanti q.b. a 100

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (melo, pero): contro afidi (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi*) ed eriosoma (*Eriosoma lanigerum*), cicaline (*Empoasca flavescens*), contro microlepidotteri (*Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardella, Lyonetia clerkella*), Psilla del melo (*Psilla mali*), contro Tentredine (*Hoplocampa testudinea*)(pero): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Nei trattamenti allo stadio di orecchiette di topo miscelare con Oliocin 2,5-3 % (2500-3000 ml in 100 l d'acqua). Il trattamento contro i microlepidotteri deve essere posizionato al momento del massimo sfarfallamento.
Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco): contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus sp.*) con trattamento a rottura gemme-bottoni rosa o in vegetazione: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Nel trattamento a rottura gemme-bottoni rosa miscelare con Oliocin 1,5-2% (1500-2000 ml/100 l d'acqua). Il prodotto e' efficace anche sui microlepidotteri (*Phyllonorycter spp.*). Contro Tentredine (*Hoplocampa brevis*) (susino), *Metcalfa pruinosa e Cicaline* 0,05% (50 ml/100 l d'acqua).
Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone): contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri, ecc.*), minatrice serpentina delle foglie (*Phyllocnistis citrella*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).
Orticole:
- pomodoro, melanzana: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).
- peperone, cocomero, melone: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).
- patata: contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthum solani, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua) ; contro dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).

Tabacco: contro afidi (*Myzus nicotianae, Myzus persicae*) e altica (*Epithrix hirtipennis*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua)
Le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale.
Floreali ed ornamentali: contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae*) e *Metcalfa pruinosa*: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Su floreali ed ornamentali in vaso e' possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.
MODALITA' DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l'anno. **Aggiungere il Confidor 200 SL direttamente nella botte.**
Nocivita': il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api. Non trattare ne' in immediata prefioritura ne' in fioritura (almeno 10 giorni prima) per evitare la mancata impollinazione.
Compatibilita': Confidor 200 SL e' miscibile con Oliocin.

Sospendere i trattamenti 7 giorni per pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, 14 giorni per agrumi, patata e tabacco, 21 giorni per pesco e nettarine, susino, ciliegio, 28 giorni per melo, 35 giorni per albicocco, 50 giorni per pero prima del raccolto.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. - Conservare al riparo dal gelo.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Registrazione Ministero della Sanità n° 8987 del 11/11/1996
Officine di produzione: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania); Bayer CropScience S.r.l. -Filago (BG); Torre S.r.l.-Montalcino--Torrenieri (SI); IRCA Service S.p.A. Fornovo S. Giovanni (BG)
Officine di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. -Filago (BG); Torre S.r.l. – Montalcino-Torrenieri (SI); SCB-Marle sur Serre (Francia); IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.
Contenuto netto: ml 5-10- 50-100-200-250-500; l 1-2-3-5
Partita n.

® Marchio registrato

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

CIRTOXIN DF

Erbicida per il diserbo di frumento, orzo, avena, segale, mais da granella e da foraggio, barbabietola da zucchero e da foraggio, orticole (cavoli, rapa, porro, cipolla, bietola da orto), colza.
Granuli solubili

CIRTOXIN DF
Composizione:
Clopiralid puro g 75
Coformulanti q.b. a g 100.

Frasi di rischio:
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione:
- Kwizda Landwirtschaft - Werk und Zentrallager - 2100 Leobendorf Laaer Bundestrasse (Austria)
- SBM Formulation – Saint Marcel - Marsiglia – (Francia)

Officine di confezionamento:
- STI Solfotecnica Italiana S.p.A - Stabilimento di Cotignola (RA)
  Torre S.r.l. - Torrenieri - Montalcino (SI)
- Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)

Registrazione n. 9052 del 31-12-1996 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: 100 - 150 - 250 - 500 g; 1kg.
100 g (2 monodosi da 50 g); 250 g (5 monodosi da 50 g).
500 g in sacchetti idrosolubili da 100 g; 1 kg in sacchetti idrosolubili da 250 g; 100 g in sacchetti idrosolubili da 50 g

Partita n.:

Norme precauzionali
È obbligatorio l'uso di occhiali e guanti nella preparazione ed impiego della soluzione diserbante.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, ricorrere al medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Erbe infestanti sensibili: *Anthemis arvensis* (camomilla bastarda), *Ammi majus* (visnaga maggiore), *Bifora* spp. (coriandolo fetido), *Cirsium arvense* (stoppione), *Daucus carota* (carota selvatica), *Helianthus* spp. (girasole), *Matricaria chamomilla* (camomilla), *Rumex* spp. (romice), *Sonchus* spp. (crespino), *Trifolium* spp. (trifoglio), *Tussilago farfara* (farfara), *Vicia* spp. (veccia), *Xanthium italicum* (nappola).

Erbe infestanti mediamente sensibili: *Polygonum* spp. (poligoni), *Solanum nigrum* (erba morella).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Barbabietola da zucchero e da foraggio: In presenza di *Cirsium arvense* e altre infestanti: 100-130 g/ha.
Con *Matricaria chamomilla* la dose va aumentata: 160-200 g/ha.
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti. In caso di necessità è possibile intervenire anche su *Cirsium arvense* in avanzato stadio di sviluppo.
Il prodotto è tollerato dalla bietola a qualsiasi stadio di sviluppo.
Frumento e cereali minori: 100-130 g/ha.
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nel periodo che intercorre tra la fase di accestimento e la fase di botticella dei cereali avendo cura di rispettare le modalità di impiego del prodotto associato al CIRTOXIN DF.
Mais (da granella e da foraggio): 100-130 g/ha quando il mais ha raggiunto i 15-30 cm di altezza.
Orticole (cavoli, rapa, porro, cipolla, bietola da orto) e colza: 160-200 g/ha applicando il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti.

Volume di irrorazione: 150-600 litri ettaro.

Compatibilità: è perfettamente compatibile con il p.a. Fenmedifam e con erbicidi fenossiacetici (2,4-D, MCPA, MCPP, 2,4-DP) sotto forma di sali.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non seminare soia su terreno sodo dopo il cereale trattato.

Per mais, sospendere i trattamenti 45 giorni prima della raccolta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze:
da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

CIRTOXIN DF

Erbicida per il diserbo di frumento, orzo, avena, segale, mais da granella e da foraggio, barbabietola da zucchero e da foraggio, orticole (cavoli, rapa, porro, cipolla, bietola da orto), colza.
Granuli solubili in sacchetti idrosolubili

CIRTOXIN DF
Composizione:
Clopiralid puro g 75
Coformulanti q.b. a g 100.

Frasi di rischio:
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione:
- Kwizda Landwirtschaft - Werk und Zentrallager - 2100 Leobendorf Laaer Bundestrasse (Austria)
- SBM Formulation – Saint Marcel - Marsiglia – (Francia)

Officine di confezionamento:
- STI Solfotecnica Italiana S.p.A - Stabilimento di Cotignola (RA)
  Torre S.r.l. - Torrenieri - Montalcino (SI)
- Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)

Registrazione n. 9052 del 31-12-1996 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: 500 g in sacchetti idrosolubili da 100 g;
1 kg in sacchetti idrosolubili da 250 g;
100 g in sacchetti idrosolubili da 50 g.

Partita n.: *

Norme precauzionali
È obbligatorio l'uso di occhiali e guanti nella preparazione ed impiego della soluzione diserbante.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, ricorrere al medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Erbe infestanti sensibili: *Anthemis arvensis* (camomilla bastarda), *Ammi majus* (visnaga maggiore), *Bifora* spp. (coriandolo fetido), *Cirsium arvense* (stoppione), *Daucus carota* (carota selvatica), *Helianthus* spp. (girasole), *Matricaria chamomilla* (camomilla), *Rumex* spp. (romice), *Sonchus* spp. (crespino), *Trifolium* spp. (trifoglio), *Tussilago farfara* (farfara), *Vicia* spp. (veccia), *Xanthium italicum* (nappola).

Erbe infestanti mediamente sensibili: *Polygonum* spp. (poligoni), *Solanum nigrum* (erba morella).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Barbabietola da zucchero e da foraggio: In presenza di *Cirsium arvense* e altre infestanti: 100-130 g/ha.
Con *Matricaria chamomilla* la dose va aumentata: 160-200 g/ha.
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti. In caso di necessità è possibile intervenire anche su *Cirsium arvense* in avanzato stadio di sviluppo.
Il prodotto è tollerato dalla bietola a qualsiasi stadio di sviluppo.
Frumento e cereali minori: 100-130 g/ha.
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nel periodo che intercorre tra la fase di accestimento e la fase di botticella dei cereali avendo cura di rispettare le modalità di impiego del prodotto associato al CIRTOXIN DF.
Mais (da granella e da foraggio): 100-130 g/ha quando il mais ha raggiunto i 15-30 cm di altezza.
Orticole (cavoli, rapa, porro, cipolla, bietola da orto) e colza: 160-200 g/ha applicando il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti.

Volume di irrorazione: 150-600 litri ettaro.

Compatibilità: è perfettamente compatibile con il p.a. Fenmedifam e con erbicidi fenossiacetici (2,4-D, MCPA, MCPP, 2,4-DP) sotto forma di sali.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non seminare soia su terreno sodo dopo il cereale trattato.

Per mais, sospendere i trattamenti 45 giorni prima della raccolta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:
da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI
PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

BAYCOR® 300 EC

Etichetta/foglio illustrativo

FUNGICIDA ORGANICO

per la lotta contro ticchiolatura delle pomacee con azione collaterale contro mal bianco del melo, contro monilia ed oidio delle drupacee (pesco, nettarine, percoche, susino, ciliegio, albicocco), ruggini e mal bianco di alcuni ortaggi (zucchino, cetriolo), ticchiolatura e mal bianco e ruggini delle piante ornamentali e da fiore in pieno campo ed in serra

BAYCOR® 300 EC

COMPOSIZIONE:

g 100 di BAYCOR 300 EC contengono:
g 27,7 di bitertanolo puro (= 300 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:

Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Officine di produzione: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG);
Diachem – U.P. SIFA - Caravaggio (BG);
Torre S.r.l. - Montalcino - Torrenieri (SI)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9068 del 31/12/96

Contenuto netto: ml 50

Partita N.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

Pomacee (melo e pero): contro ticchiolatura (con azione collaterale contro mal bianco del melo): 0,06-0,08% (60-80 ml in 100 l d'acqua) in miscela con fungicidi tradizionali a dose ridotta, e precisamente con Pomarsol Zf alla dose di 190-225 g/hl eseguendo gli interventi ad intervalli di 7-8 giorni a partire dalla fase di apertura delle gemme fino alla fase di frutto-noce e successivamente ad intervalli di 8-12 giorni in dipendenza dall'andamento climatico. Usare la dose superiore in caso di andamento climatico particolarmente favorevole alla malattia.

Drupacee (pesco, nettarine, percoche, susino, ciliegio, albicocco): contro monilia: 0,08-0,1% (80-100 ml in 100 litri di acqua), effettuando 2-3 trattamenti prima, durante e dopo la fioritura, ripetendoli alla comparsa dei primi sintomi della malattia ad intervalli di 6-8 gg. impiegando la dose piu' elevata e gli intervalli piu' brevi nei periodi climatici piu' favorevoli allo sviluppo della malattia.

Contro oidio: 0,04% (40 ml in 100 l di acqua) effettuando trattamenti preventivi con inizio alla fase della scamiciatura dei frutti alla cadenza di 7-10 gg. circa; in caso sia necessario intervenire con infezione in atto, elevare la dose allo 0,06% (60 ml in 100 l di acqua).

Ortaggi (zucchino e cetriolo): contro ruggini e mal bianco:

a) TRATTAMENTI PREVENTIVI: 0,06 % (60 ml in 100 l di acqua);
b) TRATTAMENTI CURATIVI: 0,06-0,08% (60-80 ml in 100 l di acqua) effettuando 2-3 trattamenti ad intervalli di 7-8 gg., effettuando il primo all'inizio dell'attacco.

Piante ornamentali e da fiore in pieno campo ed in serra: contro oidio (mal bianco), e ruggine della rosa e delle altre piante ornamentali e da fiore: 0,06-0,08% (60-80 ml in 100 l di acqua). Per trattamenti curativi: 0,08-0,12 % (80-120 ml in 100 l di acqua).

N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale. Diluire il prodotto in una quantita' d'acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione.

COMPATIBILITA': il Baycor 300 EC puo' essere miscelato con fungicidi ed insetticidi a reazione neutra.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per ortaggi (zucchino e cetriolo), 21 giorni prima del raccolto per pomacee e drupacee (pesco, nettarine, percoche, susino, ciliegio, albicocco).

DPD 30.06.05

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Conservare al riparo dal gelo.

® Marchio registrato

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

LYOS®

Fungicida ad ampio spettro d'azione, formulato in sospensione concentrata (SC)

LYOS®
Composizione:
Propamocarb idrocloruro puro 31% (375 g/l)
Clorotalonil puro 31% (375 g/l)

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione. Irritante per le vie respiratorie. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti.
Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Officine di produzione:
- Bayer CropScience GmbH - Wolfenbüttel - Germania
- SBM Formulation – St. Marcel - Marsiglia - Francia
- Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)

Officina di confezionamento:
- Bayer CropScience S.r.l. – Filago

Registrazione n. 9091 del 20/01/1997 del Ministero della Sanità

CONTENUTO NETTO: 1 – 5 L

Partita N.

NORME PRECAUZIONALI
Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.
Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi.
Non utilizzare il prodotto in prossimità dei corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Clorotalonil 31% e Propamocarb idrocloruro 31%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Clorotalonil: irritante per la cute e per le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.
Propamocarb: sostanza di bassa tossicità, non presenta sintomi specifici. Terapia sintomatica.
Consultare un Centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
Lyos associa le proprietà del Propamocarb idrocloruro, fungicida sistemico attivo verso i Ficomiceti, e del Clorotalonil, fungicida di contatto ad ampio spettro. E' attivo contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Cladosporiosi e Antracnosi di pomodoro, melone, cetriolo e cocomero. Il prodotto esplica inoltre un'importante azione di contenimento nei confronti della Muffa Grigia (*Botrytis cinerea*).
Lyos può essere impiegato in un programma di difesa antiperonosporica che preveda trattamenti ad intervalli di 10-15 giorni, in funzione della pressione della malattia, eseguendo il seguente numero massimo di interventi per stagione:
- **pomodoro**: 3 in pieno campo, 5 in serra;
- **melone, cocomero, cetriolo**: 3 sia in pieno campo che in serra.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Pomodoro, melone, cetriolo, cocomero: 250-300 ml/100 litri d'acqua (2,5-3 litri/ha).
Il prodotto va diluito in una quantità d'acqua sufficiente a bagnare uniformemente tutta la vegetazione, evitando lo sgocciolamento. Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale. Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume d'acqua, in modo da mantenere la stessa dose di prodotto per ettaro (2,5 - 3 litri/ha per colture in piena vegetazione).

COMPATIBILITÀ
LYOS è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Rispettare i seguenti tempi di rientro nell'appezzamento trattato: 12 ore in pieno campo e 24 ore in serra.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® Marchio registrato

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

MERLIN®

Erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce del mais

Granuli idrodisperdibili

MERLIN®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Isoxaflutole puro 75 g
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02-3972.1

Officine di Produzione:
Bayer CropScience France - Villefranche – Francia
Schirm AG, Division Sideco – Lübeck - Germania

Registrazione N. 9278 Ministero della Sanità del 04.07.97

Contenuto netto: 100-200-250-500 g / 1 Kg

Partita n.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE

MERLIN è un erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce attivo su infestanti in fase di germinazione o da poco emerse (fase di plantula), per assorbimento radicale e fogliare.
Agisce sulla biosintesi dei carotenoidi.
Prevalentemente attivo su infestanti dicotiledoni, esplica una buona efficacia collaterale anche su infestanti graminacee annuali. La sua persistenza di azione (40-50 giorni) copre il periodo di sensibilità della coltura alla competizione della flora infestante.

Piante infestanti dicotiledoni sensibili

In pre-emergenza:
Abutilon theophrasti (Cencio molle)*, *Amaranthus* spp. (Amaranto)*, *Anagallis arvensis* (Centonchio), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinaccio)*, *Datura* stramonium (Stramonio), *Euphorbia* spp.(Euforbia), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galeopsis tetrahit* (Canapetta), *Matricharia chamomilla* (Camomilla), *Polygonum persicaria* (Persicaria)*, *Portulaca oleracea* (Porcellana)*, *Sinapis arvensis* (Senape selvatica)*, *Solanum nigrum* (Erba morella)*.

(*) Piante infestanti controllabili con la dose inferiore prevista di 70 g/ha di prodotto formulato.

In post-emergenza precoce:
Oltre alle infestanti sopraindicate, l'intervento in post-emergenza precoce assicura il controllo di:
Ambrosia elatior (Ambrosia), *Ammi majus* (Visnaga), *Bidens tripartita* (Forbicina), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Rorippa amphibia* (Nasturzio), *Stachys annua* (Erba strega), *Stellaria media* (Centocchio).

Piante infestanti graminacee contenute nello sviluppo (**)

Echinochloa crus-galli (Giavone comune), *Panichum dichotomiflorum* (Giavone americano), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
(**) la sensibilità delle graminacee decresce nelle applicazioni di post-emergenza, fino alla resistenza oltre lo stadio di 3 foglie.

EPOCHE DI IMPIEGO

Pre-emergenza: subito dopo la semina della coltura
Post-emergenza precoce: su mais entro lo stadio di 3 foglie.

DOSI DI IMPIEGO

Pre-emergenza: 70-130 g/ha in previsione della nascita di piante infestanti più o meno sensibili o già emerse, riservando la dose più bassa alle applicazioni su terreni limosi e sabbiosi e la più alta su terreni argillosi e ad elevato contenuto di sostanza organica.
Post-emergenza precoce: 70 g di formulato per ettaro.

Volume di irrorazione: 200-400 litri per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Disciogliere la dose prevista di **MERLIN** nel serbatoio dell'irroratrice riempito a circa un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento.
Portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali soste. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

- Non applicare il prodotto su colture non ancora emerse in seguito a ristagni idrici.
- Piogge di forte intensità ed abbassamenti termici in fase di emergenza della coltura possono provocare temporanee sensibilizzazioni (imbianchimenti) della stessa; fenomeni analoghi possono manifestarsi anche nelle aree di eventuale sovrapposizione.
- Impiegato in pre-emergenza nei terreni torbosi il prodotto non è efficace.
- Nell'utilizzo del prodotto in post-emergenza precoce intervenire entro lo stadio di 3 foglie della coltura, evitando di superare detta fase.
- Nell'applicazione di post-emergenza non trattare la coltura con foglie bagnate né associare il prodotto a formulati in emulsione concentrata, a prodotti con bagnanti o con olio bianco.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si raccomanda pertanto di lavare accuratamente le attrezzature (botti, filtri, pompe e ugelli) prima di utilizzarle su altre colture.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:

Attenzione: evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso esposte.
E' raccomandato l'uso di attrezzature a bassa deriva per limitare gli effetti negativi sulle piante non bersaglio.
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

07.09.05

® Marchio registrato

MERLIN® COMBI

Erbicida selettivo di pre-emergenza del mais

Sospensione concentrata

MERLIN® COMBI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Isoxaflutole puro 6,2 g (75 g/l)
Aclonifen puro 41,3 g (500 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di rischio:
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano — Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione
AgriFormula S.r.l. - Paganica (AQ)
Bayer CropScience France - Villefranche - Francia

Registrazione N. 9279 Ministero della Sanità del 04.07.97

Contenuto netto: 1 - 5 - 10 - 20 litri

Partita N.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un centro antiveleni.**

CARATTERISTICHE TECNICHE
Associazione erbicida di pre-emergenza attiva su infestanti in fase di germinazione per assorbimento radicale e attraverso l'ipocotile e per contatto; efficace anche su infestanti da poco emerse (fase di plantula) per contatto, assorbimento fogliare e radicale.
Entrambe le componenti dell'associazione agiscono sulla biosintesi dei carotenoidi.
Prevalentemente attivo su infestanti dicotiledoni, il prodotto esplica una buona efficacia collaterale su infestanti graminacee annuali.
La sua persistenza di azione (40-50 giorni) copre il periodo di sensibilità della coltura alla competizione della flora infestante sottoindicata.

Infestanti dicotiledoni sensibili
Abutilon theophrasti (Cencio molle), *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Centonchio), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinaccio), *Datura stramonium* (Stramonio), *Euphorbia helioscopia* (Euforbia), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio).

Infestanti graminacee contenute nello sviluppo
Echinochloa crus-galli (Giavone comune), *Panichum dichotomiflorum* (Giavone americano), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Sorghum halepense* da seme (Sorghetta da seme).

Infestanti medio sensibili
Bidens tripartita (Forbicina), *Humulus luppulus* (luppolo).

Infestanti resistenti
Fallopia convolvulus (Convolvolo nero), *Xanthium italicum* (Nappola), *Phytolacca americana* (Fitolacca), *Veronica persicaria* (Veronica comune).

EPOCA DI IMPIEGO
Pre-emergenza.

DOSI DI IMPIEGO
0,7 - 1 l/ha in previsione della nascita di piante infestanti più o meno sensibili o già emerse, riservando la dose più bassa alle applicazioni su terreni limosi e sabbiosi e la più alta su terreni argillosi e ad elevato contenuto di sostanza organica.

VOLUME DI IRRORAZIONE
200-400 l/ha.

Preparazione della poltiglia
Versare la dose di prodotto necessaria nel serbatoio riempito a metà mantenendo l'agitatore in funzione fino a completo riempimento.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

- Non applicare il prodotto su colture in fase di emergenza del terreno o non ancora emerse in seguito a ristagni idrici.
- Piogge battenti di forte intensità e ristagni di acqua possono ridurre la selettività nei confronti delle colture in fase di emergenza.
- Evitare sovrapposizioni di trattamento particolarmente nei terreni sciolti.
- Su linee pure, ibridi di nuova introduzione, mais dolce e da "pop-corn" si consigliano saggi di selettività.
- In pre-emergenza delle infestanti, nei terreni torbosi il prodotto ha efficacia ridotta.
- In giornate ventose non impiegare il prodotto in prossimità di colture sensibili.
- In caso di forzata sostituzione della coltura diserbata, previa lavorazione superficiale, è possibile la risemina di mais o loietto da foraggio.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si raccomanda pertanto di lavare accuratamente le attrezzature (botti, filtri, pompe e ugelli) prima di utilizzarle su altre colture.

AVVERTENZE

Attenzione: il prodotto contiene sostanza attiva molto tossica per gli artropodi utili. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità di impiego indicate evitando usi impropri.

Durante l'applicazione usare dispositivi di protezione individuale (guanti e tuta) atti ad evitare il contatto con la pelle.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® Marchio registrato

BETANAL EXPERT®

Diserbante di post-emergenza per la barbabietola da zucchero
Formulazione: concentrato emulsionabile in olio

BETANAL EXPERT®

Composizione:
Fenmedifam puro 6,94% (75 g/l)
Desmedifam puro 2,31% (25 g/l),
Etofumesate puro 13,98% (151 g/l)
coformulanti q.b. a 100.
Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non gettare i residui nelle fognature - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Registrazione n. 9339 del 15/09/1997 del Ministero della Sanità
Officine di produzione:
-Bayer CropScience GmbH - Wolfenbüttel - Germania
-Bayer CropScience GmbH - Francoforte s/Meno - Germania
-SBM Formulation - Saint Marcel - 13367 Marsiglia - Francia
-Bayer CropScience Ltd., Hauxton (Cambridge) - Inghilterra
Officina di confezionamento: Isagro S.p.A. - Aprilia (LT).
CONTENUTO NETTO : 1 – 3 - 5 L
Partita n.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Informazioni per il medico
In caso d'intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
BETANAL EXPERT è un formulato che, grazie alla complementarietà delle sostanze attive contenute, risulta particolarmente adatto per gli interventi frazionati o ripetuti a basse dosi nel post-emergenza della barbabietola da zucchero. Le infestanti vengono controllate prevalentemente per contatto con l'apparato fogliare; la componente Etofumesate inoltre esplica anche un'azione residuale.
Il prodotto si è dimostrato attivo verso un'ampia gamma di infestanti a foglia larga, comprese quelle di più difficile controllo come ad esempio: Polygonum spp. (Poligonacee), Amaranthus spp. (Amaranto), Solanum n. (Erba morella), Mercurialis a. (Mercurella), Euphorbia h. (Erba calenzola), Stellaria m. (Centocchio), Stachys a. (Erba strega), Picris h. (Asparaggine), Galium a. (Attaccamani) ed altre importanti dicotiledoni. Il prodotto è inoltre attivo nei confronti delle graminacee ai primissimi stadi di sviluppo (1-3 foglie).
Modalità e dosi d'impiego
I migliori risultati si ottengono intervenendo su infestanti molto piccole (cotiledoni - 2 foglie) e in modo particolare ricorrendo agli interventi frazionati o ripetuti con dosi ridotte.
Interventi ripetuti a bassi dosaggi
Intervenire con BETANAL EXPERT alla dose di 0,7 litri per ettaro in 100 -150 litri di soluzione alla prima comparsa delle infestanti, indipendentemente dallo stadio di sviluppo della bietola.
Il trattamento va ripetuto a 0,7 litri per ettaro di formulato per altre 1-2 volte, orientativamente a cadenza di 7-10 giorni e comunque seguendo l'emergenza delle infestanti.
Intervento frazionato
Eseguire due interventi, iniziando il programma allo stadio di massimo sviluppo delle foglie cotiledonari/prime foglie vere della bietola.
Intervenire nella prima frazione con BETANAL EXPERT alla dose di 1-1,2 litri per ettaro in 150-200 litri d'acqua.
La seconda frazione va effettuata dopo 10 giorni circa con BETANAL EXPERT alla dose di 1,2-1,5 litri per ettaro in 200 litri d'acqua.
Intervento unico
Utilizzare BETANAL EXPERT alla dose di 2-2,5 litri per ettaro in 250-300 litri d'acqua su bietole che abbiano già differenziato le 4 foglie vere.
Indipendentemente dalla tecnica utilizzata è buona norma attenersi alle seguenti avvertenze generali:
- evitare di intervenire con temperature superiori a 22-23°C; con temperature più elevate è preferibile trattare nel tardo pomeriggio.
- effettuare il trattamento in assenza di vento, avendo cura di bagnare in modo uniforme le infestanti utilizzando volumi d'acqua necessari per le diverse tecniche d'impiego.
- non eseguire il trattamento su infestanti bagnate dalla rugiada, nell'imminenza di una pioggia o su bietole sofferenti, danneggiate da insetti, patogeni o altre cause.

Assicurarsi che le attrezzature per il diserbo non contengano residui di altri erbicidi, per precauzione prima dell'uso lavare sempre con cura e più volte le pompe con acqua e soda o con carbone attivo.
COMPATIBILITÀ
BETANAL EXPERT è miscibile con gli altri erbicidi di post-emergenza, idonei ad ampliarne lo spettro d'azione, quali quelli a base di cloridazon, metamitron, lenacil, clopiralid, propizamide, triflusulfuron-metil e graminicidi a base di haloxyfop-etossietile, cletodim, cicloxidim, fenoxaprop-p-etile, fluazifop-p-butile, propaquizofop, quizalofop-etile, setossidim e metolaclor. Si sconsiglia l'impiego di BETANAL EXPERT in associazione ad insetticidi liquidi o in polvere bagnabile a base di Azinfos.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ'
Il prodotto può essere fitotossico sulle colture non indicate in etichetta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® Marchio registrato

Etichetta / Foglio illustrativo

KEY ®

Fungicida per campi da golf, tappeti erbosi ornamentali, campi sportivi
Formulato in emulsione di olio in acqua

KEY ®
COMPOSIZIONE
g 100 di KEY contengono:
g 39,8 di procloraz puro (= 450 g/l)
Coformulanti q. b. a 100

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione:
Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1

Registrazione Ministero della Sanità n. 9669 del 06.07.1998

Officine di produzione: Bayer CropScience Ltd. - Hauxton, Cambridge (Regno Unito)
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania);
SBM Formulation – St. Marcel – Marsiglia – (Francia)
Bayer CropScience GmbH, Wolfenbüttel (Germania);
Isagro S.p.A. - Aprilia (LT).
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Officina di confezionamento: Bayer SCB – Marle sur Serre (Francia)

Distribuito da: AGRICO S.r.l. – Viale Masini, 22 – 40126 BOLOGNA

Contenuto netto: ml 5-10-50-100-200-250-500; l 1-2-3-5-10

Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea); deprime il SNC e la respirazione: possibili effetti epatici. Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Key è un formulato a base di Prochloraz, fungicida imidazolico ad ampio spettro d'azione, indicato per il controllo di *Michrodochium (Fusarium) nivale* (marciume invernale), *Drechslera spp.* (Elmintosporiosi), *Colletotrichum graminicola* (Antracnosi) e *Sclerotinia homeocarpa* (Dollar spot) nei tappeti erbosi.
Il prodotto agisce per via preventiva e curativa; è dotato di una certa attività translaminare.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Campi da golf, tappeti erbosi ornamentali, campi sportivi: 50-100 ml/100 m^2, utilizzando elevati volumi di irrorazione nei trattamenti curativi e particolarmente in presenza di *Michrodochium nivale.* I trattamenti vanno iniziati al verificarsi delle condizioni favorenti lo sviluppo dei patogeni, ripetendo l'intervento 2-3 volte a distanza di 10-14 giorni.

COMPATIBILITÀ: Key è miscibile con fungicidi ed insetticidi.

Avvertenza: in caso di miscela con altri fomulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non rientrare nelle aree trattate prima di 24 ore dal trattamento
Segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del prodotto fitosanitario.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente sui tappeti erbosi, campi da golf e sportivi: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare all'asciutto

® marchio registrato

DPD 30.06.05/a

Bayer CropScience

RAXIL® LIQUIDO

FUNGICIDA ORGANICO PER LA CONCIA DELLE SEMENTI DI GRANO E ORZO
FORMULAZIONE: CONCENTRATO FLUIDO PER CONCIA

RAXIL® LIQUIDO

COMPOSIZIONE
100 g di Raxil Liquido contengono:
2,36 g di tebuconazolo puro (=25 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa, 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania); S.C.B. Marle sur Serre (Francia); Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 9684 del 07.07.98
Contenuto netto: l 1-5-10-20-25-1000
Partita N.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO, CAMPI E DOSI DI IMPIEGO
Grano: 120 ml per 100 kg di semente contro
- carie (*Tilletia caries, Tilletia foetida*)
- carbone (*Ustilago tritici*)
- septoria (*Leptosphaeria nodorum*)
con azione collaterale contro fusario (*Fusarium spp.)*
Orzo: 120 ml per 100 kg di semente contro
- carbone fisso e volante (*Ustilago hordei, Ustilago nuda*)
con azione collaterale contro
- elmintosporiosi (*Helminthosporium gramineum, Pyrenophora teres*), fusario (*Fusarium spp.*)

MODO DI IMPIEGO
La formulazione del Raxil Liquido è particolarmente adatta per la concia umida delle sementi. A seconda delle attrezzature utilizzate, il prodotto può essere impiegato tale e quale oppure diluito in acqua.

Avvertenza: i semi trattati con Raxil Liquido non possono essere destinati alla alimentazione umana ed animale. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti nocivi.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in

DPD 30.06.05/a

prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Conservare al riparo dal gelo

Attenzione: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Non disperdere nell'ambiente.
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore deve essere effettuato in zone dotate di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto contenere la perdita usando sabbia o segatura o altro materiale inerte per assorbire il prodotto sversato. Trasferire l'inerte contaminato in un contenitore dotato di chiusura avendo cura di etichettare il contenitore indicando il nome del prodotto e la classificazione di pericolo, e trasportare/far trasportare a Bayer CropScience S.r.l., Via delle Industrie 9, 24040 Filago, telefono per emergenza 035/990111.
**** Attenzione confezione ad esclusivo uso industriale***

Bayer CropScience

* indicazioni unicamente per la confezione da 1000 litri

® Marchio registrato

DPD 30.06.05/a

LISTEN S

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA PER FRUMENTO
EMULSIONE OLIO/ACQUA (EW)

LISTEN S

Composizione:
Diclofop-metile puro 22,7 g (=250 g/l)
Fenoxaprop-P-etile puro 1,8 g (= 20 g/l)
Mefenpir-dietile puro 3,6 g (= 40 g/l)
Coformulanti quanto basta a 100 g

Contiene una miscela di 5-cloro-2metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one, fenoxaprop-p-etile, diclofop metile: può provocare una reazione allergica.

NOCIVO

Frasi di Rischio
Irritante per la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02-3972.1

Officine di produzione:
- Bayer CropScience GmbH – Francoforte s/Meno - Germania
- SBM Formulation – St. Marcel – Marsiglia – (Francia)
- Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)

Registrazione n° 9711 del 29.07.1998 del Ministero della Sanità

Contenuto netto:1 – 2,5 – 5 Litri
Partita N°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Diclofop-metile puro 22,7%, Fenoxaprop-P-etile puro 1,8% e Mefenpir-dietile puro 3,6%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Diclofop-metile: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Fenoxaprop-P-etile (nell'animale da esperimento): passività, sonnolenza, assenza di equilibrio, posizione prona.

Mefenpir-dietile (nell'animale da esperimento): sintomi aspecifici. Alterazioni dei globuli rossi e della funzione epatica.

In caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico; togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con abbondante acqua e sapone; risciacquare immediatamente gli occhi con acqua abbondante per 15 minuti; non provocare il vomito.

Controindicazioni: derivati dell'adrenalina. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE
LISTEN S è un erbicida graminicida per il diserbo del frumento in post-emergenza.

ERBE INFESTANTI SENSIBILI
Alopecurus myosuroides (coda di volpe), Avena spp. (avena), Phalaris spp. (scagliola), Lolium spp. (loglio), Poa trivialis (fienarola comune), Apera spica-venti (capellini dei campi).

MODALITA' D'AZIONE
LISTEN S viene assorbito per via fogliare e traslocato fino ai tessuti del meristema apicale. I primi sintomi d'azione si manifestano con macchie clorotiche su foglie e germogli che poi evolvono in necrosi: dopo circa 2-4 settimane (in funzione delle condizioni climatiche) si ha la morte dell'infestante. Condizioni sfavorevoli di crescita, stress da siccità delle piante infestanti possono influenzare negativamente l'efficacia di LISTEN S.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
LISTEN S si impiega alla dose di 2 - 2,5 l/ha, utilizzando 200 - 400 l/ha di acqua. La dose inferiore e' indicata per gli stadi precoci delle infestanti.

Il trattamento deve essere eseguito in post-emergenza dalla terza foglia alla levata del frumento. Le infestanti graminacee sono sensibili negli stadi compresi tra la seconda foglia e fine accestimento.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
COMPATIBILITA'
La miscela con ormonici sotto forma di sale, nonché con Dicamba, Bifenox e Bentazone può causare riduzione di efficacia.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: agitare prima dell'uso.
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

MATADOR®

FUNGICIDA SISTEMICO PER LA VITE
EMULSIONE CONCENTRATA

MATADOR®
COMPOSIZIONE
100 g di MATADOR contengono
21,8 g di Tebuconazolo puro (= 225 g/l)
7,3 g di Triadimenol puro (=75 g/l)
coformulanti quanto basta a 100
FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande. Non mangiare nè bere nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

Titolare dell'autorizzazione: Bayer Cropscience S.r.l. - V.le Certosa, 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: Bayer Cropscience AG - Dormagen (Germania); Bayer Cropscience S.r.l. Filago (BG)
Officina di confezionamento: S.C.B. - Marle sur Serre (Francia)
Registrazione n° 9712 del 29.07.1998 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: 50-100-500 ml; 1-5-10 l
Partita n°:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
TEBUCONAZOLO 21,8%, TRIADIMENOL 7,3%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
TEBUCONAZOLO/TRIADIMENOL
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrolizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro antiveleni.
ISTRUZIONI PER L'USO
Vite: contro oidio (***Uncinula necator***) intervenire alla dose di 0,030-0,035% (30-35 ml in 100 l di acqua) ogni 14 giorni.
Tale dose si riferisce all'impiego con pompe a volume normale e volumi d'acqua di 1000-1200 l/ha. Utilizzando attrezzature a basso od ultrabasso volume è necessario aumentare la concentrazione in modo da garantire la stessa quantità di prodotto per ettaro.
Si consiglia comunque, come per tutti i triazoli, di non superare 4 trattamenti per stagione e di alternare a Matador altri principi attivi a diverso meccanismo d'azione per evitare la selezione di ceppi resistenti.

Compatibilità: Matador può essere miscelato con fungicidi ed insetticidi a reazione neutra

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto

Evitare che donne in età fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte.
Per lavorazioni agricole entro 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare al riparo dal gelo.

Bayer CropScience

® marchio registrato

DPD 30.06.05/a

HORIZON ®

EMULSIONE OLIO/ACQUA
FUNGICIDA SISTEMICO PER VITE E CEREALI (FRUMENTO, ORZO, SEGALE ED AVENA), TAPPETI ERBOSI

HORIZON ®

COMPOSIZIONE
g 100 di HORIZON contengono
g 25,8 di Tebuconazolo puro (= 250 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
S.C.B. Marle s. Serre (Francia)
Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
Registrazione n. 9713 del 29.07.1998 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: ml 250-500; l 1-5-10
Partita n°:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi di seguito riportate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale e per volumi medi di irrorazione (1000 l/ha). Nel caso si utilizzassero macchine a basso od ultrabasso volume si deve aumentare di conseguenza la dose in modo che il dosaggio per ettaro rimanga lo stesso.
Vite:
- contro oidio (***Uncinula necator***)
intervenire alla dose di 0,04% (40 ml in 100 l di acqua) ogni 10-14 gg in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (es.: dinocap, zolfo bagnabile, zolfo in polvere)
Cereali (frumento, orzo, segale ed avena):
intervenire alla dose di 1 l/ha posizionando i trattamenti come di seguito:
- contro oidio (***Erysiphe graminis***), ruggini (***Puccinia spp.***), ***Septoria spp***., ***Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis*** uno-due trattamenti dalla fase di accestimento a quella di spigatura intervenendo ai primi sintomi della malattia
- contro fusariosi della spiga (***Fusarium spp.***) un trattamento in fase di piena fioritura
Il prodotto ha inoltre buona azione collaterale contro le "malattie del piede" (***Fusarium spp.***, ***Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis***)
Tappeti erbosi:
- contro ***Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa*** e ***Rhizoctonia solani*** alle dosi di 1,5-2 l/ha (in 600-800 litri d'aqua) intervenendo alla comparsa dei primi sintomi e successivamente 10-20 giorni dopo in funzione dell'andamento epidemico.
In caso di impiego su tappeti erbosi è obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.

Compatibilità: Horizon è miscibile, in generale, con i piretroidi, ad eccezione delle emulsioni concentrate. Inoltre può essere usato con solfato di magnesio e solfato di manganese. Soluzioni di nitrato d'ammonio o di urea possono essere impiegate fino alla concentrazione massima di 15 kg/ha. N.B. Queste miscele non devono essere irrorate nelle ore più calde della giornata. A causa della notevole variabilità della qualità dei concimi azotati, si consiglia di non impiegare ulteriori prodotti fitosanitari.
Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per vite. Per cereali sospendere i trattamenti a fine fioritura.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Evitare che donne in età fertile adoperino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare al riparo dal gelo.

BAYER Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® Marchio registrato

FOLICUR® COMBI

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FUNGICIDA PER LA VITE
POLVERE BAGNABILE

FOLICUR® COMBI
COMPOSIZIONE
100 g di Folicur Combi contengono:
4,5 g di tebuconazolo puro
70 g di zolfo puro
coformulanti quanto basta a 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA); Zolfindustria S.r.l. S. Cipriano Po (PV)
Registrazione Ministero della Sanità n. 9743 del 9.9.98
Contenuto netto: 100-200-250-500 g; 1-5-10-12-20-25 kg
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
TEBUCONAZOLO 4,5%, ZOLFO 70%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
TEBUCONAZOLO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica.
ZOLFO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Vite: contro oidio (***Oidium tuckeri***) intervenire alla dose di 0,22% (220 g in 100 l di acqua) ogni 10-14 gg, a seconda dei diversi fattori che possono influenzare l'andamento della malattia (sensibilità varietale, zona più o meno soggetta agli attacchi di oidio, andamento climatico). Tale dose si riferisce all'impiego con pompe a volume normale e volumi di acqua di 1000-1200 l /ha. Utilizzando attrezzature a basso od ultrabasso volume è necessario aumentare la concentrazione in modo da garantire la stessa quantità di prodotto per ettaro.
Come per tutti i triazoli , esiste anche per il tebuconazolo il rischio di sviluppare ceppi resistenti. Tale rischio viene diminuito , con il Folicur Combi, che contiene anche zolfo, sostanza attiva a diverso meccanismo d'azione . Si ritiene comunque sempre opportuno alternare il prodotto, nel calendario antioidico, con altri prodotti a diverso meccanismo d'azione, in modo da diminuire la pressione di selezione.

Compatibilità: Folicur Combi può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DPD 30.06.05/a

Attenzione – Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
Avvertenze: da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
- Conservare al riparo dall'umidità.

® Marchio registrato

Bayer CropScience

DPD 30.06.05/a

FOLICUR® COMBI

FUNGICIDA PER LA VITE
POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

FOLICUR® COMBI
COMPOSIZIONE
100 g di Folicur Combi contengono:
4,5 g di tebuconazolo puro
70 g di zolfo puro
coformulanti quanto basta a 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG);
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA); Zolfindustria S.r.l. S. Cipriano Po (PV)
Registrazione Ministero della Sanità n. 9743 del 9.9.98
Contenuto netto: g 100-200-250-500; kg 1; kg 1 (5 x g 200; 4 x g 250; 2 x g 500); kg 5 (5 x kg 1) - kg 10 (10 x kg 1) – kg 12 (12 x kg 1)
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
TEBUCONAZOLO 4,5 %, ZOLFO 70 %, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
TEBUCONAZOLO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica.
ZOLFO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Vite: contro oidio (***Oidium tuckeri***) intervenire alla dose di 0,22 % (220 g in 100 l di acqua, pari a 1 sacchetto da kg 1 in 450 litri di acqua)* ogni 10-14 gg, a seconda dei diversi fattori che possono influenzare l'andamento della malattia (sensibilità varietale, zona più o meno soggetta agli attacchi di oidio, andamento climatico). Tale dose si riferisce all'impiego con pompe a volume normale e volumi di acqua di 1000-1200 l /ha. Utilizzando attrezzature a basso od ultrabasso volume è necessario aumentare la concentrazione in modo da garantire la stessa quantità di prodotto per ettaro.
Come per tutti i triazoli , esiste anche per il tebuconazolo il rischio di sviluppare ceppi resistenti. Tale rischio viene diminuito , con il Folicur Combi, che contiene anche zolfo, sostanza attiva a diverso meccanismo d'azione . Si ritiene comunque sempre opportuno alternare il prodotto, nel calendario antioidico, con altri prodotti a diverso meccanismo d'azione, in modo da diminuire la pressione di selezione .

Compatibilità: Folicur Combi può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DPD 30.06.05/a

ATTENZIONE - Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento.
Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Avvertenze: da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
- Conservare al riparo dall'umidità.

* oppure:
- pari a 1 sacchetto da g 500 in 225 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 250 in 112 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 200 in 90 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 100 in 45 litri di acqua

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO

Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

® Marchio registrato

Bayer CropScience

DPD 30.06.05/a

BLEDOR®

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA PER FRUMENTO
EMULSIONE OLIO/ACQUA (EW)

BLEDOR®

Composizione:
Diclofop-metile puro 22,7 g (=250 g/l)
Fenoxaprop-P-etile puro 1,8 g (= 20 g/l)
Mefenpir-dietile puro 3,6 g (= 40 g/l)
Coformulanti quanto basta a 100 g
Contiene una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one; Fenoxaprop-P-etile; Diclofop-metile: può provocare una reazione allergica.

Frasi di Rischio
Irritante per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

NOCIVO

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1

Registrazione n. 9822 del 23.11.1998 del Ministero della Sanità

Officine di produzione
- Bayer CropScience GmbH - Francoforte s/ Meno - Germania
- SBM Formulation - Saint Marcel - 13367 Marsiglia - Francia
- ISAGRO S.p.A. - Aprilia (LT)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto netto:1 – 2,5 – 5 Litri

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Diclofop-metile puro 22,7%, Fenoxaprop-P-etilepuro 1,8% e Mefenpir-dietile puro 3,6%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Diclofop-metile: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Fenoxaprop-P-etile (nell'animale da esperimento): passività, sonnolenza, assenza di equilibrio, posizione prona.

Mefenpir-dietile (nell'animale da esperimento): sintomi aspecifici. Alterazioni dei globuli rossi e della funzione epatica.

In caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico; togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con abbondante acqua e sapone; risciacquare immediatamente gli occhi con acqua abbondante per 15 minuti; non provocare il vomito.

Controindicazioni: derivati dell'adrenalina.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

BLEDOR è un erbicida graminicida per il diserbo del frumento in post-emergenza.

ERBE INFESTANTI SENSIBILI
Alopecurus myosuroides (coda di volpe), Avena spp. (avena), Phalaris spp. (scagliola), Lolium spp. (loglio), Poa trivialis (fienarola comune), Apera spica-venti (capellini dei campi).

MODALITÀ D'AZIONE
BLEDOR viene assorbito per via fogliare e traslocato fino ai tessuti del meristema apicale. I primi sintomi d'azione si manifestano con macchie clorotiche su foglie e germogli che poi evolvono in necrosi: dopo circa 2-4 settimane (in funzione delle condizioni climatiche) si ha la morte dell'infestante.
Condizioni sfavorevoli di crescita, stress da siccità delle piante infestanti possono influenzare negativamente l'efficacia di BLEDOR.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
BLEDOR si impiega alla dose di 2 - 2,5 l/ha, utilizzando 200 - 400 l/ha di acqua. La dose inferiore è indicata per gli stadi precoci delle infestanti.
Il trattamento deve essere eseguito in post-emergenza dalla terza foglia alla levata del frumento. Le infestanti graminacee sono sensibili negli stadi compresi tra la seconda foglia e fine accestimento.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

COMPATIBILITÀ
La miscela con ormonici sotto forma di sale, nonché con Dicamba, Bifenox e Bentazone può causare riduzione di efficacia.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AGITARE PRIMA DELL'USO
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® marchio registrato DPD 30.06.05

TRAMAT ® COMBI SC

Erbicida di pre-emergenza per la barbabietola da zucchero

Formulazione: Sospensione Concentrata (SC)

TRAMAT ® COMBI SC

Composizione:
Etofumesate puro 300 g/l (26,38%)
Lenacil* puro 120 g/l (10,55%)
Coformulanti q. b. a 100

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione:
- Bayer CropScience GmbH - Wolfenbüttel - Germania
  Bayer CropScience Ltd. - Hauxton (Cambridge) - Inghilterra
- SBM Formulation – St. Marcel - 13367 Marsiglia - Francia
- Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)

Registrazione n° 9855 del 4/12/1998 del Ministero della Sanità

CONTENUTO NETTO: 1 - 5 - 10 L

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
TRAMAT COMBI SC è un erbicida selettivo per la barbabietola da zucchero da impiegare in:

Pre-emergenza subito dopo la semina e comunque prima della emergenza delle infestanti.
TRAMAT COMBI SC può essere usato su tutti i tipi di terreno ad eccezione di quelli sabbiosi o molto ricchi di calcare e su terreni ad alto contenuto in sostanza organica (torbosi) in cui l'attività del prodotto può risultare ridotta.
Caratteristica peculiare del TRAMAT COMBI SC è la sua marcata azione di pre-condizionamento esercitata sulle infestanti emerse dopo un trattamento di pre-emergenza, che risultano così essere molto più sensibili al trattamento in post-emergenza.

Dosi d'impiego
TRAMAT COMBI SC può essere impiegato su barbabietola da zucchero in pre-emergenza alla dose di:
2 – 2,5 l/ha: utilizzare questa dose quando si mira ad un effetto di precondizionamento delle infestanti da eliminare con un intervento programmato di post-emergenza.
3 – 3,5 l/ha: utilizzare questa dose su terreni pesanti ed in presenza di una prevedibile forte emergenza di infestanti a nascita precoce (*Polygonum spp., Stellaria m., Galium a., Fumaria o., Mercurialis a.*, ed altre).
Il prodotto può essere distribuito anche localizzato, utilizzare un volume d'acqua di 300-500 litri/ha.

Efficacia
TRAMAT COMBI SC controlla le più comuni infestanti annuali tipiche dei bietolai sia graminacee (*Alopecurus m., Digitaria s., Echinochloa spp.*), che dicotiledoni (*Amaranthus r., Anagallis a., Atriplex p., Capsella b.p., Fumaria o., Galium a., Mercurialis a., Papaver r., Polygonum spp., Raphanus r., Sinapis a., Solanum n., Stellaria m.*).
Lolium, Lamium, Veronica e *Senecio* sono parzialmente resistenti.

Condizioni di trattamento
Un sufficiente grado udometrico del terreno nel periodo successivo al trattamento è condizione necessaria per ottenere un buon risultato: in caso di necessità effettuare un intervento irriguo.
Se dopo il trattamento si dovesse abbandonare la coltivazione della bietola, prima di seminare un'altra coltura, effettuare una aratura profonda.
Non impiegare il prodotto in terreni sciolti e calcarei per evitare effetti fitotossici e nei terreni eccessivamente organici per evitare inefficacia.

COMPATIBILITÀ
TRAMAT COMBI SC è compatibile con i diserbanti ad azione disseccante.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® Marchio Registrato
* Lenacil è prodotto dalla E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.), U.S.A.

DPD 30.06.05

IMIDOR®

INSETTICIDA - AFICIDA SISTEMICO
per la concia delle sementi di mais.
CONCENTRATO FLUIDO PER CONCIA

etichetta/foglio illustrativo

IMIDOR®
COMPOSIZIONE
100 g di IMIDOR contengono :
30 g di IMIDACLOPRID puro (350 g/l)
coformulanti quanto basta a 100
Contiene benzilemiformale: può provocare una reazione allergica per contatto

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione. Nocivo per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Officina di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG);
Officina di produzione: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Officina di confezionamento: S.C.B - Marle sur Serre (Francia)
Registrazione n. 9960 del 23.02.99 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: ml 100-250-500; l 1-3-5-10-20-1000
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi d'impiego
-mais: 1-2 litri di IMIDOR/100 kg di seme, contro elateridi (*Agriotes spp.*), afidi (tra cui *Rhopalosiphum maydis, R. padi*), cicaline (tra cui *Cicadulina spp.*).

NOCIVITÀ: il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per le api.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. - Conservare al riparo dal gelo.

Attenzione: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Non disperdere nell'ambiente. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effetuato in zone di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.
In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto contenere la perdita usando sabbia o segatura o altro materiale inerte per assorbire il prodotto sversato. Trasferire l'inerte contaminato in un contenitore dotato di chiusura avendo cura di etichettare il contenitore indicando il nome del prodotto e la classificazione di pericolo, e trasportare/far trasportare a Bayer CropScience S.r.l., Via delle Industrie 9, 24040 Filago, telefono per emergenza 035/990111
****Attenzione: confezione ad esclusivo uso industriale***

Bayer CropScience

DPD 30.06.05+modifica
® Marchio registrato
*** indicazioni unicamente per la confezione da 1000 litri**

RAFT®

Erbicida selettivo di pre-emergenza e post-emergenza precoce del girasole

Sospensione concentrata (SC)

RAFT®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Oxadiargyl puro g 35,39 (400 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di rischio:
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano — Tel. 02/3972.1

Officine di produzione
AgriFormula s.r.l., Paganica (AQ)
Bayer CropScience France - Villefranche - Francia

Registrazione N. 10039 del 25/05/99 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: 1 - 5 - 10 litri

Partita N.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
RAFT è un erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce del girasole, attivo su infestanti in fase di germinazione per contatto e assorbimento attraverso l'ipocotile; il prodotto è inoltre efficace su infestanti da poco emerse (fase di plantula).
L'umidità presente nel terreno favorisce l'attività erbicida del prodotto.
Prevalentemente efficace su infestanti dicotiledoni annuali, il prodotto esplica attività collaterale condizionante su convolvolo e su giavone.
La sua persistenza di azione (40-50 giorni) copre il periodo di sensibilità della coltura alla competizione esercitata dalla flora infestante sotto indicata.

<u>Infestanti sensibili</u>
Abutilon theofrasti (Cencio molle), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto);
Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore); *Chenopodium album* (Farinaccio); *Lamium spp.* (Falsa ortica); *Matricharia chamomilla* (Camomilla); *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Solanum nigrum* (Erba morella); *Sonchus arvensis* (Grespino dei campi); *Veronica spp.* (Veronica comune); *Stachis annua* (Stachide minore).

<u>Infestanti medio-sensibili</u>
Convolvulus arvensis (Vilucchio); *Datura stramonium* (Stramonio); *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune); *Galium aparine* (Gallio o Attaccamano); *Polygonum aviculare* (Correggiola); *Polygonum* (Fallopia) *Convolvulus* (Convolvolo nero); *Polygonum persicaria* (Persicaria); *Sinapis arvensis* (Senape selvatica).

<u>Infestanti resistenti</u>
Stellaria media (Centocchio); *Xanthium italicum* (Nappola).

EPOCA DI IMPIEGO
- Pre-emergenza della coltura e delle infestanti, su terreno ben preparato (senza zolle), con sufficiente umidità e con seme ben coperto dallo stesso.
- Post-emergenza precoce della coltura (2-4 foglie) e delle infestanti dicotiledoni (max 2 foglie vere).

DOSI DI IMPIEGO
<u>Pre-emergenza</u>:
0,75 - 1 l/ha in funzione della pressione di infestazione.
In associazione con erbicida a spettro-complementare, la dose del prodotto può venire ridotta a 0,5-0,75 l/ha.
<u>Post-emergenza precoce</u>:
0,5 - 1 l/ha su infestanti in emergenza entro lo stadio di 2 foglie vere.

Numero di applicazioni: 1

Volume di irrorazione: 200-400 l/ha

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare la dose di prodotto necessaria nel serbatoio riempito a metà, mantenendo l'agitatore in funzione fino a completo riempimento.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
- Non applicare il prodotto su colture non ancora emerse in seguito a ristagni idrici.
- Piogge battenti di forte intensità in fase di emergenza della coltura possono provocare temporanee sensibilizzazioni della stessa.
- Nei terreni torbosi il prodotto ha efficacia ridotta.

Nei terreni asciutti e con andamento stagionale siccitoso il prodotto ha efficacia irregolare.

COMPATIBILITA'
Il prodotto può venire associato con erbicidi a spettro complementare, in grado di completarne l'efficacia sulle infestanti meno sensibili.

ALTRE AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

16.12.05

PROVADO® PIN

insetticida-aficida sistemico per piante ornamentali e da fiore
PASTIGLIA PER PIANTE PRONTA ALL'USO – g 2

COMPOSIZIONE
g 100 di Provado® Pin contengono:
g 2,5 di Imidacloprid
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano -Tel. 02/3972.1
Registrazione Ministero della Sanità n. 10055 del 03.06.99
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania); S.C.B. Marle sur Serre (Francia)
Contenuto netto: blister e flaconi da 10-20-30-40-50-75-100-200 pastiglie
Partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Il prodotto si impiega per la difesa professionale delle piante ornamentali e da fiore, perenni ed annuali, coltivate in vaso o altri contenitori in serra.
Un trattamento con Provado Pin prima o all'inizio dell'attacco permette di ottenere un buon controllo dei seguenti parassiti: afidi (*Macrosiphum rosae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aphis fabae, Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis sp., Aulacortum solani, Aphidula sp.*), aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci, Aleurodes sp.*), con buon effetto collaterale contro cocciniglie cotonose e cocciniglie (*Pseudococcus sp., Lecanium sp., Phenacoccus sp., Coccus sp.*).
La protezione contro questi parassiti dura fino a tre mesi dopo il trattamento. L'efficacia completa si raggiunge dopo 2-4 settimane dal trattamento.
Se necessario ripetere il trattamento dopo 10-12 settimane.
Le pastiglie di Provado Pin devono essere interrate nel substrato colturale (vasi, altri contenitori) molto vicine alla pianta, ad una profondità di 1-3 cm circa.
La dose di impiego è in funzione della dimensione del vaso e del volume di substrato colturale

Diametro (in cm)	Volume substrato (in l)	Numero pastiglie
8 - 12	ca. 0,3 - 0,75	½
12 - 16	ca. 0,75 - 2,5	1
16 - 22	ca. 2,5 - 6	2
22 - 26	ca. 6 - 8	3
26 - 30	ca. 8 - 12	4

Allo scopo di migliorare l'efficacia del prodotto si consiglia di annaffiare bene le piante dopo il trattamento per facilitare lo scioglimento della pastiglia ed accelerare l'assorbimento del principio attivo in essa contenuto da parte delle piante.

NOCIVITÀ: il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api.

Fitotossicità: dai dati disponibili il prodotto non è risultato fitotossico nei confronti delle principali varietà di piante floreali ed ornamentali. Comunque a causa della molteplicità di specie e varietà colturali e del rapido succedersi di varietà nel campo della floricoltura e della coltivazione delle piante ornamentali, non può essere esclusa l'insorgenza di fitotossicità nei confronti di specifiche varietà.
Si consiglia di eseguire test preliminari.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Conservare al riparo dall'umidità.

® Marchio registrato
Bayer CropScience

DPD 30.06.05

DECIS® JET

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

INSETTICIDA
CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

Decis® Jet
COMPOSIZIONE
100 g di Decis Jet contengono:
1,63 g di deltametrina pura (= 15 g/l)
coformulanti quanto basta a 100
FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere , né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officine di produzione:
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG),
SBM Formulation – St. Marcel - 13367 Marsiglia - Francia
Bayer CropScience GmbH - Francoforte s/Meno - Germania
Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)
SBM Formulation – St. Marcel - 13367 Marsiglia – Francia/confezionamento Diachem S.p.A. - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG);
Officina di confezionamento: IRCA Service S.p.A.– Fornovo S. Giovanni (BG)
Registrazione Ministero della Sanità N. 10127 del 02.09.1999
CONTENUTO NETTO: 5-10-20-25-50-100-150- 250 - 500 ml / 1 - 3 - 5 litri

Partita n.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
N.B. Diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Consultare un Centro Antiveleni
CARATTERISTICHE
DECIS JET e' un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attivita' contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
(ml/hl d'acqua, salvo diversa indicazione)
Frutticoltura (melo, pero, pesco, albicocco, pruno, ciliegio): contro psilla 120 ml, afide verde del melo, afide del pesco (*Myzus spp ., Hyalopterus spp., Brachycaudus persicae*) 50-80 ml, cocciniglia di S. Jose' 80-120 ml (in trattamenti estivi contro neanidi mobili). Contro carpocapsa 50 ml, cidia e anarsia 80-120 ml, capua, cacoecia e altri tortricidi 50-80 ml, microlepidotteri del melo e del pero 50-80 ml. Contro antonomo, maggiolino, tentredini, tripidi, cecidomidi e mosca della frutta 50-80 ml.
Viticoltura: contro tignole 60-100 ml, piralide, nottue, cicaline, afidi, sigaraio 50-80 ml.
Agrumicoltura: contro afidi 70-80 ml, aleurodidi e Saissetia 70 -100 ml,
mosca degli agrumi 80 ml.
Olivicoltura: contro Saissetia 70-100 ml, tignola (*Prays oleae*) e tripide 80 ml, mosca delle olive 80 ml, in trattamento preventivo.
Orticoltura (pomodoro, patata, peperone, melanzana, cavolo, carota, cetriolo, lattughe e simili, rucola, spinacio, asparago, carciofo, pisello, fagiolino, fagiolo, fava, cipolla, porro, sedano), fragola contro dorifora, altiche, cavolaia, nottue, tripidi, tentredini: 50 ml, contro afidi, aleurodidi, cimici, piralide, casside, tignola, mosca e depressaria: 80 ml.
Cereali:
-mais (trattamenti primaverili-estivi): contro nottue e tripidi 50 ml, afidi, cimici, piralide e diabrotica 80 ml.
-frumento (trattamenti primaverili-estivi): contro nottue, tripidi e afidi 50 ml, cimici 80 ml.
- frumento, orzo (trattamenti autunnali): contro afidi vettori del nanismo giallo 0,5-0,8 l/ha, allo stadio di 1-3 foglie, ripetendo, se necessario, il trattamento dopo 15 giorni circa.
Barbabietola da zucchero: contro altiche e nottue 50 ml, cleono e lisso 80 ml.
Colza: contro altiche, meligete, afidi, punteruoli: 0,5-0,8 l/ha.
Soia: contro nottue, cimici, tortricidi, vanessa, altica, afidi: 0,5-0,8 l/ha.
Tabacco: contro nottue, afidi, tripidi, pulce (*Hepithrix*): 0,5-0,8 l/ha .
Cotone: contro nottue, piralide, tignola, cicalina, tripidi, Lygus: 0,5 l/ha
Funghi: contro ditteri, collemboli: 50-80 ml
Medicai: contro cavallette, intervenendo sui nuovi ricacci 5-10 giorni dopo lo sfalcio: 0,8 l/ha.
Pioppicoltura:
Pioppo in vivaio: contro gemmaiola, tarlo vespa: 80 ml/150 l acqua; contro criptorrinco, con trattamenti localizzati al tronco: 120-150 ml.
Pioppo in piantagione: contro criptorrinco, con trattamenti localizzati al tronco: 120-150 ml; contro saperda, con trattamenti localizzati al tronco 225-300 ml; contro crisomelidi defogliatori: crisomela, crisomelidi minori e stilpnotia: 50-80 ml
Floricoltura (in pieno campo o in serra): contro afidi aleurodidi, tripidi, cetonie, maggiolino 80 ml, tortrici dei garofani (Bega e Epicoristode): 80-150 ml.
Vivai e colture ornamentali in pieno campo o in serra: contro afidi, cimice del platano (*Corythuca*), larve di lepidotteri, maggiolino 80 ml.
PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE
Diluire la dose indicata di DECIS JET in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo l'agitazione. Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, cosi' da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro.
DECIS JET agisce per contatto e ingestione, occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato badando a che la bagnatura sia il piu' uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di un bagnante. Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti delle foglie.

COMPATIBILITA'
DECIS JET, secondo le nostre attuali conoscenze, non e' miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile e' necessario aggiungere la dose di DECIS JET preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicida gia' preparata, mantenendo l'agitazione. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' nocivo per api e insetti utili: osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU COLZA, 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU ERBA MEDICA, SOIA E COTONE, 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU CIPOLLA, PORRO E SEDANO, 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SULLE ALTRE COLTURE.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience
® Marchio registrato

DPD 30.06.05

VALESATE ® COMBI SC

Erbicida di pre-emergenza per la barbabietola da zucchero
Formulazione: Sospensione Concentrata (SC)

VALESATE® COMBI SC

Composizione:
Etofumesate puro 26,38 g (=300 g/l)
Lenacil* puro 10,55 g (=120 g/l)
Coformulanti quanto basta a 100 g

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1

Registrazione n° 10177 del 11/10/1999 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
Bayer CropScience GmbH, Wolfenbüttel – Germania; Bayer CropScience Ltd., Hauxton (Cambridge) – Inghilterra;
SBM Formulation - St. Marcel - Marsiglia – Francia; ISAGRO S.p.A. - Aprilia (LT)

Contenuto netto: 1 - 5 - 10 litri

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
VALESATE COMBI SC è un erbicida selettivo per la barbabietola da zucchero da impiegare in:
Pre-emergenza subito dopo la semina e comunque prima della emergenza delle infestanti.
VALESATE COMBI SC può essere usato su tutti i tipi di terreno ad eccezione di quelli sabbiosi o molto ricchi di calcare e su terreni ad alto contenuto in sostanza organica (torbosi) in cui l'attività del prodotto può risultare ridotta.
Caratteristica peculiare di VALESATE COMBI SC è la sua marcata azione di pre-condizionamento esercitata sulle infestanti emerse dopo un trattamento di pre-emergenza, che risultano così essere molto più sensibili al trattamento in post-emergenza.

DOSI E MODALITÁ D'IMPIEGO
VALESATE COMBI SC può essere impiegato su barbabietola da zucchero in pre-emergenza alla dose di:
2 – 2,5 l/ha: utilizzare questa dose quando si mira ad un effetto di precondizionamento delle infestanti da eliminare con un intervento programmato di post-emergenza.
– **3 – 3,5 l/ha:** utilizzare questa dose su terreni pesanti ed in presenza di una prevedibile forte emergenza di infestanti a nascita precoce (*Polygonum* spp., *Stellaria m.*, *Galium a.*, *Fumaria o.*, *Mercurialis a.*, ed altre).
Il prodotto può essere distribuito anche localizzato, utilizzare un volume d'acqua di 300-500 litri/ha.

Efficacia
VALESATE COMBI SC controlla le più comuni infestanti annuali tipiche dei bietolai, sia graminacee (*Alopecurus m.*, *Digitaria s.*, *Echinochloa* spp.), che dicotiledoni (*Amaranthus r.*, *Anagallis a.*, *Atriplex p.*, *Capsella b.p.*, *Fumaria o.*, *Galium a.*, *Mercurialis a.*, *Papaver r.*, *Polygonum* spp., *Raphanus r.*, *Sinapis a.*, *Solanum n.*, *Stellaria m.*).
Lolium, *Lamium*, *Veronica* e *Senecio* sono parzialmente resistenti.

Condizioni di trattamento
Un sufficiente grado udometrico del terreno nel periodo successivo al trattamento è condizione necessaria per ottenere un buon risultato: in caso di necessità effettuare un intervento irriguo.
Se dopo il trattamento si dovesse abbandonare la coltivazione della bietola, prima di seminare un'altra coltura, effettuare una aratura profonda.
Non impiegare il prodotto in terreni sciolti e calcarei per evitare effetti fitotossici e nei terreni eccessivamente organici per evitare inefficacia.

FITOTOSSICITÁ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

COMPATIBILITÁ
VALESATE COMBI SC è compatibile con i diserbanti ad azione disseccante.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® marchio registrato ISAGRO S.p.A. DPD 30.06.05

* Lenacil è prodotto dalla E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.), U.S.A.

MERLIN® GP

Erbicida di pre-emergenza del mais
Granuli disperdibili in acqua

MERLIN® GP

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:
Isoxaflutole puro 10 g
Flufenacet puro 48 g
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'Autorizzazione:
Bayer CropScience S.r.l. - viale Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione:
Bayer CropScience AG - Dormagen - Germania

Officine di Confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
Bayer CropScience France - Villefranche - Francia
S.C.B. - MARLE sur Serre (Francia)

Registrazione n.10318 Ministero della Sanità del 08/02/2000

Contenuto netto: 500-750 g / 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 5 - 10 Kg

Partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Isoxaflutole 10% e Flufenacet 48% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Isoxaflutole: --
Flufenacet: Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi non specifici: atassia, respirazione difficoltosa ed ipoattività.
Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE

Agisce sulle malerbe in fase di germinazione o da poco emerse (in fase di plantula), prevalentemente per assorbimento radicale e, secondariamente, fogliare. La sua persistenza d'azione copre il periodo di sensibilità della coltura alla competizione della flora infestante.

PIANTE INFESTANTI SENSIBILI:

Graminacee
Digitaria sanguinalis (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano), *Poa annua*, *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* (Sorghetta da seme).

Dicotiledoni
Abutilon theophrasti (Cencio molle), *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Ambrosia elatior* (Ambrosia), *Anagallis arvensis* (Centonchio), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium* spp. (Farinaccio), *Datura stramonium* (Stramonio), *Euphorbia* spp. (Euforbia), *Galeopsis tetrahit* (Canapetta), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Linaria spuria* (Linaiola), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Solanum nigrum* (Erba morella).

PIANTE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI:

Bidens tripartita (Forbicina), *Humulus lupulus* (Luppolo).

EPOCA DI IMPIEGO

Il prodotto va impiegato in pre-emergenza.

DOSI DI IMPIEGO		
0,50	Kg/ha	nei terreni tendenzialmente sabbiosi
0,75	Kg/ha	nei terreni tendenzialmente argillosi

VOLUME D'IRRORAZIONE : 200 - 500 l/ha.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Disciogliere la dose prevista di **MERLIN GP** nel serbatoio dell'irroratrice riempito per circa un quarto della sua capacità, mantenendo l'agitatore in movimento. Portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali soste. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

COMPATIBILITA'

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si raccomanda pertanto di lavare accuratamente l'attrezzatura irroratrice (serbatoio, pompa, filtri, tubazioni, filtrini antigoccia) prima di utilizzarla su altra coltura.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

- Non applicare il prodotto su colture non ancora emerse in seguito a ristagni idrici.
- Piogge di forte intensità ed abbassamenti termici in fase di emergenza della coltura possono provocare temporanee sensibilizzazioni (imbiancamenti) della stessa, fenomeni analoghi possono verificarsi anche nelle zone di eventuale sovrapposizione dell'irrorazione.
- Nei terreni torbosi il prodotto non è efficace.
- In caso di fallimento della coltura principale è possibile riseminare mais.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

MERLIN® GP

Erbicida di pre-emergenza del mais
Granuli disperdibili in acqua in sacchetti idrosolubili

MERLIN® GP

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Isoxaflutole puro 10 g
Flufenacet puro 48 g
Coformulanti q.b. a 100

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione :
Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione :
Bayer CropScience AG – Dormagen - Germania

Officine di Confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
Bayer CropScience France - Villefranche - Francia
S.C.B. - MARLE sur Serre (Francia)

Registrazione n.10318 Ministero della Sanità del 08/02/2000

Contenuto netto: 500 g (1 x 500 g); 500 g (2x250 g); 750 g (3x250 g); 1 Kg (4 x 250 g); 1 Kg (1 x 1 Kg); 1,5 Kg (6 x 250 g); 3 Kg (3 x 1 Kg); 5 Kg (5 x 1 Kg), 10 Kg (10 x 1 Kg)

Partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Isoxaflutole 10% e Flufenacet 48% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Isoxaflutole: --
Flufenacet: Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi non specifici: atassia, respirazione difficoltosa ed ipoattività.
Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE
Agisce sulle malerbe in fase di germinazione o da poco emerse (in fase di plantula), prevalentemente per assorbimento radicale e, secondariamente, fogliare. La sua persistenza d'azione copre il periodo di sensibilità della coltura alla competizione della flora infestante.

PIANTE INFESTANTI SENSIBILI:
Graminacee
Digitaria sanguinalis (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano), *Poa annua* , *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* (Sorghetta da seme).
Dicotiledoni
Abutilon theophrasti (Cencio molle), *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Ambrosia elatior* (Ambrosia), *Anagallis arvensis* (Centonchio), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore). *Chenopodium* spp. (Farinaccio), *Datura stramonium* (Stramonio), *Euphorbia* spp. (Euforbia), *Galeopsis tetrahit* (Canapetta), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Linaria spuria* (Linaiola), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Solanum nigrum* (Erba morella).

PIANTE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI:
Bidens tripartita (Forbicina), *Humulus lupulus* (Luppolo).

EPOCA DI IMPIEGO
Il prodotto va impiegato in pre-emergenza.

DOSI DI IMPIEGO		
0,50	Kg/ha	nei terreni tendenzialmente sabbiosi
0,75	Kg/ha	nei terreni tendenzialmente argillosi

VOLUME D'IRRORAZIONE : 200 - 500 l/ha.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Disciogliere la dose prevista di **MERLIN GP** nel serbatoio dell'irroratrice riempito per circa un quarto della sua capacità, mantenendo l'agitatore in movimento. Portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali soste. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

COMPATIBILITA'

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si raccomanda pertanto di lavare accuratamente l'attrezzatura irroratrice (serbatoio, pompa, filtri, tubazioni, filtrini antigoccia) prima di utilizzarla su altra coltura.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

- Non applicare il prodotto su colture non ancora emerse in seguito a ristagni idrici.
- Piogge di forte intensità ed abbassamenti termici in fase di emergenza della coltura possono provocare temporanee sensibilizzazioni (imbiancamenti) della stessa, fenomeni analoghi possono verificarsi anche nelle zone di eventuale sovrapposizione dell'irrorazione.
- Nei terreni torbosi il prodotto non è efficace.
- In caso di fallimento della coltura principale è possibile riseminare mais.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO

Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

Bayer CropScience

® Marchio registrato DPD 30.06.05

CADOU® WP

DISERBANTE SELETTIVO PER MAIS, SOIA, GIRASOLE, PATATA E POMODORO
FORMULAZIONE: POLVERE BAGNABILE

CADOU® WP
COMPOSIZIONE
100 g di CADOU WP contengono
60 g di flufenacet puro
coformulanti quanto basta a 100
FRASI DI RISCHIO: nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle forgnature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: BAYER CropScience S.r.l. – 20156 Milano - V.le Certosa 130 – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: BAYER CropScience AG – Dormagen (Germania)
STI - Solfotecnica Italiana S.p.A.- Cotignola (RA)
Torre S.r.l. – Montalcino - Torrenieri (SI)
Officine di confezionamento: BAYER CropScience S.r.l. - Filago (BG)
S.C.B. - Marle sur Serre (Francia)
Sipcam - Salerano sul Lambro (LO)
Registrazione Ministero della Sanità n° 10319 del 08.02.2000
Contenuto netto: 500-800-850 g; 1-3-5-10-15-20 kg
Partita n°:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi non specifici: atassia, respirazione difficoltosa ed ipoattività.
Terapia sintomatica
Consultare un Centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
EPOCHE D'IMPIEGO
Mais: pre-emergenza o post-emergenza precoce fino allo stadio di 2 foglie della coltura.
Soia, girasole, patata: pre-emergenza.
Pomodoro: pre-trapianto.
SPETTRO D'AZIONE
Piante infestanti sensibili: Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Giavone (*Echinochloa crus-galli*), Panico (*Panicum dichotomiflorum*), Panico coltivato (*Panicum miliaceum*), Pabbio (*Setaria viridis*), Sorghetta da seme (*Sorghum halepense*)
Piante infestanti mediamente sensibili: Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Borsa pastore comune (*Capsella bursa pastoris*), Centonchio dei campi (*Anagallis arvensis*), Farinaccio (*Chenopodium album*), Farinello polisporo (*Chenopodium polyspermum*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Erba morella (*Solanum nigrum*).
DOSI D'IMPIEGO
Mais: 0,8-1 kg/ha, a seconda del tipo di terreno. Per garantire un risultato completo contro le dicotiledoni è necessario miscelare al prodotto un dicotiledonicida specifico.
Soia: 0,7-0,85 kg/ha.
Pomodoro: 0,7-0,85 kg/ha.
N.B. Per garantire la selettività ottimale in ogni condizione metereologica e pedologica, si consiglia di eseguire il trattamento 7-14 giorni prima del trapianto del pomodoro.
Girasole: 0,5-0,8 kg/ha.
Patata: 0,6-0,8 kg/ha. Per garantire un risultato completo contro le dicotiledoni è necessario miscelare al prodotto un dicotiledonicida specifico.
N.B: il dosaggio più basso è riservato ai terreni tendenzialmente sabbiosi o limosi.
VOLUME D'ACQUA: 200-400 litri/ha
AVVERTENZE AGRONOMICHE
L'andamento climatico siccitoso dopo il trattamento con Cadou WP può ridurre l'efficacia del prodotto.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: non richiesto dato il tipo di impiego

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare al riparo dall'umidità

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® Marchio registrato

CADOU® WP

DISERBANTE SELETTIVO PER MAIS, SOIA, GIRASOLE, PATATA E POMODORO
FORMULAZIONE: POLVERE BAGNABILE
IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

CADOU® WP
COMPOSIZIONE
100 g di CADOU WP contengono
60 g di flufenacet puro
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO: nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle forgnature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: BAYER CropScience S.r.l. – 20156 Milano - V.le Certosa 130 – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: BAYER CropScience AG – Dormagen (Germania); STI – Solfotecnica Italiana S.p.A.- Cotignola (RA); Torre S.r.l. – Montalcino - Torrenieri (SI)
Officine di confezionamento: BAYER CropScience S.r.l. - Filago (BG); S.C.B., Marle sur Serre (Francia) ; SIPCAM - Salerano sul Lambro (LO)
Registrazione Ministero della Sanità n° 10319 del 08.02.2000
Contenuto netto: 250-500-800-850 g; kg 1; kg 1 (2 x g 500; 4 x g 250); kg 3 (3 x kg 1); kg 5 (5 x kg 1)
Partita n°:

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi non specifici: atassia, respirazione difficoltosa ed ipoattività.
Terapia sintomatica
Consultare un Centro antiveleni.
ISTRUZIONI PER L'USO
EPOCA D'IMPIEGO:
Mais: pre-emergenza o post-emergenza precoce fino allo stadio di 2 foglie della coltura.
Soia, girasole e patata: pre-emergenza.
Pomodoro: pre-trapianto
SPETTRO D'AZIONE
Piante infestanti sensibili: Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Giavone (*Echinochloa crus-galli*), Panico (*Panicum dichotomiflorum*), Panico coltivato (*Panicum miliaceum*), Pabbio (*Setaria viridis*), Sorghetta da seme (*Sorghum halepense*)
Piante infestanti mediamente sensibili: Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Borsa pastore comune (*Capsella bursa pastoris*), Centonchio dei campi (*Anagallis arvensis*), Farinaccio (*Chenopodium album*), Farinello polisporo (*Chenopodium polyspermum*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Erba morella (*Solanum nigrum*).
DOSE D'IMPIEGO
Mais: 0,8-1 kg/ha, a seconda del tipo di terreno. Per garantire un risultato completo contro le dicotiledoni è necessario miscelare al prodotto un dicotiledonicida specifico.
Soia: 0,7-0,85 kg/ha.
Pomodoro: 0,7-0,85 kg/ha. N.B. Per garantire la selettività ottimale in ogni condizione metereologica e pedologica, si consiglia di eseguire il trattamento 7-14 giorni prima del trapianto del pomodoro.
Girasole: 0,5-0,8 kg/ha.
Patata: 0,6-0,8 kg/ha. Per garantire un risultato completo contro le dicotiledoni è necessario miscelare al prodotto un dicotiledonicida specifico.
N.B: Il dosaggio più basso è riservato ai terreni tendenzialmente sabbiosi o limosi.
VOLUME D'ACQUA: 200-400 litri/ha
AVVERTENZE AGRONOMICHE
L'andamento climatico siccitoso dopo il trattamento con Cadou WP può ridurre l'efficacia del prodotto.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Intervallo di sicurezza: non richiesto dato il tipo di impiego

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DPD 30.06.05

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Conservare al riparo dall'umidità.

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO

Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

MERLIN® DUO

Erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce del mais

Sospensione concentrata

MERLIN® DUO

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Isoxaflutole puro 3,44 g (37,5 g/l)
Terbutilazina pura 34,4 g (375 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

NOCIVO

Frasi di rischio:
Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano — Tel. 02/3972.1

Officine di produzione
Bayer CropScience France - Villefranche - Francia
AgriFormula S.r.l. - Paganica (AQ)

Registrazione N.10321 del 08/02/2000 del Ministero della Sanità

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto netto: 1 - 5 - 10 - 20 litri

Partita N.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: isoxaflutole 3,44% e terbutilazina 34,4 %, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
ISOXAFLUTOLE: --
TERBUTILAZINA
Sintomi: non specifici e rilevati su animali con superdosaggi. Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratoria, salivazione. Terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

MERLIN DUO è un'associazione erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce del mais, attiva su infestanti dicotiledoni e graminacee in fase di germinazione o da poco emerse (fase di plantula) per assorbimento radicale e fogliare.
Prevalentemente attivo su infestanti dicotiledoni, nell'applicazione di pre-emergenza il **MERLIN DUO** esplica un buon controllo anche su infestanti graminacee.

PIANTE INFESTANTI SENSIBILI

Dicotiledoni

Abutilon theophrasti (Cencio molle), *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Ambrosia elatior* (Ambrosia), *Anagallis arvensis* (Centonchio), *Ammi majus* (Visnaga), *Acalypha virginica* (Acalifa), *Bidens tripartita* (Forbicina), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinaccio), *Cucumis melo* (Melone selvatico), *Datura stramonium* (Stramonio), *Euphorbia* spp. (Euforbia), *Fallopia convolvolus* (Convolvolo nero), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galeopsis tetrahit* (Canapetta), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Linaria spuria* (Soldino peloso), *Matricharia chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Rorippa amphibia* (Nasturzio), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Xanthium italicum* (Lappa).

Graminacee (*)

Digitaria sanguinalis (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (Giavone), *Panicum miliaceum* (Miglio), *Setaria viridis* (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme (Sorghetta).

(*) Infestanti controllabili nelle applicazioni di pre-emergenza e con la dose di 2 l/ha di formulato. La sensibilità delle graminacee decresce nelle applicazioni di post-emergenza, fino alla resistenza oltre lo stadio di 3 foglie.

EPOCHE E DOSI DI IMPIEGO

Trattamento in pre-emergenza:
1,350-2 l/ha, riservando la dose inferiore alle applicazioni su terreni limosi e sabbiosi e la più elevata ai terreni argillosi e con elevato contenuto di sostanza organica.

Trattamento in post-emergenza precoce:
1,350 l/ha su mais entro lo stadio di 3 foglie.

VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 l/ha

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare la dose prevista di **MERLIN DUO** nel serbatoio dell'irroratrice riempito a circa un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento.
Portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali soste. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
- Non applicare il prodotto su colture non ancora emerse in seguito a ristagni idrici.
- Piogge di forte intensità ed abbassamenti termici in fase di emergenza della coltura possono provocare temporanee sensibilizzazioni (imbianchimenti) della stessa; fenomeni analoghi possono manifestarsi anche nelle aree di eventuale sovrapposizione del trattamento.
- Impiegato in pre-emergenza nei terreni torbosi il prodotto non è efficace.
- Nell'applicazione di post-emergenza non intervenire su coltura con foglie bagnate nè associare il prodotto a formulati in emulsione concentrata, a prodotti con bagnanti o con olio bianco.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si raccomanda pertanto di lavare accuratamente le attrezzature (serbatoi, filtri, pompe e ugelli) prima di utilizzarle su altre colture.

AVVERTENZE
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza. Non adoperare il prodotto ad una distanza inferiore ai 10 m dall'ambiente acquatico.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

BAYER Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

CADOU® STAR

Erbicida di pre-emergenza del mais
Formulazione: granuli disperdibili in acqua

CADOU® STAR
Composizione
g 100 di Cadou Star contengono :
g 10 di isoxaflutole puro
g 48 di flufenacet puro
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officina di produzione: Bayer CropScience AG DORMAGEN (GERMANIA)
Officine di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l.. FILAGO (BG);
S.C.B. MARLE sur SERRE (FRANCIA)
Registrazione Ministero Sanità N. 10322 del 08.02.2000
Contenuto netto: g 500-750; kg 1-1,5-3-5-10
Partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive
ISOXAFLUTOLE 10%
FLUFENACET 48%
le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
ISOXAFLUTOLE: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
FLUFENACET: sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi non specifici: atassia, respirazione difficoltosa ed ipoattivita'
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Agisce sulle malerbe in fase di germinazione o da poco emerse (in fase di plantula), prevalentemente per assorbimento radicale e, secondariamente, fogliare. La sua persistenza d'azione copre il periodo di sensibilita' della coltura alla competizione della flora infestante.
PIANTE INFESTANTI SENSIBILI:
Graminacee
Digitaria sanguinalis (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (Giavone), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum halepense* (Sorghetta da seme).
Dicotiledoni
Abutilon theophrasti (Cencio molle), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Ambrosia elatior* (Ambrosia), *Anagallis arvensis* (Centonchio), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium spp.* (Farinaccio), *Datura stramonium* (Stramonio), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Galeopsis tetrahit* (Canapella), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Linaria spuria* (Linaiola), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Solanum nigrum* (Erba morella).
PIANTE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
Bidens tripartita (Forbicina), *Humulus lupulus* (Luppolo).

EPOCA DI IMPIEGO: PRE EMERGENZA

DOSE DI IMPIEGO	
0,50 kg/ha	nei terreni tendenzialmente sabbiosi
0,75 kg/ha	nei terreni tendenzialmente argillosi

VOLUME D'IRRORAZIONE: 200-500 l/ha.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Disciogliere la dose prevista di Cadou Star nel serbatoio dell'irroratrice riempito per circa un quarto della sua capacita', mantenendo l'agitatore in movimento. Portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali soste. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

COMPATIBILITA'
Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si raccomanda pertanto di lavare accuratamente l'attrezzatura irroratrice (serbatoio, pompa, filtri, tubazioni, filtrini antigoccia) prima di utilizzarla su altra coltura.
AVVERTENZE AGRONOMICHE

- Non applicare il prodotto su colture non ancora emerse in seguito a ristagni idrici.
- Piogge di forte intensita' ed abbassamenti termici in fase di emergenza della coltura possono provocare temporanee sensibilizzazioni (imbiancamenti) della stessa, fenomeni analoghi possono verificarsi anche nelle zone di eventuale sovrapposizione dell'irrorazione.
- Nei terreni torbosi, il prodotto non e' efficace.
- In caso di fallimento della coltura principale e' possibile riseminare mais.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Conservare al riparo dall'umidità.

® Marchio registrato

BAYER Bayer CropScience

DPD 30.06.05

CADOU® STAR

Erbicida di pre-emergenza del mais
Formulazione: granuli disperdibili in acqua

CADOU® STAR
Composizione
g 100 di Cadou Star contengono :
g 10 di isoxaflutole puro
g 48 di flufenacet puro
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officina di produzione: Bayer CropScience AG DORMAGEN (GERMANIA)
Officine di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l.. FILAGO (BG);
S.C.B. MARLE sur SERRE (FRANCIA)
Registrazione Ministero Sanità N. 10322 del 08.02.2000
Contenuto netto: g 500 (2 x 250 g); g 750 (3 x g 250); kg 1 (4 x g 250); kg 1 (1x kg 1); kg 1,5 (6 x g 250); kg 3 (3 x kg 1); kg 5 (5 x kg 1); kg 10 (10 x kg 1)
Partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive
ISOXAFLUTOLE 10%
FLUFENACET 48%
le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
ISOXAFLUTOLE: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
FLUFENACET: sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi non specifici: atassia, respirazione difficoltosa ed ipoattivita'
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Agisce sulle malerbe in fase di germinazione o da poco emerse (in fase di plantula), prevalentemente per assorbimento radicale e, secondariamente, fogliare. La sua persistenza d'azione copre il periodo di sensibilita' della coltura alla competizione della flora infestante.
PIANTE INFESTANTI SENSIBILI:
Graminacee
Digitaria sanguinalis (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (Giavone), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum halepense* (Sorghetta da seme).
Dicotiledoni
Abutilon theophrasti (Cencio molle), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Ambrosia elatior* (Ambrosia), *Anagallis arvensis* (Centonchio), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium spp.* (Farinaccio), *Datura stramonium* (Stramonio), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Galeopsis tetrahit* (Canapella), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Linaria spuria* (Linaiola), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Solanum nigrum* (Erba morella).
PIANTE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
Bidens tripartita (Forbicina), *Humulus lupulus* (Luppolo).

EPOCA DI IMPIEGO: PRE EMERGENZA

DOSE DI IMPIEGO	
0,50 kg/ha*	nei terreni tendenzialmente sabbiosi
0,75 kg/ha**	nei terreni tendenzialmente argillosi

VOLUME D'IRRORAZIONE: 200-500 l/ha.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Disciogliere la dose prevista di Cadou Star nel serbatoio dell'irroratrice riempito per circa un quarto della sua capacita', mantenendo l'agitatore in movimento. Portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali soste. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

COMPATIBILITA'
Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si raccomanda pertanto di lavare accuratamente l'attrezzatura irroratrice (serbatoio, pompa, filtri, tubazioni, filtrini antigoccia) prima di utilizzarla su altra coltura.
AVVERTENZE AGRONOMICHE
- Non applicare il prodotto su colture non ancora emerse in seguito a ristagni idrici.
- Piogge di forte intensita' ed abbassamenti termici in fase di emergenza della coltura possono provocare temporanee sensibilizzazioni (imbiancamenti) della stessa, fenomeni analoghi possono verificarsi anche nelle zone di eventuale sovrapposizione dell'irrorazione.
- Nei terreni torbosi, il prodotto non e' efficace.
- In caso di fallimento della coltura principale e' possibile riseminare mais.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. - Conservare al riparo dall'umidità.

® Marchio registrato

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI
PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa sì che che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti

oppure:
*
- pari a 2 sacchetti da g 250/ha
- pari a 1 sacchetto da kg 1/2 ha
**
- pari a 3 sacchetti da g 250/ha
- pari a 3 sacchetti da kg 1/4 ha

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

AMIGO™

INSETTICIDA - AFICIDA SISTEMICO
per la concia delle sementi di mais
CONCENTRATO FLUIDO PER CONCIA

AMIGO™
COMPOSIZIONE
100 g di Amigo contengono :
30 g di IMIDACLOPRID puro (350 g/l)
coformulanti quanto basta a 100
Contiene benzilemiformale: può provocare una reazione allergica per contatto

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione. Nocivo per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l.- V.le Certosa 130 – 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l.- Filago (BG); Torre S.r.l. – Montalcino – Torrenieri (SI)
Officina di produzione: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Officina di confezionamento: S.C.B - Marle sur Serre (Francia)
Registrazione n. 10624 del 14.11.2000 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: ml 100-250-500; l 1-3-5-10-20-1000
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi d'impiego
-mais: 1-2 litri di Amigo/100 kg di seme, contro elateridi (*Agriotes spp.*), afidi (tra cui *Rhopalosiphum maydis, R. padi*), cicaline (tra cui *Cicadulina spp.*).

NOCIVITA': il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per le api.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. - Conservare al riparo dal gelo.

***Attenzione: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Non disperdere nell'ambiente. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effetuato in zone di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**
In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto contenere la perdita usando sabbia o segatura o altro materiale inerte per assorbire il prodotto sversato. Trasferire l'inerte contaminato in un contenitore dotato di chiusura avendo cura di etichettare il contenitore indicando il nome del prodotto e la classificazione di pericolo, e trasportare/far trasportare a Bayer CropScience S.r.l., Via delle Industrie 9, 24040 Filago, telefono per emergenza 035/990111
***Attenzione: confezione ad esclusivo uso industriale**

Bayer CropScience

TM Trade Mark
DPD 30.06.05+modifica

*** indicazioni unicamente per la confezione da 1000 litri**

BAYSOL® BAYCOR® SPRAY

FUNGICIDA per uso domestico in appartamenti, balconi, terrazze e giardini domestici, contro ticchiolatura, oidio (mal bianco) e ruggine delle piante ornamentali verdi e da fiore.
AEROSOL

BAYSOL® BAYCOR® SPRAY
COMPOSIZIONE:
g 100 di BAYSOL BAYCOR SPRAY contengono:
g 0,075 di bitertanolo puro
solventi e propellenti quanto basta a 100.
FRASI DI RISCHIO:
Estremamente infiammabile.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l.– Viale Certosa 130 – 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Officina di produzione e confezionamento: Bayer S.p.A. – Filago (BG); TOSVAR S.r.l. – Pozzo d'Adda (MI)
PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI
Registrazione Ministero della Sanità n. 10844/PPO del 11.04.2001
Contenuto netto: ml 200-250-300-400-500-600-750

Partita n°

NORME PRECAUZIONALI:
Recipiente sotto pressione; proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50° C. Non perforare ne' bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non erogare il prodotto in prossimità di una fiamma o di un apparecchio elettrico in funzione. Non contiene gas propellenti ritenuti dannosi all'ozono. Evitare un uso eccessivo od improprio.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
In caso di malessere chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

Modo d'impiego: Nebulizzare il prodotto sulle piante tenendo la bombola a circa 50 cm di distanza. Ripetere il trattamento ad intervalli di 7-8 giorni nei periodi in cui le piante sono soggette alle malattie.

Precauzioni d'uso

Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.
Attenzione. Da non impiegare in agricoltura o comunque su piante destinate all'alimentazione.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ACC

3

BAYER CROPSCIENCE S.R.L. MILANO

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® Marchio registrato

BAYSOL® BAYTEROID® AL

INSETTICIDA PER PIANTE DA FIORE E ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO, BALCONE E GIARDINO DOMESTICO CONTRO LARVE DEFOGLIATRICI, PIDOCCHI ED ALTRI INSETTI
Liquido pronto all'uso

A sicura e rapida azione
Non contiene gas propellenti

COMPOSIZIONE
g 100 di Baysol Bayteroid AL contengono:
g 0,005 di ciflutrin puro (0,05 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare soltanto nel recipiente originale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilita' da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonche' dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Il prodotto e' una formulazione pronta per l'uso, e quindi si impiega senza diluirlo con acqua, premendo il tasto della pompetta.
Nebulizzare il prodotto sulle piante e sui fiori, bagnando bene la vegetazione. In caso di necessità ripetere il trattamento dopo circa 10 giorni.

Precauzioni d'uso: se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione su zone circostanti la vegetazione. Evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

Attenzione. Da non impiegare in agricoltura o comunque su piante destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Conservare al riparo dal gelo.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Registrazione del Ministero della Sanità n. 10845/PPO del 11.04.2001
PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI
Officine di produzione: Bayer CropScience S.r.l. - Filago(BG); I.R.C.A. – Fornovo San Giovanni (BG)
Contenuto netto: ml 200-500-750 - l 1
Partita n°

Bayer CropScience

DPD 30.06.2005

BETANAL® SE

Erbicida selettivo di post-emergenza per il diserbo della barbabietola da zucchero, da orto e da foraggio e dello spinacio in sospensione concentrata (SC)

BETANAL® SE

Composizione:
Fenmedifam puro 15,84 g (= 160 g/l)
Coformulanti quanto basta a 100 g

Frasi di rischio:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: SBM Formulation, St. Marcel - Marsiglia - Francia;
Bayer CropScience GmbH - Wolfenbüttel - (Germania).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Registrazione n. 10999 del 30/07/2001 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: 0,5 – 1 – 3 – 5 – 10 – 20 L
Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE
BETANAL SE è un erbicida selettivo di post-emergenza per il controllo delle malerbe che infestano la barbabietola da zucchero, da orto e da foraggio, spinacio ed agisce per assorbimento fogliare di contatto, con conseguente interferenza nel processo di fotosintesi clorofilliana.
Viene impiegato contro le seguenti infestanti:
Anagallis arvensis, Atriplex patula, Capsella bursa-pastoris, Centaurea cyanus, Chenopodium album, Datura stramonium, Fumaria officinalis, Galinsoga parviflora, Lamium purpureum, Linaria minor, Matricaria spp., *Myosotis arvensis, Papaver* spp., *Plantago major, Polygonum aviculare, Polygonum convolvulus, Polygonum lapathifolium, Polygonum persicaria, Raphanus raphanistrum, Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, Spergula arvensis, Stellaria media, Thlaspi arvense, Urtica urens, Veronica persica, Viola tricolor.*

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

BARBABIETOLA A SEMINA PRIMAVERILE
BETANAL SE viene impiegato in post-emergenza della coltura con infestanti in attiva crescita e che non abbiano superato lo stadio di due foglie vere, alla dose di 6-8 litri/ha in 250-400 litri di acqua, su infestanti asciutte e con temperatura non superiore ai 25°C in quanto si possono avere ustioni.
Sono inoltre consigliate le seguenti miscele:
BETANAL SE litri 5 per ha + KEMIRON 500 SC (Etofumesate) litri 0,950-1,150 per ha in 250-300 litri di acqua in presenza di *Polygonum persicaria, Solanum nigrum, Amaranthus* spp., *Polygonum aviculare* e infestanti graminacee che non siano ancora accestite.
BETANAL SE litri 4 per ha + KEMIRON 500 SC (Etofumesate) litri 3 per ha in 250-300 litri di acqua in presenza di infestazioni dominate da graminacee quali *Alopecurus*, Avene, *Digitaria, Panicum, Setaria* purché non siano in fase di accestimento.
NB: le miscele sopra citate sono da effettuarsi solo con barbabietole che abbiano 2-4 foglie vere e con la temperatura che non superi i 20-22°C.

BARBABIETOLA A SEMINA AUTUNNALE
BETANAL SE viene impiegato alla dose di 8 litri/ha in 350-400 litri di acqua sulle seguenti infestanti: *Chenopodium, Papaver, Polygonum convolvulus, Raphanus, Sinapis* e tutte le infestanti sensibili.
Sono inoltre consigliate le seguenti miscele:
BETANAL SE a 5-6 litri/ha + KEMIRON 500 SC (Etofumesate) a 1,400 litri/ha in 250-300 litri di acqua in presenza di *Galium, Veronica, Fumaria, Stellaria* e graminacee che non siano ancora accestite; trattare con coltura allo stadio minimo di 2 foglie vere. L'assorbimento del prodotto è favorito da temperature sui 15-20°C, se si tratta in giornate particolarmente calde intervenire nel tardo pomeriggio; la sua azione, agendo per assorbimento fogliare non è influenzata dalla natura del terreno, con ottimi risultati anche in terreni torbosi, sabbiosi ed argillosi; l'azione del prodotto può essere diminuita da una pioggia che intervenga entro le sei ore dal trattamento, ma l'attività del prodotto non dipende dall'umidità del suolo non risultando condizionato dalle scarse precipitazioni primaverili. Evitare di trattare colture di barbabietole che siano danneggiate da insetti o sofferenti.

SPINACIO
BETANAL SE viene impiegato alla dose di 6-8 litri/ha in 300-400 litri di acqua, con erbe infestanti che siano poco sviluppate, massimo 2-4 foglie vere; nel caso le infestanti siano maggiormente sviluppate intervenire con BETANAL SE a 6 litri/ha + prodotti a base di Lenacil all'80% di p.a. a 0,8 kg/ha in 300-350 litri di acqua trattando con spinacio a 2-4 foglie vere minimo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLO SPINACIO.

COMPATIBILITA'
Non è compatibile con prodotti a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:
da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® **marchio registrato**

BIOPOWER®

COADIUVANTE DEGLI ERBICIDI ATLANTIS® WG, HUSSAR®, HUSSAR® OF E NOMINEE®
LIQUIDO (L)

BIOPOWER®

Composizione:
Miscela di 3,6-dioxaottodecilsolfato di sodio (70-75%) e 3,6-dioxaeicosilsolfato (20-25%): 25,5 g (265 g/L)
Coformulanti q.b. a 100 g.

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi e la pelle.
Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130, 20156 Milano - Tel. 02/3972.1

Officine di produzione/confezionamento:
Bayer CropScience GmbH – Francoforte s/ Meno - Germania
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
AgriFormula S.r.l. - Paganica (AQ)
Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)
Officina di confezionamento
Torre S.r.l. - Montalcino - Torrenieri (SI)

Registrazione n. 11059 del 24/10/01 del Ministero della Salute

Contenuto netto: 1 – 2 – 4 – 5 -10 l

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
BIOPOWER è un coadiuvante specifico da miscelare esclusivamente con i prodotti ATLANTIS WG, HUSSAR, HUSSAR OF e NOMINEE.
Agisce aumentando la bagnabilità degli erbicidi ed il loro assorbimento da parte della vegetazione infestante. Ciò permette di aumentare il controllo delle infestanti sensibili.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Epoca d'impiego:
BIOPOWER si utilizza rispettando le epoche e le modalità d'uso indicate per gli erbicidi a cui va associato, ossia:
- ATLANTIS WG, HUSSAR, HUSSAR OF: in post-emergenza del frumento tenero e duro, dalle tre foglie al primo nodo.
- NOMINEE: in post-emergenza del riso, dalle tre-quattro foglie al pieno accestimento.

Modalità:
BIOPOWER si può versare direttamente nel serbatoio della pompa già in parte riempito con la miscela di acqua ed erbicida. Si deve completare il riempimento del serbatoio con acqua mantenendo sempre in funzione l'agitatore.

Dosi: 1 l/ha in 200/400 litri di acqua per ettaro in associazione ai prodotti ATLANTIS WG, HUSSAR e HUSSAR OF.
1 l/ha in 300/600 litri di acqua per ettaro in associazione al prodotto NOMINEE.

COMPATIBILITA'
BIOPOWER è compatibile con gli erbicidi di post-emergenza del frumento ATLANTIS WG, HUSSAR e HUSSAR OF e di post-emergenza del riso NOMINEE.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

05.08.05

Etichetta/foglio illustrativo

CADDY®

FUNGICIDA SISTEMICO
formulato in granuli disperdibili in acqua contro Oidio, Ruggine, Monilia e Cladosporiosi

CADDY®
COMPOSIZIONE
100 g di CADDY contengono:
10 g di Ciproconazolo puro
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento: Syngenta Agro S.A. Gaillon (Francia); STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. Cotignola (RA); Torre S.r.l. – Montalcino -Torrenieri (SI) - SBM Formulation – Bèzier (Francia)
Officina di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
Registrazione del Ministero della Salute N. 11098 del 29.11.01
Contenuto netto: 10-20-50-100-200-250-500 g ; 1 kg
Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo l'ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni
ISTRUZIONI PER L'USO
Colture, dosi e modalità di impiego
Vite: contro *Oidio* g 10-12,5 per ettolitro ogni 14 giorni. In situazioni di forte pressione della malattia ed in particolare su uva da tavola a partire dalla fioritura la dose può essere aumentata fino a 15 g per ettolitro adottando un intervallo di 10-14 giorni.
Nota: in zone di forte pressione della malattia e su uva da tavola utilizzare il prodotto ad una dose non inferiore a 125 g ad ettaro, indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati.
Contro *Muffa grigia:* g 20 per ettolitro. Effettuare il trattamento in pre-chiusura grappolo ed in pre-raccolta. Ha effetto collaterale contro il marciume acido.
Contro *Mal dell'Esca:* g 10 per pianta, diluiti in 10 litri di acqua, per un massimo di 50 piante per ettaro.
Impiegare CADDY su piante con sviluppo vegetativo normale, che non siano già compromesse dalla malattia e che abbiano un apparato vascolare efficiente.
Intervenire quindi:
- su piante che presentino al massimo il 30% delle foglie colpite da manifestazione classica del Mal dell'Esca
-su vigneti di non oltre 15 anni di età
-subito dopo la manifestazione della malattia e comunque entro 3 anni dalla prima comparsa della sintomatologia fogliare nel vigneto.
Il prodotto va applicato al terreno col palo iniettore, in corrispondenza delle radici assorbenti, ad una profondità di 10-15 cm.
Epoca di applicazione: alla ripresa vegetativa con germogli di 5-20 cm di lunghezza.
Il trattamento non garantisce il completo risanamento delle piante, ma è in grado, di norma, di produrre un contenimento significativo dei sintomi fogliari ed un prolungamento della vita produttiva della pianta.
Melo e pero: contro *Ticchiolatura ed Oidio:* g 12,5 per ettolitro da adoperarsi in miscela con prodotti di contatto, intervenendo dall'inizio caduta petali.
Contro Ticchiolatura tardiva e Monilia: impiegare CADDY in funzione delle piogge alla dose di g 15-20 per ettolitro fino a 7 giorni dalla raccolta.
Drupacee (pesco, albicocco, susino, mandorlo)
Contro *Oidio:* g 10-12,5 per ettolitro ogni 12-14 giorni, iniziando i trattamenti dopo la caduta dei petali.
Contro *Monilia:* g 10-12,5 per ettolitro.
Nei trattamenti ai bottoni rosa, in fioritura (in caso di piogge persistenti), alla sfioritura, si consiglia di miscelare CADDY con prodotti a base di thiram, benzimidazolici, dithianon, a dosi ridotte.
Nei trattamenti ad 1-2 settimane dalla raccolta impiegare CADDY da solo alla dose di 12,5 g/hl, elevandola a 20 g/hl in condizioni di forte pressione della malattia.
Contro *Ruggine* (*Tranzschelia pruni-spinosae*): g 12,5 per ettolitro, iniziando la difesa alla comparsa dei primi sintomi della malattia.
Asparago: contro *Ruggine*: g 250-300 per ettaro: iniziare la difesa alla comparsa, dei primi sintomi della malattia sull'apparato aereo delle piante madri, trattando ogni 14-15 giorni.
Carciofo: contro *Oidio:* g 125-150 per ettaro: intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia.
Pisello: contro *Oidio:* g 100-125 per ettaro: intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia.

DPD 30.06.2005

Pomodoro: contro *Cladosporiosi e Oidio:* g 10-12,5 per ettolitro; intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia.
Fiori ed ornamentali: contro *Oidio:* g 10-15 per ettolitro contro *Ruggini:* g 20 -30 per ettolitro.
Tutte le dosi indicate si riferiscono alla distribuzione con pompe a volume normale, tale da assicurare un'uniforme e completa bagnatura.

Preparazione della poltiglia

Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione. Per la preparazione delle poltiglie miste diluire in poca acqua il prodotto prima di aggiungerlo alla poltiglia contenente altri prodotti.

Compatibilità: CADDY non è compatibile con prodotti a reazione alcalina come polisolfuri e calce.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta per vite, albicocco, mandorlo e carciofo, 10 giorni prima della raccolta per pomodoro, 7 giorni prima della raccolta per susino, pisello, melo e pero, 3 giorni prima della raccolta per pesco. Per asparago tempo di carenza non richiesto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare al riparo dall'umidità

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.2005

CADDY®

FUNGICIDA SISTEMICO

Formulato in granuli disperdibili in acqua contro Oidio, Ruggine, Monilia e Cladosporiosi

CADDY®

COMPOSIZIONE

100 g di CADDY contengono:
10 g di Ciproconazolo puro
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano - Tel. 02/3972.1

Officine di produzione e confezionamento: Syngenta Agro S.A. Gaillon (Francia); STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. Cotignola (RA); Torre S.r.l. – Montalcino - Torrenieri (SI); SBM Formulation – Bézier (Francia)

Officina di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. Filago (BG)

Registrazione del Ministero della Salute N. 11098 del 29.11.01

Contenuto netto: 25 g; 50 g (2 x 25 g); 100 g; 100 g (4 X 25 g; 2 x 50 g); 200 g; 200 g (8 x 25 g; 4 x 50 g; 2 x 100 g); 250 g; 250 g (10 x 25 g; 5 x 50 g); 500 g; 500 g (20 x 25 g; 10 x 50 g; 5 x 100 g; 2 x 250 g); 1 kg; 1 kg (10 x 100 g; 5 x 200 g; 4 x 250 g; 2 x 500 g)

Partita N.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono posssibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo l'ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

Colture, dosi e modalità di impiego

Vite: contro *Oidio* g 10-12,5 per ettolitro ogni 14 giorni. In situazioni di forte pressione della malattia ed in particolare su uva da tavola a partire dalla fioritura la dose può essere aumentata fino a 15 g per ettolitro adottando un intervallo di 10-14 giorni.
Nota: in zone di forte pressione della malattia e su uva da tavola utilizzare il prodotto ad una dose non inferiore a 125 g ad ettaro, indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati.
Contro *Muffa grigia:* g 20 per ettolitro. Effettuare il trattamento in pre-chiusura grappolo ed in pre-raccolta. Ha effetto collaterale contro il marciume acido.
Contro *Mal dell'Esca:* g 10 per pianta, diluiti in 10 litri di acqua, per un massimo di 50 piante per ettaro.
Impiegare CADDY su piante con sviluppo vegetativo normale, che non siano già compromesse dalla malattia e che abbiano un apparato vascolare efficiente.
Intervenire quindi:
- su piante che presentino al massimo il 30% delle foglie colpite da manifestazione classica del Mal dell'Esca
-su vigneti di non oltre 15 anni di età
-subito dopo la manifestazione della malattia e comunque entro 3 anni dalla prima comparsa della sintomatologia fogliare nel vigneto.

Il prodotto va applicato al terreno col palo iniettore, in corrispondenza delle radici assorbenti, ad una profondità di 10-15 cm.
Epoca di applicazione: alla ripresa vegetativa con germogli di 5-20 cm di lunghezza.
Il trattamento non garantisce il completo risanamento delle piante, ma è in grado, di norma, di produrre un contenimento significativo dei sintomi fogliari ed un prolungamento della vita produttiva della pianta.
Melo e pero: contro *Ticchiolatura ed Oidio:* g 12,5 per ettolitro da adoperarsi in miscela con prodotti di contatto, intervenendo dall'inizio caduta petali.
ControTicchiolatura tardiva e Monilia: impiegare CADDY in funzione delle piogge alla dose di g 15-20 per ettolitro fino a 7 giorni dalla raccolta.
Drupacee (pesco, albicocco, susino, mandorlo)
Contro *Oidio:* g 10-12,5 per ettolitro ogni 12-14 giorni, iniziando i trattamenti dopo la caduta dei petali.
Contro *Monilia:* g 10-12,5 per ettolitro.
Nei trattamenti ai bottoni rosa, in fioritura (in caso di piogge persistenti), alla sfioritura, si consiglia di miscelare CADDY con prodotti a base di thiram, benzimidazolici, dithianon, a dosi ridotte.
Nei trattamenti ad 1-2 settimane dalla raccolta impiegare CADDY da solo alla dose di 12,5 g/hl, elevandola a 20 g/hl in condizioni di forte pressione della malattia.
Contro *Ruggine* (*Tranzschelia pruni-spinosae*):12,5 g/hl, iniziando la difesa alla comparsa dei primi sintomi della malattia.
Asparago: contro *Ruggine*: g 250-300 per ettaro: iniziare la difesa alla comparsa, dei primi sintomi della malattia sull'apparato aereo delle piante madri, trattando ogni 14-15 giorni.
Carciofo: contro *Oidio:* g 125-150 per ettaro: intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia.
Pisello: contro *Oidio:* g 100-125 per ettaro: intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia.
Pomodoro: contro *Cladosporiosi e Oidio:* g 10-12,5 per ettolitro; intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia.
Fiori ed ornamentali contro *Oidio:* g 10-15 per ettolitro contro *Ruggini:* g 20 -30 per ettolitro.
Tutte le dosi indicate si riferiscono alla distribuzione con pompe a volume normale, tale da assicurare un'uniforme e completa bagnatura.
Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione. Per la preparazione delle poltiglie miste diluire in poca acqua il prodotto prima di aggiungerlo alla poltiglia contenente altri prodotti.

Compatibilità: CADDY non è compatibile con prodotti a reazione alcalina come polisolfuri e calce.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta per vite, albicocco, mandorlo e carciofo, 10 giorni prima della raccolta per pomodoro, 7 giorni prima della raccolta per susino, pisello, melo e pero, 3 giorni prima della raccolta per pesco. Per asparago tempo di carenza non richiesto.

DPD 30.06.2005

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

® Marchio registrato

Bayer CropScience

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO

Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

DPD 30.06.2005

CADOU® WG

DISERBANTE PER IL CONTROLLO DEL RISO CRODO E DI ALTRE INFESTANTI PER RISO, MAIS, SOIA, GIRASOLE, PATATA E POMODORO
FORMULAZIONE: MICROGRANULI IDRODISPERDIBILI

CADOU® WG
COMPOSIZIONE
100 g di CADOU WG contengono
60 g di flufenacet puro
coformulanti quanto basta a 100.

FRASI DI RISCHIO: nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – 20156 Milano - V.le Certosa 130 – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania); STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Officine di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); S.C.B. Marle sur Serre (Francia)
Registrazione n° 10379 del 08.03.2000 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: 500-700-800-850 g; 1-2-3-3,5-4-5-7-10-15-20 kg
Partita n°:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi non specifici: atassia, respirazione difficoltosa ed ipoattività.
Terapia sintomatica
Consultare un Centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

EPOCA D'IMPIEGO:
PRE-SEMINA PER RISO (almeno 30 giorni prima della semina); PRE-EMERGENZA PER MAIS, SOIA, GIRASOLE E PATATA; PRE-TRAPIANTO PER POMODORO.

SPETTRO D'AZIONE
Piante infestanti sensibili: Riso crodo (*Oryza sativa* var. *sylvatica*), Giavone (*Echinochloa crus-galli*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Panico (*Panicum dichotomiflorum*), Pabbio (*Setaria viridis*), Sorghetta da seme (*Sorghum halepense*).
Piante infestanti mediamente sensibili: Quadrettone (*Scirpus (= Schoenoplectus) mucronatus)*, Eterantera *(Heteranthera spp.)*, Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus)*, Borsa pastore comune (*Capsella bursa pastoris*), Farinaccio *(Chenopodium album*), Farinello polisporo (*Chenopodium polyspermum*), Poligono persicaria *(Polygonum persicaria)*, Erba morella (*Solanum nigrum*).

DOSE D'IMPIEGO
Mais: 0,8-1 kg/ha, a seconda del tipo di terreno. Per garantire un risultato completo contro le dicotiledoni e' necessario miscelare al prodotto un dicotiledonicida specifico.
Soia: 0,7-0,85 kg/ha.
Pomodoro: 0,7-0,85 kg/ha.
N.B. Per garantire la selettivita' ottimale in ogni condizione metereologica e pedologica, si consiglia di eseguire il trattamento 7-14 giorni prima del trapianto del pomodoro.
Girasole: 0,6-0,8 kg/ha.
Patata: 0,6-0,8 kg/ha. Per garantire un risultato completo contro le dicotiledoni e' necessario miscelare al prodotto un dicotiledonicida specifico.
N.B: Il dosaggio piu' basso e' riservato ai terreni tendenzialmente sabbiosi o limosi.
Riso: 0,6-0,7 kg/ha. Il prodotto va applicato in pre-semina su risaia allagata. L'acqua nell'appezzamento trattato va tenuta ferma per 30 giorni, ripristinandone periodicamente il livello, dopodichè eliminare l'acqua ancora presente, allagare nuovamente la risaia e procedere alla semina del riso.
VOLUME D'ACQUA: 200-400 litri/ha.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
L'andamento climatico siccitoso dopo il trattamento con Cadou WG puo' ridurre l'efficacia del prodotto.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Intervallo di sicurezza: non richiesto dato il tipo di impiego

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare al riparo dall'umidità.

Bayer CropScience 30.09.05

® Marchio registrato

CADOU® WG

DISERBANTE PER IL CONTROLLO DEL RISO CRODO E DI ALTRE INFESTANTI PER RISO, MAIS, SOIA, GIRASOLE, PATATA E POMODORO
FORMULAZIONE: MICROGRANULI IDRODISPERDIBILI IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

CADOU® WG
COMPOSIZIONE
100 g di CADOU WG contengono
60 g di flufenacet puro
coformulanti quanto basta a 100.

FRASI DI RISCHIO: nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – 20156 Milano - V.le Certosa 130 – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania); STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Officine di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); S.C.B. Marle sur Serre (Francia)
Registrazione n° 10379 del 08.03.2000 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: 500-800-850 g; kg 1; kg 1 (2 x g 500; 4 x g 250); kg 3 (3 x kg 1); kg 5 (5 x kg 1)
Partita n°:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi non specifici: atassia, respirazione difficoltosa ed ipoattività.
Terapia sintomatica
Consultare un Centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

EPOCA D'IMPIEGO:
PRE-SEMINA PER RISO (almeno 30 giorni prima della semina); PRE-EMERGENZA PER MAIS, SOIA, GIRASOLE E PATATA; PRE-TRAPIANTO PER POMODORO.
SPETTRO D'AZIONE
Piante infestanti sensibili: Riso crodo (*Oryza sativa* var. *sylvatica*), Giavone (*Echinochloa crus-galli),* Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Panico *(Panicum dichotomiflorum*), Pabbio (*Setaria viridis*), Sorghetta da seme *(Sorghum halepense*).
Piante infestanti mediamente sensibili: Quadrettone (*Scirpus (= Schoenoplectus) mucronatus),* Eterantera *(Heteranthera spp.),* Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus)*, Borsa pastore comune (*Capsella bursa pastoris*), Farinaccio *(Chenopodium album*), Farinello polisporo (*Chenopodium polyspermum*), Poligono persicaria *(Polygonum persicaria),* Erba morella (*Solanum nigrum*).
DOSE D'IMPIEGO
Mais: 0,8-1 kg/ha, a seconda del tipo di terreno. Per garantire un risultato completo contro le dicotiledoni e' necessario miscelare al prodotto un dicotiledonicida specifico.
Soia: 0,7-0,85 kg/ha.
Pomodoro: 0,7-0,85 kg/ha.
N.B. Per garantire la selettivita' ottimale in ogni condizione metereologica e pedologica, si consiglia di eseguire il trattamento 7-14 giorni prima del trapianto del pomodoro.
Girasole: 0,6-0,8 kg/ha.
Patata: 0,6-0,8 kg/ha. Per garantire un risultato completo contro le dicotiledoni e' necessario miscelare al prodotto un dicotiledonicida specifico.
N.B: Il dosaggio piu' basso e' riservato ai terreni tendenzialmente sabbiosi o limosi.
Riso: 0,6-0,7 kg/ha. Il prodotto va applicato in pre-semina su risaia allagata. L'acqua nell'appezzamento trattato va tenuta ferma per 30 giorni, ripristinandone periodicamente il livello, dopodichè eliminare l'acqua ancora presente, allagare nuovamente la risaia e procedere alla semina del riso.
VOLUME D'ACQUA: 200-400 litri/ha.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
L'andamento climatico siccitoso dopo il trattamento con Cadou WG puo' ridurre l'efficacia del prodotto.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Intervallo di sicurezza: non richiesto dato il tipo di impiego

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare al riparo dall'umidità.

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO

Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

BAYER Bayer CropScience

30.09.05

® Marchio registrato

CALYPSO® etichetta/foglio illustrativo

INSETTICIDA SISTEMICO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE

g 100 di CALYPSO® contengono :
g 40,4 di THIACLOPRID puro (480 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano -
Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania);
Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
Registrazione Ministero della Salute n. 11596 del 14.02.03
Contenuto netto: ml 5-10-50-100-200-250-500; l 1
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI e MODALITA' DI IMPIEGO

Melo, pero: contro Carpocapsa (*Cydia pomonella*): 0,025% (25 ml in 100 l di acqua); contro microlepidotteri (*Lithocolletis blancardella, Lithocolletis corylifoliella, Leucoptera scitella*) e afidi (*Dysaphis plantaginea, Aphis pomi, Aphis gossypii*): 0,02 % (20 ml in 100 l di acqua). Nei trattamenti allo stadio prefiorale miscelare con Oliocin al 2,5-3 % (2,5-3 l in 100 l di acqua). Il trattamento contro i microlepidotteri deve essere posizionato a caduta petali contro la 1^ generazione e al momento del massimo sfarfallamento contro la 2^ generazione.
Pesco/nettarino, albicocco: contro cidia (*Cydia molesta*) e anarsia (*Anarsia lineatella*): 0,025% (25 ml in 100 l di acqua); contro afidi (*Myzus persicae, Myzus varians, Hyalopterus amygdali, Anuraphis persicae-niger*): 0,02 % (20 ml in 100 l di acqua). Nei trattamenti a bottoni rosa miscelare con Oliocin al 1,5-2 % (1,5-2 l in 100 l di acqua).
Noce e altri fruttiferi a guscio: contro Carpocapsa e afidi: 0,025% (25 ml in 100 l di acqua).

Non effettuare più di 2 trattamenti all'anno.

Pomodoro: contro afidi (*Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*): 0,02 % (20 ml in 100 l di acqua). Contro aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 0,03 % (30 ml in 100 l di acqua).
Melanzana: contro afidi (*Myzus persicae*), dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,02 % (20 ml in 100 l di acqua). Contro aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 0,03 % (30 ml in 100 l di acqua).
Peperone: contro afidi (*Myzus persicae, Aphis gossypii*): 0,02 % (20 ml in 100 l di acqua). Contro aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 0,03 % (30 ml in 100 l di acqua).
Cetriolo, zucchino, melone cocomero: contro afidi (*Aphis gossypii*): 0,02 % (20 ml in 100 l di acqua). Contro aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 0,03 % (30 ml in 100 l di acqua).
Floreali ed ornamentali: contro afidi (*Myzus persicae, Aphis gossypii*): 0,02 % (20 ml in 100 l di acqua); aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 0,03 % (30 ml in 100 l di acqua).
Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua a metà; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione.
Per calcolare il corretto dosaggio ad ettaro utilizzare le quantita' di acqua indicate nella seguente tabella:

Coltura	Acqua (l/ha)
Melo, pero	1200-1500
Noce e altri fruttiferi a guscio	1200-1500
Pesco/nettarino, albicocco	1200-1500
Pomodoro	1000
Melanzana	1000
Peperone	1000
Cetriolo, zucchino	1000
Melone, cocomero	1000
Floreali ed ornamentali	1000

Le concentrazioni sono calcolate per irroratrici a volume normale. Nel caso di irroratrici a basso o ultrabasso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.

DPD 30.06.05/a

Compatibilita': il prodotto è miscibile con Oliocin. L'aggiunta di Oliocin, serve a combattere le uova svernanti degli afidi.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per melo, pero, pesco, nettarino, albicocco, noce e altri fruttiferi a guscio, 3 giorni prima del raccolto per pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchino, melone, cocomero.

Adoperare tute e guanti durante l'applicazione del prodotto, sia in campo che in serra.
Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli artropodi utili.
Per l'uso su pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchino, melone, cocomero, rispettare una distanza non inferiore a 5 m dai corsi d'acqua.
Per l'uso su melo, pero, pesco, nettarine, albicocco, noce e altri fruttiferi a guscio rispettare una distanza non inferiore a 20 m dai corsi d'acqua.
Per l'uso su melo pero, pesco, nettarine, albicocco, noce e altri fruttiferi a guscio rispettare una distanza non inferiore a 10 m rispetto alle aree naturali circostanti.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare al riparo dal gelo.

® Marchio registrato

Bayer CropScienc

DPD 30.06.05/a

CHALLENGE® COMBI

Erbicida selettivo di pre-emergenza e post-emergenza precoce del girasole

Sospensione Concentrata (SC)

CHALLENGE® COMBI

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
Oxadiargyl puro 10,3 g (120 g/l)
Aclonifen puro 34,3 g (400 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio:
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'Autorizzazione :
Bayer CropScience S.r.l. - viale Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione :
AgriFormula S.r.l. - Paganica (AQ)
Bayr CropScience France - Villefranche - Francia

Registrazione n.10325 del 08/02/2000 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: 1 - 5 - 10 - 20 litri

Partita n.:*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE
Il **CHALLENGE COMBI** è una miscela di due erbicidi da impiegarsi sia in pre-emergenza che post-emergenza precoce del girasole; è attiva su piante infestanti in fase di germinazione per contatto e assorbimento attraverso l'ipocotile. Il prodotto è inoltre efficace su infestanti da poco emerse (fase di plantula).
L'umidità presente nel terreno favorisce l'attività erbicida dei componenti la miscela.
Prevalentemente efficace su piante infestanti dicotiledoni annuali, il prodotto svolge attività di riduzione dello sviluppo vegetativo su convolvolo e giavone.
La persistenza di azione (40-50 giorni) di questa miscela erbicida copre il periodo di maggior sensibilità della coltura alla competizione esercitata dalla flora infestante sotto indicata (compresi ecotipi resistenti ad altri principi attivi).

Infestanti sensibili
Abutilon theophrasti (Cencio molle), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto),
Anagallis arvensis (Anagallide), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinaccio), *Heliotropium europaeum* (Eliotropio), *Kickxya spuria* (Soldino peloso), *Lamium spp.* (Falsa ortica), *Matricharia chamomilla* (Camomilla), *Picris echioides* (Dente di cane), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus arvensis* (Crespino dei campi), *Stellaria media* (Centocchio), *Stachys annua* (Stachide minore), *Veronica persica* (Veronica querciola).

Infestanti medio-sensibili
Echinochloa crus-galli (Giavone comune), *Polygonum* (Fallopia) *Convolvulus* (Convolvolo nero), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica).

EPOCA DI IMPIEGO
- Pre-emergenza della coltura e delle infestanti, su terreno ben preparato (senza zolle), con sufficiente umidità e con seme ben coperto dallo stesso.
- Post-emergenza precoce della coltura (2-4 foglie) e delle infestanti dicotiledoni (max 2 foglie vere).

DOSI DI IMPIEGO
Pre-emergenza:
1,5 - 1,8 l/ha in funzione della densità di infestazione e della tessitura del terreno usando la dose più bassa nei terreni tendenzialmente sabbiosi.
Post-emergenza precoce:
1,5 l/ha su infestanti in emergenza entro lo stadio di 2 foglie vere.

Volume di irrorazione: 200-400 l/ha

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare la dose di prodotto necessaria nel serbatoio riempito a metà, mantenendo l'agitatore in funzione fino a completo riempimento.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
- Non applicare il prodotto su colture non ancora emerse in seguito a ristagni idrici.
- Piogge battenti di forte intensità in fase di emergenza della coltura possono provocare temporanei rallentamenti di crescita della stessa.
- Nei terreni torbosi il prodotto ha efficacia ridotta.
- Nei terreni asciutti e con andamento stagionale siccitoso il prodotto ha efficacia irregolare.

COMPATIBILITA'
Il prodotto può venire associato con erbicidi a spettro complementare a base di Metolaclor o Pendimetalin, in grado di completarne l'efficacia sulle infestanti meno sensibili.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

CONFIDOR® GIARDINO

Etichetta/foglio illustrativo

insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE

Composizione:
g 100 di Confidor Giardino contengono :
g 17,1 di principio attivo IMIDACLOPRID puro (200 g/l)
coformulanti q.b. a 100

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Floreali ed ornamentali: contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae)* e *Metcalfa pruinosa*: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*: 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Su floreali ed ornamentali in vaso e' possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.

Precauzioni d'uso: Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione. Evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

MODALITA' DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l'anno.
Nocivita': il prodotto e' molto tossico per le api. Non trattare ne' in immediata prefioritura ne' in fioritura (almeno 10 giorni prima) per evitare la mancata impollinazione.

Da non impiegare in agricoltura o comunque su piante destinate all'alimentazione.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Conservare al riparo dal gelo.
.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Registrazione Ministero della Salute n. 11343/PPO del 22.05.2002
PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI

Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. -Filago (BG);
Bayer CropScience AG-Dormagen (Germania); IRCA Service S.r.l. Fornovo S, Giovanni (BG)
Officine di confezionamento: SCB Marle sur Serre (Francia); Torre S.r.l. – Montalcino-Torrenieri (SI)

Contenuto netto: ml 5-10-20-25-50-100
Partita n.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® Marchio registrato

CONFIDOR® OIL

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

insetticida-aficida sistemico
SOSPENSIONE CONCENTRATA

CONFIDOR® OIL
Composizione
g 100 di Confidor Oil contengono :
g 0,46 di principio attivo IMIDACLOPRID puro (4 g/l)
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi o da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: BAYER CropScience S.r.l. - 20156 Milano - Viale Certosa 130 - Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l.-Filago (BG);
IRCA Service S.p.A. Fornovo S. Giovanni (BG)
Registrazione Ministero della Salute n. 11517 del 03.12.2002
Contenuto netto: ml 50-100-200-250-500; l 1-3-5-10-20-25-200
Partita n°:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (melo, pero): trattamenti dallo stadio di orecchiette di topo a mazzetti divaricati alla dose di 2,5 –2,7 l/hl (37,5 – 40,5 l / ha) contro afidi (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Rhopalosiphum insertum*), psilla del melo (*Cacopsylla spp.*), tentredine del pero (*Hoplocampa brevis*).
Trattamento dallo stadio di completa caduta foglie a mazzetti divaricati alla dose di 2,7 l/hl (40,5 l / ha) contro le forme svernanti di cocciniglie (*Quadraspidiotus perniciosus*).
Trattamento allo stadio di completa caduta foglie alla dose di 2,7 l/hl (40,5 l / ha) contro gli adulti svernanti di psilla del pero (*Cacopsylla pyri*).
Drupacee (pesco, nettarino, albicocco): trattamento da rottura gemme a bottoni rosa alla dose di 2 – 2,5 l/hl (30 – 37,5 l / ha) contro afidi (*Myzus persicae, Myzus varians, Anuraphis persicae-niger, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus amygdali*).
Trattamento da completa caduta foglie a bottoni rosa alla dose di 2,5 l/hl (37,5 l / ha) contro cocciniglie (*Quadraspidiotus perniciosus, Diaspis pentagona*).

Le concentrazioni sono calcolate per irroratrici a volume normale e per volumi di acqua di 1500 l/ha. Nel caso di riduzione del volume di acqua per ettaro le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire almeno il dosaggio per ettaro indicato.

NB: il prodotto deve essere sciolto in acqua alle concentrazioni riportate. Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua a metà; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione.
Non deve essere miscelato a poltiglia bordolese, polisolfuri e prodotti fitosanitari contenenti zolfo, captano, TMTD.

Da non applicare con mezzi aerei.

Nocivita': il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api. Non trattare ne' in immediata prefioritura ne' in fioritura (almeno 10 giorni prima) per evitare la mancata impollinazione.

Sospendere i trattamenti 50 giorni per pero, 35 giorni per albicocco, 28 giorni per melo, 21 giorni per pesco e nettarino prima del raccolto.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Conservare al riparo dal gelo.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® marchio registrato

CYDIAN 25 PB

INSETTICIDA INIBITORE DELLA SINTESI DELLA CHITINA
Polvere bagnabile

CYDIAN 25 PB
COMPOSIZIONE
100 g di CYDIAN 25 PB contengono:
25 g di Triflumuron puro
coformulanti quanto basta a 100.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento: BAYER CropScience AG - Dormagen (Germania)
BAYER CropScience S.r.l. - Filago (BG)
Registrazione Ministero della Sanità n° 10625 del 14.11.2000
Contenuto netto: 0,25-0,5-1 kg
Partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Melo e pero: 40-60 g/hl contro Lithocolletis, Cemiostoma, Archips, Pandemis, Carpocapsa, Orgia e Psilla, Cydia molesta, Zeuzera.
Pesco: 40-60 g/hl contro Cydia, Anarsia, Lithocollete, Zeuzera.
Cavolo bianco: 50-80 g/hl contro larve defogliatrici (Cavolaia e Mamestra).
Piante forestali: 40-50 g/hl contro Processionaria, Limantria ed Ifantria e Orgia.
Floreali e ornamentali: 40-70 g/hl contro Limantria, Spodoptera littoralis, Ifantria e Orgia.
Modalità di impiego: i migliori risultati si ottengono effettuando il trattamento dall'inizio del volo degli adulti all'inizio della schiusura delle uova. Non impiegare in fioritura; è necessario sfalciare le erbe in fiore nei frutteti inerbiti.
Nota bene: per il suo specifico meccanismo d'azione il prodotto si è dimostrato selettivo verso numerosi artropodi utili quali: Fitoseidi, Coccinellidi, Orius spp., Anthocoris spp., Chrisopa spp., Calcididi, Icneumonidi e Sirfidi.

Compatibilità: il prodotto può essere miscelato con formulati a reazione neutra; escludere la miscela con prodotti a reazione alcalina (polisolfuri ad es.).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per melo, pero e pesco; 30 giorni prima del raccolto per cavolo bianco.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Conservare al riparo dall'umidità.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

CYDIAN 25 PB

Insetticida inibitore della sintesi della chitina
POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

CYDIAN 25 PB

COMPOSIZIONE
100 g di CYDIAN 25 PB contengono:
25 g di Triflumuron puro
coformulanti quanto basta a 100.

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG);
S.T.I.-Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Sanità n° 10625 del 14.11.2000
Contenuto netto: 1 kg (4 x 250 g); 1 kg (5 x 200 g)
Partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Melo e pero: 40-60 g/hl (pari a un sacchetto da g 250 in 600-400 litri di acqua)* contro Lithocolletis e Cemiostoma, Archips, Pandemis, Carpocapsa, Orgia e Psilla, Cydia molesta, Zeuzera.

Pesco: 40-60 g/hl (pari a 1 sacchetto da g 250 in 600-400 litri di acqua)* contro Cydia, Anarsia, Lithocollete, Zeuzera.

Cavolo bianco: 50-80 g/hl (pari a un sacchetto da g 250 in 500-300 litri di acqua)** contro larve defogliatrici (Cavolaia e Mamestra).

Piante forestali: 40-50 g/hl (pari a un sacchetto da g 250 in 600-500 litri di acqua)*** contro Processionaria, Limantria ed Ifantria e Orgia.

Floreali e ornamentali: 40-70 g/hl (pari a un sacchetto da g 250 in 600-350 litri di acqua)**** contro Limantria, Spodoptera littoralis e Ifantria e Orgia.

Modalità di impiego: i migliori risultati si ottengono effettuando il trattamento dall'inizio del volo degli adulti all'inizio della schiusura delle uova. Non impiegare in fioritura; è necessario sfalciare le erbe in fiore nei frutteti inerbiti.

Nota bene: per il suo specifico meccanismo d'azione il prodotto si è dimostrato selettivo verso numerosi artropodi utili quali: Fitoseidi, Coccinellidi, Orius spp., Anthocoris spp., Chrisopa spp., Calcididi, Icneumonidi e Sirfidi.

Compatibilità: il prodotto può essere miscelato con formulati a reazione neutra; escludere la miscela con prodotti a reazione alcalina (polisolfuri ad es.).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per melo, pero e pesco; 30 giorni prima del raccolto per cavolo bianco.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Conservare al riparo dall'umidità.

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI
PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

oppure:
* pari a 1 sacchetto da g 200 in 500-350 litri di acqua
** pari a un sacchetto da g 200 in 400-250 litri di acqua
*** pari a 1 sacchetto da g 200 in 500-400 litri di acqua
**** pari a 1 sacchetto da g 200 in 500-300 litri di acqua

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

DECIS® PPO

Etichetta/foglio illustrativo

INSETTICIDA LIQUIDO AD AMPIO SPETTRO DI AZIONE, PER LA DIFESA DI FIORI E PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO, BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

DECIS® PPO
COMPOSIZIONE
g 100 di DECIS PPO contengono:
g 1,5 di Deltametrina pura (=15,2 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officina di produzione e confezionamento: I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)
Officina di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI
Registrazione Ministero della Salute n.12105 /PPO del 12.07.2004
Contenuto netto: ml 2 – 5 – 10 – 10 (2 x 5 ml) 20 – 25 – 50 – 100
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE E DOSI D'IMPIEGO: DECIS PPO è efficace nei confronti degli insetti (Aleurodidi, Afidi, Bega, Oziorrinco, Cicaline, Cimici, Ditteri, Microlepidotteri defogliatori, Nottue, Tortricidi, Maggiolino) che colpiscono i fiori e le piante ornamentali da appartamento, balcone e giardino domestico. Utilizzando l'apposito misurino, impiegare 1-2 ml di prodotto per litro d'acqua intervenendo all'inizio della infestazione, bagnando accuratamente anche la pagina inferiore delle foglie. Ripetere i trattamenti dopo 7-15 giorni in caso di forte attacco.

PERIODO DI IMPIEGO:

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Preparazione della poltiglia: per preparare la miscela occorre versare la dose stabilita di prodotto nel quantitativo di acqua previsto, mescolando accuratamente la sospensione acquosa ottenuta.
Compatibilità: si consiglia di impiegare il prodotto da solo.
Nocività: il prodotto è nocivo per gli insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.

Precauzioni d'uso: se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

Avvertenza: DECIS PPO contiene una sostanza amaricante che riduce i rischi di ingestione accidentale del prodotto da parte di bambini e animali domestici.

Attenzione: da non impiegare in agricoltura o comunque su piante destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
- Conservare al riparo dal gelo.

Bayer CropScience

® Marchio registrato DPD 30.06.05/a

DIPLOME ®

DISERBANTE DEL MAIS PER IMPIEGHI IN PRE-EMERGENZA O POST-EMERGENZA PRECOCE
FORMULAZIONE: MICROGRANULI IDRODISPERDIBILI

DIPLOME®
COMPOSIZIONE
g 100 di DIPLOME contengono
g 60 di flufenacet puro
g 2,5 di metosulam puro
coformulanti q. b. a 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Registrazione n. 10380 del 08.03.2000 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
BAYER CropScience AG – Dormagen (Germania)
S.C.B. - Marle sur Serre (Francia)
STI - Solfotecnica Italiana S.p.A.- Cotignola (RA)
Officina di confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. - Filago
Contenuto netto: 500 g; 1-3-5-10-15-20 kg
Partita n°:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze: flufenacet 60% e metosulam 2,5%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FLUFENACET:
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi non specifici: atassia, respirazione difficoltosa ed ipoattività.
METOSULAM:
Terapia sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
EPOCHE D'IMPIEGO: diserbante di pre-emergenza o post-emergenza precoce del mais allo stadio di 1-2 foglie della coltura.
SPETTRO D'AZIONE
Piante infestanti sensibili: Graminacee: Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Giavone (*Echinochloa crus-galli*), Panico (*Panicum dichotomiflorum*), Sorghetta da seme (*Sorghum halepense*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Pabbio (*Setaria viridis*).
Dicotiledoni: Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Amaranto (*Amaranthus spp.*), Centonchio dei campi (*Anagallis arvensis*), Forbicina (*Bidens tripartita*), Borsa pastore comune (*Capsella bursa pastoris*), Chenopodiacee (*Chenopodium spp.*), Mercorella comune (*Mercurialis annua*), Aspraggine volgare (*Picris echioides*), Poligonacee (*Polygonum spp.*), Porcellana comune (*Portulaca oleracea*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Centocchio comune (*Stellaria media*).
DOSE D'IMPIEGO
Mais: 0,8 - 1 kg/ha, a seconda del tipo di terreno, riservando il dosaggio più basso ai terreni tendenzialmente sabbiosi o limosi.

VOLUME D'ACQUA: 200-400 L/ha

AVVERTENZE AGRONOMICHE
L'andamento climatico siccitoso dopo il trattamento con Diplome può ridurre l'efficacia del prodotto.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Usare un facciale filtrante con filtro combinato antipolvere e antigas FFAP3 (EN 405).

Intervallo di sicurezza: non richiesto dato il tipo di impiego.

Avvertenze: Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare al riparo dall'umidità.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® marchio registrato

EFFICAN 2 EFFE MICROGRANULI

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro Peronospora ed Escoriosi della vite
Granuli idrodispersibili (WG)

EFFICAN 2 EFFE MICROGRANULI

COMPOSIZIONE:
Fosetil Alluminio puro 40 g
Folpet puro 40 g
Coformulanti q.b. a 100 g
Contiene Folpet: può provocare una reazione allergica

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti.
Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel.02/3972.1
Officina di Produzione e Confezionamento: Bayer CropScience France - Villefranche - Francia
Officine di confezionamento: AgriFormula S.r.l. – Paganica (AQ)
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Registrazione del Ministero della Salute N. 11873 del 10.12.2003
Contenuto netto: **500 g; 1 - 2 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 Kg**
Partita N.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
FOSETIL ALLUMINIO 40%
FOLPET 40%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: Fosetil Alluminio: ----
Folpet: Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
EFFICAN 2 EFFE MICROGRANULI é un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemia si manifesta soprattutto in modo ascendente permettendo al prodotto di difendere anche la vegetazione che si forma dopo il trattamento.
L'attività nei confronti della Peronospora si é rivelata sia preventiva che antisporulante. Particolarmente efficace nella protezione dei grappolini appena allegati. Queste caratteristiche, unite alla buona persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta antiperonosporica con interventi distanziati a cadenza fissa. Il prodotto possiede anche azione sull' Escoriosi ed attività frenante su sviluppo di Botrite e Mal bianco.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Vite
Contro Peronospora: il primo trattamento con il prodotto va effettuato a partire dalla fase di germogli della vite lunghi 10 cm. I trattamenti successivi vanno distanziati di 10 giorni fino alla fase di allegagione avvenuta.
Dose: 250 g per 100 litri d'acqua, distribuendo non meno di 2,5 kg di formulato per ettaro.
Nelle fasi di maggiore sviluppo della coltura e con forte pressione di malattia, aumentare la dose a 350 g/hl (non meno di 3,5 kg/ha), con la possibilità di distanziare gli interventi di 12-14 giorni.
Contro Escoriosi:
Intervenire nelle fasi di "gemma mossa - gemma cotonosa" e di "foglie formate" a 300 g per ettolitro d'acqua (non meno di 3 kg/ha).

COMPATIBILITA'
Il prodotto può avere problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame, con concimi fogliari a base azotata, con oli o prodotti oleosi.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto é tossico per gli insetti utili e crostacei.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.
Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso é pericoloso.
Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze:
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

EPYLOG FLASH

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro Peronospora ed Escoriosi della vite
Granuli idrodispersibili (WG)

EPYLOG FLASH

COMPOSIZIONE:
Fosetil Alluminio puro 40 g
Folpet puro 40 g
Coformulanti q.b. a 100 g
Contiene Folpet: può provocare una reazione allergica

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti.
Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel.02/3972.1
Officina di Produzione e Confezionamento: Bayer CropScience France - Villefranche - Francia
Officine di confezionamento: AgriFormula S.r.l. – Paganica (AQ)
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Registrazione del Ministero della Salute N. 11300 del 06/05/02
Contenuto netto: **500 g; 1 - 2 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 Kg**
Partita N.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
FOSETIL ALLUMINIO 40%
FOLPET 40%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: Fosetil Alluminio: ----

Folpet: Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
EPYLOG FLASH é un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemia si manifesta soprattutto in modo ascendente permettendo al prodotto di difendere anche la vegetazione che si forma dopo il trattamento.
L'attività nei confronti della Peronospora si é rivelata sia preventiva che antisporulante. Particolarmente efficace nella protezione dei grappolini appena allegati. Queste caratteristiche, unite alla buona persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta antiperonosporica con interventi distanziati a cadenza fissa. Il prodotto possiede anche azione sull' Escoriosi ed attività frenante su sviluppo di Botrite e Mal bianco.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Vite
Contro Peronospora: il primo trattamento con il prodotto va effettuato a partire dalla fase di germogli della vite lunghi 10 cm. I trattamenti successivi vanno distanziati di 10 giorni fino alla fase di allegagione avvenuta.
Dose: 250 g per 100 litri d'acqua, distribuendo non meno di 2,5 kg di formulato per ettaro.
Nelle fasi di maggiore sviluppo della coltura e con forte pressione di malattia, aumentare la dose a 350 g/hl (non meno di 3,5 kg/ha), con la possibilità di distanziare gli interventi di 12-14 giorni.
Contro Escoriosi:
Intervenire nelle fasi di "gemma mossa - gemma cotonosa" e di "foglie formate" a 300 g per ettolitro d'acqua (non meno di 3 kg/ha).

COMPATIBILITA'
Il prodotto può avere problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame, con concimi fogliari a base azotata, con olii o prodotti oleosi.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto é tossico per gli insetti utili e crostacei.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.
Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso é pericoloso.
Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze:
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

EQUIP®

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA PER IL MAIS
DISPERSIONE OLEOSA (OD)

Equip®

Composizione:

Foramsulfuron	2,33 g (=22,5 g/L)
Isoxadifen-etile (antidoto)	2,33 g (=22,5 g/L)
Coformulanti	q.b. a 100 g

Contiene isoxadifen-etile: può provocare una reazione allergica.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Irritante per la pelle – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle – In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone - Usare indumenti protettivi e guanti adatti – Non gettare i residui nelle fognature - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza - In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Registrazione n° 12452 del 14.12.2004 del Ministero della Salute

Officine di produzione e confezionamento:
-Bayer CropScience GmbH – Francoforte s/Meno – Germania
-Irca Service Spa - Fornovo S.Giovanni (BG)
- Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
Officina di confezionamento:
-Torre Srl – Montalcino - Torrenieri (SI)

Contenuto netto: 1 - 2,5 – 5 – 10 – 20 l
PARTITA N°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

EQUIP® è un erbicida di post-emergenza selettivo per il mais, attivo verso le più diffuse infestanti graminacee e dicotiledoni.
Il prodotto viene prevalentemente assorbito per via fogliare e traslocato velocemente all'interno dell'infestante.

Infestanti sensibili
Graminacee: *Echinochloa crus-galli* (Giavone), *Panicum* spp. (Panico), *Sorghum halepense* (Sorghetta da seme e da rizoma), *Setaria* spp. (Panicastrella).
Dicotiledoni: *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Ambrosia artemisifolia* (Ambrosia), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Anthemis arvensis* (Camomilla inodora), *Bidens tripartita* (Forbicina), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Datura stramonium* (Stramonio), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Papaver rhoeas* (Papavero) *Physalis alkekengi* (Alchechengi), *Picris echioides* (Aspraggine), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sicyos angulatus* (Zucchino selvatico), *Solanum nigrum* (Erba morella).

Infestanti mediamente sensibili
Graminacee: *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
Dicotiledoni: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Chenopodium album* (Farinello), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Xanthium* spp.(Lappola).

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Epoca d'impiego
Post-emergenza con mais da 2 a 6 foglie.

Dosi d'impiego
2-2,7 l/ha: la dose inferiore è indicata per le infestanti sensibili e nei primi stadi di sviluppo. La dose maggiore va usata in presenza di infestanti mediamente sensibili e contro la sorghetta da rizoma.
Per un migliore controllo delle infestanti a nascita scalare, si possono eseguire 2 trattamenti distanziati di 10-20 giorni, alle dosi di **1,8 l/ha** per il primo trattamento e **0.9 l/ha** per il secondo.
Volume di irrorazione: 200-400 l/ha

AVVERTENZE

L'applicazione deve essere eseguita con mais in buone condizione vegetative, evitando interventi con temperature inferiori a 10° e superiori a 25°, oppure in condizioni di "stress" idrico.
EQUIP® è un erbicida ad azione prevalentemente fogliare e pertanto non è attivo su infestanti non emerse. I migliori risultati in termini di efficacia erbicida si ottengono intervenendo su infestanti ai primi stadi di sviluppo ed in attiva crescita. Eventuali precipitazioni cadute dopo 2 ore dal trattamento non pregiudicano l'attività erbicida.
Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 7 metri.
Si sconsiglia l'impiego di EQUIP® su varietà di mais dolce, vitreo da pop corn e su mais da seme.
Non impiegare il prodotto su colture trattate con geoinsetticidi fosforganici.
Evitare l'impiego del prodotto in miscela con esteri fosforici insetticidi. Si consiglia di effettuare saggi preliminari nel caso di applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Una volta ultimati i trattamenti erbicidi con EQUIP®, è necessario lavare in modo molto accurato le attrezzature:

- Dopo aver svuotato il serbatoio, risciacquare bene serbatoio, pompa e barra, quindi svuotare di nuovo.
- Riempire il serbatoio con acqua e candeggina (0,5 litri per ettolitro di acqua), risciacquare accuratamente serbatoio, pompa e barra mantenendo l'agitatore in funzione per alcuni minuti, quindi svuotare di nuovo.
- Eliminare i residui di candeggina risciacquando nuovamente serbatoio, pompa e barra con acqua pulita.
- Sia gli ugelli che i filtri devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Per sostituire una coltura di mais trattata con EQUIP®, è possibile seminare mais oppure soia. Non seminare pisello o fagiolo.
Nessuna limitazione per le colture in normale successione agronomica.

Avvertenze
Agitare prima dell'uso.
Da non applicare con mezzi aerei.
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Da non vendersi sfuso.
il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® Marchio registrato

EUPAREN® MULTI

Etichetta/foglio illustrativo

FUNGICIDA ORGANICO IN MICROGRANULI IDROSOSPENSIBILI

EUPAREN® MULTI

COMPOSIZIONE

100 g di Euparen Multi contengono:
50 g di tolilfluanide pura
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO

Tossico per inalazione. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - 20156 Milano - Viale Certosa 130 – Tel 02 3972 1
Officina di produzione: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); S.T.I. Solfotecnica Italiana – Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Salute n. 12088 del 04/02/2004
Contenuto netto: 50 g - 100 g – 200 g – 500 g - 1 kg
PARTITA N.

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

Impiegare il prodotto alla dose di 150 g/hl sulle seguenti colture:

Melo: contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis*) interventi ad intervalli di 7 giorni nei trattamenti primaverili e ad intervalli fino a 10 giorni in quelli estivi. Impiegato nel calendario anti ticchiolatura, Euparen Multi ha azione collaterale contro oidio (*Podosphaera leucotricha*).
Per le patologie da magazzino causate ad esempio da *Gloeosporium album, Alternaria alternata, Penicillium* sp., 2-3 trattamenti ad intervalli di 7 giorni in un calendario di pre-raccolta.

Pero: contro ticchiolatura (*Venturia pirina*), interventi ad intervalli di 7 giorni nei trattamenti primaverili e ad intervalli fino a 10 giorni in quelli estivi; contro maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*), interventi ad intervalli di 7 giorni.
Contro eriofide rugginoso (*Epitrimerus pyri*) impiegare Euparen Multi a partire da caduta petali (2 applicazioni con intervallo di 7 giorni).
Per le patologie di magazzino causate ad esempio da *Stemphylium vesicarium, Gloeosporium album, Alternaria alternata, Penicillium sp.*, 2-3 trattamenti ad intervalli di 7 giorni in un calendario di pre-raccolta.

Vite: contro peronospora (*Plasmopara viticola*) e con azione collaterale su botrite *(Botrytis cinerea)* ed oidio *(Uncinula necator)*, interventi ad intervalli di 7 giorni.

Fragola: contro botrite (*Botrytis cinerea*), interventi ad intervalli di 7 giorni.

Pomodoro: contro peronospora (*Phytophtora infestans*), alternaria (*Alternaria solani)* e botrite (*Botrytis cinerea*), interventi ad intervalli di 7 giorni.

Melanzana: contro botrite (*Botrytis cinerea*), interventi ad intervalli di 7 giorni.

Lattughe e simili, rucola: contro bremia (*Bremia lactucae)* e contro botrite (*Botrytis cinerea*), interventi ad intervalli di 7 giorni.

Melone, cocomero, zucchino e cetriolo: contro peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), interventi ad intervalli di 7 giorni.

Coltura	Dose f.c. (g/hl)	Dose max f.c. (kg/ha)
Melo, pero	150	2,25
Vite, fragola	150	1,5
Pomodoro	150	2,25
Melanzana	150	1,8
Lattughe e simili, rucola	150	1,5
Melone,cocomero, cetriolo, zucchino	150	1,5

® Marchio registrato

Bayer CropScience

NB: Il prodotto deve essere sciolto in acqua alla concentrazione indicata. Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua a metà; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione.
Le concentrazioni sono calcolate per irroratrici a volume normale. Nel caso di irroratrici a basso o ultrabasso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.
AVVERTENZE: non miscelare con prodotti liquidi, con oli minerali o zolfi.
Non impiegare prima di 20 giorni da trattamenti con oli minerali, polisolfuri o zolfi.

COMPATIBILITA': Euparen Multi è miscibile con gli antiparassitari formulati come polveri bagnabili e come microgranuli idrosospensibili a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per melo, pero, fragola, pomodoro, melanzana, zucchino e cetriolo; 7 giorni per lattughe e simili, rucola, 14 giorni per melone e cocomero e 21 giorni per vite.
Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 20 metri per pero e melo e 5 metri per vite.
Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie con filtri combinati di tipo A-P.
Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione irrorata sia completamente asciutta.
Per lavorazioni agricole da eseguirsi entro i tempi di carenza indossare guanti ed indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Ventilare accuratamente le serre trattate prima di accedervi.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare all'asciutto.

DPD 30.06.05

EUPAREN® MULTI

FUNGICIDA ORGANICO IN MICROGRANULI IDROSOSPENSIBILI
IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

EUPAREN® MULTI
COMPOSIZIONE
100 g di Euparen Multi contengono:
50 g di tolilfluanide pura
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per inalazione. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiete. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – 20156 Milano - Viale Certosa 130 – Tel. 02 3972.1
Officina di produzione: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); S.T.I. Solfotecnica Italiana – Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Salute n. 12088 del 04/02/2004
Contenuto netto: 100 g, 200 g, 250 g; 500 g; 1 kg; 1 kg (5 x 200 g; 4 x 250 g; 2 x 500 g); 3 kg (3 x 1 kg); 5 kg (5 x 1 kg)
PARTITA N.

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni
ISTRUZIONI PER L'USO
Impiegare il prodotto alla dose di 150 g in 100 l d'acqua (pari a un sacchetto da g 200 in 133 litri d'acqua)* sulle seguenti colture:
Melo: contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis*) interventi ad intervalli di 7 giorni nei trattamenti primaverili e ad intervalli fino a 10 giorni in quelli estivi. Impiegato nel calendario anti ticchiolatura, Euparen Multi ha azione collaterale contro oidio (*Podosphaera leucotricha).*
Per le patologie da magazzino causate ad esempio da *Gloeosporium album, Alternaria alternata, Penicililum* sp., 2-3 trattamenti ad intervalli di 7 giorni in un calendario di pre-raccolta.
Pero: contro ticchiolatura (*Venturia pirina)*, interventi ad intervalli di 7 giorni nei trattamenti primaverili e ad intervalli fino a 10 giorni in quelli estivi; contro maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium)*, interventi ad intervalli di 7 giorni.
Contro eriofide rugginoso (*Epitrimerus pyri*) impiegare Euparen Multi a partire da caduta petali (2 applicazioni con intervallo di 7 giorni).
Per le patologie di magazzino causate ad esempio da *Stemphylium vesicarium, Gloeosporium album, Alternaria alternata, Penicillium sp.*, 2-3 trattamenti ad intervalli di 7 giorni in un calendario di pre-raccolta.
Vite: contro peronospora (*Plasmopara viticola) e* con azione collaterale su botrite *(Botrytis cinerea)* ed oidio *(Uncinula necator)*, interventi ad intervalli di 7 giorni.
Fragola: contro botrite (*Botrytis cinerea)*, interventi ad intervalli di 7 giorni.
Pomodoro: contro peronospora (*Phytophtora infestans)*, alternaria (*Alternaria solani)* e botrite (*Botrytis cinerea)*, interventi ad intervalli di 7 giorni.
Melanzana: contro botrite (*Botrytis cinerea)*, interventi ad intervalli di 7 giorni.
Lattughe e simili, rucola: contro bremia (*Bremia lactucae)* e contro botrite (*Botrytis cinerea)*, interventi ad intervalli di 7 giorni.
Melone, cocomero, zucchino e cetriolo: contro peronospora (*Pseudoperonospora cubensis)*, interventi ad intervalli di 7 giorni.

Coltura	Dose f.c. (g/hl)	Dose max f.c. (kg/ha)
Melo, pero	150	2,25
Vite, fragola	150	1.5
Pomodoro	150	2,25
Melanzana	150	1.8
Lattughe e simili, rucola	150	1.5
Melone, cocomero, cetriolo, zucchino	150	1.5

NB: Il prodotto deve essere sciolto in acqua alla concentrazione indicata. Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua a metà; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione.
Le concentrazioni sono calcolate per irroratrici a volume normale. Nel caso di irroratrici a basso o ultrabasso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.
AVVERTENZE: non miscelare con prodotti liquidi, con oli minerali o zolfi.
Non impiegare prima di 20 giorni da trattamenti con oli minerali, polisolfuri o zolfi.

COMPATIBILITA': Euparen Multi è miscibile con gli antiparassitari formulati come polveri bagnabili e come microgranuli idrosospensibili a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per melo, pero, fragola, pomodoro, melanzana, zucchino e cetriolo; 7 giorni per lattughe e simili, rucola, 14 giorni per melone e cocomero e 21 giorni per vite.
Utiizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 20 metri per pero e melo e 5 metri per vite.
Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie con filtri combinati di tipo A-P.
Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione irrorata sia completamente asciutta.
Per lavorazioni agricole da eseguirsi entro i tempi di carenza indossare guanti ed indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Ventilare accuratamente le serre trattate prima di accedervi.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua

con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare all'asciutto.

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO

Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

oppure:

*

- pari a un sacchetto da g 100 in 66 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da g 250 in 166 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da g 500 in 333 litri d'acqua
- pari a un sacchetto da g 1000 in 666 litri d'acqua

DPD 30.06.05

BAYER Bayer CropScience

® Marchio registrato

FLINT®

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Granuli idrodisperdibili

Fungicida mesostemico per la difesa della vite, del melo, del pero, delle cucurbitacee e della rosa

FLINT®

COMPOSIZIONE

100 g di Flint contengono:
50 g di trifloxystrobin puro
coformulanti quanto basta a 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officina di produzione: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania)
Officina di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
Officina di produzione e confezionamento: S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione del Ministero della Salute n. 11119 del 06.12.2001
Contenuto netto: 3-5-15-20-30-50-100-150-250-500 g; 1 kg
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Sintomi aspecifici e rilevati solo su animali da laboratorio con surdosaggi.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

Flint è un fungicida a base di trifloxystrobin, molecola appartenente al gruppo degli oximinoacetati. La sostanza attiva è dotata di proprietà mesostemiche, presenta un'elevata affinità per la superficie della pianta e viene prontamente assorbita nello strato ceroso.

MODALITA' DI IMPIEGO E DOSI

Coltura	Patogeno	dose in g/hl	dose in g/ha	Modalità/epoca di applicazione
Vite	Oidio	12,5 - 15	125 -150	Trattamenti preventivi ad intervalli di 10-14 giorni
	Black-rot	15-25	150-250	Trattamenti preventivi ad intervalli di 10-14 giorni
Melo	Ticchiolatura	10 -15	150 -225	Trattamenti preventivi ad intervalli di 8-10 giorni fino a frutto noce e 10 -14 giorni dopo frutto noce
	Oidio	10 - 15	150 - 225	Trattamenti preventivi ad intervalli di 10 giorni
Pero	Ticchiolatura	10-15	150-225	Trattamenti preventivi ad intervalli di 10 giorni fino a frutto noce e 10-14 giorni dopo frutto noce
	Maculatura bruna	15	225	Trattamenti preventivi ad intervalli di 8-10 giorni
Cucurbitacee (cetriolo,melone, zucchini, anguria)	Oidii	15	150	Trattamenti preventivi a cadenza di 10 giorni
		25	250	Trattamenti preventivi a cadenza di 12-14 giorni
Rosa	Oidio	30 - 35	300- 350	Trattamenti preventivi a cadenza di 7 - 10 giorni

- Utilizzare le dosi più alte e gli intervalli più brevi nelle situazioni di alta pressione della malattia.
- In caso di impiego di volumi di acqua inferiori a 15 hl (pomacee) e 10 hl (vite, orticole), fare riferimento alla dose minima per ettaro consigliata. Per volumi di acqua superiori utilizzare la dose per ettolitro rispettando in ogni caso la dose massima per ettaro.
- Non effettuare più di 3 applicazioni per anno.
- Alle raccomandazioni di impiego per l'oidio della vite, Flint ha un effetto collaterale su muffa grigia.

Compatibilità: è possibile miscelare il prodotto con altri antiparassitari.

DPD 30.06.05

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: si consiglia di verificare preventivamente la compatibilità del prodotto in miscela. Inoltre su orticole e floricole, si raccomanda di eseguire saggi preliminari su piccole superfici onde rilevare l'eventuale sensibilità varietale.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta per la vite, 14 giorni prima della raccolta per melo e pero e 3 giorni prima della raccolta per cetriolo, zucchino, melone e anguria.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze - Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare al riparo dall'umidità.

BAYER Bayer CropScience

® marchio registrato

DPD 30.06.05

FOLICUR®SE ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

SUSPOEMULSIONE

FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERO), DRUPACEE (PESCO E NETTARINO, CILIEGIO, ALBICOCCO, SUSINO EUROPEO E SUSINO CINO-GIAPPONESE), VITE, NOCE E ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO, CEREALI (FRUMENTO E ORZO), TAPPETI ERBOSI, ORTICOLE (MELONE, CETRIOLO, COCOMERO, ZUCCA, ZUCCHINO, POMODORO, PEPERONE, ASPARAGO, CARCIOFO), ROSA

FOLICUR® SE

COMPOSIZIONE

g 100 di Folicur SE contengono:
g 4,35 di tebuconazolo puro (43,1 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

Frasi di rischio

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa, 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania),
IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG); Bayer CropScience France - Villefranche (Francia)
Officine di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG), SCB Marle-Sur-Serre (Francia)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10753 del 19.03.2001
Contenuto netto: ml 10-50-100-200-250-500; l 1-5-10
PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Pomacee (melo e pero):
- contro ticchiolatura (***Venturia inaequalis, Venturia pirina***): 0,23-0,29% (230-290 ml in 100 l di acqua) in miscela con fungicidi di copertura intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 gg fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15 gg, oppure curativamente entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione
- contro mal bianco del melo (***Podosphaera leucotricha***): 0,23-0,29% (230-290 ml in 100 l di acqua)
- contro maculatura bruna del pero (***Stemphylium vesicarium***): 0,29-0,43% (290-430 ml in 100 l di acqua)

Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco e nettarino, susino europeo)
- contro ***Monilia spp.* e *Botrytis cinerea***
1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 0,29 - 0,43% (290-430 ml in 100 l di acqua)
1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 gg tra di loro alla dose di 0,29-0,43% (290-430 ml in 100 l di acqua)
- contro mal bianco (***Sphaerotheca pannosa***): 0,29-0,43% (290-430 ml in 100 l di acqua)
- contro ruggine (***Tranzschelia pruni spinosae***) 1 o 2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 0,29% (290 ml in 100 l di acqua)

Susino cino-giapponese: contro ***Monilia spp.* e *Botrytis cinerea:*** 1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 gg tra di loro alla dose di 0,29-0.43% (290-430 ml in 100 l di acqua)

Vite: contro oidio (***Uncinula necator***): intervenire alla dose di 0,23% (230 ml in 100 l di acqua) ogni 10-14 gg in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione.

Noce ed altri fruttiferi a guscio: contro Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), necrosi apicale bruna (*Fusarium* spp., *Alternaria* spp., *Colletotrichum* spp., *Phomopsis* spp.): 2 trattamenti a distanza di 14 giorni a partire dalla fioritura, alla dose di 0,35% (350 ml in 100 l di acqua).

Cereali (frumento e orzo): intervenire alla dose di 5 l /ha posizionando il trattamento come di seguito:
- contro le "malattie del piede" (***Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis***) in fase di accestimento-levata
- contro oidio (***Erysiphe graminis***), ruggini (***Puccinia spp.***), ***Pyrenophora teres*, *Rhynchosporium secalis***, in fase di inizio levata-spigatura
- contro fusariosi della spiga (***Fusarium spp.***) in fase di piena fioritura
- contro Septoria (***Septoria spp.***) in fase di inizio levata-spigatura.

Colture orticole (melone, cetriolo, cocomero, zucca, zucchino, pomodoro, peperone, asparago, carciofo):
- contro oidio (***Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Leveillula taurica***): intervenire con intervallo di 7-10 giorni alla dose di 0,29% (290 ml in 100 l di acqua)
- contro ruggini e stemfiliosi dell'asparago (***Puccinia asparagi, Stemphylium vesicarium***) intervenire alla dose di 0,29% (290 ml in 100 litri d'acqua). Trattare esclusivamente durante la stagione vegetativa dopo la raccolta dei turioni

Rosa: contro oidio (***Sphaerotheca pannosa***), ticchiolatura (***Diplocarpon rosae***) e ruggini (***Phragmidium mucronatum***) intervenire con intervallo di 7-10 giorni alla dose di 0,35% (350 ml in 100 litri d'acqua)

Tappeti erbosi: contro ***Microdochium nivale, Sclerotinia homoeocarpa, Rhizoctonia solani*** alle dosi di 9 l/ha, pari a 0,9 l/1000 m^2 (in 100-200 litri d'acqua), intervenendo alla comparsa dei primi sintomi e successivamente dopo 10-20 giorni in funzione dell'andamento epidemico. E' obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.

Coltura	Parassita	Dose max f.c. (l/hl)	Volume d'acqua utilizzato (litri)	Dose max f.c. (l/ha)	N. max trattamenti
Melo	Ticchiolatura e oidio	0,29	1400-1800	5,22	4
Pero	Ticchiolatura Mac. bruna	0,29 0,43	1400-1600	4,64 6,88	4
Albicocco	Monilia, oidio, muffa grigia Ruggine	0,43 0,29	1200-1500	6,45 4,35	2
Ciliegio	Monilia, muffa grigia Ruggine	0,43 0,29	1200-1500	6,45 4,35	2
Pesco e nettarino	Monilia, oidio, muffa grigia Ruggine	0,43 0,29	1000-1500	6,45 4,35	2
Susino europeo	Monilia, muffa grigia Ruggine	0,43 0,29	1000-1500	6,45 4,35	2
Susino cino-giapponese	Monilia e muffa grigia	0,43	1000-1500	6,45	2
Noce ed altri fruttiferi a guscio	Antracnosi Necrosi apicale bruna	0,35	1200-1500	5,25	2
Vite	Oidio	0,23	1000	2,3	4
Frumento, orzo	Oidio, septoria, ruggini, fusariosi			5	1
Colture orticole	Oidio, ruggini	0,29	1000	2,9	4
	Ruggini e stemfiliosi dell'asparago	0,29	1000-1500	4,35	4
Rosa	Oidio, ticchiolatura, ruggini	0,35	1000	3,5	4
Tappeti erbosi	*Microdochium nivale, Sclerotinia homoeocarpa, Rhizoctonia solani*		1000-2000	9	2

Compatibilità: Folicur SE può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: su melo, in particolari condizioni climatiche, il prodotto può causare rugginosità.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per pomodoro, peperone, cetriolo e zucchino, 7 giorni per carciofo, cocomero, melone, zucca, pesco e nettarino, ciliegio, albicocco e susino; 14 giorni per vite; 15 giorni per pero; 30 giorni per melo. Per frumento e orzo sospendere i trattamenti a fine fioritura.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Conservare al riparo dal gelo.
Agitare prima dell'uso.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

Edizione del: 22.11.05

HUSSAR®

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI GRAMINACEE E DICOTILEDONI DEL FRUMENTO TENERO E DURO
GRANULI IDROSOLUBILI (WG)

HUSSAR®

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Iodosulfuron-metil-sodium puro 5 g
Mefenpir-dietile puro (antidoto) 15 g
Coformulanti q.b. a 100 g

Contiene: nafta solvente (petrolio), aromatica pesante.

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Rischio di gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione :
Bayer CropScience S.r.l. - viale Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officina di Produzione :
Bayer CropScience GmbH – Francoforte s/Meno - Germania

Registrazione n.11060 del 24/10/01 del Ministero della Salute
Contenuto netto: : : 0,1 – 0,2 - 0,3 – 0,6 – 1,8 – 3 kg

Partita n.:*

NORME DI SICUREZZA
Adoperare ad una distanza non inferiore a 3 metri dai corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Iodosulfuron-metil-sodium 5 % e Mefenpir-dietile 15 %, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
Iodosulfuron-metil-sodium: *//*
Mefenpir-dietile: (nell'animale da esperimento) sintomi aspecifici. Alterazione dei globuli rossi e della funzione epatica.
In caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico; togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con abbondante acqua e sapone; risciacquare immediatamente gli occhi con acqua abbondante per 15 minuti; non provocare il vomito.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Iodosulfuron-metil-sodium viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle infestanti trattate; subito dopo l'assorbimento, Iodosulfuron-metil-sodium blocca la crescita delle malerbe sensibili.
I sintomi dell'azione del prodotto sono caratterizzati da macchie clorotiche sulle foglie, seguite da necrosi dei germogli e dalla morte delle piante colpite che può avvenire in 4-6 settimane dall'intervento.
Condizioni ambientali favorevoli ad una buona crescita delle infestanti e della coltura accelerano il buon esito del trattamento erbicida.
Efficacia erbicida: HUSSAR® è attivo nei confronti delle seguenti infestanti:

- **Dicotiledoni**

Attaccamano (*Galium aparine*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Carota selvatica (*Daucus carota*), Centocchio (*Stellaria media*), Erba storna (*Thlaspi arvense*), Miagro (*Myagrum perfoliatum*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Ranuncolo dei campi (*Ranunculus arvensis*), Senape (*Sinapis arvensis*), Specchio di Venere (*Legousia speculum-veneris*), Stoppione (*Cirsium arvense*), Veronica comune (*Veronica persica*), Visnaga maggiore (*Ammi majus*).
Sono, inoltre, mediamente sensibili ad HUSSAR®:
Coriandolo fetido (*Bifora radians*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Veronica con foglie d'edera (*Veronica hederifolia*), Viola (*Viola arvensis e tricolor*)

- **Graminacee**

Falaride (*Phalaris brachystachys, P. paradoxa*), Loglio italico (*Lolium multiflorum*).

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Epoca di impiego
In post-emergenza del frumento tenero e duro, dalle tre foglie al primo nodo in levata. I migliori risultati si hanno intervenendo su infestanti graminacee dallo stadio di tre foglie al pieno accestimento e su infestanti dicotiledoni allo stadio di due-sei foglie.
Dosi d'impiego: 200 g/ha in 200-400 litri di acqua in associazione al coadiuvante BIOPOWER® alla dose di 1 l/ha.
Preparazione della poltiglia:
HUSSAR® alla dose stabilita deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito a circa un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; aggiungere BIOPOWER® e portare a volume il serbatoio, sempre mantenendo in movimento l'agitatore; eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE:
Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
  - Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
  - Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 l per hl di acqua. Risciacquare interamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora e ripetere l'operazione.
  - Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
  - Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, occorre attenersi alla dose riportata in etichetta ed è consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su varietà di frumento di recente introduzione, si consiglia un saggio preliminare prima di procedere ad applicazioni estese.

Colture in successione
Dopo un trattamento con HUSSAR® si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.
Effettuando un'aratura profonda, è possibile seminare o trapiantare broccolo, finocchio, lattuga, spinacio a distanza di 4 mesi dal trattamento con HUSSAR®, e bietola autunnale a distanza di 7 mesi. È sempre possibile la risemina del frumento sullo stesso appezzamento. Tutte le colture sono possibili l'anno seguente al trattamento, previa aratura profonda.
In caso di fallimento della coltura del frumento, si sconsiglia la semina di colture di sostituzione anche se preceduta da aratura.
In zone con clima arido, sono necessarie precipitazioni di almeno 100 mm tra il trattamento erbicida e l'impianto di una coltura successiva diversa dal frumento.

COMPATIBILITA'
HUSSAR® è compatibile con formulati a base di fenoxaprop-p-etile. In caso di miscela versare nella botte prima HUSSAR® e successivamente gli altri formulati.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

BAYER Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® Marchio registrato

HUSSAR® OF

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI GRAMINACEE E DICOTILEDONI DEL FRUMENTO TENERO E DURO
SUSPOSOLUZIONE

HUSSAR® OF

Composizione:

Iodosulfuron-metil-sodium puro	0,79 g (8 g/L)
Fenoxaprop-p-etile puro	6,32 g (64 g/L)
Mefenpir-dietile puro (antidoto)	2,37 g (24 g/L)
Coformulanti	q.b. a 100 g

Contiene Fenoxaprop – p- etile, alcool grasso etossilato: può provocare una reazione allergica.

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi e la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Registrazione n° 11061 del 24/10/01 del Ministero della Salute
Officina di produzione:
Bayer CropScience GmbH – Francoforte s/Meno - Germania
CONTENUTO NETTO: 1 - 1,25 – 2,5 - 3 - 5 - 10 L
Partita N°

NORME DI SICUREZZA
Adoperare ad una distanza non inferiore a 3 metri dai corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Iodosulfuron-metil-sodium 0,79 %, Fenoxaprop-p-etile 6,32 % e Mefenpir-dietile 2,37%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
Iodosulfuron-metil-sodium: //
Fenoxaprop-p-etile: (nell'animale da esperimento) passività, sonnolenza, assenza di equilibrio, posizione prona.
Mefenpir-dietile: (nell'animale da esperimento) sintomi aspecifici. Alterazione dei globuli rossi e della funzione epatica. In caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico; togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con abbondante acqua e sapone; risciacquare immediatamente gli occhi con acqua abbondante per 15 minuti; non provocare il vomito.
Trattamenti specifici: in caso di ingestione non provocare il vomito, somministrare prima di tutto 200 ml di olio di paraffina ed eseguire poi la lavanda gastrica con circa 4 l di acqua, terminare con carbone e solfato di sodio. Evitare l'aspirazione polmonare: Trattamenti sintomatici.
Controindicazioni: derivati dell'adrenalina. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Iodosulfuron-metil-sodium e Fenoxaprop-p-etile vengono rapidamente assorbiti da foglie e radici e traslocati agli apici vegetativi delle infestanti trattate; subito dopo l'assorbimento, bloccano la crescita delle malerbe sensibili.
I sintomi dell'azione del prodotto sono caratterizzati da macchie clorotiche sulle foglie, seguite da necrosi dei germogli e dalla morte delle piante colpite che può avvenire in 4-6 settimane dall'intervento.
Condizioni ambientali favorevoli ad una buona crescita delle infestanti e della coltura accelerano il buon esito del trattamento erbicida.
Efficacia erbicida: HUSSAR OF è attivo nei confronti delle seguenti infestanti:

- **Dicotiledoni**

Attaccamano (*Galium aparine*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Carota selvatica (*Daucus carota*), Centocchio (*Stellaria media),* Erba storna (*Thlaspi arvense*), Miagro (*Myagrum perfoliatum*), Papavero (*Papaver rhoeas),* Ranuncolo dei campi (*Ranunculus arvensis*), Senape (*Sinapis arvensis*), Specchio di Venere (*Legousia speculum-veneris*), Stoppione (*Cirsium arvense*), Veronica comune (*Veronica persica*), Visnaga maggiore (*Ammi majus).*
Sono, inoltre, mediamente sensibili ad HUSSAR OF:
Coriandolo fetido (*Bifora radians*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Veronica con foglie d'edera (*Veronica hederifolia*), Viola (*Viola arvensis e tricolor*).

- **Graminacee**

Avena (*Avena spp.*), Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Falaride (*Phalaris brachystachys, P. paradoxa*), Loglio italico (*Lolium multiflorum*).

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Epoca di impiego
In post-emergenza del frumento tenero e duro, dalle tre foglie al primo nodo in levata. I migliori risultati si hanno intervenendo su infestanti graminacee dallo stadio di tre foglie al pieno accestimento e su infestanti dicotiledoni allo stadio di due-sei foglie.
Dosi d'impiego: 1,25 l/ha in 200-400 litri di acqua in associazione al coadiuvante BIOPOWER® alla dose di 1 l/ha.
Preparazione della poltiglia:
HUSSAR OF alla dose stabilita deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito a circa un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; aggiungere BIOPOWER e portare a volume il serbatoio, sempre mantenendo in movimento l'agitatore; eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE:
Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
Non applicare il prodotto su colture sofferenti.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
- Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
  Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 l per hl di acqua. Risciacquare interamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora e ripetere l'operazione.
- Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
  Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, occorre attenersi alla dose riportata in etichetta ed è consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su varietà di frumento di recente introduzione, si consiglia un saggio preliminare prima di procedere ad applicazioni estese.
Colture in successione
Dopo un trattamento con HUSSAR OF si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.
Effettuando un'aratura profonda, è possibile seminare o trapiantare broccolo, finocchio, lattuga, spinacio a distanza di 4 mesi dal trattamento con HUSSAR OF e bietola autunnale a distanza di 7 mesi. È sempre possibile la risemina del frumento sullo stesso appezzamento. Tutte le colture sono possibili l'anno seguente al trattamento, previa aratura profonda.
In caso di fallimento della coltura del frumento, si sconsiglia la semina di colture di sostituzione anche se preceduta da aratura.
In zone con clima arido, sono necessarie precipitazioni di almeno 100 mm tra il trattamento erbicida e l'impianto di una coltura successiva diversa dal frumento.

COMPATIBILITA'
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nel caso di applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze
Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® Marchio registrato

LIBERTY®

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA SELETTIVO SU VARIETÀ IBRIDE DI MAIS ETICHETTATE "LIBERTY LINK "
CONCENTRATO SOLUBILE

COMPOSIZIONE

g 100 di Liberty® contengono:
g 11,3 di Glufosinate ammonio puro (=120 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Pronto soccorso
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone e togliere gli indumenti contaminati; se necessario chiamare un medico.
In caso di contatto con gli occhi, risciacquarsi immediatamente ed abbondantemente per 15 minuti con acqua, chiamare subito un medico.
In caso di ingestione, o a seguito di prolungata inalazione di polvere o vapori: chiamare subito un medico. In caso di ingestione indurre il vomito se il paziente è cosciente; mantenere libere le vie respiratorie.
Ulteriori informazioni per il medico:
Classe chimica: amminoacido fosfinico.
Sintomi di intossicazione: disturbi a livello di coscienza, tremori, spasmi e convulsioni dopo una latenza di diverse ore. Non inibisce le acetilcolinesterasi.
Indicazioni terapeutiche:
in caso di ingestione: lavanda gastrica con acqua, seguita da somministrazione di carbone animale e sodio solfato
in caso di intossicazione, qualunque sia la via di esposizione:
- 1 mg/kg di fenobarbital sodio i.m. o subcut. fino ad un massimo di 5 mg/kg/die. 10 mg/kg di diazepam i.v. al fine di prevenire e/o controllare spasmi e convulsioni
- la diuresi forzata e l'emodialisi sono risultate estremamente efficaci
- trattamenti con Atropina o Ossima (2-PAM o Tossigonina) sono controindicati

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche

LIBERTY è un erbicida ad assorbimento fogliare, attivo verso tutte le erbe infestanti graminacee e dicotiledoni, annuali e perennanti, presenti al momento del trattamento. Il prodotto viene facilmente assorbito dalle parti verdi delle erbe infestanti e, all'interno delle piante trattate, possiede una mobilità relativamente limitata. I primi sintomi dell'effetto del trattamento si manifestano dopo 3-5 giorni con un ingiallimento delle parti verdi delle erbe trattate, che nel volgere di 5-10 giorni necrotizzano e seccano completamente. Non ha alcuna efficacia residuale e pertanto non è attivo su erbe non emerse.
La selettività è limitata alle varietà ibride di mais che riportano in etichetta la denominazione "Liberty link". Su queste varietà il prodotto, utilizzato alle dosi di etichetta, è selettivo in qualsiasi stadio di sviluppo.

Campi e dosi di impiego

Mais

2,5-6,5 litri per ettaro, da distribuire in 100-300 litri di acqua in post-emergenza delle erbe infestanti.
Dosi di 2,5-4 litri/ettaro sono generalmente sufficienti su erbe dicotiledoni annuali allo stadio di 2-4 foglie e su graminacee annuali non accestite.
Dosi di 4-5 litri/ettaro sono indicate su erbe dicotiledoni allo stadio di 4-6 foglie e su graminacee all'inizio dell'accestimento.
Dosi di 5-6,5 litri/ettaro sono consigliate su erbe molto sviluppate, graminacee in accestimento, sorghetta da rizoma, cencio molle, convolvolo.
Nel caso di nuove nascite di erbe, o in presenza di infestanti perennanti, può risultare opportuno intervenire con un secondo trattamento di Liberty.

Avvertenze

Piogge cadute dopo 5-6 ore dal trattamento non condizionano l'attività erbicida.
La mobilità all'interno delle infestanti può essere migliorata eseguendo il trattamento nelle ore serali.

Compatibilità

Liberty si impiega generalmente da solo. E' possibile effettuare miscele estemporanee con altri erbicidi; si consiglia tuttavia di verificarne la compatibilità prima dell'uso.

Fitotossicità

Il prodotto è fitotossico su tutte le varietà di mais non contrassegnate in etichetta con la denominazione "Liberty link".

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non impiegare in prossimità dei corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel 02/3972.1
Registrazione n. 10323 del 08.02.2000 del Ministero della Sanità
Officina di produzione: SBM Formulation – St. Marcel – Marsiglia (Francia)
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.
Contenuto netto: 5 - 10 - 20 L
Partita n°.

Bayer CropScience
® Marchio registrato

DPD 30.06.05

LIBERTY ® 200

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA SELETTIVO SU VARIETÀ IBRIDE DI MAIS ETICHETTATE "LIBERTY LINK"

Concentrato solubile (SL)

LIBERTY® 200

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Glufosinate ammonio puro 18,02 g (= 200 g/l)
Coformulanti q.b. a 100.

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.
Irritante per gli occhi.

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare dell'Autorizzazione :
Bayer CropScience S.r.l. - viale Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officina di Produzione : SBM Formulation – St. Marcel - Marsiglia – (Francia)

Registrazione n. 10326 del 08.02.2000 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: 5 - 10 - 20 L

Partita n.:*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Pronto soccorso:
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone e togliere gli indumenti contaminati; se necessario chiamare un medico.
In caso di contatto con gli occhi, risciacquarsi immediatamente ed abbondantemente per 15 minuti con acqua, chiamare subito un medico.
In caso di ingestione, o a seguito di prolungata inalazione di polvere o vapori: chiamare subito un medico. In caso di ingestione indurre il vomito se il paziente e' cosciente; mantenere libere le vie respiratorie.
Ulteriori informazioni per il medico:
Classe chimica: amminoacido fosfinico.
Sintomi di intossicazione: disturbi a livello di coscienza, tremori, spasmi e convulsioni dopo una latenza di diverse ore. Non inibisce le acetilcolinesterasi.
Indicazioni terapeutiche:
In caso di ingestione: lavanda gastrica con acqua, seguita da somministrazione di carbone animale e sodio solfato
in caso di intossicazione, qualunque sia la via di esposizione:
-1 mg/kg di fenobarbital sodio i.m. o subcut. fino ad un massimo di 5 mg/kg/die. 10 mg/kg di diazepam i.v. al fine di prevenire e/o controllare spasmi e convulsioni
-la diuresi forzata e l'emodialisi sono risultate estremamente efficaci
-trattamenti con Atropina o Ossima (2-PAM o Tossigonina) sono controindicati
Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche
LIBERTY 200 è un erbicida ad assorbimento fogliare, attivo verso tutte le erbe infestanti graminacee e dicotiledoni, annuali e perennanti, presenti al momento del trattamento. Il prodotto viene facilmente assorbito dalle parti verdi delle erbe infestanti e, all'interno delle piante trattate, possiede una mobilità relativamente limitata. I primi sintomi dell'effetto del trattamento si manifestano dopo 3-5 giorni con un ingiallimento delle parti verdi delle erbe trattate, che nel volgere di 5-10 giorni necrotizzano e seccano completamente. Non ha alcuna efficacia residuale e pertanto non è attivo su erbe non emerse.
La selettività è limitata alle varietà ibride di mais che riportano in etichetta la denominazione "Liberty link". Su queste varietà il prodotto, utilizzato alle dosi di etichetta, è selettivo in qualsiasi stadio di sviluppo.

Campi e dosi di impiego
Mais
1,5-4 litri per ettaro, da distribuire in 100-300 litri di acqua in post-emergenza delle erbe infestanti.
Dosi di 1,5-2,5 litri/ettaro sono generalmente sufficienti su erbe dicotiledoni annuali allo stadio di 2-4 foglie e su graminacee annuali non accestite.
Dosi di 2,5-3 litri/ettaro sono indicate su erbe dicotiledoni allo stadio di 4-6 foglie e su graminacee all'inizio dell'accestimento.
Dosi di 3-4 litri/ettaro sono consigliate su erbe molto sviluppate, graminacee in accestimento, sorghetta da rizoma, cencio molle, convolvolo.
Nel caso di nuove nascite di erbe, o in presenza di infestanti perennanti, può risultare opportuno intervenire con un secondo trattamento di Liberty 200.
Avvertenze
Piogge cadute dopo 5-6 ore dal trattamento non condizionano l'attività erbicida.
La mobilità all'interno delle infestanti può essere migliorata eseguendo il trattamento nelle ore serali.

Compatibilità
Liberty 200 si impiega generalmente da solo. E' possibile effettuare miscele estemporanee con altri erbicidi; si consiglia tuttavia di verificarne la compatibilità prima dell'uso.

Fitotossicità
Il prodotto è fitotossico su tutte le varietà di mais non contrassegnate in etichetta con la denominazione "Liberty link".

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non impiegare in prossimità dei corsi d'acqua.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

LIZETAN® AE

Insetticida sistemico
Prodotto fitosanitario per piante da fiore e ornamentali da appartamento, balcone e giardino domestico.
AEROSOL

LIZETAN® AE

COMPOSIZIONE:
g 100 di LIZETAN AE contengono:
g 0,025 di Imidacloprid puro
solventi e propellenti quanto basta a 100

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

FRASI DI RISCHIO: Estremamente infiammabile.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento: BAYER S.p.A. – Filago (BG)
TOSVAR S.r.l. – Pozzo d'Adda (MI)

PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI
Registrazione del Ministero della Salute n.11593/PPO del 14.02.03
Contenuto netto: ml 250-400-500-600
Partita n°.:

NORME PRECAUZIONALI:
Recipiente sotto pressione; proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50° C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non erogare il prodotto in prossimità di una fiamma o di un apparecchio elettrico in funzione. Non contiene gas propellenti ritenuti dannosi per l'ozono. Evitare un uso eccessivo od improprio.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Lizetan AE è idoneo per il trattamento di piante ornamentali e da fiore, di tipo arbustivo ed erbaceo, annuali e perenni, coltivate in appartamento, balcone e in giardino domestico, per la lotta contro i seguenti parassiti:
Afidi *(Aphis spp., Macrosiphoniella chrysanthemi, Myzus persicae, Aulachortum solani).*
Aleurodidi: *Trialeurodes spp., Aleurodes spp.*
Tripidi: *Frankliniella occidentalis, Heliotrips spp.*
Coccinigile cotonose: *Pseudococcus sp., Phenacoccus spp.*
Cicaline*: Metcalfa pruinosa*
L'applicazione di Lizetan AE, aerosol pronto all'uso, viene effettuata mediante nebulizzazione da una distanza di 30-50 cm fino al gocciolamento delle superfici vegetali irrorate.
Il trattamento con Lizetan AE prima o all'inizio dell'attacco permette di ottenere un buon controllo dei parassiti sopraindicati.
Se necessario ripetere il trattamento.

Fitotossicità: dai dati disponibili il prodotto non è risultato fitotossico nei confronti delle principali varietà di piante floreali ed ornamentali. Comunque a causa della molteplicità di specie e varietà colturali e del rapido succedersi di varietà nel campo della floricoltura e della coltivazione delle piante ornamentali, non può essere esclusa l'insorgenza di fitotossicità nei confronti di specifiche varietà. Questo tipo di formulazione, come in generale tutte le formulazioni aerosol, può dare effetti indesiderati sul fiore.

Attenzione: il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per le api.

Precauzioni d'uso
Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

Attenzione. Da non impiegare in agricoltura o comunque su piante destinate all'alimentazione.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ACC

Bayer CropScience

BAYER CROPSCIENCE S.R.L. MILANO

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

LIZETAN® AL

Liquido pronto per l'uso
PRODOTTO FITOSANITARIO INSETTICIDA PER PIANTE DA FIORE E ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO, CONTRO LARVE DEFOGLIATRICI, PIDOCCHI ED ALTRI INSETTI

A sicura e rapida azione
Pronto all'uso
Non contiene gas propellenti

COMPOSIZIONE
g 100 di Lizetan® AL contengono:
g 0,005 di ciflutrin puro (0,05 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare soltanto nel recipiente originale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilita' da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonche' dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Il prodotto e' una formulazione pronta per l'uso, e quindi si impiega senza diluirlo con acqua, premendo il tasto della pompetta.
Nebulizzare il prodotto sulle piante e sui fiori, bagnando bene la vegetazione. In caso di necessità ripetere il trattamento dopo circa 10 giorni.

Precauzioni d'uso: se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

Attenzione. Da non impiegare in agricoltura o comunque su piante destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Conservare al riparo dal gelo.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Registrazione del Ministero della Salute n. 11496/PPO del 08.11.2002
PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI
Officine di produzione:
Bayer CropScience s.r.l. - Filago(BG)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo San Giovanni (BG)
Contenuto netto: 250-400-500-750-1000 ml
Partita n°

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

LIZETAN® Barriera

Insetticida-aficida sistemico per piante ornamentali e da fiore.
Il prodotto si impiega esclusivamente per la difesa delle piante ornamentali e da fiore, di tipo arbustivo ed erbaceo, perenni ed annuali, coltivate in vaso o altri contenitori in appartamento.
PASTIGLIA PER PIANTE PRONTA ALL'USO – g 2

COMPOSIZIONE
g 100 di Lizetan Barriera contengono:
g 2,5 di Imidacloprid
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
S.C.B. - Marle sur Serre (Francia)
PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI
Registrazione Ministero della Salute n. 11592/PPO del 14.02.03
Contenuto netto: blister da 10-20 pastiglie
Partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Un trattamento con LIZETAN Barriera prima o all'inizio dell'attacco permette di ottenere un buon controllo dei seguenti parassiti: afidi (*Macrosiphum rosae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aphis fabae, Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis spp., Aulacortum solani, Aphidula spp.*), aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci, Aleurodes spp.*), con buon effetto collaterale contro cocciniglie cotonose e cocciniglie (*Pseudococcus spp., Lecanium spp., Phenacoccus spp., Coccus spp.*). La protezione contro questi parassiti dura fino a tre mesi dopo il trattamento. L'efficacia completa si raggiunge dopo 2-4 settimane dal trattamento.
Se necessario ripetere il trattamento dopo 10-12 settimane.
Le pastiglie di LIZETAN Barriera devono essere interrate nel substrato colturale (vasi, altri contenitori) molto vicine alla pianta, ad una profondità di 1-3 cm circa.
La dose di impiego è in funzione della dimensione del vaso e del volume di substrato colturale

Diametro (in cm)	Volume substrato (in l)	Numero pastiglie
8 - 12	ca. 0,3 - 0,75	½
12 - 16	ca. 0,75 - 2,5	1
16 - 22	ca. 2,5 - 6	2
22 - 26	ca. 6 - 8	3
26 - 30	ca. 8 - 12	4

Allo scopo di migliorare l'efficacia del prodotto si consiglia di annaffiare bene le piante dopo il trattamento per facilitare lo scioglimento della pastiglia ed accelerare l'assorbimento del principio attivo in essa contenuto da parte delle piante.

Fitotossicità: dai dati disponibili il prodotto non è risultato fitotossico nei confronti delle principali varietà di piante floreali ed ornamentali. Comunque a causa della molteplicità di specie e varietà colturali e del rapido succedersi di varietà nel campo della coltivazione delle piante ornamentali, non può essere esclusa l'insorgenza di fitotossicità nei confronti di specifiche varietà.
Si consiglia di eseguire test preliminari.

Attenzione: il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per le api.

Precauzioni d'uso: se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione su zone circostanti la vegetazione. Evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

Attenzione. Da non impiegare in agricoltura o comunque su piante destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Conservare al riparo dall'umidità.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05/a

® Marchio registrato

LIZETAN® PLUS

Insetticida /acaricida

Prodotto fitosanitario per piante da fiore e ornamentali da appartamento, balcone e giardino domestico.

AEROSOL

LIZETAN® PLUS

COMPOSIZIONE:
g 100 di LIZETAN PLUS contengono:
g 0,025 di Imidacloprid puro
g 0,05 di Metiocarb puro
solventi e propellenti quanto basta a 100.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO

Estremamente infiammabile. Irritante per gli occhi

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, nè bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 – 20156 Milano Tel. 02/3972.1

Officine di produzione e confezionamento: BAYER S.P.A. – Filago (BG); Tosvar S.r.l. – Pozzo d'Adda (MI)

PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI

Registrazione del Ministero della Salute n.11594/PPO del 14.02.2003

Quantità netta del preparato: ml 250-300-400-500-600

Partita n°.:

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

NORME PRECAUZIONALI: Recipiente sotto pressione, proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50 °C. Non perforare nè bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non erogare il prodotto in prossimità di una fiamma o di un apparecchio elettrico in funzione. Non contiene gas propellenti ritenuti dannosi all'ozono. Evitare un uso eccessivo od improprio.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: 0,025 % di Imidacloprid puro; 0,05 % di Metiocarb puro le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

IMIDACLOPRID - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

METIOCARB - Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina.

Controindicazioni: ossime.

Terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Lizetan Plus è idoneo per il trattamento di piante ornamentali e da fiore, di tipo arbustivo ed erbaceo, annuali e perenni, coltivate in appartamento, balcone e in giardino domestico, per la lotta contro i seguenti parassiti:

Afidi: *Aphis spp., Macrosiphum spp., Macrosiphoniella spp., Myzus persicae, Aulachortum solani*
Aleurodidi: *Trialeurodes spp., Aleurodes spp., Bemisia tabaci*
Tripidi: *Frankliniella occidentalis, Thrips spp., Parthenothrips dracaenae, Heliotrips spp.*
Cocciniglie: *Saissetia hemispherica, Coccus spp., Lecanium spp.*
Cocciniglie cotonose: *Pseudococcus spp., Phenacoccus spp.*
Cicaline: *Typhlocyba rosae, Metcalfa pruinosa*
Lepidotteri: *Phytometra gamma*
Coleotteri: *Lilioceris lilii*
Cimici: *Lygus pabulinus*
Acari: *Tetranychus urticae*

L'applicazione di Lizetan Plus, aerosol pronto all'uso, viene effettuata mediante nebulizzazione da una distanza di 30-50 cm fino al gocciolamento delle superfici vegetali irrorate. Il trattamento con Lizetan Plus prima o all'inizio dell'attacco permette di ottenere un buon controllo dei parassiti.

Se necessario ripetere il trattamento dopo 7-10 giorni.

Fitotossicità: dai dati disponibili il prodotto non è risultato fitotossico nei confronti delle principali varietà di piante floreali ed ornamentali. Comunque a causa della molteplicità di specie e varietà colturali e del rapido succedersi di varietà nel campo della coltivazione delle piante ornamentali, non può essere esclusa l'insorgenza di fitotossicità nei confronti di specifiche varietà.

Questo tipo di formulazione, come in generale tutte le formulazioni aerosol, può dare effetti indesiderati sul fiore.

Attenzione - Il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per le api.

Precauzioni d'uso: se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione. Evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

Attenzione. Da non impiegare in agricoltura o comunque su piante destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ACC

3

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® marchio registrato

MERIT® GREEN

Etichetta / foglio illustrativo

insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE

Composizione:
g 100 di MERIT® GREEN contengono :
g 17,1 di principio attivo IMIDACLOPRID puro (200 g/l)
coformulanti q.b. a 100

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Latifoglie (trattamento endoterapico per iniezione al tronco): Merit Green può essere utilizzato su latifoglie (Platano e Ippocastano) mediante iniezioni al tronco, contro tingide del platano (*Corytucha ciliata*), afidi (*Aphis spp.*, *Periphyllus spp.*), microlepidotteri minatori (*Cameraria ohridella*) alla dose di 5 -10 ml di prodotto ogni metro di circonferenza del tronco, alla concentrazione di 0,7 % (7 ml / litro di acqua). Il trattamento viene eseguito iniettando la dose di prodotto direttamente nel tronco mediante attrezzature idonee. L'applicazione deve essere effettuata da personale specializzato. Per ottimizzare l'efficacia, si consiglia di trattare prima della comparsa dei fitofagi.
Floreali ed ornamentali: contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae)* e *Metcalfa pruinosa*: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*: 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Su floreali ed ornamentali in vaso e' possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.

Nocività: il prodotto è molto tossico per le api. Trattare in post-fioritura.
Compatibilità: Merit Green è miscibile con Oliocin.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. - Conservare al riparo dal gelo.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Registrazione Ministero della Sanita' n. 10603 del 10/10/2000

Officine di produzione: Bayer CropScience AG –Dormagen (Germania); Bayer CropScience S.r.l.-Filago (BG); Torre S.r.l.-Montalcino-Torrenieri (SI); IRCA Service S.p.A. Fornovo S. Giovanni (BG)
Officine di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG); Torre S.r.l.-Montalcino-Torrenieri (SI); SCB-Marle sur Serre (Francia); IRCA Service S.p.A. Fornovo S. Giovanni (BG)

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Contenuto netto: ml 5-7-10- 50-100-200-250-500; l 1-2-3-5
Partita n.

® Marchio registrato

Bayer CropScience

DPD 30.06.2005

Etichetta/foglio illustrativo

MELODY®

FUNGICIDA SISTEMICO PER LA VITE
MICROGRANULI IDRODISPERDIBILI

MELODY®
COMPOSIZIONE
g 100 di Melody contengono:
g 51 di iprovalicarb puro
coformulanti quanto basta a 100
Contiene dodecilpirrolidone: puo' causare una reazione allergica

Frasi di rischio
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non disperdere nell'ambiente, riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Milano - Viale Certosa 130 – Tel. 02/3972.1

Officina di produzione : Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)

Officine di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG);
STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Salute n.11254 del 28.03.2002

Contenuto netto: 10-20-50-100-200-500 g; 1-2-3-5-10-20-25 kg

Partita N.:

Informazioni per il medico
IPROVALICARB
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
VITE: contro peronospora (*Plasmopara viticola*)
Intervenire alla dose di 24-30 g/hl (0,024-0,03 %) esclusivamente in miscela con un antiperonosporico ad azione preventiva e a meccanismo d'azione diverso, come ad esempio un ditiocarbammato, rame o folpet. Questa dose è calcolata per irroratrici a volume normale e quantitativi di acqua di 1000 litri/ha. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.
Per garantire una buona difesa, soprattutto del grappolo, se ne consiglia l'impiego preventivo all'interno di un calendario a turno fisso di 7-10 giorni secondo la dose e l'andamento stagionale. Utilizzare l'intervallo più lungo con la dose maggiore e nelle situazioni climatiche meno favorevoli alla malattia. Il prodotto può essere anche impiegato con un criterio curativo, intervenendo entro il 25 % del periodo d'incubazione.
Non effettuare più di 5 interventi all'anno.
Durante l'applicazione del prodotto, indossare tuta protettiva e guanti adatti.
Compatibilità: Melody può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze - Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. - Conservare al riparo dall'umidità.

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

Bayer CropScience

MELODY®

FUNGICIDA SISTEMICO PER LA VITE
MICROGRANULI IDRODISPERDIBILI IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

MELODY®
COMPOSIZIONE
g 100 di Melody contengono:
g 51 di iprovalicarb puro
coformulanti quanto basta a 100
Contiene dodecilpirrolidone: puo' causare una reazione allergica

Frasi di rischio
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non disperdere nell'ambiente, riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Milano - Viale Certosa 130 – Tel. 02/3972.1

Officina di produzione : Bayer CropScience AG. – Dormagen (Germania)
Officine di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG);
STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Salute n.11254 del 28.03.2002

Contenuto netto: 50 g; 100 g; 100 g (2 x 50 g); 200 g; 200 g (4 x 50 g); 250 g; 250 g (5 x 50 g); 500 g; 500g (10 x 50 g); 1 kg; 1 kg (10 x 100 g; 5 x 200 g; 4 x 250 g; 2 x 500 g); 2 kg (2 x 1 kg); 3 kg (3 x 1 kg); 5 kg (5 x 1kg); 10 kg (10 x 1 kg)

Partita N.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
IPROVALICARB
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
VITE: contro peronospora (*Plasmopara viticola*)
Intervenire alla dose di 24-30 g/hl (0,024-0,03 %) pari a un sacchetto da g 100 in 416-333 litri di acqua* esclusivamente in miscela con un antiperonosporico ad azione preventiva e a meccanismo d'azione diverso, come ad esempio un ditiocarbammato, rame o folpet. Questa dose è calcolata per irroratrici a volume normale e quantitativi di acqua di 1000 litri/ha.
In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.
Per garantire una buona difesa, soprattutto del grappolo, se ne consiglia l'impiego preventivo all'interno di un calendario a turno fisso di 7-10 giorni secondo la dose e l'andamento stagionale. Utilizzare l'intervallo più lungo con la dose maggiore e nelle situazioni climatiche meno favorevoli alla malattia. Il prodotto può essere anche impiegato con un criterio curativo, intervenendo entro il 25 % del periodo d'incubazione.
Non effettuare più di 5 interventi all'anno.

Durante l'applicazione del prodotto, indossare tuta protettiva e guanti adatti.

Compatibilita': Melody puo' essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze - Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. - Conservare al riparo dall'umidità.

*oppure
- pari a un sacchetto da g 50 in 208-167 litri di acqua
- pari a un sacchetto da g 200 in 800-650 litri di acqua
- pari a un sacchetto da g 250 in 1000-800 litri di acqua
- pari a un sacchetto da g 500 in 2000-1700 litri di acqua
- pari a un sacchetto da kg 1 in 4200-3300 litri di acqua

® Marchio registrato

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO

Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

MELODY® CARE

etichetta/foglio illustrativo

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO IN POLVERE BAGNABILE

MELODY® CARE

COMPOSIZIONE

100 g di Melody Care contengono:
6 g di iprovalicarb puro
37,5 g di folpet puro
coformulanti quanto basta a 100
Contiene folpet e dodecilpirrolidone: può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO

Irritante per le vie respiratorie.
Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.
Rischio di gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Milano - Viale Certosa, 130 – Tel 02/3972.1

Officine di produzione e confezionamento:
Bayer Cropscience AG – Dormagen (Germania),
Bayer CropScience S.r.l. Filago (BG);
STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)

Officina di confezionamento:
S.C.B. – Marle Sur Serre (Francia)

Contenuto netto: 10-20-50-100-200-500 g; 1-2-3 -5 -10-20-25 kg

Registrazione Ministero della Salute n. 11402 del 17/07/2002

Partita n.:

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
6 % di Iprovalicarb puro
37,5% di Folpet puro
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione

IPROVALICARB
Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.

FOLPET
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Vite: contro peronospora (*Plasmopara viticola*)
Intervenire alla dose di 200 - 250 g/hl. Questa dose è calcolata per irroratrici a volume normale e quantitativi di acqua di 1000 litri/ha.
In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro (2-2,5 kg/ha); si consiglia l'impiego di Melody Care in un calendario preventivo a turno fisso con un intervallo tra i trattamenti di 10-12 giorni.
Non effettuare più di 5 trattamenti all'anno.

Compatibilità: Melody Care è miscibile con antiparassitari a reazione neutra. Non è miscibile con poltiglia bordolese, polisolfuri e olii bianchi.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE – Durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione del prodotto adoperare tuta protettiva e guanti adatti.

Adoperare ad una distanza non inferiore a 20 metri dai corsi d'acqua.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. - Conservare al riparo dall'umidità.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

MELODY® CARE

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO
IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

MELODY® CARE
COMPOSIZIONE
100 g di Melody Care contengono:
6 g di iprovalicarb puro
37,5 g di folpet puro
coformulanti quanto basta a 100
Contiene folpet e dodecilpirrolidone: può provocare una reazione allergica.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie.
Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.
Rischio di gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Milano - Viale Certosa, 130 – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento:
Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania), Bayer CropScience S.r.l. Filago (BG);
STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Officina di confezionamento:
S.C.B. – Marle Sur Serre (Francia)
Contenuto netto: 50 g; 100 g; 100 g (2 x 50 g); 200 g; 200 g (4 x 50 g); 250 g; 250 g (5 x 50 g); 500 g; 500g (10 x 50 g); 1 kg; 1 kg (10 x 100 g; 5 x 200 g; 4 x 250 g; 2 x 500 g); 2 kg (2 x 1 kg); 3 kg (3 x 1 kg); 5 kg (5 x 1kg); 7 kg (7 x 1 kg); 8 kg (8 x 1 kg; 16 x 500 g); 10 kg (10 x 1 kg); 12 kg (12 x 1 kg).
Registrazione Ministero della Salute n. 11402 del 17/07/2002
Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
6 % di Iprovalicarb puro
37,5% di Folpet puro
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
IPROVALICARB
Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
FOLPET
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Vite: contro peronospora (*Plasmopara viticola*)
Intervenire alla dose di 200 - 250 g/hl (pari a 1 sacchetto da 250 g in 125-100 litri d'acqua)*. Questa dose è calcolata per irroratrici a volume normale e quantitativi di acqua di 1000 litri/ha. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro (2-2,5 kg/ha); si consiglia l'impiego di Melody Care in un calendario preventivo a turno fisso con un intervallo tra i trattamenti di 10-12 giorni. Non effettuare più di 5 trattamenti all'anno.

Compatibilità: Melody Care è miscibile con antiparassitari a reazione neutra. Non è miscibile con poltiglia bordolese, polisolfuri e olii bianchi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE – Durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione del prodotto adoperare tuta protettiva e guanti adatti. Adoperare ad una distanza non inferiore a 20 metri dai corsi d'acqua.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DPD 30.06.05

Avvertenze: Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. - Conservare al riparo dall'umidità.

oppure:

- pari a 1 sacchetto da 50 g in 25-20 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 100 g in 50-40 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 200 g in 100-80 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 500 g in 250-200 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 1000 g in 500-400 litri di acqua

Bayer CropScience

® Marchio registrato

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO

Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

DPD 30.06.05

MELODY® COMPACT

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO IN POLVERE BAGNABILE

MELODY® COMPACT
COMPOSIZIONE
100 g di Melody Compact contengono :
4,2 g di Iprovalicarb puro
35,6 g di ossicloruro di rame tecnico (pari a 20,3 g di rame metallo puro)
coformulanti quanto basta a 100
FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130, 20156 Milano – Tel.02/3972.1
Officina di produzione: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania)
Officina di confezionamento: S.C.B. – Marle Sur Serre (Francia)
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG);
S.T.I. Solfotecnica Italiana – Cotignola (RA)

Registrazione del Ministero della Salute N. 11403 del 17.07.2002
Contenuto netto: 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 250, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
4,2 % di Iprovalicarb puro
35,6 % di ossicloruro di rame tecnico (pari a 20,3 % di rame metallo puro)
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
IPROVALICARB
Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
OSSICLORURO DI RAME
Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
VITE: contro peronospora (*Plasmopera viticola*)
Intervenire alla dose di 300 – 350 g/hl. Per garantire una difesa efficace se ne consiglia l'impiego preventivo a intervalli tra i trattamenti di 7-10 giorni secondo la dose e l'andamento stagionale. Utilizzare l'intervallo più lungo con la dose maggiore e nelle situazioni climatiche meno favorevoli alla malattia.
PATATA E POMODORO: contro peronospora (*Phytophthora infestans*). Intervenire impiegando il prodotto preventivamente alla dose di 300 - 400 g/hl ogni 7 giorni.
LATTUGHE E SIMILI, RUCOLA: contro peronospora (*Bremia Lactucae*). Intervenire impiegando il prodotto preventivamente alla dose di 300-400 g/hl ogni 7 giorni.
MELONE E COCOMERO: contro peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*). Intervenire impiegando il prodotto preventivamente alla dose di 300-400 g/hl ogni 7 giorni.
CIPOLLA: contro peronospora (*Peronospora destructor*). Intervenire impiegando il prodotto preventivamente alla dose di 300-400 g/hl ogni 7 giorni.

Non effettuare più di 5 trattamenti all'anno.
NB: le dosi sono calcolate per irroratrici a volume normale e quantitativi di acqua di 1000 litri/ha. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.

Compatibilità: Melody Compact può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

DPD 30.06.05

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto per vite; 7 giorni prima del raccolto per patata, lattughe e simili, rucola, cipolla, melone e cocomero; 20 giorni prima del raccolto in campo e 7 giorni prima del raccolto in serra per pomodoro.

Adoperare ad una distanza non inferiore a 20 metri dai corsi d'acqua.
Durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione del prodotto adoperare tuta protettiva e guanti adatti.

ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AVVERTENZE - Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Conservare al riparo dall'umidità.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

MELODY® COMPACT

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO
IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

MELODY® COMPACT
COMPOSIZIONE
100 g di Melody Compact contengono:
4,2 g di Iprovalicarb puro
35,6 g di ossicloruro di rame tecnico (pari a 20,3 g di rame metallo puro)
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130, 20156 Milano – Tel.02/3972.1
Officina di produzione: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania)
Officina di confezionamento: S.C.B. – Marle Sur Serre (Francia)
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG);
S.T.I. Solfotecnica Italiana – Cotignola (RA)
Registrazione del Ministero della Salute N. 11403 del 17.07.2002
Contenuto netto: 50 g; 100 g; 100 g (2 x 50 g); 200 g; 200 g (4 x 50 g); 250 g; 250 g (5 x 50 g); 500 g; 500 g (10 x 50 g); 1 kg; 1 kg (10 x 100 g; 5 x 200 g; 4 x 250 g; 2 x 500 g); 2 kg (2 x 1 kg); 3 kg (3 x 1 kg); 5 kg (5 x 1 kg); 7 kg (7 x 1 kg); 8 kg (8 x 1 kg; 16 x 500 g); 10 kg (10 x 1 kg); 12 kg (12 x 1 kg)
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
4,2 % di Iprovalicarb puro
35,6 % di ossicloruro di rame tecnico (pari a 20,3 % di rame metallo puro)
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
IPROVALICARB
Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
OSSICLORURO DI RAME
Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
VITE: contro peronospora (*Plasmopara viticola*)
Intervenire alla dose di 0,3-0,35 % (300-350 g in 100 l di acqua, pari a 1 sacchetto da 250 g in 83-71 litri di acqua)*. Per garantire una difesa efficace se ne consiglia l'impiego preventivo a intervalli tra i trattamenti di 7-10 giorni secondo la dose e l'andamento stagionale. Utilizzare l'intervallo più lungo con la dose maggiore e nelle situazioni climatiche meno favorevoli alla malattia.
PATATA E POMODORO: contro peronospora (*Phytophthora infestans*). Intervenire impiegando il prodotto preventivamente alla dose di 0,3-0,4 % (300-400 g in 100 l di acqua, pari a 1 sacchetto da 250 g in 83-62 l di acqua)** ogni 7 giorni.
LATTUGHE E SIMILI, RUCOLA: contro peronospora (*Bremia Lactucae*). Intervenire impiegando il prodotto preventivamente alla dose di 0,3-0,4 % (300-400 g in 100 l di acqua, pari a 1 sacchetto da 250 g in 83-62 l di acqua)** ogni 7 giorni.
MELONE E COCOMERO: contro peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*). Intervenire impiegando il prodotto preventivamente alla dose di 0,3-0,4 % (300-400 g in 100 l di acqua, pari a 1 sacchetto da 250 g in 83-62 l di acqua)** ogni 7 giorni.
CIPOLLA: contro peronospora (*Peronospora destructor*). Intervenire impiegando il prodotto preventivamente alla dose di 0,3-0,4 % (300-400 g in 100 l di acqua, pari a 1 sacchetto da 250 g in 83-62 l di acqua)** ogni 7 giorni.

Non effettuare più di 5 trattamenti all'anno.
NB: le dosi sono calcolate per irroratrici a volume normale e quantitativi di acqua di 1000 litri/ha. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.
Compatibilità: Melody Compact può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto per vite; 7 giorni prima del raccolto per patata, lattughe e simili, rucola, cipolla, melone e cocomero; 20 giorni prima del raccolto in campo e 7 giorni prima del raccolto in serra per pomodoro.
Adoperare ad una distanza non inferiore a 20 metri dai corsi d'acqua.
Durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione del prodotto adoperare tuta protettiva e guanti adatti.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
AVVERTENZE: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le

DPD 30.06.05

norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Conservare al riparo dall'umidità

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO

Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

oppure:

*

- pari a 1 sacchetto da 50 g in 17-14 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 100 g in 33-29 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 200 g in 67-57 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 500 g in 167-143 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 1000 g in 333-286 litri di acqua

**

- pari a 1 sacchetto da 50 g in 17-12 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 100 g in 33-25 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 200 g in 67-50 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 500 g in 167-125 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 1000 g in 333-250 litri di acqua

BAYER Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

MELODY® MED

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO IN POLVERE BAGNABILE

MELODY® MED

COMPOSIZIONE

100 g di Melody Med contengono:
6 g di Iprovalicarb puro
60 g di Mancozeb puro
coformulanti quanto basta a 100
Contiene mancozeb: può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO

Irritante per le vie respiratorie. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130, 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officina di produzione: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Officina di confezionamento: S.C.B. – Marle Sur Serre (Francia)
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Salute n. 11436 del 17.09.2002
Contenuto netto: 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g; 1kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
6 % di Iprovalicarb puro
60 % di Mancozeb puro
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
IPROVALICARB
Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
MANCOZEB
Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica.
Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

VITE: contro peronospora (*Plasmopara viticola*)
Intervenire alla dose di 200 - 250 g/hl. Questa dose è calcolata per irroratrici a volume normale e quantitativi di acqua di 1000 litri/ha. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.
Per garantire una difesa efficace se ne consiglia l'impiego preventivo a intervalli tra i trattamenti di 8-12 giorni secondo la dose e l'andamento stagionale. Utilizzare l'intervallo più lungo con la dose maggiore e nelle situazioni climatiche meno favorevoli alla malattia.
Non effettuare più di 5 trattamenti all'anno.
Il prodotto va applicato esclusivamente mediante trattori cabinati. Durante le operazioni di miscelazione e carico, adoperare tuta e guanti.
NON IMPIEGARE IN SERRA
Compatibilità: Melody Med può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto
Adoperare ad una distanza non inferiore a 10 metri dai corsi d'acqua.
Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze - Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. - Conservare al riparo dall'umidità

® Marchio registrato

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

MELODY® MED

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

MELODY® MED
COMPOSIZIONE
100 g di Melody Med contengono:
6 g di Iprovalicarb puro
60 g di Mancozeb puro
coformulanti quanto basta a 100
Contiene mancozeb: può provocare una reazione allergica.
FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130, 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officina di produzione: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Officina di confezionamento: S.C.B. – Marle Sur Serre (Francia)
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Salute n. 11436 del 17.09.2002
Contenuto netto: 50 g; 100 g; 100 g (2 x 50 g); 200 g; 200 g (4 x 50 g); 250 g; 250 g (5 x 50 g); 500 g; 500 g (10 x 50 g); 1 kg; 1 kg (10 x 100 g; 5 x 200 g; 4 x 250 g; 2 x 500 g); 2 kg (2 x 1 kg); 3 kg (3 x 1 kg); 5 kg (5 x 1kg); 7 kg (7 x 1 kg); 8 kg (8 x 1 kg; 16 x 500 g);10 kg (10 x 1 kg); 12 kg (12 x 1 kg)
Partita n.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
6 % di Iprovalicarb puro
60 % di Mancozeb puro
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
IPROVALICARB
Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
MANCOZEB
Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica.
Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.
ISTRUZIONI PER L'USO
VITE: contro peronospora (*Plasmopara viticola*)
Intervenire alla dose di 0,2-0,25 % (200-250 g in 100 l di acqua, pari a 1 sacchetto da 250 g in 125-100 litri d'acqua)*.
Questa dose è calcolata per irroratrici a volume normale e quantitativi di acqua di 1000 litri/ha. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.
Per garantire una difesa efficace se ne consiglia l'impiego preventivo a intervalli tra i trattamenti di 8-12 giorni secondo la dose e l'andamento stagionale. Utilizzare l'intervallo più lungo con la dose maggiore e nelle situazioni climatiche meno favorevoli alla malattia.
Non effettuare più di 5 trattamenti all'anno.
Il prodotto va applicato esclusivamente mediante trattori cabinati. Durante le operazioni di miscelazione e carico, adoperare tuta e guanti.
NON IMPIEGARE IN SERRA
Compatibilità: Melody Med può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto
Adoperare ad una distanza non inferiore a 10 metri dai corsi d'acqua.
ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze - Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle

DPD 30.06.05

acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. - Conservare al riparo dall'umidità.

oppure:
*
- pari a 1 sacchetto da 50 g in 25-20 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 100 g in 50-40 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 200 g in 100-80 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 500 g in 250-200 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 1000 g in 500-400 litri di acqua

® Marchio registrato

Bayer CropScience

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

DPD 30.06.05

MELODY® TRIO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO IN POLVERE BAGNABILE

MELODY® TRIO

COMPOSIZIONE

100 g di Melody Trio contengono:
3,4 g di Iprovalicarb puro
28,6 g di Mancozeb puro
37,1 g di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100
Contiene mancozeb ed esametilentetramina: può provocare una reazione allergica.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Irritante per le vie respiratorie. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa, 130 - 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officine di confezionamento: S.C.B. – Marle Sur Serre (Francia)
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania); S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Salute n. 11437 del 17.09.2002
Contenuto netto: 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g; 1kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
3,4 % di Iprovalicarb puro
28,6 % di Mancozeb puro
37,1 % di Fosetil Alluminio puro
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
IPROVALICARB
Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
MANCOZEB
Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica.
Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
FOSETIL ALLUMINIO
Sintomi: sedazione, dispnea, depressione.
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

VITE: contro peronospora (*Plasmopara viticola*)
Intervenire alla dose di 350 g/hl. Questa dose è calcolata per irroratrici a volume normale e quantitativi di acqua di 1000 litri/ha. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro (3,5 kg/ha).
Il prodotto può essere applicato in trattamenti curativi intervenendo entro 2 giorni dalla pioggia infettante (corrispondente a circa il 25 % del periodo di incubazione).
Per ottenere la migliore protezione, se ne consiglia l'uso in un calendario preventivo con intervallo tra i trattamenti di 10-14 giorni. Utilizzare l'intervallo più lungo nelle condizioni climatiche meno favorevoli allo sviluppo del patogeno.
Non effettuare più di 5 trattamenti all'anno.

NON IMPIEGARE IN SERRA

Compatibilità: Melody Trio è miscibile con antiparassitari a reazione neutra. Il prodotto non è miscibile con poltiglia bordolese e olii minerali. In caso di miscela con concimi fogliari si consiglia di eseguire prove preliminari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Avvertenza: sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.
Adoperare ad una distanza non inferiore a 10 metri dai corsi d'acqua.
Durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione del prodotto adoperare tuta protettiva e guanti adatti.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. . Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare al riparo dall'umidità.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05
® marchio registrato

MELODY® TRIO

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO
IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

MELODY® TRIO

COMPOSIZIONE
100 g di Melody Trio contengono:
3,4 g di Iprovalicarb puro
28,6 g di Mancozeb puro
37,1 g di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100
Contiene mancozeb ed esametilentetramina: può provocare una reazione allergica.

IRRITANTE

Frasi di rischio
Irritante per le vie respiratorie. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa, 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officine di confezionamento: S.C.B. – Marle Sur Serre (Francia)
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG) : Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania); S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Salute N. 11437 del 17.09.2002
Contenuto netto: 50 g; 100 g; 100 g (2 x 50 g); 200 g; 200 g (4 x 50 g); 250 g; 250 g (5 x 50 g); 500 g; 500 g (10 x 50 g); 1 kg; 1 kg (10 x 100 g; 5 x 200 g; 4 x 250 g; 2 x 500 g); 2 kg (2 x 1 kg); 3 kg (3 x 1 kg); 5 kg (5 x 1kg); 7 kg (7 x 1 kg); 8 kg (8 x 1 kg; 16 x 500 g); 10 kg (10 x 1 kg); 12 kg (12 x 1 kg)
Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
3,4 % di Iprovalicarb puro
28,6 % di Mancozeb puro
37,1 % di Fosetil Alluminio puro
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

IPROVALICARB
Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
MANCOZEB
Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica.
Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
FOSETIL ALLUMINIO
Sintomi: sedazione, dispnea, depressione.
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
VITE: contro peronospora (*Plasmopara viticola*)
Intervenire alla dose di 350 g/hl (pari a un sacchetto da 250 g in 71 litri d'acqua)*. Questa dose è calcolata per irroratrici a volume normale e quantitativi di acqua di 1000 litri/ha. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro (3,5 kg/ha).
Il prodotto può essere applicato in trattamenti curativi intervenendo entro 2 giorni dalla pioggia infettante (corrispondente a circa il 25 % del periodo di incubazione).
Per ottenere la migliore protezione, se ne consiglia l'uso in un calendario preventivo con intervallo tra i trattamenti di 10-14 giorni. Utilizzare l'intervallo più lungo nelle condizioni climatiche meno favorevoli allo sviluppo del patogeno.
Non effettuare più di 5 trattamenti all'anno.
NON IMPIEGARE IN SERRA
Compatibilità: Melody Trio è miscibile con antiparassitari a reazione neutra. Il prodotto non è miscibile con poltiglia bordolese e olii minerali. In caso di miscela con concimi fogliari si consiglia di eseguire prove preliminari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Avvertenza: sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.
Adoperare ad una distanza non inferiore a 10 metri dai corsi d'acqua.
Durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione del prodotto adoperare tuta protettiva e guanti adatti.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare al riparo dall'umidità

oppure:
*
- pari a 1 sacchetto da 50 g in 14 litri ci acqua
- pari a 1 sacchetto da 100 g in 29 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 200 g in 57 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 500 g in 143 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 1000 g in 286 litri di acqua

Bayer CropScience

DPD 30.06.05
® marchio registrato

MESUROL® M PLUS

etichetta/foglio illustrativo

ESCA LUMACHICIDA GRANULARE PER LA DISTRUZIONE DI LIMACCE - LUMACHE - CHIOCCIOLE E GASTEROPODI IN GENERE

Esca ricca di proteine attrattive - Resiste nel tempo
Contiene una sostanza repellente al gusto per l'uomo e gli animali domestici.

COMPOSIZIONE
g 100 di MESUROL® M PLUS contengono:
g 5 di metaldeide pura
g 0,03 di denatonium benzoato
coformulanti q.b. 100

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica uomo: circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria.
Postumi: danni epatici e renali.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
L'esca granulare **Mesurol M Plus** va sparsa a spaglio, a file o a mucchietti, preferibilmente di sera, dopo eventuale pioggia o annaffiatura, con terreno comunque umido coltivato a: asparago, bietola da orto e da coste, carciofo, carota, cavolfiore, cavolo, cavolo di Bruxelles, cavolo broccolo, cavolo verza, cetriolo, cipolla, cocomero, fagiolini, fava, finocchio, indivia, lattughe, melanzane, melone, patata, peperone, pisello, pomodoro, porro, rapa, ravanello, sedano, spinacio, zucca, zucchini.
- 100-300 g per ogni 100 m^2 di superficie a seconda del grado di infestazione;
- 2-3 g (pochi granuli) attorno alle piante per trattamenti singoli.

Per evitare infestazioni dall'esterno, distribuire il prodotto lungo i margini delle aree da proteggere.
Mesurol M Plus distrugge limacce, lumache, chiocciole e gasteropodi in genere infestanti le colture sopra citate.
Mesurol M Plus attira con le proteine contenute nell'esca i molluschi; non fermenta non ammuffisce, non viene dilavato dalle piogge, non viene asportato dal vento; è di facile e pratico impiego.
COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo.
RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici e il bestiame.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. - Conservare al riparo dall'umidità.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Registrazione Ministero della Sanità n. 12325 del 17.11.2004
Officine di produzione: L.I.F.A. s.r.l. - Vigonovo (VE) / **L.I.F.A. s.r.l.** - Isola Vicentina (VI)
Officina di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
Contenuto netto: 100 - 200 - 250 - 500 g / 1 - 5 - 10 - 25 kg
Partita n°

Bayer CropScience
® marchio registrato

DPD 30.06.05

MESUROL® LUMACHE

PER LA DISTRUZIONE DI LUMACHE, CHIOCCIOLE, LIMACCE PER LA DIFESA DI PIANTE ORNAMENTALI E DA FIORE IN GIARDINI DOMESTICI

MESUROL® LUMACHE
COMPOSIZIONE
100 g di Mesurol Lumache contengono:
1 g di Metiocarb puro
coformulanti quanto basta a 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: BAYER CropScience S.r.l. - 20156 Milano - V.le Certosa 130 – Tel. 02/3972.1
Officina di produzione e confezionamento: BAYER CROPSCIENCE AG – Dormagen (Germania)
Officine di confezionamento: BAYER CROPSCIENCE S.r.l. – Filago (BG)
SINAPAK S.r.l. - Stradella (PV)
STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI)
L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE)
S.C.B. - Marle sur Serre (Francia)
PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI
Registrazione Ministero della Sanità n. 10842/PPO del 11.04.2001
Contenuto netto: g 250-500-1000; kg 1
Partita n.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi di impiego: 100 – 150 g ogni 100 m^2 a seconda del grado di infestazione (g 0,5 – 0,75 per vasi della superficie media di m^2 0,5)
Modo di impiego: distribuire il prodotto a spaglio, il più uniformemente possibile.

COMPATIBILITÀ': il prodotto deve essere distribuito da solo.

Precauzioni d'uso: se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

Attenzione. Da non impiegare in agricoltura o comunque su piante destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Conservare al riparo dall'umidità.
® Marchio registrato

BAYER Bayer CropScience

DPD 30.06.05/a

MONTUR® 190 FS

Etichetta/foglio illustrativo

INSETTICIDA
per la concia delle sementi della barbabietola da zucchero
CONCENTRATO FLUIDO PER CONCIA

COMPOSIZIONE

100 g di MONTUR® 190 FS contengono:
13,9 g di Imidacloprid puro (150 g/l)
3,7 g di Teflutrin puro (40 g/l)
coformulanti quanto basta a 100
Contiene composti di isotiazolone e benzilemiformale: puo' provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – 20156 Milano – Viale Certosa 130 - Tel. 02/3972.1
Officina di produzione: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Officina di confezionamento: S.C.B - Marle sur Serre (Francia)
Officina di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l.- Filago (BG)
Registrazione n. 11152 del 15.01.2002 del Ministero della Salute
Contenuto netto: 100-500 ml; 1-3-5-10-20-1000* l
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: 13,9 % di Imidacloprid puro (150 g/l) e 3,7 % di Teflutrin puro (40 g/l) le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione
Imidacloprid: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia sintomatica.
Teflutrin: sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Barbabietola da zucchero: 100 ml per unità di seme contro Elateridi (*Agriotes spp.*).
Aggiungere Gaucho 70 WS alla dose di 43 g/unità di seme contro Altica (*Chaetocnaema tibialis*) e Atomaria (*Atomaria linearis).*

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Attenzione - Il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per le api.

Avvertenze: Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. - Conservare al riparo dal gelo.

**** indicazioni unicamente per la confezione da 1000 litri:***
Attenzione: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Non disperdere nell'ambiente. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zone di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoruscite accidentali del prodotto. In caso di fuoruscita accidentale del prodotto contenere la perdita usando sabbia o segatura o altro materiale inerte per assorbire il prodotto sversato. Trasferire l'inerte contaminato in un contenitore dotato di chiusura avendo cura di etichettare il contenitore indicando il nome

del prodotto e la classificazione di pericolo, e trasportare/far trasportare a Bayer CropScience S.r.l., Via delle Industrie 9, 24040 Filago, telefono per emergenza 035/990111 .
Attenzione confezione ad esclusivo uso industriale

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® marchio registrato

NERVURE

Erbicida selettivo di post-emergenza per le colture sottoindicate, efficace contro le infestanti graminacee annuali e poliennali.
Concentrato emulsionabile (EC)

NERVURE

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
g 5,2 di Quizalofop-Etile isomero D puro (= 50 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

Contiene: nafta solvente (petrolio), aromatica pesante e nafta solvente (petrolio), aromatica leggera.

Frasi di Rischio:
Infiammabile. Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle.
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione :
Bayer CropScience S.r.l. - viale Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione :
AgriFormula S.r.l. - Paganica (AQ)
Bayer CropScience France - Villefranche - Francia

Registrazione n. 11423 del 16/09/2002 del Ministero della Salute

Contenuto netto : 250 - 500 ml - 1 - 5 - 10 l

Partita n.:*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.
Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte.
Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il **NERVURE** é un erbicida selettivo messo a punto per il diserbo di post-emergenza delle colture qui di seguito riportate contro le infestanti graminacee annuali e poliennali. Il prodotto va impiegato sulle infestanti già emerse in fase di attiva crescita e non sofferenti per siccità o basse temperature, che vengano distrutte per assorbimento fogliare. Il prodotto agisce lentamente: occorrono 7-15 giorni in relazione all'andamento stagionale per manifestare l'effetto erbicida. Le condizioni climatiche favorevoli alla crescita vegetativa delle infestanti (caldo e buon livello di umidità del terreno) migliorano ed accelerano l'efficacia del prodotto. Per quanto concerne la lotta contro le infestanti poliennali, la frammentazione dei rizomi a mezzo di lavorazioni meccaniche migliora l'efficacia del trattamento. Il prodotto risulta selettivo per le colture sottoindicate, sulle quali può venire impiegato in qualsiasi stadio di sviluppo.

INFESTANTI SENSIBILI
a) Annuali :
Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*),
Loglio (*Lolium* spp.),
Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*),
Falso panico (*Setaria* spp.),
Digitaria (*Digitaria sanguinalis*),
Avena selvatica (*Avena* spp.),
Falaride (*Phalaris* spp.),
ricacci di cerali, riso crodo

b) Poliennali :
Falsa gramigna (*Agropyron repens* =*Elimus repens*),
Gramigna comune (*Cynodon dactylon*),
Sorghetta (*Sorghum halepense*)

APPLICAZIONI
Aglio, barbabietola da zucchero, carciofo, carota, cavolfiore, cavolo cappuccio, cipolla, colza, erba medica, fagiolino, fragola, girasole, melone, pisello, pomodoro, radicchio, soia, spinacio, tabacco, zucchino.

DOSE D'IMPIEGO
1-1,5 l/ha in 300-400 litri di acqua.
La dose minore é da impiegare su graminacee nello stadio di 1-3 foglie; quella superiore é indicata dallo stadio di accestimento in poi. Per combattere infestazioni di *Sorghum halepense* da rizoma si può intervenire:

- trattamento frazionato a 1,5 l/ha su infestante a 20-30 cm di altezza, ripetendo l'intervento sugli eventuali ricacci
- trattamento unico a 2 l/ha su infestante in fase di levata-inizio botticella.

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Trattare in assenza di vento in modo da non danneggiare colture sensibili vicine.
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

NOCIVITÀ
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta
20 giorni per erba medica, fagiolino, spinacio;
30 giorni per aglio, carciofo, carota, fragola, melone, pisello, tabacco, zucchino;
60 giorni per barbabietola da zucchero, cavolfiore, cavolo cappuccio, cipolla, colza, girasole, pomodoro, radicchio, soia.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

NOMINEE®

DISERBANTE SELETTIVO PER RISO

SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

NOMINEE®

COMPOSIZIONE

100 g di Nominee contengono:
35,2 g di bispyribac sodium puro (408 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - 20156 Milano - Viale Certosa 130 – Tel. 02/3972.1
Officina di produzione: Kumiai Chemical Industry Co., Ltd., Tatsuno Factory, Tatsuno City, Japan
Officine di confezionamento: Bayer Portugal S.A., Casal Colaride – Agualva, Cacém, Portugal; Bayer CropScience Inc. – Canlubang – Calamba, Laguna – Filippine; Irca Service S.p.A., Fornovo S. Giovanni (BG).
Registrazione n° 12070 del 16/01/04 del Ministero della Salute
Contenuto netto: 75 – 100 – 150 - 200 –300 - 500 ml
Partita n°:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: non si sono rilevati sintomi clinici di intossicazione sull'uomo nè sugli animali di laboratorio. Terapia sintomatica.
Consultare un Centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Bispyribac-sodium è una sostanza attiva ad azione sistemica; il prodotto viene assorbito prevalentemente per via fogliare e rapidamente traslocato nelle parti in accrescimento delle piante infestanti dove esplica la sua azione.

EPOCA DI IMPIEGO: post-emergenza del riso, dall'emissione della terza foglia fino al pieno accestimento.

SPETTRO D'AZIONE:
Piante infestanti sensibili: giavoni (*Echinochloa crus-galli, Echinochloa phyllopogon*), cucchiaio (*Alisma plantago-aquatica),* eterantera *(Heteranthera reniformis),* vandellia delle risaie *(Lindernia diffusa, Lindernia dubia),* limnofila *(Limnophila sessilifolia),* erba miseria *(Murdannia keisak).*
Piante infestanti mediamente sensibili: quadrettone (*Schoenoplectus mucronatus*), cipollino (*Bolboschoenus maritimus*).

DOSE D'IMPIEGO

Riso: 60 – 75 ml/ha, in funzione dell'entità dell'infestazione presente, in miscela con 1 l/ha di Biopower®.
VOLUME D'ACQUA: 300 – 600 litri/ha
Compatibilità: Nominee è miscibile con altri prodotti antiparassitari. Si consiglia di verificare preventivamente la compatibilità del prodotto in miscela.

Il prodotto può indurre leggeri e transitori ingiallimenti della coltura; dopo pochi giorni tale sintomatologia non è più riscontrabile.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Intervallo di sicurezza: non richiesto dato il tipo di impiego.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Conservare al riparo dal gelo. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05/a

® marchio registrato

NORTRON COMBI FLOW

Erbicida di pre-emergenza per la barbabietola da zucchero
Formulazione: Sospensione Concentrata (SC)

NOTRON COMBI FLOW

Composizione:
Etofumesate puro 26,38 g (=300 g/l)
Lenacil* puro 10,55 g (=120 g/l)
Coformulanti quanto basta a 100 g

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1

Registrazione n° 10898 del 20/04/2001 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
Bayer CropScience GmbH, Wolfenbüttel – Germania; Bayer CropScience Ltd., Hauxton (Cambridge) – Inghilterra;
SBM Formulation - St. Marcel - Marsiglia – Francia; ISAGRO S.p.A. - Aprilia (LT)

Contenuto netto: 1 - 5 - 10 litri

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
NORTRON COMBI FLOW è un erbicida selettivo per la barbabietola da zucchero da impiegare in:
Pre-emergenza subito dopo la semina e comunque prima della emergenza delle infestanti.
NORTRON COMBI FLOW può essere usato su tutti i tipi di terreno ad eccezione di quelli sabbiosi o molto ricchi di calcare e su terreni ad alto contenuto in sostanza organica (torbosi) in cui l'attività del prodotto può risultare ridotta.
Caratteristica peculiare di NORTRON COMBI FLOW è la sua marcata azione di pre-condizionamento esercitata sulle infestanti emerse dopo un trattamento di pre-emergenza, che risultano così essere molto più sensibili al trattamento in post-emergenza.

DOSI E MODALITÁ D'IMPIEGO
NORTRON COMBI FLOW può essere impiegato su barbabietola da zucchero in pre-emergenza alla dose di:
2 – 2,5 l/ha: utilizzare questa dose quando si mira ad un effetto di precondizionamento delle infestanti da eliminare con un intervento programmato di post-emergenza.
3 – 3,5 l/ha: utilizzare questa dose su terreni pesanti ed in presenza di una prevedibile forte emergenza di infestanti a nascita precoce (*Polygonum* spp., *Stellaria m.*, *Galium a.*, *Fumaria o.*, *Mercurialis a.*, ed altre).
Il prodotto può essere distribuito anche localizzato, utilizzare un volume d'acqua di 300-500 litri/ha.

Efficacia
NORTRON COMBI FLOW controlla le più comuni infestanti annuali tipiche dei bietolai, sia graminacee (*Alopecurus m.*, *Digitaria s.*, *Echinochloa* spp.), che dicotiledoni (*Amaranthus r.*, *Anagallis a.*, *Atriplex p.*, *Capsella b.p.*, *Fumaria o.*, *Galium a.*, *Mercurialis a.*, *Papaver r.*, *Polygonum* spp., *Raphanus r.*, *Sinapis a.*, *Solanum n.*, *Stellaria m.*).
Lolium, *Lamium*, *Veronica* e *Senecio* sono parzialmente resistenti.

Condizioni di trattamento
Un sufficiente grado udometrico del terreno nel periodo successivo al trattamento è condizione necessaria per ottenere un buon risultato: in caso di necessità effettuare un intervento irriguo.
Se dopo il trattamento si dovesse abbandonare la coltivazione della bietola, prima di seminare un'altra coltura, effettuare una aratura profonda.
Non impiegare il prodotto in terreni sciolti e calcarei per evitare effetti fitotossici e nei terreni eccessivamente organici per evitare inefficacia.

FITOTOSSICITÁ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

COMPATIBILITÁ
NORTRON COMBI FLOW è compatibile con i diserbanti ad azione disseccante.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

* Lenacil è prodotto dalla E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.), U.S.A.

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

OLIOCIN® FLEXI

Olio minerale emulsionato ad elevato grado di insulfonabilita' (95%) – Concentrato emulsionabile.
Insetticida-acaricida per la lotta contro insetti ed acari degli agrumi, delle piante da frutto, della vite e dell'olivo.

COMPOSIZIONE
g 100 di Oliocin® Flexi contengono:
g 96 di olio minerale al 95% di insulfonabilita' (= 820,8 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, nè fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Se ingerito, non indurre il vomito. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Oliocin Flexi può essere impiegato su:

- **vite (uva da vino e da tavola)**: contro afidi, tripidi, coccinìglie, uova di lepidotteri, acari; in inverno alla dose di 2,5-3,5 l/hl
- **olivo (olive da olio e da tavola)**: contro cocciniglie, tignole; in primavera-estate impiegare alla dose di 1,5-2 l/hl, in inverno alla dose di 2,5-3,5 l/hl
- **agrumi (arancio, limone, mandarino, clementino, tangerino, bergamotto, cedro, pompelmo, limetta, chinotto, arancio amaro):** contro afide verde, cimice, cocciniglie, aleurodidi, tripidi, ragno rosso; in primavera-estate impiegare alla dose di 1,5-2 l/hl, in inverno alla dose di 2,5-3,5 l/hl
- **drupacee (pesco - compresi nettarine e percoche - , albicocco, ciliegio, susino, mandorlo):** contro cocciniglie, afidi, tripidi, uova di lepidotteri, acari; in inverno alla dose di 2,5-3,5 l/hl
- **pomacee (melo, pero, cotogno)**: contro cocciniglie, afidi, psille, tignole, uova di lepidotteri, acari; in primavera-estate impiegare alla dose di 1,5-2 l/hl, in inverno alla dose di 2,5-3,5 l/hl

N.B. 1) Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale. 2) L'Oliocin Flexi puo' essere impiegato su barbabietole da zucchero e mais in miscela con diserbanti per aumentarne l'efficacia, alle dosi di 0,8-1,6 l/ha per barbabietola da zucchero e 4,8-8 l/ha per mais. 3) Agitare bene il prodotto prima di ogni prelievo.

Compatibilità: l'Oliocin Flexi non e' miscibile con la poltiglia bordolese, i polisolfuri e i prodotti a base di captan, zolfo e TMTD; l'Oliocin Flexi, essendo a reazione neutra, e' particolarmente indicato per le miscele con esteri fosforici.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicita': dopo trattamenti con poltiglia bordolese, polisolfuri, prodotti a base di captan, zolfo e TMTD, l'Oliocin Flexi deve essere impiegato con un intervallo di tempo di almeno 2 settimane.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – 20156 Milano - Viale Certosa 130 - Tel. 02/3972.1

Registrazione Ministero della Salute n. 11670 del 13.05.2003

Officina di produzione: Bayer CropScience Srl - FILAGO (BG); I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Contenuto netto: ml 50 - 100 – 200 - 250; l 1-5-10-15-20-25-30-50-200-1000*
Partita n°

**** Indicazioni unicamente per la confezione da 1000 litri:***
Attenzione: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Non disperdere nell'ambiente. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zone di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto contenere la perdita usando sabbia o segatura o altro materiale inerte per assorbire il prodotto sversato. Trasferire l'inerte contaminato in un contenitore dotato di chiusura avendo cura di etichettare il contenitore indicando il nome del prodotto e la classificazione di pericolo, e trasportare/far trasportare a Bayer CropScience S.r.l., Via delle Industrie 9, 24040 Filago, telefono per emergenza 035/990111. Attenzione confezione ad esclusivo uso industriale

Bayer CropScience

Edizione del 27/07/2005

® Marchio registrato

ORACLE™

Fungicida per la difesa della vite, del pomodoro e della patata dalla Peronospora ed altre malattie

Granuli idrodispersibili (WG)

ORACLE™

COMPOSIZIONE
4 g Fenamidone puro
40 g Rame metallo puro (sotto forma di idrossido)
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Tossico per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa, 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento:
Bayer CropScience France - Villefranche (France)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)
Officina di confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Contenuto netto: 200 – 500 g / 1 - 2 – 2,5 - 5 – 8 –10 – 15 - 20 kg
Registrazione Ministero della Salute n. 11884 del 22.10.2003
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
FENAMIDONE 4 %
RAME da idrossido 40 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FENAMIDONE: -
RAME:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo. Per il resto terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
ORACLE è un'associazione di principi attivi ad azione preventiva di contatto caratterizzata da ampio spettro di azione, per l'impiego nella difesa antiperonosporica della vite del pomodoro e della patata.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI
Vite da vino e vite da tavola : contro Peronospora (*Plasmopara viticola)* alla dose di 200-250 g/hl (2-2,5 kg/ha).

Pomodoro : contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), con contenimento di Alternaria (*Alternaria spp.*), Septoria (*Septoria spp.*) e Batteriosi, alla dose di 250-300 g/hl (2,5-3 kg/ha).

Patata : contro Peronospora (*Phytophthora infestans*) con contenimento di Alternaria (*Alternaria solani*), alla dose di 250-300 g/hl (2,5-3 kg/ha).

Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di prodotto per ettaro.

Intervenire preventivamente su tutte le colture con trattamenti effettuati ogni 8/10 giorni in relazione alla pressione della malattia.

DPD 30.06.05

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i più comuni insetticidi e fungicidi utilizzati in viticoltura ed orticoltura.

Avvertenza: in caso di miscela, con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLI DI SICUREZZA: 30 giorni su vite e 7 giorni su pomodoro e patata

AVVERTENZE

Effettuare al massimo 3 applicazioni per anno su vite e 4 applicazioni su pomodoro e patata con prodotti caratterizzati dallo stesso meccanismo di azione.
E' consentito invece l'impiego contemporaneo (miscela estemporanea) di prodotti aventi lo stesso meccanismo di azione se impiegati contro malattie diverse, senza che questo modifichi il numero totale di trattamenti suggerito.

Nei vigneti o appezzamenti dove siano state osservate perdite di efficacia a seguito dell'impiego di prodotti aventi uguale meccanismo di azione, utilizzare prodotti che agiscano sul fungo con modalità diversa.

Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 30 m per la vite, 10 m per pomodoro e patata.
Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione irrorata sia completamente asciutta.
Per lavorazioni agricole da eseguirsi entro i tempi di carenza, indossare guanti ed indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

BAYER Bayer CropScience

™ Trade mark

DPD 30.06.05

PREVICUR® ENERGY

Etichetta/foglio illustrativo

Fungicida sistemico per la protezione delle colture orticole.
Concentrato Solubile (SL)

PREVICUR® ENERGY
Composizione:
Propamocarb puro 47,2 g (530 g/l),
Fosetyl puro 27,6 g (310 g/l),
coformulanti quanto basta a 100 g
FRASI DI RISCHIO:
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: BAYER CropScience S.r.l. – Viale Certosa, 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience GmbH – Wolfenbüttel (Germania);
Bayer CropScience S.r.l. -Filago (BG);
IRCA Service S.p.A. Fornovo S. Giovanni (BG)
Registrazione n. 12043 del 11.05.2004 del Ministero della Salute
Contenuto netto: ml 5-10-20-25-50-100-250; l 1-5-10
Partita n.

IRRITANTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
PREVICUR ENERGY è un fungicida sistemico attivo nei confronti di patogeni dell'ordine degli **Oomiceti** e particolarmente di quelli appartenenti al genere: ***Pythium* e *Bremia*.**
Il prodotto ha una spiccata attività sistemica in senso acropeto per cui è indicato, oltre che per le applicazioni fogliari, anche per le applicazioni al terreno in quanto dal sistema radicale trasloca rapidamente all'interno, nelle diverse parti della pianta.
PREVICUR ENERGY può essere impiegato con tecniche diverse: disinfezione dei letti di semina, trattamenti al terreno in pre e post-trapianto delle colture, trattamenti fogliari.
I migliori risultati si ottengono con trattamenti preventivi volti ad impedire l'insediamento dei patogeni nell'ospite.
MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Trattamenti ai semenzai (contenitori alveolari, letti di semina) contro *Pythium* spp.

Colture : pomodoro, melanzana, peperone, melone, anguria, cetriolo, zucchino, lattuga, indivia, radicchio, cavolfiore, cavolo broccolo, tabacco.
Un unico trattamento alla semina alla dose di 6 ml/m^2, oppure 2 interventi da 3 ml/m^2 ciascuno: il primo alla semina ed il secondo dopo circa due settimane utilizzando 2-4 l/ di acqua al m^2 per trattamento.

Trattamenti al terreno con impianti a goccia o con distribuzione localizzata contro *Pythium* spp.

Colture : pomodoro, melanzana, peperone, melone, anguria, cetriolo, zucchino.
Effettuare al massimo 2 interventi alla dose di 2-3 l/ha in 20000 l/ha di acqua.
Intervenire al trapianto e circa dopo 2 settimane dalla prima applicazione.
Distribuire PREVICUR ENERGY con acqua e su terreno umido, evitare una eccessiva percolazione, il prodotto deve rimanere localizzato nell'area esplorata dalle radici delle piante. Si consiglia di immettere PREVICUR ENERGY nella fase finale del turno irriguo.

Trattamenti fogliari contro *Bremia lactucae*

Coltura : lattuga
Intervenire con PREVICUR ENERGY alla dose di 2-3 l/ha ogni 8/12 giorni, in relazione alla pressione infettiva della malattia, utilizzando 400-1000 l/ha di acqua.
Non impiegare il prodotto più di 2 volte per ciclo vegetativo.

COMPATIBILITA'
Il prodotto si impiega da solo; si sconsiglia l'impiego in miscela con rame.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DPD 30.06.05/a

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05/a

PROVADO® AE

Insetticida sistemico per piante ornamentali e da fiore
AEROSOL

PROVADO® AE

COMPOSIZIONE:
g 100 di PROVADO AE contengono:
g 0,025 di Imidacloprid puro
solventi e propellenti quanto basta a 100.

FRASI DI RISCHIO:
Estremamente infiammabile

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

Titolare dell'autorizzazione: BAYER CROPSCIENCE S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 Milano – Tel 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento:
BAYER S.p.A. – Filago (BG)
BAYER CROPSCIENCE AG – Dormagen (Germania)
TOSVAR S.r.l. – Pozzo d'Adda (MI)
PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI
Registrazione n. 11154 /PPO del 15.01.2002
Contenuto netto: ml 250-400-500-600
Partita n°.:

NORME PRECAUZIONALI: Recipiente sotto pressione, proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50 °C. Non perforare nè bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non erogare il prodotto in prossimità di una fiamma o di un apparecchio elettrico in funzione. Non contiene gas propellenti ritenuti dannosi all'ozono. Evitare un uso eccessivo od improprio.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.
ISTRUZIONI PER L'USO
Provado AE è idoneo per il trattamento di piante ornamentali e da fiore, di tipo arbustivo ed erbaceo, annuali e perenni, coltivate in appartamento, balcone e in giardino domestico, per la lotta contro i seguenti parassiti:
Afidi *(Aphis spp., Macrosiphoniella chrysanthemi, Myzus persicae, Aulachortum solani).*
Aleurodidi: *Trialeurodes spp., Aleurodes spp.*
Tripidi: *Frankliniella occidentalis, Heliotrips spp.*
Cocciniglie cotonose: *Pseudococcus sp., Phenacoccus spp.*
Cicaline: *Metcalfa pruinosa*
L'applicazione di Provado AE, aerosol pronto all'uso, viene effettuata mediante nebulizzazione da una distanza di 30-50 cm fino al gocciolamento delle superfici vegetali irrorate.
Il trattamento con Provado AE prima o all'inizio dell'attacco permette di ottenere un buon controllo dei parassiti sopraindicati.
Se necessario ripetere il trattamento.
Fitotossicità: dai dati disponibili il prodotto non è risultato fitotossico nei confronti delle principali varietà di piante floreali ed ornamentali. Comunque a causa della molteplicità di specie e varietà colturali e del rapido succedersi di varietà nel campo della floricoltura e della coltivazione delle piante ornamentali, non può essere esclusa l'insorgenza di fitotossicità nei confronti di specifiche varietà. Questo tipo di formulazione, come in generale tutte le formulazioni aerosol, può dare effetti indesiderati sul fiore.
Attenzione: il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per le api.
Precauzioni d'uso: se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione. Evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.
Attenzione. Da non impiegare in agricoltura o comunque su piante destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ACC

3

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PROVADO® SL

insetticida-aficida sistemico
Prodotto fitosanitario per piante da fiore e ornamentali da appartamento, balcone e giardino domestico.
CONCENTRATO SOLUBILE

Composizione:
g 100 di PROVADO SL contengono :
g 17,1 di principio attivo IMIDACLOPRID puro (200 g/l)
coformulanti q.b. a 100

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Floreali ed ornamentali: contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae)* e *Metcalfa pruinosa*: 0,05% (5 ml/10 l d'acqua); contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*: 0,075% (7,5 ml/10 l d'acqua). Su floreali ed ornamentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Effettuare al massimo un trattamento l'anno.

NOCIVITÀ
il prodotto è molto tossico per le api. Non trattare né in immediata prefioritura né in fioritura (almeno 10 giorni prima) per evitare la mancata impollinazione.

Precauzioni d'uso: se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione. Evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

Attenzione. Da non impiegare in agricoltura o comunque su piante destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. - Conservare al riparo dal gelo.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Registrazione Ministero della Salute n. 11595/PPO del 14.02.2003
PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG);
IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)

Contenuto netto: ml 5-10-20-25-50-100
Partita n.

BAYER Bayer CropScience

DPD 30.06.2005

® Marchio registrato

PROVADO® FACILE

Insetticida-aficida sistemico per piante ornamentali e da fiore
PASTIGLIA PER PIANTE PRONTA ALL'USO

COMPOSIZIONE
g 100 di Provado® Facile contengono:
g 2,5 di Imidacloprid
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano -Tel. 02/3972.1
PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI
Registrazione Ministero della Salute n. 11155 /PPO del 15.01.2002

Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania);
S.C.B. Marle sur Serre (Francia)
Contenuto netto: blister da 10 pastiglie x 2 g – 20 pastiglie x 2 g
Partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Il prodotto si impiega esclusivamente per la difesa delle piante ornamentali e da fiore, di tipo arbustivo ed erbaceo, perenni ed annuali, coltivate in vaso o altri contenitori in appartamento.
Un trattamento con Provado Facile prima o all'inizio dell'attacco permette di ottenere un buon controllo dei seguenti parassiti: afidi (*Macrosiphum rosae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aphis fabae, Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis spp., Aulacortum solani, Aphidula spp.*), aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci, Aleurodes spp.*), con buon effetto collaterale contro cocciniglie cotonose e cocciniglie (*Pseudococcus spp., Lecanium spp., Phenacoccus spp., Coccus spp.*).
La protezione contro questi parassiti dura fino a tre mesi dopo il trattamento. L'efficacia completa si raggiunge dopo 2-4 settimane dal trattamento.
Se necessario ripetere il trattamento dopo 10-12 settimane.
Le pastiglie di Provado Facile devono essere interrate nel substrato colturale (vasi, altri contenitori) molto vicine alla pianta, ad una profondità di 1-3 cm circa.
La dose di impiego è in funzione della dimensione del vaso e del volume di substrato colturale

Diametro (in cm)	Volume substrato (in l)	Numero pastiglie
8 - 12	ca. 0,3 - 0,75	½
12 - 16	ca. 0,75 - 2,5	1
16 - 22	ca. 2,5 - 6	2
22 - 26	ca. 6 - 8	3
26 - 30	ca. 8 - 12	4

Allo scopo di migliorare l'efficacia del prodotto si consiglia di annaffiare bene le piante dopo il trattamento per facilitare lo scioglimento della pastiglia ed accelerare l'assorbimento del principio attivo in essa contenuto da parte delle piante.
Fitotossicità: dai dati disponibili il prodotto non è risultato fitotossico nei confronti delle principali varietà di piante floreali ed ornamentali. Comunque a causa della molteplicità di specie e varietà colturali e del rapido succedersi di varietà nel campo della coltivazione delle piante ornamentali, non può essere esclusa l'insorgenza di fitotossicità nei confronti di specifiche varietà. Si consiglia di eseguire test preliminari.

Attenzione: il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per le api.

Precauzioni d'uso: se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione. Evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.
Attenzione. Da non impiegare in agricoltura o comunque su piante destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi

sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Conservare al riparo dall'umidità.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05/a

® marchio registrato

PROVADO® PLUS

Insetticida /acaricida
AEROSOL

PROVADO® PLUS
COMPOSIZIONE:
g 100 di PROVADO PLUS contengono:
g 0,025 di Imidacloprid puro
g 0,05 di Metiocarb puro
solventi e propellenti quanto basta a 100.

FRASI DI RISCHIO
Estremamente infiammabile. Irritante per gli occhi
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevance. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immeciatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 – 20156 Milano Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento: BAYER S.p.A. – Filago (BG); Bayer CropScience AG-Dormagen (Germania); TOSVAR S.r.l. – Pozzo d'Adda (MI)
PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI
Registrazione n.**11153/PPO** del 15.01.02 del Ministero della Salute
Contenuto netto: ml 200-250-300- 400-500-600
Partita n°.:

IRRITANTE

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: 0,025 % di Imidacloprid puro; 0,05 % di Metiocarb puro le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
IMIDACLOPRID
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
METIOCARB
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.
ISTRUZIONI PER L'USO
Provado Plus è idoneo per il trattamento di piante ornamentali e da fiore, di tipo arbustivo ed erbaceo, annuali e perenni, coltivate in appartamento, balcone e in giardino domestico, per la lotta contro i seguenti parassiti:
Afidi: *Aphis spp., Macrosiphum spp., Macrosiphoniella spp., Myzus persicae, Aulachortum solani*
Aleurodidi: *Trialeurodes spp., Aleurodes spp., Bemisia tabaci*
Tripidi: *Frankliniella occidentalis, Thrips spp., Parthenothrips dracaenae, Heliotrips spp.*
Cocciniglie: *Saissetia hemispherica, Coccus spp., Lecanium spp.*
Cocciniglie cotonose: *Pseudococcus spp., Phenacoccus spp.*
Cicaline: *Typhlocyba rosae, Metcalfa pruinosa*
Lepidotteri: *Phytometra gamma*
Coleotteri: *Lilioceris lilii*
Cimici: *Lygus pabulinus*
Acari: *Tetranychus urticae*
L'applicazione di Provado Plus, aerosol pronto all'uso, viene effettuata mediante nebulizzazione da una distanza di 30-50 cm fino al gocciolamento delle superfici vegetali irrorate.
Il trattamento con Provado Plus prima o all'inizio dell'attacco permette di ottenere un buon controllo dei parassiti.
Se necessario ripetere il trattamento dopo 7-10 giorni.
Fitotossicità: dai dati disponibili il prodotto non è risultato fitotossico nei confronti delle principali varietà di piante floreali ed ornamentali. Comunque a causa della molteplicità di specie e varietà colturali e del rapido succedersi di varietà nel campo della coltivazione delle piante ornamentali, non può essere esclusa l'insorgenza di fitotossicità nei confronti di specifiche varietà.
Questo tipo di formulazione, come in generale tutte le formulazioni aerosol, può dare effetti indesiderati sul fiore.
Attenzione - Il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per le api.

Precauzioni d'uso: se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione. Evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

Attenzione. Da non impiegare in agricoltura o comunque su piante destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Recipiente sotto pressione, proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50 °C. Non perforare nè bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione Non erogare il prodotto in prossimità di una fiamma o di un apparecchio elettrico in funzione. Evitare un uso eccessivo od improprio.

ACC

3

Bayer CropScience

® Marchio registrato

edizione del 04.07.05

R6 Erresei Trevi®

Fungicida sistemico per la difesa della vite dalla Peronospora
Polvere Bagnabile (WP) in sacchetti idrosolubili

R6 Erresei Trevi®

COMPOSIZIONE
Fenamidone puro 4 g
Iprovalicarb puro 4,8 g
Fosetyl Al puro 52 g
Coformulanti q.b. a 100 g

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione
Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione e confezionamento
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
AgriFormula S.r.l. – Paganica (AQ)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Contenuto netto: 1 kg (4 x 250 g), 1 kg (5 x 200 g), 1 kg (2 x 500 g); 1 Kg (1 x 1 kg), 2 kg (8 x 250 g), 2 kg (5 x 400 g), 2 kg (4 x 500 g), 2 kg (2 x 1 kg), 5 kg (5 x 1 kg), 5 kg (1 x 5 kg), 8 kg (8 x 1 kg), 8 kg (4 x 2 kg), 10 kg (4 x 2,5 kg), 10 kg (10 x 1 kg), 10 kg (1 x 10 kg)

Registrazione Ministero della Salute N.12138 del 30/03/2004
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
R6 Erresei Trevi è un'associazione di principi attivi con azione fungicida per l'impiego nella difesa della vite. Il prodotto è dotato di azione sistemica e di copertura, ed è in grado di svolgere un'azione preventiva e curativa contro la Peronospora.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Vite da vino e vite da tavola: contro Peronospora (*Plasmopara viticola)* intervenire preventivamente alla dose di 250 g/hl (2,5 kg/ha) con trattamenti effettuati ogni 12-14 giorni nelle fasi vegetative comprese tra la differenziazione dei grappolini e la chiusura del grappolo.
Con forte pressione infettiva, applicare R6 Erresei Trevi alla dose di 300 g/hl (3 kg/ha).
Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di prodotto per ettaro.
Su uve da tavola evitare applicazioni tardive per evitare imbrattamento agli acini.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto può avere dei problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame, con alcuni fitostimolatori e concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Per queste associazioni risulta opportuno effettuare saggi preliminari, per verificarne la compatibilità.

Non effettuare miscele con formulati oleosi.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLI DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto

AVVERTENZE
Effettuare al massimo 3 applicazioni per anno con R6 Erresei Trevi.
Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 20 metri.
Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione irrorata sia completamente asciutta.
Per lavorazioni agricole da eseguirsi entro i tempi di carenza, indossare guanti ed indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

R6 Erresei® Utilis

Fungicida per la difesa della vite, del pomodoro e della patata dalla Peronospora ed altre malattie

Granuli idrodispersibili (WG)

R6 Erresei® Utilis

COMPOSIZIONE
4 g Fenamidone puro
40 g Rame metallo puro (sotto forma di idrossido)
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Tossico per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta).
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa, 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento:
Bayer CropScience France - Villefranche (France)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)
Officina di confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Contenuto netto: 200 – 500 g / 1 - 2 – 2,5 - 5 – 8 –10 – 15 - 20 kg
Registrazione Ministero della Salute n. 12137 del 30/03/2004
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
FENAMIDONE 4 %
RAME da idrossido 40 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FENAMIDONE: -
RAME:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo. Per il resto terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
R6 Erresei Utilis è un'associazione di principi attivi ad azione preventiva di contatto caratterizzata da ampio spettro di azione, per l'impiego nella difesa antiperonosporica della vite del pomodoro e della patata.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI
Vite da vino e vite da tavola : contro Peronospora (*Plasmopara viticola)* alla dose di 200-250 g/hl (2-2,5 kg/ha).

Pomodoro : contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), con contenimento di Alternaria (*Alternaria spp.*), Septoria (*Septoria spp.*) e Batteriosi, alla dose di 250-300 g/hl (2,5-3 kg/ha).

Patata : contro Peronospora (*Phytophthora infestans*) con contenimento di Alternaria (*Alternaria solani*), alla dose di 250-300 g/hl (2,5-3 kg/ha).

Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di prodotto per ettaro.

Intervenire preventivamente su tutte le colture con trattamenti effettuati ogni 8/10 giorni in relazione alla pressione della malattia.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i più comuni insetticidi e fungicidi utilizzati in viticoltura ed orticoltura.

Avvertenza: in caso di miscela, con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLI DI SICUREZZA: 30 giorni su vite e 7 giorni su pomodoro e patata

AVVERTENZE

Effettuare al massimo 3 applicazioni per anno su vite e 4 applicazioni su pomodoro e patata con prodotti caratterizzati dallo stesso meccanismo di azione.
E' consentito invece l'impiego contemporaneo (miscela estemporanea) di prodotti aventi lo stesso meccanismo di azione se impiegati contro malattie diverse, senza che questo modifichi il numero totale di trattamenti suggerito.

Nei vigneti o appezzamenti dove siano state osservate perdite di efficacia a seguito dell'impiego di prodotti aventi uguale meccanismo di azione, utilizzare prodotti che agiscano sul fungo con modalità diversa.

Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 30 m per la vite, 10 m per pomodoro e patata.
Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione irrorata sia completamente asciutta.
Per lavorazioni agricole da eseguirsi entro i tempi di carenza, indossare guanti ed indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

BAYER Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

R6 Erresei® Veritas™

Fungicida sistemico per la difesa antiperonosporica della vite, del tabacco, del melone e della lattuga.

Granuli idrodispersibili (WG)

R6 Erresei® Veritas™

Composizione
Fenamidone puro 4,4 g
Fosetyl Al puro 66,7 g
coformulanti q.b. a 100 g

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione
Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa, 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione e confezionamento:
Bayer CropScience France, Villefranche (France)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Officina di confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Contenuto netto: 100 - 200 - 250 -300 - 500 g; 1 – 2 – 2,5 – 5 – 8 – 10 – 15 – 20 - 25 kg

Registrazione Ministero della Salute N. 12136 del 30.03.2004

Partita n.

® Marchio registrato
TM Trade Mark

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
R6 Erresei Veritas è un'associazione di principi attivi ad azione sistemica e di copertura, in grado di svolgere un'azione preventiva per l'impiego nella difesa antiperonosporica della vite, del tabacco, del melone e della lattuga.
Su vite il prodotto ha azione di contenimento anche nei confronti di oidio.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI
Vite da vino e vite da tavola : contro Peronospora (*Plasmopara viticola)* intervenire preventivamente alla dose di 230-250 g/hl (2,3-2,5 kg/ha) con trattamenti effettuati ogni 10-12 giorni, oppure alla dose di 280-300 g/hl (2,8-3 kg/ha) ogni 12-14 giorni. Eseguire le applicazioni nelle fasi comprese tra la differenziazione dei grappolini e l'inizio dell'ingrossamento degli acini.

Tabacco e Melone : contro Peronospora (*Peronospora tabacina – Pseudoperonospora cubensis*) intervenire preventivamente alla dose di 250-300 g/hl (2,5-3 kg/ha) ogni 8-12 giorni, in relazione alla pressione della malattia ed allo sviluppo delle piante.

Lattuga : contro Bremia (*Bremia lactucae*) alla dose di 200-250 g/hl (2-2,5 kg/ha) ogni 8-10 giorni, in relazione alla pressione della malattia ed allo sviluppo delle piante.

Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di prodotto per ettaro.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto può avere dei problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame, alcuni fitostimolatori e concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Per queste associazioni risulta opportuno effettuare saggi preliminari, per verificarne la compatibilità.
Non effettuare miscele con formulati oleosi.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

DPD 30.06.05

INTERVALLI DI SICUREZZA : 40 giorni su vite, 30 giorni su tabacco e 15 giorni su melone e lattuga.

AVVERTENZE
Su tutte le colture effettuare al massimo 3 applicazioni per anno con prodotti caratterizzati dallo stesso meccanismo di azione.
E' consentito invece l'impiego contemporaneo (miscela estemporanea) di prodotti aventi lo stesso meccanismo di azione se impiegati contro malattie diverse, senza che questo modifichi il numero totale di trattamenti.
Nei vigneti o appezzamenti dove siano state osservate perdite di efficacia a seguito dell'impiego di prodotti avente uguale meccanismo di azione, utilizzare prodotti che agiscano sul fungo con modalità diversa.

Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 20 m per la vite, 10 m per melone, tabacco e lattuga.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze - Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

R6 Erresei® R 37

Fungicida cupro organico ad azione biologica per la difesa della vite, del pomodoro e del garofano
Polvere Bagnabile

R6 Erresei® R 37

Composizione :
g 100 di prodotto contengono :
g 5,8 di Mancozeb puro
g 22 di Rame metallo puro
(da Rame Ossicloruro g 37)
Coformulanti q.b. a 100 g

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione. Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione:
Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
SBM Formulation - Bèziers (Francia)
AgriFormula S.r.l., Paganica (AQ)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. 11674 del 13.05.2003

Contenuto netto: 1 - 5 - 10 - 20 Kg

Partita n.: *

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Norme precauzionali
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
MANCOZEB 5,8 %
RAME OSSICLORURO 37 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
MANCOZEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B.- Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
RAME OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi.
Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia : sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni**

MODALITA' DI IMPIEGO
- VITE:
contro peronospora 400 - 500 g/hl.
- POMODORO (solo fino alla prima fioritura):
contro peronospora e alternariosi 400 - 500 g/hl.
- GAROFANO (in pieno campo):
contro ruggine 400 g/hl.
Stemperare il prodotto in poca acqua fino ad ottenere una poltiglia semi liquida e portare a volume con l'acqua occorrente.
Non impiegare in serra

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con Zolfi per la lotta contemporanea contro l'Oidio e la Peronospora.
Può essere miscelato con Dicofol e Malation per la lotta contemporanea contro Acari, Tignole, Sigaraio, Zigene.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non trattare durante la fioritura.

NOCIVITA'
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente

svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® Marchio registrato DPD 30.06.05

R6 Erresei® R 37

Fungicida cupro organico ad azione biologica per la difesa della vite, del pomodoro e del garofano
Polvere Bagnabile in sacchetti idrosolubili

R6 Erresei® R 37

Composizione :
g 100 di prodotto contengono :
g 5,8 di Mancozeb puro
g 22 di Rame metallo puro
(da Rame Ossicloruro g 37)
Coformulanti q.b. a 100 g

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione. Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione:
Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
SBM Formulation - Bèziers (Francia)
AgriFormula S.r.l., Paganica (AQ)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. 11674 del 13/05/2003

Contenuto netto: kg 2 (5 X 400 g) - 8 (4 X 2 kg) - 10 (5 X 2 kg)

Partita n.: *

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Norme precauzionali
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
MANCOZEB 5,8 %
RAME OSSICLORURO 37 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
MANCOZEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione: apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B.- Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
RAME OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi.
Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia : sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni**

MODALITA' DI IMPIEGO
- VITE :
contro peronospora 400 - 500 g/hl.
- POMODORO (solo fino alla prima fioritura):
contro peronospora e alternariosi 400 - 500 g/hl.
- GAROFANO (in pieno campo):
contro ruggine 400 g/hl.
Stemperare il prodotto in poca acqua fino ad ottenere una poltiglia semi liquida e portare a volume con l'acqua occorrente.
Non impiegare in serra
COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con Zolfi per la lotta contemporanea contro l'Oidio e la Peronospora.
Può essere miscelato con Dicofol e Malation per la lotta contemporanea contro Acari, Tignole, Sigaraio, Zigene.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Non trattare durante la fioritura.
NOCIVITA'
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente

svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO

Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti solubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05

RHODAX M

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro Peronospora, Escoriosi della vite e Black- rot

Granuli idrodispersibili (WG)

RHODAX M

COMPOSIZIONE
Fosetil Alluminio puro 35 g
Mancozeb puro 35 g
Coformulanti q.b. a 100 g
Contiene Esametilentetrammina

NOCIVO

Frasi di Rischio

Irritante per le vie respiratorie. Rischio di gravi lesioni oculari.
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

Titolare dell'Autorizzazione:

Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 - 20156 – Tel. 02/3972.1

Officina di Produzione: Bayer CropScience France, Villefranche (Francia)
Officine di Confezionamento: AgriFormula s.r.l. – Paganica (AQ); Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Registrazione n. 11033 del 11/10/01 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: 500 g; 1 - 2 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 Kg

Partita N.

Norme precauzionali:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
FOSETIL ALLUMINIO 35%
MANCOZEB 35%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Fosetil Alluminio: ---

Mancozeb:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B.- Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto é un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemia si manifesta in modo soprattutto ascendente permettendo al prodotto di difendere anche la vegetazione che si forma dopo il trattamento.
Nei confronti della Peronospora se ne consiglia l'impiego come preventivo, pur possedendo il prodotto anche efficacia antisporulante.
Queste caratteristiche, unite alla buona persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta contro la Peronospora con interventi distanziati a cadenza fissa. Il prodotto possiede anche azione sulla Escoriosi e "Black-rot" della vite.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Vite
contro Peronospora:
iniziare i trattamenti a partire dalla fase di germogli di 10 cm, distanziando gli interventi di 8-10 giorni fino ad allegagione avvenuta. Dose: 300 g/hl, utilizzando non meno di 3 kg/ha nelle fasi di maggiore sviluppo vegetativo.
Qualora gli interventi venissero distanziati di 10-12 giorni, sarà opportuno elevare la dose a 400 g /hl (4 kg/ha).
contro Escoriosi:
dose 400 g per 100 litri d'acqua (non meno di 4 kg/ha); effettuare due trattamenti: il primo nella fase di "gemma mossa" (fase D del Baggiolini) ed il secondo nella fase di foglie formate (fase E del Baggiolini)

contro Black-rot: trattamenti preventivi a 400 g /hl (non meno di 4 kg/ha)
DA NON IMPIEGARE IN SERRA
Da non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

COMPATIBILITA'
Il prodotto può avere problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame e concimi fogliari contenenti azoto nitrico e ammoniacale.
Non effettuare miscele con formulati oleosi.

Avvertenza:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

RICESTAR®

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA PER IL RISO
EMULSIONE CONCENTRATA (EC)

RICESTAR®

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Fenoxaprop-p-etile puro 6,70 g (= 69 g/L)
Isoxadifen-etile puro 7,28 g (= 75 g/L)
Coformulanti quanto basta a 100
Contiene: nafta solvente (petrolio), aromatica pesante.

Contiene fenoxaprop p- etile e isoxadifen-etile: può provocare una reazione allergica.

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione :
Bayer CropScience S.r.l. - viale Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione :
Bayer CropScience GmbH, Francoforte s/Meno - Germania
SBM Formulation – St. Marcel – Marsiglia – (Francia)
AgriFormula s.r.l. – Paganica (AQ)
Isagro S.p.A.– Aprilia (LT)

Registrazione n° 10770 del 10.04.2001 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: 0.25 - 1 - 5 – 10 - 20 L

Partita n.:*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Fenoxaprop-p-etile puro 6.70% e Isoxadifen-etile puro 7.28%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:

Isoxadifen-etile: //

Fenoxaprop-p-etile: (animale da esperimento) passività, sonnolenza, assenza di equilibrio, posizione prona. In caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico; togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con acqua e sapone; risciacquare gli occhi contaminati con acqua per 10-15 minuti; non provocare il vomito.

Trattamenti specifici: in caso di ingestione, somministrare prima di tutto 200 ml di olio di paraffina ed eseguire poi la lavanda gastrica con circa 4 litri di acqua, terminare con carbone e solfato di sodio. Fare attenzione a prevenire l'aspirazione polmonare. Mantenere un'adeguata aerazione. Trattamenti sintomatici.

Controindicazioni: derivati dell'adrenalina.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

RICESTAR è un graminicida per il diserbo del riso in post-emergenza che viene assorbito per via fogliare e traslocato fino ai tessuti del meristema apicale. I primi sintomi dell'azione erbicida si manifestano con macchie clorotiche su foglie e germogli che successivamente evolvono in necrosi; dopo circa 2-4 settimane (in funzione delle condizioni climatiche) si ha la completa morte dell'infestante.

RICESTAR non ha attività residuale, l'azione graminicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento dell'applicazione.
I migliori risultati in termini di efficacia erbicida si ottengono intervenendo su infestanti in attiva crescita.

Infestanti sensibili: le erbe infestanti sensibili sono *Echinochloa crus-galli* (giavoni rossi) e *Echinochloa phillopogon* (giavoni bianchi).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

RICESTAR si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti in condizioni di risaia non sommersa con terreno saturo. L'applicazione erbicida darà i migliori risultati, se l'acqua verrà reimmessa nelle camere circa 2 giorni dopo il trattamento.

RICESTAR deve essere impiegato, in un'unica applicazione, dalla 3ª foglia alla fase di accestimento del riso.

Il momento ottimale d'intervento contro l'Echinochloa crus-galli (giavoni rossi) è compreso tra lo stadio di 1ª foglia e lo stadio di inizio accestimento dell'infestante, mentre per l'Echinochloa phillopogon (giavoni bianchi) è compreso tra lo stadio di 1ª foglia e lo stadio di 4ª foglia dell'infestante.

Dosi d'impiego: 1,25 - 1,5 l/ha, utilizzare la dose massima in presenza di giavone bianco (*E. phillopogon*)

Volume di irrorazione: 200-400 l/ha

FITOTOSSICITA'

Eventuali ingiallimenti fogliari scompaiono dopo circa 10-15 giorni senza influenzare negativamente le rese.

Avvertenza: il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

COMPATIBILITA'

Si consiglia di effettuare saggi preliminari nel caso di applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE

Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
Usare ad una distanza non inferiore ad un metro dai corsi d'acqua.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

® Marchio registrato

SPHERE®

FUNGICIDA SISTEMICO/MESOSTEMICO
EMULSIONE CONCENTRATA contro Cercospora e Oidio della BARBABIETOLA DA ZUCCHERO e Oidio e Ruggini di GRANO e ORZO

SPHERE®
COMPOSIZIONE
100 g di SPHERE contengono :
17,2 g di trifloxystrobin puro (187,5 g/l)
7,3 g di ciproconazolo puro (80 g/l)
coformulanti quanto basta a 100
Contiene trifloxystrobin: può provocare una reazione allergica

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l.- 20156 MILANO - Viale Certosa 130 – Tel 02/3972.1
Officine di produzione: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Bayer CropScience S.L. Quart der Poblet (Valencia) -Spagna
Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
Registrazione del Ministero della Salute n. 11301 del 07/05/2002
Contenuto netto: 1-5-10 litri

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
TRIFLOXYSTROBIN
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Sintomi aspecifici rilevati solo su animali da laboratorio con surdosaggi.
CIPROCONAZOLO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo l'ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Colture, dosi e modalità di impiego
Barbabietola da zucchero: contro Cercospora (*Cercospora beticola)* e Oidio *(Erysiphe betae)* litri 0,6 – 0,8 per ettaro, 2-3 trattamenti a intervalli di 18-21 giorni.
Utilizzare le dosi più alte e gli intervalli più corti nelle aree ad elevata pressione di infezione ed in particolare: su cercosporiosi intervenire in via preventiva (varietà sensibili) o alla comparsa delle prime macchie confluenti (verietà tolleranti); su Oidio intervenire in via preventiva o ai primi sintomi della malattia.
Grano (duro/tenero) e orzo: contro Ruggine (*Puccinia* spp.) e Oidio (*Erysiphe graminis*) litri 0,6 – 1 per ettaro intervenendo alla prima comparsa delle malattie o comunque nel periodo che va da inizio levata alla fioritura.
Il prodotto possiede effetto collaterale su Fusariosi della spiga quando applicato ad inizio fioritura.
Utilizzare le dosi più alte sulle varietà sensibili e in condizioni favorevoli allo sviluppo del patogeno.
Non effettuare più di 3 trattamenti all'anno.

Compatibilità: SPHERE non è compatibile con prodotti a reazione alcalina come polisolfuri e calce.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Il formulato contiene sostanze attive molto tossiche per gli artropodi utili.
Adoperare ad una distanza non inferiore a 5 metri dai corpi idrici adiacenti ai campi trattati.
Durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione del prodotto adoperare indumenti protettivi e guanti adatti.
Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso professionalmente esposte.

Sospendere i trattamenti 42 giorni prima della raccolta per grano e orzo e 21 giorni per la barbabietola da zucchero.

DPD 30.06.05

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze - Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare al riparo dal gelo.

Bayer CropScience

® marchio registrato

DPD 30.06.05

TELDOR®

FUNGICIDA PER VITE DA TAVOLA E DA VINO, PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO; FRAGOLA, POMODORO E MELANZANA IN PIENO CAMPO ED IN SERRA E PER LA CONSERVAZIONE DEI FRUTTI DI ACTINIDIA
MICROGRANULI IDRODISPERDIBILI IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

TELDOR ®
COMPOSIZIONE
100 g di Teldor contengono:
50 g di fenexamid pura
coformulanti quanto basta a 100
Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 023972.1
Registrazione Ministero della Sanità n. 10532 del 14.06.2000
Officina di produzione : Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania)
Officine di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. Filago (BG); S.C.B. Marle s. Serre (Francia);
STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Contenuto netto: 100-200-250-500 g; 1 kg; 1 kg (2 x 500 g; 4 x 250 g; 5 x 200 g; 10 x 100 g) ; 5 kg (5 x 1 kg), 10 kg (10 x 1 kg), 12 kg (12 x 1 kg), 20 kg (20 x 1 kg), 25 kg (25 x 1 kg)
Partita n.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
FENEXAMID
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.
ISTRUZIONI PER L'USO
Vite da tavola e da vino: contro botrite (***Botrytis cinerea***) intervenire alla dose di 1-1,5 kg/ha di prodotto (0,1-0,15%, pari a un sacchetto da 1 kg in 1000-666 litri di acqua)*, eseguendo il primo trattamento allo stadio di pre-chiusura del grappolo ed il secondo fra l'invaiatura e la maturazione, in dipendenza dell'andamento stagionale. Assicurare una buona ed uniforme bagnatura dei grappoli.
Pesco, albicocco, susino, ciliegio: contro botrite (***Botrytis cinerea***) e monilia (***Monilia spp.***) intervenire alla dose di 1-1,5 kg/ha di prodotto (0,1 - 0,15%, pari a un sacchetto da kg 1 in 1000-666 litri di acqua)*, eseguendo 1-2 trattamenti in fioritura ed 1-2 trattamenti nelle due settimane precedenti la raccolta.
Fragola (in pieno campo ed in serra): contro botrite (***Botrytis cinerea***) intervenire alla dose di 1-1,5 kg/ha di prodotto (0,1-0,15% pari a un sacchetto da 1 kg in 1000-666 litri di acqua)*, con trattamenti a cadenza di 10-14 giorni.
Pomodoro e melanzana (in pieno campo e in serra): contro botrite (***Botrytis cinerea***), intervenire alla dose di 1-1,5 kg/ha di prodotto (0,1-0,15% pari a un sacchetto da 1 kg in 1000-666 litri di acqua)*, con trattamenti a cadenza di 10-14 giorni.
Actinidia: contro botrite (***Botrytis cinerea***) intervenire alla dose di 0,12 kg/hl di prodotto (pari a un sacchetto da kg 1 in 833 litri di acqua)**, eseguendo un trattamento in post-raccolta per irrorazione dei frutti o per immersione nella sospensione acquosa
MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto deve essere sciolto in acqua alle concentrazioni sopra riportate, versandolo direttamente nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua a meta'; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione. Le concentrazioni sono calcolate per irroratrici a volume normale. Nel caso di utilizzo di irroratrici a basso od ultrabasso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro. Su actinidia il prodotto va applicato in post-raccolta per irrorazione dei frutti o per immersione nella sospensione acquosa.
N.B.: come per tutti i prodotti antibotritici a meccanismo d'azione specifico, data l'alta capacita' del fungo di sviluppare ceppi diversi , e' consigliabile la miscela o l'alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. Per evitare l'insorgenza di fenomeni di resistenza non superare con il formulato impiegato da solo la metà dei trattamenti previsti per ogni ciclo colturale contro Botrytis cinerea e Monilia spp.
Usare ad una distanza dai corsi d'acqua di 1 m per le fragole, il pomodoro e le melanzane; 5 m per la vite; 10 m per gli alberi da frutto. Durante l'applicazione su colture arboree e durante le attività di rientro, adoperare tute e guanti.
Compatibilità: Teldor puo' essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 1 giorno (24 ore) prima del raccolto per fragola, pomodoro e melanzana; 3 giorni prima del raccolto per pesco, albicocco, susino, ciliegio; 7 giorni prima del raccolto per vite da tavola e da vino e 60 giorni prima dell'immissione al consumo per actinidia.
ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare al riparo dall'umidita'.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

Edizione del DPD 30.06.05+PHI

oppure

*- pari a un sacchetto da g 500 in 500-333 l tri di acqua
- pari a un sacchetto da g 250 in 250-166 litri di acqua
- pari a un sacchetto da g 200 in 200-133 litri di acqua
- pari a un sacchetto da g 100 in 100-66 litri di acqua

**
- pari a un sacchetto da g 500 in 416 litri di acqua
- pari a un sacchetto da g 250 in 208 litri di acqua
- pari a un sacchetto da g 200 in 166 litri di acqua
- pari a un sacchetto da g 100 in 83 litri di acqua

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

Edizione del DPD 30.06.05+PHI

Etichetta/foglio illustrativo

TELDOR®

FUNGICIDA PER VITE DA TAVOLA E DA VINO, PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO; FRAGOLA, POMODORO E MELANZANA IN PIENO CAMPO ED IN SERRA E PER LA CONSERVAZIONE DEI FRUTTI DI ACTINIDIA
MICROGRANULI IDRODISPERDIBILI

TELDOR®
COMPOSIZIONE
100 g di Teldor contengono:
50 g di fenexamid pura
coformulanti quanto basta a 100
Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 023972.1
Registrazione Ministero della Sanità n. 10532 del 14.06.2000
Officina di produzione : Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania)
Officine di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. Filago (BG); S.C.B. Marle s. Serre (Francia); STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Contenuto netto: 50-100-200-250-500 g; 1-5-10-20-25 kg
Partita n.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
FENEXAMID
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.
ISTRUZIONI PER L'USO
Vite da tavola e da vino: contro botrite (***Botrytis cinerea***) intervenire alla dose di 1-1,5 kg/ha di prodotto (0,1-0,15%), eseguendo il primo trattamento allo stadio di pre-chiusura del grappolo ed il secondo fra l'invaiatura e la maturazione, in dipendenza dell'andamento stagionale. Assicurare una buona ed uniforme bagnatura dei grappoli.
Pesco, albicocco, susino, ciliegio: contro botrite (***Botrytis cinerea***) e monilia (***Monilia spp.***) intervenire alla dose di 1-1,5 kg/ha di prodotto (0,1 - 0,15%), eseguendo 1-2 trattamenti in fioritura ed 1-2 trattamenti nelle due settimane precedenti la raccolta.
Fragola (in pieno campo ed in serra): contro botrite (***Botrytis cinerea***) intervenire alla dose di 1-1,5 kg/ha di prodotto (0,1-0,15%), con trattamenti a cadenza di 10-14 giorni.
Pomodoro e melanzana (in pieno campo e in serra): contro botrite (***Botrytis cinerea***), intervenire alla dose di 1-1,5 kg/ha di prodotto (0,1-0,15%), con trattamenti a cadenza di 10-14 giorni.
Actinidia: contro botrite (***Botrytis cinerea***) intervenire alla dose di 0,12 kg/hl di prodotto, eseguendo un trattamento in post-raccolta per irrorazione dei frutti o per immersione nella sospensione acquosa
MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto deve essere sciolto in acqua alle concentrazioni sopra riportate, versandolo direttamente nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua a metà; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione. Le concentrazioni sono calcolate per irroratrici a volume normale. Nel caso di utilizzo di irroratrici a basso o ultrabasso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.
Su actinidia il prodotto va applicato in post-raccolta per irrorazione dei frutti o per immersione nella sospensione acquosa.
N.B.: come per tutti i prodotti antibotritici a meccanismo d'azione specifico, data l'alta capacità del fungo di sviluppare ceppi diversi , è consigliabile la miscela o l'alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. Per evitare l'insorgenza di fenomeni di resistenza non superare con il formulato impiegato da solo la metà dei trattamenti previsti per ogni ciclo colturale contro Botrytis cinerea e Monilia spp.
Usare ad una distanza dai corsi d'acqua di 1 m per le fragole, il pomodoro e le melanzane; 5 m per la vite; 10 m per gli alberi da frutto. Durante l'applicazione su colture arboree e durante le attività di rientro, adoperare tute e guanti.
Compatibilità: Teldor può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 1 giorno (24 ore) prima del raccolto per fragola, pomodoro e melanzana; 3 giorni prima del raccolto per pesco, albicocco, susino, ciliegio; 7 giorni prima del raccolto per vite da tavola e da vino e 60 giorni prima dell'immissione al consumo per actinidia.
ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare al riparo dall'umidità.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

Edizione del DPD 30.06.05+PHI

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

STICK® STRONG

INSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

STICK® STRONG
Composizione:
Deltametrina pura 2,4 g (= 24,84 g/L)
coformulanti quanto basta a 100
Frasi di Rischio
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza
Titolare dell'autorizzazione
Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1
Registrazione n. 10453 del 19/04/2000 del Ministero della Sanità
Officine di produzione:
SBM Formulation – St. Marcel - Marsiglia – (Francia)
Officina di confezionamento:
Diachem S.p.A. - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG); Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Distribuito da: SCAM S.p.A. – Strada Bellaria, 164 – 41050 S. Maria di Mugnano (MODENA)

Contenuto netto: 10-20-50-100-250-500 ml; 1-5 L
Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree, rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE
Stick Strong è un insetticida che agisce per contatto ed ingestione, con ampio spettro di attività contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
(ml/hl d'acqua)
- Frutticoltura (melo, pero, pesco, albicocco, pruno, ciliegio): contro psilla 90 ml, afide verde del melo, afide del pesco (*Myzus spp., Hyalopterus spp., Brachycaudus persicae*) 35-60 ml, cocciniglia di S. Josè 60-90 ml (in trattamenti estivi contro neanidi mobili). Contro carpocapsa 35 ml, cidia e anarsia 60-80 ml, capua, cacoecia e altri tortricidi 35-60 ml, microlepidotteri del melo e del pero 35-60 ml. Contro antonomo, maggiolino, tentredini, tripidi, cecidomidi e mosca della frutta 35-60 ml.
- Viticoltura: contro tignole 50-70 ml, piralide, nottue, cicaline, afidi, sigaraio 35-60 ml.
- Agrumicoltura: contro afidi 50-60 ml, aleurodidi e Saissetia 50-70 ml, mosca degli agrumi 60 ml.
- Olivicoltura: contro Saissetia 50-70 ml, tignola (*Prays oleae*) e tripide 60 ml, mosca delle olive 60 ml, in trattamento preventivo.
- Orticoltura: (pomodoro, patata, peperone, melanzana, cavolo, cetriolo, lattughe e simili, rucola, spinacio, asparago, carciofo, pisello, fagiolino, fagiolo, fava, cipolla, porro, carota, sedano), fragola: contro dorifora, altiche, cavolaia, nottue, tripidi, tentredini: 35 ml; afidi, aleurodidi, cimici, piralide, casside, tignola, mosca e depressaria: 60 ml
- Cereali
- frumento, mais (trattamenti primaverili-estivi): contro nottue, tripidi, e afidi del frumento 35 ml; altri afidi, cimici, piralidi, diabrotica (mais): 60 ml.
- **frumento, orzo** (trattamenti autunnali): contro afidi vettori del nanismo giallo 0,35-0,6 l/ha, allo stadio di 1-3 foglie, ripetendo, se necessario, il trattamento dopo 15 giorni circa.
- **Barbabietola da zucchero:** contro altiche e nottue 35 ml, cleono e lisso 60 ml
- Colza: contro altiche, meligete, afidi, punteruoli: 0,35-0,6 l/ha
- Soia: contro nottue, cimici, tortricidi, vanessa, altica, afidi: 0,35-0,6 l/ha
- Tabacco: contro nottue, afidi, tripidi, pulce (*Epitrix*): 0,35-0,6 l/ha
- Cotone: contro nottue, piralide, tignola, cicalina, tripidi, lygus: 0,35 l/ha
- Funghi: contro ditteri, collemboli: 35-60 ml
- **Medicai:** contro cavallette, intervenendo sui nuovi ricacci 5-10 giorni dopo lo sfalcio: 0,6 l/ha.
- **Pioppicoltura**
- **pioppo in vivaio:** contro gemmaiola, tarlo vespa: 60 ml; contro criptorrinco, con trattamenti localizzati al tronco: 90-120 ml
- **pioppo in piantagione:** contro criptorrinco, con trattamenti localizzati al tronco: 90-120 ml; contro saperda, con trattamenti localizzati al tronco: 180-240 ml; contro crisomelidi defogliatori: crisomela, crisomelidi minori e stilpnotia: 35-60 ml
- Floricoltura (in pieno campo o in serra): contro afidi, aleurodidi, tripidi, cetonie, maggiolino 60 ml, tortrici dei garofani (Bega e Epicoristode) 60-120 ml.
- **Vivai e colture ornamentali** (in pieno campo o in serra): contro afidi, cimice del platano (Corythuca), larve di lepidotteri, maggiolino 60 ml.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

Per preparare la miscela versare la dose stabilita di Stick Strong nel quantitativo di acqua previsto, agitando la sospensione acquosa ottenuta. Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro. Stick Strong agisce per contatto e ingestione, occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato badando a che la bagnatura sia il più uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di un bagnante. Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti delle foglie.

COMPATIBILITÀ
Stick Strong non è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile è necessario aggiungere la dose di Stick Strong preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicida già preparata, mantenendo l'agitazione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU COLZA; 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU ERBA MEDICA, SOIA, COTONE; 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU CIPOLLA, SEDANO E PORRO; 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SULLE ALTRE COLTURE.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® marchio registrato SCAM

DPD 30.06.05/a

ETOCIL® SC

Erbicida di pre-emergenza per la barbabietola da zucchero
Formulazione: Sospensione Concentrata (SC)

ETOCIL® SC

Composizione:
Etofumesate puro 26,38 g (=300 g/l)
Lenacil* puro 10,55 g (=120 g/l)
Coformulanti quanto basta a 100 g

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1

Registrazione n° 11000 del 30/07/2001 del Ministero della Salute

Officine di produzione:
Bayer CropScience GmbH, Wolfenbüttel – Germania; Bayer CropScicence Ltd., Hauxton (Cambridge) – Inghilterra; SBM Formulation - St. Marcel - Marsiglia – Francia; ISAGRO S.p.A. - Aprilia (LT)

Distribuito da: SCAM S.p.A.- Strada Bellaria, 164 – 41050 S. Maria di Mugnano (MO)

Contenuto netto: 1 - 5 - 10 litri

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
ETOCIL SC è un erbicida selettivo per la barbabietola da zucchero da impiegare in:
Pre-emergenza subito dopo la semina e comunque prima della emergenza delle infestanti.
ETOCIL SC può essere usato su tutti i tipi di terreno ad eccezione di quelli sabbiosi o molto ricchi di calcare e su terreni ad alto contenuto in sostanza organica (torbosi) in cui l'attività del prodotto può risultare ridotta.
Caratteristica peculiare di ETOCIL SC è la sua marcata azione di pre-condizionamento esercitata sulle infestanti emerse dopo un trattamento di pre-emergenza, che risultano così essere molto più sensibili al trattamento in post-emergenza.

DOSI E MODALITÁ D'IMPIEGO
ETOCIL SC può essere impiegato su barbabietola da zucchero in pre-emergenza alla dose di:
- **2 – 2,5 l/ha:** utilizzare questa dose quando si mira ad un effetto di precondizionamento delle infestanti da eliminare con un intervento programmato di post-emergenza.
- **3 – 3,5 l/ha:** utilizzare questa dose su terreni pesanti ed in presenza di una prevedibile forte emergenza di infestanti a nascita precoce (*Polygonum spp., Stellaria m., Galium a., Fumaria o., Mercurialis a.*, ed altre).

Il prodotto può essere distribuito anche localizzato, utilizzare un volume d'acqua di 300-500 litri/ha.

Efficacia
ETOCIL SC controlla le più comuni infestanti annuali tipiche dei bietolai, sia graminacee (*Alopecurus m., Digitaria s., Echinochloa* spp.), che dicotiledoni (*Amaranthus r., Anagallis a., Atriplex p., Capsella b.p., Fumaria o., Galium a., Mercurialis a., Papaver r., Polygonum spp., Raphanus r., Sinapis a., Solanum n., Stellaria m.*).
Lolium, Lamium, Veronica e *Senecio* sono parzialmente resistenti.

Condizioni di trattamento
Un sufficiente grado udometrico del terreno nel periodo successivo al trattamento è condizione necessaria per ottenere un buon risultato: in caso di necessità effettuare un intervento irriguo.
Se dopo il trattamento si dovesse abbandonare la coltivazione della bietola, prima di seminare un'altra coltura, effettuare una aratura profonda.
Non impiegare il prodotto in terreni sciolti e calcarei per evitare effetti fitotossici e nei terreni eccessivamente organici per evitare inefficacia.

FITOTOSSICITÁ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

COMPATIBILITÁ
ETOCIL SC è compatibile con i diserbanti ad azione disseccante.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® marchio registrato SCAM DPD 30.06.05/b

* Lenacil è prodotto dalla E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.), U.S.A.

MERCURY® SE

Erbicida selettivo di post-emergenza per la barbabietola da zucchero in suspo-emulsione

MERCURY® SE

Composizione:
Fenmedifam puro 12,38% (= 125 g/l)
Desmedifam puro 3,96% (= 40 g/l)
coformulanti q. b. a 100.

Frasi di Rischio :
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
Non gettare i residui nelle fognature.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione :
- SBM Formulation – St. Marcel – Marsiglia – (Francia)
-Bayer CropScience GmbH – Wolfenbüttel - Germania
-Bayer CropScience GmbH – Francoforte s/Meno - Germania
-Bayer CropScience Ltd., Hauxton (Cambridge) - Regno Unito

Registrazione n°11080 del 09/11/01 del Ministero della Sanità

Distribuito da: SIAPA S.r.l. – Via Caldera, 21 – 20153 MILANO

Contenuto netto: 1 – 5 l

Partita n.:

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE

Il MERCURY SE è un erbicida di post-emergenza che agisce per assorbimento fogliare sulla maggior parte delle infestanti a foglia larga presenti nei bietolai. Il Desmedifam possiede rispetto al Fenmedifam una maggior rapidità d'azione sulle infestanti ed una maggiore efficacia nei confronti di Amaranto (*Amaranthus* spp.), Erba morella (*Solanum nigrum*), Poligonacee in genere ed alcune Crucifere (*Sinapis arvensis*). L'associazione di Desmedifam e Fenmedifam consente l'intervento su infestanti più sviluppate rispetto al solo Fenmedifam. Il prodotto controlla le più importanti infestanti dicotiledoni presenti nei bietolai:
Amaranto (*Amaranthus* spp.), Anagallide rossa (*Anagallis arvensis*), Atriplice (*Atriplex patula*), Borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Farinello (*Chenopodium album*), Stramonio (*Datura stramonium*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*), Attaccamano (*Galium aparine*), Linaria (*Linaria minor*), Nontiscordardime (*Myosotis arvensis*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Convolvolo nero (*Polygonum convolvulus*), Persicaria maggiore (*Polygonum lapathifolium*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Ramolaccio selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Erba calderina (*Senecio vulgaris*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*),Erba morella (*Solanum nigrum*), Crespino liscio (*Sonchus oleraceus*), Spergola arvense (*Spergula arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*), Erba storna (*Thlaspi arvense*),Veronica (*Veronica* spp).

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Il prodotto deve essere impiegato in post-emergenza nei modi seguenti:
applicazione unica: intervenire su barbabietole che abbiano già differenziato le due foglie vere alla dose di 2,5-3,5 l/ha diluiti in 250-300 litri di acqua.
applicazione frazionata: eseguire 2 interventi, il primo dei quali alla dose di 0,7-1 l/ha allo stadio di massimo sviluppo delle foglie cotiledonari/prime foglie vere della bietola. Effettuare il secondo dopo 7-10 giorni con 1-1,2 l/ha diluiti in 150-200 litri d'acqua.
Qualora fosse stato già effettuato un trattamento in pre-semina o in pre-emergenza, è possibile posticipare il primo intervento su barbabietole allo stadio di 2-4 foglie, ripetendolo se necessario, sempre a distanza di 7-10 giorni.
Interventi ripetuti a bassi dosaggi (tecnica DMR): indipendentemente dallo stadio di sviluppo della bietola, intervenire alla dose di 0,5-0,7 l/ha in 100-150 litri di acqua alla prima comparsa delle infestanti. Il trattamento va ripetuto a 0,7-0,9 l/ha per altre 1-2 volte, orientativamente a cadenza di 7-10 giorni seguendo l'emergenza delle infestanti.

AVVERTENZE: per ottenere un ottimo risultato nell'impiego del prodotto bisogna attenersi a determinate avvertenze quali:
-non trattare con temperature che superino i 23-25 °C
-non trattare quando si prevede una pioggia entro le 24 ore dal trattamento
-non trattare su barbabietole sofferenti
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: riempire la botte per metà, versare il totale quantitativo di prodotto richiesto e portare successivamente a volume agitando di continuo.
La temperatura dell'acqua deve essere possibilmente superiore a 10 °C.

COMPATIBILITA'

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso é pericoloso.
Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05/a

® Marchio registrato

SUGARBETA® PLUS SE

DISERBANTE DI POST-EMERGENZA PER LA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
FORMULAZIONE: SUSPO-EMULSIONE (SE)

SUGARBETA® PLUS SE

Composizione:
Fenmedifam puro 7,21% (75 g/l)
Desmedifam puro 1,44% (15 g/l)
Etofumesate puro 11,06% (115 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1

Registrazione n°11160 del 24/01/02 del Ministero della Salute

Officine di produzione
-Bayer CropScience GmbH, Wolfenbüttel – Germania
-Bayer CropScience GmbH, Francoforte s/ Meno – Germania
-SBM Formulation – St. Marcel – Marsiglia – (Francia)
-Bayer CropScience Ltd., Hauxton (Cambridge) – Inghilterra

Officine di confezionamento
-Isagro S.p.A. – Aprilia (**LT**).
-AgriFormula s.r.l – Paganica (AQ).

Distribuito da: SCAM S.p.A. – Strada Bellaria, 164 – 41050 S. Maria di Mugnano (MODENA)

CONTENUTO NETTO: 1 - 5 L
Partita N°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
SUGARBETA PLUS SE è un formulato che, grazie alla complementarietà delle sostanze attive contenute, risulta particolarmente adatto per gli interventi frazionati o ripetuti a basse dosi nel post-emergenza della barbabietola da zucchero. Le infestanti vengono controllate prevalentemente per contatto con l'apparato fogliare; la componente Etofumesate inoltre esplica anche un'azione residuale.
Il prodotto si è dimostrato attivo verso un'ampia gamma di infestanti a foglia larga, comprese quelle di più difficile controllo come ad esempio: *Polygonum* spp. (Poligonacee), *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Solanum n.* (Erba morella), *Mercurialis a.* (Mercurella), *Euphorbia h.* (Erba calenzola), *Stellaria m.* (Centocchio), *Stachys a.* (Erba strega), *Picris h.* (Asparaggine), *Galium a.* (Attaccamani). Il prodotto è inoltre attivo nei confronti delle graminacee ai primissimi stadi di sviluppo (1-3 foglie).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
I migliori risultati si ottengono intervenendo su infestanti molto piccole (cotiledoni - 2 foglie) e in modo particolare ricorrendo agli interventi frazionati o ripetuti con dosi ridotte.

Interventi ripetuti a bassi dosaggi (microdosi)
Intervenire con SUGARBETA PLUS SE alla dose di 0,8 litri per ettaro in 100-150 litri di soluzione alla prima comparsa delle infestanti, indipendentemente dallo stadio di sviluppo della bietola.
Il trattamento va ripetuto a 0,8 litri per ettaro di formulato per altre 1-2 volte, orientativamente a cadenza di 7-10 giorni e comunque seguendo l'emergenza delle infestanti.

Intervento frazionato
Eseguire due interventi, iniziando il programma allo stadio di massimo sviluppo delle foglie cotiledonari/prime foglie vere della bietola.
Intervenire nella prima frazione con SUGARBETA PLUS SE alla dose di 1,2-1,5 litri per ettaro in 150-200 litri d'acqua.
La seconda frazione va effettuata dopo 10 giorni circa con SUGARBETA PLUS SE alla dose di 1,5 litri per ettaro in 200 litri d'acqua.

Intervento unico
Utilizzare SUGARBETA PLUS SE alla dose di 2,5-3,0 litri per ettaro in 250-300 litri d'acqua su bietole che abbiano già differenziato le 4 foglie vere.
Indipendentemente dalla tecnica utilizzata è buona norma attenersi alle seguenti avvertenze generali:
- Evitare di intervenire con temperature superiori a 22-23°C; con temperature più elevate è preferibile trattare nel tardo pomeriggio.
- Effettuare il trattamento in assenza di vento, avendo cura di bagnare in modo uniforme le infestanti utilizzando volumi d'acqua necessari per le diverse tecniche d'impiego.
- Non eseguire il trattamento su infestanti bagnate dalla rugiada, nell'imminenza di una pioggia o su bietole sofferenti, danneggiate da insetti, patogeni o altre cause.

Assicurarsi che le attrezzature per il diserbo non contengano residui di altri erbicidi, per precauzione prima dell'uso lavare sempre con cura e più volte le pompe con acqua e soda o con carbone attivo.

COMPATIBILITÀ
SUGARBETA PLUS SE è miscibile con gli altri erbicidi di post-emergenza, idonei ad ampliarne lo spettro d'azione, quali quelli a base di cloridazon, metamitron, lenacil, clopiralid, propizamide, triflusulfuron-metil e graminicidi a base di haloxyfop-etossietile, cletodim, cicloxidim, fenoxaprop-p-etile, fluazifop-p-butile, propaquizofop, quizalofop-etile, setossidim e metolaclor e con olio bianco.
Si sconsiglia l'impiego di SUGARBETA PLUS SE in associazione ad insetticidi liquidi o in polvere bagnabile a base di Azinfos.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico sulle colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Conservare al riparo dal gelo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® marchio registrato SCAM

DPD 30.06.05/a

KEMIFAM TRIO FL

DISERBANTE DI POST-EMERGENZA PER LA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
FORMULAZIONE: SUSPO-EMULSIONE (SE)

KEMIFAM TRIO FL

Composizione:
Fenmedifam puro 7,21% (75 g/l)
Desmedifam puro 1,44% (15 g/l)
Etofumesate puro 11,06% (115 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Registrazione n° 11282 del 12/04/02 del Ministero della Salute

Officine di produzione:
-Bayer CropScience GmbH - Wolfenbüttel - Germania
-Bayer CropScience GmbH - Francoforte s/Meno - Germania
-SBM Formulation – St. Marcel - 13367 Marsiglia - Francia
-Bayer CropScience Ltd. -Hauxton (Cambridge) - Inghilterra

Officine di confezionamento:
-Isagro S.p.A. – Aprilia (LT).
-AgriFormula s.r.l – Paganica (AQ).

Distribuito da: SIPCAM S.p.A. – Via Sempione, 195 – 20016 Pero (MILANO)

CONTENUTO NETTO: 1 - 5 L
PARTITA N°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE
KEMIFAM TRIO FL è un formulato che, grazie alla complementarietà delle sostanze attive contenute, risulta particolarmente adatto per gli interventi frazionati o ripetuti a basse dosi nel post-emergenza della barbabietola da zucchero. Le infestanti vengono controllate prevalentemente per contatto con l'apparato fogliare; la componente Etofumesate inoltre esplica anche un'azione residuale.
Il prodotto si è dimostrato attivo verso un'ampia gamma di infestanti a foglia larga, comprese quelle di più difficile controllo come ad esempio: *Polygonum* spp. (Poligonacee), *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Solanum* n. (Erba morella), *Mercurialis a.* (Mercurella), *Euphorbia h.* (Erba calenzola), *Stellaria m.* (Centocchio), *Stachys a.* (Erba strega), *Picris h.* (Asparaggine), *Galium a.* (Attaccamani). Il prodotto è inoltre attivo nei confronti delle graminacee ai primissimi stadi di sviluppo (1-3 foglie).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
I migliori risultati si ottengono intervenendo su infestanti molto piccole (cotiledoni - 2 foglie) e in modo particolare ricorrendo agli interventi frazionati o ripetuti con dosi ridotte.

Interventi ripetuti a bassi dosaggi (microdosi)
Intervenire con KEMIFAM TRIO FL alla dose di 0,8 litri per ettaro in 100-150 litri di soluzione alla prima comparsa delle infestanti, indipendentemente dallo stadio di sviluppo della bietola.
Il trattamento va ripetuto a 0.8 litri per ettaro di formulato per altre 1-2 volte, orientativamente a cadenza di 7-10 giorni e comunque seguendo l'emergenza delle infestanti.

Intervento frazionato
Eseguire due interventi, iniziando il programma allo stadio di massimo sviluppo delle foglie cotiledonari/prime foglie vere della bietola.
Intervenire nella prima frazione con KEMIFAM TRIO FL alla dose di 1,2-1,5 litri per ettaro in 150-200 litri d'acqua.
La seconda frazione va effettuata dopo 10 giorni circa con KEMIFAM TRIO FL alla dose di 1,5 litri per ettaro in 200 litri d'acqua.

Intervento unico
Utilizzare KEMIFAM TRIO FL alla dose di 2,5-3,0 litri per ettaro in 250-300 litri d'acqua su bietole che abbiano già differenziato le 4 foglie vere.
Indipendentemente dalla tecnica utilizzata è buona norma attenersi alle seguenti avvertenze generali:
- Evitare di intervenire con temperature superiori a 22-23°C; con temperature più elevate è preferibile trattare nel tardo pomeriggio.
- Effettuare il trattamento in assenza di vento, avendo cura di bagnare in modo uniforme le infestanti utilizzando volumi d'acqua necessari per le diverse tecniche d'impiego.
- Non eseguire il trattamento su infestanti bagnate dalla rugiada, nell'imminenza di una pioggia o su bietole sofferenti, danneggiate da insetti, patogeni o altre cause.

Assicurarsi che le attrezzature per il diserbo non contengano residui di altri erbicidi, per precauzione prima dell'uso lavare sempre con cura e più volte le pompe con acqua e soda o con carbone attivo.

COMPATIBILITÀ
KEMIFAM TRIO FL è miscibile con gli altri erbicidi di post-emergenza, idonei ad ampliarne lo spettro d'azione, quali quelli a base di cloridazon, metamitron, lenacil, clopiralid, propizamide, triflusulfuron-metil e graminicidi a base di haloxyfop-etossietile, cletodim, cicloxidim, fenoxaprop-p-etile, fluazifop-p-butile, propaquizofop, quizalofop-etile, setossidim e metolaclor, e con olio bianco.
Si sconsiglia l'impiego di KEMIFAM TRIO FL in associazione ad insetticidi liquidi o in polvere bagnabile a base di Azinfos.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico sulle colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo del gelo. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05/a

NIVAL TRIO SE

DISERBANTE DI POST-EMERGENZA PER LA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
FORMULAZIONE: SUSPO-EMULSIONE

NIVAL TRIO SE
Composizione
Fenmedifam puro 7,21 % (75 g/l)
Desmedifam puro 1,44 % (15 g/l)
Etofumesate puro 11,06 % (115 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere , né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Registrazione n° 11588 del 14.02.2003 del Ministero della Salute
Officine di produzione:
-Bayer CropScience GmbH - Wolfenbüttel - Germania
-Bayer CropScience GmbH - Francoforte s/Meno – Germania
-SBM Formulation – St. Marcel – Marsiglia – (Francia)
-Bayer CropScience Ltd. - Hauxton (Cambridge) - Inghilterra
Officine di confezionamento:
-Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)
-AgriFormula s.r.l – Paganica (AQ).
Distribuito da: ISAGRO Italia S.p.A. – Via Caldera, 21 – 20153 MILANO
CONTENUTO NETTO: 1 - 5 L
Partita N°

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
NIVAL TRIO SE è un formulato che, grazie alla complementarietà delle sostanze attive contenute, risulta particolarmente adatto per gli interventi frazionati o ripetuti a basse dosi nel post-emergenza della barbabietola da zucchero. Le infestanti vengono controllate prevalentemente per contatto con l'apparato fogliare; la componente Etofumesate inoltre esplica anche un'azione residuale.
Il prodotto si è dimostrato attivo verso un'ampia gamma di infestanti a foglia larga, comprese quelle di più difficile controllo come ad esempio: Polygonum spp. (Poligonacee), Amaranthus spp. (Amaranto), Solanum n. (Erba morella), Mercurialis a. (Mercurella), Euphorbia h. (Erba calenzola), Stellaria m. (Centocchio), Stachys a. (Erba strega), Picris h. (Asparaggine), Galium a. (Attaccamani). Il prodotto è inoltre attivo nei confronti delle graminacee ai primissimi stadi di sviluppo (1-3 foglie).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
I migliori risultati si ottengono intervenendo su infestanti molto piccole (cotiledoni - 2 foglie) e in modo particolare ricorrendo agli interventi frazionati o ripetuti con dosi ridotte

Interventi ripetuti a bassi dosaggi (microdosi)
Intervenire con NIVAL TRIO SE alla dose di 0,8 litri per ettaro in 100-150 litri di soluzione alla prima comparsa delle infestanti, indipendentemente dallo stadio di sviluppo della bietola.
Il trattamento va ripetuto a 0,8 litri per ettaro di formulato per altre 1-2 volte, orientativamente a cadenza di 7-10 giorni e comunque seguendo l'emergenza delle infestanti.

Intervento frazionato
Eseguire due interventi, iniziando il programma allo stadio di massimo sviluppo delle foglie cotiledonari/prime foglie vere della bietola.
Intervenire nella prima frazione con NIVAL TRIO SE alla dose di 1,2-1,5 litri per ettaro in 150-200 litri d'acqua.
La seconda frazione va effettuata dopo 10 giorni circa con NIVAL TRIO SE alla dose di 1,5 litri per ettaro in 200 litri d'acqua.

Intervento unico
Utilizzare NIVAL TRIO SE alla dose di 2,5-3,0 litri per ettaro in 250-300 litri d'acqua su bietole che abbiano già differenziato le 4 foglie vere.
Indipendentemente dalla tecnica utilizzata è buona norma attenersi alle seguenti avvertenze generali:
- Evitare di intervenire con temperature superiori a 22-23°C; con temperature più elevate è preferibile trattare nel tardo pomeriggio.
- Effettuare il trattamento in assenza di vento, avendo cura di bagnare in modo uniforme le infestanti utilizzando volumi d'acqua necessari per le diverse tecniche d'impiego.
- Non eseguire il trattamento su infestanti bagnate dalla rugiada, nell'imminenza di una pioggia o su bietole sofferenti, danneggiate da insetti, patogeni o altre cause.

Assicurarsi che le attrezzature per il diserbo non contengano residui di altri erbicidi, per precauzione prima dell'uso lavare sempre con cura e più volte le pompe con acqua e soda o con carbone attivo,

COMPATIBILITÀ
NIVAL TRIO SE è miscibile con gli altri erbicidi di post-emergenza, idonei ad ampliarne lo spettro d'azione, quali quelli a base di cloridazon, metamitron, lenacil, clopiralid, propizamide, triflusulfuron-metil e graminicidi a base di haloxyfop-etossietile, cletodim, cicloxidim, fenoxaprop-p-etile, fluazifop-p-butile, propaquizofop, quizalofop-etile, setossidim e metolaclor, e con olio bianco.
Si sconsiglia l'impiego di NIVAL TRIO SE in associazione ad insetticidi liquidi o in polvere bagnabile a base di Azinfos.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ Il prodotto può essere fitotossico sulle colture non indicate in etichetta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare al riparo dal gelo

Bayer CropScience

DPD 30.06.05/a

IBT 25

INSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

Etichetta/ foglio illustrativo

IBT 25
Composizione:
100 g di prodotto contengono
Deltametrina pura 2,4 g (= 24,84 g/L)
coformulanti q. b. a 100

Frasi di Rischio
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione
Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione:
Bayer CopScience S.r.l. – Filago (BG); SBM Formulation – St. Marcel - Marsiglia – (Francia)
Officine di confezionamento: Diachem S.p.A. - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG); IRCA Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)
Registrazione N 11768 del 12/11/2003 del Ministero della Salute
Distribuito da: COMPO Agricoltura S.p.A. – Via Marconato ,8 – 20031 Cesano Maderno (MI)
Contenuto netto: 5-10-20–25-50-100-150-250 ml / 1 - 5 L
Partita N°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilita' da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonche' dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree, rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione , edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Avvertenze: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
IBT 25 e' un insetticida che agisce per contatto ed ingestione, con ampio spettro di attivita' contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO (ml/hl d'acqua)
- **Frutticoltura** (melo, pero, pesco, albicocco, pruno, ciliegio): contro psilla 90 ml, afide verde del melo, afide del pesco (Myzus spp., Hyalopterus spp., Brachycaudus persicae) 35-60 ml, cocciniglia di S. Jose' 60-90 ml (in trattamenti estivi contro neanidi mobili). Contro carpocapsa 35 ml, cidia e anarsia 60-80 ml, capua, cacoecia e altri tortricidi 35-60 ml, microlepidotteri del melo e del pero 35-60 ml. Contro antonomo, maggiolino, tentredini, tripidi, cecidomidi e mosca della frutta 35-60 ml.
- **Viticoltura**: contro tignole 50-70 ml, piralide, nottue, cicaline, afidi, sigaraio 35-60 ml.
- **Agrumicoltura**: contro afidi 50-60 ml, aleurodidi e Saissetia 50-70 ml, mosca degli agrumi 60 ml.
- **Olivicoltura**: contro Saissetia 50-70 ml, tignola (Prays oleae) e tripide 60 ml, mosca delle olive 60 ml, in trattamento preventivo.
- **Orticoltura** (pomodoro, patata, peperone, melanzana, cavolo, cetriolo, lattughe e simili, rucola, spinacio, asparago, carciofo, pisello, fagiolino, fagiolo, fava, cipolla, porro, carota, sedano), fragola: contro dorifora, altiche, cavolaia, nottue, tripidi e tentredini: 35 ml; afidi, aleurodidi, cimici, piralide, casside, tignola, mosca e depressaria: 60 ml.
- **Cereali**
- **frumento, mais** (trattamenti primaverili-estivi): contro nottue, tripidi e afidi del frumento: 35 ml; altri afidi, cimici, piralidi: 60 ml.
- **frumento, orzo** (trattamenti autunnali): contro afidi vettori del nanismo giallo: 0,35-0,6 l/ha, allo stadio di 1-3 foglie, ripetendo, se necessario, il trattamento dopo 15 giorni circa.
- **Barbabietola da zucchero**: contro altiche e nottue 35 ml, cleono e lisso 60 ml.
- **Colza**: contro altiche, meligete, afidi, punteruoli: 0,35-0,6 l/ha.
- **Soia**: contro nottue, cimici, tortricidi, vanessa, altica, afidi: 0,35-0,6 l/ha.
- **Tabacco**: contro nottue, afidi, tripidi, pulce (Epitrix): 0,35-0,6 l/ha.
- **Cotone**: contro nottue, piralide, tignola, cicalina, tripidi, lygus: 0,35 l/ha.
- **Funghi**: contro ditteri, collemboli: 35-60 ml.
- **Medicai**: contro cavallette, intervenendo sui nuovi ricacci 5-10 giorni dopo lo sfalcio: 0,6 l/ha.
- **Pioppicoltura**
- **Pioppo in vivaio**: contro gemmaiola, tarlo vespa: 60 ml; contro criptorrinco, con trattamenti localizzati al tronco: 90-120 ml.
- **Pioppo in piantagione**: contro criptorrinco, con trattamenti localizzati al tronco: 90-120 ml; contro saperda, con trattamenti localizzati al tronco: 180-240 ml; contro crisomelidi defogliatori: crisomela, crisomelidi minori e stilpnotia: 35-60 ml.
- **Floricoltura** (in pieno campo o in serra): contro afidi, aleurodidi, tripidi, cetonie, maggiolino 60 ml, tortrici dei garofani (Bega e Epicoristode) 60-120 ml.
- **Vivai e colture ornamentali** in pieno campo o in serra: contro afidi, cimice del platano (Corythuca), larve di lepidotteri, maggiolino 60 ml.

Per preparare la miscela versare la dose stabilita di IBT 25 nel quantitativo di acqua previsto, agitando la sospensione acquosa ottenuta.
Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale.
Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro.

IBT 25 agisce per contatto e ingestione, occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato badando a che la bagnatura sia il più uniforme possibile su tutta la vegetazione.
In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di un bagnante. Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti delle foglie.

COMPATIBILITA'

IBT 25 non e' miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile e' necessario aggiungere la dose di IBT 25 preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicida già preparata, mantenendo l'agitazione.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU COLZA, 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU ERBA MEDICA, SOIA E COTONE, 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU CIPOLLA, SEDANO E PORRO, 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SULLE ALTRE COLTURE.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

DPD 30.06.05/b

Bayer CropScience

CURIT® Linea ELECTIS

Fungicida sistemico per la difesa della vite dalla Peronospora
Polvere Bagnabile (WP) in sacchetti idrosolubili

CURIT® LINEA ELECTIS

COMPOSIZIONE
Fenamidone puro 4 g
Iprovalicarb puro 4,8 g
Fosetyl Al puro 52 g
Coformulanti q.b. a 100 g

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione
Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione e confezionamento
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
AgriFormula S.r.l. – Paganica (AQ)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Distribuito da: DOW AgroSciences Italia S.r.l. – Via Patroclo, 21 – 20151 MILANO

Contenuto netto: 1 kg (4 x 250 g), 1 kg (5 x 200 g), 1 kg (2 x 500 g); 1 Kg (1 x 1 kg), 2 kg (8 x 250 g), 2 kg (5 x 400 g), 2 kg (4 x 500 g), 2 kg (2 x 1 kg), 5 kg (5 x 1 kg), 5 kg (1 x 5 kg), 8 kg (8 x 1 kg), 8 kg (4 x 2 kg), 10 kg (4 x 2,5 kg), 10 kg (10 x 1 kg), 10 kg (1 x 10 kg)

Registrazione Ministero della Salute N.11883 del 22.10.2003
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
CURIT Linea ELECTIS è un'associazione di principi attivi con azione fungicida per l'impiego nella difesa della vite. Il prodotto è dotato di azione sistemica e di copertura, ed è in grado di svolgere un'azione preventiva e curativa contro la Peronospora.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Vite da vino e vite da tavola : contro Peronospora (*Plasmopara viticola)* intervenire preventivamente alla dose di 250 g/hl (2,5 kg/ha) con trattamenti effettuati ogni 12-14 giorni nelle fasi vegetative comprese tra la differenziazione dei grappolini e la chiusura del grappolo.
Con forte pressione infettiva, applicare CURIT Linea ELECTIS alla dose di 300 g/hl (3 kg/ha).
Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di prodotto per ettaro.
Su uve da tavola evitare applicazioni tardive per evitare imbrattamento agli acini.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto può avere dei problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame, con alcuni fitostimolatori e concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Per queste associazioni risulta opportuno effettuare saggi preliminari, per verificarne la compatibilità.

Non effettuare miscele con formulati oleosi.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLI DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto

AVVERTENZE
Effettuare al massimo 3 applicazioni per anno con CURIT Linea ELECTIS
Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 20 metri.
Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione irrorata sia completamente asciutta.
Per lavorazioni agricole da eseguirsi entro i tempi di carenza, indossare guanti ed indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

DPD 30.06.05/a

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05/a

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ELICIO®

Fungicida sistemico per la difesa antiperonosporica della vite, del tabacco, del melone e della lattuga.

Granuli idrodispersibili (WG)

ELICIO®

Composizione
Fenamidone puro 4,4 g
Fosetyl Al puro 66,7 g
coformulanti q.b. a 100 g

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione
Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa, 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione e confezionamento:
Bayer CropScience France, Villefranche (France)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)
Officina di confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Distribuito da: SIPCAM S.p.A. – Via Sempione, 195 – 20016 Pero (Milano)

Contenuto netto: 100 - 200 - 250 -300 - 500 g; 1 – 2 – 2,5 – 5 – 8 – 10 – 15 – 20 - 25 kg

Registrazione Ministero della Salute N. 11885 del 22.10.2003

Partita n.

® Marchio registrato

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
ELICIO è un'associazione di principi attivi ad azione sistemica e di copertura, in grado di svolgere un'azione preventiva per l'impiego nella difesa antiperonosporica della vite, del tabacco, del melone e della lattuga.
Su vite il prodotto ha azione di contenimento anche nei confronti di oidio.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI
Vite da vino e vite da tavola : contro Peronospora (*Plasmopara viticola)* intervenire preventivamente alla dose di 230-250 g/hl (2,3-2,5 kg/ha) con trattamenti effettuati ogni 10-12 giorni, oppure alla dose di 280-300 g/hl (2,8-3 kg/ha) ogni 12-14 giorni. Eseguire le applicazioni nelle fasi comprese tra la differenziazione dei grappolini e l'inizio dell'ingrossamento degli acini.

Tabacco e Melone : contro Peronospora (*Peronospora tabacina – Pseudoperonospora cubensis*) intervenire preventivamente alla dose di 250-300 g/hl (2,5-3 kg/ha) ogni 8-12 giorni, in relazione alla pressione della malattia ed allo sviluppo delle piante.

Lattuga : contro Bremia (*Bremia lactucae*) alla dose di 200-250 g/hl (2-2,5 kg/ha) ogni 8-10 giorni, in relazione alla pressione della malattia ed allo sviluppo delle piante.

Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di prodotto per ettaro.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto può avere dei problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame, alcuni fitostimolatori e concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Per queste associazioni risulta opportuno effettuare saggi preliminari, per verificarne la compatibilità.
Non effettuare miscele con formulati oleosi.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLI DI SICUREZZA : 40 giorni su vite, 30 giorni su tabacco e 15 giorni su melone e lattuga.

DPD 30.06.05/b

AVVERTENZE
Su tutte le colture effettuare al massimo 3 applicazioni per anno con prodotti caratterizzati dallo stesso meccanismo di azione.
E' consentito invece l'impiego contemporaneo (miscela estemporanea) di prodotti aventi lo stesso meccanismo di azione se impiegati contro malattie diverse, senza che questo modifichi il numero totale di trattamenti.
Nei vigneti o appezzamenti dove siano state osservate perdite di efficacia a seguito dell'impiego di prodotti avente uguale meccanismo di azione, utilizzare prodotti che agiscano sul fungo con modalità diversa.

Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 20 m per la vite, 10 m per melone, tabacco e lattuga.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze - Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

BAYER Bayer CropScience

DPD 30.06.05/b

RASIKAL® ULTRA

concentrato solubile
DISERBANTE SISTEMICO DI POST-EMERGENZA AD AZIONE FOGLIARE

Rasikal® Ultra
COMPOSIZIONE:
100 g di Rasikal Ultra contengono
30,7 g di Glifosate acido (=360 g/l)
(pari a sale isopropilamminico g. 41,8)
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO:
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officina di produzione: CHEMINOVA AGRO A/S Thyborønvej 78 - DK 7673 Harboøre (DK)
Torre S.r.l. - Montalcino - Torrenieri (SI)
Officine di confezionamento: DIACHEM S.p.A. - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
Irca Service S.p.A.- Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10998 del 30.07.2001
Contenuto netto: l 0,25-0,5-1-5-10-20-25-50
Partita n°

Informazioni per il medico
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE - Il RASIKAL ULTRA è un diserbante di post-emergenza efficace su tutte le infestanti monocotiledoni e dicotiledoni, annuali e perenni. Viene assorbito dalle foglie e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perennanti, che vengono pure devitalizzati. Il RASIKAL ULTRA è rapidamente disattivato a contatto con il terreno. Non possedendo il prodotto efficacia di pre-emergenza, onde ottenere un diserbo duraturo, è possibile eventualmente utilizzare il RASIKAL ULTRA in miscela con un erbicida ad azione residuale (es. Simazina, Diuron) per evitare la nascita delle infestanti provenienti da semi che possono germinare dopo l'applicazione del formulato da solo. L'effetto visivo dell'azione del RASIKAL ULTRA consiste in un ingiallimento o arrossamento ed in un appassimento graduale che si risolvono nella morte dell'infestante anche a livello dell'apparato radicale. La durata di questo processo è correlata alle condizioni ambientali.

MODALITÀ D'IMPIEGO - Il prodotto va usato per irrorazione sulle infestanti ben sviluppate, distribuendo volumi relativamente bassi (100-300 litri) di poltiglia per ettaro, in modo da bagnare uniformemente le malerbe, senza provocare perdite per gocciolamento. Impiegare pompe a bassa pressione (max 2 atm) e barre o lance munite di ugelli a specchio o a ventaglio che distribuiscono gocce di grosse dimensioni.

CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco, purchè ben lignificato: vite, agrumi, melo, pero, olivo, noce.
Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco, anche se ben lignificato: drupacee, mandorlo, pioppo.
Colture da diserbare esclusivamente utilizzando attrezzature selettive (lambenti, umettanti o a goccia): carciofo, fava, pisello, fagiolino, patata, pomodoro, melanzana, carota, barbabietola da zucchero, soia, mais (solo interfila), erba medica, prati, rosa, vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture da diserbare prima dell'emergenza: asparago.
Terreni in assenza della coltura (fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, prati, vivai): prima della semina o del trapianto (queste operazioni vanno successivamente effettuate non prima di 48 ore dal trattamento), dopo il raccolto o a fine ciclo.
Aree non agricole: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili.

DOSI D'IMPIEGO
I trattamenti possono essere effettuati su tutta la superficie o su fasce lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma. Le dosi d'impiego, riferite ad ettaro di superficie effettivamente trattata, variano in funzione della specie delle infestanti presenti:
- 3,5 litri/ha contro la maggior parte delle erbe annuali
- 4-5 litri/ha contro Sorghum halepense, Agropyrum repens, Ranunculus spp.
- 5-7 litri/ha contro Cyperus rotundus, Cirsium arvense (in fioritura), Artemisia vulgaris, Potentilla spp., Plantago spp., Taraxacum officinale, Rumex spp., Felci. Contro il Cyperus rotundus, per ottenere un risultato più duraturo, si può effettuare un primo trattamento alla dose di 5 litri/ha ripetendo l'intervento sui ricacci alla dose di 4 litri/ha;

- 8-10 litri/ha contro Convolvulus arvensis ben sviluppato (inizio fioritura), Cynodon dactylon, Urtica spp., Dacus carota, Sonchus arvensis, Tussilago farfara, Cannucce (alte 50-80 cm).
- 10-12 litri/ha contro Convolvulus arvensis all'inizio dello sviluppo (lungo almeno 30 cm.).

Per interventi su infestazioni a macchia irrorare con concentrazioni del prodotto in acqua dell' 1 - 2% contro le infestanti annuali e del 2 - 5% contro le perenni.

NOTE IMPORTANTI: evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante. Non bagnare il tronco, specialmente se non è ben lignificato o con ferite. Per evitare la deriva usare ugelli protetti da coni o schermi che evitino alla poltiglia erbicida di giungere a contatto con la vegetazione delle piante, specialmente se in forme di allevamento basse.

AVVERTENZE: le piogge che cadono entro 6 ore dall'applicazione ne riducono l'efficacia. Le temperature medie e l'alta umidità dell'aria facilitando la crescita delle infestanti, favoriscono l'esito del diserbo: le temperature basse o il caldo estivo non limitano l'efficacia del prodotto purché le infestanti siano verdi, vitali e non essiccate. Le perennanti sono meglio controllate se ben sviluppate al momento del trattamento; alcune dicotiledoni (es. Vilucchio, Stoppione, Artemisia) sono più sensibili se in fioritura o in uno stadio più avanzato. Arature, fresature, tagli delle erbe o pascolo di animali prima del trattamento riducono l'efficacia del diserbo. Dopo il trattamento su erbe perennanti lasciar traslocare il prodotto negli organi sotterranei per 2 o 3 settimane prima di procedere a lavorazione del terreno.

Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, ha efficacia ridotta.

Non impiegare per la miscelazione, distribuzione o conservazione del prodotto recipienti galvanizzati (es. zincati) o in acciaio se non protetti da apposite vernici plastiche.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ - Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare (rami non lignificati, succhioni del tronco e del portainnesto) di tutte le colture agricole. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente, con tre risciacqui successivi di acqua, le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi. Non scaricare le acque utilizzate per i lavaggi in acque destinate all'irrigazione.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Conservare al riparo dal gelo.

BAYER Bayer CropScience

® Marchio registrato

DPD 30.06.05/a

BAVICCHI S.p.a.

LIMACIDE pellets

ELIMINA CHIOCCIOLE E LUMACHE

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Metaldeide acetica pura	5,00 g
Coformulanti supporto proteico	q. b. a 100 g

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa – Evitare l'ingestione, l'inalazione e il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica per l'uomo, circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali. Terapia: sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE

Esca avvelenata già pronta per l'uso per la lotta contro chiocciole, lumache, limacce e gasteropodi in genere.
LIMACIDE Pellets non viene asportato dal vento e non ammuffisce. Trova impiego negli orti, nei giardini e in pieno campo. È molto appetito dai gasteropodi che, essendo attratti dalle proteine contenute nell'esca, muoiono in breve tempo.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Distribuire il prodotto, preferibilmente alla sera, in ragione di 100 grammi per 20-30 metri quadrati a seconda del grado di infestazione.

COMPATIBILITA': Dato il particolare impiego del prodotto non è richiesta nessuna miscelazione.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato

BAVICCHI S.p.A.
Via della Valtiera 293 – Ponte San Giovanni (PG)
Tel. 075393941

Officine di produzione: L.I.F.A. s.r.l. - Vigonovo (VE) / **L.I.F.A. s.r.l.** - Isola Vicentina (VI)

Registrazione del Ministero della Sanità N^ 2940 del 23/04/1979

Riferimento partita:.............

CONTENUTO: 500 g / 1 - 10 kg

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE**

DA NON VENDERSI SFUSO

JANSSEN-CILAG S.p.a.

FUNGAZIL® 500 EC

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
Imazalil puro (500 g/l) .... 44,66 g
Coformulanti q.b.a. .... 100 g

NOCIVO — PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:

R20/22	Nocivo per inalazione e ingestione.
R36	Irritante per gli occhi.
R51/53	Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

S 2	Conservare fuori della portata dei bambini.
S 13	Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
S 20/21	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
S 23	Non respirare gli aerosoli.
S 26	In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
S 36/37	Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
S 51	Usare soltanto in luogo ben ventilato.
S 57	Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
S 60	Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
S 61	Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
SP 1	Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

Registrazione del Ministero della Sanità n° 8002/RR del 24/1/1992

Titolare della registrazione:
JANSSEN-CILAG SpA, v. M.Buonarroti 23, 20093 Cologno Monzese (MI)

Produttore:
Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse (Belgio)

CONTENUTO NETTO: 1 litro
PARTITA N°:
Il contenitore non può essere riutilizzato.

FUNGAZIL® 500 EC

Liquido emulsionabile

FUNGICIDA DI POST RACCOLTA
PER IL TRATTAMENTO DEGLI AGRUMI

COLTURE AUTORIZZATE:
Trattamento in post raccolta di agrumi.

ORGANISMI COMBATTUTI: *Penicillium digitatum, Penicillium italicum* e *Diplodia natalensis*.

NUMERO DI TRATTAMENTI: 1

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO DEL FORMULATO (500 g/l):
- **per immersione:** 200 ml di formulato/hl
- **per atomizzazione:** in acqua 200 ml di formulato/hl
- **in aggiunta a cere:** 400 ml di formulato/100 kg di cera

Avvertenze
Non utilizzare la buccia degli agrumi trattati per scopi alimentari. Chi effettua il trattamento è tenuto ad informare l'utilizzatore che le bucce degli agrumi trattati non possono essere utilizzate a scopo alimentare.

Modalità di impiego
1. Sciogliere la dose prescritta in poca acqua, agitare la poltiglia ottenuta ed aggiungerla all'acqua occorrente. Per una giusta diluizione, avviare la pompa di riciclo e farla funzionare per 5 minuti prima di iniziare il trattamento.
2. Metodo di trattamento e tempo di contatto
- **per immersione**, in un tempo compreso da 1 e 2 minuti
- **per atomizzazione** di una soluzione acquosa a basso volume applicata prima della ceratura
- **per atomizzazione del prodotto** disperso nella cera, applicata a basso volume

L'impiego del prodotto è consentito solo in centri appositamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art.2 della legge 283/1962. La soluzione eccedente i trattamenti dovrà essere smaltita secondo le norme vigenti.

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, ptosi, lacrimazione, ipotonia, atassia, ipotermia.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

COMPATIBILITÀ
Non miscibile con prodotti alcalini.
Può essere disperso in una soluzione a base di cera. Mescolare bene per omogeneizzare.

ATTENZIONE:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura.
Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

FOS-DER S.r.l.

FOSFOGAS

FUMIGANTE PER TRATTAMENTI AI PRODOTTI AGRICOLI IMMAGAZZINATI

FOSFOGAS

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Fosfuro d'alluminio puro 56 g

Coformulanti q. b. a 100 g

Ogni compressa da 3 g svolge 1 g di fosfina gassosa.

T+

MOLTO TOSSICO

FACILMENTE INFIAMMABILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Molto tossico per ingestione –
A contatto con acidi libera gas tossico –
A contatto con acqua libera gas tossici e estremamente infiammabili –
Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone – Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – Non mescolare con acidi – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

FOS-DER S.r.l.
Fosforo derivati per l'industria e l'Agricoltura
Via B. Luini, 56 – 20036 Meda (MI) – Tel. e Fax 02/712853 – 0362/75181

Officine di produzione: UNITED PHOSFORUS Ltd. – Bombay (India)
Registrazione del Ministero della Sanità n° 5030 del 5/11/1982

CONTENUTO: 16 tubetti da 20 compresse da 3 g; PESO NETTO: 960 g
1667 pellets da 0,6 g; PESO NETTO: 1 kg

Lotto N°: ....

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi – Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

AVVERTENZE: il prodotto è classificato gas tossico. La sua conservazione e detenzione sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del D.L. 9.1.1927 n° 147 e successivi. Il prodotto dovrà essere impiegato solo da personale in possesso della "patente d'abilitazione all'impiego di gas tossici" come da D.L. 9.1.1927, il quale sarà responsabile degli eventuali danni che possano derivare da uso improprio del preparato.

All'esterno dei depositi contenenti derrate trattate col prodotto dovranno essere posti cartelli con la dicitura "vietato l'ingresso alle persone estranee – pericolo di morte" (circolare ACIS n° 52 del 9.6.1954).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sotto forma solida reagisce con l'umidità dell'ambiente formando fosfina. Odore: simile all'acetilene o al pesce marcio. Sintomi: gas altamente irritante per i polmoni. È tossico per il SNC, cuore, fegato, reni, sangue e sistemi enzimatici.

Sintomi lievi: possono simulare un'irritazione mucosa con tosse, dispnea, sensazione di freddo, nausea, dolori diaframmatici, cefalea.

Media gravità: interessamento del SNC, affaticabilità, apatia, sonnolenza, vertigini, parestesie, tremori, vomito, diarrea, senso di oppressione toracica, segni di sofferenza epatica e renale.

Avvelenamento grave: forti dolori addominali con vomito e diarrea, dispnea e cianosi, shock, edema polmonare, forti dolori muscolari, oliguria, stato stuporoso, vertigini, convulsioni, paralisi, ileo, segni ECG di dilatazione ventricolare ed enzimatici di danno miocardico.

Sintomi cronici: dosi subtossiche provocano odontalgia, gonfiori mandibolari fino alla necrosi. Anoressia e perdita di peso, anemia e tendenza a fratture spontanee, senso di inquietudine, affaticabilità, cefalea, vertigini, sete, disturbi della visione, della parola e della deambulazione. È possibile la tosse con escreato verde fluorescente. I dati maggiori si riscontrano a carico del SNC e dei sistemi gastrointestinale, respiratorio e renale. I dati di laboratorio dimostrano frequentemente ematuria, bilirubinuria ed alterazioni degli enzimi epatici. Le elevazioni della CPK e CPK-MB sono probanti per un danno del muscolo cardiaco generalmente del tipo focale, con possibile edema polmonare ed insufficienza congestizia.

Terapia: il paziente va ospedalizzato prontamente, in caso d'ingestione svuotamento gastrico sotto visione endoscopica, protettori della mucosa H2 antagonisti, plasmaferesi se c'è emolisi.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche: le compresse in presenza di umidità svolgono lentamente e gradualmente fosfina gassosa, attivata per azione fumigante, e un gas protettivo di odore ammoniacale che rende non infiammabile la miscela gassosa al momento in cui si svolge. La decomposizione inizia 1-2 ore dall'apertura del contenitore sigillato ed il tipico odore agliaceo della fosfina diventa avvertibile e gradualmente sostituisce quello del gas protettivo.

Il processo di decomposizione ha la durata di alcuni giorni (fino a 5) a seconda delle condizioni di temperatura e umidità; lascia come residuo una polvere costituita da ossido idrato di alluminio.

Campi d'impiego: cereali e leguminose in granella; semi oleaginosi e pannelli; frutta secca (da frutti adulti con seme edule); tabacco (essiccato); cacao in grani, caffè e pepe in granuli; sementi; the (solo se non confezionato per la vendita al dettaglio).

Parassiti combattuti: insetti, acari nei vari stadi di sviluppo, vertebrati.

Dosi d'impiego: nel caso dei cereali in granella:
1. in silos completamente pieni e a tenuta d'aria 2-4 compr/t
2. ammassati alla rinfusa o insaccati, coperti con film plastico 3-6 compr/t
3. ammassati alla rinfusa o insaccati, in struttura a tenuta d'aria (magazzini, container, carri ferroviari, navi) 1-2 compr/t

Nei numerosi altri impieghi previsti, si indica genericamente un prodotto concentrazione tempo (CxT) corrispondente a 50 mg di fosfina per ora e per litro, con temperature di 10-20°C.

Durata del trattamento: temperatura 12-14°C (5 giorni); temperature 15-20°C (4 giorni); temperatura superiore a 20°C (3 giorni). Deve pertanto essere in funzione della temperatura ambiente e comunque non deve superare i 5 giorni. È sconsigliabile effettuare il trattamento quando la temperatura delle derrate è inferiore a 10°C. Per le granaglie destinate alla semina, la durata d'esposizione al gas non deve superare le 72 ore (3 giorni) ed il trattamento non deve essere effettuato se l'umidità dei semi supera il 12%. È sconsigliabile operare quando la temperatura della partita da disinfestare supera i 30°C.

Metodi d'impiego: nel caso di cereali e leguminose in granelli insilati, il prodotto viene aggiunto al momento di riempimento e deve essere previsto l'impiego di dosatori all'ingresso dei depositi (esclusa pertanto la distribuzione a mano). Nel caso di cereali e leguminose in granella ammassati alla rinfusa, il prodotto viene distribuito mediante sonde e ricopertura con film plastico; se in sacchi, la fumigazione viene eseguita ponendo le compresse del formulato in appositi contenitori (vassoi) e disponendo questi alla superficie e fra le cataste, ricoprendo con film plastico. Per le altre derrate alimentari immagazzinate, le compresse disposte negli appositi contenitori (vassoi) vanno poste sulle masse da disinfestare, comunque non a contatto diretto delle derrate. Per merci in transito in vagoni ferroviari, rimorchi, containers, le compresse negli appositi vassoi e non a contatto diretto con le derrate, vengono semplicemente introdotte nel mezzo prima della chiusura.

Si deve pure evitare il contatto con le derrate con quanto rimane nei contenitori alla fine del trattamento.

Attenzione! Le confezioni del prodotto devono essere aperte in piena aria e una volta iniziate completamente utilizzate. Le confezioni del prodotto devono essere protette dall'acqua e dall'umidità.

Bonifica: immediatamente dopo la riapertura del deposito, a trattamento effettuato, le derrate e l'ambiente in cui sono conservate devono essere aerate per almeno 24 ore; comunque prima della commercializzazione devono subire un'areazione e una ventilazione a fondo per almeno 48 ore; per le merci fortemente compresse (es. tabacco in balle) il periodo d'aerazione dovrà essere di almeno 72 ore. Accertare l'assenza del gas con le speciali attrezzature rilevatrici. Nel caso di cereali in granella alla rinfusa è necessario praticare anche le normali operazioni di prepulitura. Aerare anche i locali adiacenti e comunque comunicanti con quelli contenenti le derrate fumigate. Non fumigare derrate in locali d'abitazione.

Compatibilità: il prodotto va usato da solo.

Rischio a seguito del trattamento: il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Attenzione! Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - DA NON VENDERSI SFUSO
- PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA
- SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
- IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO
- IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

FOSFOGAS

FUMIGANTE PER TRATTAMENTI AI PRODOTTI AGRICOLI IMMAGAZZINATI

FOSFOGAS

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Fosfuro d'alluminio puro 56 g
Coformulanti q. b. a 100 g
Ogni compressa da 3 g svolge 1 g di fosfina gassosa.

T+ MOLTO TOSSICO

FACILMENTE INFIAMMABILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Molto tossico per ingestione –
A contatto con acidi libera gas tossico –
A contatto con acqua libera gas tossici e estremamente infiammabili –
Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone – Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – Non mescolare con acidi – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

FOS-DER S.r.l.
Fosforo derivati per l'industria e l'agricoltura
Via B. Luini, 55 – 20036 Meda (MI) – Tel. e Fax 02/712853 – 0362/75181

Officine di produzione: UNITED PHOSFORUS Ltd. – Bombay (India)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 5030 del 5/11/1982

CONTENUTO: 10 buste da 34 g; PESO NETTO: 340 g

Lotto N°: ....

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi – Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

AVVERTENZE: il prodotto è classificato gas tossico. La sua conservazione e detenzione sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del D.L. 9.1.1927 n° 147 e successivi. Il prodotto dovrà essere impiegato solo da personale in possesso della "patente d'abilitazione all'impiego di gas tossici" come da D.L. 9.1.1927, il quale sarà responsabile degli eventuali danni che possano derivare da uso improprio del preparato.

All'esterno dei depositi contenenti derrate trattate col prodotto dovranno essere posti cartelli con la dicitura "vietato l'ingresso alle persone estranee – pericolo di morte" (circolare ACIS n° 52 del 9.6.1954).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sotto forma solida reagisce con l'umidità dell'ambiente formando fosfina. Odore: simile all'acetilene o al pesce marcio. Sintomi: gas altamente irritante per i polmoni. È tossico per il SNC, cuore, fegato, reni, sangue e sistemi enzimatici.

Sintomi lievi: possono simulare un'irritazione mucosa con tosse, dispnea, sensazione di freddo, nausea, dolori diaframmatici, cefalea.

Media gravità: interessamento del SNC, affaticabilità, apatia, sonnolenza, vertigini, parestesie, tremori, vomito, diarrea, senso di oppressione toracica, segni di sofferenza epatica e renale.

Avvelenamento grave: forti dolori addominali con vomito e diarrea, dispnea e cianosi, shock, edema polmonare, forti dolori muscolari, oliguria, stato stuporoso, vertigini, convulsioni, paralisi, ittero, segni ECG di dilatazione ventricolare ed enzimatici di danno miocardico.

Sintomi cronici: dosi subtossiche provocano odontalgia, gonfiori mandibolari fino alla necrosi. Anoressia e perdita di peso, anemia e tendenza a fratture spontanee, senso di inquietudine, affaticabilità, cefalea, vertigini, sete, disturbi della visione, della parola e della deambulazione. È possibile la tosse con escreato verde fluorescente. I dati maggiori si riscontrano a carico del SNC e dei sistemi gastrointestinale, respiratorio e renale. I dati di laboratorio dimostrano frequentemente ematuria, bilirubinuria ed alterazioni degli enzimi epatici. Le elevazioni della CPK e CPK-MB sono probanti per un danno del muscolo cardiaco generalmente del tipo focale, con possibile edema polmonare ed insufficienza congestizia.

Terapia: il paziente va ospedalizzato prontamente; in caso d'ingestione svuotamento gastrico sotto visione endoscopica, protettori della mucosa H2 antagonisti, plasmaferesi se c'è emolisi.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' D'IMPIEGO

Il FOSFOGAS Bag è costituito da buste di carta paraffinata pronte all'uso saldate insieme in strisce di dieci unità. Ogni striscia è contenuta in una lattina con i due fondi saldati. Il Fosfuro di Alluminio contenuto nel FOSFOGAS Bag quando è esposto all'aria comincia a sviluppare Fosfina dopo un'ora e lo sviluppo dura fino a 4 ore. Soltanto il gas Fosfina gassosa viene a contatto con la derrata, per cui il FOSFOGAS Bag non lascia residui nella stessa.

Dopo l'uso la confezione del prodotto viene estratta intera dalla derrata ed il residuo inerte contenente tracce di Fosfina va neutralizzato perforando tutte le bustine con un punteruolo ed immergendole in un recipiente pieno d'acqua contenente pochi grammi di tensioattivo. Questo residuo pastoso va alla fine eliminato secondo i dettami delle leggi in vigore.

Dosi d'impiego

1. in silos completamente pieni e a tenuta d'aria 1 busta per 2-5 ton
2. ammassati alla rinfusa o insaccati, coperti con film plastico 1 busta per 2,5 MC
3. ammassati alla rinfusa o insaccati, in magazzini a tenuta d'aria, carri ferroviari, navi, containers 1 busta per 2-5 MC.

Durata del trattamento: temperatura 12-14°C (5 giorni), temperature 15-20°C (4 giorni); temperatura superiore a 20°C (3 giorni). Deve pertanto essere in funzione della temperatura ambiente e comunque non deve superare i 5 giorni. È sconsigliabile effettuare il trattamento quando la temperatura delle derrate è inferiore a 10°C. Per le granaglie destinate alla semina, la durata d'esposizione al gas non deve superare le 72 ore (3 giorni) ed il trattamento non deve essere effettuato se l'umidità dei semi supera il 12%. È sconsigliabile operare quando la temperatura della partita da disinfestare supera i 30°C.

Metodi d'impiego: il prodotto va disposto sulla superficie dell'ammasso da trattare (silos, magazzini, cataste) o sotto pallets (insaccati, balle di tabacco). Alla fine del trattamento le buste contenenti il residuo esausto vanno rimosse e trattate per la distruzione come detto nelle modalità d'impiego. Nessun trattamento è richiesto dopo l'applicazione del prodotto sulle derrate trattate, dato che nessun residuo contamina le stesse durante o dopo fumigazione.

L'uso di FOSFOGAS Bag è il più sicuro e igienico rispetto alle altre confezioni in commercio.

Attenzione! Le confezioni del prodotto devono essere aperte in piena aria e una volta iniziate completamente utilizzate. Le confezioni del prodotto devono essere protette dall'acqua e dall'umidità.

Bonifica: immediatamente dopo la riapertura del deposito, a trattamento effettuato, le derrate e l'ambiente in cui sono conservate devono essere aerate per almeno 24 ore; comunque prima della commercializzazione devono subire un'areazione e una ventilazione a fondo per almeno 48 ore; per le merci fortemente compresse (es. tabacco in balle) il periodo d'aerazione dovrà essere di almeno 72 ore. Accertare l'assenza del gas con le speciali attrezzature rilevatrici. Nel caso di cereali in granella alla rinfusa è necessario praticare anche le normali operazioni di prepulitura. Aerare anche i locali adiacenti e comunque comunicanti con quelli contenenti le derrate fumigate. Non fumigare derrate in locali d'abitazione.

Compatibilità: il prodotto va usato da solo.

Rischio a seguito del trattamento: il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Attenzione! Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
- PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA
- SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
- IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
- NON OPERARE CONTRO VENTO
- IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade)
- DA NON VENDERSI SFUSO

TECOMAG S.r.l.

AGROCYDE 5 E.C.

Insetticida emulsionabile

Composizione
- Cipermetrina tecnica al 93% pari a g 5 di p.a. puro (cis/trans 40/60)
- Coformulanti q. b. a g. 100

Frasi di Rischio
Tossico per organismi acquatici; uò provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

TECOMAG srl via Bellaria 356 S.Marino di Mugnano (Mo)

Registrazione n.10315 del 03.02.2000 Ministero della Salute

Officina di produzione : - United Phosphorus ltd - Sandback - Chesire, CW 11 3QQ (UK) -- Mitchell Cotts Chemicals - Steanard Lane, Mirfield West Yorkshire WF14 8Qb (UK)- Chimac-Agriphar-Rue de Renory 26- Ougree-Belgium-Althaller srl-Str. Com per Campagna 5- S. Colombano al Lambro Mi
Lt 0,100 - 0,200 - 0,250 - 0,500 - 1 - 5 - 20 partita n°

INFORMAZIONE PER IL MEDICO : Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa ipersitmolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione - Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Epoca: infestazione in atto.
Metodo: irrorazione uniforme della pianta.
Mezzi: qualsiasi irroratore compresi atomizzatori
CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
DRUPACEE (pesco, ciliegio): afidi 75-100 cc/hl; Anarsia, Cidia, lepidotteri in genere 100-150 cc/hl; Cocciniglie: neanidi nei trattamenti estivi 100-150 cc/hl; Tripidi, Mosca 100-150 cc/hl; Per il controllo degli insetti svernanti e delle uova di acari è consigliato un trattamento con **AGROCYDE 5 E.C.** a 100-150 cc/hl con Olio bianco a 1.5 kg/hl all stadio vegetativo di bottoni rosa.
POMACEE (melo, pero): Psilla 1° trattamento a fine inverno contro adulti svernanti 100-150 cc/hl; 2° trattamento sulle uova mature prodotte dalla prima generazione all'apparire delle prime neanidi 150 cc/hl; con l'inizio della melata 200 cc/hl; 3° trattamento (facoltativo) contro 3ª generazione 200-300 cc/hl; Afidi su foglie non accartociate 75-100 cc/hl; Fillominatori (Cemiostoma, Litocolletis) contro la prima generezioneallo stadio di uova mature prima della comparsa delle mine 100-150 cc/hl; Ricamatrice estive e lepidotteri 100-150 cc/hl; Carpocapsa 100-150 cc/hl; Cocciniglie: contro neanidi in trattamenti estivi 100-150 cc/hl; Per il controllo degli insetti svernanti e delle uova di acari si consiglia un trattamento con **AGROCYDE 5 E.C.** a 100-150 cc/hl in miscela con Olio bianco a 2-3 kg/hl all stadio compreso tra le orecchiette di topo e la differenzizzione dei mazzetti.
ORTAGGI IN CAMPO E SERRA (cavolo verza, cavolo capuccio, cavolfiore, cavolo broccolo, fagiolino, pisello, pomodoro, cipolla, patata): Dorifora 100-150 cc/hl; Nottue (scoperte) 100-150 cc/hl; Mosca bianca 75-100 cc/hl; Afidi 100-150 cc/hl; Cavolaia, tripidi, piralidi 100-150 cc/hl.
VITE: (Tignola, Tignoletta): contro la prima generazione se necessario 100-150 cc/hl; contro la seconda generazione 100-150 cc/hl; Cocciniglie, Sigaraio 100-125 cc/hl.
AGRUMI (limone, arancio): afidi 75-100 cc/hl; Cocciniglie: contro neanidi nei trattamenti estivi 100-150 cc/hl; Mosca bianca 100-150 cc/hl; Mosca degli agrumi 100-150 cc/hl.
TABACCO: Afidi 75-100 cc/hl; Mosca bianca 75-100 cc/hl; nuottue (allo scoperto), tripidi 100-150 cc/hl.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: Altica 1.000-1.200 cc/ha; Afidi 500-600 cc/ha; Nottue (allo scoperto) 600-1.000 cc/ha; Cleono, Lisso, Cassida 800-1.000 cc/ha.
MAIS :Afidi 75-100 cc/hl; Piralide 100-150 cc/hl.
FRUMENTO: Afidi, Lema 75-100 cc/hl.
Le dosi sopracitate si riferiscono a volume normale nei trattamenti. Per trattamenti a volume ridotto mantenere invariate la dose per ettaro
AVVERTENZE: in caso di forti infestazioni impiegare le dosi più alte.
Bagnare accuratamente tutte le parti della pianta.
Non trattare durante la fioritura
Compatibilità: **AGROCYDE 5 E.C.** non è compatibile con gli insetticidi e fungicidi a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Intervallo di sicurezza:
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto di pisello, fagiolino, cavolo verza, cavolo capuccio, cavolfiore, cavolo broccolo; 14 giorni prima del raccolto di melo, pero, limone, arancio, pesco, ciliegio cavolo, cipolla, patata; 21 giorni prima del raccolto di barbabietola da zucchero e pomodoro; 28 giorni prima del raccolto di vite, mais; 42 giorni prima del raccolto del frumeto; 60 giorni prima del raccolto del tabacco.
"Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle"
"Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento" - "Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza".

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddetteistruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

BARRACUDA

Insetticida emulsionabile

Composizione
- Cipermetrina tecnica al 93% pari a g 5 di p.a. puro (cis/trans 40/60)
- Coformulanti q. b. a g. 100

Frasi di Rischio
Tossico per organismi acquatici;
Può provocare a lungo termine
effetti negativi per l'ambiente

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede i nformative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

TECOMAG srl via Bellaria 356 S.Martino di Mugnano(Mo)

Registrazione n.12115 del 27.04.2004 Ministero della Salute
Officina di produzione : - UNITED PHOSPHORUS ltd - Sandback - Chesire, CW 11 3QQ (UK) -- Mitchell Cotts Chemicals - Steanard Lane, Mirfield West Yorkshire WF14 8Qb (UK) TORRE SRL-Via Pian D'Asso- 53028 TORRENIERI (Siena)
Lt 0,100 - 0,200 - 0,250 - 0,500 - 1 - 5 - 20 partita n°

INFORMAZIONE PER IL MEDICO : Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione - Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Epoca: infestazione in atto.
Metodo: irrorazione uniforme della pianta.
Mezzi: qualsiasi irroratore compresi atomizzatori
Campi E DOSI d'impiego
DRUPACEE (pesco, ciliegio): afidi 75-100 cc/hl; Anarsia, Cidia, lepidotteri in genere 100-150 cc/hl; Cocciniglie: neanidi nei trattamenti estivi 100-150 cc/hl; Tripidi, Mosca 100-150 cc/hl; Per il controllo degli insetti svernanti e delle uova di acari è consigliato un trattamento con BARRACUDA a 100-150 cc/hl con Olio bianco a 1,5 kg/hl all stadio vegetativo di bottoni rosa.
POMACEE (melo, pero): Psilla 1° trattamento a fine inverno contro adulti svernanti 100-150 cc/hl; 2° trattamento sulle uova mature prodotte dalla prima generazione all'apparire delle prime neanidi 150 cc/hl; con l'inizio della melata 200 cc/hl; 3° trattamento (facoltativo) contro 3ª generazione 200-300 cc/hl; Afidi su foglie non accartociate 75-100 cc/hl; Fillominatori (Cemiostoma, Litocolletis) contro la prima generezioneallo stadio di uova mature prima della comparsa delle mine 100-150 cc/hl; Ricamatrice estive e lepidotteri 100-150 cc/hl; Carpocapsa 100-150 cc/hl; Cocciniglie: contro neanidi in trattamenti estivi 100-150 cc/hl; Per il controllo degli insetti svernanti e delle uova di acari si consiglia un trattamento con BARRACUDA. a 100-150 cc/hl in miscela con Olio bianco a 2-3 kg/hl all stadio compreso tra le orecchiette di topo e la differenzizzione dei mazzetti.
ORTAGGI IN CAMPO E SERRA (cavolo verza, cavolo capuccio, cavolfiore, cavolo broccolo, fagiolino, pisello, pomodoro, cipolla, patata): Dorifora 100-150 cc/hl; Nottue (scoperte) 100-150 cc/hl; Mosca bianca 75-100 cc/hl; Afidi 100-150 cc/hl; Cavolaia, tripidi, piralidi 100-150 cc/hl.
VITE: (Tignola, Tignoletta): contro la prima generazione se necessario 100-150 cc/hl; contro la seconda generazione 100-150 cc/hl; Cocciniglie, Sigaraio 100-125 cc/hl.
AGRUMI (limone, arancio): afidi 75-100 cc/hl; Cocciniglie: contro neanidi nei trattamenti estivi 100-150 cc/hl; Mosca bianca 100-150 cc/hl; Mosca degli agrumi 100-150 cc/hl.
TABACCO: Afidi 75-100 cc/hl; Mosca bianca 75-100 cc/hl; nuottue (allo scoperto), tripidi 100-150 cc/hl.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: Altica 1.000-1.200 cc/ha; Afidi 500-600 cc/ha; Nottue (allo scoperto) 600-1.000 cc/ha; Cleono, Lisso, Cassida 800-1.000 cc/ha.
MAIS :Afidi 75-100 cc/hl; Piralide 100-150 cc/hl.
FRUMENTO: Afidi, Lema 75-100 cc/hl.
Le dosi sopracitate si riferiscono a volume normale nei trattamenti. Per trattamenti a volume ridotto mantenere invariate la dose per ettaro
AVVERTENZE: in caso di forti infestazioni impiegare le dosi più alte. Bagnare accuratamente tutte le parti della pianta.
Non trattare durante la fioritura
Compatibilità: BARRACUDA non è compatibile con gli insetticidi e fungicidi a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza:
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto di pisello, fagiolino, cavolo verza, cavolo capuccio, cavolfiore, cavolo broccolo; 14 giorni prima del raccolto di melo, pero, limone, arancio, pesco, ciliegio cavolo, cipolla, patata; 21 giorni prima del raccolto di barbabietola da zucchero e pomodoro; 28 giorni prima del raccolto di vite, mais; 42 giorni prima del raccolto del frumeto; 60 giorni prima del raccolto del tabacco.
"Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle"
"Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento" - "Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza".

ttenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddetteistruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

BOGART

CONCENTRATO SOLUBILE

Fungicida sistemico per la protezione delle colture orticole, vivai ed impianti di melo, pero, agrumi e piante forestali, colture floreali ed ornamentali, campi da golf, tappeti erbosi e prati ornamentali.

COMPOSIZIONE
- Propamocarb cloridrato puro g. 66,5 (=722 g/l)
- Coformulanti q.b a g. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
BOGART è un fungicida sistemico attivo nei confronti dei gruppi di Ficomiceti (Pythium spp., Phytophtora spp., Peronospora, Pseudoperonospora, Aphanomyces spp., Bremia) che arrecano gravi danni alle colture orticole, floreali ed ornamentali, specie nelle zone ove viene attuata una coltivazione intensiva. Il prodotto è assorbito prevalentemente dal sistema radicale delle piante e viene traslocato nell'apparato fogliare seguendo la corrente traspiratoria, in modo da assicurare una completa protezione delle piante. Perfettamente tollerato dalle più diffuse colture orticole e ornamentali BOGART è un preparato molto versatile in quanto si presta agevolmente ad essere impiegato con tecniche diverse: concia dei semi, bagno dei bulbi e delle talee, disinfezione dei terricciati e dei letti di semina, trattamenti al terreno in pre e post-trapianto delle colture, trattamenti fogliari. I migliori risultati si ottengono tuttavia con gli interventi preventivi volti ad impedire lo sviluppo dei patogeni. BOGART è indicato per la difesa delle seguenti colture: pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo, Insalate, lattuga, cicoria, indivia, radicchio, spinacio, bietola da foglie e da coste, sedano, prezzemolo, basilico, cavolfiore, cavoli, carota, rapa, bietola rossa, aglio, cipolla, porro, tabacco, fragola, colture floreali ed ornamentali, campi da golf, tappeti erbosi e prati ornamentali in genere. Può essere convenientemente usato per la difesa contro Pythium spp. e Phytophtora cactorum, P. citrophtora, P. parasitica e P. cinnamoni delle piante di melo, pero, agrumi e delle piante forestali, sia in vivaio che nei primi anni dopo la messa a dimora in campo. Può essere inoltre utilizzato nella concia dei semi in genere.

MODALITA E DOSI D'IMPIEGO
- CONCIA DEI SEMI:

1 - 4 ml/kg di seme per semi di piccole dimensioni (es. tabacco, frumento).
10 - 40 ml/kg di seme per semi leggeri e dotati di elevata superficie (es. girasole).
- PREPARAZIONE DEI TERRICCIATI: 300 ml/m^3 di terriccio diluito in 20 litri di acqua.
- TRATTAMENTI AI SEMENZAI: 8 -12 ml/m^2 di superficie in 4 - 5 litri di acqua (ripetere il trattamento 5 giorni prima del trapianto in 6-8 l/m^2 di acqua).
- TRATTAMENTI AL TERRENO IN PRE-TRAPIANTO: 8 -12 ml/m^2 in 3-5 litri di acqua.
- TRATTAMENTI IN POST-TRAPIANTO: 100-200 ml/pianta di una soluzione allo 0,2% (200 ml/hl): ripetere il trattamento ogni 10-15 giorni (3-4 trattamenti).
- TRATTAMENTI FOGLIARI: 1,5-3 l/ha in 15-20 hl di acqua per ettaro.

Indicazioni specifiche per alcune importanti colture floricole ed ornamentali
- GAROFANO E GERBERA: contro pythium e phytophtora. Trattamenti iniziali: 12-15 ml/m^2 di BOGART in 2-4 litri di acqua due giorni prima dell'impianto, su terreno in tempera, ed incorporare uniformemente. Trattamenti successivi: 200 ml/hl per via fogliare bagnando abbondantemente (400-500 litri di soluzione ogni 1000 m^2) si consiglia di effettuare i primi due trattamenti a distanza di 8-10 giorni e proseguire con interventi ogni 15-25 giorni.
- BULSOSE: contro pythium ultimum e phytophtora. immergere i bulbi per 20-30 minuti in una soluzione di 300 ml/hl di acqua. Trattare quindi il terreno prima della messa a dimora con 10-12 ml/m^2 in 2-4 litri di acqua ed incorporare a 10-1 2 cm di profondità.
- VIVAI DI PIANTE FORESTALI: contro phytophtora cactorum, phytophtora cinnamoni e pythium. Trattare il substrato colturale con 300ml/m^2 di BOGART in 8-10 litri di acqua; intervenire all'emergenza ogni 15-18 giorni con 4-5 ml/m^2 di una soluzione allo 0,2% di BOGART.
- CAMPI DA GOLF, TAPPETI EREBOSI E PRATI ORNAMENTALI: per il controllo di pythium aphanidermatum ed eventuali altre specie, intervenire con trattamenti fogliari alla dose di 1 -1,5 ml/m^2 di prodotto formulato, avendo cura di irrorare con almeno 100-200 litri di soluzione per 1000 m^2. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni microclimatiche favorevoli allo sviluppo della malattia (caldo umido con umidità relativa superiore al 70-80%.) e, soprattutto nel periodo critico, ripetere i trattamenti ogni 14-15 giorni.

Avvertenza: I semi trattati o residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e/o del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

COMPATIBILITÀ
il prodotto è compatibile con i fungicidi benzimidazoilici (Benomil, Tiofanate metil, Carbendazim), TMTD, Clorotalonil, prodotti rameici e Mancozeb.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenze: Non immettere bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza. Per i campi da golf, tappeti erbosi e prati ornamentali segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate per le 24 ore successive al trattamento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare, l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
Registrazione Ministero della Salute n. 12405 del 24.12.2004
Stabilimenti di produzione:Althaller Italia srl . - S.Colombano al Lambro (Milano)
-United Phosphorus Ltd- Sandback Chesire
Suzhou New District Five Star Industry- Suzhou- Rep. Pop. Cinese

TECOMAG SRL-VIA BELLARIA 356
S.MARTINO DI MUGNANO 356 (MO)

Contenuto netto : ml 50 - 100 - 150 - 200 - 500 - 1 litro - 5 litri
Partita n°

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

CIPER

Insetticida emulsionabile

Composizione
- Cipermetrina tecnica al 93% pari a g 5 di p.a. puro (cis/trans 40/60)
- Coformulanti q. b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle,Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TECOMAG srl via Bellaria 356 S.Martino di Mugnano (Mo)
Distribuito da: Terranalisi srl-Via Nino Bixio 6 – Cento (Fe)

Registrazione n12067 del 23/03/2004 Ministero della Salute
Officina di produzione : -United Phosphorus Ltd-Sandback-Chesire CW 113QQ (U.K.)- Mitchell Cotts Chemicals-Steanard Lane, Mirfield West Yorkshire WF14 8QB (U.K.) – Chimac Agriphar –Rue de Renory 26-Ougree-Belgium-Althaller srl-Str. Com. Per campagna 5-S.Colombano al Lambro (Mi)
Lt 0,100 - 0,200 - 0,250 - 0,500 - 1 - 5 - 20 partita n°

INFORMAZIONE PER IL MEDICO : Sintomi. bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinopticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione - Avverteaza : consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Epoca: infestazione in atto.
Metodo: irrorazione uniforme della pianta.
Mezzi: qualsiasi irroratore compresi atomizzatori

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

DRUPACEE (pesco, ciliegio): afidi 75-100 cc/hl; Anarsia, Cidia, lepidotteri in genere 100-150 cc/hl; Cocciniglie: neanidi nei trattamenti estivi 100-150 cc/hl; Tripidi, Mosca 100-150 cc/hl; Per il controllo degli insetti svernanti e delle uova di acari è consigliato un trattamento con **CIPER** a 100-150 cc/hl con Olio bianco a 1,5 kg/hl all stadio vegetativo di bottoni rosa.

POMACEE (melo, pero): Psilla 1° trattamento a fine inverno contro adulti svernanti 100-150 cc/hl; 2° trattamento sulle uova mature prodotte dalla prima generazione all'apparire delle prime neanidi 150 cc/hl; con l'inizio della melata 200 cc/hl; 3° trattamento (facoltativo) contro 3ª generazione 200-300 cc/hl; Afidi su foglie non accartociate 75-100 cc/hl; Fillominatori (Cemiostoma, Litocolletis) contro la prima generezioneallo stadio di uova mature prima della comparsa delle mine 100-150 cc/hl; Ricamatrice estive e lepidotteri 100-150 cc/hl; Carpocapsa 100-150 cc/hl; Cocciniglie: contro neanidi in trattamenti estivi 100-150 cc/hl: Per il controllo degli insetti svernanti e delle uova di acari si consiglia un trattamento con **CIPER.** a 100-150 cc/hl in miscela con Olio bianco a 2-3 kg/hl all stadio compreso tra le orecchiette di topo e la differenzizzione dei mazzetti.

ORTAGGI IN CAMPO E SERRA (cavolo verza, cavolo capuccio, cavolfiore, cavolo broccolo, fagiolino, pisello, pomodoro, cipolla, patata): Dorifora 100-150 cc/hl; Nottue (scoperte) 100-150 cc/hl; Mosca bianca 75-100 cc/hl; Afidi 100-150 cc/hl; Cavolaia, tripidi, piralidi 100-150 cc/hl.

VITE: (Tignola, Tignoletta): contro la prima generazione se necessario 100-150 cc/hl; contro la seconda generazione 100-150 cc/hl; Cocciniglie, Sigaraio 100-125 cc/hl.

AGRUMI (limone, arancio): afidi 75-100 cc/hl; Cocciniglie: contro neanidi nei trattamenti estivi 100-150 cc/hl; Mosca bianca 100-150 cc/hl: Mosca degli agrumi 100-150 cc/hl.

TABACCO: Afidi 75-100 cc/hl; Mosca bianca 75-100 cc/hl; nuottue (allo scoperto), tripidi 100-150 cc/hl.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: Altica 1.000-1.200 cc/ha; Afidi 500-600 cc/ha; Nottue (allo scoperto) 600-1.000 cc/ha; Cleono, Lisso, Cassida 800-1.000 cc/ha.

MAIS :Afidi 75-100 cc/hl; Piralide 100-150 cc/hl.

FRUMENTO: Afidi, Lema 75-100 cc/hl.

Le dosi sopracitate si riferiscono a volume normale nei trattamenti. Per trattamenti a volume ridotto mantenere invariate la dose per ettaro
AVVERTENZE: in caso di forti infestazioni impiegare le dosi più alte.
Bagnare accuratamente tutte le parti della pianta.
Non trattare durante la fioritura

Compatibilità: **CIPER.** non è compatibile con gli insetticidi e fungicidi a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Intervallo di sicurezza:

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto di pisello, fagiolino, cavolo verza, cavolo capuccio, cavolfiore, cavolo broccolo; 14 giorni prima del raccolto di melo, pero, limone, arancio, pesco, ciliegio cavolo, cipolla, patata; 21 giorni prima del raccolto di barbabietola da zucchero e pomodoro; 28 giorni prima del raccolto di vite, mais; 42 giorni prima del raccolto del frumeto; 60 giorni prima del raccolto del tabacco.

"Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle"
"Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento" - "Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza".

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddetteistruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

CLORIMAG W D G

Erbicida della barbabietola da zucchero da orto e da foraggio
Tipo di formulazione : microgranuli idrodispersibili

CLORIMAG WDG

Composizione:
- CLORIDAZON puro g 65
- Coformulanti e inerti: q.b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

TECOMAG srl
Via Bellaria 356 S.Martino di Mugnano (Mo)

Stabilimento di produzione :
COLLAG LTD - Maidenstone Heath, Blundell Lane Bursledon - Southampton SO31 1AA (Inghilterra)
Industrie Chimiche Caffaro SpA - Stabilimento in Aprilia (LT)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. Stabilimento in via E. Torricelli, 2 - Cotignola (RA)
SIDECO DR. SCHIRM GMBK - Mecklenburger Str. 229, 23568 Lübeck
Stabilimento di Confezionamento
Torre srl. Stabilimento in via Pian d'Asso - Montalcino (SI)
Registrazione n. 8426 del 16/11/1993 del Ministero della Sanità
kg 1 - 5 - 10 - 20 Partita n ...

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici.
Terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE D'AZIONE
Il prodotto agisce per assorbimento radicale ed in parte fogliare nei primi stadi di sviluppo delle infestanti ed è indicato per il diserbo della **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA ORTO E DA FORAGGIO**
Erbe infestanti sensibili: Avena selvatica (Avena spp.), Fienarola annua (Poa annua), Giavone comune (Echinochloa grus-galli), Sanguinella (Digitaria sanguinalis), Amaranto comune (Amaranthus retroflexus), Borsa del pastore (Capsella bursa-pastoris), camomilla comune (Matricaria chamomilla), centocchio comune (Stellaria media), erba correggiola (Polygonum aviculare), erba morella (Solanum nigrum), erba storna comune (Thlaspi arvensis), falsa ortica (Lamium amplexicaule), farinello comune (Chenopodium album), galinsoga comune (Galinsoga parviflora), ortica minore (ortica urens), papavero comune (Papaver rhoeas), poligono convolvolo (Fallopia convolvolus), poligono persicaria (Polygonum persicaria), ravanello selvatico (Raphanus raphamistrum), renaiola comune (Spergula arvensis), senape selvatica (Sinapis arvensis), veronica (Veronica spp.)

Volume d'irrorazione 400 - 600 litri di acqua

Dosi d'impiego nei trattamenti pre-semina e pre-emergenza.
kg 3-3,5/ha in terreni sabbiosi
kg 4-4,5/ha in terreni di medio impasto
kg 4,5-5,5/ha in terreni argillosi
kg 6/ha in terreni ricchi di sostanza organica o fortemente argillosi
Dosi d'impiego nei trattamenti di post-emergenza.
kg 3-4/ha

Epoca d'impiego
- pre-semina (con incorporamento superficiale del prodotto)
- pre-emergenza (se non avviene una pioggia entro 2-4-settimane, effettuare una irrigazione)
- post-emergenza (con bietola che abbia superato lo stadio delle due foglie vere)

COMPATIBILITÀ: il prodotto può essere miscelato con i seguenti principi attivi: etofumesate, metamitron, fenmedifam, desmedifdam, lenacil, cicloato e olio bianco.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Il prodotto può essere fitotossico se applicato nella fase cotiledonare della coltura.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 20 giorni

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

MEGAL

Erbicida di post - emergenza del Riso
tipo di formulazione : granuli idrodispersibili

Composizione
- Bensulfuron metile puro g. 60
- Coformulanti qb a 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

TECOMAG srl - Via Bellaria 356 S.Martino di Mugnano (Mo)

Stabilimento di produzione : Suzhou New District Five Star Trade Ltd
3RR floor – Building N 74. Yanglin Xincan
Suzhou - Jiangsu 215021 CINA
Registrazione n..11591. del Ministero della Salute 14.02.2003
kg 0,05-0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10 - Partita n.: …..

***INFORMAZIONI PER IL MEDICO** : in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.*

MODALITA' D'IMPIEGO
MEGAL è un erbicida specifico per combattere le infestanti non graminacee, sia annuali che perenni, quali Butomus umbellatus, Bolboschoenus (Scirpus) maritimus, Haleocharis spp., Marsilea quadrifolia, Sagittaria spp., Potamogeton spp., Sparganium erectum, Typha angustifolia, Ammania coccinea, Bidens frondosa, Heteranthera rotundifolia, Leersia oryzoides (da seme), Schoenoplectus (Scirpus) mucronatus, Alisma plantago aquatica, Alisma lanceolata, Cyperus spp., Sparganium erectum, Thypa spp che siano piccole ed in attiva crescita; si ha pure un controllo iniziale di Heteranthera reniformis e Heteranthera limosa con infestanti allo stadio di rosetta e nessuna foglia emersa.
Agisce per assorbimento foliare e radicale ed è traslocato nei tessuti meristematici delle infestanti con arresto della crescita.
RISO : impiegato alla dose di g. 100 per ettaro con la risaia completamente ed uniformemente sommersa, con circa 3 - 10 cm di acqua, e trattando da 20 a 40 giorni dopo la semina del riso.
Dopo il trattamento non effettuare immissioni di acqua per almeno 5 giorni. Si consiglia di non trattare nel caso le colture di riso siano deboli per cause climatiche, o da qualsiasi altra causa ed inoltre l'impiego ripetuto, sullo stesso terreno, degli stessi erbicidi possono produrre selezioni naturali di biotipi che possono diventare dominanti e resistenti all'azione dell'erbicida; si consiglia, in tali casi, l'alternanza con prodotti aventi meccanismi d'azione differenti ma uguali come efficacia.
Compatibilita': non compatibile con i prodotti a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità : fitotossico per le colture non indicate in etichetta; non colpire quindi direttamente o tramite deriva le colture o piante arboree. Si raccomanda di non lavare le attrezzature vicino a qualunque altra pianta o coltura.
Per la pulizia del serbatoio o pompa usata per il trattamento, svuotare prima il serbatoio, poi risciacquare la pompa, le barrecon acqua pulita e svuotare ancora; nel serbatoio aggiungere ancora acqua pulita ed aggiungere circa lt 0,5/hl di candeggina (), risciacquare pompa e barre con agitatore in funzione per circa 10 minuti. Rimuovere il tutto, tornare a risciacquare con acqua pulita ed i filtri e gli ugelli debbono essere puliti separatamente anch'essi con una soluzione al 5% di ipoclorito di sodio
Attenzione : il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate, evitando usi impropi
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi indicati: ogni altro impiego e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile dagli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ORYZA

diserbante selettivo in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
-Oxadiazon puro g 33,4 (=370g/l)
-Coadiuvanti q. b. a g 100

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TECOMAG srl
via Bellaria 356 S.Martino di Mugnano (Mo)

Stabilimento di produzione:
UNITED PHOSPHORUS ltd - Sandback - Chesire, CW 11 9QQ (UK)
TERRANALISI srl via N. Bixio, 6 - Cento (FE)
S.I.P.C.A.M via V. Veneto,81 - Selerano sul Lambro (LO)
Stabilimento di confezionamento:
DIACHEM spa unità produttiva SIFA, S.S. Padana Superiore - Caravaggio (BG) -
Reg. n 10376 del 8/03/2000 del Ministero della Sanità
Lt 1 - 5 - 10 - 20 Partita n.:

INFORMAZIONI MEDICHE : in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE:
ORYZA è un diserbante selettivo efficace sulle seguenti erbe infestanti:
Oxalis spp (Acetosella), Atriplice patula (Atriplice maggiore), Burtomus umbellatus (Giunco fiorito), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Capsella bursa pastoris (Borsa del pastore), Polygonum aviculare (Correggiola), Polygonum persicaria (Persicaria), Senecio vulgaris (Erba calderina), Euphorbia spp. (Euforbia), Chenopodium album (Farinaccio selvatico), Fumaria officinalis (Fumaria), Alisma plantago (Cucchiaio), Amaranthus retroflexus (Amaranto spigato), Amaranthus spp., Solanum nigrum (Erba morella), Portulaca oleracea (Erba porcellana); Heteranthera limosa (Eterantere), Heteranthera reniformis (Eterantere), Panicum spp, Galisoga parviflora (Gallisoga), Echinochloa c. galli (Giavone comune), Echinochloa spp. (Giavoni), Mercurialis annua (Mercorella), Papaver rhoeas (Papavero), Poa pratensis (Poa), Raphanus raphanistum (ravanello selvatico), Rumex spp (Romice). Digtaria sanguinalis (Sanguinella), Scirpus spp., Sinapis arvensis (Senape) Veronica spp (Veronica), Convolvulus arvensis (Vilucchio). Anagallis arvensis (Anagallide), Fallopia convolvulus (Convolvolo nero), Alopecurus mysuroides (Coda di volpe), Stachys annua (Stregona annuale).
Le seguenti erbe infestanti risultano meno sensibili al formulato:
Avena spp (Avena selvatica), Galium aparine (Attaccamani), Abutilon theaphrasi (Cencio molle), Agropirum repena (Falsa gramigna), Poa annua (Erba fienarola), Bidens tripartita (Forbicina), Xanthium italicum (Lappa), Lolium spp. (Loglio)
Erbe infestanti resistenti:
Artemisia vulgaris (Assenzio selvatico), Carex spp (Carice), Stellaria media (Centocchio), Cyperus rotundus (Cipero). Agrostemma githago (Gittaione), Cynodon dactylon (Gramigna comune), Taraxacum officinale (Soffione), Sorghum halepense (Sorghetta), Cirsium arvense (Stoppione)

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
RISO: dose: 0,70-1,3 l/ha contro Heteranthera limosa (Eterantere), Heteranthera reniformis (Eterantere), Echinochloa c. galli (a nascita precoce) impiegato su terreno ben livellato e finemente lavorato; intervenire prima della semina, su terreno asciutto, dopo aver preparato il letto di semina; allagare la risaia, attendere 1-2 giorni e quindi seminare il riso.
SOIA E GIRASOLE: dose: 1,5 l/ha contro graminacee e dicotiledoni annuali (esclusa Stellaria spp.). Anche su queste colture il prodotto va impiegato su terreno ben livellato e finemente lavorato; intervenire subito dopo la semina e prima dell'emergenza della coltura e delle infestanti.
AGLIO: dose 1-2 l/ha in pre-emergenza della coltura e delle infestanti.
CARCIOFO, CAVOLFIORE, CICORIA, FINOCCHIO, INDIVIA, LATTUGA, MELANZANA, PEPERONE, POMODORO, TABACCO: dose 1-2 l/ha solo su colture trapiantate prima del trapianto e in pre-emergenza delle infestanti.
GAROFANO: dose 1,5-2 l/ha dopo la messa a dimora delle talee, in pre-emergenza delle infestanti (si può trattare anche dopo una sarchiatura) contro il Vilucchio 5-6,5 l/ha.
ASPARAGO: contro il Vilucchio alla dose di 5-6,5 l/ha prima dell'emergenza dei turrioni
CARCIOFO: contro l'Acetosella nelle carciofaie alla dose di 5-6,5 l/ha in pre-emergenza delle infestanti.
VITE, OLIVO, ARANCIO, CLEMENTINO, LIMONE, MANDARINO, MELO, PERO, NOCCIOLO, PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, ACTINIDIA, PIOPPO:
- vivai: dose 5-6,5 l/ha trattare prima della ripresa vegetativa. non trattare vivai di vite, piante madri o barbatelle appena messe a dimora.
- piante in produzione: dose 2,5 l/ha contro infestanti annuali e 6,5 l/ha contro convolvolo. Su vite intervenire solo su piante in produzione e con vegetazione sollevata dal terreno.
Trattare a fine inverno prima della ripresa vegetative sulle piante a foglia caduca.
Durante il trattamento evitare di colpire la vegetazione o parti non lignificate.
Non lavorare il terreno dopo il trattamento e in caso di siccità intervenirecon una irrigazione dopo 10-12 giorni dal trattamento.
In tutte le applicazioni utilizzare volumi d'acqua di 200-400 l/ha

COMPATIBILITÀ
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITÀ: il prodotto contiene sostanza attiva altamente tossica per gli organismi acquatici
FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta
In caso di pioggia battente, dopo il trattamento, la vegetazione delle giovani colture può venire colpita da particelle di terreno che hanno adsorbito il prodotto con conseguente leggere ustioni.
Su asparago, in caso di ristagno idrico e con emergenza della coltura rallentata da basse temperature, i turrioni possono presentare leggere incurvature apicali.
Su terreni con ristagni d'acqua e con basse temperature che rallentano l'emergenza della soia possono manifestarsi fallanze della stessa. Su vivai non intervenire su piante non sufficientemente lignificate.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

REPLANET

Fungicida sistemico e di contatto con azione curativa e preventiva

Tipo di formulazione: sospensione concentrata

Composizione
- Metalaxyl puro g 3
- Rame metallo g 15,5 (sotto forma di idrossido)
- Coadiuvanti q. b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO :
Nocivo per ingestione;
Rischio di gravi lesioni oculari;
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini;
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

TECOMAG SRL
Via Bellaria 356 S.Martino di Mugnano (Mo)

Registrazione n 9794 del 02/11/98 Ministero della Salute
Officina di produzione :
UNITED PHOSPHORUS ltd - Sandback - Chesire, CW 11 9QQ (UK)
TERRANALISI srl via N. Bixio, 6 - Cento (FE)
Lt 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 15 - 20 partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
"trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive : RAME METALLO 15,5%; METALAXYL 3%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :
RAME : Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

METALAXYL : Sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
Terapia sintomatica. CONTROINDICAZIONI :
Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
fungicida costituito dall'unione di due principi attivi che agiscono per via sistemica e di contatto con azione preventiva e curativa.
I trattamenti sotto indicati, vanno cadenzati a turni fissi di 10 - 14 giorni :

VITE : contro la Peronospora ml 450 per q.le acqua, iniziando a trattare dopo le prime piogge infettanti

CAVOLO - VERZA - MELONE COCOMERO : contro la Peronospora, Alternaria e Bremia alla dose di ml 450 per q.le acqua

SOIA : alla dose di litri 4,5 per ettaro contro la Fitoftora

PATATA : alla dose di litri 3,5 - 4,5 per ettaro contro la Peronospora

POMODORO : alla dose di ml 450 per q.le acqua contro la Peronospora

FRAGOLA : alla dose di litri 3,5 - 4,5 per ettaro contro la Fitoftora con trattamenti iniziati circa 20 giorni dopo la messa a dimora delle piantine.

MELO - : alla dose di ml 125 - 175 contro la Fitoftora, bagnando benela zona del colletto ed il terreno sottostante oppure distribuendo con la fertirrigazione; si possono effettuare eventuali spennellature al tronco con una soluzione al 20%.

"Rispettare rigorosamente le norme di impiego per contrastare i ceppi resistenti. Qualora insorga la resistenza ricorrere all'impiego di un fungicida di copertura. Non applicare mai su vivai di vite"

COMPATIBILITÀ: non compatibile con i prodotti a reazione alcalina, come Polisolfuri e Poltiglia Bordolese.
AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Fitotossicità : non impiegare in fioritura. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Nocività : il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto di pomodoro,20 giorni prima del raccolto di melone cocomero,patata, melo ; giorni 28 per vite; ; giorni 40 per fragola; giorni 60 per cavolo verza; giorni 150 per soia; giorni

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

RISET

DISERBANTE SELETTIVO PER LA LOTTA CONTRO LE INFESTANTI DEL RISO - LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE - 100 g. di prodotto contengono:
-Propanil p.a. puro g 35 (g/l 355)
-Coformulanti q.b. a g 100
(contiene Isoforone e Nafta solvente)

FRASI DI RISCHIO
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione; Irritante per gli occhi e le vie respiratorie; Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti; Altamente tossico per gli organismi acquatici.Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: Può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza; In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Tecomag srl – Via Bellaria 356
S.Martino di Mugnano (Mo)
Stabilimento di produzione: ALTHALLER ITALI SRL Strada Comunale per Campagna n 5 San Colombano al Lambro (Mi)
CHEMIA S.P.A. Strada Statale n 255 Km 46- Sant'agostino (Fe)
United Phosphorus Ltd,Sandback – Chesire CW 11 9QQ (U.K.)
Inquirport parque Industrial Lianos Occidentals, Araure;Edo. Portoguesa,Venezuela

Registrazione del Ministero della Salute n. 11927 del 22.01.2004
CONTENUTO: ℓ 10 - Riferimento partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE
RISET è un formulato a base di Propanil avente la caratteristica di venire assorbito molto rapidamente dalle infestanti delle risaie per cui la sua azione erbicida è più pronta e più sicura.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
- Contro giavone con 2-3 foglie, ma in prevalenza sulla terza foglia: litri 10-12 per ettaro.
- Contro giavone con 3-4 foglie e qualche pianta all'inizio dell'accestimento: litri 13-16 per ettaro.
- Contro giavone allo stadio di accestimento con non più di 2 germogli secondari per pianta: litri 19-20 per ettaro.

RISET si applica in post-emergenza, con la seguente tecnica applicativa: asciutta della risaia prima del trattamento, reimmissione dell'acqua 24-48 ore dopo l'esecuzione dello stesso, mantenimento di un alto livello d'acqua per 8-10 giorni, avendo l'avvertenza di non eccedere nei volumi d'acqua quando la vegetazione del riso è debole e poco sviluppata.
RISET ha dimostrato di svolgere una rapida azione erbicida anche nel confronto delle ciperacee e delle alismatacee non che una certa efficacia anche contro lo scirpus marittimus et il butomus umbellatus.
RISET può essere distribuito con volumi d'acqua molto bassi: litri 280-300 per ettaro, impiegando pompe montate su trattrici o trainate. Le pompe usate per il diserbo con RISET devono erogare una pressione minima di 25 Atm. e avere ugelli di diametro non superiore a millimetri 1-1,2.

Effettuare il trattamento in giornate prive di vento, onde evitare che la nube irrorante possa essere trasportata su culture vicine sensibili: medica, trifoglio, pisello, fagiolo, frutteti od altro.
Preparazione della poltiglia: versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria.
COMPATIBILITA'- RISET per la sua formulazione e lo specifico campo d'impiego non deve essere miscelato con insetticidi, fungicidi e concimi e non deve essere distribuito 5 giorni prima o dopo l'impiego di questi prodotti, altrimenti il riso può subire delle bruciature. Non eseguire il trattamento nel caso in cui si preveda una pioggia a distanza di 3-6 ore.

AVVERTENZE - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - RISET è selettivo nei confronti del riso; tuttavia talvolta in caso di temperature elevate si può riscontrare qualche ustione sulle foglie che però scompare dopo qualche giorno.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

TECOGLIF

Erbicida sistemico totale di post-emergenza
liquido

Composizione:
Glifosate acido puro g. 30,4 (*)
Coformulanti q.b. a g. 100
(*) il contenuto di p.a. acido equivalente corrisponde a 360 g/l
pari a g. 41 di p.a. sale isopropilamminico per 100 g di prodotto

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici,
può provocare a lungo termine effetti
negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei
bambini; Conservare lontano da alimenti
o mangimi e da bevande; Non mangiare,
nè bere, nè fumare durante l'impiego;
Non gettare i residui nelle fognature; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

TECOMAG srl
via Bellaria 356 S.Martino di Mugnano (Mo)

Stabilimento di produzione :
AGROCHIMICA FAENTINA spa - via S.Silvestro 1 - Faenza (RA)
UNITED PHOSPHORUS ltd - Sandback - Chesire. CW 11 9QQ (UK)
ALTHALLER ITALIA srl - San Colombano al Lambro (MI)
Registrazione del Ministero Salute n 8575 del 03/12/94
lt 0,150 – 0,250 – 1 - 5 - 20 - 25 – 50 - Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

MODALITÀ D'IMPIEGO E CAMPI D'IMPIEGO
Il **TECOGLIF** è un erbicida sistemico impiegato in post - emergenza. Agisce per assorbimento fogliare e viene traslocato sino alle radici e agli organi di propagazione con inibizione della sintesi proteica con effetto visivo dopo alcuni giorni con ingiallimento ed arrossamento delle infestanti e successivo disseccamento. Trattare su infestanti in attiva crescita e che non siano sofferenti per qualsiasi causa (siccità, freddo, parassiti ecc.). Viene impiegato sulle seguenti colture senza spruzzare le parti legnose e verdi in quanto il prodotto non è selettivo: **AGRUMI** (Arancio, Mandarino, Clementino, Limone, cedro, pompelmo), **POMACEE** (melo, pero), **NOCE**, **OLIVO**, **VITE**, **DRUPACEE** (albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino), **CARCIOFO**, **POMODORO**, **MELANZANA**, **FAGIOLINO**, **FAVA**, **PISELLO**, **CAROTA**, **PATATA**, **MAIS** (solo interfila), **SOIA**, **ERBA MEDICA**, **PRATI**, **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO**, **ROSA**, **VIVAI E SEMENZAI DI FLOREALI**, **ORNAMENTALI**, **FORESTALI E PIOPPO**, **ASPARAGO** (prima dell'emergenza);
SU TERRENI IN ASSENZA DI COLTURE e destinati alla coltivazione di: fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segala, avena, mais, riso, soia, prati, vivai, effettuando il trapianto o la semina non prima di 48 ore;
SU AREE NON DESTINATE ALLA COLTIVAZIONE (aree industriali, ruderi storici, cimiteri, banchine stradali, piazzole, ferrovie, argini canali, scoline, fossi, argini in genere, aree urbane ed agricole non coltivate, viali, parchi e giardini).

Impiegare 2-3 q.li di acqua per ettaro con le seguenti dosi d'impiego:

Contro malerbe annuali e biennali
1,5 - 4 lt/ha contro : Alopecurus sp. (Coda di volpe), Avena sp. (Avena), Hordeum murinum (Orzo selvatico), Lolium sp. (Loglio), Mercurialis sp. (Mercorella), Poa sp. (Fienarola), Riso crodo, Ammi majus (Rindimelo), Amaranthus sp. (Amaranto), Calendula sp. (Cappuccino dei campi), Chenopodium sp. (Farinello), Orobanche sp. (Orobanche), Portulaca sp. (Erba porcellana), Raphanus sp. (Ravanello selvatico), Senecio sp. (Erba calderina), Sinapis sp. (Senape), Stellaria sp. (Centocchio), Veronica sp. (Veronica)

Contro malerbe perennanti
4 - 5 lt/ha contro : Agropyron repens (Gramigna), Carex sp. (Carice), Cirsium sp. (Stoppione), Euphorbia sp. (Euforbia), Glyceria sp. (Gramigna di palude), Hipericum sp. (Iperico), Leersia oryzoides (Serla), Phalaris sp. (Scagliola), Rumex sp. (Romice), Sonchus sp. (Crespino), Serghum halepense (Sorghetta).
5 - 7 lt/ha contro : Alisma sp. (Alisma), Asfodelus sp. (Porraccio), Butomus sp. (Giunco fiorito), Cyperus sp. (Zigolo), Ferula sp. (Ferula), Juncus sp. (Giunco), Nardus sp. (Erba cervina), Scirpus sp. (Scirpus), Sparganium sp. (Sparganio), Tussilago sp. (Tussilagine)
8,5 - 10 lt/ha contro : Agrostis sp. (Agrostide), Allium sp. (Aglio), Artemisia sp. (Artemisia), Arundo sp. (Arundo), Cynodon sp. (Gramigna), Eracleum sp. (Eracleo), Glechoma sp. (Edera terrestre), Oxalis sp. (Acetosella), Paspalum sp. (Erba dallis), Phragmites sp. (Cannuccia), Pteridium sp. (Felce), Ranunculus sp. (Ranuncolo), Rubus sp. (Rovo), Tipha sp. (Mazza sorda), Urtica sp. (Ortica)
12 lt/ha contro : Aristolochia sp. (Aristolochia), Clematis sp. (Clematis), Convolvulus sp. (Vilucchio), Rubia peregrina (Rubia).

Contro gli arbusti
4,5 - 5,5 lt/ha contro : Acer sp. (Aceri), Fraxinus sp. (Frassino), Genista sp. (Genista), Salix sp. (Salice), Sambucus sp. (Sambuco), Vaccinium sp. (Vaccino)
10 - 12 lt/ha contro : Calluna sp. (Calluna), Cistus sp. (Cisto), Erica sp. (Erica), Lonicera sp. (Lonicera)

L'addizione di solfato ammonico, in ragione di 8-10 kg ettaro consente di impiegare le dosi inferiori prescritte.
Con presenza di infestanti nate da seme far seguire un trattamento con un prodotto residuale (es. simazina, diuron).Se dopo il trattamento entro massimo 8 ore vi fosse una pioggia essa ridurrebbe l'efficacia del trattamento; evitare la deriva; togliere i succhioni e ricacci sulle colture arboree prima del trattamento; non lavorare il terreno per 3 settimane dopo il trattamento; tra il trattamento e l'impiego di prodotti residuali far trascorrere almeno 1-2 settimane.
COMPATIBILITÀ: il prodotto non si impiega in miscela con gli antiparassitari a reazione alcalina. **AVVERTENZA**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: dopo il trattamento lavare accuratamente tutte le attrezzature impiegate.

AVVERTENZA: non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o in ferro se non sono protetti da vernici plastiche.

NOCIVITÀ: durante il trattamento tener lontano animali domestici e bestiame.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi indicati: ogni altro impiego è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile dagli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE
E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO
CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE
D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI
SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I
SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE
AGRICOLE E DALLE STRADE.

VOLLEY R

Fungicida sistemico e di contatto con azione curativa e preventiva

tipo di formulazione: sospensione concentrata

Composizione
- Metalaxyl puro g 3 (42 g/l)
- Rame metallo g 15,5 (~213 g/l) (sotto forma di idrossido)
- Coadiuvanti q. b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO :
Nocivo per ingestione;
Rischio di gravi lesioni oculari;
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini;
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

TECOMAG S.r.l.
Via Bellaria 356 S.Martino di Mugnano (Mo)

Registrazione n 10766 del 23/03/01 Ministero della Salute

Officina di produzione :
UNITED PHOSPHORUS ltd - Sandback - Chesire, CW 11 9QQ (UK)
TERRANALISI srl via N. Bixio, 6 - Cento (FE)
S.I.P.C.A.M. spa via V. Veneto, 81 Selerano sul Lambro (LO)
DIACHEM spa unità produttiva SIFA , S.S. Padana Superiore Caravaggio (BG)
Lt 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 15 - 20 partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
"trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive : RAME METALLO 15,5%; METALAXYL 3%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :
RAME : Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
METALAXYL : Sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
Terapia sintomatica. CONTROINDICAZIONI :
Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
fungicida costituito dall'unione di due principi attivi che agiscono per via sistemica e di contatto con azione preventiva e curativa.
I trattamenti sotto indicati, vanno cadenzati a turni fissi di 10 - 14 giorni :

VITE : contro la Peronospora ml 450 per q.le acqua, iniziando a trattare dopo le prime piogge infettanti

CAVOLO VERZA - MELONE COCOMERO : contro la Peronospora, Alternaria e Bremia alla dose di ml 450 per q.le acqua

SOIA : alla dose di litri 4,5 per ettaro contro la Fitoftora

PATATA : alla dose di litri 3,5 - 4,5 per ettaro contro la Peronospora

POMODORO : alla dose di ml 450 per q.le acqua contro la Peronospora

FRAGOLA : alla dose di litri 3,5 - 4,5 per ettaro contro la Fitoftora con trattamenti iniziati circa 20 giorni dopo la messa a dimora delle piantine.

MELO : alla dose di ml 125 - 175 contro la Fitoftora, bagnando benela zona del colletto ed il terreno sottostante oppure distribuendo con la fertirrigazione; si possono effettuare eventuali spennellature al tronco con una soluzione al 20%.

"Rispettare rigorosamente le norme di impiego per contrastare i ceppi resistenti. Qualora insorga la resistenza ricorrere all'impiego di un fungicida di copertura. Non applicare mai su vivai di vite"
COMPATIBILITÀ: non compatibile con i prodotti a reazione alcalina, come Polisolfuri e Poltiglia Bordolese.
AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Fitotossicità : non impiegare in fioritura. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Nocività : il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta del pomodoro; 20 giorni prima del raccolto di melone, cocomero, patata, melo; giorni 28 per vite; giorni 40 per fragola; giorni 60 per cavolo verza; giorni 150 per soia.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

BASLINI S.p.a.

FUMATHANE® - S

Soluzione fumigante per la disinfezione del terreno

FUMATHANE - S

Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Metam sodio puro g 39,1 (450 g/l)
Coformulanti (acqua) q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione – A contatto con acidi libera gas tossico – Provoca ustioni – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare al lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CORROSIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico - Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore – Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

BASLINI S.p.A.
Sede Legale: Via Barozzi, 8 - 20122 MILANO
Sede Amm.va: P.zza E. Baslini, 1 – Treviglio (BG) tel.: 0363.3191

Officine di produzione:
BASLINI S.p.A. - P.zza E. Baslini, 1 – Treviglio (BG)
DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA – S.S. Padana Superiore km 110 – Caravaggio (BG)
TAMINCO n.v. – Pantserschipstraat, 207 – B9000 Gent (Belgio)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 0357 del 22.1.1971

Contenuto netto: litri 5–50-110*–220*-1000* **Partita n. ....**

® Marchio registrato della Rohm & Haas Co., Philadelphia (USA)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - CUTE: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; OCCHIO: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; APPARATO RESPIRATORIO: Irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia**: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

GENERALITÀ

Il FUMATHANE - S è un prodotto fumigante che deve le sue proprietà fungicide e collaterali al gas (Metilisotiocianato di sodio) che si produce nel terreno a seguito della sua decomposizione. Esso viene impiegato nel trattamento preventivo del terreno per combattere i parassiti fungini agenti dei marciumi radicali, marciumi del colletto, avvizzimento delle piantine, quali: Fusarium, Verticillium, Phialophora, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia.
Il FUMATHANE - S svolge nel contempo altre interessanti azioni collaterali e cioè: azione erbicida, azione nematocida sulle forme libere, azione insetticida.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Preparazione del terreno: per ottenere i migliori risultati e cioè una penetrazione e diffusione perfetta, il terreno deve essere ben sminuzzato e piuttosto umido.
Sostanza organica: il letame e la torba devono essere interrati un mese prima del trattamento.
Temperatura: al momento dell'applicazione la temperatura del terreno non deve essere inferiore a 14°C e non superiore ai 32°C.
Applicazione: il FUMATHANE - S deve essere distribuito in modo uniforme, diluito nell'acqua mediate un irroratore a spruzzo o mediante l'impianto di irrigazione a pioggia. Per piccole superfici può essere impiegata l'annaffiatura. Immediatamente dopo, l'appezzamento trattato deve essere sottoposto ad una lenta irrigazione, fin a quando il terreno risulterà bagnato ad una profondità di cm 25-30. È possibile distribuire il FUMATHANE - S anche con palo iniettore praticando i fori a distanza di cm 15-18 come massimo, ed effettuando subito dopo una irrigazione superficiale di qualche cm..
Dieci-dodici giorni dopo il trattamento lavorare superficialmente il terreno per favorire la dispersione dei gas originatisi dal FUMATHANE - S, indi attendere ancora 20-30 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto.
Dosi: la dose di FUMATHANE - S è di 750 l/ha (kg 850/ha). Tale dose dovrà essere portata1150-1500 l/ha (= kg 1300-1700/ha) quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi o fialoforosi.

COMPATIBILITÀ: Il FUMATHANE - S non è compatibile con altri fumiganti del suolo. Evitare pertanto la miscela e dovendo applicare anche nematocidi fare due applicazioni separate a distanza di 2-5 giorni.

Il prodotto e' nocivo per gli animali domestici ed il bestiame

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
PERDITE ACCIDENTALI: Evitare che il liquido entri nelle fogne, nelle cantine, nei fossati e negli scavi; i vapori possono creare un'atmosfera tossica. Assorbire con terra, sabbia o altro materiale appropriato. Se la sostanza si è riversata in un corso d'acqua o nelle fogne o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvertire le Autorità competenti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON VENDERSI SFUSO

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

***ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO; NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE**

***LO STOCCAGGIO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE DEI CONTENITORI SUPERIORI A 200 LITRI DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO IN ZONA DOTATA DI BACINO DI CONTENIMENTO DI ADEGUATO VOLUME ATTO A RACCOGLIERE EVENTUALI FUORIUSCITE ACCIDENTALI DEL PRODOTTO**

FUMATHANE 510®

Soluzione fumigante
per la disinfezione del terreno in assenza di colture

FUMATHANE 510

Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Metam sodio puro g 42,2 (510 g/l)
Coformulanti (acqua) q.b. a g 100

CORROSIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione – A contatto con acidi libera gas tossico – Provoca ustioni – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare al lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico - Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore – Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

BASLINI S.p.A.
Sede Legale: Via Barozzi, 8 - 20122 MILANO
Sede Amm.va: P.zza E. Baslini, 1 – Treviglio (BG) tel.: 0363.3191

Officine di produzione:
BASLINI S.p.A. - P.zza E. Baslini, 1 – Treviglio (BG)
DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA – S.S. Padana Superiore km 110 – Caravaggio (BG)
TAMINCO n.v. – Pantserschipstraat, 207 – B9000 Gent (Belgio)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 0565 del 15.1.1972

Contenuto netto: litri 5-20–50-110*–220*-1000* **Partita n.** ....

® Marchio registrato della Rohm & Haas Co., Philadelphia (USA)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - CUTE: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; OCCHIO: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; APPARATO RESPIRATORIO: Irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia**: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

GENERALITÀ
Il FUMATHANE 510 è un prodotto fumigante che deve le sue proprietà fungicide e collaterali al gas (Metilisotiocianato di sodio) che si produce nel terreno a seguito della sua decomposizione. Esso viene impiegato nel trattamento preventivo del terreno per combattere i parassiti fungini agenti dei marciumi radicali, marciumi del colletto, avvizzimento delle piantine, quali: Fusarium, Verticillium, Phialophora, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia.
Il FUMATHANE 510 svolge nel contempo altre interessanti azioni collaterali e cioè: azione erbicida, azione nematocida sulle forme libere, azione insetticida.
Il suo impiego è previsto per trattamenti a terreni destinati alla messa a dimora di colture ortive, floricole, industriali, come pure nei vivai in genere, serre, semenzai, fungaie

MODALITÀ D'IMPIEGO
Preparazione del terreno: per ottenere i migliori risultati e cioè una penetrazione e diffusione perfetta, il terreno deve essere ben sminuzzato e piuttosto umido.
Sostanza organica: il letame e la torba devono essere interrati un mese prima del trattamento.
Temperatura: al momento dell'applicazione la temperatura del terreno non deve essere inferiore a 14°C e non superiore ai 32°C.
Applicazione: il FUMATHANE 510 deve essere distribuito in modo localizzato attraverso apposite macchine fumigatrici. L'impiego su piccole superfici può essere effettuato mediante annaffiatura. Immediatamente dopo, l'appezzamento trattato deve essere sottoposto ad una lenta irrigazione, fino a quando il terreno risulterà bagnato ad una profondità di cm 25-30. É possibile distribuire il FUMATHANE 510 anche con palo iniettore praticando i fori a distanza di cm 15-18 come massimo, ed effettuando subito dopo una irrigazione superficiale di qualche cm. Due settimane dopo il trattamento lavorare superficialmente il terreno per favorire la dispersione dei gas originatisi dal FUMATHANE 510, indi attendere ancora 1-2 settimane prima di procedere alla semina o al trapianto.
Dosi: la dose di FUMATHANE 510 è di 750 l/ha. Tale dose dovrà essere aumentata fino a 1300-1500 l/ha quando si operi su terreni pesanti ed infettati principalmente da verticillosi o fialoforosi.

L'applicazione del prodotto e qualsiasi altra operazione successiva al trattamento, da eseguire prima della dispersione dal terreno dei gas da esso derivanti, devono essere eseguite da operatori muniti di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi, la pelle.
Impedire l'accesso alle zone trattate a persone ed animali domestici prima di 15 giorni.

Modalità di bonifica nel caso di perdite e spandimenti accidentali.
Il prodotto sviluppa gas tossico. In caso di sversamento in ambiente chiuso, dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi, la pelle.

COMPATIBILITÀ: Il FUMATHANE 510 non è compatibile con altri fumiganti del suolo. Evitare pertanto la miscela e dovendo applicare anche nematocidi fare due applicazioni separate.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON VENDERSI SFUSO

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

***ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO; NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE**

***LO STOCCAGGIO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE DEI CONTENITORI SUPERIORI A 200 LITRI DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO IN ZONA DOTATA DI BACINO DI CONTENIMENTO DI ADEGUATO VOLUME ATTO A RACCOGLIERE EVENTUALI FUORIUSCITE ACCIDENTALI DEL PRODOTTO**

METAMBAS

Fumigante del terreno

METAMBAS
Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Metam sodio puro g 32,7 (380 g/l)
Coformulanti (acqua) q.b. a g 100

CORROSIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione – A contatto con acidi libera gas tossico – Provoca ustioni – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare al lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico - Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore – Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

BASLINI S.p.A.
Sede Legale: Via Barozzi, 8 - 20122 MILANO
Sede Amm.va: P.zza E. Baslini, 1 – Treviglio (BG) tel.: 0363.3191

Officine di produzione:
BASLINI S.p.A. - P.zza E. Baslini, 1 – Treviglio (BG)
DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA – S.S. Padana Superiore km 110 – Caravaggio (BG)
TAMINCO n.v. – Pantserschipstraat, 207 – B9000 Gent (Belgio)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 6128 del 19.10.1984

Contenuto netto: litri 20-50-110*–220*-1000* **Partita n.** ....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - CUTE: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; OCCHIO: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; APPARATO RESPIRATORIO: Irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia**: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il METAMBAS è un fumigante del terreno che deve le sue proprietà al gas (Metilisotiocianato di sodio) che si produce dalla sua decomposizione quando il prodotto si trova interrato.
Va impiegato alla dose di l 850/ha (= 1000 kg/ha) aumentabile a l 1280-1700 (= 1500-2000 kg/ha) nel caso di forti attacchi.

Funghi del suolo: Phialophora, Pythium, Fusarium, Verticillium, Rhizoctonia, Thielavia, Armillaria, Sclerotinia.

Semi di erbe infestanti: Stellaria spp., Portulaca oleracea, Taraxacum spp., Capsella, Chenopodium, Amaranthus.
Forme libere di nematodi: Paratylenchus spp., Pratylenchus spp., Criconemoides.
Insetti del terreno: Grillotalpa, Millepiedi, Maggiolino.

Viene consigliato a pieno campo, semenzai, letti caldi, serre, fungaie, terricciati, diluito in acqua e distribuito a mezzo dei sistemi di irrigazione, pali iniettori, pompe e innaffiatoi a mano.
Prima dell'esecuzione del trattamento il terreno deve essere finemente lavorato e ripulito da eventuali residui vegetali.
Al momento dell'intervento il terreno deve essere sufficientemente umido con una temperatura fra i 10 e i 32°C. Dopo 10-15 giorni dall'intervento il terreno deve essere smosso con un normale motocoltivatore onde disperdere il più possibile i gas formatisi. Dopo altri dieci-dodici giorni è possibile seminare o trapiantare.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto è compatibile con i formulati a base di Dicloropropene. Attualmente la tecnica fitosanitaria non prevede altre miscele. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICTÀ: il prodotto è fitotossico, pertanto deve essere usato su terreno nudo almeno 20-30 giorni prima della semina o del trapianto.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DA NON VENDERSI SFUSO
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
***ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO; NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE**
***LO STOCCAGGIO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE DEI CONTENITORI SUPERIORI A 200 LITRI DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO IN ZONA DOTATA DI BACINO DI CONTENIMENTO DI ADEGUATO VOLUME ATTO A RACCOGLIERE EVENTUALI FUORIUSCITE ACCIDENTALI DEL PRODOTTO**

VAPAM®

Soluzione fumigante per la disinfezione del terreno in assenza di colture

VAPAM

Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Metam sodio puro g 39,1 (470 g/l)
Coformulanti (acqua) q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione – A contatto con acidi libera gas tossico – Provoca ustioni – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare al lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CORROSIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico - Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore – Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

BASLINI S.p.A.
Sede Legale: Via Barozzi, 8 - 20122 MILANO
Sede Amm.va: P.zza E. Baslini, 1 – Treviglio (BG) tel.: 0363.3191

Officine di produzione:
BASLINI S.p.A. - P.zza E. Baslini, 1 – Treviglio (BG)
DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA – S.S. Padana Superiore km 110 – Caravaggio (BG)
TAMINCO n.v. – Pantserschipstraat, 207 – B9000 Gent (Belgio)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 3779 del 19.06.1980

Contenuto netto: litri 20-50-110*–220*-1000* **Partita n.** ....

® Marchio registrato della ICI AMERICANS (USA)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - CUTE: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; OCCHIO: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; APPARATO RESPIRATORIO: Irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia**: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il VAPAM è un prodotto fumigante che deve le sue proprietà fungicide e collaterali al gas (Metilisotiocianato di sodio) che si produce nel terreno a seguito della sua decomposizione. Esso viene impiegato nel trattamento preventivo del terreno per combattere i parassiti fungini agenti dei marciumi radicali, marciumi del colletto, avvizzimento delle piantine, quali: Fusarium, Verticillium, Phialophora, Pythium.
Il VAPAM svolge nel contempo altre interessanti azioni collaterali e cioè: azione erbicida, azione nematocida sulle forme libere, azione insetticida.
Il suo impiego è previsto per trattamenti a terreni destinati alla messa a dimora di colture ortive, floricole, industriali, come pure nei vivai in genere, serre, semenzai, fungaie.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Preparazione del terreno: per ottenere i migliori risultati e cioè una penetrazione e diffusione perfetta, il terreno deve essere ben sminuzzato e piuttosto umido.
Sostanza organica: il letame e la torba devono essere interrati un mese prima del trattamento.
Temperatura: al momento dell'applicazione la temperatura del terreno non deve essere inferiore a 14°C e non superiore ai 32°C.
Applicazione: il VAPAM deve essere distribuito in modo uniforme mediante un irroratore a spruzzo oppure a mezzo impianto di irrigazione a pioggia. Per piccole superfici può essere impiegato l'innaffiatoio. Immediatamente dopo, l'appezzamento trattato deve essere sottoposto ad una lenta irrigazione fino a quando il terreno risulterà bagnato ad una profondità di cm. 25-30. E' possibile distribuire il VAPAM anche con palo iniettore praticando i fori a distanza di cm 15-18 come massimo, ed effettuando subito dopo una irrigazione superficiale che raggiunga qualche cm. di profondità. Dieci, dodici giorni dopo il trattamento lavorare molto superficialmente il terreno per favorire la dispersione dei gas originatisi dal VAPAM. Indi attendere ancora 8-10 giorni prima di procedere alla semina od al trapianto.
Dosi d'impiego: la dose normale di VAPAM è di 950 l/ha. Tale dose dovrà essere aumentata fino a 1400-1800 quando si operi su terreni pesanti o interessati prevalentemente da verticillosi o fialoforosi.
Le dosi più elevate sono particolarmente consigliabili quando il trattamento avviene con temperatura del terreno sul minimo sopra indicato.

L'applicazione del prodotto e qualsiasi altra operazione successiva al trattamento, da eseguire prima della dispersione dal terreno dei gas da esso derivanti, devono essere eseguite da operatori muniti di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi, la pelle.
Impedire l'accesso alle zone trattate a persone ed animali domestici prima di 15 giorni.

Modalità di bonifica nel caso di perdite e spandimenti accidentali.
Il prodotto sviluppa gas tossico. In caso di sversamento in ambiente chiuso, dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi, la pelle.

COMPATIBILITÀ: Il VAPAM non è compatibile con altri fumiganti del suolo. Evitare pertanto la miscela e dovendo applicare anche nematocidi fare due applicazioni separate a distanza di 2-5 giorni.

INTERVALLO: Far trascorrere 20-30 giorni dal trattamento alla semina.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO È' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DA NON VENDERSI SFUSO
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
***ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO; NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE**
***LO STOCCAGGIO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE DEI CONTENITORI SUPERIORI A 200 LITRI DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO IN ZONA DOTATA DI BACINO DI CONTENIMENTO DI ADEGUATO VOLUME ATTO A RACCOGLIERE EVENTUALI FUORIUSCITE ACCIDENTALI DEL PRODOTTO**

AGFORM Ltd.

FITORIS

Diserbante selettivo per la lotta contro le infestanti del riso

Tipo di formulazione: microgranuli idrodispersibili

FITORIS Registrazione Ministero della Sanità n. 9479 13/01/1998

Contenuto: **1 – 5 – 10 – 20 Kg**

Partita n.

Composizione	
Propanil puro	g. 80
Coformulanti q.b.a	g 100

Pericoloso per l'ambiente

AGFORM **Ltd**

Maidenstone Heath

Blundell Lane, Bursledon, Southampton (Regno Unito)

Stabilimento di produzione:

AGFORM Ltd.

Hazel Road, Woolston, Southampton (Regno Unito)

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.

Terapia: sintomatica.

Avvertenze: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO

Erbicida selettivo in microgranuli idrodispersibili che agisce per contatto e anche per traslocazione, specifico per la coltura di RISO, indicato per la lotta contro il Giavone. Il prodotto controlla anche le seguenti malerbe: Digitaria, Setaria, Alisma, Bidens, Cyperus, Heleocharis, Polygonum spp., Sagittaria, Scirpus spp. purchè provenienti da seme o ai primi stadi di sviluppo. Per permettere una omogenea crescita del Giavone bisogna mantenere l'acqua bassa dopo la semina del riso; quindi effettuare una "asciutta" per circa 24-36 ore in concomitanza del trattamento.

Le dosi d'impiego sono le seguenti:

- Giavone di 1-2-3 foglie: Kg 4 per ettaro
- Giavone di 3-4 foglie: Kg 5-6 per ettaro
- Giavone dalla 4ª foglia fino all'accestimento: Kg 7-8 per ettaro

Nel caso che il giavone si sviluppi con temperature basse, il suo apparato fogliare risulterà ridotto rispetto al normale, e l'apparato radicale è invece robusto e profondo; un giavone sulla 3ª foglia, cresciuto con temperature basse è da considerare "vecchio" e paragonabile ad un giavone sulla 4ª-5ª foglia. Per cui con un giavone "vecchio" è bene aumentare le dosi come di seguito consigliato:

- Giavone di 1-2-3 foglie: Kg 5,5 per ettaro
- Giavone di 2-3-4 foglie: Kg 7 per ettaro

Impiegare dai 300 ai 700 litri/ha di acqua, con il quantitativo più alto negli interventi tardivi.

COMPATIBILITÀ

Non deve essere utilizzato in miscela con fertilizzanti o altri antiparassitari e non deve essere distribuito prima o dopo 5 giorni dall'impiego di questi prodotti in quanto il riso potrebbe avere danni da fitotossicità.

FITOTOSSICITÀ

Impiegando i dosaggi più elevati si potrebbero avere necrosi o ingiallimenti agli apici delle foglie di riso, che però nel giro di una settimana rientrano non provocando danni alla coltura. Trattare in giornate con assenza di vento per evitare che la nube irrorante giunga a contatto con qualunque altra coltura adiacente.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

FITOBIET

Diserbante selettivo della barbabietola da zucchero in formulazione microgranuli idrodispersibili

FITOBIET Registrazione Ministero della Sanità n. 9792 del 30/10/1998

Contenuto: **1 – 3 – 5 – 10 – 15 – 20 Kg**

Partita n.

Composizione	
Metamitron puro	g. 70
Coformulanti q.b.a	g 100

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

AGFORM **Ltd**
Maidenstone Heath
Blundell Lane, Bursledon
Southampton SO31 1AA (Regno Unito)

Stabilimento di produzione:
AGFORM Ltd.
Hazel Road, Woolston, Southampton (Regno Unito)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CAMPI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Prodotto diserbante in formulazione di microgranuli idrodispersibili, che agisce per assorbimento radicale e fogliare inibendo la fotosintesi clorofilliana. Viene indicato contro le seguenti infestanti: Alopecurus myosuroides, Avena spp., Amaranthus spp., Amaranthus retroflexus, Anagallis spp., Stachis annua, Diplotaxis spp., Myagrum spp., Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Echinochloa crus-galli, Fumaria officinalis, Galinsoga parviflora, Matricaria spp., Papaver rhoeas, Poa annua, Polygonum aviculare, Phalaris spp., Polygonum persicaria, Solanum nigrum, Stellaria media, Veronica spp., Polygonum convolvulus, ecc.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
? Pre-semina: Kg 3-5 per ettaro in 400 litri di acqua con interramento del prodotto e dose maggiore in terreni tendenzialmente pesanti.
? Pre-emergenza: Kg 4-6 per ettaro a seconda della natura del terreno.
? Post-emergenza: Kg 0,5-1 per ettaro miscelato con il p.a. Fendedifam in 200 litri di acqua e trattando con piantine di bietole nello stadio delle 2-4 foglie vere. Nel caso si debba intervenire in trattamenti più tardivi impiegare Kg 1,5-2 di prodotto in miscela con litri 2-3 di Fenmedifam e con l'aggiunta di litri 0,5-1 di olio bianco.

N.B. Si raccomanda di effettuare il trattamento con assenza di vento e con terreno ben lavorato e quindi sminuzzato.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DI 65/2003

Etichetta/foglio illustrativo

FITOBEN

(granuli idrodispersibili)

Diserbante selettivo di post-emergenza contro Giavoni ed altre infestanti della risaia

FITOBEN Registrazione Ministero della Salute n. 11121 del 17/12/2001

Contenuto: **100-200-400-500 g 1-5 Kg**

Partita n.

Composizione	
Bensulfuron metile	g. 60
Coformulanti q.b.a	g 100

AGFORM **Ltd**
Maidenstone Heath
Blundell Lane, Bursledon
Southampton SO31 1AA (Regno Unito)

IRRITANTE

Stabilimento di produzione:
AGFORM Ltd.
Hazel Road, Woolston, Southampton (Regno Unito)

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE DEL FORMULATO
FITOBEN è efficace verso un gran numero di specie infestanti della risaia tra le quali si comprendono: Alisma plantago acquatica, Butomus umbellatus, Heleocharis spp., Marsilea quadrifolia, Potamogeton spp., Sagittaria spp., Sparganium erectum, Typha angustifolia, Ammania coccinea, Bidens frondosa, Cyperus difformis, Cyperus esculentus, Cyperus serotinus, Heteranthera rotundifolia, Leersia oryzoides (da seme), Alisma lanceolata, Scirpus maritimus, Scirpus mucronatus, Lindernia spp. e un buon controllo iniziale di Heteranthera reniformis.
Per la maggior parte delle infestanti, tuttavia, l'efficacia ottimale si ha allorché queste sono nella fase giovanile e in attiva crescita.

DOSI D'IMPIEGO
Di norma la dose d'impiego è di 100 g/ha. Tuttavia, specie in miscela con altri prodotti e nei trattamenti di pre-semina, essa può ridursi a 50-60 g/ha.

MODALITÀ ED EPOCHE D'IMPIEGO
Il FITOBEN si impiega disciolto in acqua mediante uniforme distribuzione della poltiglia ottenuta sulla superficie dell'acqua o sul terreno utilizzando le normali attrezzature per il diserbo. Il trattamento può essere eseguito prima della semina o dopo la semina del riso su risaia sommersa o su risaia asciutta. Dopo la semina l'epoca migliore si ha tra i 20 e i 40 giorni dopo che il riso ha raggiunto lo stadio vegetativo di 1-2 foglie e fino alla fine dell'accestimento.

Trattamenti di pre-semina
Nei trattamenti di pre-semina il FITOBEN viene per lo più addizionato ad altri diserbanti. In questo caso la dose di impiego del FITOBEN è ridotta rispetto alla norma e varia, a seconda del grado di presenza delle infestanti, dai 50 ai 60 g/ha.

Trattamenti dopo la semina
a) risaia sommersa
Il FITOBEN deve essere distribuito, con infestanti in fase di pre-emergenza o di post-emergenza precoce, con un livello d'acqua non superiore agli 8-10 cm. dopo aver chiuso le bocchette di alimentazione; dopo il trattamento non eseguire manovre d'acqua per almeno 5 giorni. Nei terreni che tendono ad asciugarsi, lasciare asciugare la risaia prima di introdurre nuova acqua.
Il trattamento può essere eseguito in combinazione con prodotti specifici contro il giavone o in sequenza a questi:

trattamento unico con prodotti in miscela	**FITOBEN 100 g/ha + Giavonicida**	
trattamenti in sequenza	**1° intervento** **2° intervento**	**Giavonicida** **FITOBEN 100 g/ha**

b) risaia in asciutta
Per il controllo contemporaneo dei giavoni e delle altre infestanti non graminacee della risaia il FITOBEN può essere addizionato con il propanil o con il quinclorac alle dosi standard. In caso di doppio intervento con propanil, impiegare il FITOBEN nella prima applicazione.
Ristabilire il livello dell'acqua nella camera 2-4 giorni dopo il trattamento.

Preparazione della poltiglia: Quando il FITOBEN si impiega da solo è sufficiente sciogliere direttamente il FITOBEN nel serbatoio già riempito per metà e poi aggiungere altra acqua fino a portare a volume, mantenendo la miscela in costante agitazione. Quando il FITOBEN si impiega in miscela con altri prodotti è necessario prima disciogliere il FITOBEN nel serbatoio riempito a metà e poi aggiungere l'altro prodotto portando a volume con l'agitatore in funzione.
Avvertenza: non applicare il FITOBEN su colture sotto stress per anormali condizioni climatiche, malattie, insetti o eventualmente già danneggiate da altri erbicidi.

COMPATIBILITÀ
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare di colpire direttamente o tramite deriva colture o piante arboree. Non lavare l'attrezzatura vicino a colture o piante sensibili.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DT 65/2003

Etichetta formato ridotto

FITOBEN

(granuli idrodispersibili)

Diserbante selettivo di post-emergenza contro Giavoni ed altre infestanti della risaia

FITOBEN Registrazione Ministero della Salute n. 11121 del 17/12/2001

Contenuto: **100 g**

Partita n.

Composizione	
Bensulfuron metile	g. 60
Coformulanti q.b.a	g 100

AGFORM **Ltd**

Maidenstone Heath
Blundell Lane, Bursledon
Southampton SO31 1AA (Regno Unito)

IRRITANTE

Stabilimento di produzione:
AGFORM Ltd.
Hazel Road, Woolston, Southampton (Regno Unito)

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

FITOSOL375

(granuli idrodispersibili)

Diserbante selettivo di post-emergenza contro Giavoni ed altre infestanti della risaia

FITOSOL 375 Registrazione Ministero della Sanità n. 11122 del 17.12.2001

Contenuto: **5-10-20-50 Kg**

Partita n.

Composizione	
Propanil puro	g. 75
Bensulfuron metile puro	g. 0,375
Coformulanti* q.b.a	g 100

***Contiene Bensulfuron metile: può provocare una reazione allergica**

AGFORM Ltd.
Maidenstone Heath
Blundell Lane, Bursledon - Southampton (Regno Unito)

Stabilimento di produzione:
Agform Ltd.
Hazel Road, Woolston, Southampton (Regno Unito)

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione di due sostanze attive, propanile 75% e bensulfuron 0,375%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.

Propanile: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.

Bensulfuron metile: ----

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE DEL FORMULATO

FITOSOL 375 è un diserbante specifico e selettivo per il riso, con un ampio spettro d'azione sulla maggior parte delle infestanti presenti in risaia. La sua efficacia deriva dalla combinazione dell'azione di contatto del propanile e di quella di traslocazione del bensulfuron.Le principali infestanti controllate sono: Giavone (Echinochloa crus-galli), Quadrettone (Scirpus mucronatus), Cipollino (Scirpus maritimus), Cucchiaio (Alisma spp.), Porretta (Heleocharis spp.), Heteranthera limosa e H. reniformis (se applicato nei primi stadi di sviluppo), Fiorone (Butomus umbellatus).

DOSI D'IMPIEGO

Da 4 a 10 Kg/Ha a seconda dello stadio vegetativo del riso (3a/4a foglia) e dei Giavoni (2a/4a foglia).

MODALITÀ ED EPOCHE D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega in post-emergenza precoce delle infestanti quando queste sono nei primi stadi vegetativi e in fase di attiva crescita, su risaia in asciutta ed in assenza di rugiada. Il flusso idrico ed il livello d'acqua deve essere ristabilito 24/48 ore dopo il trattamento erbicida. Il prodotto può essere versato (lentamente) direttamente nella botte irroratrice con il serbatoio metà pieno, quindi con l'agitatore in funzione riempire con acqua fino a raggiungere il volume prestabilito. Si consiglia di aggiungere coadiuvanti ed adesivanti solo alla fine dell'operazione.

FITOTOSSICITÀ

Non applicare il prodotto su coltura sotto stress per anormali condizioni climatiche, malattie, fitopatie, insetti o eventualmente già danneggiate da altri erbicidi. Il prodotto può essere fitotossico per altre colture non indicate in etichetta, quindi si raccomanda di fare molta attenzione all'effetto deriva su colture limitrofe (erbacee ed arboree).

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non deve essere usato in miscela con fertilizzanti o con altri prodotti fitosanitari, inoltre, non applicare il prodotto se non dopo 30 giorni da trattamenti insetticidi, in quanto il riso potrebbe subire danni da fitotossicità. Il FITOSOL 375 risulta compatibile con i bagnanti adesivi che consentono di migliorare l'attività di contatto.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici e bestiame.

Avvertenza: Evitare l'accesso di uomini e animali nelle 24 ore successive al trattamento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

PROBEN

(granuli idrodispersibili)

Diserbante selettivo di post-emergenza contro Giavoni ed altre infestanti della risaia

PROBEN Registrazione Ministero della Salute n. 12011 del 27/02/2004

Contenuto: **5 - 10 - 20 - 50 Kg**

Partita n.

Composizione	
Propanil	g. 75
Bensulfuron metile	g. 0,375
Coformulanti q.b.a	g. 100

***Contiene Bensulfuron metile: può provocare una reazione allergica**

Pericoloso per l'ambiente

AGFORM **Ltd**
Maidenstone Heath
Blundell Lane, Bursledon
Southampton SO31 1AA (Regno Unito)

Distribuito da: AGROWIN BIOSCIENCES Srl – 24121 Bergamo

Stabilimento di produzione:
AGFORM Ltd.
Hazel Road, Woolston, Southampton (Regno Unito)

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione di due sostanze attive, propanile 75% e bensulfuron metile 0,375%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
Propanile: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Bensulfuron metile: ----
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE DEL FORMULATO

PROBEN è un diserbante specifico e selettivo per il riso, con un ampio spettro d'azione sulla maggior parte delle infestanti presenti in risaia. La sua efficacia deriva dalla combinazione dell'azione di contatto del propanile e di quella di traslocazione del bensulfuron.
Le principali infestanti controllate sono: Giavone (Echinochloa crus-galli), Quadrettone (Schoenoplectus mucronatus), Cipollino (Bolboschoenus maritimus), Cucchiaio da seme (Alisma spp.), Porretta (Heleocharis spp.), Heteranthera limosa e H. reniformis (se applicato nei primi stadi di sviluppo), Fiorone (Butomus umbellatus).

DOSI D'IMPIEGO
Da 4 a 10 Kg/Ha a seconda dello stadio vegetativo del riso (3a/4a foglia) e dei Giavoni (2a/4a foglia). Impiegare la dose stabilita con volumi di acqua di 300-400 l/ha.

MODALITÀ ED EPOCHE D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega in post-emergenza precoce delle infestanti quando queste sono nei primi stadi vegetativi e in fase di attiva crescita, su risaia in asciutta ed in assenza di rugiada. Il flusso idrico ed il livello d'acqua deve essere ristabilito 24/48 ore dopo il trattamento erbicida.
Il prodotto può essere versato (lentamente) direttamente nella botte irroratrice con il serbatoio metà pieno, quindi con l'agitatore in funzione riempire con acqua fino a raggiungere il volume prestabilito. Si consiglia di aggiungere coadiuvanti ed adesivanti solo alla fine dell'operazione.

FITOTOSSICITÀ
Non applicare il prodotto su coltura sotto stress per anormali condizioni climatiche, malattie, fitopatie, insetti o eventualmente già danneggiate da altri erbicidi. Il prodotto può essere fitotossico per altre colture non indicate in etichetta, quindi si raccomanda di fare molta attenzione all'effetto deriva su colture limitrofe (erbacee ed arboree).

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non deve essere usato in miscela con fertilizzanti o con altri prodotti fitosanitari, inoltre, non applicare il prodotto se non dopo 30 giorni da trattamenti insetticidi, in quanto il riso potrebbe subire danni da fitotossicità. Il PROBEN risulta compatibile con i bagnanti adesivi che consentono di migliorare l'attività di contatto.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici e bestiame.
Avvertenza: Evitare l'accesso di uomini e animali nelle 24 ore successive al trattamento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DT 65/2003

CROMTON CHEMICAL S.r.l.

ACARION EW

Acaricida formulato come emulsione acquosa

ACARION EW Registrazione del Ministero della Salute n. 9418 del 05/11/1997

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Propargite pura g 57 (= 570 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Titolare dell'autorizzazione
CROMPTON CHEMICAL Srl
VIA PICO DELLA MIRANDOLA, 8 - 04013 - LATINA SCALO (LT)

Distribuito da: **DU PONT DE NEMOURS ITALIANA Srl** - Via Pontaccio, 10 – Milano

Stabilimenti di produzione:
Uniroyal Chemical Co., Inc. - Naugatuck, Connecticut (USA)
Crompton Chemical Srl - Via Pico della Mirandola, 8 - Latina Scalo (LT)

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

Partita n.:
Contenuto netto: Litri 0,150-0,200-1-5-10-20

FRASI di RISCHIO: Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere, consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Obbligo dell'uso di guanti e tuta di protezione. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche

L'ACARION EW è un acaricida attivo contro le popolazioni di acari resistenti, da impiegare su **piante da frutto (pesco, melo, limone)**, sulla **vite**, sugli **ortaggi (melanzana, peperone, melone)**, su **pomodoro e soia.**
Agisce per contatto sulle larve e sugli adulti delle specie di acari vegetali: Tetranichidi (ragnetti rossi, gialli, bruni, rugginosi), Eriofidi, Tarsonemidi.
L'ACARION EW possiede un'attività iniziale ed una persistenza di azione tale da uccidere anche le giovani larve nate dopo il trattamento. Dopo il trattamento gli acari interrompono l'assorbimento della linfa delle piante e muoiono dopo 1-4 giorni dall'irrorazione in funzione della temperatura. In condizione di alte temperature dove il prodotto esprime la sua maggiore efficacia, gli acari muoiono dopo 1-2 giorni dal trattamento. In presenza di basse temperature invece il prodotto è lento ad agire e gli acari muoiono dopo 3-4 giorni dall'irrorazione.
L'impiego dell'ACARION EW dà i migliori risultati quando le piante sono completamente bagnate fino allo sgocciolamento.

Modalità e dosi di impiego

L'ACARION EW viene impiegato alla dose di 80-100 ml/hl nei trattamenti ad alto volume (10-15 hl di acqua per ettaro). La dose minore si impiega nei casi di leggera infestazione di acari che sono presenti soprattutto nel periodo primaverile e nei confronti di popolazioni di acari sensibili; la dose maggiore si irrora nei confronti di acari molto resistenti e generalmente in estate in presenza di attacchi massicci.
Quando le infestazioni sono gravi è consigliato un secondo trattamento alla distanza di 10-15 giorni dal primo.
L'ACARION EW può inoltre essere mescolato con acaricidi-ovicidi per avere un risultato completo anche sulle uova.

Compatibilità

L'ACARION EW è compatibile con la generalità degli antiparassitari. Incompatibile è invece con i prodotti fortemente alcalini come la poltiglia bordolese, la calce e il solfuro di calcio. In questo caso diminuisce l'efficacia acaricida dell'ACARION EW.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Non applicare su vite prima della fioritura.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta della soia e 15 giorni prima della raccolta di tutte le altre colture.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL n. 65/2003

ALAR™ 85

Fitoregolatore in polvere solubile per piante floreali e ornamentali.

ALAR 85 Reg. Ministero della Sanità N. 8479 del 30/03/1994

IRRITANTE

Composizione:
Daminozide puro g. 85
Coformulanti q.b.a g.100

Partita n.

Contenuto: 200 - 500 g 1-5 Kg

CROMPTON CHEMICAL Srl
Via Pico della Mirandola, 8
04013 Latina Scalo (LT)

Officine di produzione:
UNIROYAL CHEMICAL Co. Inc.
Naugatuck, Connecticut (USA)
CROMPTON EUROPE B.V.
Ankerweg. 18 – 1041 AT Amsterdam (Olanda)

Distribuito da: **AGRIMPORT SpA** – Via Piani, 1 – 39100 Bolzano
CASTALDO SpA sede legale: Via G. Porzio – Is. G1 – 80143 Napoli
sede amministrativa: Via Nazionale delle Puglie snc - loc. Salice – 80021 Afragola (NA)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche del prodotto

L' **Alar 85** è un fitoregolatore in polvere solubile che viene assorbito dalle foglie entro 12 ore dall'applicazione e traslocato nei tessuti della pianta. La sua attività si evidenzia dopo 2-3 settimane dall'applicazione ed è caratterizzata da una spiccata attività brachitizzante, permette di ottenere piante più compatte con steli più robusti e foglie più verdi e migliora le caratteristiche qualitative dei fiori nelle colture ornamentali e floricole. L'Alar 85 va applicato solo su piante sane e vigorose. Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. I trattamenti devono essere eseguiti in condizioni tali da garantire il massimo assorbimento da parte delle foglie.

Modalità e dosi d'impiego

Crisantemo: 2-3 trattamenti alla dose di 150 g/hl eseguendo il primo trattamento circa due settimane dopo la cimatura e ripetendo i trattamenti a distanza di 2-3 settimane.
Poinsettia: 2-3 trattamenti alla dose di 200-250 g/hl eseguendo il primo trattamento quando le piante sono alte 5-8 cm e ripetendo i trattamenti a distanza di 2-3 settimane.
Petunia: 1-2 trattamenti alla dose di 300 g/hl eseguendo il primo trattamento a 2 settimane dall'invasatura.
Azalea: 1-2 trattamenti alla dose di 100-150 g/hl eseguendo il primo trattamento quando lo sviluppo dei nuovi getti è di 2-5 cm e ripetendo il trattamento a 2-3 settimane.
Ortensia: 1-2 trattamenti alla dose di 200 g/hl eseguendo il primo trattamento quando lo sviluppo dei nuovi getti è di 4-8 cm e ripetendo eventualmente dopo circa 2-3 settimane.
Piante ornamentali: 1-2 trattamenti alla dose di 250 g/hl per ottenere piante più compatte con steli più robusti e foglie di un verde più intenso.

Il quantitativo di soluzione deve considerarsi per tutte le colture di 400-600 litri per ettaro.

Compatibilità

L'**Alar 85** non è compatibile con gli antiparassitari e con i fertilizzanti fogliari. Pertanto va irrorato da solo.

Avvertenze:
La sostanza non è facilmente degradabile.
Per l'impiego in serra si deve usare idonea maschera protettiva.
Tempo di rientro 24 ore.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

™ Marchio registrato della CHEMTURA CORPORATION

DL n.65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CLEAN SOIL G

GRANULI - Erbicida per il diserbo dei vigneti, frutteti (melo), oliveti, piante ornamentali, argini di risaie, sedi ferroviarie, argini ed alvei di canali, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, campi da golf.

Registrazione del Ministero della Salute n. 12397 del 24/12/2004

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Diclobenil puro	g	6,75
Coformulanti ed inerti q.b.a	g	100

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
CROMPTON CHEMICAL S.r.l.
Via Pico della Mirandola, 8 - Latina Scalo (LT)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

distribuito da:

OFFICINA DI PRODUZIONE
CROMPTON EUROPE B.V. - Amsterdam (Olanda)

Contenuto
g 100 - g 200 - g 300 - g 500 kg 1 - kg 5 - kg 10 - kg 25- kg 50 Partita n.

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
CLEAN SOIL G è un erbicida efficace contro la maggior parte delle erbe infestanti annuali, biennali e perenni, anche di difficile controllo come Equiseto (*Equisetum spp.*), Stoppione (*Cirsium arvense*), Romice (Rumex spp.), Soffione (*Taraxacum officinale*).
La sostanza attiva del CLEAN SOIL G viene assorbita dalle radici delle infestanti, in pre-emergenza CLEAN SOIL G agisce sulle infestanti germinanti e sui rizomi. All'inizio della vegetazione le malerbe sono più sensibili all'azione del CLEAN SOIL G; è inoltre molto importante distribuire **tempestivamente** il prodotto su terreno umido o in periodi di pioggia.
CLEAN SOIL G non agisce per via fogliare e perciò non causa alcun danno alle colture nemmeno quando investe gli organi verdi (foglie, rametti).
Per la vite è consigliabile tuttavia evitare di colpire i germogli. Nei vigneti con sistema di allevamento molto basso (tipo alberello, Sylvoz), è pertanto necessario trattare prima che le gemme si gonfino. CLEAN SOIL G può essere usato tutto l'anno in trattamenti di pre o post-emergenza, al più tardi all'inizio dello sviluppo delle malerbe.
L'epoca più favorevole per il diserbo con CLEAN SOIL G è però dopo la raccolta e dopo la vendemmia e in primavera, prima o subito dopo l'inizio della vegetazione.
Evitare accumuli di prodotto in vicinanza dei fusti delle piante da frutto e dei ceppi delle viti. Sono particolarmente indicati i trattamenti localizzati in forma di strisce o di aiuole.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Campi e dosi d'impiego

1. **Diserbo selettivo**

VITE (dopo il 4° anno di impianto)		
su terreni leggeri e sabbiosi	80 - 100	kg/ha
su terreni pesanti e argillosi	100 - 120	kg/ha
su terreni ricchi di humus	120	kg/ha
MELO (su franco, dopo il 5° anno di impianto)		
su terreni leggeri e sabbiosi	80 - 100	kg/ha
su terreni pesanti e argillosi	100	kg/ha
su terreni ricchi di humus	120	kg/ha
OLIVO (dopo il 5° anno di impianto)		
su terreni leggeri	80 - 100	kg/ha
su terreni pesanti	100 - 120	kg/ha

2. **Diserbo totale**
   Diserbo dei bordi stradali, piazze da gioco, aree di fabbriche e depositi, sedi ferroviarie, spartitraffico di autostrade, argini di canali di irrigazione e drenaggio, ripe.
   Dose d'impiego:
   80 - 120 kg/ha, a seconda della composizione botanica delle infestanti e del loro sviluppo.
3. **Diserbo localizzato**
   Lotta contro cespi di Romice (*Rumex spp.*), Tussilago (*Tussilago fanfara*). Consigliamo di distribuire 0,5 g di CLEAN SOIL G nella parte centrale del ceppo. Apposite attrezzature di distribuzione facilitano il lavoro.
4. **Diserbo delle erbe acquatiche**
   L'impiego di CLEAN SOIL G è consigliabile anche per l'eliminazione delle erbe acquatiche, indifferentemente se natanti o sommerse.
   Con CLEAN SOIL G si possono trattare anche i canali di bonifica. Non si consiglia l'applicazione incondizionata del CLEAN SOIL G nei canali di irrigazione. CLEAN SOIL G è praticamente innocuo per i pesci, non altera il contenuto di ossigeno ed il pH dell'acqua.
   Dose d'impiego: 80 - 120 kg/ha a seconda della profondità dell'acqua.
5. **Diserbo selettivo delle piante ornamentali**
   Cespugli ornamentali : 4 - 6 g/m^2
   Fino al secondo anno di impianto prestare molta attenzione all'applicazione. Le aiuole di rose vanno diserbate con CLEAN SOIL G solo prima della ripresa vegetativa oppure dopo lo sviluppo completo dell'apparato fogliare.
6. **Diserbo totale di argini di risaie, sedi ferroviarie, argini ed alvei di canali, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, campi da golf**
   Contro erbe a riproduzione annuale, è sufficiente una dose di 6 - 8 g/m^2. In presenza di una flora infestante mista, con malerbe a riproduzione mediante radici e rizomi, la dose d'impiego non deve essere inferiore a 12 g/m^2.

La natura del terreno e l'andamento climatico incidono in modo determinante sui risultati ottenibili. È indispensabile al riguardo, distribuire CLEAN SOIL G in periodi di pioggia o almeno limitarne l'uso su terreni umidi. Risulta importante, inoltre, distribuire il prodotto **uniformemente** e con la massima **regolarità** sulla superficie da trattare. Da non applicare su terreni sabbiosi.

COMPATIBILITÀ
Impiegare CLEAN SOIL G da solo.

Sospendere i trattamenti su vite, melo e olivo 60 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

DL 65/2003

ETICHETTA RIDOTTA

CLEAN SOIL G

GRANULI - Erbicida per il diserbo dei vigneti, frutteti (melo), oliveti, piante ornamentali, argini di risaie, sedi ferroviarie, argini ed alvei di canali, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, campi da golf.

Registrazione del Ministero della Salute n. 12397 del 24/12/2004

COMPOSIZIONE 100 grammi di prodotto contengono: Diclobenil puro g 6,75 Coformulanti ed inerti q.b.a g 100	TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE **CROMPTON CHEMICAL Srl** Via Pico della Mirandola, 8 Latina Scalo (LT) distribuito da:	**ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA**

Contenuto **g 100** OFFICINA DI PRODUZIONE: **CROMPTON EUROPE B.V. - Amsterdam (Olanda)** Partita n.

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

FAZOR

FITOREGOLATORE IN GRANULI SOLUBILI PER IL CONTROLLO DEI GERMOGLI DI CIPOLLA ED AGLIO

Reg. Ministero della Salute N. 11258 del 04/04/2002

Composizione	
Idrazide maleica pura	**g. 60**
(contenente meno di 1 mg/Kg di idrazina)	
Coformulanti	**q.b.a g.100**

Partita n.

Contenuto: **0,5 - 1 – 5 - 15 Kg**.

CROMPTON CHEMICAL SRL
Via Pico della Mirandola, 8
Latina Scalo (LT)

Officina di produzione:
GROTECH FORMULATIONS Ltd.
Goole, East Yorkshire - UK

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Distribuito da:
AGRIMPORT SpA
Via Piani, 1 – 39100 Bolzano

<u>CONSIGLI DI PRUDENZA</u>: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

<u>NORME PRECAUZIONALI</u>: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

<u>INFORMAZIONI PER IL MEDICO</u>
Sintomi: irritante per cute e mucose, tremori, convulsioni fino al coma.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

<u>Caratteristiche</u>
Il **FAZOR** viene assorbito dalle piante per via fogliare e traslocato in ogni suo organo per via linfatica. Nei germogli, inibisce principalmente i processi respiratori delle cellule, riduce le attività enzimatiche, rallenta la moltiplicazione cellulare. La sommatoria di queste complesse azioni impedisce lo sviluppo dei germogli. Nella cipolla e nell'aglio il **FAZOR** inibisce la germinazione durante la conservazione in magazzino ne, evita inoltre le perdite dovute alla disidratazione.

<u>CIPOLLE ED AGLIO</u>
<u>Dosi e modalità d'impiego</u>
Cipolla: 2,8-4 Kg in 500-600 litri di acqua per ettaro.
Aglio: 2,8-4 Kg in 500-600 litri di acqua per ettaro.
Assicurare una buona copertura delle foglie.
Il rispetto dei tempi di applicazione è essenziale per ottenere i migliori risultati.
<u>Nelle cipolle</u>: applicare **FAZOR** quando i bulbi sono pienamente maturi, nello stadio di inizio piegamento delle foglie. Questo stadio si individua quando il 10% delle foglie sono piegate, ma sono ancora tutte verdi. Questo stadio si raggiunge da circa 2 settimane a 10 giorni prima della raccolta.
<u>Nell'aglio</u>: **FAZOR** si applica allo stadio che precede l'appassimento, quando tutte le foglie sono ancora verdi, appena prima il viraggio al colore giallo che si verifica da 2 settimane a 10 giorni prima della raccolta.
Per le cipolle e l'aglio la presenza di foglie verdi è essenziale per consentire l'assorbimento del **FAZOR** e la sua traslocazione. **FAZOR** non ha effetto se la sua applicazione è troppo tardiva, anche sulle cipolle quando le piante hanno 3 foglie verdi e tutte le foglie sono piegate. Su aglio e cipolla si raccomanda di associare l'impiego di **FAZOR** alla scelta di varietà vegetali con buone caratteristiche di conservabilità.
Non applicare su varietà a bassa capacità di conservazione.
Apparirà una diminuzione di efficacia se piove o se si irrigheranno le colture entro 24 ore dal trattamento.
Per consentire il migliore assorbimento e traslocazione del **FAZOR**, non trattare in condizioni di carenza idrica, quando la temperatura supera i 26°C o quando la coltura è sotto condizioni di stress da malattie fungine o da attacchi di insetti. Sebbene il **FAZOR** non sia volatile bisogna assolutamente evitare la deriva del prodotto sulle colture vicine.
Su aglio e cipolla evitare di applicare il prodotto troppo anticipatamente. Se l'applicazione è effettuata prima di due settimane dalla maturazione potrebbero svilupparsi dei bulbi spugnosi.
<u>Compatibilità</u>: Il FAZOR non è compatibile con gli antiparassitari e con i fertilizzanti fogliari. Pertanto va irrorato da solo.

<u>Fitotossicità</u>: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

<u>Rischi di nocività</u>: Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici e bestiame.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

D.L. n.65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FORTUNE® G

Erbicida per il diserbo dei vigneti, frutteti (melo), oliveti, piante ornamentali, aree industriali, campi sportivi, ripe e bordi stradali.

GRANULARE

Registrazione del Ministero della Salute n. 12398 del 24/12/2004

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Diclobenil puro g. 6,75
Coformulanti, q.b. a g.100

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
CROMPTON CHEMICAL Srl
Via Pico della Mirandola, 8
04013 Latina Scalo (LT)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

distribuito da: ....

OFFICINA DI PRODUZIONE
CROMPTON EUROPE B.V. - Amsterdam (Olanda)

Contenuto: **g 100-200-300-500 kg 1-5-10-25-50**

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
FORTUNE® G è un erbicida efficace contro la maggior parte delle erbe infestanti annuali, biennali e perenni, anche di difficile controllo come Equiseto (*Equisetum spp.*), Stoppione (*Cirsium arvense*), Romice (*Rumex spp.*), Soffione (*Taraxacum officinale*).
La sostanza attiva del FORTUNE® G viene assorbita dalle radici delle infestanti, in pre-emergenza il FORTUNE® G agisce sulle infestanti germinanti e sui rizomi. All'inizio della vegetazione le malerbe sono più sensibili all'azione del FORTUNE® G; è inoltre molto importante distribuire **tempestivamente** il prodotto su terreno umido o in periodi di pioggia.
FORTUNE® G non agisce per via fogliare e perciò non causa alcun danno alle colture nemmeno quando investe gli organi verdi (foglie, rametti).
Per la vite è consigliabile tuttavia evitare di colpire i germogli. Nei vigneti con sistema di allevamento molto basso (tipo alberello, Sylvoz), è pertanto necessario trattare prima che le gemme si gonfino. FORTUNE® G può essere usato tutto l'anno in trattamenti di pre o post-emergenza, al più tardi all'inizio dello sviluppo delle malerbe. L'epoca più favorevole per il diserbo con FORTUNE® G è però dopo la raccolta e dopo la vendemmia e in primavera, prima o subito dopo l'inizio della vegetazione.
Evitare accumuli di prodotto in vicinanza dei fusti delle piante da frutto e dei ceppi delle viti. Sono particolarmente indicati i trattamenti localizzati in forma di strisce o di aiuole.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Campi e dosi d'impiego

1. **Diserbo selettivo**

VITE (dopo il 4° anno di impianto)		
su terreni leggeri e sabbiosi	80 - 100	kg/ha
su terreni pesanti e argillosi	100 - 120	kg/ha
su terreni ricchi di humus	120	kg/ha
MELO (su franco, dopo il 5° anno di impianto)		
su terreni leggeri e sabbiosi	80 - 100	kg/ha
su terreni pesanti e argillosi	100	kg/ha
su terreni ricchi di humus	120	kg/ha
OLIVO (dopo il 5° anno di impianto)		
su terreni leggeri	80 - 100	kg/ha
su terreni pesanti	100 - 120	kg/ha

2. **Diserbo totale**
Diserbo dei bordi stradali, piazze da gioco, aree di fabbriche e depositi, sedi ferroviarie, spartitraffico di autostrade, argini di canali di irrigazione e drenaggio, ripe.
Dose d'impiego:
80 - 120 kg/ha, a seconda della composizione botanica delle infestanti e del loro sviluppo.

3. **Diserbo localizzato**
Lotta contro cespi di Romice (*Rumex spp.*), Tussilago (*Tussilago farfara*). Consigliamo di distribuire 0,5 g di FORTUNE® G nella parte centrale del ceppo. Apposite attrezzature di distribuzione facilitano il lavoro.

4. **Diserbo selettivo delle piante ornamentali**
Cespugli ornamentali : 4 - 6 g/m^2
Fino al secondo anno di impianto prestare molta attenzione all'applicazione. Le aiuole di rose vanno diserbate con FORTUNE® G solo prima della ripresa vegetativa oppure dopo lo sviluppo completo dell'apparato fogliare.

5. **Diserbo totale di parchi, giardini, viali e sentieri.**
Contro erbe a riproduzione annuale, è sufficiente una dose di 6 - 8 g/m^2. In presenza di una flora infestante mista, con malerbe a riproduzione mediante radici e rizomi, la dose d'impiego non deve essere inferiore a 12 g/m^2.
Impiegare la sera in assenza di pubblico.

La natura del terreno e l'andamento climatico incidono in modo determinante sui risultati ottenibili. E' indispensabile al riguardo, distribuire FORTUNE® G in periodi di pioggia o almeno limitarne l'uso su terreni umidi. Risulta importante, inoltre, distribuire il prodotto **uniformemente** e con la massima **regolarità** sulla superficie da trattare. Da non applicare su terreni sabbiosi.

COMPATIBILITÀ
Impiegare FORTUNE® G da solo.

Sospendere i trattamenti su vite, melo e olivo 60 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

DL 65/2003

ETICHETTA RIDOTTA

FORTUNE® G

Erbicida per il diserbo dei vigneti, frutteti (melo), oliveti, piante ornamentali, aree industriali, campi sportivi, ripe e bordi stradali.

GRANULARE

Registrazione del Ministero della Salute n. 12398 del 24/12/2004

Composizione 100 grammi di prodotto contengono:		TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE	**ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA**
Diclobenil puro	g. 6,75	**CROMPTON CHEMICAL Srl** Via Pico della Mirandola, 8	
Coformulanti, q.b. a	g.100	04013 Latina Scalo (LT)	

distribuito da: ………………………

OFFICINA DI PRODUZIONE: CROMPTON EUROPE B.V. - Amsterdam (Olanda) Contenuto: **g 100** Partita n.:

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

HERBARON® G

Erbicida per il diserbo dei vigneti, frutteti (melo), oliveti, piante ornamentali, aree industriali, campi sportivi, ripe e bordi stradali.

GRANULARE

Registrazione del Ministero della Salute n. 11915 del 19/12/2003

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Diclobenil puro g 6,75
Coformulanti, q.b. a 100 grammi

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
CROMPTON CHEMICAL Srl
Via Pico della Mirandola, 8
04013 Latina Scalo (LT)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

distribuito da: **COMPO Agricoltura SpA** – Via Marconato, 8 – Cesano Maderno (MI)

OFFICINA DI PRODUZIONE
CROMPTON EUROPE B.V. - Amsterdam (Olanda)

Contenuto: **g 100-200-300-500 kg 1-5-10-25-50**

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
HERBARON® G è un erbicida efficace contro la maggior parte delle erbe infestanti annuali, biennali e perenni, anche di difficile controllo come Equiseto (*Equisetum spp.*), Stoppione (*Cirsium arvense*), Romice (*Rumex spp.*), Soffione (*Taraxacum officinale*).
La sostanza attiva dell'HERBARON® G viene assorbita dalle radici delle infestanti, in pre-emergenza l'HERBARON® G agisce sulle infestanti germinanti e sui rizomi. All'inizio della vegetazione le malerbe sono più sensibili all'azione dell'HERBARON® G; è inoltre molto importante distribuire **tempestivamente** il prodotto su terreno umido o in periodi di pioggia.
HERBARON® G non agisce per via fogliare e perciò non causa alcun danno alle colture nemmeno quando investe gli organi verdi (foglie, rametti).
Per la vite è consigliabile tuttavia evitare di colpire i germogli. Nei vigneti con sistema di allevamento molto basso (tipo alberello, Sylvoz), è pertanto necessario trattare prima che le gemme si gonfino. HERBARON® G può essere usato tutto l'anno in trattamenti di pre o post-emergenza, al più tardi all'inizio dello sviluppo delle malerbe. L'epoca più favorevole per il diserbo con HERBARON® G è però dopo la raccolta e dopo la vendemmia e in primavera, prima o subito dopo l'inizio della vegetazione.
Evitare accumuli di prodotto in vicinanza dei fusti delle piante da frutto e dei ceppi delle viti. Sono particolarmente indicati i trattamenti localizzati in forma di strisce o di aiuole.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Campi e dosi d'impiego

1. **Diserbo selettivo**

VITE (dopo il 4° anno di impianto)		
su terreni leggeri e sabbiosi	80 - 100	kg/ha
su terreni pesanti e argillosi	100 - 120	kg/ha
su terreni ricchi di humus	120	kg/ha
MELO (su franco, dopo il 5° anno di impianto)		
su terreni leggeri e sabbiosi	80 - 100	kg/ha
su terreni pesanti e argillosi	100	kg/ha
su terreni ricchi di humus	120	kg/ha
OLIVO (dopo il 5° anno di impianto)		
su terreni leggeri	80 - 100	kg/ha
su terreni pesanti	100 - 120	kg/ha

2. **Diserbo totale**
   Diserbo dei bordi stradali, piazze da gioco, aree di fabbriche e depositi, sedi ferroviarie, spartitraffico di autostrade, argini di canali di irrigazione e drenaggio, ripe.
   Dose d'impiego:
   80 - 120 kg/ha, a seconda della composizione botanica delle infestanti e del loro sviluppo.
3. **Diserbo localizzato**
   Lotta contro cespi di Romice (*Rumex spp.*), Tussilago (*Tussilago farfara*). Consigliamo di distribuire 0,5 g di HERBARON® G nella parte centrale del ceppo. Apposite attrezzature di distribuzione facilitano il lavoro.
4. **Diserbo selettivo delle piante ornamentali**
   Cespugli ornamentali : 4 - 6 g/m^2
   Fino al secondo anno di impianto prestare molta attenzione all'applicazione. Le aiuole di rose vanno diserbate con HERBARON® G solo prima della ripresa vegetativa oppure dopo lo sviluppo completo dell'apparato fogliare.
5. **Diserbo totale di parchi, giardini, viali e sentieri.**
   Contro erbe a riproduzione annuale, è sufficiente una dose di 6 - 8 g/m^2. In presenza di una flora infestante mista, con malerbe a riproduzione mediante radici e rizomi, la dose d'impiego non deve essere inferiore a 12 g/m^2.
   Impiegare la sera in assenza di pubblico.

La natura del terreno e l'andamento climatico incidono in modo determinante sui risultati ottenibili. E' indispensabile al riguardo, distribuire HERBARON® G in periodi di pioggia o almeno limitarne l'uso su terreni umidi. Risulta importante, inoltre, distribuire il prodotto **uniformemente** e con la massima **regolarità** sulla superficie da trattare. Da non applicare su terreni sabbiosi.

COMPATIBILITÀ
Impiegare HERBARON® G da solo.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

® Marchio della CHEMTURA CORPORATION

DL 65/2003

ETICHETTA RIDOTTA

HERBARON® G

Erbicida per il diserbo dei vigneti, frutteti (melo), oliveti, piante ornamentali, aree industriali, campi sportivi, ripe e bordi stradali.

GRANULARE

Registrazione del Ministero della Salute n. 11915 del 19/12/2003

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Diclobenil puro g 6,75
Coformulanti, q.b. a 100 grammi

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
CROMPTON CHEMICAL Srl
Via Pico della Mirandola, 8
04013 Latina Scalo (LT)

**ATTENZIONE:
MANIPOLARE
CON PRUDENZA**

distribuito da: **COMPO Agricoltura SpA** – Via Marconato, 8 – Cesano Maderno (MI)

OFFICINA DI PRODUZIONE: CROMPTON EUROPE B.V. - Amsterdam (Olanda) Contenuto: **g 100** Partita n.:

FRASI DI RISCHIO: **Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

NORME PRECAUZIONALI: **Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio della CHEMTURA CORPORATION

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

OMITE™ 57E

(Concentrato Emulsionabile)
Acaricida emulsionabile

OMITE 57 E Registrazione del Ministero della Sanità n. 1520 del 07/03/1974

Composizione:	
g 100 di prodotto contengono:	
Propargite pura	g 57 (= 587 g/l)
Solventi, emulsionanti q.b. a	g 100

Contiene Xilene

Titolare dell'autorizzazione
CROMPTON CHEMICAL Srl
VIA PICO DELLA MIRANDOLA, 8 - 04013 - LATINA SCALO (LT)

Stabilimenti di produzione
CROMPTON CHEMICAL Srl - Via Pico della Mirandola, 8 - Latina Scalo (LT)
A.D.I.C.A. SpA - Via S. Silvestro, 1 - Faenza (RA)
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)
AGRIFORMULA Srl - Paganica (AQ)
BAYER CropScience Srl - Filago (BG)

TOSSICO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

Partita n.:

Contenuto netto:
Litri 0,100 - 0,150 - 0,200 - 0,500 - 1 - 5 - 10

FRASI di RISCHIO: Infiammabile. Nocivo per ingestione. Tossico per inalazione. Provoca ustioni. Irritante per la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Norme Precauzionali: Obbligo dell'uso di guanti e tuta di protezione. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Informazioni per il medico
Sintomi - Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al S.N.C.: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia : sintomatica. Ospedalizzare
Controindicazioni: non provocare il vomito per la presenza di distillati del petrolio come solventi.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche
L'Omite 57E è un acaricida di recente preparazione attivo contro le popolazioni di acari resistenti, da impiegare su **piante da frutto (pesco, melo, limone)**, sulla **vite**, sugli **ortaggi (melanzana, peperone, melone)** e su **pomodoro** e **soia.**
Agisce per contatto sulle larve e sugli adulti delle specie di acari vegetali: Tetranichidi (ragnetti rossi, gialli, bruni, rugginosi), Eriofidi, Tarsonemidi. Possiede un'attività iniziale ed una persistenza di azione tale da uccidere anche le giovani larve nate dopo il trattamento. Dopo il trattamento gli acari interrompono l'assorbimento della linfa delle piante e muoiono dopo 1-4 giorni dall'irrorazione in funzione della temperatura. In condizione di alte temperature dove il prodotto esprime la sua maggiore efficacia, gli acari muoiono dopo 1-2 giorni dal trattamento. In presenza di basse temperature invece il prodotto è lento ad agire e gli acari muoiono dopo 3-4 giorni dall'irrorazione.
L'impiego dell'Omite 57E dà i migliori risultati quando le piante sono completamente bagnate fino allo sgocciolamento.

Modalità e dosi di impiego
Omite 57E viene impiegato alla dose di 80-100 ml/hl nei trattamenti ad alto volume.
La dose minore si impiega nei casi di leggera infestazione di acari che sono presenti soprattutto nel periodo primaverile e nei confronti di popolazioni di acari sensibili; la dose maggiore si irrora nei confronti di acari molto resistenti e generalmente in estate in presenza di attacchi massicci.

Quando le infestazioni sono gravi è consigliato un secondo trattamento alla distanza di 10-15 giorni dal primo.
L'Omite 57E può inoltre essere mescolato con acaricidi-ovicidi per avere un risultato completo anche sulle uova.

Compatibilità
L'Omite 57E è compatibile con la generalità degli antiparassitari. Incompatibile è invece con i prodotti fortemente alcalini come la poltiglia bordolese, la calce e il solfuro di calcio. In questo caso diminuisce l'efficacia acaricida dell'Omite 57E.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Non applicare il prodotto sulla vite prima della fioritura perché è fitotossico.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta della soia, 15 giorni prima della raccolta delle altre colture

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

™ Marchio registrato della CHEMTURA CORPORATION

DL 65/2003

ETICHETTA RIDOTTA

OMITE™ 57E

(Concentrato Emulsionabile)

Acaricida emulsionabile

OMITE 57 E Registrazione del Ministero della Sanità n. 1520 del 07/03/1974

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:

Propargite pura	g 57 (= 587 g/l)
Solventi, emulsionanti q.b. a	g 100

Contiene Xilene

Titolare dell'autorizzazione

CROMPTON CHEMICAL Srl

VIA PICO DELLA MIRANDOLA, 8 - 04013 - LATINA SCALO (LT)

Stabilimenti di produzione

CROMPTON CHEMICAL Srl
Via Pico della Mirandola, 8 - Latina Scalo (**LT**)
A.D.I.C.A. SpA - Via S. Silvestro, 1 - Faenza (RA)
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)
AGRIFORMULA Srl - Paganica (AQ)
BAYER CropScience Srl - Filago (BG)

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n.:

Contenuto netto: **ml 100**

FRASI di RISCHIO: Infiammabile. Nocivo per ingestione. Tossico per inalazione. Provoca ustioni. Irritante per la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Norme Precauzionali: Obbligo dell'uso di guanti e tuta di protezione. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Informazioni per il medico

Sintomi - Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al S.N.C.: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia : sintomatica. Ospedalizzare
Controindicazioni: non provocare il vomito per la presenza di distillati del petrolio come solventi.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

™ Marchio registrato della CHEMTURA CORPORATION

OMITE™ 57EW

Acaricida formulato come emulsione acquosa

OMITE 57 EW Registrazione del Ministero della Salute n. 8315 del 15/06/1993

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Propargite pura g 57 (= 570 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Partita n.:*

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
CROMPTON CHEMICAL SRL
VIA PICO DELLA MIRANDOLA, 8 - 04013 - LATINA SCALO (LT)

DISTRIBUITO DA
SIPCAM – Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano SpA
Via Carroccio, 8 – Milano

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

STABILIMENTI DI PRODUZIONE (FORMULAZIONE E CONFEZIONAMENTO O SOLA FORMULAZIONE)
Uniroyal Chemical Co., Inc. - Naugatuck, Connecticut (USA)
Crompton Chemical s.r.l. - Via Pico della Mirandola, 8 - Latina Scalo (LT)
STABILIMENTO DI CONFEZIONAMENTO: **Bayer CropScienceSrl** - Via delle Industrie, 9 - Filago (BG)

Contenuto netto:
Litri 0,150 - 0,200
1 - 5 - 10 - 20

FRASI di RISCHIO: Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: **Obbligo dell'uso di guanti e tuta di protezione. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia : sintomatica. Ospedalizzare
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche
L'Omite 57EW è un acaricida attivo contro le popolazioni di acari resistenti, da impiegare su piante da frutto (pesco, melo, limone), sulla vite, sugli ortaggi (melanzana, peperone, melone), su pomodoro e soia.
Agisce per contatto sulle larve e sugli adulti delle specie di acari vegetali: Tetranichidi (ragnetti rossi, gialli, bruni, rugginosi), Eriofidi, Tarsonemidi. Omite 57EW possiede un'attività iniziale ed una persistenza di azione tale da uccidere anche le giovani larve nate dopo il trattamento. Dopo il trattamento gli acari interrompono l'assorbimento della linfa delle piante e muoiono dopo 1-4 giorni dall'irrorazione in funzione della temperatura. In condizione di alte temperature dove il prodotto esprime la sua maggiore efficacia, gli acari muoiono dopo 1-2 giorni dal trattamento. In presenza di basse temperature invece il prodotto è lento ad agire e gli acari muoiono dopo 3-4 giorni dall'irrorazione.
L'impiego dell'Omite 57EW dà i migliori risultati quando le piante sono completamente bagnate fino allo sgocciolamento.

Modalità e dosi di impiego
L'Omite 57EW viene impiegato alla dose di 80-100 ml/hl nei trattamenti ad alto volume (10-15 hl di acqua per ettaro). La dose minore si impiega nei casi di leggera infestazione di acari che sono presenti soprattutto nel periodo primaverile e nei confronti di popolazioni di acari sensibili; la dose maggiore si irrora nei confronti di acari molto resistenti e generalmente in estate in presenza di attacchi massicci.
Quando le infestazioni sono gravi è consigliato un secondo trattamento alla distanza di 10-15 giorni dal primo.
L'Omite 57EW può inoltre essere mescolato con acaricidi-ovicidi per avere un risultato completo anche sulle uova.

Compatibilità: L'Omite 57EW è compatibile con la generalità degli antiparassitari. Incompatibile è invece con i prodotti fortemente alcalini come la poltiglia bordolese, la calce e il solfuro di calcio. In questo caso diminuisce l'efficacia acaricida dell'Omite 57EW.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Non applicare su vite prima della fioritura.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta della soia e 15 giorni prima della raccolta di tutte le altre colture.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

Crompton Chemical s.r.l.
Via Pico della Mirandola, 8 - 04013 - Latina Scalo (LT)
tel. 0773 / 61.51

™ Marchio registrato della CHEMTURA CORPORATION

D.L. n.65/2003

RED PROP EW

Acaricida formulato come emulsione acquosa

RED PROP EW Registrazione del Ministero della Sanità n. 9525 del 20/02/98

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:

Propargite pura	**g 57 (= 570 g/l)**
Coformulanti q.b. a	**g 100**

Partita n.:

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
CROMPTON CHEMICAL SRL
VIA PICO DELLA MIRANDOLA, 8 - 04013 - LATINA SCALO (LT)

DISTRIBUITO DA
SIAPA Srl - Via Caldera, 21 - Milano

STABILIMENTI DI PRODUZIONE
Uniroyal Chemical Co., Inc. - Naugatuck, Connecticut (USA)
Crompton Chemical Srl - Via Pico della Mirandola, 8 - Latina Scalo (LT)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto netto:
Litri 0,150 - 0,200
1 - 5 - 10 - 20

FRASI di RISCHIO: Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Norme Precauzionali: Obbligo dell'uso di guanti e tuta di protezione. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

Sintomi - Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia : sintomatica. Ospedalizzare
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche

Il Red Prop EW è un acaricida attivo contro le popolazioni di acari resistenti, da impiegare su **piante da frutto (pesco, melo, limone)**, sulla **vite**, sugli **ortaggi (melanzana, peperone, melone)**, su **pomodoro** e **soia.**
Agisce per contatto sulle larve e sugli adulti delle specie di acari vegetali: Tetranichidi (ragnetti rossi, gialli, bruni, rugginosi), Eriofidi, Tarsonemidi.
Red Prop EW possiede un' attività iniziale ed una persistenza di azione tale da uccidere anche le giovani larve nate dopo il trattamento. Dopo il trattamento gli acari interrompono l'assorbimento della linfa delle piante e muoiono dopo 1-4 giorni dall'irrorazione in funzione della temperatura. In condizione di alte temperature dove il prodotto esprime la sua maggiore efficacia, gli acari muoiono dopo 1-2 giorni dal trattamento. In presenza di basse temperature invece il prodotto è lento ad agire e gli acari muoiono dopo 3-4 giorni dall'irrorazione.
L'impiego del Red Prop EW dà i migliori risultati quando le piante sono completamente bagnate fino allo sgocciolamento.

Modalità e dosi di impiego

Il Red Prop EW viene impiegato alla dose di 80-100 ml/hl nei trattamenti ad alto volume (10-15 hl di acqua per ettaro). La dose minore si impiega nei casi di leggera infestazione di acari che sono presenti soprattutto nel periodo primaverile e nei confronti di popolazioni di acari sensibili; la dose maggiore si irrora nei confronti di acari molto resistenti e generalmente in estate in presenza di attacchi massicci.
Quando le infestazioni sono gravi è consigliato un secondo trattamento alla distanza di 10-15 giorni dal primo.

Il Red Prop EW può inoltre essere mescolato con acaricidi-ovicidi per avere un risultato completo anche sulle uova.

Compatibilità

Il Red Prop EW è compatibile con la generalità degli antiparassitari. Incompatibile è invece con i prodotti fortemente alcalini come la poltiglia bordolese, la calce e il solfuro di calcio. In questo caso diminuisce l'efficacia acaricida del Red Prop EW.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Non applicare su vite prima della fioritura.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta della soia e 15 giorni prima della raccolta di tutte le altre colture.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

ROYAL MH 60G™-Tab

FITOREGOLATORE IN GRANULI SOLUBILI PER IL CONTROLLO DEI GERMOGLI ASCELLARI PRIMARI E SECONDARI DEL TABACCO

Reg. Ministero della Salute N. 11379 del 25/06/2002

Composizione	
Idrazide maleica pura	**g. 60**
(contenente meno di 1 mg/Kg di idrazina)	
Coformulanti	**q.b.a g.100**

CROMPTON CHEMICAL SRL
Via Pico della Mirandola, 8
Latina Scalo (LT)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Partita n.

Officina di produzione:
Grotech Formulations Limited
Goole, East Yorkshire - uk

Contenuto:
0,5 - 1 – 5 - 15 Kg

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.**

NORME PRECAUZIONALI: **Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose, tremori, convulsioni fino al coma.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Il **ROYAL MH 60G-Tab** viene assorbito dalle piante per via fogliare e traslocato in ogni suo organo per via linfatica. Nei germogli, inibisce principalmente i processi respiratori delle cellule, riduce le attività enzimatiche, rallenta la moltiplicazione cellulare. La sommatoria di queste complesse azioni impedisce lo sviluppo dei germogli e dei succhioni principali e secondari. Sul tabacco, questo prodotto impedisce lo sviluppo dei germogli ascellari. Dato che il **ROYAL MH 60G-Tab** viene assorbito ed entra in circolo nella pianta, non è necessario irrorare l'intera pianta. Il miglior controllo si ottiene quando viene irrorata da 1/3 a 1/2 della parte superiore della pianta.

TABACCO
Dosi e modalità d'impiego
Sulle varietà Nostrano del Brenta, Beneventano, Havanna, Bright Burley, in caso di applicazione meccanica, il **ROYAL MH 60G-Tab** si impiega alla dose di 2,8-4,2 Kg/ha di prodotto diluito in circa 500 litri di acqua, corrispondenti, per un investimento di 20.000 piante, a 140-210 g di prodotto per 1000 piante; sulla varietà Kentucky si impiegano 200-250 g di prodotto per 1000 piante, avendo cura che la quantità di prodotto irrorato per ettaro non superi i 4,2-5 Kg. In caso di applicazione manuale, diluire la quantità di prodotto da impiegare su 1000 piante in 20 litri di acqua ed impiegare 15-20 ml per pianta di questa soluzione.
Epoca di impiego
Trattare con **ROYAL MH 60G-Tab** entro 24 ore dalla cimatura eseguita allo stadio della piena fioritura. Il trattamento può essere effettuato con un irroratore a spalla ad un solo ugello, oppure con attrezzature dotate di barre appositamente studiate per questo impiego.
Si raccomanda inoltre quanto segue:

1. Trattare le piante in modo uniforme e quando le foglie sono asciutte;
2. Irrorare solo il terzo o la metà superiore della pianta;
3. Trattare durante la mattina; non applicare il prodotto durante le ore troppo calde della giornata o nel tardo pomeriggio o di sera quando le foglie sono troppo appassite;
4. Impiegare irroratori con ugelli a getto sottile;
5. Non applicare il prodotto su piante per la produzione del seme;
6. Una eventuale pioggia dopo 12 ore dal trattamento non pregiudica l'effetto del prodotto;
7. In alcune condizioni, le foglie apicali del tabacco trattato hanno tendenza ad ingiallire anticipatamente; ciò non è dannoso, ma non significa che il tabacco sia maturo. Non iniziare la raccolta utilizzando il colore delle foglie come il solo indice di maturità;
8. Evitare che il prodotto giunga a contatto con le colture vicine a quella soggetta ad irrorazione;
9. Rispettare le dosi consigliate: esse comunque hanno carattere generico e vanno messe a punto caso per caso tenendo conto dei fattori ambientali.

Compatibilità
Il **ROYAL MH 60G-Tab** non è compatibile con gli antiparassitari e con i fertilizzanti fogliari. Pertanto va irrorato da solo.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Rischi di nocività
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici e bestiame.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

™Marchio registrato CHEMTURA CORPORATION

DL 65/2003

ROYAL MH 60G™

FITOREGOLATORE IN GRANULI SOLUBILI PER IL CONTROLLO DEI GERMOGLI ASCELLARI PRIMARI E SECONDARI DEL TABACCO E DEI GERMOGLI DI CIPOLLA ED AGLIO

Reg. Ministero della Sanità N. 7535 del 22/09/88

Composizione	
Idrazide maleica pura	**g. 60**
(contenente meno di 1 mg/Kg di idrazina)	
Coformulanti	**q.b.a g.100**

Partita n.

CROMPTON CHEMICAL SRL
Via Pico della Mirandola, 8
Latina Scalo (LT)

Officine di produzione:
Uniroyal Chemical Co. Inc.- Naugatuck, USA
Crompton Chemical Srl – Latina Scalo (LT)

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Contenuto:
0,5 - 1 – 5 - 15 Kg.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose, tremori, convulsioni fino al coma.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Il **ROYAL MH 60G** viene assorbito dalle piante per via fogliare e traslocato in ogni suo organo per via linfatica. Nei germogli, inibisce principalmente i processi respiratori delle cellule, riduce le attività enzimatiche, rallenta la moltiplicazione cellulare. La sommatoria di queste complesse azioni impedisce lo sviluppo dei germogli e dei succhioni principali e secondari. Sul tabacco, questo prodotto impedisce lo sviluppo dei germogli ascellari. Dato che il **ROYAL MH 60G** viene assorbito ed entra in circolo nella pianta, non è necessario irrorare l'intera pianta. Il miglior controllo si ottiene quando viene irrorata da 1/3 a 1/2 della parte superiore della pianta. Nella cipolla e nell'aglio il **ROYAL MH 60G** inibisce la germinazione durante la conservazione in magazzino ne, evita inoltre le perdite dovute alla disidratazione.

TABACCO
Dosi e modalità d'impiego
Sulle varietà Nostrano del Brenta, Beneventano, Havanna, Bright Burley, in caso di applicazione meccanica, il **ROYAL MH 60G** si impiega alla dose di 2,8-4,2 Kg/ha di prodotto diluito in circa 500 litri di acqua, corrispondenti, per un investimento di 20.000 piante, a 140-210 g di prodotto per 1000 piante; sulla varietà Kentucky si impiegano 200-250 g di prodotto per 1000 piante, avendo cura che la quantità di prodotto irrorato per ettaro non superi i 4,2-5 Kg. In caso di applicazione manuale, diluire la quantità di prodotto da impiegare su 1000 piante in 20 litri di acqua ed impiegare 15-20 ml per pianta di questa soluzione.
Epoca di impiego
Trattare con **ROYAL MH 60G** entro 24 ore dalla cimatura eseguita allo stadio della piena fioritura. Il trattamento può essere effettuato con un irroratore a spalla ad un solo ugello, oppure con attrezzature dotate di barre appositamente studiate per questo impiego.
Si raccomanda inoltre quanto segue:

1. Trattare le piante in modo uniforme e quando le foglie sono asciutte;
2. Irrorare solo il terzo o la metà superiore della pianta;
3. Trattare durante la mattina; non applicare il prodotto durante le ore troppo calde della giornata o nel tardo pomeriggio o di sera quando le foglie sono troppo appassite;
4. Impiegare irroratori con ugelli a getto sottile;
5. Non applicare il prodotto su piante per la produzione del seme;
6. Una eventuale pioggia dopo 12 ore dal trattamento non pregiudica l'effetto del prodotto;
7. In alcune condizioni, le foglie apicali del tabacco trattato hanno tendenza ad ingiallire anticipatamente; ciò non è dannoso, ma non significa che il tabacco sia maturo. Non iniziare la raccolta utilizzando il colore delle foglie come il solo indice di maturità;
8. Evitare che il prodotto giunga a contatto con le colture vicine a quella soggetta ad irrorazione;
9. Rispettare le dosi consigliate: esse comunque hanno carattere generico e vanno messe a punto caso per caso tenendo conto dei fattori ambientali.

CIPOLLE ED AGLIO
Dosi e modalità d'impiego
Cipolla: 2,8-4 Kg in 500-600 litri di acqua per ettaro.
Aglio: 2,8-4 Kg in 500-600 litri di acqua per ettaro.
Assicurare una buona copertura delle foglie.
Il rispetto dei tempi di applicazione è essenziale per ottenere i migliori risultati.
Nelle cipolle: applicare **ROYAL MH 60G** quando i bulbi sono pienamente maturi, nello stadio di inizio piegamento delle foglie. Questo stadio si individua quando il 10% delle foglie sono piegate, ma sono ancora tutte verdi. Questo stadio si raggiunge da circa 2 settimane a 10 giorni prima della raccolta.
Nell'aglio: **ROYAL MH 60G** si applica allo stadio che precede l'appassimento, quando tutte le foglie sono ancora verdi, appena prima il viraggio al colore giallo che si verifica da 2 settimane a 10 giorni prima della raccolta.
Per le cipolle e l'aglio la presenza di foglie verdi è essenziale per consentire l'assorbimento del **ROYAL MH 60G** e la sua traslocazione.
ROYAL MH 60G non ha effetto se la sua applicazione è troppo tardiva, anche sulle cipolle quando le piante hanno 3 foglie verdi e tutte le foglie sono piegate. Su aglio e cipolla si raccomanda di associare l'impiego di **ROYAL MH 60G** alla scelta di varietà vegetali con buone caratteristiche di conservabilità.
Non applicare su varietà a bassa capacità di conservazione.
Apparirà una diminuzione di efficacia se piove o se si irrigheranno le colture entro 24 ore dal trattamento.
Per consentire il migliore assorbimento e traslocazione del **ROYAL MH 60G**, non trattare in condizioni di carenza idrica, quando la temperatura supera i 26°C o quando la coltura è sotto condizioni di stress da malattie fungine o da attacchi di insetti. Sebbene il **ROYAL MH 60G** non sia volatile bisogna assolutamente evitare la deriva del prodotto sulle colture vicine.
Su aglio e cipolla evitare di applicare il prodotto troppo anticipatamente.. Se l'applicazione è effettuata prima di due settimane dalla maturazione potrebbero svilupparsi dei tuberi spugnosi.

Compatibilità: Il ROYAL MH 60G non è compatibile con gli antiparassitari e con i fertilizzanti fogliari. Pertanto va irrorato da solo.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Rischi di nocività: Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici e bestiame.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

™Marchio registrato CHEMTURA CORPORATION

DL 65/2003

ROYALTAC™

Fitoregolatore liquido emulsionabile ad azione di contatto per il controllo selettivo
dei germogli ascellari primari e secondari del tabacco

ROYALTAC Reg. Ministero della Sanità N. 6180 del 15/01/85

Composizione:
n-Decanolo puro g. 78,4 (=679 g/l) Partita n.
Coformulanti q.b.a g.100

CROMPTON CHEMICAL Srl
Via Pico della Mirandola, 8 - 04013 Latina Scalo (LT)

Officine di produzione:
Crompton Chemical Srl - Latina Scalo (LT)
A.D.I.C.A. Srl - Faenza (RA)
Du Pont de Nemours Italiana SpA - Bolzano
Althaller Italia Srl - S. Colombano al Lambro (MI)

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto: Litri 1[1] - 5[1] - 20[1] - 50[1] - 100[2] - 200[2,3] – 500[2,3] – 1000[2,3]

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche
Il **Royaltac** agisce per contatto e, per essere completamente efficace, deve bagnare i germogli ascellari delle piante. Il liquido irrorato deve scorrere lungo lo stelo delle piante e, scendendo, venire a contatto con le gemme ascellari. Il prodotto può essere utilmente applicato su qualsiasi varietà di tabacco senza alterare le caratteristiche organolettiche.

Modalità d'impiego
Periodo di applicazione: il **Royaltac** può essere impiegato sia prima che dopo la cimatura.
a) prima della cimatura: trattare con **Royaltac** preferibilmente allo stadio fra allungamento dei bottoni fiorali e l'apertura dei fiori. I migliori risultati si ottengono trattando e cimando entro una settimana. In questo caso raramente i germogli ascellari sono tanto grandi da richiedere l'asportazione manuale;
b) dopo la cimatura: trattare con **Royaltac** entro e non oltre 2 giorni (preferibilmente entro 24 ore) dalla cimatura, asportando nell'operazione di cimatura anche i germogli ascellari più lunghi di 2,5 cm.

Dosi d'impiego
Il **Royaltac** si impiega alla dose di 4-6 litri di prodotto in 94-96 litri d'acqua, utilizzando 15-20 ml di miscela per pianta. Risulterà una quantità di 1 litro di miscela ogni 50-60 piante nell'applicazione manuale; la quantità di miscela da applicare per unità di superficie dipenderà dal numero di piante presenti nella stessa, generalmente variabile a seconda della varietà coltivata, della pratica colturale adottata. Nell'applicazione con mezzi meccanici generalmente si impiegherà un volume compreso fra i 600 e gli 800 litri per ettaro.

Metodi di applicazione
Il trattamento con **Royaltac** può essere eseguito sia con mezzi manuali (irroratori a spalla), sia con mezzi meccanici (irroratori a barre). In entrambi i casi si debbono impiegare ugelli producenti un getto grossolano (come gocce di pioggia leggera), mantenuti sopra le piante ad un'altezza tale da fare liberamente scorrere la miscela lungo lo stelo ed evitando di bagnare, sia pure accidentalmente, la pagina inferiore delle foglie. In particolare nel trattamento con mezzi di irrorazione manuali, la pressione del serbatoio deve essere tenuta assai bassa (meno di 0,5 atm.), può essere impiegato un solo ugello (raccordato con una curva per facilitarne l'uso), mantenuto a 15-20 cm dalle cime delle piante e rivolto verso il basso. Nel trattamento con mezzi di irrorazione meccanici, si richiede innanzitutto un'accurata taratura della macchina, affinché le condizioni d'applicazione siano rigorosamente osservate, ed un impianto assai regolare della coltura. Gli ugelli, in gruppo di tre per fila di piante, sono disposti a 20 cm di distanza uno dall'altro, rivolti verso il basso: quello centrale verticale ed allineato con la fila delle piante, i laterali inclinati in direzione della cima delle piante. La barra irrorante deve essere mantenuta ad un'altezza tale da assicurare agli ugelli una distanza di 30-40 cm dalla sommità delle piante. La pressione alla barra deve essere di 0,5-1 atm.; si prescrive pertanto l'impiego di un manometro sensibile avente 3 atm. come fondo scala.

Numero di applicazioni
Un solo trattamento con **Royaltac** è sufficiente per la devitalizzazione dei germogli ascellari. In presenza di germogli eccezionalmente vigorosi, può essere utile un secondo trattamento a distanza di 5-10 giorni dal primo. L'impiego del **Royaltac**, avente lo scopo di eliminare i germogli già presenti al momento del trattamento, dovrebbe essere integrato con l'applicazione di un prodotto a base di idrazide maleica, avente azione sistemica e lo scopo di inibire la formazione dei nuovi germogli.

Avvertenze:
- evitare che la miscela vada a contatto con la pagina inferiore delle foglie, sensibile e pertanto soggetta ad ustionarsi; si sconsiglia di trattare in giornate ventose e su piante inclinate che vanno anticipatamente raddrizzate;
- evitare di applicare la miscela nelle ore più calde della giornata. Al mattino attendere che la rugiada sia asciugata, al pomeriggio che le piante si siano riprese dall'appassimento pomeridiano;
- il prodotto agisce entro un'ora; una eventuale pioggia dopo un'ora e mezza dal trattamento non ne pregiudica l'esito. Non trattare in caso di pioggia e con le foglie bagnate;
- non trattare piante ammalate, malnutrite e comunque sofferenti;
- agitare il prodotto prima dell'uso nel suo contenitore;
- il **Royaltac** va usato da solo. Preparare la miscela subito prima dell'impiego e mantenerla agitata nel serbatoio dell'irroratore;
- rispettare le dosi consigliate. esse hanno carattere generico e la tecnica dell'applicazione va messa a punto caso per caso.

Compatibilità
Il **Royaltac** non è compatibile con gli antiparassitari e con i fertilizzanti fogliari, pertanto va irrorato da solo.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

[1] IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
[2] ATTENZIONE: Contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo; non disperdere nell'ambiente.
[3] Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

™ Marchio registrato della CHEMTURA CORPORATION

DL 65/2003

ROYALTAC™ N

Fitoregolatore liquido emulsionabile ad azione di contatto per il controllo selettivo dei germogli ascellari primari e secondari del tabacco

ROYALTAC N Reg. Ministero della Sanità N. 9267 del 12/06/97

Composizione:

n-Decanolo puro g. 78,4 (=679 g/l) Partita n.

Coformulanti q.b.a g.100

CROMPTON CHEMICAL Srl

Via Pico della Mirandola, 8 - 04013 Latina Scalo (LT)

Officine di produzione:

Crompton Chemical Srl - Latina Scalo (LT)

A.D.I.C.A. Srl - Faenza (RA)

Du Pont de Nemours Italiana SpA - Bolzano

Althaller Italia Srl - S. Colombano al Lambro (MI)

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

Contenuto: Litri 1[1] - 5[1] - 20[1] - 50[1] - 100[2] - 200[2,3] – 500[2,3] – 1000[2,3]

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche
Il **Royaltac N** agisce per contatto e, per essere completamente efficace, deve bagnare i germogli ascellari delle piante. Il liquido irrorato deve scorrere lungo lo stelo delle piante e, scendendo, venire a contatto con le gemme ascellari. Il prodotto può essere utilmente applicato su qualsiasi varietà di tabacco senza alterarne le caratteristiche organolettiche.

Modalità d'impiego
Periodo di applicazione: il **Royaltac N** può essere impiegato sia prima che dopo la cimatura.
a) prima della cimatura: trattare con **Royaltac N** preferibilmente allo stadio fra allungamento dei bottoni fiorali e l'apertura dei fiori. I migliori risultati si ottengono trattando e cimando entro una settimana. In questo caso raramente i germogli ascellari sono tanto grandi da richiedere l'asportazione manuale;
b) dopo la cimatura: trattare con **Royaltac N** entro e non oltre 2 giorni (preferibilmente entro 24 ore) dalla cimatura, asportando nell'operazione di cimatura anche i germogli ascellari più lunghi di 2,5 cm.

Dosi d'impiego
Il **Royaltac N** si impiega alla dose di 4-6 litri di prodotto in 94-96 litri d'acqua, utilizzando 15-20 ml di miscela per pianta. Risulterà una quantità di 1 litro di miscela ogni 50-60 piante nell'applicazione manuale; la quantità di miscela da applicare per unità di superficie dipenderà dal numero di piante presenti nella stessa, generalmente variabile a seconda della varietà coltivata, della pratica colturale adottata. Nell'applicazione con mezzi meccanici generalmente si impiegherà un volume compreso fra i 600 e gli 800 litri per ettaro.

Metodi di applicazione
Il trattamento con **Royaltac N** può essere eseguito sia con mezzi manuali (irroratori a spalla), sia con mezzi meccanici (irroratori a barre). In entrambi i casi si debbono impiegare ugelli producenti un getto grossolano (come gocce di pioggia leggera), mantenuti sopra le piante ad un'altezza tale da fare liberamente scorrere la miscela lungo lo stelo ed evitando di bagnare, sia pure accidentalmente, la pagina inferiore delle foglie. In particolare nel trattamento con mezzi di irrorazione manuali, la pressione del serbatoio deve essere tenuta assai bassa (meno di 0,5 atm.), può essere impiegato un solo ugello (raccordato con una curva per facilitarne l'uso), mantenuto a 15-20 cm dalle cime delle piante e rivolto verso il basso. Nel trattamento con mezzi di irrorazione meccanici, si richiede innanzitutto un'accurata taratura della macchina, affinché le condizioni d'applicazione siano rigorosamente osservate, ed un impianto assai regolare della coltura. Gli ugelli, in gruppo di tre per fila di piante, sono disposti a 20 cm di distanza uno dall'altro, rivolti verso il basso: quello centrale verticale ed allineato con la fila delle piante, i laterali inclinati in direzione della cima delle piante. La barra irrorante deve essere mantenuta ad un'altezza tale da assicurare agli ugelli una distanza di 30-40 cm dalla sommità delle piante. La pressione alla barra deve essere di 0,5-1 atm.; si prescrive pertanto l'impiego di un manometro sensibile avente 3 atm. come fondo scala.

Numero di applicazioni
Un solo trattamento con **Royaltac N** è sufficiente per la devitalizzazione dei germogli ascellari. In presenza di germogli eccezionalmente vigorosi, può essere utile un secondo trattamento a distanza di 5-10 giorni dal primo. L'impiego del **Royaltac N**, avente lo scopo di eliminare i germogli già presenti al momento del trattamento, dovrebbe essere integrato con l'applicazione di un prodotto a base di idrazide maleica, avente azione sistemica e lo scopo di inibire la formazione dei nuovi germogli.

Avvertenze:
- evitare che la miscela vada a contatto con la pagina inferiore delle foglie, sensibile e pertanto soggetta ad ustionarsi; si sconsiglia di trattare in giornate ventose e su piante inclinate che vanno anticipatamente raddrizzate;
- evitare di applicare la miscela nelle ore più calde della giornata. Al mattino attendere che la rugiada sia asciugata, al pomeriggio che le piante si siano riprese dall'appassimento pomeridiano;
- il prodotto agisce entro un'ora; una eventuale pioggia dopo un'ora e mezza dal trattamento non ne pregiudica l'esito. Non trattare in caso di pioggia e con le foglie bagnate;
- non trattare piante ammalate, malnutrite e comunque sofferenti;
- agitare il prodotto prima dell'uso nel suo contenitore;
- il **Royaltac N** va usato da solo. Preparare la miscela subito prima dell'impiego e mantenerla agitata nel serbatoio dell'irroratore;
- rispettare le dosi consigliate. esse hanno carattere generico e la tecnica dell'applicazione va messa a punto caso per caso.

Compatibilità
Il **Royaltac N** non è compatibile con gli antiparassitari e con i fertilizzanti fogliari, pertanto va irrorato da solo.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

[1] IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

[2] ATTENZIONE: Contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo; non disperdere nell'ambiente.

[3] Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

™ Marchio registrato della CHEMTURA CORPORATION

DL 65/2003

SARMITE 57 EW

Acaricida formulato come emulsione acquosa

SARMITE 57 EW Registrazione del Ministero della Sanità n. 9493 del 06/02/98

Composizione:
g 100 di prodotto
contengono: g. 57 (= 570 g/l)
Propargite pura g. 100
Coformulanti q.b. a

Partita n.:*

Contenuto netto:
Litri 0,150-0,200–0,250
1- 5-10–20

Titolare dell'autorizzazione
CROMPTON CHEMICAL S.R.L.
VIA PICO DELLA MIRANDOLA, 8 - 04013 - LATINA SCALO (LT)
Distribuito da: **ISAGRO ITALIA Srl** - Via Caldera, 21 - 20153 Milano
Officina di Produzione
Crompton Chemical s.r.l. Via Pico della Mirandola, 8 - Latina Scalo (LT)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI di RISCHIO: Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Norme Precauzionali:
Obbligo dell'uso di guanti e tuta di protezione. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Informazioni per il medico
Sintomi - Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al S.N.C.: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriose, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche
Il SARMITE 57 EW è un acaricida attivo contro le popolazioni di acari resistenti, da impiegare su piante da frutto (pesco, melo, limone), sulla vite, sugli ortaggi (melanzana, peperone, melone), su pomodoro e soia.
Agisce per contatto sulle larve e sugli adulti delle specie di acari vegetali: Tetranichidi (ragnetti rossi, gialli, bruni, rugginosi), Eriofidi, Tarsonemidi. SARMITE 57 EW possiede un'attività iniziale ed una persistenza di azione tale da uccidere anche le giovani larve nate dopo il trattamento. Dopo il trattamento gli acari interrompono l'assorbimento della linfa delle piante e muoiono dopo 1-4 giorni dall'irrorazione in funzione della temperatura. In condizione di alte temperature dove il prodotto esprime la sua maggiore efficacia, gli acari muoiono dopo 1-2 giorni dal trattamento. In presenza di basse temperature invece il prodotto è lento ad agire e gli acari muoiono dopo 3-4 giorni dall'irrorazione.
L'impiego del SARMITE 57 EW dà i migliori risultati quando le piante sono completamente bagnate fino allo sgocciolamento.

Modalità e dosi di impiego
Il SARMITE 57 EW viene impiegato alla dose di 80-100 ml/hl nei trattamenti ad alto volume (10-15 hl di acqua per ettaro). La dose minore si impiega nei casi di leggera infestazione di acari che sono presenti soprattutto nel periodo primaverile e nei confronti di popolazioni di acari sensibili; la dose maggiore si irrora nei confronti di acari molto resistenti e generalmente in estate in presenza di attacchi massicci.
Quando le infestazioni sono gravi è consigliato un secondo trattamento alla distanza di 10-15 giorni dal primo.
Il SARMITE 57 EW può inoltre essere mescolato con acaricidi-ovicidi per avere un risultato completo anche sulle uova.

Compatibilità: Il SARMITE 57 EW è compatibile con la generalità degli antiparassitari. Incompatibile è invece con i prodotti fortemente alcalini come la poltiglia bordolese, la calce e il solfuro di calcio. In questo caso diminuisce l'efficacia acaricida del SARMITE 57 EW.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Non applicare su vite prima della fioritura.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta della soia e 15 giorni prima della raccolta di tutte le altre colture.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

Crompton Chemical S.r.l.
Via Pico della Mirandola, 8
04013 - Latina Scalo (LT)
tel. 0773 / 61.51

DL 65/2003

THIRAM 42-S

Fungicida in formulazione flowable per la concia delle sementi.

THIRAM 42-S Reg. Ministero della Sanità N. 7312 del 10/12/1987

Composizione:	
Tiram puro	g. 42 (=480 g/l)
Coformulanti q.b.a	g.100

Partita n.

Contenuto:
1-5-10-20-200*-500*-1000* L

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CROMPTON CHEMICAL Srl
Via Pico della Mirandola, 8 - 04013 Latina Scalo (LT)

Officina di produzione:
CROMPTON CHEMICAL Srl - Latina Scalo (LT)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Il **Thiram 42-S** è un fungicida in formulazione flowable appositamente studiato per la concia delle sementi. Il prodotto è efficace contro i seguenti patogeni presenti nel terreno o sul seme, che possono attaccare le plantule: *Rhyzoctonia spp., Pythium spp., Sclerotium spp., Phoma spp.* e le infezioni esterne da *Fusarium spp.* Inoltre il prodotto è attivo contro la carie (*Tilletia spp.*) e i carboni esterni (*Ustilago levis, U. ordei, U. kolleri*).

Dosi e modalità d'impiego
Per i seguenti tipi di seme si deve diluire 1 litro di prodotto in 5 litri di acqua e impiegare la quantità di miscela indicata per trattare 100 Kg di seme:

	dose ml per 100 kg di seme	quantità di prodotto corrispondente (ml)
Mais	700	120

Per i seguenti tipi di seme diluire 1 litro di prodotto in 3 litri di acqua ed impiegare la quantità di miscela indicata per trattare 100 Kg di seme:

	dose ml per 100 kg di seme	quantità di prodotto corrispondente (ml)
Cantalupo, cetriolo, zucchino, zucca, anguria	650	163
Lino	700	175
Frumento	500	125
Orzo	600	150
Segale	500	125
Riso	1300	325
Trifoglio, erba medica e altri piccoli semi di leguminose	1500	375
Sorgo, miglio	650	163
Pisello, lenticchia	750	190
Fagiolo, soia	500	125
Graminacee da foraggio	1200	300
Carota, insalata, lattuga, peperone, radicchio, spinacio	1200	300
Girasole	500	125
Cavoli	1200	300
Melanzana, cipolla, pomodoro	900	225
Bietola da foglia, barbabietola da zucchero	1200	300

Diluire la dose di **Thiram 42-S** nella quantità di acqua consigliata per eseguire il trattamento ed agitare bene. Pulire bene la macchina dopo l'uso.

Compatibilità
È consigliabile non mescolare il prodotto ad altri formulati prima di averne saggiato la miscibilità.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Consigli per la conservazione del prodotto: Conservare il prodotto in un locale fresco e asciutto. Non esporre i contenitori alla luce diretta del sole.

Avvertenze: Il seme trattato deve essere impiegato esclusivamente per la semina: non deve essere perciò riutilizzato per l'alimentazione dell'uomo, degli animali domestici, del bestiame e della selvaggina. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzate devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**
***Attenzione: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Non disperdere nell'ambiente.**
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zone di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoruscite accidentali del prodotto.
*** Confezione destinata ad esclusivo uso industriale.**
** Non applicabile per le confezioni da 200-500-1000 L

DL 65/2003

TERRAZOLE™ 35% WP

Fungicida in formulazione polvere bagnabile, stabile alla temperatura e non degradabile dall'azione dei raggi ultravioletti e dall'esposizione all'aria. Si impiega contro Pythium, Phytophtora e Fusarium per la concia dei bulbi, per la disinfezione dei semenzai, dei vivai, dei terricciati e dei terreni destinati a colture ortoflorofrutticole

TERRAZOLE 35% WP Registrazione n. 5765 Ministero della Sanità del 12/09/1985

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Etridiazol puro g. 35
Coformulanti q.b. a g.100

Partita n.:*
Contenuto netto: **kg 1**

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
CROMPTON CHEMICAL SRL
VIA PICO DELLA MIRANDOLA, 8 - 04013 - LATINA SCALO (LT)

Officine di Produzione
Dow Elanco Italia - Ozzano Emilia (BO)
Olin Corporation - Leland, Mississippi (USA)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI di RISCHIO: Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale in luogo fresco e asciutto. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - Irritante per cute e mucose, nausea, vomito, cefalea, vertigini. Epatopatia cronica
Terapia: sintomatica. Non far vomitare; ricovero immediato, svuotamento gastrico sotto visione endoscopica
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

Modalità e dosi di impiego
Il Terrazole 35% WP può essere impiegato sia tal quale che in sospensione acquosa. In quest'ultimo caso si scioglierà la dose di prodotto necessaria in poca acqua, diluendo la pasta così ottenuta fino a raggiungere la concentrazione desiderata. Prima di effettuare il trattamento, agitare bene la sospensione, soprattutto se l'attrezzatura è priva di agitatore. Si sconsiglia l'uso di atomizzatori.

a) **Per la concia dei semi:**
è consigliabile il trattamento in polvere secca, alla dose di g 20 di Terrazole 35% WP per 10 kg di seme.

b) **Per la concia dei bulbi:**
per la disinfezione dei bulbi è preferibile la concia liquida che si effettua immergendo i bulbi in una sospensione acquosa allo 0,2% - 0,3% di Terrazole 35% WP

c) **Per la disinfezione del terreno, dei semenzai, dei vivai e dei terricciati:**
nei terreni sciolti o ricchi di sostanze organiche, impiegare il prodotto in polvere secca alla dose di 40-110 kg/ha, distribuendo il più possibile uniformemente ed utilizzando, se necessario, un inerte quale sabbia o cenere nel rapporto di 1 a 10. Nei terreni compatti od argillosi, il Terrazole 35% WP si impiega alla dose di 80-110 kg/ha. I trattamenti vanno effettuati prima della semina o del trapianto, su terreno ben sminuzzato. Dopo l'applicazione, il prodotto deve essere interrato ad una profondità di 10-20 cm

Avvertenza:
Non applicare su colture in atto

Compatibilità:
Il prodotto è compatibile con i formulati a base di zolfo. Non può essere miscelato con prodotti a reazione alcalina (poltiglia bordolese) e con emulsioni oleose (oli minerali).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
In caso di dubbio di varietà di colture poco diffuse o di recente acclimatazione, si consiglia di eseguire preventive prove parcellari

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

TM Marchio registrato della CHEMTURA CORPORATION

DL 65/2003

TERRAZOLE™ 25% EC

Fungicida in formulazione liquido emulsionabile, stabile alla temperatura e non degradabile dai raggi ultravioletti e dall'esposizione all'aria. Si impiega contro Pythium, Phytophtora e Fusarium per la concia dei bulbi, per la disinfezione dei semenzai, dei vivai, dei terricciati e dei terreni destinati a colture ortoflorofrutticole

TERRAZOLE 25% EC Registrazione n. 5708 Ministero della Sanità del 27/01/1984
Composizione:
g 100 di prodotto contengono:

Etridiazol puro	g 25 (= 249 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100

Contiene xilene

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
CROMPTON CHEMICAL SRL
VIA PICO DELLA MIRANDOLA, 8 - 04013 - LATINA SCALO (LT)

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

DISTRIBUITO DA
AGRIMPORT SpA – Via Piani, 1 – 39100 Bolzano
CASTALDO SpA
Sede legale: Via G. Porzio – Is. G1 – 80143 Napoli
Sede amministrativa: Via nazionale delle Puglie snc, loc. Salice – 80021 Afragola (NA)
OFFICINE DI PRODUZIONE
Crompton Chemical s.r.l. - Via Pico della Mirandola, 8 - Latina Scalo (LT)
Olin Corporation - Leland, Mississippi (USA)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Torrenieri (SI)

Contenuto netto: **Litri 0,250 - 0,500 -1**

Partita n.:*

FRASI di RISCHIO: Infiammabile. Irritante per la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - Irritante per cute e mucose, nausea, vomito, cefalea, vertigini. Epatopatia cronica
Terapia: sintomatica. Non far vomitare, ricovero immediato, svuotamento gastrico sotto visione endoscopica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

Modalità e dosi di impiego
Il Terrazole 25% EC deve essere impiegato in emulsione acquosa nelle proporzioni indicate:

a) **per la concia dei bulbi:**
per la disinfezione dei bulbi la concia liquida si effettua immergendo i bulbi in una soluzione acquosa allo 0,3% - 0,4% di Terrazole 25% EC; lasciare in tale soluzione per 5-10 minuti;
b) **per la disinfezione del terreno, dei semenzai, dei vivai e dei terricciati:**
nei terreni sciolti o ricchi di sostanze organiche, impiegare il prodotto alla dose di 50-110 l/ha, distribuendo il più possibile uniformemente. Nei terreni compatti od argillosi, il Terrazole 25% EC si impiega alla dose di 90-110 l/ha. I trattamenti vanno effettuati prima della semina o del trapianto, su terreno ben sminuzzato. Dopo l'applicazione, il prodotto deve essere interrato ad una profondità di 10-20 cm subito dopo la sua distribuzione.

Avvertenza: Non applicare su colture in atto

Compatibilità: Il prodotto è compatibile con i formulati a base di zolfo. Non può essere miscelato con prodotti a reazione alcalina (poltiglia bordolese) e con emulsioni oleose (oli minerali e oli di antracene)
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: In caso di dubbio si consiglia di eseguire preventive prove parcellari

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONSERVARE IL PRODOTTO CHIUSO NEL CONTENITORE ORIGINALE

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

Crompton Chemical S.r.l.
Via Pico della Mirandola, 8
04013 - Latina Scalo (LT)
tel. 0773 / 61.51

™ Marchio registrato della CHEMTURA

D.L. n.65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

UNISOL® G

GRANULI - Erbicida per il diserbo dei vigneti, frutteti (melo), oliveti, piante ornamentali, argini di risaie, sedi ferroviarie, argini ed alvei di canali, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, campi da golf.

Registrazione del Ministero della Salute n. 11916 del 19/12/2003

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
Diclobenil puro	g 6,75
Coformulanti ed inerti q.b.a	g 100

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
CROMPTON CHEMICAL S.r.l.
Via Pico della Mirandola, 8 - Latina Scalo (LT)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

OFFICINA DI PRODUZIONE
CROMPTON EUROPE B.V. - Amsterdam (Olanda)

Distribuito da:
SACOM ambiente &servizi
Via Boscariello, 58 – 81043 Capua (CE)

Partita n.

Contenuto **g 100 - g 200 - g 300 - g 500 kg 1 - kg 5 - kg 10 - kg 25**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
UNISOL® G è un erbicida efficace contro la maggior parte delle erbe infestanti annuali, biennali e perenni, anche di difficile controllo come Equiseto (*Equisetum spp.*), Stoppione (*Cirsium arvense*), Romice (Rumex spp.), Soffione (*Taraxacum officinale*).
La sostanza attiva dell'UNISOL® G viene assorbita dalle radici delle infestanti, in pre-emergenza l'UNISOL® G agisce sulle infestanti germinanti e sui rizomi. All'inizio della vegetazione le malerbe sono più sensibili all'azione dell'UNISOL® G; è inoltre molto importante distribuire **tempestivamente** il prodotto su terreno umido o in periodi di pioggia.
L'UNISOL® G non agisce per via fogliare e perciò non causa alcun danno alle colture nemmeno quando investe gli organi verdi (foglie, rametti).
Per la vite è consigliabile tuttavia evitare di colpire i germogli. Nei vigneti con sistema di allevamento molto basso (tipo alberello, Sylvoz), è pertanto necessario trattare prima che le gemme si gonfino. L'UNISOL® G può essere usato tutto l'anno in trattamenti di pre o post-emergenza, al più tardi all'inizio dello sviluppo delle malerbe.
L'epoca più favorevole per il diserbo con UNISOL® G è però dopo la raccolta e dopo la vendemmia e in primavera, prima o subito dopo l'inizio della vegetazione.
Evitare accumuli di prodotto in vicinanza dei fusti delle piante da frutto e dei ceppi delle viti. Sono particolarmente indicati i trattamenti localizzati in forma di strisce o di aiuole.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Campi e dosi d'impiego

1. **Diserbo selettivo**

VITE (dopo il 4° anno di impianto)		
su terreni leggeri e sabbiosi	80 - 100	kg/ha
su terreni pesanti e argillosi	100 - 120	kg/ha
su terreni ricchi di humus	120	kg/ha
MELO (su franco, dopo il 5° anno di impianto)		
su terreni leggeri e sabbiosi	80 - 100	kg/ha
su terreni pesanti e argillosi	100	kg/ha
su terreni ricchi di humus	120	kg/ha
OLIVO (dopo il 5° anno di impianto)		
su terreni leggeri	80 - 100	kg/ha
su terreni pesanti	100 - 120	kg/ha

2. **Diserbo totale**
Diserbo dei bordi stradali, piazze da gioco, aree di fabbriche e depositi, sedi ferroviarie, spartitraffico di autostrade, argini di canali di irrigazione e drenaggio, ripe.
Dose d'impiego:
80 - 120 kg/ha, a seconda della composizione botanica delle infestanti e del loro sviluppo.

3. **Diserbo localizzato**
Lotta contro cespi di Romice (*Rumex spp.*), Tussilago (*Tussilago fanfara*). Consigliamo di distribuire 0,5 g di UNISOL® G nella parte centrale del ceppo. Apposite attrezzature di distribuzione facilitano il lavoro.

4. **Diserbo delle erbe acquatiche**
L'impiego di UNISOL® G è consigliabile anche per l'eliminazione delle erbe acquatiche, indifferentemente se natanti o sommerse.
Con UNISOL® G si possono trattare anche i canali di bonifica. Non si consiglia l'applicazione incondizionata dell'UNISOL® G nei canali di irrigazione. L'UNISOL® G è praticamente innocuo per i pesci, non altera il contenuto di ossigeno ed il pH dell'acqua.
Dose d'impiego: 80 - 120 kg/ha a seconda della profondità dell'acqua.

5. **Diserbo selettivo delle piante ornamentali**
Cespugli ornamentali : 4 - 6 g/m²
Fino al secondo anno di impianto prestare molta attenzione all'applicazione. Le aiuole di rose vanno diserbate con UNISOL® G solo prima della ripresa vegetativa oppure dopo lo sviluppo completo dell'apparato fogliare.

6. **Diserbo totale di argini di risaie, sedi ferroviarie, argini ed alvei di canali, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, campi da golf**
Contro erbe a riproduzione annuale, è sufficiente una dose di 6 - 8 g/m². In presenza di una flora infestante mista, con malerbe a riproduzione mediante radici e rizomi, la dose d'impiego non deve essere inferiore a 12 g/m².

La natura del terreno e l'andamento climatico incidono in modo determinante sui risultati ottenibili. È indispensabile al riguardo, distribuire l'UNISOL® G in periodi di pioggia o almeno limitarne l'uso su terreni umidi. Risulta importante, inoltre, distribuire il prodotto **uniformemente** e con la massima **regolarità** sulla superficie da trattare. Da non applicare su terreni sabbiosi.

COMPATIBILITÀ
Impiegare l'UNISOL® G da solo.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

® Marchio della CHEMTURA CORPORATION

DL 65/2003

ETICHETTA RIDOTTA

UNISOL® G

GRANULI - Erbicida per il diserbo dei vigneti, frutteti (melo), oliveti, piante ornamentali, argini di risaie, sedi ferroviarie, argini ed alvei di canali, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, campi da golf.

Registrazione del Ministero della Salute n. 11916 del 19/12/2003

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
Diclobenil puro	g 6,75
Coformulanti ed inerti q.b.a	g 100

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
CROMPTON CHEMICAL Srl
Via Pico della Mirandola, 8
Latina Scalo (LT)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

OFFICINA DI PRODUZIONE
CROMPTON EUROPE B.V. - Amsterdam (Olanda)

Distribuito da:
SACOM ambiente &servizi
Via Boscariello, 58 81043 Capua (CE)

Partita n.

Contenuto **g 100**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio della CHEMTURA CORPORATION

DL 65/2003

VITAFLO™

Fungicida sistemico formulato come liquido emulsionabile per la concia delle sementi.

VITAFLO Reg. Ministero della Sanità N. 7107 del 17/06/1987

Composizione:	
Carbossina pura	**g. 14,9 (=166,8 g/l)**
Tiram puro	**g. 13,2 (=147,8 g/l)**
Coformulanti q.b.a	**g.100**

Partita n.

Contenuto:
1-5-10-20 L

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CROMPTON CHEMICAL Srl
Via Pico della Mirandola, 8 - 04013 Latina Scalo (LT)

Officina di produzione:
UNIROYAL CHEMICAL Co. Inc. - Naugatuck, Connecticut (USA)

FRASI di RISCHIO: Irritante per la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Norme precauzionali:
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Carbossina 14,9% - Tiram 13,2% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Carbossina - -----
Tiram - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore pre-cordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Il **Vitaflo** è un fungicida sistemico particolarmente studiato per la concia liquida delle sementi di: frumento, orzo, avena, mais, sorgo, riso, barbabietola da zucchero, fagiolo, soia. Il prodotto unisce l'azione sistemica della Carbossina a quella per contatto dovuta al Tiram.
Il **Vitaflo** è particolarmente efficace nei confronti del carbone volante del frumento (*Ustilago tritici*), dell'orzo (*U. nuda*) e di tutte le altre specie di carboni che attaccano i semi di cereali. Il prodotto risulta altresì efficace contro le varie specie di carie del frumento (*Tilletia tritici, T. foetida, T. controversa*) e degli altri cereali; contro l'*Helminthosporium gramineum* dell'orzo, l'*H. maydis, H. orizae* e *Rhizoctonia solani* del riso e *R. solani, Phoma betae* della barbabietola, *Septoria nodorum* del frumento, *R. solani* del fagiolo e della soia e contro altri parassiti fungini quali *Fusarium* e *Pythium*, che possono attaccare le sementi indicate.

Modalità e dosi d'impiego
Per 100 Kg di seme si impiegano le seguenti dosi:

- frumento e orzo molto infetti	500-600 ml
- frumento e orzo poco infetti	350-450 ml
- segale e avena	300-350 ml
- mais e sorgo	400-450 ml
- riso	450-550 ml
- barbabietola da zucchero	600-700 ml
- soia e fagiolo	300-350 ml

Applicare il prodotto in modo da garantire una uniforme distribuzione sulle sementi. Non impiegare su sementi diverse da quelle indicate.

Prescrizioni in caso di impiego in industrie sementiere.
Effettuare il trattamento in locali ben areati.
In caso di fuoriuscita del prodotto dai recipienti, assorbire con segatura o altri materiali inerti.
I residui derivati dal lavaggio delle attrezzature non devono essere versati in corsi d'acqua.

Compatibilità
Il **Vitaflo** è compatibile con la generalità degli insetticidi e fungicidi impiegati nella concia delle sementi.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività
Il prodotto è nocivo per gli animali domestici e il bestiame.

Avvertenze: I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate, non riutilizzabili, devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DT. 65/2003

VITAVAX™ FLO NF

Fungicida sistemico in formulazione flowable per la concia delle sementi.

VITAVAX FLO NF Reg. Ministero della Sanità N. 7106 del 17/06/87

Composizione:	
Carbossina pura	g. 17,75 (=200 g/l)
Tiram puro	g. 17,75 (=200 g/l)
Coformulanti q.b.a	g.100

Partita n.

Contenuto:
1-5-10-20-200*
400*-500*–1000* L.

CROMPTON CHEMICAL Srl
Via Pico della Mirandola, 8 - 04013 Latina Scalo (LT)

Officine di produzione:
CROMPTON CHEMICAL Srl - Latina Scalo (LT)
UNIROYAL CHEMICAL Co. Inc. - Naugatuck, Connecticut (USA)

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI di RISCHIO: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI:
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Carbossina 17,75% - Tiram 17,75% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Carbossina - -----
Tiram - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore pre-cordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Il **Vitavax Flo NF** è un fungicida sistemico particolarmente studiato per la concia liquida delle sementi di: **frumento, orzo, avena, mais, sorgo, riso, barbabietola da zucchero, fagiolo, soia**. Il prodotto unisce l'azione sistemica della Carbossina a quella per contatto dovuta al Tiram.
Il **Vitavax Flo NF** è particolarmente efficace nei confronti del carbone volante del frumento (*Ustilago tritici*), dell'orzo (*U. nuda*) e di tutte le altre specie di carboni che attaccano i semi di cereali. Il prodotto risulta altresì efficace contro le varie specie di carie del frumento (*Tilletia tritici, T. foetida, T. controversa*) e degli altri cereali; contro *Helmintosporium gramineum* dell'orzo, *H. maydis, H. orizae* e *Rhizoctonia solani* del riso e *R. solani, Phoma betae* della barbabietola, *Septoria nodorum* del frumento, *R. solani* del fagiolo e della soia e contro altri parassiti fungini quali *Fusarium e Pythium,* che possono attaccare le sementi indicate.

Modalità e dosi d'impiego
Per 100 Kg di seme si impiegano le seguenti dosi:

- frumento e orzo molto infetti	450-500 ml
- frumento e orzo poco infetti	300-400 ml
- segale e avena	250-300 ml
- mais e sorgo	350-400 ml
- riso	400-500 ml
- barbabietola da zucchero	500-600 ml
- soia e fagiolo	250-300 ml

Applicare il prodotto in modo da garantire una uniforme distribuzione sulle sementi. Non impiegare su sementi diverse da quelle indicate.

Prescrizioni in caso di impiego in industrie sementiere.
Effettuare il trattamento in locali ben areati.
In caso di fuoriuscita del prodotto dai recipienti, assorbire con segatura o altri materiali inerti.
I residui derivati dal lavaggio delle attrezzature non devono essere versati in corsi d'acqua.

Compatibilità
Il **Vitavax Flo NF** è compatibile con la generalità degli insetticidi e fungicidi impiegati nella concia delle sementi.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività
Il prodotto è nocivo per gli animali domestici e il bestiame.

Avvertenze: I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui i rifiuti tossici.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**
***Attenzione: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Non disperdere nell'ambiente.**
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zone di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoruscite accidentali del prodotto.

* Confezione destinata ad esclusivo uso industriale.
** Non applicabile per le confezioni da 200-400-500-1000 L

™ Marchio registrato della CHEMTURA CORPORATION

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

GRANFORZA

Fungicida sistemico in polvere bagnabile per la concia della semente dell'orzo e degli altri cereali.

GRANFORZA Reg. Ministero della Sanità N. 4583 del 28.12.1981

Composizione:

Carbossina pura	**g. 20**
Maneb puro	**g. 40**
Coformulanti q.b.a	**g.100**

CROMPTON CHEMICAL Srl
Via Pico della Mirandola, 8
04013 Latina Scalo (LT)

Partita n.

distribuito da:
SIAPA Srl - Via Caldera, 21 - Milano

Contenuto:
100-200-500 g 1-5-10-20 Kg.

Officina di produzione:
Crompton Chemical Srl
Via Pico della Mirandola, 8
04013 Latina Scalo (LT)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI di RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Carbossina 20% - Maneb 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Carbossina - -----
Maneb - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore pre-cordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Il **Granforza** è un fungicida impiegato per la concia delle sementi dell'orzo e degli altri cereali (frumento, avena, mais, sorgo). Il prodotto unisce all'azione sistemica dovuta alla Carbossina, che penetra nell'interno delle cariossidi, quella per contatto dovuta al Maneb.
Il **Granforza** è efficace contro l'*Helmintosporium gramineum* dell'orzo, l'*H. avenae* dell'avena, l'*H. maydis* del mais, i carboni coperti dell'orzo (*Ustilago hordei*) e del sorgo (*U. sorghi*), le carie del frumento (*Tilletia caries* e *T. foetida*), il *Fusarium nivale* del frumento e la *Septoria nodorum* del frumento. Il prodotto, inoltre, dà un controllo soddisfacente nei confronti dei carboni nudi del frumento (*Ustilago tritici*), dell'orzo (*U. nuda*) e dell'avena (*U. avenae*).

Dosi e modalità d'impiego
Il **Granforza** si impiega alla dose di 200-250 g per 100 Kg di seme.
Il trattamento può essere effettuato a "secco" mescolando direttamente la polvere con il seme da conciare nel modo più uniforme, oppure con il sistema "slurry". In questo secondo caso al prodotto si aggiunge la quantità di acqua richiesta per ottenere una pasta che verrà meccanicamente spruzzata sul seme.

Attenzione: i semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame.

Compatibilità
Il **Granforza** è compatibile con la generalità degli insetticidi e fungicidi impiegati nella concia delle sementi.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Divieto di impiego in serra
Divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

ETICHETTA RIDOTTA

GRANFORZA

Fungicida sistemico in polvere bagnabile per la concia della semente dell'orzo e degli altri cereali.

GRANFORZA Reg. Ministero della Sanità N. 4583 del 28.12.1981

Composizione:

Carbossina pura	**g. 20**
Maneb puro	**g. 40**
Coformulanti q.b.a	**g.100**

Partita n.

Contenuto: **100 g**

CROMPTON CHEMICAL Srl
Via Pico della Mirandola, 8
04013 Latina Scalo (LT)

distribuito da:
SIAPA Srl - Via Caldera, 21 - Milano

Officina di produzione:
Crompton Chemical Srl
Via Pico della Mirandola, 8
04013 Latina Scalo (LT)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI di RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Carbossina 20% - Maneb 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Carbossina - -----
Maneb - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore pre-cordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

OMITE™ 30 PB

Acaricida in polvere bagnabile

OMITE 30 PB Registrazione del Ministero della Sanità n. 1517 del 12/11/1974

Composizione:
g 100 di prodotto contengono: **Partita n.:**
Propargite pura g 30
Bagnanti e disperdenti q.b. a g 100
Contiene terra diatomacea naturale

Titolare dell'autorizzazione
CROMPTON CHEMICAL Srl
VIA PICO DELLA MIRANDOLA, 8 – 04013 - LATINA SCALO (LT)

Distribuito da: **CASTALDO SpA**
Sede legale: via G.Porzio – Isola G1 Centro Direzionale – 80132 Napoli
Sede amministrativa: via Nazionale delle Puglie (località Salice) – C.P.79 – 80021 Afragola(NA)
AGRIMPORT SpA – via Piani,1 – 39100 Bolzano

Stabilimenti di produzione
CROMPTON CHEMICAL S.r.l. - Via Pico della Mirandola, 8 - Latina Scalo (LT)
A.D.I.C.A. SpA - Via S. Silvestro, 1 - Faenza (RA)
AGRIFORMULA S.r.l. - Paganica (AQ)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto netto: kg 0,100 - 0,500 1 - 5

FRASI di RISCHIO: Possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi - Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al S.N.C.: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare
AVVERTENZA : Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche

L'Omite 30 PB è un acaricida di recente preparazione attivo contro le popolazioni di acari resistenti, da impiegare su **melo, pesco, agrumi, vite, noce, nocciolo, pomodoro, peperone, melanzana, melone, fagiolino**.
Agisce per contatto sulle larve e sugli adulti delle specie di acari vegetali: Tetranichidi (ragnetti rossi, gialli, bruni, rugginosi), Eriofidi, Tarsonemidi.
Possiede un'attività iniziale ed una persistenza di azione tale da uccidere anche le giovani larve nate dopo il trattamento.
Dopo il trattamento gli acari interrompono l'assorbimento della linfa delle piante e muoiono dopo 1-4 giorni dall'irrorazione in funzione della temperatura. In condizione di alte temperature (sopra i 20° C) dove il prodotto esprime la sua maggiore efficacia, gli acari muoiono dopo 1-2 giorni dal trattamento. In presenza di basse temperature invece il prodotto è lento ad agire e gli acari muoiono dopo 3-4 giorni dall'irrorazione. L'impiego dell'Omite 30 PB dà i migliori risultati quando le piante sono completamente bagnate fino allo sgocciolamento.

Modalità e dosi di impiego

L'Omite 30 PB viene impiegato alla dose di 150-200 g/hl nei trattamenti ad alto volume. La dose minore si impiega nei casi di leggera infestazione di acari che sono presenti soprattutto nel periodo primaverile e nei confronti di popolazioni di acari sensibili; la dose maggiore si irrora nei confronti di acari molto resistenti e generalmente in estate in presenza di attacchi massicci. Quando le infestazioni sono gravi è consigliato un secondo trattamento alla distanza di 10-15 giorni dal primo. L'Omite 30 PB può inoltre essere mescolato con acaricidi-ovicidi per avere un risultato completo anche sulle uova.

Preparazione della miscela: Sospendere la dose di prodotto in poca acqua, mescolare fino ad ottenere un fluido omogeneo; versare gradualmente questa poltiglia nel quantitativo totale di acqua richiesto, agitando ripetutamente. L'aggiunta di 30-40 g/hl di un adesivo-bagnante è consigliabile quando l'Omite 30 PB viene impiegato da solo. In miscela con altri prodotti non aggiungere l'adesivo-bagnante.

Compatibilità

L'Omite 30 PB è compatibile con i più comuni prodotti fitosanitari (fungicidi, insetticidi, acaricidi). Incompatibile è invece con i prodotti fortemente alcalini come la poltiglia bordolese, la calce e il solfuro di calcio. In questo caso diminuisce l'efficacia acaricida dell'Omite 30 PB

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Sulla vite l'Omite 30 PB si impiega normalmente: solo in prefioritura si possono rilevare delle ustioni sulle giovani foglie.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

™ Marchio registrato della CHEMTURA CORPORATION

DL 65/2003

ETICHETTA RIDOTTA

OMITE™ 30 PB

Acaricida in polvere bagnabile

OMITE 30 PB Registrazione del Ministero della Sanità n. 1517 del 12/11/1974

Composizione:
g 100 di prodotto
contengono:
Propargite pura g 30
Bagnanti e disperdenti q.b. a g 100
Contiene terra diatomacea naturale

Titolare dell'autorizzazione
CROMPTON CHEMICAL Srl
VIA PICO DELLA MIRANDOLA, 8
04013 - LATINA SCALO (LT)

Distribuito da: **CASTALDO SpA**
Sede legale: via G.Porzio – Isola G1 Centro Direzionale – 80132 Napoli
Sede amm.va: via Nazionale delle Puglie(località Salice) – C.P.79 – 80021 Afragola(NA)

AGRIMPORT SpA – via Piani,1 – 39100 Bolzano

Stabilimenti di produzione
CROMPTON CHEMICAL S.r.l. - Via Pico della Mirandola, 8 - Latina Scalo (LT)
A.D.I.C.A. SpA - Via S. Silvestro, 1 - Faenza (RA)
AGRIFORMULA S.r.l. - Paganica (AQ)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi) kg 0,100 Partita n.:

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI di RISCHIO: Possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi - Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al S.N.C.: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare
AVVERTENZA : Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

™ Marchio registrato della CHEMTURA CORPORATION

DL 65/2003

Etichetta confezioni in sacchetti idrosolubili/foglio illustrativo

OMITE™ 30 PB

Acaricida in polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

OMITE 30 PB Registrazione del Ministero della Sanità n. 1517 del 12/11/1974

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Propargite pura g 30
Bagnanti e disperdenti q.b. a g 100
Contiene terra diatomacea naturale

Titolare dell'autorizzazione
CROMPTON CHEMICAL Srl
VIA PICO DELLA MIRANDOLA, 8
04013 - LATINA SCALO (LT)

Partita n.:

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

Distribuito da: **CASTALDO SpA**
Sede legale: via G.Porzio – Isola G1 Centro Direzionale – 80132 Napoli
Sede amm.va: via Nazionale delle Puglie (località Salice) – C.P.79 – 80021 Afragola (NA)
AGRIMPORT SpA – via Piani,1 – 39100 Bolzano
Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento)
CROMPTON CHEMICAL Srl - Via Pico della Mirandola, 8 - Latina Scalo (**LT**)
Stabilimenti di confezionamento
Bayer CropScence Srl - Via delle Industrie, 9 - Filago (BG)
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via Torricelli, 2 - Cotignola (RA)

Contenuto netto: g 100 (1 s.i. da 100 g); 1 Kg (2 s.i. da 500 g); 1 Kg (5 s.i. da 200 g); 1 Kg (10 s.i. da 100 g); 5 Kg (10 s.i. da 500 g); 10 Kg (100 s.i. da 100 g); 10 Kg (20 s.i. da 500 g); 10 Kg (10 s.i. da 1 Kg)

FRASI di RISCHIO: Possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al S.N.C.: vertigini. atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia : sintomatica. Ospedalizzare
AVVERTENZA : Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
L'Omite 30 PB è un acaricida di recente preparazione attivo contro le popolazioni di acari resistenti, da impiegare su sul melo, pesco, agrumi, vite, noce, nocciolo, pomodoro, peperone, melanzana, melone, fagiolino. Agisce per contatto sulle larve e sugli adulti delle specie di acari vegetali: Tetranichidi (ragnetti rossi, gialli, bruni, rugginosi), Eriofidi, Tarsonemidi. Possiede un'attività iniziale ed una persistenza di azione tale da uccidere anche le giovani larve nate dopo il trattamento. Dopo il trattamento gli acari interrompono l'assorbimento della linfa delle piante e muoiono dopo 1-4 giorni dall'irrorazione in funzione della temperatura. In condizione di alte temperature (sopra i 20° C) dove il prodotto esprime la sua maggiore efficacia, gli acari muoiono dopo 1-2 giorni dal trattamento. In presenza di basse temperature invece il prodotto è lento ad agire e gli acari muoiono dopo 3-4 giorni dall'irrorazione. L'impiego dell'Omite 30 PB dà i migliori risultati quando le piante sono completamente bagnate fino allo sgocciolamento.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
L'Omite 30 PB viene impiegato alla cose di 150-200 g/hl nei trattamenti ad alto volume. La dose minore si impiega nei casi di leggera infestazione di acari che sono presenti soprattutto nel periodo primaverile e nei confronti di popolazioni di acari sensibili; la dose maggiore si irrora nei confronti di acari molto resistenti e generalmente in estate in presenza di attacchi massicci. Quando le infestazioni sono gravi è consigliato un secondo trattamento alla distanza di 10-15 giorni dal primo. L'Omite 30 PB può inoltre essere mescolato con acaricidi-ovicidi per avere un risultato completo anche sulle uova.
Avvertenze d'uso: Nel caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la confezione.

COMPATIBILITÀ
L'Omite 30 PB è compatibile con i più comuni prodotti fitosanitari (fungicidi, insetticidi, acaricidi). Incompatibile è invece con i prodotti fortemente alcalini come la poltiglia bordolese, la calce e il solfuro di calcio. In questo caso diminuisce l'efficacia acaricida dell'Omite 30 PB
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÁ: Sulla vite l'Omite 30 PB si impiega normalmente: solo in prefioritura si possono rilevare delle ustioni sulle giovani foglie.
Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

Sacchetti Idrosolubili: AVVERTENZE PARTICOLARI

Non toccare mai i sacchetti con mani / guanti bagnati

Assicurare a completa pulizia della botte a riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per qualche minuto

Azionare l'agitatore : nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa sì che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

™ Marchio registrato della CHEMTURA CORPORATION
DL 65/2003

Etichetta ridotta per confezioni in sacchetti idrosolubili

OMITE™ 30 PB

Acaricida in polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

OMITE 30 PB Registrazione del Ministero della Sanità n. 1517 del 12/11/1974

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Propargite pura g 30
Bagnanti e disperdenti q.b. a g 100
Contiene terra diatomacea naturale

Titolare dell'autorizzazione
CROMPTON CHEMICAL Srl
VIA PICO DELLA MIRANDOLA, 8
04013 - LATINA SCALO (LT)
Partita n.:

Distribuito da: **CASTALDO SpA**
Sede legale: via G.Porzio – Isola G1 Centro Direzionale – 80132 Napoli
Sede amm.va: via Nazionale delle Puglie (località Salice) – C.P.79 – 80021 Afragola (NA)

AGRIMPORT SpA – via Piani,1 – 39100 Bolzano
Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento)
CROMPTON CHEMICAL Srl - Via Pico della Mirandola, 8 - Latina Scalo (LT)
Stabilimenti di confezionamento
Bayer CropScence Srl - Via delle Industrie, 9 - Filago (BG)
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via Torricelli, 2 - Cotignola (RA)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI di RISCHIO: Possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Contenuto netto:
g 100 (1 s.i. da 100 g)

NORME PRECAUZIONALI: Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al S.N.C.: vertigini. atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia : sintomatica. Ospedalizzare
AVVERTENZA : Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

™ Marchio registrato della CHEMTURA CORPORATION
DL 65/2003

ETICHETTA SACCHETTO IDROSOLUBILE

OMITE™ 30 PB

Acaricida in polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

OMITE 30 PB Registrazione del Ministero della Sanità n. 1517 del 12/11/1974

Composizione: g 100 di prodotto contengono:	
Propargite pura	g 30
Bagnanti e disperdenti q.b. a	g 100

Titolare dell'autorizzazione
CROMPTON CHEMICAL Srl
VIA PICO DELLA MIRANDOLA, 8
04013 - LATINA SCALO (LT)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Stabilimento di produzione
CROMPTON CHEMICAL Srl - Via Pico della Mirandola, 8 - Latina Scalo (LT)
Stabilimenti di confezionamento
Bayer CropScence Srl - Via delle Industrie, 9 - Filago (BG)
STI - Solfotecnica Italiana SpA - Via Torricelli, 2 - Cotignola (RA)

Distribuito da:
CASTALDO SpA
Sede legale: Via G. Porzio – Isola G1 Centro Direzionale – 80132 Napoli
Sede amm.va: Via Nazionale delle Puglie (località Salice) – C.P. 79 – 80021 Afragola (NA)
AGRIMPORT SpA – via Piani,1 – 39100 Bolzano

Contenuto netto: **100-200-500 g 1 Kg** Partita n.:

Avvertenza : leggere l'etichetta riportata sulla confezione.
Da non vendere né conservare fuori della confezione
Da sciogliere in acqua senza rompere

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

GRANOSAN

Fungicida sistemico in polvere bagnabile per la concia della semente dell'orzo e degli altri cereali.

GRANOSAN Reg. Ministero della Sanità N. 10528 del 14/06/2000

Composizione:

Carbossina pura	**g. 20**
Maneb puro	**g. 40**
Coformulanti q.b.a	**g.100**

CROMPTON CHEMICAL Srl
Via Pico della Mirandola, 8
04013 Latina Scalo (LT)

Partita n.

Contenuto:
100-200-500 g 1-5-10-20 Kg.

Officina di produzione:
Crompton Chemical Srl
Via Pico della Mirandola, 8
04013 Latina Scalo (LT)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI di RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Norme precauzionali: Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Carbossina 20% - Maneb 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Carbossina - -----
Maneb - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore pre-cordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Il **Granosan** è un fungicida impiegato per la concia delle sementi dell'orzo e degli altri cereali (frumento, avena, mais, sorgo). Il prodotto unisce all'azione sistemica dovuta alla Carbossina, che penetra nell'interno delle cariossidi, quella per contatto dovuta al Maneb.
Il **Granosan** è efficace contro l'*Helmintosporium gramineum* dell'orzo, l'*H. avenae* dell'avena, l'*H. maydis* del mais, i carboni coperti dell'orzo (*Ustilago hordei*) e del sorgo (*U. sorghi*), le carie del frumento (*Tilletia caries* e *T. foetida*), il *Fusarium nivale* del frumento e la *Septoria nodorum* del frumento. Il prodotto, inoltre, dà un controllo soddisfacente nei confronti dei carboni nudi del frumento (*Ustilago tritici*), dell'orzo (*U. nuda*) e dell'avena (*U. avenae*).

Dosi e modalità d'impiego
Il **Granosan** si impiega alla dose di 200-250 g per 100 Kg di seme. Il trattamento può essere effettuato a "secco" mescolando direttamente la polvere con il seme da conciare nel modo più uniforme, oppure con il sistema "slurry". In questo secondo caso al prodotto si aggiunge la quantità di acqua richiesta per ottenere una pasta che verrà meccanicamente spruzzata sul seme.

Attenzione: i semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame.

Compatibilità
Il **Granosan** è compatibile con la generalità degli insetticidi e fungicidi impiegati nella concia delle sementi.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Divieto di impiego in serra
Divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

ETICHETTA RIDOTTA

GRANOSAN

Fungicida sistemico in polvere bagnabile per la concia della semente dell'orzo e degli altri cereali.

GRANOSAN Reg. Ministero della Sanità N. 10528 del 14/06/2000

Composizione:

Carbossina pura	**g. 20**
Maneb puro	**g. 40**
Coformulanti q.b.a	**g.100**

CROMPTON CHEMICAL Srl
Via Pico della Mirandola, 8
04013 Latina Scalo (LT)

Partita n.

Officina di produzione:
Crompton Chemical Srl
Via Pico della Mirandola, 8
04013 Latina Scalo (LT)

Contenuto: **100 g**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI di RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Norme precauzionali: Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Carbossina 20% - Maneb 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Carbossina - -----
Maneb - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore pre-cordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

ELKAM S.r.l.

HORMO - TAL

FITOREGOLATORE

PRODOTTO AD AZIONE RIZOGENA PER IMPIEGO SU TALEE

COMPOSIZIONE
NAA puro..................g. 10
Solventi.......q.b. a g. 100

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

TIPO DI FORMULAZIONE : Soluzione

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini. S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. S20 Non mangiare, ne bere durante limpiego. S21 Non fumare durante l impiego.

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche: fitoregolatore attivo per azione di stimolazione all emissione di radici nelle talee. Il prodotto viene vantaggiosamente impiegato sia per le talee che mettono radici con facilità aumentando la percentuale di attecchimento, sia per le talee che radicano con difficoltà, dando luogo a barbatelle forti e vigorose.
Colture: per tutti i tipi di talee erbacee e legnose.
Concentrazioni e dosi d'impiego: considerando la grande var età di piante che possono essere trattate con il prodotto, vengono suggerite alcune concentraz oni d impiego assai generiche, lasciando al coltivatore la messa a punto del trattamento a seconda dei moltissimi fattori che influenzano in modo determinante il fenomero della radicazione. Per le talee erbacee si impiegano concentrazioni di 10-50 ppm di p.a.(parti per milione di principio attivo), per le talee legnose concentrazioni di 50-250 ppm di p.a. Si tenga presente che il contenuto di p.a. d el prodotto è di 0,1 g./cc. E che 1 cc di prodotto sciolto in 10 litri d'acqua dà una soluzione alla concentrazione di 10 ppm
Epoche d'impiego: il prodotto può essere usato in ogni stagione a secor da dell'epoca che è più favorevole a ciascuna specie vegetale. Il trattamento non mocifica la normale pratica colturale.

Metodi d'impiego: fra i vari metodi possibili viene descritto quello per immersione come il più comunemente utilizzato. Le talee appena preparate per essere poste nel substrato di radicazione, vengono immerse nella soluzione contenente il prodotto per una lunghezza di 1-2 cm. Lasciandole per un tempo di 14-18 ore o 24 ore, tenendo conto che a una maggiore permanenza deve corrispondere una minore concentrazione. Le talee vengono successivamente estratte, lavate in acqua e poste immediatamente a dimora. La soluzione deve essere preparata di fresco e utilizzata una sola volta. Impiegare preferibilmente recipienti di plastica ben puliti e acqua perfettamente limpida e poco dura.

Compatibilità: il prodotto va impiegato da solo.

Fitotossicità: concentrazioni troppo elevate o permanenze protratte nella soluzione possono danneggiare anche gravemente la talea rendendola inadatta alla radicazione.

Avvertenze: Il prodotto è fotolabile; non esporlo direttamente a forte illuminazione per tempi prolungati. L'azione dei fitoregolatori interferisce sui meccanismi biologici delle piante; i risultati dell'applicazione del prodotto dipendono pertanto da molti fattori inerenti lo stato fisiologico delle piante, le varietà ed anche le situazioni ambientali. E' pertanto impossibile indicare condizioni standardizzate d'impiego, ma solo suggerire indicazioni di massima. Nella pratica i trattamenti andranno messi a punto caso per caso dal coltivatore, con la massima cura.

Attenzione! Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Stabilimento produttore:
ALTHALLER ITALIA s.r.l.
Strada Comunale per Campagna, 5
I-20078 S.Colombano al Lambro (MI)

Registrazione Ministero della Sanità n. 4980 del 25/10/1982

DA NON VENDERSI SFUSO.

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

ELKAM SRL
Via G. Cascino 29 F
97019 Vittoria (RG)

Contenuto: litri 1

ELKAM

CROMPTON UNIROYAL CHEMICAL

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CASORON® G

Erbicida per il diserbo dei vigneti, frutteti (melo), oliveti, piante ornamentali, aree industriali, campi sportivi, ripe e bordi stradali.

GRANULARE

CASORON G Registrazione n. 0993 del 10.10.1972 del Ministero della Sanità

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Diclobenil puro g 6,75
Coformulanti, quanto basta a 100 grammi

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
CROMPTON (UNIROYAL CHEMICAL) REGISTRATIONS LTD
Langley Quay, Slough Berkshire SL3 6EH, Regno Unito

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Officina di produzione
CROMPTON EUROPE B.V.
Amsterdam (Olanda)

Rappresentante per l'Italia:
CROMPTON CHEMICAL S.r.l.
Via Pico della Mirandola, 8 - 04013 Latina Scalo (LT)

Distribuito da:
BAYER CROPSCIENCE Srl
Viale Certosa, 130 - Milano

Contenuto: g 100-g 200-g 300-g 500-kg 1-kg 5-kg 10–kg 15 kg 25- kg 50 Partita n.:

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
CASORON® G è un erbicida efficace contro la maggior parte delle erbe infestanti annuali, biennali e perenni, anche di difficile controllo come Equiseto (*Equisetum spp.*), Stoppione (*Cirsium arvense*), Romice (*Rumex spp.*), Soffione (*Taraxacum officinale*).
La sostanza attiva del CASORON® G viene assorbita dalle radici delle infestanti, in pre-emergenza il CASORON® G agisce sulle infestanti germinanti e sui rizomi. All'inizio della vegetazione le malerbe sono più sensibili all'azione del CASORON® G; è inoltre molto importante distribuire **tempestivamente** il prodotto su terreno umido o in periodi di pioggia.
Il CASORON® G non agisce per via fogliare e perciò non causa alcun danno alle colture nemmeno quando investe gli organi verdi (foglie, rametti).
Per la vite è consigliabile tuttavia evitare di colpire i germogli. Nei vigneti con sistema di allevamento molto basso (tipo alberello, Sylvoz), è pertanto necessario trattare prima che le gemme si gonfino. Il CASORON® G può essere usato tutto l'anno in trattamenti di pre o post-emergenza, al più tardi all'inizio dello sviluppo delle malerbe. L'epoca più favorevole per il diserbo con CASORON® G è però dopo la raccolta e dopo la vendemmia e in primavera, prima o subito dopo l'inizio della vegetazione.
Evitare accumuli di prodotto in vicinanza dei fusti delle piante da frutto e dei ceppi delle viti. Sono particolarmente indicati i trattamenti localizzati in forma di strisce o di aiuole.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Campi e dosi d'impiego

1. **Diserbo selettivo**

VITE (dopo il 4° anno di impianto)

su terreni leggeri e sabbiosi	80 - 100	kg/ha
su terreni pesanti e argillosi	100 - 120	kg/ha
su terreni ricchi di humus	120	kg/ha

MELO (su franco, dopo il 5° anno di impianto)

su terreni leggeri e sabbiosi	80 - 100	kg/ha
su terreni pesanti e argillosi	100	kg/ha
su terreni ricchi di humus	120	kg/ha

OLIVO (dopo il 5° anno di impianto)

su terreni leggeri	80 - 100	kg/ha
su terreni pesanti	100 - 120	kg/ha

2. **Diserbo totale**

Diserbo dei bordi stradali, piazze da gioco, aree di fabbriche e depositi, sedi ferroviarie, spartitraffico di autostrade, argini di canali di irrigazione e drenaggio, ripe.

Dose d'impiego:
80 - 120 kg/ha, a seconda della composizione botanica delle infestanti e del loro sviluppo.

3. **Diserbo localizzato**

Lotta contro cespi di Romice (*Rumex spp.*), Tussilago (*Tussilago farfara*). Consigliamo di distribuire 0,5 g di CASORON® G nella parte centrale del ceppo. Apposite attrezzature di distribuzione facilitano il lavoro.

4. **Diserbo selettivo delle piante ornamentali**

Cespugli ornamentali : 4 - 6 g/m²
Fino al secondo anno di impianto prestare molta attenzione all'applicazione. Le aiuole di rose vanno diserbate con CASORON® G solo prima della ripresa vegetativa oppure dopo lo sviluppo completo dell'apparato fogliare.

5. **Diserbo totale di parchi, giardini, viali e sentieri.**

Contro erbe a riproduzione annuale, è sufficiente una dose di 6 - 8 g/m². In presenza di una flora infestante mista, con malerbe a riproduzione mediante radici e rizomi, la dose d'impiego non deve essere inferiore a 12 g/m².
Impiegare la sera in assenza di pubblico.

La natura del terreno e l'andamento climatico incidono in modo determinante sui risultati ottenibili. E' indispensabile al riguardo, distribuire il CASORON® G in periodi di pioggia o almeno limitarne l'uso su terreni umidi. Risulta importante, inoltre, distribuire il prodotto **uniformemente** e con la massima **regolarità** sulla superficie da trattare. Da non applicare su terreni sabbiosi.

COMPATIBILITÀ
Impiegare il CASORON® G da solo.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Marchio della CHEMTURA CORPORATION

DL n.65/2003

ETICHETTA RIDOTTA

CASORON® G

Erbicida per il diserbo dei vigneti, frutteti (melo), oliveti, piante ornamentali, aree industriali, campi sportivi, ripe e bordi stradali.

GRANULARE

CASORON G Registrazione n. 0993 del 10.10.1972 del Ministero della Sanità

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Diclobenil puro g 6,75
Coformulanti, q. b. a 100 g

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
CROMPTON (UNIROYAL CHEMICAL) REGISTRATIONS LTD
Langley Quay, Slough Berkshire
SL3 6EH, Regno Unito

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Officina di produzione
CROMPTON EUROPE B.V.
Amsterdam (Olanda)
Contenuto: **g 100**

Rappresentante per l'Italia:
CROMPTON CHEMICAL S.r.l.
Via Pico della Mirandola, 8
04013 Latina Scalo (LT)

Distribuito da:
BAYER CROPSCIENCE Srl
Viale Certosa, 130 – Milano
Partita n.:

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio della CHEMTURA CORPORATION

DL n.65/2003

Etichetta / Foglietto illustrativo

DIMILIN®

Polvere bagnabile - Insetticida per ingestione per la difesa delle piante di melo, pero, floricole, forestali ed ornamentali e colture di funghi.

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
Diflubenzuron puro	g 5
Bagnanti, disperdenti ed inerti q. b. a	g 100

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
CROMPTON (UNIROYAL CHEMICAL) REGISTRATIONS Ltd
4, Langley Quay - Slough Berkshire SL3 6EH UK

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Officine di produzione
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A.
Via Siemens 12 - Bolzano
CROMPTON CHEMICAL S.r.l.
Via Pico della Mirandola, 8 - Latina Scalo (LT)

Rappresentata in Italia da:
CROMPTON CHEMICAL S.r.l.
Via Pico della Mirandola, 8
Latina Scalo (LT)

Distribuito da
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA Srl
Via Pontaccio, 10 - Milano

Contenuto g 50 - g 100 - g 200 - g 400 - g 500 kg 1 - kg 5

Registrazione del Ministero della Sanità n. 2454 del31.01.1977

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il DIMILIN® appartiene ad un gruppo di insetticidi di sintesi che inibiscono la deposizione della chitina negli insetti, con conseguente morte in fase di muta.
Il DIMILIN® è efficace sulle colture agrarie contro i microlepidotteri minatori ed i lepidotteri ricamatori del melo, la Carpocapsa, l'Orgyia e la Psilla del pero.
In foresta combatte: **Thaumetopoea pityocampa** (Processionaria del pino), **Lymantria dispar, Rhyacionia buoliana e Pristiphora abietina.**

MODALITÀ D'IMPIEGO
Dosi per 100 litri d'acqua:
Frutticoltura (meli e peri): **contro microlepidotteri** minatori **(Lithocolletis, Cemiostoma)** g 200 - 300. Effettuare il trattamento durante la fase di volo degli adulti, in corrispondenza alla ovideposizione.
Contro i lepidotteri ricamatori (Capua, Archips), Carpocapsa, Orgyia g 400. Trattare durante la deposizione delle uova o in prossimità della loro schiusura.
Contro la Psilla del pero: g 400. Effettuare il trattamento alla schiusura delle uova.
Piante forestali: contro **Thaumetopoea pityocampa, Lymantria dispar, Rhyacionia buoliana, Pristiphora abietina** g 250 - 350. Su tutte le colture effettuare il trattamento in linea di massima durante la ovideposizione o quando le uova stanno per schiudere.
Piante ornamentali (solo in pieno campo) contro Tignole e Nottue g 360 - 600. Su tutte le colture effettuare il trattamento in linea di massima durante la ovideposizione o quando le uova stanno per schiudere.
Colture floricole (solo in pieno campo) contro **bega verde e la bega africana del garofano, nottue, aleurodidi, tignole e agrotidi** g 360-600.
Colture di funghi: contro **Megaselia halterata** (Phoridae) e **Lycoriella auripila** (Sciaridae).

1. **Miscelazione del substrato**
   20 g/m^2 di substrato. Preparare una soluzione che viene poi applicata come spray o con annaffiatoio a getto fine al substrato, al momento della miscelazione. Incorporare completamente ed uniformemente.
2. **Bagnatura dopo l'incassettamento**
   20 g in 2,5 litri di acqua/m^2. Queste quantità sono basate su un normale peso del substrato di 3 tonnellate di substrato/100 m^2 ed avranno una dose di 30 ppm di principio attivo.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è miscibile con prodotti a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 45 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

® Marchio della CHEMTURA CORPORATION

DL n. 65/2003

Etichetta ridotta

DIMILIN®

Polvere bagnabile - Insetticida per ingestione per la difesa delle piante di melo, pero, floricole, forestali ed ornamentali e colture di funghi.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Diflubenzuron puro	g 5
Bagnanti, disperdenti ed inerti q. b. a	g 100

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
CROMPTON (UNIROYAL CHEMICAL) REGISTRATIONS Ltd
4, Langley Quay - Slough Berkshire SL3 6EH UK

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Officine di produzione
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A.
Via Siemens 12 - Bolzano
CROMPTON CHEMICAL S.r.l.
Via Pico della Mirandola, 8 - Latina Scalo (LT)

Rappresentata in Italia da:
CROMPTON CHEMICAL S.r.l.
Via Pico della Mirandola, 8
Latina Scalo (LT)

Distribuito da
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA Srl
Via Pontaccio, 10 - Milano

Contenuto g 50 - g 100

Registrazione del Ministero della Sanità n. 2454 del31.01.1977

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio della CHEMTURA CORPORATION

DL n. 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

DIMILIN® 25 P.B.

POLVERE BAGNABILE

Insetticida per ingestione per la difesa di melo e pero, forestali, floreali ed ornamentali e colture di funghi.

DIMILIN 25 P.B. Reg. Ministero della Sanità N. 4686 del 25/02/82

Composizione
100 gr di prodotto contengono:
Diflubenzuron puro g. 25
Coformulanti q.b.a g.100

Partita n. Contenuto: **0,1 - 0,5 - 1 - 5 Kg.**

CROMPTON (UNIROYAL CHEMICAL) REGISTRATIONS LTD
Langley Quay, Slough Berkshire SL3 6EH, UK

Officina di produzione:
Crompton Europe B.V.
Amsterdam (Olanda)

Rappresentante per l'Italia
CROMPTON CHEMICAL SRL
Via Pico della Mirandola, 8
Latina Scalo (LT)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Distribuito da: **AGRIMPORT SpA** – via Piani,1 – 39100 Bolzano

FRASI di RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: **Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il **DIMILIN® 25 P.B.** appartiene ad un gruppo di insetticidi di sintesi che inibiscono la deposizione della chitina negli insetti, con conseguente morte in fase di muta. Il **DIMILIN® 25 P.B.** è efficace sulle colture agrarie contro i **microlepidotteri minatori** ed i **lepidotteri ricamatori** del melo, la **Carpocapsa**, l'**Orgya** e la **Psilla** del pero. In foresta combatte: **Thaumetopoea pityocampa (Processionaria del pino), Lymantria dispar, Rhyacionia buoliana** e **Pristiphora abietina**.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Dosi per 100 litri di acqua:

Frutticoltura (melo e pero):
Contro **microlepidotteri minatori (Lithocolletis, Cemiostoma) g. 50-60**. Effettuare il trattamento durante la fase di volo degli adulti, in corrispondenza alla ovodeposizione. Contro i **lepidotteri ricamatori (Capua, Archips), Carpocapsa, Orgya g. 80**. Trattare durante la deposizione delle uova o in prossimità della loro schiusura. Contro la **Psilla del pero g. 80**. Effettuare il trattamento alla schiusura delle uova.

Piante forestali: contro **Thaumetopoea pityocampa (Processionaria del pino), Lymantria dispar, Rhyacionia buoliana** e **Pristiphora abietina g. 50-70**.

Su tutte le colture effettuare il trattamento in linea di massima durante la ovodeposizione o quando le uova stanno per schiudere.

Colture ornamentali e floricole in pieno campo: contro **Operophtera brumata, Euproctis chrysorrhoea g. 50-80**. Trattare le colture durante la ovodeposizione o quando le uova stanno per schiudere.

Colture di funghi: contro **Megaselia halterata (Phoridae)** e **Lycoriella auripila (Sciaridae)**.

1. Miscelazione al substrato: 4 g di prodotto per mq di substrato. Preparare una soluzione che viene poi applicata come spray o con annaffiatoio a getto fine al substrato, al momento della miscelazione. Incorporare completamente ed uniformemente.
2. Bagnatura dopo l'incassettamento: 4 g. di prodotto in 2,5 litri di acqua per mq. Queste quantità sono basate su un normale peso del substrato di 3 tonnellate per 100 mq ed avranno una dose di 30 ppm di principio attivo.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

COMPATIBILITÀ

Il **DIMILIN® 25 P.B.** non è miscibile con prodotti a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 45 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

® Marchio della CHEMTURA CORPORATION

DL 65/2003

ETICHETTA RIDOTTA

DIMILIN® 25 P.B.

POLVERE BAGNABILE

Insetticida per ingestione per la difesa di melo e pero, forestali, floreali ed ornamentali e colture di funghi.

DIMILIN 25 P.B. Reg. Ministero della Sanità N. 4686 del 25/02/82

Composizione
100 gr di prodotto contengono:
Diflubenzuron puro g. 25
Coformulanti q.b.a g.100

Partita n. Contenuto: **100 g.**

Officina di produzione:
Crompton Europe B.V.
Amsterdam (Olanda)

CROMPTON (UNIROYAL CHEMICAL) REGISTRATIONS LTD
Langley Quay, Slough Berkshire SL3 6EH, UK

Rappresentante per l'Italia
CROMPTON CHEMICAL SRL
Via Pico della Mirandola, 8
Latina Scalo (LT)

Distribuito da: **AGRIMPORT SpA** – via Piani,1 – 39100 Bolzano

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI di RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

®Marchio della CHEMTURA CORPORATION

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

DU-CASON® G

GRANULI - Erbicida per il diserbo dei vigneti, frutteti (melo), oliveti, piante ornamentali, argini di risaie, sedi ferroviarie, argini ed alvei di canali, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, campi da golf.

DU-CASON G Registrazione n. 2686 del 13.01.1978 del Ministero della Sanità

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
Diclobenil puro	g 6,75
Coformulanti, coloranti ed inerti q. b. a	g 100

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
CROMPTON (UNIROYAL CHEMICAL) REGISTRATIONS LTD
Langley Quay, Slough Berkshire SL3 6EH, UK

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Officina di produzione
CROMPTON EUROPE B.V.
Amsterdam (Olanda)

Rappresentante per l'Italia
CROMPTON CHEMICAL S.r.l.
Via Pico della Mirandola, 8 - Latina Scalo (LT)

Distribuito da:
SIAPA Srl
Via Caldera, 21 - Milano

Contenuto **g 100 - g 200 - g 300 - g 500 kg 1 - kg 5 - kg 10 – kg 15 - kg 25 – kg 50** Partita n

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
DU-CASON® G è un erbicida efficace contro la maggior parte delle erbe infestanti annuali, biennali e perenni, anche di difficile controllo come Equiseto (*Equisetum spp.*), Stoppione (*Cirsium arvense*), Romice (Rumex spp.), Soffione (*Taraxacum officinale*).
La sostanza attiva del DU-CASON® G viene assorbita dalle radici delle infestanti, in pre-emergenza il DU-CASON® G agisce sulle infestanti germinanti e sui rizomi. All'inizio della vegetazione le malerbe sono più sensibili all'azione del DU-CASON® G; è inoltre molto importante distribuire **tempestivamente** il prodotto su terreno umido o in periodi di pioggia.
Il DU-CASON® G non agisce per via fogliare e perciò non causa alcun danno alle colture nemmeno quando investe gli organi verdi (foglie, rametti).
Per la vite è consigliabile tuttavia evitare di colpire i germogli. Nei vigneti con sistema di allevamento molto basso (tipo alberello, Sylvoz), è pertanto necessario trattare prima che le gemme si gonfino. Il DU-CASON® G può essere usato tutto l'anno in trattamenti di pre o post-emergenza, al più tardi all'inizio dello sviluppo delle malerbe.
L'epoca più favorevole per il diserbo con DU-CASON® G è però dopo la raccolta e dopo la vendemmia e in primavera, prima o subito dopo l'inizio della vegetazione.
Evitare accumuli di prodotto in vicinanza dei fusti delle piante da frutto e dei ceppi delle viti. Sono particolarmente indicati i trattamenti localizzati in forma di strisce o di aiuole.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Campi e dosi d'impiego

1. **Diserbo selettivo**

VITE (dopo il 4° anno di impianto)

su terreni leggeri e sabbiosi	80 - 100	kg/ha
su terreni pesanti e argillosi	100 - 120	kg/ha
su terreni ricchi di humus	120	kg/ha

MELO (su franco, dopo il 5° anno di impianto)

su terreni leggeri e sabbiosi	80 - 100	kg/ha
su terreni pesanti e argillosi	100	kg/ha
su terreni ricchi di humus	120	kg/ha

OLIVO (dopo il 5° anno di impianto)

su terreni leggeri	80 - 100	kg/ha
su terreni pesanti	100 - 120	kg/ha

2. **Diserbo totale**
Diserbo dei bordi stradali, piazze da gioco, aree di fabbriche e depositi, sedi ferroviarie, spartitraffico di autostrade, argini di canali di irrigazione e drenaggio, ripe.
Dose d'impiego:
80 - 120 kg/ha, a seconda della composizione botanica delle infestanti e del loro sviluppo.

3. **Diserbo localizzato**
Lotta contro cespi di Romice (*Rumex spp.*), Tussilago (*Tussilago fanfara*). Consigliamo di distribuire 0,5 g di DU-CASON® G nella parte centrale del ceppo. Apposite attrezzature di distribuzione facilitano il lavoro.

4. **Diserbo delle erbe acquatiche**
L'impiego di DU-CASON® G è consigliabile anche per l'eliminazione delle erbe acquatiche, indifferentemente se natanti o sommerse.
Con DU-CASON® G si possono trattare anche i canali di bonifica. Non si consiglia l'applicazione incondizionata del DU-CASON® G nei canali di irrigazione. Il DU-CASON® G è praticamente innocuo per i pesci, non altera il contenuto di ossigeno ed il pH dell'acqua.
Dose d'impiego: 80 - 120 kg/ha a seconda della profondità dell'acqua.

5. **Diserbo selettivo delle piante ornamentali**
Cespugli ornamentali : 4 - 6 g/m²
Fino al secondo anno di impianto prestare molta attenzione all'applicazione. Le aiuole di rose vanno diserbate con DU-CASON® G solo prima della ripresa vegetativa oppure dopo lo sviluppo completo dell'apparato fogliare.

6. **Diserbo totale di argini di risaie, sedi ferroviarie, argini ed alvei di canali, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, campi da golf**
Contro erbe a riproduzione annuale, è sufficiente una dose di 6 - 8 g/m². In presenza di una flora infestante mista, con malerbe a riproduzione mediante radici e rizomi, la dose d'impiego non deve essere inferiore a 12 g/m².

La natura del terreno e l'andamento climatico incidono in modo determinante sui risultati ottenibili. È indispensabile al riguardo, distribuire il DU-CASON® G in periodi di pioggia o almeno limitarne l'uso su terreni umidi. Risulta importante, inoltre, distribuire il prodotto **uniformemente** e con la massima **regolarità** sulla superficie da trattare. Da non applicare su terreni sabbiosi.

COMPATIBILITÀ
Impiegare il DU-CASON® G da solo.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

® Marchio della CHEMTURA CORPORATION

DL n. 65/2003

ETICHETTA RIDOTTA

DU-CASON® G

GRANULI - Erbicida per il diserbo dei vigneti, frutteti (melo), oliveti, piante ornamentali, argini di risaie, sedi ferroviarie, argini ed alvei di canali, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, campi da golf.

DU-CASON G Registrazione n. 2686 del 13.01.1978 del Ministero della Sanità

COMPOSIZIONE	TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE	
100 grammi di prodotto contengono: Diclobenil puro g 6,75 Coformulanti, coloranti ed inerti q. b. a g 100	**CROMPTON (UNIROYAL CHEMICAL) REGISTRATIONS LTD** Langley Quay, Slough Berkshire SL3 6EH, UK	**ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA**
Officina di produzione **CROMPTON EUROPE B.V.** Amsterdam (Olanda) Contenuto **g 100**	Rappresentante per l'Italia **CROMPTON CHEMICAL S.r.l.** Via Pico della Mirandola, 8 Latina Scalo (LT)	Distribuito da: **SIAPA Srl** Via Caldera, 21 – Milano Partita n

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio della CHEMTURA CORPORATION

DL n. 65/2003

DU-DIM® 5 PB

(Polvere bagnabile)

Insetticida per ingestione per la difesa delle piante di melo, pero e forestali.

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
Diflubenzuron puro	g 5
Bagnanti, disperdenti ed inerti q. b. a	g 100

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
CROMPTON (UNIROYAL CHEMICAL) REGISTRATIONS Ltd
4, Langley Quay - Slough Berkshire SL3 6EH UK

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Officina di produzione
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A.
Via Siemens 12 - Bolzano

Rappresentata in Italia da:
CROMPTON CHEMICAL S.r.l.
Via Pico della Mirandola, 8
Latina Scalo (LT)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 2640 del 17.10.1977

Contenuto **kg 1**

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il DU-DIM® 5 PB appartiene ad un gruppo di insetticidi di sintesi che inibiscono la deposizione della chitina negli insetti, con conseguente morte in fase di muta.

Il DU-DIM® 5 PB è efficace sulle colture indicate in etichetta contro i microlepidotteri minatori ed i lepidotteri ricamatori del melo, la Carpocapsa, l'Orgyia e la Psilla del pero.

In foresta combatte: **Thaumetopoea pityocampa** (Processionaria del pino)**, Lymantria dispar, Rhyacionia buoliana e Pristiphora abietina.**

MODALITÀ D'IMPIEGO

Dosi per 100 litri d'acqua:

Frutticoltura (meli e peri): **contro microlepidotteri** minatori **(Lithocolletis, Cemiostoma)** g 200 - 300. Effettuare il trattamento durante la fase di volo degli adulti, in corrispondenza della ovideposizione.

Contro i lepidotteri ricamatori (Capua, Archips), Carpocapsa, Orgyia g 400. Trattare durante la deposizione delle uova o in prossimità della loro schiusura.

Contro la Psilla del pero: g 400. Effettuare il trattamento alla schiusura delle uova.

Piante forestali: contro **Thaumetopoea pityocampa, Lymantria dispar, Rhyacionia buoliana, Pristiphora abietina** g 250 - 350. Su tutte le colture effettuare il trattamento in linea di massima durante la ovideposizione o quando le uova stanno per schiudere.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

COMPATIBILITÀ

Il DU-DIM® 5 PB prodotto non è miscibile con prodotti a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 45 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

® Marchio della CHEMTURA CORPORATION

DL n. 65/2003

AGROWIN BIOSCIENCES S.r.l.

ALLES

Erbicida selettivo del Riso contro il Giavone ed altre infestanti
tipo di formulazione : microgranulare idrodisperdibile

Composizione :
Propanil puro g. 80
coadiuvanti qb a 100

Frasi di Rischio
Può provocare sensibilizzazione per inalazione;
Altamente tossico per gli organismi acquatici

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non respirare le polveri; Non gettare i residui nelle fognature; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza; In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo

AGROWIN BIOSCIENCES srl – Via Monte Grappa, 7 – Bergamo
Officine di produzione : Agform Ltd Maidestone Heath, Blundell Lane, Bursledon, Southampton, Hampshire, S031 1 AA, England
Registrazione n.11507 del 22/11/2002 del Ministero della Salute
kg : 1-5-10-20 Partita n:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi : irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia : sintomatica - Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
L'ALLES è un diserbante che agisce principalmente per contatto ma anche per assorbimento fogliare e radicale contro le seguenti infestanti : Giavone (Echinochloa crus-galli), Zigolo delle risaie (Cyperus difformis), Giunchina (Eleocharis spp.), Giunco fiorito (Butomus umbellatus), Mestolaccia comune (Alisma plantago - aquatica), Palla lisca marittima (Bolboschoenus maritimus), Palla lisca mucronata (Schoenoplectus mucronatus), Sagittaria (Sagittaria spp.), Quadrettone (Scirpus mucronatus), Giavone peloso (Echinochloa phyllopogon), Giavone americano (Echinochloa crus - pavonis).
Viene impiegato sulle seguenti colture :
RISO
il trattamento deve essere effettuato in post - emergenza con risaia in asciutta (togliendo acqua dalle camere 3 - 4 giorni prima del trattamento e con terreno ben livellato) dopo che il riso e i Giavoni sono nati; l'epoca migliore si ha quando la maggioranza dei Giavoni sono compresi nello stadio di seconda e terza foglia sino all'inizio dell'accestimento, mantenendo per 24 ore in asciutta la risaia dopo l'applicazione e poi ripristinando il livello dell'acqua mantenendolo per 6-8 giorni il più alto possibile, poi si riporterà ad un livello più basso.
Eventuali sintomi di fitotossicità (necrosi, ingiallimenti) sulle piantine di riso si risolvono nello spazio di una settimana senza pregiudicare lo sviluppo della coltura. E' consigliabile non trattare se si prevede una pioggia a distanza di 3 - 6 ore e non trattare con piantine bagnate.
Dose d'impiego :
- Giavone con 1-2-3 foglie : kg. 4,250/Ha
- Giavone con 3-4 foglie : kg. 5,500/Ha
- Giavone dalla 4^ foglia all'inizio dell'accestimento : kg. 7,3 - 8 /Ha

impiegando da 500 a 700 litri di acqua per ettaro, con barra di distribuzione che deve essere tenuta il più basso possibile (circa 50 cm da terra).
Nel caso il Giavone cresca con temperature basse, si può avere un apparato fogliare meno sviluppato ed al contrario un apparato radicale più profondo e robusto, in questo caso aumentare le dosi sopraindicate come segue :
- Giavone con 1-2-3 foglie : kg 5,5 / Ha
- Giavone con 3-4 foglie : kg 7,3 / Ha

Compatibilità : non deve essere impiegato in miscela con fertilizzanti o altri prodotti e non deve essere distribuito prima e dopo 5 giorni dall'uso di tali prodotti
Fitotossicità : non trattare in giornate con presenza di vento onde evitare che la nube irrorante giunga a contatto con colture sensibili.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta
"Evitare l'accesso di uomini e animali nelle 24 ore successive al trattamento"
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

AWARD

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)

Insetticida dotato di energica azione di contatto, per ingestione e per inalazione

AWARD
COMPOSIZIONE:
CLORPIRIFOS puro g 40,8 (g/l 480)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per ingestione; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini;
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl
Via Monte Grappa, 7 - Bergamo

Registrazione del Ministero della Salute n° 12026 del 27/02/2004
Contenuto: 0,1-0,2-0,25–0,5-1-5-10 litri Partita n°
Stabilimenti di produzione : Althaller Italia Srl S. Colombano al Lambro (MI) / Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Sintomi:colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare.Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa):astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall' episodio acuto possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità.
Terapia: Atropina ad alte dosi fino alla comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: Consultare Un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE E MODALITA' DI IMPIEGO
AWARD è un insetticida che agisce per contatto, per ingestione e per vapore.
COLTURE ARBOREE: AWARD si impiga alla comparsa dei parassiti sulle colture e alle dosi di seguito riportate, che valgono per trattamenti a volume normale. Nei trattamenti a volume ridotto, per poter distribuire su ogni ettaro la stessa quantità di principio attivo, le dosi di impiego del formulato devono essere proporzionalmente aumentate. **AGRUMI**: contro Cocciniglie, Dialeurodidi (Dialeurodes citri), Aleurodidi (Aleurotrixus floccosus) alla dose di 110 ml/hl d' acqua; contro formiche (Formica argentina) alla dose di 220 ml/hl d'acqua irrorando il terreno cor. 10
hl/ha. **Melo e Pero** : contro Cocciniglie, Carpocapsa, Totricidi ricamatori, Sesamia alla dose di 85-110 ml/hl. **Vite** : contro Tignole alla dose di 85-110 ml/hl. Trattare alla comparsa delle prime larve. **Pesco** : contro Cocciniglie, Tignola oientale (Cydia), Anarsia, Mosca della frutta, alla dose 85-110 ml/hl. **Pioppo** : contro Criptorrinco alla dose di 220 ml/hl.
COLTURE ERBACEE : AWARD si impiega di norma alla comparsa dei parassiti. Salvo quanto diversamente indicato la quantità di acqua da distribuire è di 600-800 litri/ettaro. **Barbabietola da zucchero**:contro Altica e Atomaria alla dose di 850-1100 ml/ha.**Soja**: contro Cimici (Nezara viridula) e Lepidotteri foliari (Vanessa cardui, Choristoneura lafauryana) alla dose di 1,2 l/ha in 800-1000 litri di acqua/ha. Ripetere il trattamento se necessario. **Mais**: contro Piralide e Sesamia: il primo trattamento alla dose di 1-1,2 l/ha, contro la prima generazione, quando la coltura si trova tra 60 e 100 cm di altezza; il secondo trattamento alla dose di 1,2-1,7 l/ha, contro la seconda generazione a fine luglio-agosto. **Patata**: contro Dorifora alla dose di 1,2-1,6 l/ha. Ripetere il trattamento se necessario. **Pomodoro**: contro Dorifora, Piralide e altri lepidotteri alla dose di 850-1100 ml/ha. **Fagiolo e Pisello**: contro Piralidi e altri lepidotteri alla dose di 850-1100 ml/ha. **Carota**: contro Tortricidi ed altri Lepidotteri alla dose di 850-1100 ml/ha. **Cipolla**: contro Tripidi alla dose di 850-1100 ml/ha. **Colture floreali ed ornamentali (in pieno campo ed in serra)**: previo saggio preliminare per accertare la selettività del prodotto sulle varietà e nelle diverse condizioni ambientali (specialmente in serra) contro Aleurodidi, Tripidi, Totricidi, Nottue, Cocciniglie e Oziorrinchi alle dose di 100 ml/hl. **Trattamenti al terreno destinato alla coltura dei Cavoli**: contro Nottue ed altri lepidotteri 850-1100 ml/ha.
LOTTA CONTRO LE NOTTUE: per irrorazione o con esche preparate allo scopo nella lotta contro le nottue che infestano le colture di mais, barbabietola da zucchero, tabacco, soia, girasole, cavoli, fagiolo, pisello, patata, asparago, carota, pomodoro, peperone, melanzana e colture ornamentali e floreali. Trattamenti per irrorazione 850-1100 ml di prodotto per ettaro distribuiti con 800/1000 litri di acqua. Distribuzione di esche 25 ml di prodotto per Kg di esca preparata utilizzando una base di crusca e melasso miscelati. Ditribuire 50 Kg di esca per ettaro. Trattare o distribuire le esche durante le ore serali o comunque durante le ore più fresche della giornata.

COMPATIBILITA' - Il prodotto non è compatibile con polisolfuri di Calcio e di Bario.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' Non effettuare trattamenti sugli agrumi nei mesi compresi tra Gennaio ed Aprile.
RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, il bestiame gli animali domestici ed è altamente tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 120 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER SOIA E GIRASOLE; 60 GIORNI PER AGRUMI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E TABACCO; 30 GIORNI PER MELO, PERO, PESCO, VITE MAIS E PATATA; 21 GIORNI PER POMODORO, CAROTA, CIPOLLA E PEPERONE; 15 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE.

AVVERTENZA: Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante l'apllicazione del prodotto. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

BACK

Fungicida a base di Triadimenol.
FORMULAZIONE: MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione:
Triadimenol puro ....g 5
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio : Nocivo per organismi acquatici; Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AGROWIN BIOSCIENCES srl
Via Monte Grappa, 7 - Bergamo

Officina di Produzione :
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
ADICA srl – Nera Montoro (TR)
Sideco Dr. Schirm GMBH – MEKLENBURGER Strasse 229 – D 23568 Lubek
Reg. n. 10743 Ministero della Salute del 12/03/2001
Contenuto netto : kg. 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 / 5 / 10 / 15 Partita n.:*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti ad alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell' intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L' escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. **AVVERTENZA :** Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
Fungicida appartenente al gruppo dei triazoli, possiede attivita' sistemica, preventiva , curativa ed eradicante contro numerose malattie fungine. La sua rapida penetrazione gli permette di sfuggire ad eventuali piogge dilavanti. Combatte le seguenti malattie fungine: Mal bianco sulle seguenti colture: (dosi riferite a q.le di acqua)
POMODORO – PEPERONE : contro Oidio delle Solanacee g 50 – 100
MELO : contro Oidio g 50 – 80
VITE : contro Oidio g 50 – 100, per trattamenti curativi effettuare 2 – 3 interventi ad intervalli di 7 – 10 giorni di cui il primo all' inizio dell' attacco.
CETRIOLO – MELONE – ZUCCHINO : contro Oidio delle Cucurbitacee g 50 – 100
ORNAMENTALI : contro Oidio g 50 – 100

FRUMENTO – ORZO – AVENA – SEGALE – TRITICALE : contro Oidio e Ruggini a kg 2,5 per ettaro in 600 – 800 litri di acqua trattando alla prima comparsa dei sintomi.

Compatibilità : non compatibile con prodotti alcalini.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti : 14 giorni prima della raccolta di vite, peperone, cetriolo, melone, pomodoro, melo; 7 giorni per lo zucchino; 30 giorni per frumento, orzo, avena, segale, triticale.

NOCIVITA' : nocivo per gli animali domestici e bestiame, insetti utili, pesci ed api

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura;nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

BACK COMBI

fungicida a base di Triadimenol e Zolfo
Tipo di formulazione : polvere bagnabile

Composizione
- Triadimenol puro g. 2,5
- Zolfo puro............ g. 50
  (esente da selenio)
- coformulanti qb a g. 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle;
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl – Via Monte Grappa, 7 – Bergamo
Stabilimento produttore : CHEMIA spa – S.Agostino (FE)
Registrazione n. 11912 Ministero della Salute del 15/10/2004
Kg. 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-15-20-25

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive : TRIADIMENOL 2,5%, ZOLFO 50% le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione :
TRIADIMENOL : Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su basa allergica (da semplici dermatiti a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica.
ZOLFO : --
Terapia : sintomatica. - Consultare un centro antiveleni.

CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
Fungicida sistemico e di contatto con attività preventiva, curativa ed eradicante contro numerose malattie fungine; indicato sulle seguenti colture per combattere **l'Oidio o Mal Bianco** e **le Ruggini** di :
VITE - CETRIOLO - MELONE - PEPERONE - POMODORO – FRUMENTO – ORZO – AVENA – SEGALE – TRITICALE - ZUCCHINO - MELO - PIANTE ORNAMENTALI : g. 100 - 200 per q.le acqua
Impiegare la dose più alta in caso di maggiore sensibilità varietale in zone soggette ad attacchi di Oidio o con intervalli, tra i trattamenti, superiori ai 10 giorni. Non trattare durante le ore più calde.

COMPATIBILITA': tra il trattamento con il prodotto e l'impiego di olii minerali attendere 2 settimane. **AVVERTENZA** : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di vite, cetriolo, melo, peperone, melone, pomodoro, 7 giorni per lo zucchino, 30 giorni per frumento, orzo, avena, segale e triticale.
Fitotossicità : il prodotto può risultare fitotossico sulle seguenti varietà di mele : Stayman (Winesap), Granny Smith, Starking, Renetta. Sulla Vite e fitotossico sulla Cv. Sangiovese.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

BLICK

INSETTICIDA – LIQUIDO SOLUBILE

COMPOSIZIONE: g 100 di prodotto contengono
Metomil puro g 18,4 (g/l 195)
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Molto tossico per ingestione; Irritante per gli occhi e la pelle; Tossico per organismi acquatici; Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl - Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Stabilimenti di produzione : S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A., Via Pian d'Asso - Torrenieri (SI) / ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI) / CHEMIA Spa S.Agostino (FE) / SAPEC AGRO S.A. Setubal Portogallo
Registrazione del Ministero della Salute n°11109 del 06/12/2001
Riferimento partita: CONTENUTO: ℓ 0,5-1-5-10

NORME PRECAUZIONALI - Conservare il recipiente ben chiuso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - *Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo, vomito, diarrea; bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: Atropina. Controindicazioni: Ossime.* ***Avvertenza: Consultare Un Centro Antiveleni***

CARATTERISTICHE - BLICK è un insetticida che agisce in modo sistemico per contatto ed ingestione; possiede un forte potere abbattente con rapido ed esteso controllo degli attacchi degli insetti, possiede inoltre una limitata azione residua che ne permette l'impiego a breve distanza dalla raccolta.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

colture	parassiti	dosi/hl di acqua
MELO – PERO	afidi, larve 1° stadio di lithocolletis e leucoptera, le larve dei racamatori quali pandemis, eulia, archips, carpocapsa pomonella, capua reticulana, cacoecia padana, orgya antigua	ml 200-250
DRUPACEE (pesco, susino, ciliegio, albicocco) E MANDORLO	cydia molesta, diaspis pentagona, tignola, afidi, anarsia	ml 200
VITE DA VINO – VITE DA TAVOLA (dose massima: g 400 s.a./ha, numero massimo di applicazioni: 2	tignola, tignoletta, afidi	ml 200-250
OLIVO – AGRUMI	cocciniglia mezzograno di pepe (saisseria oleae) e le cocciniglie in genere	ml 200-250
POMODORO – MELANZANA – PEPERONE	nottue, aleurodidi, cavolaia, afidi	ml 200
CUCURBITACEE	afidi, nottue, aleurodidi	ml 200
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	afidi, cleono, nottue, altica	ℓ 2,5/ha in 750-1000 ℓ d'acqua
CAVOLI BROCCOLI, CAVOLI DI BRUXELLES, CAVOLO BIANCO, CAVOLO ROSSO, CAVOLO VERZA, CAVOLI A FOGLIA – LATTUGA	nottue, cavolaie, afidi	ml 200
FAGIOLO – PISELLO	larve di lepidotteri	ml 200
TABACCO – ORNAMENTALI E FLOREALI (solo in pieno campo)	nottue, tortricidi, afidi, tripidi e le larve di lepidotteri	ml 200-250
PIOPPO	afidi e lepidotteri	ml 400-600

COMPATIBILITA' - Il BLICK non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti prima della raccolta 14 giorni su lattuga – su vite da tavola 30 giorni - 10 giorni su tutte le altre colture
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Attenzione : data l'elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego é consentito esclusivamente al personale qualificato munito di autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23/04/2001

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO;NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA;DA NON VENDERSI SFUSO;SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

BUZZY

Diserbante selettivo per le colture di patata, pomodoro, soia, asparago ed erba medica
GRANULI IDRODISPERSIBILI

Partita n.:*

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Metribuzin puro..................g 35
Coformulanti q.b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl
Via Monte Grappa, 7 - Bergamo

Officina di Produzione : S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A., Via Torricelli, 2 - Cotignola (RA) / A.D.I.C.A – Nera Montoro (TR)
Officina di Confezionamento : S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A., Via Pian d'Asso - Torrenieri (SI)
Registrazione n.10713 del Ministero della Salute del 15/02/01
Contenuto netto : g 500 kg 1 - 5 - 10

Informazioni per il medico
Sintomi : organi interessati : occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo :dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia : Sintomatica - **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE

BUZZY è un diserbante selettivo che controlla infestanti mono e dicotiledoni annuali applicabile in pre e post-emergenza delle infestanti. Agisce sia per assorbimento fogliare sia sui semi in fase di germinazione e sulle plantule.

Le infestanti controllate sono le seguenti :

- MONOCOTILEDONI ANNUALI
Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Fienarola comune (*Poa annua*), Loglio (*Lolium spp.*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*)
- DICOTILEDONI ANNUALI :
Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*),Anagallide (*Anagallis arvensis*), Borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Canapa (*Galeopsis spp.*), Centocchio (*Stellaria media*), Cicerbita (*Sonchus oleraceus*), Erba calderina (*Senecio vulgaris*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Erba storna (*Thlaspi arvense*), Euforbia (*Euphorbia spp.*), Farinaccio (*Chenopodium album*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*), Papavero comune (*Papaver rhoeas*), Poligoni (*Poligonum spp.*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*)

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

PATATA :

a) TRATTAMENTO IN PRE-EMERGENZA........................... 0,7-1 kg/ha
in 500-700 litri d'acqua, impiegando la dose minore nei terreni leggeri e quella maggiore in quelli pesanti, escludendo i terreni sabbiosi.

b) TRATTAMENTO IN POST-EMERGENZA......................... 0,4-0,5 kg/ha
in 500-700 litri d'acqua , riservando la dose maggiore ai terreni pesanti.

Il prodotto si è dimostrato perfettamente tollerato dalle seguenti varietà di patata: Admirandus, Alkumaria, Apollo, Arsy, Bea, Bintje, Cardinal, Desiree, Favorita, Humalda, Kennbec, Majestic, Monnalisa, Primura, Resy, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal.

POMODORO :

a) TRATTAMENTO IN PRE-SEMINA.................................. 0,4-0,6 kg/ha
in 500-700 litri d'acqua, intervenendo 7-14 giorni prima della semina sul terreno già preparato senza interrare

b) TRATTAMENTI DI POST-EMERGENZA E POST-TRAPIANTO.. 0,5-1 kg/ha
riservando la dose maggiore ai terreni pesanti e intervenendo dopo il diradamento o dopo che le piantine hanno superato la crisi di trapianto. Al momento del trattamento le piantine devono aver differenziato almeno 8-9 foglie (pre-fioritura).

SOIA :

TRATTAMENTI IN PRE-SEMINA / PRE-EMERGENZA............ 0,5-0,7 kg/ha
evitando di trattare in terreni molto leggeri o torbosi.

ASPARAGO :

TRATTAMENTI IN PRE-EMERGENZA .... 1-1,5 kg/ha
con 600 litri di soluzione, in asparagiaie di almeno 2 anni.

ERBA MEDICA :

Terreni leggeri.. 1 kg/ha
Terreni di medio impasto, pesanti e molto pesanti........... 1,5 kg/ha
con 500-700 litri d'acqua intervenendo in autunno dopo l'ultimo sfalcio, quando la coltura è entrata in riposo vegetativo a seguito delle prime brinate.

Avvertenza generale : eseguire il trattamento in giornate senza vento, avendo cura di distribuire uniformemente la soluzione su tutta la superfice da trattare, evitando sovrapposizioni e di raggiungere le colture adiacenti. A lavoro ultimato lavare accuratamente pompe e recipienti usati per la preparazione della soluzione.

COMPATIBILITÀ

Per alcune colture (medica) il prodotto può essere miscelato solamente con alcuni altri diserbanti a reazione neutra per aumentare il campo di azione contro le infestanti.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non effettuare il diserbo su pomodoro in serra e sotto tunnel e nei terreni molto leggeri; non intervenire in pre-semina del pomodoro nei seguenti casi : a) qualora si usi un quantitativo di seme inferiore a 2,5 kg/ha in quanto la coltura risulterebbe più sensibile in caso di repentini abbassamenti di temperatura; b) nei cosiddetti "terreni bianchi" che formano la crosta al momento dell'emergenza delle piantine. Per l'intervento in post-emergenza o post-trapianto su pomodoro, attenersi alle seguenti norme : a) in caso di necessità di irrigazione al momento del diserbo eseguirla almeno 6-7 giorni prima del trattamento diserbante; b) non diserbare una coltura sofferente (ad esempio per siccità, alte o basse temperature, ristagni d'acqua); c) le eventuali fresature devono essere superficiali per non danneggiare l'apparato radicale del pomodoro e devono essere eseguite 5-10 giorni prima del trattamento. Per quanto riguarda la patata, non effettuare il trattamento su Draga, Jarla e Vivax in quanto si sono dimostrate sensibili al prodotto.

Sospendere i trattamenti : 30 giorni prima del raccolto per pomodoro e 60 giorni prima della raccolta per le altre colture.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

CHARGE

Fungicida organico - tipo di formulazione : emulsione acquose

composizione
- Prochloraz puro g. 35,9 (= 400 g/lt)
- coformulanti qb a 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Nocivo per ingestione; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl
Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Registrazione Ministero della Salute n° 11896 del 21/11/2003
stabilimento di produzione : Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)
litri 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15-20-25 Partina n: :

INFORMAZIONI PER IL MEDICO *: Sintomi : nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea), deprime il SNC e la respirazione: possibili effetti epatici. Terapia : sintomatica. Consultare un centro antiveleni.*

MODALITA' D'IMPIEGO
Il CHARGE è un fungicida curativo e preventivo con azione di contatto e translaminare, viene impiegato sulle seguenti colture :
FRUMENTO - ORZO : contro le malattie del piede ed anche della parte aerea quali Cercosporella h., Oidio, Rhyncosporium s., Fusarium spp., Septoria n., Helminthosporium spp., Alternaria spp., ecc. alla dose di litri 1,2 - 1,5 per ettaro in 400 - 600 litri di acqua, con trattamenti tra la fine dell'accestimento e la fioritura. Nel caso di infezioni notevoli di Cercosporella h. elevare la dose a lt 1,5 - 2 per ettaro. Per controllare anche le Ruggini ed aumentare l' azione contro l' Oidio, fare miscele estemporanee con prodotti a base dei principi attivi quali Carbendazim e con CHARGE alla dose di litri 1-1,2.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO : controlla l'Oidio e la Cercospora a litri 2 per ettaro in 400 -600 litri di acqua, trattando in modo preventivo. Si possono effettuare massimo due trattamenti all'anno.
FLORICOLE - ORNAMENTALI
contro i marciumi del colletto e nell'apparato radicale (Verticillium, Fusarium, Sclerotinia) immergere le talee ed i bulbi di gladiolo, tulipano ed ixia in una soluzione di ml. 50 – 100 per hl di acqua, su rosa e garofano contro i sopraindicati marciumi, oidio e muffa grigia il prodotto può essere impiegato anche per la disinfezione del terreno alla dose di 15 ml per 100 mq o per trattamenti fogliari alla dose di ml 50 – 100 per hl di acqua.
CONCIA SEMENTI (frumento - sorgo - riso - mais - orzo)
contro le malattie del piede quali Helminthosporium spp., Cercosporella h., Cochliobolus spp., Fusarium spp., Septoria tritici, Rhizoctonia spp., ecc., a g. 40 - 50 per q.le di seme, avendo cura di rimescolare accuratamente. Nella concia del riso si possono fare pregerminare le cariossidi e quindi immergerle per 24 ore in una soluzione contenente g. 30 - 40 di prodotto per q.le acqua. I semi trattati non possono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame, ma debbono essere inviati allo smaltimento secondo le norme di legge riguardanti i prodotti tossici.
FUNGHI COLTIVATI: contro Verticillium spp., Cladobotryum dendroides, Tricoderma viridis, Mycogone perniciosa ecc. alla dose di g. 3 per ogni mq 5 - 7 giorni dopo la copertura del composto (si può intervenire sia in grotta che in capannone). I trattamenti debbono generalmente coincidere con l'irrigazione, usando le attrezzature meccaniche a bassa pressione per poter impiegare litri 1 - 2 di acqua per ogni mq.

COMPATIBILITA': può miscelarsi ai prodotti diserbanti ormonici impiegati sui cereali alla stessa epoca (2,4-d, MCPA, Mecoprop)- Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. "Nelle fasi di caricamento e di semina delle sementi trattate utilizzare indumenti protettivi e guanti"
Fitotossicità : il prodotto è selettivo per le varietà di funghi coltivati prataiolo (Agaricus bisporus, Agaricus bitorquis) e nei confronti del micelio che sui funghi in attiva crescita.
Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta dei cereali, 20 giorni prima della raccolta della barbabietola da zucchero e 10 giorni prima della raccolta dei funghi.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni provocati dall'uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

DALARICE

Erbicida sistemico per la lotta contro il riso crodo.
Formulazione in polvere solubile

DALARICE
Composizione
-Dalapon puro g. 85
-Coformulanti qb a g. 100
FRASI DI RISCHIO :
Nocivo per ingestione; Irritante per la pelle; Rischio di gravi lesioni oculari; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservarelontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl – Via Monte Grappa, 7 – Bergamo
OFFICINA DI PRODUZIONE: SCAM srl – Modena / FLATEX AGRO LTD Krasnogo Majaka STR 17 -113570 MOSCOW – RUSSIAN FEDERATION / PT Biosciences Manufacturing Industries Tanjung Uncang, Batam, Indonesia
Registrazione n. 9.348 del 15/09/1997 del Ministero della Salute
Confezioni : kg 0,1-0,5-1-5-10-15-20 Partita n. : .....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi : irritante delle mucose, nausea. Terapia sintomatica. - Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ' DI IMPIEGO
Generalità : Il DALARICE è un diserbante sistemico, indicato per la lotta – nella coltura del riso – contro il Riso crodo.
Agisce per assorbimento fogliare, con azione lenta, ma graduale, determinando l'arresto vegetativo delle infestanti.
MODALITÀ' DI APPLICAZIONE:
DALARICE deve essere utilizzato con un trattamento in presemina anticipata seguendo la tecnica della "falsa semina" per favorire la germinazione dell' infestante:

- Introdurre un sottile strato di acqua sul terreno pronto per la semina in modo da favorire la germinazione del riso crodo;
- Quando l' infestante e' allo stadio di 2 foglie vere, togliere l' acqua dalla risaia ed effettuare il trattamento su terreno asciutto;
- Dopo 3-4 giorni senza effettuare altre lavorazioni effettuare la semina del riso con risaia allagata. Per ottenere i migliori risultati effettuare il trattamento su infestanti ben sviluppate.

DOSI DI IMPIEGO
DALARICE si utilizza alla dose di **11-14 kg/ha** in 300-400 litri di acqua. Versare la dose del prodotto necessario in meta' dell' acqua e poi agitando con cura aggiungere l' altra meta' di acqua.

"NON RIENTRARE NELLE ZONE TRATTATE PRIMA DI 24 ORE"

COMPATIBILITÀ: Il DALARICE è miscibile con tutti i diserbanti impiegati sulle colture indicate purché non alcalini.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza pù lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE : Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone, alle piante ed agli animali

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

DAMIT

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE
PER LA DIFESA DEL MELO E DEL PERO, DELLE PIANTE FORESTALI ED ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Diflubenzuron puro g 5
Bagnanti, disperdenti e inerti q. b. a 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche - Il DAMIT provoca la morte degli insetti in fase di muta. E' efficace contro i microlepidotteri minatori e i lepidotteri ricamatori del melo; la Carpocapsa, l'Orgia e la Psilla del pero. Sulle piante forestali combatte la Processionaria del pino, la Limantria dispari, Pristifora abietina.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Meli e peri - g 200-300 per ettolitro di acqua, contro Cemiostoma e Litocolletis, intervenendo nella fase dell'ovodeposizione;
-g 400 per ettolitro di acqua contro la Psilla del pero nella fase della schiusura delle uova;
-g 400 per ettolitro di acqua contro Orgia antiqua, Capua reticulana, Carpocapsa, durante la deposizione delle uova.
Piante forestali e ornamentali in pieno campo - g 250-350 per ettolitro di acqua, contro Processionaria del pino, Limantria dispari, Pristifora abietina, intervenendo durante l'ovodeposizione.

COMPATIBILITA'- Il DAMIT è miscibile con tutti i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 45 giorni prima del raccolto
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AGROWIN BIOSCIENCES srl – Via Monte Grappa, 7 – Bergamo
Stabilimento di produzione : A.D.I.C.A. srl – Nera Montoro (TR) / STI -SOLFOTECNICA ITALIANA spa – Cotignola (RA) / Terranalisi srl – via N.Bixio, 6 – Cento (FE)
Registrazione del Ministero della Salute n. 11187 del 5/2/2002
CONTENUTO: g 100-200-500 Kg 1-5-10-20
Riferimento partita:

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

DAMIT

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI
PER LA DIFESA DEL MELO E DEL PERO, DELLE PIANTE FORESTALI ED ORNAMENTALI
IN PIENO CAMPO

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Diflubenzuron puro g 5
Bagnanti, disperdenti e inerti q. b. a 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche - Il DAMIT provoca la morte degli insetti in fase di muta. E' efficace contro i microlepidotteri minatori e i lepidotteri ricamatori del melo; la Carpocapsa, l'Orgia e la Psilla del pero. Sulle piante forestali combatte la Processionaria del pino, la Limantria dispari, Pristifora abietina.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Meli e peri - g 200-300 per ettolitro di acqua, contro Cemiostoma e Litocolletis, intervenendo nella fase dell'ovodeposizione;
-g 400 per ettolitro di acqua contro la Psilla del pero nella fase della schiusura delle uova;
-g 400 per ettolitro di acqua contro Orgia antiqua, Capua reticulana, Carpocapsa, durante la deposizione delle uova.
Piante forestali e ornamentali in pieno campo - g 250-350 per ettolitro di acqua, contro Processionaria del pino, Limantria dispari, Pristifora abietina, intervenendo durante l'ovodeposizione.
COMPATIBILITA'- Il DAMIT è miscibile con tutti i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 45 giorni prima del raccolto
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AGROWIN BIOSCIENCES srl – Via Monte Grappa, 7 – Bergamo
Stabilimento di produzione : S.T.I. Solfotecnica Cotignola (RA)/ Chemia Spa S. Agostino (FE)
Registrazione del Ministero della Salute n. 11187 del 5/2/2002 - Riferimento partita:
Contenuto del sacchetto : kg 1 (1x1) (0,5x2) (0,25x4) (0,2x5)

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. - NON TOCCARE CON MANI BAGNATE - DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE L'INVOLUCRO - DA NON VENDERE, NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE ORIGINALE

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

20% 25%

1 Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua

2 Introdurre il numero di sacchetti idrosolubili chiusi, previsti (come da etichetta) nell'atomizzatore

3 Mettere in funzione l'agitatore

4 Attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti), ed........

5 ....aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

DIAMOND

Acaricida in formulazione di sospensione concentrata

Partita n.:*

COMPOSIZIONE
-Clofentezine puro g. 42 (= 500 g/l)
-Coformulanti qb a 100

Frasi di Rischio
Irritante per la pelle; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl – Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Officina di produzione : CHEMIA spa - S.Agostino (FE) / SCAM srl – Modena
Officina di confezionamento : ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI)/Torre srl Via Pian d' Asso – Torrenieri (SI)
Registrazione n. 10767 del 23/03/02 del Ministero della Salute
Litri 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10

INFORMAZIONI PER IL MEDICO *: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.*

MODALITA' D'IMPIEGO
Il DIAMOND è un acaricida in formulazione di sospensione concentrata che agisce per contatto sulle uova (sia invernali che estive) e nei primi stadi (larve) degli Acari Tetranichidi (Panonychus ulmi, Panonychus citri, Tetranychus urticae, Eotetranichus carpini), con azione translaminare e duratura nel tempo.
Il prodotto può essere miscelato con acaricidi adulticidi nel caso, al momento del trattamento, vi siano popolazioni di acari in diversi stadi di sviluppo; il prodotto non interferisce negativamente sugli insetti ed acari utili (antocoridi, crisopidi, coccinellidi, sirfidi, imenotteri, fitoseidi) per cui è consigliato nei programmi di lotta guidata.
VITE (Solo uva da vino) : trattare alla dose di ml 20 - 25 / hl, in miscela con un prodotto avente azione adulticida in presenza di forme mobili di Panonychus ulmi, (con germogli lunghi 5-30 cm), nel caso di successive infestazioni di Ragno rosso e giallo trattare subito con pochissimi ragni per foglia. Se si vuole combattere l' Eotetranichus carpini trattare a ml. 25 - 30 ml/hl.
MELO - PERO – PRUGNE : il trattamento sulle uova invernali di Panonychus ulmi, viene effettuato alla dose di ml. 40/hl, ogni 10 - 15 giorni e prima della schiusura delle uova; se si aggiunge olio bianco su può diminuire la dose a ml 30/hl, oppure trattare, sulle forme mobili (Ragno Rosso), impiegando il prodotto alla dose di 30 ml/hl in miscela con un prodotto adulticida, nell'epoca della post - fioritura o al massimo quando vi sono da 1 a 3 acari per foglia.
AGRUMI : contro il P.citri, intervenire all'inizio dell'infestazione alla dose di ml 30 ml/hl in miscela con un adulticida; se si ha T. urticae elevare al dose a 40 ml/hl più un prodotto adulticida.
MELONE - FRAGOLA - POMODORO -
FLORICOLE ED ORNAMENTALI IN SERRA ED IN CAMPO
contro T.urticae in pre - fioritura a ml 40/hl insieme ad un prodotto adulticida; se si tratta precocemente, a ml 50 - 60/hl, non si ha la diffusione del fitofago sino all'epoca della maturazione
AVVERTENZE : rispettare le norme d'impiego anche per contrastare i ceppi resistenti. In caso di presenza di ceppi resistenti si deve risorrere all'impiego di un prodotto acaricida alternativo.
Quando si tratta la pianta deve essere completamente bagnata (impiegare 1500 - 2000 litri di acqua per ettaro con pompe a volume normale e litri 500 nei trattamenti a basso volume, ovviamente in questo caso la dose del prodotto deve essere diminuita, ma non oltre alla dose di 400 - 500 ml per ettaro). Non trattare in presenza di vento e con alte temperature e bassa umidità.

COMPATIBILITA' : compatibile con olio bianco e rame ossicloruro e una precedente irrorazione di polisolfuro non compromette l'azione acaricida del prodotto. Non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : su qualunque cultivar poco note o da poco introdotta effettuare saggi preventivi.
sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto di pomodoro, melone e fragola, 30 giorni prima del raccolto delle altre colture.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Informazioni per il medico:
Fenitrotion : colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa) : nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa) : astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali : confusione, atassia, convulsione, coma. Cause di morte : generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). Terapia : atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza : Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche : DONNER è un insetticida-ovicida a bassa tossicità ed ampio spettro d'azione, impiegabile su un gran numero di colture arboree ed erbacee Grazie alla tecnologia di microincapsulazione, libera progressivamente il principio attivo, rendendo così l'azione insetticida costante e duratura nel tempo. Il prodotto, possiede anche un'azione acaricida.

Dosi e modalità d'impiego :
- **Vite,** contro :
  - Tignole ....160 – 190 ml /hl
    all'inizio della fase crescente delle catture, dopo 7-13 giorni oppure alla comparsa di uova o fori di penetrazione
  - Tripidi....300 ml/hl
    ai primi sintomi, dopo il germogliamento
  - Cicaline ....300 ml/hl
    a inizio infestazione (2 forme mobili/foglia)
- **Pomacee,** contro :
  - Carpocapsa....190 ml/hl
    al superamento della soglia di 2 adulti/trappola catturati in 1-2 settimane
  - Psille, Afidi e Tentredini ....190 ml/hl
    ai primi sintomi di infestazione
- **Fragola,** contro :
  - Eulia, Pandemis e Afidi....160 – 190 ml/hl
    ai primi sintomi di infestazione
- **Drupacee,** contro :
  - Anarsia ....170 – 190 ml/hl
    7 catture per trappola/settimana, intervenendo dopo 15 giorni per la prima generazione, 6 giorni per le successive
  - Cydia....170 – 190 ml/hl
    10 catture per trappola/settimana, intervenendo dopo 7-8 giorni per la seconda generazione, 4-6 giorni per le successive
  - tripidi, Cocciniglie e Afidi....170 – 190 ml/hl
    ai primi sintomi di infestazione
- **Agrumi,** contro :
  - Cocciniglie, Afidi, Tripidi, Mosca della frutta ....190 – 250 ml/hl
    nel corso della migrazione delle neanidi (2 trattamenti distanziati 10-12 giorni); per la mosca ad inizio infestazioni
- **Castagno,** contro : Afidi e Carpocapsa....170 – 190 ml/hl
- **Mandorlo, Noce, Nocciolo,** contro :
  - Afidi, Carpocapsa, Lecanio e Altica....170 – 190 ml/hl
- **Olivo,** contro :
  - Mosca, Tignola, Margaronia, Cocciniglie....190 ml/hl
    Intervenire ai primi sintomi di infestazione. Nel corso della migrazione delle neanidi 2 trattamenti distanziati di 10 – 12 giorni

DONNER

Insetticida polivalente a bassa tossicità
Sospensione di capsule

DONNER

Partita n.:*

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Fenitrotion puro ......g37,5 (= 400 g/l)

Coformulanti q.b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl
Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Officina di Produzione :
Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46

Registrazione n.11562 Ministero della Salute del 22/01/2003

Contenuto netto : ml 100 200-250-500; Litri 1 2,5 5 10-15-20

- **Ortaggi,** contro :
  - Afidi, Cavolaie, Cassidc, Vanessa, Depressaia, Criocera, Tipule, Nottue, Piralide, Dorifora, Punteruolo, Tignole, Mosca .... 160 – 190 ml/hl
    alla comparsa dell'infestazione
- **Patata,**contro : Dorifora.... 160 – 190 ml/hl
- **Cereali** , contro :
  - Afidi, Lema, Coppette e Chironomi.... 1,5 – 2 l/ha
- **Barbabietola da zucchero,** contro :
  - Altica, Cleono, Lisso e Casside.... 250 – 310 ml/hl
    alla comparsa delle erinosi fogliari
- **Erba medica,** contro Misurino .... 160 – 190 ml/hl
- **Tabacco,** contro : Afidi e Nottue.... 160 – 190 ml/hl
- **Floreali, Ornamentali e Forestali** , contro :
  - Mosche, Tripidi e Cocciniglie .... 125 ml/hl
    alla comparsa delle infestazioni
- **Pioppo,** contro :
  - Tarlo vespa , Saperda e Afide lanigero .... 125 ml/hl

Il prodotto si impiega con attrezzature a volume normale aventi ugelli e filtri con fori di diametro non inferiore a 0,30 mm (50 mesh).
Preparazione della miscela : agitare e mescolare prima dell'uso. Diluire la prescritta dose d'impiego in poca acqua a parte, rimescolando con cura e successivamente diluire nel totale quantitativo d'acqua, mantenendo in agitazione la massa.
Compatibilità : Il prodotto non è miscibile con formulati a reazione alcalina (es. Polisolfuri, Poltiglia Bordolese, ecc.)
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di Nocività : Il prodotto è tossico per le api, gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci. Non trattare durante la fioritura, non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente od accidentalmente prima che siano trascorsi 20 gg. dal trattamento.

Avvertenze : Non rientrare nelle zone trattate prima che la superfice fogliare sia completamente asciutta. Per operazioni agricole da effettuare sulle colture trattate, entro i tempi di carenza, utilizzare dispositivi di protezione individuale al fine di evitare il contatto cutaneo. Tabellare le aree trattate con cartelli indicanti il trattamento e il divieto di accesso agli estranei. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI, IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

DRANG

Fungicida sistemico con azione preventiva, curativa e bloccante
sulle colture di VITE, PERO, MELO, PESCO, ORTIVE, TABACCO, ORNAMENTALI E FLOREALI

DRANG
Composizione
- Penconazolo puro g. 10,20 (100 g/lt)
- coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi e la pelle; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

IRRITANTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, ne fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl – Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Distribuito da: VEBI sas del dr. L. Bazzolo & C. Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD)
Registrazione n.11110 del 06/12/2001.Ministero della Salute
Stabilimenti di produzione : Torre srl - Via Pian d'Asso - Torrenieri (SI) / ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI) / CHEMIA S. Agostino (FE)
Stabilimento di confezionamento: Vebi sas Borgoricco (PD)
Litri 0,025-0,050-0,1-0,2-1-5-10-20 Partita n° .....

Informazioni per il medico : sintomi e organi interessati : occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato , reni. -Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). -Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. - Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acute ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergenico. -In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del S.N.C.. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Fungicida sistemico che può essere utilizzato come preventivo, curativo e come bloccante; agisce all'interno della pianta e l'assorbimento del prodotto avviene velocemente (poche ore).

VITE
Oidio (Uncinula necator)
- Trattamenti preventivi: : ml 25 - 30 hl in pre post-fioritura intervenendo ogni 14-16 giorni e ml 15 - 20 hl in pre e post-fioritura effettuando i trattamenti ogni 7-10 giorni. Con attacchi in atto (primi sintomi) fare 2 trattamenti ogni 5-7 giorni alla dose di ml 50 hl, poi continuare con trattamenti di tipo preventivo. Il prodotto esplica un' attività collaterale su Guignardia spp. e in minor misura su Pseudopezia spp.

MELO
Ticchiolatura (Venturia inaequalis)
-Trattamenti preventivi: ml 30 - 40 hl ogni 6 - 8 giorni fino alla fase di frutto noce, poi ogni 10-15 giorni. I trattamenti contro la Ticchiolatura sono sufficienti per controllare efficacemente anche l'Oidio.
-Trattamenti curativi : ml 40 - 50 hl, si può intervenire entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
-Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi) : ml 40 - 45 hl effettuando 2 applicazioni ogni 5 - 7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali. E' bene aggiungere un prodotto di copertura.
Oidio (Podosphaera leucotricha)
-Trattamenti preventivi : in primavera ml 30 - 40 hl ogni 10 giorni; nei trattamenti estivi ogni 10 - 14 giorni con dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia.
-Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): ml 30 - 35 hl ogni settimana, con un totale di 3 - 4, che consentono il controllo delle infezioni in atto e la protezione della nuova vegetazione.
Malattie da conservazione :(Monilia fructigena, Penicillium spp.)
- fare in totale 2 - 3 trattamenti a cadenza settimanale in pre raccolta alla dose di 40-45 ml/hl.

PERO
Ticchiolatura (Venturia pirina):
-Trattamenti preventivi: ml 25 - 35 hl ogni 10 - 12 giorni, impiegando la dose maggiore e gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo della malattia.
-Trattamenti curativi: ml 30 - 40 hl trattando entro massimo 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
-Trattamenti bloccanti:(in presenza di sintomi) ml 30 - 40 hl con 2 trattamenti ogni 5 - 7 giorni, proseguire con cadenze e dosi normali. E' bene aggiungere un prodotto di copertura.

PESCO
Oidio
-Trattamenti preventivi: In zone dove il rischio di infezione è alto e con cultivar particolarmente sensibili trattare a ml 40 - 50 hl dalla caduta petali ed ogni 10 - 14 giorni. In zone a minor rischio intervenire ogni 14-21 giorni.
Malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp.)
- fare 2 - 3 interventi a cadenza settimanale in pre-raccolta alla dose di 50 ml/hl.

TABACCO
Oidio : ml 35 - 50 hl facendo da 2 a 4 trattamenti in modo preventivo, iniziando dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.

MELONE - ZUCCHINO - ZUCCA - CETRIOLO - CARCIOFO - PEPERONE (solo in pieno campo)- POMODORO (solo in pieno campo)- PISELLO
Oidio : In pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione, fare da 2 a 4 trattamenti ogni 14 - 16 giorni a ml 25 - 50 hl a seconda della coltura e del rischio di infezione. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.

COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE:
Oidio e ruggini : ml 25 - 50 ml/hl ogni 10 - 14 giorni a seconda della coltura e della incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.
attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro utilizzo è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall' uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

FASER

Fungicida in polvere bagnabile contro la peronospora della vite, del pomodoro, del tabacco e della rosa

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
CIMOXANIL puro g. 4
MANCOZEB puro g. 40
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl
via Monte Grappa 7 – (BG)

STABILIMENTI DI PRODUZIONE
CHEMIA spa – S.Agostino / Sti – Solfotecnica Italiana spa – Cotignola (RA) / ADICA srl – Nera Montoro (TR)
Registrazione Ministero della Salute n. 11666 del 18/4/2003
Partita n. CONTENUTO: g 100-250-500-750 Kg 1-5-10-20-25

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4% e Mancozeb 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il FASER è un fungicida formulato in polvere bagnabile efficace contro la Peronospora della **VITE**, del **POMODORO**, del **TABACCO** e della **ROSA** che agisce sia per penetrazione fogliare che per contatto. Il FASER può essere utilizzato per tutta la stagione secondo il calendario antiperonosporico.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
VITE: contro Peronospora impiegare g 200-300 di FASER per ettolitro di acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infestazioni peronosporiche e proseguire con intervalli di 8-10 giorni fino a quando persistono condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. In condizioni particolarmente critiche gli intervalli possono essere accorciati.
POMODORO (fino alla prima fioritura): contro Peronospora impiegare g 250-300 di FASER per ettolitro di acqua. In presenza di attacchi di Peronospora ed Alternaria aumentare la dose fino a g 300-350 per ettolitro di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere della malattia, ripetendoli ogni 6-10 giorni o in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo.
TABACCO: contro Peronospora impiegare g 300-350 di FASER per ettolitro di acqua. La dose più alta è consigliabile in caso di forti attacchi su varità particolarmente sensibili. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere della malattia, ripetendoli ogni 6-10 giorni o in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo.
ROSA: contro Peronospora impiegare g 250-300 di FASER per ettolitro di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere della malattia, ripetendoli ogni 6-10 giorni o in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo.

NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ
Il FASER è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. Non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. SU POMODORO TRATTAMENTI CONSENTITI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

FENTRO'

Insetticida liquido a vasto spettro di azione

Riferimento partita: *

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Fenitrotion puro g 47,5 (= 465 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio :
Infiammabile - Nocivo per ingestione; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare: Non gettare i residui nelle fognature; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl
Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Stabilimento di Produzione : TORRE srl - Torrenieri (SI) / ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI) CHEMIA Spa S. Agostino (FE)

Registrazione del Ministero della Salute n.10712 del 15/02/01

Contenuto netto : ml 50 - 100 - 250 – 500 - l l - 5 - 10 – 20

Norme Precauzionali :
Conservare il recipiente ben chiuso
in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :

Sintomi : colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa) **:** nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa) **:** astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali : confusione, atassia, convulsione, coma.
Cause di morte : generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia : atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Avvertenza : Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO
(dosi riferite a 100 litri d'acqua)

Insetticida fosforganico che agisce per contatto e per ingestione, dotato anche di una certa attività ovicida e con potere citotropico nei tessuti vegetativi.

E' indicato sulle seguenti colture :

- **Ortaggi :** contro Afidi, Dorifora, Tripidi, Cavolaie, Tentredini alla dose di ml 125 - 175.
- **Agrumi :** contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Tignola, Mosca e Cocciniglie alla dose di ml 125 - 175.
- **Vite :** contro Tignole, Cicaline, Tripidi, Sigaraio, Cocciniglie alla dose di ml 125 - 175.
- **Melo :** contro Afidi, Tripidi, Ricamatrici, Verme delle mele, Microlepidotteri, Cocciniglie alla dose di ml 125 - 175.
- **Pero :** contro Afidi, Psilla, Cocciniglie, Verme delle pere, Carpocapsa, Cicaline, Tortrici alla dose di ml 125 - 175.
- **Olivo :** contro Tignola, Mosca, Tripidi, Cocciniglia alla dose di ml 125 - 175.
- **Cereali :** contro Afidi alla dose di ml 125 - 175.
- **Barbabietola da zucchero :** contro Afidi, Altica, Cleono, Lixus alla dose di litri 1 - 1,5 per ettaro.
- **Medica :** contro Afidi alla dose di ml 125 - 175.
- **Ornamentali - Floreali :** contro Afidi, Tripidi, Tentredini alla dose di ml 125 - 175.
- **Pioppo :** contro Tarlo vespa, Gemmaiolo alla dose di ml 125 - 175.
- **Drupacee :** contro Cocciniglie, Afidi verdi, Tripide, Mosca alla dose di ml 125 - 175.

COMPATIBILITÀ

Non compatibile con prodotti a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

Tossico per gli animali domestici, bestiame, pesci e insetti utili.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

FERSEN

ACARICIDA SELETTIVO IN SOSPENSIONE ACQUOSA

FERSEN

Composizione in peso:
Fenbutatin ossido puro g 50,0 (= 570 g/l)
Disperdenti, coadiuvanti q.b. a 100,0

Frasi di Rischio :
Molto tossico per inalazione;
Irritante per gli occhi e la pelle;
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza :
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini;
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza; In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo

AGROWIN BIOSCIENCES s.r.l.
Via Monte Grappa, 7 - Bergamo

Officina di Produzione :
Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)
Registrazione n. 11895 Ministero della Salute del 17/02/2004
Contenuto netto : ml 250 - 500; lt 1 - 5 - 10
Partita n.: *

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose, cefalea, tinnitus, vertigini, dolori lombari e addominali, insufficienza respiratoria e circolatoria, interessamento del SNC e periferico con nevralgie e paralisi.
Terapia: sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO

FERSEN è un acaricida di superfice attivo nei confronti delle forme mobili degli acari (Panonychus ulmi, tetranichus urticae, Eotetranychus carpini, E. vitis, Eotetranychus pruni), che infestano pero, melo, vite, agrumi, nonché pomodoro, cetriolo ed ornamentali.
L'attività acaricida del FERSEN aumenta progressivamente dopo il trattamento e mantiene valori elevati, per un periodo di 4-6 settimane. Nei trattamenti d'estate inoltrata si previene quindi, in buona misura, con conseguente minore infestazione nella primavera successiva, la deposizione delle uova d'inverno che hanno luogo verso la fine stagione da parte delle femmine di P. ulmi.
FERSEN nei trattamenti a volume normale s'impiega alla dose di ml 88 ogni 100 litri di acqua. L'intervento va effettuato alla comparsa dei primi sintomi d'infestazione bagnando accuratamente tutta la chioma.

COMPATIBILITÀ : Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari normalmente impiegati sulle colture citate.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICTÀ: Il prodotto può essere fitotossico nei confronti di alcune varietà di rose.
NOCIVITÀ : Il prodotto è tossico per i pesci
INTERVALLO DI SICUREZZA :
60 giorni per agrumi
45 giorni per la vite
30 giorni per pomacee, pomodoro e cetriolo
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Attenzione : data l'elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23/04/2001

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

FLOPPY

(concentrato emulsionabile)
Graminicida selettivo

FLOPPY
Composizione:
- DICLOFOP METILE puro g 27,3 (= 284 g/lt)
- Coformulanti q.b. a 100
(contiene Xilene)

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO :
Infiammabile; Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione; Irritante per la pelle; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl - via Monte Grappa 7 (Bergamo)

Officina di produzione :
Torre srl– Torrenieri (fraz. di Montalcino) / CHEMIA s.p.a.-S.Agostino (FE); SAPEC AGRO S.A. – Setubal Portogallo
Registrazione n.10714 del 15/02/2001 del Ministero della Salute
lt. 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15 partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione della mucosa oro-faringea ed esofagea: irritante oculare, miosi, Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini,atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità. fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica : Ospedalizzare. - Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
FLOPPY è un prodotto graminicida per la lotta in particolare contro Avena (Avena spp.), Pabbio (Setaria spp.), Giavone (Echinocloa spp.), Loglio (lolium spp.) e Scagliola (Phalaris spp.).
FLOPPY esplica la sua azione principalmente per via fogliare. La sua efficacia è massima contro le infestanti allo stadio di 1-4 foglie;
Agisce anche per via radicale ma la sua attività e' legata all'umidità del terreno.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
- **FRUMENTO E ORZO :** 2-3 l/Ha in 300 litri di acqua
- **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO :** 2,5- 3,5 l/ha in 300 litri di acqua.
- **LEGUMINOSE E COLTURE ORTICOLE (PISELLO, FAVA, FAGIOLO, LATTUGA SPINACIO, CAVOLI, CAROTA, CIPOLLA, PATATA) :** 2,5-3 l/ha in 300 litri di acqua.

La dosa piu bassa e' indicata in presenza di infestatati nate uniformemente e allo stadio di 2-4 foglie, mente la dose piu alta e' indicata per infestazioni difformi come stadio di sviluppo.

COMPATIBILITA'
FLOPPY e' miscibile con prodotti a base di Fenmedifam e Metamitron, mentre esiste un antagonismo nella miscela estemporanea con derivati ormonici che causa una riduzione di efficacia verso l'Avena selvatica.
AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU CIPOLLA E PATATA, 30 GIORNI SU PISELLO, FAVA, FAGIOLO, LATTUGA, SPINACIO, CAVOLI E CAROTA.
Avvertenza : non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.
Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

HEXY

ACARICIDA

tipo di formulazione : polvere bagnabile

Composizione
- Exitiazox puro g. 10
- Coformulanti qb a 100

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl – Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Officina di produzione : STI - SOLFOTECNICA ITALIANA Cotignola (RA) / ADICA srl Nera Montoro (TR) / CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46

Registrazione n. 10746 del 12/03/2001 del Ministero della Salute

Peso netto kg 0,1/0,2/0,5/1/5/10/15/20 Partita n. :

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza : consultare un centro antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
Acaricida in polvere bagnabile che agisce per contatto ed ingestione, ed inoltre è dotato di effetto translaminare, con notevole persitenza d'azione ed estrema selettività nei confronti delle api e degli acari predatori. La sua azione acaricida è mirata a combattere uova, larve e ninfe di acari tetranichidi rossi e gialli (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini f. vitis).
Viene impiegato sulle seguenti colture :
melo - pero - pesco - agrumi - vite - fragola - actinidia - melone - cetriolo - peperone - melanzana - pomodoro - fagiolino - soia - colture floreali in pieno campo ed in serra, trattando in presenza di pochissime forme mobili (1 - 2 acari per foglia) alla dose di g. 50 per ettolitro di acqua, nel caso vi sia necessità si miscela con prodotti acaricidi adulticidi per avere una rapida azione iniziale sugli adulti. Per ottenere un risultato migliore bagnare abbondantemente la vegetazione trattata.

Compatibilità : non compatibile con i prodotti a reazione alcalina.
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta di fragola, peperoni, melanzane, fagiolini, pomodoro, melone, cetriolo, 14 giorni prima della raccolta di pesco, melo, pero, actinidia, agrumi, vite e 34 giorni prima della raccita della soia.

Fitotossicità : sulle floricole si consiglia un saggio preliminare su piccole superfici
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi indicati: ogni altro impiego è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile dagli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ICE

(concentrato solubile)
Fitoregolatore contro la rugginosità e per la buona fioritura e allegagione
dei frutti del melo e del pero

Partita n°
COMPOSIZIONE
Gibberelline A4A7 g. 1 (=10,5 g/lt)
Coformulanti q.b. a g. 100

Frasi di Rischio: Irritante per gli occhi

IRRITANTE

Consigli di Prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

AGROWIN BIOSCIENCES srl Via Monte Grappa, 7 Bergamo

Stabilimento di produzione : Torre srl Torrenieri (fraz. Montalcino) SI / SCAM srl MODENA
Registrazione n. 10745 del 12/03/01 Ministero della Salute
Contenuto: ml 50 - 100 - 200 – 250 – 300 – 400 – 500 litri 1 - 5

***Informazioni mediche** : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.*

CARATTERISTICHE
ICE è un fitoregolatore che trova interessanti campi di impiego su alcune cultivar di melo e di pero. In determinate situazioni ambientali, i frutti delle mele appartenenti al gruppo delle Delicious rosse, sia normali che Spur, tendono ad assumere una forma schiacciata, **ICE** provoca una modifica della forma (allungamento) secondo gli standard varietali delle zone più vocate. **ICE** sulle mele della varietà Golden Delicious previene o riduce significativamente la rugginosità, fisiopatia che causa un importante deprezzamento della produzione. Il prodotto ha dimostrato di diminuire i danni da gelo e quindi di aiutare l' allegagione nei casi di gelate durante la fioritura; in questo caso trattare entro 24 ore dalla gelata, nelle ore più calde, e ripetere l' intervento in caso di perdurare delle gelate.
CAMPI, DOSI ed EPOCHE DI IMPIEGO
Melo (Gruppo Delicious Rosse) – Miglioramento della forma.
Applicare 100-130 ml/hl, distribuendo il prodotto tra la piena fioritura (80% dei petali aperti) e la caduta dei petali, preferibilmente in due applicazioni di 50-80 ml/hl ciascuna ad intervallo di 7–10 giorni.
Melo (Gruppo Delicious) – Prevenzioni della rugginosità
Impiegare 40-50 ml/hl per trattamento, realizzando un programma di 3-4 applicazioni; effettuare il primo trattamento a fine fioritura ed i successivi ad intervalli di 7-10 giorni.
Melo del Gruppo Gala
Favorisce il miglioramento della forma, anticipa l' emissione e lo sviluppo dell' apparato fogliare, migliora l' omogeneità della frutta, incrementa la quantità raccolta al primo stacco. Fare 4 applicazioni distanziate di 15 giorni con 30-40 ml/hl in pre-fioritura (orecchiette di topo e mazzetti) e ad ingrossamento dei frutti (frutto noce).
Altre varietà di melo
50-60 ml/hl durante la fioritura ripetuto per 2 volte
Pero- Miglioramento dell' allegagione
Applicare 80-100 ml/hl distribuendo il prodotto all' inizio della fioritura preferibilmente in due applicazioni di 30-50 ml/hl, effettuando il primo trattamento al 30-40% dei fiori aperti ed il secondo entro 2-3 giorni.
AVVERTENZE DI IMPIEGO
-Aggiungere 50-100 ml/hl di un bagnante non ionico, avendo cura di metterlo prima dell' ICE.- Mettere la dose prestabilita di ICE in circa la metà dell' acqua necessaria e, mantenendo la soluzione in agitazione, aggiungere altra acqua sino al raggiungimento del volume totale richiesto.- Mantenere in agitazione la soluzione anche durante la distribuzione, provvedendo al suo impiego nello stesso giorno della preparazione.- Impiegare nella distribuzione un getto finemente nebulizzato, bagnando uniformemente la massa fiorale ed evitando lo sgocciolamento.- La quantità totale di soluzione per ettero dovrà essere regolata in funzione dello sviluppo delle piante e della forma di allevamento.- Trattare in assenza di pioggia per almeno 4-6 ore dopo l' applicazione; nel caso di trattamento dopo una pioggia, attendere che la vegetazione si asciughi.- Trattare preferibilmente nelle ore del tardo pomeriggio e comunque con temperature non inferiori a 7° C o superiori a 32°C.
COMPATIBILITA' : il prodotto non è compatibile con le sostanze alcaline quali polisolfuri e poltiglia bordolese. Durante la preparazione di miscele, aggiungere ICE per ultimo.
AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': L' impiego dell' ICE in prossimità di interventi con prodotti diradanti, può accentuare l' effetto diradante degli stessi: pur essendo tale aspetto talvolta ricercato, si raccomanda particolare attenzione allo scopo di evitare danni alla produzione
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

JAGER

Insetticida
CONCENTRATO EMULSIONABILE

Partita: *

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Clorpirifos metile puro .... g 22 (= 217,8 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio :
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl
Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Stabilimento di Produzione :
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A., Via Pian d'Asso - Torrenieri (SI) / ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI) / ADICA srl – Faenza (RA) / CHEMIA s.p.a. S.Agostino (FE) / SAPEC AGRO S.A. – Setubal - PORTOGALLO
Registrazione del Ministero della Salute n. 11186 del 05/02/02
Contenuto netto : lt 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-15-20

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :
Sintomi : colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa) : nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa) : astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali : confusione, atassia, convulsione, coma.
Cause di morte : generalmente insufficienza respiratoria.
A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia : atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Avvertenza : Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Lo JAGER è un insetticida fosforganico, agisce per contatto, ingestione ed in parte per azione di vapore. È particolarmente indicato per combattere le larve di lepidotteri e le neanidi di cocciniglie. Esplica inoltre azione frenante dello sviluppo delle popolazioni di acari tetranichidi come Panonychus, Tetranychus, Eotetranychus.

DOSI D'IMPIEGO

- **Melo, Pero e Pesco :**
200 ml/hl contro Lepidotteri, Tortricidi (Capua, Cacoecia, Pandemis, Eulia), Tignola orientale (Cydia molesta), Anarsia (Anarsia);
200 - 250 ml/hl contro neanidi di Cocciniglie (Aspidiotus ed altre).
- **Arancio :** 250 ml/hl contro neanidi di Cocciniglie (Saissetia, Ceroplastes, Pseudococcus).
- **Vite :** 100 - 150 ml/hl contro Tignole (Polycrosis, Clysia).Il prodotto potrebbe risultare fitotossico per alcune varietà sensibili : si raccomandano pertanto saggi zonali e varietali.
- **Fragola :** 300 - 400 ml/hl contro Frankliniella o Nottue ed Afidi.
- **Ortaggi (pomodoro, peperone, melanzana, pisello, ravanello, patata) :** 1,5 - 2 l/hl contro Nottue (Agrotis, Mamestra ed altre), Macaone (Papilio), Dorifora (Leptinotarsa).
- **Mais :** 300 ml/hl contro Nottue (Agrotis), Piralide (Ostrinia) ed Elateridi.
- **Pioppo :** 400 - 500 ml/hl contro Saperda e Criptorrinco.
- **Ornamentali (garofano, crisantemo, azalea, ciclamino) :** 200 ml/hl contro Bega, Tortricidi, Cocciniglie, Oziorrinco.

COMPATIBILITÀ

JAGER non è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non impiegare il prodotto sulle varietà di melo Stayman Red, Stayman Winesap, Gloster, Gallia Beauty.
In post-fioritura del melo non eseguire più di due trattamenti. Non effettuare trattamenti su arancio nei mesi compresi tra gennaio ed aprile.

NOCIVITÀ

↖ Nocivo per i pesci
↖ Nocivo per api ed insetti utili
↖ Tossico per i crostacei

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

KLING

Erbicida liquido ureico per il diserbo selettivo della carota, della patata, del sedano, del finocchio, della soia, del girasole e del mais

COMPOSIZIONE
-LINURON puro g. 37,6 (= 436 g/l)
-solventi ed emulsionanti qb a 100

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO :
Nocivo per ingestione: Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti; Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione; Altamente tossico per gli organismi acquatici; Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico; Può danneggiare i bambini non ancora nati; Possibile rischio di ridotta fertilità

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl – Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Officina di produzione : CHEMIA spa – S.Agostino (FE)
Registrazione Ministero della Salute n° 11227 del 4/3/2002
- Litri 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15
PARTITA N°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : LINURON. Derivato dell'Urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

CAMPO D'AZIONE
Combatte le più diffuse infestanti annuali quali : Poligono , Portulaca, Matricaria, Amaranto, Chenopodio, Ranuncolo, Papavero, Capsella. Meno sensibili sono Giavone, Digitaria e Setaria. Non controlla le erbe perenni.
MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO AD ETTARO PER 600 LITRI DI ACQUA
Prima dell'applicazione lavorare bene il terreno fino a che sia privo di zollosità ed effettuare una prova in "bianco" con sola acqua per poter eseguire poi una uniforme distribuzione del prodotto. Dopo il trattamento il terrenon non deve essere lavorato per non annullare l'effetto erbicida. Non nebulizzare troppo finemente la miscela e tenerla in costante agitazione. Evitare i trattamenti in periodi molto caldi e sul terreno estremamente sabbioso o secco. Lavare accuratamente il macchinario usato per la distribuzione del prodotto.
CAROTA : a) in pre-emergenza, nell'intervallo che intercorre fra la semina fino a due-tre giorni prima dell'emergenza della coltura ponendo il seme a circa 2 centimetri di profondità :
-su terreni sciolti 1,4 litri
-su terreni di medio impasto 2 litri
-su terreni compatti 2,3 litri
b) in post-emergenza della coltura, prima che le piante infestanti abbiano raggiunto 2-3 centimetri di altezza e preferibilmente quando la carota ha 2-3 foglie vere :
-su ogni tipo di terreno 1,4-2 litri
PATATA : in pre-emergenza, nell'intervallo che intercorre fra la semina e l'inizio dell'emergenza della coltura :
-su terreni sciolti 1,4 litri
-su terreni di medio impasto 2 litri
-su terreni compatti 2,3 litri
SEDANO E FINOCCHIO : dopo la posa a dimora delle piante non appena superata la crisi del trapianto :

	Sedano	Finocchio
-su terreni sciolti	1,4 litri	0,5 litri
-su terreni di medio impasto e compatti	2,3 litri	1,2 litri

SOIA : in pre-emergenza della coltura e delle infestanti, avendo cura che il seme sia interrato perfettamente :
-su terreni sciolti 0,6 litri
-su terreni compatti 0,9 litri
GIRASOLE : in pre-emergenza della coltura e delle infestanti, avendo cura che il seme sia interrato perfettamente :
-su qualsiasi tipo di terreno 0,9 litri
MAIS : in pre-emergenza, da solo o in miscela, avendo cura che il seme sia interrato perfettamente : su terreni sciolti, di medio impasto e compatti 0,6 – 0,7 litri. Non impiegare su terreni molto sciolti.
AVVERTENZA : il KLING agisce per assorbimento radicale e per contatto e presenta efficacia erbicida e relativamente rapida decomposizione nel terreno (3-4 mesi) si da evitare pericoli alle colture che succedono a quella diserbata. Il KLING non è volatile, né corrosivo, né infiammabile. Il prodotto deve essere conservato in luogo lontano da insetticidi, anticrittogamici, concimi, sementi.

COMPATIBILITA' : il prodotto può essere miscelato con altri diserbanti a base di Diuron, Paraquat, Diquat e Trifluralin.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono
inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. **Preparazione della sospensione** : agitare prima dell'uso. Stemperare in poca acqua la quantità prestabilita di prodotto mescolando accuratamente e versare il tutto nella quantità necessaria di acqua contenuta nel serbatoio, sempre agitando. Durante l'irrorazione, la poltiglia deve essere tenuta continuamente in movimento da un opportuno agitatore meccanico.
AVVERTENZA : Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Il p.a. non deve essere impiegato in terreni con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.
Fitotossicità : il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta
sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta
"Attenzione, il prodotto tal quale contiene sostanza molto tossica per gli organismi acquatici"
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: *irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia: irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).*
Terapia: *sintomatica.*
Avvertenza: *CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI*

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
Il prodotto ha un'azione preventiva nei confronti della peronospra e botrite ed un'azione collaterale nell'oidio della vite.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO
Vite - effettuare i trattamenti alle dosi di ml 200-250/hl di acqua alla fine della fioritura e successivamente altri 2-3 trattamenti fino a 40 giorni prima della raccolta sulle uve da vino, mentre sulle uve da tavola si può intervenire fino a 10 giorni prima della raccolta.
Non intervenire in caso di umidità e di temperature elevate.

Preparazione della miscela acquosa: versare direttamente la quantità necessaria di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice, mantenendo l'acqua in agitazione.

N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

COMPATIBILITA'- Il prodotto non è miscelabile con Poltiglia bordolese, Polisolfuro e Olio bianco.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

KREIS

FUNGICIDA LIQUIDO SOTTO FORMA DI SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE: 100 g. di prodotto contengono
Folpet g 40 (g/l 480)
Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione;
Irritante per gli occhi; Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere,nè fumare dur indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di i[illegible] immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl
Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / CHEMIA spa – S.Agostino (FE)
Registrazione del Ministero della Salute n. 11145 del 08/01/2002
CONTENUTO: litri 0,1-0,5-1-5-10
Riferimento partita: …..

FITOTOSSICITA' - Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con olii minerali e prodotti a base di zolfo.
RISCHI DI NOCIVITA'-Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta sulle uve da tavola.
Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta per non ostacolare la fermentazione del mosto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

KRUG

Fungicida citotropico translaminare ad azione preventiva e curativa nei confronti delle peronosporacee che attaccano vite, orticole, tabacco, soia, girasole e rosa.

GRANULI IDRODISPERSIBILI

Partita n.:*

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Cimoxanil puro.......................g 45
Coformulanti q.b. a 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl
Via Monte Grappa, 7 - Bergamo

Contenuto netto : kg. 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15-20
Officina di Produzione : S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA) / ADICA srl – Nera Montoro (TR) /
Officina di Confezionamento : Torre srl - Torrenieri (SI)
Reg. n. 11147 Ministero della Salute del 08/01/02

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
AVVERTENZA : Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

KRUG è un fungicida attivo sia nei confronti della peronospora della vite, sia nei confronti di altre peronosporacee che attaccano le orticole ed il tabacco. La sua azione viene esplicata in un duplice modo :

a) di contatto nei confronti degli elementi di propagazione della peronospora (zoospore)
b) azione endoterapica nei confronti del micelio che si sviluppa all'interno della lamina fogliare

La sua persistenza di azione è di circa 5 giorni a seconda dell'andamento climatico.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Crittogama	Epoca di impiego	Dosi g/hl
Vite	Peronospora *(Plasmopara viticola)*	dal manifestarsi delle condizioni d'infezione fino alla sfioritura	40 - 50
		dall'allegagione fino alla chiusura del grappolo	30 - 35
Carciofo	Peronospora *(Bremia lactuce)*	dal manifestarsi delle condizioni di infezione fino alla raccolta dei capolini	40 - 50
Lattuga	Peronospora *(Bremia lactuce)*	dal manifestarsi delle condizioni d'infezione; sia in semenzaio che in campo, ripetendo i trattamenti a cadenza quindicinale	40 - 50
Spinacio	Peronospora *(Peronospora farinosa)*	trattare quando le piantine sono ancora giovani; in caso di comparsa della malattia ripetere i trattamenti	40 - 50
Melone, Zucchina	Peronospora *(Pseudoperonospora cubensis)*	trattamenti ripetuti dalla fase di post-trapianto fino al frutto giovane	40 - 50
Pisello	Peronospora *(Peronospora pisi)*	in vegetazione fino alla fioritura a seconda delle condizioni climatiche	40 - 50
Aglio, Cipolla	Peronospora *(Peronospora schleideni)*	dal manifestarsi delle condizioni d'infezione e in seguito a cadenza quindicinale secondo l'andamento pluviometrico e termico	40 - 50

Coltura	Crittogama	Epoca di impiego	Dosi g/hl
Porro	Peronospora *(Phytophtora porri)*	dal manifestarsi delle condizioni d'infezione e in seguito a cadenza quindicinale secondo l'andamento pluviometrico e termico	40 - 50
Patata	Peronospora *(Phytophtora infestans)*	dal manifestarsi delle condizioni di infezione fino all'approssimarsi del periodo della raccolta	40 - 50
Pomodoro	Peronospora *(Phytophtora infestans)*	dal manifestarsi delle condizioni di infezione fino alla fruttificazione	40 - 50
Soia	Peronospora *(Peronospora manshurica)*	dalla post-emergenza in poi	40 - 50
Girasole	Peronospora *(Plasmopara helianthi)*	trattare alla comparsa dei primi sintomi	40 - 50
Tabacco	Peronospora *(Peronospora tabacina)*	dal manifestarsi delle condizioni di infezione in tutte gli stadi di accrescimento; dal semenzaio fino all'approssimarsi della raccolta	40 - 50
Rosa	Peronospora *(Peronospora sparsa)*	dal manifestarsi delle condizioni di infezione ripetere i trattamenti ogni 6-10 giorni a seconda dell'andamento pluviometrico e termico	40 - 50

VITE : per quanto riguarda la *Plasmopara viticola*, si consiglia l'impiego di KRUG in associazione con prodotti cuprici, ftalimidici e ditiocarbammati, quali prodotti di copertura, alla metà della dose normalmente impiegata.

COLTURE ORTICOLE E TABACCO : nel caso di sintomi di malattia conclamati, intervenire con due trattamenti ravvicinati, alla dose più alta. Nel caso specifico di aglio e cipolla, si consiglia l'associazione con bagnanti e adesivanti a causa dell'elevato contenuto di cere.

Si può dimezzare la dose d'impiego se KRUG è utilizzato in miscela con rameici, tenendo presente comunque che la dose minima per ettaro non deve essere inferiore a 250 g.
Compatibilità : KRUG non è compatibile con prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese) e gli oli minerali.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di Nocività : Durante il trattamento si consiglia di tenere lontani animali domestici e bestiame

Sospendere i trattamenti : 28 giorni prima della raccolta di Soia e Girasole; 21 giorni prima della raccolta del carciofo; 10 giorni prima della raccolta delle altre colture

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

LAUNE

fungicida a lunga persistenza contro i funghi patogeni del terreno e della parte aerea,
nonché per la concia di bulbi e tuberi
Tipo di formulazione : polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
Tolclofos-metile puro .... g. 50
Coformulanti ....q.b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl – Via Monte Grappa, 7 – Bergamo
Stabilimento di produzione : A.D.I.C.A. srl – Nera Montoro (TR) / STI -SOLFOTECNICA ITALIANA spa – Cotignola (RA) / Terranalisi srl via N.Bixio, 6 Cento (FE)
Registrazione n. 11111 del 06/12/01 Ministero della Salute
Contenuto: kg. 0,05 -0,1 -0,25 -0,5 -1 -5 -10 -15 - 20 - Partita n° .....

***INFORMAZIONI MEDICHE** : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni.*

CARATTERISTICHE, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il LAUNE è un fungicida organico, che agisce per contatto, per il controllo di funghi terricoli quali: Rhizoctonia spp. , Corticium spp., Sclerotium spp., Sclerotinia spp., Alternaria spp., Botrytis spp.. e si dimostra notevolmente efficace nei confronti di miceti resistenti ad altri prodotti.
Il prodotto si utilizza sulle seguenti colture nelle modalità sottoindicate.
Dopo ogni trattamento al terreno effettuare una irrigazione o una lavorazione superficiale.
LATTUGA (contro Rhizoctonia solani e Sclerotinia sclerotiorum): per trattamenti al terreno: da 2 - 4 fino a 5 - 8 g/mq.. Per trattamenti alla parte aerea (applicazione ogni 2-3 settimane): 1-2 Kg./ha.
POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, RADICCHIO, FAGIOLO, FAGIOLINO, ZUCCHINO, CAROTA, COCOMERO, CAVOLI (contro Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum, Corticium rolfsil, Alternaria spp, Botrytis spp.): per trattamenti al terreno: 2-4 g./mq., per trattamenti alla parte aerea (applicazione ogni 2-3 settimane) 1-2 Kg./ha. e per Concia sementi 1-2 g./Kg. di seme.
PATATA (contro Rhizoctonia solani): per concia dei tuberi tramite immersione od aspersione: 200-300 g./hl.; per trattamento al terreno 10-20 Kg./ha. e per trattamento localizzato nei solchi: 80-120 g. per 100 metri lineari.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (contro Corticium rolfsii e Rhizoctonia spp.): per trattamento al terreno:1-3 g./mq. e per concia dei semi: g. 80 per 100 Kg. di semi.
ZUCCA - AGLIO - CIPOLLA (contro Rhizoctonia solani e Sclerotium spp.) : per trattamento al terreno (in assenza della coltura) 2-4 g./mq. e per concia del seme : 1-2 g./Kg. di materiale.
FLOREALI ED ORNAMENTALI (contro Rhizoctonia spp. e Corticium spp.): per trattamento al terreno 3-5 g./mq. e per Concia tuberi e rizomi : 1-2 g./Kg. di materiale.
FRUMENTO (contro Rhizoctonia cerealis): per trattamento alla parte aerea (fine accestimento) 1-2 Kg./ha.
AVVERTENZA : nella **concia delle sementi** indicate i semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati alla alimentazione umana e del bestiame. per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.
COMPATIBILITA' : non compatibile con i prodotti a reazione alcalina. Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.Devono inoltre essere osservate le norme per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto per cavoli; 30 giorni per lattuga, pomodoro, peperone, melanzana, radicchio e fagiolo, fagiolino, barbabietola; 45 giorni per lo zucchino; 60 giorni per il cocomero
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

LAUNE

fungicida a lunga persistenza contro i funghi patogeni del terreno e della parte aerea,
nonché per la concia di bulbi e tuberi
Tipo di formulazione : polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
Tolclofos-metile puro .... g. 50
Coformulanti ....q.b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl – Via Monte Grappa, 7 – Bergamo
Stabilimento di produzione : STI Solfotecnica Srl Cotignola (RA) / CHEMIA Spa S. Agostino (FE)
Registrazione n. 11111 del 06/12/01 Ministero della Salute
Contenuto: kg.1 (1x1) (0,5x2) (0,25x4) (0,2x5) - Partita n° .....

***INFORMAZIONI MEDICHE** : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni.*

CARATTERISTICHE, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il LAUNE è un fungicida organico, che agisce per contatto, per il controllo di funghi terricoli quali: Rhizoctonia spp. , Corticium spp., Sclerotium spp., Sclerotinia spp., Alternaria spp., Botrytis spp.. e si dimostra notevolmente efficace nei confronti di miceti resistenti ad altri prodotti.
Il prodotto si utilizza sulle seguenti colture nelle modalità sottoindicate.
Dopo ogni trattamento al terreno effettuare una irrigazione o una lavorazione superficiale.
LATTUGA (contro Rhizoctonia solani e Sclerotinia sclerotiorum): per trattamenti al terreno: da 2 - 4 fino a 5 - 8 g/mq.. Per trattamenti alla parte aerea (applicazione ogni 2-3 settimane): 1-2 Kg./ha.
POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, RADICCHIO, FAGIOLO, FAGIOLINO, ZUCCHINO, CAROTA, COCOMERO, CAVOLI (contro Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum, Corticium rolfsil, Alternaria spp, Botrytis spp.): per trattamenti al terreno: 2-4 g./mq., per trattamenti alla parte aerea (applicazione ogni 2-3 settimane) 1-2 Kg./ha. e per Concia sementi 1-2 g./Kg. di seme.
PATATA (contro Rhizoctonia solani): per concia dei tuberi tramite immersione od aspersione: 200-300 g./hl.; per trattamento al terreno 10-20 Kg./ha. e per trattamento localizzato nei solchi: 80-120 g. per 100 metri lineari.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (contro Corticium rolfsii e Rhizoctonia spp.): per trattamento al terreno:1-3 g./mq. e per concia dei semi: g. 80 per 100 Kg. di semi.
ZUCCA - AGLIO - CIPOLLA (contro Rhizoctonia solani e Sclerotium spp.) : per trattamento al terreno (in assenza della coltura) 2-4 g./mq. e per concia del seme : 1-2 g./Kg. di materiale.
FLOREALI ED ORNAMENTALI (contro Rhizoctonia spp. e Corticium spp.): per trattamento al terreno 3-5 g./mq. e per Concia tuberi e rizomi : 1-2 g./Kg. di materiale.
FRUMENTO (contro Rhizoctonia cerealis): per trattamento alla parte aerea (fine accestimento) 1-2 Kg./ha.
AVVERTENZA : nella **concia delle sementi** indicate i semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati alla alimentazione umana e del bestiame. per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.
COMPATIBILITA' : non compatibile con i prodotti a reazione alcalina. Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.Devono inoltre essere osservate le norme per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto per cavoli; 30 giorni per lattuga, pomodoro, peperone, melanzana, radicchio e fagiolo, fagiolino, barbabietola; 45 giorni per lo zucchino; 60 giorni per il cocomero
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE. - NON TOCCARE CON MANI BAGNATE - DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE L'INVOLUCRO - DA NON VENDERE, NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE ORIGINALE

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

20% 25%

1 Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua

2 Introdurre il numero di sacchetti idrosolubili chiusi, previsti (come da etichetta) nell'atomizzatore

3 Mettere in funzione l'agitatore

4 Attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti), ed........

5 ......aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

LAUNE

fungicida a lunga persistenza contro i funghi patogeni del terreno e della parte aerea,
nonché per la concia di bulbi e tuberi
Tipo di formulazione : polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
Tolclofos-metile puro .... g. 50
Coformulanti ....q.b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

AGROWIN BIOSCIENCES srl – Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Stabilimento di produzione : STI Solfotecnica Srl Cotignola (RA) / CHEMIA Spa S. Agostino (FE)

Registrazione n. 11111 del 06/12/01 Ministero della Salute
Contenuto: kg. 1 (1x1) (0,5x2) (0,25x4) (0,2x5) - Partita n° .....

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE
FUORI DALLA CONFEZIONE

AVVERTENZA : LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

1. Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua
2. Introdurre il numero di sacchetti idrosolubili chiusi, previsti (come da etichetta) nell'atomizzatore
3. Mettere in funzione l'agitatore
4. Attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti), ed ......
5. ......aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

LICHT

Erbicida liquido per il diserbo totale e selettivo
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
Diuron puro g 50
(= 580 g/l)
Disperdenti, solventi
q. b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione; Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl
Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Officine di produzione : ALTHALLER ITALIA srl S.Colombano al Lambro (MI) / CHEMIA spa – A.Agostino (FE) / Torre srl - Via Pian d'Asso - Torrenieri (SI) / TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE)

Registrazione Ministero della Salute n. 11188 del 05/02/02
QUANTITA' NETTA: L 1-5-10-20 - PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Diuron: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute.
L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
N.B- Metemoglobinemia segnalata: se è superiore al 30 %: blu di metilene, se è inferiore: Vit. C ad alte dosi (3-4 g)
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche: LICHT è un erbicida ad effetto residuale di lunga durata che combatte le più importanti infestanti **graminacee** quali Alopecorus spp. Digitaria, Echinocloa, Lolium, Poa, Setaria e **dicotiledoni** quali Amaranthus, Capsella bursa pastoris, Matricaria spp., Rumex da seme, Sinapis arvensis, Solanum, Stellaria media, ecc., annuali o biennali
LICHT viene impiegato prima della nascita delle infestanti o quando sono nella prima fase di sviluppo nei seguenti trattamenti e alle dosi indicate, **diluite** in 600-1000 litri d'acqua per ettaro.

Vite: 5-8 l/ha dopo il quarto anno dall'impianto in inverno – primavera; si sconsiglia su terreni molto sciolti.
Pomacee: (melo e pero) 5-8 l/ha dopo il quarto anno dall'impianto in inverno –primavera; su impianti più giovani ridurre la dose a 3-5 l/ha.
Agrumi: 4-7 l/ha ad inizio stagione, dopo le eventuali lavorazioni e sistemazioni per la irrigazione.
Olivo: 6-8 l/ha fine estate - autunno oppure 5 l/ha in autunno seguiti da 5 l/ha a fine inverno.
Asparago: 5-7 l/ha a fine inverno (prima della fuoriuscita dei turrioni) o a fine raccolta; nelle nuove asparagiaie 1,5-3 l/ha in pre - emergenza.
Medica: 3-4 l/ha in autunno. Non trattare i medicai nuovi e in terreni sciolti
Gladiolo: 1,5-2 l/ha in pre emergenza.
Luoghi incolti, canali, scoline, sponde di fossi: 9-15 l/ha prima della nascita delle malerbe.
In caso di malerbe gia sviluppate miscelare con disseccante o erbicida di contatto.

Dopo aver effettuato il trattamento, il terreno non deve più essere lavorato nemmeno superficialmente, per non comprometterne la persistenza e l'uniformità di azione.
Compatibilità:
Non miscibile con prodotti fitosanitari a base di olii minerali.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: E' fitotossico per molte colture (cereali, mais, bietole e per tutte le colture non indicate in etichetta) per cui occorre evitare che possa giungervi a contatto.

NOCIVITA'
"Attenzione, il prodotto tal quale contiene sostanza molto tossica per gli organismi acquatici"
Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

LORRY

Fungicida

FORMULATO IN GRANULI IDRODISPERSIBILI

Partita n.:*

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
-Clorotalonil puro 75 g
-Bagnanti, disperdenti e
 supporti inerti q.b. a 100 g

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio :
Molto tossico per inalazione; Irritante per le vie respiratorie; Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti; Rischio di gravi lesioni oculari; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza :
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico, In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo materia di sicurezza;

AGROWIN BIOSCIENCES srl
Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Officina di Produzione :
-S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A., Via Torricelli, 2 - Cotignola (RA)

Officina di Confezionamento : Torre srl - Via Pian d'Asso - Torrenieri (SI)
Registrazione n. 10742 Ministero della Salute del 12/03/01
Contenuto netto : g 100 - 200 - 250 – 500 - kg 1 - 5 - 10 - 20

Norme Precauzionali :
Conservare la confezione ben chiusa; Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi : irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.
Terapia : sintomatica - **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE

Il LORRY è un fungicida ad azione preventiva a largo spettro d'azione, efficace contro vari funghi patogeni delle seguenti colture :
ortaggi, fruttiferi e colture floreali.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO (per 100 litri d'acqua)

- **COLTURE ORTIVE** (in pieno campo od in serra)
  - **Pomodoro e patata :** contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Cladosporiosi, Muffa grigia, Sclerotinia, Antracnosi, Cercosporiosi e Rizoctonia ....150 - 200 g/hl
    Con un massimo di tre applicazioni annue in campo e cinque in serra per il pomodoro e di due applicazioni annue per la patata.
  - **Cetriolo, melone e cocomero :** contro Antracnosi, Peronospora, Alternaria, Cladosporiosi, Vaiolatura, Rizoctonia e Fusariosi non vascolare ....150 - 200 g/hl
    Con un massimo di tre applicazioni annue a pieno campo o in serra.
  - **Sedano :** contro Septoria, Rizoctonia, Cercospora e Sclerotinia ....200 - 250 g/hl
    Massimo tre applicazioni annue a pieno campo o in serra.
  - **Cipolla :** contro Peronospora, Muffa grigia, Ruggini ed Alternaria ....150 - 200 g/hl
    Massimo due applicazioni annue a pieno campo.
  - **Fagiolo, fagiolino e pisello :** contro Antracnosi, Peronospora e Ruggine............150 - 200 g/hl
    Massimo due applicazioni annue in pieno campo da effettuarsi fino alla fioritura, ad eccezione del fagiolino per il quale il trattamento deve essere sospeso prima della fioritura

Il LORRY va impiegato sulle colture ortive in via preventiva in qualunque periodo dell'anno a seconda della necessità, ripetendo i trattamenti ad intervalli variabili in funzione della virulenza e dell'andamento stagionale e rispettando il numero massimo di applicazioni annuali sopra riportato.

- **POMACEE (melo e pero) :** contro Ticchiolatura, Cancri rameali, Ruggine, Marciume dei frutti e del colletto
  - 200 - 250 g/hl in trattamenti invernali ;
  - 100 - 150 g/hl in trattamenti prima della fioritura ;
  - 120 - 150 g/hl in trattamenti dopo la fioritura ;

impiegando il prodotto solo in campo con un massimo di quattro applicazioni annue e solo in miscela con fungicidi sistemici.

- **DRUPACEE (pesco e susino) :** contro Monilia, Corineo, Bolla, Ruggine, Nerume e Cancri rameali
  - 150 - 200 g/hl in trattamenti prima e dopo la fioritura ;
  - 150 - 200 g/hl in trattaenti 5 - 6 settimane prima della raccolta ;
  - 150 - 200 g/hl in trattamenti 3 - 4 settimane prima della raccolta ;

impiegando il prodotto solo in campo con un massimo di quattro applicazioni annue e solo in miscela con fungicidi sistemici.

- **COLTURE FLOREALI E ORNAMENTALI :** contro Antracnosi, Muffa grigia, Ticchiolatura, Ruggini, Septoriosi, Alternaria, Fusariosi non vascolare ....150 - 200 g/hl
  in interventi preventivi od alla prima comparsa della malattia, ripetendo i trattamenti quando è necessario in funzione dell'andamento stagionale e delle infezioni.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE : stemperare la dose stabilita di LORRY in poca acqua mescolando sino ad ottenere una poltiglia fluida ed omogenea, versarla quindi nella quantità d'acqua rimanente, mescolando con cura, sino ad ottenere la diluizione voluta.
Tempi di rientro : 12 ore (in campo) - 24 ore (in serra).

AVVERTENZE :
- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi
- Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua

COMPATIBILITÀ

Associazioni possibili con : sterolo-inibitori fungicidi; antiperonosporici sistemici, citotropici e translaminari; dicarbossimidici (antibotritici); benzimidazolici; rame; zolfi.
Non è invece compatibile con olii minerali e con prodotti fitosanitari a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).
Avvertenze : Il LORRY deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego di olii minerali.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

È consigliabile eseguire saggi preliminari prima di procedere ad effettuare trattamenti su colture da fiore particolarmente delicate.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Non eseguire trattementi durante la fioritura essendo il prodotto tossico per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti :
35 giorni prima della raccolta del susino
21 giorni prima della raccolta di pomacee e pesco
14 giorni prima della raccolta di colture orticole

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Attenzione : data l'elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23/04/2001

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

PADDOC

Erbicida di post–emergenza del Riso
Tipo di formulazione: granuli idrodispersibili

Composizione :
Bensulfuron metile puro g 60
coformulanti qb a 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl – Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Officine di Confezionamento : STI SOLFOTECNICA ITALIANA – Cotignola (RA);SIDECO dr.SHIRM Gmbh – Mecklenburger Strasse 229 D 23568 Lubeck – GERMANIA; CHEMIA S.p.a. S. Agostino (FE); SAPEC GROUP- Apartado 11 E.C. Bonfim 2901- 852 Setubal Portugal; JIANGSU REPONT PESTICIDE FACTORY –Jintang, Jiangsu P.R. China.
Registrazione n.10508 del 14/06/2000 del Ministero della Salute
CONTENUTO : kg 0,5 - 0,1- 0,2 – 1 - 5 Partita n: Vedere Confezione

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza : consultare un centro antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO

Erbicida specifico per combattere le infestanti non graminacee, sia annuali che perenni, quali Butomus umbellatus, Bolboschoenus (Scirpus) maritimus, Heleocharis spp., Marsilea quadrifolia, Sagittaria spp., Potamogeton spp., Sparganium erectum, Typha angustifolia, Ammania coccinea, Bidens frondosa, Heteranthera rotundifolia, Leersia oryzoides (da seme), Schoenoplectus (Scirpus) mucronatus, Alisma plantago aquatica, Alisma lanccolata, Cyperus spp., Thypha spp., che siano piccole ed in attiva crescita; si ha pure un controllo iniziale di Heteranthera reniformis e Heteranthera limosa con infestanti allo stadio di rosetta e nessuna foglia emersa. Agisce per assorbimento fogliare e radicale ed è traslocato nei tessuti meristematici delle infestanti con arresto della crescita.
RISO: impiegato alla dose di g. 100 per ettaro con la risaia completamente ed uniformemente sommersa, con circa 3 10 cm di acqua, e trattando da 20 a 40 giorni dopo la semina del riso. Dopo il trattamento non effettuare immissioni di acqua per almeno 5 giorni. Si consiglia di non trattare nel caso le colture di riso siano deboli per cause climatiche, o da qualsiasi altra causa ed inoltre l'impiego ripetuto, sullo stesso terreno, degli stessi erbicidi possono produrre selezioni naturali di biotipi che possono diventare dominanti e resistenti all'azione dell'erbicida; si consiglia, in tali casi, l'alternanza con prodotti aventi meccanismi d'azione differenti ma uguali come efficacia.
Compatibilità: Non compatibile con i prodotti a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: fitotossico per le colture non indicate in etichetta; non colpire quindi direttamente o tramite deriva le colture o piante arboree. Si raccomanda di non lavare le attrezzature vicino a qualunque altra pianta o coltura. Per la pulizia del serbatoio o pompa usata per il trattamento, svuotare il serbatoio, poi risciacquare la pompa, le barre con acqua pulita e svuotare ancora; nel serbatoio aggiungere ancora acqua pulita ed aggiungere circa lt 0,5/hl di candeggina, risciacquare pompa e barre con agitatore in funzione per circa 10 minuti. Rimuovere il tutto, tornare a risciacquare con acqua pulita ed i filtri e gli ugelli debbono essere puliti separatamente anch'essi con una soluzione al 5% di ipoclorito di sodio.
Attenzione : il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate, evitando usi impropri.
Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi indicati: ogni altro impiego è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile dagli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

PAM

Fungicida ad azione sistemica
Tipo di preparazione : liquido solubile

Composizione
- PROPAMOCARB cloroidrato g. 66,5 (= 722 g/l)
- Coadiuvanti qb a 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : carbammato che non presenta una evidente inibizione della colinesterasi.
Consigli Terapeutici : nei casi di intossicazione è sufficente dare al paziente una sospensione acquosa di carbone attivato : praticare eventualmente una lavanda gastrica. Nei casi di maggiore gravità somministrare atropina solfato per iniezione, facendo attenzione a non eccedere con le dosi, specialmente nei bambini. Sono inoltre possibili altri trattamenti di supporto sa stabilire in base ai sintomi.

MODALITA' D'IMPIEGO
Fungicida sistemico indicato nella difesa di numerose colture nel combattere i seguenti ficomiceti: Pythium spp., Phytophthora sp., Peronospora, Pseudoperonospora, Aphanomices sp., Bremia.
Viene assorbito prevalentemente dalle radici e poi traslocato nell'apparato fogliare, caratterizzato da una lunga e completa protezione ed elevata selettività sulle colture.
Il prodotto ha la caratteristica di poter essere impiegato con numerose tecniche quali: trattamenti fogliari, concia delle sementi, bagno dei bulbi e delle talee, disinfezione dei terricciati e dei letti di semina, trattamenti al terreno in pre e post - trapianto delle colture.
Viene impiegato sulle seguenti colture : **agrumi, melo, pero, fragola, cavoli, lattuga, cicoria, indivia, radicchio, spinacio, bietola da foglia e da costa, sedano, prezzemolo, basilico, cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo), solanacee (pomodoro, peperone, melanzana), carota, bietola da orto, rapa, cipolla, aglio, porro, tabacco, floreali, forestali, ornamentali, nei vivai, nei semenzai, nella concia delle sementi e bulbi, campi da golf e prati ornamentali.**
INTERVENTI
TRATTAMENTI FOGLIARI : viene impiegato alla dose di litri 1,5 - 3 per ettaro di coltura in circa 10 - 15 ettolitri di acqua, sulle colture sopramenzionate.
CONCIA DELLE SEMENTI : la dose d'impiego è di ml 1 - 4 per kg di seme di piccole dimesione e ml. 10 - 40 per kg. di seme di dimensioni maggiori.
PREPARAZIONE DEI TERRICCIATI : impiegare 300 ml di prodotto per metro cubo di terriccio, disciolti in circa 20 litri di acqua.
TRATTAMENTI AI SEMENZAI : impiegare ml. 8 - 12 per metro quadro di superfice disciolti in 4 - 5 litri di acqua con l'avvertenza di ripetere il trattamento cinque giorni prima del trapianto con l'utilizzo di 6 - 8 litri di acqua per metro quadrato.
TRATTAMENTI AL TERRENO
pre - trapianto : impiegare ml 8 - 12 per metro quadro in 3 - 5 litri di acqua.
post - trapianto : impiegare 100 - 200 ml per pianta di una soluzione ottenuta diluendo 200 ml di prodotto per q.le acqua: trattare ogni 10 - 15 giorni con un massimo di 3 - 4 interventi.
COLTURE FLOREALI IN GENERALE - informazioni particolareggiate per le seguenti colture : Garofano – Gerbera : si impiega il prodotto specificatamente contro Pythium e Phytophtora alla dose di ml 12 - 15 per metro quadro, disciolto in circa 2 - 4 litri di acqua, trattando due giorni prima dell'impianto e quindi procedendo all'incorporamento. Successivamente impiegare 200 ml per q.le acqua, con trattamento fogliare, bagnando abbondantemente con 400 - 500 litri ogni 1000 metri quadri, ad intervalli inizialmente di circa 8 - 10 giorni e successivamente ogni 15 - 25 giorni.
BULBOSE : per controllare Pythium ultimum e Phytophthora si immergono i bulbi per 20 - 30 minuti in una soluzione contenente 300 ml di prodotto per q.le acqua, poi, prima della messa a dimora, si tratta il terreno con 10 - 12 ml di prodotto, per metro quadrato in 2 - 4 litri di acqua e successivo incorporamento a circa 10 - 12 cm di profondità.
PIANTE FORESTALI (VIVAI) : contro Phytophthora cactorum, Phytophtora cinnamomi e Pythium, trattando il substrato colturale con 300 ml di prodotto per metro cubo, disciolto in 8 - 10 litri di acqua; intervenire, in caso di necessità all'emergenza ogni 15 - 18 giorni con 4 - 5 litri di acqua per metro quadro di una soluzione allo 0,2% (200 ml/hl di acqua).
CAMPI DA GOLF, PRATI ORNAMENTALI : contro Pythium aphanidermatum e altre specie alla dose di 1-1,5 ml/mq. Trattamenti fogliari irrorando con almeno 100-200 l di soluzione per 1000mq. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni microclimatiche favorevoli allo sviluppo della malattia (caldo umido, con umidità relativa superiore al 70-80%) e, soprattutto nel periodo critico, ripetere i trattamenti ogni 14 -15 giorni
"non rientrare nelle aree trattate prima di 24 ore dal trattamento segnalando con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del pesticida"
COMPATIBILITA' : non compatibile con i prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese) e gli olii minerali. **AVVERTENZA** : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
"I semi trattati e residuati della semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame" – "Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi" – "Effettuare i trattamenti in locali ben aerati"
Nocività : nocivo per i pesci
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

AGROWIN BIOSCIENCES srl – Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Officina di produzione : TORRE srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI) / TERRANALISI Srl Cento (FE) / ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI)
Registrazione n. 10.582 del 6/09/2000 del Ministero della Sanità
litri 0,05-0,1-0,2-0,5-1-5-10-20 - Partita N. :

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ETICHETTA PER CONFEZIONE DI FORMATO RIDOTTO

PAM

Fungicida ad azione sistemica
Tipo di preparazione : liquido solubile

Composizione
- PROPAMOCARB cloroidrato g. 66,5 (= 722 g/l)
- Coadiuvanti qb a 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza;
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : carbammato che non presenta una evidente inibizione della colinesterasi.
Consigli Terapeutici : nei casi di intossicazione è sufficente dare al paziente una sospensione acquosa di carbone attivato : praticare eventualmente una lavanda gastrica. Nei casi di maggiore gravità somministrare atropina solfato per iniezione, facendo attenzione a non eccedere con le dosi, specialmente nei bambini. Sono inoltre possibili altri trattamenti di supporto sa stabilire in base ai sintomi.

AGROWIN BIOSCIENCES srl – Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Officina di produzione : TORRE srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
TERRANALISI Srl – Cento (FE)
ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI)
Registrazione n. 10.582 del 6/09/2000 del Ministero della Sanità
litri 0,05-0,1-0,2-0,5 Partita N. :

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

PROBE

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
Erbicida a base di 2,4D per il diserbo selettivo
del frumento e dei cereali minori

COMPOSIZIONE
24 D Acido puro (da estere isottilico) g 32,5 (=320 g/l)
Coformulanti q. b. a g.100
(contiene Xilene)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Infiammabile; Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione; Irritante per la pelle; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES Srl
Via Montegrappa, 7 - 24121 Bergamo

Stabilimenti di produzione: Torre srl – Torrenieri (SI) / ALTHALLER ITALIA Srl – San Colombano al Lambro (MI) / A.D.I.C.A. Srl – Faenza (RA)

Reg. Ministero della Salute n. 11220 del 22/02/02

Contenuto: 0,5 - 1 - 5 - 10 litri Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucosa oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione. alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ DI IMPIEGO
Il PROBE distrugge le più comuni infestanti a foglia larga del frumento, dell'orzo, della segale e dell'avena. Il PROBE mantiene la propria efficacia se dopo il trattamento subentra una pioggia e risulta efficace anche operando su vegetazione bagnata.

DOSI DI IMPIEGO
Il PROBE si impiega a dosi comprese fra i L. 0,400 ed i L. 1,250 per ettaro diluito in un quantitativo di acqua che consenta di irrorare uniformemente l'appezzamento da diserbare (circa 400-600 litri per ettaro). La dose più bassa si impiegherà operando in giornate calde, su infestanti molto sensibili ed ancora nei primi stadi di sviluppo. La dose più elevata sarà invece necessaria operando in giornate fresche su malerbe più resistenti e già sviluppate.

EPOCA DI APPLICAZIONE
L'epoca utile per eseguire il trattamento decorre da quando il cereale ha ultimato l'accestimento e termina quando il cereale stesso inizia la fase di botticella (rigonfiamento della spiga nella guaina fogliare). Non eseguire il trattamento con temperature al di sotto dei 10°C. Operare in giorni senza vento e tenere il getto rivolto verso il basso affinche' la nube irrorante non venga a contatto direttamente od indirettamente con colture sensibili.Non impiegare le attrezzature usate per la preparazione e distribuzione della miscela erbicida per trattamenti antiparassitari. Riservarle esclusivamente a trattamenti erbicidi.

COMPATIBILITÀ
Il PROBE non deve essere miscelato con prodotti di nessun genere.

FITOTOSSICITÀ
Prima del diserbo di colture effettuare un saggio preventivo su una piccola superficie per rilevare se esistono eventuali sensibilità alla coltura. Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è nocivo per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA:20 giorni

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

RASCH

(CONCENTRATO SOLUBILE)
Fitoregolatore

COMPOSIZIONE
-ETEFON puro g. 39,5 (= 478 g/l)
-Coformulanti qb a g 100

CORROSIVO

FRASI DI RISCHIO :
Nocivo per inalazione e contatto con la pelle;
Provoca ustioni; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di
sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl – Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Officine di produzione : CHEMIA Spa – S.Agostino (FE) – Althaller Srl – S.Colombano al Lambro (MI) – Torre srl– Torrenieri Fraz. di Montalcino (SI) – SAPEC S.A. Setubal Portogallo
Registrazione Ministero della Salute n° 11.585 del 06/02/2003
Contenuto : 25-50-100-250-500 ml / 1-5 L

INFORMAZIONI MEDICHE : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto e' un fitoregolatore di sintesi che, dopo essere stato assorbito dalla pianta, libera etilene . Questo gas, che la pianta gia produce, e' in grado di stimolare la maturazione della frutta .

POMODORO DA INDUSTRIA :
per anticipare ed uniformare la maturazione dei frutti, 1-4 l/ha, con trattamenti singoli o frazionati. Intervenire quando il 40-60% delle bacche sono mature. La dose piu alta si impiega su varietà tardive con temperatura di 12-15 ° C al momento del trattamento e su varietà a maturazione scalare. Il prodotto può essere distribuito con le normali barre irroratrici diluito in 10 – 12 ettolitri di acqua ad ettaro.
POMODORO DA MENSA : 200-250 ml/hl per anticipare ed uniformare la maturazione dei frutti. Irrorare solo i frutti prossimi alla raccolta (invaiatura). Nel caso si voglia far maturare contemporaneamente tutte le bacche, grandi e piccole , per liberare il terreno dalla coltura, trattare tutta la pianta.

MELO :
- Cultivar precoci, trattare 8-10 giorni prima della raccolta : 40-50 ml/hl.
- Cultivar medio tardiva , trattare 15/20 giorni prima della raccolta
80-100 ml/hl
Raccogliere 7-10 giorni dopo il trattamento, in quanto il prodotto anticipa la maturazione. Il prodotto può essere distribuito con le normali attrezzature da irrorazione diluito in 15-20 ettolitri di acqua ad ettaro.

TABACCO : l' impiego del prodotto risulta particolarmente vantaggioso in quanto e' in grado di ridurre il numero delle raccolte manuali, anticipando e uniformando la maturazione della foglia.
- varietà scalari, non cimate e tradizionalmente raccolte a " foglia "(Burley,Bright ecc.) 200-350 ml/hl d'acqua, intervenendo dopo 1 o 2 raccolte quando le foglie restanti hanno raggiunto il massimo sviluppo e/o mostrano segni di cambiamento di colore.
- varietà a maturazione contemporanea o cimate tradizionalmente raccolte a " pianta " (Nostrano del Brenta , Avana, Kentucky , ecc) 200-350 ml/hl d'acqua, intervenendo su tutta la pianta dopo l'asportazione delle foglie basali. In ogni caso, prima di intervenire su una superficie vasta, effettuare dei piccoli saggi su poche piante, osservando attentamente l'evoluzione delle foglie trattate.
COMPATIBILITA' : Il prodotto si impiega da solo.
FITOTOSSICITA' : Il prodotto su pomodoro, può causare un parziale ingiallimento delle foglie; inoltre i fiori aperti, se bagnati dalla soluzione cadono.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU MELO, 10 GIORNI SU POMODORO.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

REX

Erbicida selettivo in miccrogranuli idrodispersibili

Composizione
- Dicamba puro g. 70
- coadiuvanti qb a 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO :
Irritante per gli occhi; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl - via Monte Grappa 7 (Bergamo)
officina di produzione : STI-SOLFOTECNICA ITALIANA – Cotignola (RA) / SIDECO Dr. SCHIM GMBH – Mecklemburger strasse 229 – D – 23568 LUBECK
registrazione n. 10.414 del 29/03/2000 del Ministero della Salute
kg : 0,1-0,2-0,3-0,5-1-3-10-15-20 partita n. :

NORME PRECAUZIONALI : Conservare la confezione ben chiusa

***INFORMAZIONI PER IL MEDICO** : irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia*
Terapia : sintomatica - Consultare un Centro antiveleni.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
Erbicida selettivo che viene assorbito dalle malerbe infestanti per via fogliare e radicale e poi traslocato nella pianta con la circolazione linfatica con rapido assorbimento, eventuali pioggie, dopo poche ore dal trattamento, non influiscono sull'attività erbicida. Combatte le seguenti infestanti: amaranto, borsa del pastore, caglio, camomilla, canapa selvatica, cencio molle, centocchio comune, centocchio dei campi, erba storna comune, senape selvatica, senecione comune, veccia, veronica spp., stoppione, vilucchio bianco, vilucchio comune. Impiegato sulle seguenti colture:
FRUMENTO – ORZO – AVENA – SEGALE: alla dose di g. 140 – 175 per ettaro allo stadio delle 4 – 5 foglie della coltura sino all'inizio della levata.
PRATI – PASCOLI – PRATI ORNAMENTALI: alla dose di g. 370 per ettaro contro le infestanti a foglia larga quando sono nei primi stadi di sviluppo, facendo trascorrere almeno quattro giorni prima del taglio successivo.
MAIS: alla dose di g. 250 – 350 per ettaro, in post-emergenza, con piante già nate, quando la coltura non ha ancora superato l'altezza
di 40 cm. Non applicare su linee pure di mais da seme e su mais dolce.
SORGO DA GRANELLA: alla dose di g. 250 per ettaro, in post – emergenza prima che le piantine della coltura abbiano superato la quinta foglia.
TERRENI AGRICOLI SENZA COLTURA: alla dose di g. 175 – 210 per ettaro per il contenimento delle infestanti dicotiledoni, per evitare la disseminazione e per poter mantenere una copertura vegetale al terreno utile a limitare l'erosione. Inoltre per la totale eliminazione della vegetazione impiegare g. 400 per ha. Tenere presente che dal trattamento alla semina di colture successive bisogna far trascorrere minimo 20 giorni.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. **AVVERTENZA:** per applicazioni su prati ornamentali segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione del prodotto. "non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore" – " non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza "
Compatibilità : impiegato da solo.
Fitotossicità : Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Sospendere i trattamenti 130 giorni prima della raccolta del sorgo, 20 giorni per le altre colture.
"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

SONNE

FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE
FORMULAZIONE : POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Procimidone puro g 50
Coformulanti q. b. a 100

Pericoloso per l'ambiente

Frasi di Rischio : Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl
Via Monte Grappa, 7 - Bergamo
Stabilimento di produzione: S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA) / TERRANALISI Srl Cento (FE)
Registrazione del Ministero della Salute n. 10.757 del 19/03/2001
Peso netto : kg 0,1 0,2 0,5 1 5 10 15 20 Partita n.:*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO
SONNE è un fungicida a base di Procimidone, che esplica la propria azione preventivamente ed in modo curativo nelle prime fasi di incubazione: risulta essere dotato di moderata attività sistemica
Colture protette:
VITE - indicato contro la muffa grigia alla dose di g 100-150/hl, effettuando 3-4 trattamenti nei periodi di fine fioritura, poi quando gli acini hanno il diametro di ca. 3 mm (in coincidenza della chiusura del grappolo), poi si tratta all'invaiatura 7-8 settimane prima del raccolto per finire 3-4 settimane prima della raccolta. Si consiglia di bagnare molto affinchè vi sia una distribuzione uniforme del prodotto; l'impiego della dose più alta è su varietà più sensibili all'attacco della malattia.
PESCO - NETTARINE - indicato contro il marciume bruno (monilia) sia dei fiori e dei rami (g 150-200 per q.le acqua, con un primo trattamento ai bottoni fiorali ed un altro con il 25% dei fiori aperti ed un successivo in piena fioritura) e dei frutti (g 100-150 per q.le acqua, trattando 30-35 gg e 15-20 giorni prima della raccolta.
PERO - indicato contro la maculatura bruna g 100-150 per q.le acqua con trattamenti a partire dalla fioritura e ripetuti.
ALBICOCCO - SUSINO - indicato contro la muffa grigia e marciumi da sclerotinia alla dose di g 100-200 per q.le acqua.
MANDORLO - indicato contro la monilia alla dose di g 150-200 per q.le acqua.
ACTINIDIA - indicato contro i marciumi da botrytis e marciumi da sclerotinia, a g 75-100/hl alla caduta dei petali ed eventualmente in pre-raccolta; in post-raccolta con doccia (drencher) g 12/hl; trattamenti per immersione: g 12/hl.
NOCCIOLO - indicato contro la maculatura fogliare del nocciolo a g 75-100/hl.
FRAGOLA - indicato contro la muffa grigia a g 80-100 per q.le acqua con 3 trattamenti alle seguenti epoche: alla schiusura dei petali, poi con circa il 10-20% dei fiori aperti ed alla completa sfioritura. Bagnare bene sia la pianta che il terreno circostante.
POMODORO - indicato contro la muffa grigia g 80-100 per q.le acqua, iniziando a trattare a fine fioritura del primo palco fiorale e ripetendo ogni 15 giorni sino a concludere 28 giorni prima della raccolta.
LATTUGA - indicato contro il mal dello sclerozio alla dose di Kg 1,5-2 per ettaro.
INDIVIA - indicato contro il mal dello sclerozio e la muffa grigia alla dose di Kg 1,5-2 per ettaro.
TABACCO - indicato contro i marciumi da botrytis e marciumi da sclerotini alla dose di Kg 1,5-2 per ettaro.
PEPERONE - MELANZANA - indicato contro la muffa grigia e marciumi da sclerotinia alla dose di g 80-100 per q.le acqua.
AGLIO - indicato contro la muffa grigia e mal dello sclerozio alla dose di g 30 per Kg 100 di seme.
CIPOLLA - indicato contro la muffa grigia e marciume bianco dei bulbi alla dose di g 100-150/hl.
CETRIOLO - indicato contro la marcescenza dei semi e morte delle plantule, marciumi da botrytis a g 100-150/hl.
GIRASOLE - indicato contro la sclerotinia a g 100/hl prima della fioritura e g 100 -200 per q.le di seme nella concia.
COLZA - indicato contro la sclerotinia alla dose di Kg 1-1,5 per ettaro all'inizio della fioritura.
ORNAMENTALI - Indicato contro i marciumi da botrytis a g 40-80/hl.
FLORICOLTURA (in pieno campo ed in serra) - viene indicato contro la muffa grigia della rosa a g 40-80 per q.le acqua, effettuando almeno 3 trattamenti iniziando dal germogliamento sino ad inizio fioritura, bagnando molto bene tutta la vegetazione. Indicato contro la muffa grigia della Gerbera, Geranio, Crisantemo, Garofano g 40-80 per q.le acqua trattando con presenza della malattia a ripetuti interventi. Indicato contro la rhizoctonia del garofano ed altri ornamentali g 4 dispersi in 5-10 litri di acqua per mq di superficie, intervenendo 10 gg circa dopo la messa a dimora, quando è superata la crisi del trapianto e con comparsa dei primi sintomi della malattia ed eventualmente ripetendo l'intervento dopo circa un mese.
COMPATIBILITA' - Miscibile con antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Sui trattamenti alle colture orticole e floricole, specie se in serra, fare saggi preliminari.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto della vite, girasole, susino; 60 giorni per l'actinidia (derrata post-raccolta); 45 giorni per la colza; 14 giorni prima del raccolto sulle altre colture.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

SONNE

FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE
FORMULAZIONE : POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Procimidone puro g 50
Coformulanti q. b. a 100

Pericoloso per l'ambiente

Frasi di Rischio : Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl - Via Monte Grappa, 7 - Bergamo
Stabilimento di produzione: STI SOLFOTECNICA COTIGNOLA (RA)
Registrazione del Ministero della Salute n. 10.757 del 19/03/2001
Peso netto : kg 1 (1x1) (0,5x2) (0,25x4) (0,2x5) Partita n.:*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO
SONNE è un fungicida a base di Procimidone, che esplica la propria azione preventivamente ed in modo curativo nelle prime fasi di incubazione: risulta essere dotato di moderata attività sistemica

Colture protette:
VITE - indicato contro la muffa grigia alla dose di g 100-150/hl, effettuando 3-4 trattamenti nei periodi di fine fioritura, poi quando gli acini hanno il diametro di ca. 3 mm (in coincidenza della chiusura del grappolo), poi si tratta all'invaiatura 7-8 settimane prima del raccolto per finire 3-4 settimane prima della raccolta. Si consiglia di bagnare molto affinchè vi sia una distribuzione uniforme del prodotto; l'impiego della dose più alta è su varietà più sensibili all'attacco della malattia.
PESCO - NETTARINE - indicato contro il marciume bruno (monilia) sia dei fiori e dei rami (g 150-200 per q.le acqua, con un primo trattamento ai bottoni fiorali ed un altro con il 25% dei fiori aperti ed un successivo in piena fioritura) e dei frutti (g 100-150 per q.le acqua, trattando 30-35 gg e 15-20 giorni prima della raccolta.
PERO - indicato contro la maculatura bruna g 100-150 per q.le acqua con trattamenti a partire dalla fioritura e ripetuti.
ALBICOCCO - SUSINO - indicato contro la muffa grigia e marciumi da sclerotinia alla dose di g 100-200 per q.le acqua.
MANDORLO - indicato contro la monilia alla dose di g 150-200 per q.le acqua.
ACTINIDIA - indicato contro i marciumi da botrytis e marciumi da sclerotinia, a g 75-100/hl alla caduta dei petali ed eventualmente in pre-raccolta; in post-raccolta con doccia (drencher) g 12/hl; trattamenti per immersione: g 12/hl.
NOCCIOLO - indicato contro la maculatura fogliare del nocciolo a g 75-100/hl.
FRAGOLA - indicato contro la muffa grigia a g 80-100 per q.le acqua con 3 trattamenti alle seguenti epoche: alla schiusura dei petali, poi con circa il 10-20% dei fiori aperti ed alla completa sfioritura. Bagnare bene sia la pianta che il terreno circostante.
POMODORO - indicato contro la muffa grigia g 80-100 per q.le acqua, iniziando a trattare a fine fioritura del primo palco fiorale e ripetendo ogni 15 giorni sino a concludere 28 giorni prima della raccolta.
LATTUGA - indicato contro il mal dello sclerozio alla dose di Kg 1,5-2 per ettaro.
INDIVIA - indicato contro il mal dello sclerozio e la muffa grigia alla dose di Kg 1,5-2 per ettaro.
TABACCO - indicato contro i marciumi da botrytis e marciumi da sclerotini alla dose di Kg 1,5-2 per ettaro.
PEPERONE - MELANZANA - indicato contro la muffa grigia e marciumi da sclerotinia alla dose di g 80-100 per q.le acqua.
AGLIO - indicato contro la muffa grigia e mal dello sclerozio alla dose di g 30 per Kg 100 di seme.
CIPOLLA - indicato contro la muffa grigia e marciume bianco dei bulbi alla dose di g 100-150/hl.
CETRIOLO - indicato contro la marcescenza dei semi e morte delle plantule, marciumi da botrytis a g 100-150/hl.
GIRASOLE - indicato contro la sclerotinia a g 100/hl prima della fioritura e g 100 -200 per q.le di seme nella concia.
COLZA - indicato contro la sclerotinia alla dose di Kg 1-1,5 per ettaro all'inizio della fioritura.
ORNAMENTALI - Indicato contro i marciumi da botrytis a g 40-80/hl.
FLORICOLTURA (in pieno campo ed in serra) - viene indicato contro la muffa grigia della rosa a g 40-80 per q.le acqua, effettuando almeno 3 trattamenti iniziando dal germogliamento sino ad inizio fioritura, bagnando molto bene tutta la vegetazione. Indicato contro la muffa grigia della Gerbera, Geranio, Crisantemo, Garofano g 40-80 per q.le acqua trattando con presenza della malattia a ripetuti interventi. Indicato contro la rhizoctonia del garofano ed altri ornamentali g 4 dispersi in 5-10 litri di acqua per mq di superficie, intervenendo 10 gg circa dopo la messa a dimora, quando è superata la crisi del trapianto e con comparsa dei primi sintomi della malattia ed eventualmente ripetendo l'intervento dopo circa un mese.
COMPATIBILITA' - Miscibile con antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Sui trattamenti alle colture orticole e floricole, specie se in serra, fare saggi preliminari.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto della vite, girasole, susino; 60 giorni per l'actinidia (derrata post-raccolta); 45 giorni per la colza; 14 giorni prima del raccolto sulle altre colture.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE. - NON TOCCARE CON MANI BAGNATE - DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE L'INVOLUCRO - DA NON VENDERE, NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE ORIGINALE

MODO DI UTILIZZO

1 — 20-25%

2

3 — Mettere in funzione l'agitatore

4

5

SONNE

FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE
FORMULAZIONE : POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Procimidone puro g 50
Coformulanti q. b. a 100

Pericoloso per l'ambiente

AGROWIN BIOSCIENCES srl
Via Monte Grappa, 7 - Bergamo
Stabilimento di produzione: STI SOLFOTECNICA COTIGNOLA (RA)

Registrazione del Ministero della Salute n. 10.757 del 19/03/2001
Peso netto : kg 1 (1x1) (0,5x2) (0,25x4) (0,2x5) Partita n.:……..

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE
FUORI DALLA CONFEZIONE

AVVERTENZA : LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA
SULLA CONFEZIONE

SONNE SC

FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA CONTRO MUFFA GRIGIA ED ALTRE CRITTOGAME

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

-Procimidone puro g 25 = 285 g/l
-Coformulanti q. b. a 100

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, né fumare durante l'impiego; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl - Via Monte Grappa, 7 - Bergamo

Stabilimento di produzione: Chemia Spa – S.Agostino (FE)
Contenuto netto : litri 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15-20-25
Registrazione del Ministero della Salute n. 11909 del 16/01/2004 Partita N……………….

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche tecniche
SONNE SC e' un prodotto ad azione prevalentemente sistemica , protegge le colture trattate dalle malattie fungine con azione preventiva e curativa.
Dosi, epoche e modalità di impiego :
SONNE SC e' consigliato sulle seguenti colture alle dosi a fianco di ciascuna indicate :
VITE – contro muffa grigia : ml 200-300/hl. In relazione all'andamento climatico ed alle caratteristiche varietali sono consigliati 3-4 trattamenti nelle seguenti epoche 1° a fine fioritura; 2° quando gli acini hanno diametro di circa 3 mm; 3° all'invaiatura (7-8 settimane prima della raccolta) : 4° a 3-4 settimane prima della raccolta. Distribuire una adeguata quantità di miscela per ottenere una completa ed uniforme copertura della vegetazione. Utilizzare la dose più alta sulle varietà più sensibili alla malattia particolarmente quando l'andamento stagionale e' piovoso.
Non interferisce con il regolare andamento della fermentazione dei mosti e non altera il gusto dei vini.
ACTINIDIA (Kiwi) - contro muffa grigia : ml 300-400/hl. Impiegare nelle seguenti epoche : piena fioritura; fine fioritura – inizio allegazione; ingrossamento dei frutti ; 15 giorni prima della raccolta per difendere il frutto durante la conservazione in frigorifero.
PESCO ALBICOCCO - SUSINO – contro Monilia o Marciume bruno dei frutti e dei rami : ml 300-400 hl . Impiegare alla comparsa dei bottoni fiorali, quando il circa il 25% dei fiori sono schiusi e in piena fioritura. Contro Monilia dei frutti ml 200-300 hl Impiegare a 4-5 e a 2-3 settimane prima della raccolta.
PERO – contro Alternaria o Maculatura bruna : ml 200-300 hl Effettuare trattamenti ripetuti a partire dalla fioritura.
MANDORLO contro Monilia dei fiori : ml 300-400 hl. Effettuare il trattamento fino alla prima fioritura.
NOCCIOLO – contro Marciume bruno : ml 150-200 hl. Impiegare preventivamente in prossimità della allegagione.
TABACCO – contro Muffa grigia e Sclerotinia : l 3-4 ha . impiegare a superamento della crisi di trapianto.
GIRASOLE – contro Muffa grigia e Sclerotinia : ml 200 hl. Effettuare un trattamento preventivo prima della fioritura.
COLZA – contro Sclerotinia : l 2-3 ha . effettuare un intervento all'inizio della fioritura.
POMODORO – contro muffa grigia : ml 150-200 hl . Iniziare i trattamenti al termine della fioritura del primo palco fiorale e ripeterli ogni 15 giorni sino a due settimane prima della raccolta.
PEPERONE E MELANZANA – contro Muffa grigia e Sclerotinia : ml 150-200 hl. Effettuare non più di uno (peperone) e tre (melanzana) trattamenti a stagione.
FRAGOLA – contro Muffa grigia : ml 150-200 hl. Effettuare 3 trattamenti nelle seguenti epoche : 1° alla apertura dei petali ; 2 ° quando i fiori sono schiusi per circa il 20% ; 3° alla sfioritura. Bagnare abbondantemente la pianta.
LATTUGA E INDIVIA - contro Muffa grigia e Sclerotinia : l 3-4 ha . effettuare non più di due trattamenti per stagione.
CIPOLLA – contro Muffa grigia : ml 200-300 hl : effettuare trattamenti alla prima comparsa dei sintomi
CETRIOLO E FAGIOLINO – contro Muffa grigia a Sclerotinia : ml 200-300 hl. Impiegare alla prima comparsa dei sintomi
ROSA – (in pieno campo) contro muffa grigia : ml 80-150 hl : effettuare almeno tre trattamenti iniziando dal germogliamento avanzato sino all'inizio della fioritura avendo cura di bagnare uniformante tutta la vegetazione.
GERBERA , GERANO, CRISANTEMO GAROFANO (in pieno campo) – contro Muffa grigia : ml 80-150 hl. Effettuare trattamenti ripetuti durane il periodo di sviluppo della malattia.
Preparazione della miscela : diluire la giusta dose di prodotto in poca acqua sino ad ottenere una sospensione omogenea. Versare quindi nel serbatoio della irroratrice aggiungendo il resto dell'acqua per raggiungere la concentrazione voluta.
Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Nei trattamenti alle colture floricole e pomodoro eseguire saggi preliminari in quanto alcune varietà potrebbero risultare sensibili.
INTERVALLO DI SICUREZZA - 45 giorni prima della raccolta per colza; 21 giorni per vite, susino girasole e 14 giorni per actinidia , pesco, albicocco , pero, pomodoro peperone, melanzana, fragola, lattuga, indivia, cetriolo, fagiolino.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

TEAM

tipo di formulazione : polvere bagnabile

Composizione:
-Fosetil Alluminio puro g. 80
-Coformulanti qb a 100

Frasi di Rischio
Rischio di gravi lesioni oculari; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

IRRITANTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Proteggersi gli occhi/la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl
Via Monte Grappa, 7 - Bergamo
Officina di produzione : STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - Cotignola (RA) / CHEMIA spa - S.Agostino (FE)
Registrazione n° 10.768 del 23/03/2001 del Ministero della Salute
Partita n. ...... - kg 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15-20

INFORMAZIONI MEDICHE : in caso di intossicazione informare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

MODALITA' D'IMPIEGO
Fungicida che possiede azione sistemica che si manifesta in modo ascendente e discendente che è evidente con vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita, e gli permette di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento;, quindi dotato di una notevole mobilità sulle colture trattate.
Vite : viene impiegato contro la Peronospora alla dose di g. 250 per q.le acqua trattando sempre in miscela con prodotti di copertura.
Melo, Pero, Pesco, Actinidia : viene impiegato contro la Phytophthora cactorum trattando sulla vegetazione, una volta al mese, dalla sfioritura fino a quaranta giorni dalla raccolta (per melo e actinidia), con 250 g/hl. Nel caso di colture già debilitate dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida: effettuare un'innaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, con litri 1-2 per pianta di una poltiglia costituita da Kg. 5 di prodotto per 100 litri d'acqua.
Melo - Pero : viene impiegato contro la Ticchiolatura con trattamenti preventivi a g. 150 - 250, nelle fasi pre - fiorali e subito dopo l'allegagione si consigli l'associazione con fungicidi di copertura o con Dodina. **Pero** : viene impiegato contro la Maculatura bruna (Stemphyllium sp.), trattamenti preventivi a 250 g. per q.le acqua. **Fragola** : viene impiegato contro la Peronospora (Phytophthora cactorum e fragariae). L'immersione delle piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti, seguita da 2-3 irrorazioni alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immersione delle piante prima del trapianto in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti, seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di g. 0.5 di formulato per pianta. **Lattuga** : viene impiegato contro la Bremia lactucae effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire almeno 3 Kg. di prodotto per ettaro). Si consiglia di effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto; se si verificano forti sbalzi termici la lattuga può essere sensibile al prodotto. **Melone** : viene impiegato contro la Pseudoperonospora cubensis effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl avendo cura di distribuire, come minimo, 3 Kg. di prodotto per ettaro. **Cocomero, Cetriolo, Spinacio** : viene impiegato contro la Peronospora, effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire, come minimo, 3 Kg. di prodotto per ettaro). **Carciofo** : viene impiegato contro la Bremia lactucae a 200-300 g/hl. **Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo** : viene impiegato contro Phytophthora spp. effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl, utilizzando dieci litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione possono venire integrati da pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche); pratica indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida. **Vivai di fruttiferi** : effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl con cadenza mensile. **Vivai di agrumi** : impiegare la dose di 400 g/hl ogni 60 giorni. **Colture Ornamentali in pieno campo ed in serra** : Viene impiegato contro la Phytophthora cinnamoni di Chamaecyparis e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee. Poinsettia, St.Paulia e Crisantemo, effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con g. 5-10 di formulato per mq. una volta al mese in primavera.
COMPATIBILITA' : Il prodotto non é compatibile con i prodotti a base di rame, di Dicofol e con concimi fogliari contenenti azoto. Si consiglia inoltre di non irrorare il prodotto su colture precedentemente trattate con i formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto. Nella miscelazione del prodotto con altri formulati si consigliano comunque saggi preliminari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti: 15 giorni prima del raccolto su carciofo, cetriolo, cocomero, melone, lattuga, spinacio; 30 giorni prima del raccolto su fragola; 40 giorni prima del raccolto su melo, pero, pesco, actinidia e vite; 80 giorni prima della raccolta di arancio, limone, mandarino, pomplemo.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso é pericoloso.
Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

TEAM

tipo di formulazione : polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

Composizione:
-Fosetil Alluminio puro g. 80
-Coformulanti qb a 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Rischio di gravi lesioni oculari; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini;
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego;
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl
Via Monte Grappa, 7 - Bergamo

Officina di produzione : STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - Cotignola (RA) / CHEMIA spa - S.Agostino (FE)
Registrazione n° 10.768 del 23/03/2001 del Ministero della Salute
Partita n. ......
Contenuto del sacchetto : kg 1 (1 sacchetto idrosolubile da kg 1) / (2 sacchetti idrosolubili da g 500) / (4 sacchetti idrosolubili da g 250) / (5 sacchetti idrosolubili da g 200)

INFORMAZIONI MEDICHE : in caso di intossicazione informare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

MODALITA' D'IMPIEGO
Fungicida che possiede azione sistemica che si manifesta in modo ascendente e discendente che è evidente con vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita, e gli permette di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento;, quindi dotato di una notevole mobilità sulle colture trattate.
Vite : viene impiegato contro la Peronospora alla dose di g. 250 per q.le acqua trattando sempre in miscela con prodotti di copertura.
Melo, Pero, Pesco, Actinidia : viene impiegato contro la Phytophthora cactorum trattando sulla vegetazione, una volta al mese, dalla sfioritura fino a quaranta giorni dalla raccolta (per melo e actinidia), con 250 g/hl. Nel caso di colture già debilitate dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida: effettuare un'innaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, con litri 1-2 per pianta di una poltiglia costituita da Kg. 5 di prodotto per 100 litri d'acqua.
Melo - Pero : viene impiegato contro la Ticchiolatura con trattamenti preventivi a g. 150 - 250, nelle fasi pre - fiorali e subito dopo l'allegagione si consigli l'associazione con fungicidi di copertura o con Dodina. **Pero** : viene impiegato contro la Maculatura bruna (Stemphyllium sp.), trattamenti preventivi a 250 g. per q.le acqua. **Fragola** : viene impiegato contro la Peronospora (Phytophthora cactorum e fragariae). L'immersione delle piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti, seguita da 2-3 irrorazioni alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immersione delle piante prima del trapianto in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti, seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di g. 0,5 di formulato per pianta. **Lattuga** : viene impiegato contro la Bremia lactucae effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire almeno 3 Kg. di prodotto per ettaro). Si consiglia di effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto; se si verificano forti sbalzi termici la lattuga può essere sensibile al prodotto. **Melone** : viene impiegato contro la Pseudoperonospora cubensis effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl avendo cura di distribuire, come minimo, 3 Kg. di prodotto per ettaro. **Cocomero, Cetriolo, Spinacio** : viene impiegato contro la Peronospora, effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire, come minimo, 3 Kg. di prodotto per ettaro). **Carciofo** : viene impiegato contro la Bremia lactucae a 200-300 g/hl. **Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo** : viene impiegato contro Phytophthora spp. effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl, utilizzando dieci litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione possono venire integrati da pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche); pratica indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida.
Vivai di fruttiferi : effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl con cadenza mensile. **Vivai di agrumi** : impiegare la dose di 400 g/hl ogni 60 giorni.
Colture Ornamentali in pieno campo ed in serra : Viene impiegato contro la Phytophthora cinnamoni di Chamaecyparis e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee. Poinsettia, St.Paulia e Crisantemo, effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con g. 5-10 di formulato per mq. una volta al mese in primavera.
COMPATIBILITA' : Il prodotto non é compatibile con i prodotti a base di rame, di Dicofol e con concimi fogliari contenenti azoto. Si consiglia inoltre di non irrorare il prodotto su colture precedentemente trattate con i formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto. Nella miscelazione del prodotto con altri formulati si consigliano comunque saggi preliminari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti: 15 giorni prima del raccolto su carciofo, cetriolo, cocomero, melone, lattuga, spinacio; 30 giorni prima del raccolto su fragola; 40 giorni prima del raccolto su melo, pero, pesco, actinidia e vite; 80 giorni prima della raccolta di arancio, limone, mandarino, pomplemo.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso é pericoloso.
Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
AVVERTENZE D'USO
Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti; Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi; Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE. - NON TOCCARE CON MANI BAGNATE - DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE L'INVOLUCRO - DA NON VENDERE, NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE ORIGINALE

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

1 Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua
2 Introdurre il numero di sacchetti idrosolubili chiusi, previsti (come da etichetta) nell'atomizzatore
3 Mettere in funzione l'agitatore
4 Attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti), ed.......
5 .....aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

THIAN

Anticrittogamico ad azione preventiva e curativa indicato per la lotta contro diverse malattie fungine del melo, del pero, del pesco, della vite, delle colture orticole e delle floreali ed ornamentali

Tipo di formulazione : polvere bagnabile in sacchetti drosolubili

COMPOSIZIONE

Ditianon puro .... g. 75

Coformulanti ....q.b. a g. 100

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

AGROWIN BIOSCIENCES srl – Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Stabilimento di produzione : CHEMIA Spa S. Agostino (FE)

Registrazione n. 10747 del 12/03/01 Ministero della Salute

Contenuto: kg. 1 (1x1) (0,5x2) (0,25x4) (0,2x5) - Partita n° .....

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE
FUORI DALLA CONFEZIONE

AVVERTENZA : LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

MODO DI UTILIZZO

Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

1. Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua
2. Introdurre il numero di sacchetti idrosolubili chiusi, previsti (come da etichetta) nell'atomizzatore
3. Mettere in funzione l'agitatore
4. Attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti), ed.......
5. ......aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

WINSTAR

Diserbante indicato per il controllo dell'Heteranthera nel RISO e per il diserbo
di SOIA, GIRASOLE, CARCIOFO, CAVOLFIORE, AGLIO, CICORIA, FINOCCHIO, INDIVIA, LATTUGA, MELANZANA, PEPERONE, POMODORO, TABACCO
Tipo di formulazione : microgranuli idrodispersibili

Composizione
- Oxadiazon puro g. 60
- Coformulanti qb a 100

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl – Via Monte Grappa. 7 – Bergamo
Officine di produzione : STI - SOLFOTECNICA ITALIANA – Cotignola (RA) / SIDECO Dr. SCHIRM - GMBH - Mecklenburger Strasse 229 D-23568 LUBECK
Registrazione n. 10.101 del 23/07/1999 del Ministero della Sanita
Confezioni da kg 1-5–10–20-25 Numero riferimento partita: ....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : In caso di intossicazione chiamare il medico per consueti interventi di pronto soccorso. Consultare uncentro antiveleni.

MODALITÀ D' IMPIEGO
Il prodotto agisce per assorbimento radicale sui germinelli e per contatto sugli steli e foglie delle malerbe.
RISO: contro l' Heteranthera, Giavone, Alisma e Ciperacee impiegando il prodotto circa 7 giorni prima della semina su terreno asciutto ben livellato oppure in acqua dopo la slottatura e con acqua al livello normale (cm 10-12).
Qualunque metodo si scelga prima della semina effettuare il ricambio dell'acqua presente in risaia e dopo la semina si possono effettuare le asciutte (se necessarie). Le dosi d'impiego sono di kg 0,450 nei terreni argillosi e kg 0,650 per ettaro nei terreni di medio impasto, impiegando lt 400 - 600 di acqua per ettaro.
GIRASOLE – SOIA - COLTURE TRAPIANTATE (CARCIOFO, CAVOLFIORE, AGLIO, CICORIA, FINOCCHIO, INDIVIA, LATTUGA, MELANZANA, PEPERONE, POMODORO, TABACCO) : contro Amaranthus spp.(Amaranto), Atriplex spp (Atriplice), Avena fatua (Avena selvatica), Capsella bursa pastoris (Borsa del pastore), Chenopodium album (Farinello comune), Convolvolus arvensis (Vilucchio), Digitaria sanguinalis (Sanguinella comune), Euphorbia spp (Euforbia)., Fumaria officinalis (Fumaria comune), Galinsoga parviflora (Galinsoga comune), Galium aparine (Gallio asprello), Lolium italicum (Loglio marittimo), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Mercurialis annua (Mercorella comune), Papaver rhoeas (Papavero comune), Poa spp. (Fienarola), Polygonum spp.(Poligono), Portulaca oleracea (Porcellana comune). Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico). Rumex spp (Romice)., Senecio vulgaris (Senecione comune), Setaria viridis (Pabbio comune). Sinapis arvensis (Senape selvatica), Solanum nigrum (Erba morella), Veronica spp (Veronica).
Su **SOIA e GIRASOLE** alla dose di kg 1 - 1,5 per ettaro in pre-emergenza della coltura e delle infestanti. Si possono verificare a causa del trattamento ingiallimenti della coltura che sono momentanei e non causano alcun danno alla produzione. In caso di mancata pioggia dopo il trattamento effettuare una irrigazione dopo massimo 10 - 12 giorni. Sulle **COLTURE TRAPIANTATE** alla dose kg. 0,650 – 1,250ha in pre-emergenza delle infestanti prima del trapianto della coltura. Su girasole, soja e sulle colture trapiantate il prodotto va impiegato con volumi di acqua di 300-400 l/ha
COMPATIBILITÀ : Non miscibile con i prodotti a reazione alcalina.
AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione il formulato contiene sostanza molto tossica per gli organismi acquatici, osservare scrupolosamente le dosi e le modalita d' impiego indicate.
FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

WIRK

Erbicida selettivo in emulsione concentrata

WIRK
Composizione
- Oxyfluorfen puro g. 22 (= 240 g/l)
- Coadiuvanti qb a 100

FRASI DI RISCHIO :
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, né fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl – Via Monte Grappa, 7 – Bergamo
Registrazione n. 11396 del 17/7/2002 del Ministero della Salute
officina di produzione : ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI) / CHEMIA spa - S.Agostino (FE)
litri : 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-15-20 Partita n:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro - faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica: Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito se nel formulato sono presenti distillati del petrolio come solventi. **Avvertenza** : consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
Diserbante che agisce essenzialmente per contatto venendo assorbito localmente dalle foglie e dai germinelli e poco dalle radici; impiegato sulle seguenti infestanti : Coda di topo (Alopecurus spp.), Fienarola annua (Poa annua), Zizzania (Lolium temulentum), Borsa del pastore (Capsella bursa pastoris), Camomilla (Matricaria spp.), Centocchio (Stellaria spp.), Papavero (Papaver spp.), Peverina (Cerastium spp.), Ranuncolo (Ranunculus spp.), Veccia (Vicia spp.), Vilucchio comune (Convolvulus arvensis), Vilucchio bianco (Calystegia sepium).
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
VITE - POMACEEE - DRUPACEE - NOCCIOLO - ARANCIO - LIMONE - POMPELMO : intervenendo in pre - emergenza delle malerbe annuali nel tardo autunno - inizio inverno, su terreno pulito e quando le stesse cominciano a germinare alla dose di litri 3-4 ettaro; ed in post - emergenza delle malerbe ricorrendo a miscele con altri principi attivi, intervenendo quando le malerbe hanno germogli lunghi non meno di 20 cm e sono in attiva crescita alla dose di 4-5 l/ha in miscela.
CIPOLLA - AGLIO : si interviene a completamento del diserbo di pre - emergenza, trattando nello stadio compreso tra seconda e inizio quarta foglia ed in pre - emergenza o inizio emergenza delle infestanti alla dose di 1,5 l/ha.
GIRASOLE : in pre - emergenza della coltura a 1 l/ha; eventuali sintomi di fitotossicità scompaiono in breve tempo.
CARCIOFO : in pre - emergenza della coltura, subito dopo l'impianto o la riattivazione della coltura, alla dose di 1 - 1,5 l/ha; ed in post - emergenza della coltura a 2-3 l/ha. Raccomandabile è proteggere il carciofo con opportuni ripari.
VIVAI FORESTALI E ORNAMENTALI : In pre - emergenza delle infestanti annuali , trattando uniformemente la superfice alla dose di 5-8 l/ha in 400 - 800 litri di acqua. Per combattere il Convolvolo fare due trattamenti, il primo ad inizio fioritura ed il secondo su ricacci lunghi 40 - 50 cm. Sulle essenze resinose distribuire il prodotto sulla vegetazione ma prima della emissione dei nuovi germogli; su Pioppo ed Eucalipto intervenire a fine inverno prima della ripresa vegetativa
CAVOLO - CAVOLFIORE TRAPIANTATI : trattare su terreno già pronto per il trapianto da 1 ad alcuni giorni prima della messa a dimora alla dose di 2-3 l/ha, con piantine forti e alte non meno di 15 cm.

Compatibilità : compatibile con paraquat, diquat e glifosate.
AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità : non trattare in giornate con presenza di vento onde evitare che la nube irrorante giunga a contatto con colture sensibili.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

WOGE

FUNGICIDA ORGANICO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA

WOGE
COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono
Dodina pura g 35 (g/l 355)
Coformulanti q. b. a 100

Frasi di Rischio : Nocivo per ingestione; Irritante per gli occhi e la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali /schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl
Via Monte Grappa, 7 – Bergamo
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / CHEMIA spa – S.Agostino (FE)
Registrazione del Ministero della Salute n. 11296 del 24/04/02
CONTENUTO: ml 100-250-500 ℓ 1-5 –10-20 - Riferimento partita:

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - *Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cordiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia. Irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia. Terapia: sintomatica.* ***Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni***

CARATTERISTICHE TECNICHE
Fungicida ad attività preventiva e curativa.
Grazie alla speciale formulazione flowable, WOGE si distingue dai tradizionali prodotti in polvere bagnabile per la migliore adesività, uniformità di distribuzione sulla vegetazione e resistenza al dilavamento.
MODALITA' D'IMPIEGO
Le seguenti dosi sono riferite a 100 litri di acqua
Melo e Pero - In primavera-estate, contro ticchiolatura in funzione preventiva si usa a ml 110-140 intervenendo ogni 6-7 giorni;
alla dose di ml 150-180 usandolo entro 48 ore dall'inizio della pioggia infettante esplica una buona azione curativa.
Pesco, Albicocco, Ciliegio - Contro monilia e sclerotinia ml 100-130. Trattamenti preventivi: effettuare almeno 3 trattamenti all'apertura dei petali, alla fine della fioritura ed alla caduta dei petali.
Pesco - Contro bolla (in autunno dopo caduta foglie e in pre-fioritura) ml 180-230.
Ciliegio - Contro cilindrosporiosi ml 125-150.
Trattamenti preventivi: effettuare almeno 3 trattamenti iniziando subito dopo la fioritura ad intervalli di circa 10-15 giorni.
Vite - In primavera-estate, contro peronospora ml 130-200.
Fragola - in primavera, contro la muffa grigia e vaiolatura ml 80-140 per trattamenti preventivi; ml 200 per trattamenti curativi.
Insalata, spinacio, sedano, finocchio, basilico, carota - ortaggi a frutto - ortaggi a bulbo - in primavera-estate, contro peronospora, alternariosi, fusariosi, antracnosi ml 130 per trattamenti preventivi; ml 200 per trattamenti curativi.
Patata - in primavera-estate, contro peronospora ml 125-150.
Olivo - contro occhio di pavone ml 150. Effettuare due interventi:
- primaverile alla ripresa vegetativa delle gemme
- autunnale fra fine Settembre e i primi di Ottobre.

Nespolo - contro la ticchiolatura alla dose di ml 100-130 intervenendo alla fase di bottoni fiorali all'ingrossamento del frutto a seconda delle condizioni climatiche.
Pioppo - Per una difesa contro la marssonina intervenire a fine Aprile e nella seconda metà di Maggio, alla dose di ml 150-200 eventualmente ripetendo il trattamento a distanza di 3-4 settimane.
Floreali, ornamentali - contro alternaria, antracnosi, cladosporiosi, fusariosi, peronospora, ruggine, septoriosi e ticchiolatura che attaccano garofano, rosa, bulbose ed altre ornamentali, intervenire con la dose preventiva di ml 130 aumentando a ml 200 in caso di interventi curativi e ripetendo ad intervalli di 7-10 giorni.
Preparazione della poltiglia: diluire direttamente il prodotto in acqua agitando.

COMPATIBILITA'- Non è compatibile con i clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina. Non è consigliabile miscelarlo con Carbaril, Dimetoato, Metilazinfos, DDVP. Le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con olii minerali possono dare luogo a scarsa sospensibilità. Evitare i trattamenti con acque troppo fredde con temperature esterne prossime a 0°C.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Per la Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%.
TOSSICITA': il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci, le api e gli insetti utili.
AVVERTENZE - Da non impiegare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che non siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

SILENT

**FUNGICIDA ORGANICO CONTRO SCLEROTINIE E BOTRYTIS
DELLE COLTURE OTICOLE, FLOREALI E FRAGOLE**

COMPOSIZIONE
Dicloran puro g 50
Bagnanti e disperdenti q. b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorse

MODALITA' D'IMPIEGO
Il **SILENT** e' un fungicida organico in polvere bagnabile, specifico per combattere tutte le forme di marciume proveninete da Botrytis e Sclerotinia delle colture ortive frutticole e floreali.
Insalata: Il **SILENT** si impiega contro il marciume alla dose di gr.200 q.le acqua, praticando 2-3 trattamenti a distanza di 3-4 settimane l'uno dall'altro.
Avvertenza: Si raccomanda di non trattare le piantine di insalata prima della comparsa delle prime due foglie vere e prima che siano trascorsi 14 giorni almeno dal trapianto .
Fragola: Contro la Botrytis (muffa grigia) si applica il **SILENT** prima dell'inizio della fioritura continuando ogni 10-15 giorni, effettuando dai 3 ai 5 trattamenti alla dose di gr. 150 – 200 per q. le di acqua.
Colture ortive: in semenzai – letti caldi – serre (pomodori-zucchini-cetrioli-peperoni-melanzane-basilico) Per combattere varie forme di marciumi, pedali e radicali, far spruzzature con **SILENT** alla dose di gr. 200 per q.le acqua, con trattamenti distanziati 3-4 settimane l'uno dall'altro.
Piante ornamentali in serra e in pieno campo: Per prevenire attacchi di Botrytis ed altre muffe usare il **SILENT** alla dose di gr. 150 q.le acqua.
Botrytis su gladioli: Usare il **SILENT** alla dose di gr. 800 per q.le acqua, usando 5 litri della soluzione per ogni 20 metri di solco destinato a ricever i bulbi a dimora. Sulla coltura in atto usare il prodotto alla dose di gr. 200 ad intervalli di 3-4 settimane, bagnando bene le foglie.
Colture di garofani ed altri fiori: Per prevenire il Mal del Colletto dei garofani ed altri marciumi pedali di altri fiori, trattare il terreno prima del trapianto con spruzzature di **SILENT** alla dose di gr.200 per q.le acqua.

Compatibilita': Il **SILENT** e' compatibile con la maggior parte degli antiparassitari in commercio, eccezion fatta per quelli a reazione alcalina ed oleosa.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le Norme Precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il Medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità : Prestare attenzione nelle avvrtenze indicate nella coltura della insalata.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

AGROWIN BIOSCIENCES srl - Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Prodotto nello Stabilimento CHEMIA S.p.A. di S.Agostino (FE) – S.S. 255 Km 46
Registrazione n. 11992 del 17/02/04 del Ministero della Salute
Contenuto netto : Kg 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-15-20 Partita n.:*

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

TEAM

Tipo di formulazione : polvere bagnabile in sacchetti drosolubili

COMPOSIZIONE

Fosetil Alluminio puro .... g. 80

Coformulanti ....q.b. a g. 100

IRRITANTE

AGROWIN BIOSCIENCES srl – Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Stabilimento di produzione : STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - Cotignola (RA) / CHEMIA spa - S.Agostino (FE)

Registrazione n. 10768 del 23/03/01 Ministero della Salute

Contenuto: kg. 1 (1x1) (0,5x2) (0,25x4) (0,2x5) - Partita n° .....

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE
FUORI DALLA CONFEZIONE

AVVERTENZA : LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

MODO DI UTILIZZO

Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

1 Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua

2 Introdurre il numero di sacchetti idrosolubili chiusi, previsti (come da etichetta) nell'atomizzatore

3 Mettere in funzione l'agitatore

4 Attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti), ed.......

5 ......aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

TEAM WG

Fungicida sistemico
tipo di formulazione : microgranuli idrodisperdibili

Composizione:
-Fosetil Alluminio puro g. 80
-Coformulanti qb a 100

Frasi di Rischio
Rischio di gravi lesioni oculari; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

IRRITANTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl – Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Officina di produzione: A.D.I.C.A. srl - Nera Montoro (Terni)
Registrazione n. 11803 del 10/11/2003 del Ministero della Salute
Peso netto kg 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15-20 - Partita n: ....

INFORMAZIONI MEDICHE : in caso di intossicazione informare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

MODALITA' D'IMPIEGO
TEAM WG è un fungicida dotato di azione sistemica che si manifesta in modo ascendente e discendente che è evidente con vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita, e gli permette di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento;, quindi dotato di una notevole mobilità sulle colture trattate.
Vite : viene impiegato contro la Peronospora alla dose di g. 250 per q.le acqua trattando sempre in miscela con prodotti di copertura (Rame escluso)
Melo, Pero, Pesco, Actinidia : viene impiegato contro la Phytophthora cactorum trattando sulla vegetazione, una volta al mese, dalla sfioritura fino a quaranta giorni dalla raccolta (per melo e actinidia), con 250 g/hl. Nel caso di colture già debilitate dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida: effettuare un'innaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, con litri 1-2 per pianta di una poltiglia costituita da Kg. 5 di prodotto per 100 litri d'acqua.
Melo - Pero : viene impiegato contro la Ticchiolatura con trattamenti preventivi a g. 150 - 250, nelle fasi pre - fiorali e subito dopo l'allegagione si consigli l'associazione con fungicidi di copertura o con Dodina.**Pero** : viene impiegato contro la Maculatura bruna (Stemphyllium sp.), trattamenti preventivi a 250 g. per q.le acqua. **Fragola** : viene impiegato contro la Peronospora (Phytophthora cactorum e fragariae). L'immersione delle piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti, seguita da 2-3 irrorazioni alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immersione delle piante prima del trapianto in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti, seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di g. 0,5 di formulato per pianta. **Lattuga** : viene impiegato contro la Bremia lactucae effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire almeno 3 Kg. di prodotto per ettaro). Si consiglia di effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto; se si verificano forti sbalzi termici la lattuga può essere sensibile al prodotto. **Melone** : viene impiegato contro la Pseudoperonospora cubensis effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl avendo cura di distribuire, come minimo, 3 Kg. di prodotto per ettaro. **Cocomero, Cetriolo, Spinacio** : viene impiegato contro la Peronospora, effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire, come minimo, 3 Kg. di prodotto per ettaro). **Carciofo** : viene impiegato contro la Bremia lactucae a 200-300 g/hl. **Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo** : viene impiegato contro Phytophthora spp. effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl, utilizzando dieci litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione possono venire integrati da pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche): pratica indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida.
Vivai di fruttiferi : contro Phytophthora effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl con cadenza mensile. **Vivai di agrumi** : contro Phytophthora impiegare la dose di 400 g/hl ogni 60 giorni. **Colture Ornamentali in pieno campo ed in serra :** Viene impiegato contro la Phytophthora cinnamoni di Chamaecyparis e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee. Poinsettia, St.Paulia e Crisantemo, effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con g. 5-10 di formulato per mq. una volta al mese in primavera.
COMPATIBILITA' : Il prodotto non é compatibile con i prodotti a base di rame, di Dicofol e con concimi fogliari contenenti azoto. Si consiglia inoltre di non irrorare il prodotto su colture precedentemente trattate con il formulato TEAM WG che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto. Nella miscelazione del prodotto con altri formulati si consigliano comunque saggi preliminari. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti: 15 giorni prima del raccolto su carciofo, cetriolo, cocomero, melone, lattuga, spinacio; 30 giorni prima del raccolto su fragola; 40 giorni prima del raccolto su melo, pero, pesco, actinidia e vite; 80 giorni prima della raccolta di arancio, limone, mandarino, pompelmo.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso é pericoloso.
Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

THIAN

Anticrittogamico ad azione preventiva e curativa indicato per la lotta contro diverse malattie fungine del melo, del pero, del pesco, della vite, delle colture orticole e delle floreali ed ornamentali.
Tipo di formulazione : polvere bagnabile

THIAN
Composizione
-Ditianon puro g. 75
-Coformulanti qb a 100

Frasi di rischio :
Nocivo per ingestione; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl – Via Monte Grappa, 7 – Bergamo
Registrazione Ministero della Salute N. 10.747 del 12/03/2001
stabilimento di produzione : ADICA srl - Nera Montoro; SCAM Srl - Modena; CHEMIA Spa –CENTO (FE)
Contenuto del sacchetto : kg 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15-20 Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: irritante oculare e cutaneo; per ingestione: scialorrea, vomito e diarrea. Trattamento topico delle manifestazioni cutanee con pomate antistaminiche o cortisoniche.
Terapia sintomatica - Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il THIAN è un anticrittogamico che esplica un'azione preventiva a curativa, essenzialmente per contatto, indicato per la lotta contro diverse malattia fungine dei fruttiferi (melo, pero, pesco, vite), delle orticole (fragola, pomodoro, peperone, spinacio, pisello), della patata e delle colture floreali ed ornamentali in pieno campo.
CAMPI D'APPLICAZIONE E DOSI D'IMPIEGO
MELO : contro Ticchiolatura, Gleosporium, Cancri rameali
-100 - 200 g/hl in trattamenti preventivi in zone ad alta virulenza della malattia;
- 80 – 90 g/hl in zone e periodi meno fevorevoli.
PERO : contro Ticchiolatura 80 g/hl, contro Cancri del legno 150 g/hl.
PESCO : contro Bolla, Corineo, Fusicoccum (cancro) e Monilia 100-150 g/hl.
VITE : contro Peronospora 100 –120 g/hl.
POMODORO : contro Phytophtora 150 g/hl
PATATA : contro Peronospora 150 g/hl.
FRAGOLA : contro Vaiolatura 100 glhl.
PEPERONE : contro Peronospora 120 g/hl.
SPINACIO : contro Peronospora 100 g/hl.
PISELLO : contro Antracnosi e Cilindrosporiosi 120 g/hl
FLOREALI ED ORNAMENTALI (in pieno campo) : contro Ticchiolatura e Ruggine della rosa, Vaiolo e Ruggine del garofano, Botrytis e Antracnosi del ciclamino, Botrytis e Maculatura fogliare dalla primula, Botrytis e Ruggine dell'azalea e dell'erica, Antracnosi del ficus, Septoria dell'oleandro, Ruggine del rododendro 80 - 100 g/hl
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Sciogliere la dose prescritta del prodotto in poca acqua, agitare la poltiglia ottenuta ed aggiungere all'acqua rimanente.

COMPATIBILITA : Il prodotto è misciblie con prodotti emulsionabili; è opportuno che la miscela venga impiegata subito dopo la preparazione. Per trattamenti nei mesi estivi è indispensabile aggiungere un bagnante
AVVERTENZA : in caso di miscela con atri formulati deve essere rispettato li periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora ai verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ : Evitare di trattare su melo Golden Delicious in prossimità della raccolta.
RISCHI DI NOCIVITA : Il prodotto è nocivo verso insetti utili, animali domestici, pesci, bestiame ed uccelli. Evitare di immettere animali e bestiame nella zone trattate.
Avvertenze : per lavorazioni agricole antro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nella zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Non immettere bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 40 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA NEL CASO DI VITE, 21 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio dal preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante. alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

THIAN

Anticrittogamico ad azione preventiva e curativa indicato per la lotta contro diverse malattie fungine del melo, del pero, del pesco, della vite, delle colture orticole e delle floreali ed ornamentali.
Tipo di formulazione : polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

THIAN
Partita N.

Composizione
-Ditianon puro g. 75
-Coformulanti qb a 100

Frasi di rischio :
Nocivo per ingestione; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl – Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Registrazione Ministero della Salute N. 10.747 del 12/03/2001
stabilimento di produzione : CHEMIA Spa –CENTO (FE)
Contenuto del sacchetto : kg 1 (1 sacchetto idrosolubile da kg 1)/(2 sacchetti idrosolubili da g 500)/(4 sacchetti idrosolubili da g 250)/(5 sacchetti idrosolubili da g 200)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: irritante oculare e cutaneo; per ingestione: scialorrea, vomito e diarrea. Trattamento topico delle manifestazioni cutanee con pomate antistaminiche o cortisoniche.
Terapia sintomatica - Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il THIAN è un anticrittogamico che esplica un'azione preventiva a curativa, essenzialmente per contatto, indicato per la lotta contro diverse malattia fungine dei fruttiferi (melo, pero, pesco, vite), delle orticole (fragola, pomodoro, peperone, spinacio, pisello), della patata e delle colture floreali ed ornamentali in pieno campo.
CAMPI D'APPLICAZIONE E DOSI D'IMPIEGO
MELO : contro Tiochiolatura, Gleosporium, Cancri rameali
-100 - 200 g/hl in trattamenti preventivi in zone ad alta virulenza della malattia;
- 80 – 90 g/hl in zone e periodi meno fevorevoli.
PERO : contro Ticchiolatura 80 g/hl, contro Cancri del legno 150 g/hl.
PESCO : contro Bolla, Corineo, Fusicoccum (cancro) e Monilia 100-150 g/hl.
VITE : contro Peronospora 100 –120 g/hl.
POMODORO : contro Phytophtora 150 g/hl
PATATA : contro Peronospora 150 g/hl.
FRAGOLA : contro Vaiolatura 100 glhl.
PEPERONE : contro Peronospora 120 g/hl.
SPINACIO : contro Peronospora 100 g/hl.
PISELLO : contro Antracnosi e Cilindrosporiosi 120 g/hl
FLOREALI ED ORNAMENTALI (in pieno campo) : contro Ticchiolatura e Ruggine della rosa, Vaiolo e Ruggine del garofano, Botrytis e Antracnosi del ciclamino, Botrytis e Maculatura fogliare dalla primula, Botrytis e Ruggine dell'azalea e dell'erica, Antracnosi del ficus, Septorla dell'oleandro, Ruggine del rododendro 80 - 100 g/hl
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Sciogliere la dose prescritta del prodotto in poca acqua, agitare la poltiglia ottenuta ed aggiungere all'acqua rimanente.

COMPATIIBILITA : Il prodotto è misciblie con prodotti emulsionabili; è opportuno che la miscela venga impiegata subito dopo la preparazione. Per trattamenti nei mesi estivi è indispensabile aggiungere un bagnante
AVVERTENZA : in caso di miscela con atri formulati deve essere rispettato li periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora ai verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ : Evitare di trattare su melo Golden Delicious in prossimità della raccolta.
RISCHI DI NOCIVITA : Il prodotto è nocivo verso insetti utili, animati domestici, pesci, bestiame ed uccelli. Evitare di immettere animali e bestiame nella zone trattate.
Avvertenze : per lavorazioni agricole antro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nella zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Non immettere bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 40 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA NEL CASO DI VITE, 21 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE.
Attenzlone: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio dal preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante. alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

PLAASKEM ITALIA S.r.l.

FLAG

Fungicida a base di Rame sotto forma di solfato basico - sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
- Rame metallo g. 15.2 (= 190 g/l)
(sotto forma di solfato basico)
- Sostanze coadiuvanti q.b. a gr. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Nocivo per inalazione; Rischio di gravi lesioni oculari;
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Non gettare i residui nelle fognature; Proteggersi gli occhi/la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di
sicurezza

PLAASKEM ITALIA srl – Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Registrazione n°10941 del 17/05/01 del Ministero della Salute
Officina di produzione: - CHEMIA spa – A.Agostino (FE) / TERRANALISI srl - Via N. Bixio n. 6 - Cento (FE)
Litri 0,1-0,15-0,20-0,25-0,5-1-5-10-20 Partita n. :

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi : denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali; ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il FLAG e' un anticrittogamico polivalente in pasta fluida a base di solfato di rame tribasico, caratterizzato da estrema finezza delle particelle (finemente micronizzato) con ottimo potere coprente con la possibilità di impiegare dosi inferiori ai tradizionali prodotti rameici, da impiegarsi nella lotta alle malattie fungine, sulle seguenti colture :
VITE : ml 300 - 400 /hl contro Peronospora e Marciume nero degli acini. Intervenire dalla formazione degli acini alla vendemmia.
MELO-PERO : contro Ticchiolatura alla dose di ml 300 - 400 /hl nei trattamenti primaverili e ml 800 / hl nei trattamenti autunnali anche contro la Nectria.
DRUPACEE : contro Bolla, Corineo, Monilia, Cancro dei rametti con trattamenti autunno-invernali alla dose di ml 700 - 800 / hl
OLIVO : contro Occhio di pavone, Lebbra, Batteriosi, Fumaggine alla dose di ml 500 / hl
ORTAGGI:Contro Peronopsora, Alternaria, Septoriosi, Ruggini,Batteriosi e Antracnosi alla dose di ml 300-400/hl
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO : contro la Cercospora alla dose di lt 4-5 / ha
CEREALI : quale conciante del grano da seme alla dose di ml 100 per 100 kg di seme e disalgo del RISO alla dose di lt 4-5 per Ha
MANDORLO : ml 400 - 500 /hl contro Corineo , Bolla e Monilia. Intervenire dopo la caduta delle foglie, all'ingrossamento delle gemme e subito prima della fioritura. Per interventi post-fiorali mantenere inalterata la dose. A ml 400 - 500 /hl contro Batteriosi (Pseudomonas) intervenendo prima della fase dei bottoni rosa.
AGRUMI : ml 300 - 350 /hl contro Mal secco, Allupatura, Melanosi, Fumaggine, Antracnosi e Scabbia del limone e dell'arancio. Intervenire prima e dopo la fioritura in funzione della gravita' della malattia.
NOCCIOLO : ml 400/hl contro la Batteriosi (Xanthomonas corylina) con due trattamenti in ottobre distanziati di circa 20-25 giorni uno dall'altro.
NOCE : ml 400/hl contro l'Antracnosi. Intervenire in pre-fioritura; in caso di piogge frequenti sono necessarie applicazioni supplementari. In estate si consiglia di aggiungere ml 150/hl di olio minerale bianco.
NESPOLO : ml 300/hl contro la Ticchiolatura.
CIPRESSO : ml 500/hl contro il Cancro (Coryneum cardinale) intervenire in pieno inverno.
FRAGOLA : litri 2 - 3 / ettaro contro Vaiolatura. Iniziare a trattare quando le piante hanno attecchito proseguendo ogni settimana per tutta la stagione. Cessare le applicazioni ai primi eventuali segni di fitotossicita'.
ROSA : ml 250 /hl contro Ticchiolatura, Peronospora e Ruggine. **CICLAMINO** : ml 250 /hl contro Antracnosi e Maculatura fogliare. **FILODENDRO** : ml 250 /hl contro la Batteriosi (Pectobacterium Philodendri) con applicazioni settimanali ad iniziare prima della comparsa della malattia.
COMPATIBILITA' : il prodotto non e' compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina, quali polisolfuri di calcio e bario.
AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi si intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : Non si deve trattare durante la fioritura ad eccezione dei casi menzionati nel capitolo "Campi, dosi e modalità d'impiego". Su alcune varietà di pesco, di nettarine, di melo (Abbondanza, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canada', Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) il prodotto e' cupro-sensibile e puo' essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa, ad eccezione della lotta contro le batteriosi menzionate nel capitolo "Campi, dosi e modalità d'impiego" in cui la fitotossicità può diventare un problema secondario.
NOCIVITA' : Il prodotto e' tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

MYCLOS

Fungicida sistemico
Tipo di formulazione : concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
-MICLOBUTANIL puro 13,4 (125 g/lt)
-Coformulanti qb a 100

Frasi di rischio :
Irritante per gli occhi; Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati;
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

NOCIVO

PLAASKEM ITALIA srl - via Monte Grappa 7 – Bergamo
Officina di produzione : Torre srl – Torrenieri (SI) / ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI)
Registrazione Ministero della Salute n. 10966 del 18/06/01
Peso netto: lt 0,1-0,2-0,5-1-5-10 PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermati eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CAMPI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il **MICLOS** è un fungicida ad azione sistemica con attività preventiva, curativa ed eradicante, il prodotto penetra rapidamente nei tessuti sfuggendo all'azione dilavante della pioggia
Viene impiegato sulle seguenti colture :
Vite : impiegato contro l'Oidio alle seguenti dosi :
- Uva da vino : ml 15 – 20 / hl sino alla fioritura, quindi a ml 30 dalla allegagione in avanti, con trattamenti ogni 14 giorni.
- Uva da tavola : ml 20 / hl sino alla fioritura, quindi a ml 30 dalla allegagione in avanti, con trattamenti ogni 8 – 14 giorni in funzione dello stato vegetativo e dell'intensità dell'infezione fungina.Nel controllo del Marciume nero (Black-rot) alla dose di 15 - 30 ml/hl d'acqua ad intervallo di 8-14 giorni, con dose maggiore ad intervallo maggiore.
Melo – Pero : contro Ticchiolatura ed Oidio alla dose di ml 35 – 40 / hl trattando alla comparsa delle orecchiette di topo e proseguendo ogni 7 – 14 giorni in funzione della fase vegetativa e della pressione della malattia.
Pesco – contro la Monilia ml 50 con 2 trattamenti all'epoca dei bottoni rosa ed alla caduta petali, in caso di condizioni climatiche sfavorefoli trattare anche in fioritura.Contro l'Oidio alla dose di 40- 50 ml/hl iniziando alla scamiciatura del frutto e proseguendo ad intervalli di 10-14 giorni.
Susino : contro la Monilia alla dose di 40 – 50 ml/hl con 2-3 trattamenti tra l'inizio della fioritura e la caduta dei petali.
Albicocco : contro la Monilia alla dose di ml 40 – 50 /hl con tre trattamenti compresi tra l'inizio della fioritura e la caduta dei petali; per combattere l'Oidio (Sphaeroteca pannosa) impiegare 40 – 50 ml/hl iniziando alla scamiciatura dei frutti e continuando ogni 14 giorni.
Melone - Cococmero - Zucchino - Cetriolo : contro l'Oidio alla dose di ml 40-50 / hl ogni 8-10 giorni alla prima comparsa della malattia.
Pomodoro – Peperone : contro la Leveillula taurica a ml 40 – 50 / hl trattando ogno 8 – 12 giorni iniziando all'apparire della malattia, con utilizzo della dose massima quando vi è forte pressione della malattia ad intervalli ridotti.
Fragola : contro l'Oidio in post-trapianto ed in produzione a ml 40/hl trattando ad inizio malattia e continuando ogni 14 giorni.
Rosa – contro l'Oidio e Ticchiolatura alla dose di ml 40 – 50/hl
Garofano - contro la Ruggine alla dose di ml 40 – 50/hl
Nota: le dosi sopra riferite sono per trattamenti a volume normale, con bagnatura accurata delle parti suscettibili di malattia; in caso di trattamenti a basso volume impiegare la stessa dose per ettaro di prodotto impiegata in trattamenti a volume normale.
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta su melone, cocomero, zucchino, cetriolo, pomodoro, peperone, fragola, 7 giorni prima della raccolta su albicocco, pesco, susino e 15 giorni prima della raccolta sulle altre colture.
attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro utilizzo è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall' uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI ;PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO;

SPINN

Anticrittogamico acuprico ad azione preventiva e curativa
GRANULI IDRODISPERSIBILI

Partita n.:*

Composizione:
g 100 ci prodotto contengono:
Dodina pura ....g 65
Coformulanti q.b. a 100

NOCIVO

Frasi di Rischio :
Nocivo per ingestione;
Irritante per gli occhi e la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori della portata dei bambini ;
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande ; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego;
Non gettare i residui nelle fognature;
Usare indumenti protettivi e guanti adatti: in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PLAASKEM ITALIA srl
Via Monte Grappa, 7 - Bergamo

Officina di Produzione :
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A., Via Torricelli, 2 - Cotignola (RA) /
AD CA srl – Nera Montoro (TR)
Officina di Confezionamento :
Torre srl - Via Pian d'Asso - Torrenieri (SI)

Registrazione n. 11146 Ministero della Salute del 08/01/02

Contenuto netto : kg 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-15-20

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :
Sintomi :a carico dell'apparato gastrointestinale: colori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea ; a carico dell'apparato cardio-circolatorio: ipotensione, cianosi, aritmie ; irritazione della cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti).Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.
Terapia : sintomatica.- **Consultare un Centro Antiveleni**

Caratteristiche : Lo SPINN è un anticrittogamico organico dotato di azione preventiva e curativa nei confronti della Ticchiolatura delle pomacee e per la lotta conto numerose altre crittogame che attaccano le colture eduli, ornamentali e floreali.

Dosi e modalità d'impiego :

- POMACEE :
  - **Melo, Pero** contro Ticchiolatura *(Venturia inaequalis, pirina)* :
    trattamento preventivo in primavera (gemme rigonfie) .... 70 - 80 g/hl
    trattamento curativo dalla comparsa dei primi sintomi firo alla fase di frutto a noce (entro 60 ore dalla pioggia infettante).. .... 120 g/hl
  - **Nespolo** contro Ticchiolatura :
    trattamento preventivo in primavera alla fase di gemme rigonfie ..70 g/hl
    trattamento curativo dalla comparsa dei primi sintomi alla fase di frutto sviluppato ....80 - 120 g/hl
- DRUPACEE :
  - **Ciliegio**
    contro Antracnosi (*Sphaceloma spp.*) e Cilindroporiosi (*Cylindrosporium padi*) : trattamenti preventivi da subito dopo la fioritura eseguire 3 interventi distanti circa 10 - 15 giorni alla dose di .... 80 - 100 g/hl
    contro Marciume bruno *(Monilia laxa, fructigena)* : trattamenti preventivi dalla fase di pre-fioritura alla dose di.. 80 - 100 g/hl
  - **Albicocco**
    contro Ruggine *(Tranzschelia pruni)* : trattamenti preventivi durante l'estate alla dose di.. 80 - 100 g/hl
    Marciume bruno *(Monilia laxa, fructigena)* : trattamenti preventivi dalla pre-fioritura fino alla scamiciatura .... 80 - 100 g/hl
    Corineo *(Coryneum beijerinkii)* : trattamenti preventivi alla caduta delle foglie (trattamenti al bruno) e alla ripresa vegetativa alla dose di............. 80 - 100 g/hl
  - **Pesco**
    contro Bolla *(Taphrina deformans)* trattamenti preventivi alla caduta delle foglie (trattamenti al bruno) e inizio rigonfiamento delle gemme
    .... 80 - 120 g/hl
    contro Corineo (*Coryneum beijerinkii*) : trattamenti curativi in piena vegetazione 80 g/hl
    contro Marciume bruno (*Monilia laxa, fructigena*) : interventi preventivi dalla prefioritura alla scamiciatura ; interventi curativi in pre-raccolta alla dose di 80 - 120 g/hl
    contro Ticchiolatura (*Megacladosporium carpophilum*) : interventi preventivi in primavera alla fase di gemme rigonfie..................................80 g/hl
    interventi curativi dalla comparsa dei primi sintomi alla fase di frutto sviluppato 80 - 120 g/hl
- ORTICOLTURA :
  - **Cipolla**
    contro Peronospora (*Plasmopara destructor*) trattamenti preventivi, intervenire a seconda dell'andamento pluviometrico e termico...............100 g/hl
    trattamenti curativi dalla comparsa dei primi sintomi dell'infezione sino allo stadio di maturazione da consumo. ....120 g/hl
  - **Spinacio**
    contro Peronospora (*P. farinosa*) e Ramularia (*Ramularia spp.*) trattamenti preventivi intervenendo a seconda dell'andamento pluviometrico e termico 80 - 100 g/hl
  - **Sedano**
    contro Septoriosi *(Septoria apiicola)* trattamenti preventivi con irrorazioni all'apparato fogliare da ripetersi se il clima è umido....... 100 - 120 g/hl
  - **Finocchio**
    contro Peronospora (*Plasmopara nivea*) : trattamenti preventivi a cadenza settimanale se le condizioni climatiche sono favorevoli allo sviluppo della crittogama.. 80 - 120 g/hl
  - **Lattughe e simili**
    contro Peronospora (*Bremia lactucae*) e Septoria (*Septoria spp.*)
    trattamenti preventivi a cadenza settimanale se le condizioni climatiche sono favorevoli allo sviluppo della crittogama .... 80 - 120 g/hl
  - **Carota**
    contro Peronospora (*Plasmopara nivea*) e Cercospora *(Cercospora carotae)* trattamenti preventivi a cadenza settimanale se le condizioni climatiche sono favorevoli allo sviluppo della crittogama....................... 80 - 120 g/hl
  - **Pomodoro**
    contro Peronospora (*Phytophtora infestans*) e Septoriosi (*Septoria lycopersici*) trattamenti preventivi appena dopo che si sono manifestate le condizioni favorevoli allo sviluppo dell'infezione e ripetere il trattamento a cadenza quindicinale, a seconda dell'andamento pluviometrico e termico100 - 120
    contro Fusariosi (*Fusarium oxysporum*) trattamenti preventivi, irrorare il terreno e il colletto delle piantine.. 200 g/hl
    (distribuire 3-4 g/mq)
  - **Cocomero, Melone, Zucca, Zucchino, Cetriolo**
    contro Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*) e Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*) trattamenti preventivi in post-trapianto a seconda dell'andamento pluviometrico e climatico .... 80 - 120 g/hl
- PATATA, contro Peronospora (*Phytophtora infestans*) : trattamenti preventivi intervenendo poco prima della fioritura a 80 - 120 g/hl
- FRAGOLA, contro Muffa grigia *(Botrytis cinerea)* e Vaiolatura *(Mycosphaerella fragarie)* : trattamenti preventivi intervenendo dalla fase di pre-fioritura a .... 120 g/hl
- VITE, contro Peronospora *(Plasmopara viticola)* : trattamenti preventivi intervenendo alla formazione dei grappolini, all'inizio della fioritura e poco dopo l'allegagione a.. 90 - 120 g/hl
- OLIVO , contro Occhio di pavone *(Cycloconium oleaginum)* :
  - trattamenti preventivi intervenendo in pre-fioritura a 90 -120 g/hl
  - trattamenti curativi intervenendo nella fase di frutto ingrossato a .... 100 g/hl
- PIOPPICOLTURA, contro Bronzatura del pioppo *(Marssonina brunnea)*
  - trattamenti preventivi intervenendo al risveglio vegetativo a 80 g/hl
  - trattamenti curativi intervenendo sulla vegetazione primaverile ed estiva a .... 120 g / hl
- ROSA , contro Ticchiolatura *(Diplocarpon rosae)* : trattamenti curativi intervenendo alla prima comparsa dei sintomi a .... 60 g/hl
- GAROFANO, contro Fusariosi *(Fusarium culmorum, dianthi, poae)* : trattamenti preventivi intervenendo sul terreno a 80 - 100 g / hl
- ORNAMENTALI (Dracaena, Sanseveria, Yucca, Ficus, ecc.), contro Alternaria *(Alternaria spp.)*, Antracnosi *(Colletotrichum spp.)*, Fusariosi *(Fusarium spp.)*, Cladosporiosi *(Cladosporium spp.)*, Peronospora *(Plasmopara spp.)*, Ruggine (*Puccinia spp.)*, Septoria *(Septoria spp.)*, Ticchiolatura *(Fusicladium spp.)* : trattare alla comparsa dei primi sintomi delle crittogame a .... 100 - 150 g/hl
- CONCIA DI BULBI DEI FIORI, contro Marciumi (Fusarium spp.) : trattamenti preventivi immergendo il materiale da disinfettare in una soluzione allo 1,3 - 1,5 g/l di SPINN per circa 15-20 minuti (130 - 150 g /hl)

Compatibilità : Il prodotto non è compatibile con formulati a reazione alcalina, clorobenzilati, dimetoato, azinfos metile, carbaril. Miscele con formulazioni emulsionabili a base ci esteri fosforici e con oli minerali possono dare luogo a scarsa sospensibilità. Non trattare con acque troppo fredde con temperature prossime a 0°C.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : Per la Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%. Su tutte le colture sopraindicate si raccomanda di effettuare saggi varietali onde accertare fenomeni di sensibilizzazione al formulato.

Avvertenza : da non impiegare durante la fioritura

Rischi di Nocività : Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona, persone non protette, animali domestici e bestiame. Tossico per le api.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle; non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura ; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

BLAU

Fungicida a base di Rame sotto forma di solfato basico - sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
- Rame metallo g. 15,2 (= 190 g/l)
(sotto forma di solfato basico)
- Sostanze coadiuvanti q.b. a gr. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Nocivo per inalazione; Rischio di gravi lesioni oculari;
Altamente tossico per gli organismi acquatici,
può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Non gettare i residui nelle fognature; Proteggersi gli occhi/la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PLAASKEM ITALIA srl – Via Monte Grappa, 7 – Bergamo
Registrazione n° 11535 del 15/01/2003 del Ministero della Salute
Officina di produzione: - CHEMIA spa – A.Agostino (FE) / TERRANALISI srl - Via N. Bixio n. 6 - Cento (FE)
Litri 0,1-0,15-0,20-0,25-0,5-1-5-10-20 Partita n. :

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi : denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali; ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremiaelevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il BLAU e' un anticrittogamico polivalente in pasta fluida a base di solfato di rame tribasico, caratterizzato da estrema finezza delle particelle (finemente micronizzato) con ottimo potere coprente con la possibilità di impiegare dosi inferiori ai tradizionali prodotti rameici, da impiegarsi nella lotta alle malattie fungine, sulle seguenti colture :
VITE : ml 300 - 400 /hl contro Peronospora e Marciume nero degli acini. Intervenire dalla formazione degli acini alla vendemmia.
MELO-PERO : contro Ticchiolatura alla dose di ml 300 - 400 /hl nei trattamenti primaverili e ml 800 / hl nei trattamenti autunnali anche contro la Nectria.
DRUPACEE : contro Bolla, Corineo, Monilia, Cancro dei rametti con trattammti autunno-invernali alla dose di ml 700 - 800 / hl
OLIVO : contro Occhio di pavone, Lebbra, Batteriosi, Fumaggine alla dose di ml 500 / hl
ORTAGGI:Contro Peronopsora, Alternaria, Septoriosi, Ruggini,Batteriosi e Antracnosi alla dose di ml 300-400/hl
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO : contro la Cercospora alla dose di lt 4-5 / ha
CEREALI : quale conciante del grano da seme alla dose di ml 100 per 100 kg di seme e disalgo del RISO alla dose di lt 4-5 per Ha
MANDORLO : ml 400 - 500 /hl contro Corineo , Bolla e Monilia. Intervenire dopo la caduta delle foglie, all'ingrossamento delle gemme e subito prima della fioritura. Per interventi post-fiorali mantenere inalterata la dose. A ml 400 - 500 /hl contro Batteriosi (Pseudomonas) intervenendo prima della fase dei bottoni rosa.
AGRUMI : ml 300 - 350 /hl contro Mal secco, Allupatura, Melanosi, Fumaggine, Antracnosi e Scabbia del limone e dell'arancio. Intervenire prima e dopo la fioritura in funzione della gravita' della malattia.
NOCCIOLO : ml 400/hl contro la Batteriosi (Xanthomonas corylina) con due trattamenti in ottobre distanziati di circa 20-25 giorni uno dall'altro.
NOCE : ml 400/hl contro l'Antracnosi. Intervenire in pre-fioritura; in caso di piogge frequenti sono necessarie applicazioni supplementari. In estate si consiglia di aggiungere ml 150/hl di olio minerale bianco.
NESPOLO : ml 300/hl contro la Ticchiolatura.
CIPRESSO : ml 500/hl contro il Cancro (Coryneum cardinale) intervenire in pieno inverno.
FRAGOLA : litri 2 - 3 / ettaro contro Vaiolatura. Iniziare a trattare quando le piante hanno attecchito proseguendo ogni settimana per tutta la stagione. Cessare le applicazioni ai primi eventuali segni di fitotossicita'.
ROSA : ml 250 /hl contro Ticchiolatura, Peronospora e Ruggine. **CICLAMINO** : ml 250 /hl contro Antracnosi e Maculatura fogliare. **FILODENDRO** : ml 250 /hl contro la Batteriosi (Pectobacterium Philodendri) con applicazioni settimanali ad iniziare prima della comparsa della malattia.

COMPATIBILITA' : il prodotto non e' compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina, quali polisolfuri di calcio e bario.
AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi si intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : Non si deve trattare durante la fioritura ad eccezione dei casi menzionati nel capitolo "Campi, dosi e modalità d'impiego". Su alcune varietà di pesco, di nettarine, di melo (Abbondanza, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canada', Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) il prodotto e' cupro-sensibile e puo' essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa, ad eccezione della lotta contro le batteriosi menzionate nel capitolo "Campi, dosi e modalità d'impiego" in cui la fitotossicità può diventare un problema secondario.
NOCIVITA' : Il prodotto e' tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ORVITAL S.p.a.

Etichetta normale

FLORTIS INSETTICIDA P 1

INSETTICIDA A RAPIDA AZIONE E BASSA CARENZA

FLORTIS INSETTICIDA P 1

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Piretro puro (9,5 g/litro)	1,0 g
Piperonil butossido puro (45,6 g/litro)	4,8 g
Coformulanti e solventi	q.b. a 100,0 g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

ORVITAL S.p.A.
Via Darwin, 63 – 20019 SETTIMO MILANESE (MI)

Officine di produzione: L.I.F.A. - Vigonovo (VE) / **L.I.F.A. –** Isola Vicentina (VI) / **DIACHEM U.P. SIFA -** Caravaggio (BG) / **DIACHEM –** Albano S. Alessandro (BG) / **IRCA SERVICE S.p.A. –** Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 8.439 del 16.11.1993

Contenuto: 10 - 20 - 25 - 250 - 500 ml / 1 litro

Partita N° ....

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazioni delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione. Il diluente può provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.

CARATTERISTICHE
Insetticida a rapida azione, agisce per contatto. Ha azione su molti insetti ma pur agendo tempestivamente ha poca persistenza e quindi una bassa carenza. Alla luce ed ad alte temperature perde la sua efficacia insetticida.
MODALITA' D'IMPIEGO
E' consigliabile trattare la vegetazione subito dopo aver preparato l'emulsione ed eseguire i trattamenti serali e sempre nelle ore più fresche della giornata.
Dosi per ettolitro d'acqua: Contro afidi del carciofo, fagiolo, fragola, lattuga, crisantemo, garofano, rosa: 150/200 ml. Contro la mosca dell'asparago, cipolla carota, cavolo, ciliegio: 180/250 ml. Contro l'afide del melo: 250/300 ml. Contro farfalle dei minatori, psille e tripidi: 250/300 ml. Contro cavolaia, bemisia: 150/200 ml. Contro moscerino del pomodoro: 150/200 ml. Per trattamenti sul tabacco: 150/200 ml; Disinfestazione dei cerali: 250/300 ml.
COMPATIBILITA': Il prodotto **FLORTIS INSETTICIDA P 1** è compatibile con i comuni fitofarmaci ad esclusione di quelli a reazione alcalica.
AVVERTENZA: *In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.*
Sospendere i trattamenti 2 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura per le epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE STRADE).**

DA NON VENDERSI SFUSO

Etichetta ridotta

FLORTIS INSETTICIDA P 1

INSETTICIDA A RAPIDA AZIONE E BASSA CARENZA

FLORTIS INSETTICIDA P 1

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Piretro puro (9,5 g/litro)	1,0 g
Piperonil butossido puro (45,6 g/litro)	4,8 g
Coformulanti e solventi	q.b. a 100,0 g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

ORVITAL S.p.A.
Via Darwin, 63 – 20019 SETTIMO MILANESE (MI)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 8.439 del 16.11.1993

Contenuto: 10 - 20 - 25 ml

Partita n° ....

- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

DIAZISPRAY

INSETTICIDA AEROSOL PER IMPIEGO FLOREALE E DI GIARDINAGGIO
PER PIANTE DA APPARTAMENTO, BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

DIAZISPRAY **F+**

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Diazinone puro 0,65 g
Solvente, coformulanti e propellenti q. b. a 100 g

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

FRASI DI RISCHIO: Estremamente infiammabile – Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

ORVITAL S.p.A.
Via Darwin, 63 - Settimo Milanese (MI)

Officina di produzione: Tosvar s.a.s. - Pozzo D'Adda (MI)

Registrazione del Ministero della Sanità N° 10.853/PPO del 11.04.2001

CONTENUTO: 200 – 300 – 400 – 500 – 600 – 650 – 700 – 750 – 800 – 900 ml / 1 litro

Partita N°..........

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici – Evitare di respirare i vapori – Non usare nei locali dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto – Recipiente sotto pressione: proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori ai 50° C. – Non perforare ne bruciare neppure dopo l'uso – Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente – Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione - Non fumare – Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione – Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, dalle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
Insetticida a base di diazinone puro indicato per la lotta ai principali fitofagi quali afidi (pidocchi), tripidi, coleotteri, aleuroidi, bruchi, larve, acari (ragnetti rossi), ecc. che infestano le piante ornamentali verdi e da fiore in casa, balcone e giardino.
MODALITA' D'IMPIEGO
Agitare la bombola prima dell'uso. Irrorare in modo uniforme le parti verdi e legnose della pianta evitando il gocciolamento delle foglie. Nebulizzare mantenendo il braccio teso a una distanza di 30 cm dalla vegetazione. Trattare la mattina o la sera (evitare trattamenti in pieno sole). In ambienti chiusi non superare l'erogazione di 4 – 5 secondi. Effettuare i trattamenti preventivi ogni 20 – 25 giorni, quelli curativi (solo se persiste l'insetto) ogni 10 giorni fino alla comparsa del fitofago avendo cura di bagnare completamente l'insetto.
ATTENZIONE: da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione; ogni altro uso è pericoloso – Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE STRADE).**

DA NON VENDERSI SFUSO

P U L V O S A N

Insetticida polvere secca pronto all'uso per impiego floreale e di giardinaggio per piante da appartamento, balcone e giardino domestico.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:

Piretrine pure (da 1,6 g di estratto di piretro al 25 %)	0,4 g
Inerti	q. b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone – In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) – Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione – Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Tremori, convulsioni, irritazione delle vie aeree, tosse, broncospasmo, ipertermia, sudorazione. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici e asmatici, nonché dei bambini.
Terapia sintomatica e di rianimazione.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
Insetticida in polvere secca pronta all'uso che agisce per contatto e ingestione contro i principali insetti delle piante ornamentali verdi e da fiore in casa, balcone e giardino quali: aleuroidi, psille, punteruoli, bruchi, cicale, coleotteri, tripidi e larve di molti insetti.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Distribuire il prodotto sulla parte di vegetazione colpita dagli insetti creando uno strato omogeneo in modo da ricoprire uniformemente con la polvere.

O R V I T A L S. p. a.
Via Darwin 63 Settimo Milanese (MI)

Officine di produzione:
L.I.F.A S.r.l. Vigonovo (VE) / L.I.F.A. S.r.l. Isola Vicentina (VI) / DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA Caravaggio (BG)

Registrazione del Ministero della Sanità N° 10.856/PPO del 11.04.2001

Partita n° ....

CONTENUTO: 50,100,150,200,250,300,400,500,750, 800 g / 1 kg

ATTENZIONE: da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione; ogni altro uso è pericoloso – Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE STRADE).**

DA NON VENDERSI SFUSO

DISINFEST

Insetticida microgranulare contro gli insetti del terreno per impiego floreale e di giardinaggio per piante da appartamento, balcone e giardino domestico.

DISINFEST

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Diazinone puro 5 g
Cereali, adescanti e leganti q. b. a 100 g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

O R V I T A L S. p. a.
Via Darwin, 63 - Settimo Milanese (MI)

Officine di produzione: L.I.F.A S.r.l. - Vigonovo (VE) / L.I.F.A S.r.l. - Isola Vicentina (VI) / DIACHEM S.p.a. - Albano S. Alessandro (BG) / DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione del Ministero della Sanità N° 10.857/PPO del 11.04.2001

Partita n° ....
CONTENUTO: 50-100-150-200-250-300-350-400-450-500-550-600-650-700-750-800-850-900-950 g / 1 kg

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone – In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) – Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione – Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolati. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo; ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente per insufficienza respiratoria. A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto può provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia. Atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
Insetticida in forma microgranulare specifico per la disinfestazione del terreno dai principali insetti quali: formiche, larve, vermi ecc. delle piante ornamentali verdi e da fiore in casa, balcone e giardino. Particolarmente indicato l'impiego nei tappeti erbosi e nella disinfestazione di gerbere, gladioli, gigli e crisantemi.
MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Distribuire uniformemente il prodotto sul terreno o interrarlo leggermente nei vasi nella dose di 5 – 8 g (pari a 2-3 cucchiaini da caffè) per m^2 e di 2 – 3 g (pari a un cucchiaino da caffè) per vasi di 15 cm di diametro. Trattare all'atto della semina o del trapianto e in coltivazione anche in prossimità della pianta. Il prodotto è dotato di attività citotropica per cui penetra nei tessuti vegetali ed elimina gli insetti annidati.

ATTENZIONE: da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del prodotto.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE STRADE).**

DA NON VENDERSI SFUSO

Etichetta normale e foglio illustrativo

COCCINOIL

Insetticida anticoccidico liquido ad impiego floreale di giardinaggio
per piante da appartamento, balcone e giardino domestico

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Olio minerale (U.R. 95 %) 80 g
Coformulanti q. b. a 100 g

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico – In caso di contatto con la pelle lavarsi abbondantemente con acqua e sapone – Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone – Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione – Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di malessere intervenire con i consueti interventi di pronto soccorso.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
Insetticida a base di olio minerale bianco emulsionato specifico per la lotta contro le cocciniglie, uova di afidi e di ragnetti rossi delle piante ornamentali verdi e da fiore in casa, balcone e giardino. Prodotto utilizzabile anche come lucidante fogliare.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Agitare il flacone prima dell'uso. Come insetticida disperdere 2–3 ml di prodotto in un litro di acqua (soluzione al 2-3%), miscelare accuratamente e spruzzare la soluzione sulle foglie infestate. Se necessario ripetere il trattamento dopo 10 giorni. Nei trattamenti estivi applicare alla mattina o alla sera (evitare le ore più calde della giornata).
Come lucidante disperdere 5 ml di prodotto in 10 ml di acqua , miscelare accuratamente e, dopo spolveratura delle foglie, detergerle con un batuffolo di cotone o uno straccio imbevuto.

COMPATIBILITA': Il prodotto va usato da solo.

ORVITAL S.p.A.
Via Darwin, 63 - Settimo Milanese (MI)

Officine di produzione:
L.I.F.A S.r.l. - Vigonovo (VE) / L.I.F.A. S.r.l. – Isola Vicentina (VI) / DIACHEM S.p.a. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG) / IRCA SERVICE S.P.A. Fornovo S. Giovanni (BG) / DIACHEM S.p.A. – Albano S. Alessandro (BG)

Registrazione del Ministero della Sanità N° 10.858/PPO del 11.04.2001

Partita N°.......

Contenuto: 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ml

ATTENZIONE: da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del prodotto.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE**

DA NON VENDERSI SFUSO

Etichetta ridotta

COCCINOIL

Insetticida anticoccidico liquido ad impiego floreale di giardinaggio
per piante da appartamento, balcone e giardino domestico

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Olio minerale (U.R. 95 %) 80 g
Coformulanti q. b. a 100 g

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

ORVITAL S.p.A.
Via Darwin, 63 - Settimo Milanese (MI)

Registrazione del Ministero della Sanità N° 10.858/PPO del 11.04.2001

Partita N° ....

Contenuto: 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ml

- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Etichetta normale e foglio illustrativo

DIAZIPLUS

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE PER IMPIEGO FLOREALE E DI GIARDINAGGIO PER PIANTE DA APPARTAMENTO, BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

DIAZIPLUS

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Diazinone puro (41,8 g/litro) 3,8 g
Coformulanti e solvente q. b. a 100,0 g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

ORVITAL S.p.a.
Via Darwin, 63 Settimo Milanese (MI)

Officine di produzione: L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) / DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG) / IRCA SERVICE S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione del Ministero della Sanità N° 10.860/PPO del 11.04.2001
CONTENUTO: 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 75 – 80 – 90 - 100 ml
Partita N° ....

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici – Evitare di respirare i vapori – Non usare nei locali dove si soggiorna o nelle camere da letto – Non nebulizzare nell'aria ambiente – Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal produttore – Dopo applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone – Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione – Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici i(di prima comparsa) nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo; ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, si può avere un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità. Terapia: atropina ad alte cosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. N.B. Poco efficace la pralidossima.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
Insetticida a base di diazinone puro in formulazione di liquido emulsionabile indicato per la lotta ai principali fitofagi quali: afidi (pidocchi), tripidi, tentredini, cicaline, bega del garofano, acari (ragnetti rossi), coleotteri, aleuroidi, bruchi, larve ecc. che infestano le piante ornamentali verdi e da fiore in casa, balcone e giardino. Il prodotto penetra nei tessuti vegetali (effetto citotropico9 uccidendo gli insetti annidati nella pianta.

MODALITA' D'IMPIEGO
Disperdere 10 ml di prodotto (usando l'apposito dosatore) in un litro di acqua, miscelare accuratamente e con la soluzione ottenuta irrorare, a braccio teso, con uno spruzzatore a distanza di circa 30 cm dalla vegetazione. Nebulizzare uniformemente la pianta evitando il gocciolamento delle foglie. La dispersione così preparata si conserva per un massimo di 24 ore. In caso di infestazioni gravi ripetere il trattamento dopo 4-5 giorni. Il prodotto può essere usato in qualsiasi periodo dell'anno e anche in trattamenti di tipo preventivo (prima della comparsa dell'insetto). Effettuare i trattamenti nelle ore meno calde della giornata e preferibilmente alla sera.
COMPATIBILITA': il prodotto va usato da solo.
ATTENZIONE: da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione, ogni altro uso è pericoloso. Chi usa il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE STRADE).**

DA NON VENDERSI SFUSO

Etichetta ridotta

DIAZIPLUS

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE PER IMPIEGO FLOREALE E DI GIARDINAGGIO PER PIANTE DA APPARTAMENTO, BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

DIAZIPLUS

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Diazinone puro (41,8 g/litro) 3,8 g
Coformulanti e solvente q. b. a 100,0 g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

O R V I T A L S. p. a.
Via Darwin, 63 - Settimo Milanese (MI)

Registrazione del Ministero della Sanità N° 10.860/PPO del 11.04.2001
CONTENUTO: 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 75 – 80 – 90 - 100 ml
Partita N° ……

- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

AUTOVAP PLUS

INSETTICIDA PRONTO ALL'USO A BASE DI PIRETRO NATURALE PER PIANTE ORNAMENTALI E FIORI DA BALCONE, APPARTAMENTO E GIARDINO DOMESTICO

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Piretrine 0,075 g
(pari a g 0,3 di Estratto di Piretro 25%)
Piperonil Butossido 0,564 g
Coformulanti q.b. a 100

Avvertenze
Attenzione: manipolare con prudenza. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego.

Precauzioni d'uso
Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Da impiegarsi esclusivamente su piante ornamentali e su fiori e comunque non su piante destinate all'alimentazione.

Informazioni per il medico
Consultare un centro antiveleni

Caratteristiche
AUTOVAP PLUS è un insetticida di contatto a base di Piretro naturale, che protegge le piante fiorite (come Rosa, Azalea, Begonia, Geranio, Ortensia, Oleandro), le piante verdi da appartamento (come Ficus, Dracaena, Filodendro, Felce) e le piante ornamentali in genere dall'azione dannosa di insetti come afidi, aleurodidi (mosche bianche), tentredini, tripidi, tingidi, ragnetti rossi, coleotteri e lepidotteri defogliatori e larve di Ifantria.

Modalità d'impiego
Agitare bene prima dell'uso ed irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm bagnando in modo uniforme tutta la superficie, compresa la pagina inferiore delle foglie. Trattare al manifestarsi delle infestazioni e, se occorre, ripetere l'operazione 8-10 giorni dopo il primo trattamento.

ORVITAL S.p.A.
Via Darwin 63 - Settimo Milanese (MI)

Officine di produzione:
Althaller Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI) / IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione del Ministero della Salute n° 11.970/PPO del 27.01.04

Contenuto netto: ml 200-350-400-500-750-1000

Lotto N° del

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **DA NON VENDERSI SFUSO**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE**

VEBI S.r.l.

ANERBA LIQUIDO

Diserbante chimico ad azione totale per aree non coltivate

COMPOSIZIONE

Clorato di sodio puro		g 24 (= 326,4 g/l)
Coformulanti	q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

VEBI Istituto Biochimico srl
via Desman, 43 – Borgoricco (PD)

OFFICINE DI PRODUZIONE :
IRCA SERVICE – FORNOVO S.GIOVANNI (BG)
DIACHEM S.p.A. – CARAVAGGIO (BG)
DIACHEM S.p.A. – ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
VEBI Istituto Biochimico srl - Borgoricco (PD)
Registrazione del Ministero della Sanità n° 7896 del 30/11/1989
Quantità netta del preparato: litri 1-2-5-10-20-50-100
Partita n°:

NORME PRECAUZIONALI

Conservare la confezione ben chiusa – Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Durante l'uso non avvicinarsi a fiamme o fonti di calore. Usare solo materiali metallici o in plastica e mai recipienti di legno.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: forte azione ossidante sui tessuti e distruzione dei globuli rossi. Emolisi e metaemoglobinemia in caso di esposizione prolungata. Nausea, vomito, coliche, cianosi, sintomi ematologici.

Terapia: diluire ed inattivare il veleno nello stomaco con soluzione Na tiosolfato 1-2,5% in Na bicarbonato 5%; gastrolusi od emesi seguita da somministrazione di carbone attivo e catarsi salina; endoscopia se sangue nel vomito. Se emolisi trasfusioni, rimuovere l'Hb libera con plasmaferesi; diuresi forzata se oliguria od anuria; emodialisi per rimuovere il tossico e vicariare la funzione renale insufficiente. Ospedalizzare.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE

Erbicida ad assorbimento radicale. ANERBA LIQUIDO è attivo contro tutte le specie di erbe infestanti che crescono in zone non coltivate lungo le strade, le seci ferroviarie e tranviarie, nei cortili, piazzali, campi sportivi, cimiteri, aree industriali e simili. Agisce rapidamente anche contro le radici più profonde per cui l'azione diserbante è totale e grazie alla sua soluzione addensante assicura una migliore permanenza in loco duratura nel tempo. Le piante irrorate avvizziscono e seccano in breve tempo. ANERBA LIQUIDO è stabile e miscibile con acqua in tutti i rapporti.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Diluire al 4-6% in acqua (4-6 litri di ANERBA LIQUIDO in 100 litri di acqua) e irrorare il terreno in ragione di ½ litro – 1 litro di questa soluzione per mq di superficie, a seconda che si tratti di vegetazioni esili con radici superficiali o di piante con radici più profonde (tipo gramigna). Far precedere l'irrorazione da un innaffiamento o irrorare dopo la pioggia per ottenere un migliore effetto penetrante.
La soluzione diluita di ANERBA LIQUIDO si applica con un annaffiatoio o una pompa irroratrice bagnando oltre il terreno anche le erbe. Stagioni ottimali per il diserbo: primavera e autunno (sufficiente di norma un solo trattamento). In estate invece il trattamento va ripetuto dopo tre giorni in quanto l'apparato radicale è più profondo.

COMPATIBILITA'

Prodotto da usare sempre da solo.

FITOTOSSICITA'

ANERBA LIQUIDO va usato esclusivamente come diserbante in zone NON COLTIVATE e irrorato solo sulle piante da distruggere. Va evitato il contatto con colture di qualsiasi genere anche sotto forma di vapori portati dal vento.
Attenzione: da impiegare in assenza di colture agricole esclusivamente per gli scopi sopra indicati. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

LUMACHICIDA VEBI

Esca microgranulare a base di Metaldeide

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Metaldeide pura g 5
Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL – Via Desman 43 – Borgoricco (PD)

DISTRIBUITO DA:
EUROCHIMICA SRL – Via Tinozzi, 22 – Pescara
PROGETTO EUROPA – V.le della Cooperazione – Borsea (RO)

OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM spa – Albano S. Alessandro (BG)
OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO: DIACHEM spa – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO:
LIFA SRL – Vigonovo (VE)
LIFA SRL – Isola Vicentina (VI)
INDUSTRIAL CHIMICA – Maserà (PD)
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL –Borgoricco (PD)
Registrazione Ministero della Sanità n. 10423 del 29/03/2000

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO : gr. 100-200-250-500-750
Kg 1-2-5-10-25

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica uomo: circa 50 mg/kg; irritante per le mucose, latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali.
Consultare un Centro Antiveleni

DOSI E TECNICA DI IMPIEGO

Orti e giardini g 250/400 per 100 mq.
Colture in pieno campo g 100/300 per 100 mq.
Eseguire il trattamento preferibilmente la sera o subito dopo una pioggia distribuendo il LUMACHICIDA VEBI a piccoli mucchietti od a file.

COMPATIBILITA'
Trattandosi di un'esca pronta all'uso non è prevista alcuna compatibilità, non miscelare con altri prodotti.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è nocivo per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per l' uso consentito: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

VEBIGLYF

ERBICIDA SISTEMICO NON SELETTIVO

LIQUIDO SOLUBILE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione di VEBIGLYF
Glifosate acido puro
(da sale isopropilamminico) g 30,8 (=360 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL
Via Desman 43 – 35010 Borgoricco (PD)

Stabilimenti autorizzati:
ALTHALLER ITALIA S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL - Borgoricco (PD)
Distribuito da: Eurochimica srl – Via

Taglie autorizzate: ml 50-100-150-200-250-300-350-400-450-500-600-700-800-900; litri 1-5-10-20

Registrazione n.10424 del 29/03/2000 del Ministero della Sanità
Partita n. Vedere sulla confezione

Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare un medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: VEBIGLYF è un erbicida sistemico, non selettivo, non residuale. Esso agisce solo in post-emergenza delle infestanti ed è particolarmente efficace quando queste sono in attiva crescita e/o in prossimità della fioritura quando la linfa discendente ne facilita il trasporto verso le parti ipogee (rizomi, tuberi, fittoni) ricche di riserve. L'effetto si palesa dopo alcuni giorni dal trattamento.

USI E MODALITA' D'IMPIEGO
CAMPI D'IMPIEGO:

- Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato, quali **AGRUMI** (Arancio, Mandarino, Clementino, Limone, Cedro, Pompelmo), **POMACEE** (Melo, Pero), **NOCE, OLIVO, VITE**.
- Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce anche il tronco ben lignificato, quali **DRUPACEE** (Albicocco, Ciliegio, Mandorlo, Nettarina, Pesco, Susino).
- Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti ed a goccia) quali: **ORTAGGI:** carciofo, pomodoro, melanzana, fagiolino, fava, pisello, carota, patata; **SOIA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, PRATI** (leguminose e graminacee), **ERBA MEDICA, COLTURE FLOREALI:** rosa; **VIVAI E SEMENZAI DI FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI E PIOPPO**;
- Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo nelle interfile con attrezzature schermate quali: **ORTAGGI**: carciofo, pomodoro, melanzana, patata; **MAIS** (da non impiegare in pre-raccolta); **VIVAI DI ORNAMENTALI, FORESTALI E PIOPPO.**
- Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima dell'emergenza: **ASPARAGO, MAIS, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO** (per mais e barbabietola da zucchero il trattamento va eseguito entro 3 giorni dalla semina);
- **TERRENI IN ASSENZA DI COLTURE** e destinati alla coltivazione di: fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, grano, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai con trattamenti prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura) o del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo, trattando con malerbe emerse ed effettuando il trapianto o la semina non prima di 48 ore;
- **AREE NON DESTINATE ALLE COLTURE AGRARIE**. Con interventi a piena superficie o per il diserbo controllato con attrezzature selettive. Aree industriali, aree archeologiche, ruderi storici, cimiteri, piazzali, banchine stradali, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, frangifuoco, argini, arginelli, aree urbane e agricole non coltivate, viali, parchi e giardini.

MODALITÀ' D'IMPIEGO: VEBIGLYF è un liquido solubile da impiegare in acqua, a volume normale o ridotto, con attrezzature aziendali adeguate per ben colpire le infestanti da controllare. Normalmente si impiegano 200-300 litri di acqua. Attendere alcuni giorni prima di effettuare eventuali lavorazioni allo scopo di assicurare la completa traslocazione della sostanza attiva.

DOSI: La quantità di VEBIGLYF necessarie per il controllo delle infestanti è variabile in relazione alla specie, allo stadio vegetativo ed all'obiettivo agronomico.

Per interventi a pieno campo
Su annuali e biennali
- graminacee e dicotiledoni: **2-4 l/ha** (la dose più bassa è da utilizzare su infestanti ai primi stadi di sviluppo).

Sulle perenni
- in presenza di Gramigna comune (*Agropyron repens*), Sorghetta (*Sorghum halepense*), Riso Selvatico (*Leersia oryroides*), Stoppione (*Cirsium arvensis*), Tarassaco comune (*Taraxacum officinale*), Piantaggine (*Plantago spp*), Romice (*Rumex spp*): **4-5 l/ha**
- contro Cannuccia (*Phragmites communis*), Canna (*Arundo donax*), Rovo (*Rubus spp*), Ferula (*Ferula spp*), Ortica (*Urtica spp*), Sparganio (*Sparganium erectum*), Tifa (*Typha spp*): **5,5-8 l/ha**
- contro Gramigna (*Cynodon dactylon*), Paspalo (*Paspalum distichum*), Vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*), Felce (*Pteridium aquilinum*), Cipero (*Cyperus spp*), Rubia (*Rubbia peregrina*): **6-10 l/ha**
- contro Convolvolo (*Calystegia sepium*), Aristolochia (*Aristolochia spp*), Clematide (*Clematis spp*): **9-12 l/ha**

Per interventi localizzati e per 100 litri di acqua:
Su annuali e biennali: **1-1,5 litri**
Su perenni: **2-4 litri**

Raccomandazioni: con infestanti vigorose come Canna e Rovo impiegare VEBIGLYF in autunno per assicurare il trasporto della sostanza attiva negli organi di riserva perennanti; nella primavera successiva ritrattare gli eventuali ricacci per completare l'eradicazione.

Compatibilità: non impiegare con prodotti a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischio di fitotossicità alle colture:
- usare acqua pulita;
- con acque molto dure usare un tamponante;
- evitare il contatto con le parti non ben lignificate delle piante impiegando schermi, ugelli antideriva, attrezzature umettanti;
- il prodotto è fitotossico se assorbito dalle parti verdi delle piante;
- impiegare attrezzature ben pulite e dopo il trattamento effettuare un accurato lavaggio di tutte le parti che sono state a contatto con il prodotto allo scopo di rimuovere gli eventuali residui;
- con terreni sabbiosi attendere 7 giorni dal trattamento prima di effettuare un eventuale trapianto delle piantine.

AVVERTENZA:
- per impiego in AREE PUBBLICHE (parchi e giardini) segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso per 24 ore alle aree trattate;
- durante il trattamento tenere lontani animali domestici e bestiame;
- assicurarsi che il prodotto non venga a contatto con parti zincate e/o di ferro delle attrezzature;
- non impiegare su infestanti coperte di polvere, in stato di stress e nella fase dormiente;
- le piogge che cadono entro 4-6 ore dal trattamento possono ridurre l'efficacia.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati). **Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.**
Da non applicare con mezzi aerei.
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

VEBIPHOS G

Granulare
Insetticida per la lotta contro gli insetti del terreno

Composizione:
Clorpirifos puro g 7,5
Coformulanti q.b. a 100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
R22 Nocivo per ingestione.
R 50-53 Altamente tossico per gli organismi acquatici,
può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini; S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; S 20/21 Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; S46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; S60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; S 61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL
Via Desman,43 Borgoricco (PD)

Stabilimenti di produzione: DIACHEM spa - Albano S. Alessandro (BG) / VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL - Borgoricco (PD)
Stabilimento di confezionamento: DIACHEM spa U.P. SIFA Caravaggio (BG)
Taglie autorizzate: g 100 - 200 - 250 - 500 – 750 ; Kg 1 - 5 - 10 - 20 - 25
Registrazione n. 10427 del Ministero della Sanità del 29/03/2000 Partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi prengagliari. le placche neuromuscolari.
Sintomi muscolari (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7 - 15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Caratteristiche: VEBIPHOS G è insetticida granulare per la lotta contro gli insetti che vivono nel terreno e sulla superficie ed è efficacie anche nei terreni umidi ed in quelli irrigui.
VEBIPHOS G si impiega per la difesa delle colture seguenti:
Barbabietola da zucchero, Mais, Tabacco, Patata, Oleaginose (girasole, soia), **Cavoli** (cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo verza, Cavolo bianco, Cavolo rosso, Cavolo cappuccio, Cavolo cinese, Cavolo di Bruxelles, Cavolo rapa, Cavolo nero) **Solanacee** (Pomodoro, Peperone, Melanzana), **Fagiolo, Pisello, Carota, Cipolla, Colture floreali ed ornamentali.**
Dosi di impiego: VEBIPHOS G è consigliato per la disinfestazione del terreno contro Elateridi, Nottue, Grillotalpa, Maggiolino, Tipule, Bibio, Mosca del cavolo, Formiche, alla dose di 32-40 Kg/ha, incorporandolo al terreno con leggera erpicatura o fresatura.
Nel caso di trattamenti localizzati, VEBIPHOS G va distribuito a 10-16 kg/ha nei solchi preparati per la semina, per il trapianto o all'atto della rincalzatura. In terreni molto leggeri si consiglia la dose minima.

AVVERTENZA: PATATA: l'uso è raccomandato alle dosi sopra indicate **esclusivamente alla semina.**
Nella distribuzione di VEBIPHOS G in miscela con concimi, è necessario che la granulometria dei singoli componenti non sia molto diversa: in caso contrario non si avrebbe un uniforme distribuzione dei prodotti.
Compatibilità: tale prodotto, data la sua formulazione granulare, non si applica in miscela con altri formulati.
Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le altre colture non indicate in etichetta.
Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 120 GIORNI prima della raccolta per soia e girasole; 60 GIORNI per barbabietola da zucchero, tabacco e patata; 30 GIORNI per mais e cavoli; 21 GIORNI per pomodoro, peperone, carota e cipolla; 15 GIORNI per le altre colture.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

VEBIZOLFO WG

Zolfo micronizzato sotto forma di microgranuli idrodispersibili contro
le forme di Oidio in frutticoltura, viticoltura, orticoltura e floricoltura.

Partita n°……………

Composizione – 100 gr. di prodotto contengono:
- ZOLFO puro (esente da selenio) g. 80
- Disperdenti, bagnanti q.b. a g. 100

Frasi di Rischio
R 36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

IRRITANTE

Consigli di Prudenza
S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini; S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; S 20/21 Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; S 36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti; S 46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL
Via Desman 43 - 35010 Borgoricco (PD)

Registrazione n. 12323 del 08/11/2004 del Ministero della Salute
Officina di produzione: AGROSTULLN GmbH - Werk Stulln, Werksweg 2 – D-92551 STULLN (Germania)
Officine di confezionamento: VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO srl – Via Desman 43 – Borgoricco (PD)
LIFA srl – Isoal Vicentina (VI)
Taglie di confezione: Kg. 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15-20-25

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: riferite a 100 litri d'acqua
VITICOLTURA: trattamenti preventivi: gr. 200-400; trattamenti ad infezione da oidio avvenuta: gr. 400-500.
FRUTTICOLTURA: Pomacee: trattamenti prefiorali: gr. 200-500; in fioritura e postfiorali: gr. 200-300. Pesco, Susino, Ciliegio, Agrumi: gr.200-500.
ORTICOLTURA: patate, pomodoro, bietole, cavoli, fragole, cucurbitacee gr. 200-500.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: Kg. 8/Ha effettuando il primo trattamento alla comparsa dei sintomi ed effettuando i successivi ad intervalli di 15-20 giorni.
CEREALI: Kg. 8/Ha intervenendo alla comparsa della malattia sulle ultime due foglie del culmo.
GIRASOLE – SOIA – TABACCO: Kg. 4-8/Ha.
VIVAI DI PIOPPO: gr. 200-400.
COLTURE FLOREALI – ORNAMENTALI – FORESTALI: gr. 150-400 intervenendo ai primi sintomi della malattia.
Preparazione della poltiglia: mettere in un recipiente il quantitativo di prodotto necessario, aggiungere 1-2 lt di acqua per Kg di VEBIZOLFO WG e agitare fino ad ottenere un liquido cremoso che dovrà essere versato nella botte (con l'agitatore in funzione) entro 30 minuti dalla sua preparazione, quindi portare a volume con acqua mescolando bene.

COMPATIBILITA': Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese), con oli minerali, DNOC, Captano, DDVP, Binapacryl, Diclofluanide, Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano. Non applicare su colture sofferenti o stressate. Mantenere sempre l'agitatore in funzione.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': VEBIZOLFO WG può arrecare danno alle seguenti cultivars di: MELE: Black Ben Davis – Black Stayman – Calvilla Bianca – Commercio – Golden delicious – Jonathan – Imperatore – Renetta – Rome Beauty – Stayman Red- Winesap. PERE: Buona Luigia D'Avranches – Contessa di Parigi - Kaiser Alexander – Olivier de Serres – William - Decana del Comizio. VITE: Sangiovese. CUCURBITACEE: Può essere fitotossico.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del formulato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

06A05236

SEGUE III ELENCO

Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 162 del 14 luglio 2006 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 luglio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

MINISTERO DELLA SALUTE

Etichette di prodotti fitosanitari riclassificati ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, con decreti dirigenziali del Ministero della salute.

ELENCO III

S O M M A R I O

MINISTERO DELLA SALUTE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo alle etichette di prodotti fitosanitari riclassificati ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 con decreti dirigenziali del Ministero della salute. (III Elenco)

Si pubblica il terzo elenco di etichette di prodotti fitosanitari riclassificati ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65.

Il presente comunicato raccoglie le etichette, fornite dalle Imprese, dei prodotti fitosanitari riclassificati con decreti dirigenziali i cui allegati sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

La vendita e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in questione, confezionati con le etichette precedentemente autorizzate, è consentito fino al 30 gennaio 2007.

I N D I C E

TERZO ELENCO

C.Q. MASSO' S.a.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsione, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossina.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
METICLOR è indicato per combattere larve di lepidotteri e neanidi di cocciniglie. Esplica inoltre una azione frenante sul ragno rosso e gli acari in genere.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Meli e peri - contro: pandemis, eulia, capua, cacoecia, neanidi di cocciniglia, ml 200-250 per 100 litri di acqua.
Peschi - contro: cidia molesta, anarsia, neanidi di cocciniglia, ml 200-250 per 100 litri di acqua.
Pomodoro, piselli, melanzane, ravanelli - contro: nottue, cavolaie, moscone, litri 1,5-2 per ettaro in 6-8 q.li di acqua.

METICLOR

INSETTICIDA - LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE – g 100 di prodotto contengono:
CLORPIRIFOS METILE puro g 22 (g/l 250)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

C.Q. MASSO' S.A. – Viladomat 321, 5° - Barcellona (Spagna)
Distribuito da: Chimasso Italia S.r.l., Via Milanese, 20, Sesto S. Giovanni (Mi).

Stabilimento di Produzione : - C. Q. Masso S.A., Barcellona, Spagna. / Althaller Italia s.r.l. Strada Comunale,5 20078 S. Colombano al Lambro (MI).
Reg. del Ministero della Sanità n. 7127 del 24/06/1987
CONTENUTO: ml 10, 20, 50, 100, 250, 500 e litri 1, 5, 10, 20
Riferimento partita:

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con tutti i formulati di comune impiego esclusi quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

"**Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso". "Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto". "Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ".

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE
ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE
COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO
CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE
IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA
CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE
ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ALIADO 4-40 CM

(POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI)
FUNGICIDA PER LA DIFESA DELLA VITE, DEL POMODORO E DEL TABACCO

ALIADO 4-40 CM Registrazione Ministero della Sanità n 10028 del 6/05/99

Composizione
CIMOXANIL puro g. 4
MANCOZEB puro g. 40
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
- COMERCIAL QUÍMICA MASSÒ S.A Barcellona (Spagna)
- S.T.I.-SOLFOTECNICA ITALIANA SpA Cotignola (Ravenna)
DIACHEM SpA Unità Produttiva SIFA Caravaggio (Bergamo)
- A.D.I.C.A. Srl Via dello Stabilimento, 11 - 05027 Nera Montoro (Terni)
- Torre srl - Torrenieri Montalcino (SI)

COMERCIAL QUÍMICA MASSÒ S.A.
Barcellona (Spagna)

Partita n. CONTENUTO NETTO: **0,250-0,500-1-5-10 Kg**

Distribuito da: CHIMASSÒ ITALIA S.r.l. - Via Milanese, 20 Sesto S. Giovanni (MI)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Precauzioni particolari: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Mancozeb 40% e Cimoxanil 4% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
MANCOZEB - Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE

ALIADO 4-40 CM è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la Peronospora della VITE, del TABACCO, del POMODORO. Sulla vite può essere usato per tutta la stagione e nella lotta contro l'Escoriosi. Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Può essere usato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Peronospora della vite: usare g 200-300 di prodotto per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti quando i germogli raggiungono i 10 cm di lunghezza e proseguirli fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.

Peronospora del pomodoro: usare g 200-300 di prodotto per 100 litri di acqua. La dose massima va usata in presenza di forti attacchi di Peronospora e in presenza di alternaria.
I trattamenti al pomodoro sono consentiti solo fino alla prima fioritura.
Peronospora del tabacco: usare g 300 di prodotto per 100 litri di acqua.

Preparazione della poltiglia
Formare una pasta fluida sciogliendo la dose in poca acqua e portare a volume mantenendo la miscela in costante agitazione.

NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare in associazione a prodotti con reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Durante il trattamento si consiglia di tenere lontani gli animali domestici e il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE - LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati.

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore.

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per qualche minuto.

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione.

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare.

STOCCAGGIO: Se non si utilizzano tutti i sacchetti, richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

Etichetta per sacchetti idrosolubili

ALIADO 4-40 CM

(POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI)
FUNGICIDA PER LA DIFESA DELLA VITE, DEL POMODORO
E DEL TABACCO

SACCHETTI IDROSOLUBILI

ALIADO 4-40 CM Registrazione del Ministero della Sanità n. 10028 del 6/05/99

Composizione

CIMOXANIL puro	g. 4
MANCOZEB puro	g. 40
Coformulanti q.b. a	g. 100

AVVERTENZA:
LEGGERE ATTENTAMENTE L'ETICHETTA
RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto: g. 100-200-250-500 Kg. 1

Partita n°

COMMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A.
Barcellona (Spagna)

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
- COMMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A - Barcellona (Spagna)
- S.T.I.-SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Cotignola (Ravenna)
DIACHEM SpA Unità Produttiva SIFA Caravaggio (Bergamo)
- A.D.I.C.A. Srl - Via dello Stabilimento, 11 - 05027 Nera Montoro (Terni)

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n.

Distribuito da: CHIMASSÒ ITALIA S.r.l. - Via Milanese, 20
Sesto S. Giovanni (MI)

ALIADO 4-40 CM

(POLVERE BAGNABILE)

FUNGICIDA PER LA DIFESA DELLA VITE, DEL POMODORO E DEL TABACCO

ALIADO 4-40 CM Registrazione Ministero della Sanità n.10028 del 6/05/99

Composizione
CIMOXANIL puro g. 4
MANCOZEB puro g. 40
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
- COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A Barcellona (Spagna)
- S.T.I.-SOLFOTECNICA ITALIANA SpA Cotignola (Ravenna)
- DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA Caravaggio (Bergamo)
- A.D.I.C.A. Srl Via dello Stabilimento, 11 - 05027 Nera Montoro (Terni)
- Torre srl - Torrenieri Montalcino (SI)

COMERCIAL QUÍMICA MASSÒ S.A.
Barcellona (Spagna)

Partita n. CONTENUTO NETTO: **0,250-0,500-1-5-10 Kg**

Distribuito da: CHIMASSÒ ITALIA S.r.l. - Via Milanese, 20 Sesto S. Giovanni (MI)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi: Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Precauzioni particolari: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Mancozeb 40% e Cimoxanil 4% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
MANCOZEB - Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE

ALIADO 4-40 CM è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la Peronospora della VITE, del TABACCO, del POMODORO. Sulla vite può essere usato per tutta la stagione e nella lotta contro l'Escoriosi. Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Può essere usato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Peronospora della vite: usare g 200-300 di prodotto per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti quando i germogli raggiungono i 10 cm di lunghezza e proseguirli fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
Peronospora del pomodoro: usare g 200-300 di prodotto per 100 litri di acqua. La dose massima va usata in presenza di forti attacchi di Peronospora o in presenza di alternaria.
I trattamenti al pomodoro sono consentiti solo fino alla prima fioritura.
Peronospora del tabacco: usare g 300 di prodotto per 100 litri di acqua.

Preparazione della poltiglia
Formare una pasta fluida sciogliendo la dose in poca acqua e portare a volume mantenendo la miscela in costante agitazione.

NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare in associazione a prodotti con reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Durante il trattamento si consiglia di tenere lontani gli animali domestici e il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE - LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ALIADO WDG

Granuli idrodispersibili

Fungicida citotropico translaminare impiegato su Vite, Carciofo, Pomodoro, Patata e Tabacco contro la Peronospora

COMPOSIZIONE
- Cimoxanil puro gr. 30
- Coformulanti q.b. a gr. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Nocivo per ingestione; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

C.Q. MASSO', S.A. – Viladomat 321, 5° - Barcellona (Spagna)

Distribuito da:

stabilimento di produzione : A.D.I.C.A. srl – Nera Montoro (TR) / STI SOLFOTECNICA ITALIANA, S.p.a. - via Torricelli,2 - Cotignola (RA);
Registrazione n. 10034 del 24/05/99 del Ministero della Sanita'
Kg. 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-15-20 - Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè, irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica.
Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
L'ALIADO WDG è un fungicida in formulazione di microgranuli idrodisperdibili ad azione citotropica translaminare indicato per il trattamento contro la Peronospora, possiede una persistenza d'azione di circa 5 giorni.
VITE
contro la Peronospora alla dose di gr. 65-80 per q.le acqua trattando da quando si hanno le infezioni della malattia, e fino alla fine della fioritura.
Quindi dall'allegagione impiegare gr. 30-40 per q.le acqua miscelato con i prodotti di copertura quali i rameici, i ditiocarbammati ed il folpet a un dosaggio pari al 60%-70% della dose comunemente impiegata.
CARCIOFO - PATATA - POMODORO - CIPOLLA - AGLIO - PORRO - GIRASOLE - SOIA - LATTUGA - ROSA - ZUCCHINO - MELONE - PISELLO - SPINACIO – TABACCO
contro la Peronospora a gr. 65-80 per q.le acqua, iniziando al verificarsi delle condizioni di infestazioni e proseguendo. Nel caso di infezione in atto effettuare due trattamenti ravvicinati alla dose piu' alta (5-7 giorni l'uno dall'altro). Si puo' ridurre la dose a gr. 30-40 per q.le acqua se si effettuano trattamenti in miscela con rameici o ditiocarbammati, comunque tenere presente che la dose minima riferita ad ettaro non deve essere inferiore ai 400 gr/ettaro.

COMPATIBILITA' : non compatibile con i prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese) e gli olii minerali. AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA' : quando si trattata tenere lontano gli animali domestici e il bestiame; tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto della soia e del girasole, 21 giorni per il carciofo e 10 giorni per le altre colture.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti : ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

OIDIMENOL COMBI

fungicida a base di Triadimenol e Zolfo
Tipo di formulazione : polvere bagnabile

Composizione
- Triadimenol puro .... g. 2,5
- Zolfo puro...................... g. 50
(esente da Selenio)
- coformulanti qb a g. 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

C.Q. MASSO', S.A. – Viladomat 321, 5°, 08029 Barcellona (Spagna)
Distribuito da: Chimasso Italia S.r.l., Via Milanese, 20, Sesto S. Giovanni (Mi).

stabilimento produttore : STI SOLFOTECNICA ITALIANA - Cotignola (RA); CHEMIA spa - S.Agostino (FE); DIACHEM spa - Unità Produttiva SIFA Caravaggio (BG); TERRANALISI srl - Cento (FE) - AGRINDUSTRIA srl - S.Cipriano Po (PV) - C.Q. MASSO', S.A. Barcellona (Spagna)
Registrazione n. 10067 del 6/07/99 del Ministero della Sanità
Kg. 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1- 5 – 10 - 15

***INFORMAZIONI PER IL MEDICO :** Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive : TRIADIMENOL 2,5%, ZOLFO 50% le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione :*
TRIADIMENOL : Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su basa allergica (da semplici dermatiti a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica.
ZOLFO : --
Terapia : sintomatica. - Consultare un centro antiveleni.

CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
Fungicida sistemico e di contatto con attività preventiva, curativa ed eradicante contro numerose malattie fungine; indicato sulle seguenti colture per combattere l'Oidio o Mal Bianco e le Ruggini di :
VITE - CETRIOLO - MELONE - PEPERONE - POMODORO - FRUMENTO – ORZO – AVENA – SEGALE - TRITICALE - ZUCCHINO - MELO - PIANTE ORNAMENTALI : g. 100 - 200 per q.le acqua
Impiegare la dose più alta in caso di maggiore sensibilità varietale in zone soggette ad attacchi di Oidio o con intervalli, tra i trattamenti, superiori ai 10 giorni. Non trattare durante le ore più calde.
COMPATIBILITA' : tra il trattamento con il prodotto e l'impiego di olii minerali attendere 2 settimane
AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di vite, melo, peperone, cetriolo, melone, pomodoro, 7 giorni per lo zucchino, 30 giorni per frumento, orzo, avena, segale e triticale
Fitotossicità : il prodotto può risultare fitotossico sulle seguenti varietà di mele : Stayman (Winesap). Granny Smith, Starking, Renetta. Sulla Vite e fitotossico sulla Cv. Sangiovese.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

OIDIMENOL COMBI

fungicida a base di Triadimenol e Zolfo
Tipo di formulazione : polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

Composizione
- Triadimenol puro .... g. 2,5
- Zolfo puro........................ g. 50
  (esente da Selenio)
- coformulanti qb a g. 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

C.Q. MASSO', S.A. Viladomat 321, 5°, 08029 Barcellona (Spagna)
Distribuito da: Chimasso Italia S.r.l., Via Milanese, 20, Sesto S. Giovanni (Mi).

stabilimento produttore : STI SOLFOTECNICA ITALIANA - Cotignola (RA); CHEMIA spa - S.Agostino (FE); DIACHEM spa - Unità Produttiva SIFA Caravaggio (BG); TERRANALISI srl - Cento (FE) - AGRINDUSTRIA srl - S.Cipriano Po (PV) - C.Q. MASSO', S.A. Barcellona (Spagna)
Registrazione n. 10067 del 6/07/99 del Ministero della Sanità
Kg. 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1- 5 – 10 - 15

***INFORMAZIONI PER IL MEDICO** : Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive : TRIADIMENOL 2,5%, ZOLFO 50% le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione :*
TRIADIMENOL : Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su basa allergica (da semplici dermatiti a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica.
ZOLFO : --
Terapia : sintomatica. - Consultare un centro antiveleni.

CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
Fungicida sistemico e di contatto con attività preventiva, curativa ed eradicante contro numerose malattie fungine; indicato sulle seguenti colture per combattere l'Oidio o Mal Bianco e le Ruggini di :
VITE - CETRIOLO - MELONE - PEPERONE - POMODORO - FRUMENTO – ORZO – AVENA – SEGALE - TRITICALE - ZUCCHINO - MELO - PIANTE ORNAMENTALI : g. 100 - 200 per q.le acqua
Impiegare la dose più alta in caso di maggiore sensibilità varietale in zone soggette ad attacchi di Oidio o con intervalli, tra i trattamenti, superiori ai 10 giorni. Non trattare durante le ore più calde.
COMPATIBILITA' : tra il trattamento con il prodotto e l'impiego di olii minerali attendere 2 settimane
AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di vite, melo, peperone, cetriolo, melone, pomodoro, 7 giorni per lo zucchino, 30 giorni per frumento, orzo, avena, segale e triticale
Fitotossicità : il prodotto può risultare fitotossico sulle seguenti varietà di mele : Stayman (Winesap), Granny Smith, Starking, Renetta. Sulla Vite è fitotossico sulla Cv. Sangiovese.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

20 25%

1 Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua

2 Introdurre il numero di sacchetti idrosolubili chiusi, previsti (come da etichetta) nell'atomizzatore

3 Mettere in funzione l'agitatore

4 Attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti), ed.........

5 ....aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

PRECLOR 65 WDG

erbicida della Barbabietola da zucchero da orto e da foraggio
tipo di formulazione : microgranuli idrodisperdibili

PRECLOR 65 WDG
Composizione
- CLORIDAZON puro g. 65
- Coformulanti qb a 100

Frasi di rischio :
Irritante per gli occhi e la pelle; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature ; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

C.Q. MASSO', S.A. – Viladomat 321, 5° - Barcellona (Spagna)
Distribuito da: Chimasso Italia, S.r.l., Via Milanese, 20, Sesto S. Giovanni (Mi).
Stabilimento di produzione : A.D.I.C.A.srl – Nera Montoro (TR) / Torre srl -Torrenieri (Fraz. Montalcino) Siena (solo confezionamento)
Registrazione n. 10179 del 11/10/99 del Ministero della Sanita'
Kg : 1-2-3-5-10-20 Partita n: .....

Informazioni per il medico : sintomi : nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico – clonici terapia : sintomatica. Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE D'AZIONE
il prodotto agisce per assorbimento radicale ed in parte fogliare nei primi stadi di sviluppo delle infestanti ed è indicato per il diserbo della ***BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA ORTO E DA FORAGGIO***.
Erbe infestanti sensibili : avena selvatica (avena spp.), fienarola annua (poa annua), giavone comune (echinochloa crus - galli), sanguinella (digitaria sanguinalis), amaranto comune (amaranthus retroflexus), borsa del pastore (capsella bursa pastoris), camomilla comune (matricaria chamomilla), centocchio comune (stellaria media), erba correggiola (polygonum aviculare), erba morella (solanum nigrum), erba storna comune (thlaspi arvensis), falsa ortica (lamium amplexicaule), farinello comune (chenopodium album), galinsoga comune (galinsoga parviflora), ortica minore (ortica urens), papavero comune (papaver rhoeas), poligono convolvolo (fallopia convolvolus), poligono persicaria (polygonum persicaria), ravanello selvatico (raphanus raphanistrum), renaiola comune (spergula arvensis), senape selvatica (sinapis arvensis), veronica (veronica spp.).
Volume d'irrorazione : 400 - 600 litri di acqua
Dosi d'impiego nei trattamenti pre - semina e pre - emergenza :
kg 3 - 3,5 / ha in terreni sabbiosi
kg 4 - 4,5 / ha in terreni di medio impasto
kg 4,5 - 5,5 / ha in terreni argillosi
kg 6 / ha in terreni ricchi di sostanza organica o fortemente argillosi
Dosi d'impiego nei trattamenti di post - emergenza
kg 3 - 4 / ha
Epoca d'impiego
- pre - semina (con incorporamento superficiale del prodotto)
- pre - emergenza (se non avviene una pioggia entro 2 - 4 settimane, effettuare una irrigazione)
- post - emergenza (con bietola che abbia superato lo stadio delle due foglie vere).

COMPATIBILITA': il prodotto può essere miscelato con i seguenti principi attivi : etofumesate, metamitron, fenmedifam, desmedifam, lenacil, cicloato e olio bianco. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta
Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Il prodotto può essere fitotossico nella fase cotiledonare della coltura.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

RELBUG 22

Insetticida
Concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
Clorpirifos Metile puro g 22 (= 217,8 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

Frasi di Rischio
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può
provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature ; Usare indumenti protettivi e guanti adatti ; Evitare il contatto con la pelle; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

C.Q. MASSO', S.A. – Viladomat 321, 5° - Barcellona (Spagna)
Distribuito da: Chimasso Italia S.r.l., Via Milanese, 20, Sesto S. Giovanni (Mi).
OFFICINA DI PRODUZIONE : Torre srl - Torrenieri (fraz. di Montalcino) (SI)/ DIACHEM spa - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG) / ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI)/ C.Q. MASSO', S.A.,Barcellona (Spagna)
Registrazione Ministero della Sanita' n. 10490 del 10/05/00
ml 10-20-50-100-250-500 - litri 1 - 5 - 10 - 15 - 20
PARTITA N.....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : *Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita'). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. Consultare un Centro Antiveleni*

CARATTERISTICHE
RELBUG 22 è un insetticida fosforganico, agisce per contatto, ingestione ed in parte per azione di vapore. E' particolarmente indicato per combattere le larve di lepidotteri e le neanidi di cocciniglie. Esplica inoltre azione frenante dello sviluppo delle popolazioni di acari tetranichidi come Panonychus, Tetranychus, Eotetranychus.
DOSI DI IMPIEGO
MELO, PERO, PESCO: 200 ml/hl contro Lepidotteri, Tortricidi (Capua, Cacoecia, Pandemis, Eulia), tignola orientale (Cydia molesta), Anarsia (Anarsia); 200-250 ml/hl contro neanidi di Cocciniglie (Aspidiotus ed altre)
ARANCIO: 250 ml/hl contro neanidi di cocciniglie (Saissetia, Ceroplastes, Pseudococcus).
VITE: 100-150 ml/hl contro Tignole (Lobesia, Clysia). Il prodotto potrebbe risultare fitotossico per alcune varietà sensibili; si raccomandano pertanto saggi zonali e varietali.
FRAGOLA: 300-400 ml/hl contro Frankliniella o Nottue ed Afidi
ORTAGGI (pomodoro, peperone, melanzana, pisello, ravanello, patata): 1,5 -2 litri/ha contro Nottue (Agrotis, Mamestra ed altre), Macaone (Papilio), Dorifora (Leptinotarsa).
MAIS : 300 ml/hl contro Nottue (Agrotis), Piralide (Ostrinia) ed Elateridi.
PIOPPO: 400-500 ml/hl contro Saperda e Criptorrinco
ORNAMENTALI (garofano, crisantemo, azalea, ciclamino): 200 ml/hl contro Bega, Tortricidi, Cocciniglie, Oziorrinco
COMPATIBILITA' : RELBUG 22 non e' miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina .
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : Non impiegare il prodotto sulle varietà di melo Stayman Red, Stayman Winesap, Gloster, Gallia Beauty. In post-fioritura del melo non eseguire più di due trattamenti. Non effettuare trattamenti su arancio nei mesi compresi tra gennaio ed aprile.
INTERVALLO DI SICUREZZA : 15 giorni
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

MASSOTRON 70

GRANULI IDRODISPERSIBILI (WDG)
ERBICIDA SELETTIVO DELLA
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Registrazione Ministero della Sanità n.10555 del 20/07/00

Composizione
METAMITRON puro g. 70
Coformulanti q.b.a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Nocivo per ingestione; Altamente tossico per gli organismi acquatici.

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A.
Barcellona (Spagna)

Distribuito da: CHIMASSÒ ITALIA S.r.l.
Via Milanese, 20 - Sesto S. Giovanni (MI)

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A - Barcellona (Spagna)
A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)
S.T.I. Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (RA)
CONTENUTO NETTO: 1-3-5-10 Kg Partita n.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il MASSOTRON 70 agisce per assorbimento radicale e fogliare.

ERBE INFESTANTI SENSIBILI

Dicotiledoni che vengono controllate: Amaranto (*Amaranthus spp.*), Farinello (*Chenopodium spp.*), Scannacavallo (*Euphorbia falcata*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*), Erba ruota (*Lamium amplexicaule*), Falsa ortica (*Lamium purpurea*), Camomilla (*Matricaria spp.*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Senape selvatica (*Sinapsis arvensis*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Centocchio (*Stellaria media*), Erba storna (*Thlaspi arvensis*), Ortica comune (*Urtica urens*), Veronica a foglie di edera (*Veronica hederifolia*), Veronica comune (*Veronica persica*), Viola del pensiero (*Viola tricolor*).
Graminacee: Coda di volpe (*Alopecurus spp.*), Capellini dei campi (*Apera spica venti*), Fienarola annua (*Poa annua*).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Pre-semina: 3-5 Kg/ha con interramento del prodotto a non più di 3-4 cm di profondità.
Pre-emergenza: 3-5 Kg/ha.
Le dosi più elevate vanno impiegate nei terreni argillosi o ricchi di sostanza organica.
Post-emergenza: 1-1,5 Kg/ha con coltura allo stadio di almeno 2-4 foglie vere.
La dose sopra menzionata può essere distribuita a dose dimezzata a partire dallo stadio dei 2 foglie vere della coltura su infestanti nei primissimi stadi di sviluppo ed eventualmente ripetendo il trattamento alla distanza di 8-10 giorni.
Il prodotto può essere impiegato anche a dosi ridotte 1-1,5 Kg/ha in miscela con 2 litri/ha di un formulato a base di Fenmedifam al 15,9%.

Volume di irrorazione: 200-300 l/ha.

NOTIZIE AGRONOMICHE

Per i trattamenti di post-emergenza si consiglia di impiegare volumi di distribuzione più bassi di 150-300 l/ha, seguendo il principio che una maggiore concentrazione permette una maggiore efficacia. Nel caso di interventi frazionati sarà necessario adottare i volumi di distribuzione più bassi.

COMPATIBILITÀ

Il MASSOTRON 70 è compatibile con i prodotti a base di Fenmedifam.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

MASSOZIN 35 DF

(MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI)
ERBICIDA SELETTIVO PER LA LOTTA CONTRO LE ERBE INFESTANTI DI ORTAGGI, SOIA, ERBA MEDICA

Registrazione Ministero della Sanità n. 10556 del 20/07/00

Composizione
METRIBUZIN puro g. 35
Coformulanti q.b.a g. 100

Frasi di Rischio
Nocivo per ingestione; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

NOCIVO

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle Fognature; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A.

Barcellona (Spagna)

Distribuito da: CHIMASSÒ ITALIA S.r.l.
Via Milanese, 20 - Sesto S. Giovanni (MI)

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A - Barcellona (Spagna)
A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)
S.T.I. Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (RA)

CONTENUTO NETTO: 100-500 g 1-5 Kg Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

MASSOZIN 35 DF è un diserbante in granuli idrodispersibili selettivo per le colture di patata, pomodoro, soia ed erba medica. Agisce per assorbimento fogliare e sui semi in fase di germinazione e sulle plantule. Il prodotto controlla diverse infestanti, tra cui:
Monocotiledoni annuali: Coda di topo (*Alopecurus spp*), Fienarola annuale (*Poa annua*). Loglio (*Lolium spp*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*);
Dicotiledoni annuali: Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Camomilla (*Matricaria spp*), Canapetta (*Galeopsis spp*), Centocchio comune (*Stellaria media*), Centonchio dei campi (*Anagallis arvensis*), Erba storna comune (*Thlaspi arvense*), Euforbia (*Euphorbia spp*), Farinello comune (*Chenopodium album*), Fiordaliso vero (*Centaurea cyanus*), Fumaria comune (*Fumaria officinalis*), Galinsoga comune (*Galinsoga parviflora*), Grespino comune (*Sonchus oleraceus*), Papavero comune (*Papaver rhoeas*), Poligono (*Polygonum spp*), Porcellana comune (*Portulaca oleracea*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Senecione comune (*Senecio vulgaris*).

ISTRUZIONI PER L'USO

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Patata
a) trattamento in pre-emergenza: 0,6-1 Kg/ha in 500-700 litri di acqua, impiegando la dose minore nei terreni leggeri e quella maggiore in quelli pesanti, escludendo i terreni sabbiosi;
b) trattamenti in post-emergenza: 0,5-0,6 Kg/ha in 500-700 litri di acqua riservando la dose maggiore ai terreni pesanti.
N.B. Il MASSOZIN 35 DF si è dimostrato perfettamente tollerato dalle seguenti varietà di patata: Admirandus, Alkmaria, Apollo, Arsy, Bea, Bintje, Cardinal, Desirée, Favorita, Humalda, Kennebec, Majestic, Monnalisa, Primura, Resy, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal.
Pomodoro
a) pre-semina: 0,5-0,6 Kg/ha in 500-700 litri di acqua, intervenendo 7-14 giorni prima della semina sul terreno già preparato senza interrare;
b) trattamenti in post-emergenza e post-trapianto: 0,4-0,8 Kg/ha riservando la dose maggiore ai terreni pesanti e intervenendo dopo il diradamento o dopo che le piantine hanno superato la crisi di trapianto. Al momento del trattamento le piantine devono aver differenziato almeno 8-9 foglie (pre-fioritura).
Soia: 0,5-0,7 Kg/ha in pre-semina/pre-emergenza. Non impiegare in terreni molto leggeri o torbosi.
Asparago: 1-1,5 Kg/ha in pre-emergenza con 600 litri di soluzione, in asparagiaie di almeno 2 anni.
Medica: 1 Kg/ha in terreni leggeri, 1,5 Kg/ha in terreni di medio impasto e pesanti e in terreni molto pesanti, sempre in 500-700 litri di acqua intervenendo in autunno dopo l'ultimo sfalcio, quando la coltura è entrata in riposo vegetativo a seguito delle prime brinate.
Avvertenza generale: Eseguire il trattamento in giornate senza vento, avendo cura di distribuire uniformemente la soluzione su tutta la superficie da trattare, evitando sovrapposizioni e di raggiungere altre colture adiacenti. A lavoro ultimato lavare accuratamente pompe e recipienti usati per la preparazione della soluzione.

COMPATIBILITÀ

Per la coltura medica il prodotto può essere miscelato solamente con altri diserbanti a reazione neutra (es. Metabentiazuron) per aumentare il campo d'azione contro le infestanti.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non effettuare il diserbo su pomodoro in serra e sotto tunnel e nei terreni molto leggeri; non intervenire in pre-semina del pomodoro nei seguenti casi: a) qualora si usi un quantitativo di seme inferiore a 2,5 Kg/ha in quanto la coltura risulterebbe più sensibile in caso di repentini abbassamenti di temperatura; b) nei cosiddetti "terreni bianchi" che formano la crosta al momento dell'emergenza delle piantine.
Per l'intervento di post-emergenza o post-trapianto su pomodoro attenersi alle seguenti norme: a) in caso di necessità di irrigazione al momento del diserbo eseguirla almeno 6-7 giorni prima del trattamento diserbante; b) non diserbare una coltura sofferente (ad esempio per siccità, alte o basse temperature, ristagni d'acqua, ecc.); c) le eventuali fresature devono essere superficiali per non danneggiare l'apparato radicale del pomodoro e devono essere eseguite 5-10 giorni prima del trattamento. Per quanto riguarda la patata, non effettuare il trattamento su Draga, Jarla e Vivax in quanto si sono dimostrate sensibili al prodotto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER POMODORO E 60 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

PLANTACUR

(CONCENTRATO SOLUBILE)

Fungicida sistemico per la protezione delle colture orticole, vivai ed impianti di melo, pero, agrumi e piante forestali, colture floreali ed ornamentali, campi da golf e prati ornamentali.

Registrazione Ministero della Sanità n. 10557 del 20/07/00

Composizione
PROPAMOCARB-CLORIDRATO puro g. 66,5 (=720 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A.
Barcellona (Spagna)

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A - Barcellona (Spagna)
A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)
DIACHEM SpA - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
Torre srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)

ATTENZIONE:MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONTENUTO NETTO: **100-250 ml 0,5- 1-5-10 L** Partita n.

Distribuito da: CHIMASSÒ ITALIA S.r.l.
Via Milanese, 20 - Sesto S. Giovanni (MI)

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini: Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il PLANTACUR è un fungicida sistemico attivo nei confronti del gruppo di Ficomiceti (Pythium spp., Phytophtora spp., Peronospora, Pseudoperonospora, Aphanomyces spp., Bremia) che arrecano gravi danni alle colture orticole, floreali ed ornamentali, specie nelle zone ove viene attuata una coltivazione intensiva. Il prodotto è assorbito prevalentemente dal sistema radicale delle piante e viene traslocato nell'apparato fogliare seguendo la corrente traspiratoria, in modo da assicurare una completa protezione delle piante. Perfettamente tollerato dalle più diffuse colture orticole e ornamentali il PLANTACUR è un preparato molto versatile in quanto si presta agevolmente ad essere impiegato con tecniche diverse: concia dei semi, bagno dei bulbi e delle talee, disinfezione dei terricciati e dei letti di semina, trattamenti al terreno in pre e post-trapianto delle colture, trattamenti fogliari. I migliori risultati si ottengono tuttavia con gli interventi preventivi volti ad impedire lo sviluppo dei patogeni.

Il PLANTACUR è indicato per la difesa delle seguenti colture: **pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo, lattuga, cicoria, indivia, radicchio, spinacio, bietola da foglie e da coste, sedano, prezzemolo, basilico, cavoli, carota, rapa, aglio, cipolla, porro, tabacco, fragola, colture floreali ed ornamentali, campi da golf e prati ornamentali in genere**. Può essere convenientemente usato per la difesa contro Pythium spp. e Phytophtora cactorum, P. citrophtora, P. parasitica e P. cinnamoni delle piante di **melo, pero, agrumi e delle piante forestali**, sia in vivaio che nei primi anni dopo la messa a dimora in campo. Può essere inoltre utilizzato nella **concia dei semi** in genere.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Concia dei semi: **1-4 ml/Kg** di seme per semi di piccole dimensioni (es. tabacco, frumento).
10-40 ml/Kg di seme per semi leggeri e dotati di elevata superficie (es. girasole).
Preparazione dei terricciati: **300 ml/m³** di terriccio diluito in 20 litri di acqua.
Trattamenti ai semenzai: **8-12 ml/m²** di superficie in 4-5 litri di acqua (ripetere il trattamento 5 giorni prima del trapianto in 6-8 l/m² di acqua).
Trattamenti al terreno in pre-trapianto: **8-12 ml/m²** in 3-5 litri di acqua.
Trattamenti in post-trapianto: **100-200 ml/pianta** di una soluzione allo 0,2% **(200 ml/hl)**: ripetere il trattamento ogni 10-15 giorni (3-4 trattamenti).
Trattamenti fogliari: **1,5-3 l/ha** in 15-20 hl di acqua per ettaro.
Indicazioni specifiche per alcune importanti colture floricole ed ornamentali
Garofano e gerbera: contro Pythium e Phytophtora. Trattamenti iniziali: **12-15 ml/m²** di PLANTACUR in 2-4 litri di acqua due giorni prima dell'impianto, su terreno in tempera, ed incorporare uniformemente. Trattamenti successivi: **200 ml/hl** per via fogliare bagnando abbondantemente (400-500 litri di soluzione ogni 1000 m²). Si consiglia di effettuare i primi due trattamenti a distanza di 8-10 giorni e proseguire con interventi ogni 15-25 giorni.
Bulbose: contro Pythium ultimum e Phytophtora. Immergere i bulbi per 20-30 minuti in una soluzione di **300 ml/hl** di acqua. Trattare quindi il terreno prima della messa a dimora con **10-12 ml/m²** in 2-4 litri di acqua ed incorporare a 10-12 cm di profondità.
Vivai di melo, pero, agrumi e piante forestali: contro Phytophtora cactorum, Phytophtora cinnamoni e Pythium. Trattare il substrato colturale con **300 ml/m³** di PLANTACUR in 8 10 litri di acqua; intervenire all'emergenza ogni 15 18 giorni con **4-5 l/m²** di una soluzione allo **0,2%** di PLANTACUR.
Campi da golf e prati ornamentali: per il controllo di Pythium aphanidermatum ed eventuali altre specie, intervenire con trattamenti fogliari alla dose di **1-1,5 ml/m²** di prodotto formulato, avendo cura di irrorare con almeno 100-200 litri di soluzione per 1000 m². Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni microclimatiche favorevoli allo sviluppo della malattia (caldo umido con umidità relativa superiore al 70-80%) e, soprattutto nel periodo critico, ripetere i trattamenti ogni 14-15 giorni.

Avvertenza: I semi trattati o residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e/o del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci, alghe, crostacei e molluschi.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i fungicidi benzimidazolici (Benomil, Tiofanate metil, Carbendazim), TMTD, Clorotalonil, prodotti rameici e Mancozeb.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Avvertenze: **In caso di utilizzo su campi da golf e prati ornamentali, non rientrare nelle aree trattate prima di 24 ore dal trattamento e segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del prodotto.**

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

LOGRADO 360

(CONCENTRATO SOLUBILE)

Erbicida non selettivo

Registrazione Ministero della Sanità n.10575 del 1/08/2000

Composizione
GLIFOSATE puro g. 30,4 (=360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico g. 41)
Coformulanti q.b.a g. 100

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande: Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A.
Barcellona (Spagna)

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A - Barcellona (Spagna)
DIACHEM SPA - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
ALTHALLER ITALIA Srl - San Colombano al Lambro (MI)
CHEMIA SpA - S. Agostino (FE)

CONTENUTO NETTO: **100-200-250-500 ml 1-2-5-10-20-50 L**
Partita n.

Distribuito da: CHIMASSÒ ITALIA S.r.l.
Via Milanese, 20 - Sesto S. Giovanni (MI)

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

LOGRADO 360 è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, biennali o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. LOGRADO 360 non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

ATTREZZATURE, VOLUMI D'ACQUA E MISCELE

LOGRADO 360 consente di ottenere migliori risultati con ugelli a specchio o a ventaglio e ridotti volumi d'acqua. L'addizione alla miscela di 2-4 Kg/ha di solfato ammonico è utile.

Avvertenza: Impiegare su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su piante sofferenti per cause diverse, come siccità, freddo, attacchi parassitari, ha efficacia ridotta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento.

Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

CAMPI D'IMPIEGO

LOGRADO 360 può essere impiegato per il controllo delle infestanti presenti nelle seguenti colture:

vite, olivo, melo, pero, arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo (non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato);

albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino, noce (possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato):

asparago: eseguire l'intervento prima dell'emergenza della coltura:

carciofo, pomodoro, melanzana, fagiolino, fava, pisello, carota, patata, mais (solo interfila), soia, prati (leguminose e graminacee), erba medica, barbabietola da zucchero, rosa, vivai e semenzai di floricole, ornamentali, forestali e pioppo: impiegare attrezzature selettive (umettanti, lambenti) al fine di evitare di colpire le colture.

Terreni agrari in assenza della coltura (fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai): prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.

Aree non destinate alle colture agrarie: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi, scoline, aree rurali e industriali, aree ed opere civili.

DOSI D'IMPIEGO

Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata.

In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1-2 litri di prodotto per ettolitro di acqua sulle annuali/biennali e di 2-5 litri di prodotto per ettolitro di acqua sulle perenni.

Annuali e biennali: **1,5-4 litri/ha** contro Alopecurus sp., Avena sp., Hordeum murinum, Lolium sp., Mercurialis sp., Poa sp., Riso crodo, Ammi majus, Amaranthus sp., Calendula sp., Chenopodium sp., Orobanche sp., Portulaca sp., Raphanus sp., Senecio sp., Sinapis sp., Stellaria sp., Veronica sp.

Perenni:

4-5 litri/ha contro Agropyrum repens, Carex sp., Cirsium sp., Euphorbia sp., Glyceria sp., Hipericum sp., Laersia oryzoides, Phalaris sp., Rumex sp., Sonchus sp., Sorghum halepense.

5-7 litri/ha contro Alisma sp., Asfodelus sp., Butomus sp., Cyperus sp., Ferula sp., Juncus sp., Nardus sp., Scirpus sp., Sparganium sp., Tussilago sp.

8-10 litri/ha contro Agrostis sp., Alium sp., Artemisia sp., Arundo sp., Cynodon sp., Eracleum sp., Gleochoma sp., Oxalis sp., Paspalum sp., Phragmites sp., Pteridium sp., Ranunculus sp., Rubus sp., Tipha sp., Urtica sp.

12 litri/ha contro Aristolochia sp., Clematis sp., Convolvulus sp., Rubia peregrina.

Arbusti:

4-6 litri/ha contro Acer sp., Fraxinus sp., Genista sp., Salix sp., Sambucus sp., Vaccinum sp.

10-12 litri/ha contro Calluna sp., Cistus sp., Erica sp., Lonicera sp.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con solfato ammonico.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

SPORAMIL MZ

(POLVERE BAGNABILE)
FUNGICIDA SPECIFICO PER LA LOTTA CONTRO
LA PERONOSPORA DELLA VITE,
DEL POMODORO E DEL TABACCO

SPORAMIL MZ Registrazione Ministero della Sanità n. 10576 del 6/9/00

Composizione
METALAXIL puro g. 8
MANCOZEB puro g. 64
Coformulanti q.b. a g. 100

Frasi di Rischio
Irritante per le vie respiratorie;
Può provocare sensibilizzazione
per contatto con la pelle

IRRITANTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A
Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA - Unità produttiva SIFA
Caravaggio (BG)
CONTENUTO NETTO: 0,250-0,500-1-5 Kg Partita n.

COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A.
Barcellona (Spagna)
Distribuito da: CHIMASSÒ ITALIA S.r.l.
Via Milanese, 20 - Sesto S. Giovanni (MI)

NORME PRECAUZIONALI : Conservare la confezione ben chiusa. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Metalaxil 8% e Mancozeb 64% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL - Irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
MANCOZEB - Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE E CAMPI DI APPLICAZIONE
SPORAMIL MZ è un antiperonosporico che sfrutta l'azione combinata di due principi attivi: il Metalaxil, dotato di azione sistemica e il Mancozeb, con attività di contatto. SPORAMIL MZ consente una protezione non solo dall'interno della pianta (Metalaxil), ma anche dall'esterno (Mancozeb). Il Metalaxil è assorbito molto rapidamente dalla vegetazione e protegge anche quella nuova che si sviluppa tra due trattamenti successivi. SPORAMIL MZ, grazie alla sua azione retroattiva e alla sua persistenza, consente di cadenzare i trattamenti indipendentemente dal verificarsi delle piogge e dall'incremento della superficie fogliare. È inoltre possibile impiegare SPORAMIL MZ nei programmi di difesa post-infestazioni in viticoltura, intervenendo entro il 30% del periodo di incubazione.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dosi/hl	Epoche di impiego
VITE	Peronospora	250 g	Eseguire il primo trattamento dopo il verificarsi della prima pioggia infettante e, successivamente, intervenire ad intervalli cadenzati di 14 gg.; non effettuare più di 3-4 trattamen-ti. Nei programmi di difesa post-infezione intervenire entro il 30% del periodo di incubazione.
POMODORO	Peronospora	250 g	Il primo trattamento si effettua appena si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione, i successivi ad intervalli di 14 giorni. Sospen-dere i trattamenti alla prima fio-ritura del pomodoro e continu-are la protezione con un idoneo prodotto antiperonosporico.
TABACCO	Peronospora	250-300 g	Interventi in semenzaio. Un primo importante trattamento viene consigliato non appena emergono le plantule (fase di crocetta); i trattamenti successivi a distanza di 10 giorni l'uno dall'altro.
		250-300 g	Interventi pre-trapianto. Eseguire un trattamento almeno 2 giorni prima della messa a dimora.
		300 g	Interventi dopo la crisi post-trapianto: si consiglia di intervenire ogni 10 giorni in condizioni sfavorevoli.

NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è nocivo per i pesci, alghe, crostacei e molluschi. Moderatamente pericoloso per i mammiferi.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLA VITE E DEL TABACCO. SU POMODORO TRATTAMENTI CONSENTITI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

SPORAMIL MZ

(POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI)
FUNGICIDA SPECIFICO PER LA LOTTA CONTRO
LA PERONOSPORA DELLA VITE,
DEL POMODORO E DEL TABACCO

SPORAMIL MZ Registrazione Ministero della Sanità n. 10576 del 6/9/00

Composizione
METALAXIL puro g. 8
MANCOZEB puro g. 64
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Irritante per le vie respiratorie;
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A
Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA - Unità produttiva SIFA
Caravaggio (BG)
CONTENUTO NETTO: 0.250-0.500-1-5 Kg Partita n.

COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A.
Barcellona (Spagna)
Distribuito da: CHIMASSÒ ITALIA S.r.l.
Via Milanese, 20 - Sesto S. Giovanni (MI)

NORME PRECAUZIONALI : Conservare la confezione ben chiusa. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Metalaxil 8% e Mancozeb 64% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: METALAXIL - Irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari. MANCOZEB - Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE E CAMPI DI APPLICAZIONE
SPORAMIL MZ è un antiperonosporico che sfrutta l'azione combinata di due principi attivi: il Metalaxil, dotato di azione sistemica e il Mancozeb, con attività di contatto. SPORAMIL MZ consente una protezione non solo dall'interno della pianta (Metalaxil), ma anche dall'esterno (Mancozeb). Il Metalaxil è assorbito molto rapidamente dalla vegetazione e protegge anche quella nuova che si sviluppa tra due trattamenti successivi. SPORAMIL MZ, grazie alla sua azione retroattiva e alla sua persistenza, consente di cadenzare i trattamenti indipendentemente dal verificarsi delle piogge e dall'incremento della superficie fogliare. È inoltre possibile impiegare SPORAMIL MZ nei programmi di difesa post-infestazioni in viticoltura, intervenendo entro il 30% del periodo di incubazione.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dosi/hl	Epoche di impiego
VITE	Peronospora	250 g	Eseguire il primo trattamento dopo il verificarsi della prima pioggia infettante e, successi-vamente, intervenire ad inter-valli cadenzati di 14 gg.; non effettuare più di 3-4 trattamen-ti. Nei programmi di difesa post-infezione intervenire entro il 30% del periodo di incuba-zione.
POMODORO	Peronospora	250 g	Il primo trattamento si effettua appena si verificano le condi-zioni sufficienti a determinare l'infezione, i successivi ad in-tervalli di 14 giorni. Sospen-dere i trattamenti alla prima fio-ritura del pomodoro e continu-are la protezione con un idoneo prodotto antiperonosporico.
TABACCO	Peronospora	250-300 g	Interventi in semenzaio. Un primo importante trattamento viene consigliato non appena emergono le plantule (fase di crocetta); i trattamenti succes-sivi a distanza di 10 giorni l'uno dall'altro.
		250-300 g	Interventi pre-trapianto. Ese-guire un trattamento almeno 2 giorni prima della messa a dimora.
		300 g	Interventi dopo la crisi post-trapianto: si consiglia di inter-venire ogni 10 giorni in conci-zioni sfavorevoli.

NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è nocivo per i pesci, alghe, crostacei e molluschi. Moderatamente pericoloso per i mammiferi.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLA VITE E DEL TABACCO. SU POMODORO TRATTAMENTI CONSENTITI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

20% 25%

1 **Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua**

2 **Introdurre il numero di sacchetti idrosolubili chiusi, previsti (come da etichetta) nell'atomizzatore**

3 **Mettere in funzione l'agitatore**

4 **Attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti). ed.........**

5 **.......aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione**

SPORAMIL MZ

FUNGICIDA SPECIFICO PER LA LOTTA CONTRO
LA PERONOSPORA DELLA VITE, DEL POMODORO E DEL TABACCO

FORMULAZIONE: POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

Composizione:

- Metalaxyl puro g. 8
- Mancozeb puro g 64
- Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE
FUORI DALLA CONFEZIONE

COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A.
Barcellona (Spagna)

Contenuto del sacchetto :
kg 1 - g 500 – 250 - g 100

AVVERTENZA : LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

Registrazione del Ministero della Salute n. 10576 del 06/09/2000

SANILATE 13

(LIQUIDO EMULSIONABILE)

ERBICIDA GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA SELETTIVO PER NUMEROSE COLTURE SIA ERBACEE SIA ARBOREE

Composizione
-Fluazifop-p-butile puro g. 13.3 (= 125 g/l)
-Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO : Infiammabile; Nocivo per inalazione e contatto con la pelle; Irritante per la pelle; Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

C.Q. MASSO' S.A. – Viladomat 321, 5° - Barcellona (Spagna)
Distribuito da : CHIMASSÒ ITALIA S.r.l. - Via Milanese, 20 - Sesto San Giovanni (Mi)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10578 del 06/09/2000
STABILIMENTI DI PRODUZIONE: C.Q. MASSÒ S.A, Barcellona (Spagna) / ALTHALLER ITALIA srl - San Colombano al Lambro (MI) / DIACHEM SpA Unità Produttiva SIFA Caravaggio (BG) / A.D.I.C.A. s.p.a. – Faenza (RA)
CONTENUTO NETTO : 0,5-1-5-10 L Partita n.

NORME PRECAUZIONALI : Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di un facciale filtrante con filtro combinato contro aerosol solidi e liquidi ed antigas FFAP3 SL (EN 405)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia e rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il SANILATE 13 è un erbicida selettivo specifico per il controllo delle infestanti graminacee. Viene assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato, per via sistemica, sia verso gli apici vegetativi, sia verso le radici, i rizomi e gli stoloni. Il prodotto è assorbito rapidamente (entro 3 ore dal trattamento) ed primi sintomi appaiono nell'ambito di una settimana.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il SANILATE 13 si distribuisce con attrezzature a bassa pressione (2-3 atm.) utilizzando ugelli a ventaglio o a specchio. Intervenire durante le ore fresche del giorno, su infestanti in attiva crescita, impiegando volumi d'acqua medi (200-400 litri/ha), onde favorire la uniforme copertura della vegetazione.
Trattare quando le infestanti graminacee si trovano nello stadio di 1-3 foglie/accestimento per le annuali e le biennali, quali Avena *(Avena spp),* Bromo *(Bromus spp.)* Coda di volpe *(Alopecurus spp),* Digitaria (*Digitaria Sanguinalis*), Giavone *(Echinochloa spp.).* Setaria
(Setaria spp.), Loglio *(Lolium spp),* Falaride *(Phalaris spp.),* Sorghetta da seme *(sorghum halepense),* ricacci di frumento e orzo;
d 30-50 cm di altezza per la Sorghetta da rizoma *(Sorghum halepense).* L'erba fienarola (Poa *annua)* è mediamente resistente.

CAMPO E DOSI D'IMPIEGO

COLTURE	INFESTANTI	DOSE - l/ha
Agrumi: arancio, mandarino, limone, clementine, cedro, pompelmo, tangerino chinotto, kumquat, arancio amaro	Graminacee	
Drupacee: pesco (nettarine e percoche), ciliegio, susino	annuali e	1,5-2
Pomacee: melo, pero	biennali	
Nocciolo		
Olivo, Vite		
Ortaggi: cavoli, lattuga, cicoria, carciofo, sedano, finocchio, cocomero, melone, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, carota, cicoria da radice, sedano rapa, ravanello. Cipolla	Graminacee annuali e biennali	1,5-2

COLTURE	INFESTANTI	DOSE - l/ha
agiolo, fagiolino, pisello, fava (intervenire prima della fioritura)	Sorghetta da rizoma	2-2,5
Patata	Graminacee annuali e perenni	1,5-2
Barbabietola da zucchero	Graminacee annuali e Biennali	1,25-2
	Sorghetta da rizoma	2-2,5
Oleaginose: girasole, soia, colza	Graminacee annuali e Biennali	1,5-2
Foraggere leguminose: trifoglio	Sorghetta da rizoma	2-2,5
Tabacco Floreali: (in pieno campo ed in serra) rosa, garofano, liliacee, bulbose, gerbera, geranio, viola, petunia, crisantemo, strelizia	Graminacee annuali e biennali	1,5-2

Attenzione: adottare le dosi minori con infestanti nello stadio più giovanile e in condizioni ottimali d'impiego. Nelle applicazioni localizzate adottare la concentrazione del 2% (2 litri di SANILATE 13 in 100 litri d'acqua). Non trattare infestanti che si trovano in stato di stress (siccità, danneggiamento, abbassamento di temperatura, pascolo, ecc.). L'efficacia del prodotto può essere ridotta in presenza di terreno secco ed umidità relativa dell'aria inferiore al 60%.
RISCHI DI NOCIVITÀ : Il prodotto è nocivo per i pesci –
Da non usare su terreni grossolanamente sabbiosi. - Da non usare sullo stesso appezzamento più di due volte l'anno.
INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA : agrumi, pesco, ciliegio, susino, melo, pero, nocciolo, olivo, vite, cavoli, carciofo, lattuga, cicoria, sedani, finocchio, cocomero, melone, cetriolo, solanacee, carota, ravanello, cipolla 30 giorni; patata 50 giorni; barbabietola da zucchero, girasole, soia, colza, trifoglio, tabacco 60 giorni.
Avvertenze: Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare Indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza. Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

OIDIMENOL EC

fungicida a base di Triadimenol
tipo di formulazione : emulsione concentrata

OIDIMENOL EC
Composizione
- Triadimenol puro g. 22,9
- coformulanti qb a g. 100

FRASI DI RISCHIO :
Irritante per gli occhi e la pelle; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

C.Q. MASSO', S.A. – Viladomat 321, 5° - Barcellona (Spagna)
Distribuito da: Chimasso Italia S.r.l., Via Milanese, 20, Sesto S. Giovanni (Mi).
Registrazione n. 10700 del 08-02-01del Ministero della Sanità
Officina di produzione : C.Q. MASSO'. S.A., Barcellona (Spagna)
Contenuto lt 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-15 partita numero:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : *Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su basa allergica (da semplici dermatiti a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Avvertenza : consultare un centro antiveleni.*

MODALITA' D'IMPIEGO
L'OIDIMENOL EC è un fungicida triazolico con attività sistemica e di contatto, con azione preventiva, curativa ed eradicante contro malattie fungine quali Oidio e Ruggini. Penetra rapidamente permettendogli di sfuggire ad eventuali piogge dilavanti. Indicato sulle seguenti colture :
VITE
contro l'Oidio a ml 8 - 15 per q.le acqua, il trattamento deve essere effettuato nelle zone ad alto rischio fin dalla pre - fioritura, mentre nelle zone a basso rischio si dovrà intervenire dopo l'allegagione con turni di 7 - 10 giorni.
POMODORO - PEPERONE - CETRIOLO - MELONE - ZUCCHINO - ORNAMENTALI
contro l'Oidio a ml 10 - 20 per q.le acqua; trattare in modo preventivo o curativo in relazione al rischio di infezione.
FRUMENTO – ORZO – AVENA – SEGALE - TRITICALE
contro l'Oidio e Ruggini a ml 500 per ettaro in 600 - 700 lt di acqua trattando in fase di spigatura e fino alla fioritura in modo preventivo, in alternativa trattare ai primi sintomi
MELO
contro l'Oidio a ml 10 - 20 per q.le acqua; trattare in modo preventivo o curativo in relazione alla suscettibilità delle cultivar e alla zone in cui si opera.

COMPATIBILITA': non compatibile con i prodotti alcalini come Polisolfuri e Poltiglia Bordolese.
AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
"per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle" - "non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore" - "non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza" – "impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza"
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di vite, cetriolo, melone, pomodoro, melo, 7 giorni per lo zucchino, 30 giorni per frumento, orzo, avena, segale, triticale.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

BANDOLERO

Fungicida che agisce in modo preventivo e curativo a largo spettro d'azione
formulazione: microgranuli idrodisperdibili

Composizione
-Procimidone puro g. 50
-coformulanti qb a 100

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

C.Q. MASSO', S.A. – Viladomat 321, 5° - Barcellona (Spagna)
Distribuito da: Chimasso Italia S. r.l. Via Milanese, 20, Sesto S. Giovanni (Mi).
Officina di produzione : C.Q. MASSO', S.A., Barcellona (Spagna) / ADICA srl – Nera Montoro (TR)
Registrazione n°10963 del 18/06/01 del Ministero della Sanità - kg. 0,1/0,2/0,25/0,5/1/5/10/20

Informazioni mediche : in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
Fungicida in microgranuli idrodisperdibili che agisce in modo preventivo con inibizione della germinazione delle spore e in modo curativo, bloccando lo sviluppo del micelio nelle prime fasi di incubazione dell'infezione. Viene indicato sulle seguenti colture :
VITE : impiegato contro la Muffa grigia alla dose di g. 100 - 150 per hl , effettuando 3-4 trattamenti nei periodi di fine fioritura, poi quando gli acini hanno il diametro di ca. 3 mm (in coincidenza della chiusura del grappolo), poi si prosegue all'invaiatura, circa 7-8 settimane prima del raccolto ed infine 3-4 settimane prima della raccolta.
E' consigliabile bagnare bene affinchè vi sia una distribuzione uniforme del prodotto, la dose più alta impiegarla su varietà più sensibili all'attacco della malattia.
POMODORO : impiegato contro la Muffa grigia g. 80-100 per q.le acqua, iniziando a trattare a fine fioritura del primo palco fiorale e ripetendo ogni 15 giorni sino a concludere 28 giorni prima della raccolta
PESCO - NETTARINE – PERCOCHE : impiegato contro il Marciume bruno (Monilia) sia dei fiori e dei rami (g. 150 - 200 per q.le acqua, con un primo trattamento ai bottoni fiorali ed un altro con il 25% dei fiori aperti ed un successivo in piena fioritura) ede i frutti (g. 100 - 150 per q.le acqua, trattando 30-35 gg e 15-20 gg prima della raccolta.
PERO : impiegato contro la Maculatura bruna g. 100 - 150 per q.le acqua con trattamenti a partire dalla fioritura e ripetuti.
GIRASOLE : impiegato contro la Sclerotinia a g. 100/hl prima della fioritura, e g. 100 - 200 per q.le di seme nella concia
COLZA : impiegato contro la Sclerotinia alla dose di kg. 1 - 1,5 per ettaro all'inizio della fioritura.
LATTUGA : impiegato contro il Mal dello Sclerozio alla dose di kg. 1,5 - 2 per ettaro
INDIVIA : impiegato contro il Mal dello Sclerozio e la Muffa grigia alla dose di kg 1,5 - 2 per ettaro
TABACCO : impiegato contro i Marciumi da Botrytis e Marciumi da Sclerotini alla dose di kg. 1,5 - 2 per ettaro
ALBICOCCO - SUSINO : impiegato contro la Muffa grigia e Marciumi da Sclerotinia alla dose di 100 - 200 g. per q.le acqua
MANDORLO : impiegato contro la Monilia alla dose di 150 - 200 g. per q.le acqua
PEPERONE - MELANZANA : impiegato contro la Muffa grigia e Marciumi da Sclerotinia alla dose di 80 - 100 g. per q.le acqua
AGLIO : impiegato contro la Muffa grigia e Mal dello Sclerozio alla dose di g. 100-200 per ettolitro
CIPOLLA : impiegato contro la Muffa grigia e Marciume bianco dei bulbi alla dose di 100 - 150 g/hl
FRAGOLA : impiegato contro la Muffa grigia a g. 80 100 per q.le acqua con 3 trattamenti alle seguenti epoche : alla schiusura dei petali, poi con circa il 10 20% dei fiori aperti ed alla completa sfioritura. Bagnare bene sia la pianta che il terreno circostante.
CETRIOLO : impiegato contro Marciumi da Botrytis e Sclerotinia a g. 100 - 150 / hl
FAGIOLINO : impiegato contro la Muffa grigia e Mal dello Sclerozio a g. 100 - 150 per q.le acqua
ACTINIDIA : impiegato contro i Marciumi da Botrytis e Marciumi da Sclerotinia, a g. 75 - 100/hl alla caduta dei petali ed eventualmente in pre raccolta
NOCCIOLO : impiegato contro la Monilia delle nocciole a g. 75 - 100 / hl
COLTURE FLOREALI IN PIENO CAMPO ED IN SERRA : impiegato contro la Muffa grigia della rosa a g. 40-80 per q.le acqua, effettuando almeno 3 trattamenti iniziando dal germogliamento sino ad inizio fioritura, bagnando molto bene tutta al vegetazione. Impiegato contro la Muffa grigia della Gerbera, Geranio, Crisantemo, Garofano g. 40 - 80 per q.le acqua trattando con presenza della malattia a ripetuti interventi. Impiegato contro la Rhizoctonia del garofano ed altri ornamentali g. 4 dispersi in 5-10 litri di acqua per mq. di superfice, intervenendo 10 gg circa dopo la messa a dimora, quando è superata la crisi del trapianto e con comparsa dei primi sintomi della malattia ed eventualmente ripetendo l'intervento dopo circa un mese.

COMPATIBILITA' : miscibile con antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : sui trattamenti alle colture orticole e floricole, specie se in serra, fare saggi preliminari.
Sospendere i trattamenti 45 giorni prime del raccolto della colza, 21 giorni prima del raccolto della vite, girasole, susino e 14 giorni prima del raccolto sulle altre colture.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ALLEGOL

Regolatore di crescita in formulazione liquida

ALLEGOL
COMPOSIZIONE:
- Gibberelline puro 1,8% (19,1 g/l)
(isomero A4 + A7)
- 6 Benziladenina pura 1,8% (19,1 g/l)
- coformulanti qb a 100
contiene alcool tetraidrofurfurilico

IRRITANTE

NATURA DEL RISCHIO : Irritante per gli occhi

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

C.Q. MASSO', S.A. – Viladomat 321, 5°, 08029 Barcellona (Spagna)

Distribuito da:

Registrazione Ministero della Sanità Nr. 10992 del 30/07/01

stabilimento di produzione : C.Q. MASSO', S.A. Barcellona (Spagna) / DIACHEM spa - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG) / ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI)

litri 0,05-0,1-0,2-0,5-1-5-10 Partita n: :

NORME PRECAUZIONALI: Conservare il recipiente ben chiuso. Per maggior sicurezza mettere occhiali protettivi durante la preparazione e l'impiego del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: gibberelline 1,8% - 6-benziladenina 1,8% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: BENZILADENINA: irritazione cutanea degli occhi e dell'apparato respiratorio. Terapia: sintomatica. Avvertenza : consultare un centro antiveleni. **Avvertenza** : consultare un centro antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
L'ALLEGOL è un fitoregolatore di crescita delle piante, che per la sua particolare azione, influenza in modo positivo i processi fisiologici dando luogo ad un incremento della qualità e della produzione delle frutta.
Viene impiegato nel seguente modo :
PERO : impiegare il prodotto per il miglioramento dell'allegagione alla dose di ml 60 – 80 per ettolitro (pari a 600 – 800 ml/Ha), con due applicazioni a ml 30 - 40 per hl (pari a 300 – 400 ml/Ha) , con il primo trattamento quando si ha il 25% circa dei fiori aperti ed il secondo dopo circa 2 - 3 giorni al massimo.
MIGLIORAMENTO DELLA FORMA DEL MELO DEL GRUPPO DELLE DELICIOUS : trattare con 70 - 100 ml (pari a 700 – 1000 ml/Ha) per ettolitro dalla piena fioritura ((80% dei fiori aperti) alla caduta dei petali, preferibilmente in due applicazioni a ml 35 - 50 per ettolitro (pari a 350 – 500 ml/Ha) a 7 - 10 giorni di distanza
PREVENZIONE DELLA RUGGINOSITA' DELLE MELE GOLDEN DELICIOUS : trattare alla dose di ml 25 - 30 per ettolitro (pari a 250 – 300 ml/Ha), con 3 - 4 trattamenti da fine della fioritura e con i successivi ogni 7 - 10 giorni
ANTICIPO DI BRANCHETTE SU ASTONI DI MELO NON IN PRODUZIONE E VIVAI : impiegare lt 4,5 - 5,5 per ettaro equivalenti a litri 2,5 per ettolitro sulle parti apicali, su astoni della lunghezza di 50 - 70 cm in piena crescita e con buon sviluppo dell'apparato fogliare.
AVVERTENZE : è bene aggiungere, quando si effettua il trattamento, un bagnante adesivo o un concime fogliare azotato organico per avere una migliore azione - trattare piante sane e vigorose con interventi fatti al mattino o tardo pomeriggio - non trattare con temperatura inferiore a 7°C ne può essere ridotta l'efficacia - adeguare la quantità totale di soluzione per ettaro allo sviluppo delle piante ed alla forma di allevamento - non creare sgocciolamento dopo il trattamento - applicare un getto finemente nebulizzate all'atto del trattamento

COMPATIBILITA': compatibile con i comuni bagnanti, concimi fogliari, zolfo bagnabile ed altri fungicidi comunemente usati in frutticoltura. Evitare di miscelare al prodotto sostanze alcaline (polisolfuri, poltiglia bordolese).
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni provocati dall'uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

DUOGOL

Fitoregolatore del melo
Tipo di formulazione: liquido

COMPOSIZIONE
- Gibberelline pure g. 1
  (isomero A4 + A7)
- Coadiuvanti qb a 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccroso. Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il DUOGOL è costituito dalLe gibberelline che sono fitormoni prodotti dalle piante per regolare le proprie funzioni metaboliche ed in particolar modo quelle preposte alla fruttificazione, regolare lo sviluppo del frutto, stimolare l'allungamento, controllare lo sviluppo del pericarpo riducendone le spaccature e ridurre la rugginosità della buccia delle mele.
Alcune cultivar di melo hanno una scarsa o insufficente produzione di gibberelline e con buona carica di frutti risulta evidente chiaramente la carenza con frutti piccoli, spaccature e su Golden un'estesa rugginosità. L'impiego del DUOGOL, riduce o elimina questi difetti fisiologici.
Si dve intervenire dopo l'allegagione ad inizio caduta petali, le infiorescenze devono essere bagnate uniformemente senza che vi sia sgocciolamento, e quindi trattare con un secondo trattamento fatto ad una distanza di 10 - 12 giorni dal primo trattamento, poi a seguire intervenire ogni 10 giorni per almeno altre due volte, in tutto quattro trattamenti. Per dare il tempo alla pianta di assorbire la gibberellina e opportuno trattare nelle ore più fresche del pomeriggio.
Golden delicious, Karamiynde de Sonnaville, Jonagold, Red Boskoop : 50-60 ml per 100 litri d'acqua, pari a 500 - 600 ml/Ha.
Cox Orange Pippin : 25-50 ml per 100 litri d'acqua, pari a 250 – 500 ml/ha.
La dose più elevata è da utilizzare in impianti predisposti ad una forte rugginosità.
Nel caso di scarsa rugginosità e piante con un forte rigoglio vegetativo si applica la dose minore.
Su Golden delicious è possibile fare 7 interventi distanziati 7-8 giorni l'uno dall'altro alla dose di 30 ml per 100 litri d'acqua.
Avvertenza : trattando con gibberelline, l'anno successivo si possono avere diminuzioni nel numero di gemme fiorali.

COMPATIBILITA' : compatibile con captano, zineb, mancozeb, metiram, bupirimate. Non compatibile con i prodotti a reazione alcalina. Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni provocati dall'uso improprio del preparato.

C.Q. MASSO', S.A. – Viladomat 321, 5°, 08029 Barcellona (Spagna)
Distribuito da: Chimasso Italia S.r.l., Via Milanese, 20, sesto S. Giovanni (Mi).
Registrazione Ministero della Sanità Nr. 10993 del 30/07/01
stabilimento di produzione : C.Q. MASSO', S.A., Barcellona (Spagna) / DIACHEM spa - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG) / ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI)
litri 0,05- 0,1-0,2-0,5-1-2-5-10 Partita n. :

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

SPORAMIL R

Fungicida ad azione preventiva e curativa in sospensione concentrata

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
RAME METALLO g. 19,04 (= 259 g/l)
(sotto forma di Idrossido)
METALAXIL puro g 3,6 (= 49 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione; Tossico per inalazione; Rischio di gravi lesioni oculari; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza; In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

C.Q. MASSO', S.A.

Viladomat 321, 5° - Barcellona (Spagna)

Distribuito da: Chimasso Italia S.r.l., Via Milanese, 20, Sesto S. Giovanni (Mi).

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ, S.A. Barcellona (Spagna)
Registrazione Ministero della Salute n. 11318 del 9/05/02
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 50 - 100 - 250 - 500 - litri 1 – 2 – 3 – 5 – 10 – 20
PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME METALLO g 19,04 e METALAXIL g. 3,6 le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione. RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emesi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo Irritante cutaneo ed oculare. METALAXIL- Sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
SPORAMIL R è una miscela fungicida ad azione preventiva e curativa. La presenza di metalaxil, dotato di attività sistemica, permette di proteggere la vegetazione agendo all'interno della pianta e di assicurare protezione anche sulla vegetazione sviluppatasi successivamente al trattamento. La componente rameica invece, presente sotto forma di idrossido, consente una protezione esterna di contatto, garantendo ottimo grado di copertura, resistenza al dilavamento e contemporanea attività nei confronti delle batteriosi.
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
VITE : contro peronospora (Plasmopora viticola) alla dose di 400 ml/hl intervenire entro il 30% del periodo di incubazione dell'infezione primaria, proseguendo ad intervalli di 14 giorni fino ad allegagione. Ridurre l'intervallo a 12 giorni in presenza di piogge persistenti o di elevata pressione della malattia.
POMODORO: 400 ml/hl contro Peronospora (Phytophthora infestans), alternaria (Alternaria porri sp solani) e Batteriosi. Intervenire al verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione, cadenzando i trattamenti a distanza di 10-14 giorni e per un massimo di 4 interventi.
PATATA contro peronospora (Phytophthora infestans) e alternaria (Alternaria porri sp. solani) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.
FRAGOLA contro marciume bruno (Phytophthora cactorum) alla dose di 4 l/ha intervenendo dopo 15 e 30 giorni dall'impianto. Possibile immersione delle piantine prima dell'impianto in una soluzione al 3 per mille.
COLTURE ORTICOLE (cocomero, melone, cetriolo, carciofo, cavolo verza, fagiolo*, fagiolino*) contro peronospora (Peronospora spp., Pseudoperonospora cubensis, Bremia lactucae), alternariosi (Alternaria spp) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.
N.B. * fagiolo e fagiolino: impiego consentito solo per trattamenti al terreno.
LATTUGA: contro peronospora (Bremia lactucae) alla dose di 2 - 3 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.
SOIA: contro peronospora (Peronospora manshurica) e fitoftora (Phytophthora megasperma var. sojae) alla dose di 4 l/ha con 1-2 interventi a distanza di 10-14 giorni.
MELO: contro marciume del colletto (Phytophthora spp) alla dose di 100-150 ml/pianta, dopo la ripresa vegetativa. Irrorare accuratamente la zona del colletto ed il terreno circostante. Ripetere eventualmente l'intervento 3-5 settimane dopo. In presenza di lesioni del tronco, spennellature con una soluzione al 20%.

AVVERTENZA: rispettare rigorosamente le norme di impiego anche per contrastare i ceppi resistenti. Non applicare mai su vivai di vite.
COMPATIBILITA'
Non è compatibile con i formulati a reazione alcalina quali polisolfuri, poltiglia bordolese, calce.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura.
RISCHI DI NOCIVITA' : il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA
VITE: 28 giorni; FRAGOLA: 40 giorni; FAGIOLINO: 56 giorni; CAVOLO VERZA: 60 giorni; FAGIOLO: 120 giorni; SOIA: 150 giorni; ALTRE COLTURE: 20 giorni.
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

SPORAMIL R

Fungicida ad azione preventiva e curativa
in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE

RAME METALLO	g. 19,04 (= 259 g/l)
(sotto forma di Idrossido)	
METALAXIL puro	g 3,6 (= 49 g/l)
Coformulanti	q.b. a g. 100

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione; Tossico per inalazione; Rischio di gravi lesioni oculari; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con agua e consultare un medico; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza; In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME METALLO g 19,04 e METALAXIL g. 3,6 le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione. RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. METALAXIL- Sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

C.Q. MASSO', S.A.
Viladomat 321, 5° - Barcellona (Spagna)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
COMMERCIAL QUÌMICA MASSÒ, S.A. – S.Pere Molanta - Barcellona (Spagna)

Registrazione Ministero della Sanità n. 11318 del 9/05/02

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

ALIADO R 44

Fungicida ad azione citotropica translaminare impiegato contro la Peronospora, l'Alternaria, l'Antracnosi, la Septoria
Tipo di formulazione : polvere bagnabile

ALIADO R 44
COMPOSIZIONE
- Cimoxanil puro g. 4
- Rame metallo g. 40 (sotto forma di ossicloruro)
- Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione e ingestione; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini: Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

C.Q. MASSO' S.A. – Viladomat 321, 5° - Barcellona (Spagna)
Distribuito da Chimassò Italia s.r.l. – via Milanese 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI)

registrazione n. 11439 del 23/09/02 del Ministero della Salute
Stabilimento di Produzione: C.Q. MASSO' - Barcellona (Spagna) / DIACHEM spa - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG) / A.D.I.C.A. spa – Faenza (RA)
Kg 0,025-0,05-0,1-0,2-1-5-10-15-20 Partita n° .....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4% e Rame metallo 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia : gastrolusi con soluzione latto - albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
ALIADO R 44 è un fungicida in formulazione polvere bagnabile dato dall'unione di due principi attivi che agiscono per contatto e con azione endoterapica (citotropica translaminare), penetrando in modo completo nei tessuti vegetali entro 6 ore dal trattamento svolgendo una azione preventiva e curativa.
Impiegato sulle seguenti colture:
VITE - CARCIOFO - PATATA - POMODORO - CIPOLLA - AGLIO - PORRO - GIRASOLE - SOIA - LATTUGA - ROSA - ZUCCHINO - MELONE - PISELLO - SPINACIO - TABACCO
contro la Peronospora, l'Alternaria, l'Antracnosi, la Septoria e con effetto secondario contro la Muffa grigia (Botrytis cinerea) e le Batteriosi, alla dose di g 200-300 su tutte le colture e per q.le d'acqua, trattando da quando si hanno i primi sintomi di infezione della malattia e ripetendo i trattamenti ad ogni necessità.
COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con tutti i prodotti a reazione neutra o acida, è sconsigliato l'impiego con prodotti a reazione alcalina. AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci
FITOTOSSICITA' : non trattare in fioritura
Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto del carciofo, 28 giorni per girasole e soia e 20 giorni per tutte le altre colture.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ALIADO R 44

Fungicida ad azione citotropica translaminare impiegato contro la Peronospora,
l'Alternaria, l'Antracnosi, la Septoria
Tipo di formulazione : polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

ALIADO R 44
COMPOSIZIONE
- Cimoxanil puro g. 4
- Rame metallo g. 40 (sotto forma di ossicloruro)
- Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione e ingestione; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

C.Q. MASSO' S.A. – Viladomat 321, 5° - Barcellona (Spagna)
Distribuito da Chimassò Italia s.r.l. – via Milanese 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI)

registrazione n. 11439 del 23/09/02 del Ministero della Salute
Stabilimento di Produzione: C.Q. MASSO' - Barcellona (Spagna) / DIACHEM spa - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG) / A.D.I.C.A. spa – Faenza (RA)
Kg 0,025-0,05-0,1-0,2-1-5-10-15-20 Partita n° .....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4% e Rame metallo 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia : gastrolusi con soluzione latto - albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
ALIADO R 44 è un fungicida in formulazione polvere bagnabile dato dall'unione di due principi attivi che agiscono per contatto e con azione endoterapica (citotropica translaminare), penetrando in modo completo nei tessuti vegetali entro 6 ore dal trattamento svolgendo una azione preventiva e curativa.
Impiegato sulle seguenti colture:
VITE - CARCIOFO - PATATA - POMODORO - CIPOLLA - AGLIO - PORRO - GIRASOLE - SOIA - LATTUGA - ROSA - ZUCCHINO - MELONE - PISELLO - SPINACIO - TABACCO
contro la Peronospora, l'Alternaria, l'Antracnosi, la Septoria e con effetto secondario contro la Muffa grigia (Botrytis cinerea) e le Batteriosi, alla dose di g 200-300 su tutte le colture e per q.le d'acqua, trattando da quando si hanno i primi sintomi di infezione della malattia e ripetendo i trattamenti ad ogni necessità.
COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con tutti i prodotti a reazione neutra o acida, è sconsigliato l'impiego con prodotti a reazione alcalina. AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci
FITOTOSSICITA' : non trattare in fioritura
Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto del carciofo, 28 giorni per girasole e soia e 20 giorni per tutte le altre colture.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

20 25%

1 **Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua**

2 **Introdurre il numero di sacchetti idrosolubili chiusi, previsti (come da etichetta) nell'atomizzatore**

3 **Mettere in funzione l'agitatore**

4 **Attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti), ed.........**

5 **.......aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione**

ALIADO R 44

Fungicida ad azione citotropica translaminare impiegato contro la
Peronospora, l'Alternaria, l'Antracnosi, la Septoria
Tipo di formulazione: polvere bagnabile

Composizione:

- Cimoxanil puro	g. 4
- Rame metallo (sotto forma di ossicloruro)	g. 40
- Coformulanti	q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE
FUORI DALLA CONFEZIONE

C.Q. MASSO', S.A. – Viladomat 321, 5° - Barcellona (Spagna)
Distribuito da : CHIMASSÒ ITALIA S.r.I.
Via Milanese, 20 - Sesto San Giovanni (Mi)

Contenuto del sacchetto : kg 1 - g 500 – 250

AVVERTENZA : LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

Registrazione n. 10028 del 23/09/02 del Ministero della Salute

MASSOMIL 20 LS

Insetticida sistemico
tipo di formulazione : liquido solubile

MASSOMIL 20 LS
COMPOSIZIONE
-Metomil puro g 20
-Coadiuvanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO :
Molto tossico per ingestione; Irritante per la pelle; Rischio di gravi lesioni oculari; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

C.Q. MASSO', S.A. – Viladomat 321, 5[c] - Barcellona (Spagna)
Distribuito da: Chimasso Italia S.r.l., Via Milanese, 20, Sesto S. Giovanni (Mi).
Registrazione n.11440 del 23/09/02 del Ministero della Salute
Officina di produzione : Officina di produzione: C.Q. MASSO' S.A., Barcellona (Spagna) / Torre srl - Torrenieri (fraz. di Montalcino) (SI) / DIACHEM spa - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG) / ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI) / A.D.I.C.A. spa Faenza (RA)
Contenuto lt 0,1- 0,2-0,250-0,5-1-5-10-15 partita numero:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione ; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori, fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina. Controindicazioni : ossime. - Consultare un centro antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il **MASSOMIL 20 LS** è un insetticida sisetmico a base di Metomil, efficace per contatto ed ingestione nei confronti di numerosi insetti parassiti delle colture: Tisanotteri, Emitteri, Lepidotteri, Coleotteri. Il prodotto manifesta un forte potere abbattente ed in virtù della sua sistemicità consente un rapido ed esteso controllo delle infestazioni. Per la limitata azione residua, può impiegarsi a breve distanza dalla raccolta.
Melo - Pero : contro larve dei ricamatori, (Pandemis, Eulia, Archips), larve di 1^ stadio di Lithocolletis e Leucoptera, Afidi, Carpocapsa pomonella, Capua reticulana, Caocecia podana, Orgya antigua, Minatori ml. 200-250.
Drupacee - Mandorlo: contro Afidi, Anarsia, Cydia molesta, Diaspis pentagona, Tortrici, Ricamatrici e Tignola ml. 200.
Vite: contro Tignola, Cicaline e Tignoletta ml. 200-250.
Olivo - Agrumi : contro Afidi, Tignole e Cocciniglia Mezzograno di pepe (Saissetia oleae) e Cocciniglie in genere ml. 200-250.
Pomodoro, Melanzana, Peperone : contro Nottue, Aleurodidi, Tignole, Cavolaia ed Afidi ml. 200.
Cucurbitacee: contro Afidi, Nottue, Tignole e Aleurodidi ml. 200.
Barbabietola da zucchero: contro Afidi, Cleono e Altica lt. 2,5 per Ha dispersi in 800-1000 litri d'acqua.
Cavoli (esclusi Cavolfiore e Cavoppuccio) - Lattuga: contro Afidi, Nottue, Tignole e Cavolaie ml. 200.
Fagiolo - Pisello : contro larve di Lepidotteri, Afidi, Tignole a ml 200
Garofano in pieno campo: contro la Bega ml. 200-250.
Tabacco - Ornamentali e Floreali : contro afidi, nottue, tortricidi, minatrici, tripidi e larve di lepidotteri ml. 200 - 250.
Esche per Nottue : l'esca deve essere costituita da 1 litro di prodotto + 5 kg di crusca + 1 kg di zucchero, mescolando a secco la crusca e lo zucchero, inumidire ed aggiungere il prodotto; distribuire a spaglio sul terreno od a mucchietti. Le dosi sopra indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale. Impiegare le dosi più basse per trattamenti ravvicinati e quelle più alte per trattamenti a più lunga distanza.
COMPATIBILITA' : è incompatibile con le poltiglie solfocalciche
AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': è tossico per animali domestici, insetti utili, pesci e bestiame. Non immettere nel campo trattato pollame e bestiame prima di 14 giorni, non preparare la soluzione in prossimità di corsi d'acqua.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima dell'ultimo trattamento e la raccolta per la lattuga, e 10 giorni per tutte le altre colture.
"Durante l'applicazione del prodotto utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie" – "Non immettere nelle zone trattate il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza" – "Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore" – "Per lavorazioni agricole tra le 48 ore ed i tempi di carenza indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle" - "Il formulato contiene una sostanza attiva altamente tossica per gli organismi acquatici. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate"
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Attenzione : data l'elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego é consentito esclusivamente al personale qualificato munito di autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23/04/2001

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

SPORAMIL COMBI

Fungicida per la VITE contro la Peronospora
Tipo di formulazione: polvere bagnabile

SPORAMIL COMBI
COMPOSIZIONE
- METALAXYL puro g. 10
- FOLPET puro g. 40
- Coformulanti q.b. a gr. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO :
Nocivo per inalazione; Irritante per gli occhi; Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i rrsidui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informativein materia di sicurezza

C.Q. MASSO', S.A. – Viladomat 321, 5° - Barcellona (Spagna)
Distribuito da Chimassò Italia s.r.l. – Via Milanese 20, Sesto San Giovanni (MI)

Officina di produzione : C.Q. MASSO' S.A., Barcellona (Spagna) / A.D.I.C.A. srl – Nera Montoro (TR) / DIACHEM spa - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG) / A.D.I.C.A. spa – Faenza (RA)
Registrazione n.11441del 23/09/02 del Ministero della Salute
kg. 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15 partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO *: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive : Metalaxyl 10% e Folpet 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :*
METALAXYL - Sintomi : irritante cutaneo ed ocularecon possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalme, dispnea, spasmi muscolari. Terapia : sintomatica.
FOLPET - Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro-intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea) ; interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia : sintomatica. Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
Fungicida polvere bagnabile ad azione preventiva e curativa indicato nella lotta contro la **PERONOSPORA** della **VITE**; il primo trattamento va eseguito dopo che si verificano le condizioni della prima pioggia infettante, successivamente si può continuare a cadenze fisse (10-12 giorni).
La dose d'impiego è di g. 200 per q.le acqua fino ad allegagione avvenuta, con impiego di circa 1000 litri di acqua per ettaro. L'impiego regolare e costante del prodotto consentono di prevenire e contenere in misura significativa la Botrytis Cinerea.

COMPATIBILITA' : il prodotto è compatibile con tutti i prodotti a reazione neutra o acida, è sconsigliato l'impiego con prodotti a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri) e Olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con olii minerali e polisolfuri.
AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA' : il prodotto è tossico per i pesci e gli insetti utili.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto per l'uva da tavola; sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.
"Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie" - "Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento" – "Per lavorazioni agricole tra le 24 ore ed il tempo di carenza, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle" – "impedire l'accesso agli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza"
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

SPORAMIL COMBI

Fungicida per la VITE contro la Peronospora

Tipo di formulazione: polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

SPORAMIL COMBI
COMPOSIZIONE
- METALAXYL puro g. 10
- FOLPET puro g. 40
- Coformulanti q.b. a gr. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO :
Nocivo per inalazione; Irritante per gli occhi; Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informativein materia di sicurezza

C.Q. MASSO', S.A. – Viladomat 321, 5° - Barcellona (Spagna)

Distribuito da Chimassò Italia s.r.l. – Via Milanese 20, Sesto San Giovanni (MI)

Officina di produzione : C.Q. MASSO' S.A., Barcellona (Spagna) / A.D.I.C.A. srl Nera Montoro (TR) / DIACHEM spa Unità produttiva SIFA Caravaggio (BG) / A.D.I.C.A. spa – Faenza (RA)
Registrazione n.11441del 23/09/02 del Ministero della Salute
kg. 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15 partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO *: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive : Metalaxyl 10% e Folpet 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :*
METALAXYL - Sintomi : irritante cutaneo ed ocularecon possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalme, dispnea, spasmi muscolari. Terapia : sintomatica.
FOLPET - Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro-intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea) ; interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia : sintomatica. Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
Fungicida polvere bagnabile ad azione preventiva e curativa indicato nella lotta contro la **PERONOSPORA** della **VITE**; il primo trattamento va eseguito dopo che si verificano le condizioni della prima pioggia infettante, successivamente si può continuare a cadenze fisse (10-12 giorni).
La dose d'impiego è di g. 200 per q.le acqua fino ad allegagione avvenuta, con impiego di circa 1000 litri di acqua per ettaro. L'impiego regolare e costante del prodotto consentono di prevenire e contenere in misura significativa la Botrytis Cinerea.

COMPATIBILITA' : il prodotto è compatibile con tutti i prodotti a reazione neutra o acida, è sconsigliato l'impiego con prodotti a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri) e Olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con olii minerali e polisolfuri.
AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA' : il prodotto è tossico per i pesci e gli insetti utili.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto per l'uva da tavola; sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.
"Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie" - "Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento" – "Per lavorazioni agricole tra le 24 ore ed il tempo di carenza, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle" – "impedire l'accesso agli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza"
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

20% 25%

1 **Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua**

2 **Introdurre il numero di sacchetti idrosolubili chiusi, previsti (come da etichetta) nell'atomizzatore**

3 **Mettere in funzione l'agitatore**

4 **Attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti), ed.........**

5 **.......aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione**

SPORAMIL COMBI

Fungicida per la VITE contro la Peronospora

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

Composizione:

- METALAXYL puro		g. 10
- FOLPET puro		g. 40
- Coformulanti	q.b. a	gr. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

DA NON VENDERE NE' CONSERVARE

FUORI DALLA CONFEZIONE

C.Q. MASSO', S.A. – Viladomat 321, 5° - Barcellona (Spagna)

Distribuito da : CHIMASSÒ ITALIA S.r.l.

Via Milanese, 20 - Sesto San Giovanni (Mi)

Contenuto del sacchetto : kg 1 - g 500 – 250

AVVERTENZA : LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

Registrazione n. 11441 del 23/09/02 del Ministero della Salute

ALIADO 75 DF

fungicida a base di Mancozeb
Tipo di formulazione : microgranuli dispersibili

ALIADO 75 DF
- Composizione:
- Mancozeb puro ...g. 75
- Coformulanti q.b. a .g. 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO :
Irritante per le vie respiratorie.; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi
e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

C.Q. MASSO', S.A. – Viladomat 321, 5° - Barcellona (Spagna)
Distribuito da Chimassò Italia s.r.l. – Via Milanese 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Officina di produzione : C.Q. MASSO' S.A., Barcellona (Spagna) / A.D.I.C.A. Srl – Nera Montoro (TR)
Registrazione n 11442 del 23/09/02 del Ministero della Salute
Kg 0,5-1-5-10-15-20-25 Partita n.: .....

PRESCRIZIONI PARTICOLARI : Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidita' e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Terapia: sintomatica. Consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
L'ALIADO 75 DF è un fungicida. in formulazione di microgranuli dispersibili, che immesso nell'acqua si scioglie rapidamente, non dando formazione a spolvero e non creando depositi e schiuma nella botte.
Indicato sulle seguenti colture :
VITE : contro la Peronospora iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Contro l'Escoriosi, Marciume nero, Rossore parassitario, iniziare con un trattamento anticipato non appena le gemme cominciano a muovere, ed un successivo all'emissione delle prime foglioline e continuare con il normale calendario di lotta.
Trattamenti alla dose di g. 200 per q.le acqua
MELO - PERO : contro Ticchiolatuta, Septoria, Ruggine, Alternaria, Gloeodes dall'apertura delle gemme e proseguendo con il normale calendario di lotta lla dose di g. 200 per q.le acqua
POMODORO (solo fino alla prima fioritura) : contro Peronospora, Antracnosi, Cladosporiosi, Alternariosi e Septoriosi alla dose di gr. 200 – 300 per q.le acqua, iniziando quando si verificano le condizioni per l'infezione, trattanto ogni 7 – 10 giorni sino alla prima fioritura. In caso di forti attacchi di Antracnosi elevare la dose a g. 300 – 350 per q.le acqua.
TABACCO : contro la Peronospora in semenzaio effettuare il trattamento quando le piantine sono di cm. 1,5 di diametro a g. 100 150 per q.le acqua; contro la Peronospora in post – trapianto, trattare due volte alla settimana a g. 200 per q.le acqua e in pieno campo, trattare una volta alla settimana a g. 200 per q.le acqua
PIOPPO : contro la Marssonina bruna alla dose di gr. 400 - 500 per q.le acqua, iniziare a trattare molto presto in modo preventivo e ripetendoli almeno 2 – 3 il trattamento ogni 10 – 15 giorni.
GAROFANO (in pieno campo) : contro Ruggine, Alternaria, Septoria a g. 200-250 per q.le acqua
CEREALI IN CAMPO (Frumento – Orzo – Avena) : contro Ruggine e Septoria alla dose di kg. 2,5 per ettaro
CONCIA DELLE SEMENTI :
Grano : contro le Carie (Tilletia tritici) e Fusariosi (Fusarium nivale) a g 200 per q.le di seme / Riso : contro Brusone (Piricularia oryzae ed Helminthosporium oryzae) e Fusariosi (Fusarium spp.) a g. 250 per q.le di seme / Mais : contro il Carbone (Ustilago maydis), Fusariosi (Fusarium moniliforme), Gibberella (Gibberella zeae) ed Elmintosporiosi (Helminthosporium m.) a g. 300 per q.le di seme / Barbabietola da zucchero contro Mal del piede (Phoma betae), Fusariosi (Fusarium spp.), Mal vinato (Rhizoctonia solani), Cercosporiosi (Cercospora bieticola) a g. 600 per q.le di seme / Patata contro Fusarium coeruleum, Rhizoctonia solani, Alternaria solani g. 300 – 400 per q.le di seme / Sementi orticole contro Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Pythium spp. g. 300 – 800 per q.le di seme a seconda delle dimensione del seme / Girasole contro Fusarium spp, Pythium spp. g. 300 – 350 per q.le di seme.

DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA - DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
COMPATIBILITA': non miscibile con i prodotti a reazione alcalina. Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione avvenuta.
FITOTOSSICITA' : Varietà di cultivar di pero sensibili al p.a. mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta
"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso". "Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE
LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

CHIMATO 50 EC

INSETTICIDA AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE
Tipo di formulazione : concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
-Dimetoato puro g. 46,3 (500 g/l)
-Coformulanti q.b. a g. 100

Frasi di rischio: Infiammabile; Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione

Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini;Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

NOCIVO

C.Q. MASSO', S.A. – Viladomat 321, 5° - Barcellona (Spagna)
Distribuito da : CHIMASSÒ ITALIA S.r.l. - Via Milanese, 20 - Sesto San Giovanni (MI)

Officina di produzione: C.Q. MASSO' S.A., Barcellona (Spagna) / Torre srl – Torrenieri (fraz. di Montalcino) (SI) / DIACHEM spa - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG) / ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI) / A.D.I.C.A. spa – Faenza (RA)
Registrazione Ministero della Salute n°11444 del 25/09/2002 - Partita n°...
Contenuto netto litri: 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-15

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il CHIMATO 50 EC è un insetticida fosforganico attivo per contatto ed ingestione, spiccatamente citotropico e con proprietà sistemiche. E' in grado di raggiungere i fitofagi all'interno della vegetazione, quali gli afidi all'interno delle foglie accartocciate.
DOSI E MODALITà DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega con irroratrici a volume normale alla prima comparsa degli insetti dannosi. Con atomizzatori a volume ridotto adeguare la concentrazione d'impiego in modo da mantenere costante la dose per ettaro. Le quantità indicate si intendono per 100 litri d'acqua, se non diversamente indicato.
AGRUMI (piante non in produzione) – Afidi: ml 80 - 120.
POMACEE (piante non in produzione) – Afidi, Tripidi, Tentredini, Psille, Acari: ml 60 - 80, Cemiostoma: ml 60 quando le mine raggiungono 5 mm di diametro.
OLIVO – Mosca delle olive: ml 80-120 in trattamenti preventivi e curativi. Tignola: ml 80-120 da marzo a giugno. Massimo 2 trattamenti.
LATTUGA (solo in campo) – Afidi, Tripidi, Ditteri, Coleotteri, Lepidotteri: ml 60.
ASPARAGO – Afidi, Tripidi, Ditteri, Coleotteri, Lepidotteri: ml 60-100. Trattare solamente dopo la raccolta dei turioni.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO – Mosca, Afidi, Coleotteri, Lepidotteri, Casside, Cimici : ml 80-120.
TABACCO – Afidi, Tripidi, Lepidotteri, Coleotteri, Cimici: ml 60 –120.
FRUMENTO-SEGALE-TRITICALE – Afidi, Ditteri, Coleotteri, Cimici, Lepidotteri: ml 80 - 120.
FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI – Afidi, Tripidi, Cecidomidi, Lepidotteri, Coleotteri, Imenotteri, Ditteri: ml 60-80.
PIOPPO - Afidi, Tingidi, Lepidotteri, Coleotteri: ml 60-80.
COMPATIBILITA' : il prodotto è incompatibile con i formulati a reazione alcalina e con olii.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : non impiegare il prodotto su cedro, limone interdonato, crisantemo, nocciolo, fico, pistacchio ed in trattamenti a basso volume sulle seguenti varietà di olivo: Coratina, Simona, Canina, Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana, Bosana, Ottobratica, Terza grande e Dritta. Non impiegare durante la fioritura.
NOCIVITÀ : il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIONI PRIMA DEL RACCOLTO SU OLIVO E 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER LE ALTRE COLTURE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE. PER ASPARAGO TRATTARE SOLAMENTE DOPO LA RACCOLTA DEI TURIONI.
"Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie" - "Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento" – "Per lavorazioni agricole tra le 24 ore ed i tempi di carenza del formulato, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle" – "impedire l'accesso agli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza"
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

CIREX MASSO' 75 WP

Insetticida regolatore di crescita
Tipo di formulazione : polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
- Ciromazina pura g. 75
- Coformulanti qb a 100

FRASI DI RISCHIO : Irritante per gli occhi e la pelle

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini;Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

C.Q. MASSO' S.A. – Viladomat 321, 5° - Barcellona (Spagna)
Distribuito da:

Stabilimento di Produzione : - C.Q. MASSO' S.A., Barcellona (Spagna)
- ADICA srl – Faenza (RA)
Registrazione n 11647 del 24/03/2003 Ministero della Salute
Taglie : g. 25-50-100-250-500 kg 1-5-10 Partita n. : ...

INFORMAZIONI MEDICHE
Sintomi di intossicazione: non si conoscono casi di avvelenamento dell'uomo. In condizioni sperimentali si sono osservati i seguenti sintomi di avvelenamento aspecifici: sedazione, dispnea, esoftalmo, posizione curva e pelo arruffato. Terapia: sintomatica. Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

CAMPO D'IMPIEGO
Insetticida regolatore della crescita con effetto inibitorio sullo sviluppo delle larve dei Ditteri e con azione prolungata. E' dotato di proprieta' sistemiche: applicato sulla vegetazione penetra rapidamente nei tessuti fogliari (effetto transalminare) dove agisce sulle larve minatrici inibendone la crescita; somministrato al terreno viene assorbito dalle radici e traslocato all'interno, per via sistemica, della pianta proteggendone la parte aerea.
Insetticida per la difesa di ortaggi (carciofo, sedano, cocomero, melone, zucchino, cetriolo, pomodoro, melanzana, lattuga (solo applicazioni in campo)), patata, funghi, tabacco, floreali.
Specifico per il controllo delle larve di ditteri (comprese le popolazioni resistenti ai carbammati e piretroidi). In particolare risulta indicato contro i minatori del genere Liriomyza che colpiscono le piante ortive e floreali in serra e in pieno campo. Nei trattamenti delle fungaie è invece indicato per il controllo dei ditteri fitofagi Sciaridi e Foridi. La dose di applicazione del CIREX MASSO' 75 WP è di g. 25 – 30 in serra in un q.le di acqua e di g. 30 – 40 in pieno campo che corrispondono a 300 – 400 grammi per ettaro, trattando alla comparsa delle prime mine ed eventualmente ripetendo il trattamento dopo circa 7-14 giorni. Quando l'applicazione al terreno impiegare kg. 1 per ettaro e può avvenire anche con irrigatori a goccia o a manichetta.

COMPATIBILITA' : non miscibile con antiparassitari a reazione alcalina
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : sulle varietà di melo Mcintosh e relativi incroci impiegare solo fino alla fioritura; miscele con clorotalonil possono provocare rugginosità su Golden Delicious e Granny Smith
NOCIVITA' : Il prodotto è tossico per i pesci
Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta della patata e 14 giorni per le altre colture
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

MASSOCUR 12 - E

Fungicida sistemico
Tipo di formulazione : concentrato emulsionabile

Composizione:
-MICLOBUTANIL puro 13,4 (=125 g/lt)
-Coformulanti qb a 100

FRASI DI RISCHIO :
Irritante per gli occhi; Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati; Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione; L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle; L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza; In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

C.Q. MASSO' S.A. – Viladomat 321, 5° - Barcellona (Spagna)
Distribuito da: Chimasso Italia S.r.l., Via Milanese, 20, Sesto S. Giovanni (Mi).
Stabilimento di Produzione: C.Q. MASSO' S.A., Barcellona (Spagna); Althaller Italia s.r.l., Strada Comunale per Campagna, 5 – 20078 – S. Colombano al Lambro (MI)
Peso netto: lt 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15 PARTITA N.
Registrazione Ministero della Salute N.11650 del 07/04/03

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose dei tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermati eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, brancospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CAMPI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Fungicida ad azione sistemica con attività preventiva, curativa ed eradicante, il prodotto penetra rapidamente nei tessuti sfuggendo all'azione dilavante della pioggia
Viene impiegato sulle seguenti colture :
Vite : impiegato contro all'Oidio alle seguenti dosi :
- Uva da vino : ml 15 – 20 / hl sino alla fioritura, quindi a ml 30 dalla allegagione in avanti, con trattamenti ogni 14 giorni.
- Uva da tavola : **ml 20 / hl** sino alla fioritura, quindi a **ml 30** dalla allegagione in avanti, con trattamenti ogni 8 – 14 giorni in funzione dello stato vegetativo e dell'intensità dell'infezione fungina.
Nel controllo del Marciume nero (Black-rot) alla dose di 15 - 30 ml/hl d'acqua ad intervallo di 8-14 giorni, con dose maggiore ad intervallo maggiore)
Pesco – contro la Monilia ml 50 con 2 trattamenti all'epoca dei bottoni rosa ed alla caduta petali, in caso di condizioni climatiche sfavorevoli trattare anche in fioritura.
Contro l'Oidio alla dose di 40- 50 ml/hl iniziando alla scamiciatura del frutto e proseguendo ad intervalli di 10-14 giorni.
Susino : contro la Monilia alla dose di 40 – 50 ml/hl con 2-3 trattamenti tra l'inizio della fioritura e la caduta dei petali.
Albicocco : contro la Monilia alla dose di ml 40 – 50 /hl con tre trattamenti compresi tra l'inizio della fioritura e la caduta dei petali; per combattere l'Oidio (Sphaeroteca pannosa) impiegare 40 – 50 ml/hl iniziando alla scamiciatura dei frutti e continuando ogni 14 giorni.
Melone - Cocomero - Zucchino - Cetriolo : contro l'Oidio alla dose di ml 40-50 / hl ogni 8-10 giorni alla prima comparsa della malattia.
Pomodoro – Peperone : contro Oidio (Leveillula taurica) a ml 40 – 50 / hl trattamenti ogni 8 – 12 giorni iniziando all'apparire della malattia, con utilizzo della dose massima quando vi è forte pressione della malattia ad intervalli ridotti.
Fragola : contro l'Oidio in post-trapianto ed in produzione a ml 40/hl trattando ad inizio malattia e continuando ogni 14 giorni.
Rosa – contro l'Oidio e Ticchiolatura alla dose di ml 40 – 50/hl
Garofano - contro la Ruggine alla dose di ml 40 – 5/hl
Nota: le dosi sopra riferite sono per trattamenti a volume normale, con bagnatura accurata delle parti suscettibili di malattia; in caso di trattamenti a basso volume impiegare la stessa dose per ettaro di prodotto impiegata in trattamenti a volume normale.
COMPATIBILITA' : compatibile con i fungicidi, compresi gli antiperonosporici sistemici, nonchè con gli insetticidi fosforganici o carbammati. **Avvertenza** : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
"Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso professionalmente esposte" – "non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento" – "per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle" – "impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza"
Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta su vite, 7 giorni su pesco, susino, albicocco e 3 giorni sulle altre colture.
Il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli organismi acquatici, osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro utilizzo è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall' uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO, SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

CONAS 10 EC

Fungicida sistemico con azione preventiva, curativa e bloccante
sulle colture di VITE, PERO, MELO, PESCO, ORTIVE, TABACCO, ORNAMENTALI E FLOREALI

CONAS 10 EC
Composizione
- Penconazolo puro g. 10,20 (100 g/lt)
- coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi e la pelle; Nocivo per gli organismi acquarici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

IRRITANTE

Registrazione n. 11714 del 23/07/03 del Ministero della Salute
Stabilimenti di Produzione: COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ, S.A. Barcellona (Spagna); Althaller Italia s.r.l. Strada Comunale per Campagna, 5. 20078 S.Colombano al Lambro (MI)

C.Q. MASSO' S.A. – Viladomat 321, 5° - Barcellona (Spagna)
Distribuito da: Chimasso Italia S.r.l., Via Milanese, 20, Sesto S. Giovanni (Mi)

litri 0,1 0,2 0,5 1 5 10 15 20 Partita n° .....

Informazioni per il medico: *sintomi e organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato , reni. - Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). -Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. -Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acute ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergenico. -in caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del S.N.C.. Metabolismo: dopo ingestione la sostenza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'esecrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Consultare un centro antiveleni.*

MODALITÀ D'IMPIEGO
Fungicida sistemico che può essere utilizzato come preventivo, curativo e come bloccante; agisce all'interno della pianta e l'assorbimento del prodotto avviene velocemente (poche ore).
VITE
Oidio (Uncinula necator)
- Trattamenti preventivi: 25 - 30 ml/hl in pre e post-fioritura intervenendo ogni 14-16 giorni e 15 - 20 ml/hl in pre e post-fioritura effettuando i trattamenti ogni 7-10 giorni. Con attacchi in atto (primi sintomi) fare 2 trattamenti ogni 5 - 7 giorni alla dose di 50 ml/hl, poi continuare con trattamenti di tipo preventivo. Il prodotto esplica un' attività collaterale su Guignardia spp. e in minor misura su Pseudopezia spp.
MELO
Ticchiolatura (Venturia inaequalis)
-Trattamenti preventivi: 30 - 40 ml/hl ogni 6 - 8 giorni fino alla fase di frutto noce, poi ogni 10-15 giorni. I trattamenti contro la Ticchiolatura sono sufficienti per controllare efficacemente anche l'Oidio.
-Trattamenti curativi: 40 - 50 ml/hl, si può intervenire entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
-Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): 40 - 45 ml/hl effettuando 2 applicazioni ogni 5 - 7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali. E' bene aggiungere un prodotto di copertura.
Oidio (Podosphaera leucotricha)
-Trattamenti preventivi : in primavera 30 - 40 ml/hl ogni 10 giorni; nei trattamenti estivi ogni 10 - 14 giorni con dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia.
-Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): 30 - 35 ml/hl ogni settimana, per un totale di 3 - 4, che consentono il controllo delle infezioni in atto e la protezione della nuova vegetazione.
Malattie da conservazione: (Botrytis cinerea, Monilia fructigena, Penicillium spp., Gloeosporium spp.)
- fare in totale 2 - 3 trattamenti a cadenza settimanale in pre raccolta alla dose di 40-45 ml/hl.
PERO
Ticchiolatura (Venturia pirina):
-Trattamenti preventivi: 25 - 35 ml/hl ogni 10 - 12 giorni, impiegando la dose maggiore e gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli all sviluppo della malattia.
-Trattamenti curativi: 30 - 40 ml/hl trattando entro massimo 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
-Trattamenti bloccanti:(in presenza di sintomi) 30 - 40 ml/hl con 2 trattamenti ogni 5 - 7 giorni, proseguire con cadenze e dosi normali. E' bene aggiungere un prodotto di copertura.
PESCO
Oidio
-Trattamenti preventivi: in zone dove il rischio di infezione è alto e con cultivar particolarmente sensibili trattare a 40 - 50 ml/hl dalla caduta petali ed ogni 10 - 14 giorni. In zone a minor rischio intervenire ogni 14-21 giorni.
Malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp.)
- fare 2 - 3 interventi a cadenza settimanale in pre-raccolta alla dose di 50 ml/hl.
TABACCO
Oidio : 35 - 50 ml/hl facendo da 2 a 4 trattamenti in modo preventivo, iniziando dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.

MELONE - ZUCCHINO - ZUCCA - CETRIOLO - CARCIOFO - POMODORO IN PIENO CAMPO - PISELLO – PEPERONI IN PIENO CAMPO
Oidio: in pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione, fare da 2 a 4 trattamenti ogni 14 - 16 giorni a 25 - 50 ml/hl a seconda della coltura e del rischio di infezione. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.
COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE:
Oidio e ruggini: 25 - 50 ml/hl ogni 10 - 14 giorni a seconda della coltura e della incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro utilizzo è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

BACTUR WG

BIOINSETTICIDA PER LARVE DI LEPIDOTTERI

Tipo di formulazione: granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE

-Bacillus thuringiensis varietà Kurstaki
ceppo HD-1, sierotipo 3a 3b .... g. 6,4
(pari a 32.000 U.I./mg di formulato)
-Coformulanti .... q.b. a g. 100

IRRITANTE

NATURA DEL RISCHIO : Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

C.Q. MASSO', S.A. – Viladomat 321, 5°, 08029 Barcellona (Spagna)

Registrazione Ministero della Salute n° 11785 del 9-09-03
Distribuito da: Chimasso Italia S. r. l. Via Milanese 20, Sest S. Giovanni (Mi).
Officina di produzione : BECKER MICROBIAL PRODUCTS Florida (USA)
Officina di confezionamento : C.Q. MASSO' - 08799 Barcellona (Spagna) / DIACHEM spa - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
Partita n°.. - Contenuto netto: 100-250-500-1000 g – 5 – 10 – 20 – 25 kg

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE

BACTUR WG è un insetticida a base di di Bacillus thuringiensis varietà Kurstaki Berliner, ceppo HD-1, sierotipo 3a 3b, specifico per il controllo delle larve dei lepidotteri fitofagi. Il prodotto è completamente selettivo nei confronti degli insetti utili, ed è ideale quindi per i programmi di lotta biologica e integrata. Il principio attivo è efficace sulle larve dei lepidotteri per ingestione. Intervenire con attrezzature che munite di pompe a volume distribuiscano un volume medio-alto di acqua.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Distribuire il prodotto sulla parte aerea delle piante da proteggere. Iniziare i trattamenti alla prima comparsa dei parassiti e ripeterli secondo necessità.
Agrumi: Tignola (*Prays citri*) 700-1000 g/ha
Pomacee: per lepidotteri defogliatori (*Operophthera brumata, Hyponomeuta padellus, Hibernia defoliara, Hyponomeuta malinellus*), Ifantria (*Hyphantria cunea*) 350-500 g/ha; Tortricidi ricamatori, Nottuidi 700-1000 g/ha
Vite: Tignole (*Eupoecilia ambiguella, Lobesia botrana*), Ifantria (*Hyphantria cunea*) 700-1000 g/ha
Olivo: Tignola (*Prays oleae*), Ifantria (*Hyphantria cunea*) 700-1000 g/ha
Actinidia: Eulia (*Argyrotaenia purchellana*), Tignola 700-1000 g/ha
Drupacee (Pesco, Susino, Albicocco, Mandorlo): Cidia, (*Grapholita molesta*), Anarsia (*Anarsia lineatella*), Nottuidi, Falene, Ifantria (*Hyphantria cunea*) 700-1000 g/ha
Fragola: Piralide (*Ostrinia nubilalis*), Pandemis (*Pandemis dumetana*), Eulia (*Argyrotaenia pulchellana*) 1000 - 1500 g/ha
Ortaggi a foglia: Nottue (*Spodoptera littoralis*), *Udea ferrugatis* ,Vanessa del Cardo (*Vanessa cardui*) 1000 – 2000 g/ha
Solanacee (Pomodoro, Melanzana, Peperone): Nottue (*Mamestra brassicae, Autographa gamma, Heliotis armigera*), Piralide (*Ostrinia nubilalis*) 1000-2000 g/ha a pieno campo e/o in serra
Rapa e Ravanello: Cavolaie (*Pieris brassicae, Pieris rapae*), Tignola (*Plutella maculipennis*) 1000 - 1500 g/ha
Cavolo: Cavolaie (*Pieris brassicae, Pieris rapae*), Tignola (*Plutella maculipennis*) 1000-1500 g/ha
Carciofo: Nottue, Depressaria 1000 –2000 g/ha
Cucurbitacee e Leguminose da granella (Fagioli, Lenticchie, Piselli, Fava, Cece, Lupino, Cicerchia): Nottue e Tignole 1000 – 2000 g/ha
Patata: Ifantria (*Hyphantria cunea*), Tignola (*Pthorimea operculella*) 700-1000 g/ha
Mais: Piralide (*Ostrinia nubilalis*), Ifantria (*Hyphantria cunea*) 1000-1500 g/ha
Tabacco: Nottue 1000 – 2000 g/ha
Barbabietola da zucchero: Mamestra (*Mamestra brassicae*), Tignola (*Loxostege spp.*), Ifantria (*Hyphantria cunea*) 700-1000 g/ha
Soia: Vanessa (*Vanessa cardui*) 1000 – 1500 g/ha
Colture floreali ed ornamentali: Larve di lepidotteri, Ifantria (*Hyphantria cunea*) 700-2000 g/ha
Forestali: Processionarie (*Thaumatopea processionaea, Thaumatopea pityocampa*), Limantrie (*Ljmantria dispar, Limantria monacha*), Ifantria (*Hyphantria cunea*) 80-200 g/hl
Pioppo: Stilnoptia (*Stilnoptia salicis*), Ifantria (*Hyphantria cunea*) 80-200 g/hl

COMPATIBILITÀ: non miscelare con prodotti alcalini.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
"Nell'applicazione del prodotto usare indumenti di protezione per agenti biologici, classificati come dispositivi di protezione individuale e con relativa marcatura CE per la protezione di agenti biologici e guanti quali dispositivi di protezione individuale con relativa marcatura CE e conformità allla EN 374"
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

USARE INDUMENTI DI PROTEZIONE PER AGENTI BIOLOGICI, CLASSIFICATI COME DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E CON RELATIVA MARCATURA CE PER LA PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI, E GUANTI, QUALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CON RELATIVA MARCATURA CE E CONFORMITÀ ALLA EN 374

MASSODINA WG

Fungicida citotropico ad azione preventiva-curativa a base di Dodina
tipo di formulazione: microgranuli idrodisperdibili

MASSODINA WG
COMPOSIZIONE
-Dodina pura g. 40
-Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione: Irritante per gli occhi e la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

C.Q. MASSO' S.A. – Viladomat 321, 5° - Barcellona (Spagna)
Distribuito da: Chimasso italia S.r.l., Via Milanese, 20, Sesto S. Giovanni (Mi).
Stabilimento di Produzione: : C.Q. MASSO' S.A., Barcellona (Spagna)
Registrazione n.11830 del 30/09/03 del Ministero della Salute
Kg 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15-20 - Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi e aritmia. Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (30 g per litro di acqua) e digitale. Avvertenza: consultare un centro antiveleno

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
MASSODINA WG è un fungicida citotropico con azione preventiva e curativa in formulazione di microgranuli idrodispersibili, formulazione che conferisce al prodotto maggiore sicurezza e praticità d'uso per l'operatore, nonché un'elevata precisione nei dosaggi. Inoltre, la distribuzione del prodotto sulla vegetazione risulta più uniforme e di buona adesività. L'azione preventiva impedisce l'instaurarsi delle infezioni contaminanti e l'azione curativa blocca le infezioni in atto durante la fase di incubazione.
COLTURE: Melo, Pero, Nespolo: contro la Ticchiolatura utilizzare 100-120 g/hl per trattamenti preventivi e 180 g/hl in caso di trattamenti curativi, da effettuarsi entro e non oltre 60 ore dall'inizio della pioggia infettante. **Ciliegio:** utilizzare 120 g/hl contro la Cilindrosporiosi e 100-150 g/hl contro la Botrite. **Albicocco:** contro la Monilia utilizzare 120 g/hl effettuando applicazioni preventive. **Pesco:** utilizzare 160-180 g/hl contro la Bolla e il Corineo, effettuando un trattamento all'80% della caduta foglie e uno alla ripresa vegetativa (ingrossamento gemme apicali), in piena vegetazione utilizzare 120 g/hl. Contro Monilia e Botrite utilizzare 120-150 g/hl in trattamenti di tipo preventivo in pre e post-fioritura ed in pre-raccolta. **Vite:** effettuare trattamenti preventivi con 150-180 g/hl ad intervalli di 7-10 giorni. **Olivo:** contro Occhio di Pavone e Fumaggini effettuare un trattamento di tipo preventivo con 120-160 g/hl sia alla ripresa vegetativa delle gemme a legno che all'inizio dell'Autunno. **Fragola:** contro Vaiolatura e Botrite utilizzare 120-160 g/hl. **Lattuga e simili:** applicare 120-150 g/hl contro Peronospora, Botrite e Sclerotinia. **Cipolla, Aglio e Porro:** contro Peronospora utilizzare 110-130 g/hl per trattamenti preventivi e 200 g/hl per trattamenti curativi. **Spinacio:** contro Peronospora e Ramularia utilizzare 150 g/hl per trattamenti preventivi e 180 g/hl per trattamenti curativi. **Sedano:** contro Septoria, Cercospora e Peronospora utilizzare 150 g/hl per trattamenti preventivi e 200 g/hl per trattamenti curativi.
Finocchio e Carota: contro Alternaria e Sclerotinia utilizzare 130-160 g/hl, contro Septoria, Cercospora e Peronospora effettuare trattamenti preventivi con 150 g/hl. **Basilico:** contro la Fusariosi distribuire 4 L/m^2 di una soluzione preparata con 200 g/hl. Contro Septoria, Cercospora e Peronospora effettuare trattamenti fogliari preventivi con 150 g/hl.
Pomodoro, Peperone e Melanzana: contro Peronospora e Septoria effettuare trattamenti preventivi utilizzando 160-180 g/hl. Contro la Fusariosi distribuire 4 L/m^2 di una soluzione preparata con 200 g/hl.
Patata: contro la Peronospora effettuare trattamenti di tipo preventivo utilizzando 160-180 g/hl. **Cucurbitacee (Cocomero, Melone, Cetriolo, Zucca e Zucchino):** contro Peronospora e Antracnosi effettuare applicazioni preventive utilizzando 160-200 g/hl.
Garofano: contro la Fusariosi intervenire con applicazioni al terreno di una soluzione preparata con 130-160 g/hl. **Rosa:** contro la Ticchiolatura intervenire alla comparsa dei sintomi effettuando trattamenti con 100-120 g/hl. **Ornamentali (Dracaena, Yucca e Ficus):** contro Alternaria, Antracnosi, Peronospora, Septoria e Ticchiolatura intervenire con 160-200 g/hl. **Pioppo:** contro la Marssonina effettuare trattamenti preventivi con 160 g/hl o trattamenti curativi con 180 g/hl.
COMPATIBILITA': Non e' compatibile con i prodotti a reazione alcalina; non è consigliabile miscelarlo con Carbaryl, Dimetoato, Azinfos-metile; la miscela con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con olii minerali può dare luogo a scarsa sospensività; evitare i trattamenti con acque fredde e con temperature esterne prossime a 0 gradi centigradi.
AVVERTENZE: nella scelta della dose da utilizzare sono da tenersi in considerazione sia la pressione del patogeno che l'intervallo tra i trattamenti. Le applicazioni di tipo preventivo sono sempre da ritenersi preferibili a quelle di tipo curativo. Le dosi riportate fanno riferimento a trattamenti a volumi d'acqua normali (10-18 hl/ha per i fruttiferi, 10 hl/ha per la vite, 10-15 hl/ha per il pioppo, 6-8 hl/ha per le altre colture). In caso di applicazioni a basso volume calcolare la dose in g/ha moltiplicando la dosi ettolitrica per il numero di hl/ha a volume normale. Per scongiurare l'instaurarsi di ceppi resistenti si consiglia di alternare principii attivi a differente modo d'azione e di non effettuare più di 2-3 trattamenti consecutivi con il medesimo principio attivo. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': Il prodotto e' nocivo per i pesci, animali domestici e bestiame.
FITOTOSSICITA': Su Golden Delicious usare dosi non superiori allo 0,05%.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto
Non far pascolare e non alimentare il bestiame su raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi 10 giorni dalla applicazione.
"Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento" - "Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle"
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

FLYTION

Insetticida liquido a vasto spettro di azione

Riferimento partita: *

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:

Fenitrotion puro g 47,5 (= 465 g/l)

Coformulanti q.b. a 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio :

Infiammabile; Nocivo per ingestione; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza :

Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A.
Barcellona (Spagna)
Distribuito da :
CHIMASSO' ITALIA srl
via Milanese, 20 - Sesto San Giovanni (MI)

STABILIMENTO DI PRODUZIONE :
C.Q. MASSO' S.A., Barcellona (Spagna)

Registrazione del Ministero della Salute n. 12139 del 11/05/04

Contenuto netto : ml 10 - 20 - 50 - 100 - 250 - 500
l 1 - 5 - 10 – 20

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :

Sintomi : colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa) : nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa) : astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali : confusione, atassia, convulsione, coma.
Cause di morte : generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia : atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Avvertenza : Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO
(dosi riferite a 100 litri d'acqua)

Insetticida fosforganico che agisce per contatto e per ingestione, dotato anche di una certa attività ovicida e con potere citotropico nei tessuti vegetativi.

E' indicato sulle seguenti colture :

- **Ortaggi :** contro Afidi, Dorifora, Tripidi, Cavolaie, Tentredini alla dose di ml 125 - 175.
- **Agrumi :** contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Tignola, Mosca e Cocciniglie alla dose di ml 125 - 175.
- **Vite :** contro Tignole, Cicaline, Tripidi, Sigaraio, Cocciniglie alla dose di ml 125 - 175.
- **Melo :** contro Afidi, Tripidi, Ricamatrici, Verme delle mele, Microlepidotteri, Cocciniglie alla dose di ml 125 - 175.
- **Pero :** contro Afidi, Psilla, Cocciniglie, Verme delle pere, Carpocapsa, Cicaline, Tortrici alla dose di ml 125 - 175.
- **Olivo :** contro Tignola, Mosca, Tripidi, Cocciniglia alla dose di ml 125 - 175.
- **Cereali :** contro Afidi alla dose di ml 125 - 175.
- **Barbabietola da zucchero :** contro Afidi, Altica, Cleono, Lixus alla dose di litri 1 - 1,5 per ettaro.
- **Medica :** contro Afidi alla dose di ml 125 - 175.
- **Ornamentali - Floreali :** contro Afidi, Tripidi, Tentredini alla dose di ml 125 - 175.
- **Pioppo :** contro Tarlo vespa, Gemmaiolo alla dose di ml 125 - 175.
- **Drupacee :** contro Cocciniglie, Afidi verdi, Tripide, Mosca alla dose di ml 125 - 175.

COMPATIBILITÀ

Non compatibile con prodotti a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

Tossico per gli animali domestici, bestiame, pesci e insetti utili.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Facsimile dell'etichetta formato ridotto ai sensi dell'Art. 16 comma 2 del D.L. 194/95 per le taglie da ml 10 – 20 – 50 - 100

FLYTION

Insetticida liquido a vasto spettro di azione

Riferimento partita: *
Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Fenitrotion puro g 47,5 (= 465 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio :
Infiammabile; Nocivo per ingestione; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A.
Barcellona (Spagna)
Distribuito da :
CHIMASSO' ITALIA srl
via Milanese, 20 - Sesto San Giovanni (MI)

STABILIMENTO DI PRODUZIONE :
C.Q. MASSO' S.A., Barcellona (Spagna)

Registrazione del Ministero della Salute n. 12139 del 11/05/04

Contenuto netto : ml 10 - 20 - 50 - 100 - 250 - 500
1 l - 5 - 10 – 20

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :

Sintomi : colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le piacche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa) **:** nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa) **:** astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali : confusione, atassia, convulsione, coma.
Cause di morte : generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia : atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Avvertenza : Consultare un Centro Antiveleni

COMPATIBILITÀ

Non compatibile con prodotti a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

Tossico per gli animali domestici, bestiame, pesci e insetti utili.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO ALLEGATO ALLA CONFEZIONE

VERDE VIVO S.r.l.

SEAGARD®

®Marchio registrato

SOSPENSIONE DI MICROCAPSULE PRONTE ALL'USO
INSETTICIDA PER USO ORNAMENTALE E DI GIARDINAGGIO
PER PIANTE DA APPARTAMENTO E GIARDINO DOMESTICO

SEAGARD

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
Diazinone puro 0,29 g (3,00 g/l)
Coformulanti q. b. a 100 g

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Nocivo per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

VERDE VIVO S.r.l.
P.zza Petrarca 7 - Padova

Stabilimento di produzione: IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG) / **L.I.F.A. S.r.l. -** Vigonovo (VE)
Stabilimento di confezionamento: **FitoFormula S.r.l.** – Aprilia (Latina).

Registrazione Ministero della Sanità n° 10877/PPO del 11/4/2001
Contenuto: 100 - 150 - 200 - 250 - 500 – 700 ml – 1 litro
Partita n°......

DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. – Padova e AZF AGRICOLTURA S.r.l. – Padova

NORME PRECAUZIONALI: Conservare sotto chiave e fuori della portata degli animali domestici – Conservare il recipiente ben chiuso – Conservare soltanto nel recipiente originale – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone – In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico – In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone – Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione – Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
Il SEAGARD è un insetticida che agisce per contatto, ingestione e anche leggermente per asfissia. SEAGARD è efficace nei confronti di molti insetti che infestano le piante ornamentali ed in particolare afidi, tripidi, cocciniglie e mosche.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega tal quale spruzzandolo sulle piante da proteggere mediante un normale spruzzatore. I trattamenti vanno effettuati al primo manifestarsi delle infestazioni e ripetuti secondo necessità.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
ATTENZIONE: Da non impiegare in agricoltura e o su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).**

DA NON VENDERSI SFUSO

SEAGARD®

®Marchio registrato

SOSPENSIONE DI MICROCAPSULE PRONTE ALL'USO
INSETTICIDA PER USO ORNAMENTALE E DI GIARDINAGGIO
PER PIANTE DA APPARTAMENTO E GIARDINO DOMESTICO

SEAGARD

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
Diazinone puro 0,29 g (3,00 g/l)
Coformulanti q. b. a 100 g

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Nocivo per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

VERDE VIVO S.r.l.
P.zza Petrarca 7 - Padova

Stabilimento di produzione: IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG) / **L.I.F.A. S.r.l. -** Vigonovo (VE)
Stabilimento di confezionamento: FitoFormula S.r.l. – Aprilia (Latina).

Registrazione Ministero della Sanità n° 10877/PPO del 11/4/2001

Contenuto: 100 ml

Partita n°......

DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. – Padova e AZF AGRICOLTURA S.r.l. – Padova

NORME PRECAUZIONALI: Conservare sotto chiave e fuori della portata degli animali domestici – Conservare il recipiente ben chiuso – Conservare soltanto nel recipiente originale – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone – In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico – In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone – Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione – Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

ATTENZIONE: Da non impiegare in agricoltura e o su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

DA NON VENDERSI SFUSO

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

ANTILUMACA GIARDINI

ESCA GRANULARE

LIMACIDA PER PIANTE COLTIVATE NEI GIARDINI DOMESTICI

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:

Metaldeide pura	5,00 g
Coformulantii	q. b. a 100 g

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare il recipiente ben chiuso – Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle – In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone – In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Conservare soltanto nel recipiente originale – Evitare il contatto con gli indumenti – Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone – Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione – Evitare la contaminazione delle zone circostanti la vegetazione e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica uomo circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali. Terapia: sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
L'ANTILUMACA GIARDINI è un formulato specifico per la lotta contro tutte le specie di lumache con o senza guscio che attaccano le piante coltivate nei giardini. Particolarmente danneggiate risultano le piantine giovani poste in terreni freschi, umidi ed ombrosi.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Spargere il prodotto a spaglio su tutta la superficie da disinfestare in modo che su ogni metro quadrato di terreno ci siano almeno 10-15 granuli (circa 0,5-0,8 grammi), oppure disporre il prodotto in mucchietti a breve distanza tra loro e dalle piante da proteggere. Nelle aiuole e giardini domestici è consigliabile costituire, lungo il perimetro, una fascia protettiva spargendo il prodotto con una certa abbondanza. Internamente a questa fascia i granuli possono essere sparsi in quantità inferiore. Il trattamento deve essere effettuati alla comparsa delle prime lumache, preferibilmente dopo una pioggia o una irrigazione e ripetuto in caso di maltempo o secondo necessità.

ATTENZIONE: Da non impiegare in agricoltura e o su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

VERDE VIVO S.r.l.
P.zza Petrarca, 7 – Padova

Officine di produzione:
L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) **/ L.I.F.A. S.r.l.** - Isola Vicentina (VI) / **CAFFARO S.p.A.** - Aprilia (LT)

Registrazione del Ministero della Sanità N° 10.882/ppo del 11/04/2001

CONTENUTO: 100 – 200 – 250 – 500 g / 1 kg

Partita N° ....

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE**

DA NON VENDERSI SFUSO

DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. – Padova e AZF AGRICOLTURA S.r.l. – Padova

ANTILUMACA GIARDINI

ESCA GRANULARE

LIMACIDA PER PIANTE COLTIVATE NEI GIARDINI DOMESTICI

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:

Metaldeide pura	5,00 g
Coformulantii	q. b. a 100 g

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare il recipiente ben chiuso – Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle – In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone – In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Conservare soltanto nel recipiente originale – Evitare il contatto con gli indumenti – Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone – Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione – Evitare la contaminazione delle zone circostanti la vegetazione e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica uomo circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali. Terapia: sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE: Da non impiegare in agricoltura e o su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

VERDE VIVO S.r.l.
P.zza Petrarca, 7 – Padova

Officine di produzione:
L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) / **L.I.F.A. S.r.l.** - Isola Vicentina (VI) / **CAFFARO S.p.A.** - Aprilia (LT)

Registrazione del Ministero della Sanità N° 10.882/ppo del 11/04/2001

CONTENUTO: 100 g

Partita N° ……………………

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUAIL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

DA NON VENDERSI SFUSO

DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. – Padova e AZF AGRICOLTURA S.r.l. – Padova

FLORASAN® SPRAY

® Marchio registrato

INSETTICIDA SPRAY EFFICACE CONTRO AFIDI, CIMICI,TRIPIDI

Florasan Spray

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Malation puro	0,95 g
Cipermetrina pura	0,20 g
Piperonilbutossido puro	1,00 g
Coformulanti	q. b. a 100 g

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

FRASI DI RISCHIO: Estremamente infiammabile – Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare il recipiente in luogo ben ventilato – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare – Non mangiare, nè bere, né fumare durante l'impiego – Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

VERDE VIVO S.r.l.
P.zza Petrarca 7 – Padova

Officine di produzione: RODWER – Castel S. Pietro (BO) / **UNISPRAY** – Cologno Monzese (MI)

Registrazione del Ministero della Sanità N° 10.884/ppo del 11/04/2001

CONTENUTO: 100 – 150 – 200 – 250 300 – 400 ml

Partita N°................

DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. – Padova e AZF AGRICOLTURA S.r.l. – Padova

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare gli aerosoli – Evitare di inalare direttamente il getto e di spruzzarlo negli occhi – Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle – In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone – In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione – Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

AVVERTENZE: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare sulla fiamma o su corpi incandescenti. Agitare prima dell'uso. Tenere il getto distante cm. 50 dalla pianta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Malation 0,95%, Cipermetrina 0,2%, Piperonil butossido 1%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
MALATION. Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
CIPERMETRINA. Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. I propellenti (idrocarburi) presenti nel prodotto possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
PIPERONIL BUTOSSIDO. --Terapia: sintomatica.

CARATTERISTICHE

Il FLORASAN SPRAY è un antiparassitario contenente, opportunamente dosati, efficaci composti chimici per la lotta contro gli insetti (afidi, mosche, cimici, tripidi) che colpiscono le piante ornamentali. Il prodotto non va utilizzato sul Capelvenere, la Lantana ed i Ciclamini che, in particolari condizioni, possono risultare sensibili al prodotto.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Nebulizzare il prodotto nella massa del fogliame in relazione alle dimensioni della pianta, con moto uniforme, senza giungere a far sgocciolare le foglie. Per una pianta di medie dimensioni sono sufficienti circa 5 secondi di erogazione. Limitare l'applicazione alla zona occupata dalla pianta: non disperdere il preparato nell'aria per evitare che vi si formino eventuali accumuli di gas infiammabile. Dovendo trattare numerose piante presenti nello stesso locale, effettuare distinti trattamenti parziali. Aerare il locale prima di soggiornarvi nuovamente. I trattamenti vanno effettuati nelle ore meno calde della giornata (mattina o sere) e possibilmente con pianta asciutta.
EPOCA DI APPLICAZIONE I trattamenti vanno effettuati ad ogni comparsa degli insetti sulle piante da proteggere.

ATTENZIONE: Da non impiegare in agricoltura e o su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).**

DA NON VENDERSI SFUSO

FLORASAN® SPRAY

® Marchio registrato

INSETTICIDA SPRAY EFFICACE CONTRO AFIDI, CIMICI,TRIPIDI

Florasan Spray

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Malation puro	0,95 g
Cipermetrina pura	0,20 g
Piperonilbutossido puro	1,00 g
Coformulanti	q. b. a 100 g

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

FRASI DI RISCHIO: Estremamente infiammabile – Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare il recipiente in luogo ben ventilato – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

VERDE VIVO S.r.l.
P.zza Petrarca 7 – Padova

Officine di produzione: RODWER – Castel S. Pietro (BO) / **UNISPRAY** – Cologno Monzese (MI)

Registrazione del Ministero della Sanità N° 10.884/ppo del 11/04/2001

CONTENUTO: 100 ml

Partita N°................

DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. – Padova e AZF AGRICOLTURA S.r.l. – Padova

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare gli aerosoli – Evitare di inalare direttamente il getto e di spruzzarlo negli occhi – Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle – In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone – In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione – Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

AVVERTENZE: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare sulla fiamma o su corpi incandescenti. Agitare prima dell'uso. Tenere il getto distante cm. 50 dalla pianta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Malation 0,95%, Cipermetrina 0,2%, Piperonil butossido 1%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

MALATION. Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

CIPERMETRINA. Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. I propellenti (idrocarburi) presenti nel prodotto possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.

PIPERONIL BUTOSSIDO. --Terapia: sintomatica.

EPOCA DI APPLICAZIONE I trattamenti vanno effettuati ad ogni comparsa degli insetti sulle piante da proteggere.

ATTENZIONE: Da non impiegare in agricoltura e o su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

DA NON VENDERSI SFUSO

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Etichetta normale e foglio illustrativo

VERDEVIVO PIRETRO

CONCENTRATO EMULSIONABILE
INSETTICIDA NATURALE A BASE DI PIRETRO

VERDEVIVO PIRETRO

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Piretrine pure g 4 (40 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

VERDE VIVO S.r.l.
Piazzale Petrarca 7 - Padova

Stabilimento di produzione: TORRE S.r.l.– Torrenieri - Moltalcino (SI) / **Fitoformula S.r.l.** – Aprilia (latina) / **IRCA Service S.p.a.** – Fornovo S. Giovanni (BG) / **Agriformula S.r.l.** - Paganica (L'Aquila) **/ L.I.F.A. S.r.l.** - Vigonovo (VE)

Registrazione del Ministero della Salute n° 11.363/ppo del 10/06/2002

Contenuto: 50 – 100 ml

Partita N° ……..
DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. – Padova e AZF AGRICOLTURA S.r.l. – Padova

NORME PRECAUZIONALI: Conservare il recipiente ben chiuso – Non respirare le goccioline spruzzate – Evitare il contatto con gli occhi e la pelle – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone – In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Conservare soltanto nel recipiente originale – In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare il medico – Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione – Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione – Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti, sciacquandoli dopo l'uso.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi. Blocca la trasmissione nervosa iper stimolando pre.post- sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici e asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
I solventi contenuti nel prodotto possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Terapia sintomatica e di rianimazione.

CARATTERISTICHE
VERDEVIVO PIRETRO è un insetticida a base di piretro naturale attivo contro gli afidi, le cicaline, i tripidi, i lepidotteri e i coleotteri defogliatori che infestano le piante da apprtamento e da giardino domestico.
MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto va diluito in acqua e successivamente spruzzato sulle foglie e sui fusti delle piante alla prima comparsa degli insetti parassiti.
DOSI D'IMPIEGO
0,7 – 0,8 ml per litro di acqua. In presenza di infestazioni particolarmente gravi, la dose può essere inalzata anche a 1 - 1,5 ml per litro d'acqua. Per un preciso dosaggio usare il misurino in dotazione alla confezione.

AVVERTENZA. Il prodotto è sensibile alla luce. Si consiglia quindi di effettuare le applicazioni nelle ore serali.
COMPATIBILITA': Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari alcalini (poltiglia bordolese) oli minerali.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
ATTENZIONE: da non impiegare in agricoltura o comunque su piante destinate all'alimentazione, chi impiega il prodotto è responsabile anche degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone a agli animali

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE** (non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo dalle acque delle aziende agricole e dalle strade).

DA NON VENDERSI SFUSO

Etichetta formato ridotto

VERDEVIVO PIRETRO

CONCENTRATO EMULSIONABILE
INSETTICIDA NATURALE A BASE DI PIRETRO

VERDEVIVO PIRETRO

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Piretrine pure g 4 (40 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

VERDE VIVO S.r.l.
Piazzale Petrarca 7 - Padova

Stabilimento di produzione: TORRE S.r.l. Torrenieri - Moltalcino (SI) / **Fitoformula S.r.l.** – Aprilia (latina) / **IRCA Service S.p.a.** – Fornovo S. Giovanni (BG) / **Agriformula S.r.l.** - Paganica (L'Aquila)/ **L.I.f.a. S.r.l.** - Vigonovo

Registrazione del Ministero della Salute n° 11.363/ppo del 10/06/2002

Contenuto: 50 – 100 ml

Partita N° ……..

DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. – Padova e AZF AGRICOLTURA S.r.l. – Padova

NORME PRECAUZIONALI: Conservare il recipiente ben chiuso – Non respirare le goccioline spruzzate – Evitare il contatto con gli occhi e la pelle – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone – In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Conservare soltanto nel recipiente originale – In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare il medico – Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione – Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione – Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti, sciacquandoli dopo l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi. Blocca la trasmissione nervosa iper stimolando pre.post- sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici e asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
I solventi contenuti nel prodotto possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Terapia sintomatica e di rianimazione.

AVVERTENZA. Il prodotto è sensibile alla luce. Si consiglia quindi di effettuare le applicazioni nelle ore serali.
COMPATIBILITA': Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari alcalini (poltiglia bordolese) oli minerali.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
ATTENZIONE: da non impiegare in agricoltura o comunque su piante destinate all'alimentazione, chi impiega il prodotto è responsabile anche degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone a agli animali

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE** (non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo dalle acque delle aziende agricole e dalle strade).

DA NON VENDERSI SFUSO

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

VERDEVIVO ANTICOCCINIGLIA

(EMULSIONE)
Olio bianco

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Olio minerale bianco (U.R. 95%) .... 80 g (700 g/l)
Coformulanti ....q. b. a 100 g

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa – Usare indumenti e guanti protettivi adatti – In caso di malessere consultare il medico e, se possibile, mostrargli l'etichetta – Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati – Non disfarsi del recipiente e del prodotto se non con le dovute precauzioni – Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle – In caso di contatto con gli occhi lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di malessere chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un olio bianco emulsionato per la lotta primaverile - estiva contro cocciniglie degli agrumi, dei fruttiferi, dell'ulivo, delle piante ornamentali e contro le uova dei ragnetti rossi e gialli, nonché psille ed afidi.
Il VERDEVIVO ANTICOCCINIGLIA serve ottimamente ad esaltare l'azione diserbante dei triazinici nel diserbo del Mais.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
In frutticoltura (pomacee e drupacee)
- a gemma ferma litri 3,4 - 4,6 (pari a Kg 3 - 4) in 100 L di acqua
- all'ingrossamento delle gemme litri 2,3 - 3,4 (pari a Kg 2 -3) in 100 L di acqua
- nel periodo estivo litri 0,9 - 1,1 (pari a Kg 0,8 - 1) in 100 L di acqua

In agrumicoltura e olivicoltura litri 2,9 - 3,4 (pari a Kg 2,5 - 3) in 100 L di acqua
In floricoltura (rose, oleandri....): litri 1,7 - 2,3 (pari a Kg 1,5 - 2) in 100 L di acqua da usarsi in pieno campo.
In aggiunta alle triazine nel diserbo post-emergenza del Mais: il VERDEVIVO ANTICOCCINIGLIA addizionato ai triazinici favorisce la penetrazione del diserbante nelle foglie delle infestanti e ne facilita così l'azione distruttiva, senza provocare fitotossicità sulle piantine di Mais. Il trattamento va eseguito allorché le infestanti hanno raggiunto un'altezza di 10 cm impiegando, oltre alla dose di diserbante, 5 - 10 litri di VERDEVIVO ANTICOCCINIGLIA in volume di acqua di 5 - 6 hl/ha, in maniera da effettuare un'irrorazione uniforme. Il quantitativo di prodotto che serve per il trattamento si stempera in poca acqua e poi, si aggiunge, poco alla volta, la quantità di acqua occorrente.

Compatibilità: il prodotto non è miscibile con gli zolfi bagnabili, i carbammati, il polisolfuro di calcio, il captano, il Karathane, il Folpet, il dinocap, il diclorofluanide, il Dicloran, il chinometionato e il tioquinox.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: il prodotto può provocare rugginosità su mele del gruppo Golden ed altre a buccia rossa.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone e animali.

VERDE VIVO S.r.l.
Piazzale Petrarca, 7 – Padova

Stabilimenti di produzione: DIACHEM S.p.A. - Unità produttiva S.I.F.A. - Caravaggio (BG); **Isagro S.p.A.** - Aprilia (Latina); **Torre S.r.l.** - Torrenieri - Montalcino (SI); **IRCA Service S.p.A.** - Fornovo S. Giovanni (BG); **AgriFormula S.r.l.** - Paganica (L'Aquila); **Isagro Copper S.r.l.** - Adria Cavanella Po (RO)
Per il solo confezionamento: L.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE)

Registrazione Ministero della Salute n° 11432 del 16.09.2002

Contenuto netto: 100 - 150 - 200 - 250 - 500 – 700 ml
1 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17,5 - 20 - 25 litri

Partita n°..........

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.**

DA NON VENDERSI SFUSO

DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. - Padova e da AZF AGRICOLTURA S.r.l. - Padova

VERDEVIVO ANTICOCCINIGLIA

(EMULSIONE)
Olio bianco

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Olio minerale bianco (U.R. 95%).............. 80 g (700 g/l)
Coformulanti....................................q. b. a 100 g

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa – Usare indumenti e guanti protettivi adatti – In caso di malessere consultare il medico e, se possibile, mostrargli l'etichetta – Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati – Non disfarsi del recipiente e del prodotto se non con le dovute precauzioni – Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle – In caso di contatto con gli occhi lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di malessere chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Consultare un centro antiveleni.

Compatibilità: il prodotto non è miscibile con gli zolfi bagnabili, i carbammati, il polisolfuro di calcio, il captano, il Karathane, il Folpet, il dinocap, il diclorofluanide, il Dicloran, il chinometionato e il tioquinox.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: il prodotto può provocare rugginosità su mele del gruppo Golden ed altre a buccia rossa.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone e animali.

VERDE VIVO S.r.l.
Piazzale Petrarca, 7 – Padova

Stabilimenti di produzione: DIACHEM S.p.A. - Unità produttiva S.I.F.A. - Caravaggio (BG); **Isagro S.p.A.** - Aprilia (Latina); **Torre S.r.l.** - Torrenieri - Montalcino (SI); **IRCA Service S.p.A.** - Fornovo S. Giovanni (BG); **AgriFormula S.r.l.** - Paganica (L'Aquila); **Isagro Copper S.r.l.** - Adria Cavanella Po (RO)
Per il solo confezionamento: L.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE)

Registrazione Ministero della Salute n° 11432 del 16.09.2002

Contenuto netto: 100 ml

Partita n°..........

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

DA NON VENDERSI SFUSO

DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. - Padova e da AZF AGRICOLTURA S.r.l. - Padova

VERDEVIVO POLTIGLIA BORDOLESE

Polvere bagnabile

Anticrittogamico rameico

VERDEVIVO POLTIGLIA BORDOLESE

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono
Rame metallo 13 g
(da solfato neutralizzato con calce spenta)
Coformulanti q. b. a 100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazion
Rischio di gravi lesioni oculare –
Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico – Non gettare i residui nelle fognature – Proteggersi gli occhi/la faccia – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Verdevivo S.r.l. – P.zza Petrarca, 7 – PADOVA

STABILIMENTI DI PRODUZIONE: STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA); **Isagro S.p.A.** - Aprilia (Latina); **DIACHEM S.p.A. – U.P. S.I.F.A.** - Caravaggio (BG); **AgriFormula S.r.l.** - Paganica (L'Aquila); **Isagro Copper S.r.l.** - Adria Cavanella Po (RO); **IMC LIMITED** - Naxxar (Malta)

Registrazione Ministero della Salute n° 11433 del 16.09.2002

Contenuto netto: 100 - 200 - 250 - 500 g
1-1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 - 25 Kg

PARTITA N°......

DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. - Padova
AZF AGRICOLTURA S.r.l. - Padova

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emis-sione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE: Il prodotto è un anticrittogamico in polvere bagnabile a base di solfato di rame neutralizzato con calce spenta. VERDEVIVO POLTIGLIA BORDOLESE è efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee ed arboree. Il prodotto si utilizza anche per il contenimento delle alghe e dei molluschi della risaia.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea, se non diversamente specificato. Le concentrazioni indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (1500-1800 l/ha sui fruttiferi, 1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha nelle altre colture). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro.

VITE - Peronospora, Marciume nero degli acini, Melanosi, azione collaterale su Escoriosi e Rossore parassitario. Intervenire alla dose di 1000-1500 g per 100 litri d'acqua in funzione delle condizioni climatiche, piogge, temperature, dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva.

AGRUMI - Cancro gommoso, Antracnosi, Mal secco, Allupatura, Marciume o gommosi del colletto, Batteriosi - azione collaterale nei confronti di Fumaggine. Intervenire mensilmente alla dose di 1000-1500 g per 100 litri d'acqua a partire dalla fine di Gennaio.

Melo - Ticchiolatura: intervenire alla dose di 800-1500 g per 100 litri d'acqua prima della fioritura e dopo la fase di frutto noce, adeguando la cadenza in funzione delle condizioni climatiche, piogge, temperature, dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva; Monilia, Cancro delle pomacee - intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 2000-3000 g per 100 litri d'acqua; Marciume del colletto: 1000-1500 g per 100 litri d'acqua. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.

Pero - Ticchiolatura, Septoriosi: intervenire alla dose di 800-1500 g per 100 litri d'acqua prima della fioritura e dopo la fase di frutto noce, adeguando la cadenza in funzione delle condizioni climatiche, piogge, temperature, dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva; Monilia, Cancro delle pomacee - intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 2000-3000 g per 100 litri d'acqua.
Colpo di fuoco: trattamenti primaverili, estivi e invernali alla dose di 800-1500 g per 100 litri d'acqua.

Cotogno - Monilia, Cancro delle pomacee - intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 2000-3000 g per 100 litri d'acqua.

Mandorlo - Corineo, Monilia - trattamenti invernali alla dose di 2000-3000 g per 100 litri d'acqua.

Albicocco - Corineo, Monilia - trattamenti invernali alla dose di 2000-3000 g per 100 litri d'acqua.

Ciliegio - Monilia, Bolla - trattamenti invernali alla dose di 2000-3000 g per 100 litri d'acqua; Marciume del colletto: 1000-1500 g per 100 litri d'acqua. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.

Pesco, Nettarine e percoche - Corineo, Cancro delle drupacee, Monilia, Bolla - trattamenti invernali alla dose di 2000-3000 g per 100 litri d'acqua.

Susino - Corineo, Monilia, Maculatura batterica - trattamenti invernali alla dose di 2000-3000 g per 100 litri d'acqua.

Fragola - Vaiolatura, Marciume del colletto: intervenire alla ripresa vegetativa alla dose di 700-1500 g per 100 litri d'acqua.

Olivo - Fumaggine, Piombatura, Lebbra, Rogna, Cicloconio o occhio di pavone: intervenire durante il periodo primaverile - estivo alla dose di 800-1500 g per 100 litri d'acqua.

Actinidia - Marciume del colletto: 1000-1500 g per 100 litri d'acqua. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.

Fruttiferi a guscio e fruttiferi minori - Cancri rameali: trattamenti autunno-invernali alla dose di 1500 g per 100 litri d'acqua; trattamenti primaverili - estivi alla dose di 800 - 1200 g per 100 litri d'acqua.

ORTAGGI: Intervenire alla dose di 700-1000 g per 100 litri d'acqua iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.

Bietola da orto, Bietola rossa - Cercospora, Ruggine; **Carota** - Alternariosi; **Rapa, Ravanello** - Ruggine bianca delle crucifere, Peronospora; **Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno** - Peronospora, azione collaterale su: Muffa grigia, Marciumi batterici; **Pomodoro** - Cladosporiosi, Vaiolatura dei frutti, Peronospora, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume nero. Azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi; **Peperone** - Antracnosi, Cancrena pedale, Moria delle piantine, azione collaterale su: Muffa grigia, Marciume molle batterico, Alternariosi; **Melanzana** - Antracnosi, Moria delle piantine, azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi; **Melone, Cocomero, Zucca, Zucchino, Cetriolo, Cetriolino** - Maculatura angolare, Peronospora, azione collaterale su: Muffa grigia, Marciume molle batterico; **CAVOLI** - Ruggine bianca, Marciume molle batterico, Marciume nero, Micosferella, azione collaterale su: Muffa grigia - Alternariosi; **Asparago** - Ruggine, Azione collaterale su: Muffa grigia; **Carciofo, Cardo** - Peronospora della lattuga, azione collaterale su Marciume molle batterico; **Finocchio, Sedano, Prezzemolo** - Cercosporiosi del sedano, Septoriosi del sedano, azione collaterale su Marciume molle batterico; **Altre orticole escluso il porro** - Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Batteriosi.

COLTURE INDUSTRIALI

Oleaginose: Peronospora, antracnosi: 8-12 kg/ha. Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie.

Patata - Peronospora, Alternariosi delle solanacee. Intervenire alla dose di 8-12 kg per ettaro, iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.

Barbabietola da zucchero - Cercospora, Peronospora, Ruggine: intervenire alla dose di 8-12 Kg/ha iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.

Tabacco - Peronospora: intervenire alla dose di 8-12 kg/ha iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.

FLOREALI, ORNAMENTALI - Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Ruggini, Batteriosi. Intervenire alla dose di 800-1500 g per 100 litri d'acqua iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.

Cipresso - Cancro del cipresso: Intervenire alla dose di 2000-4000 g per 100 litri d'acqua quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.

ALTRI IMPIEGHI: Lotta contro le Alghe e i Molluschi della Risaia: intervenire alla dose di 8-12 Kg per ha effettivamente trattato.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Diluire il prodotto in poca acqua a parte, indi versarlo nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri etc.) e con quelli contenenti Thiram.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine e percoche, susino e varietà di melo e di pero cuprosensibili (vedi oltre) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio. Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel. Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard. Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico. **SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO**

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende e delle strade)

DA NON VENDERSI SFUSO

VERDEVIVO POLTIGLIA BORDOLESE
Polvere bagnabile
Anticrittogamico rameico

VERDEVIVO POLTIGLIA BORDOLESE
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
Rame metallo 13 g
(da solfato neutralizzato con calce spenta)
Coformulanti q. b. a 100 g

NOCIVO PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione – Rischio di gravi lesioni oculare – Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico – Non gettare i residui nelle fognature – Proteggersi gli occhi/la faccia – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Verdevivo S.r.l. – P.zza Petrarca, 7 – PADOVA

STABILIMENTI DI PRODUZIONE: STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA); **Isagro S.p.A.** - Aprilia (Latina); **DIACHEM S.p.A. – U.P. S.I.F.A.** - Caravaggio (BG); **AgriFormula S.r.l.** - Paganica (L'Aquila); **Isagro Copper S.r.l.** - Adria Cavanella Po (RO); **IMC LIMITED** - Naxxar (Malta)
Registrazione Ministero della Salute n° 11433 del 16.09.2002

Contenuto netto: 100 g

PARTITA N°......
DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. - Padova
AZF AGRICOLTURA S.r.l. - Padova

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emis-sione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

DA NON VENDERSI SFUSO

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

VERDEVIVO RAME LIQUIDO

Sospensione concentrata - Anticrittogamico rameico

VERDEVIVO RAME LIQUIDO
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono
Rame metallo 25 g (377,5 g/l)
(da ossicloruro tetraramico)
Coformulanti q.b. a 100 g
FRASI DI RISCHIO: Può provocare
Sensibilizzazione per contatto con la pelle –
Altamente tossico per gli acquatici.
Può provocare a lungo termine
effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE — PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

VERDE VIVO S.r.l. – P.zza Petrarca, 7- Padova

Stabilimento di produzione: IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG); **AgriFormula S.r.l.** - Paganica (L'Aquila); **Isagro Copper S.r.l.** - Adria Cavanella Po (RO); **Isagro S.p.A.** - Aprilia (Latina); **DIACHEM S.p.A. – U.P. S.I.F.A.** - Caravaggio (BG); **Torre S.r.l.** - Torrenieri - Montalcino (SI); **LIFA S.r.l.** - Vigonovo (VE); **IMC Limited** – Naxxar (Malta).

Registrazione Ministero della Salute n° 11454 del 09.10.2002
Contenuto netto: 100 - 150 - 200 - 250 - 500 - 700 ml
1-2-2,5- 3- 3,5- 4- 5- 6-7- 8 -9-10-12-14-15-17,5-20-25 litri
Partita N°......
Distribuito da: KOLLANT S.p.A. – Padova
AZF AGRICOLTURA S.r.l. – Padova

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica
Consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE: Il prodotto è un anticrittogamico in sospensione concentrata a base di ossicloruro di rame. VERDEVIVO RAME LIQUIDO è efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee ed arboree. Il prodotto si utilizza anche per il contenimento delle alghe e dei molluschi della risaia.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea, se non diversamente specificato. Le concentrazioni indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (1500-1800 l/ha sui fruttiferi, 1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha nelle altre colture). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro.
VITE - Peronospora, azione collaterale contro Escoriosi, Marciume nero, Melanosi, Rossore parassitario: intervenire preventivamente alla dose di 200-300 ml per 100 l di acqua. In caso di infezioni particolarmente gravi e con tempo molto piovoso la dose può essere innalzata a 400 ml per 100 l di acqua.
AGRUMI - Cancro gommoso, Antracnosi, Mal secco, Allupatura, Marciume o gommosi del colletto, Batteriosi - azione collaterale nei confronti di Fumaggine. Intervenire mensilmente alla dose di 350 ml per 100 litri d'acqua a partire dalla fine di Gennaio.
Melo - Ticchiolatura: intervenire alla dose di 200-300 ml per 100 litri d'acqua prima della fioritura e dopo la fase di frutto noce, adeguando la cadenza in funzione delle condizioni climatiche, piogge, temperature, dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva; Monilia, Cancro delle pomacee - intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 550-700 ml per 100 litri d'acqua; Marciume del colletto: 500-600 ml per 100 litri d'acqua. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
Pero - Ticchiolatura, Septoriosi: intervenire alla dose di 200-300 ml per 100 litri d'acqua prima della fioritura e dopo la fase di frutto noce, adeguando la cadenza in funzione delle condizioni climatiche, piogge, temperature, dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva; Monilia, Cancro delle pomacee - intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 550-700 ml per 100 litri d'acqua; Colpo di fuoco, trattamenti primaverili, estivi e autunnali alla dose di 200-300 ml per 100 litri d'acqua.
Cotogno - Monilia, Cancro delle pomacee - intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 550-700 ml per 100 litri d'acqua.
Mandorlo - Corineo, Monilia - trattamenti invernali alla dose di 550-700 ml per 100 litri d'acqua.
Albicocco - Corineo, Monilia - trattamenti invernali alla dose di 550-700 ml per 100 litri d'acqua.
Ciliegio - Monilia, Bolla - trattamenti invernali alla dose di 550-700 ml per 100 litri d'acqua.
Marciume del colletto: 500-600 ml per 100 litri d'acqua. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
Pesco, Nettarine e percoche - Corineo, Cancro delle drupacee, Monilia, Bolla - trattamenti invernali alla dose di 550-700 ml per 100 litri d'acqua.
Susino - Corineo, Monilia, Maculatura batterica - trattamenti invernali alla dose di 550-700 ml per 100 litri d'acqua.
Fragola - Vaiolatura, Marciume del colletto: intervenire alla ripresa vegetativa alla dose di 350-400 ml per 100 litri d'acqua.
Olivo - Fumaggine, Piombatura, Lebbra, Rogna, Cicloconio o occhio di pavone: intervenire alla dose di 350 ml per 100 l di acqua nelle epoche di maggior rischio infettivo (autunno, primavera).
Actinidia - Marciume del colletto: 500-600 ml per 100 litri d'acqua. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
Fruttiferi a guscio e fruttiferi minori - Cancri rameali: trattamenti autunno-invernali alla dose di 450 ml per 100 litri d'acqua; trattamenti primaverili - estivi alla dose di 350-400 ml per 100 litri d'acqua.
ORTAGGI: Intervenire alla dose di 350-400 ml per 100 l di acqua iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.
Bietola da orto, Bietola rossa - Cercospora, Ruggine; **Carota** - Alternariosi; **Rapa, Ravanello** - Ruggine bianca delle crucifere, Peronospora; **Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno** - Peronospora, azione collaterale su: Muffa grigia, Marciumi batterici; **Pomodoro** - Cladosporiosi, Vaiolatura dei frutti, Peronospora, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume nero. Azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi; **Peperone** - Antracnosi, Cancrena pedale, Moria delle piantine, azione collaterale su: Muffa grigia, Marciume molle batterico, Alternariosi; **Melanzana** - Antracnosi, Moria delle piantine, azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi; **Melone, Cocomero, Zucca, Zucchino, Cetriolo, Cetriolino** - Maculatura angolare, Peronospora, azione collaterale su: Muffa grigia, Marciume molle batterico; **CAVOLI** - Ruggine bianca, Marciume molle batterico, Marciume nero, Micosferella, Peronospora, azione collaterale su: Muffa grigia - Alternariosi; **Asparago** - Ruggine, Azione collaterale su: Muffa grigia; **Carciofo, Cardo** - Peronospora della lattuga, azione collaterale su Marciume molle batterico; **Finocchio, Sedano, Prezzemolo** - Cercosporiosi del sedano Septoriosi del sedano, azione collaterale su Marciume molle batterico; **Altre orticole escluso il porro** - Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Batteriosi.
COLTURE INDUSTRIALI
Oleaginose: Peronospora, antracnosi: 2,5-3 l/ha. Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie.
Patata - Peronospora, Alternariosi delle solanacee. Intervenire alla dose di 2,5-3 litri per ettaro, iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.
Barbabietola da zucchero - Cercospora, Peronospora, Ruggine: intervenire alla dose di 2,5-3 litri per ettaro iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.
Tabacco - Peronospora: intervenire alla dose di 2,5-3 litri per ettaro iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.
FLOREALI, ORNAMENTALI - Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Ruggini, Batteriosi. Intervenire alla dose di 350 ml per 100 litri d'acqua iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.
Cipresso - Cancro del cipresso: Intervenire alla dose di 700-1000 ml per 100 litri d'acqua quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.
ALTRI IMPIEGHI: Lotta contro le Alghe e i Molluschi della Risaia: intervenire alla dose di 2,5-3 litri per ha effettivamente trattato.
COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, etc.) e quelli contenenti Thiram.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine e percoche, susino e varietà di melo e di pero cuprosensibili (vedi oltre) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, commercio. Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard. Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade);

DA NON VENDERSI SFUSO

VERDEVIVO RAME LIQUIDO

Sospensione concentrata - Anticrittogamico rameico

VERDEVIVO RAME LIQUIDO
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono
Rame metallo 25 g (377,5 g/l)
(da ossicloruro tetraramico)
Coformulanti q.b. a 100 g
FRASI DI RISCHIO: Può provocare
Sensibilizzazione per contatto con la pelle –
Altamente tossico per gli acquatici.
Può provocare a lungo termine
effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

VERDE VIVO S.r.l. – P.zza Petrarca, 7- Padova

Stabilimento di produzione: IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG); **AgriFormula S.r.l.** - Paganica (L'Aquila); **Isagro Copper S.r.l.** - Adria Cavanella Po (RO); **Isagro S.p.A.** - Aprilia (Latina); **DIACHEM S.p.A. – U.P. S.I.F.A.** - Caravaggio (BG); **Torre S.r.l.** - Torrenieri - Montalcino (SI); **LIFA S.r.l.** - Vigonovo (VE); **IMC Limited** – Naxxar (Malta).

Registrazione Ministero della Salute n° 11454 del 09.10.2002

Contenuto netto: 100 ml

Partita N°......
Distribuito da: KOLLANT S.p.A. – Padova
AZF AGRICOLTURA S.r.l. – Padova

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica
Consultare un centro antiveleni.
COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, etc.) e quelli contenenti Thiram.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

DA NON VENDERSI SFUSO

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

VERDEVIVO ZOLFO MICRO

Granuli idrodispersibili
ANTIOIDICO A BASE DI ZOLFO

VEDEVIVO ZOLFO MICRO
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
Zolfo puro (esente da selenio) 80 g
Coformulanti q. b. a 100 g

FRASI DI RISCHI: Irritante per gli occhi, la pelle e le vie respiratorie.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

VERDE VIVO S.r.l.
P.zza Petrarca 7 – Padova

Stabilimenti di produzione: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina) / **STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.** - Cotignola (RA).
Persolo confezionamento: L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) / **L.I.F.A. S.r.l.** – Isola Vicentina (VI)

Registrazione Ministero della Salute n° 11455 del 09.10.2002

Contenuto netto: 100-200-250-500 g
1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6-7-8-9-10-12-14-15-20-25 Kg

Partita N°......
DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. - Padova
AZF AGRICOLTURA S.r.l. - Padova

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di malessere chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
CARATTERISTICHE
Il VERDEVIVO ZOLFO MICRO è un fungicida antioidico a base di zolfo, indicato per trattamenti liquidi a fruttiferi, ortaggi, cereali, colture industriali, floreali, ornamentali. VERDEVIVO ZOLFO MICRO è adatto per l'impiego in strategie antiresistenza, in alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. Il prodotto esplica anche una azione collaterale nei confronti della Ticchiolatura del melo e degli acari. VERDEVIVO ZOLFO MICRO è particolarmente selettivo nei confronti delle colture, anche a dosi alte. La formulazione in granuli idrodispersibili rende l'utilizzo del prodotto estremamente semplice e sicuro, oltre che facilitare le operazioni di dosaggio.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il VERDEVIVO ZOLFO MICRO si impiega quando le condizioni diventano favorevoli alle infezioni oidiche. I migliori risultati si ottengono con trattamenti preventivi, in assenza di sintomi manifesti. Gli interventi vanno ripetuti secondo necessità, in funzione delle condizioni ambientali, dello sviluppo vegetativo e della pressione infettiva.
VITE - Oidio (*Uncinula necatrix*): Trattamenti preventivi alle seguenti dosi: 400-200 g per 100 l di acqua. Nelle situazioni di alta pressione infettiva e/o in programmi che prevedono l'alternanza di VERDEVIVO ZOLFO MICRO con principi attivi a differente meccanismo d'azione è possibile aumentare la dose a 600-800 g per 100 litri di acqua. Per gli usi alla dose massima vedere anche alla voce "fitotossicità".
POMACEE - Oidio (*Podosphaera spp.*) e la Ticchiolatura (*Venturia inaequalis e V. pirina*): 500-200 g per 100 l di acqua iniziando i trattamenti in primavera ed adottando dosi gradualmente decrescenti. Dopo la fioritura adottare la dose di 200-300 g per 100 litri di acqua.
DRUPACEE - Oidio (*Sphaerotheca pannosa, Podosphaera tridactyla*):400-600 g per 100 l di acqua prima della fioritura e dopo la raccolta; 200 g per 100 l di acqua dopo la fioritura sino alla raccolta.
FRAGOLA - Oidio (*Sphaerotheca macularis*). Intervenire alla comparsa dei sintomi alle seguenti dosi: 200-300 g per 100 l di acqua in funzione della pressione infettiva. Dopo la fioritura è consigliabile impiegare la dose più bassa. In situazioni di particolari
NOCCIOLO - Oidio (*Phyllactinia suffata*). Intervenire alla comparsa dei sintomi alle seguenti dosi: 200-300 g per 100 l di acqua in funzione della pressione infettiva. Nelle situazioni di alta pressione infettiva e/o in programmi che prevedono l'alternanza di VERDEVIVO ZOLFO MICRO con principi attivi a differente meccanismo d'azione è possibile aumentare la dose a 500 g per 100 litri di acqua - **Eriofide** (*Phytocoptella avellanae*): 200-300 g per 100 l di acqua in funzione della gravità dell'attacco. Intervenire 3-4 volte ogni 15 giorni a partire dall'emissione delle prime foglie.
ORTAGGI, FLOREALI ed ORNAMENTALI - Oidio Intervenire alla comparsa dei sintomi alle seguenti dosi: 150-250 g per 100 l di acqua in funzione della gravità dell'attacco. Impiegare la dose più alta in pre-fioritura. Nelle situazioni di alta pressione infettiva e/o in programmi che prevedono l'alternanza di VERDEVIVO ZOLFO MICRO con principi attivi a differente meccanismo d'azione è possibile aumentare la dose a 500 g per 100 litri di acqua.
POMODORO - Acaro rugginoso (*Aculops lycopersici*) Intervenire ad inizio attacco alle seguenti dosi: 200-300 g per 100 l di acqua in funzione della gravità dell'attacco. Impiegare la dose più alta in pre-fioritura.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - Oidio (*Microsphaera betae*): Intervenire alla comparsa dei sintomi alle seguenti dosi: 6-8 Kg per ettaro. Ripetere il trattamento dopo circa tre settimane.
CEREALI - Oidio (*Erysiphe spp.*) Intervenire dopo la comparsa dei sintomi alle seguenti dosi: 6-8 Kg per ettaro.
TABACCO - Oidio (*Erysiphe spp.*) Intervenire dopo la comparsa dei sintomi alle seguenti dosi: 125-150 g per 100 litri di acqua. Effettuare 2-3 trattamenti distanziati di circa 10 giorni.
QUERCIA - Oidio (*Microsphoera quercina*): 300 g per 100 l di acqua nei trattamenti invernali; 100-200 g per 100 l di acqua nei trattamenti primaverili - estivi. Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale. Effettuando i trattamenti con pompe a volume ridotto (somministrando cioè un minor quantitativo di acqua per ettaro) le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire per unità di superficie la stessa quantità di prodotto che si somministrerebbe a volume normale.
PREPARAZIONE DELLA MISCELA: Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice, mantenuto in costante agitazione. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere alla miscela 50 ml per ettolitro di bagnante-adesivo non ionico.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, *etc.*), oli minerali, Captano, Diclorvos.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar di: MELE (Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden Delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red – Winesap); PERE (Buona Luisa d'Avranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio); VITE: L'impiego alla dose massima (800 g per 100 litri di acqua) è risultato completamente selettivo sulle seguenti varietà: Canaiolo, Trebbiano, Malvasia, Chardonnay, Cabernet, Pinot, Merlot. Non impiegare il prodotto alla dose massima su varietà diverse da quelle indicate prima di aver effettuato saggi preliminari su piccole superfici o aver consultato il personale tecnico; CUCURBITACEE: può essere fitotossico. Irrorare a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano. Non effettuare i trattamenti in estate, durante le ore più calde del giorno.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE**

DA NON VENDERSI SFUSO

VERDEVIVO ZOLFO MICRO

Granuli idrodispersibili
ANTIOIDICO A BASE DI ZOLFO

VEDEVIVO ZOLFO MICRO
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
Zolfo puro (esente da selenio)80 g
Coformulanti q. b. a 100 g

IRRITANTE

FRASI DI RISCHI: Irritante per gli occhi, la pelle e le vie respiratorie.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

VERDE VIVO S.r.l.
P.zza Petrarca 7 – Padova

Stabilimenti di produzione: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina) / **STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.** - Cotignola (RA).
Persolo confezionamento: L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) / **L.I.F.A. S.r.l.** – Isola Vicentina (VI)

Registrazione Ministero della Salute n° 11455 del 09.10.2002

Contenuto netto: 100 g

Partita N°......
DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. - Padova
AZF AGRICOLTURA S.r.l. - Padova

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di malessere chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, *etc.*), oli minerali, Captano, Diclorvos.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

DA NON VENDERSI SFUSO
PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

VERDEVIVO RAME MICRO

Granuli idrodispersibili
Anticrittogamico rameico

VERDEVIVO RAME MICRO
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rame metallo (da ossicloruro tetraramico) 50 g
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, nè bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

VERDE VIVO S.r.l.
P.zza Petrarca, 7 – PADOVA

STABILIMENTI DI PRODUZIONE: ISAGRO S.p.A. - Aprilia (Latina); **STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.** - Cotignola (RA); **IMC Limited** – Naxxar (Malta); **L.I.F.A. S.r.l. -** Vigonovo (VE); **L.I.F.A. S.r.l.** – Isola Vicentina (VI)

Registrazione Ministero della Salute n° 11464 del 14.10.2002
Contenuto netto: 100 - 200 – 250 - 500 g
1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 - 25 Kg
Partita N°......
Distribuito da: KOLLANT S.p.A. – Padova
AZF AGRICOLTURA S.r.l. – Padova

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un anticrittogamico granuli idrodispersibili a base di ossicloruro di rame. VERDEVIVO RAME MICRO è efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee ed arboree. Il prodotto si utilizza anche per il contenimento delle alghe e dei molluschi della risaia. La formulazione in granuli idrodispersibili ne rende l'utilizzo semplice e sicuro.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea, se non diversamente specificato. Le concentrazioni indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (1500-1800 l/ha sui fruttiferi, 1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha nelle altre colture). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro.
VITE - Peronospora, azione collaterale contro Escorios, Marciume nero, Melanosi, Rossore parassitario: intervenire preventivamente alla dose di 150-250 g per 100 l di acqua. In caso di infezioni particolarmente gravi e con tempo molto piovoso la dose può essere innalzata a 180-300 g per 100 litri d'acqua.
AGRUMI - Cancro gommoso, Antracnosi, Mal secco, Allupatura, Marciume o gommosi del colletto, Batteriosi - azione collaterale ne confronti di Fumaggine. Intervenire mensilmente alla dose di 200-250 g per 100 litri d'acqua a partire dalla fine di Gennaio.
Melo - Ticchiolatura: intervenire alla dose di 150-200 g per 100 litri d'acqua prima della fioritura e dopo la fase di frutto noce, adeguando la cadenza in funzione delle condizioni climatiche piogge, temperature, dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva; Monilia, Cancro delle pomacee - intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 400-450 g per 100 litri d'acqua; Marciume del colletto: g 300-400 per 100 litri d'acqua. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
Pero - Ticchiolatura, Septoriosi: intervenire alla dose di 150-200 g per 100 litri d'acqua prima della fioritura e dopo la fase di frutto noce, adeguando la cadenza in funzione delle condizioni climatiche piogge, temperature, dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva; Monilia, Cancro delle pomacee - intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 400-450 g per 100 litri d'acqua; Colpo di fuoco, trattamenti primaverili-estivi ed autunnali alla dose di 150-200 g per 100 litri d'acqua.
Cotogno - Monilia, Cancro delle pomacee - intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 400-450 g per 100 litri d'acqua.
Mandorlo - Corineo, Monilia - trattamenti invernali alla dose di 400-450 g per 100 litri d'acqua.
Albicocco - Corineo, Monilia - trattamenti invernali alla dose di 400-450 g per 100 litri d'acqua.
Ciliegio - Monilia, Bolla - trattamenti invernali alla dose di 400-450 g per 100 litri d'acqua; Marciume del colletto: g 300-400 per 100 litri d'acqua. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
Pesco, Nettarine e percoche - Corineo, Cancro delle drupacee, Monilia, Bolla - trattamenti invernali alla dose di 400-450 g per 100 litri d'acqua.
Susino - Corineo, Monilia, Maculatura batterica - trattamenti invernali alla dose di 400-450 g per 100 litri d'acqua
Fragola - Vaiolatura, Marciume del colletto: intervenire alla ripresa vegetativa alla dose di 150-200 g per 100 litri d'acqua.
Olivo - Fumaggine, Piombatura, Lebbra, Rogna, Cicloconio o occhio di pavone: intervenire durante il periodo primaverile - estivo alla dose di 200 g per 100 litri d'acqua.
Actinidia - Marciume del colletto: g 300-400 per 100 litri d'acqua. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
Fruttiferi a guscio e fruttiferi minori - Cancri rameali: trattamenti autunno-invernali alla dose di 350 g per 100 litri d'acqua; trattamenti primaverili - estivi alla dose di 150 - 200 g per 100 litri d'acqua.

ORTAGGI
Intervenire alla dose di 200-250 g per 100 litri d'acqua iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.
Bietola da orto, Bietola rossa - Cercospora, Ruggine; **Carota -** Alternariosi; **Rapa, Ravanello -** Ruggine bianca delle crucifere, Peronospora; **Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno -** Peronospora, azione collaterale su: Muffa grigia, Marciumi batterici; **Pomodoro -** Cladosporiosi, Vaiolatura dei frutti, Peronospora, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume nero. Azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi; **Peperone -** Antracnosi, Cancrena pedale, Moria delle piantine, azione collaterale su: Muffa grigia, Marciume molle batterico, Alternariosi; **Melanzana -** Antracnosi, Moria delle piantine, azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi; **Melone, Cocomero, Zucca, Zucchino, Cetriolo, Cetriolino -** Maculatura angolare, Peronospora, azione collaterale su: Muffa grigia, Marciume molle batterico; **CAVOLI -** Ruggine bianca, Marciume molle batterico, Marciume nero, Micosferella, azione collaterale su: Muffa grigia - Alternariosi; **Asparago -** Ruggine, Azione collaterale su: Muffa grigia; **Carciofo, Cardo -** Peronospora della lattuga, azione collaterale su Marciume molle batterico; **Finocchio, Sedano, Prezzemolo -** Cercosporiosi del sedano Septoriosi del sedano, azione collaterale su Marciume molle batterico; **Altre orticole escluso il porro -** Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Batteriosi.

COLTURE INDUSTRIALI
Oleaginose Peronospora antracnosi: 2-2,5 kg/ha. Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie.
Patata - Peronospora, Marciume molle, Alternariosi delle solanacee. Intervenire alla dose di 2-2,5 kg per ettaro, iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.
Barbabietola da zucchero - Cercospora, Peronospora, Ruggine: intervenire alla dose di 2-2,5 Kg/ha iniziando i iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.
Tabacco - Peronospora: intervenire alla dose di 2-2,5 kg/ha iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.
FLOREALI, ORNAMENTALI - Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Ruggini, Batteriosi. Intervenire alla dose di 200-250 g per 100 litri d'acqua iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.
Cipresso - Cancro del cipresso: Intervenire alla dose di 600-750 g per 100 litri d'acqua quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.

ALTRI IMPIEGHI
Lotta contro le Alghe e i Molluschi della Risaia: intervenire alla dose di 2-2,5 Kg per ha effettivamente trattato.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, etc.) e quelli contenenti Thiram.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine e percoche, susino e varietà di melo e di pero cuprosensibili (vedi oltre) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del Canada Rosa Mantovana, commercio.
Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.
Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico.
NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per i pesci.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

DA NON VENDERSI SFUSO

VERDEVIVO RAME MICRO

Granuli idrodispersibili
Anticrittogamico rameico

VERDEVIVO RAME MICRO
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rame metallo (da ossicloruro tetraramico) 50 g
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature –Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

VERDE VIVO S.r.l.
P.zza Petrarca, 7 – PADOVA

STABILIMENTI DI PRODUZIONE: ISAGRO S.p.A. - Aprilia (Latina); **STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.** - Cotignola (RA); **IMC Limited** – Naxxar (Malta); **L.I.F.A. S.r.l.** - Vigonovo (VE); **L.I.F.A. S.r.l.** – Isola Vicentina (VI)

Registrazione Ministero della Salute n° 11464 del 14.10.2002

Contenuto netto: 100 g

Partita N°......
Distribuito da: KOLLANT S.p.A. – Padova
AZF AGRICOLTURA S.r.l. – Padova

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA en-dovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.
COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, etc.) e quelli contenenti Thiram.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

DA NON VENDERSI SFUSO

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

VERDEVIVO RAMEICO

Fungicida rameico in polvere bagnabile

VERDE VIVO RAMEICO

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono
Rame metallico 16,0 g
(sotto forma di ossicloruro di rame e calcio)
Coformulanti q.b. a 100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione – Altamente tossico per gli acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – In caso c'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

VERDE VIVO S.r.l.
P.zza Petrarca, 7 - PADOVA

STABILIMENTI DI PRODUZIONE: Isagro Copper S.r.l. – Adria Cavanella Po (RO); **Isagro S.p.A.** – Aprilia (Latina); **DIACHEM S.p.A. U.P. S.I.F.A.** – Caravaggio (BG); **IMC LIMITED** - Naxxar (Malta)

Registrazione Ministero della Salute n° 11465 del 14.10.2002

Contenuto netto: 100 - 200 - 250 - 500 g
1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 - 25 Kg

Partita n° .....

Distribuito da: KOLLANT S.p.A.. – Padova
AZF AGRICOLTURA S.r.l. – Padova

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintom : denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA en-dovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un anticrittogamico in polvere bagnabile a base di ossicloruro di rame e calcio. VERDEVIVO RAMEICO è efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee ed arboree. Il prodotto si utilizza anche per il contenimento delle alghe e dei molluschi della risaia e per la concia delle sementi di frumento.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea, se non diversamente specificato. Le concentrazioni indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (1500-1800 l/ha sui fruttiferi, 1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha nelle altre colture). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro.

VITE - Peronospora, Marciume nero degli acini, Melanosi, azione collaterale su Escoriosi, Rossore parassitario. Intervenire alla dose di 600-1000 g per 100 litri d'acqua in funzione delle condizioni climatiche, piogge, temperature, dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva.

AGRUMI - Cancro gommoso, Antracnosi, Mal secco, Allupatura, Marciume o gommosi del colletto, Batteriosi - azione collaterale nei confronti di Fumaggine. Intervenire mensilmente alla dose di 600-1000 g per 100 litri d'acqua a partire dalla fine di Gennaio.

Melo - Ticchiolatura: intervenire alla dose di 600-1000 g per 100 litri d'acqua prima della fioritura e dopo la fase di frutto noce, adeguando la cadenza in funzione delle condizioni climatiche, piogge, temperature, dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva; Monilia, Cancro delle pomacee - intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 2000-3000 g per 100 litri d'acqua; Marciume del colletto: 1000-1500 g per 100 litri d'acqua. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.

Pero - Ticchiolatura, Septoriosi: intervenire alla dose di 600-1000 g per 100 litri d'acqua prima della fioritura e dopo la fase di frutto noce, adeguando la cadenza in funzione delle condizioni climatiche, piogge, temperature, dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva; Monilia, Cancro delle pomacee - intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 2000-3000 g per 100 litri d'acqua; Colpo di fuoco, trattamenti primaverili, estivi e autunnali alla dose di 600-1000 g per 100 litri d'acqua.

Cotogno - Monilia, Cancro delle pomacee - intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 2000-3000 g per 100 litri d'acqua.

Mandorlo - Corineo, Monilia - **trattamenti** invernali alla dose di 2000-3000 g per 100 litri d'acqua.

Albicocco - Corineo, Monilia - trattamenti invernali alla dose di 2000-3000 g per 100 litri d'acqua.

Ciliegio - Monilia, Bolla - trattamenti invernali alla dose di 2000-3000 g per 100 litri d'acqua.

Marciume del colletto: 1000-1500 g per 100 litri d'acqua. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.

Pesco, Nettarine e percoche - Corineo, Cancro delle drupacee, Monilia, Bolla - trattamenti invernali alla dose di 2000-3000 g per 100 litri d'acqua.

Susino - Corineo, Monilia, Maculatura batterica - trattamenti invernali alla dose di 2000-3000 g per 100 litri d'acqua.

Fragola - Vaiolatura. Marciume del colletto: intervenire alla ripresa vegetativa alla dose di 600-1000 g per 100 litri d'acqua.

Olivo - Fumaggine, Piombatura, Lebbra, Rogna, Cicloconio o occhio di pavone: intervenire durante il periodo primaverile - estivo alla dose di 800-1000 g per 100 litri d'acqua.

Actinidia - Marciume del colletto: 1000-1500 g per 100 litri d'acqua. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.

Fruttiferi a guscio e fruttiferi minori - Cancri rameali: trattamenti autunno-invernali alla dose di 1200 g per 100 litri d'acqua; trattamenti primaverili - estivi alla dose di 600 - 1000 g per 100 litri d'acqua.

ORTAGGI

Intervenire alla dose di 600-1000 g per 100 litri d'acqua iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.

Bietola da orto, Bietola rossa - Cercospora, Ruggine; **Carota** - Alternariosi; **Rapa, Ravanello -** Ruggine bianca delle crucifere, Peronospora; **Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno -** Peronospora, azione collaterale su: Muffa grigia, Marciumi batterici; **Pomodoro -** Cladosporiosi, Vaiolatura dei frutti, Peronospora, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume nero. Azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi; **Peperone** - Antracnosi, Cancrena pedale, Moria delle piantine, azione collaterale su: Muffa grigia, Marciume molle batterico, Alternariosi; **Melanzana -** Antracnosi, Moria delle piantine, azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi; **Melone, Cocomero, Zucca, Zucchino, Cetriolo, Cetriolino** - Maculatura angolare, Peronospora, azione collaterale su: Muffa grigia, Marciume molle batterico; **CAVOLI -** Ruggine bianca, Marciume molle batterico, Marciume nero, Micosferella, azione collaterale su: Muffa grigia - Alternariosi; **Asparago -** Ruggine, Azione collaterale su: Muffa grigia; **Carciofo, Cardo** - Peronospora della lattuga, azione collaterale su Marciume molle batterico; **Finocchio, Sedano, Prezzemolo -** Cercosporiosi del sedano, Septoriosi del sedano, azione collaterale su Marciume molle batterico; **Altre orticole escluso il porro -** Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Batteriosi.

COLTURE INDUSTRIALI

Oleaginose: Peronospora, Antracnosi: 6-9 kg/ha. Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie.

Patata - Peronospora, Alternariosi delle solanacee. Intervenire alla dose di 8-12 kg per ettaro, iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.

Barbabietola da zucchero - Cercospora, Peronospora, Ruggine: intervenire alla dose di 8-12 Kg/ha iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.

Tabacco - Peronospora: intervenire alla dose di 8-12 kg/ha iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.

FLOREALI, ORNAMENTALI - Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Ruggini, Batteriosi. Intervenire alla dose di 600-1000 g per 100 litri d'acqua iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.

Cipresso - Cancro del cipresso: Intervenire alla dose di 2000-3000 g per 100 litri d'acqua quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.

ALTRI IMPIEGHI

Lotta contro le Alghe e i Molluschi della Risaia: intervenire alla dose di 8-12 Kg per ha effettivamente trattato.

TRATTAMENTI MEDIANTE IMPOLVERATRICI

Il prodotto si può impiegare anche in trattamenti polverulenti (ad esempio in miscela con zolfo ventilato) alla dose di 6-9 kg di formulato per ettaro, in miscela alla quantità di zolfo normalmente utilizzata.

CONCIA DELLE SEMENTI

Frumento - Carie. Miscelare a secco 200 g di prodotto per 100 kg di semente. I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Diluire il prodotto in poca acqua a parte, indi versarlo nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, ecc.) e con quelli contenenti Tiram.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOSSICITÀ

Non trattare in fioritura.

Non trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine e percoche, susino e varietà di melo e di pero cuprosensibili (vedi oltre) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, commercio.

Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico.

NOCIVITÀ

Il prodotto è nocivo per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO; **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).**

DA NON VENDERSI SFUSO

VERDEVIVO RAMEICO

Fungicida rameico in polvere bagnabile

VERDE VIVO RAMEICO
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
Rame metallico 16,0 g
(sotto forma di ossicloruro di rame e calcio)
Coformulanti q.b. a 100 g

NOCIVO PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione – Altamente tossico per gli acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

VERDE VIVO S.r.l.
P.zza Petrarca, 7 - PADOVA

STABILIMENTI DI PRODUZIONE: Isagro Copper S.r.l. – Adria Cavanella Po (RO); **Isagro S.p.A.** – Aprilia (Latina); **DIACHEM S.p.A. U.P. S.I.F.A.** – Caravaggio (BG); **IMC LIMITED** - Naxxar (Malta)
Registrazione Ministero della Salute n° 11465 del 14.10.2002

Contenuto netto: 100 g

Partita n° .....
Distribuito da: KOLLANT S.p.A.. – Padova
AZF AGRICOLTURA S.r.l. – Padova

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA en-dovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.
COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, ecc.) e con quelli contenenti Tiram.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

DA NON VENDERSI SFUSO

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

VERDEVIVO SELETTIVO

SOLUZIONE ERBICIDA SELETTIVA PER IL CONTROLLO DELLE MALERBE
NEI CEREALI (MAIS, GRANO, ORZO, AVENA), NELLE ASPARAGIAIE, NEL MELO, NEI PRATI ORNAMENTALI E NEI PASCOLI

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Dicamba puro .... 21,2 g (240 g/l)
Coformulanti .... q. b. a 100 g

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. **Terapia**: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un erbicida che svolge la sua azione alterando il metabolismo enzimatico delle malerbe con cui giunge a contatto. Il prodotto viene assorbito per via fogliare e radicale e traslocato in tutta la pianta dalla circolazione linfatica. Date queste sue caratteristiche il prodotto è in grado di controllare anche le malerbe dicotiledoni perennanti quali *Convolvulus arvensis* e *Cirsium arvense*. La sua azione si estende poi alla generalità delle malerbe annuali quali: *Amaranthus retroflexus, Anagallis arvensis, Ajuga spp., Atriplex patula, Capsella bursa pastoris, Centaurea cyanus, Chenopodium album, Fallopia conv., Fumaria officinalis, Galeopsis tetrahit., Galinsoga parviflora, Galium aparine, Matricaria chamomilla, Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Polygonum persicaria, Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Senecio vulgaris, Solanum nigrum, Spergula arvensis, Stellaria media, Thlaspi arvense, Urtica urens, Veronica spp., Vicia spp., Abutilon theophrasti.*
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
MELO: Distribuire il prodotto evitando di colpire la chioma, eventuali spruzzi sul tronco e sulle piante lignificate non causano danni alle colture. Dose: 1-1,5 l/ha.
ASPARAGO: Il prodotto si impiega in primavera, prima dell'emergenza dei turioni. Il trattamento va eseguito preferibilmente su terreno sarchiato e leggermente umido. Dose applicativa: 0,2-0,6 l/ha. Il prodotto, per una razionale distribuzione, va diluito in 5-6 quintali di acqua per ha.
PRATI ORNAMENTALI E PASCOLI: Distribuire il prodotto sulle chiazze di infestanti che si vogliono eliminare alla dose di 1-1,2 l/ha, preferibilmente in primavera o fine estate.
AVVERTENZE: Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature versando il residuato nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento
COMPATIBILITA': Qualora le condizioni operative lo richiedano, il prodotto può essere impiegato in miscela con Mcpa e Mecoprop, a dosi dimezzate.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per gli impieghi e le colture non indicate in etichetta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI PRIMA DEL RACCOLTO 30 GIORNI PER IL MELO, 20 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE.
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

VERDE VIVO S.r.l.
Piazzale Petrarca 7 - PADOVA

Stabilimento di produzione: **DIACHEM S.p.A. – U.O. S.I.F.A.** - Caravaggio (BG); **Torre S.r.l.** - Torrenieri (SI); **IRCA Service S.p.A.** - Fornovo S. Giovanni (BG); **AgriFormula S.r.l.** - Paganica (L'Aquila); **Isagro S.p.A.** - Aprilia (Latina); **L.I.F.A. S.r.l.** di Vigonovo (VE) e Isola Vicentina (VI).

Registrazione Ministero della Salute n° 11586 del 06.02.2003

Contenuto netto: 50 - 70 – 75 - 100 – 150 – 200 – 250 – 500 – 700 ml
1 – 2 – 2,5 – 3 3,5 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10 – 12 – 14 – 15 – 17,5 – 20 – 25 litri

Partita n°......

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE**

DA NON VENDERSI SFUSO

DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. – Padova e AZF AGRICOLTURA S.r.l. – Padova

VERDEVIVO SELETTIVO

SOLUZIONE ERBICIDA SELETTIVA PER IL CONTROLLO DELLE MALERBE
NEI CEREALI (MAIS, GRANO, ORZO, AVENA), NELLE ASPARAGIAIE, NEL MELO, NEI PRATI ORNAMENTALI E NEI PASCOLI

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Dicamba puro .... 21,2 g (240 g/l)
Coformulanti .... q. b. a 100 g

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. **Terapia**: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

AVVERTENZE: Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature versando il residuato nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento
COMPATIBILITA': Qualora le condizioni operative lo richiedano, il prodotto può essere impiegato in miscela con Mcpa e Mecoprop, a dosi dimezzate.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI PRIMA DEL RACCOLTO 30 GIORNI PER IL MELO, 20 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE.
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

VERDE VIVO S.r.l.
Piazzale Petrarca 7 - PADOVA

Stabilimento di produzione: DIACHEM S.p.A. – U.O. S.I.F.A. - Caravaggio (BG); **Torre S.r.l.** - Torrenieri (SI); **IRCA Service S.p.A.** - Fornovo S. Giovanni (BG); **AgriFormula S.r.l.** - Paganica (L'Aquila); **Isagro S.p.A.** - Aprilia (Latina); **L.I.F.A. S.r.l.** di Vigonovo (VE) e Isola Vicentina (VI).

Registrazione Ministero della Salute n° 11586 del 06.02.2003

Contenuto netto: 50 - 70 – 75 - 100 ml

Partita n°......

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

DA NON VENDERSI SFUSO

DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. – Padova e AZF AGRICOLTURA S.r.l. – Padova

VERDEVIVO DODINA MICRO

GRANULI IDRODISPERSIBILI

Fungicida organico, preventivo e curativo, per la difesa di colture arboree, orticole, floreali, ornamentali e del pioppo

VERDEVIVO DODINA MICRO

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
Dodina pura .... 40 g
Coformulanti ed inerti .... q.b. a 100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione – Irritante per la pelle – Rischio di gravi lesioni oculari – Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico – Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

VERDE VIVO
Piazzale Petrarca, 7 – PADOVA

Stabilimenti di produzione: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina) / **STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.** - Cotignola (RA) / **IMC Limited** - Naxxar (Malta)

Registrazione Ministero della Salute n° 11664 del 18.04.2003

CONTENUTO NETTO: 100 - 200- 250 - 500 g
1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 - 25 Kg

Partita N°.....
DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. - Padova e AZFAGRICOLTURA S.r.l. - Padova

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; irritazione di cute e mucose (dermatiti,congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia. Terapia: sintomatica. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE: Fungicida specifico ad azione translaminare per la lotta preventiva e curativa di numerose malattie delle colture frutticole, orticole, floricole e del pioppo. La formulazione in granuli idrodispersibili ne facilita l'impiego e ne aumenta l'adesività alla coltura.
MODALITÀ D'IMPIEGO
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (1500-1800 litri per ettaro per i fruttiferi, 1000 per la vite, 1000-1500 per il pioppo, 600-800 per le altre colture). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni in modo da distribuire la stessa quantità di prodotto per ettaro. Utilizzare le dosi più elevate in caso di condizioni favorevoli alla malattia e nel caso di trattamenti curativi.
FRUTTIFERI
- Pomacee: (Melo, Pero, Nespolo): contro Ticchiolatura: trattamenti preventivi: 80-100 g/hl; trattamenti curativi (entro 48-60 ore dalla pioggia infettante, in funzione della temperatura): 120-150 g/hl.
- Drupacee:
Pesco: Bolla e Corineo 150-200 g/hl (intervenire in autunno all'80% della caduta delle foglie ed in inverno all'ingrossamento delle gemme apicali); Monilia, Muffa grigia, Ruggine, Ticchiolatura, Bolla, Corineo 80-150 g/hl (trattamenti preventivi in pre-fioritura, post-fioritura, pre-raccolta).
Ciliegio: Cilindrosporiosi, Antracnosi 100 g/hl; Monilia, Muffa grigia 100-150 g/hl. I trattamenti vanno effettuati preventivamente.
Albicocco: Ruggine e Monilia trattamenti preventivi 80-150 g/hl.
Vite: Peronospora 100-180 g/hl (effettuare i trattamenti preventivi ad intervalli di 7-10 giorni).
Olivo: Cicloconio (Occhio di Pavone) 100-180 g/hl (intervenire in maniera preventiva almeno due volte, in primavera alla ripresa vegetativa delle gemme a legno e in autunno tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre).
Fragola: Botrite e Vaiolatura 120-150 g/hl.
COLTURE ORTICOLE
- Cipolla: Peronospora: trattamenti preventivi 100 g/hl; trattamenti curativi – eradicanti 150-200 g/hl.
Sulle seguenti colture orticole intervenire in trattamenti preventivi
- Spinacio: Peronospora e Ramularia 100-150 g/hl.
- Sedano: Septoria, Peronospora, Cercospora 150-200 g/hl.
- Finocchio, Carota, Basilico - Septoria, Peronospora, Cercospora 150 g/hl.
- Pomodoro: Peronospora, Septoria 150 g/hl; Fusariosi applicare il prodotto al piede della pianta alla dose di 200 g/hl.
- Cucurbitacee (Cocomero, Melone, Cetriolo, Zucca, Zucchino): Peronospora, Antracnosi 150-200 g/hl.
- Patata: Peronospora 150 g/hl.
COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI
- Garofano: Fusariosi: trattamenti preventivi 100-150 g/hl; trattamenti curativi, da applicare alla base della pianta 200 g/hl.
- Rosa: Ticchiolatura: trattamenti preventivi 100-120 g/hl; trattamenti curativi 150-200 g/hl.
PIOPPO: Marssonina 150-200 g/hl (Intervenire alla fine di Aprile e nella seconda metà di Maggio, ripetere eventualmente dopo 3-4 settimane).
COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con i clorobenzilati, e con i prodotti a reazione alcalina. Non è consigliabile miscelarlo con Carbaryl, Dimetoato e Azinfos metile e DDVP. Le miscele con liquidi emulsionabili a base di esteri fosforici e oli minerali possono dare luogo a scarsa sospensività. Evitare i trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0° gradi centigradi.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: Su mele cv. Golden Delicious il prodotto può essere fitotossico a dosi superiori a 0,05%.
Avvertenza: da non impiegare in fioritura. Non fare pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o indirettamente prima che siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMNENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).**

DA NON VENDERSI SFUSO

VERDEVIVO DODINA MICRO

GRANULI IDRODISPERSIBILI

Fungicida organico, preventivo e curativo, per la difesa di colture arboree, orticole, floreali, ornamentali e del pioppo

VERDEVIVO DODINA MICRO

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
Dodina pura .... 40 g
Coformulanti ed inerti .... q.b. a 100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione – Irritante per la pelle – Rischio di gravi lesioni oculari – Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico – Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

VERDE VIVO
Piazzale Petrarca, 7 – PADOVA

Stabilimenti di produzione: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina) **/ STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. -** Cotignola (RA) **/ IMC Limited -** Naxxar (Malta)

Registrazione Ministero della Salute n° 11664 del 18.04.2003

CONTENUTO NETTO: 100 g

Partita N°.....
DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. - Padova e AZFAGRICOLTURA S.r.l. - Padova

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; irritazione di cute e mucose (dermatiti,congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia. Terapia: sintomatica. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con i clorobenzilati, e con i prodotti a reazione alcalina. Non è consigliabile miscelarlo con Carbaryl, Dimetoato e Azinfos metile e DDVP. Le miscele con liquidi emulsionabili a base di esteri fosforici e oli minerali possono dare luogo a scarsa sospensività. Evitare i trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0° gradi centigradi.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMNENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

DA NON VENDERSI SFUSO

SILLIM

LIMACIDA IN GRANULI ESTRUSI

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
Metaldeide pura 5 g
Coformulanti q. b. a 100 g

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI:: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone – In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica uomo circa 50 mg/Kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali.
Terapia: sintomatica.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Per le coltivazioni in pieno campo: leggere e medie infestazioni: Kg 6-10 per Ha, forti infestazioni (40-50 individui per mq) Kg 15 per Ha.
Per le colture orticole: il prodotto si impiega distribuendo 10 granuli per mq.
È consigliabile spargere il prodotto lungo il perimetro del campo su una striscia larga circa m 1,50; internamente a questa striscia il prodotto si sparge più rado.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo.
RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Si raccomanda pertanto di far trascorrere almeno 20 giorni dal trattamento prima di far pascolare il bestiame in zone trattate od alimentarlo con prodotti che direttamente od accidentalmente siano venuti a contatto con il formulato.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

VERDE VIVO S.r.l.
P.zza Petrarca, 7 – PADOVA

Stabilimenti di produzione:
Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina); **L.I.F.A.** - Vigonovo (Venezia); **L.I.F.A.** - Isola Vicentina (Vicenza).

Registrazione Ministero della Sanità n° 2272 del 14/01/1977

Contenuto netto: 200- 250 – 500 g / 1 - 5 - 10 - 20 - 25 Kg

Partita numero: ....

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE**

DA NON VENDERSI SFUSO

DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. - Padova e AZF AGRICOLTURA S.r.l. - Padova

RANSOM®

(GRANULARE)
ERBICIDA SELETTIVO GRANULARE

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Dichlobenil puro 6,75 g
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI ORUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il RANSOM è un formulato indicato per il diserbo selettivo dei vigneti e degli oliveti, nonché per il diserbo totale di bordi stradali, viali, contro: Amaranto, Spica venti, Artemisia, Borsa del pastore, Cerastio, Farinaccio, Stoppione, Gramigna, Cipero, Giavone, Senape, Romice, Centocchio, Erba porcellana, Ortica.
La formulazione granulare facilita la distribuzione del prodotto.
Il RANSOM può essere usato in trattamenti di pre o di post-emergenza delle infestanti. L'epoca di impiego più consigliabile va dall'inizio dell'autunno alla fine dell'inverno.
Agendo in post-emergenza l'efficacia del prodotto si manifesta circa 2 settimane dopo l'applicazione.
Il trattamento dovrà comunque essere effettuato con temperatura fresca e su terreno umido. Piogge ed irrorazioni per aspersione favoriranno la penetrazione del formulato nel terreno migliorandone l'efficacia. L'incorporamento del prodotto ad una profondità di 4-6 cm con una zappatura aumenta l'efficacia e la durata di azione del formulato.
Poiché i risultati dell'applicazione sono strettamente dipendenti da una buona distribuzione dei granuli, bisogna aver cura di distribuire uniformemente il prodotto.
MODALITÀ DI IMPIEGO
Il RANSOM è un formulato che grazie alla efficacia del suo principio attivo ed alla durata dell'effetto erbicida, è indicato per il diserbo selettivo dei vigneti e degli oliveti, nonché per il diserbo totale di campi sportivi, bordi stradali, strade ferrate, viali, fosse ed aree industriali contro: *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Apèra spica-venti* (Spica venti), *Artemisia vulgaris* (Artemisia), *Capsella bursa-pastoris*, (Borsa del pastore), *Cerastium arvense* (Cerastio), *Chenopodium album* (Farinaccio), *Cirsium spp.* (Stoppione), *Cynodon dactylon* (Gramigna), *Cyperus spp.* (Cipero), *Echinochloa crus-galli* (Giavone), *Sinapis arvensis* (Senape), *Rumex spp.* (Romice), *Stellaria media* (Centocchio), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Urtica dioica* (Ortica).
La formulazione granulare facilita la distribuzione del prodotto sia a mano che a macchina.
Il RANSOM può essere usato tutto l'anno in trattamenti di pre o di post-emergenza delle infestanti. L'epoca di impiego più consigliabile va dall'inizio dell'autunno alla fine dell'inverno.
Nel caso si debba impiegare il RANSOM in piena estate, si dovrà effettuare l'interramento del prodotto subito dopo l'applicazione. Agendo in post-emergenza l'efficacia del prodotto si manifesta circa 2 settimane dopo l'applicazione.
Il trattamento dovrà comunque essere effettuato con temperatura fresca e su terreno umido. Piogge ed irrorazioni per aspersione favoriranno la penetrazione del formulato nel terreno migliorandone l'efficacia. L'incorporamento del prodotto ad una profondità di 4-6 cm con una fresa o con un erpice a dischi o con zappatura, aumenta l'efficacia e la durata di azione del formulato.
Poiché i risultati dell'applicazione sono strettamente dipendenti da una buona distribuzione dei granuli, bisogna aver cura di distribuire uniformemente il prodotto.
DOSI DI IMPIEGO
Su vite ed olivo: 80-100 Kg/Ha. La dose di impiego dovrà essere aumentata a 120 Kg/Ha se il terreno da diserbare si presenta totalmente ricoperto dalle infestanti, specialmente quando fra esse predominano il Convolvolo e la Gramigna.
Si sconsiglia di usare il RANSOM nei vigneti di età inferiore ai quattro anni e nei vivai. Il trattamento deve essere effettuato nel periodo autunno-invernale e, comunque, non oltre un mese prima della ripresa vegetativa. Nel caso che il diserbo selettivo debba essere ripetuto per due anni consecutivi sullo stesso terreno e che il primo intervento sia stato effettuato impiegando le dosi massime, nel secondo anno queste dovranno essere ridotte del 20%.
Si sconsiglia di effettuare il trattamento su terreni molto permeabili (ciottolosi, sabbiosi). Nel caso si debba impiegare il prodotto su terreni in pendio, si consiglia di interrarlo subito dopo la distribuzione, onde evitare che la pioggia possa trasportarlo verso altre colture e, comunque, determinare accumuli su zone più basse.
Interventi localizzati sui Romici: Per distruggere piante isolate di Romice che vegetano in campi di medica, trifoglio, campi da golf, prati, basta porre 2-3 grammi di prodotto attorno al colletto della pianta. Si consiglia di non impiegare il prodotto per questo specifico uso in prati di primo impianto per non provocare danni alla giovane vegetazione e nei prati vecchi poco prima della rottura per evitare che i residui dell'erbicida possano danneggiare la coltura che segue.
Diserbo totale di aree industriali: Da 150 Kg/Ha se si devono combattere infestanti annuali, biennali o perenni sensibili come Equiseto, Romice, Ranuncolo, Senecio, Sonco, Senape, a 250 Kg/Ha se si devono combattere infestanti molto resistenti come Gramigna, Cipero, Convolvolo.
Diserbo dei canali e degli argini delle risaie: Per il diserbo dei canali Kg 25-35 per 1.000 mq. Il prodotto va distribuito sul fondo quando è stata tolta l'acqua dal canale ed il terreno è ancora umido oppure con acqua bassa e ferma. In quest'ultimo caso, l'acqua dei canali potrà essere utilizzata per l'irrigazione solo 20 giorni dopo il trattamento mentre nel primo caso i 20 giorni dovranno decorrere dal momento in cui viene ripristinato il normale livello dell'acqua. Per gli argini delle risaie, preferibilmente dopo la loro sistemazione, si consiglia l'impiego di Kg 20 per 2000-2300 metri di argine largo 50 cm.
COMPATIBILITÀ: Dato la formulazione granulare il RANSOM non viene impiegato in miscela con altri prodotti. Si raccomanda di non contaminare con il formulato antiparassitari in genere e concimi.
FITOTOSSICITÀ: Il RANSOM non agisce per via fogliare e perciò non causa danno alle colture nel caso dovesse venire a contatto con gli organi verdi delle piante. Non contaminare con il prodotto patate e sementi.
AVVERTENZE: Usare guanti di gomma per la manipolazione e la distribuzione del prodotto se questo viene distribuito a spaglio. Al termine delle operazioni lavare accuratamente con acqua e soda tutti i recipienti e gli utensili agricoli adoperati per l'impiego del prodotto.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
ATTENZIONE: Impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

VERDE VIVO S.r.l.
P.zza Petrarca, 7 – Padova

Stabilimenti di produzione: FitoFormula S.r.l. - Aprilia (Latina) / **CROMPTON EUROPE BV** - Amsterdam (Paesi Bassi).
Stabilimenti di confezionamento: L.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE) / **STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.** - Cotignola (RA) / **TORRE S.p.A.** - Torrenieri (SI) / **Società BAM di Benazzi e Uttini S.n.c.** - San Patrizio di Conselice (Ravenna)

Registrazione Ministero della Sanità n° 6113 del 19/10/1984

Contenuto: 500 g / 1 - 5 - 10 - 20 - 25 Kg
Partita numero: ....
- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMNENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE**

DA NON VENDERSI SFUSO

DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. – Padova
AZF AGRICOLTURA S.r.l. – Padova

FURACON 5 G FIORI

GEODISINFESTANTE SISTEMICO GRANULARE

FURACON 5 G FIORI

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Benfuracarb puro 4,7 g
Coformulanti q. b. a 100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e contatto con la pelle – Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

VERDE VIVO S.r.l.
P.zza Petrarca, 7 – Padova

Stabilimenti di produzione:
FitoFormula S.r.l. - Aprilia (Latina) / **SIPCAM S.p.A.** - Salerano sul Lambro (Lodi) / **I. M.C. Limited** - Naxxar (Malta)

Registrazione Ministero della Sanità n° 6661 del 08.04.1986

Contenuto netto: 1 – 5 – 10 – 25 kg

Partita numero: ....

DISTRIBUITO da: KOLLANT S.p.A. - Padova e AZF AGRICOLTURA S.r.l. - Padova

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).
Sintomi di intossicazione: Nausea vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare. Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg. 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno terapia se vi è cianosi.
CONTROINDICAZIONI: Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.
Consultare un Centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: FURACON 5 G FIORI è un insetticida granulare, ad ampio spettro di azione, per la geodisinfestazione del terreno. Dotato di elevata sistemicità, FURACON 5 G FIORI viene assorbito dalle radici e traslocato in tutti gli organi della pianta. La sua attività è pertanto duplice, controllando sia gli insetti terricoli, ferretti, nottue, maggiolino, atomaria, oziorrinco, grillotalpa, bibio, sia parassiti della parte aerea quali afidi, tripidi, aleurodidi. FURACON 5 G FIORI ha una elevata azione di contenimento delle popolazioni di nematodi fitoparassiti.
COLTURE PROTETTE: Tutte le ornamentali e le floricole.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Contro insetti ed artropodi terricoli
- per trattamenti localizzati sulle file di semina o di trapianto: 10 Kg/Ha;
- per trattamenti su tutta la superficie: 40-50 Kg/Ha.

Contro i nematodi liberi e galligeni
- per trattamenti su tutta la superficie: 150-200 Kg/Ha.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto va impiegato da solo.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE** (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

DA NON VENDERSI SFUSO

NORDOX Industrier AS

□

COBRE NORDOX SUPER 75 WG

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

ANTICRITTOGAMICO CUPRICO

Fungicida micronizzato a base di rame ossido per irrorazioni su fruttiferi, agrumi, vite, barbabietola da zucchero, olivi, ortaggi e fiori

COBRE NORDOX SUPER 75 WG

Registrazione Ministero della Sanità n.10632 del 6/12/2000

Composizione

RAME METALLO	g. 75
(sotto forma di ossido)	
Coformulanti q.b. a	g. 100

NORDOX Industrier AS
Oslo (Norvegia)

rappresentata in Italia da:
COMERCIAL
QUÌMICA MASSÒ S.A.
Barcellona (Spagna)

Distribuito da:
CHIMASSÒ ITALIA srl
Via Milanese, 20
20099 Sesto S. Giovanni (MI)

ATENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONTENUTO NETTO **g 250-500 Kg 1-5-10-20**
Partita n.

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
NORDOX Industrier AS - Oslo (Norvegia)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Cotignola (RA)
COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A. - Barcellona (Spagna)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negative per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso d'ingestioneconsultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle instruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

NORME PRECAUZIONALI: Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il COBRE NORDOX SUPER 75 WG, grazie alla particolare formulazione in granuli idrodispersibili, è dotato di elevata efficacia, persistenza ed adesività. Il prodotto è attivo contro tutte le malattie crittogamiche delle colture arboree ed erbacee, sensibili al rame.

COLTURE, PARASSITI CONTROLLATI E DOSI D'IMPIEGO

COLTURA	MALATTIE	EPOCHE D'IMPIEGO	DOSI
Melo e Pero	ticchiolatura, batteriosi	- trattamenti di fine inverno - trattamenti pre-fiorali	200 g/hl 135-170 g/hl
	cancro dei rami	- trattamenti invernali	270-300 g/hl
Pesco e drupacee in genere	bolla, corineo, bozzacchioni, batteriosi, marciume bruno	- trattamenti invernali	270-300 g/hl
Albicocco	sclerotinia, corineo	- trattamenti pre-fiorali - trattamenti post-fiorali	135-170 g/hl 170-250 g/hl
Ciliegio	sclerotinia, corineo, scopazzi	- trattamenti pre-fiorali	135-170 g/hl
Nespolo	brusone	- trattamenti preventivi	135-170 g/hl
Nocciolo	batteriosi	- trattamenti preventivi	135-170 g/hl
Vite	peronospora	- trattamenti pre-fiorali e post-fiorali - trattamenti di "chiusura"	170-200 g/hl 200-250 g/hl
Olivo	occhio di pavone e lebbra	- trattamenti primaverili-estivi ed autunno-invernali	170-250 g/hl
Agrumi	allupatura, mal secco	- interventi da gennaio a maggio e all'invaiatura	135-250 g/hl
Actinidia	marciume del colletto	- trattamenti preventivi	200 g/hl
Barbabietola da zucchero	cercospora	- 1-2 trattamenti (pieno accrescimento e prossimità raccolta)	2,3-2,6 Kg/ha
Pomodoro e Patata	peronospora, alternaria, batteriosi	trattamenti preventivi	135-200 g/hl
Sedano	ticchiolatura, septoria	trattamenti preventivi	135-200 g/hl
Pisello e Fagiolo	antracnosi, ruggine, batteriosi	trattamenti preventivi	135-200 g/hl
Asparago	ruggine	trattamenti preventivi	135-200 g/hl
Cipolla	peronospora	trattamenti preventivi	135-200 g/hl
Cavoli, Carciofo, Cardo, Cicoria, Cucurbitacee, Spinacio, Cece	peronospora	trattamenti preventivi	135-170 g/hl
Rosa, garofano, crisantemo e altre floricole	peronospora, ticchiolatura, ruggine	trattamenti preventivi	135-270 g/hl

Le dosi sopra indicate si riferiscono a trattamenti a volume normal

COMPATIBILITÀ - Il COBRE NORDOX SUPER 75 WG è miscibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra o leggermente alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ - Non impiegare durante la fioritura. Il prodotto è fitotossico su alcune varietà di Melo* e Pero** sensibili ai prodotti cuprici. (*) Abbondanza Belfort, Black Stayman Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana. (**) Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Doll. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.
RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per i pesci, è nocivo per gli insetti utili, animali domestici e bestiame.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.
AVVERTENZE: Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO. CONSERVARE ALL'ASCIUTTO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

FIELD FARM S.r.l.

CUPROCIM FF

Fungicida in polvere bagnabile ad azione citotropica translaminare impiegato contro la Peronospora, l'Alternaria l'Antracnosi, la Septoria e le Batteriosi

CUPROCIM FF
Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
CYMOXAMIL puro………………… …….gr. 2
RAME metallo
(sotto forma di solfato neutralizzato alla calce spenta) ...gr. 13,6
Coformulanti……………..q.b. a …… ….. gr. 100

NOCIVO

Pericoloso per l'ambien-

FRASI DI RISCHIO : Nocivo per inalazione – Rischio di gravi lesioni oculari – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici – Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, nè fumare durante l'impiego In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico- Non gettare i residui nelle fognature Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi /la faccia In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: FIELD FARM s.r.l. Via Colle Dell'Ara, 25 –66010 (CHIETI)
Officina di produzione e/o confezionamento: TERRANALISI SRL CENTO (FE) – STI SOLFOTECNICA ITALIANA SPA COTIGNOLA (RA) – TORRE SRL TORRENIERI (SI) – MANICA SPA ROVERETO (TN) LA CORNUBIA S.A BORDEAUX FRANCE – CHEMIA SPA S. AGOSTINO (FE)
Taglie di confezione: KG 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15-20
Registrazione n° 9979 del 05.03.99 del Ministero della Sanità
Partita n. : ……………………..

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cymoxanil 3% e Rame metallo 20% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: **Cymoxanil -** derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria, Terapia: sintomatica.
Rame metallo, Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile, oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
AVVERTENZA: Consultare un centro Antiveleni

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
Fungicida in formulazione polvere bagnabile costituito da due principi attivi che agiscono per contatto e con azione endoterapica (citotropica translaminare), penetrando in modo completo nei tessuti vegetali entro 6 ore dal trattamento.
Viene impiegato contro la Peronospora, l'Alternaria, l'Antracnosi, la Septoria, le Batteriosi e con effetto secondario contro la muffa grigia (Botrytis cinerea)
VITE: gr. 500-600 dose per q.le d'acqua
CARCIOFO – PATATA - POMODORO – CIPOLLA - AGLIO, - PORRO – GIRASOLE – SOIA - LATTUGA - ROSA – ZUCCHINO – MELONE - PISELLO – SPINACIO - TABACCO: gr. 600-800 dose per q.le d'acqua.
Si tratta da quando si hanno i primi sintomi di infezione della malattia e ripetendo ad ogni necessità

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con prodotti a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura Il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO DEL CARCIOFO; 28 GIORNI PER SOIA E GIRASOLE; 20 GIORNI PER TUTTE LE ALTRE COLTURE.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n. 65/2003).
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua;
Non operare contro vento;
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.).

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

FIELD FARM
PER L'AGRICOLTURA

CUPROCIM FF

Fungicida in polvere bagnabile ad azione citotropica translaminare impiegato contro la Peronospora, l'Alternaria l'Antracnosi.

CUPROCIM FF

Composizione 100 grammi di prodotto contengono:

CYMOXANIL puro	gr 3
RAME metallo (sotto forma di solfato neutralizzato alla calce spenta)	gr 13,6
Coformulanti q.b. a	gr 100

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO : Nocivo per **inalazione** – Rischio di gravi lesioni oculari – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle Altamente tossico per gli organismi acquatici Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico- Non gettare i residui nelle fognature Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi /la faccia In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: FIELD FARM s.r.l. Via Colle Dell'Ara, 25 –66010 (CHIETI)

Officina di produzione e/o confezionamento: TERRANALISI SRL CENTO (FE) STI SOLFOTECNICA ITALIANA SPA COTIGNOLA (RA) TORRE SRL TORRENIERI (SI) MANICA SPA ROVERETO (TN) LA CORNUBIA S.A BORDEAUX FRANCE CHEMIA SPA S. AGOSTINO (FE)

Taglie di confezione: KG 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15-20

Registrazione n° 9979 del 05.03.99 del Ministero della Salute Partita n. : ....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cymoxanil 3% e Rame metallo 20% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: **Cymoxanil** - derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria, Terapia: sintomatica.

Rame metallo, Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile, oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo: per il resto terapia sintomatica.

AVVERTENZA: Consultare un centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO'
ESSERE RIUTILIZZATO

FIELD FARM

THIOLAC DF

Zolfo micronizzato sotto forma di microgranuli idrodispersibili contro le forme di Oidio in frutticoltura, viticoltura, orticoltura e floricoltura

THIOLAC DF
Composizione
100 gr. di prodotto contengono
ZOLFO puro (esente da selenio) gr. 80
Disperdenti e bagnanti q.b. a gr. 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi e le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: FIELD FARM SRL VIA COLLE DELL'ARA, 25 66100 CHIETI
REGISTRAZIONE N. 10896 DEL 20.04.2001 DEL MINISTERO DELLA SANITA'
OFFICINA DI PRODUZIONE: AGROSTULLN GmbH STULLN (GERMANIA) - SULPHUR MILLS LTD BOMBAY INDIA
TAGLIE DI CONFEZIONE: Kg. 0,1 0,2 0,5 - 1 5 10 15 20 25
PARTITA N. ____________________

NORME PRECAUZIONALI: non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento.
INFORMAZIONI MEDICHE: in caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: (riferite a 100 litri di acqua salvo diversa indicazione)
VITICOLTURA: trattamenti preventivi: gr. 200-400; trattamenti ad infezione da Oidio avvenuta: gr. 400-500.
FRUTTICOLTURA: pomacee: trattamenti prefiorali: gr. 200-500; in fioritura e post-fiorali: gr. 200-300: Pesco, Susino, Ciliegio, Agrumi: gr. 200-500.
ORTICOLTURA: Patate, Pomodoro, Bietole, Cavoli, Fragole, Cucurbitacee, gr. 200-500.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: Kg. 8/Ha effettuando il primo trattamento alla comparsa dei sintomi ed effettuando i successivi ad intervalli di 15-20 giorni.
CEREALI: Kg. 8/Ha intervenendo alla comparsa della malattia sulle ultime due foglie del culmo.
GIRASOLE – SOIA – TABACCO: Kg. 4-6/Ha.
VIVAI DI PIOPPO: gr. 200-400.
COLTURE FLOREALI – ORNAMENTALI – FORESTALI: gr. 150-400 intervenendo ai primi sintomi della malattia.
Preparazione della poltiglia: mettere in un recipiente il quantitativo di prodotto necessario, aggiungere 1-2 litri di acqua per chilo di THIOLAC DF e agitare fino ad ottenere un liquido cremoso che dovrà essere versato nella botte, (con l'agitatore in funzione), entro 30 minuti dalla sua preparazione, quindi portare a volume con acqua mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' : THIOLAC DF non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese), con oli minerali, DNOC, Captano, DDVP, Binapacryl, Diclofluanide. Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano. Non applicare su colture sofferenti o stressate. Mantenere l'agitatore sempre in funzione.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': THIOLAC DF può arrecare danno alle seguenti cultivars: MELO: (Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap,); PERO: (Buona Luigia d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio); VITE: (Sangiovese); CUCURBITACEE: (può essere fitotossico);

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del formulato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n. 65/2003).
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

FIELD FARM
PER L'AGRICOLTURA

THIOLAC DF

Zolfo micronizzato sotto forma di microgranuli idrodispersibili contro le forme di Oidio in frutticoltura, viticoltura, orticoltura e floricoltura

THIOLAC DF

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono

ZOLFO puro (esente da selenio)		gr. 80
Disperdenti e bagnanti	q.b. a	gr. 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi e le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: FIELD FARM SRL VIA COLLE DELL'ARA, 25 66100 CHIETI
REGISTRAZIONE N. 10896 DEL 20.04.2001 DEL MINISTERO DELLA SANITA'
OFFICINA DI PRODUZIONE: AGROSTULLN GmbH STULLN (GERMANIA) - SULPHUR MILLS LTD BOMBAY INDIA
TAGLIE DI CONFEZIONE: Kg. 0,1 0,2 0,5 - 1 5 10 15 20 25
PARTITA N. ____________________

NORME PRECAUZIONALI: non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI MEDICHE: in caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

FIELD FARM

BORDEAUX 2-F

Anticrittogamico cuprico. Tipo di formulazione: Polvere bagnabile

BORDEAUX 2-F
Composizione: 100 grammi di prodotto contengono:
Rame metallo (da solfato, neutralizzato alla calce) gr. 20
Coformulanti q.b. a gr. 100

IRRITANTE

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: FIELD FARM SRL VIA COLLE DELL'ARA, 25 CHIETI
OFFICINE DI PRODUZIONE E/O CONFEZIONAMENTO: Sti Solfotecnica Italiana Spa COTIGNOLA (RA) – Sti Solfotecnica Italiana Spa TORRENIERI (SI) – Terranalisi srl CENTO (FE) – Manica Spa ROVERETO (TN) - Industria Chimica Scarmagnan Sas MINERBE (VR) - La Cornubia s.a. BORDEAUX (France) – Chemia Spa S. AGOSTINO (FE)
Registrazione n. 11412 del 23.07.2002 del Ministero della Salute
TAGLIE DI CONFEZIONI: KG. 0,1 1 5 10 20 25 Partita n.: …………………

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina, se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.**

CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO:
BORDEAUX 2-F è un fungicida polivalente a base di solfato di rame neutralizzato alla calce indicato per combattere le crittogame delle seguenti colture:
VITE : contro Peronospora, Botrite, alla dose di 1 kg/hl;
MELO: contro Ticchiolatura, Cancri rameali, alla dose di 0,6-0,7 kg/hl;
PERO: contro Ticchiolatura, Fumaggine, Ruggine, Maculatura bruna, Cancri rameali, Marciumi del colletto, alla dose di 0,6-0,7 kg/hl; per trattamenti in vegetazione;
DRUPACEE. (ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO, PESCO-NETTARINE, MANDORLO): contro Bolla, Monilia, Fumaggine, Corineo, Cladosporiosi, Cancri rameali, Batteriosi alla dose di 0,6-0,7 kg/hl;
OLIVO: contro Occhio di pavone, Rogna, Lebbra, alla dose di 0,7-0,8 kg/hl;
AGRUMI: contro Mal secco, Antracnosi, Allupatura, Fumaggine alla dose di 0,7-0,8 kg/hl;
POMODORO: contro Septoriosi, Peronospora, Cladosporiosi, Botrite, Batteriosi, Alternaria, alla dose di 0,6-0,7 kg/hl;
PATATA: contro Peronospora, Alternaria, alla dose di 0,6-0,7 kg/hl;
FAGIOLO – PISELLO: contro Peronospora, Antracnosi, Ruggine, Batteriosi, alla dose di 0,5-/0,6 kg/hl;
CAVOLI – CAVOLFIORI – CAVOLI DI BRUXELLES – BROCCOLI: contro Peronospora e Alternaria alla dose di 0,5-0,6 kg/hl;
CAROTA: contro Alternaria alla dose di 0,5-0,6 kg/hl ;
SEDANO – FINOCCHIO: contro Peronospora, Septoria e Cercospora, alla dose di 0,5-0,6 kg/hl;
MELANZANA: contro Alternaria e Peronospora alla dose di 0,5-0,6 kg/hl;
CETRIOLO: contro Peronospora, Antracnosi, Cladosporiosi e Batteriosi, alla dose di 0,5-0,6 kg/hl;
MELONE ANGURIA: contro Peronospora e Antracnosi, alla dose di 0,5-0,6 kg/hl;
CIPOLLA –AGLIO: contro Peronospora e Alternaria, alla dose di 0,5 -0,6 kg/hl;
INSALATA – CARDO – CARCIOFO: contro Peronospora e Alternaria, alla dose di 0,5-0,6 kg/hl;
ROSA: contro Ticchiolatura, Peronospora, Ruggine e Fumaggine, alla dose di 0,6-0,7 kg/hl;
CICLAMINO: contro Antracnosi e Maculatura fogliare, alla dose di 0,6-0,7 kg/hl;
FILODENDRO: contro le Batteriosi, alla dose di 0,6-0,7 kg/hl;
COLTURE FORESTALI: contro Fumaggine, Cancri rameali, alla dose di 0,8-1 kg/hl;
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Ruggine, Cercospora, Alternaria, alla dose di 0,7-0,8 kg/hl;
OLEAGINOSE: contro Peronospora, Alternaria, Sclerotinia, alla dose di 0,7-0,8 kg/hl;
FRAGOLA: contro Vaiolatura, Phytophthora, Colletotrichum, Botrite, Antracnosi, Batteriosi, Alternaria, alla dose di 0,7-0,8 kg/hl;
TABACCO: contro Peronospora, Alternaria alla dose di 0,6-0,7 kg/hl;
CEREALI: contro Septoriosi, Ruggine alla dose di 0,7-0,8 kg/hl;
Nell'impiego autunno -invernale sulle pomacee e drupacee il formulato viene impiegato alla dose di kg 1,5-2 per quintale d'acqua.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITÀ : Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Non trattare durante la fioritura su cultivar di Pesco, Susino, e varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cupro –sensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Non trattare su Vite quando la temperatura è inferiore ai 6-8°.
NOCIVITA' : Il prodotto è tossico per i pesci
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
DURATA DELLA REGISTRAZIONE:
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da usi improprio del preparato.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.Lvo n. 65/2003)
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.).

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

FIELD FARM
PER L'AGRICOLTURA

BORDEAUX 2-F

Anticrittogamico cuprico. Tipo di formulazione: Polvere bagnabile

BORDEAUX 2-F
Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Rame metallo gr. 20
(da solfato, neutralizzato alla calce)
Coformulanti q.b. a gr. 100

IRRITANTE

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego Non gettare i residui nelle fognature Usare indumenti protettivi e guanti adatti In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: FIELD FARM SRL VIA COLLE DELL'ARA, 25 CHIETI
OFFICINE DI PRODUZIONE E/O CONFEZIONAMENTO: Sti Solfotecnica Italiana Spa COTIGNOLA (RA)
Sti Solfotecnica Italiana Spa TORRENIERI (SI) Terraralisi srl CENTO (FE) Manica Spa ROVERETO (TN)
Industria Chimica Scarmagnan Sas MINERBE (VR) - La Cornubia s.a. BORDEAUX (France) -
Chemia Spa S. AGOSTINO (FE)
Registrazione n. 11412 del 23.07.2002 del Ministero della Salute
TAGLIE DI CONFEZIONI: KG. 0,1 1 5 10 20 25 Partita n.: ....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina, se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

FIELD FARM

PHYTON – 27

Anticrittogamico con particolari caratteristiche di formulazione che consentono l'impiego a dosi molto ridotte. Sospensione concentrata

PHYTON – 27
Composizione
Rame Metallo puro 5,5% (=60g/l)
sotto forma di Rame Solfato pentahydrato
Coformulanti q.b. a 100

IRRITANTE — Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi e la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare ne bere ne fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti . In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: FIELD FARM SRL VIA COLLE DELL'ARA, 25 66100 CHIETI ITALIA
OFFICINE DI PRODUZIONE E/O CONFEZIONAMENTO: TIRO INDUSTRIES INC. MINNEAPOLIS U.S.
SOURCE TECH. BIO. INC. EDINA MINNESOTA U.S.
Registrazione N. 11615 del 03.03.03 del Ministero della Salute
TAGLIE DI CONFEZIONI: ML 20 – 60 – 100 – 250 - 500 LITRI 1 – 3,8 – 10
Partita n. : ……………………..

NORME PRECAUZIONALI:
Non contaminare altre colture bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento .
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica. **AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.**

CARATTERISTICHE: PHYTON – 27 è un anticrittogamico a base di Solfato di Rame pentahydrato in sospensione concentrata con particolari caratteristiche di formulazione che consentono l'impiego a dosi molto ridotte.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO (riferite a 100 litri d'acqua)
PHYTON – 27 è un anticrittogamico da impiegarsi nella lotta delle malattie crittogamiche sulle seguenti colture:
FRUTTIFERI: VITE: contro Peronospora e con azione di contenimento verso l'Oidio, alla dose di ml. 100-150 intervenendo ogni 7-10 giorni. In caso di forte attacco della malattia attenersi alla dose massima e ridurre l'intervallo di trattamento.
MELO PERO: contro Ticchiolatura e Maculatura Bruna, con azione di contenimento verso Erwinia amilovora (colpo di fuoco batterico), alla dose di ml. 150 (lt. 1,5/ha) intervenendo ogni 7-10 giorni dalle prime fasi vegetative fino alla raccolta in base all'andamento climatico. L'applicazione ripetuta esplica un'azione biostimolante sulla pianta.
NESPOLO: contro la Ticchiolatura alla dose di ml. 150 (lt. 1,5/ha) , iniziando i trattamenti alla piena ripresa vegetativa.
ORTIVE : POMODORO-PEPERONE-MELANZANA-PATATA–FAGIOLO-PISELLO-SPINACIO-LATTUGA-INDIVIA-RADICCHIO-CARDO-CARCIOFO-MELONE-ANGURIA-CETRIOLO-SEDANO-FINOCCHIO-CAROTA-CIPOLLA-AGLIO-ZUCCA-ZUCCHINO: contro Peronospora alla dose di ml. 150. Iniziare i trattamenti al verificarsi delle condizioni per lo sviluppo della malattia, proseguendo in funzione dell'andamento climatico e dello sviluppo della vegetazione
CAVOLI-CAVOLFIORI-CAVOLI DI BRUXELLES-BROCCOLI: contro la Peronospora alla dose di ml. 150. Iniziare le applicazioni dopo il trapianto o dopo l'emergenza delle coltivazioni seminate, ad intervalli di 10-15 giorni in funzione delle condizioni climatiche. Alle dosi più alte potrebbero verificarsi, in alcune varietà, leggeri arrossamenti delle foglie vecchie dei broccoli e delle macchie sulle foglie esterne dei cavoli. Per una maggiore efficacia del prodotto si consiglia l'impiego dei seguenti volumi di soluzione: colture ortive: litri 600-1000/ettaro - Vite litri 600-1000/ettaro.
FLORICOLTURA: GERBERA-CICLAMINO-ROSA-CRISANTEMO-GAROFANO-BULBOSE-GERANIO-ORTENSIA-PRIMULA-CINERARIA-FICUS ELASTICA-STATICE-VIOLA CIOCCHE-GIPSOFILA-PIANTE GRASSE-BEGONIA POINSETTIA-ORCHIDEA-CALLA-IMPATIENS– AZALEA-RHODODENTRO-PIANTE ORNAMENTALI-FIORI RECISI: contro Peronospora alla dose di ml 100-150/hl. Iniziare i trattamenti alla comparsa dell'attacco e ripetere in funzione dell'andamento climatico e dello sviluppo della vegetazione. Impiegato alla dose di ml 150/hl ed intervenendo preventivamente ogni 7-10 giorni il prodotto esplica azione di contenimento nei confronti di Oidio e Muffa grigia.
ROSA: contro Oidio e Macchie nere alla dose di ml. 150/hl; intervenire preventivamente ogni 7-10 giorni
FIORI RECISI DI ROSA: contro Muffa Grigia intingere i fiori recisi/boccioli per pochi secondi in una soluzione di ml. 90/hl.
CALLA: contro Erwinia Carotovora immergere i bulbi per 5 minuti in una soluzione di ml. 250/hl e lasciarli asciugare prima di sotterrarli.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
ISTRUZIONI PER L'USO: agitare bene il prodotto prima di miscelare nell'acqua. Addizionare la dose prescritta nella quantità d'acqua necessaria. Miscelare per circa due minuti, dopo quattro ore miscelare di nuovo se la poltiglia non è stata impiegata. Non impiegare la miscela dopo 48 ore. **Impiegare il prodotto solo con attrezzature che non si corrodono.**
COMPATIBILITA': sulla base delle conoscenze attuali è consigliabile che il prodotto venga applicato da solo cioè non in miscela con altri prodotti antiparassitari o concimi fogliari.
FITOTOSSICITA': Non si deve trattare durante la fioritura. Non trattare piante in condizioni di stress (siccità), con temperature troppo alte o basse o in caso di escursioni termiche. Non è fitotossico sulle più comuni varietà di pero cuprosensibili in qualsiasi stato fenologico.
NOCIVITA': PHYTON – 27 è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n. 65/2003)
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. (non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.).

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

FIELD FARM PER L'AGRICOLTURA

PHYTON – 27

Anticrittogamico con particolari caratteristiche di formulazione che consentono l'impiego a dosi molto ridotte. Sospensione concentrata

PHYTON – 27
Composizione
Rame Metallo puro 5,5% (=60g/l)
sotto forma di Rame Solfato pentahydrato
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi e la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE

Pericoloso per l'ambiente

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare ne bere ne fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti . In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: FIELD FARM SRL VIA COLLE DELL'ARA. 25 66100 CHIETI ITALIA
OFFICINE DI PRODUZIONE E/O CONFEZIONAMENTO: TIRO INDUSTRIES INC. MINNEAPOLIS U.S.
SOURCE TECH. BIO. INC. EDINA MINNESOTA U.S.
Registrazione N. 11615 del 03.03.03 del Ministero della Salute
TAGLIE DI CONFEZIONE: ML 20 60 100 250 - 500 LITRI 1 3,8 10
Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI:
Non contaminare altre colture bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento .
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena o BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica. **AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

FIELD FARM

COVER Combi

Fungicida cuprorganico in polvere bagnabile

COVER Combi
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

MANCOZEB puro	gr.	30
RAME metallo puro (sotto forma di ossicloruro di rame)	gr.	15
Coformulanti q.b. a	gr.	100

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO : Nocivo per ingestione – Irritante per le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle Tossico per gli organismi acquatici Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: FIELD FARM SRL VIA COLLE DELL'ARA, 25 66100 CHIETI (ITALIA)
OFFICINE DI PRODUZIONE: DIACHEM SPA U.P. SIFA CARAVAGGIO (BG) - AGRINDUSTRIA SRL S. CIPRIANO PO (PV) - TERRANALISI SRL CENTO (FE) - L.I.F.A. SRL ISOLA VICENTINA (VI) - L.I.F.A. SRL VIGONOVO (VE) - STI SOLFOTECNICA ITALIANA SPA COTIGNOLA (RA) - STI SOLFOTECNICA ITALIANA SPA TORRENIERI (SI) - LA CORNUBIA S.A. BORDEAUX (FRANCE) - ADICA SRL FAENZA (RA) - SULPHUR MILLS LTD BOMBAY (INDIA)
Registrazione N. 8579 del 03.12.94 del Ministero della Sanità
TAGLIE DI CONFEZIONI: KG.: 1-10-25
Partita n. : ……………………...

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d'acqua.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento, proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame metallo 15% e Mancozeb 30%: le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: terapia sintomatica. Controindicazioni: === **AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.**

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
COVER Combi è un anticrittogamico cuprorganico in polvere bagnabile che viene indicato sulle seguenti malattie fungine:
VITE: contro la Peronospora, Escoriosi, Antracnosi e Marciume nero alla dose di gr. 250-350
MELO – PERO: contro la Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria e Glomerella alla dose di gr. 250-300.
POMODORO: (**solo fino alla prima fioritura**) contro Batteriosi, Antracnosi, Peronospora, Alternariosi, Cladosporiosi, alla dose di gr. 300-350
GAROFANO: contro la Ruggine, con trattamenti in pieno campo a gr. 300
TABACCO: contro la Peronospora alla dose di gr. 300-350.
Tutte le dosi sono riferite a q.le acqua, salvo diversa indicazione
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – NON IMPIEGARE IN SERRA
COMPATIBILITÀ: il COVER Combi non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non trattare durante la fioritura. Sulle seguenti varietà di pero (Abate Fetel, Armella, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Julies Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) e di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. SU POMODORO TRATTAMENTI AMMESSI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n. 65/2003).
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.).

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

FIELD FARM
PER L'AGRICOLTURA

RUBIFEN

Fungicida organico in pasta fluida contro l'oidio

RUBIFEN
Composizione:
Fenarimol puro gr. 11,4 (=120g/l)
Coformulanti q.b. a gr. 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO: Possibile rischio di ridotta fertilità. Possibile rischio di danni ai bambini ancora nati. Possibile rischio per i bambini allattati al seno. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare , né bere, né fumare durante l'impiego – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: FIELD FARM SRL VIA COLLE DELL'ARA, 25 66100 CHIETI
OFFICINE DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO: TERRANALISI SRL Via Nino Bixio, 6 CENTO (FE) - FITOFORMULA SRL Via Nettunense KM. 23,400 APRILIA (LT) - SULPHUR MILLS 303/304 TV Estate S.K. Ahire Marg, Worli, Bombay INDIA
OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO : ADICA SRL VIA S. SILVESTRO, 1 FAENZA (RA) - STI SOLFOTECNICA ITALIANA SPA VIA PIAN D'ASSO TORRENIERI (SI)
Registrazione n. 8773 del 02.11.1995 del Ministero della Sanità
TAGLIE DI CONFEZIONI: Lt. 0,2-0,25-0,5– 1– 5
Partita n.: ………………….

NORME PRECAUZIONALI: non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **AVVERTENZA**: **consultare un centro antiveleni.**

CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO:
Il RUBIFEN è un fungicida in pasta concentrata indicato per combattere l'Oidio e il Mal Bianco. Agisce in modo citotropico-translaminare, ed immediatamente viene assorbito dopo la sua applicazione sulle foglie attaccando l'infezione fungina in qualunque punto essa si trovi, non venendo dilavato dalle piogge con possibilità di trattamenti a calendario fisso. Viene applicato sulle seguenti colture:
VITE contro l'Oidio alla dose di ml 10-15/hl fino ad allegagione avvenuta; ml. 25-30/hl dopo l'allegagione.
POMODORO – PESCO – PEPERONE – MELO – FRAGOLA (solo fino alla prima fioritura) - CUCURBITACEE: contro l'Oidio alla dose di ml. 30-40/hl;

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ : Il RUBIFEN è miscibile con tutti i prodotti eccetto quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Il prodotto contiene una sostanza attiva che può avere effetti dannosi su antropodi utili (Encarsia Formosa e Encarsia Berlesei).

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DEL PESCO E DELLA VITE, 21 GIORNI PER IL MELO, 7 GIORNI SU TUTTE LE ALTRE COLTURE.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da usi improprio del preparato.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n. 65/2003)
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.).

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUÒ' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

FIELD FARM
PER L'AGRICOLTURA

RUBIFEN

Fungicida organico in pasta fluida contro l'oidio

RUBIFEN
Composizione:
Fenarimol puro gr. 11,4 (=120g/l)
Coformulanti q.b. a gr. 100

FRASI DI RISCHIO: Possibile rischio di ridotta fertilità. Possibile rischio di danni ai bambini ancora nati. Possibile rischio per i bambini allattati al seno. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego Usare indumenti protettivi e guanti adatti In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: FIELD FARM SRL VIA COLLE DELL'ARA, 25 66100 CHIETI
OFFICINE DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO: TERRANALISI SRL Via Nino Bixio, 6 CENTO (FE) - FITO-FORMULA SRL Via Nettunense KM. 23,400 APRILIA (LT) - SULPHUR MILLS 303/304 TV Estate S.K. Ahire Marg, Worli, Bombay INDIA
OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO : ADICA SRL VIA S. SILVESTRO, 1 FAENZA (RA) - STI SOLFOTECNICA ITALIANA SPA VIA PIAN D'ASSO TORRENIERI (SI)
Registrazione n. 8773 del 02.11.1995 del Ministero della Sanità
TAGLIE DI CONFEZIONI: Lt. 0,2-0,25-0,5 1 5 Partita n.: ....

NORME PRECAUZIONALI: non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **AVVERTENZA**: **consultare un centro antiveleni.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

FIELD FARM

RAME 3-F

Fungicida cuprico a base di ossicloruro di rame in pasta fluida (flowable).

RAME 3-F
Composizione:
RAME metallo (sotto forma di ossicloruro) gr. 20 (=284g/l)
Coadiuvanti q.b. a gr. 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Pericoloso per l'ambiente

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: FIELD FARM SRL VIA COLLE DELL'ARA, 25 CHIETI
OFFICINE DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO: FITOFORMULA SRL VIA NETTUNENSE KM. 23,400 APRILIA (LT) - SULPHUR MILLS 303/304 TV Estate S.K. Ahire Marg, Worli, Bombay INDIA TERRANALISI SRL VIA NINO BIXIO, 6 CENTO (FE);
OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO: ADICA SRL VIA S. SILVESTRO, 1 FAENZA (RA) - STI SOLFOTECNICA ITALIANA SPA VIA PIAN D'ASSO TORRENIERI (SI);
Registrazione N. 8775 del 02.11.95 del Ministero della Sanità
TAGLIE DI CONFEZIONI: LITRI: 0,250-1-2-5-10-15-20-25
Partita n. : ……………………....

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento . Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica. **AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.**

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il RAME 3-F è un anticrittogamico in emulsione fluida (flowable) a base di Rame Ossicloruro che agisce in forma preventiva, come prodotto di contatto.
Colture protette (le dosi sono riferite a 100 litri di acqua salvo diversa indicazione):
ORTAGGI – PATATA : contro Alternariosi, Antracnosi, Peronospora, Ticchiolatura, Batteriosi, Septoriosi, alla dose di ml. 450-550.
VITE: contro la Peronospora alla dose di ml. 400-550.
MELO – PERO: contro la Ticchiolatura alla dose di ml. 400-450 prima della fioritura e ml. 350 dopo la fioritura. Nei trattamenti di autunno-inverno ml. 800-1000.
AGRUMI: contro Fumaggine, Malsecco, Gommosi, Allupatura, ml. 450-550.
DRUPACEE: contro Corineo, Bolla e Cancro dei rametti con trattamenti invernali ml. 800-1000.
TABACCO: contro la Peronospora ml. 450.550.
OLIVO: contro la Fumaggine, Occhio di Pavone alla dose di ml. 450-550.
FLORICOLE – ORNAMENTALI: contro la Ticchiolatura, Batteriosi, Antracnosi, Alternariosi, Peronospora, Septoriosi alla dose di ml. 400-500.
FRAGOLA: contro la Vaiolatura ml. 450-550.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro la Peronospora e la Cercospora alla dose di litri 4 per ettaro di coltura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: compatibile con tutti gli antiparassitari in commercio, esclusi quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
NOCIVITÀ: tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n. 65/2003)
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.).

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

FIELD FARM
PER L'AGRICOLTURA

RAME 3-F

Fungicida cuprico a base di ossicloruro di rame in pasta fluida (flowable).

RAME 3-F
Composizione:
RAME metallo (sotto forma di ossicloruro) gr. 20 (=284g/l)
Coadiuvanti q.b. a gr. 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Pericoloso per l'ambiente

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: FIELD FARM SRL VIA COLLE DELL'ARA, 25 CHIETI
OFFICINE DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO: FITOFORMULA SRL VIA NETTUNENSE KM 23,400 APRILIA (LT) - SULPHUR MILLS 303/304 TV Estate S.K. Ahire Marg, Worli, Bombay INDIA TERRANALISI SRL VIA NINO BIXIO, 6 CENTO (FE);
OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO: ADICA SRL VIA S. SILVESTRO, 1 FAENZA (RA) - STI SOLFOTECNICA ITALIANA SPA VIA PIAN D'ASSO TORRENIERI (SI)
Registrazione N. 8775 del 02.11.95 del Ministero della Sanità
TAGLIE DI CONFEZIONI: LITRI 0,250-1-2-5-10-15-20-25
Partita n.: ……………………

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento . Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica. **AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

FIELD FARM

MANCOPLANT 80

Fungicida a base di Mancozeb in formulazione polvere bagnabile

MANCOPLANT 80

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
MANCOZEB puro gr. 80
Coformulanti e inerti q.b. a gr. 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: FIELD FARM SRL VIA COLLE DELL'ARA, 25 66100 CHIETI (ITALIA)

STABILIMENTI DI PRODUZIONE: TERRANALISI SRL CENTO (FE) - DIACHEM SPA U.P. SIFA CARAVAGGIO (BG) - L.I.F.A. SRL ISOLA VICENTINA (VI) - L.I.F.A. SRL VIGONOVO (VE) - C.T.K. HOLLAND B.V. HILVERSUM (OLANDA) - AGRINDUSTRIA SRL S. CIPRIANO PO (PV) - STI SOLFOTECNICA ITALIANA SPA COTIGNOLA (RA) - STI SOLFOTECNICA ITALIANA SPA TORRENIERI (SI) - LA CORNUBIA S. A. BORDEAUX (FRANCE) - ADICA SRL FAENZA (RA) - SULPHUR MILLS LTD BOMBAY (INDIA)
REGISTRAZIONE N. 8577 DEL 03.12.94 DEL MINISTERO DELLA SANITÀ
TAGLIE DI CONFEZIONI: KG.: 1-10-25
Partita n. : ……………………..

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d'acqua.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento, proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: terapia sintomatica. **AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.**

CARATTERISTICHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
MANCOPLANT 80 è un fungicida in formulazione polvere bagnabile indicato nella lotta delle seguenti malattie fungine:
VITE: contro la Peronospora, Antracnosi e Escoriosi alla dose di gr. 250-250/hl.
MELO – PERO: contro la Ticchiolatura e Gleosporium alla dose di gr. 200/hl.
POMODORO: **(solo fino alla prima fioritura)** contro Peronospora, Antracnosi, Alternariosi, Septoriosi, alla dose di gr. 175.275/hl.
TABACCO: contro la Peronospora e Antracnosi alla dose di gr. 175-225/hl.
PIOPPO: contro la Marssonnina alla dose di gr. 350-450/hl.
GAROFANO: contro la Ruggine,Alternariosi e Septoriosi alla dose di 200-250/hl.
FRUMENTO – ORZO – SEGALE – AVENA: contro Ruggine, Nerume e Septoriosi alla dose di Kg. 2,5-3/Ha.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: MANCOPLANT 80 non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': varietà di pero sensibili al p.a. Mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. SU POMODORO TRATTAMENTI AMMESSI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n. 65/2003).
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

FIELD FARM
PER L'AGRICOLTURA

DIACHEM S.p.a.

TORPEDO 80 WP

Fungicida sistemico (Polvere bagnabile)

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
FOSETIL ALLUMINIO puro g 80
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10661 del 29.12.2000

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g. 100-250-500 - kg 1- 5-10- 25

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
CARATTERISTICHE
TORPEDO 80 WP è un fungicida sistemico la cui efficacia è garantita anche dalla sua grande mobilità nelle piante. Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui non presenta rischi collegati al dilavamento, e manifesta una sistemia ascendente e discendente che consente anche la protezione delle foglie formatesi dopo il dilavamento.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua, quindi portare a volume mescolando bene.

MODALITA' DI IMPIEGO
ORTICOLTURA
CARCIOFO: contro Bremia lactucae a 200-300 g/hl
LATTUGA: contro Bremia lactucae effettuare irrorazioni a 200-300 g/hl distribuendo almeno 3 kg/ha di prodotto. In presenza di forti sbalzi termici possono aversi problemi di fitotossicità. Per impiego su lattuga romana effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto.
CETRIOLO, SPINACIO, COCOMERO: contro Peronospora, effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl distribuendo almeno 3 kg/ha di prodotto.
MELONE: contro Pseudoperonospora cubensis effettuare irrorazioni fogliari a 200-300 g/hl distribuendo almeno 3 kg/ha di prodotto.
FRAGOLA: contro Peronospora (Phytophthora cactorum e fragariae). Per evitare il deperimento anche in terreni molto infettati, immergere le piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti e far seguire, alla medesima dose, 1 irrorazione in autunno e 2 in primavera oppure, sempre prima del trapianto, immergerle in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti e far seguire 1 annaffiatura al piede in autunno e 2 in primavera alla dose di g 0,5 di formulato per pianta.
FRUTTICOLTURA
ARANCIO, LIMONE, MANDARINO, POMPELMO: contro Phytophthora spp., effettuare irrorazioni fogliari a 200-300 g/hl utilizzando 10 litri di poltiglia per pianta. Quando le piante si presentano fortemente debilitate dalla malattia e gli apparati fogliari non sono più in grado di assorbire completamente il fungicida, i trattamenti alla vegetazione si potranno integrare con pennellature sulle parti infette del legno (tronco e branche).
MELO, PERO, PESCO, ACTINIDIA: contro Phytophthora cactorum. Effettuare un trattamento al mese dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta (per melo e actinidia) con 250 g/hl. Su piante già debilitate dalla malattia effettuare un'annaffiatura alla loro base (in modo da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, con litri 1-2 per pianta di una poltiglia costituita da kg 5 di prodotto per 100 litri di acqua.
VITE: contro Peronospora, a 250 g/hl di acqua. Si consiglia sempre l'associazione con formulati di copertura (rame escluso).
VIVAI DI FRUTTIFERI: effettuare , con cadenza mensile, irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl
VIVAI DI AGRUMI: impiegare ad una dose di 400 g/hl ogni 60 giorni.
COLTURE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO ED IN SERRA:: contro Pytophthora spp. di Chamaecyparis e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee, Poinsettia, St. Paulia e Crisantemo, effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con 5-10 g di formulato per mq una volta al mese in primavera.
COMPATIBILITA'
TORPEDO 80 WP non è compatibile con i prodotti a base di rame, di dicofol e con concimi fogliari contenenti azoto. Non effettuare miscele con formulati oleosi, nè irrorare il prodotto su colture che ne siano state precedentemente trattate, in quanto si ostacolerebbe la penetrazione del prodotto nella pianta.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA
15 giorni per carciofo, cetriolo, cocomero, melone, lattuga, spinacio; 30 giorni per fragola; 40 giorni per melo, pero, pesco, actinidia, vite; 80 giorni per arancio, limone, mandarino, pompelmo.
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

TORPEDO 80 WP

Fungicida sistemico, polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
FOSETIL ALLUMINIO puro g 80
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10661 del 29.12.2000
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1 (10 s. i. da g 100); kg 1 (4 s. i. da g 250)
PARTITA N.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
CARATTERISTICHE
TORPEDO 80 WP è un fungicida sistemico la cui efficacia è garantita anche dalla sua grande mobilità nelle piante. Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui non presenta rischi collegati al dilavamento, e manifesta una sistemia ascendente e discendente che consente anche la protezione delle foglie formatesi dopo il dilavamento.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua, quindi portare a volume mescolando bene.

MODALITA' DI IMPIEGO: ORTICOLTURA
CARCIOFO: contro Bremia lactucae a 200-300 g/hl.
LATTUGA: contro Bremia lactucae effettuare irrorazioni a 200-300 g/hl distribuendo almeno 3 kg/ha di prodotto. In presenza di forti sbalzi termici possono aversi problemi di fitotossicità. Per impiego su lattuga romana effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto.
CETRIOLO, SPINACIO, COCOMERO: contro Peronospora, effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl distribuendo almeno 3 kg/ha di prodotto.
MELONE: contro Pseudoperonospora cubensis effettuare irrorazioni fogliari a 200-300 g/hl distribuendo almeno 3 kg/ha di prodotto.
FRAGOLA: contro Peronospora (Phytophthora cactorum e fragariae). Per evitare il deperimento anche in terreni molto infettati, immergere le piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti e far seguire, alla medesima dose, 1 irrorazione in autunno e 2 in primavera oppure, sempre prima del trapianto, immergerle in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti e far seguire 1 annaffiatura al piede in autunno e 2 in primavera alla dose di g 0,5 di formulato per pianta.
FRUTTICOLTURA
ARANCIO, LIMONE, MANDARINO, POMPELMO: contro Phytophthora spp., effettuare irrorazioni fogliari a 200-300 g/hl utilizzando 10 litri di poltiglia per pianta. Quando le piante si presentano fortemente debilitate dalla malattia e gli apparati fogliari non sono più in grado di assorbire completamente il fungicida, i trattamenti alla vegetazione si potranno integrare con pennellature sulle parti infette del legno (tronco e branche).
MELO, PERO, PESCO, ACTINIDIA: contro Phytophthora cactorum. Effettuare un trattamento al mese dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta (per melo e actinidia) con 250 g/hl. Su piante già debilitate dalla malattia effettuare un'annaffiatura alla loro base (in modo da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, con litri 1-2 per pianta di una poltiglia costituita da kg 5 di prodotto per 100 litri di acqua.
VITE: contro Peronospora, a 250 g/hl di acqua. Si consiglia sempre l'associazione con formulati di copertura (rame escluso).
VIVAI DI FRUTTIFERI: effettuare , con cadenza mensile, irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl
VIVAI DI AGRUMI: impiegare ad una dose di 400 g/hl ogni 60 giorni.
COLTURE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO ED IN SERRA:: contro Pytophthora spp. di Chamaecyparis e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee, Poinsettia, St. Paulia e Crisantemo, effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con 5-10 g di formulato per mq una volta al mese in primavera.
COMPATIBILITA'
TORPEDO 80 WP non è compatibile con i prodotti a base di rame, di dicofol e con concimi fogliari contenenti azoto. Non effettuare miscele con formulati oleosi, nè irrorare il prodotto su colture che ne siano state precedentemente trattate, in quanto si ostacolerebbe la penetrazione del prodotto nella pianta.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA
15 giorni per carciofo, cetriolo, cocomero, melone, lattuga, spinacio; 30 giorni per fragola; 40 giorni per melo, pero, pesco, actinidia, vite; 80 giorni per arancio, limone, mandarino, pompelmo.
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

30%

1. Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.
2. Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.
3. Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti).
4. Aggiungere la restante acqua nell'atomizzatore.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

TORPEDO 80 WP

Fungicida sistemico (Polvere bagnabile)

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
FOSETIL ALLUMINIO puro g 80
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10661 del 29.12.2000

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA DA APPORRE SUL SACCHETTO IDROSOLUBILE

TORPEDO 80 WP

Fungicida sistemico, polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
FOSETIL ALLUMINIO puro g 80
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10661 del 29.12.2000

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100; 250.

PARTITA N.

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE
AVVERTENZA: LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

CUMETA SC

Fungicida ad azione preventiva e curativa in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
RAME METALLO g. 19,04 (= 259 g/l)
(sotto forma di Idrossido)
METALAXIL puro g 3,6 (= 49 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10701 del 15.2.2001

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 50 - 100 - 250 - 500 - litri 1 – 2-3-5 - 10 – 20

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME METALLO g 19,04 e METALAXIL g. 3,6 le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione. RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. METALAXIL- Sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
CUMETA SC è una miscela fungicida ad azione preventiva e curativa. La presenza di metalaxil, dotato di attività sistemica, permette di proteggere la vegetazione agendo all'interno della pianta e di assicurare protezione anche sulla vegetazione sviluppatasi successivamente al trattamento. La componente rameica invece, presente sotto forma di idrossido, consente una protezione esterna di contatto, garantendo ottimo grado di copertura, resistenza al dilavamento e contemporanea attività nei confronti delle batteriosi.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
VITE : contro peronospora (Plasmopora viticola) alla dose di 400 ml/hl intervenire entro il 30% del periodo di incubazione dell'infezione primaria, proseguendo ad intervalli di 14 giorni fino ad allegagione. Ridurre l'intervallo a 12 giorni in presenza di piogge persistenti o di elevata pressione della malattia.
POMODORO: 400 ml/hl contro Peronospora (Phytophthora infestans), alternaria (Alternaria porri sp solani) e Batteriosi. Intervenire al verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione, cadenzando i trattamenti a distanza di 10-14 giorni e per un massimo di 4 interventi.
PATATA contro peronospora (Phytophthora infestans) e alternaria (Alternaria porri sp. solani) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.
FRAGOLA contro marciume bruno (Phytophthora cactorum) alla dose di 4 l/ha intervenendo dopo 15 e 30 giorni dall'impianto. Possibile immersione delle piantine prima dell'impianto in una soluzione al 3 per mille.
COLTURE ORTICOLE (cocomero, melone, cetriolo, carciofo, cavolo verza, fagiolo*, fagiolino*) contro peronospora (Peronospora spp., Pseudoperonospora cubensis, Bremia lactucae), alternariosi (Alternaria spp) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.
N.B. * fagiolo e fagiolino: impiego consentito solo per trattamenti al terreno.
LATTUGA: contro peronospora (Bremia lactucae) alla dose di 2 - 3 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.
SOIA: contro peronospora (Peronospora manshurica) e fitoftora (Phytophthora megasperma var. sojae.) alla dose di 4 l/ha con 1-2 interventi a distanza di 10-14 giorni.
MELO: contro marciume del colletto (Phytophthora spp) alla dose di 100-150 ml/pianta, dopo la ripresa vegetativa. Irrorare accuratamente la zona del colletto ed il terreno circostante. Ripetere eventualmente l'intervento 3-5 settimane dopo. In presenza di lesioni del tronco, spennellature con una soluzione al 20%.

AVVERTENZA: rispettare rigorosamente le norme di impiego anche per contrastare i ceppi resistenti. Non applicare mai su vivai di vite.
COMPATIBILITA':
non è compatibile con i formulati a reazione alcalina quali polisolfuri, poltiglia bordolese, calce.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura.
RISCHI DI NOCIVITA' : il prodotto è tossico per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA
VITE: 28 giorni; FRAGOLA: 40 giorni; FAGIOLINO: 56 giorni; CAVOLO VERZA: 60 giorni; FAGIOLO: 120 giorni; SOIA: 150 giorni; ALTRE COLTURE: 20 giorni.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CUMETA SC

Fungicida ad azione preventiva e curativa
in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
RAME METALLO g. 19,04 (= 259 g/l)
(sotto forma di Idrossido)
METALAXIL puro g 3,6 (49 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10701 del 15.2.2001

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 50 - 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

MAYA

Erbicida selettivo in granuliidrodispersibili

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Metribuzin puro g 35
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE

SCHIRM GmbH Division SIDECO
Mecklenburger Str. 229 - LUBECCA (Germania)
SULPHUR MILLS LIMITED
1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist.Bharuch, GUJARAT (India)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10738 del 28.2.2001

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100-250-500 - kg 1-5-10-20-25

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncosasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

E' un erbicida selettivo ad assorbimento radicale e fogliare utilizzato per il diserbo di patata, pomodoro, asparago, frumento, orzo, soia ed erba medica. Risulta efficace nei confronti delle seguenti infestanti graminacee: Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Apera spica venti (Agrostide annuale) Lolium multiflorum (Loietto), Poa annua (Fienarola comune) e dicotiledoni: Amaranthus retroflexus (Amaranto), Anagallis arvensis (Anagallide), Capsella bursa-pastoris (Borsa pastore), Centaurea cyanus (Fiordaliso), Chenopodium album (Farinaccio), Chenopodium spp., Fumaria officinalis (Fumaria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Lamium purpureum (Falsa ortica) Matricaria chamomilla (Camomilla), Mercurialis annua (Mercurella), Myagrum perfoliatum (Miagro) Papaver rhoeas (Papavero), Polygonum spp., Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Stellaria media (Centocchio), Veronica arvensis (Veronica).

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

PATATA: in pre-emergenza alla dose di 0,5-0,8 kg/ha, impiegando la dose più alta nei terreni argillosi; evitare l'applicazione nei terreni sabbiosi. In post-emergenza alla dose di 0,5-0,6 kg/ha. Risulta selettivo sulle seguenti varietà: Admirandus, Alkamaria, Apollo, Arsy, Bea, Bintje, Cardinal, Desirée, Favorita, Humalda, Kennebec, Majestic, Monnalisa, Primura, Resj, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal. Se ne sconsiglia l'impiego su Draga, Jarla, Vivax.
POMODORO: 0,5-0,6 kg/ha intervenendo 7-14 giorni prima della semina o del trapianto su terreno preparato e senza interrare.
0,5-0,8 kg/ha in post-emergenza o post-trapianto con piante di pomodoro con almeno 8-9 foglie e comunque dopo il superamento della crisi di trapianto.
ASPARAGO: in pre-emergenza dei turioni alla dose di 1-1,2 kg/ha e su impianti di almeno 2 anni.
FRUMENTO E ORZO : 0,2 kg/ha dallo stadio di 2 foglie vere a fine accestimento
SOIA: 0,5 - 0,7 kg/ha in pre-semina o pre-emergenza. Evitare l'impiego nei terreni più sabbiosi e torbosi.
ERBA MEDICA : 1-1,5 kg/ha in autunno/inverno e con coltura in pieno riposo vegetativo. Dose minore nei terreni sabbiosi.

AVVERTENZE D'USO

Impiegare il prodotto con 500-700 litri di acqua ad ettaro in pre-semina, pre-trapianto e pre-emergenza della coltura e con 300-400 litri ad ettaro in post-emergenza.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con erbicidi a reazione neutra. In particolare miscele con 2,4D, MCPA, tralkoxydim, fenoxaprop-ethyl, tribenuron-metil, rinsulfuron, fluoroxipir, triasulfuron, consentono di ampliare lo spettro di efficacia del trattamento erbicida.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA

PATATA, ASPARAGO, SOIA, ERBA MEDICA: 60 giorni.
POMODORO, FRUMENTO, ORZO: 30 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua –
Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

MAYA

Erbicida selettivo in granuli idrodispersibili.
Sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Metribuzin puro g 35
Coformulanti q.b. a g. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
- SCHIRM GmbH Division SIDECO - Mecklenburger Str. 229 - LUBECCA (Germania)
- SULPHUR MILLS LIMITED - 1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist.Bharuch, GUJARAT (India)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10738 del 28.2.2001

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 0,5 (5 x 100 g; 1 x 500 g); **kg 1** (2 x 500 g)
PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti critematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncosasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
E' un erbicida selettivo ad assorbimento radicale e fogliare utilizzato per il diserbo di patata, pomodoro, asparago, frumento, orzo, soia ed erba medica. Risulta efficace nei confronti delle seguenti infestanti graminacee: Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Apera spica venti (Agrostide annuale) Lolium multiflorum (Loietto), Poa annua (Fienarola comune) e dicotiledoni: Amaranthus retroflexus (Amaranto), Anagallis arvensis (Anagallide), Capsella bursa-pastoris (Borsa pastore), Centaurea cyanus (Fiordaliso), Chenopodium album (Farinaccio), Chenopodium spp., Fumaria officinalis (Fumaria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Lamium purpureum (Falsa ortica) Matricaria chamomilla (Camomilla), Mercurialis annua (Mercurella), Myagrum perfoliatum (Miagro) Papaver rhoeas (Papavero), Polygonum spp., Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Stellaria media (Centocchio), Veronica arvensis (Veronica).

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
PATATA: in pre-emergenza alla dose di 0,5-0,8 kg/ha, impiegando la dose più alta nei terreni argillosi; evitare l'applicazione nei terreni sabbiosi. In post-emergenza alla dose di 0,5-0,6 kg/ha. Risulta selettivo sulle seguenti varietà: Admirandus, Alkamaria, Apollo, Arsy, Bea, Bintje, Cardinal, Desirée, Favorita, Humalda, Kennebec, Majestic, Monnalisa, Primura, Resj, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal. Se ne sconsiglia l'impiego su Draga, Jarla, Vivax.
POMODORO: 0,5-0,6 kg/ha intervenendo 7-14 giorni prima della semina o del trapianto su terreno preparato e senza interrare.
0,5-0,8 kg/ha in post-emergenza o post-trapianto con piante di pomodoro con almeno 8-9 foglie e comunque dopo il superamento della crisi di trapianto.
ASPARAGO: in pre-emergenza dei turioni alla dose di 1-1,2 kg/ha e su impianti di almeno 2 anni.
FRUMENTO E ORZO : 0,2 kg/ha dallo stadio di 2 foglie vere a fine accestimento
SOIA: 0,5 - 0,7 kg/ha in pre-semina o pre-emergenza. Evitare l'impiego nei terreni più sabbiosi e torbosi.
ERBA MEDICA : 1-1,5 kg/ha in autunno/inverno e con coltura in pieno riposo vegetativo. Dose minore nei terreni sabbiosi.

AVVERTENZE D'USO
Impiegare il prodotto con 500-700 litri di acqua ad ettaro in pre-semina, pre-trapianto e pre-emergenza della coltura e con 300-400 litri ad ettaro in post-emergenza.

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con erbicidi a reazione neutra. In particolare miscele con 2,4D, MCPA, tralkoxydim, fenoxaprop-ethyl, tribenuron-metil, rinsulfuron, fluoroxipir, triasulfuron, consentono di ampliare lo spettro di efficacia del trattamento erbicida.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
PATATA, ASPARAGO, SOIA, ERBA MEDICA: 60 giorni.
POMODORO, FRUMENTO, ORZO: 30 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

1. Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.
2. Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.
3. Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti).
4. Aggiungere la restante acqua nell'atomizzatore.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

MAYA

Erbicida selettivo in granuli idrodispersibili

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Metribuzin puro g 35
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
SCHIRM GmbH Division SIDECO
Mecklenburger Str. 229 - LUBECCA (Germania)
SULPHUR MILLS LIMITED
1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist.Bharuch, GUJARAT (India)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10738 del 28.2.2001

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA DA APPORRE SUL SACCHETTO IDROSOLUBILE

MAYA

Erbicida selettivo in granuli idrodispersibili.
Sacchetti idrosolubili

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Metribuzin puro g 35
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
- SCHIRM GmbH Division SIDECO - Mecklenburger Str. 229 - LUBECCA (Germania)
- SULPHUR MILLS LIMITED - 1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist.Bharuch, GUJARAT (India)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10738 del 28.2.2001

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100 ; 500
PARTITA N.

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE
AVVERTENZA: LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

MITENE

Acaricida selettivo per impiego su Pero, Melo, Vite
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Bromopropilato puro g 25 (– 270 g/l)
Coformulanti q.b.a g.100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.
via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SITA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10956 del 18/6/2001

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 10 – 20- 50 100 – 200 – 250 litri 1- 5- 10-20

PARTITA N.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
MITENE è un acaricida selettivo attivo per contatto; è efficace nella lotta contro l'eriofide del pero (Phytoptus pyri) e del melo (Aculus schlechtendali) e l'acaro responsabile dell'acariosi della vite (Calepitrimerus vitis), con azione simultanea contro uova estive, neanidi ed adulti. E' particolarmente indicato nei programmi di lotta integrata.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
MITENE si impiega, a volume normale o ridotto, alla dose di 200 ml/hl di acqua sulle seguenti colture ed epoche di trattamento:

- **Pomacee** (pero e melo): per la lotta all'eriofide con intervento a rottura gemme-punta verde
- **Vite:** per il controllo dell'acariosi intervenendo tra la fase di gemma cotonosa e foglie libere.

MITENE non va impiegato oltre le epoche indicate.

COMPATIBILITA'
MITENE non è miscibile con gli anticrittogamici e gli insetticidi a reazione alcalina

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
MITENE risulta selettivo sulle colture in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA : non necessario

ATTENZIONE! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

MITENE

Acaricida selettivo per impiego su Pero, Melo, Vite
Sospensione concentrata

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Bromopropilato puro g 25 (= 270 g/l)
Coformulanti q.b.a g.100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.
via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10956 del 18/6/2001

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 10 – 20- 50 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

METEOR

Insetticida in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Deltametrina pura g 1,51 (= 15,7 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A.
Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A.- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10976 del 12/7/2001

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 10-50-100-250-500 litri 1-2-3-5

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea. Reazioni allergiche scatenanti: ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica e di rianimazione. Consultare un Centro antiveleni

CARATTERISTICHE

METEOR è un insetticida piretroide in sospensione concentrata che agisce per contatto ed ingestione . La mancanza di solventi e la bassa tossicità ne rendono l'impiego particolarmente adatto in serra e nelle colture protette. Risulta dotato di un ampio spettro di azione insetticida e manifesta ottima capacità di protezione delle colture anche a basse temperature. L'effetto repellente ne prolunga la durata di azione, ostacolando la reinfestazione.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a "volume normale". Il prodotto deve essere preferibilmente impiegato in interventi precoci e prima che l'insetto provochi l'accartocciamento delle foglie o penetri all'interno delle stesse.
METEOR si impiega sulle seguenti colture:
AGRUMI: contro Afidi, Aleurodidi, Mosca degli agrumi, Cocciniglie alla dose di 75-120 ml/hl
FRUTTIFERI (Melo, Pero, Albicocco, Pesco, Ciliegio, Susino, Mandorlo):
- contro Psilla del pero alla dose di 120-130 ml/hl
- contro neanidi di Cocciniglia S.Josè in trattamenti estivi alla dose di 90-130 ml/hl
- contro Cidia e Anarsia alla dose di 90-120 ml/hl
- contro Microlepidotteri minatori del melo e del pero alla dose di 70-100 ml/hl
- contro Afide verde del melo, Afide del pesco, Capua, Cacoecia, Carpocapsa, Antonomo, Maggiolini, Tentredine, Tripidi, Mosca della frutta alla dose di 70-100 ml/hl
VITE: contro Tignole alla dose di 75-120 ml/hl , contro Cicaline, Afidi, Sigaraio, Nottue, Piralide alla dose di 60-90 ml/hl
OLIVO : contro Mosca dell'olivo, Tignola dell'olivo, Cocciniglia m. g. di pepe, Tripide alla dose di 75-120 ml/hl
ASPARAGO, CAVOLI, CAROTA, CETRIOLO, CIPOLLA, FAGIOLO, FAGIOLINO, FAVA, FRAGOLA, LATTUGHE E SIMILI, RUCOLA, MELANZANA, PATATA, PISELLO, PORRO, POMODORO, PEPERONE, SEDANO, SPINACIO: contro Afidi, Aleurodidi, Cimici, Casside, Criocera, Piralide, Dorifora, Cavolaia, Altiche, Nottue, Tentredini, Tripidi, Mosca e Depressaria alla dose di 75– 90 ml/hl (0,75-0,9 l/ha).
FRUMENTO, ORZO, MAIS : contro Piralide, Diabrotica del mais, Afidi, Nottue, Tripidi alla dose di 0,6-0,9 l/ha
SOIA, COLZA: contro Altiche, Afidi, Cimici, Punteruolo, Nottue, Meligete, Tortricidi alla dose di 0,6-0,9 l/ha
COTONE: contro Cicalina, Nottue, Piralide, Tripidi, Lygus alla dose di 0,6 l/ha
ERBA MEDICA: contro Nottue, Misurino alla dose di 0,7-0,8 l/ha
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Altica e Nottue alla dose di 0,5-0,6 l/ha; contro Lisso e Cleono alla dose di 0,9-1 l/ha
TABACCO : contro Afidi, Tripidi, Nottue, Epitrix alla dose di 0,7-0,9 l/ha
PIOPPO : -*in vivaio* contro Tarlo vespa e Gemmaiola alla dose di 100 ml/hl; in interventi localizzati al tronco contro Criptorrinco 160-170 ml/hl.
- *in pieno campo* contro Crisomelidi defogliatori alla dose di 50-90 ml/hl; contro Criptorrinco ed in interventi localizzati al tronco 130-200 ml/hl; contro Saperda maggiore 280-350 ml/hl
FLOREALI : in campo ed in serra contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Tortricidi alla dose di 70-120 ml/hl; contro Bega del garofano 90-160 ml/hl
ORNAMENTALI E VIVAI : in campo ed in serra contro Afidi, Tingide, Cimice del Platano, Maggiolino, Cetonia, larve di lepidotteri alla dose di 85-100 ml/hl
FUNGHI COLTIVATI: contro Ditteri e Collemboli alla dose di 60- 90 ml/hl

COMPATIBILITA'- Il prodotto non è miscibile con antiparassitari a reazione alcalina. In caso di miscela con formulati in polvere bagnabile è consigliabile effettuare prima la diluizione del prodotto in acqua, procedendo successivamente alla preparazione della poltiglia.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci e nocivo per gli insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.
INTERVALLO DI SICUREZZA: CIPOLLA, SEDANO, PORRO: 7 giorni; SOIA, COTONE, ERBA MEDICA: 15 giorni; COLZA 30 giorni. ALTRE COLTURE : 3 giorni
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

METEOR

Insetticida in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Deltametrina pura g 1,51 (= 15,7 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.
Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A.- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10976 del 12/7/2001

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 10-50-100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

BUTILENE 80 WG

Diserbante in granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
TERBUTILAZINA pura g 80
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE

- SCHIRM AG – Division Sideco - Lubecca (Germania)
- SULPHUR MILLS LIMITED - Dist. Bharuch, Gujarat (India)
- A.D.I.C.A. SRL – Nera Montoro (TR)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO

DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Salute n . 11125 del 17/12/2001

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100 - 250 – 500 kg 1 – 3 - 5- 10

PARTITA N.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE

BUTILENE 80 WG è un erbicida selettivo in granuli idrodispersibili indicato per il controllo di numerose infestanti annuali graminacee e dicotiledoni. Agisce principalmente per assorbimento radicale e la sua azione risulta favorita da un buon grado di umidità del terreno.

Infestanti sensibili:

- GRAMINACEE: Lolium spp (Loglio), Poa spp (Poe), Setaria spp (Setarie).
- DICOTILEDONI: Amaranthus retroflexus (Amaranto), Atriplex patula (Atriplice), Calepina corvini (Calepina), Chenopodium spp (Chenopodi), Datura stramonium (Stramonio), Matricaria chamomilla (Camomilla), Mercurialis annua (Mercurella), Polygonum aviculare (Correggiola), Polygonum persicaria (Persicaria), Portulaca oleracea (Erba porcellana), Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Rapistrum rugosum (Rapistro), Senecio vulgaris (Senecione), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Solanum nigrum (Erba morella), Sonchus spp (Crespino), Stellaria media (Centocchio), Veronica spp (Veronica).

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

BUTILENE 80 WG esplica appieno la sua efficacia in presenza di una sufficiente umidità del terreno e con infestanti non emerse o ai primissimi stadi di sviluppo.

MAIS, SORGO: in pre-emergenza 0,8– 1,250 l/ha come unico prodotto oppure in miscela ad altro erbicida;
in post-emergenza precoce 0,5 – 0,8 l/ha;
In tutte le applicazioni distribuire il prodotto con volumi di acqua di 300-500 l/ha

COMPATIBILITA'

BUTILENE 80 WG è miscibile con erbicidi quali alachlor, metolaclor, pendimetalin, glifosate.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZA

Attendere 8-12 mesi dall'applicazione del prodotto prima di procedere alla semina di nuove colture (eccetto mais e sorgo); eseguire una lavorazione profonda.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

BUTILENE 80 WG

Diserbante in granuli idrodispersibili
Sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
TERBUTILAZINA pura g 80
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
- SCHIRM AG – Division Sideco - Lubecca (Germania)
- SULPHUR MILLS LIMITED - Dist. Bharuch, Gujarat (India)
- A.D.I.C.A. SRL – Nera Montoro (TR)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Salute n . 11125 del 17/12/2001

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 500 (n. 2 s.i. da g 250); kg 1 (n. 4 s.i. da g 250); kg 1 (n. 10 s.i. da g 100)

PARTITA N.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
BUTILENE 80 WG è un erbicida selettivo in granuli idrodispersibili indicato per il controllo di numerose infestanti annuali graminacee e dicotiledoni. Agisce principalmente per assorbimento radicale e la sua azione risulta favorita da un buon grado di umidità del terreno.
Infestanti sensibili:
- GRAMINACEE: Lolium spp (Loglio), Poa spp (Poe), Setaria spp (Setarie)
- DICOTILEDONI: Amaranthus retroflexus (Amaranto), Atriplex patula (atriplice), Calepina corvini (Calepina), Chenopodium spp (Chenopodi), Datura stramonium (Stramonio), Matricaria chamomilla (Camomilla), Mercurialis annua (Mercurella), Polygonum aviculare (Correggiola), Polygonum persicaria (Persicaria), Portulaca oleracea (Erba porcellana), Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Rapistrum rugosum (Rapistro), Senecio vulgaris (Senecione), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Solanum nigrum (Erba morella), Sonchus spp (Crespino), Stellaria media (Centocchio), Veronica spp (Veronica).

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
BUTILENE 80 WG esplica appieno la sua efficacia in presenza di una sufficiente umidità del terreno e con infestanti non emerse o ai primissimi stadi di sviluppo.

MAIS, SORGO: in pre-emergenza 0,8 1,250 l/ha come unico prodotto oppure in miscela ad altro erbicida;
in post-emergenza precoce 0,5 – 0,8 l/ha;
In tutte le applicazioni distribuire il prodotto con volumi di acqua di 300-500 l/ha.

AVVERTENZE D'USO
Nel caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti – Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi – Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola

COMPATIBILITA'
BUTILENE 80 WG è miscibile con erbicidi quali alachlor, metolaclor, pendimetalin, glifosate.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZA
Attendere 8-12 mesi dall'applicazione del prodotto prima di procedere alla semina di nuove colture (eccetto mais e sorgo); eseguire una lavorazione profonda.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

1. 30% — Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.
2. Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.
3. Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti).
4. Aggiungere la resta acqua nell'atomizz

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

BUTILENE 80 WG

Diserbante in granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
TERBUTILAZINA pura g 80
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE

- SCHIRM AG – Division Sideco - Lubecca (Germania)
- SULPHUR MILLS LIMITED - Dist. Bharuch, Gujarat (India)
- A.D.I.C.A. SRL – Nera Montoro (TR)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO

DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Salute n . 11125 del 17/12/2001

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100
PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA DA APPORRE SUL SACCHETTO IDROSOLUBILE

BUTILENE 80 WG

Diserbante in granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
TERBUTILAZINA pura g 80
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
OFFICINE DI PRODUZIONE
- SCHIRM AG – Division Sideco - Lubecca (Germania)
- SULPHUR MILLS LIMITED - Dist. Bharuch, Gujarat (India)
- A.D.I.C.A. SRL – Nera Montoro (TR)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
Registrazione Ministero della Salute n . 11125 del 17/12/2001

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100 , 250
PARTITA N.

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE
AVVERTENZA: LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

SHELTER

Anticrittogamico in granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 45
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
A.D.I.C.A. SRL – Nera Montoro (TR)
SULPHUR MILLS LIMITED - Dist. Bharuch, Gujarat (India)
SHANGHAI SAFECHEM INTERN. LTD – 818 Dongfang Road, Shanghai (Cina)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 11133 del 8/1/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g- 100-250-500 - kg 1- 5-10

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fungicida ad azione citotropica translaminare, efficace contro la Peronospora; agisce per contatto sulle zoospore germinanti e, penetrando nei tessuti vegetali, è anche in grado di colpire il micelio nei primissimi stadi di sviluppo.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
VITE: impiegare 40-50 g di prodotto per ettolitro di acqua. Iniziare i trattamenti preventivi non appena inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fino alla fine della fioritura; dall'allegagione, e per il resto della stagione, impiegare il prodotto miscelando con prodotti di contatto quali rameici, ditiocarbammati e folpet ad una dose ridotta rispetto a quella comunemente impiegata. La dose minima del prodotto per ettaro non deve comunque essere inferiore a 250 g.
POMODORO, PATATA, TABACCO, CARCIOFO, CIPOLLA, MELONE, PISELLO, LATTUGA, SPINACIO, ZUCCHINO, AGLIO, PORRO, GIRASOLE, SOIA E ROSA: impiegare 40-50 g di prodotto per ettolitro di acqua. Iniziare i trattamenti preventivi al verificarsi delle condizioni di infezione favorevoli alla malattia proseguendo per il resto della stagione. Nel caso vi possano essere delle infezioni in atto effettuare due trattamenti ravvicinati alla dose più alta. E' possibile ridurre la dose a 20-25 g/hl se si effettuano trattamenti in miscela con prodotti di contatto. La dose minima di prodotto per ettaro non deve comunque essere inferiore a 250 g.

Preparazione della poltiglia. Sciogliere la dose di prodotto in poca acqua, indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione

COMPATIBILITA'
SHELTER non è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina (es. polisolfuri e poltiglia bordolese) ed olii minerali. In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela, preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta per vite, lattuga, spinacio, pomodoro, melone, zucchino, patata, pisello, cipolla, aglio, porro, tabacco; 21 giorni per il carciofo e 28 giorni per girasole e soia.
Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE: l'imballaggio vuoto dovrà essere smaltito secondo le disposizioni vigenti. Qualora per qualsiasi necessità si dovesse distruggere il prodotto, occorre attenersi a quando disposto dalle norme vigenti

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

SHELTER

Anticrittogamico in granuli idrodispersibili
Sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 45
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
A.D.I.C.A. SRL Nera Montoro (TR)
SULPHUR MILLS LIMITED - Dist. Bharuch, Gujarat (India)
SHANGHAI SAFECHEM INTERN. LTD 818 Dongfang Road, Shanghai (Cina)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 11133 del 8/1/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 500 (5x100g); g 500 (2 x 250g); kg 1 (10 x 100g); kg 1 (4 x 250g); kg 1 (5 x 200g); kg 1 (2 x 500g).

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fungicida ad azione citotropica translaminare, efficace contro la Peronospora; agisce per contatto sulle zoospore germinanti e, penetrando nei tessuti vegetali, è anche in grado di colpire il micelio nei primissimi stadi di sviluppo.
EPOCHE, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
VITE: impiegare 40-50 g di prodotto per ettolitro di acqua. Iniziare i trattamenti preventivi non appena inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fino alla fine della fioritura; dall'allegagione, e per il resto della stagione, impiegare il prodotto miscelando con prodotti di contatto quali rameici, ditiocarbammati e folpet ad una dose ridotta rispetto a quella comunemente impiegata. La dose minima del prodotto per ettaro non deve comunque essere inferiore a 250 g.
POMODORO, PATATA, TABACCO, CARCIOFO, CIPOLLA, MELONE, PISELLO, LATTUGA, SPINACIO, ZUCCHINO, AGLIO, PORRO, GIRASOLE, SOIA E ROSA: impiegare 40-50 g di prodotto per ettolitro di acqua. Iniziare i trattamenti preventivi al verificarsi delle condizioni di infezione favorevoli alla malattia proseguendo per il resto della stagione. Nel caso vi possano essere delle infezioni in atto effettuare due trattamenti ravvicinati alla dose più alta. E' possibile ridurre la dose a 20-25 g/hl se si effettuano trattamenti in miscela con prodotti di contatto. La dose minima di prodotto per ettaro non deve comunque essere inferiore a 250 g.

Preparazione della poltiglia. Sciogliere la dose di prodotto in poca acqua, indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione
COMPATIBILITA'
SHELTER non è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina (es. polisolfuri e poltiglia bordolese) ed oli minerali. In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela, preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta per vite, lattuga, spinacio, pomodoro, melone, zucchino, patata, pisello, cipolla, aglio, porro, tabacco: 21 giorni per il carciofo e 28 giorni per girasole e soia.
Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE: l'imballaggio vuoto dovrà essere smaltito secondo le disposizioni vigenti. Qualora per qualsiasi necessità si dovesse distruggere il prodotto, occorre attenersi a quando disposto dalle norme vigenti

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

30%

1 Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.

2 Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.

3 Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti).

4 Aggiungere la restante acqua nell'atomizzatore.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

SHELTER

Anticrittogamico in granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 45
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
A.D.I.C.A. SRL – Nera Montoro (TR)
SULPHUR MILLS LIMITED - Dist. Bharuch, Gujarat (India)
SHANGHAI SAFECHEM INTERN. LTD – 818 Dongfang Road, Shanghai (Cina)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 11133 del 8/1/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100
PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA DA APPORRE SUL SACCHETTO IDROSOLUBILE

SHELTER

Anticrittogamico in granuli idrodispersibili
Sacchetti idrosolubili

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 45
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
A.D.I.C.A. SRL – Nera Montoro (TR)
SULPHUR MILLS LIMITED - Dist. Bharuch, Gujarat (India)
SHANGHAI SAFECHEM INTERN. LTD – 818 Dongfang Road, Shanghai (Cina)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 11133 del 8/1/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100; 200; 250; 500.

PARTITA N.

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE
AVVERTENZA: LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

SINDER

Erbicida selettivo di post-emergenza
in formulazione liquida

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Clopiralid puro g 9,5 (= 100 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 11140 del 8/1/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100 - 250 - 500 litri - 1 – 5 – 10 - 20

PARTITA N.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il prodotto agisce per assorbimento fogliare e in parte radicale.
Erbe infestanti sensibili: Anthemis arvensis (Camomilla bastarda), Ammi majus (Visnaga maggiore), Bifora spp (Coriandolo fetido), Cirsium arvense (Stoppione), Daucus carota (Carota selvatica), Helianthus spp (Girasole), Matricaria chamomilla (Camomilla), Rumex spp (Romice), Sonchus spp (Crespino), Trifolium spp (Trifoglio), Vicia spp. (Veccia), Xanthium italicus (Nappola).
Erbe infestanti mediamente sensibili: Polygonum spp (Poligoni), Solanum nigrum (Erba morella).

MODALITA' DI IMPIEGO
Da impiegare in post-emergenza della coltura e delle infestanti, intervenendo sulle erbe infestanti nei primi stadi di sviluppo. Applicare il prodotto utilizzando un volume di acqua di 200-300 litri ettaro utilizzando attrezzature a bassa pressione.

COLTURE E DOSI DI IMPIEGO
Barbabietola da zucchero e da foraggio: in presenza di Cirsium arvense e altre infestanti: 0,8–1 l/ha. Con Matricaria chamomilla la dose va aumentata a 1,2 – 1,5 l/ha.
Frumento, Orzo, Avena, Segale: 0,8 – 1 l/ha tra la fase di accestimento e la fase di botticella
Mais (da granella e da foraggio) : 0,8 – 1 l/ha da applicare alla coltura alta 15-30 cm
Orticole (cavoli, rapa, cipolla, bietola da orto): 1,2 – 1,5 l/ha applicando il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti
Colza: 1,2 – 1,5 l/ha applicando il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti

COMPATIBILITA'
E' compatibile con Fenmedifam e con erbicidi fenossiacetici (2,4D, MCPA, Mecoprop, Diclorprop) sotto forma di sali. In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
ATTENZIONE: il formulato contiene una sostanza attiva tossica per gli organismi acquatici. Impedire l'accesso di animali domestici alle aree trattate per almeno una settimana.

FITOTOSSICITA': Il prodotto è fitotossico per le colture dicotiledoni non indicate in etichetta. Non seminare soia sul terreno sodo dopo il cereale trattato.

INTERVALLO DI SICUREZZA : 45 giorni per mais
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DELL'IMBALLO: l'imballaggio vuoto deve essere risciacquato almeno tre volte e l'acqua di lavaggio utilizzata nel trattamento fitosanitario.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

SINDER

Erbicida selettivo di post-emergenza
in formulazione liquida

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Clopiralid puro g 9,5 (= 100 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 11140 del 8/1/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

RADAR

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante per la lotta contro la Ticchiolatura e l'Oidio del melo, la Ticchiolatura del pero e l'Oidio del pesco, della vite, del tabacco e di alcune colture ortive ed ornamentali. Concentrato emulsionabile

IRRITANTE

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Penconazolo puro g 10,20 (= 100 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
Contiene Cicloesanone

FRASI DI RISCHIO

Irritante per gli occhi. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 11141 del 8/1/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 25 - 50 - 100 – 250 - 500 litri 1 - 5

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica .Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
RADAR è un fungicida sistemico ad ampio spettro d'azione ad attività di tipo preventivo, curativo e bloccante con alcune differenze nell'importanza relativa ai suddetti meccanismi d'azione in riferimento ai diversi patogeni e alle condizioni ambientali.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
VITE . *contro Oidio* (Uncinula necator) - **Trattamenti preventivi** : 25-30 ml/hl in pre e post-fioritura intervenendo ogni 14-16 giorni; 15-20 ml/hl in pre e post-fioritura effettuando i trattamenti alla cadenza di 7-10 giorni.
Con attacchi di oidio in atto (primi sintomi) effettuare 2 trattamenti ad intervallo di 5-7 giorni con RADAR alla dose di 50 ml/hl, quindi continuare con trattamenti di tipo preventivo. Il prodotto esplica un'attività collaterale su Guignardia spp. e in minor misura su Pseudopeziza spp.
MELO: *contro Ticchiolatura* (Venturia inacqualis) -**Trattamenti preventivi** : 30-40 ml/hl alla cadenza di 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce; successivamente si tratta ogni 10-15 giorni. In entrambe le epoche utilizzare gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli alla malattia. I normali trattamenti anti ticchiolatura con RADAR sono sufficienti per controllare efficacemente anche l'Oidio. **Trattamenti curativi** : 40-45 ml/hl intervenendo entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante. **Trattamenti bloccanti** (in presenza di sintomi). 40-45 ml/hl effettuando 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali. Si raccomanda l'impiego di RADAR in miscela con un prodotto di copertura.
Contro Oidio (Podosphaera leucotricha) **Trattamenti preventivi** : interventi primaverili alla dose di 30-40 ml/hl alla cadenza di 10 giorni. Nei trattamenti estivi trattare alla cadenza di 10-14 giorni. Impiegare le dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia. **Trattamenti bloccanti** (in presenza di sintomi): trattamenti alla dose di 30-35 ml/hl a cadenza settimanale in numero di 3-4 permettono il controllo delle infezioni in atto e la protezione della nuova vegetazione. **Contro malattie da conservazione** (Monilia fructigena, Penicillium spp.) effettuare 2-3 trattamenti a cadenza settimanale i pre-raccolta alla dose di 40-45 ml/hl
PERO : *contro Ticchiolatura* (Ventura pirina). **Trattamenti preventivi** : 25-35 ml/hl alla cadenza di 10-12 giorni per tutta la stagione. Usare la dose maggiore e gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo della malattia. **Trattamenti curativi** : 30-40 ml/hl intervenendo entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante. **Trattamenti bloccanti** (in presenza di sintomi) : 30-40 ml/hl effettuando 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali. Si raccomanda l'impiego di RADAR in miscela con un prodotto di copertura.
PESCO : *contro Oidio*. **Trattamenti preventivi** : in zone ad alta pressione di infezione e in presenza di varietà particolarmente sensibili effettuare i trattamenti alla dose di 40-50 ml/hl dalla caduta petali ad intervalli di 10-14 giorni. In zone a bassa pressione di infezione trattare ogni 14-21 giorni. Qualora sia necessario intervenire in presenza dei primi sintomi utilizzare il dosaggio più elevato. Contro Monilia, Bolla, Corineo, RADAR esplica un'attività collaterale che può essere sufficiente in zone dove sono stati effettuati i normali trattamenti invernali.
Contro malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp.) effettuare 2-3 trattamenti a cadenza settimanale in pre-raccolta alla dose di 50 ml/hl.
TABACCO: contro Oidio 35-50 ml/hl effettuando 2-4 trattamenti preventivi a partire dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.
COLTURE ORTICOLE: (MELONE, ZUCCHINO, ZUCCA, CETRIOLO, CARCIOFO, PISELLO) (PEPERONE, POMODORO solo in pieno campo): contro Oidio in pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione effettuare 2-4 trattamenti ad intervalli di 14-16 giorni alla dose di 25-50 ml/hl a seconda della coltura e della pressione di infezione. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.
COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE Contro oidio e ruggini utilizzare 25-50 ml/hl ad intervalli di 10-14 giorni a seconda della coltura e dell'incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala
N.B. Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale. Il prodotto va diluito in una quantità di acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione evitando lo sgocciolamento.
COMPATIBILITA': Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA 14 giorni
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

RADAR

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante per la lotta contro la Ticchiolatura e l'Oidio del melo, la Ticchiolatura del pero e l'Oidio del pesco, della vite, del tabacco e di alcune colture ortive ed ornamentali. Concentrato emulsionabile

IRRITANTE

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Penconazolo puro g 10,20 (= 100 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
Contiene Cicloesanone

FRASI DI RISCHIO

Irritante per gli occhi. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 11141 del 8/1/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 25 - 50 - 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

GRAMILANE G

Erbicida granulare pronto all'uso per tappeti erbosi e colture ornamentali

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Pendimetalin puro g 1,70
Coformulanti q.b. a g. 100

NATURA DEL RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.
via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 11207 del 22.2.2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 0,500 - 1 - 5 - 10 – 20

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento si osservano: depressione SNC, dispnea, diuresi, convulsioni. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
GRAMILANE G è un erbicida granulare pronto all'uso indicato per il controllo di numerose infestanti graminacee e dicotiledoni dei tappeti erbosi e delle colture ornamentali anche in vivaio.
Agisce inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli e mostra efficacia anche su infestanti già emerse purché nei primi stadi di sviluppo (graminacee allo stadio di 1-2 foglie e dicotiledoni non oltre lo stadio di 2-3 foglie vere).
Infestanti sensibili:
GRAMINACEE: Alopecurus myosuroides (coda di volpe), Apera spica-venti (agrostide annuale), Digitaria sanguinalis (digitaria), Echinochloa crus-galli (giavone comune), Lolium spp (loglio), Panicum dicotoniflorum (panico americano), Poa spp (fienarola), Setaria spp (falso panico), Sorghum halepense da seme (sorghetta)
DICOTILEDONI: Anagallis arvensis (anagallide), Capsella bursa-pastoris (borsa pastore), Cerastium arvense (cerastio), Chenopodium spp (farinello), Diplotaxis spp (ruchetta), Fallopia convolvulus (convolvolo nero), Fumaria officinalis (fumaria), Lamium purpureum (falsa ortica), Mercurialis annua (mercorella), Papaver rhoeas (papavero), Polygonum aviculare (correggiola), Polygonum persicaria (persicaria), Portulaca oleracea (erba porcellana), Solanum nigrum (erba morella), Stachys annua (erba stregona) Stellaria media (centocchio), Veronica spp (veronica), Urtica urens (ortica piccola), Viola tricolor (viola a tre colori)

MODALITA' DI IMPIEGO
Si applica su tappeti erbosi di Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra, Festuca arundinacea, Cynodon dactylon e Zoysia matrella;
Evitare trattamenti su "Greens" e "Tee" da golf a base di Agrostis e Poa annua.
Il prodotto non deve essere applicato su tappeti appena seminati, su tappeti nuovi sin dopo l'esecuzione del quarto taglio e su tappeti sofferenti e deboli (ad esempio con crescita lenta ed irregolare).
La distribuzione dovrà essere eseguita nel modo più uniforme possibile, con l'ausilio di spandiconcimi professionali o con appositi carrelli gravitazionali, facendo seguire al trattamento una leggera irrigazione (5-10 litri/mq).
GRAMILANE G può essere inoltre impiegato nel diserbo di impianti di alberi e arbusti ornamentali, distribuendo il prodotto a spaglio nell'interfila o tra pianta e pianta.

EPOCHE E DOSI DI IMPIEGO
Tappeti erbosi:
- in primavera e prima della germinazione delle infestanti alla dose di 6-8 kg /1.000 mq; in caso di forte infestazione ripetere il trattamento dopo 6-8 settimane
- in autunno, alla stessa dose, per impedire la germinazione di Poa annua; tappeti erbosi a base di Agrostis e Poa annua non devono essere più trattati dopo la fine di settembre.

Colture ornamentali (alberi e arbusti):
- nell'interfila (anche in vivaio) alla dose di 3-5 kg/1.000 mq e nelle stesse epoche riportate per il diserbo dei tappeti erbosi.

COMPATIBILITA': Il prodotto deve essere impiegato da solo .
Avvertenza: dopo il trattamento non arieggiare o fare tagli verticali (Verticut). Nei tappeti erbosi in cui è prevista una trasemina a metà giugno, eseguire l'intervento entro l'inizio di marzo.
Tempo di sicurezza per la trasemina: 4 mesi.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per le colture e le epoche non indicate in etichetta. Su colture di piante ornamentali non portare il prodotto a contatto con foglie o parti verdi o tessuti non ben lignificati.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

VAFOR PIR

Insetticida. Concentrato emulsionabile

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Clorpirifos Metile puro g 22 (= 217,8 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO

Infiammabile. Irritante per la pelle.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
Albano S.Alessandro (BG)
DISTRIBUITO DA:
IQV ITALIA S.R.L. Fiano Romano (RM)
OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 11244 del 19/3/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 10-20-50-100-250-500 - litri 1 - 5

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia. ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita'). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE

VAFOR PIR è un insetticida fosforganico, agisce per contatto, ingestione ed in parte per azione di vapore. E' particolarmente indicato per combattere le larve di lepidotteri e le neanidi di cocciniglie. Esplica inoltre azione frenante dello sviluppo delle popolazioni di acari tetranichidi come Panonychus, Tetranychus, Eotetranychus.

DOSI DI IMPIEGO

MELO, PERO, PESCO: 200 ml/hl contro Lepidotteri, Tortricidi (Capua, Cacoecia, Pandemis, Eulia), tignola orientale (Cydia molesta), Anarsia (Anarsia); 200-250 ml/hl contro neanidi di Cocciniglie (Aspidiotus ed altre)
ARANCIO: 250 ml/hl contro neanidi di cocciniglie (Saissetia, Ceroplastes, Pseudococcus).
VITE: 100-150 ml/hl contro Tignole (Lobesia, Clysia). Il prodotto potrebbe risultare fitotossico per alcune varietà sensibili; si raccomandano pertanto saggi zonali e varietali.
FRAGOLA: 300-400 ml/hl contro Frankliniella o Nottue ed Afidi
ORTAGGI **(pomodoro, peperone, melanzana, pisello, ravanello, patata)**: 1,5 -2 litri/ha contro Nottue (Agrotis, Mamestra ed altre), Macaone (Papilio), Dorifora (Leptinotarsa).
MAIS : 300 ml/hl contro Nottue (Agrotis), Piralide (Ostrinia) ed Elateridi.
PIOPPO: 400-500 ml/hl contro Saperda e Criptorrinco
ORNAMENTALI **garofano, crisantemo, azalea, ciclamino)**: 200 ml/hl contro Bega, Tortricidi, Cocciniglie, Oziorrinco

COMPATIBILITA'

VAFOR PIR non e' miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina .
ATTENZIONE: estremamente tossico per i pesci.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non impiegare il prodotto sulle varietà di melo Stayman Red, Stayman Winesap, Gloster, Gallia Beauty. In post-fioritura del melo non eseguire più di due trattamenti. Non effettuare trattamenti su arancio nei mesi compresi tra gennaio ed aprile.

INTERVALLO DI SICUREZZA : 15 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua-
Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

VAFOR PIR

Insetticida. Concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Clorpirifos Metile puro g 22 (= 217,8 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Irritante per la pelle.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
Albano S.Alessandro (BG)
DISTRIBUITO DA:
IQV ITALIA S.R.L. Fiano Romano (RM)
OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 11244 del 19/3/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 10-20-50-100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

VAPIRE DEL

Insetticida in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Deltametrina pura g 1,51 (= 15,7 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.
Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

DISTRIBUITO DA:
IQV ITALIA SRL – Fiano Romano RM)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A.- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 11255 del 28/3/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 10-50-100-250-500 litri 1-2-3-5

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea. Reazioni allergiche scatenanti: ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica e di rianimazione. Consultare un Centro antiveleni
CARATTERISTICHE
VAPIRE DEL è un insetticida piretroide in sospensione concentrata che agisce per contatto ed ingestione . La mancanza di solventi e la bassa tossicità ne rendono l'impiego particolarmente adatto in serra e nelle colture protette. Risulta dotato di un ampio spettro di azione insetticida e manifesta ottima capacità di protezione delle colture anche a basse temperature. L'effetto repellente ne prolunga la durata di azione, ostacolando la reinfestazione.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a "volume normale". Il prodotto deve essere preferibilmente impiegato in interventi precoci e prima che l'insetto provochi l'accartocciamento delle foglie o penetri all'interno delle stesse.
VAPIRE DEL si impiega sulle seguenti colture:
AGRUMI: contro Afidi, Aleurodidi, Mosca degli agrumi, Cocciniglie alla dose di 75-120 ml/hl
FRUTTIFERI (Melo, Pero, Albicocco, Pesco, Ciliegio, Susino, Mandorlo):
- contro Psilla del pero alla dose di 120-130 ml/hl
- contro neanidi di Cocciniglia S.Josè in trattamenti estivi alla dose di 90-130 ml/hl
- contro Cidia e Anarsia alla dose di 90-120 ml/hl
- contro Microlepidotteri minatori del melo e del pero alla dose di 70-100 ml/hl
- contro Afide verde del melo, Afide del pesco, Capua, Cacoecia, Carpocapsa, Antonomo, Maggiolini, Tentredine, Tripidi, Mosca della frutta alla dose di 70-100 ml/hl
VITE: contro Tignole alla dose di 75-120 ml/hl , contro Cicaline, Afidi, Sigaraio, Nottue, Piralide alla dose di 60-90 ml/hl
OLIVO : contro Mosca dell'olivo, Tignola dell'olivo, Cocciniglia m. g. di pepe, Tripide alla dose di 75-120 ml/hl
ASPARAGO, CAVOLI, CAROTA, CETRIOLO, CIPOLLA, FAGIOLO, FAGIOLINO, FAVA, FRAGOLA, LATTUGHE E SIMILI, RUCOLA, MELANZANA, PATATA, PISELLO, PORRO, POMODORO, PEPERONE, SEDANO, SPINACIO : contro Afidi, Aleurodidi, Cimici, Casside, Criocera, Piralide, Dorifora, Cavolaia, Altiche, Nottue, Tentredini, Tripidi, Mosca e Depressaria alla dose di 75– 90 ml/hl (0,75-0,9 l/ha).
FRUMENTO, ORZO, MAIS : contro Piralide, Afidi, Nottue, Tripi5di alla dose di 0,6-0,9 l/ha
SOIA, COLZA: contro Altiche, Afidi, Cimici, Punteruolo, Nottue, Meligete, Tortricidi alla dose di 0,6-0,9 l/ha
COTONE: contro Cicalina, Nottue, Piralide, Tripidi, Lygus alla dose di 0,6 l/ha
ERBA MEDICA: contro Nottue, Misurino alla dose di 0,7-0,8 l/ha
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Altica e Nottue alla dose di 0,5-0,6 l/ha; contro Lisso e Cleono alla dose di 0,9-1 l/ha
TABACCO : contro Afidi, Tripidi, Nottue, Epitrix alla dose di 0,7-0,9 l/ha
PIOPPO : *in vivaio* contro Tarlo vespa e Gemmaiola alla dose di 100 ml/hl; in interventi localizzati al tronco contro Criptorrinco 160-170 ml/hl.
- *in pieno campo* contro Crisomelidi defogliatori alla dose di 50-90 ml/hl; contro Criptorrinco ed in interventi localizzati al tronco 130-200 ml/hl; contro Saperda maggiore 280-350 ml/hl
FLOREALI : in campo ed in serra contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Tortricidi alla dose di 70-120 ml/hl; contro Bega del garofano 90-160 ml/hl
ORNAMENTALI E VIVAI : in campo ed in serra contro Afidi, Tingide, Cimice del Platano, Maggiolino, Cetonia, larve di lepidotteri alla dose di 85-100 ml/hl
FUNGHI COLTIVATI: contro Ditteri e Collemboli alla dose di 60- 90 ml/hl

COMPATIBILITA'- Il prodotto non è miscibile con antiparassitari a reazione alcalina. In caso di miscela con formulati in polvere bagnabile è consigliabile effettuare prima la diluizione del prodotto in acqua, procedendo successivamente alla preparazione della poltiglia.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta
RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per i pesci e nocivo per gli insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.
INTERVALLO DI SICUREZZA: CIPOLLA, SEDANO, PORRO: 7 giorni; SOIA, COTONE, ERBA MEDICA: 15 giorni; COLZA 30 giorni. ALTRE COLTURE : 3 giorni
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento- Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

VAPIRE DEL

Insetticida in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Deltametrina pura g 1,51 (= 15,7 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.
Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

DISTRIBUITO DA:
IQV ITALIA SRL – Fiano Romano RM)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A.- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 11255 del 28/3/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 10-50-100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CORONADO

Insetticida emulsionabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Malation puro g 36,10 (361,7 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.- Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A.- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 11275 del 4/4/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 10-50-100-250-500 litri 1-2-5-10

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi salivazione e sudorazione.
Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
CORONADO è un insetticida ad ampio spettro di azione che agisce per contatto ed ingestione.
MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
FRUTTIFERI (Agrumi – Pomacee – Drupacee - Fragola – Actinidia – Fruttiferi minori – Frutta a guscio) OLIVO: 200-250 ml/hl contro Afidi, Tripidi, Cocciniglie, Mosca della frutta, Antonomo, Tentredine, Carpocapsa, Anarsia, Tignola orientale, Mosca del ciliegio, Tortricidi, Cimici, Balanino, Cicalina e larve di Lepidotteri in genere.
ORTAGGI (ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, ortaggi a foglia, solanacee, cucurbitacee, cavoli a infiorescenza, a testa, a foglia, cavoli-rapa, ortaggi a stelo, legumi): 250-300 ml/hl contro Afidi, Tripidi, Aleurodidi, Nottue fogliari, Pieridi, Altiche, Tentredine, Depressaria, Criocera.
COLZA, RAVIZZONE, GIRASOLE, COTONE, CANAPA: 1,8 – 2 l/ha contro Punteruolo, Altica dello stelo, Afidi.
PATATA: 250-300 ml/hl contro Afidi e tignola
CEREALI : 2-2,5 l/ha contro Afidi
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO : 1,8 –2 l/ha contro Afidi e Nottue fogliari
FORAGGERE LEGUMINOSE: 1,5 l/ha contro Afidi, Apion, Fitonomo, Misurino
TABACCO : 1,8 l/ha contro Afidi e Tripidi
FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI, VIVAI : 250-300 ml/hl contro Afidi, Tripidi, Aleurodidi, Cocciniglie, Cicaline, Tingidi.
PIOPPO : 300-350 ml/hl contro Crisomela del pioppo, Cimicetta del pioppo

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Per le colture in serra si consiglia di eseguire saggi preliminari.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame

INTERVALLO DI SICUREZZA : 20 giorni
Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tre le 48 ore ed i tempi di carenza del formulato, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua- Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CORONADO

Insetticida emulsionabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Malation puro g 36,10 (361,7 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.- Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A.- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 11275 del 4/4/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 10-50-100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

VAFOR DIM

Insetticida a base di Dimetoato
Concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DIMETOATO puro g. 38 (= 395,2 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
Contiene Xilene e Cicloesanone

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile
Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione
Irritante per gli occhi

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

DISTRIBUITO DA:
IQV ITALIA S.R.L.
Fiano Romano (RM)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 11310 del 9.5.2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 250 - 500 litri 1 - 5 - 10 – 20

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare, visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Poco efficace la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
VAFOR DIM è un insetticida dotato di efficacia contro numerosi insetti parassiti delle colture agrarie.
VAFOR DIM ha un potere abbattente ed una azione citotropica per cui penetra nei tessuti vegetali agendo sulle forme di insetti piu' nascoste.
AGRUMI (vivai di piante non in produzione): contro Afidi, Acari, - Cocciniglie e Ragno rosso 125 ml/hl.
OLIVO : contro Mosca delle olive 140 ml/hl negli attacchi "precocissimi" (luglio) e "normali" (settembre-ottobre); 75 ml/hl in quelli "precoci" (agosto). I trattamenti si eseguono normalmente all'inizio dell'ovodeposizione, cioè quando si notano le prime punture della mosca sulle olive; contro Tignola 140 ml/hl contro larve della generazione fillofaga; contro Liotripide 90 ml/hl in pre-fioritura; contro Punteruolo e Oziorrinco 70 ml/hl.
CILIEGIO : contro Mosca della ciliegia 50 ml/hl sulle varietà a maturazione media e tardiva.
ASPARAGO: contro Mosca 70-100 ml/hl alla comparsa dell'infestazione; contro Ragno rosso e Afidi 90 ml/hl.
POMODORO, MELANZANA (entrambe solo in pieno campo): contro Afidi e Aleurodidi 70-100 ml/hl; contro Vasate 100 ml/hl.
LATTUGA (solo in pieno campo), **BIETOLA ROSSA, RAPA, NAVONE**: contro Afidi, Mosca e Ragno rosso 70-100 ml/hl.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Sminturide 50 ml/hl, contro Mosca 70-100 ml/hl.
TABACCO: contro lepidotteri 55-100 ml/hl; contro Aleurodidi, Afidi e Tripidi 70-90 ml/hl.
FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE: contro Sminturide 50 ml/hl.
FLORICOLE: contro Ditteri dei fiori, Striscino del garofano e Hylemya Brunnescens eseguire, alla dose di 200 ml per ettolitro di acqua, trattamenti a partire dal mese di aprile contro queste larve minatrici.
PIOPPO, COLTURE FORESTALI: contro Tarlo vespa, Gemmaiola, Crisomela 300 ml/hl.

COMPATIBILITA'
VAFOR DIM è compatibile con tutti i fungicidi comunemente usati ad eccezione della poltiglia bordolese, borgognona e polisolfuro di calcio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Si sconsiglia l'impiego del prodotto su cedro, arancio amaro, limone interdonato, crisantemo, e su varietà di olivo quali: Coratina, Canino, Frantoio, Simona, Vernina, Marsella, Itrana, Bosana.

RISCHI DI NOCIVITA'
A seguito dei trattamenti il prodotto è nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA:
14 giorni prima della raccolta per lattuga e asparago;
20 giorni per tabacco e ciliegio;
21 giorni per pomodoro e melanzana;
28 giorni per olivo, frumento, segale e triticale;
30 giorni per barbabietola da zucchero, bietola rossa, rapa e navone.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

VALTOR

Erbicida selettivo in granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Metribuzin puro g 35
Coformulanti q.b. a g. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
OFFICINE DI PRODUZIONE
- SCHIRM GmbH Division SIDECO - Mecklenburger Str. 229 - LUBECCA (Germania)
- SULPHUR MILLS LIMITED - 1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist.Bharuch, GUJARAT (India)
DISTRIBUITO DA
IQV ITALIA S.R.L. – Fiano Romanop (RM)
OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 11311 del 9.5.2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100 -250-500 - kg 1-5-10-20-25

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

E' un erbicida selettivo ad assorbimento radicale e fogliare utilizzato per il diserbo di patata, pomodoro, asparago, frumento, orzo, soia ed erba medica. Risulta efficace nei confronti delle seguenti infestanti graminacee: Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Apera spica venti (Agrostide annuale) Lolium multiflorum (Loietto), Poa annua (Fienarola comune) e dicotiledoni: Amaranthus retroflexus (Amaranto), Anagallis arvensis (Anagallide), Capsella bursa-pastoris (Borsa pastore), Centaurea cyanus (Fiordaliso), Chenopodium album (Farinaccio), Chenopodium spp., Fumaria officinalis (Fumaria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Lamium purpureum (Falsa ortica) Matricaria chamomilla (Camomilla), Mercurialis annua (Mercurella), Myagrum perfoliatum (Miagro) Papaver rhoeas (Papavero), Polygonum spp., Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Stellaria media (Centocchio), Veronica arvensis (Veronica).

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

PATATA: in pre-emergenza alla dose di 0,5-0,8 kg/ha, impiegando la dose più alta nei terreni argillosi; evitare l'applicazione nei terreni sabbiosi. In post-emergenza alla dose di 0,5-0,6 kg/ha. Risulta selettivo sulle seguenti varietà: Admirandus, Alkamaria, Apollo, Arsy, Bea, Bintje, Cardinal, Desirée, Favorita, Humalda, Kennebec, Majestic, Monnalisa, Primura, Resj, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal. Se ne sconsiglia l'impiego su Draga, Jarla, Vivax.
POMODORO: 0,5-0,6 kg/ha intervenendo 7-14 giorni prima della semina o del trapianto su terreno preparato e senza interrare.
0,5-0,8 kg/ha in post-emergenza o post-trapianto con piante di pomodoro con almeno 8-9 foglie e comunque dopo il superamento della crisi di trapianto.
ASPARAGO: in pre-emergenza dei turioni alla dose di 1-1,2 kg/ha e su impianti di almeno 2 anni.
FRUMENTO E ORZO : 0,2 kg/ha dallo stadio di 2 foglie vere a fine accestimento
SOIA: 0,5 - 0,7 kg/ha in pre-semina o pre-emergenza. Evitare l'impiego nei terreni più sabbiosi e torbosi.
ERBA MEDICA : 1-1,5 kg/ha in autunno/inverno e con coltura in pieno riposo vegetativo. Dose minore nei terreni sabbiosi.

AVVERTENZE D'USO

Impiegare il prodotto con 500-700 litri di acqua ad ettaro in pre-semina, pre-trapianto e pre-emergenza della coltura e con 300-400 litri ad ettaro in post-emergenza.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con erbicidi a reazione neutra. In particolare miscele con 2,4D, MCPA, tralkoxydim, fenoxaprop-ethyl, tribenuron-metil, rinsulfuron, fluoroxipir, triasulfuron, consentono di ampliare lo spettro di efficacia del trattamento erbicida.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA

PATATA, ASPARAGO, SOIA, ERBA MEDICA: 60 giorni.
POMODORO, FRUMENTO, ORZO: 30 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

VALTOR

Erbicida selettivo in granuliidrodispersibili. Sacchetti idrosolubili

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Metribuzin puro	g 35
Coformulanti	q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE

- SCHIRM GmbH Division SIDECO - Mecklenburger Str. 229 - LUBECCA (Germania)
- SULPHUR MILLS LIMITED - 1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist.Bharuch, GUJARAT (India)

DISTRIBUITO DA

IQV ITALIA S.R.L. – Fiano Romanop (RM)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 11311 del 09/05/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 500 (5 s.i. x 100 g; 1 s. i. x 500 g); **kg 1** (2 s. i. x 500 g)

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncosasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

E' un erbicida selettivo ad assorbimento radicale e fogliare utilizzato per il diserbo di patata, pomodoro, asparago, frumento, orzo, soia ed erba medica. Risulta efficace nei confronti delle seguenti infestanti graminacee: Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Apera spica venti (Agrostide annuale) Lolium multiflorum (Loietto), Poa annua (Fienarola comune) e dicotiledoni: Amaranthus retroflexus (Amaranto), Anagallis arvensis (Anagallide), Capsella bursa-pastoris (Borsa pastore), Centaurea cyanus (Fiordaliso), Chenopodium album (Farinaccio), Chenopodium spp., Fumaria officinalis (Fumaria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Lamium purpureum (Falsa ortica) Matricaria chamomilla (Camomilla), Mercurialis annua (Mercurella), Myagrum perfoliatum (Miagro) Papaver rhoeas (Papavero), Polygonum spp., Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Stellaria media (Centocchio), Veronica arvensis (Veronica).

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

PATATA: in pre-emergenza alla dose di 0,5-0,8 kg/ha, impiegando la dose più alta nei terreni argillosi; evitare l'applicazione nei terreni sabbiosi. In post-emergenza alla dose di 0,5-0,6 kg/ha. Risulta selettivo sulle seguenti varietà: Admirandus, Alkamaria, Apollo, Arsy, Bea, Bintje, Cardinal, Desirée, Favorita, Humalda, Kennebec, Majestic, Monnalisa, Primura, Resj, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal. Se ne sconsiglia l'impiego su Draga, Jarla, Vivax.

POMODORO: 0,5-0,6 kg/ha intervenendo 7-14 giorni prima della semina o del trapianto su terreno preparato e senza interrare.
0,5-0,8 kg/ha in post-emergenza o post-trapianto con piante di pomodoro con almeno 8-9 foglie e comunque dopo il superamento della crisi di trapianto.

ASPARAGO: in pre-emergenza dei turioni alla dose di 1-1,2 kg/ha e su impianti di almeno 2 anni.

FRUMENTO E ORZO : 0,2 kg/ha dallo stadio di 2 foglie vere a fine accestimento

SOIA: 0,5 - 0,7 kg/ha in pre-semina o pre-emergenza. Evitare l'impiego nei terreni più sabbiosi e torbosi.

ERBA MEDICA : 1-1,5 kg/ha in autunno/inverno e con coltura in pieno riposo vegetativo. Dose minore nei terreni sabbiosi.

AVVERTENZE D'USO

Impiegare il prodotto con 500-700 litri di acqua ad ettaro in pre-semina, pre-trapianto e pre-emergenza della coltura e con 300-400 litri ad ettaro in post-emergenza.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con erbicidi a reazione neutra. In particolare miscele con 2,4D, MCPA, tralkoxydim, fenoxaprop-ethyl, tribenuron-metil, rinsulfuron, fluoroxipir, triasulfuron, consentono di ampliare lo spettro di efficacia del trattamento erbicida.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA

PATATA, ASPARAGO, SOIA, ERBA MEDICA: 60 giorni. POMODORO, FRUMENTO, ORZO: 30 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua –

Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

30%

1 Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.

2 Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.

3 Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti).

4 Aggiungere la restante acqua nell'atomizzatore.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

VALTOR

Erbicida selettivo in granuli idrodispersibili

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Metribuzin puro g 35
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
OFFICINE DI PRODUZIONE
- SCHIRM GmbH Division SIDECO - Mecklenburger Str. 229 - LUBECCA (Germania)
- SULPHUR MILLS LIMITED - 1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist.Bharuch, GUJARAT (India)
DISTRIBUITO DA
IQV ITALIA S.R.L. – Fiano Romanop (RM)
OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 11311 del 9.5.2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA DA APPORRE SUL SACCHETTO IDROSOLUBILE

VALTOR

Erbicida selettivo in granuli idrodispersibili. Sacchetti idrosolubili

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Metribuzin puro g 35
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
OFFICINE DI PRODUZIONE
- SCHIRM GmbH Division SIDECO - Mecklenburger Str. 229 - LUBECCA (Germania)
- SULPHUR MILLS LIMITED - 1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist.Bharuch, GUJARAT (India)
DISTRIBUITO DA
IQV ITALIA S.R.L. – Fiano Romanop (RM)
OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 11311 del 09/05/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100; 500.

PARTITA N.

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE
AVVERTENZA: LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

VAMILO

Insetticida polivalente in forma liquida

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
METOMIL puro g 19,6 (= 200 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene N-metil-2-pirrolidone

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente a personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3/8/1968 n. 1255.

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Infiammabile.
Molto tossico per ingestione.
Irritante per gli occhi e la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
Albano S.Alessandro (BG)

DISTRIBUITO DA

IQV ITALIA S.R.L. – Fiano Romano (RM)

OFFICINE DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 11312 del 9.5.2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,5 – 1 – 2 – 3 - 5 - 10

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni,ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

VAMILO è un insetticida che si presenta in forma liquida prontamente dispersibile in acqua.
VAMILO agisce per contatto ed ingestione su larve ed adulti di insetti che attaccano numerose colture agrarie quali lepidotteri, emitteri, omotteri, ditteri e coleotteri.
Per la limitata persistenza VAMILO può essere impiegato sino a 10 giorni prima della raccolta (14 giorni su lattuga).

DOSI E CAMPI DI IMPIEGO

PESCO, SUSINO, ALBICOCCO, CILIEGIO, MANDORLO: contro Afidi, Anarsia, Tignola orientale 200 ml/hl; contro Cocciniglie 180-200 ml/hl.
MELO E PERO: contro Afide farinoso e verde; Litocollete, Cemiostoma, Carpocapsa e Ricamatrici 150-200 ml/hl
VITE DA VINO: contro Tignole 150-200 ml/hl;
VITE DA TAVOLA: contro Tignole 150-200 ml/hl non superando comunque i 2 litri per ettaro di superficie e per un numero massimo di 2 applicazioni.
AGRUMI: contro Cocciniglie, afidi 200 ml/hl
OLIVO: contro Cocciniglie e Tignola 200 ml/hl
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Altica e Cleono 150-180 ml/hl
TABACCO: contro Afidi, Tripidi, larve di Lepidotteri 150-180 ml/hl
COLTURE ORTICOLE (cavoli, escluso cavolfiore e cavolo cappuccio, lattuga, cucurbitacee, fagiolo, pisello, solanacee) contro Afidi, Cavolaia, larve di Nottuidi, Aleurodidi, 150-200 ml/hl
PIOPPO: contro larve defogliatrici, Saperda, Crisomela del pioppo, Cimicetta del pioppo 200 ml/hl;
COLTURE FLOREALI E ORNAMENTALI contro Afidi, Cocciniglie, Cicaline, Cecidomia, larve defogliatrici, Coleotteri defogliatori, Minatrice della gerbera, Tortrice del garofano, Tingidi 150-200 ml/hl

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

E' tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame

INTERVALLO DI SICUREZZA: 10 giorni; 14 giorni su lattuga; 30 giorni su vite da tavola
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

DIEFFE 80 WG

Zolfo in microgranuli idrodispersibili ad azione fungicida

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
ZOLFO puro g 80
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.- Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
Sulphur Mills Limited
1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist. Bharuch, Gujarat (India)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 11333 del 22.05.2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100 –250-500 kg 1-2,5-5-10-25

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
DIEFFE 80 WG è uno zolfo realizzato in granuli idrodispersibili caratterizzato da una pronta e facile dispersibilità in acqua durante la preparazione della poltiglia. La finezza ed uniformità di lavorazione fanno sì che quando questa formulazione viene irrorata sulla vegetazione, le particelle di zolfo si dispongono le une accanto alle altre con regolarità, a guisa di film, senza lasciare spazi scoperti sulla vegetazione.
Per le peculiari caratteristiche il DIEFFE 80 WG resiste bene al dilavamento ed ha, conseguentemente, un'ottima persistenza. IL DIEFFE 80 WG è usato contro l'oidio o mal bianco delle colture agrarie affette da tale fitopatia.

EPOCHE DI IMPIEGO
DIEFFE 80 WG si impiega in trattamenti preventivi o alla prima comparsa della crittogama ripetendo i trattamenti ad intervalli variabili in funzione dell'andamento stagionale e della intensità degli attacchi.

COLTURE E DOSI DI IMPIEGO
VITE: 200-400 g/hl in situazioni a bassa pressione di oidio; 400-800 g/hl in situazioni ad alta pressione. A parità di pressione della malattia, scegliere le dosi maggiori nel caso si adottino intervalli di trattamento più lunghi.
POMACEE: 300-500 g/hl in pre-fioritura; 200-300 g/hl in trattamenti post-fioritura.
DRUPACEE: 200-400 g/hl in pre e post-fioritura; 400-600 g/hl nei trattamenti post-raccolta
AGRUMI: 200-400 g/hl intervenendo alla prima comparsa dei sintomi
OLIVO: 200-400 g/hl intervenendo alla prima comparsa dei sintomi
FRAGOLA: 250-500 g/hl intervenendo alla prima comparsa della malattia
NOCCIOLO: 300-500 g/hl intervenendo alla prima comparsa della malattia
ORTAGGI, PATATA: 200-500 g/hl effettuando le prime applicazioni non appena si manifestano i primi sintomi dell'infezione; le dosi più elevate dovranno essere impiegate nel periodo primaverile e nei momenti in cui gli attacchi del patogeno sono più virulenti
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: utilizzare 6-8 kg per ettaro di superficie effettuando il primo trattamento non appena appaiono i sintomi della malattia e ripetendo gli interventi ad intervalli di 15-20 giorni.
CEREALI: 6-8 kg per ettaro intervenendo quando l'oidio si manifesta sulle ultime foglie del culmo
GIRASOLE, SOIA, TABACCO : 4-6 kg/ha
VIVAI DI PIOPPO: 200-400 g/hl
COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI: da g 150 a g 400 per 100 litri di acqua

COMPATIBILITA'
DIEFFE 80 WG è incompatibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.), con olii minerali, con Captano, DDVP, Diclofluanide.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.
Può arrecare danno alle seguenti cultivar di MELO: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome beauty, Stayman red, Winesap, PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivieer de Serres, William, Decana del Comizio; VITE: Sangiovese; CUCURBITACEE: può essere fitotossico.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 5 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

DIEFFE 80 WG

Zolfo in microgranuli idrodispersibili ad azione fungicida, in sacchetti idrosolubili

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
ZOLFO puro g 80
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.- Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
Sulphur Mills Limited
1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist. Bharuch, Gujarat (India)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 11333 del 22.05.2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1 (5 s. i. x 200 g); **kg 1** (4 s. i. x 250 g)

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il DIEFFE 80 WG è uno zolfo realizzato in granuli idrodispersibili caratterizzato da una pronta e facile dispersibilità in acqua durante la preparazione della poltiglia. La finezza ed uniformità di lavorazione fanno si che quando questa formulazione viene irrorata sulla vegetazione, le particelle di zolfo si dispongono le une accanto alle altre con regolarità, a guisa di film, senza lasciare spazi scoperti sulla vegetazione.
Per le peculiari caratteristiche il DIEFFE 80 WG resiste bene al dilavamento ed ha, conseguentemente, un'ottima persistenza.
IL DIEFFE 80 WG è usato contro l'oidio o mal bianco delle colture agrarie affette da tale fitopatia.

EPOCHE DI IMPIEGO
Il DIEFFE 80 WG si impiega in trattamenti preventivi o alla prima comparsa della crittogama ripetendo i trattamenti ad intervalli variabili in funzione dell'andamento stagionale e della intensità degli attacchi.

COLTURE E DOSI DI IMPIEGO
VITE: 200-400 g/hl in situazioni a bassa pressione di oidio; 400-800 g/hl in situazioni ad alta pressione. A parità di pressione della malattia, scegliere le dosi maggiori nel caso si adottino intervalli di trattamento più lunghi
POMACEE: 300-500 g/hl in pre-fioritura; 200-300 g/hl in trattamenti post-fioritura.
DRUPACEE: 200-400 g/hl in pre e post-fioritura; 400-600 g/hl nei trattamenti post-raccolta
AGRUMI: 200-400 g/hl intervenendo alla prima comparsa dei sintomi. **OLIVO**: 200-400 g/hl intervenendo alla prima comparsa dei sintomi. **FRAGOLA**: 250-500 g/hl intervenendo alla prima comparsa della malattia. **NOCCIOLO**: 300-500 g/hl intervenendo alla prima comparsa della malattia
ORTAGGI, PATATA: 200-500 g/hl effettuando le prime applicazioni non appena si manifestano i primi sintomi dell'infezione, le dosi più elevate dovranno essere impiegate nel periodo primaverile e nei momenti in cui gli attacchi del patogeno sono più virulenti
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: utilizzare 6-8 kg per ettaro di superficie effettuando il primo trattamento non appena appaiono i sintomi della malattia e ripetendo gli interventi ad intervalli di 15-20 giorni.
CEREALI: 6-8 kg per ettaro intervenendo quando l'oidio si manifesta sulle ultime foglie del culmo
GIRASOLE, SOIA, TABACCO : 4-6 kg/ha .**VIVAI DI PIOPPO**: 200-400 g/hl
COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI: da g 150 a g 400 per 100 litri di acqua
AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

COMPATIBILITA'
Il DIEFFE 80 WG è incompatibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.), con olii minerali, con Captano, DDVP, Diclofluanide.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' Deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.
Può arrecare danno alle seguenti cultivar di MELO: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome beauty, Stayman red, Winesap, PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contesssa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivieer de Serres. William, Decana del Comizio; VITE: Sangiovese; CUCURBITACEE: può essere fitotossico.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 5 giorni
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

30%
1. Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.
2. Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.
3. Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti).
4. Aggiungere la restante acqua nell'atomizzatore.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

DIEFFE 80 WG

Zolfo in microgranuli idrodispersibili ad azione fungicida

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
ZOLFO puro g 80
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.- Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
Sulphur Mills Limited
1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist. Bharuch, Gujarat (India)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 11333 del 22.05.2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA DA APPORRE SUL SACCHETTO IDROSOLUBILE

DIEFFE 80 WG

Zolfo in microgranuli idrodispersibili ad azione fungicida, in sacchetti idrosolubili

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
ZOLFO puro g 80
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.- Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
Sulphur Mills Limited
1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist. Bharuch, Gujarat (India)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 11333 del 22.05.2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 200; 250

PARTITA N.

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE
AVVERTENZA: LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

CURENOX 30 PB

Ossicloruro di rame al 30% di rame
Fungicida in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
RAME METALLO (sotto forma di ossicloruro) g. 30
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.
Via Tonale, 15
ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

DISTRIBUITO DA:
IQV S.R.L. - MILANO

OFFICINE DI PRODUZIONE
- DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
- IQV – INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A. MOLLLET DEL VALLES (Barcellona – Spagna)

Registrazione Ministero della Salute n. 11461 del 9.10.2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100 - 250 - 500 - kg 1 - 5 - 10 – 20 - 25

PARTITA N.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
Il CURENOX 30 PB è un fungicida impiegato nella lotta contro tutte le Crittogame sensibili ai comuni sali di rame.
Le applicazioni sono preventive e vanno effettuate in concomitanza alle condizioni di umidità e temperatura favorevoli all'insorgere delle malattie.

DOSI DI IMPIEGO
VITE: 400-500 g/hl contro peronospora
POMACEE:(melo, pero, cotogno): contro ticchiolatura, cancri rameali 400 g/hl per trattamenti primaverili;- 600 g/hl per trattamenti ad ingrossamento gemme; 1000-1500 g/hl per trattamenti invernali
DRUPACEE (pesco, susino, albicocco, ciliegio): contro bolla, corineo, cancro dei rametti 850-1500 g/hl in trattamenti autunno-invernali, contro batteriosi 400-500 g/hl a caduta foglie (2 interventi)
OLIVO: 500-600 g/hl contro occhio di pavone, lebbra, fumaggine
AGRUMI: 500-600 g/hl contro mal secco e allupatura
ACTINIDIA: 600-800 g/hl contro batteriosi a caduta foglie
FRUTTIFERI A GUSCIO (noce, nocciolo, mandorlo, castagno): 500-700 g/hl contro citospora, batteriosi, maculatura fogliare, cancri rameali in trattamenti autunno-invernali
FRAGOLA: 300-400 g/hl contro vaiolatura
ORTAGGI A TUBERO E RADICE, ORTAGGI A BULBO, ORTAGGI A FOGLIA, ASPARAGO, CARDO, SEDANO, FINOCCHIO, CARCIOFO, PORRO, FAGIOLO, PISELLO, CAVOLI, SOLANACEE, CUCURBITACEE :400-500 g/hl contro peronospora, alternaria, septoria, antracnosi, cladosporiosi, cercospora, ruggini
PATATA: 400-500 g/hl contro peronospora, alternaria, septoria, cladosporiosi
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: 4-5 kg/ha contro cercospora
TABACCO: 300-400 g/hl contro peronospora
OLEAGINOSE : 300-400 g/hl contro septoria, peronospora, batteriosi
CEREALI: 300-400 g/hl contro ruggini e septoria
RISO: 4-5 kg/ha contro le alghe da risaia
FLOREALI E ORNAMENTALI: 300-400 g/hl contro ruggini, peronospora, ticchiolatura, septoria
CONCIA ANTICARIE DELLE SEMENTI DI CEREALI (esclusi mais, sorgo e riso) 300 g/q.le di seme
AVVERTENZA: I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi

COMPATIBILITA'
Il CURENOX 30 PB è miscibile con i comuni prodotti fitosanitari a reazione neutra.
AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA': Non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco, susino e varietà di melo Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, e di pero Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott.Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard, cuprosensibili, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA' : il prodotto è tossico per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CURENOX 30 PB

Ossicloruro di rame al 30% di rame
Fungicida in polvere bagnabile, in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
RAME METALLO (sotto forma di ossicloruro) g. 30
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S. ALESSANDRO (BG)
DISTRIBUITO DA:
IQV S.R.L. - MILANO
OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
IQV – INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A. Molllet del Valles (Barcellona – Spagna)

Registrazione Ministero della Salute n. 11461 del 9.10.2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1 (n. 10 x g 100; n. 4 x g 250; n. 2 x g 500)
PARTITA N.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cuprenia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
Il CURENOX 30 PB è un fungicida impiegato nella lotta contro tutte le Crittogame sensibili ai comuni sali di rame.
Le applicazioni sono preventive e vanno effettuate in concomitanza alle condizioni di umidità e temperatura favorevoli all'insorgere delle malattie.

DOSI DI IMPIEGO
VITE: 400-500 g/hl contro peronospora
POMACEE:(melo, pero, cotogno): contro ticchiolatura, cancri rameali 400 g/hl per trattamenti primaverili;- 600 g/hl per trattamenti ad ingrossamento gemme; 1000-1500 g/hl per trattamenti invernali
DRUPACEE (pesco, susino, albicocco, ciliegio): contro bolla, corineo, cancro dei rametti 850-1500 g/hl in trattamenti autunno-invernali, contro batteriosi 400-500 g/hl a caduta foglie (2 interventi)
OLIVO: 500-600 g/hl contro occhio di pavone, lebbra, fumaggine
AGRUMI: 500-600 g/hl contro mal secco e allupatura
ACTINIDIA: 600-800 g/hl contro batteriosi a caduta foglie
FRUTTIFERI A GUSCIO (noce, nocciolo, mandorlo, castagno): 500-700 g/hl contro citospora, batteriosi, maculatura fogliare, cancri rameali in trattamenti autunno-invernali
FRAGOLA: 300-400 g/hl contro vaiolatura
ORTAGGI A TUBERO E RADICE, ORTAGGI A BULBO, ORTAGGI A FOGLIA, ASPARAGO, CARDO, SEDANO, FINOCCHIO, CARCIOFO, PORRO, FAGIOLO, PISELLO, CAVOLI, SOLANACEE, CUCURBITACEE :400-500 g/hl contro peronospora, alternaria, septoria, antracnosi, cladosporiosi, cercospora, ruggini
PATATA: 400-500 g/hl contro peronospora, alternaria, septoria, cladosporiosi
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: 4-5 kg/ha contro cercospora
TABACCO: 300-400 g/hl contro peronospora
OLEAGINOSE : 300-400 g/hl contro septoria, peronospora, batteriosi
CEREALI: 300-400 g/hl contro ruggini e septoria
RISO: 4-5 kg/ha contro le alghe da risaia
FLOREALI E ORNAMENTALI: 300-400 g/hl contro ruggini, peronospora, ticchiolatura, septoria
CONCIA ANTICARIE DELLE SEMENTI DI CEREALI (esclusi mais, sorgo e riso) 300 g/q.le di seme
AVVERTENZA: I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi

COMPATIBILITA'
Il CURENOX 30 PB è miscibile con i comuni prodotti fitosanitari a reazione neutra.
AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA': Non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco, susino e varietà di melo Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, e di pero Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott.Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard, cuprosensibili, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
RISCHI DI NOCIVITA' : il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

30%

1. Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.
2. Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.
3. Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti).
4. Aggiungere la restante acqua nell'atomizzatore.

ETICHETTA DA APPORRE SUL SACCHETTO IDROSOLUBILE

CURENOX 30 PB

Ossicloruro di rame al 30% di rame
Fungicida in polvere bagnabile, in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
RAME METALLO (sotto forma di ossicloruro) g. 30
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S. ALESSANDRO (BG)
DISTRIBUITO DA:
IQV S.R.L. – MILANO
OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
IQV – INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A. Molllet del Valles (Barcellona – Spagna)

Registrazione Ministero della Salute n. 11461 del 9.10.2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100; 250; 500

PARTITA N.

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE
AVVERTENZA: LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CURENOX 30 PB

Ossicloruro di rame al 30% di rame
Fungicida in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
RAME METALLO (sotto forma di ossicloruro) g. 30
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

DISTRIBUITO DA:
IQV S.R.L. - MILANO

OFFICINE DI PRODUZIONE
- DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
- IQV – INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
  MOLLLET DEL VALLES (Barcellona – Spagna)

Registrazione Ministero della Salute n. 11461 del 9.10.2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

READY GERMIPLUS

Erbicida granulare pronto all'uso per tappeti erbosi e colture ornamentali

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Pendimetalin puro g 1,70
Coformulanti q.b. a g. 100

NATURA DEL RISCHIO **IRRITANTE**
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

DISTRIBUITO DA
SCOTTS Italia S.r.l.- Via Monterumici, 8
31100 TREVISO

Registrazione Ministero della Salute n. 11505 del 22/11/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 50– 100- 200- 250- 500 kg 1 – 5 – 7 - 10 – 15 - 20 - 25

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento si osservano: depressione SNC, dispnea, diuresi, convulsioni. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
READY GERMIPLUS è un erbicida granulare pronto all'uso indicato per il controllo di numerose infestanti graminacee e dicotiledoni dei tappeti erbosi e delle colture ornamentali anche in vivaio.
Agisce inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli e mostra efficacia anche su infestanti già emerse purché nei primi stadi di sviluppo (graminacee allo stadio di 1-2 foglie e dicotiledoni non oltre lo stadio di 2-3 foglie vere).
Infestanti sensibili:
GRAMINACEE: Alopecurus myosuroides (coda di volpe), Apera spica-venti (agrostide annuale), Digitaria sanguinalis (digitaria), Echinochloa crus-galli (giavone comune), Lolium spp (loglio), Panicum dicotoniflorum (panico americano), Poa spp (fienarola), Setaria spp (falso panico), Sorghum halepense da seme (sorghetta)
DICOTILEDONI: Anagallis arvensis (anagallide), Capsella bursa-pastoris (borsa pastore), Cerastium arvense (cerastio), Chenopodium spp (farinello), Diplotaxis spp (ruchetta), Fallopia convolvulus (convolvolo nero), Fumaria officinalis (fumaria),Lamium purpureum (falsa ortica), Mercurialis annua (mercorella), Papaver rhoeas (papavero), Polygonum aviculare (correggiola), Polygonum persicaria (persicaria), Portulaca oleracea (erba porcellana), Solanum nigrum (erba morella), Stachys annua (erba stregona) Stellaria media (centocchio), Veronica spp (veronica), Urtica urens (ortica piccola), Viola tricolor (viola a tre colori)

MODALITA' DI IMPIEGO
Si applica su tappeti erbosi di Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra, Festuca arundinacea, Cynodon dactylon e Zoysia matrella;
Evitare trattamenti su "Greens" e "Tee" da golf a base di Agrostis e Poa annua.
Il prodotto non deve essere applicato su tappeti appena seminati, su tappeti nuovi sin dopo l'esecuzione del quarto taglio e su tappeti sofferenti e deboli (ad esempio con crescita lenta ed irregolare).
La distribuzione dovrà essere eseguita nel modo più uniforme possibile, con l'ausilio di spandiconcimi professionali o con appositi carrelli gravitazionali, facendo seguire al trattamento una leggera irrigazione (5-10 litri/mq).
READY GERMIPLUS può essere inoltre impiegato nel diserbo di impianti di alberi e arbusti ornamentali, distribuendo il prodotto a spaglio nell'interfila o tra pianta e pianta.

EPOCHE E DOSI DI IMPIEGO
Tappeti erbosi:
- in primavera e prima della germinazione delle infestanti alla dose di 6-8 kg /1.000 mq; in caso di forte infestazione ripetere il trattamento dopo 6-8 settimane
- in autunno, alla stessa dose, per impedire la germinazione di Poa annua; tappeti erbosi a base di Agrostis e Poa annua non devono essere più trattati dopo la fine di settembre.

Colture ornamentali (alberi e arbusti):
- nell'interfila (anche in vivaio) alla dose di 3-5 kg/1.000 mq e nelle stesse epoche riportate per il diserbo dei tappeti erbosi.

COMPATIBILITA'
Il prodotto deve essere impiegato da solo .
Avvertenza: dopo il trattamento non arieggiare o fare tagli verticali (Verticut). Nei tappeti erbosi in cui è prevista una trasemina a metà giugno, eseguire l'intervento entro l'inizio di marzo.
Tempo di sicurezza per la trasemina: 4 mesi.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture e le epoche non indicate in etichetta. Su colture di piante ornamentali non portare il prodotto a contatto con foglie o parti verdi o tessuti non ben lignificati.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

READY GERMIPLUS

Erbicida granulare pronto all'uso per tappeti erbosi e colture ornamentali

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Pendimetalin puro g 1,70
Coformulanti q.b. a g. 100

NATURA DEL RISCHIO **IRRITANTE**
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

DISTRIBUITO DA
SCOTTS Italia S.r.l.- Via Monterumici, 8
31100 TREVISO

Registrazione Ministero della Salute n. 11505 del 22/11/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 50– 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

LIRIUS 60 DF

Erbicida per il riso in granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Bensulfuron metile puro g 6 0
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE

SULPHUR MILLS LIMITED
1904-1905 G.I.D.C. Panoli
Dist. Bharuch, Gujarat, India
TIDE INTERNATIONAL CO. LTD.
Ronhuo Tong, Changzhou, Cina

OFFCINA DI CONFEZIONAMENTO

DIACHEM S.P.A. –U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 11514 del 03/12/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100 – 250 – 500 - kg 1

PARTITA N.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

E' un erbicida per il riso utilizzato per il controllo delle infestanti non graminacee. **E'** efficace nei confronti di Butomus umbellatus (Giunco), Bolboschoemus (Scirpus) maritimus (Cipollino), Schoenoplectus (Scirpus) mucronatus (Quadrettone), Alisma plantago aquatica (Cucchiaio), Alisma lanceolata (Erba saetta), Cyperus spp. (Porro), Sparganium erectum (Palmassa), Typha spp. (Mazza sorda)

L'azione del prodotto risulta in genere più marcata in presenza di infestanti in attiva crescita ed ai primi stadi di sviluppo. Il prodotto, nelle normali condizioni d'uso, garantisce inoltre un discreto controllo iniziale di Heteranthera limosa e reniformis (specie se colpite allo stadio di rosetta); possono comunque ricomparire reinfestazioni di queste due infestanti.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Impiegare il prodotto alla dose di 100 g per ettaro di superficie con risaia sommersa con circa 10 cm di acqua, eseguendo l'intervento da 20 a 40 giorni dopo la semina del riso. Il prodotto può essere associato con giavonicidi specifici e deve essere distribuito uniformemente sulla superficie dell'acqua. Eseguito l'intervento si raccomanda di mantenere l'acqua ferma nelle camere per almeno 5 giorni, senza ulteriori immissioni; la fuoriuscita di acqua, causata ad esempio da forti precipitazioni nei giorni immediatamente successivi al trattamento, può causare riduzioni di efficacia del prodotto. Evitare di intervenire su colture sotto stress. Impiegare il prodotto alla dose indicata con volumi di 300/400 l/ha di acqua.

COMPATIBILITA'

In caso di miscela con altri formulati versare nella botte prima LIRIUS 60 DF facendo seguire gli altri formulati.

AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare di colpire direttamente o tramite deriva colture o piante arboree. Non lavare le attrezzature in vicinanza di colture o piante sensibili.

AVVERTENZA: immediatamente dopo il trattamento operare come segue allo scopo di rimuovere ogni traccia del prodotto nella pompa e nel serbatoio delle irroratrici:

- svuotare il serbatoio, risciacquando scrupolosamente pompa, barre e serbatoio; riempire il serbatoio con acqua pulita e addizionare una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% ca (candeggina) alla dose di 0,5 hl di acqua.
- risciacquare con agitatore in moto per circa 10 minuti, svuotare e risciacquare ancora con abbondante acqua pulita
  -filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ipoclorito di sodio al 5%.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

LIRIUS 60 DF

Erbicida per il riso in granuli idrodispersibili
Sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Bensulfuron metile puro g 60
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
SULPHUR MILLS LIMITED
1904-1905 G.I.D.C. Panoli
Dist. Bharuch, Gujarat, India
TIDE INTERNATIONAL CO. LTD.
Ronhuo Tong, Changzhou, Cina

OFFCINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A. –U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 11514 del 03/12/2002

Quantita' netta del preparato (n° sacchetti x g): g 100 (10x10; 5x20; 2x50; 1x100) – **g 250** (1x250; 5x50) – **g 500** (5x100; 2x250; 1x500) - **kg 1** (4x250; 1x1000)

Partita N.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
E' un erbicida per il riso utilizzato per il controllo delle infestanti non graminacee. E' efficace nei confronti di Butomus umbellatus (Giunco), Bolboschoemus (Scirpus) maritimus (Cipollino), Schoenoplectus (Scirpus) mucronatus (Quadrettone), Alisma plantago aquatica (Cucchiaio), Alisma lanceolata (Erba saetta), Cyperus spp. (Porro), Sparganium erectum (Palmassa), Typha spp. (Mazza sorda)
L'azione del prodotto riisulta in genere più marcata in presenza di infestanti in attiva crescita ed ai primi stadi di sviluppo. Il prodotto, nelle normali condizioni d'uso, garantisce inoltre un discreto controllo iniziale di Heteranthera limosa e reniformis (specie se colpite allo stadio di rosetta); possono comunque ricomparire reinfestazioni di queste due infestanti.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Impiegare il prodotto alla dose di 100 g per ettaro di superficie con risaia sommersa con circa 10 cm di acqua, eseguendo l'intervento da 20 a 40 giorni dopo la semina del riso. Il prodotto può essere associato con giavonicidi specifici e deve essere distribuito uniformemente sulla superficie dell'acqua. Eseguito l'intervento si raccomanda di mantenere l'acqua ferma nelle camere per almeno 5 giorni, senza ulteriori immissioni; la fuoriuscita di acqua, causata ad esempio da forti precipitazioni nei giorni immediatamente successivi al trattamento, può causare riduzioni di efficacia del prodotto. Evitare di intervenire su colture sotto stress. Impiegare il prodotto alla dose indicata con volumi di 300/400 l/ha di acqua.

COMPATIBILITA'
In caso di miscela con altri formulati versare nella botte prima LIRIUS 60 DF facendo seguire gli altri formulati.
AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare di colpire direttamente o tramite deriva colture o piante arboree. Non lavare le attrezzature in vicinanza di colture o piante sensibili.
AVVERTENZA: immediatamente dopo il trattamento operare come segue allo scopo di rimuovere ogni traccia del prodotto nella pompa e nel serbatoio delle irroratrici:
- svuotare il serbatoio, risciacquando scrupolosamente pompa, barre e serbatoio; riempire il serbatoio con acqua pulita e addizionare una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% ca (candeggina) alla dose di 0,5 hl di acqua.
- risciacquare con agitatore in moto per circa 10 minuti, svuotare e risciacquare ancora con abbondante acqua pulita
- filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ipoclorito di sodio al 5%

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

30%

1 Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.

2 Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.

3 Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti).

4 Aggiungere la restante acqua nell'atomizzatore.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

LIRIUS 60 DF

Erbicida per il riso in granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Bensulfuron metile puro g 6 0
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
SULPHUR MILLS LIMITED - 1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist. Bharuch, Gujarat, India
TIDE INTERNATIONAL CO. LTD. - Ronhuo Tong, Changzhou, Cina

OFFCINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A. U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 11514 del 03/12/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100
PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA DA APPORRE SUL SACCHETTO IDROSOLUBILE

LIRIUS 60 DF

Erbicida per il riso in granuli idrodispersibili
Sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Bensulfuron metile puro g 6 0
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
SULPHUR MILLS LIMITED - 1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist. Bharuch, Gujarat, India
TIDE INTERNATIONAL CO. LTD. -Ronhuo Tong, Changzhou, Cina

OFFCINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A. –U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 11514 del 03/12/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000.
PARTITA N.

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE
AVVERTENZA: LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

STEADY

Fungicida in granuli idrodispersibili per il controllo di numerose malattie delle colture frutticole, orticole ed ornamentali

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Ditianon puro g 66
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
SHANGAI AGRO-CHEMICALS INT. TRADE CO.LTD - Shangai (CINA)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n.11515 del 03/12/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g-50-100-250-500 - kg 1- 5-10-20

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante oculare e cutaneo; per ingestione scialorrea, vomito e diarrea.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
STEADY è un fungicida di contatto, efficace contro le principali malattie delle colture frutticole ed orticole tra cui ticchiolatura, bolla e cancri rameali. Dotato di spiccata attività preventiva e curativa, STEADY assicura prolungata persistenza d'azione ed elevata resistenza al dilavamento. La sua attività risulta maggiore quando la temperatura e l'umidità sono elevate

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO
MELO - Ticchiolatura, Gloeosporium, Cancri rameali: trattamenti preventivi in periodi caratterizzati da frequenti piogge 100-120 g/hl; trattamenti preventivi in periodi di piovosità media o scarsa 80-90 g/hl. Il prodotto è in grado di esplicare una attività curativa se somministrato entro 60 ore dall'inizio della pioggia.
PERO: Ticchiolatura 80-90 g/hl; Cancri rameali: 130-150 g/hl effettuando i trattamenti in autunno-inverno.
PESCO: Bolla, Corineo, Fusicoccum, Cytospora, Monilia, 130-150 g/hl in autunno alla caduta foglie
VITE: Peronospora 100 g/hl durante la stagione vegetativa con trattamenti preventivi; impiegare la dose di 100-120 g/hl in caso di sintomi in atto. Il prodotto è efficace anche nei confronti dell'Escoriosi.
POMODORO, PATATA: contro Peronospora 130-150 g/hl avendo l'avvertenza di effettuare trattamenti preventivi durante il periodo di maggiore piovosità.
FRAGOLA: Vaiolatura, Botrytis 100 g/hl effettuando trattamenti preventivi nei periodi di maggiore rischio.
PEPERONE: contro Phytophtora della parte aerea 100-120 g/hl nei periodi più umidi.
SPINACIO : Peronospora 100 g/hl
PISELLO : Antracnosi, Cilindrosporiosi, Cladosporiosi, Colletotrichum 120 g/hl
COLTURE FLOREALI E ORNAMENTALI: Ticchiolatura, Ruggine, Vaiolatura, Antracnosi, Muffa grigia, Septoria 80-100 g/hl

COMPATIBILITA'
Non effettuare miscele con olii minerali.
Impiegare la sospensione di prodotto subito dopo la sua preparazione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per i pesci

FITOTOSSICITA'
Evitare di trattare il melo Golden Delicious in prossimità della raccolta a causa del potere marcante del prodotto.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto; 40 giorni per la vite.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

STEADY

Fungicida in granuli idrodispersibili per il controllo di numerose malattie delle colture frutticole, orticole ed ornamentali.

Sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Ditianon puro g 66
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15 - 24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
SHANGAI AGRO-CHEMICALS INT. TRADE CO.LTD - Shangai (CINA)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n.11515 del 03/12/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1 (4 s.i x 250 g; 10 s.i. x 100 g)
PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante oculare e cutaneo; per ingestione scialorrea, vomito e diarrea.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
STEADY è un fungicida di contatto, efficace contro le principali malattie delle colture frutticole ed orticole tra cui ticchiolatura, bolla e cancri rameali. Dotato di spiccata attività preventiva e curativa, STEADY assicura prolungata persistenza d'azione ed elevata resistenza al dilavamento. La sua attività risulta maggiore quando la temperatura e l'umidità sono elevate

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO
MELO - Ticchiolatura, Gloeosporium, Cancri rameali: trattamenti preventivi in periodi caratterizzati da frequenti piogge 100-120 g/hl; trattamenti preventivi in periodi di piovosità media o scarsa 80-90 g/hl. Il prodotto è in grado di esplicare una attività curativa se somministrato entro 60 ore dall'inizio della pioggia.
PERO: Ticchiolatura 80-90 g/hl; Cancri rameali: 130-150 g/hl effettuando i trattamenti in autunno-inverno.
PESCO: Bolla, Corineo, Fusicoccum, Cytospora, Monilia, 130-150 g/hl in autunno alla caduta foglie
VITE: Peronospora 100 g/hl durante la stagione vegetativa con trattamenti preventivi; impiegare la dose di 100-120 g/hl in caso di sintomi in atto. Il prodotto è efficace anche nei confronti dell'Escoriosi.
POMODORO, PATATA: contro Peronospora 130-150 g/hl avendo l'avvertenza di effettuare trattamenti preventivi durante il periodo di maggiore piovosità.
FRAGOLA: Vaiolatura, Botrytis 100 g/hl effettuando trattamenti preventivi nei periodi di maggiore rischio.
PEPERONE: contro Phytophtora della parte aerea 100-120 g/hl nei periodi più umidi.
SPINACIO : Peronospora 100 g/hl
PISELLO : Antracnosi, Cilindrosporiosi, Cladosporiosi, Colletotrichum 120 g/hl
COLTURE FLOREALI E ORNAMENTALI: Ticchiolatura, Ruggine, Vaiolatura, Antracnosi, Muffa grigia, Septoria 80-100 g/hl

COMPATIBILITA'
Non effettuare miscele con olii minerali.
Impiegare la sospensione di prodotto subito dopo la sua preparazione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per i pesci

FITOTOSSICITA'
Evitare di trattare il melo Golden Delicious in prossimità della raccolta a causa del potere marcante del prodotto.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto; 40 giorni per la vite.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

30%

1 Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.

2 Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.

3 Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti).

4 Aggiungere la restante acqua nell'atomizzatore.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

STEADY

Fungicida in granuli idrodispersibili per il controllo di numerose malattie delle colture frutticole, orticole ed ornamentali

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Ditianon puro g 66
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
SHANGAI AGRO-CHEMICALS INT. TRADE CO.LTD - Shangai (CINA)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n.11515 del 03/12/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g-50-100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA DA APPORRE SUL SACCHETTO IDROSOLUBILE

STEADY

Fungicida in granuliidrodispersibili per il controllo di numerose malattie delle colture frutticole, orticole ed ornamentali.

Sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Ditianon puro g 66
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15 –
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE

SHANGAI AGRO-CHEMICALS INT. TRADE CO.LTD - Shangai (CINA)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO

DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n.11515 del 03/12/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100; 250
PARTITA N.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE
AVVERTENZA: LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

STREAM 44

Fungicida ad azione citotropica translaminare impiegato contro la Peronospora,l'Alternaria, l'Antracnosi, la Septoria
Formulazione: polvere bagnabile

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Cimoxanil puro g 4
- Rame metallo g 40
(sottoforma di ossicloruro)
- Coformulanti q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
Albano S. Alessandro (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA – Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 11532 del 20/12/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 10- 50 -100 –200 - 250 – 500; kg 1 - 5 - 10 – 20 - 25

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4% e Rame metallo 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia : gastrolusi con soluzione latto - albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
STREAM 44 è un fungicida in formulazione polvere bagnabile dato dall'unione di due principi attivi che agiscono per contatto e con azione endoterapica (citotropica translaminare), penetrando in modo completo nei tessuti vegetali entro 6 ore dal trattamento svolgendo una azione preventiva e curativa.
Impiegato sulle seguenti colture:
VITE - CARCIOFO - PATATA - POMODORO - CIPOLLA - AGLIO - PORRO - GIRASOLE - SOIA - LATTUGA - ROSA - ZUCCHINO - MELONE - PISELLO - SPINACIO - TABACCO contro la Peronospora, l'Alternaria, l'Antracnosi, la Septoria e con effetto secondario contro la Muffa grigia (Botrytis cinerea) e le Batteriosi, alla dose di g 200-300 su tutte le colture e per q.le d'acqua, trattando da quando si hanno i primi sintomi di infezione della malattia e ripetendo i trattamenti ad ogni necessità.

COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con tutti i prodotti a reazione neutra o acida. è sconsigliato l'impiego con prodotti a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci

FITOTOSSICITA' : non trattare in fioritura
Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto del carciofo, 28 giorni per girasole e soia e 20 giorni per tutte le altre colture.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

STREAM 44

Fungicida ad azione citotropica translaminare impiegato contro la Peronospora,l'Alternaria, l'Antracnosi, la Septoria. Formulazione: polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Cimoxanil puro g 4
- Rame metallo g 40
(sottoforma di ossicloruro)
- Coformulanti q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
Albano S. Alessandro (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA – Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 11532 del 20/12/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1 (10 s.i. da g 100; kg 1 (2 s.i. da g 500); kg 1 (4 s.i. da g 250); kg 1 (5 s.i. da g 200); kg 5 (10 s.i. da g 500).

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4% e Rame metallo 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia : gastrolusi con soluzione latto - albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
STREAM 44 è un fungicida in formulazione polvere bagnabile dato dall'unione di due principi attivi che agiscono per contatto e con azione endoterapica (citotropica translaminare), penetrando in modo completo nei tessuti vegetali entro 6 ore dal trattamento svolgendo una azione preventiva e curativa.
Impiegato sulle seguenti colture:
VITE - CARCIOFO - PATATA - POMODORO - CIPOLLA - AGLIO - PORRO - GIRASOLE - SOIA - LATTUGA - ROSA - ZUCCHINO - MELONE - PISELLO - SPINACIO - TABACCO
contro la Peronospora, l'Alternaria, l'Antracnosi, la Septoria e con effetto secondario contro la Muffa grigia (Botrytis cinerea) e le Batteriosi, alla dose di g 200-300 su tutte le colture e per q.le d'acqua, trattando da quando si hanno i primi sintomi di infezione della malattia e ripetendo i trattamenti ad ogni necessità.

COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con tutti i prodotti a reazione neutra o acida, è sconsigliato l'impiego con prodotti a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci

FITOTOSSICITA' : non trattare in fioritura
Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto del carciofo, 28 giorni per girasole e soia e 20 giorni per tutte le altre colture.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

30%

1 Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.

2 Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.

3 Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti).

4 Aggiungere la restante acqua nell'atomizzatore.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

STREAM 44

Fungicida ad azione citotropica translaminare
impiegato contro la Peronospora,l'Alternaria,
l'Antracnosi, la Septoria
Formulazione: polvere bagnabile

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Cimoxanil puro g 4
- Rame metallo g 40
(sottoforma di ossicloruro)
- Coformulanti q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare
a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
Albano S. Alessandro (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA – Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 11532 del 20/12/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 10- 50 -100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA DA APPORRE SUL SACCHETTO IDROSOLUBILE

STREAM 44

Fungicida ad azione citotropica translaminare impiegato contro la Peronospora,l'Alternaria, l'Antracnosi, la Septoria. Formulazione: polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Cimoxanil puro g 4
- Rame metallo g 40
(sottoforma di ossicloruro)
- Coformulanti q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per inalazione e ingestione
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
Albano S. Alessandro (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA – Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 11532 del 20/12/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100; 200; 250; 500.

PARTITA N.

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE
AVVERTENZA: LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

VEBIZIRAM

Fungicida acuprico neutro in formulazione sospensione concentrata a base di Ziram colloidale

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
ZIRAM puro g. 28,5 (= 336 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione. Molto tossico per inalazione.
Irritante per le vie respiratorie. Rischio di gravi lesioni oculari.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
Distribuito da
VE.BI S.A.S. del Dr. Luigi Bazzolo & C.
Via Desman, 43 - S. EUFEMIA DI BORGORICCO (PD)
Officine di produzione
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
Officina di confezionamento
VEBI S.A.S. - BORGORICCO (PD)

Registrazione Ministero della Salute n. 11630 del 11/03/2003

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100-200-250-500 litri 1-5 –20

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Terapia: sintomatica.; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
Il VEBIZIRAM è una formulazione di Ziram colloidale disperso in fase liquida, dotato di attività fungicida. Il VEBIZIRAM è dotato di adesività, resistenza al dilavamento e di potere ricoprente delle superfici trattate. Il suo impiego è pratico e semplice in quanto per la preparazione della poltiglia è sufficiente versarlo lentamente nell'acqua necessaria tenendola agitata.

EPOCHE E DOSI DI IMPIEGO
AGRUMI: contro Mal secco, Fumaggine e marciume bruno dei frutti alla dose di 500 ml/hl
DRUPACEE, MANDORLO: contro Bolla, Corineo, Moniliosi e Ticchiolatura nei trattamenti autunno-invernali a 1300-1400 ml/hl; nei trattamenti pre-fiorali a 600-650 ml/hl; nei trattamenti post-fiorali a 400-500 ml/hl
POMACEE: contro Ticchiolaura e Marciume dei frutti a 500 ml/hl nei trattamenti pre-fiorali e a 400 ml/hl nei trattamenti post-fiorali.
FRAGOLA. contro Botrite alla dose di 400-500 ml/hl
OLIVO: contro Cicloconio alla dose di 500-600 ml/hl
ORTAGGI: contro Ruggine, Antracnosi, Peronospora, Alternaria, Septoria, Nerume e Cercospora a 400 ml/hl
PATATA: contro Alternaria e peronospora alla dose di 400 ml/hl
FLOREALI E ORNAMENTALI: contro Ticchiolatura, Peronospora, Ruggine, Septoria, Antracnosi ed Alternaria a 400 ml/hl
FORESTALI, VIVAI E SEMENZAI: contro Ruggini e Antracnosi a 400 ml/hl

FITOTOSSICITA'
Varietà di pero sensibili allo Ziram: Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona d'estate
COMPATIBILITA'
Il VEBIZIRAM è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 10 giorni.
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

VEBIZIRAM

Fungicida acuprico neutro in formulazione sospensione concentrata a base di Ziram colloidale

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
ZIRAM puro g. 28,5 (= 336 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Molto tossico per inalazione. Irritante per le vie respiratorie. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
DISTRIBUITO DA
VE.BI S.A.S. del Dr. Luigi Bazzolo & C.
Via Desman, 43 - S. EUFEMIA DI BORGORICCO (PD)
OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
VEBI S.A.S. - BORGORICCO (PD)

Registrazione Ministero della Salute n. 11630 del 11/03/2003

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

PROCIMEX

Anticrittogamico ad azione preventiva e curativa in sospensione concentrata

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
PROCIMIDONE puro g 26 (~ 281 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RICHIO

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
Distribuito da:
VEBI S.A.S. del Dr. Luigi Bazzolo & C
Via Desman, 43 - BORGORICCO (PD)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. – U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
VEBI S.A.S.del dr. Luigi Bazzolo & C
Via Desman, 43 - BORGORICCO (PD)

Registrazione Ministero della Salute n. 11634 del 11/03/2003

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 25-50-100-200 –250-500- 750 litri 1 – 5

PARTITA N.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
CARATTERISTICHE
PROCIMEX è un fungicida dotato di azione preventiva e curativa, particolarmente efficace nella lotta contro le muffe grigie ed i marciumi delle piante causati da Botrytis, Sclerotinia, Monilia ed Alternaria. La formulazione flowable ne migliora gli aspetti applicativi, assicurando migliore uniformità di copertura e resistenza al dilavamento. Il PROCIMEX non influisce sulla fermentazione dei mosti e non conferisce sapori

DOSI, EPOCHE E MODALITA' DI IMPIEGO
VITE: 200-300 ml/hl contro muffa grigia (Botrytis cinerea), intervenendo nelle seguenti fasi fenologiche: a) fine fioritura; b) pre-chiusura del grappolo; c) invaiatura; d) 3-4- settimane prima della raccolta.
PESCO, SUSINO, ALBICOCCO: 300-400 ml/hl contro moniliosi dei fiori e dei rami (Monilia laxa) intervenendo dalla fase di pre-fioritura alla piena fioritura; contro la moniliosi dei frutti (Monilia fructigena) intervenendo da 5 a 3 settimane prima della raccolta alla dose di 200-300 ml/hl
MANDORLO : contro moniliosi (Monilia laxa e fructigena) intervenire alla dose di 300-400 ml/hl fino alla piena fioritura.
NOCCIOLO : contro moniliosi (Monilia laxa e fructigena) intervenire alla dose di 150-200 ml/hl in prossimità della fase di piena allegagione
FRAGOLA: 160-200 ml/hl contro Botrite (Botrytis cinerea): Effettuare tre trattamenti ai seguenti stadi vegetativi: a) apertura dei petali; b) durante la fioritura; c) a fine fioritura.
ACTINIDIA: contro muffa grigia (Botrytis cinerea) intervenendo alla dose di 300-400 ml/hl nelle seguenti fasi: piena fioritura, inizio allegagione, ingrossamento dei frutti, 2-3 settimane prima della raccolta; nei trattamenti di post-raccolta in magazzino intervenire con una soluzione allo 0,02% per immersione o a doccia.
PERO: contro moniliosi (Monilia laxa e fructigena) e contro maculatura bruna (Stemphylium versicarium) alla dose di 200-300 ml/hl con interventi ripetuti a partire dalla fase di fine fioritura.
POMODORO, MELANZANA, PEPERONE: 160-200 ml/h. contro alternaria (Alternaria alternata), muffa grigia (Botrytis cinerea), Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum) intervenendo ai seguenti stadi vegetativi: su Pomodoro effettuare interventi ripetuti ogni 2 settimane iniziando dalla fase di fioritura del 1° palco fiorale; su PEPERONE intervenire non più di una volta e su MELANZANA non più di 3 volte.
FAGIOLINO, CETRIOLO, AGLIO, CIPOLLA: 200-300 ml/hl contro Botrite, Sclerotinia, Alternaria e marciume bianco (Sclerotium cepivorum) intervenendo in funzione dello sviluppo della malattia fungina.
LATTUGA, INDIVIA : 2-3 l/ha contro Sclerotinia e Botrite: Eseguire non più di 2 interventi dopo la crisi di trapianto.
COLZA, GIRASOLE: 2 l/ha contro Botrite e Sclerotinia. Intervenire prima della fioritura.
TABACCO: 2-3 l/ha contro Muffa grigia e Sclerotinia intervenendo in funzione dello sviluppo della malattia fungina.
COLTURE FLOREALI (ROSA in pieno campo, **GERBERA**, **GERANIO** , **CRISANTEMO**, **GAROFANO**, **CICLAMINO**) : 80-160 ml/hl contro Muffa grigia e Sclerotinia ripetendo gli interventi in funzione degli attacchi fungini. 6-8 ml/mq per interventi al terreno.
COMPATIBILITA'
PROCIMEX risulta compatibile con i più comuni fungicidi ed insetticidi in commercio. Occorre effettuare la miscelazione estemporaneamente prima dell'impiego, diluendo dapprima in poca acqua ed aggiungendo la rimanente quantità sino al volume desiderato.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Nei trattamenti a colture floricole ed orticole, specie se in serra, si consiglia di effettuare saggi preliminari.
INTERVALLO DI SICUREZZA
21 giorni VITE, SUSINO, GIRASOLE; **14 giorni** PESCO, ALBICOCCO, ACTINIDIA, PERO, FRAGOLA, POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, CETRIOLO, FAGIOLINO, LATTUGA, INDIVIA; **45 giorni** COLZA; **60 giorni. in post raccolta** ACTINIDIA.
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

PROCIMEX

Anticrittogamico ad azione preventiva e curativa in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
PROCIMIDONE puro g 26 (= 281 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RICHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Distribuito da:
VEBI S.A.S. del Dr. Luigi Bazzolo & C
Via Desman, 43 - BORGORICCO (PD)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. – U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
VEBI S.A.S.del dr. Luigi Bazzolo & C
Via Desman, 43 - BORGORICCO (PD)

Registrazione Ministero della Salute n. 11634 del 11/03/2003

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 25-50-100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

MASTERCOP

Fungicida rameico in soluzione acquosa per l'utilizzo di dosi molto ridotte di rame metallo

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
RAME METALLO g 5,5 (= 60 g/l)
(sotto forma di Solfato pentaidrato)
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e per la pelle
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare nè bere nè fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
Potrerillo. No 6, Col. Parque Industrial
57819, Nezahualcoybtl, Edo de Mexico - Messico
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n° 11645 del 14/03/2003

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100- 200 - 500 litri 1 - 5 - 10 – 20

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
MASTERCOP è basato su uno speciale complesso cuprico che consente un elevato rendimento dello ione rame nei confronti di funghi e batteri, grazie al quale è possibile adottare dosi di impiego molto ridotte di rame metallo per unità di superficie. L'attività esplicata è di tipo preventivo.
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
MASTERCOP esplica una specifica attività anticrittogamica contro la Peronospora di numerose colture ed è dotato di un'azione collaterale nei confronti di alcune batteriosi.
VITE : 100-150 ml/hl intervenendo ogni 7-10 giorni, in funzione della pressione della malattia
POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, PATATA, FAGIOLO, PISELLO, SPINACIO, LATTUGA, INSALATA, CARDO, CARCIOFO, MELONE, ANGURIA, CETRIOLO, SEDANO, FINOCCHIO, CAROTA, CIPOLLA, AGLIO : 150 ml/hl, iniziando le applicazioni al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia e proseguendole in funzione di andamento climatico e sviluppo della vegetazione.
CAVOLI, CAVOLFIORI, CAVOLI DI BRUXELLES, BROCCOLI: 150 ml/hl, iniziando le applicazioni dopo il trapianto o l'emergenza delle coltivazioni seminate, ad intervalli di 10-15 giorni in funzione delle condizioni climatiche.
PERO e MELO: 150 ml/hl contro Ticchiolatura e Maculatura bruna con azione di contenimento nella profilassi del colpo di fuoco batterico da *Erwinia amylovora*.
FRAGOLA: 100-120 ml/hl contro *Phytophthora Cactorum* e Batteriosi (*Xanthomonas Fragariae*), con azione collaterale su Botritis, effettuando tre trattamenti a cadenza settimanale a partire da fine fioritura.
NOCCIOLO: contro il mal dello stacco e per la prevenzione della moria del nocciolo impiegare 150 ml/hl nei trattamenti primaverili, 180 ml/hl in quelli autunnali.
FLOREALI ED ORNAMENTALI: 100-150 ml/hl contro Peronospora
Le dosi sono riferite ai volumi di trattamento normali, pari a 6-8 hl/ha per le orticole e 10-15 hl/ha per le colture arboree.

COMPATIBILITA'
Si consiglia l'impiego del prodotto da solo
FITOTOSSICITA'
Non si deve trattare durante la fioritura. Evitare gli impieghi su piante stressate, durante le ore più calde della giornata o con temperature troppo alte. Su broccoli e cavoli possono verificarsi transitori arrossamenti o ingiallimenti sulle foglie.
RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 3 giorni per Fragola, Ortaggi, Patata, 20 giorni per le altre colture

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA – DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

MASTERCOP

Fungicida rameico in soluzione acquosa per l'utilizzo di dosi molto ridotte di rame metallo

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
RAME METALLO g 5,5 (= 60 g/l)
(sotto forma di Solfato pentaidrato)
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e per la pelle
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare nè bere nè fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
- INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - Potrerillo, No 6, Col. Parque Industrial 57819, Nezahualcoybtl, Edo de Mexico - Messico
- DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n° 11645 del 14/03/2003

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

MANEB 80 DIACHEM

Fungicida acuprico a base di Maneb

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
MANEB puro g. 80
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie
Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare al riparo dall'umidita'
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.
Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 863 del 18/1/1973

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1 - 5 - 25
PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Terapia: sintomatica.; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Consultare un Centro Antiveleni

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

MODALITA' DI IMPIEGO
Si tratta di un fungicida organico sotto forma di polvere bagnabile ad azione selettiva sulla Peronospora o" muffa blu " del tabacco.
DIVIETO DI IMPIEGO : divieto di impiego in serra. Divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.
EPOCA DI APPLICAZIONE : Trattamenti preventivi in concomitanza delle condizioni di umidità e temperature favorevoli all'insorgere delle malattie.

DOSI DI IMPIEGO : per 100 litri di acqua
Peronospora del tabacco in pieno campo g. 100-200
Peronospora, alternariosi, septoriosi e ticchiolatura del pomodoro solo fino alla prima fioritura g. 200-250
Ruggine e septoriosi del garofano g. 300-350
Ticchiolatura delle pomacee (melo,pero) g. 250-300

COMPATIBILITA'
Il MANEB 80 e' compatibile con gli usuali principi attivi a reazione neutra.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Leggeri fenomeni di ingiallimento fogliare esclusivamente nei primi trattamenti in pre-fioritura su meli Imperatore.

INTERVALLO DI SICUREZZA : 28 giorni
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

CUPRENOX 50

Ossicloruro di rame micronizzato adesivo

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
RAME METALLO (sotto forma di
ossicloruro tetraramico) g.50
Coformulanti q.b. a g.100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.
Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1009 del 4/1/1973

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 5

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica..
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
Il CUPRENOX 50 è un ossicloruro di rame micronizzato adesivo. Viene impiegato con successo su Pomacee (melo,pero) contro la ticchiolatura; vite, patata e pomodoro contro peronospora; olivo contro occhio di pavone; pesco contro bolla e corineo; bietola contro cercospora.

DOSI DI IMPIEGO
g 300 per 100 litri di acqua ad eccezione della cercospora della bietola che richiede g 600-800 per 100 litri di acqua.

COMPATIBILITA'
E' miscibile con i comuni prodotti fitosanitari a reazione neutra.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non si deve trattare durante la fioritura.Su pesco e varietà di melo quale Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgeduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, e di pero quali Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches ,Butirra Clargeau , Passacrassana, B.C.William, Dott.Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard, cuprosensibili il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

PHYTOX MZ 80

Fungicida organico

COMPOSIZIONE
MANCOZEB puro g. 80
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie
Può' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare al riparo dall'umidità
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A.
Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1228 del 2/5/1974

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1 - 5 - 25

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Terapia: sintomatica ; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Consultare un Centro Antiveleni

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

MODALITA' DI IMPIEGO
Il PHYTOX MZ 80 è un fungicida ottenuto per un particolare processo chimico dei sali ditiocarbammici di zinco e manganese. Questo anticrittogamico combatte la maggioranza delle crittogame come la Ticchiolatura delle pomacee, la Peronospora della vite. Risulta peraltro efficace contro la Peronospora, l'Alternaria e la Septoria del pomodoro fino alla prima fioritura, la ruggine del garofano.

DIVIETO DI IMPIEGO
Divieto di impiego in serra, divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.

EPOCA ED ISTRUZIONI D'USO
L'epoca di impiego non differisce da quella dei normali fungicidi acuprici e segue i calendari già in uso.

DOSI DI IMPIEGO : g. 200 per 100 litri di acqua
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA : Stemperare la dose necessaria di PHYTOX MZ 80 in poca acqua e, rimestando continuamente, portare a volume.

COMPATIBILITA'
Il PHYTOX MZ 80 è miscibile con i prodotti fitosanitari di uso normale, esteri fosforici, zolfo bagnabile. Risulta incompatibile per contro con la Poltiglia solfocalcica, con i prodotti ad alto tenore di Boro e con poltiglie alcaline in genere.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Su alcune cultivar di pero come Coscia, Conference, Santa Maria, Trionfo di Vienna, il prodotto può dar luogo ad alcune manifestazioni fitotossiche e pertanto se ne sconsiglia l'uso su tali varietà.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 28 giorni
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

SUTENE 35 EC

Insetticida selettivo concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
ENDOSULFAN puro g 32.9 (= 347.09 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
Contiene XILENE

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Infiammabile.
Nocivo per inalazione.
Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.
Irritante per gli occhi e la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1457 del 7/3/1974

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 1 - 5 - 10

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni. Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni. Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO

Il SUTENE 35 EC è un liquido emulsionabile ad azione insetticida ed aficida che agisce per contatto ed ingestione contro numerosi insetti ad apparato boccale masticatore e perforante succhiatore.

CAMPI DI IMPIEGO

FRUTTICOLTURA: AGRUMI, MANDORLO, NOCCIOLO, POMACEE, PESCO, VITE contro afidi, anarsia, tignola orientale, orgia, minatori fogliari, eriofidi, tripidi, cicaline, oglocampa, recurvaria, iponomenta, lepidotteri defogliatori, tingidi, carpocapsa, antonomo, oziorrinco, tentredine, sigaraio della vite, tignola della vite, tignola dell'olivo, mosca dell'olivo, fleotribo, mosca della frutta, aleurodidi, nottue, cimici e balanino, alla dose di 100-200 ml/hl.
Su AGRUMI e VITE non superare comunque i 3 litri di SUTENE 35 EC per ettaro di superficie ed effettuare massimo 2 applicazioni.
Su PESCO non superare comunque i 2 litri di SUTENE 35 EC per ettaro di superficie ed effettuare massimo 3 applicazioni
ORTICOLTURA: POMODORO, CUCURBITACEE CON BUCCIA NON COMMESTIBILE (melone, zucca, cocomero) contro afidi, tripidi, aleurodidi, nottue fogliari, piralide, depressarie, altiche, tentredine, saperda, dorifora, alla dose di 150-200 ml/hl.
COLTURE FORESTALI contro larve defogliatrici, tortrice dei pini, coleotteri defogliatori, tingidi, cicaline, cinicette alla dose di 150-200 ml/hl.

COMPATIBILITA'

E' miscibile con i normali prodotti fitosanitari non alcalini, con gli integratori fogliari e con gli olii minerali.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 25 giorni; Vite: 28 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

IDRORAME FLOW

Anticrittogamico a base di solfato tribasico di rame

Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
RAME METALLO g 15,2 (=193,04 g/l)
(sotto forma di solfato tribasico)
Coformulanti q.b. a g. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A
Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1850 del 31/5/1975

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,500 - 1 - 5 - 10 - 20 - 25

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica..
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO

IDRORAME FLOW è un anticrittogamico rameico caratterizzato da adesività e persistenza. Il suo impiego viene raccomandato sulla vite per la difesa dalla peronospora e su numerose altre colture contro le principali malattie crittogamiche sensibili al rame.

DOSI DI IMPIEGO (per 100 litri di acqua)

ORTAGGI, FRAGOLA, POMODORO contro Ticchiolatura, Peronospora, Alternaria, Septoria, Ruggine e Antracnosi 500 ml/hl.
POMACEE: contro Cancri e Disseccamenti rameali 600-700 ml/hl intervenendo al 30% ed al 70% della caduta delle foglie; contro Batteriosi e Ticchiolatura 500-600 ml/hl allo stadio di gemma ingrossata.
DRUPACEE: contro Cancro batterico 700 ml/hl alla caduta delle foglie; contro Fusicocco e Corineo 800-900 ml/hl durante il riposo vegetativo.
OLIVO contro Rogna 500-600 ml/hl durante il riposo vegetativo; contro Occhio di pavone 500-600 ml/hl in pre-fioritura e a frutto ingrossato.
VITE:contro Peronospora 400-600 ml/hl.
AGRUMI: contro Mal secco, Antracnosi e Fumaggine 500-600 ml/hl.
ACTINIDIA: contro Batteriosi 600-700 ml/hl alla caduta delle foglie.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro Cercospora 5-6 l/ha.
TABACCO: contro Peronospora e Batteriosi 500 ml/hl.
PATATA: contro Peronospora, Alternaria ml 500
FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI contro Ruggini, Ticchiolatura e Peronospora 300-400 ml/hl.
LOTTA CONTRO ALGHE E MOLLUSCHI DELLE RISAIE 6-7 l/ha alla prima comparsa delle alghe.

COMPATIBILITA'

E' miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo quali Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, e di pero quali Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C.WiLiam, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard, cuprosensibili, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 3 giorni per Fragola, Ortaggi, Patata, 20 giorni per le altre colture

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

MALERBANE MCPA 56

Diserbante selettivo in granuli solubili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
MCPA puro g 56
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione. Irritante per la pelle
Rischio di gravi lesioni oculari.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1868 del 19/2/1975

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100 - 250 – 500 kg 1 – 2,5 - 3 - 5 - 10

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti, l'ingestione, l'inalazione. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

MALERBANE MCPA 56 è un diserbante ormonico di post-emergenza impiegato per la lotta contro le infestanti non graminacee dei cereali (riso, sorgo, mais, orzo, frumento, segale e avena), delle pomacee (melo e pero), della vite e dell'arancio, di argini di fossi e canali.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

RISO : 0,750 – 1,750 kg/ha, dall'emissione della 5ª foglia del riso sino all'inizio della fase di botticella.
FRUMENTO, ORZO, SEGALE, AVENA: 1,250 - 1,750 g/ha da fine accestimento sino all'inizio della fase di botticella.

MAIS, SORGO: 0,175 - 0,250 kg/ha dalla 3ª alla 6ª foglia della coltura
MELO, PERO, VITE, ARANCIO: 1 – 1,5 kg/ha evitando il contatto diretto o indiretto (deriva) con la coltura, nel periodo primaverile-estivo; si consiglia l'aggiunta di olio bianco.
ARGINI DI FOSSI E CANALI: 0,500-1 kg/ha in associazione ad altri erbicidi.
Il prodotto deve essere distribuito in 4-6 hl di acqua per ettaro di superficie, operando in giornate serene ed in assenza di vento.

COMPATIBILITA'

Il prodotto risulta compatibile con erbicidi a reazione neutra.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate, prima che sia trascorso il tempo di carenza.

AVVERTENZE D'USO

Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari, si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti.
Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione , chiudere bene la scatola.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi e floreali . Evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

NORME FITOPROTETTIVE PER LE RISAIE

Al momento del trattamento la risaia non deve trovarsi asciutta, ma presentare la superficie degli appezzamenti coperta da qualche centimetro di acqua onde evitare danni.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

MALERBANE MCPA 56

Diserbante selettivo in granuli solubili
Sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
MCPA puro g 56
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione. Irritante per la pelle
Rischio di gravi lesioni oculari.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1868 del 19/2/1975

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1 (4 s.i. 250g); kg 1 (1 s.i. da kg 1)

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti, l'ingestione, l'inalazione. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito. cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia. nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG.
Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

MALERBANE MCPA 56 è un diserbante ormonico di post-emergenza impiegato per la lotta contro le infestanti non graminacee dei cereali (riso, sorgo, mais, orzo, frumento, segale e avena), delle pomacee (melo e pero), della vite e dell'arancio, di argini di fossi e canali.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

RISO : 0,750 – 1,750 kg/ha, dall'emissione della 5ª foglia del riso sino all'inizio della fase di botticella.
FRUMENTO, ORZO, SEGALE, AVENA: 1,250 - 1,750 g/ha da fine accestimento sino all'inizio della fase di botticella.
MAIS, SORGO: 0,175 - 0,250 kg/ha dalla 3ª alla 6ª foglia della coltura
MELO, PERO, VITE, ARANCIO: 1 – 1,5 kg/ha evitando il contatto diretto o indiretto (deriva) con la coltura, nel periodo primaverile-estivo; si consiglia l'aggiunta di olio bianco.
ARGINI DI FOSSI E CANALI: 0,500-1 kg/ha in associazione ad altri erbicidi.
Il prodotto deve essere distribuito in 4-6 hl di acqua per ettaro di superficie, operando in giornate serene ed in assenza di vento.

COMPATIBILITA'

Il prodotto risulta compatibile con erbicidi a reazione neutra.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate, prima che sia trascorso il tempo di carenza.

AVVERTENZE D'USO

Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari, si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti.
Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione , chiudere bene la scatola.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi e floreali . Evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

NORME FITOPROTETTIVE PER LE RISAIE

Al momento del trattamento la risaia non deve trovarsi asciutta, ma presentare la superficie degli appezzamenti coperta da qualche centimetro di acqua onde evitare danni.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

30%

1 Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.

2 Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.

3 Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti).

4 Aggiungere la restante acqua nell'atomizzatore.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

MALERBANE MCPA 56

Diserbante selettivo in granuli solubili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
MCPA puro g 56
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione. Irritante per la pelle
Rischio di gravi lesioni oculari.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1868 del 19/2/1975

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100
PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA DA APPORRE SUL SACCHETTO IDROSOLUBILE

MALERBANE MCPA 56

Diserbante selettivo in granuli solubili
Sacchetti idrosolubili

NOCIVO

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
MCPA puro g 56
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Irritante per la pelle
Rischio di gravi lesioni oculari.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1868 del 19/2/1975

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 250; 1000

PARTITA N.

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE
AVVERTENZA: LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

MALATHION 50

Insetticida liquido emulsionabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
MALATION puro g 50 (= 515 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
Contiene XILENE

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile.
Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
Irritante per la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A.- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2016 del 30/7/1975

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 1 - 5 - 10 – 20

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
AGRUMI: contro Afidi, Cocciniglie, Mosca della frutta alla dose di 150-200 ml/hl
MELO, PERO: contro Afidi, Cocciniglie, Carpocapsa, Antonomo, Tentredine alla dose di 150-200 ml/hl
DRUPACEE (PESCO, SUSINO, ALBICOCCO, CILIEGIO): contro Afidi, Cocciniglie, Anarsia, Tignola orientale, Mosca della frutta, Mosca del ciliegio, Recurvaria alla dose di 200 ml/hl
FRUTTIFERI A GUSCIO (NOCCIOLO, NOCE, MANDORLO, CASTAGNO): contro Cocciniglie, Cimici, Anarsia, Tignola orientale, Balanino alla dose di 200 ml/hl
OLIVO: contro Tignola dell'olivo, Cocciniglia cotonosa, Liotripide alla dose di 200 ml/hl
VITE: contro Tignola, Tignoletta, Cicalina alla dose di 150-200 ml/hl
FRAGOLA: contro Afidi, Oziorrinchi alla dose di 150-200 ml/hl
ACTINIDIA: contro Larve di lepidotteri alla dose di 150-200 ml/hl
ORTAGGI A RADICE E TUBERO, ORTAGGI A BULBO, ORTAGGI A FRUTTO, CAVOLI, ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE, LEGUMI FRESCHI, ORTAGGI A STELO: contro Afidi, Tripidi, Nottue fogliari, Pieridi, Altiche, Tentredine, Depressaria alla dose di 200-250 ml/hl
PATATA: contro Afidi e Tignola alla dose di 200-250 ml/hl
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Afidi e Nottue fogliari alla dose di 1,5 l/ha
CEREALI: contro Afidi alla dose di 1,5-2 l/ha
GIRASOLE: contro Afidi alla dose di 1,2 l/ha
FORAGGERE: contro Afidi, Apion, Fitonomo alla dose di 1,2 l/ha
COLZA E RAVIZZONE: contro Punteruolo, Altica dello stelo alla dose di 1,5 l/ha
TABACCO: contro Afidi, Tripidi, alla dose di 1,5 l/ha
VIVAI, FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI contro Afidi, Cocciniglie, Cicaline, Tingide, Galerucella alla dose di 200-250 ml/hl
PIOPPO: contro Crisomela del pioppo, Cimicetta del pioppo alla dose di 250 ml/hl

COMPATIBILITA'
Il MALATHION 50 non è compatibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA – DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE).

MALERBANE GIAVONI LIQUIDO

Diserbante per la lotta contro i giavoni in risaia

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
MOLINATE puro g 72.6 (= 737.6 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
Contiene XILENE

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per inalazione e ingestione.
Irritante per la pelle.
Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Possibile rischio di ridotta fertilità.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A.
Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2157 del 12/4/1976

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 1 - 5 - 20

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose, nausea, vomito, ipertermia, depressione del SNC, bronchite.
N.B. - Il formulato contiene solventi i quali possono essere responsabili di variazione e di aggravamento della sintomatologia clinica: in tali casi possono aversi gravi lesioni epatiche, renali ed a carico del SNC e periferico; i derivati del petrolio possono provocare polmoniti chimiche.
Terapia: sintomatica; non provocare il vomito, ma effettuare gastrolusi.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO

Il MALERBANE GIAVONI LIQUIDO può essere impiegato prima della semina avendo però cura di eseguire l'interramento subito dopo l'applicazione; si procederà all'immissione dell'acqua nella camera e quindi alla semina del riso. Il trattamento può anche essere fatto quando lo stesso è già germinato e sino a quando il giavone presenta due o tre foglie vere, distribuendo il prodotto in veicolo acquoso sulla superficie dell'acqua.

DOSI DI IMPIEGO

Litri 5-6 per ettaro di superficie in 400-600 litri di acqua

COMPATIBILITA'

Il prodotto si impiega tal quale.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto è fitotossico per le altre colture.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 30 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

JOKER 70 SG

Diserbante selettivo di post-emergenza
(Granuli solubili)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DICAMBA puro g 70
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. – U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2594 del 19/6/1980

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100 - 250 - 500 – kg 1 - 5 - 10

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia.
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
JOKER 70 SG è un diserbante che agisce alterando il metabolismo enzimatico delle infestanti con cui viene a contatto. Esso viene assorbito per via fogliare e radicale e traslocato in tutta la pianta attraverso la circolazione linfatica.
Il prodotto, da applicare in post-emergenza delle malerbe, oltre a controllare dicotiledoni perenni quali vilucchio (Convolvulus arvensis) e Stoppione (Cirsium arvense), è efficace nei confronti di numerose specie di infestanti annuali quali Cencio molle (Abutilon theophrasti), Amaranto (Amaranthus retroflexus), Anagallide (Anagallis arvensis), Iva comune (Ajuga spp), Atriplice maggiore (Atriplex patula), Forbicina (Bidens spp), Borsa del pastore (Capsella bursa pastoris), Fiordaliso (Centaurea cyanus), Farinaccio (Chenopodium album), Stramonio (Datura stramonium), Convolvolo nero (Fallopia convolvolus), Fumaria (Fumaria officinalis) Canapaccia comune (Galeopsis tetrahit), Galinsoga comune (Galinsoga parviflora), Attaccamano (Galium aparine), Camomilla (Matricaria chamomilla), Papavero (Papaver rhoeas), Correggiola (Polygonum aviculare), Persicaria Polygonum persicaria), Porcellana (Portulaca oleracea), Rapastrella (Raphanus raphanistrum), Sicio (Sycios angulatus), Senape (Sinapis arvensis), Erba calderina (Senecio vulgaris), Erba morella (Solanum nigrum), Arenaiola (Spergula arvensis), Stellaria (Stellaria media), Erba storna (Thlaspi arvense), Ortica minore (Utica urens), Veronica (Veronica spp), Veccia (Vicia spp), Nappola (Xanthium spp).

CAMPI DI IMPIEGO
JOKER 70 SG è un erbicida selettivo per il controllo delle infestanti di Mais, Sorgo, Frumento, Orzo, Segale, Avena, Prati di graminacee (ornamentali, pascoli, campi sportivi e campi da golf), Asparago e Melo.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
MAIS: impiegare in post-emergenza con le infestanti ai primi stadi di sviluppo e con Mais a 3-4 foglie fino ad un massimo di 6-7 foglie (altezza 40 cm), alla dose di 300-400 g/ha. - **SORGO** : impiegare in post-emergenza della coltura allo stadio di 3-4 foglie alla dose di 250-300 g/ha - **FRUMENTO-ORZO-SEGALE-AVENA**: intervenire dallo stadio della coltura di 4 foglie fino ad inizio levata alla dose di 150-200g/ha. E' consigliabile, per ottenere migliori risultati, trattare quando le infestanti e la coltura siano in attiva crescita. **PRATI, PASCOLI, CAMPI ORNAMENTALI (campi sportivi, campi da golf, tappeti erbosi)**: effettuare il trattamento quando le infestanti abbiano almeno 2 foglie sviluppate alla dose di 350 g/ha per applicazioni a pieno campo e con soluzione allo 0,07% per trattamenti localizzati. Si consiglia di non intervenire immediatamente dopo lo sfalcio.
Obbligo di segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nelle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del prodotto.
ASPARAGO: il trattamento deve essere effettuato in primavera prima dell'emergenza dei turioni, su infestanti in sviluppo vegetativo preferibilmente su terreno sarchiato e leggermente umido, sia con trattamenti a pieno campo alla dose di 70-150g//ha, sia con trattamenti localizzati con soluzione allo 0,07%. Utilizzare per i trattamenti un volume d'acqua di 200-400 l/ha, fino a 500-600 l/ha. **MELO**: effettuare il trattamento alla dose di 350-500g/ha con l'avvertenza di non colpire le parti verdi della coltura
AVVERTENZE: non impiegare su colture di mais trapiantate su terreni sabbiosi o con basso contenuto di sostanza organica; evitare che la nube irrorante possa giungere a contatto con colture vicine.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

COMPATIBILITA'
JOKER 70 SG è compatibile con MCPA, Mecoprop, Pendimetalin, 2,4D, Tribenuron metile, Triasulfuron qualora le condizioni di applicazione lo richiedano. In caso di miscele utilizzare JOKER 70 SG a dosi dimezzate. AVVERTENZA :in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
NOCIVITA': ATTENZIONE, il prodotto tal quale contiene sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici

INTERVALLO DI SICUREZZA
SORGO: 130 giorni, MELO: 30 giorni; ALTRE COLTURE: 20 giorni
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua –
Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

JOKER 70 SG

Erbicida selettivo di post emergenza in granuli solubili
Sacchetti idrosolubili

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DICAMBA puro g 70
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. – U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2594 del 19/6/1980

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 500 (5x100; 2x250;1x500) - **kg 1** (10 x 100; 5 x 200; 4x250; 2x500; 1x1000)

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
JOKER 70 SG è un diserbante che agisce alterando il metabolismo enzimatico delle infestanti con cui viene a contatto. Esso viene assorbito per via fogliare e radicale e traslocato in tutta la pianta attraverso la circolazione linfatica. Il prodotto, da applicare in post-emergenza delle malerbe, oltre a controllare dicotiledoni perenni quali vilucchio (Convolvulus arvensis) e Stoppione (Cirsium arvense), è efficace nei confronti di numerose specie di infestanti annuali quali Cencio molle (Abutilon theophrasti), Amaranto (Amaranthus retroflexus), Anagallide (Anagallis arvensis), Iva comune (Ajuga spp), Atriplice maggiore (Atriplex patula), Forbicina (Bidens spp), Borsa del pastore (Capsella bursa pastoris), Fiordaliso (Centaurea cyanus), Farinaccio (Chenopodium album), Stramonio (Datura stramonium), Convolvolo nero (Fallopia convolvolus), Fumaria (Fumaria officinalis) Canapaccia comune (Galeopsis tetrahit), Galinsoga comune (Galinsoga parviflora), Attaccamano (Galium aparine), Camomilla (Matricaria chamomilla), Papavero (Papaver rhoeas), Correggiola (Polygonum aviculare), Persicaria (Polygonum persicaria), Porcellana (Portulaca oleracea), Rapastrella (Raphanus raphanistrum), Sicio (Sycios angulatus), Senape (Sinapis arvensis), Erba calderina (Senecio vulgaris), Erba morella (Solanum nigrum), Arenaiola (Spergula arvensis), Stellaria (Stellaria media), Erba storna (Thlaspi a rvense), Ortica minore (Utica urens), Veronica (Veronica spp), Veccia (Vicia spp), Nappola (Xanthium spp).

CAMPI DI IMPIEGO
JOKER 70 SG è un erbicida selettivo per il controllo delle infestanti di Mais, Sorgo, Frumento, Orzo, Segale, Avena, Prati di graminacee (ornamentali, pascoli, campi sportivi e campi da golf), Asparago e Melo.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
MAIS: impiegare in post-emergenza con le infestanti ai primi stadi di sviluppo e con Mais a 3-4 foglie fino ad un massimo di 6-7 foglie (altezza 40 cm), alla dose di 300-400 g/ha. - **SORGO** : impiegare in post-emergenza della coltura allo stadio di 3-4 foglie alla dose di 250-300 g/ha - **FRUMENTO-ORZO-SEGALE-AVENA**: intervenire dallo stadio della coltura di 4 foglie fino ad inizio levata alla dose di 150-200g/ha. E' consigliabile, per ottenere migliori risultati, trattare quando le infestanti e la coltura siano in attiva crescita. **PRATI, PASCOLI, CAMPI ORNAMENTALI (campi sportivi, campi da golf, tappeti erbosi)**: effettuare il trattamento quando le infestanti abbiano almeno 2 foglie sviluppate alla dose di 350 g/ha per applicazioni a pieno campo e con soluzione allo 0,07% per trattamenti localizzati. Si consiglia di non intervenire immediatamente dopo lo sfalcio.

Obbligo di segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nelle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del prodotto.

ASPARAGO: il trattamento deve essere effettuato in primavera prima dell'emergenza dei turioni, su infestanti in sviluppo vegetativo preferibilmente su terreno sarchiato e leggermente umido, sia con trattamenti a pieno campo alla dose di 70-150g//ha, sia con trattamenti localizzati con soluzione allo 0,07%. Utilizzare per i trattamenti un volume d'acqua di 200-400 l/ha, fino a 500-600 l/ha. **MELO**: effettuare il trattamento alla dose di 350-500g/ha con l'avvertenza di non colpire le parti verdi della coltura

AVVERTENZE: non impiegare su colture di mais trapiantate su terreni sabbiosi o con basso contenuto di sostanza organica; evitare che la nube irrorante possa giungere a contatto con colture vicine.

Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

COMPATIBILITA'
JOKER 70 SG è compatibile con MCPA, Mecoprop, Pendimetalin, 2,4D, Tribenuron metile, Triasulfuron qualora le condizioni di applicazione lo richiedano. In caso di miscele utilizzare JOKER 70 SG a dosi dimezzate. AVVERTENZA :in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

NOCIVITA': ATTENZIONE, il prodotto tal quale contiene sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici

INTERVALLO DI SICUREZZA
SORGO: 130 giorni, MELO: 30 giorni; ALTRE COLTURE: 20 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua –

Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

30%

1 Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.

2 Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.

3 Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti).

4 Aggiungere la restante acqua nell'atomizzatore.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

JOKER 70 SG

Diserbante selettivo di post-emergenza
(Granuli solubili)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DICAMBA puro g 70
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. – U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2594 del 19/6/1980

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA DA APPORRE SUL SACCHETTO IDROSOLUBILE

JOKER 70 SG

Erbicida selettivo di post emergenza in granuli solubili
Sacchetti idrosolubili

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DICAMBA puro g 70
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. – U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2594 del 19/6/1980

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100; 200; 250; 500; 1000
PARTITA N.

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE
AVVERTENZA: LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

LIMATOX

Esca microgranulare a base di Metaldeide

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Metaldeide pura g 5
Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P. A
Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P. A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2671 del 18/10/1977

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO : kg 1

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica uomo: circa 50 mg/kg; irritante per le mucose, latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali.
Consultare un Centro Antiveleni

DOSI E TECNICA DI IMPIEGO

Orti e giardini g 250/400 per 100 mq.
Colture in pieno campo g 100/300 per mq.
Eseguire il trattamento preferibilmente la sera o subito dopo una pioggia distribuendo il LIMATOX a piccoli mucchietti od a file.

COMPATIBILITA'
Trattandosi di un'esca pronta all'uso non è prevista alcuna compatibilità, non miscelare con altri prodotti.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è nocivo per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per l' uso consentito: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO
O IL SUO CONTENITORE

SEDIT 5 DUST

Insetticida a base di Carbaryl
Polvere secca

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
CARBARIL puro g 5
Esente da Beta Naftolo
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, nè fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A
Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2758 del 10.8.1978

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100 – 250 - 500 kg 1-5-10-20

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Carbaril: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina. Controindicazioni: essime. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
E' un insetticida sotto forma di polvere secca il quale, nella sua gamma d'azione, è indicato su Melo e Pero contro la Carpocapsa e la Eulia, Pesco contro la Capua, la Cacoecia, la Tignola orientale del Pesco, Garofano in pieno campo e in serra contro la Tortrice, Uva: contro la Tignola. Patata e melanzana : contro cavolaie e lepidotteri.

EPOCA DI APPLICAZIONE
Intervenire alla prima comparsa dei parassiti ripetendo i trattamenti in corrispondenza dei nuovi attacchi.

DOSI DI IMPIEGO
kg 30/35 per ettaro di superficie.

COMPATIBILITA'
Il SEDIT 5 DUST è miscibile con gli insetticidi e fungicidi di uso più comune esclusi i prodotti alcalini in genere (Poltiglia bordolese, polisolfiti).Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
E' nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame
ATTENZIONE, il prodotto tal quale contiene sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici

INTERVALLO DI SICUREZZA: 7 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

SEDIT 5 DUST

Insetticida a base di Carbaryl
Polvere secca

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
CARBARIL puro g 5
Esente da Beta Naftolo
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, nè fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A
Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2758 del 10.8.1978

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CHIMITHION P.B.

Insetticida polivalente a base di Azinfos metile in polvere bagnabile

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del DPR 3 agosto 1968 n. 1255

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
AZINFOS METILE puro g 25
Coformulanti q.b. a g. 100

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Tossico a contatto con la pelle. Molto tossico per inalazione e per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, ne fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle togliersi immediatamente di dosso gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezzz. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2804 del 7/1/1980

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: Kg 1 - 5

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Il CHIMITHION P.B. e' un insetticida caratterizzato da un ampio spettro d'azione e da una lunga persistenza.
Intervenire alla prima comparsa dei parassiti, ripetendo i trattamenti in relazione ai nuovi attacchi.
AGRUMI: 150-200 g/hl contro cocciniglia mezzo grano di pepe, cotonello, cimice verde
MELO,PERO,COTOGNO: 150-200 g/hl contro afidi, cocciniglie, carpocapsa, antonomo, ricamatrici, fillominatori, rodilegno, tentredine, sesia del melo.
PESCO, SUSINO, ALBICOCCO, CILIEGIO, MANDORLO: 150-200 g/hl contro afidi, cocciniglie, tignola orientale, anarsia, ricamatrici.
VITE: 100-200 g/hl contro cicaline, tignole, oziorrinco
OLIVO: 100-200 g/hl contro oziorrinco, tignola, felotribo
NOCCIOLO: 150-200 g/hl contro balanino
FRAGOLA: 200 g/hl contro antonomo, nottue, tortricidi, oziorrinco
ORTAGGI A RADICE E TUBERO : 150-200 g/hl contro afidi, altiche, casside, nottue
ORTAGGI A FOGLIA : 150-200 g/hl contro nottue fogliari, tipule, tignole
CETRIOLO E ZUCCA: 150-200 g/hl contro afidi e tripidiù
LEGUMI: 150-200 g/hl contro afidi, tripidi, cimici, nottue fogliari
CAVOLI: 150-200 g/hl contro afidi, altiche, nottua del cavolo, pieridi, tignola, punteruolo, tentredine
SOLANACEE (pomodoro, peperone, melanzana): 150-200 g/hl contro afidi, dorifora, piralide, tignole
PATATA: 150-200 g/hl contro afidi, dorifora, nottue, tignole.
ASPARAGO: 150-200 g/hl contro cosside, criocera dell'asparago; CARCIOFO: 150-200 g/hl contro piralide e nottua del carciofo. BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: 1,5 kg/ha contro afidi, altica, atomaria, cleono, punteruolo
TABACCO: 1,2 kg/ha contro altica e nottue fogliari
FRUMENTO, MAIS: 1,5 kg/ha contro afidi, piralide, sesamia, zabro gobbo. SOIA, COLZA: 1,2 kg/ha contro altiche, lepidotteri defogliatori. ERBA MEDICA: 1,2 kg/ha contro fitonomo, misurino
PIOPPO: 300 g/hl contro crittorrinco, crisomela, saperda
FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI: 200 g/hl contro afidi, cocciniglie, larve defogliatrici, tortricide del garofano, rodilegno, coleotteri defogliatori, oziorrinco.

COMPATIBILITA'
Il CHIMITHION P.B. non è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

RISCHI DI NOCIVITA'
A seguito dei trattamenti il prodotto e' tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

CHIMITHION P.B.

Insetticida polivalente a base di Azinfos metile
in polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del DPR 3 agosto 1968 n. 1255

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
AZINFOS METILE puro g 25
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico a contatto con la pelle. Molto tossico per inalazione e per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle togliersi immediatamente di dosso gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2804 del 7/1/1980

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: Kg 1 (4 sacchetti idrosolubili da g 250)
PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
L CHIMITHION P.B. e' un insetticida caratterizzato da un ampio spettro d'azione e da una lunga persistenza.
Intervenire alla prima comparsa dei parassiti, ripetendo i trattamenti in relazione ai nuovi attacchi.
AGRUMI: 150-200 g/hl contro cocciniglia mezzo grano di pepe, cotonello, cimice verde
MELO,PERO,COTOGNO: 150-200 g/hl contro afidi, cocciniglie, carpocapsa, antonomo, ricamatrici, fillominatori, rodilegno, tentredine, sesia del melo.
PESCO, SUSINO, ALBICOCCO, CILIEGIO, MANDORLO: 150-200 g/hl contro afidi, cocciniglie, tignola orientale, anarsia, ricamatrici.
VITE: 100-200 g/hl contro cicaline, tignole, oziorrinco
OLIVO: 100-200 g/hl contro oziorrinco, tignola, felotripo
NOCCIOLO: 150-200 g/hl contro balanino
FRAGOLA: 200 g/hl contro antonomo, nottue, tortricidi, oziorrinco
ORTAGGI A RADICE E TUBERO : 150-200 g/hl contro afidi, altiche, casside, nottue
ORTAGGI A FOGLIA : 150-200 g/hl contro nottue fogliari, tipule, tignole
CETRIOLO E ZUCCA: 150-200 g/hl contro afidi e tripidiù
LEGUMI: 150-200 g/hl contro afidi, tripidi, cimici, nottue fogliari
CAVOLI: 150-200 g/hl contro afidi, altiche, nottua del cavolo, pieridi, tignola, punteruolo, tentredine
SOLANACEE (pomodoro, peperone, melanzana): 150-200 g/hl contro afidi, dorifora, piralide, tignole
PATATA: 150-200 g/hl contro afidi, dorifora, nottue, tignole.
ASPARAGO: 150-200 g/hl contro cosside, criocera dell'asparago; CARCIOFO: 150-200 g/hl contro piralide e nottua del carciofo. BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: 1,5 kg/ha contro afidi, altica, atomaria, cleono, punteruolo
TABACCO: 1,2 kg/ha contro altica e nottue fogliari
FRUMENTO, MAIS: 1,5 kg/ha contro afidi, piralide, sesamia, zabro gobbo. SOIA, COLZA: 1,2 kg/ha contro altiche, lepidotteri defogliatori. ERBA MEDICA: 1,2 kg/ha contro fitonomo, misurino
PIOPPO: 300 g/hl contro crittorrinco, crisomela, saperda
FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI: 200 g/hl contro afidi, cocciniglie, larve defogliatrici, tortricide del garofano, rodilegno, coleotteri defogliatori, oziorrinco.

COMPATIBILITA'
L CHIMITHION P.B. non è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

RISCHI DI NOCIVITA'
A seguito dei trattamenti il prodotto e' tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

1 Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.

2 Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.

3 Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti).

4 Aggiungere la restante acqua nell'atomizzatore.

ETICHETTA DA APPORRE SUL SACCHETTO IDROSOLUBILE

CHIMITHION P.B.

Insetticida polivalente a base di Azinfos metile
in polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del DPR 3 agosto 1968 n. 1255

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
AZINFOS METILE puro g 25
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico a contatto con la pelle. Molto tossico per inalazione e per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2804 del 7/1/1980

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 250
PARTITA N.

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Non toccare con mani o guanti bagnati
Da sciogliere in acqua senza rompere
Da non vendere ne' conservare fuori dalla confezione
Avvertenza: leggere l'etichetta riportata sulla confezione

CHEM-RICE

Erbicida selettivo per risaie contro il giavone
a base di Propanil

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
PROPANIL puro g.31.5 (= 330.12 g/l)
Coformulanti q.b.a g.100
Contiene BUTANOLO

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non gettare i residui nelle fognature. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza. Non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A.
Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A.- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 3158 del 5/6/1979

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO litri 5 - 20
PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
Il CHEM-RICE è un diserbante selettivo ad applicazione post-emergenza che si impiega in risaia per la lotta contro i giavoni. Il CHEM-RICE viene formulato in emulsione concentrata e viene distribuito mediante irrorazione previa diluizione in acqua.
Il CHEM-RICE trova impiego contro i giavoni ed altre malerbe quando si trovano nei primi stadi di sviluppo. Il CHEM-RICE viene distribuito con le usuali pompe irroratrici dopo essere stato preventivamente diluito in una quantità di acqua che consenta una omogenea copertura delle infestanti. Al fine di ottenere i migliori risultati si dovrà effettuare una buona preparazione del letto di semina (buona lavorazione e buon livellamento del terreno) e peraltro subito dopo la semina si dovrà mantenere un basso livello d'acqua per una più intensa ed omogenea germinazione dei giavoni che verranno distrutti in un secondo tempo dal CHEM-RICE. Lo stadio vegetativo in cui il giavone denota la maggior sensibilità al CHEM-RICE è quello compreso fra la prima e la terza foglia; in questo stadio sono infatti sufficienti l. 9,5 di CHEM-RICE. Più dettagliatamente si possono indicare dosi di l.9,5 di CHEM-RICE per ettaro intervenendo su giavoni con stadio vegetativo compreso fra la prima e la terza foglia, l. 12 di CHEM-RICE per ettaro intervenendo su giavoni con stadio vegetativo compreso fra la terza e la quarta foglia; l. 15-19 di CHEM-RICE per ettaro intervenendo su giavoni con stadio vegetativo compreso fra la quarta foglia e l'inizio dell'accestimento. Poichè il CHEM-RICE risulta tanto più efficace quanto più le infestanti sono in rapido accrescimento, quando si interviene su giavoni cresciuti in andamento climatico avverso bisognerà aumentare le dosi di CHEM-RICE, poichè ad un apparato fogliare esiguo fa riscontro un apparato radicale già robusto ed approfondito (giavone invecchiato).Il CHEM-RICE va distribuito previa diluizione in acqua e, qualora si faccia uso di una motopompa con barra di 8 metri ed ugelli di mm 1,si indica in 300/400 litri per ettaro il quantitativo ottimale di acqua per una omogenea distribuzione del prodotto. Usando pompa a spalla si dovrà aumentare leggermente il quantitativo di acqua portandolo a 400/500litri per ettaro di superficie. Qualora vengano impiegate le dosi più elevate (15/19 lt/ha)il quantitativo di acqua dovrà essere elevato a 600/700 litri per ettaro. In ogni caso la barra irrorante dovà essere tenuta bassa il più possibile. Il trattamento deve essere fatto con risaia asciutta avendo cura cioè di togliere l'acqua uno o due giorni prima di effettuare la distribuzione del prodotto. All'atto dell'applicazione le piantine di giavone dovranno essere ben asciutte ed il trattamento dovrà essere eseguito nelle ore più calde della giornata. Trascorse 24 ore dal trattamento si immetterà acqua nella risaia mantenendo il livello più alto possibile per circa una settimana, dopo di che lo si riporterà al livello normale. Non effettuare il trattamento se si prevede una pioggia entro 5/6 ore. Non trattare in giornate ventose al fine di evitare che la nube irrorante possa essere trasportata su colture sensibili provocando danni.

COMPATIBILITA'
Il CHEM-RICE va usato da solo.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 30 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

DALACIDE

Erbicida selettivo per il riso contro il riso crodo
Polvere solubile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DALAPON puro g. 85
Coformulanti q.b. a g.100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione.
Irritante per la pelle.
Rischio di gravi lesioni oculari.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.
Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 3170 del 29/6/1979

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO kg 1 - 5 - 20 - 25

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante delle mucose, nausea. Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE E MODALITA' DI IMPIEGO

Il DALACIDE è un diserbante selettivo per il riso efficace per la **lotta al Riso crodo**: agisce prevalentemente per assorbimento fogliare oltre che radicale e viene traslocato in ogni parte dell'infestante. L'azione si manifesta inizialmente con il progressivo ingiallimento delle foglie, sino alla completa devitalizzazione dell'apparato radicale entro 2-3 settimane.
L'intervento ottimale va effettuato in pre-semina anticipata con la tecnica della "falsa semina" per favorire la germinazione del crodo:

? introdurre un leggero strato di acqua sul terreno già pronto per la semina del riso, per favorire la germinazione delle infestanti;
? quando le piante di riso crodo hanno raggiunto lo stadio di 2 foglie vere, togliere l'acqua dalla risaia ed eseguire il trattamento;
? dopo 3-4 giorni, senza rimuovere il terreno, reintrodurre l'acqua e procedere alla semina del riso.

Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore

DOSI DI IMPIEGO
12-15 kg/ha

COMPATIBILITA'
Il DALACIDE non è miscibile con gli erbicidi a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Non richiesto

Attenzione! Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

DIDIVANE 50 E.C.

Insetticida emulsionabile a base di DDVP

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DICLORVOS puro g 45,5 (= 485.48 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
Contiene XILENE

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile
Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.
Molto tossico per inalazione.
Irritante per la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di contatto con la pelle togliersi immediatamente di dosso gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.
In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 3386 del 20/11/1979

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 1 - 5

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita'). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
E' un insetticida per uso agricolo in soluzione emulsionabile a base di Diclorvos, ad azione di contatto e fumigante. Il DIDIVANE 50 E.C. risulta efficace contro le larve dei minatori (Litocollete, Nepticula, Cemiostoma) su melo, pero, susino, pesco, albicocco, pomodoro e melanzana. Il DIDIVANE 50 E.C. agisce anche contro le forme adulte degli acari e può essere usato in miscela con un prodotto ad azione prevalentemente ovicida. Eseguire il trattamento alla prima comparsa dei parassiti ripetendo i trattamenti in relazione ai nuovi eventuali attacchi.
DOSI DI IMPIEGO: ml. 100-200 per 100 litri di acqua
E' vietato l'impiego in serra, fungaie e magazzini.

COMPATIBILITA'
Il DIDIVANE 50 E.C. è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra. Non è miscibile invece con i prodotti a reazione alcalina quali poltiglia bordolese e polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame. E' molto velenoso per le api, pertanto è consigliabile tenere lontane più possibile le arnie dai luoghi trattati e non effettuare trattamenti alle piante durante la fioritura.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 7 giorni.
Far trascorrere lo stesso periodo prima di far pascolare il bestiame in zone trattate od alimentate con foraggi o mangimi che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto con il prodotto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

AMADENE

Esca proteica per la preparazione di esche insetticide contro la mosca delle olive, la mosca degli agrumi, e la mosca delle ciliege

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Proteine idrolizzate pure g. 36 (= 421 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A. –u.p. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 3411 del 27.11.1979

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 1-5-20

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, mostrandogli l'etichetta del prodotto che è stato miscelato con Amadene.

ISTRUZIONI PER L'USO
Trattamenti da terra: impiegare l'AMADENE alla concentrazione dell'1% in miscela con l'insetticida alla dose usualmente consigliata. A seconda dello sviluppo della pianta e conseguentemente della chioma, impiegare da ml 250 a ml 500 di soluzione.
Eseguire il trattamento solo su alcuni rami, preferibilmente quelli esposti ad un maggiore soleggiamento. Per l'applicazione usare preferibilmente pompe a volume normale ad alta pressione onde ottenere la perfetta nebulizzazione della miscela insetticida.
Come insetticidi impiegare prodotti che abbiano una persistenza almeno pari a quella dell'Amadene (es. Etalene 48,5 EC a base di Fenitrotion).
Per una buona riuscita della lotta è necessario eseguire 2-4 trattamenti, distanziati l'uno dall'altro di circa 20/30 giorni. Per un più preciso confronto tenere in evidenza la comparsa degli adulti usando opportune bottiglie trappola.

COMPATIBILITA'
Il prodotto deve essere miscelato ad insetticidi.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

PER LA SOSPENSIONE DEI TRATTAMENTI ATTENERSI A QUANTO INDICATO SULLE CONFEZIONI DELL'INSETTICIDA USATO IN MISCELA.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

AGRUMIN

Olio minerale paraffinico ad azione insetticida e coadiuvante di erbicidi
Concentrato Emulsionabile

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Olio bianco paraffinico g. 95 (= 803,7 g/l)
(insulfonabilità minima 95%)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Evitare l'ingestione, l'inalazione, il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.p..A. - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A. –U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
VE.BI S.A.S. del Dr. Luigi Bazzolo - Via Desman, 43
S. EUFEMIA DI BORGORICCO (PD)

Registrazione Ministero della Sanità n. 3503 del 7.2.1980

Quantita' netta del preparato: litri 0,1-0,2-0,25-0,5-0,75-1-5-10-20-50-100-200

PARTITA N.

CARATTERISTICHE

AGRUMIN è un olio paraffinico altamente raffinato, caratterizzato da elevato residuo insulfonabile e minimo intervallo di distillazione, dotato di azione insetticida per asfissia, in grado di svolgere azione sinergica con eventuali insetticidi usati in miscela. AGRUMIN può inoltre essere usato come coadiuvante nei trattamenti erbicidi di post-emergenza

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

COLTURE ARBOREE: Agrumi, Drupacee, Pomacee, Noce, Nocciolo, Caco, Fico, Vite da tavola e da vino, Olivo
contro Cocciniglie, Afidi, Tripidi, Uova di lepidotteri, Tignole, Acari intervenire alle dosi seguenti:
trattamenti invernali: 2,5-3,5 l/hl
trattamenti primaverili: 1,5-2 l/hl

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro afidi, mosca, altica, cassida, 1-2,5 l/hl
CUCURBITACEE: contro afidi, mosca bianca, tripidi, uova di lepidotteri e coleotteri, minatori delle foglie, acari, 1-2,5 l/hl
PEPERONE, POMODORO, PATATA: contro afidi, uova di dorifora, ditteri, acari, 1-2,5 l/hl
FAGIOLO : contro afidi, tripidi, acari, 1-2,5 l/hl
CARCIOFO: contro afidi, mosca bianca, uova di lepidotteri, ditteri minatori, acari, 1-2,5 l/hl
SEDANO, FINOCCHIO: controafidi, mosca bianca, tripidi, uova di minatori delle foglie, acari, 1-2,5 l/hl
FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI: contro cocciniglie, afidi, tripidi, tignole, aleurodidi, acari:
in fase vegetativa: 1,5-2 l/hl
in inverno: 2-2,5 l/hl

AGRUMIN può essere utilizzato come coadiuvante degli erbicidi, nei trattamenti di post-emergenza sulle seguenti colture:

Colture	Erbicidi utilizzabili in miscela	Dosi (litri/ha)
Barbabietola da zucchero	phenmedipham, desmedipham, ethofumesate, lenacil, metamitron, chloridazon, fluazifop-p-butyl, sethoxydim, cycloxydim, haloxyfop-R-metile, quizalofop-etile, clopyralid, diclofop-methyl, propaquizafop, clethodim	0,3-1 l/ha
Mais	dicamba, bentazone, clopyralid, bromoxynil, fluroxypir	0,3-2 l/ha
Soia	bentazone, imazethapyr, fluazifop-p-butyl, sethoxydim, cycloxydim, haloxyfop-R-metile, quizalofop-etile, propaquizafop, clethodim	0,3-2 l/ha
Patata	metribuzin, fluazifop-p-butyl, sethoxydim, cycloxydim, diclofop-methyl	0,3-2 l/ha
Pomodoro	metribuzin, fluazifop-p-butyl, sethoxydim, cycloxydim, quizalofop-etile, propaquizafop, clethodim	0,3-2 l/ha
Peperone	fluazifop-p-butyl, sethoxydim, cycloxydim	0,3-2 l/ha
Fagiolo	fluazifop-p-butyl, cycloxydim, diclofop-methyl, propaquizafop	0,3-2 l/ha
Carciofo	fluazifop-p-butyl, sethoxydim, cycloxydim, haloxyfop-R-metile, quizalofop-etile	0,3-2 l/ha
Sedano	fluazifop-p-butyl, sethoxydim	0,3-2 l/ha
Finocchio	fluazifop-p-butyl, sethoxydim, cycloxydim, haloxyfop-R-metile	0,3-2 l/ha

COMPATIBILITA' : AGRUMIN non è miscibile con prodotti a base di zolfo, polisolfuri, carbammati, captano, clorotalonil, diclofuanide, dimetoato, dinocap, folpet, propargite, triclorfon. Qualora fossero effettuati trattamenti con tali formulati l'applicazione di AGRUMIN deve essere effettuata almeno 10 giorni prima o due settimane dopo quella dei prodotti citati, ad eccezione dei ditiocarbammati, per i quali può essere applicato 3-5 giorni prima o dopo.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ': Non trattare durante la fioritura. Si sconsigliano gli interventi su Pero cv. Decana. Non applicare con temperature superiori a 32-34°C e su piante stressate.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni.
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da litri 200 dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Per le taglie da litri 100 e 200 : "contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo"

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

AGRUMIN

Olio minerale paraffinico ad azione insetticida e coadiuvante di erbicidi
Concentrato Emulsionabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Olio bianco paraffinico g. 95 (= 803,7 g/l)
(insulfonabilità minima 95%)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Evitare l'ingestione, l'inalazione, il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p..A. - Via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. –U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
VE.BI S.A.S. del Dr. Luigi Bazzolo - Via Desman, 43 - S. EUFEMIA DI BORGORICCO (PD)

Registrazione Ministero della Sanità n. 3503 del 7.2.1980

Quantita' netta del preparato: litri 0,1

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

METAMBANE

Diserbante selettivo liquido solubile

NOCIVO

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DICAMBA Sale dimetilamminico puro g 2,53 (= 28,6 g/l)
MCPA sale sodico potassico puro g 28,2 (= 318.6 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.
Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 3519 del 15/3/1980

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 250 - 500 - litri 1 - 5 - 10 - 20

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
DICAMBA SALE DIMETILAMMINICO; MCPA le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: DICAMBA SALE DIMETILAMMINICO-Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. Terapia sintomatica. MCPA Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
Il METAMBANE e' una miscela di erbicidi, selettiva per il diserbo di Melo, Frumento, Mais e cereali minori : Avena, Segale, Orzo.
L'aggiunta del Dicamba ad un derivato fenossiacetico (MCPA), amplia lo spettro di efficacia del METAMBANE e consente di ottenere controlli anche su infestanti notoriamente resistenti ai derivati fenossiacetici.
In particolare si consiglia l'impiego del METAMBANE ove esistono infestazioni di erbe annuali e perenni a foglia larga quali: Anagallis arvensis, Atriplex spp., Brassica spp., Capsella bursa pastoris, Cardamine hirsuta, Centaurea spp., Chenopodium album, Cirsium spp., Convolvolus arvensis, Delphinium consolida, Fumaria officinalis, Galinsoga parviflora, Galium aparine, Matricaria spp., Papaver rhoeas, Geranium, Polygonum spp., Portulaca oleracea, Plantago spp., Ranunculus spp., Raphanus raphanistrum, Rumex spp., Senecio vulgaris, Sinapis spp., Spergula arvensis, Sonchus arvensis, Stellaria media, Taraxacum officinalis, Thlaspi arvense, Veronica spp., Vicia sativa, Viola spp.

EPOCA E DOSI DI IMPIEGO
FRUMENTO, AVENA, SEGALE, ORZO : 3 - 3,5 l/ha in 400/600 litri di acqua dalla fine dell'accestimento sino all'inizio della fase di botticella.
MAIS : 0,800 - 1 litro/ha in 400-600 litri di acqua. Si consiglia di intervenire nelle ore più fresche della giornata, con temperature comprese tra 10° e 12°C e su mais tra la 3° e 4° foglia.
MELO : 4 litri/ha con infestanti in fase di attiva crescita. Trattare con temperature miti, nei periodi di stasi vegetativa della coltura e con l'ausilio di barre schermate. Bagnare uniformemente la vegetazione infestante. E' consigliabile l'aggiunta di olio bianco (1-2%).

COMPATIBILITA'
Il METAMBANE e' compatibile con i formulati che contengono i principi attivi di cui e' costituito il prodotto stesso e precisamente MCPA oppure Dicamba.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto puo' danneggiare colture sensibili quali la vite, alberi da frutto, ortaggi ecc. anche sotto forma di vapori portati dal vento. Data la tossicita' del principio attivo MCPA per l'erba medica, trattare almeno 15 giorni prima della semina.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni sui cereali, 30 giorni su melo.
AVVERTENZA: non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Per lavorazioni agricole da effettuare entro 10 giorni, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

CLOMITANE

Fungicida organico
Tipo di formulazione: polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
CAPTANO puro g 45
Coformulanti q.b. a g. 100

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Tossico per inalazione.
Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti.
Rischio di gravi lesioni oculari
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.
In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 3819 del 11/9/1980

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO : kg 5 - 20

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
Il CLOMITANE è efficace su MELO e PERO contro Ticchiolatura e Marciume bruno. Il CLOMITANE viene impiegato per la concia a secco delle sementi di mais, sorgo ed ortive all'atto della semina.

DOSI DI IMPIEGO
MELO e PERO: gr.200/300 per 100 litri di acqua.
CONCIA DELLE SEMENTI di mais, sorgo, ortive: gr.300 per 100 kg. di semente. All'atto della concia assicurarsi che tutte le sementi trattate vengano perfettamente ricoperte.
AVVERTENZA: i semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili, devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

COMPATIBILITA'
Il CLOMITANE non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.) con olii e con zolfi. La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious-Weinesap-Stayman-Renetta del Canada) e di pero (Butirra d'Anjou-Butirra Clargeau-Contessa di Parigi- Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 15 giorni

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ZOLFO COLLOIDALE 80

Zolfo colloidale per irrorazioni

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Zolfo puro g 80
(esente da Selenio)
Disperdenti, supporti e coadiuvanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A
Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A.- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 3823 del 11.9.1980

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1 – 5 - 25

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
E' uno zolfo colloidale che si impiega in trattamenti liquidi per la lotta contro l'oidio della vite, il mal bianco di Melo e Pero e delle colture orticole e floreali.

EPOCA DI IMPIEGO
I trattamenti vanno eseguiti secondo i classici schemi di lotta contro l'oidio.

DOSI DI IMPIEGO per 100 litri di acqua
In viticoltura contro oidio g 80-100
Su Melo e Pero contro Mal bianco g 100-120
Su Rosa, Gerbera, Anemone contro oidio g 100-150
Su Pomodoro, Patata, Melanzana contro mal bianco g 100-150

COMPATIBILITA'
Non è compatibile con prodotti fitosanitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacryl, Diclofluamide.
Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Può arrecare danno alle seguenti cultivar di :
MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman red, Winesap.
PERE: Buona Luigia d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio

INTERVALLO che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 5 giorni.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

MICOSIN F 30

Fungicida acuprico neutro in formulazione liquida a base di Ziram colloidale

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
ZIRAM puro g. 28,5 (= 336 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione.
Molto tossico per inalazione.
Irritante per le vie respiratorie.
Rischio di gravi lesioni oculari.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.
Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 4088 del 1/12/1980

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 250 – 500 litri 1 - 5 –10 – 20

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Terapia: sintomatica. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO

Il MICOSIN F 30 è una formulazione di Ziram colloidale disperso in fase liquida, dotato di attività fungicida. Il MICOSIN F 30 è dotato di adesività, resistenza al dilavamento e di potere ricoprente delle superfici trattate. Il suo impiego è pratico e semplice in quanto per la preparazione della poltiglia è sufficiente versarlo lentamente nell'acqua necessaria tenendola agitata.

EPOCHE E DOSI DI IMPIEGO

AGRUMI: contro Mal secco, Fumaggine e marciume bruno dei frutti alla dose di 500 ml/hl
DRUPACEE, MANDORLO: contro Bolla, Corineo, Moniliosi e Ticchiolatura nei trattamenti autunno-invernali a 1300-1400 ml/hl; nei trattamenti pre-fiorali a 600-650 ml/hl; nei trattamenti post-fiorali a 400-500 ml/hl
POMACEE: contro Ticchiolaura e Marciume dei frutti a 500 ml/hl nei trattamenti pre-fiorali e a 400 ml/hl nei trattamenti post-fiorali.
FRAGOLA. contro Botrite alla dose di 400-500 ml/hl
OLIVO: contro Cicloconio alla dose di 500-600 ml/hl
ORTAGGI: contro Ruggine, Antracnosi, Peronospora, Alternaria, Septoria, Nerume e Cercospora a 400 ml/hl
PATATA: contro Alternaria e peronospora alla dose di 400 ml/hl
FLOREALI E ORNAMENTALI: contro Ticchiolatura, Peronospora, Ruggine, Septoria, Antracnosi ed Alternaria a 400 ml/hl
FORESTALI, VIVAI E SEMENZAI: contro Ruggini e Antracnosi a 400 ml/hl

FITOTOSSICITA'

Varietà di pero sensibili allo Ziram: Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona d'estate

COMPATIBILITA'

Il MICOSIN F 30 è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 10 giorni.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

T.M.T.D. 50 BORCHERS

Fungicida organico per trattamenti liquidi
Polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
TIRAM puro g 47.5
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione
Irritante per gli occhi e la pelle.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 4089 del 01.12.80

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1 - 5 - 20

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Terapia: sintomatica; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
E' un fungicida adatto per la lotta contro la muffa grigia dell'uva, il marciume dei tulipani e dei gladioli, la vaiolatura delle fragole, la ticchiolatura del melo e del pero, la bolla ed il corineo del pesco, la gommosi del pesco e dell'albicocco.

EPOCA DI APPLICAZIONE
Interventi preventivi a seconda della gravità delle infestazioni.

DOSI DI IMPIEGO:(per 100 litri di acqua):
Viticoltura (contro muffa grigia) g.250-300; - Melo, Pero (contro la ticchiolatura) g.300-400; - Pesco, Albicocco (contro la bolla, corineo, gommosi) per trattamenti primaverili-estivi: g.200-250, per trattamenti autunno-invernali: g. 600-800; - Fragola (contro la vaiolatura) g:250-300; - Colture floreali (contro i marciumi) g. 250-300.

COMPATIBILITA'
Il T.M.T.D.50 BORCHERS è compatibile con i comuni prodotti fitosanitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Può risultare fitotossico sulle cultivar di Pesco: Red Haven, Cardinal, Dixired e sensibili possono risultare le cultivar di pero Butirra Clargeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna, Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

RISCHI DI NOCIVITA'
E' tossico per i pesci, gli insetti utili, il bestiame e gli animali domestici.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 10 giorni
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

MALERBANE CEREALI

Erbicida selettivo a base di 2,4 D

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
2,4-D acido puro g. 33 (= 328,3 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
Contiene XILENE

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Infiammabile.
Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
Irritante per la pelle.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A
Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 4090 del 1/12/1980

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO : litri 1 - 5 - 10

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica, Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO

E' un erbicida di estere pesante. Il 2,4-D e' dotato di azione selettiva e si impiega per combattere malerbe quali papavero, veccia, senape, rapastrella, fumaria, borsa del pastore, cardo selvatico, romice, artemisia, achillea, che infestano il frumento ed i cereali minori (orzo, avena e segale). E' un preparato efficace e risulta attivo anche operando su vegetazione bagnata e se piove subito dopo il trattamento.

EPOCA DI APPLICAZIONE

Da quando il cereale ha ultimato l'accestimento sino all'inizio della fase di botticella.

DOSI DI IMPIEGO

Da litri 0,450 a litri 1,500 per ettaro in 500/1000 litri di acqua.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con erbicidi a reazione neutra.
AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Prima del diserbo delle colture effettuare un saggio preventivo su una piccola superficie per rilevare se esistono eventuali sensibilità della coltura. Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, i pioppi e le colture floreali in genere. Evitare che il prodotto giunga a contatto di tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per animali domestici, pesci e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

FLURENE S.E.

Diserbante selettivo per il controllo in pre-emergenza di infestanti graminacee e dicotiledoni di varie colture
Concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
TRIFLURALIN puro g 44.8 (= 490 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A-U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 4526 del 2/11/1981

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO : ml 100 - 250 - 500 litri 1 - 5 - 10

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di malessere chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il FLURENE S.E. è un erbicida pre-emergenza che agisce su numerose infestanti in fase germinante. Il FLURENE S.E., nell'applicazione pratica, viene incorporato nel terreno affinchè risulti efficace anche se dopo il trattamento succede un periodo siccitoso; inoltre, con questa tecnica, le successive lavorazioni superficiali non influiscono sull'efficacia dell'erbicida verso le malerbe. Il FLURENE S.E. risulta efficace sia su graminacee sia su infestanti a foglia larga e precisamente: tra le graminacee il FLURENE S.E. controlla le seguenti specie: Digitaria sanguinalis (Sanguinella), Echinochloa crus-galli (Giavone), Sorgum halepense (Sorghetta da seme), Setaria spp. (Panico falso), Bromus spp.(Forasacco), Poa annua (Fienarola), Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Apera spica venti (Agrostide annuale) Lolium spp. (Loietto). Tra le malerbe a foglia larga il FLURENE S.E. controlla le seguenti specie: Portulaca oleracea (Erba porcellana), Polygonum aviculare (Correggiola), Polygonum convolvulus (Convolvolo nero), Amaranthus retroflexus (Amaranto), Chenopodium album (Farinello), Stellaria media (Centocchio), Urtica urens (Ortica minore), Galium aparine (Attaccamano), Lamium spp.(Falsa ortica), Papaver rhoeas (Papavero), Veronica spp.(Veronica), Atriplex patula (Atriplice), Galeopsis spp. (Canapetta).

MODALITA' DI IMPIEGO
Il FLURENE S.E. deve essere incorporato immediatamente dopo l'applicazione ad una profondità di 5/10 cm. Circa il tipo di attrezzatura da impiegare è necessario ricordare che il lavoro di incorporazione deve mirare a sminuzzare le zolle grosse ed incorporare omogeneamente al terreno. Si consiglia, laddove è possibile, di eseguire due lavorazioni in senso ortogonale.

EPOCHE E DOSI DI IMPIEGO
Il FLURENE S.E. si impiega alle dosi di 1 l/ha in terreni leggeri, 1,5 l/ha in terreni di medio impasto, 2 l/ha in terreni pesanti e argillosi, salvo dosi diverse specificate in etichetta per alcune colture. La distribuzione del prodotto deve essere effettuata impiegando 300-500 l/ha di acqua.

TRATTAMENTI DI PRE-TRAPIANTO : Eseguire l'applicazione da 6 settimane a 1 giorno prima del trapianto sulle seguenti colture: Pomodoro, Peperone, Indivia, Lattuga, Scarola, Carota, Finocchio, Sedano, Prezzemolo, Porro, Cavolo, Cavolfiore, Cipolla, nonchè su nuovi impianti di Agrumi, Vite, Melo, Pero, Drupacee e piante ornamentali.

ASPARAGO : applicare prima del ricaccio, incorporando il prodotto al terreno.

TRATTAMENTI DI PRE-SEMINA: Applicare il prodotto da 6 settimane ad 1 giorno prima della semina delle seguenti colture: Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Carota, Finocchio, Sedano, Prezzemolo, Aglio, Cavolo, Girasole, Cotone, Arachide, Soja, Colza, Ravizzone. Su gladiolo eseguire il trattamento prima della semina dei bulbilli aventi diametro di almeno 2,5 cm.

TRATTAMENTI DI PRE-EMERGENZA: Patata: applicare ed interrare il FLURENE S.E. dopo l'impianto dei tuberi nello strato sovrastante. **TRATTAMENTI DI POST-EMERGENZA**: Pomodoro: applicare il prodotto tra le fila all'epoca del diradamento alla dose di 1.2 l/ha in terreni leggeri e di medio impasto e di 1,5 l/ha in terreni pesanti. - Drupacee (Pesco, Susino, Albicocco), Vite, Melo, Pero, Agrumi, Piante Ornamentali : su impianti già radicati alla dose di 2 l/ha.; Melone, Cocomero, Cetriolo: intervenire all'epoca del diradamento (stadio di 3-4 foglie). Carciofo: eseguire l'applicazione impiegando 1 litro/ha in terreni leggeri, 1.2 l/ha in terreni di medio impasto e 1.5 l/ha in terreni pesanti o argillosi: il trattamento deve essere eseguito prima dell'impianto dei carducci oppure dopo l 'impianto degli ovuli incorporando immediatamente.- Frumento, Orzo, Segale (a semina autunnale): da subito dopo la semina sino all'emergenza della coltura direttamente sul terreno e senza incorporarlo. Operando in post-emergenza intervenire prima che le infestanti abbiano superato lo stadio vegetativo di plantule.

CAMPI DA GOLF: intervenire con litri 1-1,5 di FLURENE SE per ettaro di superficie all'inizio della primavera, prima della germinazione delle graminacee annuali sensibili che si vogliono eliminare; far seguire al trattamento una irrigazione a pioggia. Intervenire su campi da golf già affrancati.

ISTRUZIONI SPECIALI: Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del Trifluralin e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocomero, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza, cavoli, spinacio. Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto ecc) nella primavera successiva all'applicazione del prodotto. Non deve essere applicato in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.

NOCIVITA': Attenzione, il prodotto tal quale contiene sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici

COMPATIBILITA' : avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA : 30 giorni

Attenzione! Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua –
Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

FLURENE S.E.

Diserbante selettivo per il controllo in pre-emergenza
di infestanti graminacee e dicotiledoni di varie colture
Concentrato emulsionabile

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
TRIFLURALIN puro g 44.8 (= 490 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A-U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 4526 del 2/11/1981

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO : ml 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CLORVAL

Fungicida polivalente in formulazione flowable

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
CLORTALONIL puro g 40 (= 488 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.
Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. U.P. SIFA – CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 4669 del 25/2/1982

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100-250-500 - litri 1

PARTITA N.

AVVERTENZE PARTICOLARI
Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante - Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi - Non utilizzare per nessuna ragione questo contenitore per altro uso - Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore per i prodotti nocivi Non utilizzare il prodotto in prossimità dei corsi d'acqua. Evitare l'accesso ai terreni prima che siano trascorse almeno 12 ore dall'applicazione in pieno campo e 24 ore dall'applicazione in serra.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
E' un fungicida polivalente ad azione preventiva, dotato di ampio spettro di azione e persistenza. Il suo impiego consente di combattere contemporaneamente i principali parassiti fungini, ad eccezione dell'Oidio.
COLTURE ORTICOLE: sedano, pomodoro, fagiolo, fagiolino, cipolla, contro alternaria, cercospora, antracnosi; peronospora: 250/280 ml/hl;
PATATA: 150/220 ml/hl;
COLTURE FLOREALI (rosa, garofano, gladiolo e crisantemo) ed ORNAMENTALI in pieno campo ed in serra contro ticchiolatura, botrite, ruggini, antracnosi, septoriosi, fusariosi, alternaria: 200/280 ml/hl; stemperare la dose in poca acqua aggiungendola poi al totale quantitativo di acqua ed agitando per alcuni minuti fino alla formazione di una poltiglia omogenea.
DOSI MASSIME DI IMPIEGO: 1000/1500 ml/hl di p.a. per applicazione.

COMPATIBILITA'
Associazioni possibili con: sterolo-inibitori, fungicidi antiperonosporici sistemici, citotropici e traslaminasi-dicarbossimidici (antibotritici) - benzimidazolici - rame - zolfi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
In condizioni normali di ambiente e di impiego il prodotto non è fitotossico. Alcune colture quali Melone, Pomodoro sono sensibili all'azione del prodotto.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' tossico per gli insetti utili, animali domestici, i pesci ed il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA
14 giorni; su fagiolo massimo 2 trattamenti da effettuarsi fino alla fioritura. Su fagiolino massimo 2 trattamenti da effettuarsi fino alla fioritura (esclusa).

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua- Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CLORVAL

Fungicida polivalente in formulazione flowable

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
CLORTALONIL puro g 40 (= 488 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. U.P. SIFA – CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 4669 del 25/2/1982

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

SUTENE 5 GRANULARE

Geodisinfestante inodoro
per trattamenti localizzati ed a pieno campo

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
ENDOSULFAN puro g 5
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A
Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5056 del 27/11/1982

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO : kg 25

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni. Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni. Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il SUTENE 5 GRANULARE è un geodisinfestante che agisce per contatto, ingestione e, secondariamente, per asfissia, contro i più diffusi e dannosi insetti terricoli quali: elateridi, maggiolini, grillotalpe, nottue e agrotidi, oziorrinchi, atomarie, cleoni, lixus, tipulidi, zabro gobbo, bibionidi, mosche delle orticole e dei seminati.
IL SUTENE 5 GRANULARE può essere distribuito sia localizzato, mediante le speciali apparecchiature dette microgranulatori, sia a pieno campo.
Le dosi di impiego sono le seguenti:
- TABACCO: 30/40 kg/ha solo a pieno campo;
- PATATA: 35-40 kg/ha a pieno campo; 10-12 kg/ha localizzato
- FLORICOLE: 25-35 kg/ha in pieno campo; 8-10 kg/ha localizzato
Il SUTENE 5 GRANULARE quale geodisinfestante è applicato su terreni destinati a colture frutticole (**pomacee, nocciolo**) e forestali, prima della semina o del trapianto. Le dosi di impiego sono: 60-100 kg/ha a pieno campo; 18-30 kg/ha localizzato.
Agrumi e vite : la dose di impiego è di 20 kg/ha di prodotto tal quale per un massimo di 2 applicazioni
Pesco: la dose di impiego è di 16 kg/ha di prodotto tal quale per un massimo di 3 applicazioni.

COMPATIBILITA'
In genere è distribuito da solo, specie nei trattamenti localizzati. E' comunque miscibile, al momento della distribuzione, con i concimi chimico-minerali.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per gli insetti utili

INTERVALLO DI SICUREZZA: 25 giorni ; VITE : 28 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

TIOMETANE P.B.

Fungicida organico a base di Tiofanate Metile in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Tiofanato Metile puro g 70
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per inalazione.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Possibilità di effetti irreversibili.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A.
Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A.
U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5057 del 24.11.1982

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 50 - 100 - 250 - 500 - kg 1 - 5

PARTITA N.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Consultare un Centro Antiveleni

DOSI, EPOCHE E MODALITA' DI IMPIEGO

Il TIOMETANE P.B. è un fungicida organico ad azione preventiva e curativa che si impiega nella difesa delle seguenti colture:
PESCO, ALBICOCCO, SUSINO contro Monilia, Oidio, Ticchiolatura : 70-100 g/hl
MELO, PERO contro Ticchiolatura e Oidio 70-100 g/hl sino alla fase di post-fioritura; 50-70 g/hl nei trattamenti successivi. Contro Gloeosporium 60-100 g/hl in pre-raccolta; 75-150 g/hl per trattamenti di post-raccolta a mezzo di immersione o irrorazione della frutta.
I trattamenti dovranno essere effettuati, per non più di 30 secondi, in ambienti appositamente attrezzati per le operazioni meccanizzate, che escludano l'intervento diretto dell'operatore e che consentano l'immagazzinamento con frigo-conservazione. La soluzione eccedente ai trattamenti dovrà essere prelevata da ditte specializzate per la sua depurazione (fisica o microbiologica).
Le mele e le pere così trattate possono essere poste in commercio non prima di 15 giorni dal trattamento.
VITE: contro Botrite e Oidio 70-100 g/hl
NOCCIOLO: contro Gloeosporium 150 g/hl a caduta foglie, contro Monilia 70-100 g/hl da aprile a giugno.
FRUMENTO: contro Rizottoniosi dei cereali, Mal del piede del grano, Fusariosi, Cercosporella 500-600 g/ha in fase di accestimento e/o levata.
FLOREALI E ORNAMENTALI contro Botrite, Septoriosi, Mal bianco 60-70 g/hl in pieno campo; contro Corineo del cipresso 100-150 g/hl; contro Gloeosporium e Ceratocystis del platano 150 g/hl.
Trattamenti al terreno contro Fusariosi, Verticiliosi, Fialoforosi del garofano : 1,5 - 2 g/mq.
CONCIA DEI BULBI (bulbose da fiore) contro marciumi da Fusarium, Sclerotinia, Penicillium, Botrytis: 750-1000 g/hl per immersione (15-30 minuti)

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA FUNGICIDA

Stemperare la dose necessaria di prodotto in poca acqua, aggiungere quindi lentamente l'ulteriore volume di acqua agitando continuamente con cura.

COMPATIBILITA'

Il TIOMETANE P.B. è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra.. Sono esclusi i Polisolfuri e la Poltiglia bordolese.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta del frumento e 15 giorni per le altre colture.

ATTENZIONE: il prodotto tal quale contiene sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici

AVVERTENZA: l'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositiidoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.

Attenzione! Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

TIOMETANE P.B.

Fungicida organico a base di Tiofanate Metile.
Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili.

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Tiofanato Metile puro g 70
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per inalazione.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Possibilità di effetti irreversibili.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. -U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5057 del 24.11.1982

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
g 100 (n. 10 sacchetti idrosolubili da g 10)
g 500 (n. 10 sacchetti idrosolubili da g 50)
kg 1 (n. 5 sacchetti idrosolubili da g 200)
kg 1 (n. 2 sacchetti idrosolubili da g 500)
kg 5 (n. 1 sacchetto idrosolubile da kg 5)
g 250 (n. 10 sacchetti idrosolubili da g 25)
kg 1 (n. 10 sacchetti idrosolubili da g 100)
kg 1 (n. 4 sacchetti idrosolubili da g 250)
kg 1 (n. 1 sacchetto idrosolubile da kg 1)

PARTITA N.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Consultare un Centro Antiveleni

DOSI, EPOCHE E MODALITA' DI IMPIEGO
Il TIOMETANE P.B. è un fungicida organico ad azione preventiva e curativa che si impiega nella difesa delle seguenti colture:
PESCO, ALBICOCCO, SUSINO contro Monilia, Oidio, Ticchiolatura : 70-100 g/hl
MELO, PERO contro Ticchiolatura e Oidio 70-100 g/hl sino alla fase di post-fioritura; 50-70 g/hl nei trattamenti successivi. Contro Gloeosporium 60-100 g/hl in pre-raccolta; 75-150 g/hl per trattamenti di post-raccolta a mezzo di immersione o irrorazione della frutta.
I trattamenti dovranno essere effettuati, per non più di 30 secondi, in ambienti appositamente attrezzati per le operazioni meccanizzate, che escludano l'intervento diretto dell'operatore e che consentano l'immagazzinamento con frigo-conservazione. La soluzione eccedente ai trattamenti dovrà essere prelevata da ditte specializzate per la sua depurazione (fisica o microbiologica).
Le mele e le pere così trattate possono essere poste in commercio non prima di 15 giorni dal trattamento.
VITE: contro Botrite e Oidio 70-100 g/hl
NOCCIOLO: contro Gloeosporium 150 g/hl a caduta foglie, contro Monilia 70-100 g/hl da aprile a giugno.
FRUMENTO: contro Rizottoniosi dei cereali, Mal del piede del grano, Fusariosi, Cercosporella 500-600 g/ha in fase di accestimento e/o levata.
FLOREALI E ORNAMENTALI contro Botrite, Septoriosi, Mal bianco 60-70 g/hl in pieno campo; contro Corineo del cipresso 100-150 g/hl; contro Gloeosporium e Ceratocystis del platano 150 g/hl.
Trattamenti al terreno contro Fusariosi, Verticiliosi, Fialoforosi del garofano : 1,5 - 2 g/mq.
CONCIA DEI BULBI (bulbose da fiore) contro marciumi da Fusarium, Sclerotinia, Penicillium, Botrytis: 750-1000 g/hl per immersione (15-30 minuti)

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA FUNGICIDA
Stemperare la dose necessaria di prodotto in poca acqua, aggiungere quindi lentamente l'ulteriore volume di acqua agitando continuamente con cura.

COMPATIBILITA'
Il TIOMETANE P.B. è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra.. Sono esclusi i Polisolfuri e la Poltiglia bordolese.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta del frumento e 15 giorni per le altre colture.

ATTENZIONE: il prodotto tal quale contiene sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici

AVVERTENZA: l'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositiidoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.

Attenzione! Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

30%

1 Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.

2 Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.

3 Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti).

4 Aggiungere la restante acqua nell'atomizzatore.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

TIOMETANE P.B.

Fungicida organico a base di Tiofanate Metile in polvere bagnabile

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Tiofanato Metile puro g 70
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per inalazione.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Possibilità di effetti irreversibili.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.
Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A.
U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5057 del 24.11.1982

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 50 - 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA DA APPORRE SUL SACCHETTO IDROSOLUBILE

TIOMETANE P.B.

Fungicida organico a base di Tiofanate Metile.
Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili.

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Tiofanato Metile puro g 70
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per inalazione.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Possibilità di effetti irreversibili.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. -U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5057 del 24.11.1982

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 10; 25; 50; 100; 200; 250; 500; 1000; 5000

PARTITA N.

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE
AVVERTENZA: LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

AGRIBAS

Diserbante selettivo per cereali

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
2,4-D Estere isottilico g. 49,77 (= 495,21 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
Contiene XILENE

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Infiammabile.
Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
Irritante per la pelle.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A -
Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5295 del 30/3/1983

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO : l 1 - 5

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO

AGRIBAS è un erbicida ormonico selettivo indicato per il controllo di infestanti dicotiledoni che infestano i cereali coltivati. Viene assorbito per via fogliare e traslocato nei vari organi delle infestanti. Per questo viene preferito nei periodi piovosi in quanto si evitano pericoli di dilavamento.Alle dosi consigliate combatte: Chenopodium, Vicia, Amaranthus, Centaurea, Cirsium, Raphanus, Melharis difformis,ecc.

DOSI DI IMPIEGO

Applicare litri 0,5 - 1,2 per ettaro su Grano, Segale, Orzo, Avena, trattando dalla fine dell'accestimento fino all'inizio della fase di botticella.
Litri 0,5 - 1 per ettaro su Mais con la coltura alta 15-20 cm orientando lo spruzzo verso la parte più bassa delle piante, trattando nelle ore più fresche della giornata.

COMPATIBILITA'

Il prodotto e' compatibile con i prodotti a reazione alcalina
AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Prima del diserbo delle colture effettuare un saggio preventivo su una piccola superficie per rilevare se esistono eventuali sensibilità della coltura. Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, i pioppi e le colture floreali in genere. Evitare che il prodotto giunga a contatto di tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per animali domestici, pesci e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

CHIMIGOR 40

Insetticida a base di Dimetoato
Concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DIMETOATO puro g. 38 (= 395,2 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
Contiene Xilene e Cicloesanone

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile
Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione
Irritante per gli occhi

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NOCIVO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.
Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5509 del 23/11/1983

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 250 - 500 litri 1 - 5 - 10 – 20

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare, visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Poco efficace la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
CHIMIGOR 40 è un insetticida dotato di efficacia contro numerosi insetti parassiti delle colture agrarie.
CHIMIGOR 40 ha un potere abbattente ed una azione citotropica per cui penetra nei tessuti vegetali agendo sulle forme di insetti piu' nascoste.
AGRUMI (vivai di piante non in produzione): contro Afidi, Acari, - Cocciniglie e Ragno rosso 125 ml/hl.
OLIVO : contro Mosca delle olive 140 ml/hl negli attacchi "precocissimi" (luglio) e "normali" (settembre-ottobre); 75 ml/hl in quelli "precoci" (agosto). I trattamenti si eseguono normalmente all'inizio dell'ovodeposizione, cioè quando si notano le prime punture della mosca sulle olive; contro Tignola 140 ml/hl contro larve della generazione fillofaga; contro Liotripide 90 ml/hl in pre-fioritura; contro Punteruolo e Oziorrinco 70 ml/hl.
CILIEGIO : contro Mosca della ciliegia 50 ml/hl sulle varietà a maturazione media e tardiva.
ASPARAGO: contro Mosca 70-100 ml/hl alla comparsa dell'infestazione; contro Ragno rosso e Afidi 90 ml/hl.
POMODORO, MELANZANA (entrambe solo in pieno campo): contro Afidi e Aleurodidi 70-100 ml/hl; contro Vasate 100 ml/hl.
LATTUGA (solo in pieno campo), **BIETOLA ROSSA, RAPA, NAVONE**: contro Afidi, Mosca e Ragno rosso 70-100 ml/hl.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Sminturide 50 ml/hl, contro Mosca 70-100 ml/hl.
TABACCO: contro lepidotteri 55-100 ml/hl; contro Aleurodidi, Afidi e Tripidi 70-90 ml/hl.
FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE: contro Sminturide 50 ml/hl.
FLORICOLE: contro Ditteri dei fiori, Striscino del garofano e Hylemya Brunnescens eseguire, alla dose di 200 ml per ettolitro di acqua, trattamenti a partire dal mese di aprile contro queste larve minatrici.
PIOPPO, COLTURE FORESTALI: contro Tarlo vespa, Gemmaiola, Crisomela 300 ml/hl.

COMPATIBILITA'
CHIMIGOR 40 è compatibile con tutti i fungicidi comunemente usati ad eccezione della poltiglia bordolese, borgognona e polisolfuro di calcio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Si sconsiglia l'impiego del prodotto su cedro, arancio amaro, limone interdonato, crisantemo, e su varietà di olivo quali: Coratina, Canino, Frantoio, Simona, Vernina, Marsella, Itrana, Bosana.

RISCHI DI NOCIVITA'
A seguito dei trattamenti il prodotto è nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA:
14 giorni prima della raccolta per lattuga e asparago;
20 giorni per tabacco e ciliegio;
21 giorni per pomodoro e melanzana;
28 giorni per olivo, frumento, segale e triticale;
30 giorni per barbabietola da zucchero, bietola rossa, rapa e navone.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

TIOMARE

Zolfo ventilato

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Zolfo puro g 75
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A.- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6521 del 3.10.1985

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1 – 5 - 25

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
Il TIOMARE, a base di zolfo, consente di ottenere una valida azione contro l'oidio della vite grazie alla elevata purezza e finezza di lavorazione dello zolfo contenuto nel prodotto.

EPOCA DI APPLICAZIONE
Eseguire una prima solforazione quando i tralci misurano da 5 a 10 centimetri e ripetere il trattamento se la stagione avversa non consente allo zolfo una completa azione di difesa. Un secondo trattamento al momento della fioritura.
Tre-quattro solforazioni da luglio in avanti quando gli acini sono ben formati.

DOSI DI IMPIEGO
Impolverare quanto basta operando di preferenza al mattino quando le viti sono coperte di rugiada.

COMPATIBILITA'
Il TIOMARE non è compatibile con prodotti fitosanitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese,e cc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacryl, Diclofluamide.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Può arrecare danno alla seguente cultivar di vite: Sangiovese

INTERVALLO DI SICUREZZA: 5 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

TIOLENE 80 WG

Zolfo in microgranuli idrodispersibili ad azione fungicida

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
ZOLFO puro g 80
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.- Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
Sulphur Mills Limited
1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist. Bharuch, Gujarat (India)
OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6704 del 4.6.1986

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100 –250-500 kg 1-2,5-5-10-25
PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il TIOLENE 80 WG è uno zolfo realizzato in granuli idrodispersibili caratterizzato da una pronta e facile dispersibilità in acqua durante la preparazione della poltiglia. La finezza ed uniformità di lavorazione fanno sì che quando questa formulazione viene irrorata sulla vegetazione, le particelle di zolfo si dispongono le une accanto alle altre con regolarità, a guisa di film, senza lasciare spazi scoperti sulla vegetazione.
Per le peculiari caratteristiche il TIOLENE 80 WG resiste bene al dilavamento ed ha, conseguentemente, un'ottima persistenza.
IL TIOLENE 80 WG è usato contro l'oidio o mal bianco delle colture agrarie affette da tale fitopatia.

EPOCHE DI IMPIEGO
Il TIOLENE 80 WG si impiega in trattamenti preventivi o alla prima comparsa della crittogama ripetendo i trattamenti ad intervalli variabili in funzione dell'andamento stagionale e della intensità degli attacchi.

COLTURE E DOSI DI IMPIEGO
VITE: 200-400 g/hl in situazioni a bassa pressione di oidio; 400-800 g/hl in situazioni ad alta pressione. A parità di pressione della malattia, scegliere le dosi maggiori nel caso si adottino intervalli di trattamento più lunghi.
POMACEE: 300-500 g/hl in pre-fioritura; 200-300 g/hl in trattamenti post-fioritura.
DRUPACEE: 200-400 g/hl in pre e post-fioritura; 400-600 g/hl nei trattamenti post-raccolta
AGRUMI: 200-400 g/hl intervenendo alla prima comparsa dei sintomi
OLIVO: 200-400 g/hl intervenendo alla prima comparsa dei sintomi
FRAGOLA: 250-500 g/hl intervenendo alla prima comparsa della malattia
NOCCIOLO: 300-500 g/hl intervenendo alla prima comparsa della malattia
ORTAGGI, PATATA: 200-500 g/hl effettuando le prime applicazioni non appena si manifestano i primi sintomi dell'infezione; le dosi più elevate dovranno essere impiegate nel periodo primaverile e nei momenti in cui gli attacchi del patogeno sono più virulenti
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: utilizzare 6-8 kg per ettaro di superficie effettuando il primo trattamento non appena appaiono i sintomi della malattia e ripetendo gli interventi ad intervalli di 15-20 giorni.
CEREALI: 6-8 kg per ettaro intervenendo quando l'oidio si manifesta sulle ultime foglie del culmo
GIRASOLE, SOIA, TABACCO : 4-6 kg/ha
VIVAI DI PIOPPO: 200-400 g/hl
COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI: da g 150 a g 400 per 100 litri di acqua

COMPATIBILITA'
Il TIOLENE 80 WG è incompatibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.), con olii minerali, con Captano, DDVP, Diclofluanide.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.
Può arrecare danno alle seguenti cultivar di MELO: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome beauty, Stayman red, Winesap, PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivieer de Serres, William, Decana del Comizio; VITE: Sangiovese; CUCURBITACEE: può essere fitotossico.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 5 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

TIOLENE 80 WG

Zolfo in microgranuli idrodispersibili ad azione fungicida. Sacchetti idrosolubili

IRRITANTE

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
ZOLFO puro g 80
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A.- Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE

SULPHUR MILLS LIMITED
1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist. Bharuch, Gujarat (India)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO

DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6704 del 4.6.1986
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1 (5 s. i. da 200 g; 4 s. i. da 250 g)
PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il TIOLENE 80 WG è uno zolfo realizzato in granuli idrodispersibili caratterizzato da una pronta e facile dispersibilità in acqua durante la preparazione della poltiglia. La finezza ed uniformità di lavorazione fanno sì che quando questa formulazione viene irrorata sulla vegetazione, le particelle di zolfo si dispongono le une accanto alle altre con regolarità, a guisa di film, senza lasciare spazi scoperti sulla vegetazione.
Per le peculiari caratteristiche il TIOLENE 80 WG resiste bene al dilavamento ed ha, conseguentemente, un'ottima persistenza.
IL TIOLENE 80 WG è usato contro l'oidio o mal bianco delle colture agrarie affette da tale fitopatia.

EPOCHE DI IMPIEGO

Il TIOLENE 80 WG si impiega in trattamenti preventivi o alla prima comparsa della crittogama ripetendo i trattamenti ad intervalli variabili in funzione dell'andamento stagionale e della intensità degli attacchi.

COLTURE E DOSI DI IMPIEGO

VITE: 200-400 g/hl in situazioni a bassa pressione di oidio; 400-800 g/hl in situazioni ad alta pressione. A parità di pressione della malattia, scegliere le dosi maggiori nel caso si adottino intervalli di trattamento più lunghi.
POMACEE: 300-500 g/hl in pre-fioritura; 200-300 g/hl in trattamenti post-fioritura.
DRUPACEE: 200-400 g/hl in pre e post-fioritura; 400-600 g/hl nei trattamenti post-raccolta
AGRUMI: 200-400 g/hl intervenendo alla prima comparsa dei sintomi
OLIVO: 200-400 g/hl intervenendo alla prima comparsa dei sintomi
FRAGOLA: 250-500 g/hl intervenendo alla prima comparsa della malattia
NOCCIOLO: 300-500 g/hl intervenendo alla prima comparsa della malattia
ORTAGGI, PATATA: 200-500 g/hl effettuando le prime applicazioni non appena si manifestano i primi sintomi dell'infezione; le dosi più elevate dovranno essere impiegate nel periodo primaverile e nei momenti in cui gli attacchi del patogeno sono più virulenti
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: utilizzare 6-8 kg per ettaro di superficie effettuando il primo trattamento non appena appaiono i sintomi della malattia e ripetendo gli interventi ad intervalli di 15-20 giorni.
CEREALI: 6-8 kg per ettaro intervenendo quando l'oidio si manifesta sulle ultime foglie del culmo
GIRASOLE, SOIA, TABACCO : 4-6 kg/ha
VIVAI DI PIOPPO: 200-400 g/hl
COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI: da g 150 a g 400 per 100 litri di acqua

COMPATIBILITA': il TIOLENE 80 WG è incompatibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.), con olii minerali, con Captano, DDVP, Diclofluanide.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.
Può arrecare danno alle seguenti cultivar di MELO: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome beauty, Stayman red, Winesap, PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contesssa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivieer de Serres, William, Decana del Comizio; VITE: Sangiovese; CUCURBITACEE: può essere fitotossico.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 5 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

30%

1 Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.

2 Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.

3 Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti).

4 Aggiungere la restante acqua nell'atomizzatore.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

TIOLENE 80 WG

Zolfo in microgranuli idrodispersibili
ad azione fungicida

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
ZOLFO puro g 80
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.- Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
Sulphur Mills Limited
1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist. Bharuch, Gujarat (India)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6704 del 4.6.1986

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA DA APPORRE SUL SACCHETTO IDROSOLUBILE

TIOLENE 80 WG

Zolfo in microgranuli idrodispersibili ad azione fungicida. Sacchetti idrosolubili

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
ZOLFO puro g 80
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.- Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
SULPHUR MILLS LIMITED
1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist. Bharuch, Gujarat (India)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6704 del 4.6.1986

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 200; 250.

PARTITA N.

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE
AVVERTENZA: LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

ETALENE 48,5 E.C.

Insetticida liquido emulsionabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
FENITROTION puro g. 48,5 (= 510,22 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
Contiene XILENE

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile
Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
Irritante per la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita'n. 6833 del 29/10/1986

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: l 1 - 5 - 10 – 20

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Consultare un Centro Antiveleni.**

MODALITA' DI IMPIEGO
L'ETALENE 48,5 EC e' un insetticida ad ampio spettro d'azione che agisce per contatto ed ingestione dotato di potere citotropico, penetrando nei tessuti vegetali. Viene altresi' impiegato per la disinfestazione di magazzini destinati alla conservazione dei prodotti agrari.

DOSI D'IMPIEGO
AGRUMI contro Afidi, Tignola, Mosca, Cocciniglie:150-200 ml/hl; **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO** contro Cleono, Altica, Afidi 200-250 ml/hl; **ALBICOCCO, CILIEGIO, PESCO, SUSINO** contro Mosca della frutta, Cidia, Mosca della ciliegia, Afidi, Cocciniglie 150/-200 ml/hl; **PIANTE ORNAMENTALI E FLOREALI** in pieno campo (Rosa, Garofano, Gerbera) contro Mosca, Tripidi, Tentredini, Bega, Cocciniglia 100 ml/hl; **OLIVO** contro Mosca, Tignola, Cocciniglia 150 ml/hl; **MELO, PERO** contro Afidi, Psilla, Antonomo, Tentredini, Cocciniglie, Carpocapsa 130-150 ml/hl; **VITE** contro Tignole, Cicaline 130-150 ml/hl; **NOCCIOLO, NOCE, CASTAGNO** contro Cocciniglie, Cimici, Anarsia, Tignola orientale, Balanino 150-180 ml/hl; **FRAGOLA** contro Afidi, Oziorrinchi 150 ml/hl; **ORTAGGI A RADICE E TUBERO, ORTAGGI A BULBO, ORTAGGI A FRUTTO , CAVOLI, ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE, LEGUMI FRESCHI, ORTAGGI A STELO** contro Afidi, Tripidi, Nottue fogliari, Pieridi, Altiche, Tentredine, Depressaria, 120-160 ml/hl; PATATA contro Afidi e Tignola 120-160 ml/hl; **CEREALI** contro Afidi e Zabro gobbo 1,5 l/ha; **ERBA MEDICA** contro Afidi, Apion, Fitonomo 1,2 l/ha; **TABACCO** contro Afidi, Tripidi 1,2-1,5 l/ha; **PIOPPO** contro Afide lanigero: 200 ml/hl; **PIANTE FORESTALI E VIVAI** contro Afidi, Cocciniglie, Cicaline, Tingide, Galerucella 150-180 ml/hl.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non e' miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione altamente alcalina es.Polisolfuri, Poltiglia bordolese.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

TEPETA COMBI

Anticrittogamico a base di Folpet e Rame solfato neutralizzato con idrossido di calcio

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
FOLPET puro g 30
RAME METALLO g 13.75
sotto forma di solfato neutralizzato con idrossido di calcio
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione.
Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti
Rischio di gravi lesioni oculari.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A.-U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6834 del 29/10/1986

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 5

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOLPET - RAME SOLFATO le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FOLPET - Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica.
RAME SOLFATO - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
Il TEPETA COMBI è un antiperonosporico cupro-organico che trova particolare applicazione in viticoltura.
DOSI DI IMPIEGO
VITE : contro Peronospora e Botritis: trattamenti in pre-fioritura g. 250 per 100 litri di acqua; trattamenti in post fioritura g. 300 per 100 litri di acqua.

COMPATIBILITA'
Il TEPETA COMBI è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra, fatta eccezione per quelli a base di olii minerali, polisolfuri e Tepp.
AVVERTENZA:in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non si deve trattare durante le fioritura

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci. Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e polisolfuri.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni.
Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

FLURAME

Anticrittogamico a base di solfato tribasico di rame
Sospensione concentrata

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
RAME METALLO g 15,2 (=193,04 g/l)
(sotto forma di solfato tribasico)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

DISTRIBUITO DA
CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
Via Antonio Silvani, 113 - ROMA

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A.- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6873 del 11/11/1986

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 1-5-10-20-25
PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa. se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica..
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO

Il FLURAME è una formulazione in pasta fluida a base di Solfato di Rame. Una volta irrorato sulla vegetazione da proteggere, il Flurame essicca in meno di un'ora formando una sottile pellicola che costituisce uno strato protettivo contro le malattie fungine, resistendo al dilavamento. Il suo impiego viene raccomandato per interventi preventivi nella lotta contro tutte le crittogame sensibili ai sali di rame.

DOSI DI IMPIEGO (per 100 litri di acqua)

ORTAGGI, FRAGOLA, POMODORO contro Ticchiolatura, Peronospora, Alternaria, Septoria, Ruggine e Antracnosi 500 ml/hl.
FRUTTIFERI : POMACEE contro Cancri e Disseccamenti rameali 600-700 ml/hl intervenendo al 30% ed al 70% della caduta delle foglie; contro Batteriosi e Ticchiolatura 500-600 ml/hl allo stadio di gemma ingrossata .DRUPACEE contro Cancro batterico 700 ml/hl alla caduta delle foglie; contro Fusicocco e Corineo 800-900 ml/hl durante il riposo vegetativo.
OLIVO: contro Rogna e Tubercolosi 500-600 ml/hl durante il riposo vegetativo; contro Occhio di pavone 500-600 ml/hl in pre-fioritura e a frutto ingrossato.
VITE: contro Peronospora 400-600 ml/hl
AGRUMI: contro Mal secco, Antracnosi e Fumaggine 500-600 ml/hl
ACTINIDIA: contro Batteriosi 600-700 ml/hl alla caduta delle foglie
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cercospora 5-6 l/ha
TABACCO: contro Peronospora e Batteriosi 500 ml/hl
PATATA . contro Peronospora Alternaria e Batteriosi 500 ml/hl
FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI contro Ruggini, Ticchiolatura e Peronospora 300-400 ml/hl
LOTTA CONTRO ALGHE E MOLLUSCHI DELLE RISAIE 6-7 l/ha alla prima comparsa delle alghe.

COMPATIBILITA'

E' miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo quali Abbondanza Belford, Black stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, e di pero quali Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott.Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard, cuprosensibili, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 3 giorni per Fragola, Ortaggi, Patata, 20 giorni per le altre colture

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

SEDIT F 43,5

Insetticida flowable a base di Carbaril

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
CARBARIL puro g 43.5 (= 478.5 g/l)
Esente da Beta Naftolo
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione. Possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A.-U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7043 del 16/4/1987

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,100 - 0,250 - 1 - 5 - 10 - 20

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Carbaril: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime.

Consultare un Centro Antiveleni

DOSI DI IMPIEGO

POMACEE (MELO, PERO) contro Verme, Capua, Cacoecia, Eulia .alla dose di 100-150 ml/hl.;
DRUPACEE (PESCO, SUSINO, ALBICOCCO, CILIEGIO) contro Anarsia, Tignola orientale, Recurvaria alla dose di 150-200 ml/hl;
FRUTTIFERI A GUSCIO (NOCCIOLO, NOCE, MANDORLO, CASTAGNO) contro Anarsia, Tignola orientale, Balanino, alla dose di 150-200 ml/hl;
PATATA: contro Cavolaia e Dorifora 125-200 ml/hl.,
VITE, AGRUMI: contro Tignola 100-150 ml/hl.;
OLIVO: contro Saissetia alla dose di 150-200 ml/hl, contro Tignola alla dose di 100-150 ml/hl;
FRAGOLA contro Antonomo della fragola, Nottue, Rinchite, Oziorrinchi alla dose di 150-200 ml/hl.
ACTINIDIA contro larve di lepidotteri alla dose di 150-200 ml/hl.
ORTAGGI A RADICE E TUBERO, ORTAGGI A BULBO, ORTAGGI A FRUTTO, CAVOLI, ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE, LEGUMI FRESCHI, ORTAGGI A STELO: contro Dorifora, Nottua mediterranea, Nottue del cavolo, Cidia del pisello, Piralide del mais, Nottue fogliari, Pieridi, Tignola delle crucifere, Tignola del porro, Altiche, Casside, Tentredine, Depressaria alla dose di 200-250 ml/hl.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro Altica, Casside, Cleono, Lisso, Nottue fogliari alla dose di 1,5 l/ha.
CEREALI: contro Nottue defogliatrici, Piralide, Sesamia, Zabro gobbo alla dose di 1,5-2 l/ha
SOIA, GIRASOLE, COTONE contro Lepidotteri defogliatori alla dose di 1,2-1,5 l/ha
FORAGGERE: contro Lepidotteri defogliatori, Apion, Fitonomo, Crisomelidi alla dose di 1,2 l/ha
TABACCO: contro Nottue fogliari, Altica, Tipule alla dose di 1,2 l/ha
VIVAI, FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI contro larve defogliatrici, Tortricidi del garofano, Tortrice del pino, Galerucella dell'olmo alla dose di 200-250 ml/hl
PIOPPO: contro Crisomela del pioppo, Sigaraio del pioppo, larve defogliatrici alla dose di 250 mll/hl
TAPPETI ERBOSI DI CAMPI DA GOLF E SPORTIVI: contro Nottue, Tignole, Sputacchina alla dose di 1,5 l/ha

COMPATIBILITA'

Il SEDIT F 43,5 non è miscibile con i prodotti alcalini in genere (Poltiglia bordolese, polisolfiti).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

E' nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame: Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
ATTENZIONE: il prodotto tal quale contiene sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 7 giorni
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Per gli impieghi su tappeti erbosi di campi da golf e sportivi obbligo di segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.

Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

SEDIT F 43,5

Insetticida flowable a base di Carbaril

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
CARBARIL puro g 43.5 (= 478.5 g/l)
Esente da Beta Naftolo
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Possibilità di effetti cancerogeni Prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A.-U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7043 del 16/4/1987

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CUPRENOX 30

Ossicloruro di rame al 30% di rame
Fungicida in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
RAME METALLO (sotto forma di ossicloruro) g. 30
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale 15
24061 Albano S.Alessandro (BG)

DISTRIBUITO DA:
GUABER S.R.L. - Via Gobetti, 4
40050 Funo (BO)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA
Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7196 del 3/7/1987

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100 - 250 - 500 - kg 1 - 5 - 10 – 20

PARTITA N.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni
MODALITA' DI IMPIEGO
Il CUPRENOX 30 è un fungicida impiegato nella lotta contro tutte le Crittogame sensibili ai comuni sali di rame.
Le applicazioni sono preventive e vanno effettuate in concomitanza alle condizioni di umidità e temperatura favorevoli all'insorgere delle malattie.
DOSI DI IMPIEGO
VITE: 400-500 g/hl contro peronospora
POMACEE:(melo, pero, cotogno): contro ticchiolatura, cancri rameali 400 g/hl per trattamenti primaverili;- 600 g/hl per trattamenti ad ingrossamento gemme; 1000-1500 g/hl per trattamenti invernali
DRUPACEE (pesco, susino, albicocco, ciliegio): contro bolla, corineo, cancro dei rametti 850-1500 g/hl in trattamenti autunno-invernali, contro batteriosi 400-500 g/hl a caduta foglie (2 interventi)
OLIVO: 500-600 g/hl contro occhio di pavone, lebbra, fumaggine
AGRUMI: 500-600 g/hl contro mal secco e allupatura
ACTINIDIA: 600-800 g/hl contro batteriosi a caduta foglie
FRUTTIFERI A GUSCIO (noce, nocciolo, mandorlo, castagno): 500-700 g/hl contro citospora, batteriosi, maculatura fogliare, cancri rameali in trattamenti autunno-invernali
FRAGOLA: 300-400 g/hl contro vaiolatura
ORTAGGI A TUBERO E RADICE, ORTAGGI A BULBO, ORTAGGI A FOGLIA, ASPARAGO, CARDO, SEDANO, FINOCCHIO, CARCIOFO, PORRO, FAGIOLO, PISELLO, CAVOLI, SOLANACEE, CUCURBITACEE :400-500 g/hl contro peronospora, alternaria, septoria, antracnosi, cladosporiosi, cercospora, ruggini
PATATA: 400-500 g/hl contro peronospora, alternaria, septoria, cladosporiosi
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: 4-5 kg/ha contro cercospora
TABACCO: 300-400 g/hl contro peronospora
OLEAGINOSE : 300-400 g/hl contro septoria, peronospora, batteriosi
CEREALI: 300-400 g/hl contro ruggini e septoria
RISO: 4-5 kg/ha contro le alghe da risaia
FLOREALI E ORNAMENTALI: 300-400 g/hl contro ruggini, peronospora, ticchiolatura, septoria
CONCIA ANTICARIE DELLE SEMENTI DI CEREALI (esclusi mais, sorgo e riso) 300 g/q.le di seme
AVVERTENZA: I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi
COMPATIBILITA'
Il CUPRENOX 30 è miscibile con i comuni prodotti fitosanitari a reazione neutra.
AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA': Non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco, susino e varietà di melo Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgendufft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, e di pero Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott.Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard, cuprosensibili, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
RISCHI DI NOCIVITA' : il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CUPRENOX 30

Ossicloruro di rame al 30% di rame
Fungicida in polvere bagnabile, in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
RAME METALLO (sotto forma di ossicloruro) g. 30
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale 15
24061 Albano S.Alessandro (BG)

DISTRIBUITO DA:
GUABER S.R.L. - Via Gobetti, 4 - 40050 Funo (BO)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7196 del 3/7/1987

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1 (n. 10 x g 100; n. 4 x g 250; n. 2 x g 500)

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

MODALITA' DI IMPIEGO
Il CUPRENOX 30 è un fungicida impiegato nella lotta contro tutte le Crittogame sensibili ai comuni sali di rame.
Le applicazioni sono preventive e vanno effettuate in concomitanza alle condizioni di umidità e temperatura favorevoli all'insorgere delle malattie.

DOSI DI IMPIEGO
VITE: 400-500 g/hl contro peronospora
POMACEE:(melo, pero, cotogno): contro ticchiolatura, cancri rameali 400 g/hl per trattamenti primaverili;- 600 g/hl per trattamenti ad ingrossamento gemme; 1000-1500 g/hl per trattamenti invernali
DRUPACEE (pesco, susino, albicocco, ciliegio): contro bolla, corineo, cancro dei rametti 850-1500 g/hl in trattamenti autunno-invernali, contro batteriosi 400-500 g/hl a caduta foglie (2 interventi)
OLIVO: 500-600 g/hl contro occhio di pavone, lebbra, fumaggine
AGRUMI: 500-600 g/hl contro mal secco e allupatura
ACTINIDIA: 600-800 g/hl contro batteriosi a caduta foglie
FRUTTIFERI A GUSCIO (noce, nocciolo, mandorlo, castagno): 500-700 g/hl contro citospora, batteriosi, maculatura fogliare, cancri rameali in trattamenti autunno-invernali
FRAGOLA: 300-400 g/hl contro vaiolature
ORTAGGI A TUBERO E RADICE, ORTAGGI A BULBO, ORTAGGI A FOGLIA, ASPARAGO, CARDO, SEDANO, FINOCCHIO, CARCIOFO, PORRO, FAGIOLO, PISELLO, CAVOLI, SOLANACEE, CUCURBITACEE :400-500 g/hl contro peronospora, alternaria, septoria, antracnosi, cladosporiosi, cercospora, ruggini
PATATA: 400-500 g/hl contro peronospora, alternaria, septoria, cladosporiosi
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: 4-5 kg/ha contro cercospora
TABACCO: 300-400 g/hl contro peronospora
OLEAGINOSE : 300-400 g/hl contro septoria, peronospora, batteriosi
CEREALI: 300-400 g/hl contro ruggini e septoria
RISO: 4-5 kg/ha contro le alghe da risaia
FLOREALI E ORNAMENTALI: 300-400 g/hl contro ruggini, peronospora, ticchiolatura, septoria
CONCIA ANTICARIE DELLE SEMENTI DI CEREALI (esclusi mais, sorgo e riso) 300 g/q.le di seme
AVVERTENZA: I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi

COMPATIBILITA'
Il CUPRENOX 30 è miscibile con i comuni prodotti fitosanitari a reazione neutra.
AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA': Non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco, susino e varietà di melo Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgendaft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, e di pero Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott.Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard, cuprosensibili, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
RISCHI DI NOCIVITA' : il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

30%
1 Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.
2 Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.
3 Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti).
4 Aggiungere la restante acqua nell'atomizzatore.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CUPRENOX 30

Ossicloruro di rame al 30% di rame
Fungicida in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
RAME METALLO (sotto forma di ossicloruro) g. 30
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale 15
24061 Albano S.Alessandro (BG)
DISTRIBUITO DA:
GUABER S.R.L. - Via Gobetti, 4
40050 Funo (BO)
OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA
Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7196 del 3/7/1987

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA DA APPORRE SUL SACCHETTO IDROSOLUBILE

CUPRENOX 30

Ossicloruro di rame al 30% di rame
Fungicida in polvere bagnabile, in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
RAME METALLO (sotto forma di ossicloruro) g. 30
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale 15
24061 Albano S.Alessandro (BG)
DISTRIBUITO DA:
GUABER S.R.L. - Via Gobetti, 4 - 40050 Funo (BO)
OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7196 del 3/7/1987

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100; 250; 500

PARTITA N.

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE
AVVERTENZA: LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

LINURON CHIMIBERG

Diserbante ureico a base di Linuron ad azione radicale e fogliare in sospensione acquosa

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
LINURON puro g. 36,10 (= 422,3 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione.
Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti.
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Può danneggiare i bambini non ancora nati.
Possibile rischio di ridotta fertilità.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti..
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7215 del 3/7/1987

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100 -250-500 - litri 1 – 5

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

LINURON: derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito o diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il LINURON CHIMIBERG è un diserbante selettivo specifico per la distruzione delle specie erbacee annuali di numerose colture. Esplica la propria azione per via radicale e fogliare e combatte Amarantus retroflexus (Amaranto), Capsella bursa pastoris (Borsa del pastore), Chenopodium spp. (Farinaccio), Digitaria sanguinalis (Sanguinella), Echinocloa crus-galli (Giavone), Euphorbia spp. (Euphorbia),Galinsoga parviflora (Galinsoga), Matricaria camomilla (Camomilla), Mercurialis annua (Mercurella), Plantago major (Piantaggine), Polygonum convolvolus (Falso convolvolo), Polygonum persicaria (Persicaria), Portulaca oleracea (Erba porcellana), Setaria spp.(Setaria), Sinapis arvensis (Senape), Solanum nigrum (Erba morella), Stellaria media (Centocchio), Veronica spp. (Veroniche). Alle normali dosi di impiego la persistenza nel terreno del LINURON CHIMIBERG non supera i 2-3 mesi per cui si ha una buona persistenza di azione senza pericolo alcuno di inconvenienti per le colture che seguono nella rotazione.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

MAIS: intervenire in pre-emergenza in miscela con altri principi attivi alla dose di 1 l/ha nei terreni di medio impasto e di 1,25 l/ha nei terreni torbosi e argillosi. **CAROTA**: intervenire in pre-emergenza impiegando 1-1,5 l/ha. **SEDANO**: intervenire dopo 8-10 giorni dal trapianto alla dose di 1,5 l/ha. **PATATA**: intervenire in pre-emergenza alla dose di 1,5-2,250 l/ha in terreni pesanti ed in associazione ad altri erbicidi. **CARCIOFO**: intervenire all'impianto o subito dopo nel caso di ovuli non pre-germinati; nel caso invece di ovuli pre-germinati o di carducci, eseguire il trattamento 30 giorni dopo l'impianto. Impiegare 1 l/ha di LINURON CHIMIBERG in un volume d'acqua che consenta di distribuire uniformemente il prodotto sulla superficie. Su coltura già in atto il trattamento deve essere eseguito prima della ripresa vegetativa impiegando 1-1,5 l/ha. **FINOCCHIO**: intervenire dopo la semina o il trapianto alla dose di 0,500-1,100 l/ha (alla 4° foglia vera della coltura)
SOJA :intervenire in pre-emergenza della coltura alla dose di 0,6-0,8 l/ha in terreni leggeri; 0,8-1.0 l/ha in terreni di medio impasto e 1.0-1,2 l/ha in terreni argillosi.
GIRASOLE: intervenire in pre-semina o in pre-emergenza alla dose di 1-1,4 l/ha in funzione del tipo di terreno.
FAGIOLO,FAGIOLINO: intervenire in pre-emergenza: a 0,8-1.0 l/ha nei terreni leggeri e a 1.0-1,2 l/ha in quelli di medio impasto.
ASPARAGO: prima della fuoriuscita dei turrioni a 1-2 l/ha
Impiegare 300-500 l/ha di acqua.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE, il prodotto tal quale contiene sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici
INTERVALLO che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 60 giorni.
AVVERTENZE: Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.

- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi.
- Non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco
- Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua
- Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore
- Il principio attivo non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanze organica inferiore all'1%.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

LINURON CHIMIBERG

Diserbante ureico a base di Linuron ad azione radicale e fogliare in sospensione acquosa

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
LINURON puro g. 36,10 (422,3 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione.
Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti.
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Può danneggiare i bambini non ancora nati.
Possibile rischio di ridotta fertilità.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti..
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7215 del 3/7/1987

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

TOTERBANE 50 F

Erbicida selettivo per vite, melo, pero, olivo , asparago, agrumi, erba medica, ribes, menta piperita, argini delle risaie, bulbose da fiore ed aree civili e industriali non destinate alle coltivazioni.
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DIURON puro g 50 (= 600 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione
Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A.-U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7271 del 26/11/1987

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 1 - 5 – 20

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. N.B. - Metemoglobinemia segnalata: se superiore al 30% blu di metilene, se inferiore vit.C ad alte dosi (3-4 g). Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE D'AZIONE
Il TOTERBANE 50 F agisce per assorbimento radicale: gli effetti pertanto possono essere anche lenti poichè si manifestano una volta che il prodotto e' stato portato, dalla pioggia o dall'acqua di irrigazione, nella zona ove i semi germinano o dove allignano le radici delle erbacce e quindi assorbito.
ERBE INFESTANTI SENSIBILI: Amarantus retroflexus (Amaramto comune), Digitaria sanguinalis (Sanguinella comune), Polygonum spp. (Poligoni), Lolium spp. (loicsso), Myosotis arvensis (Non ti scordar di me), Ranunculus spp. (Ranuncoli), Sonchus arvensis (Crespino comune); Anagallis arvensis (Centocchio dei campi), Anthemis spp., (Camomilla bastarda), Atriplex spp.(Atriplice), Chenopodium album (Farinello comune), Chrysanthemum segetum, (crisantemo dei campi), Echinochloa crus-galli (Giavone comune), Poa annua (Fienarola annua), Portulaca oleracea, (Porcellana), Setaria spp. (Panicastrella), Sinapis spp. (Senape selvatica), Stellaria media (Centocchio), Spergula arvensis (Renaiola comune), Capsella bursa pastoris (Borsa pastore), Cerastium spp. (Peverina), Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Solanum nigrum (Erba morella), Sorghum halepense (Sorghetta).

EPOCA DI IMPIEGO
Pre-emergenza delle infestanti o comunque nei primissimi stadi di sviluppo.

DOSI DI IMPIEGO
VITE: in impianti di almeno 3 anni a 2-5-l/ha.
MELO E PERO: su impianti di almeno 3 anni a 4-5- l/ha.
OLIVO: 3-5 l/ha a fine estate o in autunno, oppure 2,5 l/ha in autunno e 2,5 l/ha a fine inverno.
ASPARAGO: 1,5-2 l/ha prima della fuoriuscita dei turioni o a fine raccolta.
AGRUMI: con impianti di almeno 3 anni a 2-6 l/ha.
ERBA MEDICA: su medicai di almeno un anno a 2,5-3 l/ha prima della ripresa vegetativa: Non trattare su terreni sciolti.
RIBES: a 2 l/ha con impianti di almeno 1 anno.
MENTA PIPERITA: su impianti di almeno 1 anno trattare a 2.5-3,5 l/ha subito dopo l'ultima lavorazione e prima dell'emergenza della coltura.
ARGINI DI RISAIA: prima della nascita delle infestanti a 6-7 l/ha.
MARGINI STRADALI, AREE INDUSTRIALI, SEDI FERROVIARIE ED AREE CIVILI ED INDUSTRIALI NON DESTINATE ALLE COLTIVAZIONI: alla dose di 40-50 l/ha.
BULBOSE DA FIORE: eseguire il trattamento in pre-emergenza prima che i germogli spuntino dal terreno a 0,5-1,5 l/ha.

COMPATIBILITA'
E' miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra quali ad esempio il Glifosate, il Dicamba.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta
NOCIVITA': ATTENZIONE, il prodotto tal quale contiene sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 60 giorni
Attenzione! Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

CLORTOBAS

Diserbante selettivo dei cereali autunno-vernini in formulazione flowable

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Clortoluron puro g 50 (550 g/l)
Disperdenti, coadiuvanti q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7320 del 16.12.87

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 1-5

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
CLORTOBAS è un diserbante selettivo dei cereali autunno-vernini (frumento, orzo, avena) che è dotato di una buona azione sia contro graminacee, comprese le avene selvatiche, che contro le principali dicoltiledoni infestanti.
Si può impiegare sia in pre- che in post-emergenza della coltura. La forma "flowable" favorisce la dispersione nella soluzione. Graminacee controllate: avena selvatica, alopecuro, loglio, poa. Dicotiledoni controllate: capsella, camomilla, lamio, papavero, poligono, stellaria.
In trattamenti post-emergenza si può anche avere il controllo del rafano e del ranuncolo se colpiti nei primi stadi.

TRATTAMENTO PRE-EMERGENZA: trattare subito dopo la semina a 2,5-3 l/ha con almeno 500 litri di acqua senza interrare.
TRATTAMENTO POST-EMERGENZA : trattare tra le 4 foglie e l'accestimento a 1,5-2 l/ha con almeno doppia quantità di acqua. Le infestanti debbono essere nei primi stadi di sviluppo.

ATTENZIONE: sconsigliabile l'impiego ad alte temperature e su varietà di grano duro Kid, tenero Damar 4, Brasilia.

MISCIBILITA'
Si sconsiglia la miscela con altri prodotti fitosanitari.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

RISCHI DI NOCIVITA'
E' tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA : sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua- Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

TURFENE L

Diserbante selettivo per prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi,prati, pascoli, frumento, orzo, segale, avena. Liquido solubile

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

DICAMBA Sale Dimetilamminico puro	g 1,54	(=16,6 g/l)
MECOPROP Sale Potassico puro	g 20,14	(= 217,5 g/l)
Coformulanti	q.b. a g. 100	

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Irritante per la pelle.
Rischio di gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7368 del 8/1/1988

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,100 - 0,250 - 1 - 5 - 10 - 50

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
DICAMBA SALE DIMETILAMMINICO; MECOPROP le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: DICAMBA SALE DIMETILAMMINICO - Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. Terapia sintomatica

MECOPROP Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il TURFENE L è un erbicida selettivo studiato per la lotta contro le principali malerbe a foglia larga che infestano i tappeti erbosi di prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi, prati e pascoli di graminacee, nonchè colture cerealicole.
Il TURFENE L risulta efficace nei confronti di numerose infestanti dicotiledoni annuali e poliennali fra le quali si annoverano: amaranto (Amaranthus retroflexus), fiordaliso (Centaurea cyanus) anagallide (Anagallis arvensis) papavero (Papaver rhoeas) cerastio (Cerastium arvense), borsa pastore (Capsella bursa pastoris), farinello (Chenopodium album), ranuncolo dei campi (Ranunculus arvensis), centocchio (Stellaria media) trifoglio (Trifolium arvense), fumaria (Fumaria officinalis), stoppione (Cirsium arvense), vilucchio (Convolvolus arvensis), Plantago spp, Equisetum spp., Rumex spp.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

Il diserbo con il TURFENE L può essere eseguito in presenza di infestanti attive con temperature comprese tra 10 e 25°C. e a distanza di 5 ore da una pioggia.
La dose di impiego dovrà essere diluita in una quantità di acqua pari a 400-600 litri per ettaro, distribuendo il prodotto in modo uniforme sull'intera superficie trattata.. Si ricorda di procedere ad un accurato lavaggio delle attrezzature utilizzate dopo l'esecuzione del diserbo.
PRATI ORNAMENTALI, CAMPI DA GOLF, CAMPI SPORTIVI
- al 1° anno di impianto: 5-6 litri per ettaro di superficie su prato affrancato
- dopo il 2° anno : 5-8 litri per ettaro di superficie durante tutto il periodo primaverile-estivo, intervenendo qualche giorno dopo il taglio.
PRATI, PASCOLI: 7-8 litri per ettaro di superficie su infestanti poco sviluppate e qualche giorno dopo lo sfalcio.
FRUMENTO, ORZO, SEGALE, AVENA: 6-7 litri per ettaro di superficie da fine accestimento a levata

COMPATIBILITA'

Il TURFENE L è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra quali ad esempio Carbaryl, TMTD.
AVVERTENZA :in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per gli impieghi non indicati in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Prati, Pascoli, Cereali 20 Giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

TURFENE L

Diserbante selettivo per prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi,prati, pascoli, frumento, orzo, segale, avena.
Liquido solubile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

DICAMBA Sale Dimetilamminico puro	g 1,54	(=16,6 g/l)
MECOPROP Sale Potassico puro	g 20,14	(= 217,5 g/l)
Coformulanti	q.b. a g. 100	

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle.
Rischio di gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7368 del 8/1/1988

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

GEA-TER

Disinfestante granulare del terreno

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
DIAZINONE puro g 5
Coformulanti q.b. a g. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature.
Non disperdere nell'ambiente Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A.
Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7397 del 2/2/1988

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO : g 250-500- kg 1-5-10-25
PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita'). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO

Il GEA-TER è un disinfestante del terreno in formulazione granulare, ovvero granuli costituiti da un supporto inerte caricato da sostanza attiva, che nel suolo si libera esplicando l'effetto insetticida con pronta azione e successiva liberazione graduale del principio attivo.
I granuli del GEA-TER sono tali da consentire una facile distribuzione ed una regolare ripartizione nel terreno, posseggono buona scorrevolezza e non sono abrasivi.
I granuli del GEA-TER agiscono per contatto contro gli insetti terricoli che infestano le colture di PATATA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, CAROTA, MAIS, danneggiandole soprattutto nelle prime fasi di sviluppo, attaccando seme e plantule.
Il GEA-TER viene impiegato in

- trattamenti in pieno campo: alla dose di kg 40-80 per ettaro di coltura incorporandolo 1-2 giorni prima della semina tramite una leggera erpicatura. Si possono impiegare dosi inferiori a quella indicata in presenza di modeste infestazioni.
- trattamenti localizzati: alla dose di kg 10-12 per ettaro, effettuando la distribuzione o sulla linea di semina con il seme già ricoperto, incorporandolo leggermente nello strato superficiale, oppure distribuendolo a diretto contatto con il seme. Sulla barbabietola non impiegarlo localizzato ma per trattamenti a pieno campo in pre-semina.

COMPATIBILITA'

Non miscelare con altri prodotti fitosanitari

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario vista l'epoca di impiego

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

TIOLENE

Anticrittogamico per la lotta contro le malattie fungine sensibili allo zolfo

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
ZOLFO puro g 52 (= 717,6 g/l)
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.
Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7764 del 28.4.1989

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 1 – 5 – 20

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il TIOLENE è una sospensione concentrata a base di zolfo caratterizzato da una pronta e facile dispersibilità in acqua durante la preparazione della miscela. Durante la fase di lavorazione le particelle di zolfo vengono micronizzate finemente e uniformemente (2-3 micron), per cui quando questa formulazione viene irrorata sulla vegetazione, le particelle stesse si dispongono le une accanto alle altre con regolarità, a guisa di film, senza lasciare spazi scoperti sulla vegetazione. Per le peculiari caratteristiche il TIOLENE resiste bene al dilavamento ed ha una persistenza superiore agli usuali preparati a base di zolfo. Il TIOLENE è usato nei classici campi di impiego dello zolfo e precisamente: VITE contro l'oidio; MELO E PERO contro il Mal bianco. Peraltro il TIOLENE non imbratta la vegetazione, per cui se ne preconizza l'uso anche sulle colture floreali (ad esempio l'oidio della rosa) e non ustiona per cui può essere impiegato su colture ortive come zucchine, cetriolo, melone in serra.

EPOCHE E DOSI DI IMPIEGO
Il TIOLENE si impiega in trattamenti preventivi o alla prima comparsa delle crittogame ripetendo i trattamenti ad intervalli variabili in funzione dell'andamento stagionale e della intensità degli attacchi.
La dose di impiego è di ml 100-150 per 100 litri di acqua.

COMPATIBILITA'
Non è compatibile con prodotti fitosanitari alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.), con olii minerali, con Captano, DDVP, Diclofluanide.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.
Può arrecare danno alle seguenti cultivar di MELO: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome beauty, Stayman red, Winesap, PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contesssa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivieer de Serres,, William, Decana del Conizio; VITE : Sangiovese; CUCURBITACEE: può essere fitotossico.

Tempo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 5 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

FALTEX LIQUIDO

Fungicida in formulazione liquida autosospensibile a base di Folpet

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
FOLPET puro g 40.3 (= 499.72 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione.
Irritante per gli occhi
Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7906 del 7/4/1990

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 1 - 5 - 20

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
Il FALTEX LIQUIDO si usa alle dosi di ml. 200/250 per ettolitro di acqua contro la muffa grigia e la peronospora della vite.

COMPATIBILITA'
IL FALTEX LIQUIDO non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri ed olio bianco.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 10 giorni
Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

OPALENE

Insetticida agricolo per trattamenti su fruttiferi, agrumi e piante ornamentali in pieno campo

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Olio minerale puro g 80 (688 g/l)
(Insolfonabilità minimo 95%)
Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
Conservare la confezione ben chiusa
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.
Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. –U.P. SIFA
Caravaggio (BG)
IRCA SERVICE SPA
Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n . 7922 del 16.5.1990

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 1 - 20 - 50 – 200

PARTITA N.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
L'OPALENE è un olio minerale ad elevata raffinazione. La tecnica di preparazione di questo formulato fa dell'OPALENE un preparato per la lotta contro le cocciniglie senza tema di manifestazioni fitotossiche sulle piante utili.
Sugli agrumi può essere impiegato nei seguenti periodi:
- periodo invernale: dalla raccolta alla pre-fioritura
- periodo estivo: da giugno (quando il frutto raggiunge la grossezza di una noce) fino al periodo che precede l'invaiatura.
Sui fruttiferi (melo, pero; pesco, albicocco, susino, ciliegio; vite; olivo) e sulle piante ornamentali in pieno campo va impiegato preferibilmente a fine inverno (al rigonfiamento delle gemme) e nel periodo primaverile-estivo al primo apparire delle infestazioni.

EPOCA DELLE APPLICAZIONI
Trattamenti invernali e primaverili-estivi.

DOSI DI IMPIEGO (per 100 litri di acqua)
- Trattamenti a gemme chiuse o leggermente gonfie. litri 2 - 3
- Trattamenti al verde : litri 1 - 2
- Trattamenti come adesivo in unione ai comuni insetticidi . litri 0,300

COMPATIBILITA'
E' compatibile con i prodotti fitosanitari di uso comune ad eccezione di quelli contenenti calce, zolfo, dinocap, captano, mancozeb e derivati. Non usare i prodotti anzidetti 2-3 settimane prima o dopo il trattamento con OPALENE. Per lo zolfo è sufficiente un intervallo di 1-2 settimane.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua- Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

LO STOCCAGGIO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE DEL CONTENITORE DA LITRI 200 DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO IN ZONE DOTATE DI BACINO DI CONTENIMENTO DI ADEGUATO VOLUME ATTO A RACCOGLIERE EVENTUALI FUORIUSCITE ACCIDENTALI DEL PRODOTTO.

Per le taglie da litri 100 e 200: "Contenitore da restituire al produttore per i l riutilizzo"

IDROLENE

Fungicida organico polivalente
in formulazione sospensione concentrata

IRRITANTE

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
MANEB puro g. 37 (= 473,60 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
Contiene Glicol Etilenico

FRASI DI RISCHIO

Irritante per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A.
Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 8097 del 9/11/1992

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 1 - 5 - 20

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Terapia: sintomatica.; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Consultare un Centro Antiveleni

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco lontano da calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

MODALITA' DI IMPIEGO

L'IDROLENE è un fungicida organico ad ampio spettro in formulazione sospensione concentrata flowable).
Questa particolare caratteristica esalta le proprietà del principio attivo Maneb, consentendo una migliore uniformità del trattamento, una più rapida preparazione delle miscele, una economia di principio attivo per unita 'di superficie.
L'IDROLENE controlla efficacemente Peronospora, Antracnosi, Septoria, Ticchiolature, nonche la Marsonnina del pioppo.
Una volta irrorato sulla vegetazione l'IDROLENE si dispone a forma di film senza soluzione di continuita coprendo uniformemente la vegetazione. L'IDROLENE resiste al dilavamento.

DIVIETO DI IMPIEGO

- Divieto di impiego in serra
- Divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.

EPOCA E DOSI DI IMPIEGO

L'IDROLENE si impiega in forma preventiva o in concomitanza alle condizioni di umidità e temperatura favorevoli all'insorgere delle malattie.

- PERONOSPORA DEL TABACCO: ml 200/300 per hl
- PERONOSPORA,ALTERNARIA,SEPTORIA del POMODORO solo fino alla prima fioritura ml 250/300 per hl
- RUGGINE del GAROFANO ml 400/500 per hl
- MARSONNINA del PIOPPO ml 350/400 per hl
- TICCHIOLATURA del MELO e del PERO ml 350/400 per hl

COMPATIBILITA'

L'IDROLENE è compatibile con gli usuali principi attivi a reazione neutra.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Leggeri fenomeni di ingiallimento fogliare esclusivamente nei primi trattamenti in pre-fioritura su meli Imperatore.
Varieta' di pero sensibili al Maneb: Abate Fetel, Armella Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipione, Spadona d'estate,Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

INTERVALLO DI SICUREZZA :28 giorni
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

CIMOMANIL

Fungicida a base di Cimoxanil e Mancozeb in pasta fluida

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
MANCOZEB puro g 32,5 (= 400 g/l)
CIMOXANIL puro g 3,25 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie.
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A
Via Tonale, 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 8562 del 3.12.1994

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,100 - 0,200 - 0,500 - 1 - 5 - 10 – 20

PARTITA N.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidità e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: MANCOZEB 32,5%; CIMOXANIL 3,25% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
MANCOZEB-Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Terapia: sintomatica; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
CIMOXANIL: derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il CIMOMANIL è un prodotto costituito da due principi attivi che esplicano la propria azione sia preventivamente che in modo curativo, agendo per contatto e in modo endoterapico penetrando nei tessuti vegetali tramite azione citotropica translaminare. E' dotato di lunga persistenza.
Viene impiegato sulle seguenti colture:
VITE - POMODORO - TABACCO per combattere la Peronospora alla dose di ml 200-300 per 100 litri di acqua con tratta menti preventivi e con cadenza settimanale, tenendo presente che il Cimoxanil consente un arresto della Peronospora entro 2-3 giorni iniziali del periodo di incubazione. Su Pomodoro è impiegabile solo fino alla prima fioritura contro Antracnosi, Peronospora, Alternariosi, Septoriosi e Cladosporiosi.

DIVIETO DI IMPIEGO
Divieto di impiego in serra; divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

NOCIVO per api ed insetti utili.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 28 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CIMOMANIL

Fungicida a base di Cimoxanil e Mancozeb in pasta fluida

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
MANCOZEB puro g 32,5 (= 400 g/l)
CIMOXANIL puro g 3,25 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

Irritante per le vie respiratorie.
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 8562 del 3.12.1994

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

PIRIDANE 40,8 E.C.

Insetticida polivalente a base di Clorpirifos
Concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Clorpirifos puro g 40,8 (– 428,4 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
Contiene XILENE

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 8649 del 31.1.1995

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: l 1 - 5 - 10 - 20

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuronuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita'). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.Consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
MELO E PERO: contro ricamatrici, cocciniglie, psilla, carpocapsa: 80 ml/hl intervenendo alla prima comparsa delle larve.
AGRUMI: contro cocciniglie: (forme giovanili) 100 ml /hl.; contro aleurodidi (neanidi) usare 100-110 ml /h; contro formica argentina 200-220 ml/hl irrorando il terreno.
PESCO: contro cidia, anarsia, mosca della frutta 80-110 ml/hl
VITE: contro tignole 80-110 ml/hl
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro nottue, altica, atomaria 0,8 - 1 l/ha in 600 litri di acqua
TABACCO: contro nottue, litri 0,85 - 1 / ha
PIOPPO: contro punteruolo e saperda, 200-250 ml/hl.
MAIS: contro nottue, sesamia, , piralide e diabrotica del mais , 1/ 1,5 l/ha
SOIA : contro cimici e lepidotteri fogliari litri 1,2/ha; contro nottue litri 0,9-1,1/ha
GIRASOLE : contro nottue litri 0,8 - 1,1 / ha
PATATA: contro dorifora litri 1,2 - 1,6 / ha; contro nottue litri 0,8 - 1,1 /ha
POMODORO, PEPERONE , MELANZANA: contro dorifora, piralide, nottue litri 0,8 - 1,1 / ha
FAGIOLO, PISELLO : contro nottue fogliari. e piralide litri 0,8 - 1,1 l/ha
CAROTA: contro depressaria e nottue litri 0,8 - 1,1 /ha
CIPOLLA : contro tripide e tignola litri 0,8 - 1.1 /ha
ASPARAGO : copntro nottue litri 0,8 - 1,1 /ha
FLOREALI E ORNAMENTALI : contro aleurodidi, tripidi, tortricidi 100 ml / hl

COMPATIBILITA'
Il PIRIDANE 40,8 E.C. non e' compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina quali i polisolfuri di calcio e bario.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' nocivo per insetti utili,animali domestici e bestiame. E' altamente tossico per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Agrumi, Barbabietola da zucchero, Tabacco: 60 giorni; Pesco, Melo, Pero, Mais, Patata, Vite: 30 giorni, Melanzana, Fagiolo, Pisello, Asparago: 15 giorni; Carota, Cipolla, Pomodoro, Peperone: 21 giorni; Soia, Girasole: 120 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua –
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

PIRIDANE

Geodisinfestante granulare

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Clorpirifos puro g 7,5
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 8652 del 31/01/1995

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 250 - 500 kg 1 - 10 - 25

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita'). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il Piridane è un geodisinfestante granulare indicato per il controllo di diversi insetti terricoli quali: Elateridi, Nottue, Agrotidi, Maggiolino, Grillotalpa, Grillo nero, Tipule, Mosca del cavolo.
Il Piridane non trasmette cattivi odori ai vegetali trattati.
Per la notevole persistenza che lo caratterizza, il PIRIDANE è indicato per la disinfestazione di terreni destinati a colture di CAVOLO CAPPUCCIO, CAVOLO CINESE, PATATA, MAIS, TABACCO, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, SOIA, GIRASOLE, POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, FAGIOLO, PISELLO, CAROTA, CIPOLLA, ASPARAGO, COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI, AGRUMI, MELO, PERO, PESCO, VITE, PIOPPO.
Il Piridane può essere impiegato sia a pieno campo sia localizzato, ricorrendo in quest'ultimo caso ai microgranulatori.

DOSI DI IMPIEGO
kg 30-40 per ettaro quando il trattamento è effettuato a pieno campo.
kg 10-15 per ettaro se l'intervento è eseguito in modo localizzato
COMPATIBILITA': Il PIRIDANE va impiegato da solo
RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' nocivo per insetti utili, animali domestici e bestiame. E' altamente tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Agrumi, Barbabietola da zucchero, Tabacco, Patata - **60 giorni;** Pesco, Melo, Pero, Mais, Vite - **30 giorni;** Carota, Cipolla, Pomodoro, Peperone - **21 giorni;** Melanzana, Fagiolo, Pisello, Asparago - **15 giorni;** Soia, Girasole - **120 giorni.**

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

MEMILENE L

Insetticida polivalente in forma liquida

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
METOMIL puro g 19,6 (= 200 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene N-metil-2-pirrolidone

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente a personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3/8/1968 n. 1255.

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile.
Molto tossico per ingestione.
Irritante per gli occhi e la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A.
U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 8653 del 31.1.1995

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,5 – 1 – 2 – 3 - 5 - 10
PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni,ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il MEMILENE L è un insetticida che si presenta in forma liquida prontamente dispersibile in acqua.
Il MEMILENE L agisce per contatto ed ingestione su larve ed adulti di insetti che attaccano numerose colture agrarie quali lepidotteri, emitteri, omotteri, ditteri e coleotteri.
Per la limitata persistenza il MEMILENE L può essere impiegato sino a 10 giorni prima della raccolta (14 giorni su lattuga).

DOSI E CAMPI DI IMPIEGO
PESCO, SUSINO, ALBICOCCO, CILIEGIO, MANDORLO: contro Afidi, Anarsia, Tignola orientale 200 ml/hl; contro Cocciniglie 180-200 ml/hl.
MELO E PERO: contro Afide farinoso e verde; Litocollete, Cemiostoma, Carpocapsa e Ricamatrici 150-200 ml/hl
VITE DA VINO: contro Tignole 150-200 ml/hl;
VITE DA TAVOLA: contro Tignole 150-200 ml/hl non superando comunque i 2 litri per ettaro di superficie e per un numero massimo di 2 applicazioni.
AGRUMI: contro Cocciniglie, afidi 200 ml/hl
OLIVO: contro Cocciniglie e Tignola 200 ml/hl
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Altica e Cleono 150-180 ml/hl
TABACCO: contro Afidi, Tripidi, larve di Lepidotteri 150-180 ml/hl
COLTURE ORTICOLE (cavoli, escluso cavolfiore e cavolo cappuccio, lattuga, cucurbitacee, fagiolo, pisello, solanacee) contro Afidi, Cavolaia, larve di Nottuidi, Aleurodidi, 150-200 ml/hl
PIOPPO: contro larve defogliatrici, Saperda, Crisomela del pioppo, Cimicetta del pioppo 200 ml/hl;
COLTURE FLOREALI E ORNAMENTALI contro Afidi, Cocciniglie, Cicaline, Cecidomia, larve defogliatrici, Coleotteri defogliatori, Minatrice della gerbera, Tortrice del garofano, Tingidi 150-200 ml/hl

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
E' tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame

INTERVALLO DI SICUREZZA: 10 giorni; 14 giorni su lattuga; 30 giorni su vite da tavola
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

CARBOFURAN CHIMIBERG FURAMATE 4,75 G

Insetticida granulare per la disinfestazione del terreno

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Carbofuran puro	g 4.75
Coformulanti	q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO

Tossico per inalazione e ingestione

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

Non gettare i residui nelle fognature

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A - Via Tonale 15

ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE

CHEMIA S.P.A - S. AGOSTINO (FE)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA – Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 8724 del 27.02.1995

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO kg 5 – 7,5 - 10 – 12 - 15 – 20 - 25

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.

Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito,diarrea, bradicardia.

Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.

Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il CARBOFURAN CHIMIBERG FURAMATE 4,75 G è un insetticida del terreno con proprietà nematocide, particolarmente indicato per la lotta contro i parassiti terricoli della barbabietola da zucchero, aglio, cipolla, patata, mais (Elateridi, Larve di Agrotidi). Essendo dotato di azione sistemica il CARBOFURAN CHIMIBERG FURAMATE 4.75 G è efficace anche contro gli insetti che danneggiano le foglie della barbabietola da zucchero, quali Afidi, Altiche, Atomarie, Mosca. Il prodotto non trasmette alcun odore o sapore alle piante che crescono sul terreno trattato.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Trattamento localizzato: distribuire kg 10-12 di prodotto al momento della semina lungo le file mediante microgranulatore.

Trattamento in pieno campo: distribuire uniformemente in pre-semina kg 40-60 di prodotto mediante spandiconcime ed interrare successivamente.

COMPATIBILITA': Il prodotto può essere miscelato solo con concimi granulari.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è nocivo per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

AFIDANE 25

Aficida in polvere bagnabile

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Pirimicarb puro g 25

Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO

Tossico per ingestione

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande

Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego

Non gettare i residui nelle fognature

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.p.A.

Via Tonale, 15

24061 ALBANO S.ALESSANDRO BG

OFFICINE DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n 8806 del 6/3/1996

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg. 0,250 - 0,500 - 1

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime.

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

L'AFIDANE 25 è un aficida che agisce contro gli afidi verso i quali denota una notevole rapidità di azione.

La dose di impiego varia da 80 a 125 g/hl di acqua.

In particolare si consiglia l'impiego di AFIDANE 25 alla prima comparsa del parassita, ripetendo, eventualmente, in caso di reinfestazioni.

L'AFIDANE 25 ha un campo di impiego molto ampio e, precisamente, può essere impiegato su: AGRUMI, MELO, PERO, PESCO, CILIEGIO, SUSINO, ALBICOCCO, MANDORLO; VITE, in orticoltura su: LATTUGHE, INDIVIA, POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, COCOMERO, MELONE, ZUCCHINO, CETRIOLO, FAGIOLINO, FAGIOLO, PISELLO; CAVOLI, CARCIOFO, SEDANO, CAROTA, BIETOLA ROSSA, RAPA, CIPOLLA, PATATA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO; CEREALI (FRUMENTO, ORZO, MAIS); TABACCO; LINO E CANAPA, COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI in pieno campo, PIANTE FORESTALI.

COMPATIBILITA'

L'AFIDANE 25 è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra.,

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

E' tossico per gli insetti utili. E' nocivo per animali domestici, pesci e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA:14 giorni; 30 giorni per i cereali.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua- Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

AFIDANE 25

Aficida in polvere bagnabile
In sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Pirimicarb puro g 25
Coformulanti q.b. a g. 100

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Tossico per ingestione.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO BG
OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n 8806 del 6/3/1996

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg. 1 (10 x 100 g)

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime.

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

L'AFIDANE 25 è un aficida che agisce contro gli afidi verso i quali denota una notevole rapidità di azione.
La dose di impiego varia da 80 a 125 g/hl di acqua.
In particolare si consiglia l'impiego di AFIDANE 25 alla prima comparsa del parassita, ripetendo, eventualmente, in caso di reinfestazioni.
L'AFIDANE 25 ha un campo di impiego molto ampio e, precisamente, può essere impiegato su: AGRUMI, MELO, PERO, PESCO, CILIEGIO, SUSINO, ALBICOCCO, MANDORLO; VITE, in orticoltura su: LATTUGHE, INDIVIA, POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, COCOMERO, MELONE, ZUCCHINO, CETRIOLO, FAGIOLINO, FAGIOLO, PISELLO; CAVOLI, CARCIOFO, SEDANO, CAROTA, BIETOLA ROSSA, RAPA, CIPOLLA, PATATA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO; CEREALI (FRUMENTO, ORZO, MAIS); TABACCO; LINO E CANAPA, COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI in pieno campo, PIANTE FORESTALI.

COMPATIBILITA'

L'AFIDANE 25 è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra..
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

E' tossico per gli insetti utili. E' nocivo per animali domestici, pesci e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA:14 giorni; 30 giorni per i cereali.
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua- Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

30%

1 Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.

2 Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.

3 Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti).

4 Aggiungere la restante acqua nell'atomizzatore.

ETICHETTA DA APPORRE SUL SACCHETTO IDROSOLUBILE

AFIDANE 25

Aficida in polvere bagnabile
In sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Pirimicarb puro g 25
Coformulanti q.b. a g. 100

TOSSICO

FRASI DI RISCHIO
Tossico per ingestione.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO BG

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n 8806 del 6/3/1996

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100

PARTITA N.

Non toccare con mani o guanti bagnati
Da sciogliere in acqua senza rompere
Da non vendere ne' conservare fuori dalla confezione
Avvertenza: leggere l'etichetta riportata sulla confezione

DIFLUBENE 5

Insetticida per ingestione in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Diflubenzuron puro g 5
Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
Conservare la confezione ben chiusa
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.
Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO BG

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 8808 del 4/4/1996

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg. 0,250 - 0,500 – 1

PARTITA N.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni..

CARATTERISTICHE
Il DIFLUBENE 5 è un insetticida di nuova concezione. Risulta infatti efficace su insetti dannosi quali Microlepidotteri minatori e lepidotteri ricamatori, Psilla, Carpocapsa, Processionaria, Orgya, Limantrya, Psilla del pero, rispettando nel contempo gli insetti utili, gli animali domestici a sangue caldo ed i pesci. Risulta pertanto un prodotto valido per la lotta integrata nel rispetto delle esigenze ambientali.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
In linea generale il trattamento con DIFLUBENE 5 deve essere eseguito durante la ovodeposizione o quando le uova stanno per schiudere.
Le dosi di impiego sono di 250 g/hl su MELO, contro Microlepidotteri minatori, Lepidotteri ricamatori e Carpocapsa. di 150/200 g/hl su PERO contro Psilla e Carpocapsa; di 400 g/hl su COLTURE FORESTALI contro Processionaria, Limantrya.

COMPATIBILITA'
Il DIFLUBENE 5 è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra.. Sono esclusi i Polisolfuri e la Poltiglia bordolese.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 45 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua- Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

DIFLUBENE 5

Insetticida per ingestione. Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Diflubenzuron puro g 5
Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
Conservare la confezione ben chiusa
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.
Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO BG

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 8808 del 4/4/1996

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1 (5 x g 200)

PARTITA N.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni..

CARATTERISTICHE
Il DIFLUBENE 5 è un insetticida di nuova concezione. Risulta infatti efficace su insetti dannosi quali Microlepidotteri minatori e lepidotteri ricamatori, Psilla, Carpocapsa, Processionaria, Orgya, Limantrya, Psilla del pero, rispettando nel contempo gli insetti utili, gli animali domestici a sangue caldo ed i pesci. Risulta pertanto un prodotto valido per la lotta integrata nel rispetto delle esigenze ambientali.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
In linea generale il trattamento con DIFLUBENE 5 deve essere eseguito durante la ovodeposizione o quando le uova stanno per schiudere.
Le dosi di impiego sono di 250 g/hl su MELO, contro Microlepidotteri minatori, Lepidotteri ricamatori e Carpocapsa. di 150/200 g/hl su PERO contro Psilla e Carpocapsa; di 400 g/hl su COLTURE FORESTALI contro Processionaria, Limantrya.

COMPATIBILITA'
Il DIFLUBENE 5 è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra.. Sono esclusi i Polisolfuri e la Poltiglia bordolese.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 45 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua- Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

1. Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.
2. Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.
3. Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti).
4. Aggiungere la restante acqua nell'atomizzatore.

ETICHETTA DA APPORRE SUL SACCHETTO IDROSOLUBILE

DIFLUBENE 5

Insetticida per ingestione. Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Diflubenzuron puro g 5
Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO BG

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 8808 del 4/4/1996

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 200

PARTITA N.

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE
AVVERTENZA: LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

DATIMETHION 19

Insetticida fosforganico concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Metidathion puro g. 19 (– 190 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
Contiene XILENE

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui art. 25 del DPR 23 Aprile 2001, n.290.

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile.
Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.
Molto tossico per ingestione.
Irritante per gli occhi e la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9035 del 23.12.1996

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,250 - 0,500 - 1 - 5 - 10 - 20

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
Il DATIMETHION 19 è un insetticida fosforganico che agisce per contatto ed ingestione. E' pure in grado di penetrare nei tessuti della coltura trattata raggiungendo in tal modo diversi insetti difficilmente controllabili con altri insetticidi. E' dotato di lunga persistenza di azione ed è particolarmente idoneo nella lotta anticoccidica invernale.

DOSI D'IMPIEGO
OLIVO : contro tignole, cocciniglie, tripidi, alla dose di 300 ml/hl

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione altamente alcalina es. .Polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per gli insetti utili, animali domestici, pesci bestiame e altamente tossica per gli organismi acquatici.

INTERVALLO DI SICUREZZA: olivo, 100 giorni.
Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore.
Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi non meno di 20 giorni dal trattamento.
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Conservare il prodotto in luogo fresco.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

TIARIMOL

Fungicida antioidico ad azione preventiva e curativa in pasta fluida

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
FENARIMOL puro g 1.19 (= 15 g/l)
ZOLFO puro g 39,70 (= 500 g/l)
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
Possibile rischio per i bambini allattati al seno.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9132 del 14/2/1997

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100 - 250 - 500 litri 1 – 5 – 10 – 20

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
Il TIARIMOL si impiega in interventi preventivi ad intervalli di 7-12 giorni nei programmi di difesa contro oidio, ticchiolatura. In presenza di condizioni favorevoli all'insorgere della malattia adottare intervalli brevi; ai dosaggi più alti presenta attività curativa.

DOSI DI IMPIEGO
MELO, PERO: contro oidio e ticchiolatura alla dose di 200-250 ml/hl;
VITE: contro oidio alla dose di 80 ml/hl prima dell'allegagione; alla dose di 150-200 ml/hl in post allegagione;
FRAGOLA: contro oidio alla dose di 150-200 ml/hl sino alla prima fioritura;
CUCURBITACEE (Cocomero, Melone, Zucchino, Zucca, Cetriolo): contro mal bianco alla dose di 150-200 ml/hl;
POMODORO, PEPERONE: contro mal bianco alla dose di 150-200 ml/hl;
COLTURE FLOREALI: contro mal bianco alla dose di 150-200 ml/hl.

COMPATIBILITA'
Il TIARIMOL non è compatibile con formulati a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.), con olii minerali, con Captano, DDVP, Diclofluanide.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane da un precedente trattamento con olio minerale o con Captano.
Può arrecare danno, specie in presenza di elevate temperature, alle seguenti cultivar di MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome beauty, Stayman red, Winesap. PERE: Buona Luigia Davranches, Contesssa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivieer de Serres,, William, Decana del Conizio; VITE : Sangiovese; CUCURBITACEE: può essere fitotossico.

RISCHI DI NOCIVITA': E' nocivo per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA
21 giorni per Melo; 14 giorni per Pero, Vite; 7 giorni per Cucurbitacee, Pomodoro, Peperone.
Per la fragola trattamenti ammessi solo fino alla prima fioritura.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

TIARIMOL

Fungicida antioidico ad azione preventiva e curativa in pasta fluida

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
FENARIMOL puro g 1,19 (= 15 g/l)
ZOLFO puro g 39,70 (= 500 g/l)
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
Possibile rischio per i bambini allattati al seno.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9132 del 14/2/1997

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

PROMIX 26 F

Anticrittogamico ad azione preventiva e curativa in sospensione concentrata

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
PROCIMIDONE puro g 26 (= 281 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RICHIO

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A .- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9157 del 14.3.1997

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,100 - 0,250 - 0,500 - 1 – 5 – 10 -20

PARTITA N.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
CARATTERISTICHE
Il PROMIX 26 F è un fungicida dotato di azione preventiva e curativa, particolarmente efficace nella lotta contro le muffe grigie ed i marciumi delle piante causati da Botrytis, Sclerotinia, Monilia ed Alternaria. La formulazione flowable ne migliora gli aspetti applicativi, assicurando migliore uniformità di copertura e resistenza al dilavamento. Il PROMIX 26 F non influisce sulla fermentazione dei mosti e non conferisce sapori e odori sgradevoli alle colture trattate.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' DI IMPIEGO
VITE: 200-300 ml/hl contro muffa grigia (Botrytis cinerea), intervenendo nelle seguenti fasi fenologiche: a) fine fioritura; b) pre-chiusura del grappolo; c) invaiatura; d) 3-4- settimane prima della raccolta.
PESCO, SUSINO, ALBICOCCO: 300-400 ml/hl contro moniliosi dei fiori e dei rami (Monilia laxa) intervenendo dalla fase di pre-fioritura alla piena fioritura; contro la moniliosi dei frutti (Monilia fructigena) intervenendo da 5 a 3 settimane prima della raccolta alla dose di 200-300 ml/hl
MANDORLO: contro moniliosi (Monilia laxa e fructigena) intervenire alla dose di 300-400 ml/hl fino alla piena fioritura.
NOCCIOLO: contro moniliosi (Monilia laxa e fructigena) intervenire alla dose di 150-200 ml/hl in prossimità della fase di piena allegagione
FRAGOLA: 160-200 ml/hl contro Botrite (Botrytis cinerea): Effettuare tre trattamenti ai seguenti stadi vegetativi: a) apertura dei petali; b) durante la fioritura; c) a fine fioritura.
ACTINIDIA: contro muffa grigia (Botrytis cinerea) intervenendo alla dose di 300-400 ml/hl nelle seguenti fasi: piena fioritura, inizio allegagione, ingrossamento dei frutti, 2-3 settimane prima della raccolta; nei trattamenti di post-raccolta in magazzino intervenire con una soluzione allo 0,02% per immersione o a doccia.
PERO: contro moniliosi (Monilia laxa e fructigena) e contro maculatura bruna (Stemphylium versicarium) alla dose di 200-300 ml/hl con interventi ripetuti a partire dalla fase di fine fioritura.
POMODORO, MELANZANA, PEPERONE: 160-200 ml/hl contro alternaria (Alternaria alternata), muffa grigia (Botrytis cinerea), Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum) intervenendo ai seguenti stadi vegetativi: su Pomodoro effettuare interventi ripetuti ogni 2 settimane iniziando dalla fase di fioritura del 1° palco fiorale; su PEPERONE intervenire non più di una volta e su MELANZANA non più di 3 volte.
FAGIOLINO, CETRIOLO, AGLIO, CIPOLLA: 200-300 ml/hl contro Botrite, Sclerotinia, Alternaria e marciume bianco (Sclerotium cepivorum) intervenendo in funzione dello sviluppo della malattia fungina.
LATTUGA, INDIVIA, : 2-3 l/ha contro Sclerotinia e Botrite: Eseguire non più di 2 interventi dopo la crisi di trapianto.
COLZA, GIRASOLE: 2 l/ha contro Botrite e Sclerotinia. Intervenire prima della fioritura.
TABACCO: 2-3 l/ha contro Muffa grigia e Sclerotinia intervenendo in funzione dello sviluppo della malattia fungina.
COLTURE FLOREALI (ROSA in pieno campo, GERBERA, GERANIO, CRISANTEMO, GAROFANO, CICLAMINO) : 80-160 ml/hl contro Muffa grigia e Sclerotinia ripetendo gli interventi in funzione degli attacchi fungini. 6-8 ml/mq per interventi al terreno.
COMPATIBILITA'
Il PROMIX 26 F risulta compatibile con i più comuni fungicidi ed insetticidi in commercio. Occorre effettuare la miscelazione estemporaneamente prima dell'impiego, diluendo dapprima in poca acqua ed aggiungendo la rimanente quantità sino al volume desiderato.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Nei trattamenti a colture floricole ed orticole, specie se in serra, si consiglia di effettuare saggi preliminari.
INTERVALLO DI SICUREZZA
21 giorni VITE, SUSINO, GIRASOLE; **14 giorni** PESCO, ALBICOCCO, ACTINIDIA, PERO, FRAGOLA, POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, CETRIOLO, FAGIOLINO, LATTUGA, INDIVIA; **45 giorni** COLZA; **60 giorni. in post raccolta** ACTINIDIA.
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

PROMIX 26 F

Anticrittogamico ad azione preventiva e curativa in sospensione concentrata

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
PROCIMIDONE puro g 26 (= 281 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RICHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A .- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9157 del 14.3.1997

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ENOFOL 40

Fungicida organico per trattamenti in viticoltura in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
FOLPET puro g 40.5 (– 490 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione.
Irritante per gli occhi
Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9187 del 10.04.1997

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0.250 - 0,500 - 1 - 5 - 10 -20

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
L'ENOFOL 40 è un fungicida organico indicato per i trattamenti contro Peronospora e Muffa grigia (Botrytis cinerea) della vite con inizio da fine fioritura, particolarmente indicato per una azione di penetrazione all'interno del grappolo dove più difficile è la difesa dalle crittogame.

DOSI DI IMPIEGO
Su vite, contro Peronospora e Muffa grigia : ml 200-250 per ettolitro di acqua

COMPATIBILITA'
L'ENOFOL 40 non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e prodotti a base di zolfo.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA
L'intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta deve essere di 10 giorni sulle uve da tavola; sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

AVVERTENZA: non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Per lavorazioni agricole da effettuare entro 10 giorni, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

BUTILENE

Diserbante selettivo in formulazione flowable

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
TERBUTILAZINA pura g 37 (– 400 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9447 del 17.12.1997

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,100 - 0,250 - 0,500 - 1 - 5 - 10 - 20

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi , con la pelle e con gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il BUTILENE è un diserbante di pre-emergenza o post-emergenza precoce, assorbito quasi esclusivamente per via radicale e traslocato alle parti verdi attraverso il sistema linfatico, determinando fenomeni clorotici ed una successiva necrosi dei tessuti attraverso l'inibizione della fotosinesi clorofilliana. La sua applicazione assicura il controllo delle seguenti infestanti: Lolium spp. (Loglio), Amaranthus retroflexus (Amaranto), Atriplex spp. (Atriplice), Calepina corvini (Calepina), Chenopodium spp (Farinello), Datura stramonium (Stramonio), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Mercurialis annua (Mercorella comune) Polygonum lapathifolium (Poligono nodoso), Portulaca Oleracea (Erba porcellana), Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Rapistrum rugosum (Rapistro), Senecio vulgaris (Senecione), Sinapis spp. (Senape), Solanum nigrum (Erba morella), Sonchus spp (Crespino), Stellaria media (Centocchio comune), Veronica spp (Veronica), Setaria spp (Pabbio) Poa annua (Fienarola comune).

EPOCA E DOSI DI APPLICAZIONE
MAIS, SORGO:
? in pre-emergenza 1,5 – 2.5 l/ha come unico prodotto oppure in miscela ad altro erbicida;
? in post-emergenza precoce 1 – 1,5 l/ha;

COMPATIBILITA'
Il BUTILENE è miscibile con i comuni erbicidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZA
Attendere 12 mesi prima della semina della coltura successiva, preceduta da una lavorazione profonda.
Si consiglia l'impiego del prodotto su terreno umido, su infestanti non emerse od ai primi stadi di sviluppo.

ATTENZIONE! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

BUTILENE

Diserbante selettivo in formulazione flowable

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
TERBUTILAZINA pura g 37 (= 400 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9447 del 17.12.1997

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

IDROXANIL

Fungicida citotropico in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
RAME METALLO g 12,5 (= 150 g/l)
(sotto forma di Solfato tribasico)
CIMOXANIL puro g 2,08 (= 25 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A
Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9448 del 17.12.1997

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 50 - 100- 250 - 500 litri 1 - 5 - 10 – 20

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME METALLO e CIMOXANIL, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito, diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso, Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
IDROXANIL è un fungicida che agisce per contatto e per assorbimento citotropico. Si impiega in trattamenti preventivi al verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, cadenzando, in situazioni normali, gli interventi ogni 7-9 giorni; si consigliano trattamenti più ravvicinati in presenza di forte pressione della malattia. IDROXANIL presenta inoltre attività curativa ed eradicante entro tre giorni dalla avvenuta infezione peronosporica. E' efficace nella lotta a peronospora, alternaria, septoria e antracnosi.

DOSI DI IMPIEGO
VITE : contro peronospora alla dose di 400-450 ml/hl
POMODORO, PATATA, TABACCO, CARCIOFO: contro peronospora, alternaria, septoria, antracnosi alla dose di 450-500 ml/hl.
LATTUGA,SPINACIO: contro Peronospora della lattuga e dello spinacio alla dose di 450 ml/hl
MELONE, ZUCCHINO: contro Peronospora delle cucurbitacee alla dose di 450 ml/hl
PISELLO: contro Peronospora ed Antracnosi alla dose di 450 ml/hl
CIPOLLA, AGLIO, PORRO: contro Peronospora della cipolla, Peronospora del porro, Alternaria, alla dose di 450 ml/hl

COMPATIBILITA'
Non è compatibile con i formulati a reazione alcalina quali polisolfuri, poltiglia bordolese, calce.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non si deve trattare durante la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni; 21 giorni per Carciofo
AVVERTENZA: per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

IDROXANIL

Fungicida citotropico in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
RAME METALLO g 12,5 (= 150 g/l)
(sotto forma di Solfato tribasico)
CIMOXANIL puro g 2,08 (= 25 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9448 del 17.12.1997

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 50 - 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

RAMENOX P.B.

Poltiglia Bordolese essiccata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
RAME METALLO g 25
(sotto forma di Solfato di rame
neutralizzato con calce idrossido)
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione.
Rischio di gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non gettare i residui nelle fognature Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
MANICA S.P.A - ROVERETO (TN)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 9688 del 14.7.1998

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 5-10-20-50-100-250-500 kg. 1- 5 -10- 25

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
La diluizione della poltiglia in acqua è facile in tutte le circostanze. Basta versare la polvere nel totale quantitativo di acqua ed agitare. RAMENOX P.B. viene distribuito mediante irroratrice a volume normale impiegando 1000 litri di acqua per ettaro. In caso di impiego di irroratrici a basso volume le dosi prescritte andranno maggiorate in base alle caratteristiche delle macchine.

DOSI DI IMPIEGO
RAMENOX P.B. consiste in una preparazione industriale di Poltiglia Bordolese essiccata assolutamente neutra. Viene impiegato alle seguenti dosi in 100 litri di acqua:
VITE: contro Peronospora kg 0,7-1,2 (in trattamenti primaverili-estivi quando gli acini sono ben formati). - **MELO**: contro Marciume bruno o Muffa a circoli, Ticchiolatura: kg 1 (nella fase gemma rigonfia) - **PERO**: contro Ticchiolatura kg 1 (nella fase gemma rigonfia) - **PESCO**: contro Bolla e Corineo kg 3 (in trattamenti invernali sul secco) - **CILIEGIO**: contro Marciume bruno e muffa a circoli, Nebbia o seccume fogliare, Vaiolo o gommosi : kg 2 (nella fase gemma d'inverno) - **OLIVO**: contro Occhio di Pavone kg 1,5 - 2 (nella ripresa vegetativa e verso l'invaiatura) - **AGRUMI** . contro Gommosi o Marciume del colletto : kg 2-3 (da gennaio a fine maggio) e all'invaiatura (novembre-dicembre) con trattamenti al colletto, tronchi e grosse branche). - **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO**: contro Peronospora, Cercospora, Vaiolatura: kg 2 (nel periodo di pieno accrescimento e verso la raccolta) - **POMODORO**: contro Alternariosi, Peronospora kg 1,5 - 2 (all'accestimento ed alla fioritura); contro Mal del Piede, moria delle piantine: kg 0,5 (al trapianto) - **FRAGOLA**: contro vaiolatura rossa (vegetazione autunnale) : kg 1 - **FAGIOLO**: contro Antracnosi kg 1- **SEDANO, CAROTA, PREZZEMOLO**: contro Septoriosi kg 1 (in funzione del periodo di sviluppo delle malattie crittogamiche).

COMPATIBILITA'
RAMENOX P.B. e' compatibile con i più comuni fungicidi ed insetticidi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco e varietà di melo quali Abbondanza Belford - Black Stayman - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rome Beauty- Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman - Winesap - Black Davis- King Davis - Renetta del Canada - Rosa Mantovana, e di pero quali Abate Fetel - Buona Luigia d'Avranches - Butirra Clargeau - Passacrassana - R.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard, cuprosensibili; il prodotto puo' essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto e' tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA : 20 giorni
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

RAMENOX P.B.

Poltiglia Bordolese essiccata
In sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
RAME METALLO g 25
(sotto forma di Solfato di rame
neutralizzato con calce idrossido)
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non gettare i residui nelle fognature. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
MANICA S.P.A - ROVERETO (TN)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 9688 del 14.7.1998

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: confezione con sacchetto idrosolubile da g 10; 20; 50; 100
Confezione da g 100 (2 x 50 g); da g 250 (1 x 250 g); da g 500 (5 x 100 g); da kg 1 (1 x 1000 g)
PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso Febbre da malazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
La diluizione della poltiglia in acqua è facile in tutte le circostanze. Basta versare la polvere nel totale quantitativo di acqua ed agitare. RAMENOX P.B. viene distribuito mediante irroratrice a volume normale impiegando 1000 litri di acqua per ettaro. In caso di impiego di irroratrici a basso volume le dosi prescritte andranno maggiorate in base alle caratteristiche delle macchine.
DOSI DI IMPIEGO
RAMENOX P.B. consiste in una preparazione industriale di Poltiglia Bordolese essiccata assolutamente neutra. Viene impiegato alle seguenti dosi in 100 litri di acqua:
VITE: contro Peronospora kg 0,7-1,2 (in trattamenti primaverili-estivi quando gli acini sono ben formati). - **MELO**: contro Marciume bruno o Muffa a circoli, Ticchiolatura: kg 1 (nella fase gemma rigonfia) - **PERO**: contro Ticchiolatura kg 1 (nella fase gemma rigonfia) - **PESCO**: contro Bolla e Corineo kg 3 (in trattamenti invernali sul secco) - **CILIEGIO**: contro Marciume bruno e muffa a circoli, Nebbia o seccume fogliare, Vaiolo e gommosi : kg 2 (nella fase gemma d'inverno) - **OLIVO**: contro Occhio di Pavone kg 1,5 - 2 (nella ripresa vegetativa e verso l'invaiatura) - **AGRUMI** , contro Gommosi o Marciume del colletto : kg 2-3 (da gennaio a fine maggio) e all'invaiatura (novembre-dicembre) con trattamenti al colletto, tronchi e grosse branche). - **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO**: contro Peronospora, Cercospora, Vaiolatura: kg 2 (nel periodo di pieno accrescimento e verso la raccolta) - **POMODORO**: contro Alternariosi, Peronospora kg 1,5 - 2 (all'accestimento ed alla fioritura); contro Mal del Piede, moria delle piantine: kg 0,5 (al trapianto) - **FRAGOLA**: contro vaiolatura rossa (vegetazione autunnale) : kg 1 - **FAGIOLO**: contro Antracnosi kg 1- **SEDANO, CAROTA, PREZZEMOLO**: contro Septoriosi kg 1 (in funzione del periodo di sviluppo delle malattie crittogamiche).
COMPATIBILITA'
RAMENOX P.B. e' compatibile con i più comuni fungicidi ed insetticidi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco e varietà di melo quali Abbondanza Belford - Black Stayman - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rome Beauty- Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman - Winesap - Black Davis- King Davis - Renetta del Canada - Rosa Mantovana, e di pero quali Abate Fetel - Buona Luigia d'Avranches - Butirra Clargeau - Passacrassana - R.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard, cuprosensibili; il prodotto puo' essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA' : Il prodotto e' tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA : 20 giorni
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

30%
1 Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.
2 Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.
3 Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti).
4 Aggiungere la restante acqua nell'atomizzatore.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

RAMENOX P.B.

Poltiglia Bordolese essiccata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
RAME METALLO g 25
(sotto forma di Solfato di rame neutralizzato con calce idrossido)
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione.
Rischio di gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non gettare i residui nelle fognature. Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
MANICA S.P.A - ROVERETO (TN)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 9688 del 14.7.1998

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 5-10-20-50-100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA DA APPORRE SUL SACCHETTO IDROSOLUBILE

RAMENOX P.B.

Poltiglia Bordolese essiccata
In sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
RAME METALLO g 25
(sotto forma di Solfato di rame neutralizzato con calce idrossido)
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
MANICA S.P.A - ROVERETO (TN)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 9688 del 14.7.1998

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000.
PARTITA N.

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE
AVVERTENZA: LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

TALOBERG

Fungicida persistente in forma flowable

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Clorotalonil puro g. 40,8 (= 498 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Molto tossico per inalazione.
Irritante per le vie respiratorie.
Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti
Rischio di gravi lesioni oculari.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO ((BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9691 del 14.7.1998

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 250 - 500 - litri 1 - 5 - 10 - 20

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia. Terapia sintomatica.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

Il TALOBERG è un anticrittogamico a base di Clorotalonil preparato secondo le più recenti tecniche e norme in forma flowable. E' un fungicida ad ampio spettro di azione, molto persistente, ed ha la proprietà di resistere al dilavamento.
Le colture su cui è indicato l'impiego del TALOBERG sono riportate qui di seguito con le rispettive dosi:
POMODORO: contro Peronospora, Septoria, Cladosporiosi, Alternaria, Antracnosi, Muffa grigia alla dose di 1 2-3/ha (massimo 3 applicazioni all'anno in campo e 5 in serra)
COCOMERO, MELONE, CETRIOLO: contro Peronospora, Cancro gommoso, Cladosporiosi, Muffa grigia, Sclerotinia alla dose di 2-3 l/ha (massimo 3 applicazioni/anno);
FAGIOLO, FAGIOLINO, PISELLO: contro Peronospora, Antracnosi, Ruggine, Muffa grigia, Rizottoniosi, Sclerotinia alla dose di 2-3 l/ha; (massimo 2 applicazioni/anno in pieno campo);
SEDANO: contro Alternaria, Cercosporiosi, Septoria alla dose di 2-3 l/ha (massimo 3 applicazioni/anno);
CIPOLLA: contro Peronospora, Alternaria, Ruggine, Muffa grigia a 2-3 l/ha (max. 2 applicazioni/anno in pieno campo);
PATATA: contro Peronospora, Alternaria alla dose di 2-3 l/ha (max.2 applicazionii/anno);
MELO, PERO: contro Ticchiolatura, Septoria, Cancri rameali alla dose di 1,2 - 2 l/ha (max.4 applicazioni/anno, solo in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici);
PESCO,PRUGNO: contro Bolla, Corineo, Monilia, Ruggini, Cancri rameali a 1,6-2 l/ha (max.4 applicazioni/anno, solo in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici);
COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI: contro Peronospora, Muffa grigia, Ticchiolatura, Ruggini, Alternaria, Antracnosi alla dose di 250 ml/hl.

AVVERTENZE

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante;
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aperti, diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi;
- Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco;
- Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore;
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.
- Evitare l'accesso ai terreni prima che siano trascorse almeno 12 ore dall'applicazione in pieno campo e 24 ore dall'applicazione in serra.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Evitare di respirarne i vapori - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

COMPATIBILITA'

Il prodotto non e' compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina e gli olii minerali. Dopo un trattamento con olio il prodotto deve essere impiegato dopo almeno tre settimane
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può provocare rugginosità su cultivar di melo del gruppo Golden, Stark e Starking. Su colture floreali e ornamentali, stante l'elevato numero di varietà, si consigliano saggi preliminari.
INTERVALLO DI SICUREZZA:14 giorni; Pomacee e Drupacee 21 giorni, Prugno 35 giorni. Fagiolo e pisello fino alla fioritura. Fagiolino fino alla fioritura esclusa.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

DIACLOR L

Diserbante liquido ad azione totale per aree non coltivate

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Clorato di sodio puro g 40 (– 544 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Esplosivo in miscela con materie combustibili.
Nocivo per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Tenere lontano da sostanze combustibili. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMBURENTE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale 15
24061 Albano S.Alessandro (BG)
Distribuito da:
RECKITT & COLMAN ITALIA S.P.A.
Via Grosio, 108 - MILANO

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA-CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9699 del 28.7.1998

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100-200-250-500 litri 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100 –200

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: forte azione ossidante sui tessuti e distruzione dei globuli rossi. Emolisi e metaemoglobinemia in caso di esposizione prolungata. Nausea, vomito, coliche, cianosi, sintomi ematologici.
Terapia: diluire ed inattivare il veleno nello stomaco con soluzione Na.tiosolfato 1-2,5% in Na..bicarbonato 5%; gastrolusi od emesi seguita da somministrazione di carbone attivo e catarsi salina; endosscopia se sangue nel vomito
Se emolisi trasfusioni, rimuovere l'Hb libera con plasmaferesi; diuresi forzata se oliguria od anuria, emodialisi per rimuovere il tossico e vicariare la funzione renale insufficiente. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Erbicida ad assorbimento radicale. DIACLOR L è attivo contro tutti i generi di erbacce infestanti che crescono in zone non coltivate lungo le strade, le sedi ferroviarie e tranviarie, nei cortili, piazzali, campi sportivi, cimiteri, aree industriali e simili. Agisce rapidamente anche contro le radici più profonde per cui l'azione diserbante è totale e grazie alla sua soluzione addensata assicura una migliore permanenza in loco duratura nel tempo. Le piante irrorate avvizziscono e seccano in breve tempo. DIACLOR L è stabile e miscibile con acqua in tutti i rapporti.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Diluire al 10% in acqua (1 parte di DIACLOR L e 9 parti di acqua) e irrorare il terreno in ragione di 1/2 litro - 1 litro di questa soluzione per mq di superficie, a seconda che si tratti di vegetazioni esili con radici superficiali o di piante con radici più profonde (tipo gramigna). Far precedere l'irrorazione da un innaffiamento o irrorare dopo la pioggia per ottenere un miglior effetto penetrante.
La soluzione diluita di DIACLOR L si applica con un innaffiatoio o una pompa irroratrice bagnando oltre il terreno anche le erbacce.. Stagioni ottimali per il diserbo: primavera e autunno (sufficiente di norma un solo trattamento). In estate invece il trattamento va ripetuto dopo tre giorni in quanto l'apparato radicale è più profondo.
COMPATIBILITA'
Prodotto da usare sempre da solo
FITOTOSSICITA'
DIACLOR L va usato esclusivamente come diserbante in zone NON COLTIVATE e irrorato solo sulle piante da distruggere. Va evitato il contatto con colture di qualsiasi genere anche sotto forma di vapori portati dal vento
Attenzione! Da impiegare in assenza di colture agricole esclusivamente per gli scopi sopra indicati. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

Per le taglie da litri 100 e 200:
ATTENZIONE: confezione ad esclusivo uso industriale. Contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

DIACLOR L

Diserbante liquido ad azione totale per aree non coltivate

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Clorato di sodio puro g 40 (= 544 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Esplosivo in miscela con materie combustibili.
Nocivo per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Tenere lontano da sostanze combustibili. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMBURENTE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale 15
24061 Albano S.Alessandro (BG)
Distribuito da:
RECKITT & COLMAN ITALIA S.P.A.
Via Grosio, 108 - MILANO

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA-CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9699 del 28.7.1998

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100
PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

STRALE

Anticrittogamico organico per la difesa preventiva di colture orticole e floreali. Polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DICLORAN puro g 50
Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.
Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9807 del 2.11.1998

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g. 250-500 - kg 1-5-10- 20- 25

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
STRALE è un anticrittogamico indicato in prevalenza per la difesa dai marciumi, dovuti principalmente a Botrytis, Sclerotinia, Rhizoctonia, che colpiscono il colletto e l'apparato radicale delle seguenti colture:
ORTAGGI: Cavoli, Carciofo, Asparago, Carota contro Sclerotinia, Rhizoctonia; Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Zucchino, Melone, Cocomero, Zucca, Legumi, Ortaggi a foglia, Ortaggi a bulbo: contro Botrytis, Sclerotinia, Rhizoctonia.
FRAGOLA: contro Botrytis e Rhizoctonia.
PATATA E TABACCO: contro Rhizoctonia e Sclerotinia
COLTURE FLOREALI: Geranio, Ciclamino, Poinsettia, Bromeliacee, Anthurium, e tutte le altre specie contro Botrytis e Rhizoctonia.
STRALE si applica alle seguenti dosi, valide per trattamenti a volume normale:
- trattamenti al terreno: 150-250 g per 100 mq di superficie, da incorporare leggermente, sia in semenzai che in pieno campo;
- trattamenti su colture in atto: 150-200 g per 100 litri di acqua, in due-tre trattamenti, a seconda dell'andamento stagionale distanziati di 3-4 settimane, indirizzando il getto verso il colletto delle piante;
- concia bulbi: g 600 per ogni 100 kg di bulbi che devono essere leggermente inumiditi in precedenza.
- disinfezione terricciati : 600 g per ogni metro cubo di composto.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE
STRALE, nella dose necessaria, deve essere stemperato prima in poca acqua a parte e poi versato nel serbatoio dell'irroratore, aggiungendo acqua ed agitando.

COMPATIBILITA'
Miscibile con la maggior parte degli anticrittogamici in commercio e con tutti quelli di nostra produzione, ad eccezione di quelli contenenti calcio e comunque a reazione alcalina. E' sconsigliabile la miscela con prodotti in formulazione oleosa.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non deve essere impiegato su piantine troppo giovani, quando la temperatura è alta: è bene che abbiano almeno 4 foglie; le piantine inoltre devono aver superato la crisi dopo il trapianto (10-15 giorni dopo il trapianto). In caso di varietà poco diffuse o di recente acclimatazione si consiglia di effettuare preventivamente delle piccole prove.

RISCHI DI NOCIVITA'
E' nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA : 20 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

STRALE

Anticrittogamico organico per la difesa preventiva di colture orticole e floreali. Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DICLORAN puro g 50
Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9807 del 2.11.1998

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1 (10 s. i. da 100 g; 4 s. i. da 250 g)

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
STRALE è un anticrittogamico indicato in prevalenza per la difesa dai marciumi, dovuti principalmente a Botrytis, Sclerotinia, Rhizoctonia, che colpiscono il colletto e l'apparato radicale delle seguenti colture:
ORTAGGI: Cavoli, Carciofo, Asparago, Carota contro Sclerotinia, Rhizoctonia; Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Zucchino, Melone, Cocomero, Zucca, Legumi, Ortaggi a foglia, Ortaggi a bulbo: contro Botrytis, Sclerotinia, Rhizoctonia.
FRAGOLA: contro Botrytis e Rhizoctonia.
PATATA E TABACCO: contro Rhizoctonia e Sclerotinia
COLTURE FLOREALI: Geranio, Ciclamino, Poinsettia, Bromeliacee, Anthurium, e tutte le altre specie contro Botrytis e Rhizoctonia.
STRALE si applica alle seguenti dosi, valide per trattamenti a volume normale:
- trattamenti al terreno: 150-250 g per 100 mq di superficie, da incorporare leggermente, sia in semenzai che in pieno campo;
- trattamenti su colture in atto: 150-200 g per 100 litri di acqua, in due-tre trattamenti, a seconda dell'andamento stagionale distanziati di 3-4 settimane, indirizzando il getto verso il colletto delle piante;
- concia bulbi: g 600 per ogni 100 kg di bulbi che devono essere leggermente inumiditi in precedenza.
- disinfezione terricciati : 600 g per ogni metro cubo di composto.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE
STRALE, nella dose necessaria, deve essere stemperato prima in poca acqua a parte e poi versato nel serbatoio dell'irroratore, aggiungendo acqua ed agitando.

COMPATIBILITA'
Miscibile con la maggior parte degli anticrittogamici in commercio e con tutti quelli di nostra produzione, ad eccezione di quelli contenenti calcio e comunque a reazione alcalina. E' sconsigliabile la miscela con prodotti in formulazione oleosa.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non deve essere impiegato su piantine troppo giovani, quando la temperatura è alta: è bene che abbiano almeno 4 foglie; le piantine inoltre devono aver superato la crisi dopo il trapianto (10-15 giorni dopo il trapianto). In caso di varietà poco diffuse o di recente acclimatazione si consiglia di effettuare preventivamente delle piccole prove.

RISCHI DI NOCIVITA'
E' nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA : 20 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

30%
1 Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.
2 Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.
3 Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti).
4 Aggiungere la restante acqua nell'atomizzatore.

ETICHETTA DA APPORRE SUL SACCHETTO IDROSOLUBILE

STRALE

Anticrittogamico organico per la difesa preventiva di colture orticole e floreali. Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DICLORAN puro g 50
Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9807 del 2.11.1998

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100; 250

PARTITA N.

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE
AVVERTENZA: LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

OPTIMIST

Fungicida cuprorganico in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Clorotalonil puro g. 18,9 (=240 g/l)
Rame metallo g 10,24 (= 130 g/l)
(sotto forma di Solfato Basico)
Coformulanti q.b. a g. 100

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Molto tossico per inalazione.
Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti
Rischio di gravi lesioni oculari.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9814 del 18.11.1998

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 250 - 500 - litri 1 - 5 - 20

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi dell'associazione delle seguenti sostanze attive: CLOROTALONIL 18,9%, RAME 10,24%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: CLOROTALONIL- sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia. RAME : sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.Terapia sintomatica..Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
OPTIMIST è una miscela anticrittogamica caratterizzata da un ampio spettro di azione, impiegabile in trattamenti di tipo preventivo. Agisce per contatto fogliare e presenta elevata persistenza d'azione e resistenza al dilavamento. Ne viene consigliato l'utilizzo nella difesa delle più importanti crittogame delle colture orticole quali Alternaria, Septoria, Peronospora, Antracnosi, Ruggini, Sclerotinia, Botrite. Grazie alla presenza di Clorotalonil e Rame solfato basico, OPTIMIST esplica anche collaterale attività antibatterica ad azione acaro-frenante.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
POMODORO (in serra e in pieno campo): contro Peronospora, Septoria, Alternaria, Antracnosi, Batteriosi alla dose di 3,5-5 l/ha - **SEDANO** (in serra e in pieno campo) contro Alternaria, Cercosporiosi, Septoria, Rizottoniosi, Sclerotinia, Marciume nero del colletto, Batteriosi alla dose di 3,5 - 5 l/ha
COCOMERO, MELONE, CETRIOLO : (in serra e in pieno campo): contro Peronospora, Antracnosi, Cancro gommoso, Cladosporiosi, Muffa grigia, Sclerotinia, Batteriosi alla dose di 3,5 -5 l/ha
FAGIOLO, FAGIOLINO, PISELLO (in pieno campo): contro Peronospora, Antracnosi, Ruggine, Muffa grigia, Rizottoniosi, Batteriosi, alla dose di 3,5 - 4,2 l/ha;
CIPOLLA (in pieno campo): contro Peronospora, Alternaria, Ruggine, Botrite, Marciume bianco, Batteriosi alla dose di 3,5 - 5 l/ha
PATATA (in pieno campo) contro Peronospora, Alternaria, Rizottoniosi e Batteriosi alla dose di 3,5 - 5 l/ha
COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI (in serra ed in pieno campo): contro Peronospora, Alternaria, Cladosporiosi, Botrite e Batteriosi alla dose di 330-500 ml/hl.
AVVERTENZA: POMODORO IN SERRA: massimo 5 trattamenti all'anno; SEDANO, COCOMERO, MELONE, CETRIOLO, POMODORO IN PIENO CAMPO: massimo 3 trattamenti all'anno;
CIPOLLA, FAGIOLO, FAGIOLINO, PISELLO, PATATA : massimo 2 trattamenti all'anno.
AVVERTENZE: Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante - Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerati, diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi - Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco - Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore - Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua - Evitare l'accesso ai terreni prima che siano trascorse almeno 12 ore dall'applicazione in pieno campo e 24 ore dall'applicazione in serra.
COMPATIBILITA'
Il prodotto non e' compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina , gli olii minerali ed i fertilizzanti fogliari a base di boro. Dopo un trattamento con olio il prodotto deve essere impiegato dopo almeno tre settimane
Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle; non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento; non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci. Nocivo per gli animali domestici ed il bestiame
FITOTOSSICITA'
Sulle colture floreali più delicate, si consiglia di eseguire saggi preliminari, prima di procedere al trattamento sull'intera coltivazione.
INTERVALLO DI SICUREZZA:20 giorni. Fagiolo e pisello fino alla fioritura. Fagiolino fino alla fioritura esclusa.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso . Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.. Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

AGROTERB

Diserbante selettivo in formulazione flowable

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
TERBUTILAZINA pura g 37 (= 400 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A -
Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9872 del 07.01.1999

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,100 - 0,250 - 0,500 - 1 - 5 - 10 - 20

PARTITA N.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO
AGROTERB è un diserbante di pre-emergenza o post-emergenza precoce, assorbito quasi esclusivamente per via radicale e traslocato alle parti verdi attraverso il sistema linfatico, determinando fenomeni clorotici ed una successiva necrosi dei tessuti attraverso l'inibizione della fotosinesi clorofilliana. La sua applicazione assicura il controllo delle seguenti infestanti: Lolium spp. (Loglio), Amaranthus retroflexus (Amaranto), Atriplex spp. (Atriplice), Calepina corvini (Calepina), Chenopodium spp (Farinello), Datura stramonium (Stramonio), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Mercurialis annua (Mercorella comune) Polygonum lapathifolium (Poligono nodoso), Portulaca Oleracea (Erba porcellana), Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Rapistrum rugosum (Rapistro), Senecio vulgaris (Senecione), Sinapis spp. (Senape), Solanum nigrum (Erba morella), Sonchus spp (Crespino), Stellaria media (Centocchio comune), Veronica spp (Veronica), Setaria spp (Pabbio) Poa annua (Fienarola comune).

EPOCA E DOSI DI APPLICAZIONE

MAIS, SORGO: pre-emergenza 1,5 – 2,5 l/ha come unico prodotto oppure in miscela ad altro erbicida;
post-emergenza precoce 1 – 1,5 l/ha;

COMPATIBILITA'
AGROTERB è miscibile con i comuni erbicidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
AVVERTENZA
Attendere 12 mesi prima della semina della coltura successiva, preceduta da una lavorazione profonda.
Si consiglia l'impiego del prodotto su terreno umido, su infestanti non emerse od ai primi stadi di sviluppo.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

AGROTERB

Diserbante selettivo in formulazione flowable

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
TERBUTILAZINA pura g 37 (400 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9872 del 07.01.1999

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,100
PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

SULDAN EC

Insetticida selettivo concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
ENDOSULFAN puro g 32.9 (= 347.09 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
Contiene XILENE

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile.
Nocivo per inalazione.
Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.
Irritante per gli occhi e la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9873 del 07.01.1999

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,250 - 0,500 - 1 - 5 - 10

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni. Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni. Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
SULDAN EC è un liquido emulsionabile ad azione insetticida ed aficida che agisce per contatto ed ingestione contro numerosi insetti ad apparato boccale masticatore e perforante succhiatore.

CAMPI DI IMPIEGO
FRUTTICOLTURA: AGRUMI, MANDORLO, NOCCIOLO, POMACEE, PESCO, VITE contro afidi, anarsia, tignola orientale, orgia, minatori fogliari, eriofidi, tripidi, cicaline, oglocampa, recurvaria, iponomenta, lepidotteri defogliatori, tingidi, carpocapsa, antonomo, oziorrinco, tentredine, sigaraio della vite, tignola della vite, tignola dell'olivo, mosca dell'olivo, fleotribo, mosca della frutta, aleurodidi, nottue, cimici e balanino, alla dose di 100-200 ml/hl.
Su AGRUMI e VITE non superare comunque i 3 litri di SULDAN EC per ettaro di superficie ed effettuare massimo 2 applicazioni.
Su PESCO non superare comunque i 2 litri di SULDAN EC per ettaro di superficie ed effettuare massimo 3 applicazioni
ORTICOLTURA: POMODORO, CUCURBITACEE CON BUCCIA NON COMMESTIBILE (melone, zucca, cocomero) contro afidi, tripidi, aleurodidi, nottue fogliari, piralide, depressarie, altiche, tentredine, saperda, dorifora, alla dose di 150-200 ml/hl.
COLTURE FORESTALI contro larve defogliatrici, tortrice dei pini, coleotteri defogliatori, tingidi, cicaline, cinicette alla dose di 150-200 ml/hl.

COMPATIBILITA'
E' miscibile con i normali prodotti fitosanitari non alcalini, con gli integratori fogliari e con gli olii minerali.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 25 giorni; Vite: 28 giorni
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

JOKER

Diserbante selettivo di post-emergenza
(Liquido solubile)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DICAMBA puro g 21,2 (230 g/l)
(corrispondente a g 25,5 di sale dimetilamminico puro)
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A
Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9954 del 12.2.1999

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100 - 250 - 500 - litri 1 - 5 - 10 - 20

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
JOKER è un diserbante che agisce alterando il metabolismo enzimatico delle infestanti con cui viene a contatto. Esso viene assorbito per via fogliare e radicale e traslocato in tutta la pianta attraverso la circolazione linfatica.
Il prodotto, da applicare in post-emergenza delle malerbe, oltre a controllare dicotiledoni perenni quali vilucchio (Convolvulus arvensis) e Stoppione (Cirsium arvense), è efficace nei confronti di numerose specie di infestanti annuali quali Cencio molle (Abutilon theophrasti), Amaranto (Amaranthus retroflexus), Anagallide (Anagallis arvensis), Iva comune (Ajuga spp), Atriplice maggiore (Atriplex patula), Forbicina (Bidens spp), Borsa del pastore (Capsella bursa pastoris), Fiordaliso (Centaurea cyanus), Farinaccio (Chenopodium album), Stramonio (Datura stramonium), Convolvolo nero (Fallopia convolvolus), Fumaria (Fumaria officinalis) Canapaccia comune (Galeopsis tetrahit), Galinsoga comune (Galinsoga parviflora), Attaccamano (Galium aparine), Camomilla (Matricaria chamomilla), Papavero (Papaver rhoeas), Correggiola (Polygonum aviculare), Persicaria (Polygonum persicaria), Porcellana (Portulaca oleracea), Rapastrella (Raphanus raphanistrum), Sicio (Sycios angulatus), Senape (Sinapis arvensis), Erba calderina (Senecio vulgaris), Erba morella (Solanum nigrum), Arenaiola (Spergula arvensis), Stellaria (Stellaria media), Erba storna (Thlaspi arvense), Ortica minore (Utica urens), Veronica (Veronica spp), Veccia (Vicia spp), Nappola (Xanthium spp).

CAMPI DI IMPIEGO
JOKER è un erbicida selettivo per il controllo delle infestanti di Mais, Sorgo, Frumento, Orzo, Segale, Avena, Prati di graminacee (ornamentali, pascoli, campi sportivi e campi da golf), Asparago e Melo.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
MAIS: impiegare in post-emergenza con le infestanti ai primi stadi di sviluppo e con Mais a 3-4 foglie fino ad un massimo di 6-7 foglie (altezza 40 cm), alla dose di 0,8-1,2 l/ha. - SORGO : impiegare in post-emergenza della coltura allo stadio di 3-4 foglie alla dose di 0,8-1 l/ha - FRUMENTO-ORZO-SEGALE-AVENA: intervenire dallo stadio della coltura di 4 foglie fino ad inizio levata alla dose di 500 ml/ha. E' consigliabile, per ottenere migliori risultati, trattare quando le infestanti e la coltura siano in attiva crescita. PRATI DI GRAMINACEE (ornamentali, pascoli, campi sportivi, campi da golf): effettuare il trattamento quando le infestanti abbiano almeno 2 foglie sviluppate alla dose di 1 l/ha per applicazioni a pieno campo e con soluzione allo 0,2% per trattamenti localizzati. Si consiglia di non intervenire immediatamente dopo lo sfalcio.
ASPARAGO: il trattamento deve essere effettuato in primavera prima dell'emergenza dei turioni, preferibilmente su terreno sarchiato e leggermente umido, sia con trattamenti a pieno campo alla dose di 200-500 ml/ha, sia con trattamenti localizzati con soluzione allo 0,2%. Utilizzare per i trattamenti un volume d'acqua di 200-400 l/ha, fino a 500-600 l/ha. MELO: effettuare il trattamento alla dose di 1-1,5 l/ha con l'avvertenza di non colpire le parti verdi della coltura.
AVVERTENZE : non impiegare su colture di mais trapiantate su terreni sabbiosi o con basso contenuto di sostanza organica; evitare che la nube irrorante possa giungere a contatto con colture vicine.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

COMPATIBILITA'
JOKER e' compatibile con i principali erbicidi di post-emergenza presenti sul mercato quali MCPA, Mecoprop, Pendimetalin, 2,4D, Tribenuron metile, Triasulfuron qualora le condizioni di applicazione lo richiedano. In caso di miscele utilizzare JOKER a dosi dimezzate. AVVERTENZA :in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto puo' essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
INTERVALLO DI SICUREZZA - SORGO: 130 giorni, MELO: 30 giorni; ALTRE COLTURE:20 giorni
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

JOKER

Diserbante selettivo di post-emergenza
(Liquido solubile)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DICAMBA puro g 21,2 (230 g/l)
(corrispondente a g 25,5 di sale dimetilamminico puro)
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A
Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9954 del 12.2.1999

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

METIDANE 22

Insetticida. Concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Clorpirifos Metile puro g 22 (= 217.8 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Irritante per la pelle.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9963 del 23/02/1999

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 10-20-50-100-250-500 - litri 1 - 5

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita'). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE
METIDANE 22 è un insetticida fosforganico, agisce per contatto, ingestione ed in parte per azione di vapore. E' particolarmente indicato per combattere le larve di lepidotteri e le neanidi di cocciniglie. Esplica inoltre azione frenante dello sviluppo delle popolazioni di acari tetranichidi come Panonychus, Tetranychus, Eotetranychus.

DOSI DI IMPIEGO
MELO, PERO, PESCO: 200 ml/hl contro Lepidotteri, Tortricidi (Capua, Cacoecia, Pandemis, Eulia), tignola orientale (Cydia molesta), Anarsia (Anarsia); 200-250 ml/hl contro neanidi di Cocciniglie (Aspidiotus ed altre)
ARANCIO: 250 ml/hl contro neanidi di cocciniglie (Saissetia, Ceroplastes, Pseudococcus).
VITE: 100-150 ml/hl contro Tignole (Lobesia, Clysia). Il prodotto potrebbe risultare fitotossico per alcune varietà sensibili; si raccomandano pertanto saggi zonali e varietali.
FRAGOLA: 300-400 ml/hl contro Frankliniella o Nottue ed Afidi
ORTAGGI (**pomodoro, peperone, melanzana, pisello, ravanello, patata**): 1,5 -2 litri/ha contro Nottue (Agrotis, Mamestra ed altre), Macaone (Papilio), Dorifora (Leptinotarsa).
MAIS : 300 ml/hl contro Nottue (Agrotis), Piralide (Ostrinia) ed Elateridi.
PIOPPO: 400-500 ml/hl contro Saperda e Criptorrinco
ORNAMENTALI (**garofano, crisantemo, azalea, ciclamino**): 200 ml/hl contro Bega, Tortricidi, Cocciniglie, Oziorrinco

COMPATIBILITA'
METIDANE 22 non e' miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina .
ATTENZIONE: estremamente tossico per i pesci.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non impiegare il prodotto sulle varietà di melo Stayman Red, Stayman Winesap, Gloster, Gallia Beauty. In post-fioritura del melo non eseguire più di due trattamenti. Non effettuare trattamenti su arancio nei mesi compresi tra gennaio ed aprile.

INTERVALLO DI SICUREZZA : 15 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua- Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

METIDANE 22

Insetticida. Concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Clorpirifos Metile puro g 22 (= 217,8 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Irritante per la pelle.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9963 del 23/02/1999

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 10-20-50-100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CONTENDER

Fungicida sistemico. Polvere bagnabile

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
FOSETIL ALLUMINIO puro g 80
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9964 del 23.2.1999

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g- 100-250-500 - kg 1- 5-10- 25

PARTITA N.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
CARATTERISTICHE
CONTENDER è un fungicida sistemico la cui efficacia è garantita anche dalla sua grande mobilità nelle piante. Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui non presenta rischi collegati al dilavamento, e manifesta una sistemia ascendente e discendente che consente anche la protezione delle foglie formatesi dopo il dilavamento.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua, quindi portare a volume mescolando bene.
MODALITA' DI IMPIEGO
ORTICOLTURA
CARCIOFO: contro Bremia lactucae a 200-300 g/hl
LATTUGA: contro Bremia lactucae effettuare irrorazioni a 200-300 g/hl distribuendo almeno 3 kg/ha di prodotto. In presenza di forti sbalzi termici possono aversi problemi di fitotossicità. Per impiego su lattuga romana effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto.
CETRIOLO, SPINACIO, COCOMERO: contro Peronospora, effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl distribuendo almeno 3 kg/ha di prodotto.
MELONE: contro Pseudoperonospora cubensis effettuare irrorazioni fogliari a 200-300 g/hl distribuendo almeno 3 kg/ha di prodotto.
FRAGOLA: contro Peronospora (Phytophthora cactorum e fragariae). Per evitare il deperimento anche in terreni molto infettati, immergere le piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti e far seguire, alla medesima dose, 1 irrorazione in autunno e 2 in primavera oppure, sempre prima del trapianto, immergerle in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti e far seguire 1 annaffiatura al piede in autunno e 2 in primavera alla dose di g 0,5 di formulato per pianta.
FRUTTICOLTURA
ARANCIO, LIMONE, MANDARINO, POMPELMO: contro Phytophthora spp., effettuare irrorazioni fogliari a 200-300 g/hl utilizzando 10 litri di poltiglia per pianta. Quando le piante si presentano fortemente debilitate dalla malattia e gli apparati fogliari non sono più in grado di assorbire completamente il fungicida, i trattamenti alla vegetazione si potranno integrare con pennellature sulle parti infette del legno (tronco e branche).
MELO, PERO, PESCO, ACTINIDIA: contro Phytophthora cactorum. Effettuare un trattamento al mese dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta (per melo e actinidia) con 250 g/hl. Su piante già debilitate dalla malattia effettuare un'annaffiatura alla loro base (in modo da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, con litri 1-2 per pianta di una poltiglia costituita da kg 5 di prodotto per 100 litri di acqua.
VITE: contro Peronospora, a 250 g/hl di acqua. Si consiglia sempre l'associazione con formulati di copertura (rame escluso).
VIVAI DI FRUTTIFERI: effettuare , con cadenza mensile, irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl
VIVAI DI AGRUMI: impiegare ad una dose di 400 g/hl ogni 60 giorni.
COLTURE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO ED IN SERRA: contro Pytophthora spp. di Chamaecyparis e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee, Poinsettia, St. Paulia e Crisantemo, effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con 5-10 g di formulato per mq una volta al mese in primavera.

COMPATIBILITA'
CONTENDER non è compatibile con i prodotti a base di rame, di dicofol e con concimi fogliari contenenti azoto. Non effettuare miscele con formulati oleosi, nè irrorare il prodotto su colture che ne siano state precedentemente trattate, in quanto si ostacolerebbe la penetrazione del prodotto nella pianta.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
15 giorni Carciofo, cetriolo, cocomero, melone, lattuga, spinacio; **30 giorni** Fragola; **40 giorni** Melo, pero, pesco, actinidia, vite; **80 giorni** Arancio, limone, mandarino, pompelmo;
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali..

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

CONTENDER

Fungicida sistemico.
Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
FOSETIL ALLUMINIO puro g 80
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9964 del 23.2.1999

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1 (10 s.i. da 100 g; 4 s.i. da 250 g)
PARTITA N.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
CARATTERISTICHE
CONTENDER è un fungicida sistemico la cui efficacia è garantita anche dalla sua grande mobilità nelle piante. Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui non presenta rischi collegati al dilavamento, e manifesta una sistemia ascendente e discendente che consente anche la protezione delle foglie formatesi dopo il dilavamento.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua, quindi portare a volume mescolando bene.
MODALITA' DI IMPIEGO
ORTICOLTURA
CARCIOFO: contro Bremia lactucae a 200-300 g/hl
LATTUGA: contro Bremia lactucae effettuare irrorazioni a 200-300 g/hl distribuendo almeno 3 kg/ha di prodotto. In presenza di forti sbalzi termici possono aversi problemi di fitotossicità. Per impiego su lattuga romana effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto.
CETRIOLO, SPINACIO, COCOMERO: contro Peronospora, effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl distribuendo almeno 3 kg/ha di prodotto.
MELONE: contro Pseudoperonospora cubensis effettuare irrorazioni fogliari a 200-300 g/hl distribuendo almeno 3 kg/ha di prodotto.
FRAGOLA: contro Peronospora (Phytophthora cactorum e fragariae). Per evitare il deperimento anche in terreni molto infettati, immergere le piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti e far seguire, alla medesima dose, 1 irrorazione in autunno e 2 in primavera oppure, sempre prima del trapianto, immergerle in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti e far seguire 1 annaffiatura al piede in autunno e 2 in primavera alla dose di g 0,5 di formulato per pianta.
FRUTTICOLTURA
ARANCIO, LIMONE, MANDARINO, POMPELMO: contro Phytophthora spp., effettuare irrorazioni fogliari a 200-300 g/hl utilizzando 10 litri di poltiglia per pianta. Quando le piante si presentano fortemente debilitate dalla malattia e gli apparati fogliari non sono più in grado di assorbire completamente il fungicida, i trattamenti alla vegetazione si potranno integrare con pennellature sulle parti infette del legno (tronco e branche).
MELO, PERO, PESCO, ACTINIDIA: contro Phytophthora cactorum. Effettuare un trattamento al mese dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta (per melo e actinidia) con 250 g/hl. Su piante già debilitate dalla malattia effettuare un'annaffiatura alla loro base (in modo da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, con litri 1-2 per pianta di una poltiglia costituita da kg 5 di prodotto per 100 litri di acqua.
VITE: contro Peronospora, a 250 g/hl di acqua. Si consiglia sempre l'associazione con formulati di copertura (rame escluso).
VIVAI DI FRUTTIFERI: effettuare , con cadenza mensile, irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl
VIVAI DI AGRUMI: impiegare ad una dose di 400 g/hl ogni 60 giorni.
COLTURE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO ED IN SERRA: contro Pytophthora spp. di Chamaecyparis e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee, Poinsettia, St. Paulia e Crisantemo, effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con 5-10 g di formulato per mq una volta al mese in primavera.

COMPATIBILITA'
CONTENDER non è compatibile con i prodotti a base di rame, di dicofol e con concimi fogliari contenenti azoto. Non effettuare miscele con formulati oleosi, nè irrorare il prodotto su colture che ne siano state precedentemente trattate, in quanto si ostacolerebbe la penetrazione del prodotto nella pianta.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
15 giorni Carciofo, cetriolo, cocomero, melone, lattuga, spinacio; **30 giorni** Fragola; **40 giorni** Melo, pero, pesco, actinidia, vite; **80 giorni** Arancio, limone, mandarino, pompelmo;
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali..

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

1 Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.
2 Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.
3 Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti).
4 Aggiungere la restante acqua nell'atomizzatore.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CONTENDER

Fungicida sistemico. Polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
FOSETIL ALLUMINIO puro g 80
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9964 del 23.2.1999

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g- 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA DA APPORRE SUL SACCHETTO IDROSOLUBILE

CONTENDER

Fungicida sistemico.
Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
FOSETIL ALLUMINIO puro g 80
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9964 del 23.2.1999

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100 - 250

PARTITA N.

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE
AVVERTENZA: LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

SUGAR

Erbicida selettivo della barbabietola da zucchero
Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Metamitron puro g 70
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi e la pelle.
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.
In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
- SCHIRM AG – DIVISION SIDECO - Lubecca (Germania)
- A.D.I.C.A. S.R.L. – Nera Montoro (TR)
- SULPHUR MILLS LIMITED - 1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist. Bharuch, Gujarat, India

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A. – U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n 10.000 del 29.3.1999

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1- 5- 10- 20

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
SUGAR è un erbicida selettivo per la barbabietola da zucchero a semina primaverile. Agisce per assorbimento radicale ed anche per via fogliare.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
SUGAR è indicato contro le seguenti infestanti: Alopecurus myosuroides, Avena spp., Amaranthus spp., Amaranthus retroflexus, Anagallis spp., Stachys annua, Capsella bursa -pastoris, Chenopodium album, Echinochloa crus-galli, Fumaria officinalis, Galinsoga parviflora, Matricaria spp., Papaver rhoeas, Poa annua, Polygonum aviculare, Phalaris spp., Polygonum persicaria, Solanum nigrum, Stellaria media, Veronica spp., Polygonum convolvulus.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
- **Intervento di pre-semina anticipata** (da fine ottobre a metà gennaio): kg 4-5 per ettaro in 600 litri di acqua con terreno perfettamente preparato, esente da eventuali infestanti già presenti.
- **Pre-semina:** kg 3-5 per ettaro in 600 litri di acqua con interramento del prodotto
- **Post-emergenza**: kg 1-1,5 per ettaro miscelato con Fenmedifam (1-3 litri/ha di formulato al 16%) in 300 litri di acqua e trattando con piantine di bietole nello stadio delle 2-4 foglie vere.
Nei casi si debba intervenire in trattamenti più tardivi impiegare kg 2-3 per ettaro di prodotto in miscela con litri 2-3 di Fenmedifam (16%) con l'aggiunta di litri 0,5-1 di olio bianco. Effettuare il trattamento in assenza di vento e con terreno ben lavorato. Le dosi maggiori sono riferite per impieghi su terreni pesanti

COMPATIBILITA'
SUGAR si può impiegare in miscela con altri erbicidi utilizzabili per il diserbo della barbabietola da zucchero.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

SUGAR

Erbicida selettivo della barbabietola da zucchero
Granuli idrodispersibili – Sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Metamitron puro g 70
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi e la pelle.
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
- SCHIRM AG – DIVISION SIDECO - Lubecca (Germania)
- A.D.I.C.A. S.R.L. – Nera Montoro (TR)
- SULPHUR MILLS LIMITED - 1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist. Bharuch, Gujarat, India

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A. – U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n 10.000 del 29.3.1999

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1 (2 s.i. da 500 g; 1 s.i. da 1000 g)

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
SUGAR è un erbicida selettivo per la barbabietola da zucchero a semina primaverile. Agisce per assorbimento radicale ed anche per via fogliare.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
SUGAR è indicato contro le seguenti infestanti: Alopecurus myosuroides, Avena spp., Amaranthus spp., Amaranthus retroflexus, Anagallis spp., Stachys annua, Capsella bursa -pastoris, Chenopodium album, Echinochloa crus-galli, Fumaria officinalis, Galinsoga parviflora, Matricaria spp., Papaver rhoeas, Poa annua, Polygonum aviculare, Phalaris spp., Polygonum persicaria, Solanum nigrum, Stellaria media, Veronica spp., Polygonum convolvolus.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
- **Intervento di pre-semina anticipata** (da fine ottobre a metà gennaio): kg 4-5 per ettaro in 600 litri di acqua con terreno perfettamente preparato, esente da eventuali infestanti già presenti.
- **Pre-semina:** kg 3-5 per ettaro in 600 litri di acqua con interramento del prodotto
- **Post-emergenza:** kg 1-1,5 per ettaro miscelato con Fenmedifam (1-3 litri/ha di formulato al 16%) in 300 litri di acqua e trattando con piantine di bietole nello stadio delle 2-4 foglie vere.
Nei casi si debba intervenire in trattamenti più tardivi impiegare kg 2-3 per ettaro di prodotto in miscela con litri 2-3 di Fenmedifam (16%) con l'aggiunta di litri 0,5-1 di olio bianco. Effettuare il trattamento in assenza di vento e con terreno ben lavorato. Le dosi maggiori sono riferite per impieghi su terreni pesanti

COMPATIBILITA': SUGAR si può impiegare in miscela con altri erbicidi utilizzabili per il diserbo della barbabietola da zucchero.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

30%

1 Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.

2 Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.

3 Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti).

4 Aggiungere la restante acqua nell'atomizzatore.

ETICHETTA DA APPORRE SUL SACCHETTO IDROSOLUBILE

SUGAR

Erbicida selettivo della barbabietola da zucchero
Granuli idrodispersibili – Sacchetti idrosolubili

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Metamitron puro g 70
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi e la pelle.
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15 –
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
- SCHIRM AG – DIVISION SIDECO - Lubecca (Germania)
- A.D.I.C.A. S.R.L. – Nera Montoro (TR)
- SULPHUR MILLS LIMITED - 1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist. Bharuch, Gujarat, India

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A. – U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n 10.000 del 29.3.1999

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 500; 1000

PARTITA N.

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE
AVVERTENZA: LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

CHEM-RICE 450 SC

Erbicida a base di Propanil in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
PROPANIL puro g 38,7 (~ 447 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A.
Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A.- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10012 del 12.4.1999

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO litri 5 -10 - 20- 25 - 50

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
Il CHEM-RICE 450 SC è un diserbante selettivo di post-emergenza che si impiega in risaia per la lotta contro giavoni, ciperacee e alismatacee da seme nei primi stadi di sviluppo. Il CHEM-RICE 450 SC viene formulato come sospensione concentrata e viene applicato per irrorazione con le comuni attrezzature da diserbo, previa diluizione in una quantità di acqua sufficiente ad assicurare una omogenea copertura delle infestanti da combattere.

EPOCHE DI INTERVENTO
Il trattamento deve essere fatto con risaia posta in asciutta (24-36 ore prima del trattamento), nelle ore più calde della giornata, in assenza di vento e con infestanti ben asciutte e non ricoperte da rugiada. Eseguito l'intervento ripristinare il livello di acqua dopo almeno 24-36 ore, mantenendolo il più alto possibile per 6-8 giorni. Non effettuare il trattamento se si prevede una pioggia entro 5-6 ore.

DOSI DI IMPIEGO
Il CHEM-RICE 450 SC presenta maggiore efficacia con infestanti ai primi stadi di sviluppo (es. giavone alla seconda e terza foglia) ed in fase di attiva crescita. La dose di impiego risulta determinata dallo stadio di accrescimento delle piantine di giavone, secondo lo schema seguente:
- giavone con 2-3 foglie : 7 litri per ettaro
- giavone con 3-4 foglie : 9-9,5 litri per ettaro
- giavone da 4 foglie ad accestimento: 11-14 litri per ettaro
In presenza di giavoni cresciuti con andamento climatico avverso (giavone vecchio), aumentare le dosi sopra indicate di 1,5 - 2,5 litri per ettaro.

COMPATIBILITA'
Il CHEM-RICE 450 SC non deve essere impiegato in miscela a fertilizzanti fogliari, insetticidi fosforganici e carbammati, lasciando intercorrere un periodo di almeno 5 giorni dalla distribuzione di questi prodotti.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Alle dosi più elevate il CHEM-RICE 450 SC può provocare parziali necrosi ed ingiallimenti degli apici fogliari; tali manifestazioni si risolvono comunque nell'arco di 6-7 giorni senza negative influenze nello sviluppo delle giovani piante di riso.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 30 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

KING

Anticrittogamico a base di solfato tribasico di rame
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
RAME METALLO g 24 (= 360 g/l)
(sotto forma di Solfato tribasico)
Coformulanti q.b. a g. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10029 del 24.5.1999

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,100 - 0,250 - 0,500 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 25

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
RAME METALLO - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
KING è un anticrittogamico rameico caratterizzato da adesività e persistenza. Il suo impiego viene raccomandato sulla vite per la difesa dalla peronospora e su numerose altre colture contro le principali malattie crittogamiche sensibili al rame.

DOSI DI IMPIEGO (per 100 litri di acqua)
POMACEE (melo, pero, cotogno): contro Cancri e disseccamenti rameali 400 ml in trattamenti autunnali e/o di fine inverno. Contro Batteriosi e Ticchiolatura 250-300 ml a gemma rigonfia; 150-200 ml in trattamenti pre fiorali. Contro colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) 100 ml, a partire da 30 giorni dopo caduta petali, intervenendo a distanza di 7-10 giorni (azione collaterale di contenimento).
DRUPACEE: contro Cancro batterico 350 ml alla caduta delle foglie; contro Fusicocco e Corineo 400-450 ml durante il riposo vegetativo.
OLIVO contro Rogna , Occhio di pavone 250-300. ml
VITE: contro Peronospora, Marciume nero 200-300 ml
AGRUMI: contro Mal secco, Antracnosi, Fumaggine, Batteriosi 250-300 ml.
ACTINIDIA: contro Batteriosi 300-350 ml alla caduta delle foglie.
NOCCIOLO: contro Necrosi batterica, Mal dello stacco e Moria (azione collaterale di contenimento) 450 ml/hl negli interventi autunnali, 350 ml/hl in quelli primaverili.
NOCE: contro l'Antracnosi 350 ml/hl negli interventi primaverili-estivi.
ORTAGGI, FRAGOLA, POMODORO: contro Alternaria, Antracnosi, Peronospora, Ruggine, Septoria, Ticchiolatura, Vaiolatura e Batteriosi ml 250
PATATA: contro Peronospora, Alternaria ml 250
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro Cercospora , Peronospora, Alternaria 2,5 l/ha.
TABACCO: contro Peronospora , Batteriosi ml 250.
FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI contro Ruggini, Ticchiolatura, Peronospora, Batteriosi, Septoria, Alternaria 150-200 ml.
LOTTA CONTRO ALGHE E MOLLUSCHI DELLE RISAIE 3-3,5 l/ha alla prima comparsa .

COMPATIBILITA'
KING è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo quali Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, e di pero quali Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guyot,Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard, cuprosensibili, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 3 giorni per Fragola, Ortaggi, Patata, 20 giorni per le altre colture
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

KING

Anticrittogamico a base di solfato tribasico di rame
Sospensione concentrata

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
RAME METALLO g 24 (= 360 g/l)
(sotto forma di Solfato tribasico)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10029 del 24.5.1999

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

COMET SC

Anticrittogamico ad azione preventiva-curativa
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DODINA pura g 38 (– 384 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A
Via Tonale, 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10080 del 6/7/1999

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 50 - 100 - 250 - 500 - litri 1 - 2 - 3 - 5 - 10 – 20

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
Conservare la confezione ben chiusa
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
COMET SC si impiega sulle seguenti colture alle dosi valide per 100 litri di acqua:
- OLIVO: contro occhio di pavone 200 ml/hl nei due interventi preventivi (inizio primavera o fine estate prima delle piogge autunnali); 250 ml/hl per trattamenti curativi in zone con elevata umidità.
- CILIEGIO: contro vaiolatura, sclerotinia, antracnosi (tre trattamenti dopo la fioritura con intervallo di 10-15 giorni) ml 125-150.
- PESCO: contro Bolla e Corineo alla dose di 125-150 ml/hl nelle seguenti epoche: fine caduta foglie; rigonfiamento gemme; da bottoni rosa a scamiciatura; contro Monilia in interventi preventivi alla dose di 125-150 ml/hl
- ALBICOCCO : contro Monilia e Corineo in interventi preventivi alla dose di 125-150 ml/hl
- FRAGOLA: contro muffa grigia e vaiolo in trattamenti preventivi alla dose di 150-200 ml/hl
- MELO e PERO: contro ticchiolatura nei trattamenti preventivi, intervallati di una settimana, 100-140 ml/hl; nei trattamenti curativi, entro 48 ore dall'inizio della pioggia infettante, 150-170.ml/hl
- NESPOLO: contro ticchiolatura, nei trattamenti preventivi, 100-150 ml/hl; nei trattamenti curativi 150-200 ml/hl
- ORTAGGI (lattughe e simili, spinacio, sedano, finocchio, basilico, ortaggi a frutto, carota, ortaggi a bulbo) contro peronospora, alternariosi, fusariosi, antracnosi, ml 150-200 nei trattamenti curativi, 100-125 ml/hl nei trattamenti preventivi.
- PATATA: contro peronospora 125-150 ml/hl
- FLOREALI ed ORNAMENTALI: contro fusariosi del garofano (in pieno campo o in serra) 200 ml/hl nei trattamenti preventivi e ml 250 in quelli curativi; contro ticchiolatura della rosa (in pieno campo o in serra), 100-125 ml/hl nei trattamenti preventivi e ml 125-200/hl in quelli curativi.
- PIOPPO. contro marssonina o bronzatura 125 ml/hl

COMPATIBILITA'
COMET SC non è compatibile con gli insetticidi ed acaricidi a reazione fortemente alcalina. Non è compatibile con i clorbenzilati. Non è consigliabile miscelare con carbaryl, dimetoato, DDVP; le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con olii minerali possono dar luogo a scarsa sospensività; evitare i trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0°C.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA
Per la varietà di melo Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' tossico per api, insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.
AVVERTENZAda non impiegare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.

INTERVALLO DI SICUREZZA 10 giorni
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

COMET SC

Anticrittogamico ad azione preventiva-curativa

Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DODINA pura g 38 (= 384 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A- Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10080 del 6/7/1999

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 50 - 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

MISTRAL

Erbicida ormonico in soluzione acquosa

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
MCPA puro g 23,3 (= 260 g/l)
(sotto forma di Sale sodico potassico)
Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10306 del 3.2.2000

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,250 – 0,500 - 1 - 2- 3- 5 - 10 -20

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il Mistral è un erbicida ormonico di post-emergenza impiegato per la lotta contro le infestanti non graminacee. Risulta rapidamente assorbito per via fogliare e traslocato nei diversi organi della pianta, dove manifesta la sua attività. Mistral trova impiego nel diserbo dei cereali (riso, sorgo, mais, orzo, frumento, segale e avena), delle pomacee (melo e pero), della vite e dell'arancio.

Infestanti sensibili: *Atriplex patula* (Atriplice), *Brassica nigra* (Senape nera), *Chenopodium album* (Farinello comune), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Cirsium arvense* (Stoppione), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Sinapis spp.* (Senape), *Thlaspi arvense* (Erba storna), *Vicia spp.* (Veccia).
Infestanti mediamente sensibili: *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Centaurea spp.* (Fiordaliso), *Cerastium halosteoides* (Peveriva), *Convolvolus arvensis* (Vilucchio), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galeopsis tetrahit* (Canapa selvatica), *Lithospermium arvense* (Strigolo), *Myosotis arvense* (Miosotide dei campi), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Ranunculus arvensis* (Ranuncolo dei campi), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus asper* (Grespino spinoso), *Sonchus oleraceus* (Grespino comune),*Urtica urens* (Ortica minore).

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

RISO : 1,5 - 3,5 l/ha, dall'emissione della 5ª foglia del riso sino all'inizio della fase di botticella.
FRUMENTO, ORZO, SEGALE, AVENA: 2,5 - 3,5 l/ha da fine accestimento sino all'inizio della fase di botticella.
MAIS, SORGO: 0,35 - 0,50 l/ha dalla 3ª alla 6ª foglia della coltura
MELO, PERO, VITE, ARANCIO: 2 - 3 l/ha evitando il contatto diretto o indiretto (deriva) con la coltura, nel periodo primaverile-estivo; si consiglia l'aggiunta di olio bianco.
ARGINI DI FOSSI E CANALI, SEDI FERROVIARIE, AREE INCOLTE ED INDUSTRIALI: 1-2 l/ha in associazione ad altri erbicidi.
Il prodotto deve essere distribuito in 4-6 hl di acqua per ettaro di superficie, operando in giornate serene ed in assenza di vento.
COMPATIBILITA': Il prodotto risulta compatibile con erbicidi a reazione neutra.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate, prima che sia trascorso il tempo di carenza.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi e floreali . Evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.
NORME FITOPROTETTIVE PER LE RISAIE
Al momento del trattamento la risaia non deve trovarsi asciutta, ma presentare la superficie degli appezzamenti coperta da qualche centimetro di acqua onde evitare danni.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

DOXAR SC

Diserbante selettivo a base di Oxadiazon
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Oxadiazon puro g 35,2 (= 380 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10307 del 3.2.2000

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,250 – 0,500 - 1 - 2- 3- 5 - 10

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Si tratta di un erbicida selettivo ad ampio spettro di azione che trova impiego per il controllo delle seguenti nfestanti mono e dicotiledoni:: Heteranthera spp. (Eterantere), Alisma plantago (Cucchiaio), Scirpus mucronatus (Quadrettone), Echinochloa spp (Giavoni), Digitaria sanguinalis (Sanguinella), Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Amaranthus retroflexus (Amaranto), Atriplex patula (Atriplice maggiore), Butomus umbellatus (Giunco fiorito), Capsella bursa pastoris (Borsa pastore), Chenopodium album (Farinaccio selvatico), Convolvolus arvensis (Vilucchio), Fallopia convolvulus (Convolvolo nero), Datura stramonium (Stramonio), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Papaver rhoeas (Papavero), Polygonum aviculare (Correggiola), Polygonum persicaria (Persicaria), Portulaca oleracea (Erba porcellana), Solanum nigrum (Erba morella).

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
RISO: 0,7-1,3 l/ha per il controllo delle eterantere e di nascite precoci di Giavone, Alisma da seme e Butomus umbellatus. Applicare in pre-semina su risaia asciutta e livellata. Il prodotto può essere inoltre utilizzato anche su risaia allagata (dopo la slottatura) mantenendo un livello di 10-12 cm di acqua. Dopo l'applicazione attendere 48 ore prima di procedere alla semina. Mantenere un moderato livello di acqua (10-12 cm) nelle prima fasi vegetative del riso.
Riso coltivato in asciutta: 1,5 - 2 l/ha subito dopo la semina, in pre-emergenza della coltura e delle infestanti.
SOIA E GIRASOLE: 1,4 - 1,7 l/ha in pre-emergenza della coltura e delle infestanti. Intervenire su terreno ben livellato, eseguendo una eventuale irrigazione dopo 10-12 giorni in caso di mancate piogge.
AGLIO E FINOCCHIO : 1-2 l/ha in pre-emergenza delle colture e delle infestanti.
Colture trapiantate di **POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, TABACCO, CICORIA, INDIVIA, LATTUGA, FINOCCHIO, CAVOLFIORE**: 1-2 l/ha prima del trapianto e dell'emergenza delle infestanti.
ASPARAGO: in post-impianto dopo la rincalzatura e con zampe ben ricoperte alla dose di 2,5 l/ha. Su asparagiaie in produzione per la lotta contro vilucchio, intervenire prima dell'emergenza dei turrioni o dopo la completa raccolta degli stessi alla dose di 5-6,5 l/ha.
CARCIOFO: in post-trapianto alla dose di 5-6,5 l/ha per la lotta contro Oxalis spp., intervenendo in pre-emergenza delle infestanti. Evitare di colpire l'apparato vegetativo della coltura.
ACTINIDIA, ALBICOCCO, ARANCIO, CLEMENTINO, LIMONE, MANDARINO, MELO, NOCCIOLO, OLIVO, PERO, PESCO, PIOPPO, SUSINO, VITE, ORNAMENTALI:
- vivai: 5-6,5 l/ha, dopo la messa a dimora e prima della ripresa vegetativa. Non intervenire su vivai di vite, piante madri e barbatelle da poco a dimora;
- impianti in produzione: 2,5 l/ha su infestanti annuali e sino a 6,5 l/ha nella lotta contro il vilucchio.
Intervenire a fine inverno, prima del risveglio vegetativo. Su tutte le colture evitare di colpire la vegetazione presente o parti non perfettamente lignificate.
TAPPETI ERBOSI DI GRAMINACEE: 1–2 l/ha (100 ml/1000mq) impiegare in primavera in pre-emergenza delle infestanti..
ARGINI DI FOSSI E SCOLINE, SEDI FERROVIARIE, BORDI STRADALI, AREE INCOLTE ED INDUSTRIALI: 4-6,5 l/ha in pre-emergenza delle infestanti
In tutte le applicazioni distribuire il prodotto con volumi d'acqua di 400 – 500 l/ha.
COMPATIBILITA': DOXAR SC è miscibile con la generalità degli erbicidi impiegati sulle colture sopra indicate (es. Pendimetalin, Tiobencarb, Molinate, Tiocarbazil, Bensulfuron metile, Metamitron, Metribuzin, Aclonifen)
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci
ATTENZIONE: il formulato contiene una sostanza attiva altamente tossica per gli organismi acquatici.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua-
Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

NIMBUS

Fungicida sistemico - Liquido solubile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Propamocarb cloridrato puro g 66,6 (~ 720 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A .- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministro della Sanità n. 10403 del 22.3.2000

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100 - 250 - 500 litri 1 – 2 – 3 – 5
PARTITA N.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Si tratta di un fungicida sistemico ad assorbimento prevalentemente radicale.
Risulta indicato nella difesa di numerosi agenti patogeni appartenenti al genere Pythium spp (marciumi e moria delle piantine), Phytophthora spp (Marciumi del colletto e Cancrena pedale), Peronospora spp. (Peronospora delle
crucifere, della cipolla, ecc.), Pseudoperonospora cubensis (Peronospora delle cucurbitacee), Bremia lactucae (Peronospora della lattuga), sulle seguenti colture:
POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, COCOMERO, MELONE, ZUCCA, ZUCCHINO, CETRIOLO, INSALATE (LATTUGA, CICORIA, INDIVIA, RADICCHIO), BIETOLA ROSSA, BIETOLA DA COSTA E DA FOGLIA, CAROTA, RAPA, AGLIO, CIPOLLA, PORRO, CAVOLI, SPINACIO, PREZZEMOLO, BASILICO, SEDANO, TABACCO, FRAGOLA, COLTURE FLOREALI E ORNAMENTALI, PRATI ORNAMENTALI E CAMPI DA GOLF.
Si impiega inoltre nella difesa di MELO, PERO, AGRUMI E PIANTE FORESTALI sia in vivaio che nei primi anni dopo la messa a dimora contro gli agenti patogeni causati da Pythium spp., Phytophthora (cactorum, parasitica, cinnamomi). Il prodotto, perfettamente tollerato dalle colture in tutte le fasi di sviluppo, risulta estremamente versatile nell'impiego, potendosi applicare per via fogliare e radicale, in concia al seme o per immersione di bulbi e piantine e come disinfezione di terricciati e semenzai.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' DI IMPIEGO
Concia dei semi: 1-4 ml/kg per semi di piccole dimensioni (es. tabacco); 10-40 ml/kg per semi leggeri e di elevata dimensione.
Disinfezione dei terricciati: 300 ml/m ^{3} di terriccio diluiti in 20 litri di acqua
Trattamenti ai semenzai: 8 ml/m^2 di superficie in 4 litri di acqua, ripetendo il trattamento 5 giorni prima del trapianto
Trattamenti in pre-trapianto (bulbi e piantine): immergere in una soluzione allo 0,3% (300 ml/hl) per 20-30 minuti
Trattamenti al terreno in pre-trapianto: 8-12 ml/m ^{2} di superficie in 3-5 litri di acqua
Trattamenti di post-trapianto: distribuire 200 ml/pianta di una soluzione allo 0,2% (200 ml/hl)
Trattamenti fogliari: 1,5 - 3 l/ha in 15-20 hl di acqua per ettaro di superficie.

RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE
Lattuga: contro Bremia lactucae eseguire due interventi fogliari alla dose di 2 l/ha, avendo cura di ripetere il trattamento a distanza di 10 giorni
Melone : contro Pseudoperonospora cubensis intervenire alla scopertura dei tunnel alla dose di 2 l/ha ogni 7-10 giorni ed in miscela eventualmente a clorotalonil.
Garofano e Gerbera: contro Pythium e Phytophthora intervenire due giorni prima dell'impianto alla dose di 12-15 ml/m^2 in 2-4 litri di acqua. Successivamente applicare il prodotto per via fogliare alla dose di 200 ml/hl a distanza di 8-10 giorni (primi due interventi) e 15-25 giorni (interventi successivi).
Vivai di piante forestali: contro Phytophthora spp. e Pythium spp, disinfezione dei terricciati (vedi sopra); dopo l'emergenza della coltura intervenire ogni 15-18 giorni distribuendo 4-5 litri/m^2. di una soluzione allo 0,2% (200 ml/hl).
Campi da golf e prati ornamentali in genere. contro Pythium spp interventi fogliari alla dose di 1-1,5 litri per 1000 mq di superficie impiegando almeno 200 litri di acqua. Ripetere gli interventi a distanza di 14 giorni con condizioni favorevoli alla malattia (temperature ed umidità elevate).

AVVERTENZA: i semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici e nocivi.

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con formulati a base di fungicidi benzimidazolici, clortalonil, captano, TMTD, mancozeb, folpet e rameici.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

INTERVALLO DI SICUREZZA : 20 giorni
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

NIMBUS

Fungicida sistemico - Liquido solubile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Propamocarb cloridrato puro g 66,6 (= 720 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A .- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministro della Sanità n. 10403 del 22.3.2000

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

TOMIL 200

Insetticida polivalente in forma liquida

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
METOMIL puro g 19,6 (= 200 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene N-metil-2-pirrolidone

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente a personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3/8/1968 n. 1255.

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile.
Molto tossico per ingestione.
Irritante per gli occhi e la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10457 del 19.4.2000

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,5 – 1 – 2 – 3 - 5 - 10

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE
TOMIL 200 è un insetticida che si presenta in forma liquida prontamente dispersibile in acqua.
TOMIL 200 agisce per contatto ed ingestione su larve ed adulti di insetti che attaccano numerose colture agrarie quali lepidotteri, emitteri, omotteri, ditteri e coleotteri.
Per la limitata persistenza TOMIL 200 può essere impiegato sino a 10 giorni prima della raccolta (14 giorni su lattuga).

DOSI E CAMPI DI IMPIEGO
PESCO, SUSINO, ALBICOCCO, CILIEGIO, MANDORLO: contro Afidi, Anarsia, Tignola orientale 200 ml/hl; contro Cocciniglie 180-200 ml/hl.
MELO E PERO: contro Afide farinoso e verde; Litocollete, Cemiostoma, Carpocapsa e Ricamatrici 150-200 ml/hl
VITE DA VINO: contro Tignole 150-200 ml/hl
VITE DA TAVOLA: contro Tignole 150-200 ml/hl non superando comunque i 2 litri per ettaro di superficie e per un numero massimo di 2 applicazioni.
AGRUMI: contro Cocciniglie, afidi 200 ml/hl
OLIVO: contro Cocciniglie e Tignola 200 ml/hl
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Altica e Cleono 150-180 ml/hl
TABACCO: contro Afidi, Tripidi, larve di Lepidotteri 150-180 ml/hl
COLTURE ORTICOLE (cavoli, escluso cavolfiore e cavolo cappuccio), lattuga, cucurbitacee, fagiolo, pisello, solanacee) contro Afidi, Cavolaia, larve di Nottuidi, Aleurodidi, 150-200 ml/hl
PIOPPO: contro larve defogliatrici, Saperda, Crisomela del pioppo, Cimicetta del pioppo 200 ml/hl;
COLTURE FLOREALI E ORNAMENTALI contro Afidi, Cocciniglie, Cicaline, Cecidomia, larve defogliatrici, Coleotteri defogliatori, Minatrice della gerbera, Tortrice del garofano, Tingidi 150-200 ml/hl

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
E' tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame

INTERVALLO DI SICUREZZA: 10 giorni; 14 giorni su lattuga; 30 giorni su vite da tavola.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

DICOTURF

Diserbante selettivo per prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi,prati, pascoli, frumento, orzo, segale, avena.
Liquido solubile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DICAMBA Sale Dimetilamminico puro g 1,54 (=16,6 g/l)
MECOPROP Sale Potassico puro g 20,14 (= 217,5 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle.
Rischio di gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
DISTRIBUITO DA
WOLF ITALIA S.R.L. - Via Galilei, 5
ORNAGO (MI)
OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10461 del 19.4.2000

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,100 - 0,250 - 1 – 2 – 3 - 5 - 10 - 50

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
DICAMBA SALE DIMETILAMMINICO; MECOPROP le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: DICAMBA SALE DIMETILAMMINICO - Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. Terapia sintomatica
MECOPROP Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
DICOTURF è un erbicida selettivo studiato per la lotta contro le principali malerbe a foglia larga che infestano i tappeti erbosi di prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi, prati e pascoli di graminacee, nonchè colture cerealicole.
DICOTURF risulta efficace nei confronti di numerose infestanti dicotiledoni annuali e poliennali fra le quali si annoverano: amaranto (Amaranthus retroflexus), fiordaliso (Centaurea cyanus) anagallide (Anagallis arvensis) papavero (Papaver rhoeas) cerastio (Cerastium arvense), borsa pastore (Capsella bursa pastoris), farinello (Chenopodium album), ranuncolo dei campi (Ranunculus arvensis), centocchio (Stellaria media) trifoglio (Trifolium arvense), fumaria (Fumaria officinalis), stoppione (Cirsium arvense), vilucchio (Convolvolus arvensis), Plantago spp, Equisetum spp., Rumex spp.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Il diserbo con DICOTURF può essere eseguito in presenza di infestanti attive con temperature comprese tra 10 e 25°C. e a distanza di 5 ore da una pioggia.
La dose di impiego dovrà essere diluita in una quantità di acqua pari a 400-600 litri per ettaro, distribuendo il prodotto in modo uniforme sull'intera superficie trattata.. Si ricorda di procedere ad un accurato lavaggio delle attrezzature utilizzate dopo l'esecuzione del diserbo.
PRATI ORNAMENTALI, CAMPI DA GOLF, CAMPI SPORTIVI
- al 1° anno di impianto: 5-6 litri per ettaro di superficie su prato affrancato
- dopo il 2° anno : 5-8 litri per ettaro di superficie durante tutto il periodo primaverile-estivo, intervenendo qualche giorno dopo il taglio.
PRATI, PASCOLI: 7-8 litri per ettaro di superficie su infestanti poco sviluppate e qualche giorno dopo lo sfalcio.
FRUMENTO, ORZO, SEGALE, AVENA: 6-7 litri per ettaro di superficie da fine accestimento a levata

COMPATIBILITA'
DICOTURF è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra quali ad esempio Carbaryl, TMTD.
AVVERTENZA :in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per gli impieghi non indicati in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Prati, Pascoli, Cereali 20 Giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

DICOTURF

Diserbante selettivo per prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi,prati, pascoli, frumento, orzo, segale, avena.
Liquido solubile

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

DICAMBA Sale Dimetilamminico puro	g 1,54	(=16,6 g/l)
MECOPROP Sale Potassico puro	g 20,14	(= 217,5 g/l)
Coformulanti	q.b. a g. 100	

FRASI DI RISCHIO

Irritante per la pelle.
Rischio di gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
DISTRIBUITO DA
WOLF ITALIA S.R.L. - Via Galilei, 5
ORNAGO (MI)
OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10461 del 19.4.2000

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

DIAZINA

Diserbante selettivo in formulazione flowable

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
TERBUTILAZINA pura g 37 (= 400 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10484 del 10/5/2000

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,100 - 0,250 - 0,500 - 1 - 5 - 10 - 20

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO
DIAZINA è un diserbante di pre-emergenza o post-emergenza precoce, assorbito quasi esclusivamente per via radicale e traslocato alle parti verdi attraverso il sistema linfatico, determinando fenomeni clorotici ed una successiva necrosi dei tessuti attraverso l'inibizione della fotosinesi clorofilliana. La sua applicazione assicura il controllo delle seguenti infestanti: Lolium spp. (Loglio), Amaranthus retroflexus (Amaranto), Atriplex spp. (Atriplice), Calepina corvini (Calepina), Chenopodium spp (Farinello), Datura stramonium (Stramonio), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Mercurialis annua (Mercorella comune) Polygonum lapathifolium (Poligono nodoso), Portulaca Oleracea (Erba porcellana), Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Rapistrum rugosum (Rapistro), Senecio vulgaris (Senecione), Sinapis spp. (Senape), Solanum nigrum (Erba morella), Sonchus spp (Crespino), Stellaria media (Centocchio comune), Veronica spp (Veronica), Setaria spp (Pabbio) Poa annua (Fienarola comune).

EPOCA E DOSI DI APPLICAZIONE
MAIS, SORGO:
? in pre-emergenza 1,5 – 2.5 l/ha come unico prodotto oppure in miscela ad altro erbicida;
? in post-emergenza precoce 1 – 1,5 l/ha;

COMPATIBILITA'
DIAZINA è miscibile con i comuni erbicidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZA
Attendere 12 mesi prima della semina della coltura successiva, preceduta da una lavorazione profonda.
Si consiglia l'impiego del prodotto su terreno umido, su infestanti non emerse od ai primi stadi di sviluppo.

ATTENZIONE! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

DIAZINA

Diserbante selettivo in formulazione flowable

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
TERBUTILAZINA pura g 37 (= 400 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10484 del 10/5/2000

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,100
PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ENDOMAS

Insetticida selettivo concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
ENDOSULFAN puro g 32.9 (– 347.09 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
Contiene XILENE

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile.
Nocivo per inalazione.
Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.
Irritante per gli occhi e la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

DISRIBUITO DA:
CHIMASSO' ITALIA S.R.L. - Via Milanese, 20
SESTO S. GIOVANNI (MI)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10486 del 10/5/2000

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,250 - 0,500 - 1 – 2 – 3 - 5 - 10

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni. Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni. Controindicazioni: per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa. **Consultare un Centro Antiveleni**

MODALITA' DI IMPIEGO
ENDOMAS è un liquido emulsionabile ad azione insetticida ed aficida che agisce per contatto ed ingestione contro numerosi insetti ad apparato boccale masticatore e perforante succhiatore.

CAMPI DI IMPIEGO
FRUTTICOLTURA: AGRUMI, MANDORLO, NOCCIOLO, POMACEE, PESCO, VITE contro afidi, anarsia, tignola orientale, orgia, minatori fogliari, eriofidi, tripidi, cicaline, oglocampa, recurvaria, iponomenta, lepidotteri defogliatori, tingidi, carpocapsa, antonomo, oziorrinco, tentredine, sigaraio della vite, tignola della vite, fleotribo, mosca della frutta, aleurodidi, nottue, cimici e balanino, alla dose di 100-200 ml/hl
Su AGRUMI e VITE non superare comunque i 3 litri di ENDOMAS per ettaro di superficie ed effettuare massimo 2 applicazioni.
Su PESCO non superare comunque i 2 litri di ENDOMAS per ettaro di superficie ed effettuare massimo 3 applicazioni.
ORTICOLTURA: POMODORO, CUCURBITACEE CON BUCCIA NON COMMESTIBILE (melone, zucca, cocomero), contro afidi, tripidi, aleurodidi, nottue fogliari, piralide, depressarie, altiche, tentredine, saperda, dorifora, alla dose di 150-200 ml/hl.
COLTURE FORESTALI contro larve defogliatrici, tortrice dei pini, coleotteri defogliatori, tingidi, cicaline, cinicette alla dose di 150-200 ml/hl.

COMPATIBILITA'
E' miscibile con i normali prodotti fitosanitari non alcalini, con gli integratori fogliari e con gli olii minerali.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 25 giorni ; Vite: 28 giorni.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

VEBIRAME FLOW

Anticrittogamico a base di solfato tribasico di rame
Sospensione concentrata

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
RAME METALLO g 15,2 (~193,04 g/l)
(sotto forma di solfato tribasico)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Distribuito da:
VE.BI s.a.s. del Dr. Luigi Bazzolo & C. - Via Desman, 43
S. EUFEMIA DI BORGORICCO (PD)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Officina di confezionamento
VE.BI s.a.s. del Dr. Luigi Bazzolo & C.
S. Eufemia di Borgoricco (PD)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10491 del 10.5.2000

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 50-100-200-250-500-750 litri 1 - 5 - 10 - 20 - 25

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica..
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
VEBIRAME FLOW è un anticrittogamico rameico caratterizzato da adesività e persistenza.Il suo impiego viene raccomandato sulla vite per la difesa dalla peronospora e su numerose altre colture contro le principali malattie crittogamiche sensibili al rame.

DOSI DI IMPIEGO (per 100 litri di acqua)
ORTAGGI, FRAGOLA, POMODORO contro Ticchiolatura, Peronospora, Alternaria, Septoria, Ruggine e Antracnosi 500 ml/hl.
POMACEE: contro Cancri e Disseccamenti rameali 600-700 ml/hl intervenendo al 30% ed al 70% della caduta delle foglie; contro Batteriosi e Ticchiolatura 500-600 ml/hl allo stadio di gemma ingrossata.
DRUPACEE: contro Cancro batterico 700 ml/hl alla caduta delle foglie; contro Fusicocco e Corineo 800-900 ml/hl durante il riposo vegetativo.
OLIVO contro Rogna 500-600 ml/hl durante il riposo vegetativo; contro Occhio di pavone 500-600 ml/hl in pre-fioritura e a frutto ingrossato.
VITE:contro Peronospora 400-600 ml/hl.
AGRUMI: contro Mal secco, Antracnosi e Fumaggine 500-600 ml/hl.
ACTINIDIA: contro Batteriosi 600-700 ml/hl alla caduta delle foglie.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro Cercospora 5-6 l/ha.
TABACCO: contro Peronospora e Batteriosi 500 ml/hl.
PATATA: contro Peronospora, Alternaria ml 500
FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI contro Ruggini, Ticchiolatura e Peronospora 300-400 ml/hl.
LOTTA CONTRO ALGHE E MOLLUSCHI DELLE RISAIE 6-7 l/ha alla prima comparsa delle alghe.

COMPATIBILITA'
E' miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA'
Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo quali Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, e di pero quali Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard, cuprosensibili, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 3 giorni per Fragola, Ortaggi, Patata, 20 giorni per le altre colture
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

VEBIRAME FLOW

Anticrittogamico a base di solfato tribasico di rame
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
RAME METALLO g 15,2 (=193,04 g/l)
(sotto forma di solfato tribasico)
Coformulanti q.b. a g. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Distribuito da:
VE.BI s.a.s. del Dr. Luigi Bazzolo & C. - Via Desman, 43
S. EUFEMIA DI BORGORICCO (PD)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Officina di confezionamento
VE.BI s.a.s. del Dr. Luigi Bazzolo & C.
S. Eufemia di Borgoricco (PD)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10491 del 10.5.2000

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 50-100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

VEBIZOLFO FLOW

Anticrittogamico per la lotta contro le malattie fungine sensibili allo zolfo – Sospensione concentrata

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
ZOLFO puro g 52 (= 717,6 g/l)
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.PA. - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Distribuito da:
VE.BI s.a.s. del Dr. Luigi Bazzolo & C.
Via Desman, 43 - S. EUFEMIA DI BORGORICCO (PD)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
VE.BI s.a.s. del Dr. Luigi Bazzolo
S. EUFEMIA DI BORGORICCO (PD)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10.492 del 10.5.2000

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 50-100-200-250-500-750 litri 1-5-20

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
VEBIZOLFO FLOW è una sospensione concentrata a base di zolfo caratterizzato da una pronta e facile dispersibilità in acqua durante la preparazione della miscela. Durante la fase di lavorazione le particelle di zolfo vengono micronizzate finemente e uniformemente (2-3 micron), per cui quando questa formulazione viene irrorata sulla vegetazione, le particelle stesse si dispongono le une accanto alle altre con regolarità, a guisa di film, senza lasciare spazi scoperti sulla vegetazione. Per le peculiari caratteristiche il VEBIZOLFO FLOW resiste bene al dilavamento ed ha una persistenza superiore agli usuali preparati a base di zolfo. Il VEBIZOLFO FLOW è usato nei classici campi di impiego dello zolfo e precisamente: **VITE** contro l'oidio; **MELO E PERO** contro il Mal bianco. Peraltro il VEBIZOLFO FLOW non imbratta la vegetazione, per cui se ne preconizza l'uso anche sulle **colture floreali** (ad esempio l'oidio della rosa) e non ustiona per cui può essere impiegato su colture ortive come **zucchino, cetriolo, melone** in serra.

EPOCHE E DOSI DI IMPIEGO
VEBIZOLFO FLOW si impiega in trattamenti preventivi o alla prima comparsa delle crittogame ripetendo i trattamenti ad intervalli variabili in funzione dell'andamento stagionale e della intensità degli attacchi.
La dose di impiego è di ml 100-150 per 100 litri di acqua.

COMPATIBILITA'
Non è compatibile con prodotti fitosanitari alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.), con olii minerali, con Captano, DDVP, Diclofluanide.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.
Può arrecare danno alle seguenti cultivar di MELO: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome beauty, Stayman red, Winesap, PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contesssa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Conizio; VITE : Sangiovese; CUCURBITACEE: può essere fitotossico.

Tempo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 5 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

VEBIZOLFO FLOW

Anticrittogamico per la lotta contro le malattie fungine sensibili allo zolfo – Sospensione concentrata

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
ZOLFO puro g 52 (= 717,6 g/l)
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

DISTRIBUITO DA:
VE.BI s.a.s. del Dr. Luigi Bazzolo & C.
Via Desman, 43 - S. EUFEMIA DI BORGORICCO (PD)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
VE.BI s.a.s. del Dr. Luigi Bazzolo
S. EUFEMIA DI BORGORICCO (PD)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10.492 del 10.5.2000

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 50-100
PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

VEBIZINON G

Disinfestante granulare del terreno

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DIAZINONE puro g 5
Coformulanti q.b. a g. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
DISTRIBUITO DA
VE.BI S.A.S. del dr. Luigi Bazzolo & C.
Via Desman, 43
S. EUFEMIA DI BORGORICCO (PD)
OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P. A –U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)
OFFICINE DI CONFEZIONAMENTO
VE.BI S.A.S del dr. Luigi Bazzolo & C.
S. EUFEMIA DI BORGORICCO (PD)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10496 del 31.05.2000

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO : g 100-200- 250-500-750 kg 1-5-10-20-25

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita'). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
Il VEBIZINON G è un disinfestante del terreno in formulazione granulare, ovvero granuli costituiti da un supporto inerte caricato da sostanza attiva, che nel suolo si libera esplicando l'effetto insetticida con pronta azione e successiva liberazione graduale del principio attivo.
I granuli del VEBIZINON G sono tali da consentire una facile distribuzione ed una regolare ripartizione nel terreno, possiedono buona scorrevolezza e non sono abrasivi.
I granuli del VEBIZINON G agiscono per contatto contro gli insetti terricoli che infestano le colture di PATATA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, CAROTA, MAIS, danneggiandole soprattutto nelle prime fasi di sviluppo, attaccando seme e plantule.
Il VEBIZINON G viene impiegato in
- trattamenti in pieno campo: alla dose di kg 40-80 per ettaro di coltura incorporandolo 1-2 giorni prima della semina tramite una leggera erpicatura. Si possono impiegare dosi inferiori a quella indicata in presenza di modeste infestazioni.
- trattamenti localizzati: alla dose di kg 10-12 per ettaro, effettuando la distribuzione o sulla linea di semina con il seme già ricoperto, incorporandolo leggermente nello strato superficiale, oppure distribuendolo a diretto contatto con il seme. Sulla barbabietola non impiegarlo localizzato ma per trattamenti a pieno campo in pre-semina.

COMPATIBILITA'
Non miscelare con altri prodotti fitosanitari

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario vista l'epoca di impiego.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Per lavorazioni agricole da effettuare entro 10 giorni, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

VEBIZINON G

Disinfestante granulare del terreno

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DIAZINONE puro g 5
Coformulanti q.b. a g. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
DISTRIBUITO DA
VE.BI S.A.S. del dr. Luigi Bazzolo & C.
Via Desman, 43
S. EUFEMIA DI BORGORICCO (PD)
OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P. A – U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)
OFFICINE DI CONFEZIONAMENTO
VE.BI S.A.S del dr. Luigi Bazzolo & C.
S. EUFEMIA DI BORGORICCO (PD)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10496 del 31.05.2000

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO : g 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

SOLEIL

Fungicida a base di Triadimenol e Zolfo
Tipo di formulazione: polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Triadimenol puro g 2,5
Zolfo puro g 50
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b.a 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.
Via Tonale, 15
24061 ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. – U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10497 del 31.05.2000

Quantità netta del preparato: g 100-200-500 kg 1-5-10-15-20

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostnaze attive : TRIADIMENOL 2,5%, ZOLFO 50% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione :
TRIADIMENOL - Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica.
ZOLFO : Terapia : sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
Fungicida sistemico e di contatto con attività preventiva, curativa ed eradicante contro numerose malattie fungine; indicato sulle seguenti colture per combattere l'Oidio o Mal Bianco e le Ruggini di :
VITE - CETRIOLO - MELONE - ZUCCHINO – MELO - PEPERONE - POMODORO – CEREALI (Frumento, Orzo, Avena, Segale, Triticale) - PIANTE ORNAMENTALI : g. 100 - 200 per q.le d'acqua
Impiegare la dose più alta in caso di maggiore sensibilità varietale in zone soggette ad attacchi di Oidio o con intervalli, tra i trattamenti, superiori ai 10 giorni. Non trattare durante le ore più calde.

COMPATIBILITA'
Tra il trattamento con il prodotto e l'impiego di olii minerali attendere 2 settimane

AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di vite, melo, peperone, cetriolo, melone, pomodoro, 7 giorni per lo zucchino, 30 giorni per i cereali.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico sulle seguenti varietà di mele : Stayman (Winesap), Grammy Smith, Starking, Renetta. Sulla Vite è fitotossico sulla Cv. Sangiovese.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade)

SOLEIL

Fungicida a base di Triadimenol e Zolfo
Tipo di formulazione: polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Triadimenol puro g 2,5
Zolfo puro g 50
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b.a 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.
Via Tonale, 15
24061 ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. – U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10497 del 31.05.2000

Quantità netta del preparato (n° sacchetti x g) : g 100 (10 x 10) - **g 250** (10 x 25) - **g 500** (10 x 50) - **kg 1** (10 x 100; 5 x 200; 4 x 250; 2 x 500; 1 x 1000) - **kg 5** (1 x 5000)

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive : TRIADIMENOL 2,5%, ZOLFO 50% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione :
TRIADIMENOL - Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica.
ZOLFO : Terapia : sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
Fungicida sistemico e di contatto con attività preventiva, curativa ed eradicante contro numerose malattie fungine; indicato sulle seguenti colture per combattere l'Oidio o Mal Bianco e le Ruggini di :
VITE - CETRIOLO - MELONE - ZUCCHINO – MELO - PEPERONE - POMODORO – CEREALI (Frumento, Orzo, Avena, Segale, Triticale) - PIANTE ORNAMENTALI : g. 100 - 200 per q.le d'acqua
Impiegare la dose più alta in caso di maggiore sensibilità varietale in zone soggette ad attacchi di Oidio o con intervalli, tra i trattamenti, superiori ai 10 giorni. Non trattare durante le ore più calde.

COMPATIBILITA'
Tra il trattamento con il prodotto e l'impiego di olii minerali attendere 2 settimane

AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di vite, melo, peperone, cetriolo, melone, pomodoro, 7 giorni per lo zucchino, 30 giorni per i cereali.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico sulle seguenti varietà di mele : Stayman (Winesap), Grammy Smith, Starking, Renetta. Sulla Vite è fitotossico sulla Cv. Sangiovese.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

1 — 30% — Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.

2 — Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.

3 — Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti).

4 — Aggiungere la restante acqua nell'atomizzatore.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

SOLEIL

Fungicida a base di Triadimenol e Zolfo
Tipo di formulazione: polvere bagnabile

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Triadimenol puro g 2,5
Zolfo puro g 50
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b.a 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.
Via Tonale, 15
24061 ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. – U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10497 del 31.05.2000

Quantità netta del preparato: g 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA DA APPORRE SUL SACCHETTO IDROSOLUBILE

SOLEIL

Fungicida a base di Triadimenol e Zolfo
Tipo di formulazione: polvere bagnabile
in sacchetti idrosolubili

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Triadimenol puro g 2,5
Zolfo puro g 50
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b.a 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.- Via Tonale, 15
24061 ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. – U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10497 del 31.05.2000

Quantità netta del preparato : g 10; 25; 50; 100; 200; 250; 500; 1000; 5000.

PARTITA N.

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE
AVVERTENZA: LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

COCCISTOP

Insetticida agricolo per trattamenti su fruttiferi, agrumi e piante ornamentali in pieno campo

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Olio minerale puro g 80 (688 g/l)
(Insolfonabilità minimo 95%)
Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
Conservare la confezione ben chiusa
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Distribuito da:
ORVITAL S.P.A.
Via Darwin, 63
SETTIMO MILANESE (MI)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. –U.P. SIFA
Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10607 del 18.10.2000

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100-200-250-500-750 litri 1-2-5-10-20-50-100-200
PARTITA N.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

COCCISTOP è un olio minerale ad elevata raffinazione. La tecnica di preparazione di questo formulato fa di COCCISTOP un preparato per la lotta contro le cocciniglie senza tema di manifestazioni fitotossiche sulle piante utili.
Sugli agrumi può essere impiegato nei seguenti periodi:
- periodo invernale: dalla raccolta alla pre-fioritura
- periodo estivo: da giugno (quando il frutto raggiunge la grossezza di una noce) fino al periodo che precede l'invaiatura.

Sui fruttiferi (melo, pero; pesco, albicocco, susino, ciliegio; vite; olivo) e sulle piante ornamentali in pieno campo va impiegato preferibilmente a fine inverno (al rigonfiamento delle gemme) e nel periodo primaverile-estivo al primo apparire delle infestazioni.

EPOCA DELLE APPLICAZIONI

Trattamenti invernali e primaverili-estivi.

DOSI DI IMPIEGO (per 100 litri di acqua)

- Trattamenti a gemme chiuse o leggermente gonfie. litri 2 - 3
- Trattamenti al verde : litri 1 - 2
- Trattamenti come adesivo in unione ai comuni insetticidi . litri 0,300

COMPATIBILITA'

E' compatibile con i prodotti fitosanitari di uso comune ad eccezione di quelli contenenti calce, zolfo, dinocap, captano, mancozeb e derivati. Non usare i prodotti anzidetti 2-3 settimane prima o dopo il trattamento con COCCISTOP. Per lo zolfo è sufficiente un intervallo di 1-2 settimane.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua- Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

LO STOCCAGGIO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE DEL CONTENITORE DA LITRI 200 DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO IN ZONE DOTATE DI BACINO DI CONTENIMENTO DI ADEGUATO VOLUME ATTO A RACCOGLIERE EVENTUALI FUORIUSCITE ACCIDENTALI DEL PRODOTTO.

Per le taglie da litri 100 e 200: "Contenitore da restituire al produttore per i l riutilizzo"

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

COCCISTOP

Insetticida agricolo per trattamenti su fruttiferi, agrumi e piante ornamentali in pieno campo

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Olio minerale puro g 80 (688 g/l)
(Insolfonabilità minimo 95%)
Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
Conservare la confezione ben chiusa
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Distribuito da:
ORVITAL S.P.A. - Via Darwin, 63
SETTIMO MILANESE (MI)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. –U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10607 del 18.10.2000

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100
PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

KEEPER 8 - 64

Fungicida specifico per la lotta contro la Peronospora della vite, del pomodoro e del tabacco in polvere bagnabile

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
- Metalaxil puro g 8
- Mancozeb puro g 64
- Coformulanti q.b. a 100

IRRITANTE

Frasi di rischio: Irritante per le vie respiratorie.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare al riparo dall'umidità. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A - Via Tonale,15 - 24061 Albano S. Alessandro (BG)

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.p.A. – U.P. SIFA – 24043 Caravaggio (BG)
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Registrazione Ministero della Salute n° 10658 del 29/12/2000

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 25-50-100-250-500; kg 1-5-10

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI: Prescrizioni particolari: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL 8% e MANCOZEB 64%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL: Sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore pre-cordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il KEEPER 8-64 è un fungicida ad azione preventiva e curativa specificatamente indicato per la lotta contro le Peronosporacee delle colture di **VITE, TABACCO** e **POMODORO**.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il primo trattamento verrà eseguito dopo il verificarsi della prima pioggia infettante; per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permetterà di mantenere delle cadenze fisse sganciate dalle piogge. Infatti anche le piogge abbondanti e ripetute non dminuiscono l'efficacia del trattamento. La traslocazione acropeta di KEEPER 8-64 consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo che intercorre tra un trattamento ed un altro.
• **PERONOSPORA DELLA VITE** (Plasmopara Viticola): 250 g/hl di acqua fino ad allegagione avvenuta eseguendo i trattamenti ad intervalli di 14 giorni.
Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare la buona copertura della vegetazione. Per la lotta contemporanea contro l'Oidio, miscelare il prodotto agli anticrittogamici previsti per questo scopo. L'impiego di KEEPER 8-64 è particolarmente indicato nelle zone e condizioni in cui il rame può dare luogo a fitotossicità o comunque a fenomeni secondari negativi a carico della vite.
• **PERONOSPORA DEL TABACCO** (Peronospora tabacina): 300 g/hl di acqua. Iniziare i trattamenti non appena la coltura abbia superato la crisi del trapianto con cadenza di 10 giorni. Ciò consentirà la protezione totale della coltura anche nei periodi di elevata pressione di infezione. Onde evitare la comparsa di infezioni durante la fase della crisi di trapianto, eseguire un trattamento in semenzaio 1-2 giorni prima della messa a dimora delle piantine in campo alla dose di 300 g/hl di acqua.
• **PERONOSPORA DEL POMODORO** (Phytophtora infestans): 250 g/hl di acqua ad intervalli di 14 giorni. Sospendere i trattamenti con la prima fioritura del pomodoro.

NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SU VITE E TABACCO SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. SU POMODORO SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALLA PRIMA FIORITURA.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

KEEPER 8 - 64

Fungicida specifico per la lotta contro la Peronospora della vite, del pomodoro e del tabacco in polvere bagnabile Sacchetti idrosolubili.

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
- Metalaxil puro g 8
- Mancozeb puro g 64
- Coformulanti q.b. a 100

IRRITANTE

Frasi di rischio: Irritante per le vie respiratorie.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare al riparo dall'umidità. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A- Via Tonale,15 - 24061 Albano S. Alessandro (BG)

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.p.A. – U.P. SIFA – 24043 Caravaggio (BG)
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Registrazione Ministero della Salute n° 10658 del 29/12/2000

Quantita' netta del preparato: kg 1 (10X100; 5X200;4X250;2X500); **kg 5** (10X500); **kg 10** (10x1000).

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI: Prescrizioni particolari: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL 8% e MANCOZEB 64%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL: Sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore pre-cordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il KEEPER 8-64 è un fungicida ad azione preventiva e curativa specificatamente indicato per la lotta contro le Peronosporacee delle colture di **VITE, TABACCO** e **POMODORO**.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il primo trattamento verrà eseguito dopo il verificarsi della prima pioggia infettante; per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permetterà di mantenere delle cadenze fisse sganciate dalle piogge. Infatti anche le piogge abbondanti e ripetute non diminuiscono l'efficacia del trattamento. La traslocazione acropeta di KEEPER 8-64 consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo che intercorre tra un trattamento ed un altro.
• **PERONOSPORA DELLA VITE** (Plasmopara Viticola): 250 g/hl di acqua fino ad allegagione avvenuta eseguendo i trattamenti ad intervalli di 14 giorni.
Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare la buona copertura della vegetazione. Per la lotta contemporanea contro l'Oidio, miscelare il prodotto agli anticrittogamici previsti per questo scopo. L'impiego di KEEPER 8-64 è particolarmente indicato nelle zone e condizioni in cui il rame può dare luogo a fitotossicità o comunque a fenomeni secondari negativi a carico della vite.
• **PERONOSPORA DEL TABACCO** (Peronospora tabacina): 300 g/hl di acqua. Iniziare i trattamenti non appena la coltura abbia superato la crisi del trapianto con cadenza di 10 giorni. Ciò consentirà la protezione totale della coltura anche nei periodi di elevata pressione di infezione. Onde evitare la comparsa di infezioni durante la fase della crisi di trapianto, eseguire un trattamento in semenzaio 1-2 giorni prima della messa a dimora delle piantine in campo alla dose di 300 g/hl di acqua.
• **PERONOSPORA DEL POMODORO** (Phytophtora infestans): 250 g/hl di acqua ad intervalli di 14 giorni. Sospendere i trattamenti con la prima fioritura del pomodoro.

NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SU VITE E TABACCO SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. SU POMODORO SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALLA PRIMA FIORITURA.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

MODO DI UTILIZZO Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

30%

1 Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.

2 Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.

3 Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti).

4 Aggiungere la restante acqua nell'atomizzatore.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

KEEPER 8 - 64

Fungicida specifico per la lotta contro la Peronospora della vite, del pomodoro e del tabaccoin polvere bagnabile

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
- Metalaxil puro g 8
- Mancozeb puro g 64
- Coformulanti q.b. a 100

IRRITANTE

Frasi di rischio: Irritante per le vie respiratorie.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare al riparo dall'umidità. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A - Via Tonale,15 - 24061 Albano S. Alessandro (BG)

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.p.A. – U.P. SIFA – 24043 Caravaggio (BG)
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Registrazione Ministero della Salute n° 10658 del 29/12/2000

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 25-50-100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA DA APPORRE SUL SACCHETTO IDROSOLUBILE

KEEPER 8 - 64

Fungicida specifico per la lotta contro la Peronospora della vite, del pomodoro e del tabacco in polvere bagnabile Sacchetti idrosolubili.

IRRITANTE

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
- Metalaxil puro g 8
- Mancozeb puro g 64
- Coformulanti q.b. a 100

Frasi di rischio: Irritante per le vie respiratorie.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A - Via Tonale,15 - 24061 Albano S. Alessandro (BG)

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.p.A. – U.P. SIFA – 24043 Caravaggio (BG)
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Registrazione Ministero della Salute n° 10658 del 29/12/2000

Quantita' netta del preparato: g 100; 200; 250; 500; 1000.
PARTITA N.

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE
AVVERTENZA: LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

CRITTODINA

Anticrittogamico ad azione preventiva-curativa
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DODINA pura g 38 (= 384 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

DISTRIBUITO DA:
VE.BI. S.A.S. del Dr. Luigi Bazzolo & C. - Via Desman, 43
BORGORICCO PD

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
VE.BI. S.A.S. del Dr. Luigi Bazzolo & C.
BORGORICCO (PD)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10660 del 29.12.2000

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO : **ml 20-25-50 - 100 – 200- 250 - 500 - litri 1 - 2 - 3 - 5 - 10 – 20**

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
Conservare la confezione ben chiusa
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
CRITTODINA si impiega sulle seguenti colture alle dosi valide per 100 litri di acqua:
- OLIVO: contro occhio di pavone 200 ml/hl nei due interventi preventivi (inizio primavera o fine estate prima delle piogge autunnali); 250 ml/hl per trattamenti curativi in zone con elevata umidità.
- CILIEGIO: contro vaiolatura, sclerotinia, antracnosi (tre trattamenti dopo la fioritura con intervallo di 10-15 giorni) ml 125-150.
- PESCO: contro Bolla e Corineo alla dose di 125-150 ml/hl nelle seguenti epoche: fine caduta foglie; rigonfiamento gemme; da bottoni rosa a scamiciatura; contro Monilia in interventi preventivi alla dose di 125-150 ml/hl
- ALBICOCCO : contro Monilia e Corineo in interventi preventivi alla dose di 125-150 ml/hl
- VITE: contro Peronospora in interventi preventivi alla dose di 125-175 ml/hl
- FRAGOLA: contro muffa grigia e vaiolo in trattamenti preventivi alla dose di 150-200 ml/hl
- MELO e PERO: contro ticchiolatura nei trattamenti preventivi, intervallati di una settimana, 100-140 ml/hl; nei trattamenti curativi, entro 48 ore dall'inizio della pioggia infettante, 150-170.ml/hl
- NESPOLO: contro ticchiolatura, nei trattamenti preventivi, 100-150 ml/hl; nei trattamenti curativi 150-200 ml/hl
- ORTAGGI (lattughe e simili, spinacio, sedano, finocchio, basilico, ortaggi a frutto, carota, ortaggi a bulbo) contro peronospora, alternariosi, fusariosi, antracnosi, ml 150-200 nei trattamenti curativi, 100-125 ml/hl nei trattamenti preventivi.
- PATATA: contro peronospora 125-150 ml/hl
- FLOREALI ed ORNAMENTALI: contro fusariosi del garofano (in pieno campo o in serra) 200 ml/hl nei trattamenti preventivi e ml 250 in quelli curativi; contro ticchiolatura della rosa (in pieno campo o in serra), 100-125 ml/hl nei trattamenti preventivi e ml 125-200/hl in quelli curativi.
- PIOPPO. contro marssonina o bronzatura 125 ml/hl

COMPATIBILITA'
CRITTODINA non è compatibile con gli insetticidi ed acaricidi a reazione fortemente alcalina. Non è compatibile con i clorbenzilati. Non è consigliabile miscelare con carbaryl, dimetoato, DDVP; le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con olii minerali possono dar luogo a scarsa sospensività; evitare i trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0°C.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA
Per la varietà di melo Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' tossico per api, insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.
AVVERTENZAda non impiegare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.

INTERVALLO DI SICUREZZA 10 giorni
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CRITTODINA

Anticrittogamico ad azione preventiva-curativa
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DODINA pura g 38 (= 384 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
DISTRIBUITO DA:
VE.BI. S.A.S. del Dr. Luigi Bazzolo & C. - Via Desman, 43
BORGORICCO PD
OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
VE.BI. S.A.S. del Dr. Luigi Bazzolo & C.
BORGORICCO (PD)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10660 del 29.12.2000

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO : ml 20-25-50 - 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

GENIAL PRO

Regolatore di crescita in formulazione liquida

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Gibberelline puro (isomero A4 + A7)	1,8% (19,1 g/l)
6 Benziladenina pura	1,8% (19,1 g/l)
coformulanti	qb a 100

contiene alcool tetraidrofurfurilico

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO

Irritante per gli occhi.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A.- U.P. SIFA -
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 11682 del 06/06/2003

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: l 0,1- 0,2- 0,250- 0,5- 0,750-1- 2,5-5
PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Per maggior sicurezza mettere occhiali protettivi durante la preparazione e l'impiego del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: gibberelline 1,8% - 6-benziladenina 1,8% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: BENZILADENINA: irritazione cutanea degli occhi e dell'apparato respiratorio. Terapia: sintomatica.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

GENIAL PRO è un fitoregolatore di crescita delle piante, che per la sua particolare azione, influenza in modo positivo i processi fisiologici dando luogo ad un incremento della qualità e della produzione delle frutta.
Viene impiegato nel seguente modo :
Pero : impiegare il prodotto per il miglioramento dell'allegagione alla dose di ml 60 80 per ettolitro, con due applicazioni a ml 30 - 40 per hl, con il primo trattamento quando si ha il 25% circa dei fiori aperti ed il secondo dopo circa 2 - 3 giorni al massimo.
Miglioramento della forma del melo del gruppo delle Delicious: trattare con 70 - 100 ml per ettolitro dalla piena fioritura ((80% dei fiori aperti) alla caduta dei petali, preferibilmente in due applicazioni a ml 35 - 50 per ettolitro a 7 - 10 giorni di distanza
Prevenzione della rugginosita' delle mele golden delicious : trattare alla dose di ml 25 - 30 per ettolitro, con 3 - 4 trattamenti da fine della fioritura e con i successivi ogni 7 - 10 giorni
Anticipo di branchette su astoni di melo non in produzione e vivai: impiegare lt 4,5 - 5,5 per ettaro equivalenti a litri 2,5 per ettolitro sulle parti apicali, su astoni della lunghezza di 50 - 70 cm in piena crescita e con buon sviluppo dell'apparato fogliare.
AVVERTENZE : è bene aggiungere, quando si effettua il trattamento, un bagnante adesivo o un concime fogliare azotato organico per avere una migliore azione - trattare piante sane e vigorose con interventi fatti al mattino o tardo pomeriggio - non trattare con temperatura inferiore a 7°C ne può essere ridotta l'efficacia - adeguare la quantità totale di soluzione per ettaro allo sviluppo delle piante ed alla forma di allevamento - non creare sgocciolamento dopo il trattamento - applicare un getto finemente nebulizzate all'atto del trattamento

COMPATIBILITA': compatibile con i comuni bagnanti, concimi fogliari, zolfo bagnabile ed altri fungicidi comunemente usati in frutticoltura. Evitare di miscelare al prodotto sostanze alcaline (polisolfuri, poltiglia bordolese).
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni provocati dall'uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua- Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

GENIAL PRO

Regolatore di crescita in formulazione liquida

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Gibberelline puro (isomero A4 – A7)	1,8% (19,1 g/l)
6 Benziladenina pura	1,8% (19,1 g/l)
coformulanti	qb a 100

contiene alcool tetraidrofurfurilico

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A.- U.P. SIFA -
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 11682 del 06/06/2003

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100
PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

COSMOS

Insetticida a vasto spettro d'azione per pesco, pero, melo, ortaggi in campo e serra (pisello, pomodoro, cipolla, patata), terreno destinato alla coltura del cavolo cappuccio, vite, arancio, limone, barbabietola da zucchero, soia, tabacco, mais, pioppo, floreali ed ornamentali. Concentrato emulsionabile

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Clorpirifos puro g 45,37 (~ 500 g/l)
Cipermetrina pura g 4,54 (~ 50 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100,00

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile.
Nocivo per inalazione e ingestione
Irritante per le vie respiratorie e la pelle.
Rischio di gravi lesioni oculari.
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
DIACHEM S.p.A - Via Tonale, 15 – 24061 Albano S. Alessandro (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE:
Dow AgroSciences Ltd. - KING'S LYNN - Norfolk (Inghilterra)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: ml 200 – 250 – 500 ; Litri 1 – 5 - 10

REGISTRAZIONE n° 12017 del 18/03/2004 del Ministero della Salute

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CLORPIRIFOS puro 45,37%; CIPERMETRINA pura 4,54%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
Clorpirifos: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione
Sintomi cerebrali: confusione, atassia, convulsioni; coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Cipermetrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
N.B. Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso e' pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NATURA DEL RISCHIO : il prodotto è tossico per i pesci ed insetti utili, è nocivo per animali domestici e bestiame.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO
Dosi riferite a 100 litri di acqua.
PESCO: Afidi: su foglie non accartocciate: 50-75 ml. Anarsia, Cidia, lepidotteri in genere: 75-100 ml. Cocciniglie: contro le neanidi in trattamenti estivi: 80-100 ml. Tripidi, Mosca: 80-100 ml.
Per il controllo degli insetti svernanti e delle uova di acari trattare allo stadio vegetativo di bottone di rosa alla dose di 80-100 ml in miscela con olio 1,5 l/hl.
PERO, MELO :Psilla: (si consiglia di aggiungere un bagnante): 1° trattamento di fine inverno contro adulti svernanti: 75 ml. 2° trattamento sulle uova mature prodotte dalla prima generazione: 100 ml all'apparire delle prime neanidi, 130 ml con inizio di melata. 3° trattamento contro la terza generazione se necessario: 130-180 ml/hl.
Afidi su foglie non accartocciate: 50-80 ml. Fillominatori (Cemiostoma, Litocolletis) contro la prima generazione allo stadio di uova mature, prima della comparsa delle mine: 75-100 ml. Ricamatrici e lepidotteri in genere (generazioni estive): 75-100 ml. Carpocapsa: 75-100 ml. Cocciniglie: contro le neanidi (generaz. estive): 75-100 ml
Per il controllo degli insetti svernanti e delle uova di acari trattare allo stadio compreso fra le orecchie di topo e la differenziazione dei mazzetti fiorali alla dose di 80-100 ml in miscela con olio 1,5 l/hl.
ORTAGGI IN CAMPO E SERRA (pisello, pomodoro, cipolla, patata): contro Dorifora: 70-80 ml. Nottue (allo scoperto): 70-80 ml. Mosca bianca: 50-60 ml. Afidi: 50-60 ml. Cavolaia, Tripidi, Piralide: 70-80 ml.
TERRENO DESTINATO ALLA COLTURA DEL CAVOLO CAPPUCCIO : contro Cavolaia, nottue ed altri lepidotteri alla dose di 850-1100 ml/ha.
VITE: Contro tignole 50-60 ml/hl. Trattare alla comparsa delle prime larve. Cocciniglie e Sigaraio: 50-60 ml/hl.
ARANCIO, LIMONE: Afidi: 50-80 ml. Cocciniglie: contro le neanidi estive 60-80 ml. Aleurodidi-Dialeurodidi: 60-80 ml. Formiche: 200 ml irrorando il terreno in ragione di 10 hl di acqua/ha.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: Altica: 800-1000 ml/ha. Afidi: 400-500 ml/ha. Nottue: 600-800 ml/ha. Cleono, Lisso, Cassida: 700-800 ml/ha
SOIA: contro cimici (Nezara viridula) e lepidotteri fogliari (Vanessa cardui, Choristoneura lafauryana) alla dose di 1,2 l/ha in 800-1000 litri di acqua/ha. Ripetere il trattamento se necessario.
TABACCO: Afidi: 60-80 ml. Mosca bianca: 60-80 ml. Nottue, tripidi: 80-100 ml
MAIS: Afidi: 60-80 ml. Piralide: 80-100 ml
PIOPPO, FLOREALI ORNAMENTALI: Afidi: 60-80 ml. Saperda, Criptorrinco: 80-120 ml
Compatibilità: Il COSMOS non è miscibile con i formulati fungicidi, acaricidi e insetticidi a reazione alcalina.
Intervallo di sicurezza: Sospendere i trattamenti 120 giorni prima della raccolta della soia; 60 giorni nel caso di agrumi, barbabietola e tabacco; 30 giorni per le colture di pero, melo, vite, pesco, mais e patata; 21 giorni per pomodoro e cipolla; 15 giorni per pisello.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

RADIKUR

Fungicida sistemico - Liquido solubile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Propamocarb cloridrato puro g 66,6 (= 720 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A .- Via Tonale, 15 – Albano S.Alessandro (BG)

DISTRIBUITO DA
VE.BI s.a.s. – Via Desman, 43 – Borgoricco (PD)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A .- U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
VE.BI s.a.s. – Via Desman, 43 – Borgoricco (PD)

Registrazione del Ministero della Salute n. 12128 del 25/05/2004

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 20-25-50-100-200-250- 500-750; litri 1–2–3–5

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
Conservare la confezione ben chiusa . Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
CARATTERISTICHE
Si tratta di un fungicida sistemico ad assorbimento prevalentemente radicale.
Risulta indicato nella difesa di numerosi agenti patogeni appartenenti al genere Pythium spp (marciumi e moria delle piantine), Phytophthora spp (Marciumi del colletto e Cancrena pedale), Peronospora spp. (Peronospora delle crucifere, della cipolla, ecc.), Pseudoperonospora cubensis (Peronospora delle cucurbitacee), Bremia lactucae (Peronospora della lattuga), sulle seguenti colture: POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, COCOMERO, MELONE, ZUCCA, ZUCCHINO, CETRIOLO, INSALATE (LATTUGA, CICORIA, INDIVIA, RADICCHIO), BIETOLA ROSSA, BIETOLA DA COSTA E DA FOGLIA, CAROTA, RAPA, AGLIO, CIPOLLA, PORRO, CAVOLI, SPINACIO, PREZZEMOLO, BASILICO, SEDANO, TABACCO, FRAGOLA, COLTURE FLOREALI E ORNAMENTALI, PRATI ORNAMENTALI E CAMPI DA GOLF.

Si impiega inoltre nella difesa di MELO, PERO, AGRUMI E PIANTE FORESTALI sia in vivaio che nei primi anni dopo la messa a dimora contro gli agenti patogeni causati da Pythium spp., Phytophthora (cactorum, parasitica, cinnamoni). Il prodotto, perfettamente tollerato dalle colture in tutte le fasi di sviluppo, risulta estremamente versatile nell'impiego, potendosi applicare per via fogliare e radicale, in concia al seme o per immersione di bulbi e piantine e come disinfezione di terricciati e semenzai.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' DI IMPIEGO
Concia dei semi: 1-4 ml/kg per semi di piccole dimensioni (es. tabacco); 10-40 ml/kg per semi leggeri e di elevata dimensione.
Disinfezione dei terricciati: 300 ml/m ^{3} di terriccio diluiti in 20 litri di acqua
Trattamenti ai semenzai: 8 ml/m^2 di superficie in 4 litri di acqua, ripetendo il trattamento 5 giorni prima del trapianto
Trattamenti in pre-trapianto (bulbi e piantine): immergere in una soluzione allo 0,3% (300 ml/hl) per 20-30 minuti
Trattamenti al terreno in pre-trapianto: 8-12 ml/m ^{2} di superficie in 3-5 litri di acqua
Trattamenti di post-trapianto: distribuire 200 ml/pianta di una soluzione allo 0,2% (200 ml/hl)
Trattamenti fogliari: 1,5 - 3 l/ha in 15-20 hl di acqua per ettaro di superficie.
RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE
Lattuga: contro Bremia lactucae eseguire due interventi fogliari alla dose di 2 l/ha, avendo cura di ripetere il trattamento a distanza di 10 giorni
Melone : contro Pseudoperonospora cubensis intervenire alla scopertura dei tunnel alla dose di 2 l/ha ogni 7-10 giorni ed in miscela eventualmente a clorotalonil.
Garofano e Gerbera: contro Pythium e Phytophthora intervenire due giorni prima dell'impianto alla dose di 12-15 ml/m^2 in 2-4 litri di acqua. Successivamente applicare il prodotto per via fogliare alla dose di 200 ml/hl a distanza di 8-10 giorni (primi due interventi) e 15-25 giorni (interventi successivi).
Vivai di piante forestali: contro Phytophthora spp. e Pythium spp, disinfezione dei terricciati (vedi sopra); dopo l'emergenza della coltura intervenire ogni 15-18 giorni distribuendo 4-5 litri/m^2· di una soluzione allo 0,2% (200 ml/hl).
Campi da golf e prati ornamentali in genere. contro Pythium spp interventi fogliari alla dose di 1-1,5 litri per 1000 mq di superficie impiegando almeno 200 litri di acqua. Ripetere gli interventi a distanza di 14 giorni con condizioni favorevoli alla malattia (temperature ed umidità elevate).
AVVERTENZA: i semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici e nocivi.

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con formulati a base di fungicidi benzimidazolici, clorotalonil, captano, TMTD, mancozeb, folpet e rameici.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.
INTERVALLO DI SICUREZZA : 20 giorni
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

RADIKUR

Fungicida sistemico - Liquido solubile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Propamocarb cloridrato puro g 66,6 (= 720 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A .- Via Tonale, 15 – Albano S.Alessandro (BG)

DISTRIBUITO DA
VE.BI s.a.s. – Via Desman, 43 – Borgoricco (PD)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A .- U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
VE.BI s.a.s. – Via Desman, 43 – Borgoricco (PD)

Registrazione del Ministero della Salute n. 12128 del 25/05/2004

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 20-25-50-100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

DROPPER

Erbicida concentrato emulsionabile

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
Diclofop-metile puro g 27 (287 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A.
Via Tonale, 15
ALBANO S. ALESSANDRO (BG)
DISTRIBUITO DA:
CHEMIA S.p.A. – S.S. 255 - km 46
44040 S. Agostino (FE)
OFFICINA DI PRODUZIONE
CHEMIA S.p.A.- S.S. 255 - km 46 - S. Agostino (FE)
DIACHEM S.p.A.- U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 12353 del 09/12/2004

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 10-20-50-100-200-250-500 litri 1-2-3-5-10-20

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per la cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni.
Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni, ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione; gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
DROPPER è un erbicida di post-emergenza ad azione avenicida/graminicida selettivo su colture di **frumento, orzo, barbabietola da zucchero, patata, cipolla, carota, cavoli, lattuga, spinacio, pisello, fagiolo e fava**. Ne viene indicato l'impiego per il controllo delle seguenti infestanti: Avena spp. (Avena selvatica), Echinochloa crus-galli (Giavone comune), Lolium multiflorum (Loglio perenne), Phalaris sp. (Scagliola), Setaria spp. (Falso panico), Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Digitaria sanguinalis (Sanguinella).
DROPPER agisce per via fogliare e risulta rapidamente assorbito dalla vegetazione delle infestanti. Le infestanti sensibili manifestano, entro 5-10 giorni dal trattamento, ingiallimenti e necrosi fogliari che portano al disseccamento completo delle stesse nell'arco di 15-20 giorni.
MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Distribuire il prodotto in 200-300 litri di acqua per ettaro di superficie.
Ad esclusione dell'orzo, dove si utilizza entro la fase di accestimento, l'applicazione del prodotto può essere eseguita in qualsiasi stadio di sviluppo della coltura e alle dosi seguenti:
Frumento, orzo: 2-3 l/ha
Barbabietola da zucchero: 2.5-3.5 l/ha
Patata, Cipolla: 2.5-3 l/ha
Carota, Cavoli, Lattuga, Spinacio: 2.5-3 l/ha
Pisello, Fagiolo, Fava: 2.5-3 l/ha
La migliore azione erbicida si ottiene intervenendo precocemente sulle infestanti e comunque non oltre gli stadi seguenti:
- Avena spp.: da 2ª foglia fino ad accestimento
- Phalaris sp.: da 2ª foglia fino ad inizio accestimento delle infestanti più sviluppate
- Lolium spp.: da 2ª foglia a 1° nodo
- Setaria spp.: fino a tutto l'accestimento
- Alopecurus myosuroides: sino a prima dell'accestimento
- Echinochloa crus-galli: fino a tutto l'accestimento
- Digitaria sanguinalis: fino a tutto l'accestimento

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con erbicidi ad azione dicotiledonicida quali bromoxinil e ioxinil; si sconsigliano invece miscele con erbicidi ormonici quali ad esempio 2,4 D o MCPA.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi, ecc. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.
INTERVALLO DI SICUREZZA: Cipolla e patata 60 giorni; carota, cavoli, lattuga, spinacio, fagiolo, pisello, fava: 30 giorni
Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 48 ore dal trattamento ed i tempi di carenza indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.
AVVERTENZA: Le miscele con erbicidi ormonici può ridurre l'efficacia graminicida del prodotto, specie in condizioni di siccità.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

DROPPER

Erbicida concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
Diclofop-metile puro g 27 (287 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S. ALESSANDRO (BG)
DISTRIBUITO DA:
CHEMIA S.p.A. – S.S. 255 - km 46
44040 S. Agostino (FE)
OFFICINA DI PRODUZIONE
CHEMIA S.p.A.- S.S. 255 - km 46 - S. Agostino (FE)
DIACHEM S.p.A.- U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 12353 del 09/12/2004

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 10-20-50-100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

MANICA S.p.a.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

POLTIGLIA

Anticrittogamico per uso agricolo
Solfato di rame neutralizzato nella calce
Polvere bagnabile per irrorazioni pronta all'uso

POLTIGLIA Registrazione Ministero della Sanità n. 0683 del 12/09/72

COMPOSIZIONE	
RAME metallico (sotto forma di solfato di rame neutralizzato con calce idrata)	g. 20
Coformulanti q.b. a	g.100

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige 4 - 38068 Rovereto (TN)

FRASI DI RISCHIO: **Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

Contenuto Kg. 20 – 10 – 5 – 2 – 1 – 0.1 – 0.05 – 0.020 – 0.010

Partita n. vedi corpo del sacco

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: **gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.**
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Anticrittogamico: contro la peronospora della vite, della patata, del pomodoro, della cipolla, dei fiori, contro l'occhio di pavone dell'olivo, la ticchiolatura del melo e del pero, la cercospora della barbabietola, il vaiolo e la gommosi del pesco, dell'albicocco e del ciliegio. Indicato comunque nei trattamenti invernali degli alberi da frutto, e consigliabile nei trattamenti dopo la fioritura della vite.
Dosi per ogni 100 litri di acqua:

MELO e PERO (ticchiolatura): - nei trattamenti al bruno **Kg. 2**
- nei trattamenti al verde non consigliata

PESCO, SUSINO, CILIEGIO, MANDORLO (bolla, corineo o gommosi, batteriosi, cancri rameali):
nei soli trattamenti al bruno **Kg. 1**

OLIVO (contro occhio di pavone, cancri rameali): - nei trattamenti al bruno **Kg. 1,5-2**

VITE (peronospora):
- nei trattamenti al verde **Kg. 1-1,5**
- prima della fioritura **Kg. 0,5**
- dopo la fioritura **Kg. 0,8-1**

ORTOFRUTTICOLTURA (contro le principali crittogame della patata, pomodoro, cipolla, barbabietola): **Kg. 0,5-1**

GIARDINAGGIO (contro le principali crittogame del cipresso, oleandro, rose): **Kg. 0,5-1**

FLORICOLTURA (contro le principali crittogame, macchie fogliari del geranio, garofano, crisantemo): **Kg. 0,5**

Si versa il quantitativo nell'acqua già preparata nel serbatoio, si mescola, ed è pronto all'uso.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è miscibile con gli insetticidi comuni, con gli zolfi bagnabili.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Si sconsigliano le irrorazioni durante la fioritura della vite e quando la temperatura va al di sotto dei 7 gradi. Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
(*) Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana.
(**) Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 20 giorni

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

POLTIGLIA

Anticrittogamico per uso agricolo
Solfato di rame neutralizzato nella calce
Polvere bagnabile per irrorazioni pronta all'uso

POLTIGLIA Registrazione Ministero della Sanità n. 0683 del 12/09/72

COMPOSIZIONE
RAME metallico g. 20
(sotto forma di solfato di rame neutralizzato con calce idrata)
Coformulanti q.b. a g.100

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige 4 - 38068 Rovereto (TN)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Contenuto g. **10-20-50-100** Partita n. vedi corpo del sacco

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

ZOLVIS 80

Fungicida a base di zolfo bagnabile micronizzato per il controllo dell'oidio, ticchiolatura e moniliosi in viticoltura, frutticoltura, orto-floricoltura

ZOLVIS 80 Registrazione Ministero della Sanità n. 4292 dell'01/04/1981

COMPOSIZIONE	
ZOLFO puro (esente da Selenio)	g. 80
Coformulanti q.b. a	g.100

Partita n.

IRRITANTE

Contenuto 10-20-50-100-200-250-300-400-500-700-750 g 1-2-5-10-25 Kg

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimenti di produzione:
MANICA SpA - Rovereto (TN)
STI - SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Cotignola (Ravenna)
SAPEC AGRO, S.A. - Ap.do 11 - Setubal (Portogallo)
SULPHUR MILLS LIMITED –Mumbai (India)
Stabilimenti di confezionamento: **SINAPAK Snc** – Stradella (PV)

FRASI DI RISCHIO: **Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.**

NORME PRECAUZIONALI: **Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Lo ZOLVIS 80 è un fungicida specifico per il controllo in viticoltura, frutticoltura, orto-floricoltura e in numerose altre colture agrarie ed ornamentali, dell'oidio, della ticchiolatura, dell'escoriosi, lebbra e moniliosi.
Lo ZOLVIS 80, grazie alla sua formulazione assicura una copertura uniforme della vegetazione, con conseguente elevata azione preventiva, eradicante e curativa della malattia a partire da 10°C. Nella speciale formulazione in microgranuli evita la fastidiosa polverosità tipica dei preparati tradizionali in polvere pur mantenendo una perfetta solubilità in acqua.

MODALITÀ, DOSI e CAMPI D'IMPIEGO
Lo ZOLVIS 80 si impiega diluito in acqua, con pompe a volume normale, con le seguenti modalità:
VITE: contro Oidio g. 200-400/hl iniziare i trattamenti molto presto (germogli 5-10 cm), proseguire poi in abbinamento con i prodotti antiperonosporici (Poltiglia Bordolese Industriale Manica). Nelle situazioni di forte pressione della malattia, per ottenere una più persistente durata d'azione ed un'azione eradicante e curativa, impiegare la dose di g. 600-1000/hl.
POMACEE (MELO, PERO): contro l'Oidio e ticchiolatura del melo g. 600/hl nei trattamenti pre-fiorali; g. 200-400/hl nei trattamenti post-fiorali. Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-12 giorni (adottando l'intervallo più breve al verificarsi delle condizioni climatiche più favorevoli alla malattia).
DRUPACEE (PESCO, NETTARINE, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO) E MANDORLO: contro Oidio g. 200-600/hl. Su **albicocco**, **pesco** e **nettarine** usare la dose più alta in pre-fioritura e dopo la raccolta, alla dose di g. 200-400/hl dopo la fioritura ripetendo i trattamenti dopo 10-15 giorni (adottando l'intervallo più breve al verificarsi delle condizioni climatiche più favorevoli alla malattia).
FRAGOLA: contro Oidio g. 200-500/hl.
NOCCIOLO: contro Oidio ed Eriofide g. 200-500/hl.
ORTAGGI: contro Oidio g. 200-500/hl. Intervenire alla comparsa dei primi sintomi della malattia e ripetere ad intervalli di 7-15 giorni (adottando l'intervallo più breve al verificarsi delle condizioni climatiche più favorevoli alla malattia). **Pisello** g. 200/hl, **pomodoro** g. 200-400/hl, **melone** g. 300-350/hl, **cocomero**, **cetriolo**, **zucca** g. 200-300/hl.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Oidio 8 Kg/ha dalla comparsa della malattia e proseguire con cadenza di circa 20 giorni.
CEREALI: 8 Kg/ha. Trattare alla comparsa della malattia dalla "levata" alla "spigatura".
FLOREALI ED ORNAMENTALI: contro Oidio g. 200-500/hl, intervenire alla comparsa dei primi sintomi della malattia.

PREPARAZIONE
Stemperare in poca acqua la prestabilita dose di prodotto e versare poi nel totale quantitativo di acqua mescolando accuratamente. Per la preparazione dei trattamenti antiparassitari composti da più principi attivi versare per ultimo lo ZOLVIS 80 preventivamente stemperato a parte.

COMPATIBILITÀ
Lo ZOLVIS 80 non è compatibile con antiparassitari alcalini, con oli minerali e captano.
Avvertenze agronomiche: Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego di oli minerali e captano.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
In tutti i campi di applicazione seguire le norme di buona pratica agricola evitando le ore di maggiore calore della giornata. Su cultivar sensibili effettuare prove preliminari su piccola scala.
Il prodotto può arrecare danno alle cultivar di:
MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.
PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

D_ 65/2003

Etichetta formato ridotto

ZOLVIS 80

Fungicida a base di zolfo bagnabile micronizzato per il controllo dell'oidio, ticchiolatura e moniliosi in viticoltura, frutticoltura, orto-floricoltura

ZOLVIS 80 Registrazione Ministero della Sanità n. 4292 dell'01/04/1981

COMPOSIZIONE	
ZOLFO puro (esente da Selenio)	g. 80
Coformulanti q.b. a	g.100

Partita n.

IRRITANTE

Contenuto
10-20-50-100 g

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimenti di produzione:
MANICA SpA - Rovereto (TN)
STI - SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Cotignola (Ravenna)
SAPEC AGRO, S.A. - Ap.do 11 - Setubal (Portogallo)
SULPHUR MILLS LIMITED –Mumbai (India)
Stabilimenti di confezionamento: **SINAPAK Snc** – Stradella (PV)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta..

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

Etichetta/foglio illustrativo

POLVERE TIPO BORDOLESE MANICA

Anticrittogamico per uso agricolo
Solfato di rame neutralizzato nella calce
Polvere bagnabile per irrorazioni pronta all'uso

POLVERE TIPO BORDOLESE MANICA Registrazione Ministero della Sanità n. 6143 del 29/11/84

COMPOSIZIONE	
RAME metallico	g. 13
(sotto forma di solfato di rame neutralizzato con calce idrata)	g.100
Coformulanti q.b. a	

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige 4 - 38068 Rovereto (TN)

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Contenuto 10-20-50-100 g 1-2-5-10-25 kg Partita n.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Anticrittogamico: contro la peronospora della vite, della patata, del pomodoro, della cipolla, delle colture floreali, contro l'occhio di pavone dell'olivo, la ticchiolatura del melo e del pero, la cercospora della barbabietola, il vaiolo e la gommosi del pesco, dell'albicocco e del ciliegio. Indicato comunque nei trattamenti invernali degli alberi da frutto, e consigliabile nei trattamenti dopo la fioritura della vite.

Dose di impiego: Kg. 1-2/hl.
Melo e Pero: nei soli trattamenti al bruno **Kg. 2-3/hl**

Si versa il quantitativo nell'acqua già preparata nel serbatoio, si mescola, ed è pronto all'uso.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è miscibile con i più comuni insetticidi, con gli zolfi bagnabili.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Si sconsigliano le irrorazioni quando la temperatura va al di sotto dei 7 gradi. Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco e varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
(*) Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana.
(**) Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 20 giorni.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

D . 65/2003

Etichetta formato ridotto

POLVERE TIPO BORDOLESE MANICA

Anticrittogamico per uso agricolo
Solfato di rame neutralizzato nella calce
Polvere bagnabile per irrorazioni pronta all'uso

POLVERE TIPO BORDOLESE MANICA Registrazione Ministero della Sanità n. 6143 del 29/11/84

COMPOSIZIONE
RAME metallico g. 13
(sotto forma di solfato di rame neutralizzato con calce idrata)
Coformulanti q.b. a g.100

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige 4 - 38068 Rovereto (TN)

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto 10-20-50-100 g Partita n.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

OSSICLOR 50

Rame adesivo Manica

OSSICLOR 50 Registrazione Ministero della Sanità n. 6653 del 18.03.1986

COMPOSIZIONE	
- RAME metallico	g. 50
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)	
- Supporti e disperdenti q.b. a	g.100

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione:

SULCOSA S.A. – Sancho de Rivera, 1215 Lima 01 (Perù)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Quantità netta: 1-5-10-20 Kg Partita n.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Ossicloruro di rame in polvere bagnabile attivo nella lotta contro la peronospora della vite e altre malattie crittogamiche.

E' dotato di persistenza e resistenza al dilavamento.

Vite: contro peronospora: trattamenti primaverili-estivi: gr. 300-400

Mele e pero: contro cancro trattamenti autunno-invernali: gr. 800-1000.

Ticchiolatura; nei trattamenti invernali: gr. 800-1000; nei trattamenti Primaverili all'ingrossamento delle gemme: gr. 300-450; alla comparsa dei mazzetti fiorali gr. 200-250.

Pesco, ciliegio, albicocco, susino, mandorlo, nespolo: contro Bolla, Lebbra, Scopazi, Ruggini, Corineo, Sclerotinia alla caduta delle foglie gr. 1000-1200; a fine inverno gr. 800-1000; a gemme rigonfie gr. 600-800.

Agrumi: contro Malsecco, Fusaggini gr. 300-400

Olivo: contro Occhio di Pavone e Lebbra gr. 300-400

Barbabietola da zucchero: contro Cercospora Kg. 4 per Ha.

Colture ortive: contro Alternaria, Peronospora, Antracnosi, Septoria del: pomodoro, patata, fragola, sedano, pisello, carciofo, carota, cipolla, cetriolo, spinacio, cavolo, cardo, rapa, zucca, prezzemolo, cicoria, insalata, fagiolo, asparago, melanzana, melone, ravanello gr. 200-400

Colture floreali e ornamentali: Peronospora, Ruggini, Septoria, Maculatura Nera gr. 250-300.

Le dosi sopra indicate si riferiscono a 100 lt. acqua.

Concia a secco delle sementi: I semi trattati e residuati della semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi. Gr. 100-150/q.le.

MODALITA DI IMPIEGO: Si stempera la dose di OSSICLOR 50 in poca acqua, quindi rimescolando si diluisce fino alla concentrazione voluta.

COMPATIBILITÀ: è compatibile con Zolfo Bagnabile per la lotta contemporanea contro oidio e peronospora, con i comuni antiparassitari non alcalini e con gli integratori fogliari. Non è compatibile con gli anticrittogamici contenenti TMTD.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susine, albicocco, mandorlo, nespolo e sulle seguenti varietà di melo (Abbondanza «Belford» - Black Stayman - Golden Delicious - Gravenstein – Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft – Stayman - Stayman Red - Stayman Winesap - Black Davis - King David - Renetta del Canada - Rosa Mantovana); e di pero (Abate Fetel - Buona Luigia D'Avranches - Butirra Clairgeau – Passacrassana - B.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp – Kaiser - Butirra Giffard), cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

VITISAN

(POLVERE BAGNABILE)

Fungicida cupro-organico per la lotta contro la Peronospora, l'Alternaria, la Septoria, l'Antracnosi e le altre crittogame della vite, del melo, del pero e del pomodoro.

VITISAN Registrazione Ministero della Sanità n.9597 del14.04.1998

COMPOSIZIONE	
RAME metallico	g. 9
(da solfato di rame neutralizzato con calce spento)	
MANCOZEB	g. 21,4
Coformulanti q.b. a	g.100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
SULPHUR MILLS LIMITED – Mumbai –(India)
DUSLO – Sala (Slovacchia)
DIACHEM S.p.A. - U.P.SIFA, Caravaggio (BG)
CHEMIA S.p.A. – S.Agostino (FE)

Contenuto 50 g - 100 g - 1 Kg - 2 Kg - 5 Kg - 10 Kg - 20 Kg Partita n.

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Irritante per le vie respiratorie. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare al riparo dall'umidità. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: MANCOZEB 21,4% e RAME 9% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
RAME - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
MANCOZEB - sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il VITISAN è efficace contro la Peronospora della **vite** e del **pomodoro** (trattamenti fino alla prima fioritura) e contro la Ticchiolatura del **melo** e del **pero**; è attivo inoltre nei confronti di tutte le crittogame sensibili al rame ed ai ditiocarbammati (Alternaria, Septoria, Antracnosi, ecc.).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
VITE: contro Peronospora, 400-600 g di prodotto per 100 litri di acqua. Il prodotto può essere usato durante tutto il periodo vegetativo, ripetendo i trattamenti ogni 10-12 giorni. Sulla vite, subito dopo l'allegagione, irrobustisce la buccia degli acini ed esplica un notevole effetto collaterale contro Botrytis e Mal bianco od Oidio.
MELO E PERO: contro Ticchiolatura, Alternaria, Septoria e Ruggine 400-600 g di prodotto per 100 litri di acqua. Intervenire a partire dalla comparsa delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia e proseguire i trattamenti secondo i normali calendari di lotta.
POMODORO (fino alla prima fioritura): contro Peronospora e Alternaria 400-600 g di prodotto per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti alla prima comparsa dei sintomi intervenendo ogni 8-12 giorni.
Le dosi d'impiego si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale. Nel caso di trattamenti a volume ridotto, le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Formare una pasta semiliquida mescolando la dose di VITISAN in poca acqua; quindi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente, continuando a mescolare.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto riduce leggermente l'attività dei fosforganici.
AVVERTENZA: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non si deve trattare durante la fioritura. Su varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
(*) Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana.
(**) Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON IMPIEGARE IN SERRA

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

VITISAN

(POLVERE BAGNABILE)

Fungicida cupro-organico per la lotta contro la Peronospora, l'Alternaria, la Septoria, l'Antracnosi e le altre crittogame della vite, del melo, del pero e del pomodoro.

VITISAN Registrazione Ministero della Sanità n.9597 del14.04.1998

COMPOSIZIONE	
RAME metallico	g. 9
(da solfato di rame neutralizzato con calce spento)	
MANCOZEB	g. 21,4
Coformulanti q.b. a	g.100

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
SULPHUR MILLS LIMITED – Mumbai –(India)
DUSLO – Sala (Slovacchia)
DIACHEM S.p.A. - U.P.SIFA, Caravaggio (BG)
CHEMIA S.p.A. – S.Agostino (FE)

Contenuto 50 g - 100 g Partita n.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Irritante per le vie respiratorie. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare al riparo dall'umidità. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: MANCOZEB 21,4% e RAME 9% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
RAME - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
MANCOZEB - sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

OSSICLOR 20 NC

Anticrittogamico in polvere bagnabile

OSSICLOR 20 NC Registrazione Ministero della Sanità n. 9598 del 14.04.1998

COMPOSIZIONE	
RAME metallico	g. 20
(sotto forma di ossicloruro)	
Coformulanti q.b. a	g.100

Contenuto
50 g-100 g-1 Kg-2 Kg-5 Kg-10 Kg-20 Kg
Partita n

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)
SULCOSA S.A. – Sancho de Rivera, 1215 Lima (PERU')

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
L'OSSICLOR 20 NC è un anticrittogamico in polvere bagnabile micronizzata, dotato di adesività, persistenza ed efficacia. È indicato nella lotta contro: Peronospora della vite; Ticchiolatura delle Pomacee; Bolla e Corineo delle drupacee nei trattamenti autunno-invernali; Cancro dei rametti; Sclerotinia in genere; Occhio di pavone, Lebbra e Fumaggine dell'Olivo; Mal secco, Gommosi, Allupatura, Batteriosi, Fumaggine degli agrumi; Cercosporiosi della barbabietola; Peronospora, Septoriosi, Alternariosi di colture orticole e floreali in pieno campo.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
FRUTTIFERI
VITE: contro Peronospora: **600-750 g/hl**.
POMACEE (MELO E PERO): contro Ticchiolatura e Cancri rameali:
- nei trattamenti autunnali o di fine inverno: **1,5-2,250 Kg/hl;**
- nei trattamenti estivi: **600-750 g/hl**.
DRUPACEE: contro Bolla del pesco, Corineo e Cancro dei rametti:
- nei trattamenti invernali: **1,5-1,8 Kg/hl**.
OLIVO: contro Occhio di pavone, Lebbra e Fumaggine: **600-750 g/hl**.
AGRUMI: contro Mal secco, Antracnosi, Fumaggine, Gommosi, Batteriosi, Allupatura: **600-750 g/hl**.
COLTURE ORTICOLE
POMODORO, MELANZANA: contro Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi, Batteriosi: **750-900 g/hl**.
SEDANO, CAROTA, PREZZEMOLO: contro Cercospora, Septoria: **600-750 g/hl**.
MELONE, ANGURIA, ZUCCHINO E CETRIOLO: contro Peronospora ed Antracnosi: **600-750 g/hl**.
PISELLO E FAGIOLO: contro Antracnosi e Ruggine: **600-750 g/hl**.
CIPOLLA, CARCIOFO, CARDO E CAVOLI: contro Peronospora: **600-900 g/hl**.
PATATA: contro Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi, Batteriosi: **600-900 g/hl**.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cercospora: **6-9 Kg/ha**.
COLTURE FLOREALI IN PIENO CAMPO: contro Ruggine, Peronospora, Septoria, Ticchiolatura: **600-750 g/hl**.
Le dosi si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale. Nel caso di trattamenti a volume ridotto, le dosi vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Stemperare la dose prestabilita di prodotto in poca acqua e quindi portare a volume tenendo in agitazione la massa.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con la generalità degli antiparassitari in commercio.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
(*) Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana.
(**) Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.
Avvertenza: non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

OSSICLOR 20 NC

Anticrittogamico in polvere bagnabile

OSSICLOR 20 NC Registrazione Ministero della Sanità n. 9598 del 14.04.1998

COMPOSIZIONE	
RAME metallico	g. 20
(sotto forma di ossicloruro)	
Coformulanti q.b. a	g.100

Contenuto: **50 g-100 g**
Partita n

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)
SULCOSA S.A. – Sancho de Rivera, 1215 Lima (PERU')

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

Etichetta/foglio illustrativo

CURAME®

(POLVERE BAGNABILE)

Antiperonosporico per la difesa della vite e di altre colture orticole e industriali

CURAME Registrazione Ministero della Sanità n. 9599 del 14.04.1998

COMPOSIZIONE	
CIMOXANIL puro	g. 4,2
RAME metallico	g. 40
(sotto forma di ossicloruro di rame)	
Coformulanti q.b. a	g.100

Contenuto: Partita n.

50-100-200-250-300-500 g 1-2-5-10-20 Kg

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione:

S.T.I. Solfotecnica Italiana SpA – Cotignola (RA)

A.D.I.C.A. Srl – Nera Monitoro (Terni)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4,2% e RAME 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

RAME - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: sintomatica

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il CURAME è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la Peronospora e di altre crittogame di **vite, patata, pomodoro, spinacio, carciofo, soia, girasole, lattuga, cipolla, aglio, porro, melone, zucchino, pisello, tabacco e rosa** con un effetto collaterale contro le altre malattie fungine di dette colture. Il CURAME è una miscela di due principi attivi, di cui l'ossicloruro di rame possiede una lunga persistenza di azione, mentre il secondo ha prontezza d'azione ed effetto curativo, in quanto penetra nelle foglie.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE: contro Peronospora 200-300 g di prodotto in 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche. Intervenire ad ogni infezione (o più semplicemente dopo ogni pioggia) oppure preventivamente ogni 8-10 giorni; tale intervallo può essere ridotto a 6-8 giorni in caso di piogge ripetute e nelle fasi di rapido accrescimento vegetativo.

PATATA, POMODORO E TABACCO: contro Peronospora, Alternaria e Septoria, 300 g di prodotto in 100 litri di acqua. Iniziare gli interventi al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo delle malattie e proseguire con un intervallo di 8-10 giorni; tale intervallo deve essere ridotto a 6-8 giorni in caso di forti attacchi o di rapido accrescimento della vegetazione.

SPINACIO, CARCIOFO, SOIA, GIRASOLE, LATTUGA, CIPOLLA, AGLIO, PORRO, MELONE, ZUCCHINI, PISELLO E ROSA: contro Peronospora 200-300 g di prodotto in 100 litri di acqua. Iniziare gli interventi al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia e proseguire con un intervallo di 6-10 giorni. In caso siano già presenti i primi sintomi, effettuare due trattamenti ravvicinati distanziati 4-5 giorni l'uno dall'altro. Il prodotto è pure attivo contro Antracnosi, Septoria, Batteriosi e Cercosporiosi.

Preparazione della miscela: Stemperare la quantità di prodotto prevista in poca acqua a parte; quindi versare la poltiglia così ottenuta nel serbatoio dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua e, continuando a mescolare, aggiungere il restante quantitativo di acqua fino al volume desiderato.

COMPATIBILITÀ

Il CURAME può essere miscelato a tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia l'impiego del prodotto in miscela con prodotti a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ - Non trattare durante la fioritura.

Avvertenza: Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta per SOIA e GIRASOLE, 21 giorni per CARCIOFO, 20 giorni per le altre colture.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto

CURAME®

(POLVERE BAGNABILE)

Antiperonosporico per la difesa della vite e di altre colture orticole e industriali

CURAME Registrazione Ministero della Sanità n. 9599 del 14.04.1998

COMPOSIZIONE	
CIMOXANIL puro	g. 4,2
RAME metallico	g. 40
(sotto forma di ossicloruro di rame)	
Coformulanti q.b. a	g.100

Contenuto: 50-100 g Partita n.

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

NOCIVO

Stabilimento di produzione:
S.T.I. Solfotecnica Italiana SpA – Cotignola (RA)
A.D.I.C.A. Srl – Nera Monitoro (Terni)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4,2% e RAME 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
RAME - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

OSSICLOR 20 BLU

Anticrittogamico in polvere bagnabile

OSSICLOR 20 BLU Registrazione Ministero della Sanità n. 9610 del 20.04.1998

COMPOSIZIONE	
RAME metallico	g. 20
(sotto forma di ossicloruro)	
Coformulanti q.b. a	g.100

Contenuto
50 g-100 g-1 Kg-2 Kg-5 Kg-10 Kg-20 Kg
Partita n

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)
SULCOSA S.A. – Sancho de Rivera, 1215 Lima (PERU')

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
L'OSSICLOR 20 BLU è un anticrittogamico in polvere bagnabile micronizzata, dotato di adesività, persistenza ed efficacia. È indicato nella lotta contro: Peronospora della vite; Ticchiolatura delle Pomacee; Bolla e Corineo delle drupacee nei trattamenti autunno-invernali; Cancro dei rametti; Sclerotinia in genere; Occhio di pavone, Lebbra e Fumaggine dell'Olivo; Mal secco, Gommosi, Allupatura, Batteriosi, Fumaggine degli agrumi; Cercosporiosi della barbabietola; Peronospora, Septoriosi, Alternariosi di colture orticole e floreali in pieno campo.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
FRUTTIFERI
VITE: contro Peronospora: **600-750 g/hl**.
POMACEE (MELO E PERO): contro Ticchiolatura e Cancri rameali:
- nei trattamenti autunnali o di fine inverno: **1,5-2,250 Kg/hl;**
- nei trattamenti estivi: **600-750 g/hl**.
DRUPACEE: contro Bolla del pesco, Corineo e Cancro dei rametti:
- nei trattamenti invernali: **1,5-1,8 Kg/hl**.
OLIVO: contro Occhio di pavone, Lebbra e Fumaggine: **600-750 g/hl**.
AGRUMI: contro Mal secco, Antracnosi, Fumaggine, Gommosi, Batteriosi, Allupatura: **600-750 g/hl**.
COLTURE ORTICOLE
POMODORO, MELANZANA: contro Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi, Batteriosi: **750-900 g/hl**.
SEDANO, CAROTA, PREZZEMOLO: contro Cercospora, Septoria: **600-750 g/hl**.
MELONE, ANGURIA, ZUCCHINO E CETRIOLO: contro Peronospora ed Antracnosi: **600-750 g/hl**.
PISELLO E FAGIOLO: contro Antracnosi e Ruggine: **600-750 g/hl**.
CIPOLLA, CARCIOFO, CARDO E CAVOLI: contro Peronospora: **600-900 g/hl**.
PATATA: contro Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi, Batteriosi: **600-900 g/hl**.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cercospora: **6-9 Kg/ha**.
COLTURE FLOREALI IN PIENO CAMPO: contro Ruggine, Peronospora, Septoria, Ticchiolatura: **600-750 g/hl**.
Le dosi si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale. Nel caso di trattamenti a volume ridotto, le dosi vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Stemperare la dose prestabilita di prodotto in poca acqua e quindi portare a volume tenendo in agitazione la massa.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con la generalità degli antiparassitari in commercio.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
(*) Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana.
(**) Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Avvertenza: non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

OSSICLOR 20 BLU

Anticrittogamico in polvere bagnabile

OSSICLOR 20 BLU Registrazione Ministero della Sanità n. 9610 del 20.04.1998

COMPOSIZIONE	
RAME metallico	g. 20
(sotto forma di ossicloruro)	
Coformulanti q.b. a	g.100

Contenuto
50 g-100 g

Partita n

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)
SULCOSA S.A. – Sancho de Rivera, 1215 Lima (PERU')

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

OSSICLOR 30 NC

Anticrittogamico in polvere bagnabile

OSSICLOR 30 NC Registrazione Ministero della Salute n. 9611 del 20.04.1998

COMPOSIZIONE	
RAME metallico	g. 30
(sotto forma di ossicloruro)	
Coformulanti q.b. a	g.100

Contenuto
50 g-100 g-1 Kg-2 Kg-5 Kg-10 Kg-20 Kg
Partita n

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)
SULCOSA S.A. – Sancho de Rivera, 1215 Lima (PERU')

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: **Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

NORME PRECAUZIONALI: **Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: **denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.**

Terapia: **gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.**

Avvertenza: **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE

L'OSSICLOR 30 NC è un anticrittogamico in polvere bagnabile micronizzata, dotato di adesività, persistenza ed efficacia. È indicato nella lotta contro: Peronospora della vite; Ticchiolatura delle Pomacee; Bolla e Corineo delle drupacee nei trattamenti autunno-invernali; Cancro dei rametti; Sclerotinia in genere; Occhio di pavone, Lebbra e Fumaggine dell'Olivo; Mal secco, Gommosi, Allupatura, Batteriosi, Fumaggine degli agrumi; Cercosporiosi della barbabietola; Peronospora, Septoriosi, Alternariosi di colture orticole e floreali in pieno campo.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

FRUTTIFERI

VITE: contro Peronospora: **400-500 g/hl**.
POMACEE (MELO E PERO): contro Ticchiolatura e Cancri rameali:
- nei trattamenti autunnali o di fine inverno: **1-1,5 Kg/hl;**
- nei trattamenti estivi: **400-500 g/hl**.

DRUPACEE: contro Bolla del pesco, Corineo e Cancro dei rametti:
- nei trattamenti invernali: **1-1,2 Kg/hl.**

OLIVO: contro Occhio di pavone, Lebbra e Fumaggine: **400-500 g/hl**.
AGRUMI: contro Mal secco, Antracnosi, Fumaggine, Gommosi, Batteriosi, Allupatura: **400-500 g/hl**.

COLTURE ORTICOLE

POMODORO, MELANZANA: contro Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi, Batteriosi: **500-600 g/hl**.
SEDANO, CAROTA, PREZZEMOLO: contro Cercospora, Septoria: **400-500 g/hl**.
MELONE, ANGURIA, ZUCCHINO E CETRIOLO: contro Peronospora ed Antracnosi: **400-500 g/hl**.
PISELLO E FAGIOLO: contro Antracnosi e Ruggine: **400-500 g/hl.**
CIPOLLA, CARCIOFO, CARDO E CAVOLI: contro Peronospora: **400-600 g/hl**.
PATATA: contro Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi, Batteriosi: **400-600 g/hl**.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cercospora: **4-6 Kg/ha**.
COLTURE FLOREALI IN PIENO CAMPO: contro Ruggine, Peronospora, Septoria, Ticchiolatura: **400-500 g/hl**.

Le dosi si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale. Nel caso di trattamenti a volume ridotto, le dosi vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Stemperare la dose prestabilita di prodotto in poca acqua e quindi portare a volume tenendo in agitazione la massa.

COMPATIBILITÀ - Il prodotto è compatibile con la generalità degli antiparassitari in commercio.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
(*) Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana.
(**) Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Avvertenza: non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

D. 65/2003

ETICHETTA/FORMATO RIDOTTO

OSSICLOR 30 NC

Anticrittogamico in polvere bagnabile

OSSICLOR 30 NC Registrazione Ministero della Salute n. 9611 del 20.04.1998

COMPOSIZIONE	
RAME metallico (sotto forma di ossicloruro)	g. 30
Coformulanti q.b. a	g.100

Contenuto
50 g-100 g
Partita n

NOCIVO

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)
SULCOSA S.A. – Sancho de Rivera, 1215 Lima (PERU')

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

Etichetta/foglio illustrativo

OSSICLOR® 30

Anticrittogamico in polvere bagnabile

OSSICLOR 30 Registrazione Ministero della Sanità n. 9612 del 20.04.1998

COMPOSIZIONE	
RAME metallico	g. 30
(sotto forma di ossicloruro)	
Coformulanti q.b. a	g.100

Partita n.

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimenti di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)
SULCOSA S.A. – Sancho de Rivera, 1215 Lima (PERÙ)

Contenuto **50 g – 100 g – 1 Kg – 2 Kg – 5 Kg – 10 Kg – 20 Kg**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
L'OSSICLOR 30 è un anticrittogamico in polvere bagnabile micronizzata, dotato di adesività, persistenza ed efficacia. È indicato nella lotta contro: Peronospora della vite; Ticchiolatura delle Pomacee; Bolla e Corineo delle drupacee nei trattamenti autunno-invernali; Cancro dei rametti; Sclerotinia in genere; Occhio di pavone, Lebbra e Fumaggine dell'Olivo; Mal secco, Gommosi, Allupatura, Batteriosi, Fumaggine degli agrumi; Cercosporiosi della barbabietola; Peronospora, Septoriosi, Alternariosi di colture orticole e floreali in pieno campo.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
FRUTTIFERI
VITE: contro Peronospora: **400-500 g/hl**.
POMACEE (MELO E PERO): contro Ticchiolatura e Cancri rameali:
- nei trattamenti autunnali o di fine inverno: **1-1,5 Kg/hl**;
- nei trattamenti estivi: **400-500 g/hl**.

DRUPACEE: contro Bolla del pesco, Corineo e Cancro dei rametti:
- nei trattamenti invernali: **1-1,2 Kg/hl.**
OLIVO: contro Occhio di pavone, Lebbra e Fumaggine: **400-500 g/hl.**
AGRUMI: contro Mal secco, Antracnosi, Fumaggine, Gommosi, Batteriosi, Allupatura: **400-500 g/hl.**
COLTURE ORTICOLE
POMODORO, MELANZANA: contro Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi, Batteriosi: **500-600 g/hl**.
SEDANO, CAROTA, PREZZEMOLO: contro Cercospora, Septoria: **400-500 g/hl.**
MELONE, ANGURIA, ZUCCHINO E CETRIOLO: contro Peronospora ed Antracnosi: **400-500 g/hl.**
PISELLO E FAGIOLO: contro Antracnosi e Ruggine: **400-500 g/hl**.
CIPOLLA, CARCIOFO, CARDO, E CAVOLI: contro Peronospora: **400-600 g/hl**.
PATATA: contro Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi, Batteriosi: **400-600 g/hl.**
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cercospora: **4-6 Kg/ha.**
COLTURE FLOREALI IN PIENO CAMPO: contro Ruggine, Peronospora, Septoria, Ticchiolatura: **400-500 g/hl**.
Le dosi si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale. Nel caso di trattamenti a volume ridotto, le dosi vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Stemperare la dose prestabilita di prodotto in poca acqua e quindi portare a volume tenendo in agitazione la massa.

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
(*) Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana.
(**) Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

Etichetta/foglio illustrativo

OSSICLOR® 30

Anticrittogamico in polvere bagnabile

OSSICLOR 30 Registrazione Ministero della Sanità n. 9612 del 20.04.1998

COMPOSIZIONE	
RAME metallico	g. 30
(sotto forma di ossicloruro)	
Coformulanti q.b. a	g.100

Partita n.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimenti di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)
SULCOSA S.A. – Sancho de Rivera, 1215 Lima (PERÙ)

Contenuto **50 g – 100 g**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

IDROX MANICA

(POLVERE BAGNABILE)

Fungicida a base di idrossido di Rame per la lotta contro le malattie fungine di Fruttiferi, Vite, Olivo, Ortaggi, Patata, Pomodoro, Barbabietola da zucchero, Oleaginose, Tabacco, Floreali, Ornamentali, Forestali e per la lotta contro le alghe delle risaie.

IDROX MANICA Registrazione Ministero della Sanità n. 10008 del 09.04.1999

COMPOSIZIONE	
- RAME metallo puro	g. 25
(sotto forma di idrossido di rame)	
- Coformulanti q.b. a	g.100

Partita n.

Contenuto
100-200-500 g
1-2-5-10-20 Kg

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimenti di produzione:
SULCOSA S.A. - Sancho de Rivera, 1215 - Lima (Perù)
DIACHEM S.p.A. – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
CHEMIA S.p.A. – S. Agostino (FE)

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Tossico per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il IDROX MANICA è un fungicida in polvere bagnabile, a base di idrossido di Rame per la lotta contro le malattie fungine di **Fruttiferi, Vite, Olivo, Ortaggi, Patata, Pomodoro, Barbabietola da zucchero, Oleaginose, Tabacco, Floreali, Ornamentali, Forestali** e per la lotta contro le alghe delle risaie.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle seguenti dosi riferite a 100 litri d'acqua, irrorati con pompe a volume normale. Effettuando i trattamenti con pompe a volume ridotto, le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate per distribuire la stessa quantità di prodotto, per unità di superficie. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere alla miscela 50 g/hl di bagnante.
PESCO E NETTARINE: contro Bolla e Corineo: in trattamenti autunnali Kg. 1-2; in trattamenti di fine inverno gr. 400-600.
ALBICOCCO E SUSINO: contro Sclerotinia, Marciume bruno, Corineo e Bozzacchioni: in trattamenti invernali Kg. 1-2; in trattamenti pre-fiorali gr. 400-600.
CILIEGIO: contro Sclerotinia, Corineo, Scopazzi Kg. 1-2 in trattamenti autunno-invernali.
MANDORLO: contro Corineo, Bolla e Monilia con interventi alla caduta delle foglie, all'ingrossamento delle gemme e subito prima della fioritura gr. 400-600. Per interventi post-floreali mantenere inalterata la dose; gr. 600 contro Batteriosi (Pseudomonas) intervenendo prima della fase dei bottoni rosa.
NOCCIOLO: contro Batteriosi (Xanthomonas corylina) gr. 400-600 con due trattamenti in ottobre distanziati ci circa 20-25 giorni uno dall'altro.

NOCE: contro Mal secco gr. 400-600. Intervenire in pre-fioritura; in caso di piogge frequenti sono necessarie applicazioni supplementari. In estate si consiglia di aggiungere ml 150/hl di olio minerale bianco.
NESPOLO: contro il Brusone gr. 400-600.
MELO E PERO: contro:
- Cancri rameali e Ticchiolatura nei trattamenti invernali in un unico trattamento alla caduta delle foglie Kg. 1-2 oppure in due applicazioni a metà dose di cui la prima ad un terzo della caduta delle foglie e la seconda alla completa caduta;
- Ticchiolatura: alla ripresa vegetativa/ingrossamento delle gemme gr. 600; dopo la ripresa vegetativa (orecchiette di topo) gr. 400-600.

Da non usare durante il periodo vegetativo sulle varietà di Melo e Pero sensibili ai prodotti rameici.
OLIVO: contro Occhio di Pavone e Lebbra gr. 400-600.
AGRUMI: contro Mal secco, Antracnosi, Fumaggine, Allupatura gr. 400-600; iniziare i trattamenti prima della comparsa od all'inizio della malattia, ripetendoli secondo necessità.
VITE: contro Peronospora gr. 400-600; effettuare i normali trattamenti sulla base dei calendari comunemente impiegati in zona. Impiegare di preferenza il prodotto dopo la fioritura della Vite, usando fungicidi acuprici prima della fioritura. In zone ed in annata con forti infezioni di Peronospora, si può opportunamente aumentare la dose di impiego a gr. 600-800; per la lotta contemporanea contro l'Oidio o Mal bianco aggiungere un prodotto antioidico specifico.
Il prodotto può essere impiegato nella preparazione di Zolfi ramati per trattamenti polverulenti mescolando Kg. 6-8/ha di prodotto con Kg. 50-60/ha di Zolfo in polvere.
FRAGOLA: contro le Maculature rosso-bruna e zonata (Marssonina e Gnomonia), Vaiolatura rossa, intervenire in pre-fioritura e sulla vegetazione autunnale gr. 400-600.
PATATA: contro Peronospora e Alternaria gr. 400-600.
POMODORO: contro Peronospora, Septoria, Alternaria, Batteriosi gr. 400-600.
TABACCO: contro Peronospora gr. 400-600.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro la Cercospora Kg. 6-7 per ettaro con trattamenti ripetuti.
ORTAGGI: **Cavoli, Carciofo, Asparago, Ortaggi a foglia, Cucurbitacee, Solanacee, Legumi, Ortaggi a radice, Ortaggi a bulbo**: contro Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Septoria e Ruggine gr. 400-600.
OLEAGINOSE: contro Peronospora, Septoria, Antracnosi gr. 400-600.
FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI: contro Peronospora, Ticchiolatura, Septoria, Antracnosi e Ruggine gr. 400-600.
Per tutti gli impieghi sopra indicati iniziare i trattamenti prima della comparsa delle malattie, ripetendoli secondo lo sviluppo delle stesse.
RISO: per la lotta contro le alghe delle risaie intervenire alla prima comparsa delle alghe, impiegando Kg. 3-4 per ettaro diluiti in 200-300 o più litri di acqua, ripetendo i trattamenti secondo necessità.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: stemperare il prodotto in poca acqua a parte e poi versare nel totale quantitativo di acqua mantenendo in agitazione la poltiglia.
COMPATIBILITÀ: Il prodotto non può essere miscelato con prodotti fitosanitari a reazione alcalina (Poltiglia bordolese, Polisolfuri, Calce).
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: Non si deve trattare durante la fioritura. Su Pesco, Nettarine, Susino e varietà di Melo (Abbondanza "Belford", Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. Williams, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la ripresa vegetativa.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DA NON IMPIEGARE IN SERRA
DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DT 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

IDROX MANICA

(POLVERE BAGNABILE)

Fungicida a base di idrossido di Rame per la lotta contro le malattie fungine di Fruttiferi, Vite, Olivo, Ortaggi, Patata, Pomodoro, Barbabietola da zucchero, Oleaginose, Tabacco, Floreali, Ornamentali, Forestali e per la lotta contro le alghe delle risaie.

IDROX MANICA Registrazione Ministero della Sanità n. 10008 del 09.04.1999

COMPOSIZIONE	
- RAME metallo puro	g. 25
(sotto forma di idrossido di rame)	
- Coformulanti q.b. a	g.100

Partita n.
Contenuto **100 g**

TOSSICO

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimenti di produzione:
SULCOSA S.A. - Sancho de Rivera, 1215 - Lima (Perù)
DIACHEM S.p.A. – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
CHEMIA S.p.A. – S. Agostino (FE)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Tossico per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

BORDOVIT

Poltiglia bordolese essiccata in polvere bagnabile

BORDOVIT Registrazione Ministero della Sanità n. 10153 del 15/09/1999

COMPOSIZIONE
RAME metallico g. 25
(sotto forma di solfato di rame neutralizzato con calce idrata)
Coformulanti q.b. a g.100

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige 4 - 38068 Rovereto (TN)

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO: **Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto 200 g - 1 Kg - 5 Kg - 10 Kg - 20 Kg Partita n.

NORME PRECAUZIONALI: **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il BORDOVIT è una poltiglia bordolese essiccata, in polvere bagnabile, preparata con procedimento industriale e quindi pronta all'uso. Il prodotto si impiega sospendendolo direttamente in acqua, senza l'aggiunta di calce.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
VITE: contro Peronospora: **500-1000 g/hl** di acqua. Intervenire secondo i tradizionali calendari di lotta, specialmente nel periodo di chiusura del grappolo.
POMACEE: contro Ticchiolatura, Cancri rameali nei trattamenti eradicanti alla caduta delle foglie: **800-1200 g/hl** di acqua.
DRUPACEE: contro Bolla, Corineo e Sclerotinia nei trattamenti autunnali ed invernali al bruno: **1000 g/hl** di acqua.
MANDORLO: contro Marciume bruno nei trattamenti autunnali ed invernali: **1000 g/hl** di acqua.
OLIVO: contro Occhio di pavone, Lebbra e Fumaggine nei trattamenti primaverili ed autunnali: **800-1200 g/hl** di acqua.
AGRUMI: contro Allupatura, Gommosi, Batteriosi, Fumaggine, Mal secco: **1200-2400 g/hl** di acqua. Intervenire anche con trattamenti al colletto, tronchi e grosse branche.
FRAGOLA: contro Vaiolatura rossa nei trattamenti sulla vegetazione autunnale: **800-1000 g/hl** di acqua.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cercosporiosi: **6-8 Kg/ha** con 5-8 hl di acqua.
PATATA, POMODORO E ALTRE COLTURE ORTICOLE (CARCIOFO, CARDO, CAVOLI, CICORIA CUCURBITACEE, SPINACIO, SEDANO, CAROTA, PREZZEMOLO, ecc.) E COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI: contro Alternariosi, Septoriosi, Antracnosi, Peronospora: **500-1000 g/hl** di acqua.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Sospendere in poca acqua la dose di prodotto, mescolare sino ad ottenere una poltiglia fluida, aggiungere altra acqua e versare nel totale quantitativo di acqua richiesto.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è miscibile con gli zolfi bagnabili e colloidali, con i fertilizzanti fogliari. Sono sconsigliabili le miscele con i prodotti a base di Maneb.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e sulle varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego in piena vegetazione.
(*) Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.
(**) Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

BORDOVIT NC

Poltiglia bordolese essiccata in polvere bagnabile

BORDOVIT NC Registrazione Ministero della Sanità n. 10154 del 15.09.1999

COMPOSIZIONE

RAME metallico	g. 25
(sotto forma di solfato di rame neutralizzato con calce idrata)	g.100
Coformulanti q.b. a	

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione:

MANICA SpA - Via all'Adige 4 - 38068 Rovereto (TN)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: **Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

Contenuto 200 g - 1 Kg - 5 Kg - 10 Kg - 20 Kg Partita n.

NORME PRECAUZIONALI: **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il BORDOVIT NC è una poltiglia bordolese essiccata, in polvere bagnabile, preparata con procedimento industriale e quindi pronta all'uso. Il prodotto si impiega sospendendolo direttamente in acqua, senza l'aggiunta di calce.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE: contro Peronospora: **500-1000 g/hl** di acqua. Intervenire secondo i tradizionali calendari di lotta, specialmente nel periodo di chiusura del grappolo.

POMACEE: contro Ticchiolatura e Cancri rameali nei trattamenti eradicanti alla caduta delle foglie: **800-1200 g/hl** di acqua.

DRUPACEE: contro Bolla, Corineo e Sclerotinia nei trattamenti autunnali ed invernali al bruno: **1000 g/hl** di acqua.

MANDORLO: contro Marciume bruno nei trattamenti autunnali ed invernali: **1000 g/hl** di acqua.

OLIVO: contro Occhio di pavone, Lebbra e Fumaggine nei trattamenti primaverili ed autunnali: **800-1200 g/hl** di acqua.

AGRUMI: contro Allupatura, Gommosi, Batteriosi, Fumaggine, Mal secco: **1200-2400 g/hl** di acqua. Intervenire anche con trattamenti al colletto, tronchi e grosse branche.

FRAGOLA: contro Vaiolatura rossa nei trattamenti sulla vegetazione autunnale: **800-1000 g/hl** di acqua.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cercosporiosi: **6-8 Kg/ha** con 5-8 hl di acqua.

PATATA, POMODORO E ALTRE COLTURE ORTICOLE (CARCIOFO, CARDO, CAVOLI, CICORIA, CUCURBITACEE, SPINACIO, SEDANO, CAROTA, PREZZEMOLO, ecc.) E COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI: contro Alternariosi, Septoriosi, Antracnosi, Peronospora: **500-1000 g/hl** di acqua.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Sospendere in poca acqua la dose di prodotto, mescolare sino ad ottenere una poltiglia fluida, aggiungere altra acqua e versare nel totale quantitativo di acqua richiesto.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con gli zolfi bagnabili e colloidali, con i fertilizzanti fogliari. Sono sconsigliabili le miscele con i prodotti a base di Maneb.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e sulle varietà di melo (*) e di pero (**) cupro-sensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego in piena vegetazione.

(*) Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.

(**) Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL65/2003

Etichetta/foglio illustrativo

OSSICLOR 50 WG

FUNGICIDA MICROGRANULARE IDRODISPERSIBILE AD AMPIO SPETTRO DI AZIONE

OSSICLOR 50 WG Registrazione Ministero della Sanità n. 10214 del 02.12.1999

COMPOSIZIONE
RAME metallico g. 50
(sotto forma di ossicloruro di rame)
Coformulanti q.b. a g.100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimenti di produzione
(formulazione e confezionamento o sola formulazione):
MANICA SpA – Rovereto (Trento)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Cotignola (Ravenna)
A.D.I.C.A. Srl – Nera Monitoro (Terni)
SULCOSA S.A. – Jr. Sancho de Rivera – Lima (Perù)
C.I. Prochimicos s.a. - Parque Industrial Juanchito Lote 1 Terraza 6 – Manizales - Colombia

Contenuto: **100-250-500 g 1-5-10-20-25 Kg** Partita n.

FRASI DI RISCHIO: **Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**
NORME PRECAUZIONALI: **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: **denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.**
Terapia: **gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.**
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
L'OSSICLOR 50 WG è un fungicida che agisce per contatto e si impiega nella lotta preventiva contro un gran numero di parassiti fungini sensibili al rame. Grazie alla particolare formulazione in microgranuli idrodispersibili l'OSSICLOR 50 WG è dotato di elevata efficacia, adesività e persistenza di azione.

MODALITÀ, DOSI E CAMPI D'IMPIEGO
L'OSSICLOR 50 WG è un fungicida ad azione polivalente che trova impiego nella difesa delle pomacee, drupacee, vite, agrumi, olivo, barbabietola da zucchero, colture orticole e floricole.

COLTURA	AVVERSITÀ	EPOCHE D'IMPIEGO	DOSI D'IMPIEGO
Melo e Pero	ticchiolatura	- trattamenti di fine inverno - trattamenti pre-fiorali	400-500 g/hl 200-250 g/hl
	cancro	- trattamenti invernali	0,5-1 Kg/hl
Pesco e drupacee in genere	bolla, corineo, bozzacchioni, batteriosi, marciume bruno	- trattamenti invernali	0,5-1 Kg/hl
Albicocco	Sclerotinia	- trattamenti pre-fiorali - trattamenti post-fiorali	200-250 g/hl 250-400 g/hl
Ciliegio	sclerotinia, corineo, scopazzi	- trattamenti pre-fiorali	0,5-1 Kg/hl
Nespolo	Brusone		200-250 g/hl
Vite	Peronospora	- trattamenti pre-fiorali e post-fiorali - trattamenti di "chiusura"	250-400 g/hl 450-500 g/hl
Olivo	occhio di pavone (cicloconio) e lebbra		250-400 g/hl
Agrumi	allupatura, mal secco		250-400 g/hl
Barbabietola da zucchero	Cercospora	1 o 2 trattamenti	3,5-4 Kg/ha
Pomodoro e Patata	peronospora, alternaria, batteriosi	trattamenti prima e dopo la fioritura	250-400 g/hl
Sedano	ticchiolatura, septoria	trattamenti preventivi	250-400 g/hl
Pisello e Fagiolo	antracnosi, ruggine, batteriosi		
Asparago	Ruggine		
Cipolla	Peronospora		
Cavoli, Carciofo, Cardo, Cicoria, Cucurbitacee, Spinacio	Peronospora		200-250 g/hl
Rosa e altre floricole	peronospora, ticchiolatura, ruggine	trattamenti preventivi	200-250 g/hl

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA - Stemperare l'OSSICLOR 50 WG in poca acqua e poi aggiungere il tutto nel serbatoio dell'irroratrice riempito per i 3/4 tenendo in agitazione.

COMPATIBILITÀ - Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non devono essere effettuati trattamenti durante la fioritura. Su pesco, susino e alcune varietà di Melo (Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) sensibili al rame, l'OSSICLOR 50 WG può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

D . 65/2003

Etichetta formato ridotto

OSSICLOR 50 WG

FUNGICIDA MICROGRANULARE IDRODISPERSIBILE AD AMPIO SPETTRO DI AZIONE

OSSICLOR 50 WG Registrazione Ministero della Sanità n. 10214 del 02/12/99

COMPOSIZIONE
RAME metallico g. 50
(sotto forma di ossicloruro di rame)
Coformulanti q.b. a g.100

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimenti di produzione
(formulazione e confezionamento o sola formulazione):
MANICA SpA – Rovereto (Trento)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Cotignola (Ravenna)
A.D.I.C.A. Srl – Nera Monitoro (Terni)
SULCOSA S.A. – Jr. Sancho de Rivera – **Lima** (Perù)
C.I. Proquimicos s.a. - Parque Industrial Juanchito Lote **1** Terraza 6 – Manizales - Colombia

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto: **100 g** Partita n.

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

KURAM

(POLVERE BAGNABILE)

Fungicida ad azione antiperonosporica con effetto collaterale contro Muffa grigia, Oidio, Alternaria e Septoria

KURAM Registrazione Ministero della Sanità n. 10365 del 08.03.2000

COMPOSIZIONE	
CIMOXANIL puro	g. 4,2
RAME metallico	g. 40
(sotto forma di ossicloruro di rame)	
Coformulanti q.b. a	g.100

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimenti di produzione:
- **S.T.I. Solfotecnica Italiana SpA** - Via Torricelli, 2 - Cotignola (RA)

Distribuito da: **FILAGRO Srl - Via Roma, 30 - 35040 Urbana (Padova)**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Contenuto: 0,250 - 0,5 - 1 - 5 - 10 Kg Partita n.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4,2% e RAME 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

RAME - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: sintomatica

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il KURAM è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la Peronospora della **vite**, della **patata** e del **pomodoro** con un effetto collaterale contro le altre malattie fungine di dette colture. Il KURAM è una miscela di due principi attivi, di cui l'ossicloruro di rame possiede una lunga persistenza di azione, mentre il secondo ha prontezza d'azione ed effetto bloccante, in quanto penetra nelle foglie.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE: contro Peronospora 200-300 g di prodotto in 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche. Intervenire ad ogni infezione (o più semplicemente dopo ogni pioggia) oppure preventivamente ogni 8-10 giorni; tale intervallo può essere ridotto a 6-8 giorni in caso di piogge ripetute e nelle fasi di rapido accrescimento vegetativo.

PATATA E POMODORO: contro Peronospora, Alternaria e Septoria, 300 g di prodotto in 100 litri di acqua. Iniziare gli interventi al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo delle malattie e proseguire con un intervallo di 8-10 giorni; tale intervallo deve essere ridotto a 6-8 giorni in caso di forti attacchi o di rapido accrescimento della vegetazione.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semiliquida mescolando la dose di KURAM in poca acqua; quindi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente, continuando a mescolare.

COMPATIBILITÀ

Il KURAM può essere miscelato a tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia l'impiego del prodotto in miscela con prodotti a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ - Non trattare la vite durante la fioritura.

Avvertenza: Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

D. 65/2003

Etichetta/foglio illustrativo

MANCOZEB MANICA 75 WG

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Fungicida a vasto spettro d'azione, attivo per contatto.

MANCOZEB MANICA 75 WG Registrazione Ministero della Sanità n. 10638 del 06/12/2000

COMPOSIZIONE	
- MANCOZEB puro	g. 75
- Coformulanti q.b. a	g.100

Contenuto
100 -200-500 g
1-2-5-10-25 Kg

IRRITANTE

Partita n.

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimenti di produzione:
GRIFFIN de Colombia S.A. – Barranquilla (Colombia)
SULPHUR MILLS LIMITED - Mumbai (India)
INDOFIL CHEMICALS COMPANY – Mumbai (Bombay) – India
DUSLO A.S. - Sala (Slovacchia)
KING TECH CORPORATION – XinShi, Fengxian – Shangai (Cina)
JIANGSU BAOLING CHEMICAL CO.LTD – Nantong, Jiangsu (China)
Stabilimento di confezionamento: **SINAPAK Snc** – Stradella (PV)

FRASI DI RISCHIO: **Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.**

NORME PRECAUZIONALI: **Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il MANCOZEB MANICA 75 WG è un fungicida ad ampio spettro d'azione in formulazione microgranuli idrodispersibili prontamente solubili in acqua. Agisce essenzialmente per contatto ed è caratterizzato, oltre che da un'elevata azione biologica, da una buona persistenza sulle foglie.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
MELO E PERO: contro Ticchiolatura, Alternaria, Septoria, Ruggine e Gloeodes 150-200 g/hl di acqua. Iniziare i trattamenti all'apertura delle gemme e continuare seguendo i calendari suggeriti nella zona. Non usare il prodotto sulle varietà di pero sensibili al principio attivo.
VITE: contro Peronospora 200 g/hl di acqua. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Attenersi alle disposizioni dei calendari per trattamenti suggeriti nella zona. Contro Escoriosi, Marciume nero (Guignardia bidwelli), Rossore parassitario (Pseudopeziza tracheiphila) 200 g/hl di acqua. Effettuare un trattamento anticipato non appena le gemme cominciano a muovere, facendone seguire un altro all'emissione delle prime foglioline; proseguire quindi secondo il normale calendario di lotta antiperonosporica.
POMODORO (solo fino alla prima fioritura): contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi. Cladosporiosi 200-300 g/hl di acqua. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, ripetendoli solo fino alla prima fioritura ogni 7-10 giorni. Con forti attacchi di Antracnosi usare 300-350 g/hl di prodotto.
CEREALI in campo (**FRUMENTO, ORZO, AVENA**): contro Ruggine e Septoria 2,5 Kg/ha. Intervenire durante lo stadio vegetativo compreso fra la botticella e l'emissione della spiga.
TABACCO: contro
- Peronospora in semenzaio 100-150 g/hl di acqua. Trattare quando le piantine sono di cm 1,5 di diametro;
- Peronospora in post-trapianto: 200 g/hl di acqua. Trattare due volte la settimana;
- Peronospora in pieno campo: 200 g/hl di acqua. Trattare una volta la settimana oppure al verificarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
PIOPPO: contro Marssonina brunnea 400-500 g/hl di acqua. Iniziare i trattamenti al più presto per prevenire le infezioni precoci (metà aprile in Val Padana). Ripetere almeno 2-3 volte il trattamento ad intervalli di 15-20 giorni.
GAROFANO (in pieno campo): contro Ruggine, Alternaria, Septoria 200-250 g/hl di acqua.
CONCIA DELLE SEMENTI: il prodotto viene impiegato nella concia umida delle sementi. Formare una pasta semiliquida e mescolare uniformemente con tutta la massa di semi da conciare.
Frumento: contro Carie (Tilletia tritici) e Fusariosi (Fusarium nivale) 200 g/100 Kg di seme.
Riso: contro Brusone (Piricularia oryzae), Helminthosporium oryzae e Fusariosi (Fusarium spp) 250 g/100 Kg di seme.
Mais: contro Carbone (Ustilago maydis), Fusariosi (Fusarium moniliforme), Gibberella (Gibberella zeae) ed Elmintosporiosi (Helminthosporium maydis) 300 g/100 Kg di seme.
Barbabietola da zucchero: contro Mal del piede (Phoma betae), Fusariosi (Fusarium spp), Mal vinato (Rhizoctonia solani) e Cercosporiosi (Cercospora beticola) 600 g/100 Kg di seme.
Patata: contro Fusarium coeruleum, Rhizoctonia solani, Alternaria solani 300 g/100 Kg di seme.
Sementi orticole: contro Fusarium spp, Rhizoctonia solani, Pytium spp 300-600 g/100 Kg di seme.
Avvertenza: I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione dell'uomo e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme sui rifiuti tossici o nocivi.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: sciogliere la giusta quantità di prodotto in un recipiente a parte e quindi versarlo nell'irroratrice tenendo in funzione il meccanismo di agitazione.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina (poltiglia solfocalcica, il Permanganato di potassio) e con concimi fogliari contenenti boro.
AVVERTENZA: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non impiegare su varietà di pero Mancozeb-sensibili: Spadona, Scipiona, S. Giovanni, Gentile, Gentilona, Armella, Coscia, Curato, Conference, Santa Maria, Spina Carpi, Giardina, Butirra precoce, Morettini, Zecchermanna, Principessa di Gonzaga, Mora.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta. Su pomodoro trattamenti ammessi solo fino alla prima fioritura.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto

MANCOZEB MANICA 75 WG

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Fungicida a vasto spettro d'azione, attivo per contatto.

MANCOZEB MANICA 75 WG Registrazione Ministero della Sanità n. 10638 del 06/12/2000

COMPOSIZIONE
- MANCOZEB puro g. 75
- Coformulanti q.b. a g.100

Contenuto:
100 g

IRRITANTE

Partita n.

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimenti di produzione:
GRIFFIN de Colombia S.A. – Barranquilla (Colombia)
SULPHUR MILLS LIMITED - Mumbai (India)
INDOFIL CHEMICALS COMPANY – Mumbai (Bombay) – India
DUSLO A.S. - Sala (Slovacchia)
KING TECH CORPORATION – XinShi, Fengxian – Shangai (Cina)
JIANGSU BAOLING CHEMICAL CO.LTD – Nantong, Jiangsu (China)
Stabilimento di confezionamento: **SINAPAK Snc** – Stradella (PV)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ZIRAM MANICA 90 PB

(POLVERE BAGNABILE)

Fungicida a vasto spettro d'azione, per la difesa delle colture orto-floro-frutticole

ZIRAM MANICA 90 PB Registrazione Ministero della Sanità n. 10639 del 06/12/2000

COMPOSIZIONE		
- ZIRAM puro		g. 86
- Coformulanti	q.b. a	g.100

Partita n.

Contenuto **100-200-250-500 g**
1-2-5-10-20 Kg

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA – Cotignola (RA)
SULPHUR MILLS LIMITED – **Mumbai (India)**

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Molto tossico per inalazione. Irritante per le vie respiratorie. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
ZIRAM MANICA 90 PB è un fungicida ad azione essenzialmente per contatto, efficace contro numerose malattie delle colture frutticole, orticole, floricole ed ornamentali.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
PESCO E ALBICOCCO: contro Bolla e Corineo, nei trattamenti autunno-invernali 350-450 g/hl di acqua; nei trattamenti primaverili-estivi 180 g/hl di acqua.
CILIEGIO: contro Scopazzi 350-400 g/hl per trattamenti autunno-invernali; 180 g/hl per trattamenti primaverili-estivi.
SUSINO: contro Corineo e Cilindrosporiosi 700-900 g/hl per trattamenti autunno-invernali; 180 g/hl per trattamenti primaverili-estivi.
MELO E PERO: contro la Ticchiolatura, nei trattamenti autunno-invernali 350-450 g/hl di acqua, nei trattamenti primaverili-estivi 180 g/hl di acqua. Nei trattamenti primaverili-estivi si abbia cura di effettuare due interventi pre-fiorali (gemme appena schiuse e fase dei mazzetti) ed un altro all'inizio della sfioritura. I successivi interventi devono effettuarsi ogni 6-15 giorni a seconda dell'andamento stagionale e dell'intensità delle infezioni, comunque subito dopo la pioggia. Contro Maculatura bruna del pero, Ruggini ed altre malattie crittogamiche: 180-250 g/hl di acqua, ripetendo i trattamenti ogni 6-10 giorni in funzione delle condizioni climatiche.
ARANCIO, MANDARINO, CLEMENTINE, LIMONE: contro Mal secco 250 g/hl di acqua in trattamenti autunno-invernali.
FRAGOLA: contro Vaiolatura rossa 150-180 g/hl.
OLIVO: contro Occhio di pavone 250-350 g/hl, in pre-fioritura ed ingrossamento frutti.
CAVOLI: contro Ruggine e Marciume da Phoma 150-180 g/hl, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
CARCIOFO, CARDO: contro Sclerotinia e Ascochita 150-180 g/hl, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
ASPARAGO: contro Ruggine 150-180 g/hl, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
LATTUGA, SCAROLA, INDIVIA, RADICCHIO, RUCOLA, DOLCETTA, CRESCIONE, SPINACIO, BIETOLE DA FOGLIA E DA COSTA, CARDO, SEDANO, FINOCCHIO, PREZZEMOLO, ERBA CIPOLLINA, BASILICO: contro Antracnosi, Alternaria, Sclerotinia, Cladosporiosi, Ascochita 150-180 g/hl, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
CAROTA, BIETOLA ROSSA (BIETOLA DA ORTO), CICORIA A RADICE, RAPA, RAVANELLO, NAVONE, RAFANO, PASTINACA, SALSEFRICA, SCORZONERA, SEDANO RAPA, PATATA DOLCE: contro Antracnosi e Alternaria 150-180 g/hl, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO, PORRO: contro Ruggine e Alternaria 150-180 g/hl, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
COCOMERO, MELONE, ZUCCA, ZUCCHINO, CETRIOLO: contro Antracnosi, Cladosporiosi, Alternaria, Sclerotinia 150-180 g/hl, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
LEGUMI: contro Antracnosi e Ruggine 150-180 g/hl, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
POMODORO, PEPERONE, MELANZANA: contro Antracnosi, Septoria, Alternaria, Sclerotinia, Cladosporiosi, Peronospora e Phoma 150-180 g/hl, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
PATATA: contro Alternaria e Peronospora 150-180 g/hl, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
FLOREALI ED ORNAMENTALI: contro Ruggine, Peronospora, Ticchiolatura, Septoria e Antracnosi 150-180 g/hl, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
TABACCO: contro Alternaria, Ascochita e Peronospora 150-180 g/hl, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
VIVAI, SEMENZAI: contro Alternaria, Septoria e Ruggine 150-180 g/hl, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale; effettuando i trattamenti a volume ridotto (cioè somministrando un minor quantitativo di acqua per ettaro) le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. La giusta dose di **ZIRAM MANICA 90 PB** va sciolta in poca acqua agitando fino ad ottenere una pasta cremosa; aggiungere poi il resto dell'acqua continuando ad agitare. I trattamenti dovranno essere effettuati in relazione all'andamento stagionale secondo lo schema comunemente adottato per la difesa anticrittogamica delle varie colture. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere alla miscela 50 ml per ettolitro di un bagnante adesivo.

COMPATIBILITÀ - Il prodotto non è miscibile con poltiglie bordolesi e polisolfuri.
AVVERTENZA: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenze: **Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore dal trattamento indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.**

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto è fitotossico per le seguenti varietà di peri: Cannellina, Gentil bianca, Gentilona, Spadona d'estate.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DA NON IMPIEGARE IN SERRA
DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ZIRAM MANICA 90 PB

(POLVERE BAGNABILE)

Fungicida a vasto spettro d'azione, per la difesa delle colture orto-floro-frutticole

ZIRAM MANICA 90 PB Registrazione Ministero della Sanità n. 10639 del 06/12/2000

COMPOSIZIONE		
- ZIRAM puro		g. 86
- Coformulanti	q.b. a	g.100

Partita n.

Contenuto **100 g**

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA – Cotignola (RA)
SULPHUR MILLS LIMITED – Mumbai (India)

MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO: **Nocivo per ingestione. Molto tossico per inalazione. Irritante per le vie respiratorie. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ZIRAM MANICA WG

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Fungicida a vasto spettro d'azione, per la difesa delle colture orto-floro-frutticole

ZIRAM MANICA WG Registrazione Ministero della Sanità n. 10640 del 06/12/2000

COMPOSIZIONE		
- ZIRAM puro		g. 81
- Coformulanti	q.b. a	g.100

Partita n.
Contenuto **100-200-250-500 g**
1-2-5-10-20 Kg

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA – Cotignola (RA)
SULPHUR MILLS LIMITED – Mumbai (India)

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Molto tossico per inalazione. Irritante per le vie respiratorie. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
ZIRAM MANICA WG è un fungicida in granuli idrodispersibili prontamente solubili in acqua, efficace contro numerose malattie delle colture frutticole, orticole, floreali ed ornamentali.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
PESCO E ALBICOCCO: contro Bolla e Corineo, nei trattamenti autunno-invernali 350-450 g/hl di acqua; nei trattamenti primaverili-estivi 180 g/hl di acqua.
CILIEGIO: contro Scopazzi 350-400 g/hl per trattamenti autunno-invernali; 180 g/hl per trattamenti primaverili-estivi.
SUSINO: contro Corineo e Cilindrosporiosi 700-900 g/hl per trattamenti autunno-invernali; 180 g/hl per trattamenti primaverili-estivi.
MELO E PERO: contro la Ticchiolatura, nei trattamenti autunno-invernali 350-450 g/hl di acqua, nei trattamenti primaverili-estivi 180 g/hl di acqua. Nei trattamenti primaverili-estivi si abbia cura di effettuare due interventi pre-fiorali (gemme appena schiuse e fase dei mazzetti) ed un altro all'inizio della sfioritura. I successivi interventi devono effettuarsi ogni 6-15 giorni a seconda dell'andamento stagionale e dell'intensità delle infezioni, comunque subito dopo la pioggia. Contro Maculatura bruna del pero, Ruggini ed altre malattie crittogamiche: 180-250 g/hl di acqua, ripetendo i trattamenti ogni 6-10 giorni in funzione delle condizioni climatiche.
ARANCIO, MANDARINO, CLEMENTINE, LIMONE: contro Mal secco 250 g/hl di acqua in trattamenti autunno-invernali.
FRAGOLA: contro Vaiolatura rossa 150-180 g/hl.
OLIVO: contro Occhio di pavone 250-350 g/hl, in pre-fioritura ed ingrossamento frutti.
CAVOLI: contro Ruggine e Marciume da Phoma 150-180 g/hl, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
CARCIOFO, CARDO: contro Sclerotinia e Ascochita 150-180 g/hl, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
ASPARAGO: contro Ruggine 150-180 g/hl, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
LATTUGA, SCAROLA, INDIVIA, RADICCHIO, RUCOLA, DOLCETTA, CRESCIONE, SPINACIO, BIETOLE DA FOGLIA E DA COSTA, CARDO, SEDANO, FINOCCHIO, PREZZEMOLO, ERBA CIPOLLINA, BASILICO: contro Antracnosi, Alternaria, Sclerotinia, Cladosporiosi, Ascochita 150-180 g/hl, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
CAROTA, BIETOLA ROSSA (BIETOLA DA ORTO), CICORIA A RADICE, RAPA, RAVANELLO, NAVONE, RAFANO, PASTINACA, SALSEFRICA, SCORZONERA, SEDANO RAPA, PATATA DOLCE: contro Antracnosi e Alternaria 150-180 g/hl, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO, PORRO: contro Ruggine e Alternaria 150-180 g/hl, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
COCOMERO, MELONE, ZUCCA, ZUCCHINO, CETRIOLO: contro Antracnosi, Cladosporiosi, Alternaria, Sclerotinia 150-180 g/hl, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
LEGUMI: contro Antracnosi e Ruggine 150-180 g/hl, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
POMODORO, PEPERONE, MELANZANA: contro Antracnosi, Septoria, Alternaria, Sclerotinia, Cladosporiosi, Peronospora e Phoma 150 180 g/hl, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
PATATA: contro Alternaria e Peronospora 150-180 g/hl, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
FLOREALI ED ORNAMENTALI: contro Ruggine, Peronospora, Ticchiolatura, Septoria e Antracnosi 150-180 g/hl, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
TABACCO: contro Alternaria, Ascochita e Peronospora 150-180 g/hl, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
VIVAI, SEMENZAI: contro Alternaria, Septoria e Ruggine 150-180 g/hl, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale; effettuando i trattamenti a volume ridotto (cioè somministrando un minor quantitativo di acqua per ettaro) le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. I trattamenti dovranno essere effettuati in relazione all'andamento stagionale secondo lo schema comunemente adottato per la difesa anticrittogamica delle varie colture. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere alla miscela 50 ml per ettolitro di un bagnante adesivo.

Preparazione della poltiglia - Diluire il totale quantitativo del prodotto nella botte parzialmente riempita, quindi portare a volume, mantenendo in agitazione la pompa.

COMPATIBILITÀ - Il prodotto non è miscibile con poltiglie bordolesi e polisolfuri.
AVVERTENZA: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenze: Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore dal trattamento indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto è fitotossico per le seguenti varietà di peri: Cannellina, Gentil bianca, Gentilona, Spadona d'estate.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DA NON IMPIEGARE IN SERRA
DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ZIRAM MANICA WG

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Fungicida a vasto spettro d'azione, per la difesa delle colture orto-floro-frutticole

ZIRAM MANICA WG Registrazione Ministero della Sanità n. 10640 del 06/12/2000

COMPOSIZIONE		
- ZIRAM puro		g. 81
- Coformulanti	q.b. a	g.100

Partita n.

Contenuto **100 g**

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA – Cotignola (RA)
SULPHUR MILLS LIMITED – Mumbai (India)

MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Molto tossico per inalazione. Irritante per le vie respiratorie. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

Etichetta/foglio illustrativo

MANCOZEB MANICA 80 PB

(POLVERE BAGNABILE)

Fungicida a vasto spettro d'azione, attivo per contatto.

MANCOZEB MANICA 80 PB Registrazione Ministero della Sanità n. 10641 del 06.12.2000

COMPOSIZIONE
- MANCOZEB puro g. 80
- Coformulanti q.b. a g.100

Partita n.

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimenti di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)
SULPHUR MILLES LIMITED – Mumbai (India)
DUSLO – Sala (Slovacchia)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE)
INDOFIL CHEMICALS COMPANY – Mumbai (Bombay) – India
KING TECH CORPORATION – XinShi, Fengxian – Shangai (Cina)
JIANGSU BAOLING CHEMICAL CO. LTD – Nantong, Jiangsu (China)
Stabilimento di confezionamento: **SINAPAK Snc – Stradella (PV)**

IRRITANTE

Contenuto
100 -200-500 g
1-2-5-10-25 Kg

FRASI DI RISCHIO: **Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il MANCOZEB MANICA 80 PB è un anticrittogamico a vasto spettro d'azione che agisce essenzialmente per contatto. È caratterizzato, oltre che da un'elevata azione biologica, da una buona persistenza sulle foglie e da un certo effetto attivante la vegetazione. Trova inoltre impiego nella concia secca o umida contro i funghi parassiti dei semi di **frumento, riso, mais, barbabietola da zucchero e delle orticole**.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
MELO E PERO: contro Ticchiolatura, Alternaria, Septoria, Ruggine e Gloeodes 150-200 g/hl di acqua. Iniziare i trattamenti all'apertura delle gemme e continuare seguendo i calendari suggeriti nella zona. Non usare il prodotto sulle varietà di pero sensibili al principio attivo.
VITE: contro Peronospora 200 g/hl di acqua. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Attenersi alle disposizioni dei calendari per trattamenti suggeriti nella zona. Contro Escoriosi, Marciume nero (Guignardia bidwelli), Rossore parassitario (Pseudopeziza tracheiphila) 200 g/hl di acqua. Effettuare un trattamento anticipato non appena le gemme cominciano a muovere, facendone seguire un altro all'emissione delle prime foglioline; proseguire quindi secondo il normale calendario di lotta antiperonosporica.

POMODORO (solo fino alla prima fioritura): contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, Cladosporiosi 200-250 g/hl di acqua. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, ripetendoli solo fino alla prima fioritura ogni 7-10 giorni. Con forti attacchi di Antracnosi usare 300-350 g/hl di prodotto.
CEREALI in campo (**FRUMENTO, ORZO, AVENA**): contro Ruggine e Septoria 2,5 Kg/ha. Intervenire durante lo stadio vegetativo compreso fra la botticella e l'emissione della spiga.
TABACCO: contro
- Peronospora in semenzaio 100-150 g/hl di acqua. Trattare quando le piantine sono di cm 1,5 di diametro;
- Peronospora in post-trapianto: 200 g/hl di acqua. Trattare due volte la settimana;
- Peronospora in pieno campo: 200 g/hl di acqua. Trattare una volta la settimana oppure al verificarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
PIOPPO: contro Marssonina brunnea 400-500 g/hl di acqua. Iniziare i trattamenti al più presto per prevenire le infezioni precoci (metà aprile in Val Padana). Ripetere almeno 2-3 volte il trattamento ad intervalli di 15-20 giorni.
GAROFANO (in pieno campo): contro Ruggine, Alternaria, Septoria 200-250 g/hl di acqua.
CONCIA DELLE SEMENTI: il prodotto viene impiegato nella concia secca o umida delle sementi. A tale scopo il prodotto deve essere mescolato uniformemente con tutta la massa di semi da conciare. Tale operazione è agevolata dall'impiego di apposito recipiente cilincrico rotante.
Grano: contro Carie (Tilletia tritici) e Fusariosi (Fusarium nivale) 200 g/100 Kg di seme.
Riso: contro Brusone (Piricularia oryzae), Helminthosporium oryzae e Fusariosi (Fusarium spp) 250 g/100 Kg di seme.
Mais: contro Carbone (Ustilago maydis), Fusariosi (Fusarium moniliforme), Gibberella (Gibberella zeae) ed Elmintosporiosi (Helminthosporium maydis) 300 g/100 Kg di seme.
Barbabietola da zucchero: contro Mal del piede (Phoma betae), Fusariosi (Fusarium spp), Mal vinato (Rhizoctonia solani) e Cercosporiosi (Cercospora beticola) 600 g/100 Kg di seme.
Patata: contro Fusarium coeruleum, Rhizoctonia solani, Alternaria solani 300 g/100 Kg di seme.
Sementi orticole: contro Fusarium spp, Rhizoctonia solani, Pytium spp 300-600 g/100 Kg di seme.
Avvertenza: I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione dell'uomo e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme sui rifiuti tossici o nocivi.

Preparazione della miscela: Stemperare la quantità di prodotto prevista in poca acqua a parte; quindi versare la poltiglia così ottenuta nel serbatoio dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua e, continuando a mescolare, aggiungere il restante quantitativo di acqua fino al volume desiderato.

COMPATIBILITÀ - Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina (poltiglia solfocalcica, il Permanganato di potassio) e con concimi fogliari contenenti boro.
AVVERTENZA: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ - Non impiegare su varietà di pero Mancozeb-sensibili: Spadona, Scipiona, S. Giovanni, Gentile, Gentilona, Armella, Coscia, Curato, Conference, Santa Maria, Spina Carpi, Giardina, Butirra precoce, Morettini, Zecchermanna, Principessa di Gonzaga, Mora.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta. Su pomodoro trattamenti ammessi solo fino alla prima fioritura.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto

MANCOZEB MANICA 80 PB

(POLVERE BAGNABILE)

Fungicida a vasto spettro d'azione, attivo per contatto.

MANCOZEB MANICA 80 PB Registrazione Ministero della Sanità n. 10641 del 06.12.2000

COMPOSIZIONE	
- MANCOZEB puro	g. 80
- Coformulanti q.b. a	g.100

Partita n.

IRRITANTE

Contenuto 100 g

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimenti di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)
SULPHUR MILLES LIMITED – Mumbai (India)
DUSLO – Sala (Slovacchia)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE)
INDOFIL CHEMICALS COMPANY – Mumbai (Bombay) – India
KING TECH CORPORATION – XinShi, Fengxian – Shangai (Cina)
JIANGSU BAOLING CHEMICAL CO. LTD – Nantong, Jiangsu (China)
Stabilimento di confezionamento: **SINAPAK Snc –** Stradella (PV)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

POLTIGLIA® MANICA® 20 PB

Anticrittogamico per uso agricolo
Solfato di rame neutralizzato nella calce
Polvere bagnabile pronta all'uso

POLTIGLIA MANICA 20 PB Registrazione Ministero della Salute n. 10891 del 20.04.2001

COMPOSIZIONE	
RAME metallico	g. 20
(sotto forma di solfato di rame neutralizzato con calce idrata)	
Coformulanti q.b. a	g.100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige 4 - 38068 Rovereto (TN)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Contenuto 10-20-50-100-200-250-300-500-700-750 g 1-2-5-10-20 Kg Partita n.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, **lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione dei metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
La POLTIGLIA MANICA 20 PB è un fungicida in polvere bagnabile pronta all'uso a base di solfato neutralizzato nella calce ad azione preventiva, con notevole efficacia, persistenza, acesività e resistenza al dilavamento. L'alto grado di micronizzazione e la perfetta combinazione rame-calce conferisce al preparato una neutralità, sospensibilità e bagnabilità adeguate ad assicurare un'omogenea ed uniforme copertura della vegetazione all'atto dei trattamenti. La POLTIGLIA MANICA 20 PB si impiega sospendendola direttamente in acqua senza l'aggiunta di calce.
VITE: contro Peronospora, Escoriosi, Black-rot, con azione collaterale contro la Muffa grigia (Botritis) prima della fioritura alla dose di **700-800 g/hl**, dopo la fioritura **800-1200 g/hl**. Applicare il prodotto secondo i tradizionali calendari di lotta, specialmente dalla fioritura alla chiusura dei trattamenti.
POMACEE (MELO, PERO): contro Ticchiolatura, Cancri rameali, Erwinia, Maculatura bruna (Alternaria), Monilia e Septoriosi del pero, nei trattamenti eradicanti dalla caduta delle foglie (autunno-inverno) **1000-2000 g/hl**, da ingrossamento gemme a mazzetti affioranti **750-1250 g/hl**, dall'allegagione ad inizio caduta foglie contro Erwinia, Ticchiolatura **500 g/hl**.
DRUPACEE (PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO), MANDORLO: contro Bolla, Corineo (Gommosi), Muffe (Monilia), Cancri rameali, nei trattamenti autunno-invernali **1200-2000 g/hl**.
ACTINIDIA: contro marciume del colletto **800 g/hl** (irrorare **10-15 litri** di soluzione sulla parte basale del fusto); contro Batteriosi **500-600 g/hl** alla caduta delle foglie.
NOCCIOLO ED ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO: contro Cancri del legno effettuare trattamenti distanziati di 15 giorni **500-1000 g/hl**.
NOCE: contro Batteriosi, Antracnosi, Cancri del legno con interventi a partire dalla pre-fioritura alla dose di **500-1200 g/hl**.

OLIVO: contro Occhio di pavone (Cicloconio), Lebbra e Fumaggini con trattamenti alla ripresa vegetativa ed all'invaiatura dei frutti **1000-2000 g/hl**.
AGRUMI (ARANCIO, LIMONE, MANDARINO, ecc.): contro Mal secco, Allupatura, Gommosi, Batteriosi, Fumaggine, Marciume del colletto, a fine inverno-inizio primavera ed in autunno (all'invaiatura dei frutti) **800-3000 g/hl**.
FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI (lampone, ribes, mirtillo, mora): contro Vaiolatura rossa, Cancri, Antracnosi **500-1000 g/hl**.
PATATA, CAVOLI, CARCIOFO, ASPARAGO, SEDANO, ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE (lattuga, scarola, cicoria, indivia, dolcetta, crescione, radicchio, rucola, spinacio, bietola da foglia e da costa, basilico, ecc.), ORTAGGI A FRUTTO (peperone, pomodoro, melanzana, cetriolo, zucca, zucchino, melone, cocomero), FAGIOLO, PISELLO, ORTAGGI A RADICE (carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria da radice, ecc.), ORTAGGI A BULBO (aglio, cipolla, cipollina, scalogno, porro, ecc.): contro Peronospora, Alternaria, Batteriosi, Septoria, Antracnosi, Ruggini **500-1000 g/hl**.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cercospora, Peronospora (nel pieno accrescimento e verso la raccolta) **7-10 Kg/ha**.
TABACCO E OLEAGINOSE (soia, girasole, colza, arachide, lino, ravizzone, senape, sesamo): contro Peronospora **5-7 Kg/ha**.
RISO: contro Alghe verdi, intervenendo alla comparsa dell'attacco **6-8 Kg/ha** fino ad una dose massima di **8-10 Kg/ha**.
FLORICOLTURA (rosa, geranio, garofano, crisantemo, ecc.): contro Peronospora, Ruggini, Ticchiolatura, Antracnosi, Septoriosi, Cancri **500-1000 g/hl**.
PIANTE FORESTALI E ORNAMENTALI (conifere, cipresso, oleandro, ecc.): contro Cancri, Necrosi, Corineo **(in primavera ed in autunno) 700-2000 g/hl**.
CONCIA ANTICARIE DELLE SEMENTI DEI CEREALI (escluso mais sorgo e riso) **200 gr/q.le** di seme.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: diluire il prodotto in poca acqua a parte, quindi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente. Il prodotto è già neutro quindi non richiede l'aggiunta di calce.
La POLTIGLIA MANICA 20 PB va impiegata secondo i normali calendari di lotta (da 8 a 12 giorni) a seconda delle condizioni di temperatura e di umidità (in caso di stagione particolarmente piovosa andranno impiegate le dosi maggiori nell'intervallo di tempo più corto).
In caso di impiego di irroratrici a basso volume, le dosi prescritte vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto.

Avvertenza: i semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana o del bestiame.

COMPATIBILITÀ - Il prodotto è miscibile con gli zolfi bagnabili e colloidali, con i fertilizzanti fogliari.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ - Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e sulle varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego in piena vegetazione.
(*) Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.
(**) Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

POLTIGLIA® MANICA® 20 PB

Anticrittogamico per uso agricolo
Solfato di rame neutralizzato nella calce
Polvere bagnabile pronta all'uso

POLTIGLIA MANICA 20 PB Registrazione Ministero della Salute n. 10891 del 20.04.2001

COMPOSIZIONE	
RAME metallico	g. 20
(sotto forma di solfato di rame neutralizzato con calce idrata)	
Coformulanti q.b. a	g.100

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige 4 - 38068 Rovereto (TN)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto 10-20-50-100 g Partita n.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta/foglio illustrativo

OSSICLOR 50 PB MANICA®

Anticrittogamico in polvere bagnabile

OSSICLOR 50 PB MANICA® Registrazione Ministero della Sanità n.10892 del 20.04.01

COMPOSIZIONE	
- RAME metallico (sotto forma di ossicloruro tetraramico)	g. 50
- Coformulanti q.b. a	g.100

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Contenuto: 10-20-50-100-200-250-300-500-700-750 g 1-2-5-10-20 Kg
Partita n.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
L'OSSICLOR 50 PB MANICA è un anticrittogamico in polvere bagnabile contenente il 50% di rame metallo sotto forma di ossicloruro di rame. È indicato nella lotta contro: Peronospora, Ticchiolatura, Antracnosi, Alternariosi, Septoriosi, Cercosporiosi, Occhio di pavone, Muffa grigia. È dotato di persistenza e resistenza al dilavamento.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle seguenti dosi per 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale.
VITE: contro Peronospora **200-500 g/hl**. Effettuare i normali trattamenti sulla base di calendari di lotta comunemente usati in zona. Impiegare il prodotto preferibilmente dopo la fioritura della vite. Contro l'Oidio aggiungere un antioidico specifico (zolfo bagnabile, ecc.).
MELO, PERO, COTOGNO: contro Ticchiolatura e Cancri rameali:
- trattamenti autunnali o di fine inverno **400-1000 g**;
- trattamenti da ingrossamento delle gemme a mazzetti affioranti **300-500 g**;
- trattamenti da fine fioritura ad inizio caduta foglie **200 g**.
Da non usare durante il periodo vegetativo sulle varietà di melo e di pero sensibili ai prodotti rameici.
DRUPACEE (PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO), MANDORLO: contro Bolla, Corineo e Cancri rameali: nei trattamenti invernali dalla caduta foglie a fine inverno **800-1200 g**, nei trattamenti a gemme rigonfie **600-800 g**.
OLIVO: contro Occhio di pavone, Fumaggine e Lebbra **300-500 g**.
AGRUMI: contro Mal secco, Gommosi, Batteriosi, Antracnosi e Fumaggine **400-500 g**.
FRAGOLA: contro Maculatura rosso-bruna e zonata (Marssonina e Gnomonia), Vaiolatura rossa (Mycosphaerella) **200-400 g**.
FRUTTIFERI MINORI, NOCE ED ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO: contro Cancri rameali in trattamenti autunnali o di fine inverno **400-1000 g**. In trattamenti primaverili **200 g**.
PATATA: contro Peronospora ed altre crittogame parassite (Alternaria, Septoria) **200-400 g**.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cercospora: **4 Kg** per ettaro.
ORTAGGI (cavoli, carciofo, asparago, ortaggi a foglia, cucurbitacee, solanacee, legumi, ortaggi a radice, ortaggi a bulbo, ecc.):
- contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Cladosporiosi del pomodoro **200-500 g**.
- contro Cercospora e Septoria del sedano e della carota **200-500 g**.
- contro Peronospora ed Antracnosi di melone, anguria, zucchino, cetriolo **200-500 g**.
- contro Antracnosi e Ruggine del pisello, fagiolo, fagiolino **200-500 g**.
- contro Peronospora dei cavoli e di altre crucifere **200-500 g**.
- contro Peronospora della cipolla, del carciofo e del cardo **400-600 g**.
OLEAGINOSE: contro Peronospora e Antracnosi **200-500 g**.
TABACCO: contro Peronospora e Antracnosi: **200-500 g**.
CEREALI: contro Ruggine e Septoria: **200-500 g**.
COLTURE FLOREALI (rosa, garofano, crisantemo, ecc.), ORNAMENTALI E FORESTALI: contro Ruggine, Peronospora, Ticchiolatura e Septoria: per trattamenti estivi **200-500 g**, per trattamenti invernali **800-1000 g**.
RISO: per la lotta contro le Alghe delle risaie intervenire alla prima comparsa delle alghe, impiegando **3-4 Kg** per ettaro diluiti in 200-300 o più litri di acqua.
CONCIA DELLE SEMENTI DI CEREALI (frumento, orzo, segale, avena, grano saraceno, miglio, ecc., esclusi mais, sorgo e riso): contro carie **150 g** per 100 Kg di seme.
PER LA RAMATURA DEGLI ZOLFI VENTILATI: **5-10 Kg** in 70-80 Kg di zolfo.
Per tutti gli impieghi sopra indicati, iniziare i trattamenti prima della comparsa delle malattie e ripetere i trattamenti secondo lo sviluppo delle stesse. L'OSSICLOR 50 PB MANICA va impiegato secondo i normali calendari di lotta (da 8 a 12 giorni) a seconda delle condizioni di temperatura e di umidità (in caso di stagione particolarmente piovosa andranno impiegate le dosi maggiori nell'intervallo di tempo più corto). In caso di impiego di irroratrici a basso volume, le dosi prescritte vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto.
Avvertenza: I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame.
Preparazione: stemperare la quantità di prodotto prevista in poca acqua a parte, quindi versare la miscela così ottenuta nel serbatoio dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua e, continuando a miscelare, aggiungere il restante quantitativo di acqua fino al volume desiderato.

COMPATIBILITÀ
I prodotto non è miscibile con i formulati a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
(*) Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana.
(**) Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

01.65/2003

Etichetta formato ridotto

OSSICLOR 50 PB MANICA®

Anticrittogamico in polvere bagnabile

OSSICLOR 50 PB MANICA® Registrazione Ministero della Sanità n.10892 del 20.04.01

COMPOSIZIONE	
- RAME metallico	g. 50
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)	
- Coformulanti q.b. a	g.100

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto: 10-20-50-100 g Partita n.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DI 65/2003

Etichetta/foglio illustrativo

MAXIRAM® 50 PB

Anticrittogamico in polvere bagnabile

MAXIRAM 50 PB MANICA Registrazione Ministero della Sanità n.10942 del 17.05.2001

COMPOSIZIONE
- RAME metallico g. 50
  (sotto forma di ossicloruro tetraramico)
- Coformulanti q.b. a g.100

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: **Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

Contenuto: 10-20-50-100-200-250-300-500-700-750 g 1-2-5-10-20 Kg

Partita n.

NORME PRECAUZIONALI: **Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: **denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.**
Terapia: **gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.**
Avvertenza: **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
MAXIRAM 50 PB è un anticrittogamico in polvere bagnabile contenente il 50% di rame metallo sotto forma di ossicloruro di rame. È indicato nella lotta contro: Peronospora, Ticchiolatura, Antracnosi, Alternariosi, Septoriosi, Cercosporiosi, Occhio di pavone, Muffa grigia. È dotato di persistenza e resistenza al dilavamento.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle seguenti dosi per 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale.
VITE: contro Peronospora **200-500 g/hl**. Effettuare i normali trattamenti sulla base di calendari di lotta comunemente usati in zona. Impiegare il prodotto preferibilmente dopo la fioritura della vite. Contro l'Oidio aggiungere un antioidico specifico (zolfo bagnabile, ecc.).
MELO, PERO, COTOGNO: contro Ticchiolatura e Cancri rameali:
- trattamenti autunnali o di fine inverno **400-1000 g**;
- trattamenti da ingrossamento delle gemme a mazzetti affioranti **300-500 g**;
- trattamenti da fine fioritura ad inizio caduta foglie **200 g**.
Da non usare durante il periodo vegetativo sulle varietà di melo e di pero sensibili ai prodotti rameici.
DRUPACEE (PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO), MANDORLO: contro Bolla, Corineo e Cancri rameali: nei trattamenti invernali dalla caduta foglie a fine inverno **800-1200 g**, nei trattamenti a gemme rigonfie **600-800 g**.
OLIVO: contro Occhio di pavone, Fumaggine e Lebbra **300-500 g**.
AGRUMI: contro Mal secco, Gommosi, Batteriosi, Antracnosi e Fumaggine **400-500 g**.
FRAGOLA: contro Maculatura rosso-bruna e zonata (Marssonina e Gnomonia), Vaiolatura rossa (Mycosphaerella) **200-400 g**.
FRUTTIFERI MINORI, NOCE ED ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO: contro Cancri rameali in trattamenti autunnali o di fine inverno **400-1000 g**. In trattamenti primaverili **200 g**.
PATATA: contro Peronospora ed altre crittogame parassite (Alternaria, Septoria) **200-400 g**.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cercospora: **4 Kg** per ettaro.
ORTAGGI (cavoli, carciofo, asparago, ortaggi a foglia, cucurbitacee, solanacee, legumi, ortaggi a radice, ortaggi a bulbo, ecc.):
- contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Cladosporiosi del pomodoro **200-500 g**.
- contro Cercospora e Septoria del sedano e della carota **200-500 g**.
- contro Peronospora ed Antracnosi di melone, anguria, zucchino, cetriolo **200-500 g**.
- contro Antracnosi e Ruggine del pisello, fagiolo, fagiolino **200-500 g**.
- contro Peronospora dei cavoli e di altre crucifere **200-500 g**.
- contro Peronospora della cipolla, del carciofo e del cardo **400-600 g**.
OLEAGINOSE: contro Peronospora e Antracnosi **200-500 g**.
TABACCO: contro Peronospora e Antracnosi: **200-500 g**.
CEREALI: contro Ruggine e Septoria: **200-500 g**.
COLTURE FLOREALI (rosa, garofano, crisantemo, ecc.), ORNAMENTALI E FORESTALI: contro Ruggine, Peronospora, Ticchiolatura e Septoria: per trattamenti estivi **200-500 g**, per trattamenti invernali **800-1000 g**.
RISO: per la lotta contro le Alghe delle risaie intervenire alla prima comparsa delle alghe, impiegando **3-4 Kg** per ettaro diluiti in 200-300 o più litri di acqua.
CONCIA DELLE SEMENTI DI CEREALI (frumento, orzo, segale, avena, grano saraceno, miglio, ecc., esclusi mais, sorgo e riso): contro carie **150 g** per 100 Kg di seme.
PER LA RAMATURA DEGLI ZOLFI VENTILATI: **5-10 Kg** in 70-80 Kg di zolfo.
Per tutti gli impieghi sopra indicati, iniziare i trattamenti prima della comparsa delle malattie e ripetere i trattamenti secondo lo sviluppo delle stesse. MAXIRAM 50 PB va impiegato secondo i normali calendari di lotta (da 8 a 12 giorni) a seconda delle condizioni di temperatura e di umidità (in caso di stagione particolarmente piovosa andranno impiegate le dosi maggiori nell'intervallo di tempo più corto). In caso di impiego di irroratrici a basso volume, le dosi prescritte vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto.
Avvertenza: I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame.
Preparazione: stemperare la quantità di prodotto prevista in poca acqua a parte, quindi versare la miscela così ottenuta nel serbatoio dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua e, continuando a miscelare, aggiungere il restante quantitativo di acqua fino al volume desiderato.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è miscibile con i formulati a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
(*) Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana.
(**) Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DI 65/2003

Etichetta formato ridotto

MAXIRAM® 50 PB

Anticrittogamico in polvere bagnabile

MAXIRAM 50 PB MANICA Registrazione Ministero della Sanità n.10942 del 17.05.2001

COMPOSIZIONE	
- RAME metallico	g. 50
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)	
- Coformulanti q.b. a	g.100

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto: 10-20-50-100 g Partita n.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DI 65/2003

etichetta/foglio illustrativo

CAPITOL 12 SC

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Fungicida organico, localmente mobile nelle superfici verdi irrorate, per la lotta all'Oidio del melo, della vite, del pesco, delle cucurbitacee, del pomodoro, del peperone, della fragola, e per il controllo della Ticchiolatura del melo e del pero

CAPITOL 12 SC Registrazione Ministero della Salute n. 11132 del 08.01.2002

COMPOSIZIONE	
FENARIMOL puro	g. 11,4 (=120 g/l)
Coformulanti* q.b. a	g.100
*contiene Glicole etilenico	

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o solo formulazione):
DOW AgroSciences – King's Lynn – Norfolk (UK)
DIACHEM S.p.A. - U.P.SIFA – Caravaggio (BG)
CHEMIA S.p.A. – S.Agostino (FE)
Stabilimenti di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA Srl – San Colombano al Lambro (MI)
TERRANALISI Srl – Cento (FE)

Contenuto 5-10-50-100-250-400-500 ml 1 L Partita n.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di ridotta fertilità. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Possibile rischio per i bambini allattati al seno.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Malattie combattute e colture protette
Il CAPITOL 12 SC combatte l'**Oidio del melo** (*Podosphaera leucotricha*), **della vite** (*Uncinula necator*), **del pesco** (*Sphaerotheca pannosa*), **delle cucurbitacee** (*Erysiphe cichoracearum* e *Sphaerotheca fuliginea*), **delle solanacee e del carciofo** (*Leiveilula taurica*), **della fragola** (*Sphaerotheca macularis*), **del pisello** (*Erysiphe polygoni*). Impiegato con altri funcigidi controlla la **ticchiolatura del melo** (*Venturia inaequalis*) e **del pero** (*Venturia pirina*).

DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO
MELO (Oidio)
Impiegare CAPITOL 12 SC alla dose di 30-40 ml/hl ad intervalli di 7-10 giorni, iniziando i trattamenti alla fase delle orecchiette di topo ed attenendosi all'intervallo più breve quando maggiore è l'intensità dell'attacco.
MELO (Oidio e Ticchiolatura), PERO (Ticchiolatura)
Impiegare CAPITOL 12 SC alla dose di 30-40 ml/hl in miscela estemporanea con Captano 50 PB alla dose di 120-150 g/hl o Dodina 65 PB alla dose di 50-60 g/hl o con Mancozeb 80 PB alla dose di 100-150 g/hl. In linea di massima applicare la miscela ad intervalli di 7-8 giorni dall'apertura delle gemme fino al frutto noce e, dopo, ad intervalli di 8-12 giorni in relazione all'andamento stagionale.

VITE DA TAVOLA
Impiegare CAPITOL 12 SC alla dose di 10-15 ml/hl ad intervalli di 7-10 giorni iniziando i trattamenti da quando i germogli sono lunghi 10 cm e continuando fino all'allegagione. Dopo l'allegagione aumentare la dose a 25-30 ml/hl mantenendo lo stesso intervallo degli interventi. Si raccomanda di impiegare la dose più alta e l'intervallo più breve nei periodi di maggior incidenza della malattia.
VITE DA VINO
Impiegare CAPITOL 12 SC ad intervalli di 7-15 giorni alla dose di 10-15 ml/hl da quando i germogli sono lunghi 10 cm e fino all'allegagione e alla dose di 15-30 ml/hl dall'allegagione in poi. La lotta antioidica può essere effettuata contemporaneamente a quella contro la Peronospora miscelando CAPITOL 12 SC all'antiperonosporico. Si raccomanda di aumentare la dose dalla minima alla massima proporzionalmente all'allungamento degli intervalli.
PESCO
Impiegare CAPITOL 12 SC alla dose di 35-40 ml/hl dalla sfioritura per 2-3 trattamenti ad intervalli di 7 giorni. Riprendere i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi dell'eventuale infezione secondaria attenendosi ad intervalli di 6-8 giorni.
CUCURBITACEE (CETRIOLO, ZUCCA, ZUCCHINO, COCOMERO, MELONE), SOLANACEE (POMODORO, PEPERONE,), FRAGOLA (fino alla prima fioritura)
Impiegare alla dose di 20-40 ml/hl iniziando i trattamenti alla prima comparsa dei sintomi della malattia e proseguendo ad intervalli di 8-12 giorni. Se si impiegano meno di 10 hl di acqua/ha aumentare la concentrazione in modo da distribuire 200-400 ml di CAPITOL 12 SC/ha.
MODALITÀ D'IMPIEGO
CAPITOL 12 SC si usa alle dosi indicate impiegando irroratrici a volume normale e la quantità d'acqua necessaria per bagnare abbondantemente tutta la vegetazione. Per l'impiego con irroratrici a basso volume, la concentrazione va proporzionalmente aumentata in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro.
PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare la quantità richiesta di CAPITOL 12 SC nella botte riempita a metà e agitare bene durante il completamento del riempimento. Non è necessaria l'aggiunta di bagnanti.
Avvertenza: Nella preparazione della miscela con Dodina 65 PB si consiglia di mantenere la poltiglia in costante agitazione; in caso di sosta durante il trattamento, agitare nuovamente bene la miscela prima della distribuzione.
COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. È compatibile con i più comuni fungicidi quali sali rameici, Dodina, Captano, Mancozeb, Zineb, Ziram, Clorotalonil e con i più comuni insetticidi ed acaricidi impiegati nelle colture che figurano in questa etichetta. Comunque, poiché non sono state provate tutte le possibili combinazioni con vari formulati commerciali, si suggerisce di provare la compatibilità fisica di ciascuna miscela estemporanea preparandone una piccola quantità prima dell'impiego.
Si raccomanda di attenersi alle dosi consigliate potendosi avere, nelle varietà sensibili, effetti sfavorevoli al verificarsi di avverse condizioni climatiche. Nel caso di miscela con altri principi attivi con i quali il CAPITOL 12 SC è compatibile, fare attenzione alle eventuali controindicazioni riportate nelle etichette dei prodotti con i quali si è fatta la miscela.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU PERO, PESCO E VITE, 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU MELO, 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SULLE ALTRE COLTURE.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

CONSERVARE IL PRODOTTO CHIUSO NEL CONTENITORE ORIGINALE, IN LUOGO ASCIUTTO E FRESCO
NON CONSERVARE PRESSO SORGENTI DI CALORE O FIAMME
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

etichetta formato ridotto

CAPITOL 12 SC

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Fungicida organico, localmente mobile nelle superfici verdi irrorate, per la lotta all'Oidio del melo, della vite, del pesco, delle cucurbitacee, del pomodoro, del peperone, della fragola, e per il controllo della Ticchiolatura del melo e del pero

CAPITOL 12 SC Registrazione Ministero della Salute n. 11132 del 08.01.2002

COMPOSIZIONE
FENARIMOL puro g. 11,4 (=120 g/l)
Coformulanti* q.b. a g.100
*contiene Glicole etilenico

Contenuto
5-10-50-100 ml
Partita n.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o solo formulazione):
DOW AgroSciences – King's Lynn – Norfolk (UK)
DIACHEM S.p.A. - U.P.SIFA – Caravaggio (BG)
CHEMIA S.p.A. – S.Agostino (FE)
Stabilimenti di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA Srl – San Colombano al Lambro (MI)
TERRANALISI Srl – Cento (FE)

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di ridotta fertilità. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Possibile rischio per i bambini allattati al seno.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta/foglio illustrativo

ZOLVIS 80 WDG

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Fungicida a base di zolfo per il controllo dell'oidio, ticchiolatura e moniliosi in viticoltura, frutticoltura, orto-floricoltura

ZOLVIS 80 WDG Registrazione Ministero della Salute n. 11345 del 30.05.2002

COMPOSIZIONE	
ZOLFO puro (esente da Selenio)	g. 80
Coformulanti q.b. a	g.100

Partita n.

IRRITANTE

Contenuto 100-200-250-300-400-500-700-750 g 1-2-5-10-25 Kg

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o solo formulazione):
BASFf Aktiengesellschaft Global Production Fungicides/ Insecticides - APP/FS – Q 305 - 67056 Ludwigshafen – Germany
SULPHUR MILLS LIMITED – Mumbai (India)
SAPEC AGRO S.A. - Setubal (Portogallo)
Stabilimento di confezionamento:
MANICA SpA – Via all'Adige, 4 – 38068 Rovereto (TN)
SINAPAK Snc – Stradella (PV)

FRASI DI RISCHIO: **Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.**

NORME PRECAUZIONALI: **Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Lo ZOLVIS 80 WDG è un fungicida in granuli idrodispersibili a base di zolfo, specifico per il controllo in viticoltura, frutticoltura, orto-floricoltura e in numerose altre colture agrarie ed ornamentali, dell'oidio, della ticchiolatura, dell'escoriosi, lebbra e moniliosi.
Lo ZOLVIS 80 WDG, grazie alla sua formulazione assicura una copertura uniforme della vegetazione, con conseguente elevata azione preventiva e bloccante contro gli oidi a partire da 10°C. Nella speciale formulazione in microgranuli evita la fastidiosa polverosità tipica dei preparati tradizionali in polvere pur mantenendo una perfetta solubilità in acqua.

MODALITÀ, DOSI e CAMPI D'IMPIEGO
Lo ZOLVIS 80 WDG si impiega diluito in acqua, con pompe a volume normale, con le seguenti modalità:
VITE: contro Oidio g. 200-400/hl iniziare i trattamenti molto presto (germogli 5-10 cm), proseguire poi in abbinamento con i prodotti antiperonosporici (Poltiglia Bordolese Industriale Manica). Nelle situazioni di forte pressione della malattia, per ottenere una più persistente durata d'azione ed un'azione eradicante e curativa, impiegare la dose di g. 600-1000/hl.
POMACEE (MELO, PERO): contro l'Oidio e ticchiolatura del melo g. 600/hl nei trattamenti pre-fiorali; g. 200-400/hl nei trattamenti post-fiorali. Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-12 giorni (adottando l'intervallo più breve al verificarsi delle condizioni climatiche più favorevoli alla malattia).
DRUPACEE (PESCO, NETTARINE, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO) E MANDORLO: contro Oidio g. 200-600/hl. Su **albicocco**, **pesco** e **nettarine** usare la dose più alta in pre-fioritura e dopo la raccolta, alla dose di g. 200-400/hl dopo la fioritura ripetendo i trattamenti dopo 10-15 giorni (adottando l'intervallo più breve al verificarsi delle condizioni climatiche più favorevoli alla malattia).
FRAGOLA: contro Oidio g. 200-500/hl.
NOCCIOLO: contro Oidio ed Eriofide g. 200-500/hl.
ORTAGGI: contro Oidio g. 200-500/hl. Intervenire alla comparsa dei primi sintomi della malattia e ripetere ad intervalli di 7-15 giorni (adottando l'intervallo più breve al verificarsi delle condizioni climatiche più favorevoli alla malattia). **Pisello** g. 200/hl, **pomodoro** g. 200-400/hl, **melone** g. 300-350/hl, **cocomero**, **cetriolo**, **zucca** g. 200-300/hl.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Oidio 8 Kg/ha dalla comparsa della malattia e proseguire con cadenza di circa 20 giorni.
CEREALI: contro Oidio 8 Kg/ha. Trattare alla comparsa della malattia dalla "levata" alla "spigatura".
FLOREALI ED ORNAMENTALI: contro Oidio g. 200-500/hl, intervenire alla comparsa dei primi sintomi della malattia.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare la quantità di prodotto prevista nella botte dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua e, mantenendo la massa in agitazione, portare al volume desiderato. Per la preparazione dei trattamenti antiparassitari composti da più principi attivi versare per ultimo lo ZOLVIS 80 WDG preventivamente stemperato a parte.

COMPATIBILITÀ
Lo ZOLVIS 80 WDG non è compatibile con antiparassitari alcalini, con oli minerali e captano.
Avvertenze agronomiche: Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego di oli minerali e captano.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
In tutti i campi di applicazione seguire le norme di buona pratica agricola evitando le ore di maggiore calore della giornata.
Il prodotto può arrecare danno alle cultivar di:
MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renella, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.
PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.
VITE: Sangiovese.
CUCURBITACEE: può essere fitotossico.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

DI 65/2003

Etichetta formato ridotto

ZOLVIS 80 WDG

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Fungicida a base di zolfo per il controllo dell'oidio, ticchiolatura e moniliosi in viticoltura, frutticoltura, orto-floricoltura

ZOLVIS 80 WDG Registrazione Ministero della Salute n. 11345 del 30.05.2002

COMPOSIZIONE	
ZOLFO puro (esente da Selenio)	g. 80
Coformulanti q.b. a	g.100

Partita n.

IRRITANTE

Contenuto **100 g**

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o solo formulazione):
BASFf Aktiengesellschaft Global Production Fungicides/ Insecticides - APP/FS – Q 305 - 67056 Ludwigshafen – Germany
SULPHUR MILLS LIMITED Mumbai (India)
SAPEC AGRO S.A. - Setubal (Portogallo)
Stabilimento di confezionamento:
MANICA SpA – Via all'Adige, 4 – 38068 Rovereto (TN)
SINAPAK Snc – Stradella (PV)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DI 65/2003

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

CURZEB PB

(POLVERE BAGNABILE)

Fungicida citotropico traslaminare e di contatto ad azione preventiva e curativa

CURZEB PB Registrazione Ministero della Salute n. 11398 del 17.07.2002

COMPOSIZIONE		
- CIMOXANIL puro	g.	4,2
- MANCOZEB puro	g.	40
- Coformulanti q.b.a		g.100

Contenuto:
100 -200-500 g
1-5-10-25 Kg
Partita n.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimenti di produzione:
Manica S.p.A. - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)
SULPHUR MILLS LIMITED – Mumbai (India)
DUSLO – Sala (Slovacchia)
DIACHEM S.p.A. – U.P.SIFA - Caravaggio (BG)
CHEMIA S.p.A. – S. Agostino (FE)
KING TECH CORPORATION – Shangai (Cina)

Stabilimenti di confezionamento: **SINAPAK Snc – Stradella (PV)**

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare al riparo dall'umidità. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4% e MANCOZEB 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL: derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica
Controindicazioni: ---
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Formulato in polvere bagnabile a base di Cimoxanil e Mancozeb, attivo sia per penetrazione all'interno dei tessuti verdi irrorati (azione preventiva e curativa) sia per contatto esterno (azione preventiva); è in grado quindi di arrestare lo sviluppo del micelio durante i primi stadi del periodo di incubazione e prevenire la germinazione degli organi di propagazione della malattia.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
VITE: 200-300 g/hl, intervenendo ad ogni infezione (o più semplicemente ad ogni pioggia) oppure preventivamente ogni 8-10 giorni (6-8 in caso di piogge ripetute e nelle fasi di rapido accrescimento vegetativo).
POMODORO: 250-300 g/hl, effettuare trattamenti preventivi a partire dal manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia (piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni fino alla prima fioritura; in presenza di attacchi di peronospora e alternaria elevare la dose a 300-350 g/hl.
TABACCO: effettuare trattamenti cadenzati di 8-10 giorni alla dose di 300-350 g/hl a partire dal manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.

Preparazione della miscela: Stemperare la quantità di prodotto prevista in poca acqua a parte; quindi versare la poltiglia così ottenuta nel serbatoio dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua e, continuando a mescolare, aggiungere il restante quantitativo di acqua fino al volume desiderato.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina (polisolfuri, calce, poltiglia bordolese).
AVVERTENZA: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta. Su pomodoro trattamenti ammessi solo fino alla prima fioritura.
Prima di rientrare nelle aree trattate attendere l'asciugatura della vegetazione. Per lavorazioni agricole successive al trattamento da effettuarsi entro i tempi di carenza del formulato, indossare indumenti protettivi e guanti atti ad evitare il contatto con la pelle.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON IMPIEGARE IN SERRA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CURZEB PB

(POLVERE BAGNABILE)

Fungicida citotropico traslaminare e di contatto ad azione preventiva e curativa

CURZEB PB Registrazione Ministero della Salute n. 11398 del 17.07.2002

COMPOSIZIONE	
- CIMOXANIL puro	g. 4,2
- MANCOZEB puro	g. 40
- Coformulanti q.b.a	g.100

Contenuto: 100 g

Partita n.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimenti di produzione:
Manica S.p.A. - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)
SULPHUR MILLS LIMITED – Mumbai (India)
DUSLO – Sala (Slovacchia)
DIACHEM S.p.A. – U.P.SIFA - Caravaggio (BG)
CHEMIA S.p.A. – S. Agostino (FE)
KING TECH CORPORATION – Shangai (Cina)

Stabilimenti di confezionamento: **SINAPAK Snc – Stradella (PV)**

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare al riparo dall'umidità. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4% e MANCOZEB 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL: derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica
Controindicazioni: ---
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

Etichetta/foglio illustrativo

ABOTRIL PB
(POLVERE BAGNABILE)
Fungicida antibotritico

ABOTRIL PB Registrazione Ministero della Salute n. 11399 del 17.07.2002

COMPOSIZIONE		
PROCIMIDONE puro	g. 50	
Coformulanti q.b. a	g.100	

Contenuto: **100-200-250-300-400-500-700-750 g 1-2-5-10-25 Kg.**

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Partita n

Stabilimento di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 – 38068 Rovereto (TN)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: **Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: l'ABOTRIL PB è un fungicida in polvere bagnabile particolarmente attivo nei confronti dei seguenti patogeni che affliggono le colture eduli e floreali: *Botrytis cinerea* (Muffa grigia), *Sclerotinia spp.* (Sclerotinia), *Rhizoctonia spp.* (Rizoctonia), *Monilia spp.* (Monilia), *Sclerotium cepivorum* (Marciume bianco dei bulbi), *Botrytis allii* (Botrite dell'aglio), *Botrytis squamosa* (Botrite della cipolla), *Alternaria spp.*, *Stemphylium spp.* (Maculatura bruna).

DOSI e MODALITÀ D'IMPIEGO: Le quantità sotto indicate si riferiscono all'utilizzo con volumi normali di acqua (1500-1800 litri per ettaro per le pomacee e le drupacee, 1000 litri per ettaro per la vite e 600-800 litri per ettaro per le colture erbacee). Qualora i trattamenti venissero effettuati con bassi volumi, adeguare le concentrazioni in modo da mantenere costante la quantità per ettaro che si somministrerebbe a volume normale.

VITE: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*). Intervenire alla dose di 100-150 g di prodotto per 100 litri di acqua nelle epoche di maggior rischio di infezione: fine fioritura, pre-chiusura grappolo, invaiatura, tre settimane prima del raccolto. In annate di normale pressione infettiva sono sufficienti due trattamenti: il primo in pre-chiusura del grappolo ed il secondo all'invaiatura. Nel caso di varietà particolarmente suscettibili (Pinot, Tocai, Merlot, Riesling, Verdicchio, Schiava, Barbera, Moscato bianco) è opportuno intervenire anche in fine fioritura.

DRUPACEE (PESCO, ALBICOCCO, SUSINO): contro Marciume bruno o Moniliosi (*Monilia spp.*) dei fiori: effettuare due o tre trattamenti nel periodo intercorrente tra la comparsa dei bottoni fiorali e la piena fioritura, alla dose di 150-200 g di prodotto ogni 100 litri d'acqua. Contro Marciume bruno o Moniliosi (*Monilia spp.*) dei frutti: intervenire alla dose di 100-150 g di prodotto ogni 100 litri d'acqua 4-5 e 2-3 settimane prima della raccolta.

MANDORLO: contro Marciume bruno o Moniliosi (*Monilia spp.*) intervenire nel periodo intercorrente tra la comparsa dei bottoni fiorali e la piena fioritura, alla dose di 150-200 g di prodotto ogni 100 litri d'acqua.

PERO: contro Maculatura bruna (*Stemphylium spp.*) intervenire alla dose di 100-150 g di prodotto ogni 100 litri d'acqua a partire dalla fine della fioritura, ogni 7-10 giorni, in funzione del pericolo di infezione. Le dosi sopra citate possono essere dimezzate miscelando il prodotto con formulati a base di Tiram, Ziram, Mancozeb o Captano, avendo cura di intensificare la cadenza dei trattamenti.

ACTINIDIA: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) e Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*). **Trattamenti in campo**: applicare 100 g per 100 litri di acqua alla fine della fioritura-inizio caduta dei petali ed eventualmente prima della raccolta. **Difesa in post-raccolta**: Trattamenti con doccia (drencher): utilizzare una sospensione allo 0,05% (50 g di prodotto ogni 100 litri di acqua). Trattamenti mediante immersione: immergere il materiale in una sospensione allo 0,05% (50 g di prodotto ogni 100 litri di acqua).

NOCCIOLO: contro Marciume bruno (*Monilia spp.*) applicare 75-100 g per 100 litri di acqua in prossimità dell'allegagione.

FRAGOLA: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) intervenire alla dose di 80-100 g di prodotto per 100 litri di acqua nelle epoche di maggior rischio di infezione: inizio fioritura, quando il 10-20% dei fiori sono aperti e alla sfioritura. È indispensabile un'ottima bagnatura della pianta.

POMODORO: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) intervenire alla dose di 80-100 g di prodotto per 100 litri di acqua a partire dalla fioritura del primo palco fiorale, ripetendo i trattamenti ogni 15 giorni.

LATTUGA, INDIVIA: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) e Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*) applicare 1,5-2 Kg/ha dopo il superamento della crisi di trapianto. Il trattamento può essere ripetuto ogni 10-12 giorni. In caso di colture non trapiantate intervenire quando la stagione decorre particolarmente piovosa. Si consiglia l'alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. Non effettuare più di due trattamenti per stagione.

MELANZANA, PEPERONE: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) e Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*) effettuare trattamenti alla parte aerea alla dose di 80-100 g per 100 litri di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti. Si consiglia l'alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. Su melanzana e peperone non effettuare rispettivamente più di tre e un intervento per stagione.

CETRIOLO: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) e Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*) effettuare trattamenti alla parte aerea alla dose di 100 g per 100 litri di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti.

FAGIOLINO: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) e Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*) effettuare trattamenti alla parte aerea alla dose di 100-150 g per 100 litri di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti.

AGLIO: contro Muffa grigia (*Botrytis allii*) effettuare trattamenti alla parte aerea alla dose di 100-200 g per 100 litri di acqua a partire dalla prima comparsa dei sintomi e sino alla quarta foglia.

CIPOLLA: contro Muffa grigia (*Botrytis squamosa*) e Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*) effettuare trattamenti alla parte aerea alla dose di 100-200 g per 100 litri di acqua avendo cura di utilizzare attrezzature a basso volume, a partire dalla comparsa dei sintomi e sino alla quarta foglia. Per migliorare la copertura del trattamento sulle superfici cerose, aggiungere alla sospensione un tensioattivo non ionico.

TABACCO: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) e Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*) applicare 1,5-2 Kg/ha dopo il superamento della crisi di trapianto.

GIRASOLE: Trattamenti di concia contro la Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*) alla dose di 100-200 g per 100 Kg di seme. Trattamenti alla parte aerea contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) e Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*): intervenire alla dose di 100 g per 100 litri di acqua effettuando uno-due trattamenti prima della fioritura.

COLZA: contro Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*) intervenire ad inizio fioritura alla dose di 1-1,5 Kg/ha.

FLOREALI in serra ed in campo (escluso il CICLAMINO): contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) intervenire alla dose di 40-80 g per 100 litri di acqua nei periodi di maggiore rischio infettivo, ripetendo eventualmente i trattamenti ogni 10-14 giorni. Contro Rizottoniosi (*Rhizoctonia spp.*) e Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*): 4 g/mq di superficie in 5-10 litri di acqua, dopo la crisi di trapianto.

AVVERTENZA PER LA CONCIA DELLE SEMENTI: I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: Stemperare la quantità di prodotto prevista in poca acqua a parte; quindi versare la poltiglia così ottenuta nel serbatoio dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua e, continuando a mescolare, aggiungere il restante quantitativo di acqua fino al volume desiderato.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto è miscibile con i fitofarmaci a reazione neutra.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Sulle colture floreali, data la grande varietà di specie e cultivars, è consigliabile effettuare saggi preliminari su piccole superfici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER PESCO, ALBICOCCO, PERO, FRAGOLA, CETRIOLO, POMODORO, PEPERONE, ACTINIDIA, MELANZANA, LATTUGA, INDIVIA, FAGIOLINO; 21 GIORNI PER VITE, SUSINO, GIRASOLE; 45 GIORNI PER COLZA; 60 GIORNI PER ACTINIDIA POST-RACCOLTA.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 63/2003

Etichetta formato ridotto

ABOTRIL PB

(POLVERE BAGNABILE)

Fungicida antibotritico

ABOTRIL PB Registrazione Ministero della Salute n. 11399 del 17.07.2002

COMPOSIZIONE	
PROCIMIDONE puro	g. 50
Coformulanti q.b. a	g.100

Contenuto:
100 g.

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Partita n

Stabilimento di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 – 38068 Rovereto (TN)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

Etichetta/foglio illustrativo

TIXAL MZ

(POLVERE BAGNABILE)

Fungicida specifico per la lotta contro la Peronospora della vite, del pomodoro e del tabacco

TIXAL MZ Registrazione del Ministero della Salute N° 11488 del 22.10.2002

COMPOSIZIONE		
METALAXIL puro	g.	8
MANCOZEB puro	g.	64
Coformulanti q.b. a	g.	100

Partita n.

IRRITANTE

Contenuto:
25-50-100-250-500 g.
1-5-10 Kg.

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimenti di produzione:
MANICA SpA - Rovereto (TN)
STI - Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (Ravenna)
UNITED PHOSPHORUS Ltd – Sandbach, Cheshire (Regno Unito)
SULPHUR MILLES LIMITED – Mumbai (India)
DUSLO – Sala (Slovacchia)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE)
KING TECH CORPORATION – Shangai (Cina)
Stabilimento di confezionamento: **SINAPAK Snc** – Stradella (PV)

FRASI DI RISCHIO: **Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.**

NORME PRECAUZIONALI: **Conservare al riparo dall'umidità. Non respirare le polveri. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL 8% e MANCOZEB 64%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL: Sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore pre-cordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il TIXAL MZ è un fungicida ad azione preventiva e curativa specificatamente indicato per la lotta contro le Peronosporacee delle colture di **VITE, TABACCO** e **POMODORO**.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il primo trattamento verrà eseguito dopo il verificarsi della prima pioggia infettante; per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permetterà di mantenere delle cadenze fisse sganciate dalle piogge. Infatti anche le piogge abbondanti e ripetute non diminuiscono l'efficacia del trattamento. La traslocazione acropeta di TIXAL MZ consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo che intercorre tra un trattamento ed un altro.

• **PERONOSPORA DELLA VITE** (Plasmopara Viticola): 250 g/hl di acqua fino ad allegagione avvenuta eseguendo i trattamenti ad intervalli di 10-12 giorni.
Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare la buona copertura della vegetazione. Per la lotta contemporanea contro l'Oidio, miscelare il prodotto agli anticrittogamici previsti per questo scopo. L'impiego di TIXAL MZ è particolarmente indicato nelle zone e condizioni in cui il rame può dare luogo a fitotossicità o comunque a fenomeni secondari negativi a carico della vite.

• **PERONOSPORA DEL TABACCO** (Peronospora tabacina): 300 g/hl di acqua. Iniziare i trattamenti non appena la coltura abbia superato la crisi del trapianto con cadenza di 10 giorni. Ciò consentirà la protezione totale della coltura anche nei periodi di elevata pressione di infezione. Onde evitare la comparsa di infezioni durante la fase della crisi di trapianto, eseguire un trattamento in semenzaio 1-2 giorni prima della messa a dimora delle piantine in campo alla dose di 300 g/hl di acqua.

• **PERONOSPORA DEL POMODORO** (Phytophtora infestans): 250 g/hl di acqua ad intervalli di 10-12 giorni. Sospendere i trattamenti con la prima fioritura del pomodoro.

COMPATIBILITÀ

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SU VITE E TABACCO SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. SU POMODORO SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALLA PRIMA FIORITURA.

Durante l'operazione di carico del prodotto nel dispositivo di irrorazione indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto

TIXAL MZ

(POLVERE BAGNABILE)

Fungicida specifico per la lotta contro la Peronospora della vite, del pomodoro e del tabacco

TIXAL MZ Registrazione del Ministero della Salute N° 11488 del 22.10.2002

COMPOSIZIONE	
METALAXIL puro	g. 8
MANCOZEB puro	g. 64
Coformulanti q.b. a	g. 100

Partita n.

IRRITANTE

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimenti di produzione:
MANICA SpA - Rovereto (TN)
STI - Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (Ravenna)
UNITED PHOSPHORUS Ltd – Sandbach, Cheshire (Regno Unito)
SULPHUR MILLES LIMITED – Mumbai (India)
DUSLO – Sala (Slovacchia)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE)
KING TECH CORPORATION – Shangai (Cina)
Stabilimento di confezionamento: **SINAPAK Snc** – Stradella (PV)

Contenuto:
25-50-100 g.

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta..

NORME PRECAUZIONALI: Conservare al riparo dall'umidità. Non respirare le polveri.
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL 8% e MANCOZEB 64%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL: Sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore pre-cordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

Etichetta/foglio illustrativo

ABOTRIL WG

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Fungicida antibotritico

ABOTRIL WG Registrazione Ministero della Salute n. 11489 del 22.10.2002

COMPOSIZIONE
PROCIMIDONE puro g. 50
Coformulanti q.b. a g.100

Contenuto:
100-200-250-300-400-500-700-750 g 1-2-5-10-25 Kg.

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN) Partita n

Stabilimenti di produzione:
A.D.I.C.A. S.r.l. Via dello Stabilimento, 11 - Nera Montoro (Terni)
STI Solfotecnica Italiana Spa - Via Evangelista Torricelli, 2 - Cotignola (RA)
KING TECH CORPORATION- Shangai (Cina)
SULPHUR MILLS LIMITED, India
Confezionamento: **SINAPAK Snc- Stradella (PV)**

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: l'ABOTRIL WG è un fungicida in granuli idrodispersibili particolarmente attivo nei confronti dei seguenti patogeni che affliggono le colture eduli e floreali: *Botrytis cinerea* (Muffa grigia), *Sclerotinia spp.* (Sclerotinia), *Rhizoctonia spp.* (Rizoctonia), *Monilia spp.* (Monilia), *Sclerotium cepivorum* (Marciume bianco dei bulbi), *Botrytis allii* (Botrite dell'aglio), *Botrytis squamosa* (Botrite della cipolla), *Alternaria spp.*, *Stemphylium spp.* (Maculatura bruna).

DOSI e MODALITÀ D'IMPIEGO: Le quantità sotto indicate si riferiscono all'utilizzo con volumi normali di acqua (1500-1800 litri per ettaro per le pomacee e le drupacee, 1000 litri per ettaro per la vite e 600-800 litri per ettaro per le colture erbacee). Qualora i trattamenti venissero effettuati con bassi volumi, adeguare le concentrazioni in modo da mantenere costante la quantità per ettaro che si somministrerebbe a volume normale.
VITE: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*). Intervenire alla dose di 100-150 g di prodotto per 100 litri di acqua nelle epoche di maggior rischio di infezione: fine fioritura, pre-chiusura grappolo, invaiatura, tre settimane prima del raccolto. In annate di normale pressione infettiva sono sufficienti due trattamenti: il primo in pre-chiusura del grappolo ed il secondo all'invaiatura. Nel caso di varietà particolarmente suscettibili (Pinot, Tocai, Merlot, Riesling, Verdicchio, Schiava, Barbera, Moscato bianco) è opportuno intervenire anche in fine fioritura.
DRUPACEE (PESCO, ALBICOCCO, SUSINO): contro Marciume bruno o Moniliosi (*Monilia spp.*) dei fiori: effettuare due o tre trattamenti nel periodo intercorrente tra la comparsa dei bottoni fiorali e la piena fioritura, alla dose di 150-200 g di prodotto ogni 100 litri d'acqua. Contro Marciume bruno o Moniliosi (*Monilia spp.*) dei frutti: intervenire alla dose di 100-150 g di prodotto ogni 100 litri d'acqua 4-5 e 2-3 settimane prima della raccolta.
MANDORLO: contro Marciume bruno o Moniliosi (*Monilia spp.*) intervenire nel periodo intercorrente tra la comparsa dei bottoni fiorali e la piena fioritura, alla dose di 150-200 g di prodotto ogni 100 litri d'acqua.
PERO: contro Maculatura bruna (*Stemphylium spp.*) intervenire alla dose di 100-150 g di prodotto ogni 100 litri d'acqua a partire dalla fine della fioritura, ogni 7-10 giorni, in funzione del pericolo di infezione. Le dosi sopra citate possono essere dimezzate miscelando il prodotto con formulati a base di Tiram, Ziram, Mancozeb o Captano, avendo cura di intensificare la cadenza dei trattamenti.
ACTINIDIA: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) e Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*). **Trattamenti in campo**: applicare 100 g per 100 litri di acqua alla fine della fioritura-inizio caduta dei petali ed eventualmente prima della raccolta. **Difesa in post-raccolta**: Trattamenti con doccia (drencher): utilizzare una sospensione allo 0,05% (50 g di prodotto ogni 100 litri di acqua). Trattamenti mediante immersione: immergere il materiale in una sospensione allo 0,05% (50 g di prodotto ogni 100 litri di acqua).
NOCCIOLO: contro Marciume bruno (*Monilia spp.*) applicare 75-100 g per 100 litri di acqua in prossimità dell'allegagione.
FRAGOLA: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) intervenire alla dose di 80-100 g di prodotto per 100 litri di acqua nelle epoche di maggior rischio di infezione: inizio fioritura, quando il 10-20% dei fiori sono aperti e alla sfioritura. È indispensabile un'ottima bagnatura della pianta.
POMODORO: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) intervenire alla dose di 80-100 g di prodotto per 100 litri di acqua a partire dalla fioritura del primo palco fiorale, ripetendo i trattamenti ogni 15 giorni.
LATTUGA, INDIVIA: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) e Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*) applicare 1,5-2 Kg/ha dopo il superamento della crisi di trapianto. Il trattamento può essere ripetuto ogni 10-12 giorni. In caso di colture non trapiantate intervenire quando la stagione decorre particolarmente piovosa. Si consiglia l'alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. Non effettuare più di due trattamenti per stagione.
MELANZANA, PEPERONE: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) e Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*) effettuare trattamenti alla parte aerea alla dose di 80-100 g per 100 litri di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti. Si consiglia l'alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. Su melanzana e peperone non effettuare rispettivamente più di tre e un intervento per stagione.
CETRIOLO: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) e Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*) effettuare trattamenti alla parte aerea alla dose di 100 g per 100 litri di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti.
FAGIOLINO: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) e Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*) effettuare trattamenti alla parte aerea alla dose di 100-150 g per 100 litri di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti.
AGLIO: contro Muffa grigia (*Botrytis allii*) effettuare trattamenti alla parte aerea alla dose di 100-200 g per 100 litri di acqua a partire dalla prima comparsa dei sintomi e sino alla quarta foglia.
CIPOLLA: contro Muffa grigia (*Botrytis squamosa*) e Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*) effettuare trattamenti alla parte aerea alla dose di 100-200 g per 100 litri di acqua avendo cura di utilizzare attrezzature a basso volume, a partire dalla comparsa dei sintomi e sino alla quarta foglia. Per migliorare la copertura del trattamento sulle superfici cerose, aggiungere alla sospensione un tensioattivo non ionico.
TABACCO: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) e Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*) applicare 1,5-2 Kg/ha dopo il superamento della crisi di trapianto.
GIRASOLE: Trattamenti di concia contro la Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*) alla dose di 100-200 g per 100 Kg di seme. Trattamenti alla parte aerea contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) e Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*): intervenire alla dose di 100 g per 100 litri di acqua effettuando uno-due trattamenti prima della fioritura.
COLZA: contro Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*) intervenire ad inizio fioritura alla dose di 1-1,5 Kg/ha.
FLOREALI in serra ed in campo (escluso il CICLAMINO): contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) intervenire alla dose di 40-80 g per 100 litri di acqua nei periodi di maggiore rischio infettivo, ripetendo eventualmente i trattamenti ogni 10-14 giorni. Contro Rizottoniosi (*Rhizoctonia spp.*) e Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*): 4 g/mq di superficie in 5-10 litri di acqua, dopo la crisi di trapianto.

AVVERTENZA PER LA CONCIA DELLE SEMENTI: I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame: Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: Versare la giusta quantità di prodotto direttamente nel serbatoio dell'irroratrice, preventivamente riempito con 2/3 dell'intero quantitativo di acqua che si intende distribuire, tenendo in funzione il meccanismo di agitazione. Completare il riempimento del serbatoio e procedere al trattamento.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto è miscibile con i fitofarmaci a reazione neutra.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Sulle colture floreali, data la grande varietà di specie e cultivars, è consigliabile effettuare saggi preliminari su piccole superfici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER PESCO, ALBICOCCO, PERO, FRAGOLA, CETRIOLO, POMODORO, PEPERONE, ACTINIDIA, MELANZANA, LATTUGA, INDIVIA, FAGIOLINO; 21 GIORNI PER VITE, SUSINO, GIRASOLE; 45 GIORNI PER COLZA; 60 GIORNI PER ACTINIDIA POST-RACCOLTA.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto

ABOTRIL WG

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Fungicida antibotritico

ABOTRIL WG Registrazione Ministero della Salute n. 11489 del 22.10.2002

COMPOSIZIONE		
PROCIMIDONE puro		g. 50
Coformulanti	q.b. a	g.100

Contenuto: **100 g**

Partita n

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimenti di produzione:

A.D.I.C.A. S.r.l. Via dello Stabilimento, 11 - Nera Montoro (Terni)

STI Solfotecnica Italiana Spa - Via Evangelista Torricelli, 2 - Cotignola (RA)

KING TECH CORPORATION- Shangai (Cina)

SULPHUR MILLS LIMITED, India

Confezionamento: **SINAPAK Snc- Stradella (PV)**

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

Etichetta/foglio illustrativo

CURZEB WG

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Fungicida citotropico traslaminare e di contatto ad azione preventiva e curativa

CURZEB WG Registrazione Ministero della Salute n. 11490 del 22.10.2002

COMPOSIZIONE	
- CIMOXANIL puro	g. 4
- MANCOZEB puro	g. 40
- Coformulanti q.b.a	g.100

Contenuto: 100 -200-500 g
1-5-10-25 Kg
Partita n.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimenti di produzione:
A.D.I.C.A. Srl - Via dello Stabilimento, 11 – Nera Montoro (Terni)
STI Solfotecnica Italiana Spa
Via Evangelista Torricelli, 2 – Cotignola (RA)
SULPHUR MILLS LIMITED –Mumbai (INDIA)
KING TECH CORPORATION – XinShi, Fengxian – Shangai (Cina)
Stabilimento di confezionamento:
SINAPACK SNC – Stradella (PV)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare al riparo dall'umidità. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4% e MANCOZEB 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL: derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica
Controindicazioni: ---
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Formulato in granuli idrodispersibili, attivo sia per penetrazione all'interno dei tessuti verdi irrorati (azione preventiva e curativa) sia per contatto esterno (azione preventiva); è in grado quindi di arrestare lo sviluppo del micelio durante i primi stadi del periodo di incubazione e prevenire la germinazione degli organi di propagazione della malattia.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE: 200-300 g/hl, intervenendo ad ogni infezione (o più semplicemente ad ogni pioggia) oppure preventivamente ogni 8-10 giorni (6-8 in caso di piogge ripetute e nelle fasi di rapido accrescimento vegetativo).
POMODORO: 250-300 g/hl, effettuare i trattamenti preventivi a partire dal manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia (piogge, bagnature) e ripeterli ogni 6-10 giorni fino alla prima fioritura; in presenza di attacchi di peronospora e alternaria elevare la dose a 300-350 g/hl.
TABACCO: effettuare trattamenti cadenzati di 8-10 giorni alla dose di 300-350 g/hl iniziando gli interventi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.

Preparazione della miscela: Versare la giusta quantità di prodotto direttamente nel serbatoio dell'irroratrice, preventivamente riempito con 2/3 dell'intero quantitativo di acqua che si intende distribuire, tenendo in funzione il meccanismo di agitazione. Completare il riempimento del serbatoio e procedere al trattamento.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina (polisolfuri, calce, poltiglia bordolese).
AVVERTENZA: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta. Su pomodoro trattamenti ammessi solo fino alla prima fioritura.
Prima di rientrare nelle aree trattate attendere l'asciugatura della vegetazione. Per lavorazioni agricole successive al trattamento, da effettuarsi entro i tempi di carenza del formulato, indossare indumenti protettivi e guanti atti ad evitare il contatto con la pelle.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON IMPIEGARE IN SERRA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

Etichetta formato ridotto

CURZEB WG

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)
Fungicida citotropico traslaminare e di contatto ad azione preventiva e curativa

CURZEB WG Registrazione Ministero della Salute n. 11490 del 22.10.2002

COMPOSIZIONE	
- CIMOXANIL puro	g. 4
- MANCOZEB puro	g. 40
- Coformulanti q.b.a	g.100

Contenuto: **100 g**

Partita n.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimenti di produzione:
A.D.I.C.A. Srl - Via dello Stabilimento, 11 – Nera Montoro (Terni)
STI Solfotecnica Italiana Spa
Via Evangelista Torricelli, 2 – Cotignola (RA)
SULPHUR MILLS LIMITED –Mumbai (INDIA)
KING TECH CORPORATION – XinShi, Fengxian – Shangai (Cina)
Stabilimento di confezionamento: **SINAPACK SNC** – Stradella (PV)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare al riparo dall'umidità. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4% e MANCOZEB 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL: derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica
Controindicazioni: ---
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

OSSICLOR 20 SC

Fungicida cuprico a base di ossicloruro di rame in pasta fluida (flowable)

OSSICLOR 20 SC Registrazione Ministero della Salute n. 11577 del 03.02.2003

COMPOSIZIONE:	
RAME metallico	g. 20 (=284 g/l)
(sotto forma di ossicloruro)	
Coformulanti q.b. a	g.100

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimenti di produzione:
Diachem S.p.a. Unità produttiva SIFA
S.S. Padana Superiore Km. 185,800 - Caravaggio (BG)
Terranalisi S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - Cento (FE)
Manica S.p.A. - Via all'Adige, 4 – Rovereto (TN)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto: **50–100–250–500 ml 1–2–5–10-15–20-25 litri** Partita n.

FRASI DI RISCHIO: **Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

NORME PRECAUZIONALI: **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

OSSICLOR 20 SC è un anticrittogamico in emulsione fluida (flowable) a base di rame ossicloruro che agisce in forma preventiva, come prodotto di contatto.
Colture protette (le dosi sono riferite a 100 litri di acqua salvo diversa indicazione).
ORTAGGI, PATATA: contro Alternariosi, Antracnosi, Peronospora, Ticchiolatura, Batteriosi, Septoriosi alla dose di **450-550 ml**.
VITE: contro Peronospora alla dose di **400-550 ml**.
MELO, PERO: contro la Ticchiolatura alla dose di **400-450 ml** prima della fioritura e **350 ml** dopo la fioritura. Nei trattamenti autunno-inverno **800-1000 ml**.
AGRUMI: contro Fumaggine, Mal Secco, Gommosi, Allupatura **450-550 ml.**
DRUPACEE: contro Corineo, Bolla e Cancro dei rametti con trattamenti invernali **800-1000 ml**.
TABACCO: contro Peronospora **450-550 ml**.
OLIVO: contro Fumaggine e Occhio di pavone alla dose di **450-550 ml**.
FLORICOLE, ORNAMENTALI: contro la Ticchiolatura, Batteriosi, Antracnosi, Alternariosi, Peronospora, Septoriosi alla dose di **400-500 ml**.
FRAGOLA: contro la Vaiolatura **450-550 ml**.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro la Peronospora e la Cercospora alla dose di **4 litri** per **ettaro** di coltura.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari in commercio, esclusi quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON OPERARE CONTRO VENTO

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

D. 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

OSSICLOR 20 SC

Fungicida cuprico a base di ossicloruro di rame in pasta fluida (flowable)

OSSICLOR 20 SC Registrazione Ministero della Salute n. 11577 del 03.02.2003

COMPOSIZIONE:	
RAME metallico	g. 20 (=284 g/l)
(sotto forma di ossicloruro)	
Coformulanti q.b. a	g.100

Contenuto: **50–100 ml**

Partita n.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimenti di produzione:
Diachem S.p.a. Unità produttiva SIFA
S.S. Padana Superiore Km. 185,800 - Caravaggio (BG)
Terranalisi S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - Cento (FE)
Manica S.p.A. - Via all'Adige, 4 – Rovereto (TN)

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CUPROSPOR® 50 PB

Anticrittogamico in polvere bagnabile

CUPROSPOR 50 PB Registrazione Ministero della Salute n. 11878 del 10.12.2003

COMPOSIZIONE		
- RAME metallico	g. 50	Partita n.
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)		
- Supporti e disperdenti q.b. a	g.100	

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)
Stabilimento di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Distribuito da: **SIVAM SpA** – Via Scarlatti, 30 – 20124 Milano

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: **Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi** acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare **lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti** protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezze.

Contenuto: 10-20-50-100-200-250-300-500-700-750 g '-2-5-10-20 Kg

NORME PRECAUZIONALI: **Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: **denaturazione delle proteine con lesioni a livello della mucosa, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo.** Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: **gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.**

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

I CUPROSPOR 50 PB è un anticrittogamico in polvere bagnabile contenente il 50% di rame metallo sotto forma di ossicloruro di rame. È indicato nella lotta contro: Peronospora, Ticchiolatura, Antracnosi, Alternariosi, Septoriosi, Cercosporiosi, Occhio di pavone, Muffa grigia. È dotato di persistenza e resistenza al dilavamento.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

I prodotto si impiega alle seguenti dosi per 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale.

VITE: contro Peronospora **200-500 g/hl**. Effettuare i normali trattamenti sulla base di calendari di lotta comunemente usati in zona. Impiegare il prodotto preferibilmente dopo la fioritura della vite. Contro l'Oidio aggiungere un antioidico specifico (zolfo bagnabile, ecc.).

MELO, PERO, COTOGNO: contro Ticchiolatura e Cancri rameali:
- trattamenti autunnali o di fine inverno **400-1000 g**;
- trattamenti da ingrossamento delle gemme a mazzetti affioranti **300-500 g**;
- trattamenti da fine fioritura ad inizio caduta foglie **200 g**.

Da non usare durante il periodo vegetativo sulle varietà di melo e di pero sensibili ai prodotti rameici.

DRUPACEE (PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO), MANDORLO: contro Bolla, Corineo e Cancri rameali: nei trattamenti invernali dalla caduta foglie a fine inverno **800-1200 g**, nei trattamenti a gemme rigonfie **600-800 g**.

OLIVO: contro Occhio di pavone, Fumaggine e Lebbra **300-500 g**.

AGRUMI: contro Mal secco, Gommosi, Batteriosi, Antracnosi e Fumaggine **400-500 g**.

FRAGOLA: contro Maculatura rosso-bruna e zonata (Marssonina e Gnomonia), Vaiolatura rossa (Mycosphaerella) **200-400 g**.

FRUTTIFERI MINORI, NOCE ED ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO: contro Cancri rameali in trattamenti autunnali o di fine inverno **400-1000 g**. In trattamenti primaverili **200 g**.

PATATA: contro Peronospora ed altre crittogame parassite (Alternaria, Septoria) **200-400 g**.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cercospora: **4 Kg** per ettaro.

ORTAGGI (cavoli, carciofo, asparago, ortaggi a foglia, cucurbitacee, solanacee, legumi, ortaggi a radice, ortaggi a bulbo, ecc.):
- contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Cladosporiosi del pomodoro **200-500 g**.
- contro Cercospora e Septoria del sedano e della carota **200-500 g**.
- contro Peronospora ed Antracnosi di melone, anguria, zucchino, cetriolo **200-500 g**.
- contro Antracnosi e Ruggine del pisello, fagiolo, fagiolino **200-500 g**.
- contro Peronospora dei cavoli e di altre crucifere **200-500 g**.
- contro Peronospora della cipolla, del carciofo e del cardo **400-600 g**.

OLEAGINOSE: contro Peronospora e Antracnosi **200-500 g**.

TABACCO: contro Peronospora e Antracnosi: **200-500 g**.

CEREALI: contro Ruggine e Septoria: **200-500 g**.

COLTURE FLOREALI (rosa, garofano, crisantemo, ecc.), ORNAMENTALI E FORESTALI: contro Ruggine, Peronospora, Ticchiolatura e Septoria: per trattamenti estivi **200-500 g**, per trattamenti invernali **800-1000 g**.

RISO: per la lotta contro le Alghe delle risaie intervenire alla prima comparsa delle alghe, impiegando **3-4 Kg** per ettaro diluiti in 200-300 o più litri di acqua.

CONCIA DELLE SEMENTI DI CEREALI (frumento, orzo, segale, avena, grano saraceno, miglio, ecc., esclusi mais, sorgo e riso): contro carie **150 g** per 100 Kg di seme.

PER LA RAMATURA DEGLI ZOLFI VENTILATI: 5-10 Kg in 70-80 Kg di zolfo.

Per tutti gli impieghi sopra indicati, iniziare i trattamenti prima della comparsa delle malattie e ripetere i trattamenti secondo lo sviluppo delle stesse. Il CUPROSPOR 50 PB va impiegato secondo i normali calendari di lotta (da 8 a 12 giorni) a seconda delle condizioni di temperatura e di umidità (in caso di stagione particolarmente piovosa andranno impiegate le dosi maggiori nell'intervallo di tempo più corto). In caso di impiego di irroratrici a basso volume, le dosi prescritte vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto.

Avvertenza: I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame.

Preparazione: stemperare la quantità di prodotto prevista in poca acqua a parte, quindi versare la miscela così ottenuta nel serbatoio dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua e, continuando a miscelare, aggiungere il restante quantitativo di acqua fino al volume desiderato.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è miscibile con formulati a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

(*) Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana.

(**) Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CUPROSPOR® 50 PB

Anticrittogamico in polvere bagnabile

CUPROSPOR 50 PB Registrazione Ministero della Salute n. 11878 del 10.12.2003

COMPOSIZIONE		
- RAME metallico	g. 50	Partita n.
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)		
- Supporti e disperdenti q.b. a	g.100	

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Distribuito da: **SIVAM SpA** – Via Scarlatti, 30 – 20124 Milano

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Contenuto: 10-20-50-100 g

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

Etichetta/foglio illustrativo

COBREFOL®

Anticrittogamico per la viticoltura
Polvere Bagnabile

COBREFOL Registrazione Ministero della Salute n. 11887 del 10.12.2003

COMPOSIZIONE

FOLPET PURO	**g. 30**
RAME METALLICO PURO	**g. 15**
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)	
Inerti, disperdenti, bagnanti q.b. a	**g.100**

Contenuto: 100-200-500- g 1-10-20 Kg Partita n.

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimenti di produzione:
DIACHEM S.p.A. – Unità produttiva S.I.F.A. – Caravaggio (BG)
CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE)
A.D.I.C.A. Srl – Nera Montoro (Terni)
SULPHUR MILLS LIMITED – Mumbai (India)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: **Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

NORME PRECAUZIONALI: **Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Folpet 30% e Rame metallico 15% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FOLPET - **Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica.**
RAME- **Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.**
Terapia: **gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.**
Avvertenza: **Consultare un Centro Antiveleni.**

MODALITÀ DI IMPIEGO

COBREFOL trova impiego sulla vite, alle dosi valide per 100 litri di acqua e per trattamenti a volume normale:
VITE: contro Peronospora **250-300 g;** contro Botrytis **300 g**.

Preparazione della sospensione
Il COBREFOL, nella dose necessaria, deve essere prima stemperato in poca acqua a parte e poi aggiunto al quantitativo di acqua totale; aggiungere nella miscela antiparassitaria BAGNANTE ADESIVO S, ove le condizioni del trattamento lo consigliano.

COMPATIBILITÀ
Miscibile con la maggior parte degli antiparassitari in commercio e con tutti quelli di nostra produzione ad esclusione degli oli minerali e polisolfuri.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non si deve trattare durante la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta per uve da tavola. Su uve da vino sospendere i trattamenti almeno 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

D . 65/2003

Etichetta formato ridotto

COBREFOL®

Anticrittogamico per la viticoltura
Polvere Bagnabile

COBREFOL Registrazione Ministero della Salute n. 11887 del 10.12.2003

COMPOSIZ ONE	
FOLPET PURO	**g. 30**
RAME METALLICO PURO	**g. 15**
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)	
Inerti, disperdenti, bagnanti q.b. a	**g.100**

Contenuto: 100 g Partita n.

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione:
DIACHEM S.p.A. – Unità produttiva S.I.F.A. – Caravaggio (BG)
CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE)
A.D.I.C.A. Srl – Nera Montoro (Terni)
SULPHUR MILLS LIMITED – Mumbai (India)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Può pro vocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui** nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare **immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Folpet 30% e Rame metallico 15% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FOLPET - Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibiliz-zazione e resistenza a terapia; Irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica.
RAME- Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

LUMIX

(SOSPENSIONE DI CAPSULE)

Insetticida polivalente a bassa tossicità

LUMIX Registrazione Ministero della Salute n. 11953 del 16.01.2004

COMPOSIZIONE
FENITROTION puro g. 37,5 (= 400 g/l)
Coformulanti q.b. a g.100

Partita n.

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
CHEMIA SpA – S. Agostino (FE)
IRCA SERVICE SpA – Fornivo S. Giovanni (BG)
Stabilimento di confezionamento: **SIKIM Srl – Mozzanica (BG)**

Contenuto: 100-250-500 ml 1-2,5-5-10-15-20 L

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Fenitrotion: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsione, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
LUMIX è un insetticida-ovicida a bassa tossicità ed ampio spettro d'azione, impiegabile su un gran numero di colture arboree ed erbacee. Grazie alla tecnologia di microincapsulazione, libera progressivamente il principio attivo, rendendo così l'azione insetticida costante e duratura nel tempo. Il prodotto, possiede anche un'azione acaricida.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

- **VITE**, contro
  - Tignole all'inizio della fase crescente delle catture, dopo 7-13 giorni oppure alla comparsa di uova o fori di penetrazione 160-190 ml/hl
  - Tripidi ai primi sintomi, dopo il germogliamento 300 ml/hl
  - Cicaline a inizio infestazione (2 forme mobili/foglia) 300 ml/hl
- **POMACEE**, contro:
  - Carpocapsa al superamento della soglia di 2 adulti/trappola catturati in 1-2 settimane 190 ml/hl
  - Psille, Afidi e Tentredini ai primi sintomi di infestazione 190 ml/hl
- **FRAGOLA**, contro: Eulia, Pandemis e Afidi ai primi sintomi di infestazione 160-190 ml/hl
- **DRUPACEE**, contro:
  - Anarsia 7 catture per trappola/settimana, intervenendo dopo 15 giorni per la prima generazione, 6 giorni per le successive 170-190 ml/hl
  - Cydia 10 catture per trappola/settimana, intervenendo dopo 7-8 giorni per la seconda generazione, 4-6 giorni per le successive 170-190 ml/hl
  - Tripidi, Cocciniglie e Afidi ai primi sintomi di infestazione 170-190 ml/hl
- **AGRUMI**, contro: Cocciniglie, Afidi, Tripidi, Mosca della frutta nel corso della migrazione delle neanidi (2 trattamenti distanziati 10-12 giorni); per la mosca ad inizio infestazioni 190-250 ml/hl
- **CASTAGNO**, contro : Afidi e Carpocapsa 170-190 ml/hl
- **MANDORLO, NOCE, NOCCIOLO**, contro : Afidi, Carpocapsa, Lecanio e Altica 170-190 ml/hl
- **OLIVO**, contro: Mosca, Tignola, Margaronia, Cocciniglie intervenire ai primi sintomi di infestazione. Nel corso della migrazione delle neanidi 2 trattamenti distanziati di 10–12 giorni 190 ml/hl
- **ORTAGGI**, contro: Afidi, Cavolaie, Casside, Vanessa, Depressaia, Criocera, Tipule, Nottue, Piralide, Dorifora, Punteruolo, Tignole, Mosca alla comparsa dell'infestazione 160-190 ml/hl
- **PATATA**, contro: Dorifora 160-190 ml/hl
- **CEREALI**, contro: Afidi, Lema, Coppette e Chironomi 1,5–2 l/ha
- **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO** contro: Altica, Cleono, Lisso e Casside alla comparsa delle erinosi fogliari 250-310 ml/hl
- **ERBA MEDICA**, contro Misurino 160-190 ml/hl
- **TABACCO**, contro: Afidi e Nottue 160-190 ml/hl
- **FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI**, contro: Mosche, Tripidi e Cocciniglie alla comparsa delle infestazioni 125 ml/hl
- **PIOPPO**, contro: Tarlo vespa , Saperda e Afide lanigero 125 ml/hl

Il prodotto si impiega con attrezzature a volume normale aventi ugelli e filtri con fori di diametro non inferiore a 0,30 mm (50 mesh).

Preparazione della miscela: agitare e mescolare prima dell'uso. Diluire la prescritta dose d'impiego in poca acqua a parte, rimescolando con cura e successivamente diluire nel totale quantitativo d'acqua, mantenendo in agitazione la massa.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è miscibile con formulati a reazione alcalina (es. Polisolfuri, Poltiglia Bordolese, ecc.).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per le api, gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame. Non trattare durante la fioritura, non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente od accidentalmente prima che siano trascorsi 20 gg. dal trattamento.

Avvertenze: Non rientrare nelle zone trattate prima che la superficie fogliare sia completamente asciutta. Per operazioni agricole da effettuare sulle colture trattate, entro i tempi di carenza, utilizzare dispositivi di protezione individuale al fine di evitare il contatto cutaneo. Tabellare le aree trattate con cartelli indicanti il trattamento e il divieto di accesso agli estranei. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

LUMIX

(SOSPENSIONE DI CAPSULE)

Insetticida polivalente a bassa tossicità

LUMIX Registrazione Ministero della Salute n. 11953 del 16.01.2004

COMPOSIZIONE
FENITROTION puro g. 37,5 (= 400 g/l)
Coformulanti q.b. a g.100

Partita n.

Contenuto: **100 ml**

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
CHEMIA SpA – S. Agostino (FE)
IRCA SERVICE SpA – Fornivo S. Giovanni (BG)
Stabilimento di confezionamento: **SIKIM Srl – Mozzanica (BG)**

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Fenitrotion: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsione, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

TIXAL R

(POLVERE BAGNABILE)

Fungicida sistemico e di contatto, con azione curativa e preventiva

TIXAL R Registrazione del Ministero della Salute N°12334 del 06.09.2004

COMPOSIZIONE	
- METALAXIL puro	g. 5
- RAME	g. 40
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)	
- Coformulanti q.b. a	g. 100

MANICA SpA
Via all'Adige, 4
38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione:

KING TECH CORPORATION
Shangai (Cina)

Partita n°

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

Contenuto: **100-250-500 g. 1-5-10 Kg.**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL 5% e RAME 40%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
RAME: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il TIXAL R è un fungicida a base di Metalaxil e Rame ossicloruro che agisce con azione preventiva e curativa. L'attività sistemica del prodotto consente la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo che intercorre tra un trattamento e l'altro, inoltre impedisce che il prodotto venga dilavato dalle piogge cadute dopo il trattamento.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

• **VITE**: contro la Peronospora 400 g/hl di acqua. Effettuare un trattamento cautelativo in pre-fioritura ed i successivi ad intervalli di 10-12 giorni fino ad allegagione avvenuta. Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare la buona copertura della vegetazione. Per la lotta contemporanea contro l'Oidio, miscelare il prodotto agli anticrittogamici previsti per questo scopo.

• **POMODORO**: contro la Peronospora 400 g/hl di acqua alla cadenza di 10-12 giorni.

• **PATATA**: contro la Peronospora 4 Kg/ha, effettuando non più di 2-3 trattamenti alla cadenza di 10-12 giorni. Iniziare le applicazioni al verificarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.

• **FRAGOLA**: contro Marciume del colletto (*Phytophtora cactorum*) 4 Kg/ha. Effettuare 2 trattamenti al colletto 15 e 45 giorni dopo l'impianto.

• **CETRIOLO, COCOMERO**: contro Peronospora delle cucurbitacee (*Pseudoperonospora cubensis*) 4 Kg/ha. Effettuare 2-3 trattamenti iniziando gli interventi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia (piogge, bagnature).

• **CAVOLO VERZA**: contro Peronospora delle crucifere (*Peronospora brassicae*) 4 Kg/ha. Effettuare 2-3 trattamenti iniziando gli interventi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia (piogge, bagnature).

• **SOIA**: contro Peronospora (*Peronospora manshurica*) 4 Kg/ha. Effettuare 2-3 trattamenti iniziando gli interventi al manifestarsi delle condizioni scatenanti la malattia (piogge, bagnature).

• **MELO**: contro Marciume del colletto (*Phytophtora cactorum*), applicare al colletto 150 g di prodotto/pianta alla ripresa vegetativa. Bagnare bene la zona del colletto ed il terreno sottostante.

• **FLOREALI, ORNAMENTALI**: contro Peronospora 300-400 g/hl di acqua, iniziando i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.

Preparazione della miscela: Stemperare la quantità di prodotto prevista in poca acqua a parte; quindi versare la poltiglia così ottenuta nel serbatoio dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua e, continuando a mescolare, aggiungere il restante quantitativo di acqua fino al volume desiderato.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è miscibile con gli insetticidi ed anticrittogamici a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non si deve trattare durante la fioritura. Sulle colture floreali ed ornamentali, data la notevole variabilità delle cultivar, non intervenire prima di aver effettuato saggi preliminari su piccole superfici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, COCOMERO, MELO, CETRIOLO, PATATA; 28 GIORNI PER VITE; 40 GIORNI PER FRAGOLA; 60 GIORNI PER CAVOLO VERZA; 150 GIORNI PER LA SOIA.

Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON OPERARE CONTRO VENTO

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

D . 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

TIXAL R

(POLVERE BAGNABILE)

Fungicida sistemico e di contatto, con azione curativa e preventiva

TIXAL R Registrazione del Ministero della Salute N°12334 del 06.09.2004

COMPOSIZIONE
- METALAXIL puro g. 5
- RAME g. 40
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)
- Coformulanti q.b. a g. 100

MANICA SpA
Via all'Adige, 4
38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione:

KING TECH CORPORATION
Shangai (Cina)

Partita n°

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto: **100 g.**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL 5% e RAME 40%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
RAME: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

Gibrelin®

FITOREGOLATORE LIQUIDO IN SOLUZIONE STABILE

COMPOSIZIONE

Acido gibberellico puro .... g 1,8 (18,6g/l)
Coformulanti .... q.b. a g 100,0

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Carciofi: per anticipare e concentrare il periodo di raccolta, nel caso di **2 trattamenti** si tratta con 50 ml/hl al differenziarsi del primo capolino e ripetendo dopo 15 giorni; nel caso di **4 trattamenti** con 25 ml/hl al differenziarsi del primo capolino e ripetendo i trattamenti ogni 15 giorni. Impiegare 4-5 hl/Ha di soluzione. Irrigare prima o subito dopo i trattamenti. In caso di gelate, per stimolare la ripresa della coltura, trattare con 50 ml/hl quando la temperatura è ritornata ai valori normali e le piante si sono riprese. Le varietà che meglio rispondono al trattamento sono quelle a capolini verdi, meno bene quelle violette.

Fragole: per anticipare e concentrare il periodo di raccolta, si tratta alla dose di 100-200 ml/hl impiegando 5-8 hl/Ha, 4-6 settimane prima del periodo di normale fioritura. Le varietà che meglio rispondono al trattamento sono: Gorella, Pocahontas, Red Gauntlet, Cambridge Favorite, Surprise des Halles. Nelle zone solite a freddi improvvisi, si sconsiglia di anticipare la produzione e quindi l'impiego del fitoregolatore.

Patate: per stimolare l'emissione regolare dei germogli nei tuberi da seme, s'immergono per 10 minuti in una soluzione di 5 ml/hl per tuberi sezionati e 25 ml/hl per tuberi interi, asciugando e seminando subito dopo. Per i tuberi provenienti da magazzino di conservazione, lasciare trascorrere 3-4 settimane di pregerminazione.

FRUTTI:

Pero: per migliorare l'allegagione nelle varietà di difficile impollinazione o partenocarpiche, si tratta alla dose di 50-100 ml/hl impiegando 10 hl/Ha quando il 20-30 % di fiori sono aperti nelle aree settentrionali e quando il 90 % dei fiori sono aperti nelle aree meridionali. In caso di gelate durante la fioritura , per contrastare i danni da sterilità dei fiori trattare entro le 48 ore alla dose di 100 - 125 ml/hl e impiegando 10-15 hl/Ha. In caso di gelate a fiore chiuso, attendere per trattare la piena fioritura. Le varietà che meglio rispondono al trattamento sono: Passa Crassana, Trionfo di Vienna, Butirra Giffard, Coscia, William, Spadone, Gentilona, Spadoncina, Buono Luisa d'Avranches. Si sconsiglia l'impiego sulla varietà Decana del Comizio. **Dosi eccessive** possono modificare l'aspetto dei frutti e ridurre la fioritura dell'anno successivo mentre **trattamenti tardivi** inducono un eccessivo sviluppo della parte fogliare.

Arancio: per migliorare la qualità della buccia, si tratta alla dose di 50-100 ml/hl impiegando 50 hl/Ha, dopo l'invaiatura.

Limone: per ritardare la raccolta e ridurre la presenza di frutti piccoli, si tratta alla dose di 50 ml/hl prima dell'invaiatura.

Clementini e Mandarini: per migliorare l'allegagione, specie negli ibridi di scarsa produzione si tratta alla dose di 50 ml/hl in piena fioritura per i mandarini e quando i 2/3 dei petali dei fiori sono caduti per i clementini, bagnando completamente le piante.

Metodi di impiego: Al momento dell'uso, sciogliere la quantità prevista di prodotto in poca acqua e diluire poi il tutto. La soluzione acquosa è instabile e va utilizzata in giornata.

Fitotossicità: Il prodotto può indurre deformazioni indesiderate sui frutti del pero. La forzatura chimica rende le colture maggiormente sensibili alle variazioni climatiche.

Il prodotto è tecnicamente miscibile con i prodotti a reazione neutra.
E comunque consigliabile impiegarlo da solo.

Sospendere il trattamento 20 giorni prima della raccolta

Attenzione:da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

L. Gobbi S.r.l.
Via B. Bosco, 57 - 16121 Genova

Officina di produzione : L.Gobbi S.r.l.- Campo Ligure (GE) / E. Gerlach GmbH- Lübbecke-Germania / Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI) / Diachem S.p.A. - SIFA - Caravaggio (BG) / TORRE srl - Torrenieri (SI)

Reg. n°: 5494 del 03-10-1983 del Min. San.

® Marchio registrato della l. Gobbi s.r.l.

Partita N°: (Vedasi sigla)

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto: 100 ml , 250 ml, 500 ml, 1 litro, 3 litri, 5 litri, 10 litri

etichetta per confezione di formato ridotto

Gibrelin®

Fitoregolatore liquido in soluzione stabile

COMPOSIZIONE
Acido gibberellico puro...g 1,8 (18,6g/l)
Coformulanti..q.b. a g 100,0

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
MODALITÀ DI IMPIEGO
Carciofi, Fragole, Patate:
FRUTTI: Pero, Arancio, Clementini e Mandarini:
Dose di impiego: 50-200 ml/hl
Metodi di impiego: Al momento dell'uso, sciogliere la quantità prevista di prodotto in poca acqua e diluire poi il tutto. La soluzione acquosa è instabile e va utilizzata in giornata.
L. Gobbi S.r.l.
Via B. Bosco, 57 - 16121 Genova
Officina di produzione : L.Gobbi S.r.l.- Campo Ligure (GE) / E. Gerlach GmbH- Lübbecke-Germania / Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI) / Diachem S.p.A. - SIFA - Caravaggio (BG) / TORRE srl - Torrenieri (SI)
Reg. n°: 5494 del 03/10/1983 del Min. San.
® Marchio registrato della L. Gobbi s.r.l.
Partita N°: Vedasi sigla
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto netto: 25 ml, 50 ml

AVVERTENZA
Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Foglietto illustrativo

Gibrelin®

Fitoregolatore liquido in soluzione stabile

COMPOSIZIONE
Acido gibberellico puro .... g 1,8 (18,6g/l)
Coformulanti .... q.b. a g 100,0

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
MODALITÀ DI IMPIEGO
Carciofi: per anticipare e concentrare il periodo di raccolta, nel caso di **2 trattamenti** si tratta con 50 ml/hl al differenziarsi del primo capolino e ripetendo dopo 15 giorni; nel caso di **4 trattamenti** con 25 ml/hl al differenziarsi del primo capolino e ripetendo i trattamenti ogni 15 giorni. Impiegare 4-5 hl/Ha di soluzione. Irrigare prima o subito dopo i trattamenti. In caso di gelate, per stimolare la ripresa della coltura, trattare con 50 ml/hl quando la temperatura è ritornata ai valori normali e le piante si sono riprese. Le varietà che meglio rispondono al trattamento sono quelle a capolini verdi, meno bene quelle violette.
Fragole: per anticipare e concentrare il periodo di raccolta, si tratta alla dose di 100-200 ml/hl impiegando 5-8 hl/Ha, 4-6 settimane prima del periodo di normale fioritura. Le varietà che meglio rispondono al trattamento sono: Gorella, Pocahontas, Red Gauntlet, Cambridge Favorite, Surprise des Halles. Nelle zone solite a freddi improvvisi, si sconsiglia di anticipare la produzione e quindi l'impiego del fitoregolatore.
Patate: per stimolare l'emissione regolare dei germogli nei tuberi da seme, s'immergono per 10 minuti in una soluzione di 5 ml/hl per tuberi sezionati e 25 ml/hl per tuberi interi, asciugando e seminando subito dopo. Per i tuberi provenienti da magazzino di conservazione, lasciare trascorrere 3-4 settimane di pregerminazione.
FRUTTI:
Pero: per migliorare l'allegagione nelle varietà di difficile impollinazione o partenocarpiche, si tratta alla dose di 50-100 ml/hl impiegando 10 hl/Ha quando il 20-30 % di fiori sono aperti nelle aree settentrionali e quando il 90 % dei fiori sono aperti nelle aree meridionali. In caso di gelate durante la fioritura , per contrastare i danni da sterilità dei fiori trattare entro le 48 ore alla dose di 100 - 125 ml/hl e impiegando 10-15 hl/Ha. In caso di gelate a fiore chiuso, attendere per trattare la piena fioritura. Le varietà che meglio rispondono al trattamento sono: Passa Crassana, Trionfo di Vienna, Butirra Giffard, Coscia, William, Spadone, Gentilona, Spadoncina, Buono Luisa d'Avranches. Si sconsiglia l'impiego sulla varietà Decana del Comizio. **Dosi eccessive** possono modificare l'aspetto dei frutti e ridurre la fioritura dell'anno successivo mentre **trattamenti tardivi** inducono un eccessivo sviluppo della parte fogliare.
Arancio: per migliorare la qualità della buccia, si tratta alla dose di 50-100 ml/hl impiegando 50 hl/Ha, dopo l'invaiatura.
Limone: per ritardare la raccolta e ridurre la presenza di frutti piccoli, si tratta alla dose di 50 ml/hl prima dell'invaiatura.
Clementini e Mandarini: per migliorare l'allegagione, specie negli ibridi di scarsa produzione si tratta alla dose di 50 ml/hl in piena fioritura per i mandarini e quando i 2/3 dei petali dei fiori sono caduti per i clementini, bagnando completamente le piante.
Metodi di impiego: Al momento dell'uso, sciogliere la quantità prevista di prodotto in poca acqua e diluire poi il tutto. La soluzione acquosa è instabile e va utilizzata in giornata.
Fitotossicità: Il prodotto può indurre deformazioni indesiderate sui frutti del pero. La forzatura chimica rende le colture maggiormente sensibili alle variazioni climatiche.
Il prodotto è tecnicamente miscibile con i prodotti a reazione neutra.
E comunque consigliabile impiegarlo da solo.
Sospendere il trattamento 20 giorni prima della raccolta
Attenzione:da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
L. Gobbi S.r.l.
Via B. Bosco, 57 - 16121 Genova
Officina di produzione : L.Gobbi S.r.l.- Campo Ligure (GE) / E. Gerlach GmbH- Lübbecke-Germania / Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI) / Diachem S.p.A. - SIFA - Caravaggio (BG) / TORRE srl - Torrenieri (SI)
Reg. n°: 5494 del 03-10-1983 del Min. San.
® Marchio registrato della L. Gobbi s.r.l.
Partita N°: (Vedasi sigla)
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto netto: 25 ml, 50 ml

Obsthormon® AN

Fitoregolatore liquido

Impedisce la caduta prematura delle mele e delle pere

COMPOSIZIONE

NAA puro.. g 6,86 (= 76,7g/l)
Agente bagnante e diluente stabilizzante ....q.b. a g. 100

Attenzione: Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il dosaggio delle concentrazioni va regolato in base alla temperatura della stagione, usando una concentrazione più debole per le qualità che vengono irrorate in una stagione con temperatura più mite ed una concentrazione più forte per qualità che vengono irrorate in una stagione con temperatura più fredda.

Con temperature inferiori ai 10 °C **Obsthormon AN** non può agire.

Le dosi sotto indicate si riferiscono ad una temperatura ambientale di circa 20 °C. Per ogni aumento di 5 °C occorre ridurre la dosi dello 0,01%.

MELE precocissime: irrorare 8 -15 giorni prima della raccolta alla dose dello 0,015 - 0,020 %, cioè 15 - 20 ml per 100 litri di acqua.

MELE precoci: irrorare 10-18 giorni prima della raccolta alla dose dello 0,020 - 0,025 %, cioè 20 -25 ml per 100 litri di acqua.

MELE normali: irrorare 10-20 giorni prima della raccolta alla dose dello 0,025 - 0,030%, cioè 25 - 30 ml per 100 litri di acqua.

MELE tardive: irrorare 10 -20 giorni prima della raccolta alla dose dello 0,025 - 0,030 %, cioè 25 - 30 ml per 100 litri di acqua.

PERE precoci: irrorare 7 giorni prima della raccolta alla dose di 20 ml per 100 litri di acqua.

PERE estive: irrorare 7-10 giorni prima della raccolta alla dose di 25 ml per 100 litri di acqua.

PERE autunnali: irrorare 10 giorni prima della raccolta alla dose di 30 ml per 100 litri di acqua.

PERE invernali: 1° trattamento a fine Agosto alla dose di 25-30 ml per 100 litri di acqua.

2° trattamento: 10 giorni prima della raccolta alla dose 25 -30 ml per 100 litri di acqua.

Irrorare alla sera ed evitare le ore soleggiate

Per certe qualità di mele e pere, come quelle con buccia liscia, grassa, spessa, sarà opportuno ripetere l'irrorazione, nel caso che si verifichi ancora la caduta dei frutti.

Irrorare con apparecchi ad imboccatura sottile, procurando di bagnare entrambe le pagine delle foglie, ma in modo di non farle gocciolare.

Tra il momento dell'applicazione ed un'eventuale precipitazione atmosferica, devono intercorrere almeno cinque ore perché si mantenga l'efficacia del preparato.

Non miscelare con antiparassitari.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

L. Gobbi s.r.l.
Via B. Bosco, 57 - 16121 Genova

Officina di produzione e sede:
L. Gobbi S.r.l.-Campo Ligure (GE) / Eduard Gerlach GmbH, Lübbecke - Germania
® Marchio registrato della: Eduard Gerlach GmbH - Germania
Registrazione N° 5993 del 21-06-1984 del Min.San.

PARTITA N° (vedasi sigla)

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto: 100-300-1000 ml

Germon® L

Fitoregolatore liquido

Stimola la formazione ed il maggior sviluppo delle radici

Bewurzelungsfluid per talee legnose

COMPOSIZIONE

NAA puro ....g 0,66 (6,74g/l)
Solvente e Coformulanti ....q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Diluire **100 ml** di prodotto in **5 litri** di acqua. Immergere la base delle talee, per circa **2 cm,** in questa soluzione per un periodo di 30 minuti circa.
Non si deve adoperare la stessa soluzione per due trattamenti.
Non miscelare con antiparassitari.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

L. Gobbi S.r.l., Via B. Bosco 57
16121 Genova.

Officina di produzione e sede: L. Gobbi S.r.l. – Campo Ligure (GE) / E. Gerlach GmbH- Lübbecke, Germania
® Marchio registrato della E. Gerlach GmbH-Germania
Reg. N° 6136 del 08-11-1984 del Min.San.
PARTITA N° vedasi sigla

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto netto: 100-300-1000 ml

Germon® E

FITOREGOLATORE LIQUIDO
STIMOLA LA FORMAZIONE ED IL MAGGIOR SVILUPPO DELLE RADICI
BEWURZELUNGFLUID PER TALEE ERBACEE

COMPOSIZIONE
NAA puro.. g 0,26 (2,66 g/l)
Solvente e coformulanti ....q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.
MODALITÀ DI IMPIEGO
Diluire da 2 a 5 ml di prodotto in 1 litro di acqua. Immergere la base delle talee riunite in mazzetti nella soluzione ottenuta per 1-2 cm, per un periodo di 24 ore.
Dopo tale trattamento sciacquare le talee con acqua e porle a dimora nel più breve tempo possibile
Non si deve adoperare la stessa soluzione per due trattamenti
Non si consiglia la miscela con antiparassitari.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

L. Gobbi s.r.l.
Via B. Bosco, 57 - 16121 GENOVA
Officina di produzione e sede: L.Gobbi S.r.l.- Campo Ligure (GE) / E. Gerlach GmbH- Lübbecke, Germania
® Marchio registrato della E. Gerlach GmbH-Germania
Reg. N° 6166 del 20. 12. 1984 del Min.San.
Partita N° Vedasi sigla
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto netto: 100-300-1000 ml

Stimolante 66f®

Fitoregolatore liquido: Stimolante di germinazione e di accrescimento

COMPOSIZIONE
NAA puro ....g 0,01 (0,10 g/l)
Soluzione equilibrata di microelementi ....g 0,11 (1,16 g/l)
Solvente stabilizzante e Coformulanti ....q.b. a g. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Lo stimolante 66f può avere i seguenti diversi impieghi:
SEMENZAI:
Per anticipare la germinazione dei semi ed ottenere una germinazione completa immergere i semi per 12-24 ore in una soluzione dello stimolante 66f alla dose di 1 ml in 5 litri di acqua o soluzione antiparassitaria.
Continuare il trattamento per stimolare la crescita irrorando le prime foglie della piantina con la stessa soluzione per 3-4 volte ad intervalli settimanali.
TRAPIANTO DI:
TALEE ERBACEE, TALEE LEGNOSE, ARBUSTIVE E DI VITE.
Immergere l'apparato radicale della piantina da trapiantare e irrorare subito dopo la messa a dimora le foglie con una soluzione dello stimolante 66f (1 ml in 5 litri di acqua o soluzione antiparassitaria). Ripetere il trattamento per 4-5 volte ad intervalli settimanali. Si evita in questo modo la crisi tipica del trapianto.
PER ANTICIPARE LA CRESCITA DI:
PIANTE FRUTTIFERE (Pero,Melo, Pesco),OLIVO, FRAGOLA, PIANTE ORTIVE (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Zucchino, Spinacio, Asparago, Carciofo, Radicchio).
PIANTE FORESTALI, PIANTE DA VIVAIO:
Irrorare abbondantemente le foglie con la soluzione ottenuta, diluendo lo stimolante 66f alla dose di 20 ml in 100 litri di acqua o soluzione antiparassitaria. I trattamenti vanno effettuati durante il periodo di vegetazione e ripetuti almeno 4-5 volte a distanza di 10-15 giorni.
FIORI E PIANTE ORNAMENTALI:
Diluire lo stimolante 66f alla dose di 1 ml in 5 litri di acqua o soluzione antiparassitaria ed irrorare una o due volte alla settimana per tutto il periodo della crescita.
Lo **Stimolante 66f** è compatibile con gli antiparassitari.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere il trattamento 7 gg prima della raccolta per pero, melo, pesco, pomodoro, peperone, melanzana, zucchino, spinaci, carciofo e radicchio; 24 gg prima per olivo; 27 gg prima per fragola e asparago.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

l. gobbi
Via B. Bosco, 57 – Genova
Officina di produzione e sede:
L.Gobbi S.r.l.- Campo Ligure (GE)
E. Gerlach GmbH- Lübbecke, Germania
® MARCHIO REGISTRATO DELLA E. GERLACH GMBH-GERMANIA
Reg. N° 6321 del 03-04-1985 del Min. San.
Partita N° Vedasi sigla
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto netto: **100 - 300 - 500 - 1000 ml**

etichetta per confezione di formato ridotto

Stimolante 66f ®
FITOREGOLATORE LIQUIDO
Stimolante di germinazione e di accrescimento

COMPOSIZIONE

NAA puro .... g 0,01 (0,10 g/l)
Soluzione equilibrata di microelementi. .... g 0,11(1,16 g/l)
Solvente stabilizzante e Coformulanti ....q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.
MODALITÀ DI IMPIEGO
Lo **Stimolante 66f** può avere i seguenti diversi impieghi:
SEMENZAI-TRAPIANTO DI:
TALEE ERBACEE, TALEE LEGNOSE, ARBUSTIVE E DI VITE
PER ANTICIPARE LA CRESCITA DI PIANTE FRUTTIFERE (Pero,Melo, Pesco), OLIVO, FRAGOLA,
PIANTE ORTIVE (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Zucchino, Spinacio, Asparago, Carciofo, Radicchio)
PIANTE FORESTALI, PIANTE DA VIVAIO
FIORI E PIANTE ORNAMENTALI.

Dose: 1 ml in 5 litri o 20 ml in 100 litri di acqua o soluzione antiparassitaria.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

L. Gobbi S.r.l.
Via B. Bosco 57 - 16121 Genova
Officina di produzione e sede:
L.Gobbi S.r.l.- Campo Ligure (GE)
E. Gerlach GmbH- Lübbecke, Germania
® Marchio registrato della Eduard Gerlach GmbH-Germania

Reg. N° 6321 del 03-04-1985 del Min.San.

Partita N° vedasi sigla

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto: **ml 5-20**

AVVERTENZA
Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Foglietto illustrativo

Stimolante 66f ®

Fitoregolatore liquido: Stimolante di germinazione e di accrescimento

COMPOSIZIONE
NAA puro .... g 0,01 (0,10 g/l)
Soluzione equilibrata di microelementi .... g 0,11 (1,16 g/l)
Solvente stabilizzante e coformulanti .... q.b a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.
MODALITÀ DI IMPIEGO
Lo **Stimolante 66f** può avere i seguenti diversi impieghi:
SEMENZAI:
Per anticipare la germinazione dei semi ed ottenere una germinazione completa immergere i semi per 12-24 ore in una soluzione dello stimolante 66f alla dose di **1 ml in 5 litri di acqua** o soluzione antiparassitaria. Continuare il trattamento per stimolare la crescita irrorando le prime foglie della piantina con la stessa soluzione per 3-4 volte ad intervalli settimanali.
TRAPIANTO DI:
TALEE ERBACEE, TALEE LEGNOSE, ARBUSTIVE E DI VITE.
Immergere l'apparato radicale della piantina da trapiantare e irrorare subito dopo la messa a dimora le foglie con una soluzione dello **Stimolante 66f** (**1 ml in 5 litri di acqua** o soluzione antiparassitaria). Ripetere il trattamento per 4-5 volte ad intervalli settimanali. Si evita in questo modo la crisi tipica del trapianto.
PER ANTICIPARE LA CRESCITA DI:
PIANTE FRUTTIFERE (Pero, Melo, Pesco), OLIVO, FRAGOLA, PIANTE ORTIVE (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Zucchino, Spinacio, Asparago, Carciofo, Radicchio).
PIANTE FORESTALI, PIANTE DA VIVAIO:
Irrorare abbondantemente le foglie con la soluzione ottenuta, diluendo lo stimolante 66f alla dose di **20 ml in 100 litri di acqua** o soluzione antiparassitaria. I trattamenti vanno effettuati durante il periodo di vegetazione e ripetuti almeno 4-5 volte a distanza di 10-15 giorni.
FIORI E PIANTE ORNAMENTALI:
Diluire lo **Stimolante 66f** alla dose di **1 ml in 5 litri di acqua** o soluzione antiparassitaria ed irrorare una o due volte alla settimana per tutto il periodo della crescita.
Lo **Stimolante 66f** è compatibile con gli antiparassitari.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere il trattamento 7 gg prima della raccolta per pero, melo, pesco, pomodoro, peperone, melanzana, zucchino, spinacio, carciofo e radicchio; 24 gg prima per olivo; 27 gg prima per fragola e asparago.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
L. Gobbi S.r.l.
Via B. Bosco 57 - 16121 Genova
Officina di produzione e sede:
L.Gobbi S.r.l.- Campo Ligure (GE)
E. Gerlach GmbH- Lübbecke, Germania
Reg. N° 6321 del 03-04-1985 del Min.San.
Partita n° vedasi sigla
® **Marchio registrato della Eduard Gerlach GmbH – Germania**
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto netto: ml 5-20

Obsthormon 24a ®

Fitoregolatore liquido

Impedisce la caduta prematura delle mele, delle pere e delle pesche

COMPOSIZIONE

NAA puro ....g 7,5 (84 g/l)

Agente bagnante e diluente stabilizzante ....q.b. a g. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Il dosaggio delle concentrazioni va regolato in base alla temperatura della stagione, usando una concentrazione più debole per le qualità che vengono irrorate in una stagione con temperatura più mite ed una concentrazione più forte per qualità che vengono irrorate in una stagione con temperatura più fredda.

Con temperature inferiori ai 10 °C Obsthormon 24a non può agire.

Le dosi sotto indicate si riferiscono ad una temperatura ambientale di circa 20 °C. Per ogni aumento di 5 °C occorre ridurre la dose del 10,0%.

MELE precocissime: irrorare 7 giorni prima del raccolto alla dose di 15 ml per 100 litri di acqua.

MELE precoci: irrorare 10-18 giorni prima del raccolto alla dose di 25 -30 ml per 100 litri di acqua.

MELE normali: irrorare 10-20 giorni prima del raccolto alla dose di 30 - 50 ml per 100 litri di acqua.

MELE tardive: irrorare 12 -20 giomi prima del raccolto alla dose di 50 - 75 ml per 100 litri di acqua.

PERE: irrorare 10 - 14 giorni prima del raccolto alla dose di 50 ml per 100 litri di acqua.

Per certe qualità di mele e pere, come quelle con buccia liscia, grassa, spessa, sarà opportuno ripetere l'irrorazione, nel caso che si verifichi ancora la caduta dei frutti, rispettando la carenza di 7 giorni.

Irrorare con apparecchi ad imboccatura sottile, procurando di bagnare entrambe le pagine delle foglie, ma in modo da non farle gocciolare.

Tra il momento dell'applicazione ed un'eventuale precipitazione atmosferica, devono intercorrere almeno cinque ore perchè si mantenga l'efficacia del preparato.

PESCO: Effettuare il primo trattamento circa 15-20 giorni e il secondo trattamento 7 giorni prima della raccolta alla dose di 45-70 ml per 100 litri di acqua.

Non si consiglia la miscela con antiparassitari.

Sospendere il trattamento 7 gg prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

L. **Gobbi s.r.l.**

Via B. Bosco, 57 - 16121 GENOVA

Officina di produzione e sede: L.Gobbi S.r.l.- Campo Ligure (GE) / E. Gerlach GmbH- Lübbecke, Germania

® Marchio registrato della E. Gerlach GmbH-Germania

Reg. N° 6322 del 03-04-1985 del Min.San.

Partita N° Vedasi sigla

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto: 100-300-500-1000 ml

Lumakorn®

Lumachicida: assicura la completa protezione delle colture orticole e ornamentali dagli attacchi di lumache (arionidi e limacidi), chiocciole (elicidi). La sua azione persiste a lungo essendo resistente alla pioggia e inattaccabile dalle muffe.

COMPOSIZIONE
Metaldeide pura ....g 4
Coformulanti e supporti ....q.b. a g 100

Attenzione: Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle. Sintomi di intossicazione: violenti dolori addominali -diarrea - vomito biancastro (aspetto di latte cagliato) - choc - midriasi - ipotermia - convulsioni - obnubilazione del sensorio. Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso. Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio (5 g/l di acqua)- riscaldare il paziente - cardiotonici - fleboclisi clorurate o glucosate con noradrenalina - diuretici - barbiturici - neuroplegici - anfetamina e derivati in caso di torpore.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Spargere i granuli lungo le file della coltura da difendere intensificando la distribuzione nelle aree maggiormente infestate. Impiegare il prodotto all'atto della semina e ripetere il trattamento per 2-3 volte ad intervalli di tre settimane. Non è necessario uno spargimento uniforme, dato l'effetto attrattivo esercitato sulle lumache. Utilizzare il prodotto preferibilmente nel tardo pomeriggio e possibilmente dopo la pioggia.
Dosi di impiego: da 3 a 5 kg/ha oppure 3-5 g/10 m^2.
Periodo di impiego: Prima e dopo l'attacco di lumache o chiocciole.
Compatibilità: Non è prevista la miscela con altri prodotti.
Rischi di nocività: Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Sospendere i trattamenti 20 gg prima della raccolta.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

L. Gobbi S.r.l.
Via B. Bosco, 57 - 16121 Genova
Officina di produzione e sede:
E. Gerlach GmbH - Lübbecke, Germania
Diachem, Albano S. Alessandro (BG)
Diachem, U.P. SIFA, Caravaggio (BG)
Chemia SpA, S. Agostino (FE),
Scam Srl, S. Maria di Mugnano (MO)
Lifa Srl, Vigonovo (VE)
Lifa Srl, Isola Vicentina (VI)
Reg. N° 7068 del 26-05-1987 del Min.San.
® **Marchio registrato della L. Gobbi S.r.l.**
Partita N°: Vedasi sigla
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto netto: 50-100-200-500-1000 g, 3-5-10-20 kg

DIRAGER ®
FITOREGOLATORE DIRADANTE IN FORMULAZIONE LIQUIDA

COMPOSIZIONE
NAA puro...g 3,3 (37 g/l)
Bagnante e solvente stabilizzante ....q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.
MODALITÀ DI IMPIEGO
Il **Dirager** è un fitoregolatore liquido a base di NAA ad azione diradante. Questo prodotto può essere impiegato in una fase di sviluppo avanzata e cioè quando il frutticino centrale del mazzetto ha raggiunto un diametro di 10 - 12 mm. circa. Il Dirager è efficace su pomacee. Si diluiscono 30 - 50 ml. di prodotto in 100 litri d'acqua e si irrora la chioma dell'albero, soprattutto la metà superiore. Le condizioni ottimali per il trattamento sono: temperatura compresa tra i 10° e 25° C, alto grado di umidità e poco vento. Non occorre l'aggiunta di un bagnante in quanto già incluso nella composizione del formulato.

Non si consiglia la miscela con antiparassitari.
Sospendere il trattamento 7 gg prima della raccolta.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
L. Gobbi S.r.l.
Via B. Bosco 57 - 16121 Genova.
Officina di produzione e sede: L.Gobbi S.r.l.- Campo Ligure (GE) / E. Gerlach GmbH- Lübbecke, Germania / Diachem S.p.A.- UP SIFA, Caravaggio (BG) / Althaller Italia Srl - S. Colombano al Lambro (MI)
® Marchio registrato della L. Gobbi S.r.l. - Genova
Reg. N° 7411 del 18-02-1988 del Min.San.
Partita N° (vedasi sigla)
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto netto: 50 - 100 - 150 - 300 - 500 - 750 - 1000 ml

Germon® Bewurzelungspuder K per talee erbacee

Fitoregolatore in polvere: stimola ed intensifica lo sviluppo delle radici

COMPOSIZIONE

NAA puro ....g 0,4
Supporto attivante..q.b. a g 100

Attenzione: Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Immergere nella polvere per circa 2 cm. la base della talea, dopo averla leggermente inumidita per consentire una migliore adesione della polvere. Eliminato l'eventuale eccesso di polvere, sistemare la talea nel modo usuale nelle aiuole di sviluppo, facendo attenzione di non asportare la polvere applicata.
Non si consiglia la miscela con antiparassitari.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

L. Gobbi S.r.l.
Via B. Bosco, 57 - 16121 Genova

Officina di produzione e sede: E. Gerlach GmbH- Lübbecke, Germania / Diachem S.p.a. - U.P. SIFA, Caravaggio (BG) / IRCA S.p.a., Albano S. Alessandro (BG)
Registrazione N° 7514 del 22/06/1988 del Min. San.
® Marchio registrato della Eduard Gerlach GmbH - Germania

Partita N°: Vedasi sigla

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto: 10-50-100-250-500-1000 g

Germon® Bewurzelungspuder H per talee legnose

Fitoregolatore in polvere: stimola ed intensifica lo sviluppo delle radici

COMPOSIZIONE
NAA puro .... g 0,6
Supporto attivante... q.b. a g 100,0

Attenzione: Manipolare con prudenza

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Informazioni per il medico
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.
MODALITÀ DI IMPIEGO
Immergere nella polvere per circa 2 cm. la base della talea, dopo averla leggermente inumidita per consentire una migliore adesione della polvere. Eliminato l'eventuale eccesso di polvere, sistemare la talea nel modo usuale nelle aiuole di sviluppo, facendo attenzione di non asportare la polvere applicata.
Non si consiglia la miscela con antiparassitari.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
L. Gobbi S.r.l.
Via B. Bosco, 57 - 16121 Genova
Officina di produzione e sede: E. Gerlach GmbH - Lübbecke, Germania / Diachem S.p.a. - U.P. SIFA, Caravaggio (BG) / IRCA S.p.a., Albano S. Alessandro (BG)
Registrazione N° 7515 del 22/06/1988 del Min. San.
® Marchio registrato della: Eduard Gerlach GmbH - Germania
Partita N°: Vedasi sigla
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto netto: 10-50-100-250-500-1000 g

Spollonante G®

Fitoregolatore liquido

Controlla la crescita dei polloni dei fruttiferi, vite, olivo e nocciolo

COMPOSIZIONE

NAA puro.. g 10 (112 g/l)
Bagnante e solvente stabilizzante .... q.b. a g. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Lo **Spollonante G** è un fitoregolatore liquido a base di NAA (acido alfa–naftilacetico) atto a controllare la crescita indesiderata dei polloni di fruttiferi, di vite, olivo, nocciolo. In questa maniera si viene a sostituire la pratica della spollonatura manuale. Lo **Spollonante G** deve essere usato diluendo 1 litro di prodotto in 10 litri di acqua. La soluzione così ottenuta va versata direttamente o irrorata per mezzo di un atomizzatore dirigendo il getto verso i polloni, bagnando soprattutto gli apici e avendo cura di non colpire la chioma.
Questo trattamento deve essere effettuato quando i polloni hanno raggiunto un'altezza di 20-30 cm.
Non è necessaria l'aggiunta di un bagnante in quanto incluso nella composizione del formulato.
Compatibilità: Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere il trattamento 7 giorni prima della raccolta

Attenzione : da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

L. Gobbi s.r.l.
Via B. Bosco, 57 - 16121 GENOVA

Officina di produzione e sede:
L. Gobbi S.r.l.-Campo Ligure (GE) / Eduard Gerlach GmbH, Lübbecke - Germania / Diachem S.p.A.-U.P. SIFA, Caravaggio (BG)
® Marchio registrato della: Eduard Gerlach GmbH - Germania
Reg. N° 7640 del 12.01.1989 del Min.San.
Partita N° (vedasi sigla)

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto: 100-300-500-1000 ml

Stimolante 66f M®

Fitoregolatore liquido atto a favorire lo sviluppo delle piante

COMPOSIZIONE

NAA puro ....g 0,01 (= 0,10 g/l)
Agente bagnante e diluente stabilizzante................... q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Lo **Stimolante 66f M** può avere i seguenti diversi impieghi:
SEMENZAI:
Per anticipare la germinazione dei semi ed ottenere una germinazione completa immergere i semi per 12-24 ore in una soluzione dello **Stimolante 66f M** alla dose di 1 ml in 5 litri di acqua o soluzione antiparassitaria.
Continuare il trattamento per stimolare la crescita irrorando le prime foglie della piantina con la stessa soluzione per 3-4 volte ad intervalli settimanali.
TRAPIANTO DI:
TALEE ERBACEE, TALEE LEGNOSE, ARBUSTIVE E DI VITE.
Immergere l'apparato radicale della piantina da trapiantare e irrorare subito dopo la messa a dimora le foglie con una soluzione dello **Stimolante 66f M** (1 ml in 5 litri di acqua o soluzione antiparassitaria). Ripetere il trattamento per 4-5 volte ad intervalli settimanali. Si evita in questo modo la crisi tipica del trapianto.
PER ANTICIPARE LA CRESCITA DI:
PIANTE FRUTTIFERE (Pero,Melo, Pesco),OLIVO, FRAGOLA, PIANTE ORTIVE (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Zucchino, Spinacio, Asparago, Carciofo, Radicchio).
Irrorare abbondantemente le foglie con la soluzione ottenuta, diluendo lo **Stimolante 66f M** alla dose di 20 ml in 100 litri di acqua o soluzione antiparassitaria. I trattamenti vanno effettuati durante il periodo di vegetazione e ripetuti almeno 4-5 volte a distanza di 10-15 giorni.
FLOREALI E PIANTE ORNAMENTALI:
Diluire lo **Stimolante 66f M** alla dose di 1 ml in 5 litri di acqua o soluzione antiparassitaria ed irrorare una o due volte alla settimana per tutto il periodo della crescita.
Lo **Stimolante 66f** è compatibile con gli antiparassitari.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere il trattamento 7 gg prima della raccolta per piante fruttifere e piante ortive, 24 gg prima per olivo; 27 gg prima per fragola e asparago.
Attenzione:da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

L. gobbi
Via B. Bosco, 57 – Genova
Officina di produzione e sede:
L.Gobbi S.r.l.- Campo Ligure (GE)
E. Gerlach GmbH- Lübbecke, Germania
Diachem S.p.A., U.P. SIFA- Caravaggio (BG)
® **MARCHIO REGISTRATO DELLA E. GERLACH GMBH-GERMANIA**
Reg. N° 8554 del 03-12-1994 del Min.San.
Partita N° Vedasi sigla
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto netto: **100 - 300 - 500 - 1000 ml**

etichetta per confezione di formato ridotto

Stimolante 66f ® M

Fitoregolatore liquido atto a favorire lo sviluppo delle piante

COMPOSIZIONE

NAA puro .... g 0,01 (0,10 g/l)
Agente bagnante e diluente stabilizzante.................q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Lo **Stimolante 66f M** può avere i seguenti diversi impieghi:
SEMENZAI-TRAPIANTO DI TALEE ERBACEE, TALEE LEGNOSE, ARBUSTIVE E DI VITE.
PER ANTICIPARE LA CRESCITA DI PIANTE FRUTTIFERE (Pero, Melo, Pesco),OLIVO, FRAGOLA, PIANTE ORTIVE (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Zucchino, Spinacio, Asparago, Carciofo, Radicchio), FLOREALI E PIANTE ORNAMENTALI.

Dose: 1 ml in 5 litri o 20 ml in 100 litri di acqua o soluzione antiparassitaria.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

L. Gobbi S.r.l.
Via B. Bosco 57 - 16121 Genova
Officina di produzione e sede:
L.Gobbi S.r.l.- Campo Ligure (GE)
E. Gerlach GmbH- Lübbecke, Germania
Diachem S.p.A., U.P. SIFA- Caravaggio (BG)
® **Marchio registrato della Eduard Gerlach GmbH-Germania**

Reg. N° 8554 del 03-12-1994 del Min.San.

Partita N° vedasi sigla

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto: **ml 5-20**

AVVERTENZA
Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Foglietto illustrativo

Stimolante 66f ® M

Fitoregolatore liquido atto a favorire lo sviluppo delle piante

COMPOSIZIONE

NAA puro .... g 0,01 (0,10 g/l)

Agente bagnante e diluente stabilizzante.................... q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Lo **Stimolante 66f M** può avere i seguenti diversi impieghi:

SEMENZAI:

Per anticipare la germinazione dei semi ed ottenere una germinazione completa immergere i semi per 12-24 ore in una soluzione dello **Stimolante 66f M** alla dose di 1 ml in 5 litri di acqua o soluzione antiparassitaria. Continuare il trattamento per stimolare la crescita irrorando le prime foglie della piantina con la stessa soluzione per 3-4 volte ad intervalli settimanali.

TRAPIANTO DI:

TALEE ERBACEE, TALEE LEGNOSE, ARBUSTIVE E DI VITE.

Immergere l'apparato radicale della piantina da trapiantare e irrorare subito dopo la messa a dimora le foglie con una soluzione dello **Stimolante 66f M** (1 ml in 5 litri di acqua o soluzione antiparassitaria). Ripetere il trattamento per 4-5 volte ad intervalli settimanali. Si evita in questo modo la crisi tipica del trapianto.

PER ANTICIPARE LA CRESCITA DI:

PIANTE FRUTTIFERE (Pero,Melo, Pesco),OLIVO, FRAGOLA, PIANTE ORTIVE (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Zucchino, Spinacio, Asparago, Carciofo, Radicchio).

Irrorare abbondantemente le foglie con la soluzione ottenuta, diluendo lo **Stimolante 66f M** alla dose di 20 ml in 100 litri di acqua o soluzione antiparassitaria. I trattamenti vanno effettuati durante il periodo di vegetazione e ripetuti almeno 4-5 volte a distanza di 10-15 giorni.

FLOREALI E PIANTE ORNAMENTALI:

Diluire lo **Stimolante 66f M** alla dose di 1 ml in 5 litri di acqua o soluzione antiparassitaria ed irrorare una o due volte alla settimana per tutto il periodo della crescita.

Lo **Stimolante 66f M** è compatibile con gli antiparassitari.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere il trattamento 7 gg prima della raccolta per pero, melo, pesco, pomodoro, peperone, melanzana, zucchino, spinacio, carciofo e radicchio; 24 gg prima per olivo; 27 gg prima per fragola e asparago.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

L. Gobbi S.r.l.

Via B. Bosco 57 - 16121 Genova

Officina di produzione e sede:

L.Gobbi S.r.l.- Campo Ligure (GE)

E. Gerlach GmbH- Lübbecke, Germania

Diachem S.p.A., U.P. SIFA- Caravaggio (BG)

® MARCHIO REGISTRATO DELLA E. GERLACH GMBH-GERMANIA

Reg. N° 8554 del 03-12-1994 del Min.San.

Partita N° Vedasi sigla

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto: ml 5-20

ALLEGANTE 2%- AF 96®

Fitoregolatore liquido atto a favorire l'allegagione del melo e pero

COMPOSIZIONE

NAD (Amide dell'acido alfa-naftilacetico) puro .... g 1,8 (20,16 g/l)
NAA (Acido alfa-naftilacetico) puro .... g 0,2 (2,24 g/l)
Bagnante e diluente stabilizzante .... q.b. a g 100,0

Attenzione: Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.

MODALITÀ DI IMPIEGO

L'allegante 2% - AF 96 ha lo scopo di migliorare l'allegagione e la qualità dei frutti, specialmente in quelle varietà che allegano con difficoltà.

Pero Decana del Comizio.. 150-160 ml/hl
Passa Crassana, William....................................... 200-240 ml/hl
Abate Fétel due trattamenti a 10% e 50%
di fiori aperti .... 200 ml/hl
Altre varietà .... 200-300 ml/hl
Melo .... 150-200 ml/hl

E' sufficiente una sola applicazione che deve essere effettuata quando il 25-50% dei fiori sono aperti. Sono sconsigliabili irrorazioni con il 100% dei fiori aperti o dopo, poiché in questo caso il prodotto potrebbe indurre un effetto non desiderato. Le condizioni di temperatura e umidità durante ed immediatamente dopo il trattamento influenzano l'efficacia del prodotto, pertanto le indicazioni vanno seguite scrupolosamente evitando di effettuare i trattamenti in giornate fredde asciutte e ventose.
Le condizioni ottimali per il trattamento, con il prodotto sono: temperatura non inferiore ai 10°C, umidità dell'aria oltre il 70%, possibilmente assenza di vento.
Con temperature superiori ai 20°C diminuire la dose del 10%. Dopo l'irrorazione di varietà molto sensibili si può manifestare una lieve involuzione del lembo fogliare.
Non si consiglia la miscela con antiparassitari.
Intervallo di sicurezza: 30 gg
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

L. Gobbi srl
Via B. Bosco, 57 – Genova

Officina di produzione:
Eduard Gerlach GmbH, Lübbecke-Germania / Diachem Spa-U.P.SIFA-Caravaggio (BG) / L. Gobbi S.r.l.-Campo Ligure-Genova
® Marchio registrato della: Eduard Gerlach GmbH - Germania
Reg. N° 8711 del 15.02.1995 del Min. San.
Partita N°: Vedasi sigla.
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto netto: 300 ml, 500 ml, 1000 ml

ALLEGANTE 4% - AF 96®

Fitoregolatore liquido atto a favorire l'allegagione del melo e pero

COMPOSIZIONE
NAD (Amide dell'acido alfa-naftilacetico) puro .... g 3,6 (40,32 g/l)
NAA (Acido alfa-naftilacetico) puro .... g 0,4 (4,48 g/l)
Bagnante e diluente stabilizzante .... q.b. a g 100,0

Attenzione: Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.

MODALITÀ DI IMPIEGO
L'Allegante 4% - AF 96 ha lo scopo di migliorare l'allegagione e la qualità dei frutti, specialmente in quelle varietà che allegano con difficoltà.
Pero Decana del Comizio... 70-80 ml/hl
Passa Crassana, William...................................... 100-120 ml/hl
Abate Fétel due trattamenti a 10% e 50%
di fiori aperti .... 100 ml/hl
Altre varietà... 100-150 ml/hl
Melo .... 75-100 ml/hl
E' sufficiente una sola applicazione che deve essere effettuata quando il 25-50% dei fiori sono aperti. Sono sconsigliabili irrorazioni con il 100% dei fiori aperti o dopo, poiché in questo caso l'Allegante 4% - AF 96 potrebbe indurre un effetto non desiderato. Le condizioni di temperatura e umidità durante ed immediatamente dopo il trattamento influenzano l'efficacia dell'Allegante 4% - AF 96, pertanto le indicazioni vanno seguite scrupolosamente evitando di effettuare i trattamenti in giornate fredde, asciutte e ventose. Le condizioni ottimali per il trattamento, con l'Allegante 4% - AF 96 sono: temperatura non inferiore ai 10°C, umidità dell'aria oltre il 70%, possibilmente assenza di vento.
Con temperature superiori ai 20°C diminuire la dose del 10%. Dopo l'irrorazione di varietà molto sensibili si può manifestare una lieve involuzione del lembo fogliare.
Non si consiglia la miscela con antiparassitari.
Intervallo di sicurezza: 30 gg
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

L. Gobbi srl
Via B. Bosco, 57 – Genova
Officina di produzione:
Eduard Gerlach GmbH, Lübbecke-Germania / Diachem Spa-U.P.SIFA-Caravaggio (BG) / L. Gobbi S.r.l.-Campo Ligure-Genova
® Marchio registrato della: Eduard Gerlach GmbH - Germania
Reg. N° 8712 del 15/02/1995 del Min. San.
Partita N°: Vedasi sigla.
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto netto: 150 ml, 300 ml, 1000 ml

Gerauxin®

Fitoregolatore liquido ad azione polivalente.

Anticipa la fioritura, stimola l'allegagione, riduce i danni da grandine e gelo, aumenta la pezzatura dei frutti e ne anticipa la maturazione.

COMPOSIZIONE

ß-NOA (Acido ß-Naftossiacetico) puro .... g 2,0 (22,4 g/l)
NAD (Amide dell'acido naftilacetico) puro...................................... g 1,7 (19,0 g/l)
NAA (Acido alfa naftilacetico) puro .... g 0,5 (5,6 g/l)
Coformulanti .... q.b. a g 100,0

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Irritazione oculare e sensibilizzazione cutanea. Terapia sintomatica.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il **Gerauxin** è un fitoregolatore liquido ad azione allegante, stimolante e cicatrizzante. Il prodotto, basato su tre principi attivi di natura auxinica, consente di intervenire su un ampio spettro di colture quali melo, pero, pesco, zucchino, pomodoro, melanzana, peperone, fragola, olivo, colture floricole ed ornamentali.

Il **Gerauxin** viene impiegato, come allegante, in fase di fioritura alla dose di 50-70 ml per 100 litri di acqua ripetendo poi il trattamento in corrispondenza delle fioriture successive per le varietà rifiorenti od intervenendo ad intervalli regolari distanziati di una settimana.

L'applicazione sui frutti alla dose di 50-70 ml per 100 litri di acqua stimola l'accrescimento, l'aumento di pezzatura e la precocità di maturazione.

Sulle piante da fiore e ornamentali trattamenti regolari alla dose di 50 ml per 100 litri di acqua permettono un anticipo della fioritura e una accelerazione della crescita.

In caso di gelate intervenire subito con due trattamenti ravvicinati nell'arco di 2-3 giorni.

Non si consiglia la miscela con antiparassitari.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Intervallo di sicurezza: melo, pero, pesco, olivo 30 gg.; fragola 27 gg; pomodoro, peperone, zucchino, melanzana 7 gg.

L. Gobbi s.r.l.
Via B. Bosco, 57 - 16121 Genova

Officina di produzione e sede:
Eduard Gerlach GmbH, Lübbecke - Germania / Diachem S.p.A.-U.P. SIFA, Caravaggio (BG) / L. Gobbi S.r.l.-Campo Ligure (GE)
® Marchio registrato della: Eduard Gerlach GmbH - Germania
Registrazione N° 8713 del 15.02.1995 del Min. San.
PARTITA N° (vedasi sigla)

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto: 100-300-1000 ml

Allegante 4,5% - 36c®
FITOREGOLATORE ALLEGANTE LIQUIDO

COMPOSIZIONE
ß-NOA (Acido ß-naftossiacetico) puro.................. g 4,5 (50,4 g/l)
Coformulanti.. q.b. a g 100,0

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Irritazione oculare e sensibilizzazione cutanea. Terapia sintomatica.
MODALITÀ DI IMPIEGO
Trattamento sui fiori (Tipo B) Allegante:
allega tutti i fiori.
Pomodoro, Melanzana:
Dose: 5 ml per 1 litro di acqua.
Sulle varietà ibride di pomodoro impiegare 1-2,5 ml di prodotto per 1 litro di acqua.
Irrorare con un getto molto nebulizzato i grappoli di fiori quando siano aperti. Il trattamento deve essere diretto, per quanto possibile, verso l'interno dei fiori, in modo da bagnarli bene, cercando di localizzarlo alle sole infiorescenze. In pari modo trattare i fiori che si formano successivamente.
Melone:
Dose 1-2 ml per 1 litro di acqua.
Irrorare in modo rapido e con un getto molto nebulizzato tutta la pianta, senza soffermarsi eccessivamente con il getto diretto sugli apici vegetativi. Sulle varietà ibride ridurre la dose.

Avvertenze: Effettuare il trattamento al mattino o alla sera, evitando comunque le ore più calde della giornata. Con temperature ambientali superiori a 25°C diminuire la dose del 10%.
Intervallo di sicurezza: pomodoro, melanzana, melone: 7 gg.
Non si consiglia la miscela con antiparassitari.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
L. Gobbi S.r.l.
Via B. Bosco 57 - 16121 Genova
Officina di produzione e sede: E. Gerlach GmbH - Lübbecke, Germania / L. Gobbi S.r.l. - Campo Ligure (GE) / Diachem S.p.A - U. P. SIFA, Caravaggio (BG)
® Marchio registrato della E. Gerlach GmbH - Germania
Registrazione N° 8714 del 15.02.1995 del Min. San.
Partita N°: Vedasi sigla
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto netto: 100 ml, 300 ml, 1000 ml

etichetta per confezione di formato ridotto

Allegante 4,5 % - 36 c ®

Fitoregolatore Allegante Liquido

COMPOSIZIONE
ß-NOA (Acido ß-naftossiacetico) puro .... g 4,5 (50,4 g/l)
Coformulanti ....q.b. a g 100,0

Attenzione: Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
sintomi nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Irritazione oculare e sensibilizzazione cutanea. Terapia sintomatica.
MODALITÀ DI IMPIEGO
Trattamento sui fiori (Tipo B)
Pomodoro, Melanzana: 5 ml per 1 litro di acqua.
Sulle varietà ibride di pomodoro impiegare 1-2,5 ml di prodotto per 1 litro di acqua.
Irrorare con un getto molto nebulizzato i grappoli di fiori quando siano aperti. Il trattamento deve essere diretto, per quanto possibile, verso l'interno dei fiori, in modo da bagnarli bene, cercando di localizzarlo alle sole infiorescenze. In pari modo trattare i fiori che si formano successivamente.
Melone: 1-2 ml per 1 litro di acqua.
Irrorare in modo rapido e con un getto molto nebulizzato tutta la pianta, senza soffermarsi eccessivamente con il getto diretto sugli apici vegetativi. Sulle varietà ibride ridurre la dose.
Intervallo di sicurezza: pomodoro, melanzana, melone: 7 gg.
L. Gobbi srl
Via B. Bosco 57 - 16121 Genova
Officina di produzione e sede:
E. Gerlach GmbH, Lübbecke, Germania
L. Gobbi srl - Campo Ligure (GE)
Diachem S.p.A.-U.P. SIFA, Caravaggio (BG)

Registrazione N° 8714 del 15/02/1995 del Min. San.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto: 5-25 ml

AVVERTENZA
Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Foglietto illustrativo

ALLEGANTE 4,5 % - 36 C®

FITOREGOLATORE ALLEGANTE LIQUIDO

COMPOSIZIONE

ß-NOA (Acido ß-naftossiacetico) puro .... g 4,5 (50,4 g/l)

Coformulanti .... q.b. a g 100,0

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

sintomi nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Irritazione oculare e sensibilizzazione cutanea. Terapia sintomatica.

MODALITÀ DI IMPIEGO

TRATTAMENTO SUI FIORI (**TIPO B**) - ALLEGANTE: ALLEGA TUTTI I FIORI.

Pomodoro, Melanzana:

Dose**: 5 ml per 1 litro di acqua**.

Sulle varietà ibride di pomodoro impiegare **1-2,5 ml** di prodotto **per 1 litro di acqua**.

Irrorare con un getto molto nebulizzato i grappoli di fiori quando siano aperti. Il trattamento deve essere diretto, per quanto possibile, verso l'interno dei fiori, in modo da bagnarli bene, cercando di localizzarlo alle sole infiorescenze. In pari modo trattare i fiori che si formano successivamente.

Melone:

Dose **1-2 ml per 1 litro di acqua**.

Irrorare in modo rapido e con un getto molto nebulizzato tutta la pianta, senza soffermarsi eccessivamente con il getto diretto sugli apici vegetativi. Sulle varietà ibride ridurre la dose.

Avvertenze: Effettuare il trattamento al mattino o alla sera, evitando comunque le ore più calde della giornata. Con temperature ambientali superiori a 25°C diminuire la dose del 10%.

Intervallo di sicurezza: pomodoro, melanzana, melone: 7 gg.

Non si consiglia la miscela con antiparassitari.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio dal preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

L. Gobbi srl
Via B. Bosco 57 - 16121 Genova

Officina di produzione e sede:

E. Gerlach GmbH, Lübbecke, Germania

L. Gobbi srl - Campo Ligure (GE)

Diachem S.p.A.-U.P. SIFA, Caravaggio (BG)

® Marchio registrato della E. Gerlach GmbH – Germania

Registrazione N° 8714 del 15.02.1995 del Min. San.

Partita N°: (vedasi sigla)

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto: ml 5 - 25

Diramid®

Fitoregolatore in polvere atto a favorire il diradamento dei frutti nel melo.
Pflanzenwuchsstoff in Pulverform zur Fruchtausdünnung bei Apfel.

COMPOSIZIONE - ***ZUSAMMENSETZUNG***
Amide dell'acido naftilacetico (NAD) puro, *rein* .... g 8,0
Coadiuvanti inerti q.b. a .... g 100,0
Inerte Hilfsstoffe auf.. g 100,0

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA.
ACHTUNG: MIT VORSICHT UMGEHEN

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Informazioni per il medico
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il **DIRAMID** ha lo scopo di liberare gli alberi dalla fruttificazione superflua, permettendo di sviluppare bene i frutti rimasti migliorandone la qualità e rompendo l'alternanza periodica caratteristica di alcune varietà di piante fruttifere.

Melo	**Golden Delicious, Morgenduft**	**100-125**	**g/hl**
	Jonagold, Winesap, Elstar	**80-100**	**g/hl**
	Jonathan, Granny Smith	**60-90**	**g/hl**
	Gruppo Gala	**60-80**	**g/hl**
	Idared	**50-60**	**g/hl**

Sulle altre varietà effettuare saggi preliminari prima dell'impiego intensivo.
E' sufficiente una sola applicazione che deve essere effettuata dopo la sfioritura (caduta petali). Il periodo ottimale si ha quando i frutticini centrali hanno raggiunto un diametro di 6-8 mm per quelli più sviluppati. In Trentino-Alto Adige si consiglia di anticipare il trattamento appena tali frutticini hanno raggiunto 4-5 mm di diametro.
Le piante dovranno essere irrorate solo sulla metà superiore per evitare un ipertrattamento delle fronde più basse.
Pero, Susino, Albicocco.. **110-220 g/hl**
Effettuare il trattamento alla caduta dei petali fino a due settimane dopo.
Ciliegio.. **170-220 g/hl**
Per evitare la cascola di maggio effettuare un trattamento quando circa il 75% dei petali sono caduti.
Le condizioni di temperatura e umidità durante e immediatamente dopo il trattamento influenzano la efficacia del **DIRAMID**, pertanto le indicazioni vanno seguite scrupolosamente evitando di effettuare i trattamenti in giornate fredde, asciutte e ventose. Le condizioni ottimali per il trattamento con **DIRAMID** sono: temperatura compresa tra 12 e 25°C, umidità dell'aria oltre il 70%, possibilmente assenza di vento. Con temperature superiori a 20°C diminuire proporzionalmente le dosi.
Avvertenza: non intervenire su piante giovani già soggette naturalmente a cascola, su piante con debole vegetazione o colpite da parassiti, con numerosi frutticini senza o con un solo seme (che cadranno naturalmente) quando si è oltrepassato il periodo ottimale per l'intervento.
GEBRAUCHSANWEISUNG
DIRAMID hat den Zweck, die Bäume von überflüssigem Fruchtbehang zu befreien, dadurch können sich die überbleibenden Früchte besser entwickeln. Ihre Qualität wird verbessert und die für einige Sorten typische Alternanz wird unterbrochen.

Apfel :	**Golden Delicious, Morgenduft**	**100-125**	**g/hl**
	Jonagold, Winesap, Elstar	**80 -100**	**g/hl**
	Jonathan, Granny Smith	**60 - 90**	**g/hl**
	Gruppo Gala	**60 - 80**	**g/hl**
	Idared	**50 - 60**	**g/hl**

Bei anderen Sorten vor der grossflächigen Spritzung die Aufwandmenge in kleinen Parzellen testen. Es genügt eine einmalige Spritzung nach dem Abfall der Blütenblätter. Der optimale Zeitpunkt liegt bei einem Durchmesser der Zentralfrüchte von 6-8 mm. In Südtirol wird ein Vorziehen des Einsatzzeitpunktes auf 4-5 mm. empfohlen. Es sollte nur die obere Hälfte der Bäume gespritzt werden, um eine Uberkonzentrierung auf der unteren Hälfte zu vermeiden.
Birne, Pflaume, Aprikose: .... **110-220 g/hl**
Die Behandlung vom Abfall der Blütenblätter bis zu zwei Wochen danach durchführen.
Kirsche: .... **170-220 g/hl**
Zur Verhinderung des Rötelns eine Behandlung durchführen, wenn etwa 75% der Blütenblätter abgefallen sind.
Die Witterungsverhältnisse während und nach der Behandlung beeinflussen die Wirksamkeit von **DIRAMID**, deshalb sollten die Hinweise genau beachtet und eine Behandlung an kalten, trockenen und windigen Tagen vermieden werden. Optimale Bedingungen liegen vor, bei Temperaturen zwischen 12° und 25°C, Luftfeuchtigkeit von 70%, Windstille. Bei Temperaturen über 20° C sollte die Dosierung proportional herabgesetzt werden.
Hinweis: Nicht behandelt werden sollten: Junge Bäume die schon natürlicherweise zum Fruchtabfall neigen, Bäume mit schwacher Vegetation oder mit Parasitenbefall, mit vielen Früchten ohne oder mit nur einem Samen (die von allein abfallen), wenn der optimale Einsatzzeitpunkt verstrichen ist.
Ubrige Angaben : Siehe italienischer Text.
Intervallo di sicurezza 30 gg.
Non si consiglia la miscela con antiparassitari.
Nicht mit Pflanzenschutzmitteln mischen.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
L. Gobbi S.r.l.
Via B. Bosco 57 - 16121 Genova.
Officina di produzione e sede:
E. Gerlach GmbH, Lübbecke, Germania
Diachem S.p.a. - U.P. SIFA, Caravaggio (BG)
Registrazione N° 8715 del 15-2-1995 del Ministero della Sanità.
Registr.Gesundheitsministerium
Partita n° vedasi sigla
® Marchio registrato della E. Gerlach GmbH, Germania
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
DA NON VENDERSI SFUSO.
Contenuto netto: 125g - 250g - 500 g - 1 Kg - 1,5 Kg

Adrop ®

FITOREGOLATORE IN POLVERE AD AZIONE POLIVALENTE

Anticipa la fioritura, stimola l'allegagione, riduce i danni da grandine e gelo, aumenta la pezzatura dei frutti e ne anticipa la maturazione.

COMPOSIZIONE

ß-NOA (Acido ß-Naftossiacetico) puro ....g 1,8
NAD (Amide dell'acido naftilacetico) puro ....g 1,5
NAA (Acido alfa naftilacetico) puro...g 0,5
Coformulanti ....q.b. a g 100,0

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Irritazione oculare e sensibilizzazione cutanea. Terapia sintomatica.

MODALITÀ DI IMPIEGO

L'Adrop è un fitoregolatore ad azione allegante, stimolante e cicatrizzante. Il prodotto, basato su tre principi attivi di natura auxinica, consente di intervenire su un ampio spettro di colture quali melo, pero, pesco, fragola, olivo, pomodoro, zucchino, peperone, melanzana, colture floricole ed ornamentali.

L' Adrop viene impiegato, come allegante, in fase di fioritura alla dose 50-70 g per 100 litri di acqua ripetendo poi il trattamento in corrispondenza delle fioriture successive per le varietà rifiorenti od intervenendo ad intervalli regolari distanziati di una settimana.

L'applicazione sui frutti alla dose di 50-70 g per 100 litri di acqua stimola l'accrescimento, l'aumento di pezzatura e la precocità di maturazione.

Sulle piante da fiore e ornamentali trattamenti regolari alla dose di 50 g per 100 litri di acqua permettono un anticipo della fioritura e una accelerazione della crescita.

In caso di gelate intervenire subito con due trattamenti ravvicinati nell'arco di 2-3 giorni.

Intervallo di sicurezza: melo, pero, pesco, olivo 30 gg.; fragola 27 gg.; zucchino, pomodoro, peperone, melanzana 7 gg.

Non si consiglia la miscela con antiparassitari.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

L. Gobbi s.r.l.
Via B. Bosco 57 - 16121 Genova

Officina di produzione e sede:
Eduard Gerlach GmbH, Lübbecke - Germania
Diachem S.p.A.-U.P. SIFA, Caravaggio (BG)

® Marchio registrato della E. Gerlach GmbH-Germania
Reg. N° 8716 del 15.2.1995 del Min.San.
Partita N°: Vedasi sigla

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto:100 g, 500 g, 1 Kg

Geramid-Neu®

Fitoregolatore liquido atto a favorire il diradamento dei frutti nel MELO, PERO, SUSINO, ALBICOCCO ed evitare la cascola del Ciliegio.
Flüssiger Pflanzenwuchsstoff zur Fruchtausdünnung von APFEL, BIRNE, PFLAUME und APRIKOSE, sowie zur Verhinderung des RöteIns bei KIRSCHE

COMPOSIZIONE - ZUSAMMENSETZUNG

NAD puro - rein .... g 4,0 (44,8 g/l)
Agente bagnante e diluente stabilizzante
Netzmittel und stabilisierendes Lösungsmitte .... q.b. a g 100,0

ATTENZIONE - ACHTUNG:
MANIPOLARE CON PRUDENZA - MIT VORSICHT UMGEHEN

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il Geramid-Neu ha lo scopo di liberare gli alberi dalla fruttificazione superflua, permettendo di sviluppare bene i frutti rimasti migliorandone la qualità e rompendo l'alternanza periodica caratteristica di alcune varietà di piante frutifere.

Melo Golden Delicious, Morgenduft .... 150-200 ml/hl
Jonagold .... 120-170 ml/hl
Jonathan .... 100-130 ml/hl
Gruppo Gala .... 75-120 ml/hl
Idared .... 75-100 ml/hl

Sulle altre varietà effettuare saggi preliminari prima dell'impiego intensivo.
E' sufficiente una sola applicazione che deve essere effettuata dopo la sfioritura (caduta petali). Il periodo ottimale si ha quando i frutticini centrali hanno raggiunto un diametro di 6-8 mm per quelli più sviluppati. In Trentino-Alto Adige si consiglia di anticipare il trattamento appena tali frutticini hanno raggiunto 4-5 mm di diametro. Le piante dovranno essere irrorate solo sulla metà superiore per evitare un ipertrattamento delle fronde più basse.
Pero, Susino, Albicocco .... 100-200 ml/hl
Effettuare il trattamento alla caduta dei petali fino a due settimane dopo.
Ciliegio .... 150-200 ml/hl
Per evitare la cascola di maggio effettuare un trattamento quando circa il 75% dei petali sono caduti.
Le condizioni di temperatura e umidità durante e immediatamente dopo il trattamento influenzano la efficacia del Geramid-Neu, pertanto le indicazioni vanno seguite scrupolosamente evitando di effettuare i trattamenti in giornate fredde, asciutte e ventose. Le condizioni ottimali per il trattamento con Geramid-Neu sono: temperatura compresa tra 10 e 25°C, umidità dell'aria oltre il 70%, possibilmente assenza di vento. Con temperature superiori a 20°C diminuire il dosaggio del 10%.
Avvertenza: Non intervenire su piante giovani già soggette naturalmente a cascola, su piante con debole vegetazione o colpite da parassiti, con numerosi frutticini senza o con un solo seme (che cadranno naturalmente) quando si è oltrepassato i periodo ottimale per l'intervento.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Geramid-Neu hat den Zweck, die Bäume von überflüssigem Fruchtbehang zu befreien, dadurch können sich die überbleibenden Früchte besser entwickeln. Ihre Qualität wird verbessert und die für einige Sorten typische Alternanz wird unterbrochen.

Apfel: Golden Delicious, Morgenduft .... 150-200 ml/hl
Jonagold .... 120-170 ml/hl
Jonathan .... 100-130 ml/hl
Gruppe Gala .... 75-120 ml/hl
Idared .... 75-100 ml/hl

Bei anderen Sorten vor der großflächigen Spritzung die Aufwandmenge in kleinen Parzellen testen. Es genügt eine einmalige Spritzung nach dem Abfall der Blütenblätter. Der optimale Zeitpunkt liegt bei einem Durchmesser der Zentralfrüchte von 6-8 mm. In Südtirol wird ein Vorziehen des Einsatzzeitpunktes auf 4-5 mm empfohlen. Es sollte nur die obere Hälfte der Bäume gespritzt werden, um eine Überkonzentrierung auf der unteren Hälfte zu vermeiden.
Birne, Pflaume, Aprikose: 100-200 ml/hl. Die Behandlung vor dem Abfall der Blütenblätter bis zu zwei Wochen danach durchführen. Kirsche: 150 - 200 ml/hl. Zur Verhinderung des Röteins eine Behandlung durchführen, wenn etwa 75% der Blütenblätter abgefallen sind. Die Witterungsverhältnisse während und nach der Behandlung beeinflussen die Wirksamkeit von Geramid-Neu, deshalb sollten die Hinweise genau beachtet und eine Behandlung an kalten, trockenen und windigen Tagen vermieden werden. Optimale Bedingungen liegen vor, bei Temperaturen zwischen 10 und 25°C, Luftfeuchtigkeit vor 70%, Windstille. Bei Temperaturen über 20°C sollte die Dosierung um 10% herabgesetzt werden.
Hinweis: Nicht behandelt werden sollten: Junge Bäume die schon natürlicherweise zum Fruchtabfall neigen, Bäume mit schwacher Vegetation oder mit Parasitenbefall, mit vielen Früchten, ohne oder mit nur einem Samen (die von allein abfallen), wenn der optimale Einsatzzeitpunkt verstrichen ist.
Übrige Angaben: Siehe italienischer Text.
Non si consiglia la miscela con antiparassitar. Nicht mit Pflanzenschutzmitteln mischen.
Intervallo di sicurezza: 30 gg.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

L. Gobbi s.r.l.
Via B. Bosco, 57 - 16121 Genova
Officina di produzione e sede: E. Gerlach GmbH, Lübbecke - Germania / Diachem S.p.A.-U.P. SIFA, Caravaggio (BG) / L. Gobbi S.r.l.-Campo Ligure (GE)
® Marchio registrato della: Eduard Gerlach GmbH - Germania
Reg. N° 8717 del 15/2/1995 del Min. San.
Registr. Gesundheitsministerium.
Partita N°: Vedasi sigla
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare a tre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto netto: 1000 ml

Geramid-Neu®

Fitoregolatore liquido atto a favorire il diradamento dei frutti nel MELO, PERO, SUSINO, ALBICOCCO ed evitare la cascola del Ciliegio.

COMPOSIZIONE

NAD puro .... g 4,0 (44,8 g/l)
Agente bagnante e diluente stabilizzante .... q.b. a g 100,0

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il Geramid-Neu ha lo scopo di liberare gli alberi dalla fruttificazione superflua, permettendo di sviluppare bene i frutti rimasti migliorandone la qualità e rompendo l'alternanza periodica caratteristica di alcune varietà di piante fruttifere.

Melo Golden Delicious, Morgenduft .... 150-200 ml/hl
Jonagold .... 120-170 ml/hl
Jonathan .... 100-130 ml/hl
Gruppo Gala .... 75-120 ml/hl
Idared .... 75-100 ml/hl

Sulle altre varietà effettuare saggi preliminari prima dell'impiego intensivo.
E' sufficiente una sola applicazione che deve essere effettuata dopo la sfioritura (caduta petali). Il periodo ottimale si ha quando i frutticini centrali hanno raggiunto un diametro di 6-8 mm per quelli più sviluppati. In Trentino-Alto Adige si consiglia di anticipare il trattamento appena tali frutticini hanno raggiunto 4-5 mm di diametro. Le piante dovranno essere irrorate solo sulla metà superiore per evitare un ipertrattamento delle fronde più basse.
Pero, Susino, Albicocco .... 100-200 ml/hl
Effettuare il trattamento alla caduta dei petali fino a due settimane dopo.
Ciliegio .... 150-200 ml/hl
Per evitare la cascola di maggio effettuare un trattamento quando circa il 75% dei petali sono caduti.
Le condizioni di temperatura e umidità durante e immediatamente dopo il trattamento influenzano la efficacia del Geramid-Neu, pertanto le indicazioni vanno seguite scrupolosamente evitando di effettuare i trattamenti in giornate fredde, asciutte e ventose. Le condizioni ottimali per il trattamento con Geramid-Neu sono: temperatura compresa tra 10 e 25°C, umidità dell'aria oltre il 70%, possibilmente assenza di vento. Con temperature superiori a 20°C diminuire il dosaggio del 10%.
Avvertenza: Non intervenire su piante giovani già soggette naturalmente a cascola, su piante con debole vegetazione o colpite da parassiti, con numerosi frutticini senza o con un solo seme (che cadranno naturalmente) quando si è oltrepassato il periodo ottimale per l'intervento.
Non si consiglia la miscela con antiparassitari.
Intervallo di sicurezza: 30 gg.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

L. Gobbi s.r.l.
Via B. Bosco, 57 - 16121 Genova
Officina di produzione e sede: E. Gerlach GmbH, Lübbecke - Germania / Diachem S.p.A.-U.P. SIFA, Caravaggio (BG) / L. Gobbi S.r.l.-Campo Ligure (GE)
® Marchio registrato della: Eduard Gerlach GmbH - Germania
Reg. N°8717 del 15/2/1995 del Min. San.
Partita N°: Vedasi sigla
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto netto: 300, 500 ml

Geramid-Neu® D

Fitoregolatore liquido atto a favorire il diradamento dei frutti nel MELO, PERO, SUSINO, ALBICOCCO ed evitare la cascola del Ciliegio.
Flüssiger Pflanzenwuchsstoff zur Fruchtausdünnung von APFEL, BIRNE, PFLAUME und APRIKOSE, sowie zur Verhinderung des Röteln bei KIRSCHE

COMPOSIZIONE - ZUSAMMENSETZUNG

NAD puro - rein.. g 3,6 (40,32 g/l)
Agente bagnante e diluente stabilizzante
Netzmittel und stabilisierendes Lösungsmitte .... q.b. a g 100,0

ATTENZIONE - ACHTUNG:
MANIPOLARE CON PRUDENZA - MIT VORSICHT UMGEHEN

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il Geramid-Neu D ha lo scopo di liberare gli alberi dalla fruttificazione superflua, permettendo di sviluppare bene i frutti rimasti migliorandone la qualità e rompendo l'alternanza periodica caratteristica di alcune varietà di piante fruttifere.

Melo Golden Delicious, Morgenduft .... 170-220 ml/hl
Jonagold .... 130-180 ml/hl
Jonathan .... 110-150 ml/hl
Gruppo Gala .... 80-130 ml/hl
Idared .... 80-110 ml/hl

Sulle altre varietà effettuare saggi preliminari prima dell'impiego intensivo.
E' sufficiente una sola applicazione che deve essere effettuata dopo la sfioritura (caduta petali). Il periodo ottimale si ha quando i frutticini centrali hanno raggiunto un diametro di 6-8 mm per quelli più sviluppati. In Trentino-Alto Adige si consiglia di anticipare il trattamento appena tali frutticini hanno raggiunto 4-5 mm di diametro. Le piante dovranno essere irrorate solo sulla metà superiore per evitare un ipertrattamento delle fronde più basse.
Pero, Susino, Albicocco .... 110-220 ml/hl
Effettuare il trattamento alla caduta dei petali fino a due settimane dopo.
Ciliegio .... 170-220 ml/hl
Per evitare la cascola di maggio effettuare un trattamento quando circa il 75% dei petali sono caduti.
Le condizioni di temperatura e umidità durante e immediatamente dopo il trattamento influenzano la efficacia del Geramid-Neu D, pertanto le indicazioni vanno seguite scrupolosamente evitando di effettuare i trattamenti in giornate fredde, asciutte e ventose. Le condizioni ottimali per il trattamento con Geramid-Neu D sono: temperatura compresa tra 10 e 25°C, umidità dell'aria oltre il 70%, possibilmente assenza di vento. Con temperature superiori a 20°C diminuire il dosaggio del 10%.
Avvertenza: Non intervenire su piante giovani già soggette naturalmente a cascola, su piante con debole vegetazione o colpite da parassiti, con numerosi frutticini senza o con un solo seme (che cadranno naturalmente) quando si è oltrepassato il periodo ottimale per l'intervento.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Geramid-Neu D hat den Zweck, die Bäume von überflüssigem Fruchtbehang zu befreien, dadurch können sich die überbleibenden Früchte besser entwickeln. Ihre Qualität wird verbessert und die für einige Sorten typische Alternanz wird unterbrochen.

Apfel: Golden Delicious, Morgenduft .... 170-220 ml/hl
Jonagold .... 130-180 ml/hl
Jonathan .... 110-150 ml/hl
Gruppo Gala .... 80-130 ml/hl
Idared .... 80-110 ml/hl

Bei anderen Sorten vor der großflächigen Spritzung die Aufwandmenge in kleinen Parzellen testen. Es genügt eine einmalige Spritzung nach dem Abfall der Blütenblätter. Der optimale Zeitpunkt liegt bei einem Durchmesser der Zentralfrüchte von 6-8 mm. In Südtirol wird ein Vorziehen des Einsatzzeitpunktes auf 4-5 mm empfohlen. Es sollte nur die obere Hälfte der Bäume gespritzt werden, um eine Überkonzentrierung auf der unteren Hälfte zu vermeiden.
Birne, Pflaume, Aprikose: 110-220 ml/hl. Die Behandlung vor dem Abfall der Blütenblätter bis zu zwei Wochen danach durchführen. Kirsche: 170 - 220 ml/hl. Zur Verhinderung des Rötelns eine Behandlung durchführen, wenn etwa 75% der Blütenblätter abgefallen sind. Die Witterungsverhältnisse während und nach der Behandlung beeinflussen die Wirksamkeit von Geramid-Neu D, deshalb sollten die Hinweise genau beachtet und eine Behandlung an kalten, trockenen und windigen Tagen vermieden werden. Optimale Bedingungen liegen vor, bei Temperaturen zwischen 10 und 25°C, Luftfeuchtigkeit vor 70%, Windstille. Bei Temperaturen über 20°C sollte die Dosierung um 10% herabgesetzt werden.
Hinweis: Nicht behandelt werden sollten: Junge Bäume, die schon natürlicherweise zum Fruchtabfall neigen, Bäume mit schwacher Vegetation oder mit Parasitenbefall, mit vielen Früchten, ohne oder mit nur einem Samen (die von alle n abfallen), wenn der optimale Einsatzzeitpunkt verstrichen ist.
Übrige Angaben: Siehe italienischer Text.
Non si consiglia la miscela con antiparassitari. Nicht mit Pflanzenschutzmitteln mischen.
Intervallo di sicurezza: 30 gg.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

L. Gobbi s.r.l.
Via B. Bosco, 57 - 16121 Genova
Officina di produzione e sede: L. Gobbi S.r.l.-Campo Ligure (GE) / Diachem S.p.A.-U.P. SIFA, Caravaggio (BG) / E. Gerlach GmbH, Lübecke - Germania
® Marchio registrato della: Eduard Gerlach GmbH - Germania
Reg. N°8718 del 15/02/1995 del Min. San.
Registr. Gesundheitsministerium.
Partita N°: Vedasi sigla
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto netto: 1000 ml

Geramid-Neu® D

Fitoregolatore liquido atto a favorire il diradamento dei frutti nel MELO, PERO, SUSINO, ALBICOCCO ed evitare la cascola del Ciliegio.

COMPOSIZIONE

NAD puro .... g 3,6 (40,32 g/l)
Agente bagnante e diluente stabilizzante .... q.b. a g 100,0

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il Geramid-Neu D ha lo scopo di liberare gli alberi dalla fruttificazione superflua, permettendo di sviluppare bene i frutti rimasti migliorandone la qualità e rompendo l'alternanza periodica caratteristica di alcune varietà di piante fruttifere.

Melo Golden Delicious, Morgenduft .... 170-220 ml/hl
Jonagold .... 130-180 ml/hl
Jonathan .... 110-150 ml/hl
Gruppo Gala .... 80-130 ml/hl
Idared .... 80-110 ml/hl

Sulle altre varietà effettuare saggi preliminari prima dell'impiego intensivo.
E' sufficiente una sola applicazione che deve essere effettuata dopo la sfioritura (caduta petali). Il periodo ottimale si ha quando i frutticini centrali hanno raggiunto un diametro di 6-8 mm per quelli più sviluppati. In Trentino-Alto Adige si consiglia di anticipare il trattamento appena tali frutticini hanno raggiunto 4-5 mm di diametro. Le piante dovranno essere irrorate solo sulla metà superiore per evitare un ipertrattamento delle fronde più basse.
Pero, Susino, Albicocco .... 110-220 ml/hl
Effettuare il trattamento alla caduta dei petali fino a due settimane dopo.
Ciliegio .... 170-220 ml/hl
Per evitare la cascola di maggio effettuare un trattamento quando circa il 75% dei petali sono caduti.
Le condizioni di temperatura e umidità durante e immediatamente dopo il trattamento influenzano la efficacia del Geramid-Neu D, pertanto le indicazioni vanno seguite scrupolosamente evitando di effettuare i trattamenti in giornate fredde, asciutte e ventose. Le condizioni ottimali per il trattamento con Geramid-Neu D sono: temperatura compresa tra 10 e 25°C, umidità dell'aria oltre il 70%, possibilmente assenza di vento. Con temperature superiori a 20°C diminuire il dosaggio del 10%.
Avvertenza: Non intervenire su piante giovani già soggette naturalmente a cascola, su piante con debole vegetazione o colpite da parassiti, con numerosi frutticini senza o con un solo seme (che cadranno naturalmente) quando si è oltrepassato il periodo ottimale per l'intervento.
Non si consiglia la miscela con antiparassitari.
Intervallo di sicurezza: 30 gg.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

L. Gobbi s.r.l.
Via B. Bosco, 57 - 16121 Genova

Officina di produzione e sede: L. Gobbi S.r.l.-Campo Ligure (GE) / Diachem S.p.A.-U.P. SIFA, Caravaggio (BG) / E. Gerlach GmbH, Lübbecke - Germania
® Marchio registrato della: Eduard Gerlach GmbH - Germania
Reg. N°8718 del 15/02/1995 del Min. San.
Partita N°: Vedasi sigla
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto netto: 300, 400 ml

Germon® Bewurzelungspuder per talee erbacee

Fitoregolatore in polvere

Stimola ed intensifica lo sviluppo delle radici

COMPOSIZIONE

Derivato amidico dell'acido alfa-naftilacetico puro....................g 0,5
Supporto attivante ....q.b. a g 100,0

Attenzione: Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Immergere la base della talea, dopo averla leggermente inumidita per consentire una migliore adesione alla polvere, per ca. 2 cm nel preparato Germon. Scuotere successivamente la talea per eliminare l'eventuale eccesso di polvere, sistemare quindi nel modo usuale facendo attenzione di non asportare la polvere applicata.
Si consiglia di non applicare il prodotto su materiale già dotato di apparato radicale.
Non si consiglia la miscela con antiparassitari.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

L. **Gobbi S.r.l.**
Via B. Bosco 57 - 16121 Genova
Officina di produzione e sede: Eduard Gerlach GmbH, Lübbecke – Germania / Diachem S.p.a. - U.P. SIFA, Caravaggio (BG)
® **Marchio registrato della: Eduard Gerlach GmbH - Germania**
Registrazione N° 8837 del 30-04-1996 del Min. San.
Partita N°: vedasi sigla
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto netto: **10-100-250-500-1000 g**

Germon® Bewurzelungspuder per talee legnose

Fitoregolatore in polvere

Stimola ed intensifica lo sviluppo delle radici

COMPOSIZIONE
Derivato amidico dell'acido alfa-naftilacetico puro...............g 0,75
Supporto attivante ....q.b. a g 100,00

Attenzione: Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.
MODALITÀ DI IMPIEGO
Immergere la base della talea, dopo averla leggermente inumidita per consentire una migliore adesione alla polvere, per ca. 2 cm nel preparato Germon. Scuotere successivamente la talea per eliminare l'eventuale eccesso di polvere, sistemare quindi nel modo usuale facendo attenzione di non asportare la polvere applicata.
Si consiglia di non applicare il prodotto su materiale già dotato di apparato radicale.
Non si consiglia la miscela con antiparassitari.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

L. Gobbi S.r.l.
Via B. Bosco 57 - 16121 Genova
Officina di produzione e sede: Eduard Gerlach GmbH, Lübbecke – Germania / Diachem S.p.a. - U.P. SIFA, Caravaggio (BG)
® Marchio registrato della: Eduard Gerlach GmbH - Germania
Registrazione N° 8838 del 30/04/1996 del Min. San.
Partita N° vedasi sigla
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto netto: **10-100-250-500-1000 g**

Allegante 5,0% - 36c

FITOREGOLATORE ALLEGANTE LIQUIDO

COMPOSIZIONE

ß-NOA (Acido ß-naftossiacetico) puro.................. g 5,0 (56,1 g/l)
Agente bagnante e stabilizzante................................ q.b.a g 100,0

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Irritazione oculare e sensibilizzazione cutanea. Terapia sintomatica.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il prodotto trova impiego sulle colture di pomodoro, melanzana, peperone, melone, cetriolo, zucchino, fragola, pesco nei seguenti modi:
Trattamento tutta pianta (Tipo A):
Dose: per tutte le colture 100 ml in 100 litri di acqua.
Irrorare con un getto molto nebulizzato tutta la pianta prevalentemente i grappoli fiorali, evitando di soffermarsi sugli apici vegetativi.
Ripetere il trattamento ad ogni fioritura.
Avvertenze: Effettuare il trattamento al mattino o alla sera, evitando comunque le ore più calde della giornata
Con temperature ambientali superiori a 25°C diminuire la dose del 10%.
Non si consiglia la miscela con antiparassitari.

Intervallo di sicurezza: 7 gg su pomodoro, melanzana, peperone, melone, cetriolo, zucchino e fragola. 30 gg su pesco.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
I. Gobbi s.r.l.
Via B. Bosco 57 - 16121 Genova
Officina di produzione e sede: E. Gerlach GmbH, Lübbecke, Germania
Diachem S.p.A.- UP SIFA, Caravaggio (BG)
L. Gobbi S.r.l.- Campo Ligure (GE)
® Marchio registrato della Eduard Gerlach GmbH-Germania
Registrazione N° 8846 del 16.05.1996 del Min. San.
Partita N°: (vedasi sigla)
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto netto: 100 – 300 – 500 – 1000 ml 3 – 5 litri

PROGERBALIN® LG

Regolatore di crescita

Tipo di formulazione: liquido solubile

COMPOSIZIONE

Gibberelline A4 e A7 pure .... g 1,8 (18,8 g/l)
(isomero A4 + A7)
Benziladenina pura ....g 1,8 (18,8 g/l)
Coadiuvanti ....q.b. a g 100

Attenzione: Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: gibberelline 1,8% - 6-benziladenina 1,8% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: BENZILADENINA: irritazione cutanea degli occhi e dell'apparato respiratorio. Terapia: sintomatica. Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Per maggior sicurezza mettere occhiali protettivi durante la preparazione e l'impiego del prodotto.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il PROGERBALIN LG è un fitoregolatore di crescita delle piante, che influenza in modo positivo i processi fisiologici del **MELO** con un incremento della qualità e della produzione; è dato dall'unione delle gibberelline A4 - A7 e dalla 6- Benziladenina.

Miglioramento della forma del melo del gruppo delle Delicious
impiegare 70 - 100 ml/hl trattando tra la fioritura all'80% e la caduta dei petali, è consigliabile in due applicazioni a 35 - 50 ml/hl a 7 - 10 giorni di distanza

Prevenzione della rugginosita' delle mele Golden Delicious
alla dose di 25 - 30 ml/hl, con 3 - 4 trattamenti con il primo a fine della fioritura e i successivi ogni 7 - 10 giorni

Anticipo di branchette su astoni di melo non in produzione e vivai
trattare a 4,5 - 5,5 l per ettaro equivalenti a 2,5 l/hl, su astoni della lunghezza di 50 - 70 cm che siano in piena crescita e con buon apparato fogliare. Bisogna effettuare in modo preciso la bagnatura della zona apicale (i 30 cm superiori).

PERO

per il miglioramento dell'allegagione a 60 – 80 ml/hl dall'inizio della fioritura, con due applicazioni (di preferenza) a 30 - 40 ml/hl, con il primo trattamento quando si ha il 25% circa dei fiori che siano aperti ed il secondo dopo circa 2 - 3 giorni al massimo.

NOTE PER UN CORRETTO IMPIEGO

la quantità finale di soluzione per ettaro deve essere regolata in funzione dello sviluppo delle piante e della forma di allevamento - è bene aggiungere, quando si effettua il trattamento, un bagnante adesivo per avere una migliore azione - trattare piante sane e vigorose con interventi fatti al mattino o tardo pomeriggio - non trattare con temperature inferiori ai 7°C e non superiore ai 32°C - usare un getto molto fine bagnando bene la pianta trattata e non creando sgocciolamento dopo il trattamento - non effettuare l'eventuale diradamento prima di 4 - 5 giorni dall'ultimo trattamento.

COMPATIBILITA': compatibile con i bagnanti, concimi fogliari, zolfo bagnabile. Durante la preparazione delle miscele è opportuno aggiungere il PROGERBALIN LG, nella dose richiesta, per ultimo. Evitare di miscelare al prodotto sostanze alcaline (polisolfuri, poltiglia bordolese).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni provocati dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

L. Gobbi S.r.l.
Via B. Bosco, 57 - 16121 Genova

Stabilimento di produzione e sede:
Althaller Italia Srl - S. Colombano (MI) / Diachem Spa - U.P. SIFA - Caravaggio (BG) / Adica Srl - Faenza (RA) / Eduard Gerlach GmbH - Lübbecke (Germania) / L. Gobbi srl – Campo Ligure (GE) / Hockey ltd - Dewsbury, West Yorkshire (UK)
Reg. n. 11183 del 05-02-2002 del Min. della Salute

® Marchio registrato della L. Gobbi S.r.l.

Partita N°: Vedasi sigla

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto: 250-500 ml, 1-2-5-10 litri

etichetta per confezione di formato ridotto

PROGERBALIN® LG

Regolatore di crescita
Tipo di formulazione: liquido solubile

COMPOSIZIONE
Gibberelline A4 e A7 pure .... g 1,8 (18,8 g/l)
(isomero A4 + A7)
Benziladenina pura .... g 1,8 (18,8 g/l)
Coadiuvanti .... q.b. a g 100

Attenzione: Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: gibberelline 1,8% - 6-benziladenina 1,8% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: BENZILADENINA: irritazione cutanea degli occhi e dell'apparato respiratorio. Terapia: sintomatica. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.
NORME PRECAUZIONALI
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Per maggior sicurezza mettere occhiali protettivi durante la preparazione e l'impiego del prodotto.
MODALITA' D'IMPIEGO
Per maggiori dettagli sull'impiego consultare il foglietto illustrativo.
MELO: 25-100 ml/hl
Anticipo di brachette: 4,5 - 5,5 l/ha (2,5 l/hl)
PERO: 30-60 ml/hl.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
L. Gobbi S.r.l.
Via B. Bosco, 57 - 16121 Genova
Stabilimento di produzione e sede: Althaller Italia Srl - S. Colombano (MI) / Diachem Spa - U.P. SIFA - Caravaggio (BG) / Adica Srl - Faenza (RA) / Eduard Gerlach GmbH - Lübbecke (Germania) / L. Gobbi srl – Campo Ligure (GE) / Hockey ltd - Dewsbury, West Yorkshire (UK)
Reg. n. 11183 del 05-02-2002 del Min. della Salute
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto netto: 20-50-100 ml

AVVERTENZA
Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Foglietto illustrativo

PROGERBALIN® LG
Regolatore di crescita
Tipo di formulazione: liquido solubile

COMPOSIZIONE
Gibberelline A4 e A7 pure .... g 1,8 (18,8 g/l)
(isomero A4 + A7)
Benziladenina pura.. g 1,8 (18,8 g/l)
Coadiuvanti .... q.b. a g 100

Attenzione: Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: gibberelline 1,8% - 6-benziladenina 1,8% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: BENZILADENINA: irritazione cutanea degli occhi e dell'apparato respiratorio. Terapia: sintomatica. Avvertenza : consultare un centro antiveleni.
NORME PRECAUZIONALI
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Per maggior sicurezza mettere occhiali protettivi durante la preparazione e l'impiego del prodotto.
MODALITA' D'IMPIEGO
Il PROGERBALIN LG è un fitoregolatore di crescita delle piante, che influenza in modo positivo i processi fisiologici del **MELO** con un incremento della qualità e della produzione; è dato dall'unione delle gibberelline A4 - A7 e dalla 6- Benziladenina.
Miglioramento della forma del melo del gruppo delle Delicious
impiegare 70 - 100 ml/hl trattando tra la fioritura all'80% e la caduta dei petali, è consigliabile in due applicazioni a 35 - 50 ml/hl a 7 - 10 giorni di distanza
Prevenzione della rugginosita' delle mele Golden Delicious
alla dose di 25 - 30 ml/hl, con 3 - 4 trattamenti con il primo a fine della fioritura e i successivi ogni 7 - 10 giorni
Anticipo di branchette su astoni di melo non in produzione e vivai
trattare a 4,5 - 5,5 l per ettaro equivalenti a 2,5 l/hl, su astoni della lunghezza di 50 - 70 cm che siano in piena crescita e con buon apparato fogliare. Bisogna effettuare in modo preciso la bagnatura della zona apicale (i 30 cm superiori).
PERO
per il miglioramento dell'allegagione a 60 – 80 ml/hl dall'inizio della fioritura, con due applicazioni (di preferenza) a 30 - 40 ml/hl, con il primo trattamento quando si ha il 25% circa dei fiori che siano aperti ed il secondo dopo circa 2 - 3 giorni al massimo.
NOTE PER UN CORRETTO IMPIEGO
la quantità finale di soluzione per ettaro deve essere regolata in funzione dello sviluppo delle piante e della forma di allevamento - è bene aggiungere, quando si effettua il trattamento, un bagnante adesivo per avere una migliore azione - trattare piante sane e vigorose con interventi fatti al mattino o tardo pomeriggio - non trattare con temperature inferiori ai 7°C e non superiore ai 32°C - usare un getto molto fine bagnando bene la pianta trattata e non creando sgocciolamento dopo il trattamento - non effettuare l'eventuale diradamento prima di 4 - 5 giorni dall'ultimo trattamento.
COMPATIBILITA': compatibile con i bagnanti, concimi fogliari, zolfo bagnabile. Durante la preparazione delle miscele è opportuno aggiungere il PROGERBALIN LG, nella dose richiesta, per ultimo. Evitare di miscelare al prodotto sostanze alcaline (polisolfuri, poltiglia bordolese).
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni provocati dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
L. Gobbi S.r.l.
Via B. Bosco, 57 - 16121 Genova
Stabilimento di produzione e sede:
Althaller Italia Srl - S. Colombano (MI) / Diachem Spa - U.P. SIFA - Caravaggio (BG) / Adica Srl - Faenza (RA) / Eduard Gerlach GmbH - Lübbecke (Germania) / L. Gobbi srl – Campo Ligure (GE) / Hockey ltd - Dewsbury, West Yorkshire (UK)
Reg. n. 11183 del 05-02-2002 del Min. della Salute
© **Marchio registrato della L. Gobbi S.r.l.**
Partita N°: Vedasi sigla
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto netto: 20-50-100 ml

GEREPHON LG

FITOREGOLATORE CONCENTRATO SOLUBILE

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto è un fitoregolatore di sintesi che, dopo essere stato assorbito dalla pianta, libera etilene. Questo gas, che la pianta già produce, è in grado di stimolare la maturazione della frutta.

POMODORO DA INDUSTRIA : per anticipare ed uniformare la maturazione dei frutti 1-4 l/ha, con trattamenti singoli o frazionati. Intervenire quando il 40-60% delle bacche sono mature. La dose più alta si impiega su varietà tardive con temperature di 12-15°C al momento del trattamento e su varietà a maturazione scalare. Il prodotto può essere distribuito con le normali barre irroratrici diluito in 10-12 ettolitri di acqua ad ettaro.

POMODORO DA MENSA : 200 - 250 ml/hl per anticipare ed uniformare la maturazione dei frutti. Irrorare solo i frutti prossimi alla raccolta (invaiatura). Nel caso si voglia far maturare contemporaneamente tutte le bacche, grandi e piccole, per liberare il terreno dalla coltura, trattare tutta la pianta.

MELO: Cultivar precoci, trattare 8-10 giorni prima della raccolta: 40-50 ml/hl - Cultivar medio-tardiva, trattare 15-20 giorni prima della raccolta: 80-100 ml/hl

Raccogliere 7-10 giorni dopo il trattamento, in quanto il prodotto anticipa la maturazione. Il prodotto può essere distribuito con le normali attrezzature da irrorazione diluito in 15-20 ettolitri di acqua ad ettaro.

GEREPHON LG

Composizione
Etefon puro ....g 39,5 (478 g/l)
Coformulanti ....q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO :
Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. Provoca ustioni. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

CORROSIVO

l. gobbi
Via B. Bosco. 57 – Genova

Stabilimento di produzione: Althaller Italia Srl - S. Colombano (MI) / Diachem Spa - U.P. SIFA - Caravaggio (BG) / Adica Srl - Faenza (RA) / Eduard Gerlach GmbH - Lübbecke (Germania) / L. Gobbi srl – Campo Ligure (GE) / Hockley ltd - Dewsbury, West Yorkshire (UK)

Reg. n. 11184 del 05-02-2002 del Min. della Salute

Partita n.: vedasi sigla

Contenuto netto: 250-500 ml, 1-2-5-10-20 litri

TABACCO : l'impiego del prodotto risulta particolarmente vantaggioso in quanto è in grado di ridurre il numero delle raccolte manuali, anticipando e uniformando la maturazione della foglia.
- Varietà scalari, non cimate e tradizionalmente raccolte a 'foglia' (Burley, Bright, ecc.): 200-350 ml/hl d'acqua, intervenendo dopo 1 o 2 raccolte quando le foglie restanti hanno raggiunto il massimo sviluppo e/o mostrano segni di cambiamento di colore.
- Varietà a maturazione contemporanea o cimate, tradizionalmente raccolte a "pianta" (Nostrano del Brenta, Avana, Kentucky. ecc.) 200-350 ml/hl d'acqua, intervenendo su tutta la pianta dopo l'asportazione delle foglie basali. In ogni caso, prima di intervenire su una superficie vasta, effettuare dei piccoli saggi su poche piante, osservando attentamente l'evoluzione delle foglie trattate.

COMPATIBILITA' : Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITÀ : Il prodotto, su pomodoro, può causare un parziale ingiallimento delle foglie; Inoltre i fiori aperti, se bagnati dalla soluzione, cadono.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto su melo, 10 giorni su pomodoro.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non puo' essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

DA NON VENDERSI SFUSO

etichetta per confezione di formato ridotto

GEREPHON LG

FITOREGOLATORE CONCENTRATO SOLUBILE

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
MODALITÀ D'IMPIEGO
Per maggiori dettagli sull'impiego consultare il foglietto illustrativo.
POMODORO DA INDUSTRIA: 1-4 l/ha.
POMODORO DA MENSA: 200 - 250 ml/hl.
MELO: 40-100 ml/hl.
TABACCO: 200-350 ml/hl.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto su melo, 10 giorni su pomodoro.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
DA NON VENDERSI SFUSO

AVVERTENZA
Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

GEREPHON LG
Composizione
Etefon puro .... g 39,5 (478 g/l)
Coformulanti... q.b. a g 100
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. Provoca ustioni. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CORROSIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

L. gobbi s.r.l.
Via B. Bosco, 57 – Genova

Stabilimento di produzione: Althaller Italia Srl - S. Colombano (MI) / Diachem Spa - U.P. SIFA - Caravaggio (BG) / Adica Srl - Faenza (RA) / Eduard Gerlach GmbH - Lübbecke (Germania) / L. Gobbi srl – Campo Ligure (GE) / Hockley ltd - Dewsbury, West Yorkshire (UK)
Reg. n. 11184 del 05-02-2002 del Min. della Salute
Partita n.: (vedasi sigla) Contenuto netto: 20-50-100 ml

Foglietto illustrativo

GEREPHON LG

FITOREGOLATORE CONCENTRATO SOLUBILE

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto è un fitoregolatore di sintesi che, dopo essere stato assorbito dalla pianta, libera etilene. Questo gas, che la pianta già produce, è in grado di stimolare la maturazione della frutta.
POMODORO DA INDUSTRIA : per anticipare ed uniformare la maturazione dei frutti 1-4 l/ha, con trattamenti singoli o frazionati. Intervenire quando il 40-60% delle bacche sono mature. La dose più alta si impiega su varietà tardive con temperature di 12-15°C al momento del trattamento e su varietà a maturazione scalare. Il prodotto può essere distribuito con le normali barre irroratrici diluito in 10-12 ettolitri di acqua ad ettaro.
POMODORO DA MENSA : 200 - 250 ml/hl per anticipare ed uniformare la maturazione dei frutti. Irrorare solo i frutti prossimi alla raccolta (invaiatura). Nel caso si voglia far maturare contemporaneamente tutte le bacche, grandi e piccole, per liberare il terreno dalla coltura, trattare tutta la pianta.
MELO: Cultivar precoci, trattare 8-10 giorni prima della raccolta: 40-50 ml/hl - Cultivar medio-tardiva, trattare 15-20 giorni prima della raccolta: 80-100 ml/hl
Raccogliere 7-10 giorni dopo il trattamento, in quanto il prodotto anticipa la maturazione. Il prodotto può essere distribuito con le normali attrezzature da irrorazione diluito in 15-20 ettolitri di acqua ad ettaro.

GEREPHON LG
Composizione
Etefon puro.. g 39,5 (478 g/l)
Coformulanti.. q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO :
Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. Provoca ustioni. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

CORROSIVO

l. gobbi
Via B. Bosco, 57 – Genova
Stabilimento di produzione: Althaller Italia Srl - S. Colombano (MI) / Diachem Spa - U.P. SIFA - Caravaggio (BG) / Adica Srl - Faenza (RA) / Eduard Gerlach GmbH - Lübbecke (Germania) / L. Gobbi srl – Campo Ligure (GE) / Hockley ltd - Dewsbury, West Yorkshire (UK)
Reg. n. 11184 del 05-02-2002 del Min. della Salute
Partita n.: (vedasi sigla) Contenuto netto: 20-50-100 ml

TABACCO : l'impiego del prodotto risulta particolarmente vantaggioso in quanto è in grado di ridurre il numero delle raccolte manuali, anticipando e uniformando la maturazione della foglia.
- Varietà scalari, non cimate e tradizionalmente raccolte a 'foglia' (Burley, Bright, ecc.): 200-350 ml/hl d'acqua, intervenendo dopo 1 o 2 raccolte quando le foglie restanti hanno raggiunto il massimo sviluppo e/o mostrano segni di cambiamento di colore.
- Varietà a maturazione contemporanea o cimate, tradizionalmente raccolte a "pianta" (Nostrano del Brenta, Avana, Kentucky. ecc.) 200-350 ml/hl d'acqua, intervenendo su tutta la pianta dopo l'asportazione delle foglie basali. In ogni caso, prima di intervenire su una superficie vasta, effettuare dei piccoli saggi su poche piante, osservando attentamente l'evoluzione delle foglie trattate.

COMPATIBILITA' : Il prodotto si impiega da solo.
FITOTOSSICITÀ : Il prodotto, su pomodoro, può causare un parziale ingiallimento delle foglie; Inoltre i fiori aperti, se bagnati dalla soluzione, cadono.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto su melo, 10 giorni su pomodoro.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio dal preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
DA NON VENDERSI SFUSO

GERLAGIB LG

concentrato solubile

Fitoregolatore contro la rugginosità e per la buona fioritura e allegagione dei frutti del melo e del pero

COMPOSIZIONE
Gibberelline A4 - A7... g 1 (10,5 g/l)
Coformulanti .... q.b. a g 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
CARATTERISTICHE
GERLAGIB LG è un fitoregolatore che trova interessanti campi d'impiego su alcune cultivar di melo e pero. In determinate situazioni ambientali, i frutti delle mele appartenenti al Gruppo Delicious rosse, sia normali che Spur, tendono ad assumere una forma schiacciata, GERLAGIB LG provoca una modifica della forma (allungamento) secondo gli standard varietali delle zone più vocate.
GERLAGIB LG sulle mele della varietà Golden Delicious previene o riduce significativamente la rugginosita', fisiopatia che causa un importante deprezzamento della produzione.
Il prodotto ha dimostrato di diminuire i danni da gelo e quindi di aiutare l'allegagione nei casi di gelate durante la fioritura; in questo caso trattare entro 24 ore dalla gelata, nelle ore più calde, e ripetere eventualmente l'intervento in caso di perdurare delle gelate.
CAMPI, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO
- Melo (Gruppo Delicious rosse) - Miglioramento della forma. Applicare 100-130 ml/hl, distribuendo il prodotto tra la piena fioritura (80% di fiori aperti) e la caduta petali, preferibilmente in due applicazioni di 50-80 ml/hl ciascuna ad intervallo di 7-10 giorni.
- Melo (Golden Delicious) - Prevenzione della rugginosità. Impiegare 40-50 ml/hl per trattamento, realizzando un programma di 3-4 applicazioni, effettuare il primo trattamento a fine fioritura e i successivi ad intervalli di 7-l0 giorni.
- Melo del Gruppo Gala. Favorisce il miglioramento della forma, anticipa l'emissione e lo sviluppo dell'apparato fogliare, migliora l'omogeneità della fioritura, incrementa la quantità raccolta al primo stacco. Fare 4 applicazioni distanziate di 15 giorni con 30-40 ml/hl in pre-fioritura (orecchiette di topo e mazzetti) e ad ingrossamento dei frutti (frutto noce).
- Altre varietà di melo. 50-60 ml/hl durante la fioritura ripetuto per 2 volte.
- Pero - Miglioramento dell'allegagione. Applicare 80-100 ml/hl distribuendo il prodotto all'inizio della fioritura, preferibilmente in due applicazioni di 30-50 ml/hl, effettuando il primo trattamento al 30-40% di fiori aperti ed il secondo entro 2-3 giorni.

Avvertenze d'impiego
- Aggiungere 50-100 ml/hl di un bagnante non ionico, avendo cura di metterlo prima del GERLAGIB LG.
- Mettere la dose prestabilita di GERLAGIB LG in circa la metà dell'acqua necessaria e, mantenendo la soluzione in agitazione, aggiungere altra acqua sino al raggiungimento del volume totale richiesto.
- Mantenere in agitazione la soluzione anche durante la distribuzione, provvedendo al suo impiego nello stesso giorno della preparazione.
- Impiegare nella distribuzione un getto finemente nebulizzato, bagnando uniformemente la massa fiorale ed evitando lo sgocciolamento
- La quantità totale di soluzione per ettaro dovrà essere regolata in funzione dello sviluppo delle piante e della forma di allevamento.
- Trattare in assenza di pioggia per almeno 4-6 ore dopo l'applicazione; nel caso di trattamento dopo una pioggia, attendere che la vegetazione si asciughi.
- Trattare preferibilmente nelle ore del tardo pomeriggio e comunque con temperature non inferiori a 7°C o superiori a 32°C.

COMPATIBILITA' : il prodotto non è compatibile con le sostanze alcaline quali polisolfuri e poltiglia bordolese. Durante la preparazione di miscele, aggiungere GERLAGIB LG per ultimo.
AVVERTENZA - in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: L'impiego del GERLAGIB LG in prossimità di interventi con prodotti diradanti, può accentuare l'effetto diradante degli stessi: pur essendo tale aspetto talvolta ricercato, si raccomanda particolare attenzione allo scopo di evitate danni alla produzione.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

l. gobbi
Via B. Bosco, 57 – Genova
Stabilimento di produzione: Althaller Italia Srl - S. Colombano (MI) / Diachem Spa - U.P. SIFA - Caravaggio (BG) / Adica Srl - Faenza (RA) / Eduard Gerlach GmbH - Lübbecke (Germania) / L. Gobbi srl – Campo Ligure (GE) / Hockley ltd - Dewsbury, West Yorkshire (UK)
Reg. n 11185 del 05-02-2002 del Min. della Salute
Partita n: vedasi sigla
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto netto: **250, 500 ml, 1, 2, 5, 10 litri**

etichetta per confezione di formato ridotto

GERLAGIB® LG

concentrato solubile

Fitoregolatore contro la rugginosità e per la buona fioritura e allegagione dei frutti del melo e del pero

COMPOSIZIONE
Gibberelline A4 - A7.. g 1 (10,5 g/l)
Coformulanti .... q.b. a g 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
CAMPI, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO
Per maggiori dettagli sull'impiego consultare il foglietto illustrativo.
Melo: 40-130 ml/hl.
Pero: 30-100 ml/hl.
Fitotossicità: L'impiego del GERLAGIB LG in prossimità di interventi con prodotti diradanti, può accentuare l'effetto diradante degli stessi: pur essendo tale aspetto talvolta ricercato, si raccomanda particolare attenzione allo scopo di evitate danni alla produzione.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso é pericoloso.

l. gobbi ...
Via B. Bosco, 57 – Genova
Stabilimento di produzione: Althaller Italia Srl - S. Colombano (MI) / Diachem Spa - U.P. SIFA - Caravaggio (BG) / Adica Srl - Faenza (RA) / Eduard Gerlach GmbH - Lübbecke (Germania) / L. Gobbi srl – Campo Ligure (GE) / Hockley ltd - Dewsbury, West Yorkshire (UK)
Reg. n 11185 del 05-02-2002 del Min. della Salute
Partita n: vedasi sigla
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto netto: **20-50-100 ml**

AVVERTENZA
Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Foglietto illustrativo

GERLAGIB® LG

Concentrato solubile

Fitoregolatore contro la rugginosità e per la buona fioritura e allegagione dei frutti del melo e del pero

COMPOSIZIONE
Gibberelline A4 - A7... g 1 (10,5 g/l)
Coformulanti .... q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
CARATTERISTICHE
GERLAGIB LG è un fitoregolatore che trova interessanti campi d'impiego su alcune cultivar di melo e pero. In determinate situazioni ambientali, i frutti delle mele appartenenti al Gruppo Delicious rosse, sia normali che Spur, tendono ad assumere una forma schiacciata, GERLAGIB LG provoca una modifica della forma (allungamento) secondo gli standard varietali delle zone più vocate.
GERLAGIB LG sulle mele della varietà Golden Delicious previene o riduce significativamente la rugginosita', fisiopatia che causa un importante deprezzamento della produzione.
Il prodotto ha dimostrato di diminuire i danni da gelo e quindi di aiutare l'allegagione nei casi di gelate durante la fioritura; in questo caso trattare entro 24 ore dalla gelata, nelle ore più calde, e ripetere eventualmente l'intervento in caso di perdurare delle gelate.
CAMPI, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO
- Melo (Gruppo Delicious rosse) - Miglioramento della forma. Applicare 100-130 ml/hl, distribuendo il prodotto tra la piena fioritura (80% di fiori aperti) e la caduta petali, preferibilmente in due applicazioni di 50-80 ml/hl ciascuna ad intervallo di 7-10 giorni.
- Melo (Golden Delicious) - Prevenzione della rugginosità. Impiegare 40-50 ml/hl per trattamento, realizzando un programma di 3-4 applicazioni, effettuare il primo trattamento a fine fioritura e i successivi ad intervalli di 7-l0 giorni.
- Melo del Gruppo Gala. Favorisce il miglioramento della forma, anticipa l'emissione e lo sviluppo dell'apparato fogliare, migliora l'omogeneità della fioritura, incrementa la quantità raccolta al primo stacco. Fare 4 applicazioni distanziate di 15 giorni con 30-40 ml/hl in pre-fioritura (orecchiette di topo e mazzetti) e ad ingrossamento dei frutti (frutto noce).
- Altre varietà di melo. 50-60 ml/hl durante la fioritura ripetuto per 2 volte.
- Pero - Miglioramento dell'allegagione. Applicare 80-100 ml/hl distribuendo il prodotto all'inizio della fioritura, preferibilmente in due applicazioni di 30-50 ml/hl, effettuando il primo trattamento al 30-40% di fiori aperti ed il secondo entro 2-3 giorni.

Avvertenze d'impiego
- Aggiungere 50-100 ml/hl di un bagnante non ionico, avendo cura di metterlo prima del GERLAGIB LG.
- Mettere la dose prestabilita di GERLAGIB LG in circa la metà dell'acqua necessaria e, mantenendo la soluzione in agitazione, aggiungere altra acqua sino al raggiungimento del volume totale richiesto.
- Mantenere in agitazione la soluzione anche durante la distribuzione, provvedendo al suo impiego nello stesso giorno della preparazione.
- Impiegare nella distribuzione un getto finemente nebulizzato, bagnando uniformemente la massa fiorale ed evitando lo sgocciolamento
- La quantità totale di soluzione per ettaro dovrà essere regolata in funzione dello sviluppo delle piante e della forma di allevamento.
- Trattare in assenza di pioggia per almeno 4-6 ore dopo l'applicazione; nel caso di trattamento dopo una pioggia, attendere che la vegetazione si asciughi.
- Trattare preferibilmente nelle ore del tardo pomeriggio e comunque con temperature non inferiori a 7°C o superiori a 32°C.

COMPATIBILITA' : il prodotto non è compatibile con le sostanze alcaline quali polisolfuri e poltiglia bordolese. Durante la preparazione di miscele, aggiungere GERLAGIB LG per ultimo.
AVVERTENZA - in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: L'impiego del GERLAGIB LG in prossimità di interventi con prodotti diradanti, può accentuare l'effetto diradante degli stessi: pur essendo tale aspetto talvolta ricercato, si raccomanda particolare attenzione allo scopo di evitate danni alla produzione.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso é pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

l. gobbi
Via B. Bosco, 57 – Genova
Stabilimento di produzione: Althaller Italia Srl - S. Colombano (MI) / Diachem Spa - U.P. SIFA - Caravaggio (BG) / Adica Srl - Faenza (RA) / Eduard Gerlach GmbH - Lübbecke (Germania) / L. Gobbi srl – Campo Ligure (GE) / Hockley ltd - Dewsbury, West Yorkshire (UK)
Reg. n 11185 del 05-02-2002 del Min. della Salute
Partita n: vedasi sigla
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto netto: **20-50-100 ml**

GerBAthin® 2 LG

Fitoregolatore in formulazione liquida

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
6-BENZILADENINA pura... g 2 (21 g/l)
Coformulanti ....q.b. a g 100

Attenzione: Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritazione cutanea degli occhi e dell'apparato respiratorio. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE GENERALI
GerBAthin 2 LG è un fitoregolatore destinato all'impiego su melo e pero per migliorare lo sviluppo dei getti laterali, favorire l'apertura anticipata dei rami, migliorandone l'angolatura, ed accelerare l'entrata in produzione della pianta. È particolarmente indicato per le cultivar a basso potenziale di ramificazione e su impianti giovani di meli non ancora in produzione. **GerBAthin 2 LG** può anche essere impiegato su melo come diradante, con azione di ingrossamento dei frutti. La sua azione diradante è comprovata su Golden Delicious, Gala, Fuji, Braeburn ed Elstar, mentre ne è sconsigliato l'utilizzo su Red Delicious.
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
GerBAthin 2 LG si impiega in vivaio su piante non ancora in produzione alle seguenti dosi:
Melo 500 ml/hl
Pero 750 ml/hl.
Effettuare tre trattamenti, a distanza di 5-7 giorni l'uno dall'altro. Il primo intervento va eseguito quando i getti sviluppati dalla gemma apicale hanno una lunghezza di circa 5-7 cm e 4-6 foglie non ancora completamente distese
Il prodotto va impiegato con volumi di acqua variabili da 300 a 1000 litri/ha su melo e da 300 a 650 litri/ha su pero a seconda dello sviluppo delle piante assicurando una uniforme bagnatura. Si consiglia l'aggiunta di un bagnante non ionico. Il prodotto può essere impiegato anche con trattamenti localizzati alla gemma apicale delle piante alla dose di 750-1000 ml di prodotto diluiti in 20 litri d'acqua, spruzzando almeno 0,5 ml di soluzione per bagnare bene la gemma ed avere un leggero gocciolamento.
Per l'impiego su melo come diradante intervenire alla dose di 250 -1000 ml/hl quando i frutticini sul legno di 2 o più anni hanno dimensioni intorno ai 12-14 mm di diametro (circa 20-28 giorni dalla piena fioritura). Il suo effetto diradante è ancora maggiore se associato ad acido naftalenacetico o se fatto seguire ad amide dell'acido naftalenacetico.
AVVERTENZE
Si possono aggiungere 100 ml/hl di un bagnante non ionico avendo cura di metterlo prima del **GerBAthin 2 LG**. In caso di impiego su Golden Delicious come diradante l'associazione di **GerBAthin 2 LG** col bagnante potrebbe aumentare la rugginosità dei frutti, pertanto si sconsiglia di aggiungerlo su questa cultivar e si suggerisce comunque un programma di prevenzione a base di Gibberelline. -Versare la dose stabilita di **GerBAthin 2 LG** in circa metà della quantità d'acqua e, tenendo la soluzione in costante agitazione, aggiungere altra acqua sino a raggiungere il volume richiesto. -Tenere la soluzione così preparata in costante agitazione anche durante la fase di distribuzione (la soluzione dovrà essere impiegata entro 24 ore dalla sua preparazione). -Impiegare per irrorazione con getto finemente nebulizzato e bagnare uniformemente la pianta senza tuttavia eccedere in modo da evitare lo sgocciolamento. -La quantità totale di soluzione per ettaro dipenderà dallo sviluppo delle piante e dal tipo di allevamento (mediamente 3 -10 hl/ha). -Per favorire l'emissione dei nuovi rami il trattamento va eseguito dopo un'abbondante pioggia o irrigazione e dovrà essere preceduto o seguito da una concimazione azotata. -Ripetere l'applicazione se entro 24 ore dal trattamento cadono più di 5 mm di pioggia.
COMPATIBILITÀ
GerBAthin 2 LG è compatibile con prodotti a base di acido naftalenacetico e carbaryl. Inoltre può essere fatto precedere da prodotti a base di amide dell'acido naftalenacetico. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale **per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**
L. Gobbi s.r.l.
Via B. Bosco, 57 - 16121 Genova
Stabilimento di produzione: L. Gobbi srl - Campo Ligure (GE)
Registrazione n. 12025 del 27/02/2004 del Min Salute
® **Marchio registrato della L. Gobbi S.r.l.**
Partita N°: Vedasi sigla
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto netto: 500 ml, 1-5-10-25 litri

EUROPHYTO T.S.A. S.r.l.

SUNDEK SL

Diserbante selettivo di post-emergenza
Liquido solubile

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
Dicamba puro g 21,2 (= 230 g/l)
(corrispondente a g 25,5 di sale dimetilamminico puro)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE
EUROPHYTO T.S.A. srl (tel. 0363-305786)
Viale V. Emanuele II, n.64 - Bergamo
OFFICINA DI PRODUZIONE
Irca Service S.p.A. – Fornovo S.Giovanni (Bg)
Diachem SpA – U.P. SIFA – Caravaggio (Bg)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10420 del 29.03.2000

Quantità netta del preparato: ml 100-250-500 litri 1-2-3-5-10-20

PARTITA N.

INFORMAZIONI MEDICHE
Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. Terapia sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

CARATTERISTICHE
SUNDEK SL é un diserbante che agisce alterando il metabolismo enzimatico delle infestanti con cui viene a contatto. Viene assorbito per via fogliare e radicale e traslocato in tutta la pianta attraverso la circolazione linfatica. Il prodotto, da applicare in post-emergenza delle malerbe, oltre a controllare dicotiledoni perenni quali Vilucchio (Convolvulus arvense) e Stoppione (Cirsium arvense) é efficace nei confronti di numerose specie di infestanti annuali quali il Cencio molle (Abutilon theophrasti), Amaranto (Amaranthus retroflexus), Anagallide (Anagallis arvensis), Iva comune (Ajuga spp), Atriplice maggiore (Atriplex patula), Forbicina (Bidens spp), Borsa del pastore (Capsella bursa-pastoris), Fiordaliso (Centaurea cyanus), Farinaccio (Chenopodium album), Stramonio (Datura stramonium), Convolvolo nero (Fallopia convolvulus), Fumaria (Fumaria officinalis), Canapaccia comune (Galeopsis tetrahit), Galinsoga comune (Galinsoga parviflora), Attaccamano (Galium aparine), Camomilla (Matricaria chamomilla), Papavero (Papaver rhoeas), Correggiola (Polygonum aviculare), Persicaria (Polygonum persicaria), Porcellana (Portulaca oleracea), Rapastrella (Raphanus raphinastrum), Sicio (Sycios angulatus), Senape (Sinapis arvensis), Erba calderina (Senecio vulgaris), Erba morella (Solanum nigrum), Arenaiola (Spergula arvensis), Stellaria (Stellaria media), Erba storna (Thlaspi arvense), Ortica minore (Urtica urens), Veronica (Veronica spp), Veccia (Vicia spp), Nappola (Xanthium spp).
CAMPI DI IMPIEGO
SUNDEK SL é un erbicida selettivo per il controllo delle infestanti di Mais, Sorgo, Frumento, Orzo, Segale, Avena, Prati di graminacee (ornamentali, campi sportivi e campi da golf), Asparago, Melo.
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Mais: impiegare in post-emergenza con infestanti ai primi stadi di sviluppo e con Mais a 3-4 foglie fino ad un massimo di 6-7 foglie (altezza 40 cm), alla dose di 0,8-1,2 l/ha
Sorgo: impiegare in post-emergenza della coltura allo stadio di 3-4 foglie alla dose di 0,8-1 l/ha.
Frumento, Orzo, Segale, Avena: intervenire dallo stadio della coltura di 4 foglie fino ad inizio levata alla dose di 500 ml/ha. E' consigliabile, per ottenere migliori risultati, trattare quando le infestanti e la coltura sono in attiva crescita.
Prati di graminacee (ornamentali, pascoli, campi sportivi, campi da golf): effettuare il trattamento quando le infestanti abbiano almeno 2 foglie sviluppate alla dose di 1 l/ha per applicazioni a pieno campo e con soluzione allo 0,2% per trattamenti localizzati. Si consiglia di non intervenire immediatamente dopo lo sfalcio.
Asparago: il trattamento deve essere effettuato in primavera prima dell'emergenza dei turioni, preferibilmente su terreno sarchiato e leggermente umido, sia con trattamenti a pieno campo alla dose di 200-500 ml/ha, sia con trattamenti localizzati con soluzione allo 0,2%. Utilizzare per i trattamenti un volume d'acqua di 200-400 l/ha, fino a 500-600 l/ha.
Melo: effettuare il trattamento alla dose di 1-1,5 l/ha con l'avvertenza di non colpire le parti verdi della coltura.
Avvertenze: non impiegare su colture di mais impiantate su terreni sabbiosi o con basso contenuto in sostanza organica; evitare che la nube irrorante possa giungere a contatto con le colture vicine. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

COMPATIBILITA' Sundek é compatibile con i principali erbicidi di post-emergenza presenti sul mercato quali MCPA, Mecoprop, Pendimetalin, 2-4 D, Tribenuron-metile, Triasulfuron qualora le condizioni di applicazione lo richiedano. In caso di miscela utilizzare Sundek a dosi dimezzate.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: SORGO: 130 gg **- MELO**: 30 gg **- Altre colture**: 20 gg
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Etichetta formato ridotto

SUNDEK SL

Diserbante selettivo di post-emergenza
Liquido solubile

COMPOSIZIONE
Dicamba puro g 21,2 (= 230 g/l)
(corrispondente a g 25,5 di sale dimetilamminico puro)
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE
EUROPHYTO T.S.A. srl (tel. 0363-305786)
Viale V. Emanuele II, n.64 - Bergamo
OFFICINA DI PRODUZIONE
Irca Service S.p.A. Fornovo S.Giovanni (Bg)
Diachem SpA – U.P. SIFA – Caravaggio (Bg)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10420 del 29.03.2000

Quantità netta del preparato: ml 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

PHYTOCAR

ACARICIDA SELETTIVO PER IMPIEGO SU PERO, MELO, VITE,
(sospensione concentrata)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Bromopropilato puro g 25 (=270 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
- Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
EUROPHYTO T.S.A. srl
Viale V. Emanuele II, n.64 - Bergamo (tel.0363-305786)

STABILIMENTI DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. U.P. SIFA Caravaggio (Bg)
IRCA Service S.p.A. – Fornivo S.Giovanni (Bg)
TERRANALISI srl – Cento (Fe)

Registrazione Ministero della Sanità n. 11.031 del 11.10.2001

Partita n.

Contenuto ml 100-200-250-500 litri 1-5-10-20

CARATTERISTICHE
Phytocar è un acaricida selettivo attivo per contatto; è efficace nella lotta contro l'eriofide del pero (Phytoptus pyri) e del melo (Aculus schlechtendali) e l'acaro responsabile dell'acariosi della vite (Calepitrimerus vitis),con azione simultanea contro uova estive, neanidi ed adulti. E' particolarmente indicato nei programmi di lotta integrata.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Phytocar si impiega si impiega a volume normale o ridotto, alla dose **di 200 ml/hl** d'acqua sulle seguenti colture ed epoche di trattamento:
POMACEE: per la lotta all'eriofide con intervento a rottura gemme-punte verdi
VITE: per il controllo dell'acariosi intervenendo tra la fase di gemma cotonosa e foglie libere.

PHITOCAR non deve essere impiegato oltre le epoche indicate.

COMPATIBILITA': **Phytocar** non è miscibile con gli anticrittogamici e gli insetticidi a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Phytocar risulta selettivo sulle colture indicate in etichetta; si consiglia comunque di eseguire saggi preliminari su cvs di recente introduzione.

INTERVALLO DI SICUREZZA: -

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
NON OPERARE CONTRO VENTO. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE.
EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

ARTAL 75 WP

Diserbante selettivo

POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE

Clortal-dimetile puro g 75
Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO

Possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE

EUROPHYTO T.S.A. srl – V.le V.Emanuele II, 64 –24121 Bergamo (tel. 0363-305786)
Viale V. Emanuele II, n.64 - Bergamo

STABILIMENTO DI PRODUZIONE

STI Solfotecnica Italiana SpA – Cotignola (Ra)
DIACHEM SpA – UP SIFA – Caravaggio (Bg)
ADICA srl – Nera Montoro (Tr)

Registrazione Ministero della Sanità n. 11.100 del 29.11.2001

Contenuto: **kg 0,250-500-1-3-5-10** **Partita n.**

INFORMAZIONI MEDICHE

Sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.
Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE

Artal 75 wp agisce sulle infestanti prima della loro emergenza per assorbimento radicale o per contatto con l'epicotile dei germinelli impedendone lo sviluppo.
E' efficace contro le seguenti infestanti provenienti da seme:
Digitaria sanguinalis (sanguinella), Amaranthus retroflexus (amaranto), Chenopodium album (farinaccio), Setaria verticillata (panicastrella), Portulaca oleracea (erba porcellana), Stellaria media (centocchio), Erodium cicutarium (erba cicutaria), Beta vulgaris (barbabietola), Poa annua (fienarola), Papaver rhoeas (papavero), Alopecurus myosuroides (erba codina), Echinochloa crus-galli (giavone), Lolium(loglio), Poa trivialis (spannocchina), Anagallis arvensis(anagallide), Galium aparine (attaccamani), Anthemis arvensis (camomilla inodore), Galeopsis tetrahit (canapa selvatica), Centaurea cyanus (farinello comune), Geranium dissecatum (geranio), Urtica spp (ortica), Lamium purpureum (falsa ortica).

Sono invece resistenti le infestanti come gramigna, cipero, vilucchio, stoppione (o cirsium), ed altre come coda cavallina, capsella. Inoltre sono poco sensibili al prodotto le poligonacee come: convolvolo, persicaria, correggiola (Polygonum aviculare ecc.), erba calderina, erba calenzuola, erba morella, fumaria e mercorella.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alla dose di 15-20 kg/ha, utilizzando la dose più bassa nei terreni sciolti e di medio impasto e quella più alta nei terreni argillosi. Non effettuare il diserbo nei terreni torbosi perché il prodotto viene inattivato dalla sostanza organica. Diluire il prodotto in 500-600 litri di acqua e distribuire uniformemente la poltiglia su tutta la superficie del campo con le comuni irroratrici a mano o meccaniche.

- **Su colture seminate** (Cipolla, Aglio, Porro, Cavoli, Carota, Sedano, Prezzemolo, Finocchio, Pisello, Bulbose floreali) si interviene entro qualche giorno dopo la semina o il collocamento a dimora dei bulbi o dei bulbilli sul terreno ben affinato e privo di zolle.
- **Su colture trapiantate** (Cipolla, Porro, Cetriolo, Melone, Anguria, Lattuga, Scarola, Pomodoro, Peperone, Melanzana) si interviene dopo qualche giorno dopo il trapianto su terreno ben affinato e privo di zolle
- **Su Fragola, Carciofo, Asparago** di nuovo impianto o negli anni successivi: nei nuovi impianti si interviene entro qualche giorno dopo l'impianto su terreno ben affinato, mentre per gli impianti di 1-2 o più anni si interviene dopo la lavorazione di fine inverno su terreno affinato e privo di zolle
- **Su campi da golf e su prati ornamentali** (Turf): intervenire alla dose di 13 kg/ha in 500-600 litri di acqua all'inizio della primavera, prima dell'emergenza delle infestanti, dopo aver eseguito il taglio del tappeto erboso.

Il diserbo con il prodotto alle epoche sopra indicate deve essere effettuato prima della nascita delle infestanti, operando possibilmente su terreno fresco per una recente pioggia o irrigazione; se si opera su terreno asciutto è necessario che una pioggia cada entro 8-10 giorni dal diserbo, in caso contrario si deve provvedere ad una irrigazione. Qualora la coltura diserbata dovesse fallire per avverse condizioni ambientali, si possono subito reimpiantare le stesse colture per le quali il prodotto è selettivo.
Avvertenza: la persistenza di azione varia da 4 a 8 settimane in funzione dell'andamento stagionale e della natura del terreno.Se pertanto 60-70 giorni dopo il trattamento si verificasse una nuova apparizione delle erbe infestanti, sarà consigliabile eseguire un secondo trattamento con 10 kg/ha di prodotto.

COMPATIBILITA'

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine. Dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e per la distribuzione della poltiglia erbicida prima di utilizzarli per altri trattamenti.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

In caso di utilizzo su campi da golf e prati ornamentali: non rientrare nelle aree trattate prima di 24 ore dal trattamento e segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle colture trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del pesticida.
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ECHINOM WG

Diserbante selettivo di post-emergenza contro il giavone
ed altre infestanti da risaia
GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE
Propanile puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza
INFORMAZIONI MEDICHE
Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
EUROPHYTO T.S.A. srl Viale V. Emanuele II, n.64 - Bergamo (tel. 0363-305786)

OFFICINA DI PRODUZIONE
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A.- Cotignola (Ra)
SIPCAM S.p.A – Stabilimento di Salerano sul Lambro (Lo)
Agform Limited – Bursledon Southampton - SO31 IAA, United Kingdom
Schirm AG-Division Sideco – Mecklenburger Strasse 229, Lubeck
Registrazione Ministero della Salute N. 11.101 del 29.11.2001

Contenuto: kg 1-5-10-25 **Partita n.**

CARATTERISTICHE
Echinom WG è un erbicida selettivo ad azione principalmente di contatto, ma anche per successiva traslocazione, che si impiega in post-emergenza del riso e delle infestanti.
MODALITA' DI IMPIEGO E DOSI
Il formulato viene impiegato nella lotta contro i giavoni (Echinochloa spp.) ed altre erbe infestanti (Alisma spp, Cyperus difformis, Digitaria spp, Setaria spp) della risaia nei primi stadi del loro sviluppo. **Echinom wg** si applica con le comuni attrezzature, diluito in una quantità d'acqua sufficiente a consentire una perfetta copertura delle infestanti da combattere. Il trattamento viene effettuato in post-emergenza dei giavoni, nello stadio vegetativo compreso tra una e tre foglie; in questo stadio essi presentano la maggiore sensibilità. Questo non significa che non si possa intervenire anche quando i giavoni sono più sviluppati (fase di accestimento), anche se l'intervento nello stadio di accestimento avanzato deve essere considerato eccezionale, in quanto consente di ottenere dei risultati in genere parziali, anche se soddisfacenti del diserbo, effettuare un buon livellamento del terreno c , subito dopo la semina, mantenere un livello d'acqua basso (8 10 cm massimo).

E' sempre consigliata l'aggiunta di un bagnante adesivante per migliorare l'attività di contatto per esempio in ragione del 20-30% di bagnante trattando con 2,5 l/ha di formulato. Allo scopo di ottenere i migliori presupposti per una buona riuscita
In questo modo si avrà una più alta percentuale di giavoni nello stesso stadio vegetativo al momento del trattamento e la quasi totale eliminazione delle nascite successive dell'infestante.
In normali condizioni di vegetazione e con giavone in attiva crescita, le dosi di impiego sono le seguenti:
a) Giavoni con 1-3 foglie, ma in maggioranza con 2 foglie...4 – 4,5 kg/ha
b) Giavoni con 3-4 foglie e qualche pianta all'inizio dell'accestimento............................... 5 – 5,5 kg/ha
c) Giavoni dalla 4° foglia fino all'accestimento.. 7 kg/ha
Il formulato va diluito in un quantitativo d'acqua di 400-500 l/ha; nel caso di intervento su giavone molto sviluppato è consigliabile aumentare il quantitativo d'acqua. L'applicazione deve essere effettuata irrorando uniformemente la miscela erbicida su tutta la pianta del giavone, in modo da ottenere la perfetta copertura della superficie fogliare e della guaina dell'infestante; allo scopo si consiglia di tenere la barra irroratrice più in basso possibile a circa 50 cm da terra. Il trattamento viene effettuato in asciutta, per cui è necessario togliere l'acqua dalle camere 24-36 ore prima del trattamento. Anche le piantine di giavone dovranno essere asciutte, quindi si consiglia di non operare nelle ore del primo mattino o verso sera, quando la vegetazione è ricoperta di rugiada. Effettuato il trattamento la risaia deve rimanere in asciutta per almeno 24-36 ore, dopo di che si dovrà ripristinare il livello dell'acqua e mantenerlo per 6-8 giorni il più alto possibile, naturalmente in relazione allo sviluppo del riso. Trascorso questo periodo, si riporterà l'acqua ad un livello normale, ma comunque tale da evitare nuove nascite di giavone. Nel caso di riso trapiantato, effettuare il trattamento tenendo gli spruzzatori molto bassi, quasi a livello degli apici delle foglie del riso, per meglio colpire le piantine di giavone che possono risultare protette dalla vegetazione del riso già abbastanza espansa. Evitare il trattamento qualora si preveda pioggia a distanza di 6-8 ore.
Echinom wg è tanto più efficace quanto le infestanti sono in rapido accrescimento. In linea di massima, il giavone si presenta allo stadio di 2-3 foglie da 12-15 a 20-22 giorni dopo la semina del riso; l'oscillazione è in rapporto alla temperatura che tanto più è alta, tanto più abbrevia l'intervallo tra la semina e la comparsa della terza foglia e viceversa. La valutazione dello stadio delle piantine deve essere fatta accuratamente e poco prima del trattamento. In particolare, bisogna stabilire il dosaggio in relazione allo stadio delle piantine che si trovano sulle parti di terreno più alte e che quindi sono più avanzate. Per combattere il giavone "invecchiato", cresciuto cioè con andamento climatico caratterizzato da basse temperature e di conseguenza dotato di un apparato radicale molto robusto e profondo in rapporto all'apparato fogliare, è necessario aumentare le dosi come di seguito specificato:

a) Giavoni con 1-3 foglie....................................... 5,5 kg/ha
b) Giavone con 3-4 foglie..................................... 7 kg/ha

COMPATIBILITA'
Il formulato non deve essere utilizzato in miscela con fertilizzanti, insetticidi fosforganici e carbammati e non deve essere distribuito prima o dopo 5 giorni dall'uso di questi prodotti, altrimenti il riso può subire delle bruciature.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Alle dosi d'impiego più elevate, Echinom wg, in condizioni particolari, può causare parziali necrosi o ingiallimento delle foglie del riso, che si risolvono nello spazio di 6-7 giorni al massimo, senza pregiudizio alcuno per l'accrescimento delle giovani piante di riso. Effettuare il trattamento in giornate prive di vento onde evitare che la nube irrorante possa essere trasportata su colture limitrofe sensibili: medica, trifoglio, pisello, fagiolo, frutteti, vigneti e colture orticole in genere.
Echinom wg è fitotossico se usato in miscela a insetticidi fosforganici e carbammati.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
Evitare l'accesso di uomini o animali nelle 24 ore successive al trattamento.
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

EXIT

ACARICIDA

tipo di formulazione: polvere bagnabile

COMPOSIZIONE

Exitiazox puro g 10

Coformulanti q.b. a g 100

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO

Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

EUROPHYTO T.S.A S.R.L.

Sede legale: viale V. Emanuele II, n.64 - Bergamo (tel. 0363-305786)

STABILIMENTI DI PRODUZIONE

ADICA SRL – Nera Montoro (Tr)

SINAPAK SNC – Stradella (Pv)

Registrazione Ministero della Sanità n. 11149 del 08/01/02

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: **g 100-200-250-500 kg 1-5-10**

Partita N.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare la confezione ben chiusa

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Exit è un acaricida in polvere bagnabile che agisce per contatto ed ingestione, ed inoltre è dotato di effetto translaminare, con notevole persistenza d'azione ed estrema selettività nei confronti delle api e degli acari predatori. La sua azione acaricida è mirata a combattere uova, larve e ninfe di acari tetranichidi rossi e gialli (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini f.vitis ecc).

Viene impiegato sulle seguenti colture:

MELO - PERO - PESCO - AGRUMI - VITE – FRAGOLA – ACTINIDIA – MELONE – CETRIOLO – PEPERONE – MELANZANA – POMODORO – FAGIOLINO – SOIA – COLTURE FLOREALI IN PIENO CAMPO ED IN SERRA, trattando in presenza di pochissime forme mobili (1-2 acari per foglia) alla dose di **g 50 per ettolitro d'acqua;** nel caso vi sia necessità si miscela con prodotti acaricidi adulticidi per avere una rapida azione iniziale sugli adulti.Per ottenere un risultato migliore bagnare abbondantemente la vegetazione trattata.

COMPATIBILITA': non compatibile con prodotti a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta di fragola, peperoni, melanzane, fagiolini, pomodoro, melone, cetriolo, 14 giorni prima della raccolta di pesco, melo, pero, actinidia, agrumi, vite e 34 giorni prima della raccolta della soia.

FITOTOSSICITA': sulle floricole si consiglia un saggio preliminare su piccole superfici.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi indicati: ogni altro impiego è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.
NON PULIRE IL MATERIALE DI APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE.
EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Etichetta formato ridotto

EXIT

ACARICIDA

tipo di formulazione: polvere bagnabile

COMPOSIZIONE

Exitiazox puro g 10

Coformulanti q.b. a g 100

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO

Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

EUROPHYTO T.S.A S.R.L.

Sede legale: viale V. Emanuele II, n.64 - Bergamo (tel. 0363-305786)

STABILIMENTI DI PRODUZIONE

ADICA SRL – Nera Montoro (Tr)

SINAPAK SNC – Stradella (Pv)

Registrazione Ministero della Sanità n. 11149 del 08/01/02

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: **g 100**

Partita N.

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

Il contenitore non può essere riutilizzato

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie.

Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

ALL SEASONS

OLIO INSETTICIDA (Liquido Emulsionabile)

COMPOSIZIONE
Olio minerale paraffinico g 96 (= 790 g/l)
(insulfonabilità minima 95-96%)
Coformulanti q.b. a g 100

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
EUROPHYTO T.S.A. s.r.l. (0363-305786)
Sede legale: viale V. Emanuele II, n.64 - Bergamo

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d' intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se ingerito non indurre il vomito, chiamare immediatamente un medico.

STABILIMENTI DI PRODUZIONE
Irca Service SpA – Fornovo S.Giovanni (Bg)
Zapi SpA – Conselve(Pd)
Terranalisi srl – Cento(Fe)
Registrazione Ministero della Salute n. 11150 del 08.01.2002
Contenuto netto: ml 100-250-500-750 litri 1-3-5-10-20 Partita N.

ATTENZIONE. MANIPOLARE CON PRUDENZA

CARATTERISTICHE: ALL SEASONS è un insetticida di contatto a base di olio paraffinico altamente raffinato. Il prodotto agisce essenzialmente per asfissia, coprendo il corpo degli insetti con una sottile pellicola che penetrando nei loro canali tracheali, che vengono perciò occlusi, impedisce loro la respirazione e ne causa quindi la morte per asfissia. ALL SEASONS esplica la sua azione contro le cocciniglie e le uova degli acari e presenta inoltre un'azione ovicida ed antischiusura, come pure un'azione repellente nei confronti di alcuni insetti masticatori. Esso trova impiego su colture arboree ed erbacee in piena vegetazione sia in pieno campo che in serra come pure su piante d'appartamento e da giardino.
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Vite (uva da vino e da tavola): contro afidi, tripidi, cocciniglie, uova di lepidotteri, acari, in primavera-estate impiegare 1,5-2 l/hl, in inverno 2,5-3,5 l/hl.
Olivo (olivo da olio e da tavola): contro cocciniglie, tignole, in primavera-estate impiegare 1,5-2 l/hl, in inverno 2,5-3,5 l/hl.
Agrumi (arancio, mandarino, limone, clementino, bergamotto, cedro, pompelmo, tangerino, limetta, chinotto, kumquat, arancio amaro): contro afide verde, cimice, cocciniglie, aleurodidi, tripidi, ragno rosso, in primavera-estate impiegare 1,5-2 l/hl, in inverno 2,5-3,5 l/hl.
Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino, mandorlo): contro cocciniglie, afidi, tripidi, uova di lepidotteri, acari, in primavera-estate impiegare 1,5-2 l/hl, in inverno 2,5-3,5 l/hl.
Pomacee (melo, pero, cotogno): contro cocciniglie, afidi, psilla, tignole, uova di lepidotteri, acari, in primavera-estate utilizzare 1,5-2 l/hl, in inverno 2,5-3,5 l/hl.
Caco,fico, ribes, noce, nocciolo: contro cocciniglie, afidi, uova di lepidotteri, acari, in primavera-estate impiegare 1,5-2 l/hl, in inverno 2,5-3,5 l/hl.
Cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo), pomodoro, peperone, fagiolo: contro afidi, tripidi, mosca bianca, minatori delle foglie, uova di lepidotteri e coleotteri, acari, utilizzare in periodo vegetativo 1-2,5 l/hl.
Sedano, finocchio: contro afidi, tripidi, mosca bianca, uova di minatori delle foglie, acari, impiegare in periodo vegetativo 1-2,5 l/hl.
Carciofo: contro afidi, mosca bianca, uova di lepidotteri, ditteri minatori, acari, impiegare durante il periodo vegetativo 1-2,5 l/hl.
Patata: contro afidi, uova di dorifora, impiegare durante il periodo vegetativo 1-2,5 l/hl.
Barbabietola da zucchero: contro afidi, adulti di altica e Cassida, mosca delle bietole, in periodo vegetativo utilizzare 1-2,5 l/hl.
Floreali, ornamentali e forestali: contro afidi, tripidi, cocciniglie, tignole, aleurodidi, acari, in fase vegetativa impiegare 1,5-2,5 l/hl, in inverno 2-2,5 l/hl.
Preparazione della miscela: riempire il serbatoio a ¾ per permettere un'agitazione ottimale della pompa, quindi aggiungere il prodotto, mantenendo la pompa in costante agitazione e portare l'acqua al volume totale. In caso di miscela con altri prodotti fitosanitari in polvere bagnabile, mescolare molto bene la poltiglia contenente la polvere prima di aggiungere l'olio. Nel caso di miscela con prodotti fitosanitari in formulazione emulsionabile, aggiungerli dopo che l'olio e l'acqua siano stati perfettamente mescolati. Durante l'impiego mantenere la miscela in costante agitazione. Verificare sempre che gli insetti da controllare siano completamente ricoperti dalla soluzione irrorata.
COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con dimetoato e con fungicidi quali anilazina, captano, folpet, dinocap, oxythioquinox o qualsiasi altro prodotto contenente zolfo. Qualora si eseguano trattamenti separati con tali prodotti si consiglia di osservare un intervallo di almeno 2 settimane.
Avvertenza: in caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Non trattare durante la fioritura. Si possono avere rischi di fitotossicità in caso di trattamenti durante periodi prolungati con temperature elevate. Non trattare piante sotto stress idrico. Il prodotto è tossico per le api e gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Etichetta formato ridotto

ALL SEASONS

OLIO INSETTICIDA (Liquido Emulsionabile)

COMPOSIZIONE
Olio minerale paraffinico g 96 (= 790 g/l)
(insulfonabilità minima 95-96%)
Coformulanti q.b. a g 100

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
EUROPHYTO T.S.A. s.r.l. (0363-305786)
Sede legale: viale V. Emanuele II, n.64 - Bergamo

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d' intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se ingerito non indurre il vomito, chiamare immediatamente un medico.

STABILIMENTI DI PRODUZIONE
Irca Service SpA Fornovo S.Giovanni (Bg)
Zapi SpA Conselve(Pd)
Terranalisi srl – Cento(Fe)
Registrazione Ministero della Salute n. 11150 del 08.01.2002
Contenuto netto: ml 100 Partita N.

ATTENZIONE. MANIPOLARE CON PRUDENZA

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie.

REDOX

Fungicida a base di idrossido di rame
Sospensione Concentrata

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono
Rame metallo (sottoforma di idrossido) g 24 (= 350 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico - Proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
EUROPHYTO T.S.A.s.r.l.
Sede legale: viale V. Emanuele II, n.64 Bergamo (tel. .0363-305786)
STABILIMENTI DI PRODUZIONE
IRCA Service S.P.A. – S.S. Cremasca 591, n.10 – 24040 Fornovo S.Giovanni (Bg)
DIACHEM SPA – U.P. SIFA – Caravaggio (Bg)
TERRANALISI srl Cento (Fe)

Registrazione Ministero della Salute n. 11151 del 08/01/2002
Contenuto netto: ml 100-250-500 litri 1-3-5-10-20 **Partita N.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - **Sintomi:** denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia**: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **Avvertenze: consultare un Centro Antiveleni.**

MODALITA' D'IMPIEGO - REDOX è un anticrittogamico polivalente da impiegarsi nella lotta alle malattie fungine, sulle seguenti colture:
Vite: ml 300 400 per hl contro Peronospora e Marciume nero degli acini, intervenendo dalla formazione degli acini alla vendemmia.
Melo e Pero: ml 400-500/hl contro cancri del legno (Nectria galligena, Phomopsis mali, Spaeropsis malorum, Pseudomonas syringae). Intervenire alla caduta totale delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme, ml 300-400/hl contro il colpo di fuoco. Intervenire con 2 trattamenti nelle fasi di rigonfiamento delle gemme e delle punte verdi. Sul pero applicare ml 50 o litri 0.9/ha, durante la fioritura ogni 5 giorni; ml 400/hl contro Phitophtora cactorum applicando 15 litri di soluzione alla base di ogni pianta ammalata, intervenire ogni anno in primavera e alla fine della raccolta. Contro la Ticchiolatura: ml 230-280/hl prima della fioritura; ml 160-200/hl dopo la fioritura e successivamente ml 160/hl.
Albicocco e Susino: ml 350-400/hl contro Corineo, Monilia e Cytospora leucostoma: intervenire durante il riposo vegetativo. Non trattare mai dopo la fioritura.
Ciliegio: ml 450/hl più ml 150 di olio minerale bianco contro Corineo, Monilia, Scopazzi. In frutteti fortemente ammalati ripetere l'applicazione anche in Agosto; ml 200/hl contro la monilia dei fiori, intervenendo subito prima ed immediatamente dopo la fioritura.
Pesco – nettarine: ml 400 500/hl contro Bolla e Corineo con interventi subito dopo la caduta delle foglie ed a fine inverno. ml 200 250/hl contro la Monilia nella fase dei bottoni rosa; ml 400-500/hl contro la Batteriosi con trattamenti durante il riposo vegetativo; per applicazioni in post-fioritura usare ml 60/hl per due trattamenti. Non trattare nelle tre settimane che precedono la raccolta né usare dosaggi superiori.
Mandorlo: ml 350/hl contro Corineo, Bolla e Monilia con interventi alla caduta delle foglie, all'ingrossamento delle gemme e subito prima della fioritura. Per interventi post-fiorali mantenere inalterata la dose.
ml 300-400/hl contro Batteriosi (Pseudomonas) intervenendo prima della fase dei bottoni rosa.
Agrumi: ml 250-325/hl contro Mal secco, Allupatura, Melanosi, Fumaggine, Antracnosi e Scabbia del limone e dell'arancio. Intervenire prima e dopo la fioritura in funzione della gravità della malattia.
Olivo: ml 250-350/hl contro Occhio di pavone, Fumaggine e Lebbra. Intervenire alla fine di Settembre –inizio Ottobre, dopo la raccolta ed eventualmente dopo la potatura.
Nocciolo: ml 350/hl contro la Batteriosi (Xanthomonas corylina) con due trattamenti in Ottobre distanziati di circa 20-25 giorni uno dall'altro.
Noce: ml 260/hl contro Antracnosi. Intervenendo in pre-fioritura; in caso di piogge frequenti sono necessarie applicazioni supplementari, in estate si consiglia di aggiungere ml 125/hl di olio minerale bianco.
Nespolo: ml 200/hl contro la Ticchiolatura.
Cipresso: ml 400/hl contro il cancro (Corineum cardinale) intervenire in pieno inverno
Patata: ml 300-400/hl contro Peronospora e Alternaria. Iniziare i trattamenti quando le piante hanno raggiunto l'altezza di circa 15 cm proseguendoli in funzione dell'andamento climatico.
Pomodoro: ml 300 400/hl contro Peronospora, Alternaria e Septoria. Intervenire ogni 10 giorni circa ed in funzione dell'andamento climatico.
ml 400/hl contro le Batteriosi (Cancro o Avvizzimento, Maculatura e Picchiettatura) intervenire a intervalli regolari (10-15 giorni).
Si consigliano combinazioni con Mancozeb solo fino alla prima fioritura.
Barbabietola da zucchero: l 3/ha contro la Cercospora. Iniziare i trattamenti alla fine di Giugno inizio Luglio continuandoli ogni 20-25 giorni fino a 20 giorni dalla raccolta.
Fragola: l 2/ha contro Vaiolatura. Iniziare a trattare quando le piante hanno attecchito proseguendo ogni settimana per tutta la stagione. Cessare le applicazioni ai primi eventuali segni di fitotossicità.
Fagiolo-pisello: ml 200 260/hl contro Peronospora, Antracnosi e Ruggine. Intervenire quando si creano le condizioni per lo sviluppo delle malattie e proseguire secondo il caso. Questi interventi controllano pure le Batteriosi.
Cavoli-cavolfiori-cavoli di bruxelles-broccoli: ml 130 160/hl contro Peronospora e Alternaria. ml 280/hl contro Batteriosi (Xanthomonas). Iniziare le applicazioni dopo il trapianto e dopo l'emergenza delle coltivazioni seminate a intervalli di 10-15 giorni in funzione delle condizioni climatiche.
Alle dosi più alte potrebbero verificarsi, in alcune varietà, leggeri arrossamenti delle foglie vecchie dei broccoli e macchie sulle foglie esterne dei cavoli.
Carota: ml 200-280/hl contro l'Alternaria. Iniziare le applicazioni al verificarsi delle condizioni per lo sviluppo della malattia.
Sedano e finocchio: ml 200-280/hl contro Septoria, Cercospora e Peronospora. Trattare secondo l'andamento stagionale.
Melanzana: ml 200/hl contro Alternaria, Peronospora, intervenire ogni 15 giorni circa; in tal modo si controlla pure la Phomopsis vexans.
Cetriolo: ml 160 200/hl contro Peronospora, Antracnosi, Cladosporiosi e Batteriosi (Pseudomonas). Intervenire a cadenze fisse in funzione delle condizioni climatiche.
Melone-anguria: ml 200/hl contro Peronospora, Antracnosi. Si consigliano interventi cadenzati in funzione delle condizioni climatiche.
Cipolla-aglio: ml 230/hl contro Peronospora e Alternaria. Iniziare i trattamenti quando le piante hanno raggiunto l'altezza di circa cm 15.
Insalata-cardo-carciofo - ml 160-200/hl contro Peronospora e Alternaria con trattamenti preventivi in funzione delle condizioni climatiche.
Riso: l 4/ha contro le alghe verdi. Intervenire alla comparsa dell'attacco con un quantitativo di soluzione sufficiente per coprire l'intera superficie.
Rosa: ml 200-250/hl contro Ticchiolatura, Peronospora e Ruggine. **Ciclamino:** ml 200/hl contro Antracnosi e Maculatura fogliare.
Filodendro: ml 200/hl contro le Batteriosi (Erwinia spp.) con applicazioni settimanali ad iniziare prima della comparsa della malattia.
COMPATIBILITA'- Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Non si deve trattare durante la fioritura ad eccezione dei casi menzionati nel capitolo "MODALITA' D'IMPIEGO". Su pesco, nettarine, susino e alcune varietà di melo (Abbondanza "Belford", Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta Del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibile il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la ripresa vegetativa. Ad eccezione della lotta contro le Batteriosi menzionate nel capitolo "MODALITA' D'IMPIEGO"; in cui la fitotossicità può diventare un problema secondario.
INTERVALLO DI SICUREZZA :Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.
NON PULIRE IL MATERIALE DI APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

GLIPHYT

Erbicida sistemico di post-emergenza. Liquido solubile

COMPOSIZIONE
Glifosate acido puro g 31(=360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico g 41,7)
Acqua e coadiuvanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici. **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
EUROPHYTO TSA S.R.L.
Viale V. Emanuele II, n.64 - Bergamo (0363-305786)
OFFICINA DI PRODUZIONE
IRCA Service S.p.A. Fornovo S.Giovanni (Bg)
TERRANALISI srl – Cento (Fe)
DIACHEM spa U.P. SIFA Caravaggio (Bg)
CHEMINOVA A/S - Thyborónvej 76-78, 7673 Harboore - Denmark

Registrazione Ministero della Sanità n. 11.182 del 05.02.2002
Contenuto: litri 0,100-0,250-0,500-1-1,5-2-5-10-20-50

Partita n. vedi confezione

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D' IMPIEGO
Generalità: GLIPHYT è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. GLIPHYT non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.
Attrezzature, volumi d'acqua e miscele. GLIPHYT consente di ottenere migliori risultati con ugelli a specchio o a ventaglio e ridotti volumi d'acqua. L'addizione alla miscela di 10 kg/ha di solfato ammonico può risultare utile.
Avvertenza. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse, come siccità, freddo, attacchi parassitari ha efficacia ridotta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincato) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

Campi d'impiego
- Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: vite, olivo, melo, pero, arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo, kumquat.
- Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino.
- Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago.
- Terreni agrari in assenza della coltura (fragola, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai): prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
- Aree non destinate alle colture agrarie: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi, scoline, aree rurali e industriali, aree ed opere civili.
Dosi d'impiego: le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1-2 l/100 litri d'acqua sulle annuali/bienni e di 2-5 l/100 litri d'acqua sulle perenni.
Dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti.
Annuali e bienni. **1,5-4 l/ha:** Alopecurus sp., Avena sp., Hordeum murinum, Lolium sp., Mercurialis sp., Poa sp., Riso crodo, Ammi majus, Amaranthus sp., Calendula sp., Chenopodium sp., Orobanche sp., Portulaca sp., Raphanus sp., Senecio sp., Sinapis sp., Stellaria sp., Veronica sp..
Perenni. **4-5 l/ha:** Agropyron repens, Carex sp., Cirsium sp., Euphorbia sp., Glyceria sp., Hipericum sp.,Laersia oryzoides, Phalaris sp., Rumex sp., Sonchus sp., Sorghum halepense. **5-7 l/ha:** Alisma sp., Asfodelus sp., Butomus sp., Cyperus sp., Ferula sp., Juncus sp., Nardus sp., Scirpus sp., Sparganium sp., Tussilago sp. **8-10 l/ha:** Agrostis sp., Allium sp., Artemisia sp., Arundo sp., Cynodon sp., Eracleum sp., Glechoma sp., Oxalis sp., Paspalum sp., Phragmites sp., Pteridium sp., Ranunculus sp., Rubus sp., Tipha sp., Urtica sp. **12 l/ha:** Aristolochia sp., Clematis sp., Convolvulus sp., Rubia peregrina.
Arbusti. **4-6 l/ha:** Acer sp., Fraxinus sp., Genista sp., Salix sp., Sambucus sp., Vaccinum sp.
10-12 l/ha: Calluna sp., Cistus sp., Erica sp., Lonicera sp..

Compatibilità: compatibile con il solfato ammonico.
Fitotossicità: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati.
Attenzione: da usarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.
NON PULIRE IL MATERIALE DI APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE.
EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

Etichetta formato ridotto

GLIPHYT

Erbicida sistemico di post-emergenza. Liquido solubile

COMPOSIZIONE
Glifosate acido puro g 31(=360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico g 41,7)
Acqua e coadiuvanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
EUROPHYTO TSA S.R.L.
Viale V. Emanuele II, n.64 - Bergamo (0363-305786)
OFFICINA DI PRODUZIONE
IRCA Service S.p.A. – Fornovo S.Giovanni (Bg)
TERRANALISI srl Cento (Fe)
DIACHEM spa – U.P. SIFA – Caravaggio (Bg)
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 76-78, 7673 Harboore - Denmark

Registrazione Ministero della Sanità n. 11.182 del 05.02.2002
Contenuto: litri 0,100

Partita n. vedi confezione

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PROMOSOL

Fungicida sistemico - Liquido solubile

COMPOSIZIONE

Propamocarb puro	g 66,6 (= 720 g/l)
Coformulanti	q.b. a g 100

ATTENZIONE. MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
- Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
EUROPHYTO T.S.A. srl
Sede legale: viale V.Emanuele II, n.64 - Bergamo (tel. 0363-305786)
OFFICINA DI PRODUZIONE
I.R.C.A. Service S.P.A - Fornovo S.Giovanni (Bg)
DIACHEM SPA- U.P. Sifa – Caravaggio (Bg)

Registrazione Ministero della Salute n. 11279 del 12/04/02
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100-250-500 litri 1-2-3-5

Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi d pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Si tratta di un fungicida sistemico ad assorbimento prevalentemente radicale. Risulta indicato nella difesa di numerosi agenti patogeni appartenenti alo genere Pythium spp (marciumi e moria delle piantine), Phytophthora spp (marciume del colletto e cancrena pedale), Peronospora spp (peronospora delle crucifere, della cipolla, ecc), Pseudoperonospora cubensis (peronospora delle cucurbitacee), Bremia lactucae (peronospora della lattuga), sulle seguenti colture:
POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, COCOMERO, MELONE, ZUCCA, ZUCCHINO, CETRIOLO, INSALATE (lattuga, cicoria, indivia, radicchio), BIETOLA ROSSA, BIETOLA DA COSTE e DA FOGLIA, CAROTA, RAPA, AGLIO, CIPOLLA, PORRO, CAVOLI, SPINACIO, PREZZEMOLO, BASILICO, SEDANO, TABACCO, FRAGOLA, COLTURE FLOREALI E ORNAMENTALI, PRATI ORNAMENTALI E CAMPI DA GOLF.
Si impiega inoltre nella difesa di **MELO, PERO, AGRUMI e PIANTE FORESTALI** sia in vivaio che nei primi anni dopo la messa a dimora contro gli agenti patogeni causati da Pythium spp, Phytophthora (cactorum, parassitica, cinnamoni). Il prodotto, perfettamente tollerato dalle colture in tutte le fasi di sviluppo, risulta estremamente versatile nell'impiego, potendosi applicare per via fogliare e radicale, in concia al seme o per immersione dei bulbi e piantine o come disinfezione di terricciati e semenzai.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' DI IMPIEGO
Concia dei semi: 1-4 ml/kg per semi di piccole dimensioni (es. tabacco); 10-40 ml/kg per semi leggeri e di elevate dimensioni.
Disinfezione dei terricciati: 300 ml/m^3 di terriccio, diluiti in 20 litri di acqua.
Trattamenti ai semenzai: 8 ml/m^2 di superficie in 4 litri di acqua, ripetendo il trattamento 5 gg prima del trapianto.
Trattamenti in pre-trapianto (bulbi e piantine): immergere in una soluzione allo 0,3 %(300 ml/hl) per 20-30 minuti.
Trattamenti al terreno in pre-trapianto: 8-12 ml/m^2 di superficie in 3-5 litri di acqua.
Trattamenti di post-trapianto: distribuire 200 ml/pianta di una soluzione allo 0,2% (200 ml/hl)
Trattamenti fogliari: 1,5-3 l/ha in 15-20 hl di acqua per ettaro di superficie.
RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE
Lattuga: contro Bremia lactucae eseguire due interventi fogliari alla dose di 2 l/ha, avendo cura di ripetere il trattamento a distanza di 10 gg.
Melone: contro Pseudoperonospora cubensis intervenire alla scopertura dei tunnel alla dose di 2 l/ha ogni 7-10 gg ed in miscela eventualmente a clortalonil.
Garofano e Gerbera : contro Pythium e Phytophthora intervenire 2 gg prima dell'impianto alla dose di 12-15 ml/m^2 in 2-4 litri d'acqua. Successivamente applicare il prodotto per via fogliare alla dose di 200 ml/hl a distanza di 8-10 gg (primi due interventi) e 15-25 gg (interventi successivi).
Vivai di piante forestali : contro Pythium spp e Phytophthora spp nella disinfezione dei terricciati (vedi sopra); dopo la messa a dimora della coltura intervenire ogni 15-18 gg distribuendo 4-5 litri per m^2 di superficie di una soluzione allo 0,2% (200 ml/hl).
Campi da golf e Prati ornamentali in genere: contro Pythium spp interventi fogliari alla dose di 1-1,5 litri per 1000 mq di superficie impiegando almeno 200 litri di acqua. Ripetere gli interventi a distanza di 14 gg con condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia (temperature ed umidità elevate).
AVVERTENZA: i semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati alla alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici e nocivi.
COMPATIBILITA'
Il prodotto é compatibile con formulati a base di benzimidazolici, clortalonil, captano, TMTD, mancozeb, folpet e rameici.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Impedire l'accesso agli animali domestici nelle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACUQA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Etichetta formato ridotto

PROMOSOL

Fungicida sistemico - Liquido solubile

COMPOSIZIONE

Propamocarb puro	g 66,6 (= 720 g/l)
Coformulanti	q.b. a g 100

ATTENZIONE, MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA

- Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
EUROPHYTO T.S.A. srl
Sede legale: viale V.Emanuele II, n.64 - Bergamo (tel. 0363-305786)
OFFICINA DI PRODUZIONE
I.R.C.A. Service S.P.A - Fornovo S.Giovanni (Bg)
DIACHEM SPA- U.P. Sifa – Caravaggio (Bg)

Registrazione Ministero della Salute n. 11279 del 12/04/02
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100

Partita N.

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

BRIONFLO SC

Fungicida organico ad ampio spettro d'azione
Sospensione concentrata

Pericoloso per l'ambiente

COMPOSIZIONE
Bitertanolo puro g 45,5 (= 500 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non gettare i residui nelle fognature - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
EUROPHYTO T.S.A. srl (0363-305786)
Sede legale: viale V.Emanuele II, n.64 - 24121 Bergamo
OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. – U.P. SIFA Caravaggio (Bg)
IRCA SERVICE SPA – Fornovo S.Giovanni (Bg)
TERRANALISI srl Cento (Fe)
Registrazione Ministero della Salute n.11323 del 09/05/2002
Contenuto netto: litri 0,100-0,250 -0,500-1-2-3-5-10-20
Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
CARATTERISTICHE
Brionflo sc è un fungicida organico ad ampio spettro d'azione, dotato di rapida penetrazione e diffusione locale attraverso i tessuti vegetali (locosistemicità). Presenta azione preventiva, curativa ed eradicante. Si impiega nella difesa dalla ticchiolatura delle pomacee (collaterale azione contro l'oidio), contro monilia e oidio delle drupacee, cancri rameali, cercospora della barbabietola da zucchero, ruggini e mal bianco, ticchiolatura delle colture orticole, floreali e ornamentali.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Pomacee (melo e pero): in miscela ai tradizionali fungicidi antiticchiolatura(es. propineb, captano, mancozeb) alla dose di 30-40 ml/hl ad intervalli di 7-8 giorni a partire dalla fase di apertura gemme fino alla fase di frutto-noce con;intervenire ogni 8-12 giorni nelle fasi successive in funzione dell'andamento climatico.Impiegare le dosi più elevate in presenza di condizioni particolarmente favorevoli all'insorgere della malattia. Per interventi curativi ed eradicanti aumentare la dose a 40-50 ml/hl eseguendo 1-2 interventi ravvicinati .
Pesco-percoche-nettarine, Susino, Ciliegio, Albicocco:
- contro monilia alla dose di 50-60 ml/hl, eseguendo 2-3 trattamenti tra pre e post-fioritura. Successivamente ripetere le applicazioni a distanza di 6-8 giorni all'eventuale manifestarsi dei primi sintomi della malattia.
- contro oidio intervenire preventivamente dalla fase di scamiciatura dei frutti alla dose di 30 ml/hl e ad intervalli di 7-10 giorni; con infezioni in atto aumentare la dose a 40 ml/hl.
- contro cancri rameali (Fusicocco) alla dose di 50-60 ml/hl eseguendo tre interventi nella fase di: a)caduta foglie - b) bottoni rosa - c)accrescimento frutticini

Orticole (cetriolo, zucchino): contro ruggini e mal bianco
- alla dose di 30-40 ml/hl in interventi *preventivi*
- 40-50 ml/hl al primo manifestarsi dell'infezione, ripetendo il trattamento 2-3 volte a distanza di 7-8 giorni (interventi *curativi*).

Barbabietola da zucchero: contro cercospora ed oidio alla dose di 0,6-1 l/ha in 600 litri di acqua; eseguire 2-4 interventi a distanza di 20 giorni ad iniziare dalla prima comparsa dei sintomi.
Colture floreali e ornamentali (serra e pieno campo): contro ruggini e oidio della rosa e di altre piante ornamentali e da fiore alla dose di 40-50 **ml/hl** in trattamenti preventivi: 50-80 ml/hl in trattamenti curativi.
n.b.: dosi riferite con l'impiego di pompe a volume normale.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

COMPATIBILITA'
Il prodotto risulta miscibile con fungicidi ed insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Impedire l'accesso agli animali domestici nelle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Pomacee, Pesco-percoche-nettarine, Susino, Ciliegio, Albicocco : 21 gg
Cetriolo, Zucchino: 14 gg
Barbabietola da zucchero: 20 gg

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

BRIONFLO SC

Fungicida organico ad ampio spettro d'azione
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE

Bitertanolo puro	g 45,5 (= 500 g/l)
Coformulanti	q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

EUROPHYTO T.S.A. srl
Sede legale: viale V.Emanuele II, n.64 - 24121 Bergamo

OFFICINA DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A. – U.P. SIFA Caravaggio (Bg)
IRCA SERVICE SPA – Fornovo S.Giovanni (Bg)
TERRANALISI srl – Cento (Fe)

Registrazione Ministero della Salute n.11323 del 09/05/2002

Distribuito da:

Compo Agricoltura SpA – via Marconato, 8 20031 Cesano Maderno (Mi)
Sepran sas – via Brenta,20 Isola Vicentina (Vi)

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 10 - 20 - 25 - 50 - 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

VIRENS SC

Acaricida
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
Clofentezine puro g 42 (500 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termini effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
EUROPHYTO T.S.A. srl (tel. 0363-305786)
Sede legale: viale V. Emanuele II, n.64 – 24121 Bergamo
OFFICINA DI PRODUZIONE
IRCA SERVICE SPA – Fornovo S.Giovanni (Bg)
DIACHEM S.P.A. – U.P. SIFA Caravaggio (Bg)
TERRANALISI srl – Cento (Fe)

Registrazione Ministero della Salute n. 11324 del 09/05/2002
Quantità netta del preparato: **ml 100-250-500 litri 1-2-3**

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Virens SC è un acaricida ad azione di contatto che agisce sulle uova invernali ed estive degli acari tetranichidi quali Panonychus ulmi, Panonychus citri, Tetranychus urticae ed Eotetranychus carpini, risultando efficace anche nei primi stadi di sviluppo (larve e protoninfe). E' dotato di elevata selettività nei confronti dell'entomofauna utile e risulta selettivo verso gli stessi acari predatori (Fitoseidi). Presenta un'elevata persistenza d'azione che ne permette la riduzione del numero degli interventi rispetto ai più tradizionali preparati acaricidi.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Il prodotto può essere distribuito anche con attrezzature a volume ridotto purché non inferiori a 500 l/ha con una dose di almeno di 400 ml/ha di formulato sulle uova invernali e 500 ml/ha in piena vegetazione. Nei trattamenti in presenza di stadi di sviluppo diversi degli acari si consiglia l'associazione ad un prodotto adulticida. Evitare di intervenire in condizioni di bassa umidità relativa ed elevate temperature.
Si impiega sulle colture seguenti:
AGRUMI (arancio, clementino, mandarino, pompelmo, limone, bergamotto): nelle fasi iniziali dell'infestazione alla dose di 30 ml/hl in associazione ad un adulticida contro Panonychus citri; in presenza di Tetranychus urticae aumentare la dose a 40 ml/hl sempre in associazione ad un adulticida.
FRUTTIFERI (melo, pero, susino)
- uova invernali di Panonychus ulmi alla dose di 40 ml/hl intervenendo 10-15 giorni prima della schiusura delle stesse (es. non oltre la fase di orecchiette di topo sulle pomacee). E' consigliabile l'aggiunta di olio bianco.
- forme mobili (ragno rosso): ala dose di 30 ml/hl + adulticida in post-fioritura o al primo apparire dell'infestazione (1-3 acari x foglia). In caso di reinfestazione estiva intervenire sempre in associazione a prodotto adulticida.
VITE (solo da vino): su germogli giovani (5-30 cm) intervenire alla dose di 20-25 ml/hl in associazione a prodotto adulticida se in presenza di forme mobili di Panonychus ulmi. Nel caso di attacchi più tardivi (ragno rosso e giallo) applicare il prodotto tempestivamente. Contro Eotetranychus carpini impiegare una dose leggermente superiore (25-30 ml/hl).
FRAGOLA, COLTURE ORTICOLE (melone, pomodoro) , COLTURE FLOREALI E ORNAMENTALI in serra e pieno campo: contro Tetranychus urticae prima della fioritura alla dose di 40 ml/hl in associazione ad un adulticida; interventi precoci alla dose di 50-60 ml/hl consentono di impedire la comparsa della reinfestazione.

COMPATIBILITA': il prodotto è miscibile con olio bianco e rame ossicloruro; si sconsigliano miscele con formulati a reazione alcalina quali poltiglie bordolesi e polisolfuri. Una precedente applicazione di polisolfuri non riduce comunque l'efficacia del prodotto sulle uova invernali di P.ulmi.
FITOTOSSICITA': eseguire saggi preliminari in presenza di varietà poco note o di recente introduzione.
AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA:
- Pomodoro, Melone, Fragola : 15 giorni
- Agrumi, Susino, Vite da vino, Melo e Pero: 30 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. NON OPERARE CONTRO VENTO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.
NON PULIRE IL MATERIALE DI APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Etichetta formato ridotto

VIRENS SC

Acaricida
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
Clofentezine puro g 42 (500 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termini effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
EUROPHYTO T.S.A. srl (tel. 0363-305786)
Sede legale: viale V. Emanuele II, n.64 – 24121 Bergamo
OFFICINA DI PRODUZIONE
IRCA SERVICE SPA Fornovo S.Giovanni (Bg)
DIACHEM S.P.A. – U.P. SIFA Caravaggio (Bg)
TERRANALISI srl – Cento (Fe)

Registrazione Ministero della Salute n. 11324 del 09/05/2002
Quantità netta del preparato: ml 100

Partita n.

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

OXADION

Diserbante selettivo a base di Oxadiazon
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
Oxadiazon puro g 35,2 (= 380 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
- Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non gettare i residui nelle fognature – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
EUROPHYTO T.S.A. srl
Sede legale: viale V. Emanuele II, n.64 - Bergamo (tel. 0363-305786)
Officina di produzione
I.R.C.A. Service S.P.A - 24040 Fornovo S.Giovanni (Bg)
DIACHEM SPA – U.P SIFA Caravaggio (Bg)
TERRANALISI SRL – Cento (FE)
Registrazione Ministero della Salute n. 11325 del 09/05/2002
Quantità netta del preparato: ml 100-250-500 litri 1-2-3-5-10

Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Erbicida selettivo ad ampio spettro di azione, trova impiego per il controllo delle seguenti infestanti mono e dicotiledoni: Heteranthera spp. (Eterantere), Alisma plantago (Cucchiaio), Scirpus mucronatus (Quadrettone), Echinochloa spp (Giavoni), Digitaria sanguinalis (Sanguinella), Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Amaranthus retroflexus (Amaranto), Atriplex patula (Atriplice maggiore), Butomus umbellatus (Giunco fiorito), Capsella bursa pastoris (Borsa pastore), Chenopodium album (Farinaccio selvatico), Convolvolus arvensis (Vilucchio), Fallopia convolvulus (Convolvolo nero), Datura stramonium (Stramonio), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Papaver rhoeas (Papavero), Polygonum aviculare (Correggiola), Polygonum persicaria (Persicaria), Portulaca oleracea (Erba porcellana), Solanum nigrum (Erba morella).

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
RISO: 0,7-1,3 l/ha per il controllo delle eterantere e di nascite precoci di giavone, Alisma da seme e Butomus umbellatus. Applicare in pre-semina su risaia asciutta e livellata. Il prodotto può essere inoltre utilizzato anche su risaia allagata (dopo la slottatura) mantenendo un livello di 10-12 cm di acqua. Dopo l'applicazione attendere 48 ore prima di procedere alla semina; mantenere un moderato livello di acqua (10-12 cm) nelle prima fasi vegetative del riso.
Riso coltivato in asciutta: 1,5 - 2 l/ha subito dopo la semina, in pre-emergenza della coltura e delle infestanti.
SOIA e GIRASOLE: 1,4 - 1,7 l/ha in pre-emergenza della coltura e delle infestanti. Intervenire su terreno ben livellato, eseguendo una eventuale irrigazione dopo 10-12 giorni in caso di mancate piogge.
AGLIO e FINOCCHIO : 1-2 l/ha in pre-emergenza delle colture e delle infestanti.
COLTURE TRAPIANTATE di Pomodoro, Peperone, Melanzana, Tabacco, Cicoria, Indivia, Lattuga, Finocchio, Cavolfiore: 1-2 l/ha prima del trapianto e dell'emergenza delle infestanti.
ASPARAGO: in post-impianto dopo la rincalzatura e con zampe ben ricoperte alla dose di 2,5 l/ha. Su asparagiaie in produzione per la lotta contro vilucchio, intervenire prima dell'emergenza dei turrioni o dopo la completa raccolta degli stessi alla dose di 5-6,5 l/ha.
CARCIOFO: in post-trapianto alla dose di 5-6,5 l/ha per la lotta contro Oxalis spp., intervenendo in pre-emergenza delle infestanti. Evitare di colpire l'apparato vegetativo della coltura.
ACTINIDIA, ALBICOCCO, ARANCIO, CLEMENTINO, LIMONE, MANDARINO, MELO, NOCCIOLO, OLIVO, PERO, PESCO, PIOPPO, SUSINO, VITE:
- **vivai**: 5-6,5 l/ha, dopo la messa a dimora e prima della ripresa vegetativa. Non intervenire su vivai di vite, piante madri e barbatelle da poco a dimora;
- **impianti in produzione**: 2,5 l/ha su infestanti annuali e sino a 6,5 l/ha nella lotta contro il vilucchio. Intervenire a fine inverno, prima del risveglio vegetativo.
Su tutte le colture evitare di colpire la vegetazione presente o parti non perfettamente lignificate. In tutte le applicazioni distribuire il prodotto con 500-600 litri/ha di acqua.
ARGINI DI FOSSI E SCOLINE, SEDI FERROVIARIE, BORDI STRADALI, AREE INCOLTE ED INDUSTRIALI: 4-6,5 l/ha in associazione a erbicida totale sistemico
GAROFANO: 1,5 - 2 l/ha in pre-emergenza delle infestanti dopo l'impianto della coltura o immediatamente dopo la sarchiatura
TAPPETI ERBOSI DI GRAMINACEE: 1- 2 l/ha in trattamenti primaverili.
In tutte le applicazioni distribuire il prodotto con 500-700 litri/ha di acqua.

COMPATIBILITA'
Miscibile con la generalità degli erbicidi impiegati sulle colture sopra indicate (es. Pendimetalin, Tiobencarb, Molinate, Tiocarbazil, Bensulfuron metile, Metamitron, Metribuzin, Aclonifen, Glifosate)
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci.
ATTENZIONE: il formulato contiene una sostanza attiva altamente tossica per gli organismi acquatici.
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
NON OPERARE CONTRO VENTO. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE.
EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

Etichetta formato ridotto

OXADION

Diserbante selettivo a base di Oxadiazon
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
Oxadiazon puro g 35,2 (= 380 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
- Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non gettare i residui nelle fognature – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
EUROPHYTO T.S.A. srl
Sede legale: viale V. Emanuele II, n.64 - Bergamo (tel. 0363-305786)
Officina di produzione
I.R.C.A. Service S.P.A - 24040 Fornovo S.Giovanni (Bg)
DIACHEM SPA – U.P SIFA Caravaggio (Bg)
TERRANALISI SRL – Cento (FE)
Registrazione Ministero della Salute n. 11325 del 09/05/2002
Quantità netta del preparato: m 100

Partita N

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

MESOCOR

Diserbante selettivo a base di metribuzin
Granuli idrodispersibili

Pericoloso per l'ambiente

COMPOSIZIONE
Metribuzin puro g 35
Coformulanti q.b. a g 100
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
EUROPHYTO T.S.A. srl (0363-305786)
Sede legale: viale V. Emanuele II, n.64 - Bergamo
Registrazione Ministero della Salute: **n. 11326 del 09/05/2002**
OFFICINA DI PRODUZIONE
S.T.I. Solfotecnica Italiana SpA - Stabilimento di Cotignola (Ra)
ADICA SRL – Stabilimento di Nera Montoro (Tr)
SULPHUR MILLS LIMITED- stabilimento di Gujarat, Dist. Bharuch (India)
FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 500 - kg 1- kg 5 **Partita n.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
Erbicida selettivo sistemico ad assorbimento radicale e fogliare, viene utilizzato per il diserbo di patata, pomodoro, asparago, frumento, orzo, soia ed erba medica. Risulta efficace sulle seguenti infestanti già nate o in fase di germinazione:
graminacee: Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Apera spica venti (Agrostide annuale) Lolium multiflorum (Loietto), Poa annua (Fienarola comune)
dicotiledoni: Amaranthus retroflexus (Amaranto), Anagallis arvensis (Anagallide), Capsella bursa-pastoris (Borsa pastore), Centaurea cyanus (Fiordaliso), Chenopodium album (Farinaccio), Chenopodium spp., Fumaria officinalis (Fumaria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Lamium purpureum (Falsa ortica) Matricaria chamomilla (Camomilla), Mercurialis annua (Mercurella), Myagrum perfoliatum (Miagro) Papaver rhoeas (Papavero), Polygonum spp., Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Stellaria media (Centocchio), Veronica arvensis (Veronica).
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
PATATA: - pre-emergenza alla dose di 0,5-0,8 kg/ha in 500-700 litri di acqua per ettaro
- post-emergenza alla dose di 0,5-0,6 kg/ha
Dose maggiore nei terreni più argillosi; evitare l'impiego nei terreni sabbiosi.
Risulta selettivo sulle seguenti varietà: Admirandus, Alkamaria, Apollo, Arsy, Bea, Bintje, Cardinal, Desirée, Favorita, Humalda, Kennebec, Majestic, Monnalisa, Primura, Resj, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal. Se ne sconsiglia l'impiego su Draga, Jarla, Vivax.
POMODORO: - pre-semina o pre-trapianto (7-14 gg prima) su terreno preparato e senza interrare alla dose di 0,5-0,6 kg/ha
- post-emergenza o post-trapianto con coltura ad almeno 8-9 foglie e comunque dopo il superamento della crisi di trapianto alla dose di 0,5-0,8 kg/ha
ASPARAGO: - pre-emergenza dei turioni alla dose di 1-1,2 kg/ha e su impianti di almeno 2 anni
ERBA MEDICA: - in autunno-inverno e con coltura in pieno riposo vegetativo alla dose di 1 –1,5 kg/ha; impiegare la dose minore su terreni sabbiosi.
SOIA: - pre-semina o pre-emergenza alla dose di 0.5 - 0,7 kg/ha. Evitare l'impiego nei terreni sabbiosi o torbosi.
FRUMENTO E ORZO: - dallo stadio di 2 foglie vere a fine accestimento alla dose di 0,2 kg/ha .
In tutte le applicazioni impiegare il prodotto alla dose indicata con 500-700 litri di acqua per ettaro.

COMPATIBILITA'
Compatibile con numerosi erbicidi in grado di ampliarne lo spettro di azione quali 2,4 D, MCPA, tralkoxydim, fenoxaprop-etile, tribenuron-metile, rimsulfuron, triasulfuron.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: - 60 giorni
- 30 giorni: pomodoro, frumento e orzo
Il formulato contiene una sostanza nociva per gli organismi acquatici. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate.
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO - NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUÒ' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. (NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE STRADE)

TRILOGY 200 EC

Fungicida organico per la difesa da ruggini e oidio

Emulsione concentrata

COMPOSIZIONE
Triadimenol puro g 18,65 (=200 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
(contiene N-metil-pirrolidone)
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
EUROPHYTO T.S.A. srl (tel. 0363-305786)
Sede legale: viale V. Emanuele II, n.64 – Bergamo

IRRITANTE

OFFICINA DI PRODUZIONE
IRCA Service S.P.A. - S.S. Cremasca 591, n. 10 Fornovo S.Giovanni (Bg)
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA di Caravaggio (Bg)
STI Solfotecnica Italiana SPA – Stabilimento di Torrenieri (fraz. Montalcino – SI)
FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Registrazione Ministero della Salute n. 11395 del 17/07/02
Quantità netta del preparato: litri 0,100 - 0,250 - 0,500 - 1 - 3 - 5

Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi. Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti entematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità acuta solo per assorbimento ad alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immuno allergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione, la sostanza é prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia. sintomatica.
Consultare un centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Trilogy 200 EC é un fungicida organico dotato di eccellente attività preventiva, curativa ed eradicante nei confronti di oidio e ruggini. Risulta velocemente assorbito e traslocato principalmente per via acropeta.
Trilogy 200 EC agisce anche sottoforma di vapore.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti con pompe a volume normale. Si raccomanda di utilizzare un quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione. Applicare il dosaggio più elevato in presenza di varietà particolarmente sensibili alla malattia, in zone soggette ad attacchi di oidio e con intervalli superiori a 10 giorni.
MELO: contro l'oidio alla dose di 15-20 ml per 100 litri d'acqua
VITE: contro l'oidio
- Uva da vino: alla dose di 15-20 ml per 100 litri d'acqua intervenendo ogni 12-14 giorni
- Uva da tavola: alla dose di 15-20 ml per 100 litri d'acqua intervenendo ogni 10-12 giorni

In caso di forte pressione della malattia o di interventi di tipo curativo usare la dose maggiore, eseguendo 2-3 trattamenti a distanza di 7-10 giorni.
COLTURE ORTICOLE (pomodoro, peperone, cetriolo, melone, zucchino): contro l'oidio alla dose di 15-25 ml per 100 litri d'acqua intervenendo ogni 7-10 giorni.
CEREALI(frumento, orzo, avena, segale, triticale): contro ruggini e mal bianco alla dose di 0,5-0,6 litri per ettaro in 600-800 litri d'acqua, intervenendo preventivamente dalla fase di spigatura alla fase di fioritura o all'apparire dei primi sintomi della malattia.
ORNAMENTALI : contro l'oidio alla dose di 15-25 ml per 100 litri d'acqua.

COMPATIBILITA': il prodotto risulta compatibile con fungicidi ed insetticidi a reazione neutra.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo: Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA:

Melo, Vite	14 gg
Pomodoro, Peperone, Cetriolo, Melone	14 gg
Zucchino	7 gg
Cereali (frumento, orzo, avena, segale, triticale)	30 gg

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Etichetta formato ridotto

TRILOGY 200 EC

Fungicida organico per la difesa da ruggini e oidio
Emulsione concentrata

COMPOSIZIONE
Triadimenol puro g 18.65 (=200 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
(contiene N-metil-pirrolidone)
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
EUROPHYTO T.S.A. srl (tel. 0363-305786)
Sede legale: viale V. Emanuele II, n.64 Bergamo

IRRITANTE

OFFICINA DI PRODUZIONE
IRCA Service S.P.A. - S.S. Cremasca 591, n. 10 – Fornovo S.Giovanni (Bg)
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA di Caravaggio (Bg)
STI Solfotecnica Italiana SPA – Stabilimento di Torrenieri (fraz. Montalcino – SI)
FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Registrazione Ministero della Salute n. 11395 del 17/07/02
Quantità netta del preparato: litri 0,100

Partita N.

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

LOGAL 24 EC

Diserbante selettivo a base di Oxifluorfen
Emulsione concentrata

COMPOSIZIONE
Oxifluorfen puro g 22 (=250 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE **Pericoloso per l'ambiente**
EUROPHYTO T.S.A srl
Sede legale: viale V. Emanuele II, n.64 - Bergamo (0363-305786)
OFFICINA DI PRODUZIONE
I.R.C.A. Service S.P.A. - S.S. Cremasca 591, n°10 Fornovo S.Giovanni (Bg)
DIACHEM S.P.A. – U.P. SIFA – S.S.Padana Superiore km 185,8 Caravaggio (Bg)

Registrazione Ministero della Salute n. 11491 del 22.10.02
Quantità netta del preparato: litri 0,25- 0,5 - 1 - 3 - 5
FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. **Partita N.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Irritante per la cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito,cefalea, ipertemia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC. Vertigini. atassia, iporeflessia. nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: doloenzia, rigidità, fascicolazione; gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica: ospedalizzare. **Avvertenza: consultare un centro antiveleni.**
CARATTERISTICHE
Erbicida selettivo, agisce per contatto fogliare e per assorbimento da parte dei germinelli. L'efficacia del prodotto è massima nel periodo autunno-primaverile sulle seguenti infestanti graminacee e dicotiledoni:
graminacee: Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Apera spica- venti (Agrostide annuale) Lolium multiflorum (Loietto), Poa annua (Fienarola comune), Setaria spp (Panicastrella/Falso panico), Sorghum halepense da seme (Sorghetta)
dicotiledoni: Amaranthus retroflexus (Amaranto), Anagallis arvensis (Anagallide), Capsella bursa-pastoris (Borsa pastore), Chenopodium album (Farinaccio), Datura stramonium (Stramonio), Diplotaxis spp (Ruchetta), Fallopia convolvolus (Convolvolo nero), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Geranium dissectum (Geranio a foglie divise),
Lamium purpureum (Falsa ortica), Matricaria camomilla (Camomilla), Oxalis spp(Acetosella), Mercurialis annua (Mercurella). Myagrum perfoliatum (Miagro) Papaver rhoeas (Papavero), Picris echioides (Asparaggine), Polygonum spp., Portulaca oleracea (Erba porcellana) Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Rapistrum rugosum (Rapistro), Rumex spp (Romici), Sinapis arvensis (Senape selvatica). Solanum nigrum (Erba morella), Sonchus spp (Crespino), Veronica arvensis (Veronica).

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Si raccomanda un'adeguata bagnatura del terreno e della vegetazione infestante, avendo cura di adottare volumi d'acqua compresi tra 3 e 10 hl per ettaro di superficie.
AGRUMI (Arancio, Limone, Pompelmo), POMACEE, DRUPACEE, VITE, NOCCIOLO, MANDORLO:
- in pre-emergenza delle infestanti(con prevalenza di specie annuali) alla dose di 2-2,5 l/ha su terreno pulito (es. dopo una lavorazione) o nelle prime fasi di germinazione delle stesse.
- in post-emergenza delle infestanti alla dose di 2-2,5 l/ha in miscela a dosi ridotte di disseccanti dipiridilici (es. diquat/paraquat) o dalapon; con preponderanza di infestanti graminacee poliennali quali gramigna e agrostide, si consiglia di applicare il prodotto su infestanti in attiva crescita ed in miscela a dalapon (Logal 24 EC 2,5 l/ha + dalapon 5 kg/ha).
Per assicurare un controllo completo delle infestanti si consigliano due trattamenti l'anno, intervenendo:
a) durante la fase di riposo vegetativo b) dopo l'allegagione o la prima cascola.
CAVOLI (solo colture trapiantate di cavolo e cavolfiore): 1,5-2 l/ha su terreno preparato e almeno 1 giorno prima della messa a dimora delle piantine. Si raccomanda l'utilizzo di piantine ben sviluppate ed in buono stato vegetativo.
CIPOLLA, AGLIO:
- alla dose di 0,7-1 l/ha in pre-emergenza della coltura (solo aglio)
- alla dose di 0,7-1 l/ha in post-emergenza (aglio e cipolla), intervenendo allo stadio di 2-4 foglie della coltura e con infestanti nella fase di pre-emergenza o nei primissimi stadi di sviluppo.
GIRASOLE: in pre-emergenza della coltura alla dose di 1 l/ha
CARCIOFO:
- in pre-emergenza della coltura alla dose di 1-1,5 l/ha
- in post-emergenza della coltura nell'interfila alla dose di 1,5-2 l/ha, con eventuale aggiunta di paraquat (1-1,5 l/ha), nelle primissime fasi di sviluppo di Oxalis spp. Si raccomanda adeguata schermatura della coltura.
VIVAI DI PIANTE FORESTALI E ORNAMENTALI, TALEAI E PIANTONAI DI PIOPPO ED EUCALIPTO: prima dell'emergenza delle infestanti alla dose di 2-2,5 l/ha in 400-800 litri di acqua per ettaro di superficie. Su pioppo ed eucalipto intervenire a fine inverno e prima della ripresa vegetativa.Nella lotta al convolvolo intervenire alla fioritura e sui ricacci (lunghezza 40-50 cm).
AREE CIVILI ED INDUSTRIALI, BORDI STRADALI, ARGINI: in pre-emergenza delle infestanti alla dose di 3-4 l/ha anche in miscela con prodotti disseccanti.

FITOTOSSICITA': su colture di cavolo, cavolfiore e girasole possono manifestarsi transitori sintomi di fitotossicità.
COMPATIBILITA': compatibile con paraquat, diquat e dalapon
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI. BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.
NON PULIRE IL MATERIALE DI APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

proposta di etichetta adeguata ad usi essenziali

HETRIS 50

)iserbante selettivo per risaia

:mulsione concentrata

IRRITANTE **Pericoloso per l'ambiente**

:OMPOSIZIONE

'retilaclor puro g 46.7 (=500 g/l)

;oformulanti q.b. a g 100

'ITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

:UROPHYTO T.S.A. srl

;ede legale: viale V. Emanuele II, n.64 - Bergamo (tel. 0363-305786)

)FFICINA DI PRODUZIONE

R.C.A. Service S.P.A. - S.S. Cremasca 591, n°10

'4040 Fornovo S.Giovanni (Bg)

Registrazione Ministero della Salute n. 11492 del 22.10.2002

)uantità netta del preparato: **litri 0,5 - 1 - 3 - 5- 10 - 20**

'RASI DI RISCHIO

'ritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente ɔssico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termini effetti negativi per ambiente acquatico.

:ONSIGLI DI PRUDENZA

:onservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e a bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui elle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare nmediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il uo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere ell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

'ARTITA N.

ORMAZIONI PER IL MEDICO

:omi: i sintomi osservati sono aspecifici e osservati nei ratti in condizioni di laboratorio: azione, dispnea, esoftalmo, posizione curva, pelo arruffato.

apia sintomatica: Non si conosce l'artidoto specifico.

ertenze: consultare un centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Hetris 50 è un erbicida indicato per il diserbo di pre-semina e post-emergenza del riso. Risulta efficace sulle seguenti infestanti annuali in fase di germinazione o nei primi stadi di sviluppo: Alisma spp(Cucchiaio), Cyperus difformis (Cipero), Giavoni (Echinochloa spp), Scirpus mucronatus (Quadrettone), Heteranthera limosa (Eterantera blu), Heteranthera reniformis (Eterantera bianca), Eleocharis spp (Giunchine) ; utilizzato in pre-semina esercità attività di contenimento sul riso crodo.

Esrcita inoltre azione preventiva nei confronti delle Alghe (Cyanophiceae).

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Pre-semina: per il controllo di riso crodo, intervenire 28-30 giorni prima della semina alla dose di 2–2,5 l/ha; trattare con risaia sommersa, mantenendo la sommersione sino all'epoca di semina.

Post-emergenza: per il controllo di cucchiaio(Alisma plantago), quadrettone(Scirpus mucronatus) e cipero(Cyperus difformis) intervenire alla dose di 2 l/ha alla 2°-3° foglia del riso; mantenere l'acqua ferma per 4-5 giorni.

In presenza di giavoni con 2 o più foglie, è consigliabile aggiungere dose ridotta di uno specifico giavonicida. Impiegare volumi d'acqua di 300-400 litri per ettaro di superficie.

COMPATIBILITA': compatibile con i più comuni erbicidi da risaia quali propanil, molinate e graminicidi specifici.

Avvertenze

Negli interventi di pre-semina, prevedere un'asciutta di radicamento.

in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.
NON PULIRE IL MATERIALE DI APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE.
EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

CUPRON U.L.D.

Fungicida cuprico a basso dosaggio d'impiego
Liquido solubile

COMPOSIZIONE
Rame metallo g 5,5 (=60 g/l)
(sottoforma di solfato pentaidrato)
Coformulanti q.b. a g 100

Irritante **Pericoloso per l'ambiente**

Titolare dell'autorizzazione: EUROPHYTO T.S.A. srl
Sede legale: viale V. Emanuele II, n.64 - Bergamo
Officina di produzione: I.R.C.A. Service S.P.A. - S.S. Cremasca 591, n°10
24040 Fornovo S.Giovanni (Bg)

Registrazione Ministero della Salute n. 11493 del 22/10/2002

Quantità netta del preparato: litri 0,100 - 0,250 - 0,500 - 1 - 3 - 5

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo.
Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia:gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenze: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Cupron ULD è un fungicida a base rameica che per le particolari caratteristiche formulative manifesta efficacia a ridotti dosaggi d'impiego. Tale peculiarità permette di ridurre drasticamente gli apporti in rame metallo sulla coltura abbassando, conseguentemente, l'impatto sull'ambiente.
Cupron ULD è dotato di elevata selettività anche negli impieghi più delicati e presenta collaterale attività biostimolante.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Intervenire in funzione preventiva cadenzando i trattamenti ogni 6-8 giorni e secondo i classici calendari di trattamento alle dosi riportate di seguito:
VITE:contro Peronospora della vite (Plasmopora viticola) alla dose di 100-150 ml/hl.
MELO, PERO: contro Ticchiolatura (Venturia spp) e Maculatura bruna(Alternaria spp) alla dose di 150 ml/hl.
POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, PATATA, FAGIOLO, PISELLO, SPINACIO, LATTUGHE e simili, CARCIOFO, MELONE, ANGURIA, CETRIOLO, SEDANO, FINOCCHIO, CAROTA, CIPOLLA, AGLIO, CAVOLI, CAVOLFIORE : contro Peronospora (Phytophthora spp, Peronospora spp) alla dose di 150 ml/hl (dosi riferite a volumi pari a 600 litri di acqua per ettaro).

COMPATIBILITA': Il prodotto si impiega da solo.
FITOTOSSICITA': non trattare in fioritura, non intervenire su colture sotto stress.
Al fine di evitare la rapida evaporazione del prodotto e quindi la riduzione di efficacia del trattamento, non applicare nelle ore più calde della giornata.
NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.
NON PULIRE IL MATERIALE DI APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE.
EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

LIRON

Erbicida avenicida/graminicida
Concentrato emulsionabile

Irritante

Pericoloso per l'ambiente

COMPOSIZIONE
Diclofop-metile puro g 26 (= 291 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
EUROPHYTO T.S.A. srl
Sede legale: viale V. Emanuele II, n.64
Bergamo (0363-305786)

OFFICINA DI PRODUZIONE
Irca Service S.p.A. S.S. Cremasca 591,n.10 – Forrovo S.Giovanni (Bg)
Diachem S.p.A.–U.P. SIFA S.S. Padana Superiore km 185 – Caravaggio (Bg)
S.T.I. Solfotecnica S.p.A.- Stabilimento di Torrenieri – fraz. Montalcino(Si)

Registrazione Ministero della Salute n. 11524 del 06/12/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 1 - 2- 3 - 5 - 10

Partita N.

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti e mangimi o da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per la cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni, ECG. Muscoli:dolenzia, rigidità, fascicolazione; gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito.
Consultare un Centro Antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Conservare la confezione ben chiusa .

CARATTERISTICHE
LIRON è un erbicida di post-emergenza ad azione avenicida/graminicida selettivo su colture di **frumento, orzo**, **barbabietola da zucchero, patata, cipolla, carota, cavoli, lattuga, spinacio, pisello, fagiolo e fava**.
Ne viene indicato l'impiego per il controllo delle seguenti infestanti: Avena spp.(Avena), Echinochloa crus-galli (Giavone comune), Lolium multiflorum(Loglio italico), Phalaris spp.(Falaridi), Setaria spp.(Pabbio), Alopecurus myosuroides(Coda di volpe), Digitaria sanguinalis(Sanguinella comune).
Agisce per via fogliare e risulta rapidamente assorbito dalla vegetazione delle infestanti. Le infestanti sensibili manifestano, entro 5-10 giorni dal trattamento, ingiallimenti e necrosi fogliari che portano al disseccamento completo delle stesse nell'arco di 15-20 giorni.
MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Distribuire il prodotto in 200-300 litri di acqua per ettaro di superficie.
Ad esclusione dell'orzo, dove si utilizza entro la fase di accestimento, l'applicazione del prodotto può essere eseguita in qualsiasi stadio di sviluppo della coltura e alle dosi seguenti:
Frumento, orzo: 2-3 l/ha
Barbabietola da zucchero: 2.5-3.5 l/ha
Patata, Cipolla: 2.5-3 l/ha
Carota, Cavoli, Lattuga, Spinacio: 2.5-3 l/ha
Pisello, Fagiolo, Fava: 2.5-3 l/ha
La migliore azione erbicida si ottiene intervenendo precocemente sulle infestanti e comunque non oltre gli stadi seguenti:

- Avena spp.: da 2ª foglia fino ad accestimento
- Phalaris spp.: da 2ª foglia fino ad inizio accestimento delle infestanti più sviluppate
- Lolium spp.: da 2ª foglia a 1° nodo
- Setaria spp.: fino a tutto l'accestimento
- Alopecurus myosuroides: sino a prima dell'accestimento
- Echinochloa crus-galli: fino a tutto l'accestimento
- Digitaria sanguinalis: fino a tutto l'accestimento

COMPATIBILITA'
Miscibile con erbicidi ad azione dicotiledonicida quali ioxinil e bromoxinil; si sconsigliano invece miscele con ormonici quali 2,4 D o MCPA; miscele con erbicidi ormonici possono ridurre l'efficacia graminicida del prodotto, specie in condizioni di siccità.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi, ecc. Evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.
INTERVALLO DI SICUREZZA:- Cipolla e patata: **60 giorni**
- Carota, cavoli, lattuga, spinacio, fagiolo, pisello, fava: **30 giorni**

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.
NON PULIRE IL MATERIALE DI APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE.
EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

Etichetta/foglio illustrativo

CYROM 75 WP

Insetticida sistemico a base di ciromazina
Polvere bagnabile

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
Ciromazina pura g 75
Coformulanti q.b. a g 100

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
EUROPHYTO T.S.A. srl - viale V. Emanuele II, n.64 - Bergamo
OFFICINA DI PRODUZIONE
SINAPAK s.n.c. V.le dell'Industria e dell'Artigianato,7 - 27049 Stradella (Pv)
ADICA srl – Stabilimento di Faenza (Ra)
Registrazione Ministero della Salute n. 11537 del 16.01.2003

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Quantità netta del preparato: g 50 - 100 - 250 - 500

Partita N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare al riparo dall'umidità.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere né fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non si conoscono casi di avvelenamento nell'uomo. In condizioni sperimentali si sono osservati nei ratti i seguenti sintomi di avvelenamento aspecifici: sedazione, dispnea, esoftalmo, posizione curva e pelo arruffato.
Terapia: sintomatica.

CARATTERISTICHE
Cyrom 75 WP è un insetticida sistemico appartenente al gruppo dei regolatori di crescita (IGR), caratterizzato da un' azione prolungata e da una rapida penetrazione nei tessuti vegetali.
Applicato per via radicale viene assorbito dalle radici e traslocato all'interno della pianta.
Trova impiego nella difesa delle colture orticole, floricole, patata e tabacco. Presenta una spiccata azione nei confronti delle larve di ditteri, sulle quali ne inibisce lo sviluppo, risultando specificatamente indicato nella lotta alle larve minatrici del genere Lyriomyza spp.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Cyrom 75 WP si impiega in serra e pieno campo sulle colture seguenti:
ORTICOLE: carciofo, cetriolo, cocomero, lattuga (solo pieno campo), **melanzana, melone, pomodoro, sedano, zucchino**, **FLORICOLE** (crisantemo, garofano, gerbera, gipsofila), **PATATA, TABACCO.**
Trattamenti fogliari: in serra alla dose di 500 g per ettaro di superficie, aumentando la dose a 600 g negli interventi di pieno campo. Intervenire alla comparsa delle prime mine, ripetendo l'intervento a distanza di 7-14 giorni.
Trattamenti al terreno: alla dose di 0,1-0,25 g/pianta, pari a 1-2 kg per ettaro di superficie.
Cyrom 75 WP può essere applicato anche con l'ausilio dei tradizionali impianti d'irrigazione a goccia o a manichetta, alla dose di 300-600 g per ettaro di superficie, avendo cura di ripetere l'intervento a distanza di 15-20 giorni.

FITOTOSSICITA' :si consiglia di eseguire saggi preliminari su piccole superfici al fine di verificare eventuali sensibilità varietali.
COMPATIBILITA': il prodotto risulta compatibile con fungicidi ed insetticidi purché a reazione non fortemente alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA:
35 GIORNI patata
14 GIORNI carciofo, cetriolo, cocomero, lattuga, melanzana, melone, pomodoro, sedano, zucchino, tabacco

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA – DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CYROM 75 WP

Insetticida sistemico a base di ciromazina
Polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
Ciromazina pura g 75
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
EUROPHYTO T.S.A. srl - viale V. Emanuele II, n.64 - Bergamo
OFFICINA DI PRODUZIONE
SINAPAK s.n.c. V.le dell'Industria e dell'Artigianato,7 - 27049 Stradella (Pv)
ADICA srl – Stabilimento di Faenza (Ra)
Registrazione Ministero della Salute n. 11537 del 16.01.2003

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Quantità netta del preparato: g 50 - 100

Partita N.

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

Partita N.

TOOL

Fungicida organico per il controllo dei funghi terricoli
Sospensione concentrata

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

COMPOSIZIONE
Tolclofos-metile puro g 46 (= 500 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
EUROPHYTO T.S.A. srl (tel. 0363-305786)
Sede legale: viale V.Emanuele II, n.64 - Bergamo

OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
IRCA SERVICE SPA – S.S. Cremasca 591, n.10 – Fornovo S.Giovanni (Bg)
DIACHEM SPA . U.P. SIFA – Caravaggio (Bg)
Registrazione Ministero della Salute n. 11617 del 05.03.2003
Contenuto netto: ml 100-250-500 litri 1-2-3-5-10-20
Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
CARATTERISTICHE
TOOL è un fungicida organico dotato di lunga persistenza d'azione.
Risulta indicato per il controllo di numerosi funghi patogeni terricoli e dell'apparato aereo quali Rhizoctonia solani, Sclerotinia spp, Alternaria spp e Botrytis spp. Agisce per contatto e trova applicazioni al terreno, in trattamenti fogliari e di concia al seme, a tuberi e rizomi.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Eseguire dopo ogni intervento al terreno un'irrigazione o una leggera lavorazione.
Lattuga: contro rizoctonia e sclerotinia alla dose di 4-8 ml/mq in trattamenti al terreno; 1-2 l/ha in trattamenti fogliari ogni 2-3 settimane.
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Radicchio, Fagiolo, Fagiolino, Zucchino, Carota, Cocomero, Cavolo, Cavolfiore: contro rizoctonia, sclerotinia, alternaria, botrite e Corticium spp. alla dose di 2-4 ml/mq in trattamenti al terreno; 1-2 l/ha in trattamenti fogliari ogni 2-3 settimane.
Cipolla, Aglio, Zucca, Basilico: contro rizoctonia e Sclerotium spp alla dose di 2-4 ml/mq in interventi al terreno in assenza di coltura.
Patata: contro rizoctonia alla dose di 200-300 ml/hl in trattamenti di concia dei tuberi destinati alla semina; 10-20 l/ha per interventi al terreno; 80-120 ml/100 metri lineari nel caso di localizzazione nei solchi.
Barbabietola da zucchero: contro rizoctonia e Corticium spp alla dose di 1-3 ml/mq per trattamenti al terreno; 80 ml/100 kg di seme per trattamenti di concia.
Frumento: contro Rhizoctonia cerealis alla dose di 1-2 l/ha in trattamenti fogliari (fase di fine accestimento).
Floreali e Ornamentali: contro rizoctonia e Corticium spp alla dose di 3-5 ml/mq per interventi al terreno; 1-2 ml/kg in trattamenti di concia (tuberi-rizomi)
Campi da golf: contro Rhizoctonia solani alla dose di 200 ml/ 100 mq in 10 litri d'acqua; ripetere l'intervento a distanza di 10-15 gg.
Segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.
Avvertenze: i semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti.

COMPATIBILITA'
Il prodotto è incompatibile con fungicidi ad azione alcalina (es.polisolfuri, poltiglia bordolese).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Impedire l'accesso agli animali domestici nelle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Cavoli: **15 gg**
Peperone, Pomodoro, Melanzana, Radicchio, Lattuga, Fagiolino, Fagiolo, Barbabietola da zucchero: **30 gg**
Zucchino: **45 gg**
Cocomero: **60 gg**
"Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza".
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. NON OPERARE CONTRO VENTO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Etichetta formato ridotto

TOOL

Fungicida organico per il controllo dei funghi terricoli
Sospensione concentrata

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

COMPOSIZIONE

Tolclofos-metile puro	g 46 (= 500 g/l)
Coformulanti	q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
EUROPHYTO T.S.A. srl (tel. 0363-305786)
Sede legale: viale V.Emanuele II, n.64 - Bergamo

OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
IRCA SERVICE SPA – S.S. Cremasca 591, n.10 – Fornovo S.Giovanni (Bg)
DIACHEM SPA , U.P. SIFA – Caravaggio (Bg)
Registrazione Ministero della Salute n. 11617 del 05.03.2003
Contenuto netto: ml 100

Partita N.

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

CLARET 80 WG

Fungicida sistemico

GRANULI IDRODISPERSIBILI

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
g 100 di prodotto contenono:
Fosetil Alluminio puro g 80
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
EUROPHYTO T.S.A. S.r.L.
Viale V. Emanuele II, n.64 - Bergamo

OFFICINA DI PRODUZIONE
ADICA srl – Bologna, Stabilimento di Nera Montoro (Tr)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. via Torricelli,2 – Cotignola (Ra)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
TORRE srl - . via Pian d'Asso – Torrenieri (Si)

Registrazione Ministero della Salute n. 12065 del 31-03.2004
Contenuto netto: g 10-20-50-100-250-500 kg 1-5-10-25 **Partita n.**

CARATTERISTICHE
Il prodotto é un fungicida sistemico attivo nei confronti dei ficomiceti ed in particolare contro quelli della famiglia delle peronosporacee. Il suo principio attivo é caratterizzato da una notevole mobilità nelle piante e la sua sistemicità si manifesta sia in modo ascendente sia in modo discendente. L'attività del formulato é più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in attiva crescita permettendo, grazie alla sua sistemicità di proteggere anche la vegetazione che si forma successivamente al trattamento.

MODALITA' D'IMPIEGO E DOSI
Frutticoltura
Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo: contro Gommosi parassitaria (Phytophora spp), effettuare irrorazioni fogliari in primavera ed in autunno, alla dose di 200-300 g/hl utilizzando 10 litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione possono essere integrati da pennellature alle zone del legno infette (tronco e branche). Tale pratica diventa indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, presentano un apparato fogliare non più in grado di assorbire adeguatamente il fungicida.
Vivai di agrumi: impiegare alla dose di 400 g/hl ogni 60 giorni.
Melo e Pero: contro ticchiolatura (Venturia inaequalis), trattamenti preventivi alla dose di 150-200 g/hl, in particolare nelle fasi pre-fiorali e immediatamente successive all'allegagione si consiglia l'associazione con fungicidi di copertura (rame escluso) o con dodina.
Pero: contro Maculatura bruna (Stemphyllium spp) e Colpo di fuoco (Erwinia amilovora), trattamenti preventivi alla dose di 250 g/hl. Contro Maculatura bruna, ridurre la dose d'impiego a 150 g/hl nel caso di associazione con prodotti di copertura.
Arboreti e vivai di Melo e Pero, Pesco, Actinidia: contro Marciumi radicali (Phytophthora spp.)
a) trattamento alla vegetazione, a cadenza mensile, dalla sfioritura fino a circa 40 giorni dalla raccolta (per melo e actinidia) alla dose di 250 g/hl
b) su piante già debilitate dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida: effettuare una innaffiatura alla base della pianta (in modo da irrorare il colletto)) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni prima della raccolta, con 1-2 litri per pianta di una poltiglia costituita da 5 kg/hl di formulato (sospensione al 5%)

Vite: contro Peronospora (Plasmopora viticola) in trattamenti preventivi alla dose di 250 g/hl. E' sempre consigliata l'associazione con formulati di copertura (rame escluso).
Fragola: contro Peronospora (Phytophthora cactorum e fragariae): immersione delle piantine, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti, seguita da 2-3 irrorazioni fogliari alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immersione delle piantine prima del trapianto in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti, seguita da 2-3 innaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di 0,5 g di formulato per pianta.
Orticoltura
Lattuga: contro Peronospora (Bremia lactucae), effettuare irrorazioni fin dalle prime fasi vegetative, ripetendole ogni 10-14 giorni alla dose di 200-300 g/hl(avendo cura di distribuire almeno 3 kg di prodotto per ettaro). Su lattuga romana effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici, la lattuga può essere sensibile al prodotto.
Spinacio, Carciofo: contro Peronospora (Bremia lactucae), effettuare trattamenti preventivi a seconda delle necessità, alla dose di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire almeno 3 kg di prodotto per ettaro).
Cocomero, Melone, Cetriolo: contro Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), iniziare i trattamenti fin dalle prime bagnature infettanti e ripeterli ogni 8-10 giorni alla dose di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire almeno 3 kg di prodotto per ettaro).
Colture Ornamentali in pieno campo ed in serra
Chamaecyparis, Thuya e altre conifere, Rododendro e altre ericacee, Poisettia, St. Paulia e Crisantemo: contro Marciume radicale (Phytophthora cinnamoni), effettuare un'innaffiatura alla base delle piante con 5-10 g/m^2 di formulato a cadenza mensile nel periodo primaverile.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non é compatibile con i prodotti a base di rame, di dicofol e con concimi fogliari contenenti azoto (nitrico ed ammoniacale). Non effettuare miscele con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta. Si consiglia inoltre di non irrorare il prodotto su colture precedentemente trattate con i suddetti formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI
15 giorni prima della raccolta su carciofo, cetriolo, cocomero, melone, lattuga e spinacio
30 giorni prima della raccolta su fragola
40 giorni prima della raccolta su melo, pero, pesco, actinidia e vite
80 giorni prima della raccolta su arancio, limone, mandarino e pompelmo
.**Attenzione!** Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA – DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE NON OPERARE CONTRO VENTO IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CLARET 80 WG

Fungicida sistemico
GRANULI IDRODISPERSIBILI

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
g 100 di prodotto contenono:
Fosetil Alluminio puro g 80
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
EUROPHYTO T.S.A. S.r.L.
Viale V. Emanuele II, n.64 - Bergamo (tel. 0363-305786)

OFFICINA DI PRODUZIONE
ADICA srl – Bologna. Stabilimento di Nera Montoro (Tr)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. via Torricelli,2 – Cotignola (Ra)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
TORRE srl - . via Pian d'Asso Torrenieri (Si)

Registrazione Ministero della Salute n. 12065 del 31-03.2004
Contenuto netto: g 10-20-50-100 **Partita n.**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

MICE-STOP

FUNGICIDA ORGANICO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA
AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono
Tiofanate metile puro g 38,3 (g/l 450)
Coformulanti q. b. a 100

NATURA DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi

Può provocare a lungo termine effetti per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Nocivo per inalazione - Possibilità di effetti irreversibili - Può provocare

sen

per contatto con la pelle

NOCIVO
CONSIGLI DI PRUDENZA
- Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenuto o l'etichetta - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni – Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

EUROPHYTO T.S.A. srl
V.le V.Emanuele II, 64 - Bergamo (tel. 0363-305786)
Registrazione del Ministero della Salute n. 12387 del 24.12.2004
Stabilimenti di produzione:
TERRANALISI S.R.L., Via Nino Bixio n. 6, Cento (FE) -
DIACHEM SPA – U.P SIFA Caravaggio (Bg)
CONTENUTO: ml 250-500 lt 1-5-10
Riferimento partita N.:

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni
MODALITA' D'IMPIEGO - Fungicida organico in sospensione concentrata, ad azione preventiva e curativa che viene impiegato sulle seguenti colture:
Pesco, albicocco, susino:
- contro la Monilia, l'Oidio e la Ticchiolatura alla dose di ml 80-90/hl;
- contro il Fusicoccum e la Citospora alla dose di ml 100-120/hl.
Vite - contro la Muffa grigia e l'Oidio alla dose di ml 100/hl, trattando a fine fioritura, prima della chiusura del grappolo e successivamente ad intervalli di 3 settimane circa sino a 2-3 settimane dalla verdemmia.
Melo, pero:
- contro la Ticchiolatura e l'Oidio a ml 100-140/hl fino ai primi trattamenti post-fiorali e ml 70-85/hl nelle applicazioni successive;
- contro la Ticchiolatura tardiva in pre-raccolta a ml 85-100/hl;
- contro Gloeosporium trattamenti di post-raccolta per aspersione o immersione a ml 105-210/hl. "I trattamenti dovranno essere effettuati, per non più di 30 secondi, in ambienti appositamente attrezzati per le operazioni meccanizzate, che escludano l'intervento diretto dell'operatore e che consentono l'immagazzinamento con frigo-conservazione. La soluzione eccedente ai trattamenti dovrà essere prelevata da ditte specializzate per la sua depurazione (fisica o microbiologica)". L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 283/1962. Le mele e le pere trattate possono essere messe in commercio dopo almeno 15 giorni dal trattamento.
Frumento - contro le Malattie del piede a litri 1-1,2 per ettaro, durante la fase dell'accestimento o in levata.
Garofano - contro la Fusariosi, la Verticilliosi e la Fialofora a ml 2-3/mq sciolto in 10 litri di acqua; trattare in modo preventivo e ripetendo i trattamenti.
Fiori, piante ornamentali - contro la Muffa grigia, l'Oidio e la Septoria a ml 85 100/hl.
Gladiolo, tulipano, bulbose - contro i Marciumi da Fusarium, Penicilium, Sclerotinia, Botrytis alla dose di litri 1-1,4/hl per immersione dei bulbi prima dell'impianto.
Nocciolo - contro Gleosporium delle gemme a ml 125 con 1-2 interventi ad intervallo di 20-25 giorni, trattando in autunno all'inizio della caduta delle foglie.
Cipresso, platano - contro Cancro o Corineo del cipresso a ml 125 per q.le acqua intervenendo in autunno e primavera con 2-3 trattamenti.

COMPATIBILITA' – Per una buona miscelazione procedere stemperando in acqua il prodotto e poi versare nell'irroratrice (sotto agitazione) piena a metà, poi aggiungere un bagnante adesivo. Non è compatibile con sostanze alcaline.

AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA' – Il prodotto contiene una sostanza attiva che può avere effetti negativi su acari fitoseidi.
"Attenzione, il prodotto tal quale contiene sostanza altamente tossica per gli organismi acquatici."
SU COLTURE ORNAMENTALI E FLOREALI SONO CONSENTITE SOLO APPLICAZIONI IN PIENO CAMPO
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere il trattamento 30 giorni prima della raccolta del frumento e 15 sulle altre colture.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACUQA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE.
EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - "Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: PIRETRO 2%; PIPERONIL BUTOSSIDO 8%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: *PIRETRO* - **Sintomi:** bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, ronchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
PIPERONIL BUTOSSIDO - ==="
TERAPIA: sintomatica e di rianimazione.
CONTROINDICAZIONI: ===
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
OUTFLY esplica la sua azione prevalentemente per contatto ed in minor misura per ingestione, la sua azione è rapida (forte potere abbattente) e di breve persistenza. I trattamenti devono essere eseguiti bagnando abbondantemente le piante alla comparsa delle infestazioni e in giornate di tempo buono. Possiede limitata azione tossica per l'uomo e gli animali a sangue caldo. Le seguenti dosi sono riferite a ettolitro di acqua. AGRUMI: contro ogni tipo di insetto parassita a ml 150-200. POMACEE-FICO - MELOGRANO - NOCCIOLO: contro gli afidi a ml 150-200. DRUPACEE: contro mosca ed afidi a ml 150-200. VITE - OLIVO: contro mosca, acari ed afidi a ml 150-200. ORTAGGI (escluso i funghi) - FRAGOLA: contro afidi, mosca, cavolaia, bemisia, moscerino, farfalle di minatori, psilla, tripidi e aleurodidi a ml 150-200. PATATA: contro dorifora a ml 150-200. BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - GIRASOLE - FORAGGERE LEGUMINOSE : contro tutti gli insetti ml 150-200. TABACCO: contro tutti gli insetti a ml 100-150. CEREALI : per la disinfezione in genere ml 150-200. FLORICOLTURA-ORNAMENTALI: contro gli afidi, cicaline, tingidi, coleotteri, lepidotteri defogliatori, aleurodidi e tentredini a ml 140-160.

OUTFLY
INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono
Piretrina g 2 (g/l 18) (da estratto di Piretro al 25% g 8)
Piperonil butossido g 8 (g/l 72)
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente

Pericoloso per l'ambiente

CONSIGLI DI PRUDENZA
- Conservare fuori della portata dei bambini
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
- Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
- Non gettare i residui nelle fognature
- Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale

EUROPHYTO T.S.A. srl
V.le V.Emanuele II, 64 - Bergamo (tel. 0363-305786)

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L., Via IV Novembre n. 19/1, Renazzo di Cento (FE) – IRCA Service SPA, S.S. Cremasca 591n° 10, Fornovo S.F. (Bg)

Registrazione del Ministero della Salute n. 12.386 del 24.12.2004

CONTENUTO: ml 10-20-100-200-250-500 lt 1-5-10-15-20

Riferimento partita:

COMPATIBILITA' - Incompatibile con poltiglie solfocalciche.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' – Alle dosi indicate non presenta fenomeni di fitotossicità.
" Tossico per gli insetti utili e per i pesci "
EVENTUALI RISCHI DI NOCIVITA', A SEGUITO DEI TRATTAMENTI PER GLI INSETTI UTILI, GLI ANIMALI DOMESTICI, I PESCI ED IL BESTIAME Se viene impiegato al momento della fioritura è nocivo per le api. Non immettere nel campo trattato bestiame prima di 2 giorni. Non contaminare corsi d'acqua.

INTERVALLO DI SICUREZZA – Osservare un intervallo di **2 giorni** dall'ultimo trattamento all'immissione al consumo.

"**Attenzione** da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso". "Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto".

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE.
EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

OUTFLY

etichetta formato ridotto

OUTFLY INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono Piretrina g 2 (g/l 18) (da estratto di Piretro al 25% g 8) Piperonil butossido g 8 (g/l 72) Coformulanti q. b. a g 100 FRASI DI RISCHIO Tossico per gli organismi acquatici - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente **Pericoloso per l'ambiente** CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non gettare i residui nelle fognature - Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale **EUROPHYTO T.S.A. srl** V.le V.Emanuele II, 64 - Bergamo (tel. 0363-305786) **Stabilimenti di produzione:** TERRANALISI S.R.L., Via IV Novembre n. 19/1, Renazzo di Cento (FE) - IRCA Service S.p.A., S.S. Cremasca 591 n° 10, Fornovo S.G. (Bg) Registrazione del Ministero della Salute n. 12386 del 24.12.2004 CONTENUTO: ml 10-20-100 Riferimento partita:	**Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo** Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti Il contenitore non può essere riutilizzato Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

SELEZIONE PAC S.r.l.

PULIRISO

Erbicida selettivo per risaie contro il giavone
a base di Propanil – concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
PROPANIL puro g.31.5 (= 330.12 g/l)
Coformulanti q.b.a g.100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza. Non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
SELEZIONE PAC Srl - Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A.- U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
INQUIPORT S.A. - ARAURE, ESTADO PORTUGUESA - (Venezuela)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10740 del 12.3.2001

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO litri 5 – 10 – 20 - 50

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
PULIRISO è un diserbante selettivo ad applicazione post-emergenza che si impiega in risaia per la lotta contro i giavoni. PULIRISO viene formulato in emulsione concentrata e viene distribuito mediante irrorazione previa diluizione in acqua.
PULIRISO trova impiego contro i giavoni ed altre malerbe quando si trovano nei primi stadi di sviluppo. PULIRISO viene distribuito con le usuali pompe irroratrici dopo essere stato preventivamente diluito in una quantità di acqua che consenta una omogenea copertura delle infestanti. Al fine di ottenere i migliori risultati si dovrà effettuare una buona preparazione del letto di semina (buona lavorazione e buon livellamento del terreno) e peraltro subito dopo la semina si dovrà mantenere un basso livello d'acqua per una più intensa ed omogenea germinazione dei giavoni che verranno distrutti in un secondo tempo dal PULIRISO. Lo stadio vegetativo in cui il giavone denota la maggior sensibilità al PULIRISO è quello compreso fra la prima e la terza foglia; in questo stadio sono infatti sufficienti l. 9,5 di PULIRISO. Più dettagliatamente si possono indicare dosi di l.9,5 di PULIRISO per ettaro intervenendo su giavoni con stadio vegetativo compreso fra la prima e la terza foglia, l. 12 di PULIRISO per ettaro intervenendo su giavoni con stadio vegetativo compreso fra la terza e la quarta foglia; l. 15-19 di PULIRISO per ettaro intervenendo su giavoni con stadio vegetativo compreso fra la quarta foglia e l'inizio dell'accestimento. Poichè PULIRISO risulta tanto più efficace quanto più le infestanti sono in rapido accrescimento, quando si interviene su giavoni cresciuti in andamento climatico avverso bisognerà aumentare le dosi di PULIRISO, poichè ad un apparato fogliare esiguo fa riscontro un apparato radicale già robusto ed approfondito (giavone invecchiato). PULIRISO va distribuito previa diluizione in acqua e, qualora si faccia uso di una motopompa con barra di 8 metri ed ugelli di mm 1,si indica in 300/400 litri per ettaro il quantitativo ottimale di acqua per una omogenea distribuzione del prodotto. Usando pompa a spalla si dovrà aumentare leggermente il quantitativo di acqua portandolo a 400/500litri per ettaro di superficie. Qualora vengano impiegate le dosi più elevate (15/19 lt/ha)il quantitativo di acqua dovrà essere elevato a 600/700 litri per ettaro. In ogni caso la barra irrorante dovà essere tenuta bassa il più possibile. Il trattamento deve essere fatto con risaia asciutta avendo cura cioè di togliere l'acqua uno o due giorni prima di effettuare la distribuzione del prodotto. All'atto dell'applicazione le piantine di giavone dovranno essere ben asciutte ed il trattamento dovrà essere eseguito nelle ore più calde della giornata. Trascorse 24 ore dal trattamento si immetterà acqua nella risaia mantenendo il livello più alto possibile per circa una settimana, dopo di che lo si riporterà al livello normale. Non effettuare il trattamento se si prevede una pioggia entro 5/6 ore. Non trattare in giornate ventose al fine di evitare che la nube irrorante possa essere trasportata su colture sensibili provocando danni.

COMPATIBILITA'
PULIRISO va usato da solo.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 30 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

CALTABELLOTTA S.r.l.

ZOLFO RAMATO 5 R

(Polvere secca)
Anticrittogamico

ZOLFO RAMATO 5 R
Reg. Ministero della Sanità n. 9099 del 23/01/97

CALTABELLOTTA srl
Via Friddi, 9 - Lercara Friddi (PA)

Stabilimento di produzione:
CALTABELLOTTA s.r.l
Via Friddi, 9 - Lercara Friddi (PA)

Partita n. Contenuto 1 - 5 - 10 - 25 Kg

IRRITANTE

Composizione	
ZOLFO puro (esente da Selenio)	g. 90
RAME metallo	g. 0,9
(sotto forma di ossicloruro)	
coformulanti q.b. a	g.100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Nell'applicazione del prodotto indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Non respirare le polveri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ZOLFO PURO 90% e RAME METALLO 0,9% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
ZOLFO: ----
RAME - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia: Gastrolusi con soluzione latto- albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto si impiega nei trattamenti a secco contro l'Oidio della Vite, delle Pomacee, delle Drupacee, delle Orticole e delle floreali. Esplica inoltre un'azione complementare contro la Ticchiolatura delle Pomacee e la Peronospora della Vite.

COLTURE PROTETTE: **Vite, Pomacee, Drupacee, Ortaggi (Cucurbitacee, Solanacee, Cardo, Carciofo, Lattughe e simili, Leguminose), Barbabietola, Floreali (in pieno campo).**
PARASSITI CONTROLLATI: Oidio
DOSI D'IMPIEGO: 20-25 Kg/ha

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile. Durante l'applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente.

COMPATIBILITÀ
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non si deve trattare durante la fioritura. Può essere fitotossico su Cucurbitacee e su pesco e susino in vegetazione. Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman red, Winesap, Abbondanza Belfort, Gravenstein, Morgenduft, Stayman, King David, Renetta del Canadà, Rosa mantovana;
PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio, Abate Fétel, Butirra Clairgeau, Passacrassana, Jules Guyot, Favorita di Clapp, Butirra Giffard;
VITE: Sangiovese.

Nei periodi con temperature elevate, evitare di trattare nelle ore più calde della giornata.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

Avvertenza: Non rientrare nelle zone trattate prima di tre giorni.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ZOLFO RAMATO 3 R

(Polvere secca)
Anticrittogamico

ZOLFO RAMATO 3 R Reg. Ministero della Sanità n. 9100 del 23/01/97

CALTABELLOTTA srl
Via Friddi, 9 - Lercara Friddi (PA)

Stabilimento di produzione:
CALTABELLOTTA s.r.l
Via Friddi, 9 - Lercara Friddi (PA)

Partita n. Contenuto 1 - 5 - 10 - 25 Kg

IRRITANTE

Composizione	
ZOLFO puro (esente da Selenio)	g. 90
RAME metallo	g. 0,54
(sotto forma di ossicloruro)	
coformulanti q.b. a	g.100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Nell'applicazione del prodotto indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Non respirare le polveri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ZOLFO PURO 90% e RAME METALLO 0,54% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
ZOLFO: ----
RAME - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia: Gastrolusi con soluzione latto- albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto si impiega nei trattamenti a secco contro l'Oidio della Vite, delle Pomacee, delle Drupacee, delle Orticole e delle floreali. Esplica inoltre un'azione complementare contro la Ticchiolatura delle Pomacee e la Peronospora della Vite.

COLTURE PROTETTE: **Vite, Pomacee, Drupacee, Ortaggi (Cucurbitacee, Solanacee, Cardo, Carciofo, Lattughe e simili, Leguminose), Barbabietola, Floreali (in pieno campo).**
PARASSITI CONTROLLATI: Oidio
DOSI D'IMPIEGO: 20-25 Kg/ha

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile. Durante l'applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente.

COMPATIBILITÀ
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non si deve trattare durante la fioritura. Può essere fitotossico su Cucurbitacee e su pesco e susino in vegetazione. Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman red, Winesap, Abbondanza Belfort, Gravenstein, Morgenduft, Stayman, King David, Renetta del Canadà, Rosa mantovana;
PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio, Abate Fétel, Butirra Clairgeau, Passacrassana, Jules Guyot, Favorita di Clapp, Butirra Giffard;
VITE: Sangiovese.

Nei periodi con temperature elevate, evitare di trattare nelle ore più calde della giornata.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

Avvertenza: Non rientrare nelle zone trattate prima di tre giorni.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Zolfo bagnabile 80%

(Polvere secca)

Anticrittogamico

Zolfo bagnabile 80% Reg. Ministero della Salute n.11177 del 05/02/2002

CALTABELLOTTA srl

Via Friddi, 9 - Lercara Friddi (PA)

Stabilimento di produzione:
CALTABELLOTTA s.r.l
Via Friddi, 9 - Lercara Friddi (PA)

Partita n.

Contenuto
g. 50–100–150–200–250-500
Kg . 1-5-10-25

IRRITANTE

Composizione	
ZOLFO puro micronizzato (esente da Selenio)	g. 80
coformulanti q.b. a	g.100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Zolfo bagnabile 80% è uno zolfo finemente micronizzato, per trattamenti liquidi preventivi e curativi contro tutte le forme di Oidio o Mal bianco che colpiscono vigneti, frutteti, colture orticole e floreali. Inoltre esercita, contemporaneamente, un'azione di contenimento di altre malattie (Ticchiolature, Ruggini, Corineo) e Acari di alcune specie, in particolare Eriofidi.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

- **FRUTTIFERI:**
  - **Agrumi**: contro Oidio
    - trattare alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione, alla dose di **200 g/hl**
  - **Vite**: contro Oidio
    - eseguire un primo trattamento, quando i tralci misurano da 5 a 10 cm, alla dose di **250-300 g/hl**
    - un altro trattamento al momento della fioritura ad infine altri tre o quattro trattamenti, ad acini ben formati da luglio in poi, con dosi gradualmente decrescenti fino a **200 g/hl**
  - **Pomacee** (melo, pero, cotogno, nespolo):
    - trattamenti pre-fiorali alla dose di **300-400 g/hl**
    - trattamenti post-fiorali alla dose di **250-300 g/hl** per le prime applicazioni e **200-250 g/hl** per le successive applicazioni
  - **Drupacee** (pesco, nettarine, susino, albicocco, ciliegio)
    - Pesco, Nettarine, Albicocco e Ciliegio contro:
      Oidio: trattare dalla scamiciatura dei frutticini fino alla fase di giovane frutto. Trattamenti successivi vanno effettuati alla comparsa delle prime macchie d'Oidio **150-200 g/hl**
      Pesco contro Acariosi: intervenire poco prima della schiusura delle gemme **200 g/hl**
    - Susino, contro Ruggine: trattare una o due volte durante l'estate, ai primi cenni di infezione, eseguendo il trattamento nel pomeriggio per evitare ustioni, **100 g/hl**
- **COLTURE ORTICOLE** (bietole rosse, carote, sedani rapa, ravanelli, rape, aglio, cipolla, scalogno, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, zucche, cocomeri, cavoli, lattughe e simili, spinaci, bietola da foglia e da costa, fagioli, piselli, asparagi, cardi, sedani, finocchi, carciofi, porri) **E FLOREALI**, contro Mal bianco:
  - **200-300 g/hl**, durante tutto l'anno secondo le necessità
- **PATATA**: contro Oidio
  - trattare preventivamente o alla comparsa dei sintomi dell'infezione **100 g/hl**
- **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO**, contro Oidio
  - trattare alla comparsa dei sintomi dell'infezione **2-3 Kg/ha**
- **FRAGOLA**, contro Oidio
  - trattamenti in via preventiva o al primo comparire dei sintomi dell'infezione **100-120 g/hl**
- **NOCCIOLO, MANDORLO** contro Mal bianco
  - trattare dalla fine dell'estate per tutto l'autunno **150-200 g/hl**
- **NOCCIOLO** contro Acaro delle gemme
  - trattare all'inizio della primavera partendo dall'emissione delle prime foglie **150-200 g/hl**
- **OLIVO**, contro Oidio
  - trattare alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione **150-200 g/hl**
- **TABACCO**, contro Oidio
  - trattare quando le piante raggiungono circa 1 m di altezza, con trattamenti ripetuti **2-3 Kg/ha**

Fare attenzione a non trattare verso il periodo della raccolta, per non alterare le caratteristiche qualitative del fogliame.

- **FRUMENTO, ORZO E CEREALI MINORI**, contro Oidio
  - trattamenti dalla fine accestimento ad inizio levata **3,5 Kg/ha**
- **GIRASOLE**, contro Oidio
  - trattare alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione **200 g/hl**
- **SOIA**, contro Oidio
  - trattare alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione **200 g/hl**
- **FORESTALI**
  - Faggio, Castagno, Acero, Betulla, Ontano, Frassino, Salice ed altre forestali – contro Oidio, trattamenti preventivi **200-300 g/hl**
  - Quercia, contro Oidio
    trattamenti estivi **100-200 g/hl**
    trattamenti invernali **300 g/hl**

Nel corso dell'estate effettuare trattamenti soltanto durante le ore più fresche della giornata con le dosi minime consigliate.

Per la preparazione della sospensione:. Stemperare la dose del prodotto in poca acqua, mescolare sino ad ottenere una poltiglia fluida ed omogenea e quindi versarla nel quantitativo totale d'acqua semplice o già miscelata con altri prodotti, rimescolando infine accuratamente.

COMPATIBILITÀ

Zolfo bagnabile 80% non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con oli minerali, con Captano, con DDVP.

Avvertenze: Zolfo bagnabile 80% deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Zolfo bagnabile 80% può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman red, Winesap;
PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio;
VITE: Sangiovese.
CUCURBITACEE: può essere fitotossico.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

BENTO-ZOLFO R

(Polvere secca)

Anticrittogamico

BENTO-ZOLFO R Reg. Ministero della Salute n. 11224 del 04/03/2002

CALTABELLOTTA srl

Via Friddi, 9 - Lercara Friddi (PA)

Stabilimento di produzione:
CALTABELLOTTA s.r.l
Via Friddi, 9 - Lercara Friddi (PA)

Partita n.

Contenuto 1 - 5 - 10 - 25 Kg

IRRITANTE

Composizione	
ZOLFO puro (esente da Selenio)	g. 35
RAME metallo	g. 0,54
(sotto forma di ossicloruro)	
coformulanti (bentonite) q.b. a	g.100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Nell'applicazione del prodotto indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Non respirare le polveri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ZOLFO PURO 35% e RAME METALLO 0,54% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
ZOLFO: ----
RAME - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia: Gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il Bento-Zolfo R si impiega nei trattamenti a secco contro l'Oidio della Vite, delle Pomacee, delle Drupacee, delle Orticole e delle floreali. Esplica inoltre un'azione collaterale contro la Ticchiolatura delle Pomacee e la Peronospora della Vite e delle colture orticole. Inoltre il prodotto, grazie allo zolfo, svolge una certa azione contro gli acari eriofidi del pero e della vite.

COLTURE PROTETTE: **Vite, Pomacee, Drupacee, Ortaggi (Cucurbitacee, Solanacee, Cardo, Carciofo, Insalate, Leguminose), Barbabietola, Floreali (in pieno campo).**
PARASSITI CONTROLLATI: Oidio, con azione collaterale contro Peronospora, Ticchiolatura, acari eriofidi.
DOSI D'IMPIEGO: 25-50 Kg/ha a seconda dello sviluppo della vegetazione e dell'andamento climatico.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile. Durante l'applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente. Iniziare gli interventi al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, proseguendoli poi secondo i normali calendari di lotta della zona.

COMPATIBILITÀ
Il Bento-Zolfo R è si usa da solo.

FITOTOSSICITÀ
Non si deve trattare durante la fioritura. Può essere fitotossico su Cucurbitacee e su pesco e susino in vegetazione. Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman red, Winesap, Abbondanza Belfort, Gravenstein, Morgenduft, Stayman, King David, Renetta del Canadà, Rosa mantovana;
PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio, Abate Fétel, Butirra Clairgeau, Passacrassana, Jules Guyot, Favorita di Clapp, Butirra Giffard;
VITE: Sangiovese.

Nei periodi con temperature elevate, evitare di trattare nelle ore più calde della giornata.
Avvertenza: Il prodotto deve essere applicato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego di oli minerali e di captano.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

Avvertenza: Non rientrare nelle zone trattate prima di tre giorni.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

BENTO-ZOLFO

(Polvere secca)

Anticrittogamico

BENTO-ZOLFO Reg. Ministero della Salute n. 11225 del 04/03/2002

CALTABELLOTTA srl

Via Friddi, 9 - Lercara Friddi (PA)

Stabilimento di produzione:
CALTABELLOTTA s.r.l
Via Friddi, 9 - Lercara Friddi (PA)

Partita n.

Contenuto 1 - 5 - 10 - 25 Kg

IRRITANTE

Composizione	
ZOLFO puro (esente da Selenio)	g. 35
coformulanti (bentonite) q.b. a	g.100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il Bento-Zolfo è un fungicida specifico per il controllo dell'Oidio della vite e di numerose colture agrarie, floricole ed ornamentali.
Grazie alla finezza delle sue particelle, il prodotto assicura una copertura uniforme della vegetazione ed una elevata efficacia.
Il Bento-Zolfo esplica inoltre un'azione collaterale contro eriofide (vite, pero, nocciolo) e contro l'acaro rugginoso delle colture orticole, floricole ed ornamentali.

COLTURE PROTETTE: **vite, pomacee (melo, pero, cotogno), drupacee (pesco, nettarina, albicocco, ciliegio, susino), mandorlo, nocciolo, fragola, ortaggi (ortaggi a foglia ed erbe fresche, ortaggi a radice e tubero, ortaggi a frutto, ortaggi a bulbo, cavoli), barbabietola, cereali, floreali ed ornamentali.**

DOSI D'IMPIEGO: 25-50 Kg/ha in funzione dello sviluppo della vegetazione e dell'andamento climatico.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile. Durante l'applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente. Iniziare gli interventi al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, proseguendoli secondo i normali calendari di lotta della zona.

COMPATIBILITÀ
Il Bento-Zolfo si usa da solo.

FITOTOSSICITÀ
Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman red, Winesap;
PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio;
VITE: Sangiovese.
Può essere fitotossico sulle CUCURBITACEE.

Avvertenza: Impiegare il Bento-Zolfo a distanza di almeno 20 giorni da interventi con olio minerale e captano. Non effettuare i trattamenti nelle ore più calde della giornata.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

CHEMINOVA A/S

STREAM SL

(Concentrato solubile)

DISERBANTE SISTEMICO DI POST-EMERGENZA AD AZIONE FOGLIARE

STREAM SLRegistrazione del Ministero della Sanità n. 8429 del 16/11/1993

Composizione	
GLIFOSATE ACIDO puro	g. 31 (=360 g/l)
(pari a sale isopropilamminico g. 41,9)	
Coformulanti q.b. a	g. 100

CHEMINOVA A/S

Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (DK)

Distribuito da

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl – Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 Roma

Stabilimenti di produzione:

CHEMINOVA A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (DK)

SCAM Srl – Via Bellaria, 164 – Modena

SIPCAM SpA – Salerano sul Lambro (Lodi)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto L. 0,25-0,5-1-5-10-20-25-50 Partita n°

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE - Lo STREAM SL è un diserbante di post-emergenza efficace su tutte le infestanti monocotiledoni e cicotiledoni, annuali e perenni. Viene assorbito dalle foglie e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perennanti, che vengono pure devitalizzati. Assorbimento e traslocazione vengono favoriti dall'aggiunta alla miscela da irrorare di solfato ammonico. Lo STREAM SL è rapidamente disattivato a contatto con il terreno. Non possedendo il prodotto efficacia di pre-emergenza, onde ottenere un diserbo duraturo, è possibile eventualmente utilizzare lo STREAM SL in miscela con un erbicida ad azione residuale (es. Diuron) per evitare la nascita delle infestanti provenienti da semi che possono germinare dopo l'applicazione del formulato da solo. L'effetto visivo cell'azione dello STREAM SL consiste in un ingiallimento o arrossamento ed in un appassimento graduale che si risolvono nella morte dell'infestante anche a livello dell'apparato radicale. La durata di questo processo è correlata alle condizioni ambientali.

MODALITÀ D'IMPIEGO - Il prodotto va usato per irrorazione sulle infestanti ben sviluppate, distribuendo volumi relativamente bassi (100-300 litri) di poltiglia per ettaro, in modo da bagnare uniformemente le malerbe, senza provocare perdite per gocciolamento. Impiegare pompe a bassa pressione (max 2 atm) e barre o lance munite di ugelli a specchio o a ventaglio che distribuiscono gocce di grosse dimensioni.

CAMPI D'IMPIEGO

__Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco, purchè ben lignificato__: vite, agrumi, melo, pero, olivo, noce.

__Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco, anche se ben lignificato__: drupacee, mandorlo, pioppo.

__Colture da diserbare esclusivamente utilizzando attrezzature selettive (lambenti, umettanti o a goccia)__: carciofo, fava, pisello, fagiolino, patata, pomodoro, melanzana, carota, barbabietola da zucchero, soia, mais (solo interfila), erba medica, prati, rosa; vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.

__Colture da diserbare prima dell'emergenza__: asparago.

__Terreni in assenza della coltura__ (fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, prati, vivai): prima della semina o del trapianto (queste operazioni vanno successivamente effettuate non prima di 48 ore dal trattamento), dopo il raccolto o a fine ciclo.

__Aree non agricole__: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili.

DOSI D'IMPIEGO

I trattamenti possono essere effettuati su tutta la superficie o su fasce lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma. Le dosi d'impiego, riferite ad ettaro di superficie effettivamente trattata, variano in funzione della specie delle infestanti presenti:

- 3,5 litri/ha contro la maggior parte delle erbe annuali
- 4-5 litri/ha contro Sorghum halepense (Sorghetta), Agropyrum repens (Gramignone), Ranunculus spp (Ranuncolo).
- 5-7 litri/ha contro Cyperus rotundus (Cipollino), Cirsium arvense (Stoppione, in fioritura), Artemisia vulgaris (Artemisia), Potentilla spp. (Cinquefoglio), Plantago spp. (Piantaggine), Taraxacum officinale (Soffione), Rumex spp. (Romice), Felci. Contro il Cyperus rotundus, per ottenere un risultato più duraturo, si può effettuare un primo trattamento alla dose di 5 litri/ha ripetendo l'intervento sui ricacci alla dose di 4 litri/ha;
- 8-10 litri/ha contro Convolvulus arvensis (Vilucchio) ben sviluppato (inizio fioritura), Cynodon dactylon (Gramigna), Urtica spp. (Ortica), Daucus carota (Carota selv.), Sonchus arvensis (Crispino), Tussilago farfara (Farfaro), Phragmites spp. (Cannucce, alte 50-80 cm).
- 10-12 litri/ha contro Convolvulus arvensis (Vilucchio) all'inizio dello sviluppo (lungo almeno 30 cm.).

Per interventi su infestazioni a macchia irrorare con concentrazioni del prodotto in acqua dell' 1 - 2% contro le infestanti annuali e del 2 - 5% contro le perenni.

NOTE IMPORTANTI: Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante. Non bagnare il tronco, specialmente se non è ben lignificato o con ferite. Per evitare la deriva usare ugelli protetti da coni o schermi che evitino alla poltiglia erbicida di giungere a contatto con la vegetazione delle piante, specialmente se in forma di allevamento basse.

AVVERTENZE: Le piogge che cadono entro 6 ore dall'applicazione ne riducono l'efficacia. Le temperature medie e l'alta umidità dell'aria facilitando la crescita delle infestanti, favoriscono l'esito del diserbo; le temperature basse o il caldo estivo non limitano l'efficacia del prodotto purchè le infestanti siano verdi, vitali e non essiccate. Soprattutto in condizioni critiche, comunque, l'aggiunta di solfato ammonico alla miscela incrementa l'attività del prodotto. Le perennanti sono meglio controllate se ben sviluppate al momento del trattamento; alcune dicotiledoni (es. Vilucchio, Stoppione, Artemisia) sono più sensibili se in fioritura o in uno stadio più avanzato. Arature, fresature, tagli delle erbe o pascolo di animali prima del trattamento riducono l'efficacia del diserbo. Dopo il trattamento su erbe perennanti lasciar traslocare il prodotto negli organi sotterranei per 2 o 3 settimane prima di procedere a lavorazione del terreno.

Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa ciscendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, ha efficacia ridotta.

Non impiegare per la miscelazione, distribuzione o conservazione del prodotto recipienti galvanizzati (es. zincati) o in acciaio se non protetti da apposite vernici plastiche.

COMPATIBILITÀ – Il prodotto è compatibile con erbicidi ad azione residuale (es. Diuron).

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ - Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare (rami non lignificati, succhioni del tronco e del portainnesto) di tutte le colture agricole. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente, con tre risciacqui successivi di acqua, le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi. Non scaricare le acque utilizzate per i lavaggi in acque destinate all'irrigazione.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

D.L. n. 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CYREN 7,5 G

GRANULARE

INSETTICIDA PER LA LOTTA CONTRO GLI INSETTI DEL TERRENO DA APPLICARE PRIMA DELLA SEMINA

CYREN 7,5 G Registrazione del Ministero della Sanità n. 8841 del 06/05/96

Composizione:
CLORPIRIFOS puro g. 7,5
Coformulanti q.b.a g. 100

Partita n.

CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78 - DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78 - DK 7673 Harboøre - Danimarca
SCAM Srl - Via Bellaria, 164 - Modena
ISAGRO SpA - Via Nettunense Km. 23,400 - Aprilia (LT)
Stabilimento di confezionamento:
ZAPI SpA - Z. Ind. III Strada, 12 - Conselve (PD)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto:
100-200-300-400-500-750 g
1-2-2,5-3-4-5-10-20-25 Kg

FRASI DI RISCHIO: **Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

NORME PRECAUZIONALI: **Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il CYREN 7,5 G è un insetticida granulare per la lotta contro gli insetti che vivono nel terreno e sulla sua superficie ed è efficace anche nei terreni umidi ed in quelli irrigui.

Il CYREN 7,5 G non trasmette odori sgradevoli ai vegetali e pertanto può essere utilizzato anche su terreni destinati a colture sensibili come le Bulbose ed il Tabacco.

Il CYREN 7,5 G si impiega per la difesa delle seguenti colture: **Barbabietola da zucchero, Mais, Tabacco, Patata, Oleaginose (Girasole, Soia), Cavoli (Cavoli ad infiorescenza, Cavolo cappuccio, Cavolo cinese, Cavolo rapa), Solanacee (Pomodoro, Peperone, Melanzana), Fagiolo, Pisello, Carota, Cipolla, Colture floreali ed ornamentali.**

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il CYREN 7,5 G è consigliato per la disinfestazione del terreno contro Elateridi (Agriotes spp.), Nottue (Mamestra brassicae, Agrotis spp., ecc.), Grillotalpa (Gryllotalpa gryllotalpa). Maggiolino (Melolontha melolontha), Tipule (Tipula spp.), Bibio (Bibio ortolani), Mosca del cavolo (Delia radicum), Formiche (Tatramorium spp., Formica spp.) alla dose di **32-40 Kg** per ettaro, incorporandolo al terreno con leggera erpicatura o fresatura. Nel caso di trattamenti localizzati il CYREN 7,5 G viene distribuito alla dose di **10-16 Kg/ha** nei solchi preparati per la semina o per il trapianto. Su terreni molto leggeri si consiglia di attenersi alle dosi minime. Nella distribuzione del prodotto in miscela con concimi, è necessario che la granulometria dei singoli componenti non sia molto diversa; in caso contrario non si avrebbe una uniforme distribuzione dei prodotti.

COMPATIBILITÀ: Il CYREN 7,5 G, data la sua formulazione granulare, non si applica in miscela con altri formulati.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è nocivo per i gli insetti utili, il bestiame e gli animali domestici.

Sospendere i trattamenti 120 giorni prima della raccolta per soia e girasole; 60 giorni per barbabietola da zucchero, tabacco e patata; 30 giorni per mais; 21 giorni per pomodoro, peperone, carota e cipolla; 15 giorni per le altre colture.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

D.L. n. 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CYREN 7,5 G

GRANULARE

INSETTICIDA PER LA LOTTA CONTRO GLI INSETTI DEL TERRENO DA APPLICARE PRIMA DELLA SEMINA

CYREN 7,5 G Registrazione del Ministero della Sanità n. 8841 del 06/05/96

Composizione:		
CLORPIRIFOS puro	g.	7,5
Coformulanti q.b.a	g.	100

Contenuto: **100 g**

Partita n.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CHEMINOVA A/S

Thyborønvej 78 - DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 - DK 7673 Harboøre - Danimarca
SCAM Srl - Via Bellaria, 164 - Modena
ISAGRO SpA - Via Nettunense Km. 23,400 - Aprilia (LT)
Stabilimento di confezionamento:
ZAPI SpA - Z. Ind. III Strada, 12 - Conselve (PD)

FRASI DI RISCHIO: **Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

NORME PRECAUZIONALI: **Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

D.L. n. 65/2003

NOVAMITRON

(Granuli idrodispersibili)

ERBICIDA SELETTIVO DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8993 dell' 11/11/96

CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (DANIMARCA)
Distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via R. Gigante, 18/20 – 00143 Roma

Composizione		
METAMITRON puro		g. 70
Coadiuvanti	q.b. a	g. 100

Partita n°
Contenuto
Kg. 1-5-10-20

NOCIVO

L'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
BAYER AG - Dormagen, Leverkusen (Germania)
A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (Terni)
Stabilimento di formulazione:
SCHIRM GmbH – Divisione SIDECO - Lubecca (Germania)
Stabilimento di confezionamento:
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (Bergamo)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

NOVAMITRON è un erbicida selettivo per la barbabietola da zucchero a semina primaverile. Agisce per assorbimento radicale ed anche per via fogliare.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

NOVAMITRON è indicato contro le seguenti infestanti: *Alopecurus myosuroides, Avena spp., Amaranthus spp., Amaranthus retroflexus, Anagallis spp., Stachys annua, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Echinochloa crus-galli, Fumaria officinalis, Galinsoga parviflora, Matricaria spp., Papaver rhoeas, Poa annua, Polygonum aviculare, Phalaris spp., Polygonum persicaria, Solanum nigrum, Stellaria media, Veronica spp., Polygonum convolvulus.*

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
- Intervento di pre-semina anticipata (da fine ottobre a metà gennaio)
Kg 4-5 per ettaro in 600 litri di acqua con terreno perfettamente preparato, esente da eventuali infestanti già presenti.
- Pre-semina
Kg 3-5 per ettaro in 600 litri di acqua con interramento del prodotto.
- Post-emergenza
Kg 1-1,5 per ettaro miscelato con Fenmedifam (1-3 litri/ha di formulati al 16%) in 300 litri di acqua e trattando con piantine di bietole nello stadio delle 2-4 foglie vere.

Nel caso si debba intervenire in trattamenti più tardivi impiegare Kg 2-3 per ettaro di prodotto in miscela con litri 2-3 di Fenmedifam (16%) con l'aggiunta di litri 0,5-1 di olio bianco. Effettuare il trattamento in assenza di vento e con terreno ben lavorato.
Le dosi maggiori sono riferite per impieghi su terreni pesanti.

COMPATIBILITÀ

NOVAMITRON si può impiegare in miscela con altri erbicidi utilizzabili per il diserbo della barbabietola da zucchero.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

DL n 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

KLARO

(Concentrato solubile)

ERBICIDA SISTEMICO DI POST-EMERGENZA CONTRO LE MALERBE ANNUALI E PERENNI

KLARO Registrazione del Ministero della Sanità n. 9011del 02/12/96

CHEMINOVA A/S

Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)

Distribuito da:

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via Riccardo Gigante, 18/20 - 00143 Roma

Contenuto L. 0,1-0,2-0,25-0,5-1-2-5-10-20-25-50 Partita n°

Composizione
GLIFOSATE acido puro g. 30,9 (=360 g/l)
(da sale isopropilamminico pari a g. 41,2)
Coformulanti q.b. a g. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o solo formulazione):
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 - DK-7673 Harboøre (Danimarca)
Stabilimenti di confezionamento:
SCAM Srl - Via Bellaria, 164 – Modena
ZAPI SpA - Z. Ind. III Strada, 12 - Conselve (PD)

FRASI DI RISCHIO: **Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

KLARO è un erbicida sistemico impiegato in post-emergenza, che agisce per assorbimento fogliare e viene traslocato sino alle radici e agli organi di propagazione con inibizione della sintesi proteica con effetto visivo dopo alcuni giorni con ingiallimento ed arrossamento delle infestanti e successivo disseccamento.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

- **<u>TRATTAMENTI IN POST-EMERGENZA DELLE INFESTANTI</u>: Agrumi, drupacee, pomacee, vite, olivo, asparago** (pre-emergenza), **pisello, fagiolino, pomodoro, melanzana, carota, barbabietola da zucchero, mais, erba medica.**
- **<u>TERRENI SENZA COLTURE</u> prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, mais, riso, soia, prati e vivai.**
- **<u>INCOLTI</u>: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali e industriali, aree ed opere civili.**

<u>**Nota**</u>: L'impiego su mais è consentito solo nelle interfile; da non impiegare in pre-raccolta.
Non spruzzare le parti legnose e verdi in quanto il prodotto non è selettivo.

Impiegare 3-5 ettolitri di acqua per ettaro con le seguenti dosi:

- **litri 3-5/ha** contro la maggior parte delle infestanti annuali (*Avena spp., Apera spica-venti, Alopecurus m., Poa spp., Echinochloa crus-galli, Lolium spp., Setaria spp., Panicum, Phelaris, Bromus spp., Adonis spp., Galium aparine, Camomilla, Galeopsis, Daucus carota, Thlaspi, Euphorbia spp., Lamium spp., Fumaria officinalis, Galinsoga, Geranium, Sonchus, Myosotis, Urtica, Papavero, Poa arvensis, Raphanus, Spergula, Diplotaxis, Stachys annua, Vicia spp., Veronica, Viola, Plantago, Rumex, Taraxacum, Tussilago*);
- **litri 4-5/ha** contro *Agropyron repens, Sorghum halepense, Ranunculus spp.*; su *Sorghetta* alta 30-40 cm usare la dose di litri 5,5 per ettaro, se invece è all'inizio della fioritura litri 4 per ettaro;
- **litri 5-6/ha** contro *Cirsium arvense* (in fioritura), *Cyperus spp.* (alla fioritura), *Artemisia vulgaris, Potentilla spp., Plantago spp., Taraxacum officinale, Rumex spp., Felci*;
- **litri 8-10/ha** contro *Cynodon dactylon, Sonchus arvensis, Convolvulus arvensis* (alla fioritura), *Urtica spp., Daucus carota, Tussilago farfara, Cannuccia* (alta 50-80 cm).
- **litri 10-12/ha** contro *Convolvulus arvensis* all'inizio dello sviluppo (alto 30 cm.).

Con presenza di infestanti nate da seme far seguire un trattamento con un prodotto residuale (es. Diuron). Se dopo il trattamento, entro un massimo di 8 ore, vi fosse una pioggia essa ridurrebbe l'efficacia del trattamento; evitare la deriva; togliere i succhioni e ricacci sulle colture arboree prima del trattamento; non lavorare il terreno per 3 settimane dopo il trattamento; tra il trattamento e l'impiego di prodotti residuali far trascorrere almeno 1-2 settimane.
Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, è inefficace.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto è fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Dopo il trattamento lavare accuratamente tutte le attrezzature impiegate.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Durante il trattamento tenere lontano animali domestici e bestiame.

<u>Attenzione</u>: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

D.L. n. 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

KLARO

(Concentrato solubile)
ERBICIDA SISTEMICO DI POST-EMERGENZA
CONTRO LE MALERBE ANNUALI E PERENNI

KLARO Registrazione del Ministero della Sanità n. 9011del 02/12/96

CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)

Distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 - 00143 Roma

Contenuto **100 ml** Partita n°

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione		
GLIFOSATE acido puro		g. 30,9 (=360 g/l)
(da sale isopropilamminico pari a g. 41,2)		
Coformulanti	q.b. a	g. 100

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o solo formulazione):
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 - DK-7673 Harboøre (Danimarca)
Stabilimenti di confezionamento:
SCAM Srl - Via Bellaria, 164 – Modena
ZAPI SpA - Z. Ind. III Strada, 12 - Conselve (PD)

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

D.L. n.65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CYREN 44 EC

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)

INSETTICIDA DOTATO DI ENERGICA AZIONE PER CONTATTO, PER INGESTIONE E PER INALAZIONE

CYREN 44 EC Registrazione del Ministero della Sanità n. 9153 del 07.03. 97

CHEMINOVA A/S

Thyborønvej 78 - DK 7673 Harboøre - Danimarca

Distribuito da:

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via Riccardo Gigante, 18/20 - 00143 Roma

Composizione:	
CLORPIRIFOS puro	gr. 44,55 (=480 g/l)
Coformulanti q.b.a	gr. 100

Partita n. Contenuto: 0,100-0,250-0,500-1-5-10-20 L

Contiene Nafta solvente (petrolio) aromatica pesante

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione:

CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 - DK 7673 Harboøre - Danimarca

DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

SCAM Srl - Via Bellaria, 164 - Modena

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Irritante per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI, SETTORI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Il prodotto si impiega alla prima comparsa dei fitoparassiti sulle colture di seguito riportate. Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con attrezzature a volume normale (1500-1800 l/ha) per le pomacee, le drupacee e gli agrumi, 1000 l/ha per la vite, 600-1200 l/ha per il pioppo, 600-1000 l/ha per le colture erbacee, in funzione dello sviluppo vegetativo. Qualora si somministrassero volumi d'acqua diversi da quelli indicati, si raccomanda di attenersi ai quantitativi per ettaro descritti.

Agrumi: contro Cocciniglie (Saissetia oleae, Coccus experidum, ecc.), Dialeurodidi (Dialeurodes citri), Aleurocidi (Aleurotrixus floccosus) 110 ml/hl (1,7-2 l/ha) nei trattamenti alla parte aerea; contro Formiche (Formica argentina) 220 ml/hl (2,2 l/ha) irrorando il terreno in ragione di 10 hl/ha.

Melo e Pero: contro Cocciniglie (Quadraspidiotus perniciosus, ecc.), Carpocapsa (Carpocapsa pomonella), Tortricidi ricamatori (Archips spp., Pandemis heparana, Capua reticulana, ecc.), Sesia (Synanthedon myopaeformis) 85-110 ml/hl (1,2-2 l/ha). Trattamento alla parte aerea. Il prodotto esplica una certa azione anche nei confronti di Afidi e Psille eventualmente presenti.

Vite: contro Tignole (Lobesia botrana e Clysia ambiguella): 85-110 ml/hl (0,85-1 l/ha). Trattamento alla parte aerea alla comparsa delle prime larve.

Pesco: contro Tignola orientale (Cydia molesta), Anarsia (Anarsia lineatella), Mosca della frutta (Ceratitis capitata) 85-110 ml/hl (1,2-2 l/ha). Trattamento alla parte aerea.

Pioppo: contro Criptorrinco (Chryptorrhynchus lapathi): 220 ml/hl (1,3-2,6 l/ha). Trattamento alla parte aerea utilizzando 1-3 litri di sospensione per pianta.

Barbabietola da zucchero: contro Altica (Chaetocnema tibialis), Atomaria (Atomaria linearis): 850-1100 ml/ha. Contro Nottue (Agrotis spp., ecc): 850-1100 ml/ha. Irrorazione a pieno campo in 800-1000 litri di acqua. Trattamento con esche: 1,25 litri di prodotto in 50 Kg/ha di esca a base di crusca e melasso.

Soia: contro Cimici (Nezara viridula), Lepidotteri fogliari (Vanessa cardui, Choristoneura lafauryana): 1,2 l/ha. Ripetere il trattamento se necessario. Contro Nottue (Agrotis spp., ecc): 850-1100 ml/ha. Irrorazione a pieno campo in 800-1000 litri di acqua. Trattamento con esche: 1,25 litri di prodotto in 50 Kg/ha di esca a base di crusca e melasso.

Mais: contro Piralide (Ostrinia nubilalis), Sesamia (Sesamia cretica):

- trattamento contro la prima generazione, quando la coltura ha raggiunto uno sviluppo compreso tra i 60 ed i 100 cm di altezza: 1-1,2 l/ha;
- trattamento contro la seconda generazione, a fine luglio-agosto: 1,2-1,7 l/ha. In questo caso, data l'altezza ormai raggiunta dalla coltura, i migliori risultati si ottengono con attrezzature appositamente configurate ("trampoli"). Qualora non si disponesse dei mezzi descritti, è possibile effettuare il trattamento dai lati dell'appezzamento con lance o "cannoni" a forte pressione. Contro Nottue (Agrotis spp., ecc): 850-1100 ml/ha. Irrorazione a pieno campo in 800-1000 litri di acqua. Trattamento con esche: 1,25 litri di prodotto in 50 Kg/ha di esca a base di crusca e melasso.

Patata: contro Dorifora (Leptinotarsa decemlineata) 1,2-1,6 l/ha. Ripetere il trattamento se necessario. Contro Nottue (Agrotis spp., ecc): 850-1100 ml/ha. Irrorazione a pieno campo in 800-1000 litri di acqua. Trattamento con esche: 1,25 litri di prodotto in 50 Kg/ha di esca a base di crusca e melasso.

Pomodoro: contro Dorifora (Leptinotarsa decemlineata), Piralide (Ostrinia nubilalis), altri Lepidotteri (es. Scopula initaria): 850-1100 ml/ha. Contro Nottue (Agrotis spp., ecc): 850-1100 ml/ha. Irrorazione a pieno campo in 800-1000 litri di acqua. Trattamento con esche: 1,25 litri di prodotto in 50 Kg/ha di esca a base di crusca e melasso.

Fagiolo e Pisello: contro Piralidi (Etiella zinckenella, Ostrinia nubilalis), altri Lepidotteri (es. Laspereysia nigricana): 850-1100 ml/ha. Contro Nottue (Agrotis spp., ecc): 850-1100 ml/ha. Irrorazione a pieno campo in 800-1000 litri di acqua. Trattamento con esche: 1,25 litri di prodotto in 50 Kg/ha di esca a base di crusca e melasso.

Cavoli (Cavoli ad infiorescenza, Cavolo cappuccio, Cavolo cinese, Cavolo rapa) trattamenti al terreno destinato alle colture: contro Nottue (Agrotis spp., ecc): 850-1100 ml/ha. Irrorazione a pieno campo in 800-1000 litri di acqua. Trattamento con esche: 1,25 litri di prodotto in 50 Kg/ha di esca a base di crusca e melasso.

Carota: contro Depressaria (Depressaria marcella), Rapaiola (Pieris rapae): 850-1100 ml/ha. Contro Nottue (Agrotis spp., ecc): 850-1100 ml/ha. Irrorazione a pieno campo in 800-1000 litri di acqua. Trattamento con esche: 1,25 litri di prodotto in 50 Kg/ha di esca a base di crusca e melasso.

DL 65/2003

Cipolla: contro Tripidi (Thrips tabaci): 850-1100 ml/ha.
Tabacco: contro Nottue (Agrotis spp., Mamestra brassicae, Peridroma saucla): 850-1100 ml/ha. Irrorazione a pieno campo in 800-1000 litri di acqua. Trattamento con esche: 1,25 litri di prodotto in 50 Kg/ha di esca a base di crusca e melasso.
Girasole: contro Nottue (Agrotis spp., ecc): 850-1100 ml/ha. Irrorazione a pieno campo in 800-1000 litri di acqua. Trattamento con esche: 1,25 litri di prodotto in 50 Kg/ha di esca a base di crusca e melasso.
Asparago: contro Nottue (Agrotis spp., ecc): 850-1100 ml/ha. Irrorazione a pieno campo in 800-1000 litri di acqua. Trattamento con esche: 1,25 litri di prodotto in 50 Kg/ha di esca a base di crusca e melasso.
Peperone: contro Nottue (Agrotis spp., ecc): 850-1100 ml/ha. Irrorazione a pieno campo in 800-1000 litri di acqua. Trattamento con esche: 1,25 litri di prodotto in 50 Kg/ha di esca a base di crusca e melasso.
Melanzana: contro Nottue (Agrotis spp., ecc): 850-1100 ml/ha. Irrorazione a pieno campo in 800-1000 litri di acqua. Trattamento con esche: 1,25 litri di prodotto in 50 Kg/ha di esca a base di crusca e melasso.
Floreali ed ornamentali (in pieno campo e in serra): contro Aleurodidi (Trialeurodes vaporaroirum, Bemisia tabaci), Tripidi (Thrips tabaci, ecc.), Tortricidi (Cacoecia pronubana, ecc.): 100 ml/hl (0,6-1 l/ha). Effettuare l'intervento solo dopo essersi accertati della selettività del prodotto nei confronti della coltura mediante saggi preliminari. Contro Nottue (Agrotis spp., ecc), Cocciniglie (Saissetia oleae, ecc.), Oziorrinchi (Otiorinchus spp.): 1,25 l/ha. Trattamento con esche: 1,25 litri di prodotto in 50 Kg/ha di esca a base di crusca e melasso.

COMPATIBILITÀ
Il CYREN 44 EC non è miscelabile con i polisolfuri di calcio e di bario.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non effettuare trattamenti sugli agrumi nei mesi compresi tra gennaio e aprile.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per i gli insetti utili, è nocivo per il bestiame e gli animali domestici.

AVVERTENZE
- **Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.**
- **Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.**

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER FAGIOLO, PISELLO, MELANZANA E ASPARAGO; 21 GIORNI PER POMODORO, CAROTA, CIPOLLA E PEPERONE; 30 GIORNI PER MELO, PERO, PESCO, VITE, MAIS E PATATA; 60 GIORNI PER AGRUMI, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E TABACCO; 120 GIORNI PER SOIA E GIRASOLE.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

DL 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CYREN 44 EC

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)

INSETTICIDA DOTATO DI ENERGICA AZIONE PER CONTATTO, PER INGESTIONE E PER INALAZIONE

CYREN 44 EC Registrazione del Ministero della Sanità n. 9153 del 07.03. 97

CHEMINOVA A/S

Thyborønvej 78 - DK 7673 Harboøre - Danimarca

Distribuito da:

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via Riccardo Gigante, 18/20 - 00143 Roma

Composizione:
CLORPIRIFOS puro gr. 44,55 (=480 g/l)
Coformulanti q.b.a gr. 100

Partita n.

Contenuto: 100 ml

NOCIVO

Contiene Nafta solvente (petrolio) aromatica pesante

Stabilimenti di produzione:

CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 - DK 7673 Harboøre - Danimarca

DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

SCAM Srl - Via Bellaria, 164 - Modena

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Irritante per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMART EW

(emulsione olio/acqua)

INSETTICIDA PER USO AGRICOLO

SMART EW Registrazione del Ministero della Sanità n. 9949 del 12/02/99

Composizione:	
MALATHION puro	g. 40 (=440 g/l)
Coformulanti q.b.a	g. 100

Partita n.

CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78 - DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Stabilimento di produzione:
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)

Stabilimento di formulazione:
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)

e Stabilimenti di confezionamento:
DIACHEM SpA – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
BAYER CROPSCIENCE Srl – Filago (BG)
ZAPI SpA - Z. Ind. III Strada, 12 - Conselve (PD)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto:
50 ml-100 ml-250 ml
0,500-1-5-20 L.

FRASI DI RISCHIO: **Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

NORME PRECAUZIONALI: **Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

APPLICAZIONI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Lo SMART EW permette di effettuare la lotta contro i sottoindicati parassiti delle seguenti colture: **AGRUMI (Arancio, Mandarino, Limone, Clementino, Bergamotto, Cedro, Pompelmo, Pomelo, Tangerino, Limetta, Chinotto, Kumquat); POMACEE (Pero, Melo, Cotogno); DRUPACEE (Pesco, Nettarine, Percoche, Albicocco, Ciliegio, Susino, Mandorlo); FRAGOLA; FRUTTIFERI MINORI (Actinidia, Caco, Fico, Nespolo e Sorbo, Ribes nero e rosso, Uva spina, Mirtillo rosso, Mirtillo nero, Lampone, Rovo, Corbezzolo, Melograno); FRUTTIFERI DA FRUTTA A GUSCIO (Castagno, Noce, Nocciolo, Pino da pinoli, Pistacchio); VITE; OLIVO; CAVOLI (Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo verza, Cavolo bianco, Cavolo rosso, Cavolo cappuccio, Cavolo cinese, Cavolo di Bruxelles, Cavolo rapa, Cavolo nero); CARCIOFO; ASPARAGO; ORTAGGI A FOGLIA (Insalate: Lattuga, Cicoria, Indivia, Radicchio, Scarola, Rucola, Valerianella; Spinacio, Bietole da costa e da foglia, Cardo, Sedano, Finocchio, Prezzemolo, Erba cipollina, Basilico); CUCURBITACEE: (Cocomero, Melone, Zucca, Zucchino, Cetriolo); SOLANACEE (Pomodoro, Peperone, Melanzana); LEGUMI (Fagiolo, Fava, Pisello, Cece, Lenticchia, Lupino, Fagiolino, Pisello mangiatutto); ORTAGGI A RADICE (Carota, Bietola rossa, Bietola da orto, Cicoria da radice, Rapa, Ravanello, Navone, Rutabaga, Rafano, Pastinaca, Sedano rapa, Patata dolce); ORTAGGI A BULBO (Cipolla, Aglio, Scalogno, Porro); PATATA; BARBABIETOLA DA ZUCCHERO; CEREALI: Frumento, Orzo, Mais, Sorgo, Riso; CEREALI MINORI: Segale, Triticale, Avena; OLEAGINOSE: Girasole, Colza, Ravizzone, Cotone, Canapa; FORAGGERE LEGUMINOSE; TABACCO; FLOREALI E ORNAMENTALI; FORESTALI; PIOPPO**

alle seguenti dosi:

- contro Cocciniglie in genere .... **300-360 ml/hl**
- contro Afidi, Altiche, Antonomi, Apion, Bombici, Cavolaia, Cassida, Cetonie, Cimici, Criocere, Fitonomi, Fleotribo, Misurine, Oziorrinchi, Nottue, Perrisie, Psille, Processionaria, Rinchiti, Scrivani, Sigarai, Tentredini, Tignole, Tortrici .... **180-250 ml/hl**
- contro Aleurodidi, Cecidomie, Cicaline, Mosca, Tingidi, Tripidi .... **120-150 ml/hl**

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Stemperare la giusta dose di prodotto in poca acqua e poi, sempre continuando ad agitare, aggiungere lentamente il quantitativo di acqua necessario a raggiungere la concentrazione voluta.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina. Non è comunque garantita la compatibilità con i formulati di altre Ditte.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Per le colture in serra sono sempre consigliabili saggi preliminari in funzione delle specifiche microcondizioni ambientali.

RISCHI DI NOCIVITÀ

E' tossico verso insetti utili, api, animali domestici e bestiame. Non trattare durante la fioritura. Non far pascolare o non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente, prima che siano trascorsi almeno 20 giorni dal trattamento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

DL 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

SMART EW

(emulsione olio/acqua)

INSETTICIDA PER USO AGRICOLO

SMART EW Registrazione del Ministero della Sanità n. 9949 del 12/02/99

Composizione:
MALATHION puro g. 40 (=440 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

Partita n.

CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78 - DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Stabilimento di produzione:
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)

Stabilimento di formulazione:
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)

e Stabilimenti di confezionamento:
DIACHEM SpA – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
BAYER CROPSCIENCE Srl – Filago (BG)
ZAPI SpA - Z. Ind. III Strada, 12 - Conselve (PD)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto:
50 ml-100 ml

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

GLYFOS ULTRA

(Concentrato solubile)

DISERBANTE SISTEMICO DI POST-EMERGENZA AD AZIONE FOGLIARE

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10209 del 02/12/1999

CHEMINOVA A/S

Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione
GLIFOSATE ACIDO puro g. 30,7 (=360 g/l)
(pari a sale isopropilamminico g. 41,8)
Coformulanti q.b. a g. 100

Partita n°
Contenuto
L. 0,25-0,5-1-5-10-20-25-50

Stabilimento di produzione: **CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (DK)**

FRASI DI RISCHIO: Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il GLYFOS ULTRA è un diserbante di post-emergenza efficace su tutte le infestanti monocotiledoni e dicotileconi, annuali e perenni. Viene assorbito dalle foglie e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perennanti, che vengono pure devitalizzati. Il GLYFOS ULTRA è rapidamente disattivato a contatto con il terreno. Non possecendo il prodotto efficacia di pre-emergenza, onde ottenere un diserbo duraturo, è possibile eventualmente utilizzare il GLYFOS ULTRA in miscela con un erbicida ad azione residuale (es. Diuron) per evitare la nascita delle infestanti provenienti da semi che possono germinare dopo l'applicazione del formulato da solo. L'effetto visivo dell'azione del GLYFOS ULTRA consiste in un ingiallimento o arrossamento ed in un appassimento graduale che si risolvono nella morte dell'infestante anche a livello dell'apparato radicale. La durata di questo processo è correlata alle condizioni ambientali.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto va usato per irrorazione sulle infestanti ben sviluppate, distribuendo volumi relativamente bassi (100-300 litri) di poltiglia per ettaro, in modo da bagnare uniformemente le malerbe, senza provocare perdite per gocciolamento. Impiegare pompe a bassa pressione (max 2 atm) e barre o lance munite di ugelli a specchio o a ventaglio che distribuiscono gocce di grosse dimensioni.

CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco, purchè ben lignificato: vite, agrumi, melo, pero, olivo, noce.
Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco, anche se ben lignificato: drupacee, mandorlo, pioppo.
Colture da diserbare esclusivamente utilizzando attrezzature selettive (lambenti, umettanti o a goccia): carciofo, fava, pisello, fagiolino, patata, pomodoro, melanzana, carota, barbabietola da zucchero, soia, mais (solo interfila), erba medica, prati, rosa; vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture da diserbare prima dell'emergenza: asparago.
Terreni in assenza della coltura (fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, prati, vivai): prima della semina o del trapianto (queste operazioni vanno successivamente effettuate non prima di 48 ore dal trattamento), dopo il raccolto o a fine ciclo.
Aree non agricole: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili.

DOSI D'IMPIEGO
trattamenti possono essere effettuati su tutta la superficie o su fasce lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma. Le dosi d'impiego, riferite ad ettaro di superficie effettivamente trattata, variano in funzione della specie delle infestanti presenti:
- 3,5 litri/ha contro la maggior parte delle erbe annuali
- 4-5 litri/ha contro Sorghum halepense, Agropyrum repens, Ranunculus spp.
- 5-7 litri/ha contro Cyperus rotundus, Cirsium arvense (in fioritura), Artemisia vulgaris, Potentilla spp , Plantago spp , Taraxacum officinale, Rumex spp., Felci. Contro il Cyperus rotundus, per ottenere un risultato più duraturo, si può effettuare un primo trattamento alla dose di 5 litri/ha ripetendo l'intervento sui ricacci alla dose di 4 litri/ha;
- 8-10 litri/ha contro Convolvulus arvensis ben sviluppato (inizio fioritura), Cynodon dactylon, Urtica spp., Dacus carota, Sonchus arvensis, Tussilago farfara, Cannucce (alte 50-80 cm).
- 10-12 litri/ha contro Convolvulus arvensis all'inizio dello sviluppo (lungo almeno 30 cm.).
Per interventi su infestazioni a macchia irrorare con concentrazioni del prodotto in acqua dell' 1 - 2% contro le infestanti annuali e del 2 - 5% contro le perenni.

NOTE IMPORTANTI: Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante. Non bagnare il tronco, specialmente se non è ben lignificato o con ferite. Per evitare la deriva usare ugelli protetti da coni o schermi che evitino alla poltiglia erbicida di giungere a contatto con la vegetazione delle piante, specialmente se in forma di allevamento basse.
AVVERTENZE: Le piogge che cadono entro 6 ore dall'applicazione ne riducono l'efficacia. Le temperature medie e l'alta umidità dell'aria facilitando la crescita delle infestanti, favoriscono l'esito del diserbo; le temperature basse o il caldo estivo non limitano l'efficacia del prodotto purché le infestanti siano verdi, vitali e non essiccate. Le perennanti sono meglio controllate se ben sviluppate al momento del trattamento; alcune dicotiledoni (es. Vilucchio, Stoppione, Artemisia) sono più sensibili se in fioritura o in uno stadio più avanzato. Arature, fresature, tagli delle erbe o pascolo di animali prima del trattamento riducono l'efficacia del diserbo. Dopo il trattamento su erbe perennanti lasciar traslocare il prodotto negli organi sotterranei per 2 o 3 settimane prima di procedere a lavorazione del terreno.
Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, ha efficacia ridotta
Non impiegare per la miscelazione, distribuzione o conservazione del prodotto recipienti galvanizzati (es. zincati) o in acciaio se non protetti da apposite vernici plastiche.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare (rami non lignificati, succhioni del tronco e del portainnesto) di tutte le colture agricole. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente, con tre risciacqui successivi di acqua, le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi. Non scaricare le acque utilizzate per i lavaggi in acque destinate all'irrigazione.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Distribuito da
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl – Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 Roma

D.L. n. 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

SPLENDOUR

Insetticida in sospensione concentrata

Registrazione del Ministero della Salute n. 11218 del 22/02/02

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)

Distribuito da
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 Roma

Partita n°

COMPOSIZIONE		
Deltametrina pura	g.	2,39 (= 24,25 g/l)
Coformulanti q.b. a	g. 100	

Contenuto
ml 10-20-25-50-100
L 0,250-0,500-1-5

Stabilimenti di produzione:
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)
DIACHEM SpA – U.P. SIFA – Caravaggio (Bergamo)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica e di rianimazione.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

SPLENDOUR è un insetticida che agisce per contatto ed ingestione, con ampio spettro di attività contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO (ml/hl di acqua)

- **Frutticoltura (melo, pero, pesco, albicocco, pruno, ciliegio)**: contro psilla 90 ml; afide verde del melo, afide del pesco (Myzus spp., Hyalopterus spp., Brachycaudus persicae) 35-60 ml; cocciniglia di San Josè 60-90 ml (in trattamenti estivi contro neanidi mobili). Contro carpocapsa 35 ml; cidia e anarsia 60-80 ml; capua, cacoccia e altri tortricidi 35-60 ml; microlepidotteri del melo e del pero 35-60 ml. Contro antonomo, maggiolino, tentredini, tripidi, cecidomidi e mosca della frutta 35-60 ml.
- **Viticoltura**: contro tignole 50-70 ml; piralide, nottue, cicaline, afidi, sigaraio 35-60 ml.
- **Agrumicoltura**: contro afidi 50-60 ml; aleurodidi e Saissetia 50-70 ml; mosca degli agrumi 60 ml.
- **Olivicoltura**: contro Saissetia 50-70 ml; tignola (Prays oleae) e tripide 60 ml; mosca delle olive 60 ml in trattamento preventivo.
- **Orticoltura (pomodoro, patata, peperone, melanzana, cavolo, cetriolo, insalate, spinacio, asparago, carciofo, pisello, fagiolino, fagiolo, fava, cipolla, porro, carota, sedano), fragola**: contro dorifora, altiche, cavolaia, nottue, tripidi e tentredini 35 ml; afidi, aleurodidi, cimici, piralide, casside, tignola, mosca e depressaria 60 ml.
- **Cereali**
- **frumento, mais** (trattamenti primaverili-estivi): contro nottue, tripidi e afidi del frumento 35 ml; altri afidi, cimici, piralidi 60 ml,
- **frumento, orzo** (trattamenti autunnali): contro afidi vettori del nanismo giallo 0,35-0,6 l/ha allo stadio di 1-3 foglie, ripetendo, se necessario, il trattamento dopo 15 giorni circa.
- **Barbabietola da zucchero**: contro altiche e nottue 35 ml; cleono e lisso 60 ml.
- **Colza**: contro altiche, meligete, afidi, punteruoli 0,35-0,6 l/ha.
- **Soia**: contro nottue, cimici, tortricidi, vanessa, altica, afidi 0,35-0,6 l/ha.
- **Tabacco**: contro nottue, afidi, tripidi, pulce (Epitrix) 0,35-0,6 l/ha.
- **Cotone**: contro nottue, piralide, tignola, cicalina, tripidi, lygus 0,35 l/ha.
- **Funghi**: contro ditteri, collemboli 35-60 ml.
- **Medicai**: contro cavalletta, intervenendo sui nuovi ricacci 5-10 giorni dopo lo sfalcio, 0,6 l/ha.
- **Pioppicoltura**
- **pioppo in vivaio**: contro gemmaiola, tarlo vespa 60 ml; contro criptorrinco, con trattamenti localizzati al tronco, 90-120 ml;
- **pioppo in piantagione**: contro criptorrinco, con trattamenti localizzati al tronco, 90-120 ml; contro saperda, con trattamenti localizzati al tronco, 180-240 ml; contro crisomelidi defogliatori: crisomele, crisomelidi minori e stilpnotia 35-60 ml.
- **Floricoltura** (in pieno campo e in serra): contro afidi, aleurodidi, tripidi, cetonie, maggiolino 60 ml; tortrici dei garofani (Bega e Epicoristode) 60-120 ml.
- **Vivai e colture ornamentali** (in pieno campo o in serra): contro afidi, cimice del platano (Corythuca), larve di lepidotteri, maggiolino 60 ml

Per preparare la miscela, versare la dose stabilita di SPLENDOUR nel quantitativo di acqua previsto, agitando la sospensione acquosa ottenuta.
Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro.
SPLENDOUR agisce per contatto e ingestione, occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato badando a che la bagnatura sia il più uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di un bagnante.
Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente, prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamento delle foglie.

COMPATIBILITÀ

SPLENDOUR non è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile è necessario aggiungere la dose di SPLENDOUR, preventivamente diluita in acqua, alla poltiglia fungicida già preparata, mantenendo l'agitazione. Si consiglia comunque di effettuare un saggio preliminare su poche piante. AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ - Il prodotto è nocivo per gli insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto su colza, 15 giorni per erba medica, soia e cotone, 7 giorni per cipolla, sedano e porro, 3 giorni per le altre colture.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

DL n. 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

SPLENDOUR

Insetticida in sospensione concentrata

Registrazione del Ministero della Salute n. 11218 del 22/02/02

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)

Distribuito da
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 Roma

Partita n°

COMPOSIZIONE

Deltametrina pura	g.	2,39 (= 24,25 g/l)
Coformulanti q.b. a	g.	100

Contenuto
ml 10-20-25-50-100

Stabilimenti di produzione: **CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)**
DIACHEM SpA – U.P. SIFA – Caravaggio (Bergamo)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aereee: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica e di rianimazione.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL n. 65/2003

GLYFOS PRO

(Concentrato solubile)

DISERBANTE SISTEMICO DI POST-EMERGENZA AD AZIONE FOGLIARE

Registrazione del Ministero della Salute n. 11494 del 24/10/2002

CHEMINOVA A/S

Thyborønvej 78 - DK-7673 Harboøre (Danimarca)

Distribuito da

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl – Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 Roma

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione		
GLIFOSATE ACIDO puro	g.	37,5 (=450 g/l)
(pari a sale isopropilamminico g. 50,6)		
Coformulanti q.b. a	g.	100

Partita n°

Contenuto
L. 0,25-0,5-1-5-10-20-25-50

Stabilimenti di produzione: **CHEMINOVA A/S Thyborønvej 78 - DK-7673 Harboøre (DK)**

FRASI DI RISCHIO: Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE - Il GLYFOS PRO è un diserbante di post-emergenza efficace su tutte le infestanti monocotiledoni e dicotiledoni, annuali e perenni. Viene assorbito dalle foglie e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perennanti, che vengono pure devitalizzati. Il GLYFOS PRO è rapidamente disattivato a contatto con il terreno. Non possedendo il prodotto efficacia di pre-emergenza, onde ottenere un diserbo duraturo, è possibile eventualmente utilizzare il GLYFOS PRO in miscela con un erbicida ad azione residuale (es. Diuron) per evitare la nascita delle infestanti provenienti da semi che possono germinare dopo l'applicazione del formulato da solo. L'effetto visivo dell'azione del GLYFOS PRO consiste in un ingiallimento o arrossamento ed in un appassimento graduale che si risolvono nella morte dell'infestante anche a livello dell'apparato radicale. La durata di questo processo è correlata alle condizioni ambientali.

MODALITÀ D'IMPIEGO - Il prodotto va usato per irrorazione sulle infestanti ben sviluppate, distribuendo volumi relativamente bassi (100-300 litri) di soluzione per ettaro, in modo da bagnare uniformemente le malerbe, senza provocare perdite per gocciolamento. Impiegare pompe a bassa pressione (max 2 atm) e barre o lance munite di ugelli a specchio o a ventaglio che distribuiscono gocce di grosse dimensioni.

CAMPI D'IMPIEGO

<u>Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco, purché ben lignificato</u>: vite, agrumi, melo, pero, olivo, noce.

<u>Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco, anche se ben lignificato</u>: drupacee, mandorlo.

<u>Colture da diserbare esclusivamente utilizzando attrezzature selettive (lambenti, umettanti o a goccia)</u>: carciofo, fava, pisello, fagiolino, patata, pomodoro, melanzana, carota, barbabietola da zucchero, soia, mais (solo interfila), erba medica, prati, rosa; vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.

<u>Colture da diserbare prima dell'emergenza</u>: asparago.

<u>Terreni in assenza della coltura</u> (fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, prati, vivai): prima della semina o del trapianto (queste operazioni vanno successivamente effettuate non prima di 48 ore dal trattamento), dopo il raccolto o a fine ciclo.

<u>Aree non agricole</u>: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili.

DOSI D'IMPIEGO

I trattamenti possono essere effettuati su tutta la superficie o su fasce lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma. Le dosi d'impiego, riferite ad ettaro di superficie effettivamente trattata, variano in funzione della specie delle infestanti presenti:

- 2,8 litri/ha contro la maggior parte delle erbe annuali, quali tutte le Graminacee e le Dicotiledoni diverse da quelle sotto specificate
- 3,2-4 litri/ha contro Sorghum halepense (Sorghetta), Agropyrum repens (Gramignone), Ranunculus spp (Ranuncolo).
- 4-5,6 litri/ha contro Cyperus rotundus (Cipollino), Cirsium arvense (Stoppione, in fioritura), Artemisia vulgaris (Artemisia), Potentilla spp. (Cinquefoglio), Plantago spp. (Piantaggine), Taraxacum officinale (Soffione), Rumex spp. (Romice), Felci. Contro il Cyperus rotundus, per ottenere un risultato più duraturo, si può effettuare un primo trattamento alla dose di 4 litri/ha ripetendo l'intervento sui ricacci alla dose di 3,2 litri/ha;
- 6,4-8 litri/ha contro Convolvulus arvensis (Vilucchio) ben sviluppato (inizio fioritura), Cynodon dactylon (Gramigna), Urtica spp. (Ortica), Daucus carota (Carota selv.), Sonchus arvensis (Crispino), Tussilago farfara (Farfaro), Phragmites spp. (Cannucce, alte 50-80 cm)
- 8-9,6 litri/ha contro Convolvulus arvensis (Vilucchio) all'inizio dello sviluppo (lungo almeno 30 cm.).

Per interventi su infestazioni a macchia irrorare con concentrazioni del prodotto in acqua dello 0,8-1,6% contro le infestanti annuali e dell'1,6-4% contro le perenni.

NOTE IMPORTANTI: Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante. Non bagnare il tronco, specialmente se non è ben lignificato o con ferite. Per evitare la deriva usare ugelli protetti da coni o schermi che evitino alla soluzione erbicida di giungere a contatto con la vegetazione delle piante, specialmente se in forma di allevamento basse.

AVVERTENZE: Le piogge che cadono entro 6 ore dall'applicazione ne riducono l'efficacia. Le temperature medie e l'alta umidità dell'aria facilitando la crescita delle infestanti, favoriscono l'esito del diserbo; le temperature basse o il caldo estivo non limitano l'efficacia del prodotto purché le infestanti siano verdi, vitali e non essiccate. Le perennanti sono meglio controllate se ben sviluppate al momento del trattamento; alcune dicotiledoni (es. Vilucchio, Stoppione, Artemisia) sono più sensibili se in fioritura o in uno stadio più avanzato. Arature, fresature, tagli delle erbe o pascolo di animali prima del trattamento riducono l'efficacia del diserbo. Dopo il trattamento su erbe perennanti lasciar traslocare il prodotto negli organi sotterranei per 2 o 3 settimane prima di procedere a lavorazione del terreno.

Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, ha efficacia ridotta.

Non impiegare per la miscelazione, distribuzione o conservazione del prodotto recipienti galvanizzati (es. zincati) o in acciaio se non protetti da apposite vernici plastiche.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ - Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare (rami non lignificati, succhioni del tronco e del portainnesto) di tutte le colture agricole. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente, con tre risciacqui successivi di acqua, le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi. Non scaricare le acque utilizzate per i lavaggi in acque destinate all'irrigazione.

<u>Avvertenza</u>: per impieghi in aree ed opere civili è obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

D.L. n. 65/2003

KERNEL

(Concentrato solubile)

DISERBANTE SISTEMICO DI POST-EMERGENZA AD AZIONE FOGLIARE

KERNEL Reg. del Ministero della Salute n.11736 del 31/07/2003

Composizione		
GLIFOSATE ACIDO puro		g. 39,7 (=480 g/l)
(pari a sale isopropilamminico g. 53,6)		
Coformulanti	q.b. a	g. 100

CHEMINOVA A/S

Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)

Distribuito da:

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl – Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 Roma

Stabilimento di produzione: CHEMINOVA A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (DK)

Contenuto L. 0,25-0,5-1-5-10-20-25-50 Partita n°

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: **Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE - Il KERNEL è un diserbante di post-emergenza efficace su tutte le infestanti monocotiledoni e dicotiledoni, annuali e perenni. Viene assorbito dalle foglie e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perennanti, che vengono pure devitalizzati. Assorbimento e traslocazione vengono favoriti dall'aggiunta alla miscela da irrorare di solfato ammonico. Il KERNEL è rapidamente disattivato a contatto con il terreno. Non possedendo il prodotto efficacia di pre-emergenza, onde ottenere un diserbo duraturo, è possibile eventualmente utilizzare il KERNEL in miscela con un erbicida ad azione residuale (es. Diuron) per evitare la nascita delle infestanti provenienti da semi che possono germinare dopo l'applicazione del formulato da solo. L'effetto visivo dell'azione del KERNEL consiste in un ingiallimento o arrossamento ed in un appassimento graduale che si risolvono nella morte dell'infestante anche a livello dell'apparato radicale. La durata di questo processo è correlata alle condizioni ambientali.

MODALITÀ D'IMPIEGO - Il prodotto va usato per irrorazione sulle infestanti ben sviluppate, distribuendo volumi relativamente bassi (100-300 litri) di poltiglia per ettaro, in modo da bagnare uniformemente le malerbe, senza provocare perdite per gocciolamento. Impiegare pompe a bassa pressione (max 2 atm) e barre o lance munite di ugelli a specchio o a ventaglio che distribuiscono gocce di grosse dimensioni.

CAMPI D'IMPIEGO

Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco, purchè ben lignificato: **vite, agrumi, melo, pero, olivo, noce.**

Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco, anche se ben lignificato: **drupacee, mandorlo, pioppo.**

Colture da diserbare esclusivamente utilizzando attrezzature selettive (lambenti, umettanti o a goccia): **carciofo, fava, pisello, fagiolino, patata, pomodoro, melanzana, carota, barbabietola da zucchero, soia, mais (solo interfila), erba medica, prati, rosa; vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.**

Colture da diserbare prima dell'emergenza: **asparago.**

Terreni in assenza della coltura **(fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, prati, vivai)**: prima della semina o del trapianto (queste operazioni vanno successivamente effettuate non prima di 48 ore dal trattamento), dopo il raccolto o a fine ciclo.

Aree non agricole: **sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili.**

DOSI D'IMPIEGO

I trattamenti possono essere effettuati su tutta la superficie o su fasce lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma.

Le dosi d'impiego, riferite ad ettaro di superficie effettivamente trattata, variano in funzione della specie delle infestanti presenti:

- 2,6 litri/ha contro la maggior parte delle erbe annuali
- 3-3,75 litri/ha contro Sorghum halepense (Sorghetta), Agropyrum repens (Gramignone), Ranunculus spp (Ranuncolo).
- 3,75-5,25 litri/ha contro Cyperus rotundus (Cipollino), Cirsium arvense (Stoppione, in fioritura), Artemisia vulgaris (Artemisia), Potentilla spp. (Cinquefoglio), Plantago spp. (Piantaggine), Taraxacum officinale (Soffione), Rumex spp. (Romice), Felci. Contro il Cyperus rotundus, per ottenere un risultato più duraturo, si può effettuare un primo trattamento alla dose di 3,75 litri/ha ripetendo l'intervento sui ricacci alla dose di 3 litri/ha;
- 6-7,5 litri/ha contro Convolvulus arvensis (Vilucchio) ben sviluppato (inizio fioritura), Cynodon dactylon (Gramigna), Urtica spp. (Ortica), Daucus carota (Carota selv.), Sonchus arvensis (Crispino), Tussilago farfara (Farfaro), Phragmites spp. (Cannucce, alte 50-80 cm).
- 7,5-9 litri/ha contro Convolvulus arvensis (Vilucchio) all'inizio dello sviluppo (lungo almeno 30 cm.).

Per interventi su infestazioni a macchia irrorare con concentrazioni del prodotto in acqua dello 0,75-1,5% contro le infestanti annuali e dell'1,5-3,75% contro le perenni.

NOTE IMPORTANTI: Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante. Non bagnare il tronco, specialmente se non è ben lignificato o con ferite. Per evitare la deriva usare ugelli protetti da coni o schermi che evitino alla poltiglia erbicida di giungere a contatto con la vegetazione delle piante, specialmente se in forma di allevamento basse.

AVVERTENZE: Le piogge che cadono entro 6 ore dall'applicazione ne riducono l'efficacia. Le temperature medie e l'alta umidità dell'aria facilitando la crescita delle infestanti, favoriscono l'esito del diserbo; le temperature basse o il caldo estivo non limitano l'efficacia del prodotto purché le infestanti siano verdi, vitali e non essiccate. Soprattutto in condizioni critiche, comunque, l'aggiunta di solfato ammonico alla miscela incrementa l'attività del prodotto. Le perennanti sono meglio controllate se ben sviluppate al momento del trattamento; alcune dicotiledoni (es. Vilucchio, Stoppione, Artemisia) sono più sensibili se in fioritura o in uno stadio più avanzato. Arature, fresature, tagli delle erbe o pascolo di animali prima del trattamento riducono l'efficacia del diserbo. Dopo il trattamento su erbe perennanti lasciar traslocare il prodotto negli organi sotterranei per 2 o 3 settimane prima di procedere a lavorazione del terreno.

Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, ha efficacia ridotta.

Non impiegare per la miscelazione, distribuzione o conservazione del prodotto recipienti galvanizzati (es. zincati) o in acciaio se non protetti da apposite vernici plastiche.

COMPATIBILITÀ - Il prodotto è compatibile con solfato ammonico e con preparati a base di erbicidi residuali quali Diuron.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ - Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare (rami non lignificati, succhioni del tronco e del portainnesto) di tutte le colture agricole. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente, con tre risciacqui successivi di acqua, le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi. Non scaricare le acque utilizzate per i lavaggi in acque destinate all'irrigazione.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

D.L. n. 65/2003

CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

TYONAL 90

Zolfo bagnabile micronizzato

THYONAL 90 Registrazione del Ministero della Sanità n. 0441 del 12/03/1973

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20
00143 Roma

Composizione
Zolfo bagnabile micronizzato g. 90
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b.a g. 100

IRRITANTE

Contenuto: **g.100-250-500 kg.1-5-10-25** Partita n.

Stabilimento di produzione:
DIACHEM S.P.A. - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Si tratta di uno zolfo bagnabile ad elevata finezza. Si impiega in trattamenti fogliari nella lotta contro tutte le forme di oidio di numerose colture. Risulta sospensibile in acqua, dotato di potere adesivo, resistente alla rugiada ad alla pioggia.

EPOCA E DOSI DI IMPIEGO
I trattamenti vanno eseguiti secondo i classici schemi di lotta contro l'oidio.
L'attività fungicida del prodotto risulta influenzata da temperatura ed umidità relativa; la dose di impiego più opportuna sarà quindi in funzione di questi due parametri. TYONAL 90 si impiega ad una dose variabile tra 150 g e 300 g per 100 litri di acqua sulle seguenti colture: **AGRUMI, DRUPACEE, POMACEE, FRAGOLA, NOCCIOLO, VITE, OLIVO, ORTAGGI, PATATA, GIRASOLE, SOIA, TABACCO, FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI**.
Su **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO** e **CEREALI** si impiega alla dose di 3,g Kg/ha.
Si consiglia di evitare l'impiego nelle ore più calde della giornata.

COMPATIBILITÀ
Il TYONAL 90 non è compatibile con prodotti fitosanitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con oli minerali, con Captano e con Diclorvos.
AVVERTENZA: Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Può arrecare danni alle seguenti cultivar di:
MELE: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman red - Winesap;
PERE: Buona Luisa d'Avranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio;
VITE: Sangiovese;
CUCURBITACEE: può essere fitotossico.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

DL 65/2003

ETICHETTA CONFEZIONI SACCHETTI IDROSOLUBILI

TYONAL 90

Zolfo bagnabile micronizzato
in sacchetti idrosolubili

THYONAL 90 Registrazione del Ministero della Sanità n. 0441 del 12/03/1973

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20
00143 Roma

Composizione
Zolfo bagnabile micronizzato g. 90
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b.a g. 100

IRRITANTE

Contenuto: **kg. 1** (1 sacchetto idrosolubile da 1 kg)
Partita n.

Stabilimento di produzione:
DIACHEM S.P.A. - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Si tratta di uno zolfo bagnabile ad elevata finezza. Si impiega in trattamenti fogliari nella lotta contro tutte le forme di oidio di numerose colture. Risulta sospensibile in acqua, dotato di potere adesivo, resistente alla rugiada ad alla pioggia.

EPOCA E DOSI DI IMPIEGO
I trattamenti vanno eseguiti secondo i classici schemi di lotta contro l'oidio.
L'attività fungicida del prodotto risulta influenzata da temperatura ed umidità relativa; la dose di impiego più opportuna sarà quindi in funzione di questi due parametri. TYONAL 90 si impiega ad una dose variabile tra 150 g e 300 g per 100 litri di acqua sulle seguenti colture: **AGRUMI, DRUPACEE, POMACEE, FRAGOLA, NOCCIOLO, VITE, OLIVO, ORTAGGI, PATATA, GIRASOLE, SOIA, TABACCO, FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI.**
Su **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO** e **CEREALI** si impiega alla dose di 3,g Kg/ha.

Si consiglia di evitare l'impiego nelle ore più calde della giornata.

AVVERTENZE D'USO
Nel caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

COMPATIBILITÀ
Il TYONAL 90 non è compatibile con prodotti fitosanitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con oli minerali, con Captano e con Diclorvos.
AVVERTENZA: Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Può arrecare danni alle seguenti cultivar di:
MELE: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman red - Winesap;
PERE: Buona Luisa d'Avranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio;
VITE: Sangiovese;
CUCURBITACEE: può essere fitotossico.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

MODO DI UTILIZZO DEI SACCHETTI IDROSOLUBILI

25%

Assicurare la completa pulizia della botte e riempire l'atomizzatore con il 25% di acqua.

Con mani/guanti asciutti prelevare il numero di sacchetti idrosolubili, chiusi, previsti.

Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore.

Attendere qualche minuto fino a completa solubilizzazione.

Aggiungere la restante parte di acqua necessaria ed eventuali altri prodotti da miscelare.

DL 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

TYONAL 90

Zolfo bagnabile micronizzato

THYONAL 90 Registrazione del Ministero della Sanità n. 0441 del 12/03/1973

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 - 00143 Roma

Composizione
Zolfo bagnabile micronizzato g. 90
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b.a g. 100

Contenuto:
g.100

Partita n.

Stabilimento di produzione:
DIACHEM S.P.A. - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA PER SACCHETTI IDROSOLUBILI

TYONAL 90

Zolfo bagnabile micronizzato in sacchetti idrosolubili

THYONAL 90 Registrazione del Ministero della Sanità n. 0441 del 12/03/1973

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20
00143 Roma

Composizione
Zolfo bagnabile micronizzato g. 90
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b.a g. 100

Contenuto: **kg. 1** Partita n.

IRRITANTE

Stabilimento di produzione:
DIACHEM S.P.A. - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

AVVERTENZA: leggere l'etichetta riportata sulla confezione

DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE L'INVOLUCRO

DL 65/2003

Zolone P.B. 25

Insetticida - Acaricida

ZOLONE P.B. 25 Registrazione del Ministero della Sanità n. 2778 del 18/01/78

Composizione

Fosalone g. 24 Partita n.:*

Coformulanti q.b. a g.100

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 Roma

Officine di Produzione:

AgriFormula Srl - Paganica (AQ)

Bayer CropScience S.A. - Cheste (Valencia) - Spagna

Contenuto Netto: **g. 250 Kg. 1 - 5 - 10**

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Nocivo a contatto con la pelle. Tossico per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il prodotto é un insetticida che possiede le seguenti caratteristiche: polivalenza d'azione sui parassiti sotto elencati, buona efficacia immediata e persistenza di 2-3 settimane, azione frenante sugli acari, agisce per contatto ed ingestione.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

- **FRUTTIFERI**:
  Agrumi: arancio, limone, mandarino, pompelmo, clementine, cedro; Drupacee: pesco, ciliegio, albicocco, susino, mandorlo; Pomacee: melo, pero; Fragola, Vite: contro Afidi, Larve ricamatrici e defogliatrici, Carpocapsa, Anarsia, Cydia, Antonomo, Oplocampa, Tignola della vite: 200 -250 g/hl.
- **ORTAGGI**:
  Cucurbitacee: cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo; Solanacee : pomodoro, peperone, melanzana; cavoli, carciofo, asparago, lattuga, indivia, radicchio, spinacio, cardo, sedano, finocchio, fagiolo, fava, pisello, cece, lenticchia, carota, rapa, ravanello, aglio, porro: contro Afidi, Criocera, Piralide, Nottue, Aleurodidi e Tripidi 200 - 250 g/hl.
- **PATATA**: contro Dorifora, Nottue, Afidi 200 - 250 g/hl.
- **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO**: contro Altica, Cleono, Pegonia 1,7 Kg/ha.
- **CEREALI** (frumento, orzo, mais, sorgo, riso, avena, segale): contro Afidi, Tripidi, Nottue, Piralide 2 Kg/ha.
- **GIRASOLE**: contro Nottue 200 - 250 g/hl.
- **FORAGGERE LEGUMINOSE** (erba medica, lupinella, sulla, favino): contro Afidi, Fitonomo, Aleurodidi, Lepidotteri e Coleotteri defogliatori 200 - 250 g/hl.
- **FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI**: contro Afidi, Nottue, Piralide, Coleotteri, Tripidi, Cimici 200 - 250 g/hl.

Diluire la quantità di prodotto in pochi litri d'acqua, versare nel serbatoio dell'irroratrice agitando. Trattare alla primissima comparsa dei parassiti.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto é compatibile con i più comuni antiparassitari, ad eccezione di quelli alcalini (calce, polisolfuri).
Per quanto riguarda la miscela con gli zolfi bagnabili o con la dodina, onde ottenere la migliore compatibilità é necessaria l'aggiunta del Bagnante Adesivo Etaldyn.
Allo scopo si consigliano le seguenti modalità d'impiego:
1) stemperare in acqua lo zolfo in polvere o la dodina; indi versare nell'irroratrice già riempita per metà;
2) aggiungere Etaldyn a 50 g/hl;
3) aggiungere lo ZOLONE P.B. 25 e portare a volume agitando.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

Il prodotto é tossico per gli insetti utili. È nocivo per gli animali domestici ed il bestiame. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

Zolone liquido 34

Insetticida - Acaricida

Concentrato emulsionabile

Zolone Liquido 34 Registrazione del Ministero della Sanità n. 2779 del 18/01/78

Partita n.:*

Composizione

Fosalone g. 33,6 (= 350 g/l)

Coformulanti q.b. a g.100

contiene Cicloesanone e Nafta solvente (petrolio) aromatica pesante

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 Roma

Officine di Produzione:

CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 76-78 DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Bayer CropScience France - Elbeuf (Francia)

AGRIFORMULA SRL – Paganica (AQ)

Contenuto Netto: ml 250 L 1 - 5 - 10

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto é un insetticida che possiede le seguenti caratteristiche: polivalenza d'azione sui parassiti sotto elencati, buona efficacia immediata e persistenza ci 2-3 settimane, azione frenante sugli acari. Agisce per contatto ed ingestione.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

FRUTTIFERI

- Agrumi: arancio, limone, mandarino, pompelmo, clementine, cedro;
- Drupacee: pesco, ciliegio, albicocco, susino, mandorlo;
- Pomacee: melo, pero;
- Fragola, Vite

contro: afidi, larve ricamatrici e defogliatrici, Carpocapsa, Anarsia, Cidia, Antonomo, Oplocampa, Tignola della vite: 150-200 ml /hl d'acqua.

ORTAGGI

- Cucurbitacee: cetriolo, cocomero, melone, zucca, zucchino;
- Solanacee: melanzana, peperone, pomodoro;
- Legumi: cece, fagiolo, fava, pisello, lenticchia;
- Ortaggi a foglia: lattuga, cardo, indivia, finocchio, spinacio, radicchio, sedano;
- Ortaggi a radice: carota, rapa, ravanello;
- Ortaggi a bulbo: aglio, porro, asparago, carciofo, cavoli

contro: Afidi, Criocera, Piralide, Nottue, Aleurodidi e Tripidi: 150-200 ml/hl d'acqua.

PATATA

contro: Dorifora, Nottue, Afidi: 150-200 ml/hl d'acqua.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

contro Altica, Cleono, Pegomia: 1,5 l/ha.

CEREALI (avena, frumento, mais, orzo, riso, segale, sorgo)

contro Afidi, Tripidi, Nottue, Piralide: 1,5 l/ha.

GIRASOLE

contro Nottue: 150-200 ml/hl.

FORAGGERE

Leguminose: erba medica, lupinella, sulla, favino, contro: Afidi, Fitonomo, Aleurodidi, Lepidotteri e Coleotteri defogliatori: 150-200 ml/hl d'acqua.

FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI

contro Afidi, Nottue, Piralide, Coleotteri, Tripidi, Cimici: 150-200 ml/hl d'acqua.

Diluire la quantità di prodotto in pochi litri d'acqua, versare nel serbatoio dell'irroratrice, agitando. Trattare alla primissima comparsa dei parassiti.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non é compatibile con antiparassitari alcalini, calce e polisolfuri. Per quanto riguarda la miscela con gli zolfi bagnabili o con la dodina, onde ottenere la migliore compatibilità é necessaria l'aggiunta di un Bagnante Adesivo.

Allo scopo si consigliano le seguenti modalità d'impiego:

1) stemperare in acqua lo zolfo in polvere o la dodina; indi versare nella irroratrice già riempita a metà;

2) aggiungere il Bagnante;

3) aggiungere lo Zolone Liquido 34 e portare a volume agitando.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non impiegare il prodotto su rosa, azalea e poinsettia.

NOCIVITÀ: È tossico per gli insetti utili. È nocivo per gli animali domestici ed il bestiame.

Sospendere il trattamento 21 giorni prima del raccolto.

AVVERTENZE

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

WEEDAGRO D

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
Erbicida a base di 2,4D per il diserbo selettivo del frumento e dei cereali minori

WEEDAGRO D Reg. Ministero della Sanità n. 4287 del 20/03/1981

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 Roma

COMPOSIZIONE
2,4 D Acido puro (da estere isottilico) g 32,5 (=320 g/l)
Coformulanti* q. b. a g.100
*Contiene XILENE

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimenti di produzione:
DIACHEM SpA – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
ALTHALLER ITALIA Srl – San Colombano al Lambro (MI)
NUFARM GmbH & Co KG
St. Peter Strasse, 25 - A-4021 Linz (Austria)

Contenuto:
0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 litri

Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ DI IMPIEGO
Il WEEDAGRO D distrugge le più comuni infestanti a foglia larga del frumento, dell'orzo, della segale e dell'avena. Il WEEDAGRO D mantiene la propria efficacia se dopo il trattamento subentra una pioggia e risulta efficace anche operando su vegetazione bagnata.

DOSI DI IMPIEGO
Il WEEDAGRO D si impiega a dosi comprese fra i L. 0,400 ed i L. 1,250 per ettaro diluito in un quantitativo di acqua che consenta di irrorare uniformemente l'appezzamento da diserbare (circa 400-600 litri per ettaro). La dose più bassa si impiegherà operando in giornate calde, su infestanti molto sensibili ed ancora nei primi stadi di sviluppo. La dose più elevata sarà invece necessaria operando in giornate fresche su malerbe più resistenti e già sviluppate.

EPOCA DI APPLICAZIONE
L'epoca utile per eseguire il trattamento decorre da quando il cereale ha ultimato l'accestimento e termina quando il cereale stesso inizia la fase di botticella (rigonfiamento della spiga nella guaina fogliare). Non eseguire il trattamento con temperature al di sotto dei 10°C. Operare in giorni senza vento e tenere il getto rivolto verso il basso affinche' la nube irrorante non venga a contatto direttamente od indirettamente con colture sensibili.Non impiegare le attrezzature usate per la preparazione e distribuzione della miscela erbicida per trattamenti antiparassitari. Riservarle esclusivamente a trattamenti erbicidi.

COMPATIBILITÀ
Il WEEDAGRO D non deve essere miscelato con prodotti di nessun genere.

FITOTOSSICITÀ
Prima del diserbo di colture effettuare un saggio preventivo su una piccola superficie per rilevare se esistono eventuali sensibilità alla coltura. Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è nocivo per gli animali domestici ed il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

Zolidan liquido 25

INSETTICIDA

Zolidan Liquido 25 Registrazione del Ministero della Sanità n. 6385 del 06/05/1985

Composizione:
Fosalone g 24 (= 232,08 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene Cicloesanone e Nafta solvente (petrolio) aromatica leggera

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 Roma

Officine di Produzione:
AgriFormula Srl - Paganica (AQ)
Bayer Cropscience France Elbeuf – Francia

Partita n.:* Contenuto netto: L 1 - 5 - 10

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Nocivo a contatto con la pelle. Tossico per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
NORME PRECAUZIONALI: Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE

Il prodotto é un insetticida che possiede le seguenti caratteristiche: polivalenza d'azione sui parassiti sottoelencati, buona efficacia immediata e persistenza di 2-3 settimane, azione frenante sugli acari.
Agisce per contatto ed ingestione.

APPLICAZIONI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

- Fruttiferi: (pomacee, drupacee, agrumi) contro Afidi, larve ricamatrici e defogliatrici, Carpocapsa, Anarsia, Cydia, Antonomo, Oplocampa a 200-250 ml/hl.;
- Vite: contro Tignole, a 200-250 ml/hl.;
- Cereali: contro Afidi 2 l/ha;
- Barbabietola da zucchero: contro Altica, Cleono e Pegomia della barbabietola, a 1,7 l/ha.

Diluire la quantità di prodotto in pochi litri d'acqua, versare nel serbatoio dell'irroratrice agitando. Trattare alla primissima comparsa dei parassiti.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto é compatibile con i più comuni antiparassitari, ad eccezione di quelli alcalini, calce, polisolfuri.
Per quanto riguarda la miscela con gli zolfi bagnabili o con la dodina, onde ottenere la migliore compatibilità é necessaria l'aggiunta del Bagnante Adesivo Etaldyn.
Allo scopo si consigliano le seguenti modalità d'impiego:
1) stemperare in acqua lo zolfo in polvere o la dodina; indi versare nella irroratrice già riempita per metà:
2) aggiungere Etaldyn a 50 g/hl;
3) aggiungere lo Zolidan Liquido 25 e portare a volume agitando.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non impiegare il prodotto su rosa, azalea e poinsettia

NOCIVITÀ

É tossico per gli insetti utili. É nocivo per gli animali domestici ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto

AVVERTENZE

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Zolidan PB 25

Insetticida - Acaricida

ZOLIDAN PB 25 Registrazione del Ministero della Sanità n. 6399 del 15/05/85

Composizione

Fosalone g. 24

Coformulanti q.b. a g.100

Partita n.:*

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 Roma

Officina di Produzione:

AgriFormula Srl - Paganica (AQ)

Contenuto Netto: g. 200-500 Kg. 1 - 5 – 10 - 15

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo a contatto con la pelle. Tossico per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il prodotto é un insetticida che possiede le seguenti caratteristiche: polivalenza d'azione sui parassiti sotto elencati, buona efficacia immediata e persistenza di 2-3 settimane, azione frenante sugli acari. Agisce per contatto ed ingestione.

APPLICAZIONI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

FRUTTIFERI (pomacee, drupacee, agrumi): contro Afidi, larve ricamatrici e defogliatrici, Carpocapsa, Anarsia, Cydia, Antonomo,Oplocampa a g. 200-250 per 100 litri d'acqua;

VITE: contro Tignola a g. 200-250 per 100 litri d'acqua;

CEREALI (frumento, orzo, cereali minori, mais, sorgo, riso): contro Afidi, Tripidi, Nottue, Piralide Kg. 2 per ettaro.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Altica, Cleono, Pegomia Kg. 1,7 per ettaro.

Diluire la quantità di prodotto in pochi litri d'acqua, versare nel serbatoio dell'irroratrice agitando. Trattare alla primissima comparsa dei parassiti.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto é compatibile con i più comuni antiparassitari, ad eccezione di quelli alcalini, calce, polisolfuri.

Per quanto riguarda la miscela con gli zolfi bagnabili o con la dodina, onde ottenere la migliore compatibilità é necessaria l'aggiunta del Bagnante Adesivo Etaldyn.

Allo scopo si consigliano le seguenti modalità d'impiego:

1) stemperare in acqua lo zolfo in polvere o la dodina; indi versare nell'irroratrice già riempita per metà;
2) aggiungere Etaldyn a g. 50 per 100 litri di acqua;
3) aggiungere lo ZOLIDAN PB 25 e portare a volume agitando.

Avvertenza:

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto é tossico per gli insetti utili. È nocivo per gli animali domestici ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto

AVVERTENZE

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

DL 65/2003

Zolone flo

Insetticida

Pasta fluida

ZOLONE FLO Registrazione del Ministero della Sanità n. 8037 del 16/03/1992

Composizione

Fosalone g. 42,75 (=503 g/l) Partita n.:

Coformulanti q.b. a g.100

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 Roma

Officine di Produzione:

AgriFormula Srl - Paganica (AQ)

Bayer Cropscience France - Elbeuf (Francia)

Contenuto netto: **L 1 - 5 - 10**

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo a contatto con la pelle. Tossico per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Lo ZOLONE FLO é un insetticida che possiede le seguenti caratteristiche: polivalenza d'azione sui parassiti sottoelencati, buona efficacia immediata e persistenza di 2 - 3 settimane, azione frenante sugli acari. Agisce per contatto ed ingestione.

APPLICAZIONI E DOSI

- **FRUTTIFERI** (**pomacee, drupacee, agrumi**): contro Afidi, larve ricamatrici e defogliatrici, Carpocapsa, Anarsia, Cydia, Antonomo, Oplocampa a ml 100 - 125 per 100 l d'acqua.
- **VITE**: contro Tignole a ml 100 - 125 per 100 l d'acqua.
- **CEREALI**: contro Afidi 1 l/ha.
- **COLTURE ORTIVE ED ORNAMENTALI**: contro Afidi, Criocera, Nottue, Aleurodidi, Tripidi, Dorifora della patata e della melanzana a ml 100 - 125 per 100 l d'acqua, distribuiti con almeno 1000 l d'acqua per ettaro.
- **COLTIVAZIONI INDUSTRIALI** (**girasole, erba medica, lupinella, sulla, favino**): contro Afidi, Nottue, Casside, Piralide, Fitonomo, Tripidi, Cimici, a ml 100 - 125 per 100 l d'acqua. Contro Altica, Cleono e Pegomia della barbabietola da zucchero, a ml 850 - 1 l/ha. Contro Afidi neri della favetta a 1,25 - 1,5 l/ha.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Diluire la quantità di prodotto in pochi litri d'acqua, versare nel serbatoio dell'irroratrice, agitando. Trattare alla primissima comparsa dei parassiti.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto é compatibile con la maggior parte dei prodotti della nostra gamma.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

Il prodotto é tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto

AVVERTENZE: Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame. Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale in luogo asciutto e fresco.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

IMPACT

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Fungicida sistemico ad ampio spettro d'azione per la difesa contro le malattie fogliari che colpiscono frumento, orzo, avena e la barbabietola da zucchero.

IMPACT

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8064 del 06/05/92

Composizione:
FLUTRIAFOL puro g. 11,8 (=125 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20
00143 Roma

Stabilimenti di produzione:
SCAM Srl – S. Maria di Mugnano (MO)
DIACHEM SpA – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
SIPCAM PHYTEUROP – Montreuil Bellay (Francia)

NOCIVO

Contenuto netto: 100-250-500 ml 1-5 litri Partita n°

FRASI DI RISCHIO: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In seguito ad ingestione, il flutriafol può causare nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Negli animali da esperimento l'avvelenamento da prodotti a base di flutriafol comporta sintomi di tossicità sistemica quali convulsioni, perdita di conoscenza e respirazione irregolare.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

IMPACT è un prodotto ad attività sistemica particolarmente attivo su Basidiomiceti ed Ascomiceti verso i quali dimostra azione protettiva, curativa ed eradicante.

MODALITÀ D'IMPIEGO

In relazione alle associazioni fungine che si desidera combattere, IMPACT va impiegato da solo od in miscela con altri principi attivi. In relazione allo sviluppo della vegetazione od all'attrezzatura aziendale disponibile, vanno impiegati volumi d'acqua medio bassi (50-800 lt/ha).

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

Frumento, orzo ed avena

Contro oidio, ruggini, septoria, fusariosi, rincosporiosi, impiegare **1 lt/ha.**
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi, particolarmente durante le annate difficili e su varietà sensibili. Eseguire il trattamento a fine accestimento-inizio levata e ripetere all'apparire delle prime pustole sulle ultime due foglie (spigatura-inizio fioritura).

Barbabietola da zucchero

Contro cercospora ed oidio, impiegare **250-350 ml/ha.**
Intervenire alla comparsa delle prime macchie e ripetere i trattamenti, con intervallo di due settimane, per due-tre volte a seconda delle necessità.

FITOTOSSICITÀ

In condizioni di stress climatici ed idrici sui cereali possono verificarsi clorosi od ingiallimenti degli apici fogliari.

COMPATIBILITÀ

Qualora si reputi necessaria la miscela con altri principi attivi, IMPACT è miscibile con formulati a base di: maneb, mancozeb, carbendazim, ossicloruro di rame e zolfo.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta della barbabietola da zucchero; 35 giorni prima della raccolta di frumento, orzo e avena.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

PROTEGGERE DAL FREDDO

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

DL n. 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

IMPACT

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Fungicida sistemico ad ampio spettro d'azione per la difesa contro le malattie fogliari che colpiscono frumento, orzo, avena e la barbabietola da zucchero.

IMPACT

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8064 del 06/05/92

Composizione:	
FLUTRIAFOL puro	**g. 11,8 (=125 g/l)**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20
00143 Roma

Stabilimenti di produzione:
SCAM Srl – S. Maria di Mugnano (MO)
DIACHEM SpA – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
SIPCAM PHYTEUROP – Montreuil Bellay (Francia)

NOCIVO

Contenuto netto: **100 ml** Partita n°

FRASI DI RISCHIO: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In seguito ad ingestione, il flutriafol può causare nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Negli animali da esperimento l'avvelenamento da prodotti a base di flutriafol comporta sintomi di tossicità sistemica quali convulsioni, perdita di conoscenza e respirazione irregolare.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DT. 65/2003

WEEDAGRO COMPLEX

(LIQUIDO)

Diserbante selettivo del frumento e dei cereali minori

WEEDAGRO COMPLEX Reg. Ministero della Sanità n. 8176 del 03/03/1993

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 Roma

COMPOSIZIONE

MCPA acido puro (da sale dimetilamminico)	g. 25 (=297,5 g/l)
2,4 D Acido puro (da sale dimetilamminico)	g. 31 (=369 g/l)
Coformulanti q. b. a	g.100

Quantità netta del preparato: 1 - 5 - 20 litri **Partita N.**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimenti di produzione:

DIACHEM SpA – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)

NUFARM GmbH & Co. KG – St. Peter-Strasse, 25 – A-4021 – Linz, Austria

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi dell'associazione delle seguenti sostanze attive: MCPA acido 25% e 2,4D acido 31% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.

Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Terapia sintomatica. Ospedalizzare.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

Si versa la dose prestabilita di WEEDAGRO COMPLEX direttamente nel quantitativo totale di acqua, mescolando con cura. Si consiglia di effettuare il trattamento preferibilmente in assenza di vento, con tempo non tendente al piovoso e con temperatura non inferiore ai 12°C.

FRUMENTO e CEREALI MINORI: 0,75 – 1,5 litri per ettaro tra la fine dell'accestimento e l'inizio dello stadio di botticella. In condizioni ordinarie e nella maggior parte dei casi il WEEDAGRO COMPLEX assicura un risultato pieno e soddisfacente.

Sul **frumento** le dosi sopra indicate possono essere meglio specificate in rapporto alla sensibilità delle malerbe e al periodo di esecuzione del trattamento:

- per trattamenti eseguiti per tempo ed in condizioni sfavorevoli e quando sono dominanti *Raphanus raphanistrum*, *Sinapis arvensis*, *Viola spp.* e *Galinsoga parviflora*: litri 1,2 per ettaro.
- per trattamenti ritardati e specialmente se sono presenti *Centaurea cyanus* (Fiordaliso), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio), *Lamium amplexicaule* (Erba ruota), *Papaver rhoeas* (Papavero) ed infestanti appartenenti alla famiglia delle Composite: litri 1,5 per ettaro. Si può ricorrere all'impiego di WEEDAGRO COMPLEX anche quando sono dominanti le seguenti infestanti: Stoppione, Ranuncolo, Correggiola, Convolvolo nero.

COMPATIBILITÀ

Eventuali altre miscele tra il WEEDAGRO COMPLEX ed i prodotti fitosanitari in commercio non sono di alcun interesse pratico applicativo.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che la miscela giunga a contatto con colture vicine sensibili, essendo il prodotto dannoso a fruttiferi, ortaggi, vite, pioppi e a tutte le piante non graminacee, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

RISCHI DI NOCIVITÀ

È tossico per gli animali domestici ed il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni

Data la presenza di MCPA, che è tossico per alcune piante e particolarmente per la Medica, si consiglia di effettuare il trattamento almeno 15 giorni prima della intrasemina della Medica stessa.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL n.65/2003

Zoldane

Insetticida polivalente in Concentrazione Emulsionabile

ZOLDANE Registrazione del Ministero della Sanità n. 8280 del 04/05/93

Composizione: Partita n.:

g 100 di prodotto contengono:

Fosalone puro	g. 16 (=165 g/l)	Contenuto netto:
Clorpirifos metile puro	g. 14,5 (=149 g/l)	**L 1 - 5 - 10**
Coformulanti q.b. a	g.100	

Contiene nafta solvente (petrolio) aromatica pesante

Titolare dell'Autorizzazione:

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 Roma

Officine di Produzione

AgriFormula Srl - Paganica (AQ)

Bayer Cropscience France - Elbeuf (Francia)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. Tenere lontano dal fuoco e da altre fonti di calore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSALONE 16% e CLORPIRIFOS METILE 14,5% le quali, provocano entrambe i seguenti sintomi di intossicazione:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa):astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità)

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto, formato dall'associazione di due molecole appartenenti al gruppo dei fosforganici, agisce per contatto, ingestione ed azione di vapore contro un'ampia gamma di insetti nocivi alla colture. Possiede spiccato effetto abbattente ed é caratterizzato da buona persistenza di azione (due settimane). Svolge azione limitante sulle popolazioni di acari fitofagi. Si impiega sulle seguenti colture:

MELO e PERO: contro tortricidi ricamatori (Capua, Cacoecia, Pandemis, Eulia) 250 ml/hl; contro Carpocapsa (Laspeyresia pomonella) 250 ml/hl; contro Lepidotteri defogliatori (Nottue, Geometridi, Orgia, ecc.) 200 ml/hl; contro Oplocampa e Antonomo 200 ml/hl; contro neanidi di cocciniglia di S.José (Quadraspidiotus perniciosus) 250 ml/hl;

PESCO, NETTARINE e PERCOCHE: contro Anarsia (Anarsia lineatella) e Tignola orientale (Cydia molesta) 250 ml/hl; contro neanidi di cocciniglie, Diaspis (Pseudaulacaspis pentagona) e cocciniglia di S. José (Quadraspitiotus perniciosus) 250 ml/hl;

ARANCIO: contro larve di Cacoecia 250 ml/hl; contro neanidi di cocciniglie (Saissatie oleae, Ceroplastes sinensis, Planococcus citri, ecc.) 250 ml/hl;

VITE: contro Tignole (Lobesia botrana ed Eupoecilla ambiguella) e Piralide della vite (Sparganothis pilleriana) 200 ml/hl;

COLTURE ORTICOLE (pomodoro, pisello, melanzane, ravanelli, patata): contro afidi, nottue (Agrotis, Scotia, Mamestra), Cavolaia (Pieris), Macaone (Papillo macaon), Dorifora (Leptinotarsa decemlineata), Altiche (Psylliodes, Phyllotreta) 200 ml/hl.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non é compatibile con antiparassitari alcalini, calce, polisolfuri. Per quanto riguarda la miscela con gli zolfi bagnabili o con la dodina, onde ottenere la migliore compatibilità é necessaria l'aggiunta di un bagnante adesivante. Allo scopo, si consigliano le seguenti modalità d'impiego:

1) stemperare in acqua lo zolfo in polvere o la dodina; indi versare nella irroratrice già riempita per metà;
2) aggiungere il bagnante ;
3) aggiungere il prodotto e portare a volume agitando.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non impiegare il prodotto sulle seguenti cultivar di melo: Stayman Red, Stayman Winesap, Gloester, Gallia Beauty. Non effettuare trattamenti su arancio nei mesi compresi tra gennaio ed aprile.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto é tossico per gli animali domestici, insetti utili e bestiame. Evitare di contaminare corsi d'acqua, laghi e stagni. Il prodotto é anche tossico per le api. Evitare i trattamenti nel periodo della fioritura e quando le api frequentano l'area trattata. Si consiglia di tenere lontano dalle zone trattate animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

DANADIM

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)

Insetticida a base di Dimetoato

DANADIM Registrazione del Ministero della Sanità n. 8690 del 31/01/1995

Composizione:

DIMETOATO puro	**g. 40 (=428 g/l)**
Coformulanti* q.b. a	**g. 100**

*** contiene Cicloesanone e Xilene**

Contiene Anidride Maleica: può provocare una reazione allergica

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via Riccardo Gigante, 18/20

00143 - Roma

Stabilimento di produzione:

CHEMINOVA A/S

Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Partita n°

Contenuto netto: 100-250-500 ml 1-5-10-20 litri

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: **Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Poco efficace la pralidossima.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

Da usare solo in pieno campo

Il DANADIM è un insetticida efficace contro numerosi insetti parassiti delle colture agrarie, dotato di elevata azione citotropica per cui penetra nei tessuti vegetali agendo sulle forme di insetti più nascoste.

AGRUMI (vivai di piante non in produzione): contro Afidi, Acari, - Cocciniglie e Ragno rosso 125 ml/hl. **OLIVO**: contro Mosca delle olive 140 ml/hl negli attacchi "precocissimi" (luglio) e "normali" (settembre-ottobre); 75 ml/hl in quelli "precoci" (agosto). I trattamenti si eseguono normalmente all'inizio dell'ovodeposizione, cioè quando si notano le prime punture della mosca sulle olive; contro Tignola 140 ml/hl contro larve della generazione fillofaga; contro Liotripide 90 ml/hl in pre-fioritura; contro Punteruolo e Oziorrinco 70 ml/hl. **CILIEGIO**: contro Mosca della ciliegia 50 ml/hl sulle varietà a maturazione media e tardiva. **ASPARAGO**: contro Mosca 70-100 ml/hl alla comparsa dell'infestazione; contro Ragno rosso e Afidi 90 ml/hl. **POMODORO, MELANZANA (entrambe solo in pieno campo)**: contro Afidi e Aleurodidi 70-100 ml/hl; contro Vasate 100 ml/hl. **LATTUGA (solo in pieno campo), BIETOLA ROSSA, RAPA, NAVONE**: contro Afidi, Mosca e Ragno rosso 70-100 ml/hl. **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO**: contro Sminturide 50 ml/hl, contro Mosca 70-100 ml/hl. **TABACCO**: contro lepidotteri 55-100 ml/hl; contro Aleurodidi, Afidi e Tripidi 70-90 ml/hl. **FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE**: contro Sminturide 50 ml/hl. **FLORICOLE**: contro Ditteri dei fiori, Striscino del garofano e Hylemya Brunnescens eseguire, alla dose di 200 ml per ettolitro di acqua, trattamenti a partire dal mese di aprile contro queste larve minatrici. **PIOPPO, COLTURE FORESTALI**: contro Tarlo vespa, Gemmaiola, Crisomela 300 ml/hl.

Per la preparazione dell'emulsione basta versare, agitando energicamente, la dose necessaria di prodotto in tutto il quantitativo di acqua richiesto per ottenere la concentrazione desiderata.

COMPATIBILITÀ

Il DANADIM non è compatibile con i formulati a base di poltiglia bordolese, borgognona e polisolfuro di calcio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Su olivo non impiegare il prodotto in irrorazioni a basso volume sulle varietà Coratina, Simona, Canina, Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana, Bosana.

RISCHI DI NOCIVITÀ

A seguito dei trattamenti il prodotto è nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LATTUGA E ASPARAGO; 20 GIORNI PER TABACCO E CILIEGIO; 21 GIORNI PER MELANZANA E POMODORO; 28 GIORNI PER OLIVO, FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE; 30 GIORNI PER BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, BIETOLA ROSSA, RAPA, NAVONE.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

D.L. n. 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

DANADIM

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)

Insetticida a base di Dimetoato

DANADIM Registrazione del Ministero della Sanità n. 8690 del 31/01/1995

Composizione:	
DIMETOATO puro	**g. 40 (=428 g/l)**
Coformulanti* q.b. a	**g. 100**

*** contiene Cicloesanone e Xilene**

Contiene Anidride Maleica: può provocare una reazione allergica

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20
00143 - Roma

NOCIVO

Stabilimento di produzione:
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Partita n° Contenuto netto: **100 ml**

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'inge**stione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Poco efficace la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

TALON FLOW

Fungicida persistente in forma flowable

TALON FLOW Registrazione Ministero della Sanità n. 8827 del 19/4/1996
COMPOSIZIONE
Clorotalonil puro g. 40,8 (= 498 g/l) Partita n.:
Coformulanti q.b. a g. 100

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 Roma

Stabilimento di produzione:
DIACHEM SpA - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Partita n. Contenuto: **1 - 5 – 20 litri**

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: **Molto tossico per inalazione. Irritante per le vie respiratorie. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
Il TALON FLOW è un anticrittogamico a base di Clorotalonil preparato secondo le più recenti tecniche e norme in forma flowable. E' un fungicida ad ampio spettro di azione, molto persistente, ed ha la proprietà di resistere al dilavamento.
Le colture su cui è indicato l'impiego del TALON FLOW sono riportate qui di seguito con le rispettive dosi:
Pomodoro: contro Peronospora, Septoria, Cladosporiosi, Alternaria, Antracnosi, Muffa grigia alla dose di 2-3 l/ha (massimo 3 applicazioni all'anno in campo e 5 in serra)
Cocomero, Melone, Cetriolo: contro Peronospora, Cancro gommoso, Cladosporiosi, Muffa grigia, Sclerotinia alla dose di 2-3 l/ha (massimo 3 applicazioni/anno);
Fagiolo, Fagiolino, Pisello: contro Peronospora, Antracnosi, Ruggine, Muffa grigia, Rizottoniosi, Sclerotinia alla dose di 2-3 l/ha; massimo 2 applicazioni/anno in pieno campo da effettuarsi fino alla fioritura (esclusa, per il fagiolino);
Sedano: contro Alternaria, Cercosporiosi, Septoria alla dose di 2-3 l/ha (massimo 3 applicazioni/anno);
Cipolla: contro Peronospora, Alternaria, Ruggine, Muffa grigia a 2-3 l/ha (max. 2 applicazioni/anno in pieno campo);
Patata: contro Peronospora, Alternaria alla dose di 2-3 l/ha (max.2 applicazionii/anno);
Melo, Pero: contro Ticchiolatura, Septoria, Cancri rameali alla dose di 1,2 - 2 l/ha (max 4 applicazioni/anno, solo in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici);
Pesco, Susino: contro Bolla, Corineo, Monilia, Ruggini, Cancri rameali a 1,6-2 l/ha (max.4 applicazioni/anno, solo in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici);
Colture floreali ed ornamentali: contro Peronospora, Muffa grigia, Ticchiolatura, Ruggini, Alternaria, Antracnosi alla dose di 250 ml/hl.

AVVERTENZE
- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante;
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aperti, diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi;
- Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco;
- Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore;
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.
- Evitare l'accesso ai terreni prima che siano trascorse almeno 12 ore dall'applicazione in pieno campo e 24 ore dall'applicazione in serra.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina e gli olii minerali. Dopo un trattamento con olio il prodotto deve essere impiegato dopo almeno tre settimane
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può provocare rugginosità su cultivar di melo del gruppo Golden, Stark e Starking. Su colture floreali e ornamentali, stante l'elevato numero di varietà, si consigliano saggi preliminari.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto Su Cipolla, Pomodoro, Cetriolo, Melone, Cocomero, Sedano e Patata; 21 giorni su Melo, Pero e Pesco; 35 giorni su Susino.

Attenzione: Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

MASTIFF

DISERBANTE TOTALE
(Concentrato solubile)

MASTIFF Registrazione del Ministero della Sanità n. 8859 del 10/06/1996

Composizione		
GLIFOSATE ACIDO puro	g.	30,4 (=360 g/l)
(pari a sale isopropilamminico g. 41)		
Coformulanti	q.b. a	g. 100

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 Roma

Stabilimento di produzione
(formulazione e confezionamento o sola formulazione):
CHEMINOVA A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (DK)
Stabilimento di formulazione:
CHEMINOVA A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (DK)
Stabilimento di confezionamento:
SCAM Srl – Via Bellaria, 164 – Modena

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n°

Contenuto
L. 0,5 – 1 – 2 - 5 – 10 - 20

FRASI DI RISCHIO: **Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il MASTIFF è un diserbante di post-emergenza efficace su tutte le infestanti monocotiledoni e dicotiledoni, annuali e perenni (Gramigna, Sorghetta, Cipero, Vilucchio). Viene assorbito dalle foglie e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perennanti, che vengono pure devitalizzati. Il MASTIFF è rapidamente disattivato a contatto con il terreno. Non possedendo il prodotto efficacia di pre-emergenza, onde ottenere un diserbo duraturo, è necessario, prima o dopo il trattamento con MASTIFF, intervenire con un erbicida ad azione residuale per evitare la nascita delle infestanti provenienti da semi che possono germinare dopo l'applicazione del formulato. L'effetto visivo dell'azione del MASTIFF consiste in un ingiallimento ed in un appassimento graduale che si risolvono nella morte dell'infestante anche a livello dell'apparato radicale. La durata di questo processo è correlata alle condizioni ambientali.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto va usato per irrorazione sulle infestanti ben sviluppate, distribuendo circa 300-500 litri di soluzione per ettaro, in modo da bagnare uniformemente le malerbe, senza provocare perdite per gocciolamento. Nel caso in cui le piante siano molto alte, elevare la quantità di acqua a 800 litri. Si impiega con attrezzature selettive sulle seguenti colture:

- **vite, agrumi, drupacee, melo, pero, olivo, carciofo, asparago, fava, pisello, fagiolino, pomodoro, melanzana, carota, barbabietola da zucchero, mais (consentito solo nell'interfila), erba medica, prati, rosa.**
- **per il diserbo delle stoppie dei cereali e dei luoghi incolti (strade, scoline, ripe, sedi ferroviarie, piazzali di deposito industriali e aree incolte in genere;**
- **sui terreni senza colture prima e dopo la coltivazione di ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, prati, vivai.**

DOSI D'IMPIEGO

I trattamenti possono essere effettuati su tutta la superficie o su fasce lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma. Le dosi d'impiego, riferite ad ettaro di superficie effettivamente trattata, variano in funzione della specie delle infestanti presenti:

- 3,5 litri/ha contro la maggior parte delle erbe annuali
- 4-5 litri/ha contro Sorghum halepense, Agropyrum repens, Ranunculus spp.
- 5-7 litri/ha contro Cyperus rotundus, Cirsium arvense (in fioritura), Artemisia vulgaris, Potentilla spp., Plantago spp., Taraxacum officinale, Rumex spp., Felci. Contro il Cyperus rotundus, per ottenere un risultato più duraturo, si può effettuare un primo trattamento alla dose di 5 litri/ha ripetendo l'intervento sui ricacci alla dose di 4 litri/ha;
- 8-10 litri/ha contro Convolvulus arvensis ben sviluppato (inizio fioritura), Cynodon dactylon, Urtica spp., Dacus carota, Sonchus arvensis, Tussilago farfara, Cannucce (alte 50-80 cm).
- 10-12 litri/ha contro Convolvulus arvensis all'inizio dello sviluppo (lungo almeno 30 cm.).

NOTE IMPORTANTI: Impiegare pompe a bassa pressione (max. 3 atm) e barre o lance munite di ugelli a specchio o a ventaglio che distribuiscono gocce di grosse dimensioni. Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante. Non bagnare il tronco, specialmente se non è ben lignificato o con ferite. Per evitare la deriva usare ugelli protetti da coni o schermi che evitino alla poltiglia erbicida di giungere a contatto con la vegetazione delle piante, specialmente se in forma di allevamento basse. Non impiegare il prodotto in miscela con l'erbicida residuale.

AVVERTENZE: Le piogge che cadono entro 6 ore dall'applicazione ne riducono l'efficacia. Le temperature medie e l'alta umidità dell'aria facilitando la crescita delle infestanti, favoriscono l'esito del diserbo; le temperature basse o il caldo estivo non limitano l'efficacia del prodotto purché le infestanti siano verdi, vitali e non essiccate. Le perennanti sono meglio controllate se ben sviluppate al momento del trattamento; alcune dicotiledoni (es. Vilucchio, Stoppione, Artemisia) sono più sensibili se in fioritura o in uno stadio più avanzato. Arature, fresature, tagli delle erbe o pascolo di animali prima del trattamento riducono l'efficacia del diserbo. Dopo il trattamento su erbe perennanti lasciar traslocare il prodotto negli organi sotterranei per 2 o 3 settimane prima di procedere a lavorazione del terreno. L'impiego su mais è consentito solo nell'interfila. Da non impiegare in pre-raccolta. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, è inefficace.

COMPATIBILITÀ – Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITÀ

Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare (rami non lignificati, succhioni del tronco e del portainnesto) di tutte le colture agricole. Irrorare il prodotto con pompe a bassa pressione (max. 3 atm), evitare la formazione di deriva. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente, con tre risciacqui successivi di acqua, le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi. Non scaricare le acque utilizzate per i lavaggi in acque destinate all'irrigazione.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

D.L. n. 65/2003

WEEDAGRO® MC

DISERBANTE SELETTIVO PER I FRUMENTI

WEEDAGRO MC Registrazione del Ministero della Sanità n° 9061 del 31/12/96

Composizione:

MCPA puro	gr. 25 (283 g/l)
(sotto forma di sale sodico o potassico o miscela dei due)	
Coformulanti q.b.a	gr. 100

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 Roma

Stabilimenti di produzione:
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
SCAM Srl - Via Bellaria, 164 - Modena
NUFARM GmbH & Co KG
St. Peter Strasse, 25 - A-4021 Linz (Austria)

NOCIVO

Partita n.

Contenuto: **1-5-10 L**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il WEEDAGRO MC combatte efficacemente veccia, capsella, fiordalisi, senape, colza, ranuncoli, papaveri.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Per il diserbo dei frumenti il WEEDAGRO MC si impiega alle dosi di litri 2,5-3,5 diluiti in litri 200-600 di acqua per ettaro, a seconda del tipo di irroratore che si usa.
Trattare dalla fine della fase di accestimento a poco prima della fase di botticella.
Operare in giornate serene con temperatura non inferiore a 16-18°C

COMPATIBILITÀ
Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: la vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi, ecc. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.
Le pompe e gli utensili usati per il trattamento diserbante non devono essere impiegati per altri trattamenti antiparassitari se non sono stati ripetutamente lavati con acqua calda e soda.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per gli animali domestici e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

DL n.65/2003

AFIDAGRO

Aficida in polvere bagnabile

AFIDAGRO Registrazione del Ministero della Sanità n. 9356 del 17/09/97

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20
00143 Roma

Composizione:
- Pirimicarb puro g 25
- Coformulanti q.b.a g 100

Contenuto: **Kg.0,250-0,500-1** Partita n.

Stabilimento di produzione:
DIACHEM S.P.A.
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni particolari/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legale labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
L'AFIDAGRO è un aficida che agisce contro gli afidi verso i quali denota una notevole rapidità di azione. La dose di impiego varia da 80 a 125 g/hl di acqua. In particolare si consiglia l'impiego di AFIDAGRO alla prima comparsa del parassita, ripetendo, eventualmente, in caso di reinfestazioni.
Il campo d'impiego dell'AFIDAGRO è molto ampio e, precisamente, può essere impiegato su: **AGRUMI, MELO, PERO, PESCO, CILIEGIO, SUSINO, ALBICOCCO, MANDORLO, VITE;** in orticoltura su: **LATTUGA, INDIVIA, POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, COCOMERO, MELONE, ZUCCHINO, CETRIOLO, FAGIOLINO, FAGIOLO, PISELLO, CAVOLI, CARCIOFO, SEDANO, CAROTA, BIETOLA ROSSA, RAPA, CIPOLLA, PATATA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO; CEREALI (FRUMENTO, ORZO, MAIS); TABACCO, LINO** e **CANAPA, FLOREALI** ed **ORNAMENTALI (in pieno campo), PIANTE FORESTALI.**

COMPATIBILITÀ
L'AFIDAGRO non è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
È tossico per gli insetti utili. È nocivo per animali domestici e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 30 giorni per i CEREALI; 14 giorni per le altre colture.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

ETICHETTA CONFEZIONI IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

AFIDAGRO

Aficida in polvere bagnabile
(sacchetti idrosolubili)

AFIDAGRO Registrazione del Ministero della Sanità n. 9356 del 17/09/97

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20
00143 Roma

Composizione:
- Pirimicarb puro g 25
- Coformulanti q.b.a g 100

Partita n.
Contenuto: **Kg. 1 (10 s.i. da100 g)**
Kg. 1 (4 s.i. da 250 g)

Stabilimento di produzione:
DIACHEM S.P.A.
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni particolari/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legale labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
L'AFIDAGRO è un aficida che agisce contro gli afidi verso i quali denota una notevole rapidità di azione. La dose di impiego varia da 80 a 125 g/hl di acqua. In particolare si consiglia l'impiego di AFIDAGRO alla prima comparsa del parassita, ripetendo, eventualmente, in caso di reinfestazioni.
Il campo d'impiego dell'AFIDAGRO è molto ampio e, precisamente, può essere impiegato su: **AGRUMI, MELO, PERO, PESCO, CILIEGIO, SUSINO, ALBICOCCO, MANDORLO, VITE;** in orticoltura su: **LATTUGA, INDIVIA, POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, COCOMERO, MELONE, ZUCCHINO, CETRIOLO, FAGIOLINO, FAGIOLO, PISELLO, CAVOLI, CARCIOFO, SEDANO, CAROTA, BIETOLA ROSSA, RAPA, CIPOLLA, PATATA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO; CEREALI (FRUMENTO, ORZO, MAIS); TABACCO, LINO** e **CANAPA, FLOREALI** ed **ORNAMENTALI (in pieno campo), PIANTE FORESTALI.**

AVVERTENZE D'USO
Nel caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

COMPATIBILITÀ
L'AFIDAGRO non è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
È tossico per gli insetti utili. È nocivo per animali domestici e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 30 giorni per i CEREALI; 14 giorni per le altre colture.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

MODO DI UTILIZZO DEI SACCHETTI IDROSOLUBILI

25%

Assicurare la completa pulizia della botte e riempire l'atomizzatore con il 25% di acqua.

Con mani/guanti asciutti prelevare il numero di sacchetti idrosolubili, chiusi, previsti.

Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore.

Attendere qualche minuto fino a completa solubilizzazione.

Aggiungere la restante parte di acqua necessaria ed eventuali altri prodotti da miscelare.

DL 65/2003

ETICHETTA PER SACCHETTI IDROSOLUBILI

AFIDAGRO

Aficida in polvere bagnabile
(sacchetti idrosolubili)

AFIDAGRO Registrazione del Ministero della Sanità n. 9356 del 17/09/97

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20
00143 Roma

Composizione:

- Pirimicarb puro	g 25
- Coformulanti q.b.a	g 100

Contenuto: 100 g 250 g Partita n.

TOSSICO

Stabilimento di produzione:
DIACHEM S.P.A.
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

AVVERTENZA: leggere l'etichetta riportata sulla confezione

DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE L'INVOLUCRO

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PROCIM

Fungicida ad azione preventiva e curativa in sospensione concentrata

PROCIM Registrazione del Ministero della Sanità n. 9390 del 01/10/97

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18 - 00143 Roma

Composizione
PROCIMIDONE puro g. 26 (=281 g/l)
Coformulanti q.b.a g.100

Stabilimento di produzione:
DIACHEM S.p.A.
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
Stabilimento di confezionamento:
ZAPI S.p.A. - Conselve (PD)

Partita n. Contenuto: **0,100-0,250-0,500-1-5 L**

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il PROCIM è un fungicida dotato di azione preventiva e curativa, particolarmente efficace nella lotta contro le muffe grigie ed i marciumi delle piante causati da Botrytis, Sclerotinia, Monilia ed Alternaria. La formulazione flowable ne migliora gli aspetti applicativi, assicurando migliore uniformità di copertura e resistenza al dilavamento. Il PROCIM non influisce sulla fermentazione dei mosti e non conferisce sapori e odori sgradevoli alle colture trattate.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Vite: 200-300 ml/hl contro muffa grigia (Botrytis cinerea), intervenendo nelle seguenti fasi fenologiche: a) fine fioritura; b) pre-chiusura del grappolo; c) invaiatura; d) 3-4 settimane prima della raccolta.
Pesco, Susino, Albicocco: 300-400 ml/hl contro moniliosi dei fiori e dei rami (Monilia laxa) intervenendo dalla fase di pre-fioritura alla piena fioritura; contro la moniliosi dei frutti (Monilia fructigena) intervenendo da 5 a 3 settimane prima della raccolta alla dose di 200-300 ml/hl.
Mandorlo: contro moniliosi (Monilia laxa e fructigena) intervenire alla dose di 300-400 ml/hl fino alla piena fioritura.
Nocciolo: contro moniliosi (Monilia laxa e fructigena) intervenire alla dose di 150-200 ml/hl in prossimità della fase di piena allegagione
Fragola: 160-200 ml/hl contro Botrite (Botrytis cinerea): Effettuare tre trattamenti ai seguenti stadi vegetativi: a) apertura dei petali; b) durante la fioritura; c) a fine fioritura.
Actinidia: contro muffa grigia (Botrytis cinerea) intervenendo alla dose di 300-400 ml/hl nelle seguenti fasi: piena fioritura, inizio allegagione, ingrossamento dei frutti, 2-3 settimane prima della raccolta; nei trattamenti di post-raccolta in magazzino intervenire con una soluzione allo 0,02% per immersione o a doccia.
Pero: contro moniliosi (Monilia laxa e fructigena) e contro maculatura bruna (Stemphylium versicarium) alla dose di 200-300 ml/hl con interventi ripetuti a partire dalla fase di fine fioritura.
Pomodoro, Melanzana, Peperone: 160-200 ml/hl contro Alternaria (Alternaria alternata), Muffa grigia (Botrytis cinerea), Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum) intervenendo ai seguenti stadi vegetativi: su pomodoro effettuare interventi ripetuti ogni 2 settimane iniziando dalla fase di fioritura del 1° palco fiorale; su peperone intervenire non più di una volta e su melanzana non più di 3 volte.
Fagiolino, Cetriolo, Aglio, Cipolla: 200-300 ml/hl contro Botrite, Sclerotinia, Alternaria e Marciume bianco (Sclerotium cepivorum) intervenendo in funzione dello sviluppo della malattia fungina.
Lattuga, Indivia: 2-3 l/ha contro Sclerotinia e Botrite. Eseguire non più di 2 interventi dopo la crisi di trapianto.
Colza, Girasole: 2 l/ha contro Botrite e Sclerotinia. Intervenire prima della fioritura.
Tabacco: 2-3 l/ha contro Muffa grigia e Sclerotinia intervenendo in funzione dello sviluppo della malattia fungina.
Colture floreali (Rosa in pieno campo, Gerbera, Geranio, Crisantemo, Garofano, Ciclamino) : 80-160 ml/hl contro Muffa grigia e Sclerotinia ripetendo gli interventi in funzione degli attacchi fungini. 6-8 ml/mq per interventi al terreno.

COMPATIBILITÀ
Il PROCIM risulta compatibile con i più comuni fungicidi ed insetticidi in commercio. Occorre effettuare la miscelazione estemporaneamente prima dell'impiego, diluendo dapprima in poca acqua ed aggiungendo la rimanente quantità sino al volume desiderato.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Nei trattamenti a colture floricole ed orticole, specie se in serra, si consiglia di effettuare saggi preliminari.

Sospendere i trattamenti in campo 45 giorni prima della raccolta per Colza; 21 giorni per Vite, Susino, Girasole; 14 giorni per Pesco, Albicocco, Actinidia, Pero, Fragola, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Fagiolino, Lattuga, Indivia. Nei trattamenti su Actinidia in post-raccolta lasciar trascorrere 60 giorni dal trattamento all'immissione al consumo.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

DL 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

PROCIM

Fungicida ad azione preventiva e curativa in sospensione concentrata

PROCIM Registrazione del Ministero della Sanità n. 9390 del 01/10/97

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18 - 00143 Roma

Composizione
PROCIMIDONE puro **g 26 (=281 g/l)**
Coformulanti q.b.a **g 100**

Contenuto **ml 100**

Partita n.

Stabilimento di produzione:
DIACHEM S.p.A. - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
Stabilimento di confezionamento:
ZAPI S.p.A. - Conselve (PD)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

KLARO KIT

(Soluzione acquosa)

DISERBANTE TOTALE SISTEMICO PRONTO ALL'USO

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9463 del 13/01/1998

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 Roma
Distribuito da ZAPI SpA – Conselve (PD)

Composizione	
GLIFOSATE acido puro	g. 0.8 (=8 g/l)
Coformulanti q.b.a	g. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Partita n.

Contenuto L. 0,100-0,250-0,500-0,750-1-2-5-10-20

Stabilimenti di produzione:
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)
ZAPI SpA - Conselve (PD)

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE

KLARO KIT è un diserbante sistemico di post-emergenza non selettivo e non residuale che trova impiego ovunque vi sia vegetazione. Viene assorbito dalle foglie e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perennanti (rizomi, tuberi, stoloni) che vengono devitalizzati. KLARO KIT è disattivato rapidamente a contatto con il terreno e non causa danni alle colture perenni arbustive ed arboree. Dopo 7-14 giorni compaiono i sintomi di ingiallimento delle infestanti trattate mentre l'essiccamento avviene entro 1 mese. E' importante che il trattamento avvenga in presenza di forte crescita delle infestanti o in fioritura delle stesse e con temperature alte. Si sconsiglia di trattare in giornate ventose onde evitare fenomeni di deriva o in presenza di minaccia di pioggia (6 ore dal trattamento).

SETTORI DI APPLICAZIONE

KLARO KIT è particolarmente indicato per i trattamenti localizzati sulle erbe che infestano terreni senza colture, fossi e scoline, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie; vivai e semenzai di floreali ed ornamentali, forestali e pioppo; prima e dopo la coltivazione di fragola e ortaggi.
Le semine o impianti devono essere fatti dopo che le infestanti sono state disseccate.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto si applica in post-emergenza delle malerbe e risulta efficace sulle diverse infestanti mono e dicotiledoni sia perennanti (Cynodon dactylon, Convolvulus arvensis, Cirsium arvense, Cyperus, ecc.) che annuali.
Le dosi di impiego sono:
50-100 ml/mq secondo il grado e il tipo di infestazione e sviluppo delle malerbe, avendo cura di bagnare bene le foglie. Le dosi massime sono richieste contro infestanti annuali e perennanti in avanzato stato di sviluppo.
AVVERTENZE - Piogge cadute dopo 6-8 ore dal trattamento non ne riducono l'efficacia.
Fare attenzione a non bagnare parti verdi di colture erbacee o arboree.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare, rami non lignificati, succhioni del tronco e del portainnesto di tutte le colture agricole. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente, con tre risciacqui consecutivi di acqua, le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.
Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi. Non scaricare le acque utilizzate per i lavaggi in acqua destinata all'irrigazione.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

D.L. n 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

KLARO KIT

(Soluzione acquosa)

DISERBANTE TOTALE SISTEMICO PRONTO ALL'USO

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9463 del 13/01/1998

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 Roma
Distribuito da ZAPI SpA – Conselve (PD)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione

GLIFOSATE acido puro	g. 0,8 (=8 g/l)
Coformulanti q.b.a	g. 100

Partita n.

Contenuto **100 ml**

Stabilimenti di produzione: **CHEMINOVA A/S** - Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)
ZAPI SpA - Conselve (PD)

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

D.L. n. 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

NAFTENE FLOW

Insetticida flowable a base di Carbaril

NAFTALENE FLOW Registrazione Ministero della Sanità n. 9665 del 15.06.98

COMPOSIZIONE
CARBARIL puro g. 43.5 (=478,5 g/l)
(esente da Beta Naftolo)
Coformulanti q.b. a g. 100

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 Roma
Officina di produzione:
DIACHEM S.p.A - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
Contenuto: 0,100-0,250-0,500-1-5-10-20 Litri Partita N.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Possibilità di effetti irreversibili.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
CARBARIL: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ DI IMPIEGO
Il NAFTENE FLOW è una formulazione flowable. Si tratta pertanto di un prodotto che, pur mantenendo la stessa caratteristica dell'analogo in polvere bagnabile, può essere impiegato a dosi più basse impiegando quantitativi ridotti di principio attivo per unità di superficie. Per la finezza di lavorazione e per gli speciali coadiuvanti che fanno parte della formulazione, il NAFTENE FLOW, una volta irrorato sulla vegetazione, la protegge e si dispone a guisa di film senza soluzione di continuità, proteggendo in modo completo la vegetazione utile dagli attacchi degli insetti.

DOSI DI IMPIEGO
MELO, PERO: contro verme, capua, cacoecia, eulia 100-150 ml/hl.
PESCO: contro tignola orientale 150-200 ml/hl;
PATATA: contro cavolaia e dorifora 125-200 ml/hl.
VITE, OLIVO, AGRUMI: contro tignola 100-150 ml/hl.
OLIVO: contro saissetia 150-200 ml/hl.

COMPATIBILITÀ
Il NAFTENE FLOW è miscibile con gli insetticidi e fungicidi di uso più comune esclusi i prodotti alcalini in genere (Poltiglia bordolese, polisolfiti).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
È nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 7 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

NAFTENE FLOW

Insetticida flowable a base di Carbaril

NAFTALENE FLOW Registrazione Ministero della Sanità n. 9665 del 15.06.98

COMPOSIZIONE
CARBARIL puro g. 43.5 (=478,5 g/l)
(esente da Beta Naftolo)
Coformulanti q.b. a g. 100

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 Roma
Officina di produzione:
DIACHEM S.p.A - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Contenuto: **100 ml** Partita N.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Possibilità di effetti irreversibili.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
CARBARIL: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

RUFAST E-FLO

Insetticida - Acaricida
Emulsione olio/acqua

RUFAST E-FLO Registrazione del Ministero della Sanità n° 9668 del 24/06/1998

Composizione su 100 g:	
Acrinatrina pura	g 7,01% (pari a 75 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 Roma

Distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl – via Riccardo Gigante, 18/20 - Roma
ZAPI Industrie Chimiche S.p.A. - III Strada, 12 – Conselve (PD)

Officine di produzione:
Provalis S.A. – St. Marcel - 13367 Marsiglia - Francia
Cheminova A/S - Thyborønvej 78, DK 7673 Harbøøre (Danimarca)
Isagro SpA - Aprilia (LT)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Stabilimento di confezionamento: **ZAPI Industrie Chimiche S.p.A** – III Strada, 12 – Conselve (PD)

TAGLIE: 10 – 25 – 50 – 100 - 250 - 500 ML; 1 – 5 – 10 L Partita n.

FRASI DI RISCHIO: **Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

NORME PRECAUZIONALI: **Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Durante l'impiego, in accordo con le corrette norme di applicazione, assicurare la protezione delle vie respiratorie con una maschera idonea (filtro tipo A2/P2 o tipo A2/P3). Applicare il prodotto in assenza di vento e a distanza ragionevole da persone prive di protezioni e da animali domestici. Dopo il trattamento, prima di rientrare in campo senza protezione, attendere che il deposito umido sulla vegetazione sia completamente asciugato.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
La sintomatologia tossica nell'animale è caratterizzata da sedazione, ptosi, ipersalivazione e dispnea. Arrossamenti oculari e disturbi dell'apparato respiratorio dopo inalazione.
Terapia sintomatica.
AVVERTENZA: **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE

RUFAST E-FLO è un insetticida-acaricida in emulsione acquosa particolarmente efficace contro tripidi (Frankliniella occidentalis, Taeniothrips meridionalis, ecc.); è inoltre attivo contro afidi, cicaline, psilla e contro le forme mobili dei più comuni acari fitofagi tetranichidi. RUFAST E-FLO agisce per contatto esercitando un'azione rapida e duratura. Per ottenere i migliori risultati è necessario effettuare una bagnatura accurata ed uniforme di tutta la vegetazione. Si consiglia di non effettuare più di 2 trattamenti all'anno su colture arboree e 2 trattamenti per ciclo su colture erbacee.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

VITICOLTURA:
Contro tripidi (Frankliniella occidentalis) 80 ml/hl (0,8-1,2 l/ha a seconda della forma di allevamento) ad inizio fioritura (20-30% fiori aperti) ripetendo il trattamento dopo 5-8 giorni. Bagnare accuratamente in particolare la zona dei grappoli.
Contro cicaline (Scaphoideus titanus, Empoasca flavescens, Zygina rhamni) 20-30 ml/hl (0,2-0,3 l/ha); contro acari (Panonychus ulmi, Eotetranychus carpini) 40-60 ml/hl al primo manifestarsi dell'attacco assicurando una bagnatura uniforme anche della pagina inferiore della foglia.

FRUTTICOLTURA (melo, pero, pesco, susino):
Contro tripide meridionale del pesco (Taeniothrips meridionalis) 60-80 ml/hl a bottoni rosa e a caduta petali.
Contro tripide occidentale (Frankliniella occidentalis) su pesco 60-80 ml/hl alla comparsa dell'infestazione, ripetendo il trattamento alla ricomparsa dei tripidi.
Contro psylla del pero 80-100 ml/hl ad inizio infestazione, prima della formazione della melata.
Contro acari (Panonychus ulmi) 80-100 ml/hl con interventi tempestivi (3-5 forme mobili per foglia o 50% delle foglie infestate).

AGRUMI (arancio, limone, clementino, pompelmo): Contro Panonychus citri ed altri acari 80-100 ml/hl (1,2-2 l/ha)

ORTAGGI (pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, melone, zucchino, fagiolo, fagiolino, cipolla), FRAGOLA:
Contro tripide occidentale (Frankliniella occidentalis) ed altri tripidi 60-80 ml/hl ad inizio infestazione ripetendo il trattamento dopo 4-6 giorni. Effettuare una bagnatura accurata ed uniforme curando particolarmente la zona dei fiori.
Contro acari (Tetranychus urticae e Panonychus ulmi) 60 ml/hl (0,6 l/ha) al primo manifestarsi dell'attacco, effettuando una bagnatura accurata ed uniforme anche della pagina inferiore delle foglie.
Alle dosi indicate RUFAST E-FLO è efficace anche contro afidi.

SOIA: Contro acari 0,6 l/ha.

MAIS: Contro acari ed afidi 0,6 l/ha.

COLTURE FLORICOLE ED ORNAMENTALI
Contro tripide (Frankliniella occidentalis) ed altri tripidi 60-80 ml/hl ad inizio infestazione ripetendo il trattamento dopo 4-6 giorni.
Contro acari (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi) 60-100 ml/hl.

COMPATIBILITÀ: RUFAST E-FLO generalmente si applica da solo; è comunque miscibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari a reazione neutra. Si consiglia di fare sempre una prova preliminare su poche piante prima di effettuare applicazioni estese.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Dato l'ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà di colture floricole ed ornamentali, è consigliabile effettuare saggi di selettività prima di estendere il trattamento su tutto l'impianto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU POMODORO, PEPERONE E MELANZANA, 21 GIORNI SU MELO, PERO E SUSINO, 30 GIORNI SU VITE E MAIS, 50 GIORNI SU SOIA E 7 GIORNI SULLE ALTRE COLTURE.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

DL n.65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

RUFAST E-FLO

Insetticida - Acaricida
Emulsione olio/acqua

RUFAST E-FLO Registrazione del Ministero della Sanità n° 9668 del 24/06/1998

Composizione su 100 g:
Acrinatrina pura g 7,01% (pari a 75 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

TAGLIE:
10–25–50–100 ML
Partita n.

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 Roma

Distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl – via Riccardo Gigante, 18/20 - Roma
ZAPI Industrie Chimiche S.p.A. - III Strada, 12 – Conselve (PD)

Officine di produzione:
Provalis S.A. – St. Marcel - 13367 Marsiglia - Francia
Cheminova A/S - Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)
Isagro SpA - Aprilia (LT)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Stabilimento di confezionamento: **ZAPI Industrie Chimiche S.p.A** – III Strada, 12 – Conselve (PD)

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Durante l'impiego, in accordo con le corrette norme di applicazione, assicurare la protezione delle vie respiratorie con una maschera idonea (filtro tipo A2/P2 o tipo A2/P3). Applicare il prodotto in assenza di vento e a distanza ragionevole da persone prive di protezioni e da animali domestici. Dopo il trattamento, prima di rientrare in campo senza protezione, attendere che il deposito umido sulla vegetazione sia completamente asciugato.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
La sintomatologia tossica nell'animale è caratterizzata da sedazione, ptosi, ipersalivazione e dispnea. Arrossamenti oculari e disturbi dell'apparato respiratorio dopo inalazione.
Terapia sintomatica.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL n.65/2003

NUFOS 7,5 G

GRANULARE

INSETTICIDA PER LA LOTTA CONTRO GLI INSETTI DEL TERRENO DA APPLICARE PRIMA DELLA SEMINA

NUFOS 7,5 G Registrazione del Ministero della Sanità n° 9767 del 01/10/98

Composizione:	
CLORPIRIFOS puro	g. 7,5
Coformulanti q.b.a	g.100

Partita n.

Contenuto: 0,5-1-5-10 Kg

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante 18/20 – 000143 Roma

Stabilimenti di produzione:
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78 - DK 7673 Harboøre - Danimarca
ISAGRO SpA - Aprilia (LT)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: **Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

NORME PRECAUZIONALI: **Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il NUFOS 7,5 G è un insetticida granulare per la lotta contro gli insetti che vivono nel terreno e sulla sua superficie ed è efficace anche nei terreni umidi ed in quelli irrigui.

Il NUFOS 7,5 G non trasmette odori sgradevoli ai vegetali e pertanto può essere utilizzato anche su terreni destinati a colture sensibili come le Bulbose ed il Tabacco.

Il NUFOS 7,5 G si impiega per la difesa delle seguenti colture: **Barbabietola da zucchero, Mais, Tabacco, Patata, Oleaginose (Girasole, Soia), Cavoli (Cavoli ad infiorescenza, Cavolo cappuccio, Cavolo cinese, Cavolo rapa), Solanacee (Pomodoro, Peperone, Melanzana), Fagiolo, Pisello, Carota, Cipolla, Colture floreali ed ornamentali.**

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il NUFOS 7,5 G è consigliato per la disinfestazione del terreno contro Elateridi (Agriotes spp.), Nottue (Mamestra brassicae, Agrotis spp., ecc.), Grillotalpa (Gryllotalpa gryllotalpa). Maggiolino (Melolontha melolontha), Tipule (Tipula spp.), Bibio (Bibio ortolani), Mosca del cavolo (Delia radicum), Formiche (Tatramorium spp., Formica spp.) alla dose di **32-40 Kg** per ettaro, incorporandolo al terreno con leggera erpicatura o fresatura. Nel caso di trattamenti localizzati il NUFOS 7,5 G viene distribuito alla dose di **10-16 Kg/ha** nei solchi preparati per la semina o per il trapianto. Su terreni molto leggeri si consiglia di attenersi alle dosi minime. Nella distribuzione del prodotto in miscela con concimi, è necessario che la granulometria dei singoli componenti non sia molto diversa; in caso contrario non si avrebbe una uniforme distribuzione dei prodotti.

COMPATIBILITÀ

Il NUFOS 7,5 G, data la sua formulazione granulare, non si applica in miscela con altri formulati.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è nocivo per i gli insetti utili, il bestiame, gli animali domestici

Sospendere i trattamenti 120 giorni prima della raccolta per soia e girasole; 60 giorni per barbabietola da zucchero, tabacco e patata; 30 giorni per mais; 21 giorni per pomodoro, peperone, carota e cipolla; 15 giorni per le altre colture.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

D.L. n. 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FOSETYL

Fungicida sistemico
(polvere bagnabile)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10015 del 12.04.99

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 - 00143 Roma

Composizione	
FOSETIL ALLUMINIO puro	g. 80
Coformulanti q.b.a	g. 100

Stabilimenti di produzione:
DIACHEM SpA
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
SIPCAM SpA – Salerano sul Lambro (LO)

Partita n.
Contenuto: **g. 100-250-500 e kg. 1-5-10-25**

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: **Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
FOSETYL è un fungicida sistemico la cui efficacia è garantita anche dalla sua grande mobilità nelle piante. Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui non presenta rischi collegati al dilavamento, e manifesta una sistemia ascendente e discendente che consente anche la protezione delle foglie formatesi dopo il trattamento.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua, quindi portare a volume mescolando bene.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
ORTICOLTURA
Carciofo: contro Bremia lactucae a 200-300 g/hl.
Lattuga: contro Bremia lactucae effettuare irrorazioni a 200-300 g/hl distribuendo almeno 3 kg/ha di prodotto. In presenza di forti sbalzi termici possono aversi problemi di fitotossicità. Per impiego su lattuga romana effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto.
Cetriolo, Spinacio, Cocomero: contro Peronospora, effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl distribuendo almeno 3 kg/ha di prodotto.
Melone: contro Pseudoperonospora cubensis effettuare irrorazioni fogliari a 200-300 g/hl distribuendo almeno 3 kg/ha di prodotto.
Fragola: contro Peronospora (Phytophtora cactorum e fragariae). Per evitare il deperimento anche in terreni molto infettati immergere le piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti e far seguire, alla medesima dose, 1 irrorazione in autunno e 2 in primavera; oppure, sempre prima del trapianto, immergerle in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti e far seguire 1 innaffiatura al piede in autunno e 2 in primavera alla dose di g 0,5 di formulato per pianta.
FRUTTICOLTURA
Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo: contro Phytophtora spp effettuare irrorazioni fogliari a 200-300 g/hl utilizzando 10 litri di poltiglia per pianta. Quando le piante si presentano fortemente debilitate dalla malattia e gli apparati fogliari non sono più in grado di assorbire completamente il fungicida, ai trattamenti alla vegetazione si potranno integrare pennellature sulle parti infette del legno (tronco e branche).
Melo, Pero, Pesco, Actinidia: contro Phytophtora cactorum, effettuare un trattamento al mese dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta per melo e actinidia) con 250 g/hl. Su piante già debilitate dalla malattia effettuare un'annaffiatura alla loro base (in modo da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, con litri 1-2 per pianta di una poltiglia costituita da kg 5 di prodotto per 100 litri di acqua.
Vite: contro Peronospora, a 250 g/hl di acqua. Si consiglia sempre l'associazione con formulati di copertura (rame escluso).
Vivai di fruttiferi: effettuare, con cadenza mensile, irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl.
Vivai di agrumi: impiegare ad una dose di 400 g/hl ogni 60 giorni.
COLTURE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO ED IN SERRA
Contro Phytophtora spp di Chamaecyparis e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee, Poinsetia, St. Paulia e Crisantemo, effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con g 5-10 di formulato per mq una volta al mese in primavera.

COMPATIBILITÀ
FOSETYL non è compatibile con i prodotti a base di rame, di dicofol e con concimi fogliari contenenti azoto. Non effettuare miscele con formulati oleosi, né irrorare il prodotto su colture che ne siano state precedentemente trattate in quanto si ostacolerebbe la penetrazione del prodotto nella pianta.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU CARCIOFO, CETRIOLO, COCOMERO, MELONE, LATTUGA, SPINACIO; 30 GIORNI SU FRAGOLA; 40 GIORNI SU MELO, PERO, PESCO, ACTINIDIA, VITE; 80 GIORNI SU ARANCIO, LIMONE, MANDARINO, POMPELMO.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

DL n. 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

FOSETYL

Fungicida sistemico
(polvere bagnabile)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10015 del 12.04.99

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 - 00143 Roma

Composizione		
FOSETIL ALLUMINIO puro	g.	80
Coformulanti q.b.a	g.	100

Partita n.
Contenuto:
g. 100

Stabilimenti di produzione:
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
SIPCAM SpA – Salerano sul Lambro (LO)

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DT 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

AGROCAMBA

DISERBANTE SELETTIVO DI POST-EMERGENZA
(liquido solubile)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10163 del 24/09/99

Composizione
DICAMBA puro g. 21,2 (=230 g/l)
(da sale dimetilamminico)
Coformulanti q.b.a g. 100

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante,18/20
00143 Roma

IRRITANTE

Partita n.
Contenuto: ml. 20-50-100-250-500 e L 1-5-10-20
Stabilimenti di produzione:
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
ALTHALLER ITALIA S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

FRASI DI RISCHIO: **Irritante per gli occhi. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

NORME PRECAUZIONALI: **Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
AGROCAMBA è un diserbante che agisce alterando il metabolismo enzimatico delle infestanti con cui viene a contatto. Esso viene assorbito per via fogliare e radicale e traslocato in tutta la pianta attraverso la circolazione linfatica.
Il prodotto, da applicare in post-emergenza delle malerbe, oltre a controllare dicotiledoni perenni quali Vilucchio *(Convolvulus arvensis)* e Stoppione *(Cirsium arvense)*, è efficace nei confronti di numerose specie di infestanti annuali quali Cencio molle *(Abutilon theophrasti)*, Amaranto *(Amaranthus retroflexus)*, Anagallide *(Anagallis arvensis)*, Iva comune *(Ajuga spp)*, Atriplice maggiore *(Atriplex patula)*, Forbicina *(Bidens spp)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Fiordaliso *(Centaurea cyanus)*, Farinaccio *(Chenopodium album)*, Stramonio *(Datura stramonium)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvulus)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Canapaccia comune *(Galeopsis tetrahit)*, Galinsoga comune *(Galinsoga parviflora)*, Attaccamano *(Galium aparine)*, Camomilla *(Matricaria chamomilla)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Correggiola *(Polygonum aviculare)*, Persicaria *(Polygonum persicaria)*, Poligono *(Polygonum convolvulus)*, Porcellana *(Portulaca oleracea)*, Rapastrella *(Raphanus raphanistrum)*, Sicio *(Sycios angulatus)*, Senape *(Sinapis arvensis)*, Erba calderina *(Senecio vulgaris)*, Erba morella *(Solanum nigrum)*, Arenaiola *(Spergula arvensis)*, Stellara *(Stellaria media)*, Erba storna *(Thlaspi arvense)*, Ortica minore *(Urtica urens)*, Veronica *(Veronica spp)*, Veccia *(Vicia spp)*, Nappola *(Xanthium spp)*.

CAMPI D'IMPIEGO
AGROCAMBA è un erbicida selettivo per il controllo delle infestanti di **MAIS, SORGO, FRUMENTO, ORZO, SEGALE AVENA, PRATI DI GRAMINACEE** (da foraggio, tappeti erbosi, pascoli, campi sportivi, campi da golf), **ASPARAGO** e **MELO**.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
MAIS: impiegare in post-emergenza con le infestanti ai primi stadi di sviluppo e con Mais avente 3-4 foglie fino ad un massimo di 6-7 foglie (altezza 40 cm), alla dose di **0,8-1,2 l/ha**.
SORGO: impiegare in post-emergenza della coltura allo stadio di 3-4 foglie alla dose di **0,8-1 l/ha.**
FRUMENTO, ORZO, SEGALE, AVENA: intervenire dallo stadio della coltura di 4 foglie fino ad inizio levata alla dose di **500 ml/ha**. È consigliabile, per ottenere migliori risultati, trattare quando le infestanti e la coltura sono in attiva crescita.
PRATI DI GRAMINACEE (da foraggio, tappeti erbosi, pascoli, campi sportivi, campi da golf): effettuare il trattamento quando le infestanti abbiano almeno 2 foglie sviluppate alla dose di **1 l/ha** per applicazioni a pieno campo e con soluzione allo 0,2% per trattamenti localizzati. Si consiglia di non intervenire immediatamente dopo lo sfalcio.
ASPARAGO: il trattamento deve essere effettuato in primavera prima dell'emergenza dei turioni, preferibilmente su terreno sarchiato e leggermente umido, sia con trattamenti a pieno campo alla dose di **200-500 ml/ha,** sia con trattamenti localizzati con soluzione allo 0,2%. Utilizzare per i trattamenti un volume d'acqua di 200-400 l/ha, fino a 500-600 litri/ha.
MELO: effettuare il trattamento alla dose di **1-1,5 l/ha** con l'avvertenza di non colpire le parti verdi della coltura.

Avvertenze:
- Su tappeti erbosi è d'obbligo segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del prodotto.
- Non impiegare su colture di mais impiantate su terreni sabbiosi o con basso contenuto di sostanza organica.
- Evitare che la nube irrorante possa giungere a contatto con colture vicine.

COMPATIBILITÀ
AGROCAMBA è compatibile con i principali erbicidi di post-emergenza presenti sul mercato quali MCPA, Mecoprop, Pendimetalin, 2,4D, Tribenuron metile, Triasulfuron qualora le condizioni di applicazione lo richiedano. In caso di miscele utilizzare AGROCAMBA a dosi dimezzate.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 130 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER SORGO, 30 GIORNI PER MELO E 20 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE.
SU PRATI DI GRAMINACEE DA FORAGGIO E PASCOLO NON IMMETTERE IL BESTIAME AL PASCOLO PRIMA CHE SIANO TRASCORSI 20 GIORNI DAL TRATTAMENTO.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

AGROCAMBA

DISERBANTE SELETTIVO DI POST-EMERGENZA
(liquido solubile)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10163 del 24/09/99

Composizione
DICAMBA puro **g. 21,2 (=230 g/l)**
(da sale dimetilamminico)
Coformulanti q.b.a **g. 100**

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante,18/20
00143 Roma

Stabilimenti di produzione:
DIACHEM SpA - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
ALTHALLER ITALIA S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

IRRITANTE

Partita n.

Contenuto: ml. 20-50-100

FRASI DI RISCHIO: irritante per gli occhi. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

BALDO EW

(emulsione olio/acqua)

INSETTICIDA PER USO AGRICOLO

BALDO EW Registrazione del Ministero della Sanità n. 10287 del 26.01.00

Composizione:
MALATHION puro g. 40 (=440 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

Partita n.

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 Roma

Stabilimento di produzione:
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)
Stabilimento di formulazione:
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)
Stabilimento di confezionamento:
DIACHEM SpA – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)

Distribuito da: SIAPA Srl – Via Caldera, 21 - Milano

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto:
50 ml-100 ml-250 ml
0,500-1-5-20 L.

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

APPLICAZIONI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il BALDO EW permette di effettuare la lotta contro i sottoindicati parassiti delle seguenti colture:
AGRUMI (Arancio, Mandarino, Limone, Clementino, Bergamotto, Cedro, Pompelmo, Pomelo, Tangerino, Limetta, Chinotto, Kumquat); POMACEE (Pero, Melo, Cotogno); DRUPACEE (Pesco, Nettarine, Percoche, Albicocco, Ciliegio, Susino, Mandorlo); FRAGOLA; FRUTTIFERI MINORI (Actinidia, Caco, Fico, Nespolo e Sorbo, Ribes nero e rosso, Uva spina, Mirtillo rosso, Mirtillo nero, Lampone, Rovo, Corbezzolo, Melograno); FRUTTIFERI DA FRUTTA A GUSCIO (Castagno, Noce, Nocciolo, Pino da pinoli, Pistacchio); VITE; OLIVO; CAVOLI (Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo verza, Cavolo bianco, Cavolo rosso, Cavolo cappuccio, Cavolo cinese, Cavolo di Bruxelles, Cavolo rapa, Cavolo nero); CARCIOFO; ASPARAGO; ORTAGGI A FOGLIA (Insalate: Lattuga, Cicoria, Indivia, Radicchio, Scarola, Rucola, Valerianella; Spinacio, Bietole da costa e da foglia, Cardo, Sedano, Finocchio, Prezzemolo, Erba cipollina, Basilico); CUCURBITACEE: (Cocomero, Melone, Zucca, Zucchino, Cetriolo); SOLANACEE (Pomodoro, Peperone, Melanzana); LEGUMI (Fagiolo, Fava, Pisello, Cece, Lenticchia, Lupino, Fagiolino, Pisello mangiatutto); ORTAGGI A RADICE (Carota, Bietola rossa, Bietola da orto, Cicoria da radice, Rapa, Ravanello, Navone, Rutabaga, Rafano, Pastinaca, Sedano rapa, Patata dolce); ORTAGGI A BULBO (Cipolla, Aglio, Scalogno, Porro); PATATA; BARBABIETOLA DA ZUCCHERO; CEREALI: Frumento, Orzo, Mais, Sorgo, Riso; CEREALI MINORI: Segale, Triticale, Avena; OLEAGINOSE: Girasole, Colza, Ravizzone, Cotone, Canapa; FORAGGERE LEGUMINOSE; TABACCO; FLOREALI E ORNAMENTALI; FORESTALI; PIOPPO
alle seguenti dosi:
- contro Cocciniglie in genere .... **300-360 ml/hl**
- contro Afidi, Altiche, Antonomi, Apion, Bombici, Cavolaia, Cassida, Cetonie, Cimici, Criocere, Fitonomi, Fleotribo, Misurine, Oziorrinchi, Nottue, Perrisie, Psille, Processionaria, Rinchiti, Scrivani, Sigarai, Tentredini, Tignole, Tortrici .... **180-250 ml/hl**
- contro Aleurodidi, Cecidomie, Cicaline, Mosca, Tingidi, Tripidi .... **120-150 ml/hl**

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Stemperare la giusta dose di prodotto in poca acqua e poi, sempre continuando ad agitare, aggiungere lentamente il quantitativo di acqua necessario a raggiungere la concentrazione voluta.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina. Non è comunque garantita la compatibilità con i formulati di altre Ditte.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Per le colture in serra sono sempre consigliabili saggi preliminari in funzione delle specifiche microcondizioni ambientali.

RISCHI DI NOCIVITÀ
E' tossico verso insetti utili, api, animali domestici e bestiame. Non trattare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente, prima che siano trascorsi almeno 20 giorni dal trattamento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

D.L. n 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

BALDO EW

(emulsione olio/acqua)

INSETTICIDA PER USO AGRICOLO

BALDO EW Registrazione del Ministero della Sanità n. 10287 del 26.01.00

Composizione:	
MALATHION puro	g. 40 (=440 g/l)
Coformulanti q.b.a	g. 100

Partita n.

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 Roma

Stabilimento di produzione:
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)
Stabilimento di formulazione:
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)
Stabilimento di confezionamento:
DIACHEM SpA – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Distribuito da: SIAPA Srl – Via Caldera, 21 - Milano

Contenuto: 50 ml-100 ml.

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

KLARO ULTRA

(Concentrato solubile)

DISERBANTE SISTEMICO DI POST-EMERGENZA AD AZIONE FOGLIARE

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10456 del 19/04/2000

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 - 00143 Roma
Distribuito da ZAPI SpA – Conselve (PD)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione
GLIFOSATE ACIDO puro g. 30,7 (=360 g/l)
(pari a sale isopropilamminico g. 41,8)
Coformulanti q.b. a g. 100

Partita n°

Contenuto
L 0,1-0,2-0,25-0,5-1-2-5-10-20-25-50

Stabilimento di produzione: **CHEMINOVA A/S -Thyborønvej 78 - DK-7673 Harboøre (DK)**
Stabilimento di confezionamento: **ZAPI SpA - Z.Ind. IIIa Strada, 12 - Conselve (PD)**

FRASI DI RISCHIO: Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il KLARO ULTRA è un diserbante di post-emergenza efficace su tutte le infestanti monocotiledoni e dicotiledoni, annuali e perenni. Viene assorbito dalle foglie e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perennanti, che vengono pure devitalizzati. Il KLARO ULTRA è rapidamente disattivato a contatto con il terreno. Non possedendo il prodotto efficacia di pre-emergenza, onde ottenere un diserbo duraturo, è possibile eventualmente utilizzare il KLARO ULTRA in miscela con un erbicida ad azione residuale (es. Diuron) per evitare la nascita delle infestanti provenienti da semi che possono germinare dopo l'applicazione del formulato da solo. L'effetto visivo dell'azione del KLARO ULTRA consiste in un ingiallimento o arrossamento ed in un appassimento graduale che si risolvono nella morte dell'infestante anche a livello dell'apparato radicale. La durata di questo processo è correlata alle condizioni ambientali.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto va usato per irrorazione sulle infestanti ben sviluppate, distribuendo volumi relativamente bassi (100-300 litri) di poltiglia per ettaro, in modo da bagnare uniformemente le malerbe, senza provocare perdite per gocciolamento. Impiegare pompe a bassa pressione (max 2 atm) e barre o lance munite di ugelli a specchio o a ventaglio che distribuiscono gocce di grosse dimensioni.

CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco, purchè ben lignificato: vite, agrumi, melo, pero, olivo, noce.
Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco, anche se ben lignificato: drupacee, mandorlo, pioppo.
Colture da diserbare esclusivamente utilizzando attrezzature selettive (lambenti, umettanti o a goccia): carciofo, fava, pisello, fagiolino, patata, pomodoro, melanzana, carota, barbabietola da zucchero, soia, mais (solo interfila), erba medica, prati, rosa; vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture da diserbare prima dell'emergenza: asparago.
Terreni in assenza della coltura (fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, prati, vivai): prima della semina o del trapianto (queste operazioni vanno successivamente effettuate non prima di 48 ore dal trattamento), dopo il raccolto o a fine ciclo.
Aree non agricole: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili.

DOSI D'IMPIEGO
I trattamenti possono essere effettuati su tutta la superficie o su fasce lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma. Le dosi d'impiego, riferite ad ettaro di superficie effettivamente trattata, variano in funzione della specie delle infestanti presenti:
- 3,5 litri/ha contro la maggior parte delle erbe annuali
- 4-5 litri/ha contro Sorghum halepense, Agropyrum repens, Ranunculus spp.
- 5-7 litri/ha contro Cyperus rotundus, Cirsium arvense (in fioritura), Artemisia vulgaris, Potentilla spp., Plantago spp., Taraxacum officinale, Rumex spp., Felci. Contro il Cyperus rotundus, per ottenere un risultato più duraturo, si può effettuare un primo trattamento alla dose di 5 litri/ha ripetendo l'intervento sui ricacci alla dose di 4 litri/ha;
- 8-10 litri/ha contro Convolvulus arvensis ben sviluppato (inizio fioritura), Cynodon dactylon, Urtica spp., Dacus carota, Sonchus arvensis, Tussilago farfara, Cannucce (alte 50-80 cm).
- 10-12 litri/ha contro Convolvulus arvensis all'inizio dello sviluppo (lungo almeno 30 cm.).

Per interventi su infestazioni a macchia irrorare con concentrazioni del prodotto in acqua dell' 1 - 2% contro le infestanti annuali e del 2 - 5% contro le perenni.

NOTE IMPORTANTI: Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante. Non bagnare il tronco, specialmente se non è ben lignificato o con ferite. Per evitare la deriva usare ugelli protetti da coni o schermi che evitino alla poltiglia erbicida di giungere a contatto con la vegetazione delle piante, specialmente se in forma di allevamento basse.
AVVERTENZE: Le piogge che cadono entro 6 ore dall'applicazione ne riducono l'efficacia. Le temperature medie e l'alta umidità dell'aria facilitando la crescita delle infestanti, favoriscono l'esito del diserbo; le temperature basse o il caldo estivo non limitano l'efficacia del prodotto purché le infestanti siano verdi, vitali e non essiccate. Le perennanti sono meglio controllate se ben sviluppate al momento del trattamento; alcune dicotiledoni (es. Vilucchio, Stoppione, Artemisia) sono più sensibili se in fioritura o in uno stadio più avanzato. Arature, fresature, tagli delle erbe o pascolo di animali prima del trattamento riducono l'efficacia del diserbo. Dopo il trattamento su erbe perennanti lasciar traslocare il prodotto negli organi sotterranei per 2 o 3 settimane prima di procedere a lavorazione del terreno.
Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, ha efficacia ridotta.
Non impiegare per la miscelazione, distribuzione o conservazione del prodotto recipienti galvanizzati (es. zincati) o in acciaio se non protetti da apposite vernici plastiche.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare (rami non lignificati, succhioni del tronco e del portainnesto) di tutte le colture agricole. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente, con tre risciacqui successivi di acqua, le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi. Non scaricare le acque utilizzate per i lavaggi in acque destinate all'irrigazione.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

D.L. n. 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

KLARO ULTRA

(Concentrato solubile)

DISERBANTE SISTEMICO DI POST-EMERGENZA AD AZIONE FOGLIARE

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10456 del 19/04/2000

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 - 00143 Roma
Distribuito da ZAPI SpA – Conselve (PD)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione	
GLIFOSATE ACIDO puro	g. 30,7 (=360 g/l)
(pari a sale isopropilamminico g. 41,8)	
Coformulanti q.b. a	g. 100

Partita n°

Contenuto: **100 ml**

Stabilimento di produzione: **CHEMINOVA A/S -Thyborønvej 78 - DK-7673 Harboøre (DK)**
Stabilimento di confezionamento: **ZAPI SpA - Z.Ind. IIIa Strada, 12 - Conselve (PD)**

FRASI DI RISCHIO: Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

D.L. n. 65/2003

M A S T I F F   U L T R A

(Concentrato solubile)

DISERBANTE SISTEMICO DI POST-EMERGENZA AD AZIONE FOGLIARE

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10509 del 14/06/2000

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via Riccardo Gigante, 18/20 - 00143 Roma

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione
GLIFOSATE ACIDO puro g. 30,7 (=360 g/l)
(pari a sale isopropilamminico g. 41,8)
Coformulanti q.b. a g. 100

Partita n°

Contenuto **L.** 0,25-0,5-1-5-10-20-25-50

Stabilimento di produzione: **CHEMINOVA A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (DK)**

FRASI DI RISCHIO: Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il MASTIFF ULTRA è un diserbante di post-emergenza efficace su tutte le infestanti monocotiledoni e dicotiledoni, annuali e perenni. Viene assorbito dalle foglie e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perennanti, che vengono pure devitalizzati. Il MASTIFF ULTRA è rapidamente disattivato a contatto con il terreno. Non possedendo il prodotto efficacia di pre-emergenza, onde ottenere un diserbo duraturo, è possibile eventualmente utilizzare il MASTIFF ULTRA in miscela con un erbicida ad azione residuale (es. Diuron) per evitare la nascita delle infestanti provenienti da semi che possono germinare dopo l'applicazione del formulato da solo. L'effetto visivo dell'azione del MASTIFF ULTRA consiste in un ingiallimento o arrossamento ed in un appassimento graduale che si risolvono nella morte dell'infestante anche a livello dell'apparato radicale. La durata di questo processo è correlata alle condizioni ambientali.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto va usato per irrorazione sulle infestanti ben sviluppate, distribuendo volumi relativamente bassi (100-300 litri) di poltiglia per ettaro, in modo da bagnare uniformemente le malerbe, senza provocare perdite per gocciolamento. Impiegare pompe a bassa pressione (max 2 atm) e barre o lance munite di ugelli a specchio o a ventaglio che distribuiscono gocce di grosse dimensioni.

CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco, purchè ben lignificato: vite, agrumi, melo, pero, olivo, noce.
Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco, anche se ben lignificato: drupacee, mandorlo, pioppo.
Colture da diserbare esclusivamente utilizzando attrezzature selettive (lambenti, umettanti o a goccia): carciofo, fava, pisello, fagiolino, patata, pomodoro, melanzana, carota, barbabietola da zucchero, soia, mais (solo interfila), erba medica, prati, rosa; vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture da diserbare prima dell'emergenza: asparago.
Terreni in assenza della coltura (fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, prati, vivai): prima della semina o del trapianto (queste operazioni vanno successivamente effettuate non prima di 48 ore dal trattamento), dopo il raccolto o a fine ciclo.
Aree non agricole: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili.

DOSI D'IMPIEGO
I trattamenti possono essere effettuati su tutta la superficie o su fasce lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma. Le dosi d'impiego, riferite ad ettaro di superficie effettivamente trattata, variano in funzione della specie delle infestanti presenti:

- 3,5 litri/ha contro la maggior parte delle erbe annuali
- 4-5 litri/ha contro Sorghum halepense, Agropyrum repens, Ranunculus spp.
- 5-7 litri/ha contro Cyperus rotundus, Cirsium arvense (in fioritura), Artemisia vulgaris, Potentilla spp., Plantago spp., Taraxacum officinale, Rumex spp., Felci. Contro il Cyperus rotundus, per ottenere un risultato più duraturo, si può effettuare un primo trattamento alla dose di 5 litri/ha ripetendo l'intervento sui ricacci alla dose di 4 litri/ha;
- 8-10 litri/ha contro Convolvulus arvensis ben sviluppato (inizio fioritura), Cynodon dactylon, Urtica spp., Dacus carota, Sonchus arvensis, Tussilago farfara, Cannucce (alte 50-80 cm).
- 10-12 litri/ha contro Convolvulus arvensis all'inizio dello sviluppo (lungo almeno 30 cm.).

Per interventi su infestazioni a macchia irrorare con concentrazioni del prodotto in acqua dell'1-2% contro le infestanti annuali e del 2-5% contro le perenni.

NOTE IMPORTANTI: Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante. Non bagnare il tronco, specialmente se non è ben lignificato o con ferite. Per evitare la deriva usare ugelli protetti da coni o schermi che evitino alla poltiglia erbicida di giungere a contatto con la vegetazione delle piante, specialmente se in forma di allevamento basse.
AVVERTENZE: Le piogge che cadono entro 6 ore dall'applicazione ne riducono l'efficacia. Le temperature medie e l'alta umidità dell'aria facilitando la crescita delle infestanti, favoriscono l'esito del diserbo; le temperature basse o il caldo estivo non limitano l'efficacia del prodotto purchè le infestanti siano verdi, vitali e non essiccate. Le perennanti sono meglio controllate se ben sviluppate al momento del trattamento; alcune dicotiledoni (es. Vilucchio, Stoppione, Artemisia) sono più sensibili se in fioritura o in uno stadio più avanzato. Arature, fresature, tagli delle erbe o pascolo di animali prima del trattamento riducono l'efficacia del diserbo. Dopo il trattamento su erbe perennanti lasciar traslocare il prodotto negli organi sotterranei per 2 o 3 settimane prima di procedere a lavorazione del terreno.
Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, ha efficacia ridotta.
Non impiegare per la miscelazione, distribuzione o conservazione del prodotto recipienti galvanizzati (es. zincati) o in acciaio se non protetti da apposite vernici plastiche.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare (rami non lignificati, succhioni del tronco e del portainnesto) di tutte le colture agricole. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente, con tre risciacqui successivi di acqua, le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi. Non scaricare le acque utilizzate per i lavaggi in acque destinate all'irrigazione.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

D.L. n.65/2003

DIMETHOAT ST
(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
Insetticida a base di Dimetoato

DIMETHOAT ST Registrazione del Ministero della Salute n.11248 del 19.03.02

Composizione:
DIMETOATO puro g. 40 (=428 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100
*** contiene Cicloesanone e Xilene**

Contiene Anidride Maleica: può provocare una reazione allergica

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20
00143 - Roma

NOCIVO

Distribuito da
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA Srl
Via A. Volta, 12
20093 Cologno Monzese (MI)

Stabilimento di produzione
(formulazione e confezionamento o sola formulazione):
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78, DK
7673 Harboøre (Danimarca)

Stabilimento di confezionamento:
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA Srl
Via Siemens, 12 – 39100 Bolzano

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n° **Contenuto netto: 250-500 ml 1-5-10-20 litri**

FRASI DI RISCHIO: **Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Poco efficace la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
Da usare solo in pieno campo
Il DIMETHOAT ST è un insetticida efficace contro numerosi insetti parassiti delle colture agrarie, dotato di elevata azione citotropica per cui penetra nei tessuti vegetali agendo sulle forme di insetti più nascoste.
AGRUMI (vivai di piante non in produzione): contro Afidi, Acari, - Cocciniglie e Ragno rosso 125 ml/hl. **OLIVO**: contro Mosca delle olive 140 ml/hl negli attacchi "precocissimi" (luglio) e "normali" (settembre-ottobre); 75 ml/hl in quelli "precoci" (agosto). I trattamenti si eseguono normalmente all'inizio dell'ovodeposizione, cioè quando si notano le prime punture della mosca sulle olive; contro Tignola 140 ml/hl contro larve della generazione fillofaga; contro Liotripide 90 ml/hl in pre-fioritura; contro Punteruolo e Oziorrinco 70 ml/hl. **CILIEGIO**: contro Mosca della ciliegia 50 ml/hl sulle varietà a maturazione media e tardiva. **ASPARAGO**: contro Mosca 70-100 ml/hl alla comparsa dell'infestazione; contro Ragno rosso e Afidi 90 ml/hl. **POMODORO, MELANZANA (entrambe solo in pieno campo)**: contro Afidi e Aleurodidi 70-100 ml/hl; contro Vasate 100 ml/hl. **LATTUGA (solo in pieno campo), BIETOLA ROSSA, RAPA, NAVONE**: contro Afidi, Mosca e Ragno rosso 70-100 ml/hl. **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO**: contro Sminturide 50 ml/hl, contro Mosca 70-100 ml/hl. **TABACCO**: contro lepidotteri 55-100 ml/hl; contro Aleurodidi, Afidi e Tripidi 70-90 ml/hl. **FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE**: contro Sminturide 50 ml/hl.
FLORICOLE: contro Ditteri dei fiori, Striscino del garofano e Hylemya Brunnescens eseguire, alla dose di 200 ml per ettolitro di acqua, trattamenti a partire dal mese di aprile contro queste larve minatrici. **PIOPPO, COLTURE FORESTALI**: contro Tarlo vespa, Gemmaiola, Crisomela 300 ml/hl.

Per la preparazione dell'emulsione basta versare, agitando energicamente, la dose necessaria di prodotto in tutto il quantitativo di acqua richiesto per ottenere la concentrazione desiderata.

COMPATIBILITÀ
Il DIMETHOAT ST non è compatibile con i formulati a base di poltiglia bordolese, borgognona e polisolfuro di calcio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Su olivo non impiegare il prodotto in irrorazioni a basso volume sulle varietà Coratina, Simona, Canina, Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana, Bosana.

RISCHI DI NOCIVITÀ
A seguito dei trattamenti il prodotto è nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LATTUGA E ASPARAGO; 20 GIORNI PER TABACCO E CILIEGIO; 21 GIORNI PER MELANZANA E POMODORO; 28 GIORNI PER OLIVO, FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE; 30 GIORNI PER BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, BIETOLA ROSSA, RAPA, NAVONE.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

D.L. n. 65/2003

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

DIMISTAR

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
Insetticida a base di Dimetoato

DIMISTAR Registrazione del Ministero della Salute n. 11773 del 12/11/2003

Composizione:
DIMETOATO puro g. 40 (=428 g/l)
Coformulanti* q.b. a g. 100
* contiene Cicloesanone e Xilene

Contiene Anidride Maleica: può provocare una reazione allergica

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20
00143 Roma

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)
Stabilimento di confezionamento:
DIACHEM S.p.A.
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

Partita n°

Contenuto netto: 100-250-500 ml 1-5-10-20 **L**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Poco efficace la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
Da usare solo in pieno campo
Il DIMISTAR è un insetticida efficace contro numerosi insetti parassiti delle colture agrarie, dotato di elevata azione citotropica per cui penetra nei tessuti vegetali agendo sulle forme di insetti più nascoste.
AGRUMI (vivai di piante non in produzione): contro Afidi, Acari, Cocciniglie e Ragno rosso 125 ml/hl. **OLIVO**: contro Mosca delle olive 140 ml/hl negli attacchi "precocissimi" (luglio) e "normali" (settembre-ottobre); 75 ml/hl in quelli "precoci" (agosto). I trattamenti si eseguono normalmente all'inizio dell'ovodeposizione, cioè quando si notano le prime punture della mosca sulle olive; contro Tignola 140 ml/hl contro larve della generazione fillofaga; contro Liotripide 90 ml/hl in pre-fioritura; contro Punteruolo e Oziorrinco 70 ml/hl. **CILIEGIO**: contro Mosca della ciliegia 50 ml/hl sulle varietà a maturazione media e tardiva. **ASPARAGO**: contro Mosca 70-100 ml/hl alla comparsa dell'infestazione; contro Ragno rosso e Afidi 90 ml/hl. **POMODORO, MELANZANA (entrambe solo in pieno campo)**: contro Afidi e Aleurodidi 70-100 ml/hl; contro Vasate 100 ml/hl. **LATTUGA (solo in pieno campo), BIETOLA ROSSA, RAPA, NAVONE**: contro Afidi, Mosca e Ragno rosso 70-100 ml/hl. **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO**: contro Sminturide 50 ml/hl, contro Mosca 70-100 ml/hl. **TABACCO**: contro lepidotteri 55-100 ml/hl; contro Aleurodidi, Afidi e Tripidi 70-90 ml/hl. **FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE**: contro Sminturide 50 ml/hl.
FLORICOLE: contro Ditteri dei fiori, Striscino del garofano e Hylemya Brunnescens eseguire, alla dose di 200 ml per ettolitro di acqua, trattamenti a partire dal mese di aprile contro queste larve minatrici. **PIOPPO, COLTURE FORESTALI**: contro Tarlo vespa, Gemmaiola, Crisomela 300 ml/hl.
Per la preparazione dell'emulsione basta versare, agitando energicamente, la dose necessaria di prodotto in tutto il quantitativo di acqua richiesto per ottenere la concentrazione desiderata.

COMPATIBILITÀ
Il DIMISTAR non è compatibile con i formulati a base di poltiglia bordolese, borgognona e polisolfuro di calcio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Su olivo non impiegare il prodotto in irrorazioni a basso volume sulle varietà Coratina, Simona, Canina, Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana, Bosana.

RISCHI DI NOCIVITÀ
A seguito dei trattamenti il prodotto è nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LATTUGA E ASPARAGO; 20 GIORNI PER TABACCO E CILIEGIO; 21 GIORNI PER MELANZANA E POMODORO; 28 GIORNI PER OLIVO, FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE; 30 GIORNI PER BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, BIETOLA ROSSA, RAPA, NAVONE.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

D.L. n. 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

DIMISTAR

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)

Insetticida a base di Dimetoato

DIMISTAR Registrazione del Ministero della Salute n. 11773 del 12/11/2003

Composizione:
DIMETOATO puro g. 40 (=428 g/l)
Coformulanti* q.b. a g. 100
* contiene Cicloesanone e Xilene

Contiene Anidride Maleica: può provocare una reazione allergica

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20
00143 Roma

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)
Stabilimento di confezionamento:
DIACHEM S.p.A. - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

Partita n° Contenuto netto: 100 ml

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui **nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Poco efficace la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

VELOX PRO

(Concentrato solubile)

DISERBANTE SISTEMICO DI POST-EMERGENZA AD AZIONE FOGLIARE

Registrazione del Ministero della Salute n. 11823 del 10/11/2003

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 Roma

Distribuito da: SIAPA Srl – Milano

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione
GLIFOSATE ACIDO puro g. 37,5 (=450 g/l)
(pari a sale isopropilamminico g. 50,6)
Coformulanti q.b. a g. 100

Partita n°

Contenuto
L. 0,25-0,5-1-5-10-20-25-50

Stabilimento di produzione: **CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (DK)**

FRASI DI RISCHIO: Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE - Il VELOX PRO è un diserbante di post-emergenza efficace su tutte le infestanti monocotiledoni e dicotiledoni, annuali e perenni. Viene assorbito dalle foglie e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perennanti, che vengono pure devitalizzati. Il VELOX PRO è rapidamente disattivato a contatto con il terreno. Non possedendo il prodotto efficacia di pre-emergenza, onde ottenere un diserbo duraturo, è possibile eventualmente utilizzare il VELOX PRO in miscela con un erbicida ad azione residuale (es. Diuron) per evitare la nascita delle infestanti provenienti da semi che possono germinare dopo l'applicazione del formulato da solo. L'effetto visivo dell'azione del VELOX PRO consiste in un ingiallimento o arrossamento ed in un appassimento graduale che si risolvono nella morte dell'infestante anche a livello dell'apparato radicale. La durata di questo processo è correlata alle condizioni ambientali.

MODALITÀ D'IMPIEGO - Il prodotto va usato per irrorazione sulle infestanti ben sviluppate, distribuendo volumi relativamente bassi (100-300 litri) di soluzione per ettaro, in modo da bagnare uniformemente le malerbe, senza provocare perdite per gocciolamento. Impiegare pompe a bassa pressione (max 2 atm) e barre o lance munite di ugelli a specchio o a ventaglio che distribuiscono gocce di grosse dimensioni.

CAMPI D'IMPIEGO

Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco, purché ben lignificato: vite, agrumi, melo, pero, olivo, noce.
Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco, anche se ben lignificato: drupacee, mandorlo.
Colture da diserbare esclusivamente utilizzando attrezzature selettive (lambenti, umettanti o a goccia): carciofo, fava, pisello, fagiolino, patata, pomodoro, melanzana, carota, barbabietola da zucchero, soia, mais (solo interfila), erba medica, prati, rosa; vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture da diserbare prima dell'emergenza: asparago.
Terreni in assenza della coltura (fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, prati, vivai): prima della semina o del trapianto (queste operazioni vanno successivamente effettuate non prima di 48 ore dal trattamento), dopo il raccolto o a fine ciclo.
Aree non agricole: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili.

DOSI D'IMPIEGO

I trattamenti possono essere effettuati su tutta la superficie o su fasce lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma.
Le dosi d'impiego, riferite ad ettaro di superficie effettivamente trattata, variano in funzione della specie delle infestanti presenti:

- 2,8 litri/ha contro la maggior parte delle erbe annuali, quali tutte le Graminacee e le Dicotiledoni diverse da quelle sotto specificate
- 3,2-4 litri/ha contro Sorghum halepense (Sorghetta), Agropyrum repens (Gramignone), Ranunculus spp (Ranuncolo).
- 4-5,6 litri/ha contro Cyperus rotundus (Cipollino), Cirsium arvense (Stoppione, in fioritura), Artemisia vulgaris (Artemisia), Potentilla spp. (Cinquefoglio), Plantago spp. (Piantaggine), Taraxacum officinale (Soffione), Rumex spp. (Romice), Felci. Contro il Cyperus rotundus, per ottenere un risultato più duraturo, si può effettuare un primo trattamento alla dose di 4 litri/ha ripetendo l'intervento sui ricacci alla dose di 3,2 litri/ha;
- 6,4-8 litri/ha contro Convolvulus arvensis (Vilucchio) ben sviluppato (inizio fioritura), Cynodon dactylon (Gramigna), Urtica spp. (Ortica), Daucus carota (Carota selv.), Sonchus arvensis (Crispino), Tussilago farfara (Farfaro), Phragmites spp. (Cannucce, alte 50-80 cm)
- 8-9,6 litri/ha contro Convolvulus arvensis (Vilucchio) all'inizio dello sviluppo (lungo almeno 30 cm.).

Per interventi su infestazioni a macchia irrorare con concentrazioni del prodotto in acqua dello 0,8-1,6% contro le infestanti annuali e dell'1,6-4% contro le perenni.

NOTE IMPORTANTI: Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante. Non bagnare il tronco, specialmente se non è ben lignificato o con ferite. Per evitare la deriva usare ugelli protetti da coni o schermi che evitino alla soluzione erbicida di giungere a contatto con la vegetazione delle piante, specialmente se in forma di allevamento basse.

AVVERTENZE: Le piogge che cadono entro 6 ore dall'applicazione ne riducono l'efficacia. Le temperature medie e l'alta umidità dell'aria facilitando la crescita delle infestanti, favoriscono l'esito del diserbo; le temperature basse o il caldo estivo non limitano l'efficacia del prodotto purché le infestanti siano verdi, vitali e non essiccate. Le perennanti sono meglio controllate se ben sviluppate al momento del trattamento; alcune dicotiledoni (es. Vilucchio, Stoppione, Artemisia) sono più sensibili se in fioritura o in uno stadio più avanzato. Arature, fresature, tagli delle erbe o pascolo di animali prima del trattamento riducono l'efficacia del diserbo. Dopo il trattamento su erbe perennanti lasciar traslocare il prodotto negli organi sotterranei per 2 o 3 settimane prima di procedere a lavorazione del terreno.

Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, ha efficacia ridotta.

Non impiegare per la miscelazione, distribuzione o conservazione del prodotto recipienti galvanizzati (es. zincati) o in acciaio se non protetti da apposite vernici plastiche.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ - Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare (rami non lignificati, succhioni del tronco e del portainnesto) di tutte le colture agricole. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente, con tre risciacqui successivi di acqua, le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi. Non scaricare le acque utilizzate per i lavaggi in acque destinate all'irrigazione.

Avvertenza: per impieghi in aree ed opere civili è obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

D.L. n. 65/2003

VINCIT

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Fungicida sistemico ad ampio spettro d'azione per la difesa contro le malattie fogliari che colpiscono frumento, orzo, avena e la barbabietola da zucchero.

VINCIT

Registrazione del Ministero della Salute n. 12221 del 23/12/2004

Composizione:
FLUTRIAFOL puro g. 11,8 (=125 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Riccardo Gigante, 18/20
00143 Roma

Partita n°

Contenuto netto: 250-500 ml 1-5 litri

NOCIVO

Stabilimento di produzione:
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In seguito ad ingestione, il flutriafol può causare nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Negli animali da esperimento l'avvelenamento da prodotti a base di flutriafol comporta sintomi di tossicità sistemica quali convulsioni, perdita di conoscenza e respirazione irregolare.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

VINCIT è un prodotto ad attività sistemica particolarmente attivo su Basidiomiceti ed Ascomiceti verso i quali dimostra azione protettiva, curativa ed eradicante.

MODALITÀ D'IMPIEGO

In relazione alle associazioni fungine che si desidera combattere, VINCIT va impiegato da solo od in miscela con altri principi attivi. In relazione allo sviluppo della vegetazione od all'attrezzatura aziendale disponibile, vanno impiegati volumi d'acqua medio bassi (50-800 lt/ha).

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

Frumento, orzo ed avena

Contro oidio, ruggini, septoria, fusariosi, rincosporiosi, impiegare **1 lt/ha.**

Intervenire alla comparsa dei primi sintomi, particolarmente durante le annate difficili e su varietà sensibili. Eseguire il trattamento a fine accestimento-inizio levata e ripetere all'apparire delle prime pustole sulle ultime due foglie (spigatura-inizio fioritura).

Barbabietola da zucchero

Contro cercospora ed oidio, impiegare **250-350 ml/ha.**

Intervenire alla comparsa delle prime macchie e ripetere i trattamenti, con intervallo di due settimane, per due-tre volte a seconda delle necessità.

FITOTOSSICITÀ

In condizioni di stress climatici ed idrici sui cereali possono verificarsi clorosi od ingiallimenti degli apici fogliari.

COMPATIBILITÀ

Qualora si reputi necessaria la miscela con altri principi attivi, VINCIT è miscibile con formulati a base di: maneb, mancozeb, carbendazim, sali dello stagno, ossicloruro di rame e zolfo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta della barbabietola da zucchero; 35 giorni prima della raccolta di frumento, orzo e avena.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

PROTEGGERE DAL FREDDO

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

DL 65/2003

ERMEX

(Concentrato solubile)

DISERBANTE SISTEMICO DI POST-EMERGENZA AD AZIONE FOGLIARE

ERMEX Reg.del Ministero della Salute n. 12249 del 15/10/2004

Composizione		
GLIFOSATE ACIDO puro		g. 39,7 (=480 g/l)
(pari a sale isopropilamminico g. 53,6)		
Coformulanti	q.b. a	g. 100

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 Roma

Stabilimento di produzione:

CHEMINOVA A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (DK)

Contenuto L. 0,25-0,5-1-5-10-20-25-50 Partita n°

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
L'ERMEX è un diserbante di post-emergenza efficace su tutte le infestanti monocotiledoni e dicotileconi, annuali e perenni. Viene assorbito dalle foglie e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perennanti, che vengono pure devitalizzati. Assorbimento e traslocazione vengono favoriti dall'aggiunta alla miscela da irrorare di solfato ammonico. L'ERMEX è rapidamente cisattivato a contatto con il terreno. Non possedendo il prodotto efficacia di pre-emergenza, onde ottenere un diserbo duraturo, è possibile eventualmente utilizzare l'ERMEX in miscela con un erbicida ad azione residuale (es. Diuron) per evitare la rascita delle infestanti provenienti da semi che possono germinare dopo l'applicazione del formulato da solo. L'effetto visivo dell'azione dell'ERMEX consiste in un ingiallimento o arrossamento ed in un appassimento graduale che si risolvono nella morte dell'infestante anche a livello dell'apparato radicale. La durata di questo processo è correlata alle condizioni ambientali.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto va usato per irrorazione sulle infestanti ben sviluppate, distribuendo volumi relativamente bassi (100-300 litri) di poltiglia per ettaro, in modo da bagnare uniformemente le malerbe, senza provocare perdite per gocciolamento. Impiegare pompe a bassa pressione (max 2 atm) e barre o lance munite di ugelli a specchio o a ventaglio che distribuiscono gocce di grosse dimensioni.

CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco, purchè ben lignificato: **vite, agrumi, melo, pero, olivo, noce.**
Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco, anche se ben lignificato: **drupacee, mandorlo, pioppo.**
Colture da diserbare esclusivamente utilizzando attrezzature selettive (lambenti, umettanti o a goccia): **carciofo, fava, pisello, fagiolino, patata, pomodoro, melanzana, carota, barbabietola da zucchero, soia, mais (solo interfila), erba medica, prati, rosa; vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.**
Colture da diserbare prima dell'emergenza: **asparago.**
Terreni in assenza della coltura (**fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, prati, vivai**): prima della semina o del trapianto (queste operazioni vanno successivamente effettuate non prima di 48 ore dal trattamento), dopo il raccolto o a fine ciclo.
Aree non agricole: **sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili.**

DOSI D'IMPIEGO
I trattamenti possono essere effettuati su tutta la superficie o su fasce lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma. Le dosi d'impiego, riferite ad ettaro di superficie effettivamente trattata, variano in funzione della specie delle infestanti presenti:
- 2,6 litri/ha contro la maggior parte delle erbe annuali
- 3-3,75 litri/ha contro Sorghum halepense (Sorghetta), Agropyrum repens (Gramignone), Ranunculus spp (Ranuncolo).
- 3,75-5,25 litri/ha contro Cyperus rotundus (Cipollino), Cirsium arvense (Stoppione, in fioritura), Artemisia vulgaris (Artemisia), Potentilla spp. (Cinquefoglio), Plantago spp. (Piantaggine), Taraxacum officinale (Soffione), Rumex spp. (Romice), Felci. Contro il Cyperus rotundus, per ottenere un risultato più duraturo, si può effettuare un primo trattamento alla dose di 3,75 litri/ha ripetendo l'intervento sui ricacci alla dose di 3 litri/ha;
- 6-7,5 litri/ha contro Convolvulus arvensis (Vilucchio) ben sviluppato (inizio fioritura), Cynodon dactylon (Gramigna), Urtica spp. (Ortica), Daucus carota (Carota selv.), Sonchus arvensis (Crispino), Tussilago farfara (Farfaro), Phragmites spp. (Cannucce, alte 50-80 cm).
- 7,5-9 litri/ha contro Convolvulus arvensis (Vilucchio) all'inizio dello sviluppo (lungo almeno 30 cm.).

Per interventi su infestazioni a macchia irrorare con concentrazioni del prodotto in acqua dello 0,75-1,5% contro le infestanti annuali e dell'1,5-3,75% contro le perenni.

NOTE IMPORTANTI: Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante. Non bagnare il tronco, specialmente se non è ben lignificato o con ferite. Per evitare la deriva usare ugelli protetti da coni o schermi che evitino alla poltiglia erbicida di giungere a contatto con la vegetazione delle piante, specialmente se in forma di allevamento basse.
AVVERTENZE: Le piogge che cadono entro 6 ore dall'applicazione ne riducono l'efficacia. Le temperature medie e l'alta umidità dell'aria facilitando la crescita delle infestanti, favoriscono l'esito del diserbo; le temperature basse o il caldo estivo non limitano l'efficacia del prodotto purché le infestanti siano verdi, vitali e non essiccate. Soprattutto in condizioni critiche, comunque, l'aggiunta di solfato ammonico alla miscela incrementa l'attività del prodotto. Le perennanti sono meglio controllate se ben sviluppate al momento del trattamento; alcune dicotiledoni (es. Vilucchio, Stoppione, Artemisia) sono più sensibili se in fioritura o in uno stadio più avanzato. Arature, fresature, tagli delle erbe o pascolo di animali prima del trattamento riducono l'efficacia del diserbo. Dopo il trattamento su erbe perennanti lasciar traslocare il prodotto negli organi sotterranei per 2 o 3 settimane prima di procedere a lavorazione del terreno. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, ha efficacia ridotta. Non impiegare per la miscelazione, distribuzione o conservazione del prodotto recipienti galvanizzati (es. zincati) o in acciaio se non protetti da apposite vernici plastiche.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con solfato ammonico e con preparati a base di erbicidi residuali quali Diuron.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare (rami non lignificati, succhioni del tronco e del portainnesto) di tutte le colture agricole. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente, con tre risciacqui successivi di acqua, le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi. Non scaricare le acque utilizzate per i lavaggi in acque destinate all'irrigazione.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

DT. n 65/2063

PERSHING

GRANULARE

INSETTICIDA PER LA LOTTA CONTRO GLI INSETTI DEL TERRENO DA APPLICARE PRIMA DELLA SEMINA

PERSHING Registrazione del Ministero della Salute n° 12320 del 23/11/2004

Composizione:		
CLORPIRIFOS puro	g.	7,5
Coformulanti q.b.a	g.	100

Contenuto:
0,375 - 0,5 – 1 - 5 - 10 Kg

Partita n.

Pericoloso per l'ambiente

CHEMINOVA AGRO ITALIA

Via Riccardo Gigante, 18/20 – Roma

Distribuito da: BAYER CROPSCIENCE Srl - Milano

Stabilimenti di produzione:
Isagro S.p.A. – Via Nettunense Km. 23,400 – Aprilia (LT)
Bayer CropScience Srl - via delle Industrie, 9 - Filago (BG)

Stabilimento di confezionamento:
Sinapak snc - v.le delle Industrie dell'Artigianato, 7 - Stradella (PV)

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le piacche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il PERSHING è un insetticida granulare per la lotta contro gli insetti che vivono nel terreno e sulla sua superficie ed è efficace anche nei terreni umidi ed in quelli irrigui.

Il PERSHING non trasmette odori sgradevoli ai vegetali e pertanto può essere utilizzato anche su terreni destinati a colture sensibili come le Bulbose ed il Tabacco.

Il PERSHING si impiega per la difesa delle seguenti colture: **Barbabietola da zucchero, Mais, Tabacco, Patata, Oleaginose (Girasole, Soia), Cavoli (Cavoli ad infiorescenza, Cavolo cappuccio, Cavolo cinese, Cavolo rapa), Solanacee (Pomodoro, Peperone, Melanzana), Fagiolo, Pisello, Carota, Cipolla, Colture floreali ed ornamentali.**

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il PERSHING è consigliato per la disinfestazione del terreno contro Elateridi (Agriotes spp.), Nottue (Mamestra brassicae, Agrotis spp., ecc.), Grillotalpa (Gryllotalpa gryllotalpa), Maggiolino (Melolontha melolontha), Tipule (Tipula spp.), Bibio (Bibio ortolani), Mosca del cavolo (Delia radicum), Formiche (Tatramorium spp., Formica spp.) alla dose di **32-40 Kg** per ettaro, incorporandolo al terreno con leggera erpicatura o fresatura. Nel caso di trattamenti localizzati il PERSHING viene distribuito alla dose di **10-16 Kg/ha** nei solchi preparati per la semina o per il trapianto. Su terreni molto leggeri si consiglia di attenersi alle dosi minime. Nella distribuzione del prodotto in miscela con concimi, è necessario che la granulometria dei singoli componenti non sia molto diversa; in caso contrario non si avrebbe una uniforme distribuzione dei prodotti.

COMPATIBILITÀ

Il PERSHING, data la sua formulazione granulare, non si applica in miscela con altri formulati.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 120 giorni prima della raccolta per soia e girasole; 60 giorni per barbabietola da zucchero, tabacco e patata; 30 giorni per mais; 21 giorni per pomodoro, peperone, carota e cipolla; 15 giorni per le altre colture.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

DL n.65/2003

STREAM

(Concentrato solubile)

DISERBANTE SISTEMICO DI POST-EMERGENZA CONTRO LE MALERBE ANNUALI E PERENNI

STREAM Reg.del Ministero della Salute n. 12329 del 23/11/2004

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 Roma

Contenuto 0,1 - 0,2 - 0,25 - 0,5 – 1 – 2 – 5 –10 – 20 – 25 – 50 L

Partita n°

Composizione		
GLIFOSATE acido puro		g. 30,9 (=360 g/l)
(da sale isopropilamminico pari a g. 41,2)		
Coformulanti	q.b. a	g. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione:

CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 - DK-7673 Harboøre (Danimarca)

ISAGRO SpA – Aprilia (Latina)

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

STREAM è un erbicida sistemico impiegato in post-emergenza, che agisce per assorbimento fogliare e viene traslocato sino alle radici e agli organi di propagazione con inibizione della sintesi proteica con effetto visivo dopo alcuni giorni con ingiallimento ed arrossamento delle infestanti e successivo disseccamento.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

- **TRATTAMENTI IN POST-EMERGENZA DELLE INFESTANTI: Agrumi, drupacee, pomacee, vite, olivo, asparago** (pre-emergenza), **pisello, fagiolino, pomodoro, melanzana, carota, barbabietola da zucchero, mais, erba medica.**
- **TERRENI SENZA COLTURE prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, mais, riso, soia, prati e vivai.**
- **INCOLTI: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali e industriali, aree ed opere civili.**

Nota: L'impiego su mais è consentito solo nelle interfile; da non impiegare in pre-raccolta.
Non spruzzare le parti legnose e verdi in quanto il prodotto non è selettivo.

Impiegare 3-5 ettolitri di acqua per ettaro con le seguenti dosi:

- **litri 3-5/ha** contro la maggior parte delle infestanti annuali (*Avena spp., Apera spica-venti, Alopecurus m., Poa spp., Echinochloa crus-galli, Lolium spp., Setaria spp., Panicum, Phalaris, Bromus spp., Adonis spp., Galium aparine, Camomilla, Galeopsis, Daucus carota, Thlaspi, Euphorbia spp., Lamium spp., Fumaria officinalis, Galinsoga, Geranium, Sonchus, Myosotis, Urtica, Papavero, Poa arvensis, Raphanus, Spergula, Diplotaxis, Stachys annua, Vicia spp., Veronica, Viola, Plantago, Rumex, Taraxacum, Tussilago*);
- **litri 4-5/ha** contro *Agropyron repens, Sorghum halepense, Ranunculus spp.*; su *Sorghetta* alta 30-40 cm usare la dose di litri 5,5 per ettaro, se invece è all'inizio della fioritura litri 4 per ettaro;
- **litri 5-6/ha** contro *Cirsium arvense* (in fioritura), *Cyperus spp.* (alla fioritura), *Artemisia vulgaris, Potentilla spp., Plantago spp., Taraxacum officinale, Rumex spp., Felci*;
- **litri 8-10/ha** contro *Cynodon dactylon, Sonchus arvensis, Convolvulus arvensis* (alla fioritura), *Urtica spp., Daucus carota, Tussilago farfara, Cannuccia* (alta 50-80 cm).
- **litri 10-12/ha** contro *Convolvulus arvensis* all'inizio dello sviluppo (alto 30 cm.).

Con presenza di infestanti nate da seme far seguire un trattamento con un prodotto residuale (es. Diuron). Se dopo il trattamento, entro un massimo di 8 ore, vi fosse una pioggia essa ridurrebbe l'efficacia del trattamento; evitare la deriva; togliere i succhioni e ricacci sulle colture arboree prima del trattamento; non lavorare il terreno per 3 settimane dopo il trattamento; tra il trattamento e l'impiego di prodotti residuali far trascorrere almeno 1-2 settimane.

Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, è inefficace.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto è fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Dopo il trattamento lavare accuratamente tutte le attrezzature impiegate.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Durante il trattamento tenere lontano animali domestici e bestiame.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

D.L. n 65/2003

AGRICO S.r.l.

EMME-H 60 WS

Fitoregolatore ad azione sistemica per il controllo selettivo dei germogli ascellari primari e secondari del tabacco.
Tipo di formulazione: Polvere solubile

Partita No:

Composizione:
- IDRAZIDE MALEICA PURA g 60
(contenente meno di 1 mg/kg di IDRAZINA)
- Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGRICO srl - viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

Stabilimento produttore:
DREXEL CHEMICAL COMPANY, MEMPHIS, TN, USA
Contenuto: 2 kg (2 sacchetti idrosolubili da 1kg)/ kg 1 / kg 5 / kg 10
Registrazione del Ministero della Sanità n. 10931 del 17/05/2001

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Irritante per cute e mucose, tremori, convulsioni fino al coma. Terapia: Sintomatica. Consultare un Centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche: Attivo per azione sistemica. Inibendo la divisione cellulare impedisce selettivamente lo sviluppo dei germogli del tabacco.
Colture protette: Tabacco.
Concentrazioni e dosi d'impiego: S'impiega alla dose di 4-5 kg di prodotto per ettaro diluito in circa 500 litri d'acqua. La dose inferiore si usa per i tabacchi di varietà chiara, la più alta per le varietà scure. Nell'applicazione manuale si calcolano 15-20 ml di soluzione per pianta.
Epoche d'impiego: La cimatura deve essere precoce e si tratta entro le 24 ore dalla cimatura.
Metodi d'applicazione: E' determinante per il buon esito che il prodotto venga assorbito dalle foglie della pianta. Sia nell'applicazione manuale che meccanica debbono pertanto essere impiegati ugelli producenti un getto nebulizzato e una pressione di 3 - 4 atm., bagnando bene la metà superiore della pianta.
Numero d'applicazioni: E' sufficiente un solo trattamento. Collocare il trattamento dopo un ciclo di raccolta delle foglie così da posizionare la successiva raccolta dopo circa una settimana. Interventi integrati con prodotti contattocidi come gli alcoli grassi o sistemici-locali come le dinitroaniline, prima e dopo il trattamento sono vivamente consigliati, specie nel caso di trattamenti meccanici.
Avvertenze per l'impiego:
- Bagnare uniformemente la parte superiore delle piante. Le foglie debbono essere asciutte e turgide.
- Non trattare piante destinate alla produzione del seme.
- L'efficacia del trattamento dipende dalla quantità di sostanza attiva assorbita e dislocata dalla pianta, pertanto si consiglia di trattare quando la pianta è attiva: i giorni successivi a un'irrigazione, di prima mattina o con cielo nuvoloso. Si sconsiglia di trattare con temperature elevate, su piante appassite ed in presenza di vento.
- Attenzione: Il trattamento può procurare un ingiallimento delle foglie. Tale precoce ingiallimento non essendo indice di maturità fisiologica non può essere preso come riferimento per la raccolta.

Compatibilità: Usare il prodotto da solo.
Fitotossicità: Non trattare piante ammalate, malnutrite o comunque sofferenti. Rispettare le dosi consigliate.
Attenzione! Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

PABIOS 75 WP

Diserbante di pre-emergenza in polvere bagnabile

Composizione:
Clortal-dimetile puro g. 75
Coformulanti q.b. a g. 100

Frasi di Rischio
Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

NOCIVO

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGRICO srl
Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

Stabilimento produttore: Torre srl – Torrenieri (SI) / STI - Solfotecnica Italiana spa - Cotignola (RA) / SCAM srl - S. Maria di Mugnano (MO) / CHEMIA spa - Dosso (FE) / A.D.I.C.A.-- Nero Montoro (Terni) / AMVAC - Newport Beach, CA. USA
Registrazione del Ministero della Sanità n. 2722 del 21/02/1978
Taglie autorizzate: g 100 - g 200 - g 500 – kg 1 - kg 5 - kg 10 - kg 25 - Partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso d'intossicazione chiamare il medico peri consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il PABIOS 75 WP deve essere usato in pre-emergenza avendo cura di lavorare bene il terreno; evitare trattamenti su terreni torbosi. E' traslocato per assorbimento radicale e dal colcoptile delle erbe infestanti.
E' efficace contro: Centocchio (Stellaria media), Amaranto (Amarantus retroflexus), Farinaccio (Chenopodium album), Papavero (Papaverrhoes). Resistono invece infestanti quali: Gramigna, Stoppione, Borsa di pastore, Avena.

Per Cipolla e porro: kg 10-12 per ettaro in 200-300 litri d'acqua.
Per Sedano, finocchio, insalata scarola: kg 8-10 per ettaro in 200-300 litri d'acqua.
Per Campi da golf, prati ornamentali: Kg. 9-10 per ettaro in 700-800 litri d'acqua. Eseguire l'intervento all'inizio della primavera o comunque prima della germinazione delle infestanti da controllare. Eventuali lavorazioni del tappeto erboso (taglio verticale, bucature, scarifiche o taglio dell'erba) vanno effettuate prima del trattamento.
Dopo il trattamento (entro 2-3 giorni), in assenza di precipitazioni, irrigare il tappeto erboso con un minimo di 20 mm. di acqua.
NON RIENTRARE NELL'AREA TRATTATA PRIMA DI 24 ORE DAL TRATTAMENTO SEGNALANDO CON APPOSITI CARTELLI IL DIVIETO D'ACCESSO NELLE AREE TRATTATE, MANTENENDO TALE DIVIETO PER 24 ORE DOPO L'APPLICAZIONE DEL PESTICIDA.
COMPATIBILITA': il PABIOS 75 WP non è compatibile con altri antiparassitari.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
EVENTUALI RISCHI DI NOCIVITA': Non immettere pollame e bestiame nel campo trattato prima di 30 giorni. E' velenoso per i pesci; evitare di contaminare i corsi d'acqua.
INTERVALLO AL CONSUMO: Osservare un intervallo di 30 giorni dall'ultimo trattamento all'immissione al consumo.
ATTENZIONE! Da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Zolfo Bagnabile Micronizzato 90

Fungicida
Tipo di formulazione: polvere bagnabile

Partita N.:

IRRITANTE

Composizione:
Zolfo puro (esente da selenio) . g. 90
Supporti, disperdenti, coadiuvanti q.b. a g. 100

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

AGRICO srl
viale Masini 22, 40126 BOLOGNA

Stabilimento produttore:
STI SOLFOTECNICA ITALIANA spa, Cotignola (RA)
SARIAF spa, Faenza (RA)
DREXEL CHEMICAL CO, Memphis, TN – USA
Taglie autorizzate: kg 0,5 - kg 1 – kg 5 - kg 10 - kg 25
Registrazione del Ministero della Sanità n. 4355 del 19/05/1981

INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso d'intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO:
Caratteristiche: la grande finezza e la formulazione determinano l'alta attività del prodotto e permettono l'impiego a basse dosi.
Colture protette: vite, arboree da frutto (come: pero, melo, pesco, nettarine, albicocco, nocciolo, mandorlo) e forestali, erbacee (come: frumento, tabacco), ortive (come: pomodoro, patata, melanzana, carciofo, asparago, fagiolo, cavolo, cavolfiore, carota, sedano, aglio, cipolla, lattuga, piselli, peperone, spinacio), ornamentali e da fiore in pieno campo.
Concentrazione e dosi d'impiego: in frutticoltura, g. 180-270 per 100 litri di acqua; in viticoltura, orticoltura e floricoltura, gr. 180-220 per 100 litri di acqua. Si usi la dose più bassa in caso di temperature elevate.
Epoche d'impiego: preventivamente o alla prima comparsa delle malattie, ripetendo le applicazioni a seconda dell'andamento stagionale e delle infezioni.
Metodi d'impiego: distribuire il prodotto in modo da coprire interamente e uniformemente la vegetazione. Effettuare i trattamenti durante le ore fresche della giornata evitando di trattare subito dopo una pioggia.
Da non applicare con mezzi aerei.
COMPATIBILITÀ: il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari di uso primaverile-estivo. Non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacril, diclofluanide.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico su alcune varietà sensibili allo zolfo; pere: Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio; mele: Black Ben Davis. Black Stevman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta del Canadà, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap; vite: Sangiovese.
Può essere fitotossico sulle cucurbitacee. Deve essere irrorato a distanza di almeno 21 giorni dall'applicazione di un olio bianco e captano.
Sospendere i trattamenti 5 GIORNI prima del raccolto.
Attenzione! da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

DAZOMET 85

Sterilizzante temporaneo del suolo
Tipo di formulazione: Polvere bagnabile

Partita N.:

Composizione:
- DAZOMET g. 85
- Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGRICO srl - Viale Masini 22 40126 BOLOGNA

Officine di Produzione: Torre srl, Torrenieri SI
Taglie autorizzate: kg 1 kg 5
Registrazione n. 4490 del 8/10/1981

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: irritante per cute e mucose. In animali da esperimento: eccitazione motoria, contrazioni muscolari e formazione di metemoglobinemia. Terapia sintomatica; blu di metilene se comparsa di metemoglobina superiore al 30%, se inferiore vit.C ad alte dosi (4-5g). Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:
Caratteristiche: Nematocida, fungicida, insetticida, erbicida, ad azione fumigante. Il prodotto si decompone nel suolo sotto l'azione dell'umidità e della temperatura, liberando dei gas che penetrano in tutti gli interstizi del terreno.
Terreno destinato alle seguenti colture: Arboree da frutto e forestali, vite, erbacee, orticole, da fiore e ornamentali in pieno campo, in serra, in semenzaio e in vivaio.
Parassiti combattuti: Nematodi incistati (Heterodora), liberi e gailigeni (Ditylenchus, Meloidogyne); insetti terricoli (agrotidi, melolontha, grillotalpa, atomaria); funghi terricoli (Pythium, Phoma, Rhizoctonia, Sclerotinia, Plasmodiophora); erbe infestanti ai primi stadi di sviluppo.
Dosi d'impiego: Nematodi liberi, kg. 3-5,5 per 100 mq.; nematodi incistati, kg. 6-8 per 100 mq.; insetti terricoli, kg. 5-5,5 per 100 mq.; funghi terricoli, kg. 4-6 per 100 mq.; erbe infestanti, kg. 5 per 100 mq.; per disinfestare i primi 20 cm di profondità del suolo. Per realizzare una disinfestazione più profonda, le dosi vanno aumentate di kg. 1.5-2 per 100 mq. ogni 10 cm. di profondità.
Epoche d'impiego: Prima della semina o del trapianto, almeno 3-5 settimane a seconda della temperatura del suolo.
Metodi d'impiego: Applicare il prodotto tal quale o diluito con sabbia fina, per trattamenti a secco; diluito con acqua - da 20 a 60 litri per 100 mq. - per trattamenti a spruzzo o ancora diluito nelle acque d'irrigazione - da 200 a 400 litri per 100 mq.
Il terreno deve essere sgombro dei residui delle colture prece-denti, perfettamente lavorato e livellato. Dopo il trattamento il prodotto va subito interrato con una lavorazione superficiale in modo da incorporare il prodotto nello spessore di terreno da disinfestare. E' opportuno eseguire una rullatura. L'umidità del suolo deve essere normale. In caso di terreno secco, si consiglia il trattamento a spruzzo. L'umidità è necessaria per la decomposizione del prodotto e deve essere conservata al terreno per almeno una settimana o con successive annaffiature o ricoprendolo con film plastico. La temperatura del suolo deve essere almeno di 8 centigradi; se supera i 18 centigradi sono necessarie bagnature. Se il prodotto viene diluito nell'acqua d'irrigazione, è necessario rullare e ricoprire il terreno con film plastico.
Nel caso si tratti in serra, essa deve essere completamente libera da colture in atto e arieggiata durante e dopo il trattamento. Si eviti che i vapori entrino in altre serre in coltura. Nel caso di disinfestazione di terricciati, si preparino letti di 20 cm. di spessore che vanno trattati con g. 200 di prodotto in polvere per mc. e poi annaffiati. Si può altrimenti usare una poltiglia con-tenente 100 g. di prodotto per litro di acqua. Si ricopre con film plastico, eventualmente dopo aver formato cumuli alti circa 1 me-tro, e si fanno trascorrere 8 giorni, poi si rimuove il terreno più volte per areare. Dopo 2-3 settimane il terreno può essere utilizzato se la temperatura è superiore a 10-15 centigradi; se la temperatura è più bassa, attendere 1-2 settimane ancora.
COMPATIBILITA': Usare il prodotto da solo. Lasciare trascorrere alcuni giorni prima e dopo il trattamento per l'impiego di fertilizzanti organici.
FITOTOSSICITA': Il prodotto è fitotossico! Dopo il trattamento è necessario un intervallo di tempo prima della messa a coltura. Esso dipende da vari fattori quali l'umidità, la temperatura e l'areazione. In condizioni normali, con temperatura del suolo superiore a 15 centigradi, questo intervallo è di circa 3 settimane. Eseguire sempre il test del crescione, allo scopo di confermare la eliminazione totale del prodotto.
RISCHI DI NOCIVITA': E' dannoso per i pesci.
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

CARBARYL 50

Insetticida

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

Composizione:
- CARBARIL g. 49,5 (esente da betanaftolo)
- Coformulanti q.b. a g. 100

Frasi di Rischio
Nocivo per ingestione; Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti; Altamente tossico per gli organismi acquatici

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGRICO Srl - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

Officine di produzione:
AGROCHIMICA FAENTINA srl, Faenza (RA)
STI - SOLFOTECNICA ITALIANA spa, Cotignola (RA)
DREXEL CHEMICAL CO. Memphis, TN, USA
CHEMIA spa, Dosso (FE)
Taglie delle confezioni: g 100 - g 250 - g 500 - kg 1 - kg 5 - kg 10
Registrazione n. 4804 del 21/5/1982 - Partita N.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
CARBARIL: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puó indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Caratteristiche: Attivo per contatto ed ingestione.
Colture protette: Vite, Melo, Pero, Pesco, Susino, Nocciolo, Albicocco, Cereali, Barbabietola, Colture ortive (Melanzana, patata, peperone, pomodoro. Carota, finocchio, sedano. Fagiolo, pisello. Cavolo, rapa. Spinacio, bietola. Carciofo, lattuga. Aglio, cipolla, porro), foraggere, colture industriali di piante ornamentali e da fiore (rosa, crisantemo, ortensia).
Parassiti combattuti: Carpocapsa, Capua, eulia, cacoecia ed altre tortrici, cidia, anarsia, tignole, dorifora, lepidotteri e coleotteri in genere.
Concentrazioni e dosi d'impiego: gr. 150-250 per ettolitro. Epoche d'applicazione: Alla prima comparsa dei parassiti, ripetendo i trattamenti in funzione dell'andamento stagionale e delle infestazioni.
Metodi d'impiego: Coprire completamente ed uniformemente le colture, seguendo con cura la comparsa dei primi attacchi in modo da trattare con tempestività.
Altri impieghi: Tappeti erbosi (campi da golf, campi sportivi): Contro Agrotidi e Piralidi g. 120 e contro larve di Scarabeidi g.150 per ettolitro d'acqua, distribuendo da 120 a 160 litri di sospensione per 1000 metri quadri. Fare seguire al trattamento un'abbondante irrigazione in presenza di larve di Scarabeidi.
AVVERTENZA: Non rientrare nell'area trattata prima di 12 ore dall'irrigazione successiva al trattamento.
COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari, purché non alcalini.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto è fitotossico per la fragola.
RISCHI DI NOCIVtTA': Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, per i pesci, gli animali domestici e il bestiame; non impiegarlo durante la fioritura.
Attenzione. Il prodotto tal quale contiene sostanza molto tossica per gli organismi aquatici
INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 7 GIORNI prima del raccolto.
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Smaltire secondo le norme vigenti Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO;NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Polvere tipo Bordolese AGRICO I6%

Fungicida

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

Partita N.:

Composizione:
Rame metallo (da composti di rame e calcio) g. 16
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Nocivo per inalazione; Rischio di gravi lesioni oculari; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGRICO s.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

Stabilimento produttore : STI SOLFOTECNICA ITALIANA Spa. - Cotignola (RA) / SARIAF Spa. - Faenza (RA) / MANICA Spa. - Rovereto (TN)
Taglie autorizzate: Kg. 25
Registrazione del Ministero della Sanità n. 5157 del 22/12/1982

INFORMAZIONI MEDICHE : In caso d'intossicazione chiamare il medico per i conseguenti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche: il prodotto ottenuto per reazione chimica del solfato di rame con la calce è perfettamente neutro, stabilizzato, micronizzato. Pronto all'uso, è dotato di forte adesività e resistenza al dilavamento.
Colture protette: Arboree da frutto (pomacee, drupacee, agrumi). Olive, Vite, Cereali, Barbabietola, Orticole (Melanzana, patata, peperone, pomodoro. Fragola. Carota, finocchio, sedano. Fagiolo. fava, pisello. Cetriolo, melone, zucca, zucchino, cocomero. Cavolo. cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo di Bruxelles, cavolo rapa, ravanello. Spinacio, bietola. Carciofo, cardo, indivia, lattuga, radicchio. Asparagio, aglio, cipolla). Ornamentali e da fiore industriali.
Malattie e parassiti combattuti: Alternaria, Antracnosi, Bolla, Cancri dei rami, Cercospora, Corineo, Mal secco, Marciumi radicali, Occhio di pavone, Peronospora, Septoria, Ticchiolatura, Vaiolatura. Svolge inoltre un'azione complementare contro tutte le forme d'Oidio.
Concentrazione e dosi d'impiego (per 100 litri d'acqua): per la Vite, g. 800-1200; per le pomacee nei trattamenti autunnali o di fine inverno, g. 1300-1600, nei trattamenti prefiorali, g. 600-800; per le drupacee nei trattamenti invernali g. 1300-1600; per agrumi, g. 800-1200 e per olivo, g. 1300-1600; per colture ortive, ornamentali e floreali, g. 800-1300. Nel caso di barbabietole. kg. 11-13 per ettaro.
Epoche d'impiego: Vite, preferibilmente in post-fioritura; pomacee, trattamenti autunnali o di fine inverno e prefiorali, drupacee, trattamenti invernali; altre colture, preventivamente o alla prima comparsa delle malattie. Le applicazioni vanno ripetute a seconda dell'andamento stagionale e delle infezioni.
Metodi d'impiego: Stemperare il prodotto in poca acqua a parte, indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo d'acqua mescolando con cura. Il prodotto è neutro e pronto per l'uso; non richiede pertanto l'aggiunta di calce. Si consiglia d'aggiungere g. 100 di Bagnante Agrico per ogni 100 litri di miscela. La miscela va distribuita in modo da coprire interamente e uniformemente la vegetazione.

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari di uso primaverile-estivo. Nel caso dei fosforganici si consiglia di impiegare la miscela entro poche ore dalla preparazione. AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere il trattamento 20 GIORNI prima del raccolto

FITOTOSSICITÀ
Non trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo e pero cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia pertanto l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza, Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Johnathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana. Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luisa D'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, dott. J. Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.
Attenzione! Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche
Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

DODINA 65

Fungicida

Tipo di formulazione: Polvere bagnabile.

Partita n.

Composizione:

- DODINA g. 65
- Coformulanti q.b. a g. 100

Frasi di Rischio

Nocivo per ingestione; Irritante per gli occhi e la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGRICO srl

Viale Masini 22 — 40126 BOLOGNA

Stabilimenti di produzione: STI-SOLFOTECNICA ITALIANA SPA, Cotignola RA / CHROMOS AGRO d.d. Zagreb- (Croazia)

Taglie autorizzate: g 250 — kg 0,5 — kg 1 — kg 5 — kg 10

Registrazione del Ministero della Salute n. 5493 del 3.10.1983

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardio-circolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; Irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizza-zione, resistenti a terapia. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO

Caratteristiche: Attivo per contatto con azione preventiva ed eradicante; azione curativa per translaminarità.

Colture protette: Arboree da frutto (pero, melo, ciliegio) e forestali (pioppo), Ortive (cipolla), Ornamentali e da fiore in pieno campo e in serra.

Malattie o parassiti combattuti: Ticchiolatura, peronospora, marsonnina, alternaria, antracnosi, fusariosi, septoriosi.

Concentrazione e dosi d'impiego: g. 70-100/hl per interventi a carattere preventivo; g. 100-120/hl per interventi curativi.

Epoche d'impiego: Per trattamenti a carattere preventivo, secondo i calendari adottati; per i trattamenti a carattere curativo eradicante, entro 48 ore dalla pioggia infettante. Ripetere il trattamento in funzione dell'infezione e a seconda dell'andamento stagionale.

Metodi d'impiego: Il prodotto va stemperato a parte in poca acqua e poi vuotato nel totale quantitativo liquido. Va distribuito in modo da coprire interamente e uniformemente la vegetazione.

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari; non è compatibile con i clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina; non è consigliabile miscelarlo con carbaril, dimetoato, metilazinfos, DDVP; le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con oli minerali possono dar luogo a scarsa sospensività; evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime allo zero.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Per la Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%. Si consiglia di non impiegarlo con temperature prossime allo zero e quando l'umidità relativa raggiunga valori elevati.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci.

Avvertenza: da non impiegare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che non siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 10 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

SPROUT-TAC

FITOREGOLATORE

Prodotto ad azione di contatto per il controllo selettivo dei germogli ascellari primari e secondari del tabacco.

Tipo di formulazione: liquido emulsionabile

Composizione:
- n-Decanolo puro g 79
- Coformulanti. q.b. a g 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle - Nocivo per organismi acquatici; Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGRICO S.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

Stabilimento produttore: Torre srl - Torrenieri (SI) / ALTHALLER ITALIA SRL - San Colombano al Lambro (MI) / SARIAF SPA - Faenza (RA) / DREXEL CHEMICAL COMPANY - Memphis, TN (U.S.A.)
Taglie autorizzate: litri 5, litri 10, litri 20, litri 50, litri 100*, litri 200*
Registrazione del Ministero della Sanità n. 6161 del 20.12.1984 Partita N.:

INFORMAZIONI MEDICHE : In caso d'intossicazione, chiamare il medico peri consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche: attivo per contatto. Devitalizza i giovani tessuti vegetali in rapido accrescimento determinando una necrosi selettiva. Il prodotto è costituito da un solo componente alla massima purezza con esaltazione della rapidità d'azione e della selettività.
Colture protette: tabacco.
Scopo dell'impiego: controllo selettivo dei germogli ascellari e pedali.
Concentrazioni e dosi d'impiego. Nell'applicazione manuale, s'impiega alla dose di 4-6 litri di prodotto in 96-94 litri d'acqua utilizzando 15-20 cc. di miscela per pianta, corrispondente a 50-60 piante per litro di miscela. Nell'applicazione meccanica, s'impiega alla dose di 3-5 litri di prodotto in 97-95 litri d'acqua utilizzando da 800 a 1000 litri di miscela per ettaro. Le dosi inferiori si usano per i tabacchi di varietà chiara, le più alte per le varietà scure.
Epoche d'impiego: Il prodotto può essere impiegato sia prima che dopo la cimatura. Nel primo caso il trattamento viene eseguito prima dell'apertura dei bottoni fiorali, cimando poi entro la settimana e asportando i germogli più lunghi di 3 cm. Nel secondo caso si cima allo stadio compreso fra l'allungamento dei bottoni fiorali e l'apertura dei fiori, asportando come regola i germogli lunghi più di 3 cm e trattando entro 2 giorni, meglio entro le 24 ore, dalla cimatura.
Metodi d'applicazione: E' determinante per il buon esito che il prodotto venga a contatto con i germogli, scorrendo lungo lo stelo della pianta; sia nell'applicazione manuale che meccanica debbono pertanto essere impiegati ugelli producenti un getto grossolano e mantenuti ad un'altezza tale da permettere che la miscela raccolta dalle foglie venga convogliata e scorra liberamente lungo il fusto della pianta fino alla base. Con mezzi d'irrorazione manuali, impiegando pompe a spalla, si mantenga nel serbatoio una debole pressione, appena sufficiente a fare uscire il liquido, mantenendo l'ugello, montato su un raccordo curvo, rivolto verso il basso a 15-20 cm. dalla cima delle piante. Con mezzi d'irrorazione meccanici, è importante l'accurata taratura della macchina affinché l'applicazione sia omogenea. Gli ugelli, tre per fila di piante e disposti a 20 cm di distanza fra loro, sono rivolti verso il basso: quello centrale verticale e allineato con la fila delle piante, i laterali inclinati verso l'interno. L'altezza della barra deve essere tale da mantenere gli ugelli a 30-40 cm dalla cima delle piante. La pressione assai bassa, 0,5-1 atm, permette la formazione di gocce grossolane. La velocità d'avanzamento deve essere tale da permettere che il giusto quantitativo di miscela venga raccolto da ogni pianta.
Numero d'applicazioni: Nella normalità dei casi è sufficiente un solo trattamento per un adeguato controllo dei germogli ascellari; in caso di forte attività vegetativa può essere utile un secondo trattamento a 10 giorni dal primo. Un trattamento integrativo con un prodotto sistemico, a base di idrazide maleica, che inibisca la formazione di nuovi germogli è vivamente consigliato, specie nel caso di trattamenti meccanici. Avvertenze per l'impiego:
- Prima dell'uso agitare il prodotto nel contenitore. Preparare la miscela, aggiungendo l'acqua al prodotto, subito prima dell'impiego e mantenerla agitata nel serbatoio dell'irroratore.
- Il prodotto agisce entro un'ora dal trattamento: un'eventuale pioggia dopo un'ora e mezza dal trattamento non ne pregiudica l'esito. Non trattare durante la pioggia o con le foglie bagnate.

COMPATIBILITÀ:
Usare il prodotto da solo. Non eseguire trattamenti con antiparassitari nello stesso giorno d'applicazione dell'antigermoglio.
FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
- Evitare che la miscela bagni la pagina inferiore delle foglie, delicata e soggetta a ustionarsi; non trattare in giornate ventose e su piante inclinate.
- Non trattare nelle ore più calde della giornata: al mattino attendere che la rugiada si sia asciugata, al pomeriggio che le piante si siano riprese dall'appassimento meridiano. Non trattare nella tarda serata.
- Non trattare piante ammalate, malnutrite o comunque sofferenti.
- Rispettare le dosi consigliate: esse comunque hanno carattere generico e vanno messe a punto caso per caso tenendo conto dei fattori ambientali.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.
Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
CONSERVARE IL PRODOTTO CHIUSO NEL CONTENITORE ORIGINALE, IN LUOGO ASCIUTTO E FRESCO.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

(*) Avvertenza limitata alla taglia da 100 e 200 litri :
Attenzione : contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

DE-SPROUT

Fitoregolatore

Prodotto ad azione di contatto per il controllo selettivo dei germogli ascellari primari e secondari del tabacco

Tipo di formulazione: liquido emulsionabile

Partita N.:

Composizione:

- n-Decanolo puro	g. 79 (686 g/l)
- Coformulanti	q.b a g. 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle - Nocivo per organismi acquatici;Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare dell'autorizzazione: AGRICO s.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

Stabilimenti produttori: DREXEL CHEMICAL COMPANY Memphis, TN (U.S.A.) / Torre srl, Torrenieri (SI) / ALTHALLER ITALIA srl, San Colombano al Lambro (MI) / CHEMIA spa, Sant'Agostino (FE) / FAIR PRODUCTS INC., North Carolina (USA)

Taglie autorizzate: litri 5 — litri 10 — litri 20 — litri 50 — litri 100 — litri 200* — litri 1.000*

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6162 del 20.12.84

NORME PRECAUZIONALI : Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE : In caso d'intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza : consultare un centro antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche: attivo per contatto. Devitalizza i giovani tessuti vegetali in rapido accrescimento determinando una necrosi selettiva. Il prodotto è costituito da un solo componente alla massima purezza con esaltazione della rapidità d'azione e della selettività.

Colture protette: tabacco.

Scopo dell'impiego: controllo selettivo dei germogli ascellari e pedali.

Concentrazioni e dosi d'impiego. Nell'applicazione manuale, s'impiega alla dose di 4-6 litri di prodotto in 96-94 litri d'acqua utilizzando 15-20 cc. di miscela per pianta corrispondente a 50-60 piante per litro di miscela. Nell'applicazione meccanica, s'impiega alla dose di 3-5 litri di prodotto in 97-95 litri d'acqua utilizzando da 800 a 1000 litri di miscela per ettaro. Le dosi inferiori si usano per i tabacchi di varietà chiara, le più alte per le varietà scure.

Epoche d'impiego: il prodotto può essere impiegato sia prima che dopo la cimatura. Nel primo caso il trattamento viene eseguito prima dell'apertura dei bottoni fiorali, cimando poi entro la settimana e asportando i germogli più lunghi di 3 cm. Nel secondo caso si cima allo stadio compreso fra l'allungamento dei bottoni fiorali e l'apertura dei fiori, asportando come regola i germogli lunghi più di 3 cm. e trattando entro 2 giorni, meglio entro le 24 ore, dalla cimatura.

Metodi d'applicazione: E' determinante per, il buon esito, che il prodotto venga a contatto con i germogli, scorrendo lungo lo stelo della pianta; sia nell'applicazione manuale che meccanica debbono pertanto essere impiegati ugelli producenti un getto grossolano e mantenuti ad un'altezza tale da permettere che la miscela raccolta dalle foglie venga convogliata e scorra liberamente lungo il fusto della pianta fino alla base. Con mezzi d'irrorazione manuali, impiegando pompe a spalla, si mantenga nel serbatoio una debole pressione, appena sufficiente a fare uscire il liquido, mantenendo l'ugello, montato su un raccordo curvo, rivolto verso il basso a 15-20 cm. dalla cima delle piante. Con mezzi d'irrorazione meccanici, è importante l'accurata taratura della macchina affinché l'applicazione sia omogenea. Gli ugelli, tre per fila di piante e disposti a 20 cm. di di-stanza fra loro, sono rivolti verso il basso: quello centrale verticale e allineato con la fila delle piante, i laterali inclinati verso l'interno. L'altezza della barra deve essere tale da mantenere gli ugelli a 30-40 cm. dalla cima delle piante. La pressione assai bassa, 0,5-1 atm., permette la formazione di gocce grossolane. La velocità d'avanzamento deve essere tale da permettere che il giusto quantitativo di miscela venga raccolto da ogni pianta.

Numero d'applicazioni: Nella normalità dei casi è sufficiente un solo trattamento per un adeguato controllo dei germogli ascellari; in caso di forte attività vegetativa può essere utile un secondo trattamento a 10 giorni dal primo. Un trattamento integrativo con un prodotto sistemico, a base di idrazide maleica, che inibisca la formazione di nuovi germogli è vivamente consigliato, specie nel caso di trattamenti meccanici.

Avvertenza per l'impiego:

- Prima dell'uso agitare il prodotto nel contenitore. Preparare la miscela, aggiungendo l'acqua al prodotto, subito prima dell'impiego e mantenerla agitata nel serbatoio dell'irroratore.
- Il prodotto agisce entro un'ora dal trattamento: un'eventuale pioggia dopo un'ora e mezza dal trattamento non ne pregiudica l'esito. Non trattare durante la pioggia o con le foglie bagnate.

COMPATIBILITÀ: usare il prodotto da solo. Non eseguire trattamenti con antiparassitari nello stesso giorno d'applicazione dell'antigermoglio.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

- Evitare che la miscela bagni la pagina inferiore delle foglie, delicata e soggetta a ustionarsi; non trattare in giornate ventose e su piante inclinate.
- Non trattare nelle ore più calde della giornata: al mattino attendere che la rugiada si sia asciugata, al pomeriggio che le piante si siano riprese dall'appassimento meridiano. Non trattare nella tarda serata.
- Non trattare piante ammalate, malnutrite o comunque sofferenti.
- Rispettare le dosi consigliate: esse comunque hanno carattere generico e vanno messe a punto caso per caso, tenendo conto dei fattori ambientali e dello stato della pianta e dei germogli.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE; EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

(*) Avvertenza limitata alle taglie da 200 e1000 litri :

Attenzione : contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo

Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

SPRAY-OFF 85

Fitoregolatore
Prodotto ad azione di contatto per il controllo selettivo dei germogli ascellari primari e secondari del tabacco.
Tipo di formulazione: liquido emulsionabile

Partita N.:

Composizione:
- Miscela di alcoli grassi C6-C12 (contenente 54% di n-decanolo) g. 85 (722 g/l)
- Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Irritante per la pelle; Rischio di gravi lesioni oculari; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGRICO srl - Viale Masini, 22.40126 BOLOGNA
Stabilimento produttore: Torre srl - Torrenieri (SI) / ALTHALLER ITALIA SRL - San Colombano al Lambro (MI)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 6456 del 11.7.1985
Taglie autorizzate: litri 5, litri 20, litri 50, litri 100*, litri 200*

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso d'intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche: attivo per azione di contatto. Devitalizza i giovani tessuti vegetali in rapido accrescimento producendo una necrosi selettiva
Cotture protette: tabacco.
Scopo dell'impiego: controllo selettivo del germogli ascellari e pedali.
Concentrazioni e dosi d'impiego: nell'applicazione manuale, s'impiega alla dose di 4-6 litri di prodotto in 96-94 litri d'acqua, utilizzando 15-20 cc. di miscela per pianta, corrispondente a 50-60 piante per litro dl miscela Nell'applicazione meccanica, s'impiega alla dose di 3-5 litri di prodotto in 97-95 litri d'acqua, utilizzando da 800 a 1000 litri di miscela per ettaro. Le dosi inferiori si usano peri tabacchi di varietà chiara, le più alte per le varietà scure.
Epoche d'impiego: il prodotto può essere impiegato sia prima che dopo la cimatura. Nel primo caso il trattamento viene eseguito prima dell'apertura dei bottoni fiorali, cimando poi entro la settimana e asportando i germogli più lunghi di 3 cm. Nel secondo caso si cima allo stadio compreso fra l'allungamento dei bottoni fiorali e l'apertura dei fiori, asportando come regola i germogli lunghi più di 3 cm. e trattando entro 2 giorni, meglio entro le 24 ore dalla cimatura
Metodi d'applicazione: è determinante per il buon esito che il prodotto venga a contatto con i germogli, scorrendo lungo lo stelo della pianta; sia nell'applicazione manuale che meccanica debbono pertanto essere impiegati ugelli producenti un getto grossolano e mantenuti ad un'altezza tale da permettere che la miscela raccolta dalle foglie venga convogliata e scorra liberamente lungo il fusto delle piante fino alla base. Con mezzi d'irrorazione manuali, impiegando pompe a spalla, si mantenga nel serbatoio una debole pressione, appena sufficiente a fare uscire il liquido, mantenendo l'ugello, montato su un raccordo curvo, rivolto verso il basso a 15-20 cm. dalla cima delle piante. Con mezzi d'irrorazione meccanici, è importante l'accurata taratura della macchina affinché l'applicazione sia omogenea Gli ugelli, tre per fila di piante e disposti a 20 cm. di distanza fra loro, sono rivolti verso il basso; quello centrale verticale e allineato con la fila delle piante, I laterali inclinati verso l'interno. L'altezza della barra deve essere tale da mantenere gli ugelli a 30-40 cm. dalla cima delle piante. La pressione assai bassa, 0,5-1 atm. permette la formazione di gocce grossolane. La velocità d'avanzamento deve essere tale da permettere che il giusto quantitativo di miscela venga raccolto da ogni pianta.
Numero d'applicazioni: nella normalità del casi è sufficiente un solo trattamento per un adeguato controllo dei germogli ascellari; in caso di forte attività vegetativa può essere utile un secondo trattamento a 10 giorni dal primo. Un trattamento integrativo con un prodotto sistemico che inibisca la formazione di nuovi germogli è vivamente consigliato, specie nel caso di trattamenti meccanici.
Avvertenze per l'impiego:
- Prima dell'uso agitare il prodotto nel contenitore. Preparare la miscela, aggiungendo l'acqua al prodotto, subito prima dell'impiego e mantenerla agitata nel serbatoio dell'irroratore.
- Il prodotto agisce entro un'ora dal trattamento; un'eventuale pioggia dopo un'ora dal trattamento non ne pregiudica l'esito. Non trattare durante la pioggia o con le foglie bagnate.

COMPATIBILITÀ: Usare il prodotto da solo. Non eseguire trattamenti con antiparassitari nello stesso giorno d'applicazione dell'antigermoglio.

FITOTOSSICITÀ
- Evitare che la miscela bagni la pagina inferiore delle foglie delicata e soggetta a ustionarsi; non trattare in giornate ventose e su piante inclinate.
- Non trattare nelle ore più calde della giornata: al mattino attendere che la rugiada si sia asciugata, al pomeriggio che le piante si siano riprese dall'appassimento meridiano. Non trattare nella tarda serata - Non trattare piante ammalate, malnutrite o comunque sofferenti.
- Rispettare le dosi consigliate: esse comunque hanno carattere generico e vanno messe a punto caso per caso tenendo conto dei fattori ambientali.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.
Attenzione! da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

(*) Avvertenza limitata alle taglie da 100 e 200 litri :
Attenzione : contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

CLUB

Erbicida ormonico selettivo

Partita n.:

Composizione:
- MECOPROP puro . g 32 (sotto forma di sale potassico)
- Coformulanti . q.b. a g 100

Frasi di Rischio
Nocivo per ingestione; Irritante per la pelle; Rischio di gravi lesioni oculari; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGRICO srl - Viale Masini, 22 - Bologna
Stabilimento produttore: ALTHALLER ITALIA s.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)
Taglie autorizzate: litri 1
Registrazione del Ministero della Sanità n. 1673 del 12-11-1974

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle. Sintomi di intossicazione: astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione atriale e ventricolare - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - convulsioni - coma. Consigli terapeutici: abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per le dermatosi. Controindicazioni: è sconsigliata la digitale.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: il CLUB è un erbicida ormonico selettivo a base di Mecoprop sotto forma di sale potassico, per l'impiego su riso, grano, avena, orzo, prati, campi da golf.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

RISO: Contro: Alisma plantago (cucchiaio), Scirpus mucronatus (beck de sgnepa), Scirpus maritimus (cipollino), Cyperus difformis, Heleocharis sp. (puretta): 2,6-4,3 litri per Ha diluiti in 250-400 litri di acqua a seconda del tipo di pompa impiegato.
Nel riso il diserbo può essere effettuato in due stadi vegetativi diversi: dopo l'emissione sul culmo principale della terza-quarta fogliolina, fino al periodo dell'accestimento e dall'accestimento ultimato fino alla fase di botticella. Non trattare mai durante la fase di accestimento né durante la fase di botticella. Norma fitoprotettiva per le risaie: Al momento del trattamento la risaia non deve trovarsi asciutta, ma presentare ancora la superficie degli appezzamenti coperta da qualche centimetro di acqua onde evitare danni.

GRANO - ORZO – AVENA: Contro: Stellaria media (centocchi), Vicia sp. (veccia), Matricaria (camomilla), Papaver sp. (papavero), Ranunculus sp. (ranuncolo), Galium aparine (aparine), Fumaria officinalis (fumaria), Taraxacum officinale (soffione), Cirsium sp. (stoppione): 4,3-6,0 litri per Ha diluiti in 250-400 litri di acqua a seconda del tipo di pompa impiegata.
Nel grano il diserbo si inizia dopo l'emissione sul culmo principale della quarta, quinta fogliolina, fino alla fase di botticella.

PRATI: Contro Rumex sp.(romice), il trattamento deve essere effettuato in primavera quando i romici sono ben individuabili (oppure dopo ogni sfalcio, allorché le foglie dei romici son ben sviluppate), bagnando accuratamente le foglie. Per ogni romice sono sufficienti da 25 a 35 cc. di soluzione utilizzando pompe a volume normale.

CAMPI DA GOLF: Per il diserbo del green, contro: Trifolium repens (T. bianco), Trifolium pratense (T. rosso), Trifolium incarnato (T. incarnato), Rumex sp. (romice), Plantago majorlanceolata-media (piantaggini), Cardus natans (cardo rosso), Stellaria media (centocchi), Vicia sp. (veccia), Ranunculus sp. (ranuncolo).
I trattamenti devono essere effettuati su green asciutto o lievemente umido. I periodi più indicati sono: la primavera - specialmente il mese di maggio a partire dall'inizio, fin verso il 20 - e alla fine dell'estate fin verso metà settembre. La dose di impiego è di 4,3-5,2 litri per 5-6 hl di acqua.

PRECAUZIONI DA ADOTTARSI DURANTE IL TRATTAMENTO
E' assolutamente sconsigliabile eseguire il diserbo in giornate di vento e nelle vicinanze delle piante da frutto, particolarmente della vite. La temperatura non ha particolare effetto sull'azione del diserbante, comunque non deve essere inferiore ai 10-12°C. Non eseguire il trattamento qualora si preveda prossima la pioggia.
Le pompe impiegate per il diserbo, prima di essere usate per trattamenti ai fruttiferi, devono essere accuratamente lavate con soda in modo da eliminare ogni residuo di erbicida.

COMPATIBILITÀ': il prodotto è miscibile con il 2,4 D.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

SUCKER-OFF

Fitoregolatore

Prodotto ad azione di contatto per il controllo selettivo dei germogli ascellari primari e secondari del tabacco.

Tipo di formulazione: liquido emulsionabile

Composizione:
- Miscela di alcoli grassi C6-C12 g 85
(contenente 54% di n-decanolo)
- Coformulanti q.b. a. g 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Irritante per la pelle; Rischio di gravi lesioni oculari; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGRICO S.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

Stabilimento produttore:
Torre srl - Torrenieri (SI) / SARIAF SPA - Faenza (RA)
Taglie autorizzate: litri 5, litri 20, litri 50, litri 100*, litri 200*
Registrazione del Ministero della Sanità n. 6467 del 04.09.1985 - Partita N.:

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso d'intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche: attivo per azione di contatto. Devitalizza i giovani tessuti vegetali in rapido accrescimento producendo una necrosi selettiva.
Colture protette: tabacco.
Scopo dell'impiego: controllo selettivo dei germogli ascellari e pedali.
Concentrazioni e dosi d'impiego: Nell'applicazione manuale, s'impiega alla dose di 4-6 litri di prodotto in 96-94 litri d'acqua utilizzando 15-20 cc. di miscela per pianta, corrispondente a 50-60 piante per litro di miscela. Nell'applicazione meccanica, s'impiega alla dose di 3-5 litri di prodotto in 97-95 litri d'acqua utilizzando da 800 a 1000 litri di miscela per ettaro. Le dosi inferiori si usano per i tabacchi di varietà chiara, le più alte per le varietà scure.
Epoche d'Impiego: il prodotto può essere impiegato sia prima che dopo la cimatura. Nel primo caso il trattamento viene eseguito prima dell'apertura dei bottoni fiorati, cimando poi entro la settimana e asportando i germogli più lunghi di 3 cm. Nel secondo caso si cima allo stadio compreso fra l'allungamento dei bottoni fiorati e l'apertura dei fiori, asportando come regola i germogli lunghi più di 3 cm e trattando entro 2 giorni, meglio entro le 24 ore, dalla cimatura.
Metodi d'applicazione: e' determinante per il buon esito che il prodotto venga a contatto con i germogli, scorrendo lungo lo stelo della pianta; sia nell'applicazione manuale che meccanica debbono pertanto essere impiegati ugelli producenti un getto grossolano e mantenuti ad un'altezza tale da permettere che la miscela raccolta dalle foglie venga convogliata e scorra liberamente lungo il fusto della pianta fino alla base. Con mezzi d'irrorazione manuali, impiegando pompe a spalla, si mantenga nel serbatoio una debole pressione, appena sufficiente a fare uscire il liquido, mantenendo l'ugello, montato su un raccordo curvo, rivolto verso il basso a 15-20 cm. dalla cima delle piante. Con mezzi d'irrorazione meccanici, è importante l'accurata taratura della macchina affinché l'applicazione sia omogenea. Gli ugelli, tre per fila di pianta e disposti a 20 cm di distanza fra loro, sono rivolti verso il basso: quello centrale verticale e allineato con la fila delle piante, i laterali inclinati verso l'interno. L'altezza della barra deve essere tale da mantenere gli ugelli a 30-40 cm dalla cima delle piante. La pressione assai bassa, 0,5-1 atm, permette la formazione di gocce grossolane. La velocità d'avanzamento deve essere tale da permettere che il giusto quantitativo di miscela venga raccolto da ogni pianta.
Numero d'applicazioni: nella normalità dei casi è sufficiente un solo trattamento per un adeguato controllo dei germogli ascellari; in caso di forte attività vegetativa può essere utile un secondo trattamento a 10 giorni dal primo. Un trattamento integrativo con un prodotto sistemico che inibisca la formazione di nuovi germogli è vivamente consigliato, specie nel caso di trattamenti meccanici.
Avvertenze per l'Impiego:
- Prima dell'uso agitare il prodotto nel contenitore. Preparare la miscela, aggiungendo l'acqua al prodotto, subito prima dell'impiego e mantenerla agitata nel serbatoio dell'irroratore.
- Il prodotto agisce entro un'ora dal trattamento: un'eventuale pioggia dopo un'ora dal trattamento non ne pregiudica l'esito. Non trattare durante la pioggia o con le foglie bagnate.

COMPATIBILITÀ: Usare il prodotto da solo. Non eseguire trattamenti con antiparassitari nello stesso giorno d'applicazione dell'antigermoglio.

FITOTOSSICITA'
- Evitare che la miscela bagni la pagina inferiore delle foglie, delicata e soggetta a ustionarsi; non trattare in giornate ventose e su piante inclinate.
- Non trattare nelle ore più calde della giornata: al mattino attendere che la rugiada si sia asciugata, al pomeriggio che le piante si siano riprese dall'appassimento meridiano. Non trattare nella tarda serata. - Non trattare piante ammalate, malnutrite o comunque sofferenti.
- Rispettare le dosi consigliate: esse comunque hanno carattere generico e vanno messe a punto caso per caso tenendo conto dei fattori ambientali.

Sospendere I trattamenti 7 giorni prima del raccolto.

Attenzione! da impiegarsi esclusivamente In agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso Improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

(*) Avvertenza limitata alla taglia da 100 e 200 litri :
Attenzione : contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

PABIOS

Diserbante in polvere bagnabile

Partita n

Composizione:
- Clortal-dimetile puro g 75,0
- Bagnanti, disperdenti e inerti q.b. a g 100

Frasi di Rischio
Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

NOCIVO

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGRICO SRL - viale Masini 22 – 40126 - BOLOGNA

Stabilimento produttore: STI-SOLFOTECNICA ITALIANA spa - Cotignola (RA)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 9273 del 12/06/1997
Taglie autorizzate: g 100 – g 200 - g 500 - kg 1 - kg 5 - kg 10 - kg 25

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico peri consueti interventi di pronto soccorso

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Da usare in pre-emergenza su colture orticole (cipolle, sedano, finocchio, porro, aglio, piselli, carote, asparagi. carciofo, cavoli, peperoni, fragole), nonché bulbose da fiore (gladioli, tulipani) prati, manti erbosi e campi da golf; esso agisce per assorbimento radicale o per contatto dell'epicotile dei germinelli, sulle infestanti annuali, soprattutto graminacee ma anche su talune a foglia larga.
Il prodotto è efficace contro le infestanti annuali provenienti da seme, quali Amaranto (Amarnthus retroflexus), Centocchio (Stellaria media), Cicutaria (Erodium cicutarium), Farinaccio (Chenopodium album), Panicastrella (Setaria verticillata), Papavero (Papaver Rhoeas), Porcellana (Portulaca oleracea), Sanguinella (Digitarla sanguinalis).
La dose normale d'impiego è di 15-20 kg in non meno di 500 litri di acqua per ettaro. Su prati, manti erbosi e campi da golf si consiglia una dose di 13 kg/ha, eseguendo l'intervento all'inizio della primavera, prima della germinazione delle infestanti dopo aver eseguito il taglio del tappeto erboso.
E' preferibile distribuire il prodotto su terreno ben lavorato e privo di erbacce, in epoca immediatamente successiva alla semina o al trapianto, in ogni caso prima dell'emergenza delle infestanti. Si consiglia l'intervento possibilmente a seguito di una pioggia o irrigazione; se si opera invece su terreno asciutto è necessario provvedere ad una irrigazione entro 8-10 giorni dal trattamento, a meno che non si verifichi in questo frattempo una precipitazione acquosa.
Avvertenza: la persistenza d'azione varia da 4 a 8 settimane in funzione dell'andamento stagionale e della natura del terreno. Se pertanto 60-70 giorni dopo il trattamento si verificasse una nuova apparizione delle erbe infestanti, sarà consigliabile eseguire un secondo trattamento con 10 kg di prodotto per ettaro.
Avvertenza: la persistenza d'azione varia da 4 a 8 settimane in funzione dell'andamento stagionale e della natura del terreno. Se pertanto 60-70 giorni dopo il trattamento si verificasse una nuova apparizione delle erbe infestanti, sarà consigliabile eseguire un secondo trattamento con 10 Kg di prodotto per ettaro.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 30 GIORNI prima della raccolta.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e, per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Si consiglia di immagazzinare e conservare il prodotto in luogo secco.

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

DE-SPROUT N

Fitoregolatore ad azione di contatto per il controllo selettivo dei germogli ascellari primari e secondari del tabacco
Tipo di formulazione: liquido emulsionabile

Composizione:
- n-Decanolo puro g. 79 (686 g/l)
- Coformulanti q.b a g. 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle - Nocivo per organismi acquatici; Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare dell'autorizzazione: AGRICO s.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA
Stabilimenti produttori: DREXEL CHEMICAL COMPANY - Memphis, TN (U.S.A.) / Torre srl - Torrenieri (SI) / ALTHALLER ITALIA srl. - San Colombano al Lambro (MI) / CHEMIA spa - Sant'Agostino (FE)
Registrazione del Ministero della Salute n. 9723 del 03.09.1998
Taglie autorizzate: litri 5; litri 10; litri 20; litri 50; litri 100; litri 1000* Partita N.:

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso d'intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche: Attivo per contatto. Devitalizza i giovani tessuti vegetali in rapido accrescimento determinando una necrosi selettiva. Il prodotto è costituito da un solo componente alla massima purezza con esaltazione della rapidità d'azione e della selettività.
Colture protette: Tabacco.
Scopo dell'impiego: Controllo selettivo dei germogli ascellari e pedali.
Concentrazioni e dosi d'impiego. Nell'applicazione manuale, s'impiega alla dose di 3-4 litri di prodotto in 97-96 litri d'acqua utilizzando 15-20 cc. di miscela per pianta corrispondente a 50-60 piante per litro di miscela. Nell'applicazione meccanica, s'impiega alla dose di 3-4 litri di prodotto in 97-96 litri d'acqua utilizzando da 600 a 800 litri di miscela per ettaro. Le dosi inferiori si usano per i tabacchi di varietà chiara, le più alte per le varietà scure.
Epoche d'impiego: il prodotto può essere impiegato sia prima che dopo la cimatura. Nel primo caso il trattamento viene eseguito prima dell'apertura dei bottoni fiorali, cimando poi entro la settimana e asportando i germogli più lunghi di 3 cm. Nel secondo caso si cima allo stadio compreso fra l'allungamento dei bottoni fiorali e l'apertura dei fiori, asportando come regola i germogli lunghi più di 3 cm. e trattando entro 2 giorni, meglio entro le 24 ore, dalla cimatura.
Metodi d'applicazione: E' determinante per il buon esito che il prodotto venga a contatto con i gérmogli, scorrendo lungo lo stelo della pianta; sia nell'applicazione manuale che meccanica debbono pertanto essere impiegati ugelli producenti un getto grossolano e mantenuti ad un'altezza tale da permettere che la miscela raccolta dalle foglie venga convogliata e scorra liberamente lungo il fusto della pianta fino alla base. Con mezzi d'irrorazione manuali, impiegando pompe a spalla, si mantenga nel serbatoio una debole pressione, appena sufficiente a fare uscire il liquido, mantenendo l'ugello, montato su un raccordo curvo, rivolto verso il basso a 15-20 cm. dalla cima delle piante. Con mezzi d'irrorazione meccanici, è importante l'accurata taratura della macchina affinché l'applicazione sia omogenea. Gli ugelli, tre per fila di piante e disposti a 20 cm. di distanza fra loro, sono rivolti verso il basso: quello centrale verticale e allineato con la fila delle piante, i laterali inclinati verso l'interno. L'altezza della barra deve essere tale da mantenere gli ugelli a 30-40 cm. dalla cima delle piante. La pressione assai bassa, 0,5-1 atm., permette la formazione di gocce grossolane. La velocità d'avanzamento deve essere tale da per-mettere che il giusto quantitativo di miscela venga raccolto da ogni pianta.
Numero d'applicazioni: E' sufficiente un solo trattamento per un adeguato controllo dei germogli ascellari; ma in caso di forte attività vegetativa è utile un secondo trattamento a 7 giorni dal primo. Un trattamento integrativo con un prodotto sistemico-locale a base di dinitroaniline o sistemico a base di idrazide maleica, che inibisca la formazione di nuovi germogli è vivamente consigliato, specie nel caso di trattamenti meccanici.
Avvertenza per l'impiego:
- Prima dell'uso agitare il prodotto nel contenitore. Preparare la miscela, aggiungendo l'acqua al prodotto, subito prima dell'impiego e mantenerla agitata nel serbatoio dell'irroratore.
- Il prodotto agisce entro un'ora dal trattamento: un'eventuale pioggia dopo un'ora e mezza dal trattamento non ne pregiudica l'esito. Non trattare durante la pioggia o con le foglie bagnate.

COMPATIBILITÀ:
usare il prodotto da solo. Non eseguire trattamenti con antiparassitari nello stesso giorno d'applicazione dell'antigermoglio.
FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
- Evitare che la miscela bagni la pagina inferiore delle foglie, delicata e soggetta a ustionarsi; non trattare in giornate ventose e su piante inclinate.
- Non trattare nelle ore più calde della giornata: al mattino attendere che la rugiada si sia asciugata, al pomeriggio che le piante si siano riprese dall'appassimento meridiano. Non trattare nella tarda serata.
- Non trattare piante ammalate, malnutrite o comunque sofferenti.
- Rispettare le dosi consigliate: esse comunque hanno carattere generico e vanno messe a punto caso per caso, tenendo conto dei fattori ambientali e dello stato della pianta e dei germogli

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto. Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE; EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

(*) Avvertenza limitata alla taglia da 1000 litri :
Attenzione : contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

CLOROTALONIL 75 WDG

Fungicida

Formulato in granuli idrodispersibili

Composizione: g 100 di prodotto contengono:
- Clorotalonil puro 75 g
- Bagnanti, disperdenti e supporti inerti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO :
Molto tossico per inalazione; Irritante per le vie respiratorie; Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti; Rischio di gravi lesioni oculari; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici; Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza; In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo

AGRICO srl
Viale Masini 22 - 40126 BOLOGNA

Officina di Produzione: S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Taglie Autorizzate: g 10 - g 25 - g 50 - g 100 - g 250 - kg 1 - kg 5 - kg 10
Registrazione n. 9862 Ministero della Sanità del 16.12.1998 - Partita n.:*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi : irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia. Terapia : sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il CLOROTALONIL 75WDG è un fungicida ad azione preventiva a largo spettro d'azione, efficace contro vari funghi patogeni delle seguenti colture : ortaggi, fruttiferi e colture floreali.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO (per 100 litri d'acqua)
COLTURE ORTIVE (in pieno campo od in serra)
Pomodoro e patata : contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Cladosporiosi, Muffa grigia, Sclerotinia, Antracnosi, Cercosporiosi e Rizoctonia 150 - 200 g/hl. Con un massimo di tre applicazioni annue in campo e cinque in serra per il pomodoro e di due applicazioni annue per la patata.
Cetriolo, melone e cocomero : contro Antracnosi, Peronospora, Alternaria, Cladosporiosi, Vaiolatura, Rizoctonia e Fusariosi non vascolare 150 - 200 g/hl. Con un massimo di tre applicazioni annue a pieno campo o in serra.
Sedano: contro Septoria, Rizoctonia, Cercospora e Sclerotinia 200 - 250 g/hl. Massimo tre applicazioni annue a pieno campo o in serra.
Cipolla: contro Peronospora, Muffa grigia, Ruggini ed Alternaria 150 - 200 g/hl. Massimo due applicazioni annue a pieno campo.
Fagiolo, fagiolino e pisello : contro Antracnosi, Peronospora e Ruggine 150 - 200 g/hl. Massimo due applicazioni annue in pieno campo da effettuarsi fino alla fioritura, ad eccezione del fagiolino per il quale il trattamento deve essere sospeso prima della fioritura.
Il CLOROTALONIL 75WDG va impiegato sulle colture ortive in via preventiva in qualunque periodo dell'anno a seconda della necessità, ripetendo i trattamenti ad intervalli variabili in funzione della virulenza e dell'andamento stagionale e rispettando il numero massimo di applicazioni annuali sopra riportato.
POMACEE (melo e pero) : contro Ticchiolatura, Cancri rameali, Ruggine, Marciume dei frutti e del colletto 200 - 250 g/hl in trattamenti invernali ; 100 - 150 g/hl in trattamenti prima della fioritura ;120 - 150 g/hl in trattamenti dopo la fioritura ;impiegando il prodotto solo in campo con un massimo di quattro applicazioni annue e solo in miscela con fungicidi sistemici.
DRUPACEE (pesco e susino) : contro Monilia, Corineo, Bolla, Ruggine, Nerume e Cancri rameali 150 - 200 g/hl in trattamenti prima e dopo la fioritura ;150 - 200 g/hl in trattamenti 5 - 6 settimane prima della raccolta; 150 - 200 g/hl in trattamenti 3 - 4 settimane prima della raccolta impiegando il prodotto solo in campo con un massimo di quattro applicazioni annue e solo in miscela con fungicidi sistemici.
COLTURE FLOREALI E ORNAMENTALI : contro Antracnosi, Muffa grigia, Ticchiolatura, Ruggini, Septoriosi, Alternaria, Fusariosi non vascolare 150 - 200 g/hl in interventi preventivi od alla prima comparsa della malattia, ripetendo i trattamenti quando è necessario in funzione dell'andamento stagionale e delle infezioni.
PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE : stemperare la dose stabilita di CLOROTALONIL 75 WDG in poca acqua mescolando sino ad ottenere una poltiglia fluida ed omogenea, versarla quindi nella quantità d'acqua rimanente, mescolando con cura, sino ad ottenere la diluizione voluta.
Tempi di rientro : 12 ore (in campo) - 24 ore (in serra).
AVVERTENZE :
- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi
- Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore - Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua

COMPATIBILITÀ
Associazioni possibili con : sterolo-inibitori fungicidi; antiperonosporici sistemici, citotropici e translaminari; dicarbossimidici (antibotritici); benzimidazolici; rame; zolfi. Non è invece compatibile con olii minerali e con prodotti fitosanitari a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).
Avvertenze : Il CLOROTALONIL 75WDG deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego di olii minerali.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ
È consigliabile eseguire saggi preliminari prima di procedere ad effettuare trattamenti su colture da fiore particolarmente delicate.
RISCHI DI NOCIVITÀ: Non eseguire trattenenti durante la fioritura essendo il prodotto tossico per gli insetti utili.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI
21 giorni prima della raccolta per melo, pero e pesco. 35 giorni prima della raccolta per susino.
14 giorni prima della raccolta per cipolla, pomodoro, cetriolo, melone, cocomero, sedano e patata.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Attenzione : data l'elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego é consentito esclusivamente al personale qualificato munito di autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23/04/2001

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

EMME-H

Fitoregolatore ad azione sistemica per il controllo selettivo dei germogli ascellari primari e secondari del tabacco.
Tipo di formulazione: soluzione acquosa

Partita No:

Composizione:
- Idrazide maleica pura g. 16,1 (= 180 g/l)
(contente meno di 1 mg/kg d'idrazina)
- Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGRICO s.r.l. - viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

Stabilimenti produttori: ALTHALLER ITALIA SRL – San Colombano al Lambro (Mi) / DREXEL CHEMICAL COMPANY - Memphis, TN, U.S.A.
Taglie autorizzate: Litri 5; Litri 10; Litri 20; Litri 50
Registrazione del Ministero della Sanità N 10224 del 20.12.1999

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Irritante per cute e mucose, tremori, convulsioni fino al coma. Terapia: Sintomatica. Consultare un Centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche: Attivo per azione sistemica. Inibendo la divisione cellulare impedisce selettivamente lo sviluppo dei germogli del tabacco.
Colture protette: Tabacco.
Concentrazioni e dosi d'impiego: S'impiega alla dose di 2-2,5 litri di prodotto diluito in 100 litri d'acqua. La dose inferiore si usa per i tabacchi di varietà chiara, la più alta per le varietà scure. Nell'applicazione manuale si calcolano 15-20 ml di soluzione per pianta, corrispondente a 50-60 piante per litro di miscela. Nell'applicazione meccanica si usano da 600 a 800 litri di soluzione per ettaro.
Epoche d'impiego: La cimatura deve essere precoce e si tratta entro le 24 ore dalla cimatura.
Metodi d'applicazione: E' determinante per il buon esito che il prodotto venga assorbito dalle foglie della pianta. Sia nell'applicazione manuale che meccanica debbono pertanto essere impiegati ugelli producenti un getto nebulizzato e una pressione di 3 - 4 atm., bagnando bene la metà superiore della pianta.
Numero d'applicazioni: E' sufficiente un solo trattamento. Collocare il trattamento dopo un ciclo di raccolta delle foglie così da posizionare la successiva raccolta dopo circa una settimana. Interventi integrati con prodotti contattocidi come gli alcoli grassi o sistemici-locali come le dinitroaniline, prima e dopo il trattamento sono vivamente consigliati, specie nel caso di trattamenti meccanici.
Avvertenze per l'impiego:
- Bagnare uniformemente la parte superiore delle piante. Le foglie debbono essere asciutte e turgide. - Non trattare piante destinate alla produzione del seme.
- L'efficacia del trattamento dipende dalla quantità di sostanza attiva assorbita e dislocata dalla pianta, pertanto si consiglia di trattare quando la pianta è attiva: i giorni successivi a un'irrigazione, di prima mattina o con cielo nuvoloso. Si sconsiglia di trattare con temperature elevate, su piante appassite ed in presenza di vento.
- Attenzione: Il trattamento può procurare un ingiallimento delle foglie. Tale precoce ingiallimento non essendo indice di maturità fisiologica non può essere preso come riferimento per la raccolta.

COMPATIBILITA' Usare il prodotto da solo.
FITOTOSSICITA': Non trattare piante ammalate, malnutrite o comunque sofferenti. Rispettare le dosi consigliate.
RISCHI DI NOCIVITA' Il prodotto è NOCIVO per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Attenzione! Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Conservare il prodotto chiuso nel contenitore origina-le, in luogo asciutto e fresco.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

FOGLIALARGA

Erbicida per prati ornamentali, campi da golf e campi sportivi
Tipo di formulazione: Soluzione acquosa

Partita n.

COMPOSIZIONE:
- Mecoprop puro g 16,40 (= 172 g/l)
- Dicamba puro g 1,43 (= 15 g/l)
  (da sali dimetilamminici)
- Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Rischio di gravi lesioni oculari; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Non gettare i residui nelle fognature; Proteggersi gli occhi/la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGRICO srl viale Masini 22 - BOLOGNA

Stabilimento produttore: Torre srl - Torrenieri (SI) / ALTHALLER ITALIA srl - San Colombano (MI)
Taglie autorizzate: litri 0,5 - litri 1 - litri 5 - litri 10 - litri 20
Registrazione n. 10391 del 22/03/2000 Ministero della Sanità

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione di due sostanze attive, Mecoprop 16,40% e Dicamba 1,43%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
MECOPROP. Sintomi: Irritazione per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea, irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipotermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC, vertigini, atassia, iperflessia nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia, vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione, gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia: Ospedalizzare.
DICAMBA: Sintomi: Irritazione oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
foglialarga è un erbicida ormonico selettivo, efficace contro la maggioranza delle infestanti a **foglia larga** presenti nei prati ornamentali, campi da golf, campi da calcio, campi sportivi. Controlla infestanti dicotiledoni come: Trifolium repens (T. bianco), Trifolium pratense (T. rosso), Trifolium incarnatum (T. incarnato), Rumex sp. (Romice), Plantago sp. (Piantaggini), Amaranthus sp. (Amaranto), Poligonum persicaria (Poligono persicaria), Stellaria media (Centocchi), Veronica persica (Veronica). Il prodotto non è attivo sulle specie graminacee.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
I trattamenti devono essere effettuati su tappeto erboso asciutto in buone condizioni sanitarie, su infestanti giovani in piena attività vegetativa. Il trattamento va effettuato alcuni giorni dopo un taglio in modo da permettere l'assorbimento del prodotto attraverso la superficie fogliare dell'infestante. Su impianti giovani, intervenire non prima della levata dell'erba, possibilmente dopo avere effettuato almeno 2-3 tagli del tappeto erboso alla dose di 5-7 litri per ettaro (50-70 ml/100 mq). Su tappeti erbosi stabilizzati (dal secondo anno dall'impianto), intervenire nel periodo primavera-estate e inizio autunno alla dose di 7-9 litri per ettaro(70-90 ml/100 mq).
Diluire il prodotto in 300-500 litri d'acqua per ettaro (3-5 l/100 mq). Trattare con temperature comprese tra 12 e 25°C.
PRECAUZIONI DA ADOTTARSI NEL TRATTAMENTO
E' assolutamente sconsigliabile eseguire il seguire il diserbo in giornate di vento e nelle vicinanze di piante da frutto o piante ornamentali. Il prodotto deve rimanere sulla foglia per almeno 12 ore: non eseguire il trattamento qualora si preveda prossima la pioggia. Evitare di irrigare per 24 ore dopo il trattamento. Evitare di trattare tappeti erbosi in fase di stress idrico. In questo caso irrigare abbondantemente il tappeto erboso 2-3 giorni prima del trattamento. Le pompe impiegate per il diserbo devono essere accuratamente lavate con soda in modo da eliminare ogni residuo erbicida,
COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con prodotti non acidi e non contenenti metalli. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
TEMPO DI RIENTRO: Non rientrare nelle aree trattate prima di 24 ore dal trattamento e segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del pesticida.
ATTENZIONE! da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

1

ANTAK

FITOREGOLATORE

Prodotto ad azione di contatto per il controllo selettivo dei germogli ascellari primari e secondari del tabacco

Tipo di formulazione: liquido emulsionabile

Composizione:
- n-Decanolo puro g 79 (686 g/l)
- Coformulanti. q.b. a g 100

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle - Nocivo per organismi acquatici;
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGRICO Srl
Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

Stabilimento produttore:
DREXEL CHEMICAL COMPANY - Memphis, TN (U.S.A.)
Taglie autorizzate: litri 5 - litri 10 - litri 20 - litri 50 - litri 100
Registrazione del Ministero della Sanità n. 10988 del 12/07/2001 Partita n.

INFORMAZIONI MEDICHE: in caso d'intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche: Attivo per contatto. Devitalizza i giovani tessuti vegetali in rapido accrescimento determinando una necrosi selettiva. Il prodotto è costituito da un solo componente alla massima purezza con esaltazione della rapidità d'azione e della selettività.
Colture protette: Tabacco.
Scopo dell'impiego: Controllo selettivo dei germogli ascellari e pedali.
Concentrazioni e dosi d'impiego: Nell'applicazione manuale, s'impiega alla dose di 4-6 litri di prodotto in 96-94 litri d'acqua utilizzando 15-20 ml. di miscela per pianta, corrispondente a 50-60 piante per litro di miscela. Nell'applicazione meccanica, s'impiega alla dose di 3-5 litri di prodotto in 97-95 litri d'acqua utilizzando da 800 a 1000 litri di miscela per ettaro. Le dosi inferiori si usano per i tabacchi di varietà chiara, le più alte per le varietà scure.
Epoche d'impiego: Il prodotto può essere impiegato sia prima che dopo la cimatura. Nel primo caso il trattamento viene eseguito prima dell'apertura dei bottoni fiorali, cimando poi entro la settimana e asportando i germogli più lunghi di 3 cm. Nel secondo caso si cima allo stadio compreso fra l'allungamento dei bottoni fiorali e l'apertura dei fiori, asportando come regola i germogli lunghi più di 3 cm e trattando entro 2 giorni, meglio entro le 24 ore, dalla cimatura.
Metodi d'applicazione: E' determinante per il buon esito che il prodotto venga a contatto con i germogli, scorrendo lungo lo stelo della pianta; sia nell'applicazione manuale che meccanica debbono pertanto essere impiegati ugelli producenti un getto grossolano e mantenuti ad un'altezza tale da permettere che la miscela raccolta dalle foglie venga convogliata e scorra liberamente lungo il fusto della pianta fino alla base. Con mezzi d'irrorazione manuali, impiegando pompe a spalla, si mantenga nel serbatoio una debole pressione, appena sufficiente a fare uscire il liquido, mantenendo l'ugello, montato su un raccordo curvo, rivolto verso il basso a 15-20 cm. dalla cima delle piante. Con mezzi d'irrorazione meccanici, è importante l'accurata taratura della macchina affinché l'applicazione sia omogenea. Gli ugelli, tre per fila di piante e disposti a 20 cm di distanza fra loro, sono rivolti verso il basso: quello centrale verticale e allineato con la fila delle piante, i laterali inclinati verso l'interno. L'altezza della barra deve essere tale da mantenere gli ugelli a 30-40 cm dalla cima delle piante. La pressione assai bassa, 0,5-1 atm, permette la formazione di gocce grossolane. La velocità d'avanzamento deve essere tale da permettere che il giusto quantitativo di miscela venga raccolto da ogni pianta.
Numero d'applicazioni: Nella normalità dei casi è sufficiente un solo trattamento per un adeguato controllo dei germogli ascellari; in caso di forte attività vegetativa può essere utile un secondo trattamento a 10 giorni dal primo. Un trattamento integrativo con un prodotto sistemico, a base di idrazide maleica, che inibisca la formazione di nuovi germogli è vivamente consigliato, specie nel caso di trattamenti meccanici.
Avvertenze per l'impiego:
- Prima dell'uso agitare il prodotto nel contenitore. Preparare la miscela, aggiungendo l'acqua al prodotto, subito prima dell'impiego e mantenerla agitata nel serbatoio dell'irroratore.
- Il prodotto agisce entro un'ora dal trattamento: un'eventuale pioggia dopo un'ora e mezza dal trattamento non ne pregiudica l'esito. Non trattare durante la pioggia o con le foglie bagnate.

COMPATIBILITÀ:
usare il prodotto da solo. Non eseguire trattamenti con antiparassitari nello stesso giorno d'applicazione dell'antigermoglio.
FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
- Evitare che la miscela bagni la pagina inferiore delle foglie, delicata e soggetta a ustionarsi; non trattare in giornate ventose e su piante inclinate.
- Non trattare nelle ore più calde della giornata: al mattino attendere che la rugiada si sia asciugata, al pomeriggio che le piante si siano riprese dall'appassimento meridiano. Non trattare nella tarda serata.
- Non trattare piante ammalate, malnutrite o comunque sofferenti.
- Rispettare le dosi consigliate: esse comunque hanno carattere generico e vanno messe a punto caso per caso tenendo conto dei fattori ambientali.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.
Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

SAFE

Fungicida sistemico per la protezione delle colture orticole, vivai ed impianti di melo, pero, agrumi e piante forestali, colture floreali ed ornamentali, tappeti erbosi di campi da golf e prati ornamentali.
Tipo di formulazione: liquido solubile

Composizione:
- Propamocarb cloridrato puro g 66,5 (= 722 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Fungicida sistemico del gruppo dei carbammati.
CAMPI D'IMPIEGO
- Orticole: solanacee (pomodoro, peperone, melanzana), cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo), insalate
(lattuga, cicoria, indivia, radicchio), spinacio, bietola da foglie e da costa, sedano, prezzemolo, basilico, cavolfiore, cavoli, carota,
rapa, bietola rossa, aglio, cipolla, porro,
- Tabacco, fragola,
- Colture floreali ed ornamentali, per il controllo del Pythium spp., Phytophthora spp., Peronospora, Pseudoperonospora,
Aphanomyces spp., Bremia.
- Tappeti erbosi di campi da golf e prati ornamentali in genere, per il controllo di Pythium aphanidermatum ed eventuali altre specie.
- Piante di melo, pero, agrumi e piante forestali, per il controllo di Pythium spp. e Phytophthora cactorum, P. citrophthora,
P. paralitica, P. cinnamomi, sia in vivaio che nei primi anni dopo la messa a dimora in campo.

Può essere impiegato con tecniche diverse: concia dei semi, bagno dei bulbi, disinfezione dei terricciati e dei letti di semina, trattamenti al terreno in pre e post-trapianto delle colture, trattamenti fogliari. I migliori risultati si ottengono con interventi preventivi.
MODO D'AZIONE:
Il prodotto è assorbito prevalentemente dal sistema radicale delle piante e viene traslocato nell'apparato fogliare in modo da assicura-re una completa protezione
MODALITA' D'IMPIEGO
- Concia dei semi: 1-4 ml/kg di seme, per semi di piccola dimensione (es. tabacco, frumento); 10-40 m/kg di seme, per semi leggeri
e dotati di elevata superficie (es. girasole).
I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana o del bestiame. Per la distruzione
delle sementi non utilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi
- Preparazione dei terricciati: 300 ml/mc di terriccio diluiti in 20 litri d'acqua.
- Trattamenti ai semenzai: 8-12 ml/mq di superficie in 4-5 litri d'acqua (ripetere il trattamento 5 giorni prima del trapianto in 6-8 l
d'acqua per mq).
- Trattamenti al terreno in pre-trapianto: 8-12 ml/mq in 3-5 litri d'acqua.
- Trattamenti al terreno in post-trapianto: 100-200 ml/pianta di una soluzione allo 0.2% di formulato (200 ml/hl); ripetere il
trattamento ogni 10-15 giorni (3-4 trattamenti).
- Trattamenti fogliari: 1,5-3 /ha in 15-20 hl di acqua per ettaro.

Indicazioni specifiche:
- Garofano e Gerbera: contro Pythium e Phytophthora. Trattamenti iniziali: 12-15 ml/mq di superficie in 2-4 litri d'acqua due giorni
prima dell'impianto, incorporando uniformemente. Trattamenti successivi: 200 ml/hl d'acqua per via fogliare bagnando
abbondantemente (400-500 litri di soluzione ogni 1000 mq). Si consiglia di effettuare i primi due trattamenti a distanza di 8-10
giorni proseguendo con interventi ogni 15-25 giorni.
- Bulbose: contro Pythium ultimum e Phytophthora.
Immersione dei bulbi per 20-30 minuti in una soluzione di 300 ml/hl d'acqua. Trattare il terreno prima della messa a dimora con
10-12 ml/mq in 2-4 litri d'acqua, incorporando a 10-12 cm di profondità.
- Vivai di piante forestali: contro Phytophthora cactorum, Phytophthora cinnamomi e Pythium.
Trattare il substrato colturale con 300 ml/mq in 8-10 litri d'acqua; all'emergenza trattare ogni 15-18 giorni con 4-5 l/mq di una soluzione del formulato allo 0.2%.
- Campi da golf e prati ornamentali: contro Pythium aphanidermatum ed eventuali altre specie.
Trattamenti fogliari alla dose di 1-1.5 ml/mq, avendo cura di irrorare con almeno 100-200 litri di soluzione per 1000 mq. Iniziare i
trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Ripetere i trattamenti ogni 14-15 giorni.

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con i fungicidi benzimidazolici (Tiofanate metil, Carbendazim), con TMTD, Clorotalonil, prodotti rameici e Mancozeb.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Non presenta fenomeni di fitotossicità alle dosi consigliate sulle colture indicate. Tuttavia su varietà particolarmente delicate o di recente introduzione si consiglia di eseguire prove preliminari.
INTERVALLO DI SICUREZZA:
Sospendere i trattamenti 20 GIORNI prima della raccolta.
Per i campi da golf e prati ornamentali obbligo di segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione.
ATTENZIONE! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare dell'autorizzazione: AGRICO Srl - viale Masini 22 40126 BOLOGNA
Stabilimento di produzione: ALTHALLER ITALIA srl, San Colombano (MI) / Torre srl, Torrenieri (SI) / CHEMIA spa, Sant'Agostino (FE)
Registrazione del Ministero della Salute n. 11397 del 17/07/2002
Taglie autorizzate: ml 50 - ml 100 - ml 250 - litri 0,5 - litri 1 - litri 5
Partita N.:

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.a.

ROUNDUP® RTU

Erbicida sistemico di post-emergenza.
Liquido pronto all' uso.

COMPOSIZIONE:

Glifosate sale isopropilamminico	g 0,97 (g/l 9,7)
(equivalenti a glifosate acido	g 0,72 - 7,2 g/l)
Acqua e coadiuvanti	q. b. a g 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Informazioni mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Caratteristiche:
ROUNDUP RTU è un erbicida da impiegarsi dopo la nascita delle malerbe ed è praticamente efficace contro tutte le specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato fino alle radici ed agli organi sotterranei. ROUNDUP RTU non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microorganismi presenti nell'ambiente.
ROUNDUP RTU consente di seminare le superfici trattate dopo 48 ore dall' applicazione.
La comparsa dei sintomi di sofferenza nelle malerbe può impiegare da alcuni giorni a 2 - 3 settimane. Questo intervallo consente al prodotto di diffondersi fino alle radici e agli organi sotterranei e porta alla completa distruzione delle piante. Nel periodo successivo al trattamento la crescita delle piante risulta comunque bloccata.

Distribuzione
Distribuire uniformemente sulla vegetazione da distruggere senza che il prodotto sgoccioli.

Istruzioni per le confezioni normali
Utilizzare preferibilmente irroratori dotati di ugelli a specchio o a ventaglio e distribuire a bassa pressione (1 -2 bar). Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

Istruzioni speciali per le confezioni dotate di spruzzatore
Ruotare lo spruzzatore fino ad ottenere l' ampiezza dello spruzzo desiderata. Dopo l'uso riportare in posizione di "stop".

AVVERTENZE
L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse, come siccità, freddo, attacchi parassitari ha efficacia ridotta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento. Per consentire una corretta efficacia erbicida devono trascorrere 48 ore (infestanti annuali) e 15 giorni (infestanti perenni) prima che vengano effettuati tagli o lavorazioni.

Campi d'impiego
Aree non destinate alle colture agrarie: aree rurali e industriali, aree ed opere civili.

Dosi d'impiego
25 - 50 ml/mq. Adottare le dosi maggiori per le infestanti perenni e arbustive.
Nel caso di associazioni di specie diverse adottare la dose efficace per il controllo di quelle meno sensibili.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto si usa da solo.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A. - Via San Colombano 81/A – 26900 Lodi (LO)

Officina di produzione:
Monsanto Europe N.V. - Antwerp - Belgio

Prodotto conforme alle specifiche F.A.O.

Autorizzazione del Ministero Salute n. 8565 del 3.12.1994

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto litri 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 – 3 – 5 - 10 - 20 – 50.

Partita n.: vedere sulla confezione.

CITTAVERDE

Erbicida per luoghi incolti - Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:
Principio attivo: Glifosate puro g 41 - (g/l 480)
Acqua q.b. a g 100,0

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni/schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A. - Via S. Colombano, 81/A 26900 LODI LO

Officina di Produzione:
Monsanto Europe - Antwerpen (Belgio)

Autorizzazione del Ministero Sanità n° 9773 del 1 ottobre 1998

Volume 1 - 1,5 - 2 - 5 - 10 -20 - 50 - 100 - 150 - 200 litri

Partita n°:

Informazioni mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO

Caratteristiche:
Il prodotto è un diserbante di post-emergenza efficace su tutte le infestanti monocotiledoni e dicotiledoni, annuali e perenni (Gramigna, Sorghetta, Cipero, Vilucchio). Viene assorbito dalle foglie e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perennanti, che vengono così devitalizzati. CITTAVERDE è rapidamente disattivato a contatto con il terreno, quindi la presenza del prodotto nel terreno non causa alcun danno alle colture perenni arbustive e arboree. Non possedendo il prodotto efficacia di pre emergenza, onde ottenere un diserbo duraturo, è necessario, prima o dopo il trattamento, intervenire con un erbicida ad azione persistente sul terreno (es. Simazina, Diuron) per evitare la nascita delle infestanti provenienti da semi che possono germinare dopo l'applicazione di CITTAVERDE. L'effetto visivo dell'azione di CITTAVERDE consiste in un ingiallimento ed in un appassimento graduale che si risolvono nella morte dell'infestante anche a livello dell'apparato radicale.

Diserbo totale degli incolti (sedi ferroviarie, argini di canale, fossi e scoline, aree rurali e industriali, aree ed opere civili).

Impiegare il prodotto su infestanti in vegetazione, sia in estate che in autunno o primavera; in questo secondo caso la lavorazione del terreno e la semina possono essere effettuate 2-3 settimane dopo il trattamento. Nel caso che la vegetazione da distruggere fosse molto alta e densa, usare sino a 1000 l/ha d'acqua, evitando sempre la deriva e che l'irrorato giunga su colture vicine.

Le dosi di impiego, riferite ad ettaro di superficie effettivamente trattata, variano in funzione della specie delle infestanti presenti:

3-5 l/ha (30-50 ml ogni 100 mq) contro la maggior parte delle erbe annuali;

4-5 l/ha (40-50 ml ogni 100 mq) contro Sorghum halepense, Agropyrum repens, Ranuncolus spp.. Su sorghetta alta 30-40 cm usare una dose di 5,5 l/ha mentre se l'infestante è all'inizio della fioritura usare 4 l/ha di CITTAVERDE.

5-6 l/ha (50-60 ml ogni 100 mq) contro Cyperus rotondus, Cirsium arvense (in fioritura), Artemisia vulgaris, Potentilla spp., Plantago spp., Taraxacum officinale, Rumex spp. e felci.

8-10 l/ha (80-100 ml ogni 100 mq) contro Convolvolus arvensis ben sviluppato (inizio fioritura), Cynodon dactilon, Urtica spp., Daucus carota, Sonchus arvensis, Tussilago farfara, Cannuccia (alte 50-80 cm).

10-12 l/ha (100-120 ml ogni 100 mq) contro Convolvolus arvensis all'inizio dello sviluppo (lungo almeno 30 cm).

AVVERTENZE
Le piogge che cadono entro 6 ore dall'applicazione ne riducono l'efficacia. Le temperature medie e l'alta umidità dell'aria facilitano la crescita delle infestanti e favoriscono l'esito del diserbo, le temperature basse e il caldo estivo non limitano l'efficacia del prodotto purché le infestanti siano verdi,
vitali e non essiccate. Le perennanti sono meglio controllate se ben sviluppate al momento del trattamento; alcune dicotiledoni (es. Vilucchio, Stoppione, Artemisia) sono più sensibili se in fioritura o in uno stadio più avanzato. Arature, fresature, tagli delle erbe o pascolo di animali prima del trattamento riducono l'efficacia del diserbo. Dopo il trattamento su erbe perennanti lasciar traslocare il prodotto negli organi sotterranei per 2-3 settimane, prima di procedere a lavorazione del terreno. Fra trattamenti con erbicidi residuali ed applicazioni del prodotto lasciar intercorrere almeno 1-2 settimane. Impiegare su infestanti in attività di crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. Evitare l'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari. L'efficacia erbicida può esser ridotta da: precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, il taglio, il pascolo, il danneggiamento della vegetazione, la siccità, il freddo, gli attacchi parassitari e comunque quei fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione e traslocazione del prodotto.

Preparazione della miscela
Agitare la confezione prima dell'uso, diluire in poca acqua la dose prestabilita di prodotto e versare poi nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

Dosi e modalità d'impiego.
Il prodotto va usato per irrorazione sulle infestanti ben sviluppate, distribuendo circa 300-500 litri di soluzione del prodotto per ettaro in modo da bagnare uniformemente le malerbe, senza provocare perdite per gocciolamento.
Note importanti
Impiegare pompe a bassa pressione (massimo 3 atmosfere) a barre o lance munite di ugelli a specchio o a ventaglio che distribuiscono gocce di dimensioni grosse. Evitare durante i trattamenti formazione di deriva e di goccioline polverizzate, che potrebbero portare il prodotto a contatto con l'apparato fogliare delle colture provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i succhioni e i ricacci alla base delle piante. Non bagnare il tronco, specialmente se non ben lignificato o con ferite. Per evitare la deriva usare ugelli protetti da coni e schermi, che evitino alla soluzione erbicida di giungere a contatto con la vegetazione delle piante. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi. Non scaricare le acque utilizzate per i lavaggi in acqua destinata all'irrigazione.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

Compatibilità : Il prodotto si usa da solo.

FITOTOSSICITA'
Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare (rami non lignificati, succhioni del tronco e del portainnesto) di tutte le piante. Irrorare il prodotto con pompe a bassa pressione (massimo 3 atmosfere); evitare formazioni di deriva. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente con tre risciacqui successivi di acqua, le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per le taglie da 100 a 200 litri lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali di prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con idoneo materiale assorbente e raccogliere per il successivo smaltimento come rifiuto speciale.

CLEAN-UP

Erbicida sistemico di post-emergenza. Concentrato solubile.

Composizione:
Glifosate acido puro g 31 (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico g 41,7)
Acqua e coadiuvanti q. b. a g 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Informazioni mediche.
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO.

Generalità. CLEAN-UP è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. CLEAN-UP non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

Attrezzature, volumi d'acqua e miscele. Si raccomanda l'utilizzo di ugelli a specchio o a ventaglio e di operare a pressioni comprese tra 1 e 3 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. L'impiego di attrezzature a sgocciolamento, di tipo umettante o lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto, anche quando le infestanti sono vicine alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le pompe e i recipienti, risciacquandoli almeno tre volte prima di riutilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Impiegare preferibilmente volumi d'acqua fino a 400 l/ha. L'addizione alla miscela di 10 kg/ha di solfato ammonico può risultare utile, soprattutto in condizioni di trattamento non ottimali.

Avvertenza. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, taglio, pascolo, danneggiamento della vegetazione, siccità, freddo, attacchi parassitari o comunque da quei fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincato) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

Campi d'impiego.
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi: arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo, kumquat. Pomacee: melo, pero. Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite e olivo.
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino. Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto e il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti ed a goccia). Ortaggi: carciofo, pomodoro, melanzana, fagiolino, fava, pisello, carota. Patata. Mais (solo interfila, da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati (leguminose e graminacee), erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago.
Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, vivai prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alle colture agrarie: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali e industriali, aree ed opere civili.

Dosi d'impiego. Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata. Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1 - 2 l / 100 litri d'acqua sulle annuali/bienni e di 2 - 5 l / 100 litri d'acqua sulle perenni.
Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Di seguito sono indicate le dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti (in presenza di ulteriori specie effettuare prima piccole prove di saggio).
Annuali e bienni. 1,5 - 4 l/ha: *Alopecurus spp.* (Coda di topo) , *Avena spp.* (Avena selvatica), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lolium spp.* (Loietto), *Mercurialis spp.* (Mercorella), *Poa spp.* (Fienarola), Riso crodo, *Amni majus (Sedano selvatico)*, *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Calendula spp.* (Calendula), *Chenopodium sp.* (Farinaccio), *Orobanche spp.* (Succiamele), *Portulaca spp.* (Porcellana), *Raphanus spp.* (Ravanello Selvatico), *Senecio spp.* (Senecio), *Sinapis spp.* (Senape), *Stellaria spp.* (Centocchio), *Veronica spp.* (Veronica).
Perenni. 4 - 5 l/ha: *Agropyron repens* (Agropiro), *Carex spp.* (Carice), *Cirsium spp.* (Stoppione), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Glyceria spp.* (Gliceria), *Hipericum spp.* (Erba di San Giovanni), *Laersia oryzoides* (Serla), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Rumex spp.* (Romice), *Sonchus spp.* (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorgo selvatico). 5 - 7 l/ha: *Alisma spp.* (Mestolaccio), *Asfodelus spp.* (Asfodelo), *Butomus spp.* (Fiorone), *Cyperus spp.* (Zigolo), *Ferula spp.* (Ferula), *Juncus spp.* (Giunco), *Nardus spp.* (Cervino), *Scirpus spp.* (Scirpo), *Sparganium spp.* (Sparganio), *Tussilago spp.* (Farfaraccio). 8 - 10 l/ha: *Agrostis spp.* (Cappellini), *Allium spp.* (Aglio), *Artemisia spp.* (Artemisia), *Arundo spp.* (Canna), *Cynodon spp.* (Gramigna), *Eracleum spp.* (Panece), *Glechoma spp.* (Edera), *Oxalis spp.* (Acetosella), *Paspalum spp.* (Gramignone), *Phragmites spp.* (Cannuccia di Palude), *Pteridium spp.* (Felce), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Rubus spp.* (Rovo), *Tipha spp.* (Tifa), *Urtica spp.* (Ortica) 12 l/ha: *Aristolochia spp.* (Aristolochia), *Clematis spp.* (Clematide), *Convolvulus spp.* (Convolvolo), *Rubia peregrina* (Robbia selvatica).
Arbusti. 4 - 6 l/ha: *Acer spp.* (Acero), *Fraxinus spp.* (Frassino), *Genista spp.* (Ginestra), *Salix spp.* (Salice), *Sambucus spp.* (Sambuco), *Vaccinum spp.* (Mirtillo) 10 - 12 l/ha: *Calluna spp.* (Grecchia), *Cistus spp.* (Cisto), *Erica spp.* (Erica), *Lonicera spp.* (Caprifoglio).

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto si utilizza da solo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

Fitotossicità: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A - 26900 LODI (LO)

Registrazione del Ministero della Salute n. 11791 del 09/09/2003

Officine di produzione:
Monsanto Europe N.V. - Antwerp – Belgio
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo San Giovanni (BG)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Contenuto litri 0,50 - 1 - 1,5 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50

DA NON VENDERSI SFUSO
Partita n°: vedere sulla confezione.

CLEAN-UP

Erbicida sistemico di post-emergenza. Concentrato solubile.

Composizione:

Glifosate acido puro		g 31 (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico		g 41.7)
Acqua e coadiuvanti	q. b. a	g 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Informazioni mediche.
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO.

Generalità. CLEAN-UP è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. CLEAN-UP non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Fitotossicità: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A - 26900 LODI (LO)
Registrazione del Ministero della Salute n. 11791 del 09/09/2003

Officine di produzione:
Monsanto Europe N.V. - Antwerp – Belgio
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo San Giovanni (BG)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto litri 0,05 - 0,10 - 0,25 - 0,50

Partita n.

CLEAN-UP

Erbicida sistemico di post-emergenza. Concentrato solubile.

Composizione:
Glifosate acido puro g 31 (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico g 41.7)
Acqua e coadiuvanti q. b. a g 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Informazioni mediche.
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO.

Generalità. CLEAN-UP è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. CLEAN-UP non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

Attrezzature, volumi d'acqua e miscele. Si raccomanda l'utilizzo di ugelli a specchio o a ventaglio e di operare a pressioni comprese tra 1 e 3 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. L'impiego di attrezzature a sgocciolamento, di tipo umettante o lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto, anche quando le infestanti sono vicine alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le pompe e i recipienti, risciacquandoli almeno tre volte prima di riutilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Impiegare preferibilmente volumi d'acqua fino a 400 l/ha. L'addizione alla miscela di 10 kg/ha di solfato ammonico può risultare utile, soprattutto in condizioni di trattamento non ottimali.

Avvertenza. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, taglio, pascolo, danneggiamento della vegetazione, siccità, freddo, attacchi parassitari o comunque da quei fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincato) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

Campi d'impiego.
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi: arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo, kumquat. Pomacee: melo, pero. Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite e olivo.
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino. Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto e il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti ed a goccia). Ortaggi: carciofo, pomodoro, melanzana, fagiolino, fava, pisello, carota. Patata. Mais (solo interfila, da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati (leguminose e graminacee), erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago.
Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, vivai prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alle colture agrarie: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali e industriali, aree ed opere civili.

Dosi d'impiego. Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata. Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1 - 2 l / 100 litri d'acqua sulle annuali/bienni e di 2 - 5 l / 100 litri d'acqua sulle perenni.
Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Di seguito sono indicate le dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti (in presenza di ulteriori specie effettuare prima piccole prove di saggio).

Annuali e bienni. 1,5 - 4 l/ha: *Alopecurus spp.* (Coda di topo) , *Avena spp.* (Avena selvatica), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lolium spp.* (Loietto), *Mercurialis spp.* (Mercorella), *Poa spp.* (Fienarola), Riso crodo, *Amni majus (Sedano selvatico)*, *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Calendula spp.* (Calendula), *Chenopodium sp.* (Farinaccio), *Orobanche spp.* (Succiamele), *Portulaca spp.* (Porcellana), *Raphanus spp.* (Ravanello Selvatico), *Senecio spp.* (Senecio), *Sinapis spp.* (Senape), *Stellaria spp.* (Centocchio), *Veronica spp.* (Veronica).

Perenni. 4 - 5 l/ha: *Agropyron repens* (Agropiro), *Carex spp.* (Carice), *Cirsium spp.* (Stoppione), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Glyceria spp.* (Gliceria), *Hipericum spp.* (Erba di San Giovanni), *Laersia oryzoides* (Serla), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Rumex spp.* (Romice), *Sonchus spp.* (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorgo selvatico). 5 - 7 l/ha: *Alisma spp.* (Mestolaccio), *Asfodelus spp.* (Asfodelo), *Butomus spp.* (Fiorone), *Cyperus spp.* (Zigolo), *Ferula spp.* (Ferula), *Juncus spp.* (Giunco), *Nardus spp.* (Cervino), *Scirpus spp.* (Scirpo), *Sparganium spp.* (Sparganio), *Tussillago spp.* (Farfaraccio). 8 - 10 l/ha: *Agrostis spp.* (Cappellini), *Allium spp.* (Aglio), *Artemisia spp.* (Artemisia), *Arundo spp.* (Canna), *Cynodon spp.* (Gramigna), *Eracleum spp.* (Panece), *Glechoma spp.* (Edera), *Oxalis spp.* (Acetosella), *Paspalum spp.* (Gramignone), *Phragmites spp.* (Cannuccia di Palude), *Pteridium spp.* (Felce), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Rubus spp.* (Rovo), *Tipha spp.* (Tifa), *Urtica spp.* (Ortica) 12 l/ha: *Aristolochia spp.* (Aristolochia), *Clematis spp.* (Clematide), *Convolvulus spp.* (Convolvolo), *Rubia peregrina* (Robbia selvatica).

Arbusti. 4 - 6 l/ha: *Acer spp.* (Acero), *Fraxinus spp.* (Frassino), *Genista spp.* (Ginestra), *Salix spp.* (Salice), *Sambucus spp.* (Sambuco), *Vaccinum spp.* (Mirtillo) 10 - 12 l/ha: *Calluna spp.* (Grecchia), *Cistus spp.* (Cisto), *Erica spp.* (Erica), *Lonicera spp.* (Caprifoglio).

DA NON APPLICARE CON MEZZI I AEREI

Compatibilità: Il prodotto si utilizza da solo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

Fitotossicità: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A - 26900 LODI (LO)

Registrazione del Ministero della Salute n. 11791 del 09/09/2003

Officine di produzione:
Monsanto Europe N.V. - Antwerp – Belgio
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo San Giovanni (BG)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Il presente contenitore è di proprietà della Monsanto Agricoltura Italia S.p.A., deve essere utilizzato con il previsto sistema di travaso e quando vuoto restituito per il riutilizzo. Per le taglie pari o superiori a 200 litri, lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali uscite accidentali del prodotto.
In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale.
ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non operare contro vento.

Contenuto litri 60 - 100 -150 -200 - 300 - 400 - 500 – 600

DA NON VENDERSI SFUSO

Partita n.: vedere sulla confezione.

EUROCHLOR TZ

Erbicida selettivo per il mais - Formulazione liquida contenente alaclor microincapsulato

Composizione:
Alaclor puro g 28,5 (336 g/l)
Terbutilazina pura g 12,2 (144 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Nocivo **Pericoloso per l'ambiente**

Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare né bere durante l'impiego.
Non gettare i rifiuti nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A 26900 LODI (LO)
Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. – Salerano al Lambro – LO
Distribuito da:
Europhyto S.r.l.
Viale Vittorio Emanuele II, 64 - 24121 Bergamo (BG)

Registrazione del Ministero della Salute n. 11965 del 04.02.2004

Quantità netta del preparato: litri 1 - 5 - 10 - 20

Partita n°: vedere sulla confezione.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: alaclor 28.5%; terbutilazina 12,2%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Alaclor: Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terbutilazina (non specifici e rilevati su animali con superdosaggi): Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratorie, salivazione.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: -

Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE D'AZIONE
Agisce sui semi in via di germinazione.

SPETTRO D'AZIONE
Erbe infestanti sensibili: amaranto (*Amaranthus* spp.), camomilla (*Matricaria chamomilla*), centocchio (*Stellaria media*), Erba morella (*Solanum nigrum*), sanguinella (*Digitaria* spp.), giavone americano (*Panicum dichotomiflorum*), giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), pabbio (*Setaria* spp.), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), sorghetta da seme (*Sorghum alepense*) e poligonacee.

DOSI DI IMPIEGO
6 -7 litri per ettaro.

VOLUME DI IRRORAZIONE
Distribuire impiegando 400-600 litri di acqua per ettaro.
PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE ERBICIDA
Stemperare a parte in poca acqua la quantità prestabilita di prodotto, mescolando con cura. Versare la sospensione nella metà dell'acqua necessaria, indi riempire la botte agitando.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Occorre che il terreno sia umido al momento del trattamento, oppure che una pioggia di 10-15 mm cada entro due settimane dall'applicazione; in caso contrario effettuare una leggera irrigazione a pioggia. In previsione di una lunga siccità e nell'impossibilità di irrigare a pioggia, si può effettuare prima della semina un leggero interramento del prodotto alla profondità di 2-3 cm.
Non effettuare il diserbo nei terreni torbosi in quanto la sostanza organica decompone il prodotto e quindi ne riduce l'efficacia. Il letame eventualmente distribuito antesemina deve essere ben interrato per non ridurre l'azione del prodotto: tale azione viene altresì ridotta o annullata dallo spargimento di liquame di stalla.
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento, di 10 mesi per altre colture (es. bietola, tabacco).

NOTE (norme fitoprotettive)
Impiegare il prodotto solo su colture specializzate in assenza di sottocolture. Dal trattamento erbicida alla semina di eventuali sottocolture occorre un intervallo minimo di 12 mesi. Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi. Sospendere il trattamento al massimo alla post-emergenza delle infestanti.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si usa da solo.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si consigliano prove parcellari per le varietà poco note o di recente acclimatazione. Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine perché fitotossico. Dopo l'impiego lavare accuratamente la pompa e i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione del prodotto prima del loro riutilizzo.
Conservare il prodotto protetto dal gelo.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

EUROCHLOR TZ

Erbicida selettivo per il mais - Formulazione liquida contenente alaclor microincapsulato

Composizione:
Alaclor puro g 28,5 (336 g/l)
Terbutilazina pura g 12,2 (144 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Nocivo **Pericoloso per l'ambiente**

Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare né bere durante l'impiego.
Non gettare i rifiuti nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A 26900 LODI (LO)

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. Salerano al Lambro LO

Distribuito da:
Europhyto S.r.l.
Viale Vittorio Emanuele II, 64 - 24121 Bergamo (BG)

Registrazione del Ministero della Salute n. 11965 del 04.02.2004

Quantità netta del preparato: litri 200 – 400

ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO: NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

Partita n°: vedere sulla confezione.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: alaclor 28,5%; terbutilazina 12,2%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Alaclor: Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terbutilazina (non specifici e rilevati su animali con superdosaggi): Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratorie, salivazione.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: -

Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE D'AZIONE
Agisce sui semi in via di germinazione.

SPETTRO D'AZIONE
Erbe infestanti sensibili: amaranto (*Amaranthus* spp.), camomilla (*Matricaria chamomilla*), centocchio (*Stellaria media*), Erba morella (*Solanum nigrum*), sanguinella (*Digitaria* spp.), giavone americano (*Panicum dichotomiflorum*), giavone comune (*Echinochloa crus galli*), pabbio (*Setaria* spp.), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), sorghetta da seme (*Sorghum alepense*) e poligonacee.

DOSI DI IMPIEGO
6-7 litri per ettaro.

VOLUME DI IRRORAZIONE
Distribuire impiegando 400-600 litri di acqua per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE ERBICIDA
Stemperare a parte in poca acqua la quantità prestabilita di prodotto, mescolando con cura. Versare la sospensione nella metà dell'acqua necessaria, indi riempire la botte agitando.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Occorre che il terreno sia umido al momento del trattamento, oppure che una pioggia di 10-15 mm cada entro due settimane dall'applicazione; in caso contrario effettuare una leggera irrigazione a pioggia. In previsione di una lunga siccità e nell'impossibilità di irrigare a pioggia, si può effettuare prima della semina un leggero interramento del prodotto alla profondità di 2-3 cm.
Non effettuare il diserbo nei terreni torbosi in quanto la sostanza organica decompone il prodotto e quindi ne riduce l'efficacia. Il letame eventualmente distribuito antesemina deve essere ben interrato per non ridurre l'azione del prodotto: tale azione viene altresì ridotta o annullata dallo spargimento di liquame di stalla.
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento, di 10 mesi per altre colture (es. bietola, tabacco).

NOTE (norme fitoprotettive)
Impiegare il prodotto solo su colture specializzate in assenza di sottocolture. Dal trattamento erbicida alla semina di eventuali sottocolture occorre un intervallo minimo di 12 mesi. Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi. Sospendere il trattamento al massimo alla post-emergenza delle infestanti.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si usa da solo.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si consigliano prove parcellari per le varietà poco note o di recente acclimatazione. Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine perché fitotossico. Dopo l'impiego lavare accuratamente la pompa e i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione del prodotto prima del loro riutilizzo.
Conservare il prodotto protetto dal gelo.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Non operare contro vento.

Contenitore previsto per l'uso con sistemi chiusi di travaso.
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori da 200 e 400 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

DA NON VENDERSI SFUSO

FANDANGO® *360*

Erbicida non selettivo
Formulazione: concentrato solubile.

Composizione:
Glifosate acido puro g 31 (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico g 41,7)
Acqua e coadiuvanti q. b. a g 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Informazioni mediche. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
FANDANGO 360 è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. **FANDANGO 360** non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

Attrezzature, volumi d'acqua e miscele.
FANDANGO 360 consente di ottenere migliori risultati con ugelli a specchio o a ventaglio e ridotti volumi d'acqua. L'addizione alla miscela di 10 kg/ha di solfato ammonico può risultare utile.
Avvertenza. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la translocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse, come siccità, freddo, attacchi parassitari ha efficacia ridotta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento.
Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

Campi d'impiego.
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: vite, olivo, melo, pero, arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo, kumquat.
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago.
Terreni agrari in assenza della coltura (fragola, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai): prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alle colture agrarie: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi, scoline, aree rurali e industriali, aree ed opere civili.

Dosi d'impiego.
Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata.
In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1 - 2 l / 100 litri d'acqua sulle annuali/bienni e di 2 - 5 l / 100 litri d'acqua sulle perenni.

Dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti.
Annuali e bienni. 1,5 - 4 l/ha: *Alopecurus sp., Avena sp., Hordeum murinum, Lolium sp., Mercurialis sp., Poa sp., Riso crodo, Amni majus, Amaranthus sp., Calendula sp., Chenopodium sp., Orobanche sp., Portulaca sp., Raphanus sp., Senecio sp., Sinapis sp., Stellaria sp., Veronica sp.*.
Perenni. 4 - 5 l/ha: *Agropyron repens, Carex sp., Cirsium sp., Euphorbia sp., Glyceria sp., Hipericum sp., Laersia oryzoides, Phalaris sp., Rumex sp., Sonchus sp., Sorghum halepense.* 5 - 7 l/ha: *Alisma sp., Asfodelus sp., Butomus sp., Cyperus sp., Ferula sp., Juncus sp., Nardus sp., Scirpus sp., Sparganium sp., Tussilago sp.* 8 - 10 l/ha: *Agrostis sp., Allium sp., Artemisia sp., Arundo sp., Cynodon sp., Eracleum sp., Glechoma sp., Oxalis sp., Paspalum sp., Phragmites sp., Pteridium sp., Ranunculus sp., Rubus sp., Tipha sp., Urtica sp.* 12 l/ha: *Aristolochia sp., Clematis sp., Convolvulus sp., Rubia peregrina.*
Arbusti. 4 - 6 l/ha: *Acer sp., Fraxinus sp., Genista sp., Salix sp., Sambucus sp., Vaccinium sp.* 10 - 12 l/ha: *Calluna sp., Cistus sp., Erica sp., Lonicera sp.*

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

Compatibilità: compatibile con il solfato ammonico.
Fitotossicità: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati.
Attenzione: da usarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A – 26900 Lodi (LO)

Officina di produzione:
Monsanto Europe N.V. - Antwerp - Belgio

Registrazione del Ministero della Salute n. 9318 del 01/09/1997

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

Quantità netta: 1 - 1,5 - 2 - 5 - 10 -20 - 50 litri

Partita n: vedere sulla confezione.

FANDANGO® *360*

Erbicida non selettivo
Formulazione: concentrato solubile.

Composizione:
Glifosate acido puro g 31 (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico g 41,7)
Acqua e coadiuvanti q. b. a g 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Informazioni mediche. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
FANDANGO 360 è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. **FANDANGO 360** non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Attenzione: da usarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.
Compatibilità: compatibile con il solfato ammonico.
Fitotossicità: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A – 26900 Lodi (LO)

Officina di produzione:
Monsanto Europe N.V. - Antwerp - Belgio

Registrazione del Ministero della Salute n. 9318 del 01/09/1997

Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

Quantità netta: 0,1- 0,25 - 0,5 - 0,75 litri
Partita n: vedere sulla confezione.

FUSTA ®

Erbicida di post-emergenza per il diserbo del melo,della vite, dei cereali in pre semina, di argini e arginelli di risaia, di ripe di fossi, canali e scoline.

COMPOSIZIONE:

GLIFOSATE puro	g 15,8	(= 182 g/l)
MCPA puro	g 15,6	(= 180 g/l)

Nocivo

Nocivo per ingestione.
Irritante per la pelle.
Rischio di gravi lesioni oculari.
Nocivo per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A - 26900 LODI LO

OFFICINA DI PRODUZIONE:
Monsanto Europe S.A. - Antwerp (Belgio)

Registrazione del Ministero della Salute n. 8029 del 16.3.1992

Quantita' netta del preparato: 1 - 5 - 10 - 20 l

Partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli:dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscoiari in genere precedono di poco lamorte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito se nel formulato sono presenti distillati del petrolio come solventi. Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO:

Caratteristiche generali
FUSTA è un erbicida di post-emergenza che agisce per assorbimento fogliare su tutte le infestanti annuali e perenni presenti all' atto del trattamento. L'azione diserbante viene esplicata nelle due settimane successive al trattamento. La vegetazione irrorata ingiallisce, appassisce e subisce processi di necrotizzazione. FUSTA è particolarmente indicato per il controllo delle infestanti a foglia larga, quali :Diplotaxis, Stellaria, Amaranthus sp., Malva sp., Sonchus sp., Cardaria sp., ecc., ma controlla le graminacee annuali, quali: Poa sp., Setaria sp., Lolium sp., Bromus sp..

Campo e dosi di impiego
Distribuire FUSTA in relazione allo sviluppo delle infestanti, in 200 - 400 litri d' acqua per ettaro, con pompe a bassa pressione (1-3 atm) e barre o lance munite di ugelli a specchio o a ventaglio, oppure con micronizzatori.
* Contro infestanti annuali 3 - 4 l/ha , ripetendo il trattamento quando necessario.
* Contro infestanti perenni quali Convolvulus sp., Equisetum sp., Allium sp., 5 - 6 l/ha.
* Per il diserbo pre-semina delle colture cerealicole 3- 4 l/ha.
* Incolti (argini ed arginelli di risaia, ripe di fossi, canali, scoline 5 - 6 l/ha.

Preparazione della miscela
Agitare il contenitore prima dell' uso e versare nella prestabilita quantità d' acqua, agitando con cura. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzali (es. zincati) o in ferro non protetti da vernici plastiche, in quanto il prodotto può corrodere.

Avvertenze
* Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L' intervento su piante sofferenti per cause diverse, come siccità, freddo, attacchi parassitari, ha efficacia ridotta.
* Qualora necessiti il controllo delle infestanti che nascono dopo il trattamento, miscelare prodotti ad azione residuale autorizzati per la coltura da trattare. L' addizione di solfato ammonico alla miscela incrementa l' attività del prodotto, specie in condizioni di trattamento non ottimali.
* L' impiego di attrezzature a sgocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura.
* Al termine del trattamento lavare accuratamente le pompe e i recipienti, risciacquandoli almeno tre volte prima di riutilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto non è selettivo . Eventuali spruzzi sulle parti non ben lignificate possono provocare danni. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell' ingrossamente degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO.

GLYPHEXTRA

Erbicida sistemico di post-emergenza. Concentrato solubile.

Composizione:
Glifosate acido puro g 31 (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico g 41.7)
Acqua e coadiuvanti q. b. a g 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Informazioni mediche.
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO.

Generalità. GLYPHEXTRA è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. GLYPHEXTRA non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

Attrezzature, volumi d'acqua e miscele. Si raccomanda l'utilizzo di ugelli a specchio o a ventaglio e di operare a pressioni comprese tra 1 e 3 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. L'impiego di attrezzature a sgocciolamento, di tipo umettante o lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto, anche quando le infestanti sono vicine alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le pompe e i recipienti, risciacquandoli almeno tre volte prima di riutilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Impiegare preferibilmente volumi d'acqua fino a 400 l/ha. L'addizione alla miscela di 10 kg/ha di solfato ammonico può risultare utile, soprattutto in condizioni di trattamento non ottimali.

Avvertenza. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, taglio, pascolo, danneggiamento della vegetazione, siccità, freddo, attacchi parassitari o comunque da quei fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincato) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

Campi d'impiego.
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi: arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo, kumquat. Pomacee: melo, pero. Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite e olivo.
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino. Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto e il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti ed a goccia). Ortaggi: carciofo, pomodoro, melanzana, fagiolino, fava, pisello, carota. Patata. Mais (solo interfila, da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati (leguminose e graminacee), erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago.
Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, vivai prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alle colture agrarie: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali e industriali, aree ed opere civili.

Dosi d'impiego. Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata. Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1 - 2 l / 100 litri d'acqua sulle annuali/bienni e di 2 - 5 l / 100 litri d'acqua sulle perenni.
Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Di seguito sono indicate le dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti (in presenza di ulteriori specie effettuare prima piccole prove di saggio).
Annuali e bienni. 1,5 - 4 l/ha: *Alopecurus spp.* (Coda di topo) , *Avena spp.* (Avena selvatica), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lolium spp.* (Loietto), *Mercurialis spp.* (Mercorella), *Poa spp.* (Fienarola), Riso crodo, *Amni majus (Sedano selvatico)*, *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Calendula spp.* (Calendula), *Chenopodium sp.* (Farinaccio), *Orobanche spp.* (Succiamele), *Portulaca spp.* (Porcellana), *Raphanus spp.* (Ravanello Selvatico), *Senecio spp.* (Senecio), *Sinapis spp.* (Senape), *Stellaria spp.* (Centocchio), *Veronica spp.* (Veronica).
Perenni. 4 - 5 l/ha: *Agropyron repens* (Agropiro), *Carex spp.* (Carice), *Cirsium spp.* (Stoppione), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Glyceria spp.* (Gliceria), *Hipericum spp.* (Erba di San Giovanni), *Laersia oryzoides* (Serla), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Rumex spp.* (Romice), *Sonchus spp.* (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorgo selvatico). 5 - 7 l/ha: *Alisma spp.* (Mestolaccio), *Asfodelus spp.* (Asfodelo), *Butomus spp.* (Fiorone), *Cyperus spp.* (Zigolo), *Ferula spp.* (Ferula), *Juncus spp.* (Giunco), *Nardus spp.* (Cervino), *Scirpus spp.* (Scirpo), *Sparganium spp.* (Sparganio), *Tussillago spp.* (Farfaraccio). 8 - 10 l/ha: *Agrostis spp.* (Cappellini), *Allium spp.* (Aglio), *Artemisia spp.* (Artemisia), *Arundo spp.* (Canna), *Cynodon spp.* (Gramigna), *Eracleum spp.* (Panece), *Glechoma spp.* (Edera), *Oxalis spp.* (Acetosella), *Paspalum spp.* (Gramignone), *Phragmites spp.* (Cannuccia di Palude), *Pteridium spp.* (Felce), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Rubus spp.* (Rovo), *Tipha spp.* (Tifa), *Urtica spp.* (Ortica) 12 l/ha: *Aristolochia spp.* (Aristolochia), *Clematis spp.* (Clematide), *Convolvulus spp.* (Convolvolo), *Rubia peregrina* (Robbia selvatica).
Arbusti. 4 - 6 l/ha: *Acer spp.* (Acero), *Fraxinus spp.* (Frassino), *Genista spp.* (Ginestra), *Salix spp.* (Salice), *Sambucus spp.* (Sambuco), *Vaccinum spp.* (Mirtillo) 10 - 12 l/ha: *Calluna spp.* (Grecchia), *Cistus spp.* (Cisto), *Erica spp.* (Erica), *Lonicera spp.* (Caprifoglio).

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto si utilizza da solo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

Fitotossicità: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A - 26900 LODI (LO)

Registrazione del Ministero della Salute n. 11853 del 3/10/2003

Officine di produzione:
Monsanto Europe N.V. - Antwerp – Belgio
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo San Giovanni (BG)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Contenuto litri 0,50 - 1 - 1,5 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50

DA NON VENDERSI SFUSO

Partita n.

GLYPHEXTRA

Erbicida sistemico di post-emergenza. Concentrato solubile.

Composizione:
Glifosate acido puro g 31 (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico g 41.7)
Acqua e coadiuvanti q. b. a g 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Informazioni mediche.
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO.

Generalità. GLYPHEXTRA è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. GLYPHEXTRA non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Fitotossicità: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A - 26900 LODI (LO)
Registrazione del Ministero della Salute n. 11853 del 3/10/2003

Officine di produzione:
Monsanto Europe N.V. - Antwerp – Belgio
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo San Giovanni (BG)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto litri 0,05 - 0,10 - 0,25 - 0,50

Partita n.

GLYPHEXTRA

Erbicida sistemico di post-emergenza. Concentrato solubile.

Composizione:
Glifosate acido puro g 31 (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico g 41.7)
Acqua e coadiuvanti q. b. a g 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Informazioni mediche.
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO.

Generalità. GLYPHEXTRA è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. GLYPHEXTRA non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

Attrezzature, volumi d'acqua e miscele. Si raccomanda l'utilizzo di ugelli a specchio o a ventaglio e di operare a pressioni comprese tra 1 e 3 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. L'impiego di attrezzature a sgocciolamento, di tipo umettante o lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto, anche quando le infestanti sono vicine alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le pompe e i recipienti, risciacquandoli almeno tre volte prima di riutilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Impiegare preferibilmente volumi d'acqua fino a 400 l/ha. L'addizione alla miscela di 10 kg/ha di solfato ammonico può risultare utile, soprattutto in condizioni di trattamento non ottimali.

Avvertenza. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, taglio, pascolo, danneggiamento della vegetazione, siccità, freddo, attacchi parassitari o comunque da quei fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincato) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

Campi d'Impiego.

Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi: arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo, kumquat. Pomacee: melo, pero. Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite e olivo.

Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino. Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.

Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto e il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti ed a goccia). Ortaggi: carciofo, pomodoro, melanzana, fagiolino, fava, pisello, carota. Patata. Mais (solo interfila, da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati (leguminose e graminacee), erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa.

Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago.

Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, vivai prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.

Aree non destinate alle colture agrarie: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali e industriali, aree ed opere civili.

Dosi d'impiego. Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata. Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1 - 2 l / 100 litri d'acqua sulle annuali/bienni e di 2 - 5 l / 100 litri d'acqua sulle perenni.

Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Di seguito sono indicate le dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti (in presenza di ulteriori specie effettuare prima piccole prove di saggio).

Annuali e bienni. 1,5 - 4 l/ha: *Alopecurus spp.* (Coda di topo) , *Avena spp.* (Avena selvatica), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lolium spp.* (Loietto), *Mercurialis spp.* (Mercorella), *Poa spp.* (Fienarola), Riso crodo, *Amni majus (Sedano selvatico)*, *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Calendula spp.* (Calendula), *Chenopodium sp.* (Farinaccio), *Orobanche spp.* (Succiamele), *Portulaca spp.* (Porcellana), *Raphanus spp.* (Ravanello Selvatico), *Senecio spp.* (Senecio), *Sinapis spp.* (Senape), *Stellaria spp.* (Centocchio), *Veronica spp.* (Veronica).

Perenni. 4 - 5 l/ha: *Agropyron repens* (Agropiro), *Carex spp.* (Carice), *Cirsium spp.* (Stoppione), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Glyceria spp.* (Gliceria), *Hipericum spp.* (Erba di San Giovanni), *Laersia oryzoides* (Serla), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Rumex spp.* (Romice), *Sonchus spp.* (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorgo selvatico). 5 - 7 l/ha: *Alisma spp.* (Mestolaccio), *Asfodelus spp.* (Asfodelo), *Butomus spp.* (Fiorone), *Cyperus spp.* (Zigolo), *Ferula spp.* (Ferula), *Juncus spp.* (Giunco), *Nardus spp.* (Cervino), *Scirpus spp.* (Scirpo), *Sparganium spp.* (Sparganio), *Tussilago spp.* (Farfaraccio). 8 - 10 l/ha: *Agrostis spp.* (Cappellini), *Allium spp.* (Aglio), *Artemisia spp.* (Artemisia), *Arundo spp.* (Canna), *Cynodon spp.* (Gramigna), *Eracleum spp.* (Panece), *Glechoma spp.* (Edera), *Oxalis spp.* (Acetosella), *Paspalum spp.* (Gramignone), *Phragmites spp.* (Cannuccia di Palude), *Pteridium spp.* (Felce), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Rubus spp.* (Rovo), *Tipha spp.* (Tifa), *Urtica spp.* (Ortica) 12 l/ha: *Aristolochia spp.* (Aristolochia), *Clematis spp.* (Clematide), *Convolvulus spp.* (Convolvolo), *Rubia peregrina* (Robbia selvatica).

Arbusti. 4 - 6 l/ha: *Acer spp.* (Acero), *Fraxinus spp.* (Frassino), *Genista spp.* (Ginestra), *Salix spp.* (Salice), *Sambucus spp.* (Sambuco), *Vaccinum spp.* (Mirtillo) 10 - 12 l/ha: *Calluna spp.* (Grecchia), *Cistus spp.* (Cisto), *Erica spp.* (Erica), *Lonicera spp.* (Caprifoglio).

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto si utilizza da solo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

Fitotossicità: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A - 26900 LODI (LO)

Registrazione del Ministero della Salute n. 11853 del 3/10/2003

Officine di produzione:
Monsanto Europe N.V. - Antwerp – Belgio
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo San Giovanni (BG)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Il presente contenitore è di proprietà della Monsanto Agricoltura Italia S.p.A., deve essere utilizzato con il previsto sistema di travaso e quando vuoto restituito per il riutilizzo. Per le taglie pari o superiori a 200 litri, lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali uscite accidentali del prodotto.
In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale.
ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non operare contro vento.

Contenuto litri 60 - 100 -150 -200 - 300 - 400 - 500 – 600

DA NON VENDERSI SFUSO
Partita n.

KÉIRON

Erbicida sistemico di post-emergenza. Concentrato solubile.

Composizione:

Glifosate acido puro	g 30,7	(360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico	g 41,4)	
Acqua e coadiuvanti	q. b. a g 100.	

Pericoloso per l'ambiente

Tossico per gli organismi acquatici.

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A - 26900 LODI (LO)
Officina di produzione: Monsanto Europe N.V. - Antwerp – Belgio
Registrazione del Ministero della Salute n. 11842 del 30.9.2003
Contenuto litri 0,50 - 1 - 1,5 - 2 - 5 - 10 - 20 – 50
Partita n.

Informazioni mediche: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO.

Generalità. KÉIRON è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. KÉIRON non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

Attrezzature, volumi d'acqua e miscele. Si raccomanda l'utilizzo di ugelli a specchio o a ventaglio e di operare a pressioni comprese tra 1 e 3 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. L'impiego di attrezzature a sgocciolamento, di tipo umettante o lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto, anche quando le infestanti sono vicine alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le pompe e i recipienti, risciacquandoli almeno tre volte prima di riutilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Impiegare preferibilmente volumi d'acqua fino a 400 l/ha. L'addizione alla miscela di 10 kg/ha di solfato ammonico può risultare utile, soprattutto in condizioni di trattamento non ottimali.

Avvertenza. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, taglio, pascolo, danneggiamento della vegetazione, siccità, freddo, attacchi parassitari o comunque da quei fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto. **Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincato) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.**

Campi d'impiego.

Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi: arancio, cedro, clementino, mandarino, limone, pompelmo, kumquat. Pomacee: melo, pero. Frutta a guscio: noce. Vite e olivo.

Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.

Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto e il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti ed a goccia). Ortaggi: carciofo, pomodoro, melanzana, fagiolino, fava, pisello, carota. Patata. Mais (solo interfila, da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati (leguminose e graminacee), erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa.

Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago.

Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.

Aree non destinate alle colture agrarie: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali e industriali, aree ed opere civili.

Dosi d'impiego. Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata. Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1 - 2 l / 100 litri d'acqua sulle annuali/bienni e di 2 - 5 l / 100 litri d'acqua sulle perenni.

Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Di seguito sono indicate le dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti (in presenza di ulteriori specie effettuare prima piccole prove di saggio).

Annuali e bienni. 1,5 - 4 l/ha: *Alopecurus spp.* (Coda di topo) , *Avena spp.* (Avena selvatica), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lolium spp.* (Loietto), *Mercurialis spp.* (Mercorella), *Poa spp.* (Fienarola), Riso crodo, *Amni majus (Sedano selvatico)*, *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Calendula spp.* (Calendula), *Chenopodium sp.* (Farinaccio), *Orobanche spp.* (Succiamele), *Portulaca spp.* (Porcellana), *Raphanus spp.* (Ravanello Selvatico), *Senecio spp.* (Senecio), *Sinapis spp.* (Senape), *Stellaria spp.* (Centocchio), *Veronica spp.* (Veronica).

Perenni. 4 - 5 l/ha: *Agropyron repens* (Agropiro), *Carex spp.* (Carice), *Cirsium spp.* (Stoppione), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Glyceria spp.* (Gliceria), *Hipericum spp.* (Erba di San Giovanni), *Laersia oryzoides* (Serla), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Rumex spp.* (Romice), *Sonchus spp.* (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorgo selvatico). 5 - 7 l/ha: *Alisma spp.* (Mestolaccio), *Asfodelus spp.* (Asfodelo), *Butomus spp.* (Fiorone), *Cyperus spp.* (Zigolo), *Ferula spp.* (Ferula), *Juncus spp.* (Giunco), *Nardus spp.* (Cervino), *Scirpus spp.* (Scirpo), *Sparganium spp.* (Sparganio), *Tussillago spp.* (Farfaraccio). 8 - 10 l/ha: *Agrostis spp.* (Cappellini), *Allium spp.* (Aglio), *Artemisia spp.* (Artemisia), *Arundo spp.* (Canna), *Cynodon spp.* (Gramigna), *Eracleum spp.* (Panece), *Glechoma spp.* (Edera), *Oxalis spp.* (Acetosella), *Paspalum spp.* (Gramignone), *Phragmites spp.* (Cannuccia di Palude), *Pteridium spp.* (Felce), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Rubus spp.* (Rovo), *Tipha spp.* (Tifa), *Urtica spp.* (Ortica) 12 l/ha: *Aristolochia spp.* (Aristolochia), *Clematis spp.* (Clematide), *Convolvulus spp.* (Convolvolo), *Rubia peregrina* (Robbia selvatica).

Arbusti. 4 - 6 l/ha: *Acer spp.* (Acero), *Fraxinus spp.* (Frassino), *Genista spp.* (Ginestra), *Salix spp.* (Salice), *Sambucus spp.* (Sambuco), *Vaccinum spp.* (Mirtillo) 10 - 12 l/ha: *Calluna spp.* (Grecchia), *Cistus spp.* (Cisto), *Erica spp.* (Erica), *Lonicera spp.* (Caprifoglio).

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto si utilizza preferibilmente da solo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

Fitotossicità: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

Attenzione: da usarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Non operare contro vento.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. DA NON VENDERSI SFUSO

KÉIRON

Erbicida sistemico di post-emergenza. Concentrato solubile.

Composizione:
Glifosate acido puro g 30,7 (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico g 41,4)
Acqua e coadiuvanti q. b. a g 100.

Pericoloso per l'ambiente

Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A - 26900 LODI (LO)

Officina di produzione:
Monsanto Europe N.V. - Antwerp – Belgio
Registrazione del Ministero della Salute n. 11842 del 30.9.2003

Contenuto litri 0,05 - 0,10 - 0,25 - 0,50

Partita n.

Informazioni mediche.
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO.

Generalità. KÉIRON è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. KÉIRON non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Fitotossicità: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

Attenzione: da usarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.
Non operare contro vento.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
DA NON VENDERSI SFUSO

KÉIRON

Erbicida sistemico di post-emergenza. Concentrato solubile.
Composizione:
Glifosate acido puro g 30,7 (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico g 41,4)
Acqua e coadiuvanti q. b. a g 100.

Pericoloso per l'ambiente
Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.
MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A - 26900 LODI (LO)
Officina di produzione:
Monsanto Europe N.V. - Antwerp – Belgio
Registrazione del Ministero della Salute n. 11842 del 30.9.2003
Contenuto litri 100 -150 -200 - 300 - 400 - 500 - 600
Partita n.

Informazioni mediche: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO.

Generalità. KÉIRON è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. KÉIRON non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

Attrezzature, volumi d'acqua e miscele. Si raccomanda l'utilizzo di ugelli a specchio o a ventaglio e di operare a pressioni comprese tra 1 e 3 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. L'impiego di attrezzature a sgocciolamento, di tipo umettante o lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto, anche quando le infestanti sono vicine alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le pompe e i recipienti, risciacquandoli almeno tre volte prima di riutilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Impiegare preferibilmente volumi d'acqua fino a 400 l/ha. L'addizione alla miscela di 10 kg/ha di solfato ammonico può risultare utile, soprattutto in condizioni di trattamento non ottimali.

Avvertenza. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, taglio, pascolo, danneggiamento della vegetazione, siccità, freddo, attacchi parassitari o comunque da quei fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto. **Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincato) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.**

Campi d'impiego.
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi: arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo, kumquat. Pomacee: melo, pero. Frutta a guscio: noce. Vite e olivo.
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto e il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti ed a goccia). Ortaggi: carciofo, pomodoro, melanzana, fagiolino, fava, pisello, carota. Patata. Mais (solo interfila, da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati (leguminose e graminacee), erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago.
Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alle colture agrarie: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali e industriali, aree ed opere civili.

Dosi d'impiego. Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata. Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1 - 2 l / 100 litri d'acqua sulle annuali/bienni e di 2 - 5 l / 100 litri d'acqua sulle perenni. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Di seguito sono indicate le dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti (in presenza di ulteriori specie effettuare prima piccole prove di saggio).

Annuali e bienni. 1,5 - 4 l/ha: *Alopecurus spp.* (Coda di topo) , *Avena spp.* (Avena selvatica), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lolium spp.* (Loietto), *Mercurialis spp.* (Mercorella), *Poa spp.* (Fienarola), Riso crodo, *Amni majus (Sedano selvatico)*, *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Calendula spp.* (Calendula), *Chenopodium sp.* (Farinaccio), *Orobanche spp.* (Succiamele), *Portulaca spp.* (Porcellana), *Raphanus spp.* (Ravanello Selvatico), *Senecio spp.* (Senecio), *Sinapis spp.* (Senape), *Stellaria spp.* (Centocchio), *Veronica spp.* (Veronica).

Perenni. 4 - 5 l/ha: *Agropyron repens* (Agropiro), *Carex spp.* (Carice), *Cirsium spp.* (Stoppione), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Glyceria spp.* (Gliceria), *Hipericum spp.* (Erba di San Giovanni), *Laersia oryzoides* (Serla), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Rumex spp.* (Romice), *Sonchus spp.* (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorgo selvatico). 5 - 7 l/ha: *Alisma spp.* (Mestolaccio), *Asfodelus spp.* (Asfodelo), *Butomus spp.* (Fiorone), *Cyperus spp.* (Zigolo), *Ferula spp.* (Ferula), *Juncus spp.* (Giunco), *Nardus spp.* (Cervino), *Scirpus spp.* (Scirpo), *Sparganium spp.* (Sparganio), *Tussilago spp.* (Farfaraccio). 8 - 10 l/ha: *Agrostis spp.* (Cappellini), *Allium spp.* (Aglio), *Artemisia spp.* (Artemisia), *Arundo spp.* (Canna), *Cynodon spp.* (Gramigna), *Eracleum spp.* (Panece), *Glechoma spp.* (Edera), *Oxalis spp.* (Acetosella), *Paspalum spp.* (Gramignone), *Phragmites spp.* (Cannuccia di Palude), *Pteridium spp.* (Felce), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Rubus spp.* (Rovo), *Tipha spp.* (Tifa), *Urtica spp.* (Ortica) 12 l/ha: *Aristolochia spp.* (Aristolochia), *Clematis spp.* (Clematide), *Convolvulus spp.* (Convolvolo), *Rubia peregrina* (Robbia selvatica).

Arbusti. 4 - 6 l/ha: *Acer spp.* (Acero), *Fraxinus spp.* (Frassino), *Genista spp.* (Ginestra), *Salix spp.* (Salice), *Sambucus spp.* (Sambuco), *Vaccinum spp.* (Mirtillo) 10 - 12 l/ha: *Calluna spp.* (Grecchia), *Cistus spp.* (Cisto), *Erica spp.* (Erica), *Lonicera spp.* (Caprifoglio).

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto si utilizza preferibilmente da solo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

Fitotossicità: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

Attenzione: da usarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non operare contro vento.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il presente contenitore è di proprietà della Monsanto Agricoltura Italia S.p.A., deve essere utilizzato con il previsto sistema di travaso e quando vuoto restituito per il riutilizzo. Per le taglie pari o superiori a 200 litri, lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali uscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale.
ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

LAMPO

Erbicida sistemico di post-emergenza. Concentrato solubile.

Composizione:
Glifosate acido puro g 31 (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico g 41.7)
Acqua e coadiuvanti q. b. a g 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Informazioni mediche.
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO.

Generalità. LAMPO è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. LAMPO non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

Attrezzature, volumi d'acqua e miscele. Si raccomanda l'utilizzo di ugelli a specchio o a ventaglio e di operare a pressioni comprese tra 1 e 3 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. L'impiego di attrezzature a sgocciolamento, di tipo umettante o lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto, anche quando le infestanti sono vicine alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le pompe e i recipienti, risciacquandoli almeno tre volte prima di riutilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Impiegare preferibilmente volumi d'acqua fino a 400 l/ha. L'addizione alla miscela di 10 kg/ha di solfato ammonico può risultare utile, soprattutto in condizioni di trattamento non ottimali.

Avvertenza. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, taglio, pascolo, danneggiamento della vegetazione, siccità, freddo, attacchi parassitari o comunque da quei fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincato) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

Campi d'impiego.
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi: arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo, kumquat. Pomacee: melo, pero. Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite e olivo.
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino. Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto e il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti ed a goccia). Ortaggi: carciofo, pomodoro, melanzana, fagiolino, fava, pisello, carota. Patata. Mais (solo interfila, da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati (leguminose e graminacee), erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago.
Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, vivai prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alle colture agrarie: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali e industriali, aree ed opere civili.

Dosi d'impiego. Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata. Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1 - 2 l / 100 litri d'acqua sulle annuali/bienni e di 2 - 5 l / 100 litri d'acqua sulle perenni.

Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Di seguito sono indicate le dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti (in presenza di ulteriori specie effettuare prima piccole prove di saggio).

Annuali e bienni. 1,5 - 4 l/ha: *Alopecurus spp.* (Coda di topo) , *Avena spp.* (Avena selvatica), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lolium spp.* (Loietto), *Mercurialis spp.* (Mercorella), *Poa spp.* (Fienarola), Riso crodo, *Amni majus (Sedano selvatico)*, *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Calendula spp.* (Calendula), *Chenopodium sp.* (Farinaccio), *Orobanche spp.* (Succiamele), *Portulaca spp.* (Porcellana), *Raphanus spp.* (Ravanello Selvatico), *Senecio spp.* (Senecio), *Sinapis spp.* (Senape), *Stellaria spp.* (Centocchio), *Veronica spp.* (Veronica).

Perenni. 4 - 5 l/ha: *Agropyron repens* (Agropiro), *Carex spp.* (Carice), *Cirsium spp.* (Stoppione), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Glyceria spp.* (Gliceria), *Hipericum spp.* (Erba di San Giovanni), *Laersia oryzoides* (Serla), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Rumex spp.* (Romice), *Sonchus spp.* (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorgo selvatico). 5 - 7 l/ha: *Alisma spp.* (Mestolaccio), *Asfodelus spp.* (Asfodelo), *Butomus spp.* (Fiorone), *Cyperus spp.* (Zigolo), *Ferula spp.* (Ferula), *Juncus spp.* (Giunco), *Nardus spp.* (Cervino), *Scirpus spp.* (Scirpo), *Sparganium spp.* (Sparganio), *Tussillago spp.* (Farfaraccio). 8 - 10 l/ha: *Agrostis spp.* (Cappellini), *Allium spp.* (Aglio), *Artemisia spp.* (Artemisia), *Arundo spp.* (Canna), *Cynodon spp.* (Gramigna), *Eracleum spp.* (Panece), *Glechoma spp.* (Edera), *Oxalis spp.* (Acetosella), *Paspalum spp.* (Gramignone), *Phragmites spp.* (Cannuccia di Palude), *Pteridium spp.* (Felce), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Rubus spp.* (Rovo), *Tipha spp.* (Tifa), *Urtica spp.* (Ortica) 12 l/ha: *Aristolochia spp.* (Aristolochia), *Clematis spp.* (Clematide), *Convolvulus spp.* (Convolvolo), *Rubia peregrina* (Robbia selvatica).

Arbusti. 4 - 6 l/ha: *Acer spp.* (Acero), *Fraxinus spp.* (Frassino), *Genista spp.* (Ginestra), *Salix spp.* (Salice), *Sambucus spp.* (Sambuco), *Vaccinum spp.* (Mirtillo) 10 - 12 l/ha: *Calluna spp.* (Grecchia), *Cistus spp.* (Cisto), *Erica spp.* (Erica), *Lonicera spp.* (Caprifoglio).

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto si utilizza da solo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

Fitotossicità: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

Attenzione: da usarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A - 26900 LODI (LO)

Registrazione del Ministero della Salute n. 11854 del 3/10/2003

Officine di produzione:
Monsanto Europe N.V. - Antwerp – Belgio
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo San Giovanni (BG)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da:
CONVICTA a.r.l.
Via Riccardo Zandonai, 22 - 90100 PALERMO (PA)

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non operare contro vento.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Contenuto litri 0,50 - 1 - 1,5 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50
DA NON VENDERSI SFUSO
Partita n°: vedere sulla confezione.

LAMPO

Erbicida sistemico di post-emergenza. Concentrato solubile.

Composizione:
Glifosate acido puro g 31 (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico g 41.7)
Acqua e coadiuvanti q. b. a g 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Informazioni mediche.
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO.

Generalità. LAMPO è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. LAMPO non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Fitotossicità: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

Attenzione: da usarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A - 26900 LODI (LO)

Registrazione del Ministero della Salute n. 11854 del 3/10/2003

Officine di produzione:
Monsanto Europe N.V. - Antwerp – Belgio
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo San Giovanni (BG)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da:
CONVICTA a.r.l.
Via Riccardo Zandonai, 22 - 90100 PALERMO (PA)

Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto litri 0,05 - 0,10 - 0,25 - 0,50

Partita n°: vedere sulla confezione.

LAMPO

Erbicida sistemico di post-emergenza. Concentrato solubile.

Composizione:
Glifosate acido puro g 31 (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico g 41.7)
Acqua e coadiuvanti q. b. a g 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Informazioni mediche.
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO.

Generalità. LAMPO è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. LAMPO non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

Attrezzature, volumi d'acqua e miscele. Si raccomanda l'utilizzo di ugelli a specchio o a ventaglio e di operare a pressioni comprese tra 1 e 3 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. L'impiego di attrezzature a sgocciolamento, di tipo umettante o lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto, anche quando le infestanti sono vicine alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le pompe e i recipienti, risciacquandoli almeno tre volte prima di riutilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Impiegare preferibilmente volumi d'acqua fino a 400 l/ha. L'addizione alla miscela di 10 kg/ha di solfato ammonico può risultare utile, soprattutto in condizioni di trattamento non ottimali.

Avvertenza. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, taglio, pascolo, danneggiamento della vegetazione, siccità, freddo, attacchi parassitari o comunque da quei fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincato) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

Campi d'impiego.

Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi: arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo, kumquat. Pomacee: melo, pero. Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite e olivo.

Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino. Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.

Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto e il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti ed a goccia). Ortaggi: carciofo, pomodoro, melanzana, fagiolino, fava, pisello, carota. Patata. Mais (solo interfila, da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati (leguminose e graminacee), erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa.

Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago.

Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, vivai prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.

Aree non destinate alle colture agrarie: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali e industriali, aree ed opere civili.

Dosi d'impiego. Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata. Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1 - 2 l / 100 litri d'acqua sulle annuali/bienni e di 2 - 5 l / 100 litri d'acqua sulle perenni.

Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Di seguito sono indicate le dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti (in presenza di ulteriori specie effettuare prima piccole prove di saggio).

Annuali e bienni. 1,5 - 4 l/ha: *Alopecurus spp.* (Coda di topo) , *Avena spp.* (Avena selvatica), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lolium spp.* (Loietto), *Mercurialis spp.* (Mercorella), *Poa spp.* (Fienarola), Riso crodo, *Amni majus (Sedano selvatico)*, *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Calendula spp.* (Calendula), *Chenopodium sp.* (Farinaccio), *Orobanche spp.* (Succiamele), *Portulaca spp.* (Porcellana), *Raphanus spp.* (Ravanello Selvatico), *Senecio spp.* (Senecio), *Sinapis spp.* (Senape), *Stellaria spp.* (Centocchio), *Veronica spp.* (Veronica).

Perenni. 4 - 5 l/ha: *Agropyron repens* (Agropiro), *Carex spp.* (Carice), *Cirsium spp.* (Stoppione), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Glyceria spp.* (Gliceria), *Hipericum spp.* (Erba di San Giovanni), *Laersia oryzoides* (Serla), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Rumex spp.* (Romice), *Sonchus spp.* (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorgo selvatico). 5 - 7 l/ha: *Alisma spp.* (Mestolaccio), *Asfodelus spp.* (Asfodelo), *Butomus spp.* (Fiorone), *Cyperus spp.* (Zigolo), *Ferula spp.* (Ferula), *Juncus spp.* (Giunco), *Nardus spp.* (Cervino), *Scirpus spp.* (Scirpo), *Sparganium spp.* (Sparganio), *Tussilago spp.* (Farfaraccio). 8 - 10 l/ha: *Agrostis spp.* (Cappellini), *Allium spp.* (Aglio), *Artemisia spp.* (Artemisia), *Arundo spp.* (Canna), *Cynodon spp.* (Gramigna), *Eracleum spp.* (Panece), *Glechoma spp.* (Edera), *Oxalis spp.* (Acetosella), *Paspalum spp.* (Gramignone), *Phragmites spp.* (Cannuccia di Palude), *Pteridium spp.* (Felce), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Rubus spp.* (Rovo), *Tipha spp.* (Tifa), *Urtica spp.* (Ortica) 12 l/ha: *Aristolochia spp.* (Aristolochia), *Clematis spp.* (Clematide), *Convolvulus spp.* (Convolvolo), *Rubia peregrina* (Robbia selvatica).

Arbusti. 4 - 6 l/ha: *Acer spp.* (Acero), *Fraxinus spp.* (Frassino), *Genista spp.* (Ginestra), *Salix spp.* (Salice), *Sambucus spp.* (Sambuco), *Vaccinum spp.* (Mirtillo) 10 - 12 l/ha: *Calluna spp.* (Grecchia), *Cistus spp.* (Cisto), *Erica spp.* (Erica), *Lonicera spp.* (Caprifoglio).

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto si utilizza da solo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

Fitotossicità: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

Attenzione: da usarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A - 26900 LODI (LO)
Registrazione del Ministero della Salute n. 11854 del 3/10/2003
Officine di produzione:
Monsanto Europe N.V. - Antwerp – Belgio
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo San Giovanni (BG)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI
Distribuito da:
CONVICTA a.r.l.
Via Riccardo Zandonai, 22 - 90100 PALERMO (PA)

Il presente contenitore è di proprietà della Monsanto Agricoltura Italia S.p.A., deve essere utilizzato con il previsto sistema di travaso e quando vuoto restituito per il riutilizzo. Per le taglie pari o superiori a 200 litri, lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali uscite accidentali del prodotto.
In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale.
ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non operare contro vento.
Contenuto litri 60 - 100 -150 -200 - 300 - 400 - 500 – 600
DA NON VENDERSI SFUSO
Partita n.

LARIET®

® Marchio registrato Monsanto

Erbicida selettivo per il mais - Formulazione liquida contenente alaclor microincapsulato

Composizione:
Alaclor puro microincapsulato g 41,5 (480 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Nocivo **Pericoloso per l'ambiente**

Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego.
Non gettare i rifiuti nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A 26900 LODI (LO)

Officine di produzione:
Monsanto Europe N.V. Antwerp Belgio
Monsanto Company - Muscatine - U.S.A.
Elf Atochem – Vaas - Francia

Registrazione del Ministero della Salute n. 0677 del 19/9/1972
Quantità netta del preparato: litri 1 - 5 - 10 - 20
Partita n°: vedere sulla confezione

Informazioni mediche: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO

Generalità

LARIET è efficace nei confronti di svariate infestanti annuali originate da seme, quali:
Graminacee: Giavone comune (*Echinocloa crus-galli*), Giavone americano (*Panicum dichotomiflorum*), Fienarola (*Poa spp.*), Setaria o Pabbio (*Setaria spp.*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Sorghetta o sorgagna da seme (*Sorghum halepense*), Panico capillare (*Panicum capillare*).
Dicotiledoni: Amaranto (*Amaranthus spp.*), Borsa pastore comune (*Capsella bursa pastoris*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Senecione comune (*Senecio vulgaris*), Veronica (*Veronica spp.*).
Preparare accuratamente il terreno in modo che non rimangano zolle o zollette. Occorre una certa freschezza del terreno affinché LARIET esplichi appieno la propria azione, pertanto, in caso di assenza di pioggia, entro alcuni giorni dal trattamento intervenire irrigando.

Dosi e campi di impiego

LARIET si impiega prima o dopo la semina del mais e comunque in pre-emergenza delle infestanti.
Distribuire il prodotto in 400 - 600 litri d'acqua alla dose di 4 - 5 l/ha. Per completare lo spettro d'azione unire prodotti erbicidi con azione complementare a base di principi attivi autorizzati per il mais.
Adottare le dosi maggiori nei terreni pesanti e quando predominano infestanti molto aggressive tipo sorghetta.
In caso di siccità e nell' impossibilità di irrigare effettuare prima della semina l'interramento (2 -3 cm cm di profondità) del prodotto. Allo scopo impiegare erpici con denti elastici (tipo s o c) alla velocità di avanzamento di almeno 10 km/h.

COMPATIBILITA'

LARIET è miscibile con i prodotti indicati. Curare la omogenea preparazione della poltiglia erbicida prima della sua distribuzione. Verificare preventivamente la compatibilità dei singoli formulati impiegati.

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto puo' essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Nel caso di diserbo di varietà poco note o di recente acclimatazione si raccomandano prove parcellari di selettività.

AVVERTENZE

- Conservare il prodotto protetto dal gelo.
- Agitare bene prima dell' uso.
- Non impiegare il prodotto nei terreni torbosi e organici.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

LARIET ®

® Marchio registrato Monsanto
Erbicida selettivo per il mais
Formulazione liquida contenente alaclor microincapsulato

Composizione:
Alaclor puro microincapsulato g 41,5 (480 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Nocivo **Pericoloso per l'ambiente**

Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego.
Non gettare i rifiuti nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A 26900 LODI (LO)

Officina di produzione:
Monsanto Europe N.V. - Antwerp - Belgio
Monsanto Company - Muscatine - U.S.A.
Elf Atochem – Vaas - Francia

Registrazione del Ministero della Salute n.0677 del 19/9/1972
Quantità netta del preparato: litri 50 – 100 - 200 - 400

ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO: NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

Partita n°:

Informazioni per il medico
ALACLOR: Sintomi di intossicazione: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Consultare un centro antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO

ERBE INFESTANTI SENSIBILI
Graminacee: Giavone comune (*Echinocloa crus-galli*), Giavone americano (*Panicum dichotomiflorum*), Fienarola (*Poa spp.*), Setaria o Pabbio (*Setaria spp.*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Panico capillare (*Panicum capillare*).
Dicotiledoni: Amaranto (*Amaranthus spp.*), Borsa pastore comune (*Capsella bursa pastoris*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*).

ERBE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
Sorghetta o sorgagna da seme (*Sorghum halepense*).

EPOCA DI IMPIEGO
Prima (pre-semina) o dopo (pre-emergenza) la semina della coltura e comunque prima della nascita delle infestanti.

DOSE 4 - 5 litri per ettaro

VOLUME DI IRRORAZIONE
Applicare il prodotto con 200-600 litri per ettaro di acqua; il preparato deve essere agitato bene durante il completamento del riempimento. Usare attrezzatura munita di agitatore; distribuire a bassa pressione.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
In pre-semina il prodotto deve essere incorporato nel terreno a 3-4 cm utilizzando erpici non rotativi ed evitando di approfondire eccessivamente il prodotto. Non impiegare nei terreni torbosi e organici. Nel caso di diserbi di varietà di mais poco note o di recente introduzione si raccomandano prove parcellari di selettività.
Conservare il prodotto protetto dal gelo. Agitare la confezione prima dell'uso.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è miscibile con i più comuni fitofarmaci. Verificare preventivamente la compatibilità con i prodotti con cui si intende fare la miscelazione.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto puo' essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Nel caso di diserbo di varietà poco note o di recente acclimatazione si raccomandano prove parcellari di selettività.
AVVERTENZE
- Conservare il prodotto protetto dal gelo.
- Agitare bene prima dell' uso.
- Non impiegare il prodotto nei terreni torbosi e organici.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Non operare contro vento.

Contenitore previsto per l'uso con sistemi chiusi di travaso.
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori da 200 e 400 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

DA NON VENDERSI SFUSO

AGRICHLOR TZ

Erbicida selettivo per il mais - Formulazione liquida contenente alaclor microincapsulato

Composizione:
Alaclor puro g 28,5 (336 g/l)
Terbutilazina pura g 12,2 (144 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Nocivo **Pericoloso per l'ambiente**

Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego.
Non gettare i rifiuti nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A 26900 LODI (LO)

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. Salerano al Lambro (LO)
Monsanto Company – Muscatine – (U.S.A.)

Registrazione del Ministero della Salute n. 8641 del 31.1.1995

Distribuito da:
AGRIMPORT S.p.A.
Via Piani, 1 39100 Bolzano

Quantità netta del preparato: litri 1 – 5 – 10 - 20
Partita n°: vedere sulla confezione

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: alaclor 28,5%; terbutilazina 12,2%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione: Alaclor - Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure. Terbutilazina - (non specifici e rilevati su animali con superdosaggi) Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratorie, salivazione. Terapia: sintomatica. Controindicazioni -.

Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE D'AZIONE
Agisce sui semi in via di germinazione.

SPETTRO D'AZIONE
Erbe infestanti sensibili: amaranto *(Amaranthus spp.)*, camomilla *(Matricaria chamomilla)*, centocchio (*Stellaria media)*, erba morella *(Solanum nigrum*), sanguinella *(Digitaria spp.)*, giavone americano *(Panicum dichotomiflorum)*, giavone comune *(Echinochloa crus-galli)*, pabbio *(Setaria spp.)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, sorghetta da seme *(Sorghum halepense)* e poligonacee.

DOSI DI IMPIEGO 6-7 litri per ettaro.

VOLUME DI IRRORAZIONE
Distribuire impiegando 400-600 litri di acqua per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE ERBICIDA
Stemperare a parte in poca acqua la quantità prestabilita di prodotto, mescolando con cura. Versare la sospensione nella metà dell'acqua necessaria, indi riempire la botte agitando.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Applicare in pre-emergenza o post-emergenza precoce (fino alla sesta foglia) della coltura. Occorre che il terreno sia umido al momento del trattamento, oppure che una pioggia di 10-15 mm cada entro due settimane dall'applicazione; in caso contrario effettuare una leggera irrigazione a pioggia. In previsione di una lunga siccità e nell'impossibilità di irrigare a pioggia, si può effettuare prima della semina un leggero interramento del prodotto alla profondità di 2-3 cm.
Non effettuare il diserbo nei terreni torbosi in quanto la sostanza organica decompone il prodotto e quindi ne riduce l'efficacia. Il letame eventualmente distribuito antesemina deve essere ben interrato per non ridurre l'azione del prodotto: tale azione viene altresì ridotta o annullata dallo spargimento di liquame di stalla.
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento, di 10 mesi per altre colture (es. bietola, tabacco).

NOTE (norme fitoprotettive)
Impiegare il prodotto solo su colture specializzate in assenza di sottocolture. Dal trattamento erbicida alla semina di eventuali sottocolture occorre un intervallo minimo di 12 mesi. Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi. Sospendere il trattamento al massimo alla post-emergenza delle infestanti.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si usa da solo.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine perché fitotossico. Dopo l'impiego lavare accuratamente la pompa e i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione del prodotto prima del loro riutilizzo.
Conservare il prodotto protetto dal gelo.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

AGRICHLOR TZ

Erbicida selettivo per il mais - Formulazione liquida contenente alaclor microincapsulato

Composizione:
Alaclor puro g 28,5 (336 g/l)
Terbutilazina pura g 12,2 (144 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Nocivo **Pericoloso per l'ambiente**

Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego.
Non gettare i rifiuti nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A 26900 LODI (LO)

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. Salerano al Lambro (LO)
Monsanto Company – Muscatine – (U.S.A.)

Registrazione del Ministero della Salute n. 8641 del 31.1.1995

Distribuito da:
AGRIMPORT S.p.A.
Via Piani, 1 39100 Bolzano

Quantità netta del preparato: litri 200 - 400

ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO: NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

Partita n°: vedere sulla confezione

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: alaclor 28,5%; terbutilazina 12,2%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione: Alaclor - Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure. Terbutilazina - (non specifici e rilevati su animali con superdosaggi) Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratorie, salivazione. Terapia: sintomatica. Controindicazioni -.

Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE D'AZIONE
Agisce sui semi in via di germinazione.

SPETTRO D'AZIONE
Erbe infestanti sensibili: amaranto *(Amaranthus spp.)*, camomilla *(Matricaria chamomilla)*, centocchio (*Stellaria media*), erba morella *(Solanum nigrum)*, sanguinella *(Digitaria spp.)*, giavone americano *(Panicum dichotomiflorum)*, giavone comune *(Echinochloa crus-galli)*, pabbio *(Setaria spp.)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, sorghetta da seme *(Sorghum halepense)* e poligonacee.

DOSI DI IMPIEGO 6-7 litri per ettaro.

VOLUME DI IRRORAZIONE
Distribuire impiegando 400-600 litri di acqua per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE ERBICIDA
Stemperare a parte in poca acqua la quantità prestabilita di prodotto, mescolando con cura. Versare la sospensione nella metà dell'acqua necessaria, indi riempire la botte agitando.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Applicare in pre-emergenza o post-emergenza precoce (fino alla sesta foglia) della coltura. Occorre che il terreno sia umido al momento del trattamento, oppure che una pioggia di 10-15 mm cada entro due settimane dall'applicazione; in caso contrario effettuare una leggera irrigazione a pioggia. In previsione di una lunga siccità e nell'impossibilità di irrigare a pioggia, si può effettuare prima della semina un leggero interramento del prodotto alla profondità di 2-3 cm.
Non effettuare il diserbo nei terreni torbosi in quanto la sostanza organica decompone il prodotto e quindi ne riduce l'efficacia. Il letame eventualmente distribuito antesemina deve essere ben interrato per non ridurre l'azione del prodotto: tale azione viene altresì ridotta o annullata dallo spargimento di liquame di stalla.
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento, di 10 mesi per altre colture (es. bietola, tabacco).

NOTE (norme fitoprotettive)
Impiegare il prodotto solo su colture specializzate in assenza di sottocolture. Dal trattamento erbicida alla semina di eventuali sottocolture occorre un intervallo minimo di 12 mesi. Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi. Sospendere il trattamento al massimo alla post-emergenza delle infestanti.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si usa da solo.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine perchè fitotossico. Dopo l'impiego lavare accuratamente la pompa e i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione del prodotto prima del loro riutilizzo.
Conservare il prodotto protetto dal gelo.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Non operare contro vento.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenitore previsto per l'uso con sistemi chiusi di travaso.
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori da 200 e 400 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

LASSO® MICROMIX

® Marchio registrato Monsanto

Erbicida selettivo per il mais - Formulazione liquida contenente alaclor microincapsulato

Composizione:

Alaclor puro	g 28,5	(336 g/l)
Terbutilazina pura	g 12,2	(144 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100	

Nocivo **Pericoloso per l'ambiente**

Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego.
Non gettare i rifiuti nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A 26900 LODI (LO)

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. – Salerano al Lambro – LO
Monsanto Company – Muscatine – (U.S.A.)

Registrazione del Ministero della Salute n. 8068 del 6.5.1992

Quantità netta del preparato: litri 1 - 5 - 10 – 20

Partita n°: vedere sulla confezione

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: alaclor 28.5%; terbutilazina 12,2%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Alaclor: Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terbutilazina (non specifici e rilevati su animali con superdosaggi): Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratorie, salivazione.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: -

Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE D'AZIONE
Agisce sui semi in via di germinazione.

SPETTRO D'AZIONE
Erbe infestanti sensibili: amaranto (*Amaranthus* spp.), camomilla (*Matricaria chamomilla*), centocchio (*Stellaria media*), Erba morella (*Solanum nigrum*), sanguinella (*Digitaria* spp.), giavone americano (*Panicum dichotomiflorum*), giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), pabbio (*Setaria* spp.), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), sorghetta da seme (*Sorghum alepense*) e poligonacee.

DOSI DI IMPIEGO
6 -7 litri per ettaro.

VOLUME DI IRRORAZIONE
Distribuire impiegando 400-600 litri di acqua per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE ERBICIDA
Stemperare a parte in poca acqua la quantità prestabilita di prodotto, mescolando con cura. Versare la sospensione nella metà dell'acqua necessaria, indi riempire la botte agitando.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Occorre che il terreno sia umido al momento del trattamento, oppure che una pioggia di 10 15 mm cada entro due settimane dall'applicazione; in caso contrario effettuare una leggera irrigazione a pioggia. In previsione di una lunga siccità e nell'impossibilità di irrigare a pioggia, si può effettuare prima della semina un leggero interramento del prodotto alla profondità di 2-3 cm.
Non effettuare il diserbo nei terreni torbosi in quanto la sostanza organica decompone il prodotto e quindi ne riduce l'efficacia. Il letame eventualmente distribuito antesemina deve essere ben interrato per non ridurre l'azione del prodotto: tale azione viene altresì ridotta o annullata dallo spargimento di liquame di stalla.
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento, di 10 mesi per altre colture (es. bietola, tabacco).

NOTE (norme fitoprotettive)
Impiegare il prodotto solo su colture specializzate in assenza di sottocolture. Dal trattamento erbicida alla semina di eventuali sottocolture occorre un intervallo minimo di 12 mesi. Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi. Sospendere il trattamento al massimo alla post-emergenza delle infestanti.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ'
Il prodotto si usa da solo.

FITOTOSSICITÀ'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si consigliano prove parcellari per le varietà poco note o di recente acclimatazione. Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine perché fitotossico. Dopo l'impiego lavare accuratamente la pompa e i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione del prodotto prima del loro riutilizzo. Conservare il prodotto protetto dal gelo.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

LASSO® MICROMIX

® Marchio registrato Monsanto

Erbicida selettivo per il mais - Formulazione liquida contenente alaclor microincapsulato

Composizione:

Alaclor puro	g 28,5	(336 g/l)
Terbutilazina pura	g 12,2	(144 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100	

Nocivo Pericoloso per l'ambiente

Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego.
Non gettare i rifiuti nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano , 81/A 26900 LODI (LO)

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. Salerano al Lambro (LO)
Monsanto Company – Muscatine – (U.S.A.)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8068 del 6.5.1992

Quantità netta del preparato: litri 200 - 400

Partita n°: vedere sul lato dell'etichetta.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: alaclor 28,5%; terbutilazina 12,2%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Alaclor: Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terbutilazina (non specifici e rilevati su animali con superdosaggi): Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratorie, salivazione.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: -

Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE D'AZIONE
Agisce sui semi in via di germinazione.

SPETTRO D'AZIONE
Erbe infestanti sensibili: amaranto (*Amaranthus* spp.), camomilla (*Matricaria chamomilla*), centocchio (*Stellaria media*), Erba morella (*Solanum nigrum*), sanguinella (*Digitaria* spp.), giavone americano (*Panicum dichotomiflorum*), giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), pabbio (*Setaria* spp.), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), sorghetta da seme (*Sorghum alepense*) e poligonacee.

DOSI DI IMPIEGO
6-7 litri per ettaro.

VOLUME DI IRRORAZIONE
Distribuire impiegando 400-600 litri di acqua per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE ERBICIDA
Stemperare a parte in poca acqua la quantità prestabilita di prodotto, mescolando con cura. Versare la sospensione nella metà dell'acqua necessaria, indi riempire la botte agitando.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Occorre che il terreno sia umido al momento del trattamento, oppure che una pioggia di 10-15 mm cada entro due settimane dall'applicazione; in caso contrario effettuare una leggera irrigazione a pioggia. In previsione di una lunga siccità e nell'impossibilità di irrigare a pioggia, si può effettuare prima della semina un leggero interramento del prodotto alla profondità di 2-3 cm.
Non effettuare il diserbo nei terreni torbosi in quanto la sostanza organica decompone il prodotto e quindi ne riduce l'efficacia. Il letame eventualmente distribuito antesemina deve essere ben interrato per non ridurre l'azione del prodotto: tale azione viene altresì ridotta o annullata dallo spargimento di liquame di stalla.
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento, di 10 mesi per altre colture (es. bietola, tabacco).

NOTE (norme fitoprotettive)
Impiegare il prodotto solo su colture specializzate in assenza di sottocolture. Dal trattamento erbicida alla semina di eventuali sottocolture occorre un intervallo minimo di 12 mesi. Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi. Sospendere il trattamento al massimo alla post-emergenza delle infestanti.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si usa da solo.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si consigliano prove parcellari per le varietà poco note o di recente acclimatazione. Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine perché fitotossico. Dopo l'impiego lavare accuratamente la pompa e i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione del prodotto prima del loro riutilizzo.
Conservare il prodotto protetto dal gelo.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Non operare contro vento.

Contenitore previsto per l'uso con sistemi chiusi di travaso.
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori da 200 e 400 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

DA NON VENDERSI SFUSO

LASSO MICROTECH ®

® Marchio registrato Monsanto

Erbicida selettivo per il mais - Formulazione liquida contenente alaclor microincapsulato

Composizione:
Alaclor puro microincapsulato g **41,5** (480 g/l)
Coformulanti)

Nocivo **Pericoloso per l'ambiente**

Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego.
Non gettare i rifiuti nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A 26900 LODI (LO)

Officina di produzione:
Monsanto Company - Muscatine - (U.S.A.)
Elf-Atochem - Vaas (Francia)

Registrazione del Ministero della Salute n. 7928 del 21.6.1990

Quantità netta del preparato: litri 1 - 5 - 10 - 20

Partita n°: vedere sulla confezione.

Informazioni per il medico
ALACLOR: Sintomi di intossicazione: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Consultare un centro antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO

ERBE INFESTANTI SENSIBILI
Graminacee: Giavone comune (*Echinocloa crus-galli*), Giavone americano (*Panicum dichotomiflorum*), Fienarola (*Poa spp.*), Setaria o Pabbio (*Setaria spp.*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Panico capillare (*Panicum capillare*).
Dicotiledoni: Amaranto (*Amaranthus spp.*), Borsa pastore comune (*Capsella bursa pastoris*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*).

ERBE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
Sorghetta o sorgagna da seme (*Sorghum halepense*).

EPOCA DI IMPIEGO
Prima (pre-semina) o dopo (pre-emergenza) la semina della coltura e comunque prima della nascita delle infestanti.

DOSE 4 - 5 litri per ettaro

VOLUME DI IRRORAZIONE
Applicare il prodotto con 200-600 litri per ettaro di acqua; il preparato deve essere agitato bene durante il completamento del riempimento. Usare attrezzatura munita di agitatore; distribuire a bassa pressione.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
In pre-semina il prodotto deve essere incorporato nel terreno a 3-4 cm utilizzando erpici non rotativi ed evitando di approfondire eccessivamente il prodotto. Non impiegare nei terreni torbosi e organici. Nel caso di diserbi di varietà di mais poco note o di recente introduzione si raccomandano prove parcellari di selettività.
Conservare il prodotto protetto dal gelo. Agitare la confezione prima dell' uso.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ'
Il prodotto è miscibile con i più comuni fitofarmaci. Verificare preventivamente la compatibilità con i prodotti con cui si intende fare la miscelazione.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

LASSO MICROTECH ®

® Marchio registrato Monsanto

Erbicida selettivo per il mais - Formulazione liquida contenente alaclor microincapsulato

Composizione:

Alaclor puro microincapsulato	g 41,5	(480 g/l)
Coformulanti	q.b. a g 100	

Nocivo **Pericoloso per l'ambiente**

Possibilità di effetti irreversibili.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego.
Non gettare i rifiuti nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A 26900 LODI (LO)

Officina di produzione:
Monsanto Company - Muscatine - (U.S.A.)
SIPCAM S.P.A. - Salerano al Lambro (LO)

Registrazione del Ministero della Salute n. 7928 del 21.6.1990

Quantità netta del preparato: litri 50 - 200 - 400

ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO: NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

Partita n°: vedere sul lato dell'etichetta.

Informazioni per il medico
ALACLOR: Sintomi di intossicazione: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure. ***Consultare un centro antiveleni***

MODALITÀ D'IMPIEGO

ERBE INFESTANTI SENSIBILI
Graminacee: Giavone comune (*Echinocloa crus-galli*), Giavone americano (*Panicum dichotomiflorum*), Fienarola (*Poa spp.*), Setaria o Pabbio (*Setaria spp.*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Panico capillare (*Panicum capillare*).
Dicotiledoni: Amaranto (*Amaranthus spp.*), Borsa pastore comune (*Capsella bursa pastoris*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*).

ERBE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
Sorghetta o sorgagna da seme (*Sorghum halepense*).

EPOCA DI IMPIEGO
Prima (pre-semina) o dopo (pre-emergenza) la semina della coltura e comunque prima della nascita delle infestanti.

DOSE 4 - 5 litri per ettaro

VOLUME DI IRRORAZIONE
Applicare il prodotto con 200-600 litri per ettaro di acqua; il preparato deve essere agitato bene durante il completamento del riempimento. Usare attrezzatura munita di agitatore; distribuire a bassa pressione.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
In pre-semina il prodotto deve essere incorporato nel terreno a 3-4 cm utilizzando erpici non rotativi ed evitando di approfondire eccessivamente il prodotto. Non impiegare nei terreni torbosi e organici. Nel caso di diserbi di varietà di mais poco note o di recente introduzione si raccomandano prove parcellari di selettività.
Conservare il prodotto protetto dal gelo. Agitare la confezione prima dell'uso.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è miscibile con i più comuni fitofarmaci. Verificare preventivamente la compatibilità con i prodotti con cui si intende fare la miscelazione.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Non operare contro vento.

Contenitore previsto per l'uso con sistemi chiusi di travaso.
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori da 200 e 400 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

DA NON VENDERSI SFUSO

RAMROD® *FLOW*

Erbicida liquido selettivo per sorgo da granella, cipolla, aglio, porro, cavoli (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo di Bruxelles, cavolo cappuccio) ravanello, bulbose da fiore (in pieno campo e in serra).

COMPOSIZIONE:
PROPACLOR puro g 43.2 (g/l 480)
Coformulanti q.b. a g 100. Contiene glicole etilenico.

Nocivo **Pericoloso per l'ambiente**

Nocivo per ingestione
Irritante per la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare nè bere nè fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
Via S. Colombano, 81/A 26900 Lodi LO

Officine di produzione:
Monsanto Europe NV - Antwerp (Belgio)
SIPCAM S.p.A. - Salerano al Lambro (LO)

Registrazione del Ministero della Salute n. 8566 del 3.12.1994

Quantità netta del preparato: litri 1 - 5 - 10 - 20

Partita n°:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE D'AZIONE
RAMROD Flow agisce sui semi delle infestanti in fase di germinazione. La persistenza d'azione di RAMROD Flow è di circa 6 - 8 settimane. Il prodotto viene successivamente degradato nel suolo senza lasciare residui tossici per le colture successive.
Sono sensibili (la maggior parte delle infestanti annuali provenienti da seme, quali): amaranto (*Amaranthus* spp.), centocchio comune (*Stellaria media*), centocchio dei campi (*Anagallis arvensis*), erba porcellana (*Portulaca oleracea*), fienarola (*Poa* spp.), galinsoga comune (*Galinsoga parviflora*), giavone (*Echinocloa* spp.), ortica (*Urtica* spp.), pabbio (*Setaria* spp,), papavero (*Papaver rhoeas*), senecione comune (*Senecio vulgaris*), veronica (*Veronica* spp.).
Sono mediamente sensibili: borsa pastore comune (*Capsella bursa pastoris*), camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), crespino (*Sonchus* spp.), euforbia (*Euphorbia* spp.), farinello (*Chenopodium* spp); poligono nodoso (*Polygonum lapathifolium*), poligono persicaria (*Polygonum persicaria*).
Sono resistenti: fumaria comune (*Fumaria officinalis*), gramigna (*Cynodon dactylon*), stoppione (*Cirsium arvense*), poligono convolvolo (*Fallopia convolvulus*), vilucchio (*Convolvulus arvensis*), zigolo delle risaie (*Cyperus difformis*).

EPOCA E DOSE DI IMPIEGO
SORGO
Pre-emergenza: intervenire al massimo 1-2 giorni dopo la semina.
ALTRE COLTURE
Pre-emergenza: intervenire al massimo 1-2 giorni dopo la semina.
Post-trapianto: intervenire dopo il superamento della crisi di trapianto, ma prima della nascita delle infestanti.

DOSE DI IMPIEGO
- 9 litri/ha nei terreni sabbiosi;
- 10,5 litri/ha nei terreni di medio impasto;
- 12 litri/ha nei terreni argillosi.

VOLUME DI IRRORAZIONE
300-600 litri d'acqua per ettaro.

Preparazione della poltiglia
Versare la dose prestabilita di prodotto nel serbatoio dell' irroratrice parzialmente riempito. Completare il riempimento agitando energicamente; durante il trattamento tenere in costante agitazione la poltiglia.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Perché i trattamenti possano dare buoni risultati è necessario, se si opera su terreno asciutto, che una pioggia di 10-15 mm cada entro 8-10 giorni dal diserbo; in caso contrario si deve provvedere con una buona irrigazione.
Impiegare il prodotto solo per il diserbo delle colture seminate o trapiantate in autunno-inverno e inizio della primavera, cioè quando la temperatura è bassa; in estate o durante la stagione calda la termolabilità del prodotto porta ad una riduzione della persistenza.
Non trattare in prossimità di corsi d'acqua e di zone di captazione dell'acqua.

COMPATIBILITÁ
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÁ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Evitare che il prodotto venga a contatto con le colture non indicate in etichetta.
Dopo l' impiego e prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari, lavare accuratamente le pompe e i recipienti che sono serviti per la preparazione e per la distribuzione della poltiglia erbicida.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

RODEO GOLD

Erbicida per luoghi incolti - Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:
Principio attivo: Glifosate puro g 41 - (g/l 480)
Acqua q.b. a g 100,0

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni/schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A. - Via S. Colombano, 81/A 26900 LODI LO

Officina di Produzione:
Monsanto Europe - Antwerpen (Belgio)

Autorizzazione del Ministero Salute n° 10672 del 22/01/2001

Volume: 1 - 1,5 - 2 - 5 - 10 -20 - 50 litri

Partita n°: vedere sulla confezione.

Informazioni mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche:
Il prodotto è un diserbante di post-emergenza efficace su tutte le infestanti monocotiledoni e dicotiledoni, annuali e perenni (Gramigna, Sorghetta, Cipero, Vilucchio). Viene assorbito dalle foglie e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perennanti, che vengono così devitalizzati. RODEO GOLD è rapidamente disattivato a contatto con il terreno, quindi la presenza del prodotto nel terreno non causa alcun danno alle colture perenni arbustive e arboree. Non possedendo il prodotto efficacia di pre-emergenza, onde ottenere un diserbo duraturo, è necessario, prima o dopo il trattamento, intervenire con un erbicida ad azione persistente sul terreno (es. Diuron) per evitare la nascita delle infestanti provenienti da semi che possono germinare dopo l'applicazione di RODEO GOLD. L'effetto visivo dell'azione di RODEO GOLD consiste in un ingiallimento ed in un appassimento graduale che si risolvono nella morte dell'infestante anche a livello dell'apparato radicale.

Diserbo totale degli incolti (sedi ferroviarie, argini di canale, fossi e scoline, aree rurali e industriali, aree ed opere civili).

Impiegare il prodotto su infestanti in vegetazione, sia in estate che in autunno o primavera; in questo secondo caso la lavorazione del terreno e la semina possono essere effettuate 2-3 settimane dopo il trattamento. Nel caso che la vegetazione da distruggere fosse molto alta e densa, usare sino a 1000 l/ha d'acqua, evitando sempre la deriva e che l'irrorato giunga su colture vicine.

Le dosi di impiego, riferite ad ettaro di superficie effettivamente trattata, variano in funzione della specie delle infestanti presenti:

3-5 l/ha (30-50 ml ogni 100 mq) contro la maggior parte delle erbe annuali;

4-5 l/ha (40-50 ml ogni 100 mq) contro *Sorghum halepense*, *Agropyrum repens*, *Ranuncolus* spp.. Su sorghetta alta 30-40 cm usare una dose di 5,5 l/ha mentre se l'infestante è all'inizio della fioritura usare 4 l/ha di RODEO GOLD.

5-6 l/ha (50-60 ml ogni 100 mq) contro *Cyperus rotondus*, *Cirsium arvense* (in fioritura), *Artemisia vulgaris*, *Potentilla* spp., *Plantago* spp., *Taraxacum officinale*, *Rumex* spp. e felci.

8-10 l/ha (80-100 ml ogni 100 mq) contro *Convolvolus arvensis* ben sviluppato (inizio fioritura), *Cynodon dactilon*, *Urtica* spp., *Daucus carota*, *Sonchus arvensis*, *Tussilago farfara*, *Cannuccia* (alte 50-80 cm).

10-12 l/ha (100-120 ml ogni 100 mq) contro *Convolvolus arvensis* all'inizio dello sviluppo (lungo almeno 30 cm).

AVVERTENZE
Le piogge che cadono entro 6 ore dall'applicazione ne riducono l'efficacia. Le temperature medie e l'alta umidità dell'aria facilitano la crescita delle infestanti e favoriscono l'esito del diserbo, le temperature basse e il caldo estivo non limitano l'efficacia del prodotto purché le infestanti siano verdi,
vitali e non essiccate. Le perennanti sono meglio controllate se ben sviluppate al momento del trattamento; alcune dicotiledoni (es. Vilucchio, Stoppione, Artemisia) sono più sensibili se in fioritura o in uno stadio più avanzato. Arature, fresature, tagli delle erbe o pascolo di animali prima del trattamento riducono l'efficacia del diserbo. Dopo il trattamento su erbe perennanti lasciar traslocare il prodotto negli organi sotterranei per 2-3 settimane, prima di procedere a lavorazione del terreno. Fra trattamenti con erbicidi residuali ed applicazioni del prodotto lasciar intercorrere almeno 1-2 settimane. Impiegare su infestanti in attività di crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. Evitare l'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari. L'efficacia erbicida può esser ridotta da: precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, il taglio, il pascolo, il danneggiamento della vegetazione, la siccità, il freddo, gli attacchi parassitari e comunque quei fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione e traslocazione del prodotto.

Preparazione della miscela
Agitare la confezione prima dell'uso, diluire in poca acqua la dose prestabilita di prodotto e versare poi nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

Dosi e modalità d'impiego.
Il prodotto va usato per irrorazione sulle infestanti ben sviluppate, distribuendo circa 300-500 litri di soluzione del prodotto per ettaro in modo da bagnare uniformemente le malerbe, senza provocare perdite per gocciolamento.
Note importanti
Impiegare pompe a bassa pressione (massimo 3 atmosfere) a barre o lance munite di ugelli a specchio o a ventaglio che distribuiscono gocce di dimensioni grosse. Evitare durante i trattamenti formazione di deriva e di goccioline polverizzate, che potrebbero portare il prodotto a contatto con l'apparato fogliare delle colture provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i succhioni e i ricacci alla base delle piante. Non bagnare il tronco, specialmente se non ben lignificato o con ferite. Per evitare la deriva usare ugelli protetti da coni e schermi, che evitino alla soluzione erbicida di giungere a contatto con la vegetazione delle piante. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi. Non scaricare le acque utilizzate per i lavaggi in acqua destinata all'irrigazione.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto si usa da solo.
FITOTOSSICITA'
Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare (rami non lignificati, succhioni del tronco e del portainnesto) di tutte le piante. Irrorare il prodotto con pompe a bassa pressione (massimo 3 atmosfere); evitare formazioni di deriva. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente con tre risciacqui successivi di acqua, le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

RODEO GOLD

Erbicida per luoghi incolti - Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:
Principio attivo : Glifosate puro g 41 (g/l 480)
Acqua q.b. a g 100

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni/schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via S. Colombano, 81/A 26900 LODI LO

Officina di Produzione:
Monsanto Europe - Antwerpen (Belgio)

Autorizzazione del Ministero Salute n° 10672 del 22/01/2001

Volume: 0,1 - 0,25 - 0,5 - 0,75 Litri

Partita n°: vedere sulla confezione.

Informazioni mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare (rami non lignificati, succhioni del tronco e del portainnesto) di tutte le piante. Irrorare il prodotto con pompe a bassa pressione (massimo 3 atmosfere); evitare formazioni di deriva. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente con tre risciacqui successivi di acqua, le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

ROUNDUP BIOFLOW ®

Erbicida sistemico di post-emergenza. Concentrato solubile.

Composizione:
Glifosate acido puro g 31 (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico g 41.7)
Acqua e coadiuvanti q. b. a g 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Informazioni mediche.
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO.

Generalità. ROUNDUP BIOFLOW è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. ROUNDUP BIOFLOW non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

Attrezzature, volumi d'acqua e miscele. Si raccomanda l'utilizzo di ugelli a specchio o a ventaglio e di operare a pressioni comprese tra 1 e 3 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. L'impiego di attrezzature a sgocciolamento, di tipo umettante o lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto, anche quando le infestanti sono vicine alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le pompe e i recipienti, risciacquandoli almeno tre volte prima di riutilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Impiegare preferibilmente volumi d'acqua fino a 400 l/ha. L'addizione alla miscela di 10 kg/ha di solfato ammonico può risultare utile, soprattutto in condizioni di trattamento non ottimali.

Avvertenza. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, taglio, pascolo, danneggiamento della vegetazione, siccità, freddo, attacchi parassitari o comunque da quei fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincato) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

Campi d'impiego.
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi: arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo, kumquat. Pomacee: melo, pero. Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite e olivo.
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino. Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto e il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti ed a goccia). Ortaggi: carciofo, pomodoro, melanzana, fagiolino, fava, pisello, carota. Patata. Mais (solo interfila, da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati (leguminose e graminacee), erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago.
Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, vivai prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alle colture agrarie: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali e industriali, aree ed opere civili.

Dosi d'impiego. Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata. Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1 - 2 l / 100 litri d'acqua sulle annuali/bienni e di 2 - 5 l / 100 litri d'acqua sulle perenni.
Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Di seguito sono indicate le dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti (in presenza di ulteriori specie effettuare prima piccole prove di saggio).
Annuali e bienni. 1,5 - 4 l/ha: *Alopecurus spp.* (Coda di topo) , *Avena spp.* (Avena selvatica), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lolium spp.* (Loietto), *Mercurialis spp.* (Mercorella), *Poa spp.* (Fienarola), Riso crodo, *Amni majus (Sedano selvatico), Amaranthus spp.* (Amaranto), *Calendula spp.* (Calendula), *Chenopodium sp.* (Farinaccio), *Orobanche spp.* (Succiamele), *Portulaca spp.* (Porcellana), *Raphanus spp.* (Ravanello Selvatico), *Senecio spp.* (Senecio), *Sinapis spp.* (Senape), *Stellaria spp.* (Centocchio), *Veronica spp.* (Veronica).
Perenni. 4 - 5 l/ha: *Agropyron repens* (Agropiro), *Carex spp.* (Carice), *Cirsium spp.* (Stoppione), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Glyceria spp.* (Gliceria), *Hipericum spp.* (Erba di San Giovanni), *Laersia oryzoides* (Serla), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Rumex spp.* (Romice), *Sonchus spp.* (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorgo selvatico). 5 - 7 l/ha: *Alisma spp.* (Mestolaccio), *Asfodelus spp.* (Asfodelo), *Butomus spp.* (Fiorone), *Cyperus spp.* (Zigolo), *Ferula spp.* (Ferula), *Juncus spp.* (Giunco), *Nardus spp.* (Cervino), *Scirpus spp.* (Scirpo), *Sparganium spp.* (Sparganio), *Tussillago spp.* (Farfaraccio). 8 - 10 l/ha: *Agrostis spp.* (Cappellini), *Allium spp.* (Aglio), *Artemisia spp.* (Artemisia), *Arundo spp.* (Canna), *Cynodon spp.* (Gramigna), *Eracleum spp.* (Panece), *Glechoma spp.* (Edera), *Oxalis spp.* (Acetosella), *Paspalum spp.* (Gramignone), *Phragmites spp.* (Cannuccia di Palude), *Pteridium spp.* (Felce), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Rubus spp.* (Rovo), *Tipha spp.* (Tifa), *Urtica spp.* (Ortica) 12 l/ha: *Aristolochia spp.* (Aristolochia), *Clematis spp.* (Clematide), *Convolvulus spp.* (Convolvolo), *Rubia peregrina* (Robbia selvatica).
Arbusti. 4 - 6 l/ha: *Acer spp.* (Acero), *Fraxinus spp.* (Frassino), *Genista spp.* (Ginestra), *Salix spp.* (Salice), *Sambucus spp.* (Sambuco), *Vaccinum spp.* (Mirtillo) 10 - 12 l/ha: *Calluna spp.* (Grecchia), *Cistus spp.* (Cisto), *Erica spp.* (Erica), *Lonicera spp.* (Caprifoglio).

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto si utilizza da solo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

Fitotossicità: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

Attenzione: da usarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A - 26900 LODI (LO)

Registrazione del Ministero della Salute n. 8382 del 7.8.1993

Officine di produzione:
Monsanto Europe N.V. - Antwerp - Belgio
Diachem S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto litri: 1 - 1,5 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50
Partita n.: vedere sulla confezione.

ROUNDUP BIOFLOW ®

Erbicida sistemico di post-emergenza. Concentrato solubile.

Composizione:
Glifosate acido puro g 31 (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico g 41.7)
Acqua e coadiuvanti q. b. a g 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Informazioni mediche.
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO.

Generalità. ROUNDUP BIOFLOW è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. ROUNDUP BIOFLOW non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Fitotossicità: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

Attenzione: da usarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A - 26900 LODI (LO)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8382 del 7.8.1993

Officine di produzione:
Monsanto Europe N.V. - Antwerp - Belgio
Diachem S.p.A. -U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto litri 0,05 - 0,10 - 0,25 - 0,50.
Partita n.: vedere sulla confezione.

ROUNDUP BIOFLOW ®

Erbicida sistemico di post-emergenza. Concentrato solubile.

Composizione:
Glifosate acido puro g 31 (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico g 41.7)
Acqua e coadiuvanti q. b. a g 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Informazioni mediche.
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO.

Generalità. ROUNDUP BIOFLOW è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. ROUNDUP BIOFLOW non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

Attrezzature, volumi d'acqua e miscele. Si raccomanda l'utilizzo di ugelli a specchio o a ventaglio e di operare a pressioni comprese tra 1 e 3 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. L'impiego di attrezzature a sgocciolamento, di tipo umettante o lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto, anche quando le infestanti sono vicine alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le pompe e i recipienti, risciacquandoli almeno tre volte prima di riutilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Impiegare preferibilmente volumi d'acqua fino a 400 l/ha. L'addizione alla miscela di 10 kg/ha di solfato ammonico può risultare utile, soprattutto in condizioni di trattamento non ottimali.

Avvertenza. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, taglio, pascolo, danneggiamento della vegetazione, siccità, freddo, attacchi parassitari o comunque da quei fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincato) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

Campi d'impiego.
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi: arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo, kumquat. Pomacee: melo, pero. Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite e olivo.
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino. Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto e il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti ed a goccia). Ortaggi: carciofo, pomodoro, melanzana, fagiolino, fava, pisello, carota. Patata. Mais (solo interfila, da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati (leguminose e graminacee), erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago.
Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, vivai prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alle colture agrarie: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali e industriali, aree ed opere civili.

Dosi d'impiego. Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata. Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1 - 2 l / 100 litri d'acqua sulle annuali/bienni e di 2 - 5 l / 100 litri d'acqua sulle perenni.

Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Di seguito sono indicate le dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti (in presenza di ulteriori specie effettuare prima piccole prove di saggio).

Annuali e bienni. 1,5 - 4 l/ha: *Alopecurus spp.* (Coda di topo) , *Avena spp.* (Avena selvatica), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lolium spp.* (Loietto), *Mercurialis spp.* (Mercorella), *Poa spp.* (Fienarola), Riso crodo, *Amni majus (Sedano selvatico)*, *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Calendula spp.* (Calendula), *Chenopodium sp.* (Farinaccio), *Orobanche spp.* (Succiamele), *Portulaca spp.* (Porcellana), *Raphanus spp.* (Ravanello Selvatico), *Senecio spp.* (Senecio), *Sinapis spp.* (Senape), *Stellaria spp.* (Centocchio), *Veronica spp.* (Veronica).

Perenni. 4 - 5 l/ha: *Agropyron repens* (Agropiro), *Carex spp.* (Carice), *Cirsium spp.* (Stoppione), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Glyceria spp.* (Gliceria), *Hipericum spp.* (Erba di San Giovanni), *Laersia oryzoides* (Serla), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Rumex spp.* (Romice), *Sonchus spp.* (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorgo selvatico). 5 - 7 l/ha: *Alisma spp.* (Mestolaccio), *Asfodelus spp.* (Asfodelo), *Butomus spp.* (Fiorone), *Cyperus spp.* (Zigolo), *Ferula spp.* (Ferula), *Juncus spp.* (Giunco), *Nardus spp.* (Cervino), *Scirpus spp.* (Scirpo), *Sparganium spp.* (Spargànio), *Tussillago spp.* (Farfaraccio). 8 - 10 l/ha: *Agrostis spp.* (Cappellini), *Allium spp.* (Aglio), *Artemisia spp.* (Artemisia), *Arundo spp.* (Canna), *Cynodon spp.* (Gramigna), *Eracleum spp.* (Panece), *Glechoma spp.* (Edera), *Oxalis spp.* (Acetosella), *Paspalum spp.* (Gramignone), *Phragmites spp.* (Cannuccia di Palude), *Pteridium spp.* (Felce), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Rubus spp.* (Rovo), *Tipha spp.* (Tifa), *Urtica spp.* (Ortica) 12 l/ha: *Aristolochia spp.* (Aristolochia), *Clematis spp.* (Clematide), *Convolvulus spp.* (Convolvolo), *Rubia peregrina* (Robbia selvatica).

Arbusti. 4 - 6 l/ha: *Acer spp.* (Acero), *Fraxinus spp.* (Frassino), *Genista spp.* (Ginestra), *Salix spp.* (Salice), *Sambucus spp.* (Sambuco), *Vaccinum spp.* (Mirtillo) 10 - 12 l/ha: *Calluna spp.* (Grecchia), *Cistus spp.* (Cisto), *Erica spp.* (Erica), *Lonicera spp.* (Caprifoglio).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto si utilizza da solo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

Fitotossicità: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

Attenzione: da usarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A - 26900 LODI (LO)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8382 del 7.8.1993

Officine di produzione:
Monsanto Europe N.V. - Antwerp - Belgio
Diachem S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Il presente contenitore è di proprietà della Monsanto Agricoltura Italia S.p.A., deve essere utilizzato con il previsto sistema di travaso e quando vuoto restituito per il riutilizzo. Per le taglie pari o superiori a 200 litri, lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali uscite accidentali del prodotto.
In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale.
ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non operare contro vento.
DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto litri 60 - 100 -150 -200 - 300 - 400 - 500 - 600
Partita n.: vedere sul lato dell'etichetta.

ROUNDUP® MAX

Erbicida sistemico di post-emergenza
Granulare dispersibile in acqua

COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro		g 68
(sotto forma di sale ammonico		g 78,5)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a	g 100

Irritante **Pericoloso per l'ambiente**

Rischio di gravi lesioni oculari.
Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Non gettare i residui nelle fognature.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A 26900 Lodi LO

Officina di produzione: Monsanto Europe N.V. -Antwerp- Belgio

Registrazione del Ministero della Salute n. 10465 del 19/4/2000

Quantità netta del preparato: 1 - 5 - 6 - 10 - 20 Kg.

Partita n°: vedere sulla confezione.

Informazioni mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
ROUNDUP MAX è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. ROUNDUP MAX non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

ATTREZZATURE, VOLUMI D'ACQUA E MISCELE
ROUNDUP MAX è una formulazione granulare che si disperde facilmente in acqua. Versare i granuli nel serbatoio parzialmente riempito d'acqua e agitare fino al dissolvimento. Completare il riempimento continuando l'agitazione. ROUNDUP MAX consente di ottenere migliori risultati con ugelli a specchio o a ventaglio e ridotti volumi d'acqua. Qualora necessiti il controllo delle infestanti che nascono successivamente al trattamento, impiegare prodotti ad azione residuale. In questo caso l'addizione alla miscela di 10 kg/ha di solfato ammonico può risultare utile. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincato) o di ferro se non protetti da vernici plastiche.

AVVERTENZE
Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse, come siccità, freddo, attacchi parassitari, ha efficacia ridotta. Per consentire una corretta efficacia erbicida devono trascorrere 48 ore (infestanti annuali) e 15 giorni (infestanti perenni) prima che vengano effettuati tagli o lavorazioni.

CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: vite, olivo, melo, pero, agrumi, noce.
Colture che possono evidenziare sensibilità se il trattamento a dosi superiori a 1,5 kg/ha colpisce il tronco anche ben lignificato: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago (trattare prima dell'emergenza dei turioni).
Terreni agrari in assenza della coltura, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai. Trattare con le infestanti emerse prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), dopo il raccolto o a fine ciclo. I trattamenti pre-semina vanno effettuati a dosi non superiori ai 1,5 kg/ha. Effettuare la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alle colture agrarie: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili.

DOSI D'IMPIEGO
Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata.
Dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti.
1-1,5 kg/ha: infestanti annuali (usare le dosi più elevate per le infestanti più sviluppate)
2-4,5 kg/ha: infestanti poliennali e graminacee perenni.
3-5 kg/ha: infestanti dicotiledoni perenni.
5-6 kg/ha: infestanti arbustive ed arboree.
Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo delle specie meno sensibili.
In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1 kg/100 litri d'acqua sulle annuali/bienni e di 2-3 kg/100 litri d'acqua sulle perenni.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Non operare contro vento.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

ROUNDUP® MAX

Erbicida sistemico di post-emergenza
Granulare dispersibile in acqua

COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro	g 68	
(sotto forma di sale ammonico	g 78,5)	
Inerti e coadiuvanti	q. b. a	g 100

Irritante **Pericoloso per l'ambiente**

Rischio di gravi lesioni oculari.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Non gettare i residui nelle fognature.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A 26900 Lodi LO
Officina di produzione: Monsanto Europe N.V. Antwerp Belgio

Registrazione del Ministero della Salute n. 10465 del 19/4/2000

Quantità netta del preparato: 0,13 kg.

Partita n°: vedere sulla confezione.

Informazioni mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
ROUNDUP MAX è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. ROUNDUP MAX non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microorganismi presenti nell'ambiente.

AVVERTENZE: PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.
DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Smaltire il prodotto e il suo imballaggio secondo le norme vigenti.
DA NON VENDERSI SFUSO

ROUNDUP® *PLUS*

Erbicida sistemico di post-emergenza - Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:
Principio attivo: Glifosate puro 37,7 g (g/l 450)
Inerti e coadiuvanti q.b. a g 100,0

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni/schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A 26900 Lodi (LO)

Officine di produzione:
Monsanto Europe N.V. - Antwerp – Belgio
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo San Giovanni (BG)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro – (MI)

Registrazione del Ministero della Salute N° 11418 del 23 luglio 2002

Contenuto litri: 1 5 20 50
Partita n°: vedere sulla confezione.

Informazioni mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
ROUNDUP PLUS è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. ROUNDUP PLUS non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi: arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo, kumquat. Pomacee: melo, pero. Frutta a guscio: noce. Vite e olivo.
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti ed a goccia). Ortaggi: carciofo, pomodoro, melanzana, fagiolino, fava, pisello, carota. Patata. Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati (leguminose e graminacee), erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa. Riso: per il controllo del riso crodo, da applicarsi con le attrezzature specifiche per questo scopo, secondo le istruzioni previste dal costruttore; trattare quando l'altezza dell'infestante supera di almeno 15 cm l'altezza della coltura.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: Asparago (trattare prima dell'emergenza dei turioni).
Terreni agrari in assenza della coltura, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai. Trattare con le infestanti emerse prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), dopo il raccolto o a fine ciclo. Dopo sole 6 ore dal trattamento si può già seminare. Trattare 5 - 6 giorni prima della semina nel caso di presenza di specie perenni.
Aree non destinate alle colture agrarie: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili.

DOSI DI IMPIEGO
Queste variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata. Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100 ml/10 litri di acqua sulle annuali/bienni e di 300 ml/10 litri di acqua sulle perenni. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Di seguito sono indicate le dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti (in presenza di ulteriori specie effettuare prima piccole prove di saggio). Aggiungere solfato ammonico per ottenere un effetto essiccante veloce.

Infestanti annuali
0.8 - 2 litri/ha: *Alopecurus spp.* (Coda di topo), *Avena spp.* (Avena selvatica), *Digitaria spp.* (Sanguinella), *Setaria spp.* (Pabbio), *Panicum spp.* (Panico), *Mercurialis spp.* (Mercorella), *Poa spp.* (Fienarola), *Amni majus* (Sedano selvatico), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Calendula spp.* (Calendula), *Chenopodium spp.* (Farinaccio), *Orobanche* (Succiamele), *Senecio spp.* (Senecio), *Sinapis spp.* (Senape), *Stellaria spp.* (Centocchio), *Veronica spp. (Veronica)*, Riso crodo.
2 - 3 litri/ha: *Loilum spp.* (Loietto), *Poyigonum Convolvolus* (Convolvolo nero), *Poligonum persicaria* (Persicaria), *P. Aviculare* (Correggiola), *Raphanus spp.* (Ravanello selvatico), *Portulaca spp* (Porcellana).

Infestanti perenni
3 - 5 litri/ha: *Agropyron repens* (Agropiro), *Cirsium spp.* (Stoppione), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Glyceria spp.* (Gliceria), *Hypericum spp.* (Erba di S. Giovanni), *Abutilon theophasti* (Cencio molle), *Laersia oryzoides* (Serla), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Rumex spp.* (Romice), *Sonchus spp.* (Grespino), *Alisma spp.* (Mestolaccio), *Cardus spp.* (Cardo), *Cyperus spp.* (Zigolo), *Ferula spp.* (Ferula), *Juncus spp.* (Giunco), *Nardus spp.* (Cervino), *Scirpus spp.* (Scirpo), *Sorghum halepense* (Sorgo selvatico), *Sparganium spp.* (Sparganio), *Tussilago spp.* (Farfaraccio), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo).
6 - 7 litri/ha: *Agrostis spp.* (Cappellini), *Allium spp.* (Aglio), *Artemisia spp.* (Artemisia), *Arundo spp.* (Canna), *Cynodon spp.* (Gramigna), *Tipha spp.* (Tifa), *Glechoma spp.* (Edera), *Oxalis spp.* (Acetosella), *Paspalum spp.* (Gramignone), *Phragmites spp.* (Cannuccia di palude), *Pteridium spp.* (Felce), *Urtica spp.* (Ortica).
8 - 9 litri/ha: *Aristolochia spp.* (Aristolochia), *Clematis spp.* (Clematide), *Convolvulus spp.* (Convolvolo), *Rubia peregrina* (Robbia selvatica), *Inula viscosa* (Inula).

Arbusti
5 - 6 litri/ha: *Rubus spp.* (Rovo), *Genista spp.* (Ginestra), *Salix spp.* (Salice), *Sambucus spp.* (Sambuco), *Vaccinium spp.* (Mirtillo), *Rosa canina* (Rosa selvatica), *Prunus spinosa* (Prugnolo).
8 - 9 litri/ha: *Calluna spp.* (Grecchia), *Cistus spp.* (Cisto), *Cornus spp.* (Corniolo), *Erica spp.* (Erica), *Lonicera spp.* (Caprifoglio), *Robinia pseudo-Acacia* (Robinia), *Ailanthus glandulosa* (Ailanto), *Clematis vitalba* (Vitalba).

AVVERTENZE: qualora necessiti il controllo delle infestanti che nascono successivamente al trattamento, miscelare con prodotti ad azione residuale autorizzati per la coltura da trattare. Volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. Si raccomanda l'impiego di ugelli a specchio o a ventaglio e di operare a pressioni comprese tra 1 e 3 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. L'impiego di attrezzature a sgocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure muniti di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le pompe e i recipienti, risciacquandoli almeno tre volte prima di riutilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Da non impiegare in pre-raccolta. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, ha efficacia ridotta. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o di ferro se non protetti da vernici plastiche. Agitare prima dell'uso.

COMPATIBILITÀ: il prodotto è miscibile con gli erbicidi residuali come sopra indicato e con solfato ammonico.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono dissecare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
DA NON VENDERSI SFUSO

ROUNDUP® *PLUS*

Erbicida sistemico di post-emergenza - Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:
Principio attivo: Glifosate puro 37,7 g (g/l 450)
Inerti e coadiuvanti q.b. a g 100,0

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni/schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A 26900 Lodi (LO)

Officine di produzione:
Monsanto Europe N.V. - Antwerp – Belgio
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo San Giovanni (BG)
Althaller Italia S.r.l. San Colombano al Lambro (MI)

Registrazione del Ministero della Salute N° 11418 del 23 luglio 2002

Contenuto litri: 0,10 - 0,25 - 0,75

Partita n°: vedere sulla confezione.

Informazioni mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
ROUNDUP PLUS è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. ROUNDUP PLUS non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

AVVERTENZE: PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

FITOTOSSICITA': il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono dissecare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
DA NON VENDERSI SFUSO

ROUNDUP® *PLUS*

Erbicida sistemico di post-emergenza - Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:
Principio attivo: Glifosate puro 37,7 g (g/l 450)
Inerti e coadiuvanti q.b. a g 100,0

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni/schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A 26900 Lodi (LO)
Officine di produzione:
Monsanto Europe N.V. - Antwerp – Belgio
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo San Giovanni (BG)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro – (MI)
Registrazione del Ministero della Salute N° 11418 del 23 luglio 2002
Contenuto litri: 60 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600
Partita n°: vedere sul lato dell'etichetta.

Informazioni mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
ROUNDUP PLUS è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. ROUNDUP PLUS non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi: arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo, kumquat. Pomacee: melo, pero. Frutta a guscio: noce. Vite e olivo.
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti ed a goccia). Ortaggi: carciofo, pomodoro, melanzana, fagiolino, fava, pisello, carota. Patata. Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati (leguminose e graminacee), erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa. Riso: per il controllo del riso crodo, da applicarsi con le attrezzature specifiche per questo scopo, secondo le istruzioni previste dal costruttore; trattare quando l'altezza dell'infestante supera di almeno 15 cm l'altezza della coltura.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: Asparago (trattare prima dell'emergenza dei turioni).
Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai. Trattare con le infestanti emerse prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), dopo il raccolto o a fine ciclo. Dopo sole 6 ore dal trattamento si può già seminare. Trattare 5 - 6 giorni prima della semina nel caso di presenza di specie perenni.
Aree non destinate alle colture agrarie: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili.

DOSI DI IMPIEGO
Queste variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata. Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100 ml/10 litri di acqua sulle annuali/bienni e di 300 ml/10 litri di acqua sulle perenni. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Di seguito sono indicate le dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti (in presenza di ulteriori specie effettuare prima piccole prove di saggio). Aggiungere solfato ammonico per ottenere un effetto essiccante più veloce.
Infestanti annuali
0,8 - 2 litri/ha: *Alopecurus spp.* (Coda di topo), *Avena spp.* (Avena selvatica), *Digitaria spp.* (Sanguinella), *Setaria spp.* (Pabbio), *Panicum spp.* (Panico), *Mercurialis spp.* (Mercorella), *Poa spp.* (Fienarola), *Amni majus* (Sedano selvatico), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Calendula spp.* (Calendula), *Chenopodium spp.* (Farinaccio), *Orobanche* (Succiamele), *Senecio spp.* (Senecio), *Sinapis spp.* (Senape), *Stellaria spp.* (Centocchio), *Veronica spp.* *(Veronica)*. Riso crodo.
2 - 3 litri/ha: *Lolium spp.* (Loietto), *Poygonum Convolvolus* (Convolvolo nero), *Poligonum persicaria* (Persicaria), *P. Aviculare* (Correggiola), *Raphanus spp.* (Ravanello selvatico), *Portulaca spp* (Porcellana).
Infestanti perenni
3 - 5 litri/ha: *Agropyron repens* (Agropiro), *Cirsium spp.* (Stoppione), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Glyceria spp.* (Gliceria), *Hypericum spp.* (Erba di S.Giovanni), *Abutilon theophasti* (Cencio molle), *Laersia oryzoides* (Serla), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Rumex spp.* (Romice), *Sonchus spp.* (Grespino), *Alisma spp.* (Mestolaccio), *Cardus spp.* (Cardo), *Cyperus spp.* (Zigolo), *Ferula spp.* (Ferula), *Juncus spp.* (Giunco), *Nardus spp.* (Cervino), *Scirpus spp.* (Scirpo), *Sorghum halepense* (Sorgo selvatico), *Sparganium spp.* (Sparganio), *Tussilago spp.* (Farfaraccio), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo).
6 - 7 litri/ha: *Agrostis spp.* (Cappellini), *Allium spp.* (Aglio), *Artemisia spp.* (Artemisia), *Arundo spp.* (Canna), *Cynodon spp.* (Gramigna), *Tipha spp.* (Tifa), *Glechoma spp.* (Edera), *Oxalis spp.* (Acetosella), *Paspalum spp.* (Gramignone), *Phragmites spp.* (Cannuccia di palude), *Pteridium spp.* (Felce), *Urtica spp.* (Ortica).
8 - 9 litri/ha: *Aristolochia spp.* (Aristolochia), *Clematis spp.* (Clematide), *Convolvulus spp.* (Convolvolo), *Rubia peregrina* (Robbia selvatica), *Inula viscosa* (Inula).
Arbusti
5 - 6 litri/ha: *Rubus spp.* (Rovo), *Genista spp.* (Ginestra), *Salix spp.* (Salice), *Sambucus spp.* (Sambuco), *Vaccinium spp.* (Mirtillo), *Rosa canina* (Rosa selvatica), *Prunus spinosa* (Prugnolo).
8 - 9 litri/ha: *Calluna spp.* (Grecchia), *Cistus spp.* (Cisto), *Cornus spp.* (Corniolo), *Erica spp.* (Erica), *Lonicera spp.* (Caprifoglio), *Robinia pseudo-Acacia* (Robinia), *Ailanthus glandulosa* (Ailanto), *Clematis vitalba* (Vitalba).

AVVERTENZE: qualora necessiti il controllo delle infestanti che nascono successivamente al trattamento, miscelare con prodotti ad azione residuale autorizzati per la coltura da trattare. Volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. Si raccomanda l'impiego di ugelli a specchio o a ventaglio e di operare a pressioni comprese tra 1 e 3 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. L'impiego di attrezzature a sgocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure muniti di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le pompe e i recipienti, risciacquandoli almeno tre volte prima di riutilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Da non impiegare in pre-raccolta. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, ha efficacia ridotta. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o di ferro se non protetti da vernici plastiche. Agitare prima dell'uso.
COMPATIBILITÀ: il prodotto è miscibile con gli erbicidi residuali come sopra indicato e con solfato ammonico.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.
FITOTOSSICITÀ: il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono dissecare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

Il presente contenitore è proprietà della Monsanto Agricoltura Italia S.p.A., deve essere utilizzato con il previsto sistema di travaso e quando vuoto restituito per il riutilizzo. Per le taglie pari o superiori a 200 litri, lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale.
ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non operare contro vento.
DA NON VENDERSI SFUSO

ROUNDUP® QUATTROCENTO

Erbicida sistemico di post-emergenza. Liquido concentrato solubile.

COMPOSIZIONE:
Principio attivo: Glifosate acido puro g 34,45 (da sale isopropilamminico)
Inerti e coadiuvanti q.b. a g 100,0
Il contenuto di Glifosate acido equivalente corrisponde a 400 g/l ed è pari a g 46,5 di Glifosate sale isopropilamminico per 100 g di prodotto.

Irritante **Pericoloso per l'ambiente**

Rischio di gravi lesioni oculari
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Non gettare i residui nelle fognature.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A - 26900 LODI LO
Officine di Produzione:
Monsanto Europe - Antwerpen (Belgio)
SIPCAM S.p.A.- Salerano al Lambro LO

Registrazione Ministero Salute n° 6250 del 10-4-1985

Contenuto litri: 0,5-1-2-5-10-20 – 50

Partita n°: vedere sulla confezione.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Generalità - ROUNDUP QUATTROCENTO è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni siano esse annuali, biennali o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. ROUNDUP QUATTROCENTO non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.
Attrezzature, volumi d'acqua e miscele. Per evitare il contatto con le colture da diserbare impiegare pressioni basse ed attrezzature selettive (a sgocciolamento o di tipo umettante-lambente), o munite di schermo protettivo o munite di ugelli con spruzzo controllato (G.D.C., specchio, ventaglio). Non impiegare volumi d'acqua superiori a 200 - 300 litri/ha. Qualora necessiti il controllo delle infestanti che nascono successivamente al trattamento con ROUNDUP QUATTROCENTO, impiegare prodotti ad azione residua quali ad esempio Simazina, Diuron o Pronamide. In questo caso l'addizione alla miscela di 10 kg/ha di solfato d'ammonio può risultare utile. **Avvertenze.** Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da: precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, taglio, pascolo, danneggiamento della vegetazione, siccità, freddo, attacchi parassitari o comunque da quei fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione e traslocazione del prodotto. Prima dell'uso agitare bene sia la confezione sia la miscela erbicida. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o di ferro se non protetti da vernici plastiche. Teme il gelo.

CAMPI DI IMPIEGO.
Le colture diserbabili con ROUNDUP QUATTROCENTO sono numerose. Di seguito queste sono riunite in gruppi in funzione sia delle proprietà intrinseche di difesa (biologiche, fisiche e meccaniche), sia del tipo di applicazione suggerito.
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi: arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo, kumquat. Pomacee: melo, pero. Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite e olivo.
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino. Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti ed a goccia). Ortaggi: carciofo, pomodoro, melanzana, fagiolino, fava, pisello, carota. Patata. Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati (leguminose e graminacee), erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa. Riso: per il controllo del riso crodo, da applicarsi con le attrezzature specifiche per questo scopo, secondo le istruzioni previste dal costruttore; trattare quando l'altezza dell'infestante supera di almeno 15 cm l'altezza della coltura.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago.
Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, girasole, colza, cotone, lino, senape, prati, vivai prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alle colture agrarie: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili.

DOSI DI IMPIEGO
Queste variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata. Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1:2 litri/100 litri di acqua sulle annuali/bienni e di 3:5 litri/100 litri di acqua sulle perenni. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Di seguito sono indicate le dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti (in presenza di ulteriori specie effettuare prima piccole prove di saggio).
ANNUALI E BIENNI 1 - 3 litri/ha: *Alopecurus spp.* (Coda di topo), *Avena spp.* (Avena selvatica), *Lolium spp.* (Loietto), *Mercurialis spp.* (Mercorella), *Poa spp.* (Fienarola), Riso Crodo, *Amni majus* (Sedano selvatico), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Calendula spp.* (Calendula), *Chenopodium spp.* (Farinaccio), *Orobanche* (Succiamele), *Portulaca spp.* (Porcellana), *Raphanus spp.* (Ravanello selvatico), *Senecio spp.* (Senecio), *Sinapis spp.* (Senape), *Stellaria spp.* (Centocchio), *Veronica spp.* (Veronica).
PERENNI 3,5 - 4,5 litri/ha: *Agropyron repens* (Agropiro), *Carex spp.* (Carice), *Cirsium spp.* (Stoppione), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Glyceria spp.* (Gliceria), *Hipericum spp.* (Erba di S. Giovanni), *Laersia oryzoides* (Serla), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Rumex spp. (Romice)*, *Sonchus spp.* (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorgo selvatico). 5 - 6 litri/ha: *Alisma spp.* (Mestolaccio), *Asfodelus spp.* (asfodelo), *Butomus spp.* (Fiorone), *Cyperus spp.* (Zigolo), *Ferula spp.* (Ferula), *Juncus spp.* (Giunco), *Nardus spp.* (Cervino), *Scirpus spp.* (Scirpo), *Sparganium spp.* (Sparganio), *Tussilago spp.* (Farfaraccio). 7 - 9 litri/ha: *Agrostis spp.* (Cappellini), *Allium spp.* (Aglio), *Artemisia spp.* (Artemisia), *Arundo spp.* (Canna), *Cynodon spp.* (Gramigna), *Eracleum spp.* (Panece), *Glechoma spp.* (Edera), *Oxalis spp.* (Acetosella), *Paspalum spp.* (Gramignone), *Phragmites spp.* (Cannuccia di palude), *Pteridium spp.* (Felce), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Rubus spp.* (Rovo), *Tipha spp.* (Tifa), *Urtica spp.* (Ortica). 10 litri/ha: *Aristolochia spp.* (Aristolochia), *Clematis spp.* (Clematide), *Convolvulus spp.* (Convolvolo), *Rubia peregrina* (Robbia selvatica).
ARBUSTI 4 - 6 litri/ha: *Acer spp.* (Acero), *Fraxinus spp.* (Frassino), *Genista spp.* (Ginestra), *Sambucus spp.* (Sambuco), *Vaccinium spp.* (Mirtillo). 8 - 10 litri/ha: *Calluna spp.* (Grecchia), *Cistus spp.* (Cisto), *Erica spp.* (Erica), *Lonicera spp.* (Caprifoglio).

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
COMPATIBILITÀ: Il prodotto può essere miscelato con formulati contenenti Simazina, Diuron, Pronamide. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta. **FITOTOSSICITÀ**: il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree possono provocare danni che si possono ripercuotere anche negli anni successivi. **ATTENZIONE**: da impiegarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Non operare contro vento.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
DA NON VENDERSI SFUSO

ROUNDUP® QUATTROCENTO

Erbicida sistemico di post-emergenza. Liquido concentrato solubile.

COMPOSIZIONE:
Principio attivo: Glifosate acido puro g 34,45 (da sale isopropilamminico)
Inerti e coadiuvanti q.b. a g 100,0
Il contenuto di Glifosate acido equivalente corrisponde a 400 g/l ed è pari a g 46,5 di Glifosate sale isopropilamminico per 100 g di prodotto.

Irritante **Pericoloso per l'ambiente**

Rischio di gravi lesioni oculari
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Non gettare i residui nelle fognature.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A. - Via San Colombano, 81/A - 26900 LODI LO

Officine di Produzione:
Monsanto Europe - Antwerpen (Belgio)
SIPCAM S.p.A.- Salerano al Lambro LO

Registrazione Ministero Salute n° 6250 del 10-4-1985

Contenuto litri: 0,05-0,25-0,5

Partita n°: vedere sulla confezione.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Generalità - ROUNDUP QUATTROCENTO è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni siano esse annuali, biennali o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. ROUNDUP QUATTROCENTO non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

FITOTOSSICITÀ: il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree possono provocare danni che si possono ripercuotere anche negli anni successivi.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

Non operare contro vento.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
DA NON VENDERSI SFUSO

ROUNDUP® QUATTROCENTO

Erbicida sistemico di post-emergenza. Liquido concentrato solubile.

COMPOSIZIONE:

Principio attivo: Glifosate acido puro g 34,45 (da sale isopropilamminico)
Inerti e coadiuvanti q.b. a g 100,0
Il contenuto di Glifosate acido equivalente corrisponde a 400 g/l ed è pari a g 46,5 di Glifosate sale isopropilamminico per 100 g di prodotto.

Irritante **Pericoloso per l'ambiente**

Rischio di gravi lesioni oculari

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Non gettare i residui nelle fognature.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA
S.p.A. - Via San Colombano, 81/A - 26900 LODI LO
Officine di Produzione:
Monsanto Europe - Antwerpen (Belgio)
SIPCAM S.p.A.- Salerano al Lambro LO
Registrazione Ministero Salute n° 6250 del 10-4-1985
Contenuto litri: 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600
Partita n°: vedere sul lato dell'etichetta.

Informazioni mediche: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Generalità - ROUNDUP QUATTROCENTO è un erbicida da impiegarsi in post emergenza nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni siano esse annuali, biennali o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. ROUNDUP QUATTROCENTO non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

Attrezzature, volumi d'acqua e miscele. Per evitare il contatto con le colture da diserbare impiegare pressioni basse ed attrezzature selettive (a sgocciolamento o di tipo umettante-lambente), o munite di schermo protettivo o munite di ugelli con spruzzo controllato (G.D.C., specchio, ventaglio). Non impiegare volumi d'acqua superiori a 200 - 300 litri/ha. Qualora necessiti il controllo delle infestanti che nascono successivamente al trattamento con ROUNDUP QUATTROCENTO, impiegare prodotti ad azione residua quali ad esempio Simazina, Diuron o Pronamide. In questo caso l'addizione alla miscela di 10 kg/ha di solfato d'ammonio può risultare utile. **Avvertenze.** Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da: precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, taglio, pascolo, danneggiamento della vegetazione, siccità, freddo, attacchi parassitari o comunque da quei fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione e traslocazione del prodotto. Prima dell'uso agitare bene sia la confezione sia la miscela erbicida. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o di ferro se non protetti da vernici plastiche. Teme il gelo.

CAMPI DI IMPIEGO.

Le colture diserbabili con ROUNDUP QUATTROCENTO sono numerose. Di seguito queste sono riunite in gruppi in funzione sia delle proprietà intrinseche di difesa (biologiche, fisiche e meccaniche), sia del tipo di applicazione suggerito.

Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi: arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo, kumquat. Pomacee: melo, pero. Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite e olivo.

Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino. Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.

Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti ed a goccia). Ortaggi: carciofo, pomodoro, melanzana, fagiolino, fava, pisello, carota. Patata. Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati (leguminose e graminacee), erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa. Riso: per il controllo del riso crodo, da applicarsi con le attrezzature specifiche per questo scopo, secondo le istruzioni previste dal costruttore; trattare quando l'altezza dell'infestante supera di almeno 15 cm l'altezza della coltura.

Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: Asparago.

Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, girasole, colza, cotone, lino, senape, prati, vivai prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.

Aree non destinate alle colture agrarie: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili.

DOSI DI IMPIEGO

Queste variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata. Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1:2 litri/100 litri di acqua sulle annuali/bienni e di 3:5 litri/100 litri di acqua sulle perenni. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Di seguito sono indicate le dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti (in presenza di ulteriori specie effettuare prima piccole prove di saggio).

ANNUALI E BIENNI 1 - 3 litri/ha: *Alopecurus spp.* (Coda di topo), *Avena spp.* (Avena selvatica), *Lolium spp.* (Loietto), *Mercurialis spp.* (Mercorella), *Poa spp.* (Fienarola), Riso Crodo, *Amni majus* (Sedano selvatico), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Calendula spp.* (Calendula), *Chenopodium spp.* (Farinaccio), *Orobanche* (Succiamele), *Portulaca spp.* (Porcellana), *Raphanus spp.* (Ravanello selvatico), *Senecio spp.* (Senecio), *Sinapis spp.* (Senape), *Stellaria spp.* (Centocchio), *Veronica spp.* (Veronica).

PERENNI 3,5 - 4,5 litri/ha: *Agropyron repens* (Agropiro), *Carex spp.* (Carice), *Cirsium spp.* (Stoppione), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Glyceria spp.* (Gliceria), *Hipericum spp.* (Erba di S. Giovanni), *Laersia oryzoides* (Serla), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Rumex spp. (Romice)*, *Sonchus spp.* (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorgo selvatico). 5 - 6 litri/ha: *Alisma spp.* (Mestolaccio), *Asfodelus spp.* (asfodelo), *Butomus spp.* (Fiorone), *Cyperus spp.* (Zigolo), *Ferula spp.* (Ferula), *Juncus spp.* (Giunco), *Nardus spp.* (Cervino), *Scirpus spp.* (Scirpo), *Sparganium spp.* (Sparganio), *Tussilago spp.* (Farfaraccio). 7 - 9 litri/ha: *Agrostis spp.* (Cappellini), *Allium spp.* (Aglio), *Artemisia spp.* (Artemisia), *Arundo spp.* (Canna), *Cynodon spp.* (Gramigna), *Eracleum spp.* (Panece), *Glechoma spp.* (Edera), *Oxalis spp.* (Acetosella), *Paspalum spp.* (Gramignone), *Phragmites spp.* (Cannuccia di palude), *Pteridium spp.* (Felce), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Rubus spp.* (Rovo), *Tipha spp.* (Tifa), *Urtica spp.* (Ortica). 10 litri/ha: *Aristolochia spp.* (Aristolochia), *Clematis spp.* (Clematide), *Convolvulus spp.* (Convolvolo), *Rubia peregrina* (Robbia selvatica).

ARBUSTI 4 - 6 litri/ha: *Acer spp.* (Acero), *Fraxinus spp.* (Frassino), *Genista spp.* (Ginestra), *Sambucus spp.* (Sambuco), *Vaccinium spp.* (Mirtillo). 8 - 10 litri/ha: *Calluna spp.* (Grecchia), *Cistus spp.* (Cisto), *Erica spp.* (Erica), *Lonicera spp.* (Caprifoglio).

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il prodotto Può essere miscelato con formulati contenenti Simazine, Diuron, Pronamide. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

FITOTOSSICITÀ': il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree possono provocare danni che si possono ripercuotere anche negli anni successivi.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Non operare contro vento. DA NON VENDERSI SFUSO

Il presente contenitore è di proprietà della Monsanto Agricoltura Italia S.p.A., deve essere utilizzato con il previsto sistema di travaso e quando vuoto restituito per il riutilizzo. Per le taglie pari o superiori a 200 litri, lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale.

ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

RUMBOVAL

Erbicida sistemico di post emergenza
Formulazione: liquido solubile.

Composizione:

Glifosate acido puro (da sale isopropilamminico)	g 30,4	(360 g/l)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a g 100.	

Il contenuto di glifosate acido equivalente corrisponde a 360 g/l ed è pari a g 41 di glifosate sale isopropilamminico per 100 g di prodotto.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Informazioni mediche. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO

Generalità - RUMBOVAL è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. **RUMBOVAL** non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

Attrezzature, volumi d'acqua e miscele. Per evitare il contatto con le colture da diserbare impiegare pressioni basse ed attrezzature selettive (a sgocciolamento o di tipo umettante-lambente) , munite di schermo protettivo o munite di ugello con spruzzo controllato (G.D.C., specchio, ventaglio). Non impiegare con volumi d'acqua superiori a 200-300 litri/ha. Qualora necessiti il controllo delle infestanti che nascono successivamente al trattamento con RUMBOVAL, impiegare prodotti ad azione residua, quali ad esempio simazina o diuron. In questo caso l'addizione alla miscela di 10 kg/ha di solfato ammonico può risultare utile. In tutti i casi in cui RUMBOVAL è impiegato in miscela con altri formulati la cui efficacia non è ben conosciuta, effettuare prima piccole prove di saggio.

Avvertenze. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la translocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse, come siccità, freddo, attacchi parassitari ha efficacia ridotta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili. Prima dell'uso agitare bene sia la confezione, sia la miscela erbicida. L'impiego su mais è consentito solo nell'interfila. Da non impiegarsi in pre-raccolta.

Campi d'impiego.
Le colture diserbabili con RUMBOVAL sono numerose. Di seguito sono riunite in gruppi in funzione sia delle proprietà intrinseche di difesa (biologiche, fisiche, e meccaniche), sia del tipo di applicazione suggerito.
<u>Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato:</u> vite, olivo, melo, pero. arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo, kumquat, noce.
<u>Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato</u>: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino.
<u>Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti o a goccia):</u> carciofo, pomodoro, melanzana, fagiolino, fava, pisello, carota, patata, mais (solo interfila), soia, prati (leguminose e graminacee), erba medica, bietola da zucchero, rosa, vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
<u>Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza:</u> asparago.
<u>Terreni agrari in assenza della coltura</u> (fragola, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai): prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
<u>Aree non destinate alle colture agrarie:</u> per interventi a piena superficie o per il diserbo controllato con attrezzature selettive - aree industriali, ruderi storici, cimiteri, piazzali, banchine stradali, strade ferrate, argini di canali, fossi, scoline, frangifuoco, argini, arginelli, aree urbane ed agricole non coltivate, viali, parchi e giardini.

Dosi d'impiego - Queste variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata. Nel caso di associazioni floristiche impiegare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1 - 2 l / 100 litri d'acqua sulle annuali/bienni e di 2 - 5 l / 100 litri d'acqua sulle perenni.

Dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti. (in presenza di ulteriori specie effettuare prima piccole prove di saggio)
<u>Annuali e bienni.</u> **1,5 - 4 l/ha**: *Alopecurus sp., Avena sp., Hordeum murinum, Lolium sp., Mercurialis sp., Poa sp., Riso crodo, Amni majus, Amaranthus sp., Calendula sp., Chenopodium sp., Orobanche sp., Portulaca sp., Raphanus sp., Senecio sp., Sinapis sp., Stellaria sp., Veronica sp..*
<u>Perenni.</u> **4 - 5 l/ha**: *Agropyron repens, Carex sp., Cirsium sp., Euphorbia sp., Glyceria sp., Hipericum sp., Laersia oryzoides, Phalaris sp., Rumex sp., Sonchus sp., Sorghum halepense.* **5 - 7 l/ha**: *Alisma sp., Asfodelus sp., Butomus sp., Cyperus sp., Ferula sp., Juncus sp., Nardus sp., Scirpus sp., Sparganium sp., Tussillago sp.* **8 - 10 l/ha**: *Agrostis sp., Allium sp., Artemisia sp., Arundo sp., Cynodon sp., Eracleum sp., Glechoma sp., Oxalis sp., Paspalum sp., Phragmites sp., Pteridium sp., Ranunculus sp., Rubus sp., Tipha sp., Urtica sp.* **12 l/ha**: *Aristolochia sp., Clematis sp., Convolvulus sp., Rubia peregrina.*
<u>Arbusti.</u> **4 - 6 l/ha**: *Acer sp.. Fraxinus sp., Genista sp., Salix sp., Sambucus sp., Vaccinum sp.* **10 - 12 l/ha**: *Calluna sp., Cistus sp., Erica sp., Lonicera sp..*

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

Compatibilità: il prodotto si usa da solo, tuttavia nel caso di miscele verificare prima la compatibilità e l'efficacia erbicida. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere osservato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati.

Attenzione: da usarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
Via San Colombano, 81/A - 26900 Lodi (LO)

Officina di produzione:
Monsanto Europe N.V. - Antwerp - Belgio
SIPCAM S.p.A. - Salerano al Lambro LO
Rhone Poulenc Agro - Paganica AQ
Off. di confezionamento:
DIACHEm S.p.A. u.p. SIFA - Caravaggio BG
Ital Agro S.a.s. - Grugliasco TO
Registrazione del Ministero della Salute n. 4833 del 3.8.1982

Distribuito da:
IQV Italia S.r.l. via V. Veneto, 31 20024 Garbagnate Milanese (MI)

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

Quantità netta: 0,1- 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 5 - 10 -20 - 50 litri
Partita n: vedere sulla confezione.

RUMBOVAL

Erbicida sistemico di post emergenza
Formulazione: liquido solubile.

Composizione:
Glifosate acido puro g 30,4 (360 g/l)
(da sale isopropilamminico)
Inerti e coadiuvanti q. b. a g 100.

Il contenuto di glifosate acido equivalente corrisponde a 360 g/l ed è pari a g 41 di glifosate sale isopropilamminico per 100 g di prodotto.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Informazioni mediche. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO
Generalità - RUMBOVAL è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. **RUMBOVAL** non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Compatibilità: il prodotto si usa da solo, tuttavia nel caso di miscele verificare prima la compatibilità e l'efficacia erbicida. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere osservato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati.
Attenzione: da usarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
Via San Colombano, 81/A - 26900 Lodi (LO)

Officina di produzione: Monsanto Europe N.V. - Antwerp - Belgio
SIPCAM S.p.A. - Salerano al Lambro LO
Rhone Poulenc Agro - Paganica AQ
Off. di confezionamento:DIACHEm S.p.A. u.p. SIFA - Caravaggio BG
Ital Agro S.a.s. - Grugliasco TO

Registrazione del Ministero della Salute n. 4833 del 3.8.1982

Distribuito da:
IQV Italia S.r.l. via V. Veneto, 31 20024 Garbagnate Milanese (MI)

Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Smaltire il prodotto e il suo imballaggio secondo le norme vigenti.

Quantità netta: 0,1- 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 litri
Partita n: vedere sulla confezione.

DA NON VENDERSI SFUSO

SERENO CENTOVENTI ®

ERBICIDA SISTEMICO PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI

Composizione:
Glifosate acido puro (da sale isopropilamminico) g 10,13
Acqua e coadiuvanti q. b. a g 100

Irritante **Pericoloso per l'ambiente**

Rischio di gravi lesioni oculari.
Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Non gettare i residui nelle fognature.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano 81/A – 26900 Lodi (LO)

Officina di produzione:
Monsanto Europe N.V. - Antwerp – Belgio
SIPCAM S.p.A.- Salerano al Lambro LO
Registrazione del Ministero della Salute n.7677 del 2.2.1989
Volume litri: 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 – 50

Partita n°: vedere sulla confezione.

Informazioni mediche.
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO.
SERENO CENTOVENTI è un diserbante sistemico per il controllo delle malerbe annuali che infestano sia le colture arboree ed erbacee, sia gli incolti.Esso viene assorbito attraverso le parti verdi delle infestanti e traslocato alle radici, dopo 48 ore dal trattamento è interamente diffuso all'interno delle infestanti, bloccandone la crescita e iniziando il processo di devitalizzazione. SERENO CENTOVENTI non possiede attività residua ed è rapidamente inattivato e degradato dai microorganismi presenti nell'ambiente.Non inferisce sulla germinazione dei semi delle colture o delle erbe infestanti presenti ne terreno. Se si desidera avere anche un controllo delle infestanti che nascono successivamente al trattamento, impiegare il prodotto in miscela con erbicidi di pre-semina, pre-emergenza o residuali autorizzati per le colture indicate in etichetta.
SERENO CENTOVENTI si distribuisce in 200-400 litri di acqua per ettaro, impiegando attrezzature idonee, dotate di ugelli a specchio o a ventaglio, con pressione contenuta tra 1 e 3 atmosfere; oppure con attrezzature a microgoccia controllata.

Avvertenze. Impiegare su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse, come siccità, freddo, attacchi parassitariè inefficace . L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, taglio, pascolo, danneggiamento della vegetazione, siccità, freddo, attacchi parassitari e comunque da quei fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione e la traslocazione del prodotto.

Campo e dosi d'impiego.
SERENO CENTOVENTI si impiega su infestanti annuali, a dosi variabili in funzione dell'infestante e dello stadio di sviluppo delle malerbe come di seguito specificato:
Infestanti graminacee non accestite: 3-4 l/ha.
Infestanti graminacee e dicotiledoni alle prime foglie vere: 4-6 l/ha.
Infestanti graminacee accestite, dicotiledoni sviluppate (15 - 20 cm di altezza), crucifere allo stadio di rosetta, presenza consistente di poligonacee: 6-8 l/ha.
Infestanti graminacee sviluppate, crucifere e composite ad inizio fioritura 8-10 l/ha
Campi d'impiego
Vite, olivo, melo , pero,drupacee, noce.
Preparazione dei letti di semina di:
Barbabietola da zucchero, Frumento, mais, Riso, orzo, Avena, Ortaggi, Prati, Vivai.
Asparago: (impiegare il prodotto prima dell'emergenza dei turioni o alla fine del raccolto).
Diserbo di incolti:
Bordi stradali, fossi, scoline,argini,arginelli di risaia, banchine stradali, piazzali, aree urbane non coltivate: (impiegare il prodotto una o due volte a seconda delle necessità singolarmente o in miscela con altri erbicidi residuali autorizzati, alla dose di 90-120 ml/100 mq).

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

Compatibilità:
SERENO CENTOVENTI è miscibile con altri diserbanti onde ampliarne lo spettro d'azione; stante l'elevato numero di formulati e mancanza di raccomandazioni specifiche è bene effettuare saggi preliminari di compatibilità dei formulati che si intendono miscelare.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: il prodotto non è selettivo. Il prodotto può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili (drupacee) impiegare ugelli schermati.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.
Avvertenza importante: Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o di ferro se non protetti da vernici plastiche.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio Monsanto

SEVEN

Erbicida sistemico di post-emergenza. Concentrato solubile.

Composizione:

Glifosate acido puro	g 31	(360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico	g 41.7)	
Acqua e coadiuvanti	q. b. a g 100.	

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Informazioni mediche.
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO.

Generalità. SEVEN è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. SEVEN non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

Attrezzature, volumi d'acqua e miscele. Si raccomanda l'utilizzo di ugelli a specchio o a ventaglio e di operare a pressioni comprese tra 1 e 3 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. L'impiego di attrezzature a sgocciolamento, di tipo umettante o lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto, anche quando le infestanti sono vicine alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le pompe e i recipienti, risciacquandoli almeno tre volte prima di riutilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Impiegare preferibilmente volumi d'acqua fino a 400 l/ha. L'addizione alla miscela di 10 kg/ha di solfato ammonico può risultare utile, soprattutto in condizioni di trattamento non ottimali.

Avvertenza. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, taglio, pascolo, danneggiamento della vegetazione, siccità, freddo, attacchi parassitari o comunque da quei fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincato) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

Campi d'impiego.

Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi: arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo, kumquat. Pomacee: melo, pero. Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite e olivo.
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino. Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto e il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti ed a goccia). Ortaggi: carciofo, pomodoro, melanzana, fagiolino, fava, pisello, carota. Patata. Mais (solo interfila, da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati (leguminose e graminacee), erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago.
Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, vivai prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alle colture agrarie: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali e industriali, aree ed opere civili.

Dosi d'impiego. Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata. Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1 - 2 l / 100 litri d'acqua sulle annuali/bienni e di 2 - 5 l / 100 litri d'acqua sulle perenni.
Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Di seguito sono indicate le dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti (in presenza di ulteriori specie effettuare prima piccole prove di saggio).

Annuali e bienni. 1,5 - 4 l/ha: *Alopecurus spp.* (Coda di topo) , *Avena spp.* (Avena selvatica), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lolium spp.* (Loietto), *Mercurialis spp.* (Mercorella), *Poa spp.* (Fienarola), Riso crodo, *Amni majus (Sedano selvatico)*, *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Calendula spp.* (Calendula), *Chenopodium sp.* (Farinaccio), *Orobanche spp.* (Succiamele), *Portulaca spp.* (Porcellana), *Raphanus spp.* (Ravanello Selvatico), *Senecio spp.* (Senecio), *Sinapis spp.* (Senape), *Stellaria spp.* (Centocchio), *Veronica spp.* (Veronica).

Perenni. 4 - 5 l/ha: *Agropyron repens* (Agropiro), *Carex spp.* (Carice), *Cirsium spp.* (Stoppione), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Glyceria spp.* (Gliceria), *Hipericum spp.* (Erba di San Giovanni), *Laersia oryzoides* (Serla), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Rumex spp.* (Romice), *Sonchus spp.* (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorgo selvatico). 5 - 7 l/ha: *Alisma spp.* (Mestolaccio), *Asfodelus spp.* (Asfodelo), *Butomus spp.* (Fiorone), *Cyperus spp.* (Zigolo), *Ferula spp.* (Ferula), *Juncus spp.* (Giunco), *Nardus spp.* (Cervino), *Scirpus spp.* (Scirpo), *Sparganium spp.* (Sparganio), *Tussilago spp.* (Farfaraccio). 8 - 10 l/ha: *Agrostis spp.* (Cappellini), *Allium spp.* (Aglio), *Artemisia spp.* (Artemisia), *Arundo spp.* (Canna), *Cynodon spp.* (Gramigna), *Eracleum spp.* (Panece), *Glechoma spp.* (Edera), *Oxalis spp.* (Acetosella), *Paspalum spp.* (Gramignone), *Phragmites spp.* (Cannuccia di Palude), *Pteridium spp.* (Felce), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Rubus spp.* (Rovo), *Tipha spp.* (Tifa), *Urtica spp.* (Ortica) 12 l/ha: *Aristolochia spp.* (Aristolochia), *Clematis spp.* (Clematide), *Convolvulus spp.* (Convolvolo), *Rubia peregrina* (Robbia selvatica).

Arbusti. 4 - 6 l/ha: *Acer spp.* (Acero), *Fraxinus spp.* (Frassino), *Genista spp.* (Ginestra), *Salix spp.* (Salice), *Sambucus spp.* (Sambuco), *Vaccinum spp.* (Mirtillo) 10 - 12 l/ha: *Calluna spp.* (Grecchia), *Cistus spp.* (Cisto), *Erica spp.* (Erica), *Lonicera spp.* (Caprifoglio).

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto si utilizza da solo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

Fitotossicità: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A - 26900 LODI (LO)

Registrazione del Ministero della Salute n. 11852 del 3/10/2003

Officine di produzione:
Monsanto Europe N.V. - Antwerp – Belgio
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo San Giovanni (BG)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Contenuto litri 0,50 - 1 - 1,5 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50
Partita n.: vedere sulla confezione.

DA NON VENDERSI SFUSO

SEVEN

Erbicida sistemico di post-emergenza. Concentrato solubile.

Composizione:
Glifosate acido puro g 31 (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico g 41.7)
Acqua e coadiuvanti q. b. a g 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Informazioni mediche.
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO.

Generalità. SEVEN è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. SEVEN non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Fitotossicità: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A - 26900 LODI (LO)
Registrazione del Ministero della Salute n. 11852 del 3/10/2003

Officine di produzione:
Monsanto Europe N.V. - Antwerp – Belgio
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo San Giovanni (BG)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto litri 0,05 - 0,10 - 0,25 - 0,50
Partita n.

SEVEN

Erbicida sistemico di post-emergenza. Concentrato solubile.

Composizione:
Glifosate acido puro g 31 (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico g 41.7)
Acqua e coadiuvanti q. b. a g 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Informazioni mediche.
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO.

Generalità. SEVEN è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. SEVEN non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

Attrezzature, volumi d'acqua e miscele. Si raccomanda l'utilizzo di ugelli a specchio o a ventaglio e di operare a pressioni comprese tra 1 e 3 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. L'impiego di attrezzature a sgocciolamento, di tipo umettante o lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto, anche quando le infestanti sono vicine alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le pompe e i recipienti, risciacquandoli almeno tre volte prima di riutilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Impiegare preferibilmente volumi d'acqua fino a 400 l/ha. L'addizione alla miscela di 10 kg/ha di solfato ammonico può risultare utile, soprattutto in condizioni di trattamento non ottimali.

Avvertenza. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, taglio, pascolo, danneggiamento della vegetazione, siccità, freddo, attacchi parassitari o comunque da quei fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincato) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

Campi d'impiego.
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi: arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo, kumquat. Pomacee: melo, pero. Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite e olivo.
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino. Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto e il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti ed a goccia). Ortaggi: carciofo, pomodoro, melanzana, fagiolino, fava, pisello, carota. Patata. Mais (solo interfila, da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati (leguminose e graminacee), erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago.
Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, vivai prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alle colture agrarie: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali e industriali, aree ed opere civili.

Dosi d'impiego. Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata. Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1 - 2 l / 100 litri d'acqua sulle annuali/bienni e di 2 - 5 l / 100 litri d'acqua sulle perenni.
Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Di seguito sono indicate le dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti (in presenza di ulteriori specie effettuare prima piccole prove di saggio).

Annuali e bienni. 1,5 - 4 l/ha: *Alopecurus spp.* (Coda di topo) , *Avena spp.* (Avena selvatica), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lolium spp.* (Loietto), *Mercurialis spp.* (Mercorella), *Poa spp.* (Fienarola), Riso crodo, *Amni majus (Sedano selvatico)*, *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Calendula spp.* (Calendula), *Chenopodium sp.* (Farinaccio), *Orobanche spp.* (Succiamele), *Portulaca spp.* (Porcellana), *Raphanus spp.* (Ravanello Selvatico), *Senecio spp.* (Senecio), *Sinapis spp.* (Senape), *Stellaria spp.* (Centocchio), *Veronica spp.* (Veronica).

Perenni. 4 - 5 l/ha: *Agropyron repens* (Agropiro), *Carex spp.* (Carice), *Cirsium spp.* (Stoppione), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Glyceria spp.* (Gliceria), *Hipericum spp.* (Erba di San Giovanni), *Laersia oryzoides* (Serla), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Rumex spp.* (Romice), *Sonchus spp.* (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorgo selvatico). 5 - 7 l/ha: *Alisma spp.* (Mestolaccio), *Asfodelus spp.* (Asfodelo), *Butomus spp.* (Fiorone), *Cyperus spp.* (Zigolo), *Ferula spp.* (Ferula), *Juncus spp.* (Giunco), *Nardus spp.* (Cervino), *Scirpus spp.* (Scirpo), *Sparganium spp.* (Sparganio), *Tussillago spp.* (Farfaraccio). 8 - 10 l/ha: *Agrostis spp.* (Cappellini), *Allium spp.* (Aglio), *Artemisia spp.* (Artemisia), *Arundo spp.* (Canna), *Cynodon spp.* (Gramigna), *Eracleum spp.* (Panece), *Glechoma spp.* (Edera), *Oxalis spp.* (Acetosella), *Paspalum spp.* (Gramignone), *Phragmites spp.* (Cannuccia di Palude), *Pteridium spp.* (Felce), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Rubus spp.* (Rovo), *Tipha spp.* (Tifa), *Urtica spp.* (Ortica) 12 l/ha: *Aristolochia spp.* (Aristolochia), *Clematis spp.* (Clematide), *Convolvulus spp.* (Convolvolo), *Rubia peregrina* (Robbia selvatica).

Arbusti. 4 - 6 l/ha: *Acer spp.* (Acero), *Fraxinus spp.* (Frassino), *Genista spp.* (Ginestra), *Salix spp.* (Salice), *Sambucus spp.* (Sambuco), *Vaccinum spp.* (Mirtillo) 10 - 12 l/ha: *Calluna spp.* (Grecchia), *Cistus spp.* (Cisto), *Erica spp.* (Erica), *Lonicera spp.* (Caprifoglio).

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto si utilizza da solo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

Fitotossicità: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A - 26900 LODI (LO)

Registrazione del Ministero della Salute n. 11852 del 3/10/2003

Officine di produzione:
Monsanto Europe N.V. - Antwerp – Belgio
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo San Giovanni (BG)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Il presente contenitore è di proprietà della Monsanto Agricoltura Italia S.p.A., deve essere utilizzato con il previsto sistema di travaso e quando vuoto restituito per il riutilizzo. Per le taglie pari o superiori a 200 litri, lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali uscite accidentali del prodotto.
In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale.
ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non operare contro vento.
Contenuto litri 60 - 100 -150 -200 - 300 - 400 - 500 – 600
Partita n.:vedere lato dell'etichetta.
DA NON VENDERSI SFUSO

SIMACHLOR TZ

Erbicida selettivo per il mais - Formulazione liquida contenente alaclor microincapsulato

Composizione:
Alaclor puro g 28,5 (336 g/l)
Terbutilazina pura g 12,2 (144 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Nocivo **Pericoloso per l'ambiente**

Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare né bere durante l'impiego.
Non gettare i rifiuti nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A 26900 LODI (LO)

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. – Salerano al Lambro – LO

Distribuito da:
Simar S.r.l.
Via F.lli Rosselli, 1 – 27026 Garlasco (PV)

Registrazione del Ministero della Salute n. 11982 del 04.02.2004

Quantità netta del preparato: litri 1 - 5 - 10 - 20
Partita n°: vedere sulla confezione.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: alaclor 28.5%; terbutilazina 12,2%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Alaclor. Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terbutilazina (non specifici e rilevati su animali con superdosaggi): Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratorie, salivazione.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: -

Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE D'AZIONE
Agisce sui semi in via di germinazione.

SPETTRO D'AZIONE
Erbe infestanti sensibili: amaranto (*Amaranthus* spp.), camomilla (*Matricaria chamomilla*), centocchio (*Stellaria media*), Erba morella (*Solanum nigrum*), sanguinella (*Digitaria* spp.), giavone americano (*Panicum dichotomiflorum*), giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), pabbio (*Setaria* spp.), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), sorghetta da seme (*Sorghum alepense*) e poligonacee.

DOSI DI IMPIEGO
6 -7 litri per ettaro.

VOLUME DI IRRORAZIONE
Distribuire impiegando 400-600 litri di acqua per ettaro.
PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE ERBICIDA
Stemperare a parte in poca acqua la quantità prestabilita di prodotto, mescolando con cura. Versare la sospensione nella metà dell'acqua necessaria, indi riempire la botte agitando.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Occorre che il terreno sia umido al momento del trattamento, oppure che una pioggia di 10-15 mm cada entro due settimane dall'applicazione; in caso contrario effettuare una leggera irrigazione a pioggia. In previsione di una lunga siccità e nell'impossibilità di irrigare a pioggia, si può effettuare prima della semina un leggero interramento del prodotto alla profondità di 2-3 cm.
Non effettuare il diserbo nei terreni torbosi in quanto la sostanza organica decompone il prodotto e quindi ne riduce l'efficacia. Il letame eventualmente distribuito antesemina deve essere ben interrato per non ridurre l'azione del prodotto: tale azione viene altresì ridotta o annullata dallo spargimento di liquame di stalla.
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento, di 10 mesi per altre colture (es. bietola, tabacco).

NOTE (norme fitoprotettive)
Impiegare il prodotto solo su colture specializzate in assenza di sottocolture. Dal trattamento erbicida alla semina di eventuali sottocolture occorre un intervallo minimo di 12 mesi. Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi. Sospendere il trattamento al massimo alla post-emergenza delle infestanti.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si usa da solo.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si consigliano prove parcellari per le varietà poco note o di recente acclimatazione. Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine perché fitotossico. Dopo l'impiego lavare accuratamente la pompa e i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione del prodotto prima del loro riutilizzo.
Conservare il prodotto protetto dal gelo.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

SIMACHLOR TZ

Erbicida selettivo per il mais - Formulazione liquida contenente alaclor microincapsulato

Composizione:
Alaclor puro g 28,5 (336 g/l)
Terbutilazina pura g 12,2 (144 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Nocivo **Pericoloso per l'ambiente**

Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare né bere durante l'impiego.
Non gettare i rifiuti nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A 26900 LODI (LO)

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. – Salerano al Lambro – LO

Distribuito da:
Simar S.r.l.
Via F.lli Rosselli, 1 – 27026 Garlasco (PV)

Registrazione del Ministero della Salute n. 11982 del 04.02.2004

Quantità netta del preparato: litri 200 – 400

ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO: NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

Partita n°: vedere sulla confezione.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: alaclor 28,5%; terbutilazina 12,2%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Alaclor: Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terbutilazina (non specifici e rilevati su animali con superdosaggi): Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratorie, salivazione.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: -

Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE D'AZIONE
Agisce sui semi in via di germinazione.

SPETTRO D'AZIONE
Erbe infestanti sensibili: amaranto (*Amaranthus* spp.), camomilla (*Matricaria chamomilla*), centocchio (*Stellaria media*), Erba morella (*Solanum nigrum*), sanguinella (*Digitaria* spp.), giavone americano (*Panicum dichotomiflorum*), giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), pabbio (*Setaria* spp.), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), sorghetta da seme (*Sorghum alepense*) e poligonacee.

DOSI DI IMPIEGO
6-7 litri per ettaro.

VOLUME DI IRRORAZIONE
Distribuire impiegando 400-600 litri di acqua per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE ERBICIDA
Stemperare a parte in poca acqua la quantità prestabilita di prodotto, mescolando con cura. Versare la sospensione nella metà dell'acqua necessaria, indi riempire la botte agitando.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Occorre che il terreno sia umido al momento del trattamento, oppure che una pioggia di 10-15 mm cada entro due settimane dall'applicazione; in caso contrario effettuare una leggera irrigazione a pioggia. In previsione di una lunga siccità e nell'impossibilità di irrigare a pioggia, si può effettuare prima della semina un leggero interramento del prodotto alla profondità di 2-3 cm.
Non effettuare il diserbo nei terreni torbosi in quanto la sostanza organica decompone il prodotto e quindi ne riduce l'efficacia. Il letame eventualmente distribuito antesemina deve essere ben interrato per non ridurre l'azione del prodotto: tale azione viene altresì ridotta o annullata dallo spargimento di liquame di stalla.
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento, di 10 mesi per altre colture (es. bietola, tabacco).

NOTE (norme fitoprotettive)
Impiegare il prodotto solo su colture specializzate in assenza di sottocolture. Dal trattamento erbicida alla semina di eventuali sottocolture occorre un intervallo minimo di 12 mesi. Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi. Sospendere il trattamento al massimo alla post-emergenza delle infestanti.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si usa da solo.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si consigliano prove parcellari per le varietà poco note o di recente acclimatazione. Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine perché fitotossico. Dopo l'impiego lavare accuratamente la pompa e i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione del prodotto prima del loro riutilizzo.
Conservare il prodotto protetto dal gelo.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Non operare contro vento.

Contenitore previsto per l'uso con sistemi chiusi di travaso.
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori da 200 e 400 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

DA NON VENDERSI SFUSO

SOLADO® *GOLD*

Erbicida Liquido solubile. Concentrato.

Composizione:
Glifosate acido puro g 31 (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico g 41,7)
Acqua e coadiuvanti q. b. a g 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Informazioni mediche. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
SOLADO GOLD è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. SOLADO GOLD non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microorganismi presenti nell'ambiente.

Attrezzature, volumi d'acqua e miscele.
SOLADO GOLD consente di ottenere migliori risultati con ugelli a specchio o a ventaglio e ridotti volumi d'acqua. L'addizione alla miscela di 10 kg/ha di solfato ammonico può risultare utile.
Avvertenza. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse, come siccità, freddo, attacchi parassitari ha efficacia ridotta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento.
Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincato) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

Campi d'impiego.
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: vite, olivo, melo, pero, arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo, kumquat.
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago.
Terreni agrari in assenza della coltura (fragola, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai): prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alle colture agrarie: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi, scoline, aree rurali e industriali, aree ed opere civili.

Dosi d'impiego.
Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata.
In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1 - 2 l / 100 litri d'acqua sulle annuali/bienni e di 2 - 5 l / 100 litri d'acqua sulle perenni.
Dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti.
Annuali e bienni. 1,5 - 4 l/ha: *Alopecurus sp., Avena sp., Hordeum murinum, Lolium sp., Mercurialis sp., Poa sp., Riso crodo, Amni majus, Amaranthus sp., Calendula sp., Chenopodium sp., Orobanche sp., Portulaca sp., Raphanus sp., Senecio sp., Sinapis sp., Stellaria sp., Veronica sp..*
Perenni. 4 - 5 l/ha: *Agropyron repens, Carex sp., Cirsium sp., Euphorbia sp., Glyceria sp., Hipericum sp., Laersia oryzoides, Phalaris sp., Rumex sp., Sonchus sp., Sorghum halepense.* 5 - 7 l/ha: *Alisma sp., Asfodelus sp., Butomus sp., Cyperus sp., Ferula sp., Juncus sp., Nardus sp., Scirpus sp., Sparganium sp., Tussilago sp.* 8 - 10 l/ha: *Agrostis sp., Allium sp., Artemisia sp., Arundo sp., Cynodon sp., Eracleum sp., Glechoma sp., Oxalis sp., Paspalum sp., Phragmites sp., Pteridium sp., Ranunculus sp., Rubus sp., Tipha sp., Urtica sp.* 12 l/ha: *Aristolochia sp., Clematis sp., Convolvulus sp., Rubia peregrina.*
Arbusti. 4 - 6 l/ha: *Acer sp., Fraxinus sp., Genista sp., Salix sp., Sambucus sp., Vaccinum sp.* 10 - 12 l/ha: *Calluna sp., Cistus sp., Erica sp., Lonicera sp..*

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

Avvertenza - in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Compatibilità: compatibile con il solfato ammonico.
Fitotossicità: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati.
Attenzione: da usarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A. - Via San Colombano 81/A – 26900 Lodi (LO)

Officina di produzione: Monsanto Europe N.V. - Antwerp - Belgio

Registrazione del Ministero della Salute n. 9056 del 31 dicembre 1996

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Quantità netta: 1 - 1,5 - 2 - 5 - 10 -20 - 50 litri
Partita n: vedere sulla confezione.
DA NON VENDERSI SFUSO

SOLADO® *GOLD*

Erbicida Liquido solubile. Concentrato.

Composizione:
Glifosate acido puro g 31 (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico g 41,7)
Acqua e coadiuvanti q. b. a g 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Informazioni mediche. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
SOLADO GOLD è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. SOLADO GOLD non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microorganismi presenti nell'ambiente.
Fitotossicità: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

Attenzione: da usarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

Avvertenza - in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZA:
PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano 81/A – 26900 Lodi (LO)

Officina di produzione: Monsanto Europe N.V. - Antwerp - Belgio
Registrazione del Ministero della Salute n. 9056 del 31/12/1996

Quantità netta: 0,1- 0,25 - 0,5 - 0,75 litri
Partita n.:vedere sulla confezione.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Smaltire il prodotto e il suo imballaggio secondo le norme vigenti.

DA NON VENDERSI SFUSO

TERRACHLOR TZ

Erbicida selettivo per il mais - Formulazione liquida contenente alaclor microincapsulato

Composizione:
Alaclor puro g 28,5 (336 g/l)
Terbutilazina pura g 12,2 (144 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Nocivo **Pericoloso per l'ambiente**

Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare né bere durante l'impiego.
Non gettare i rifiuti nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A 26900 LODI (LO)

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. – Salerano al Lambro – LO

Distribuito da:
Terranalisi S.r.l.
Via N. Bixio, 6 - 44042 CENTO (FE).

Registrazione del Ministero della Salute n. 12404 del 9.12.2004

Quantità netta del preparato: litri 1 - 5 - 10 - 20

Partita n°: vedere sulla confezione.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: alaclor 28.5%; terbutilazina 12,2%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Alaclor: Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terbutilazina (non specifici e rilevati su animali con superdosaggi): Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratorie, salivazione.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: -

Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE D'AZIONE
Agisce sui semi in via di germinazione.

SPETTRO D'AZIONE
Erbe infestanti sensibili: amaranto (*Amaranthus* spp.), camomilla (*Matricaria chamomilla*), centocchio (*Stellaria media*), Erba morella (*Solanum nigrum*), sanguinella (*Digitaria* spp.), giavone americano (*Panicum dichotomiflorum*), giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), pabbio (*Setaria* spp.), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), sorghetta da seme (*Sorghum alepense*) e poligonacee.

DOSI DI IMPIEGO
6 -7 litri per ettaro.

VOLUME DI IRRORAZIONE
Distribuire impiegando 400-600 litri di acqua per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE ERBICIDA
Stemperare a parte in poca acqua la quantità prestabilita di prodotto, mescolando con cura. Versare la sospensione nella metà dell'acqua necessaria, indi riempire la botte agitando.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Occorre che il terreno sia umido al momento del trattamento, oppure che una pioggia di 10-15 mm cada entro due settimane dall'applicazione; in caso contrario effettuare una leggera irrigazione a pioggia. In previsione di una lunga siccità e nell'impossibilità di irrigare a pioggia, si può effettuare prima della semina un leggero interramento del prodotto alla profondità di 2-3 cm.
Non effettuare il diserbo nei terreni torbosi in quanto la sostanza organica decompone il prodotto e quindi ne riduce l'efficacia. Il letame eventualmente distribuito antesemina deve essere ben interrato per non ridurre l'azione del prodotto: tale azione viene altresì ridotta o annullata dallo spargimento di liquame di stalla.
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento, di 10 mesi per altre colture (es. bietola, tabacco).

NOTE (norme fitoprotettive)
Impiegare il prodotto solo su colture specializzate in assenza di sottocolture. Dal trattamento erbicida alla semina di eventuali sottocolture occorre un intervallo minimo di 12 mesi. Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi. Sospendere il trattamento al massimo alla post-emergenza delle infestanti.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si usa da solo.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si consigliano prove parcellari per le varietà poco note o di recente acclimatazione. Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine perché fitotossico. Dopo l'impiego lavare accuratamente la pompa e i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione del prodotto prima del loro riutilizzo.
Conservare il prodotto protetto dal gelo.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

TERRACHLOR TZ

Erbicida selettivo per il mais - Formulazione liquida contenente alaclor microincapsulato

Composizione:
Alaclor puro g 28,5 (336 g/l)
Terbutilazina pura g 12,2 (144 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Nocivo **Pericoloso per l'ambiente**

Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare né bere durante l'impiego.
Non gettare i rifiuti nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A 26900 LODI (LO)

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. – Salerano al Lambro – LO

Distribuito da:
Terranalisi S.r.l.
Via N. Bixio, 6 - 44042 CENTO (FE).

Registrazione del Ministero della Salute n. 12404 del 9.12.2004

Quantità netta del preparato: litri 200 - 400

Partita n°: vedere sulla confezione.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: alaclor 28,5%; terbutilazina 12,2%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Alaclor: Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terbutilazina (non specifici e rilevati su animali con superdosaggi): Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratorie, salivazione.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: -

Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE D'AZIONE
Agisce sui semi in via di germinazione.

SPETTRO D'AZIONE
Erbe infestanti sensibili: amaranto (*Amaranthus* spp.), camomilla (*Matricaria chamomilla*), centocchio (*Stellaria media*), Erba morella (*Solanum nigrum*), sanguinella (*Digitaria* spp.), giavone americano (*Panicum dichotomiflorum*), giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), pabbio (*Setaria* spp.), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), sorghetta da seme (*Sorghum alepense*) e poligonacee.

DOSI DI IMPIEGO
6-7 litri per ettaro.

VOLUME DI IRRORAZIONE
Distribuire impiegando 400-600 litri di acqua per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE ERBICIDA
Stemperare a parte in poca acqua la quantità prestabilita di prodotto, mescolando con cura. Versare la sospensione nella metà dell'acqua necessaria, indi riempire la botte agitando.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Occorre che il terreno sia umido al momento del trattamento, oppure che una pioggia di 10-15 mm cada entro due settimane dall'applicazione; in caso contrario effettuare una leggera irrigazione a pioggia. In previsione di una lunga siccità e nell'impossibilità di irrigare a pioggia, si può effettuare prima della semina un leggero interramento del prodotto alla profondità di 2-3 cm.
Non effettuare il diserbo nei terreni torbosi in quanto la sostanza organica decompone il prodotto e quindi ne riduce l'efficacia. Il letame eventualmente distribuito antesemina deve essere ben interrato per non ridurre l'azione del prodotto: tale azione viene altresì ridotta o annullata dallo spargimento di liquame di stalla.
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento, di 10 mesi per altre colture (es. bietola, tabacco).

NOTE (norme fitoprotettive)
Impiegare il prodotto solo su colture specializzate in assenza di sottocolture. Dal trattamento erbicida alla semina di eventuali sottocolture occorre un intervallo minimo di 12 mesi. Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi. Sospendere il trattamento al massimo alla post-emergenza delle infestanti.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si usa da solo.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si consigliano prove parcellari per le varietà poco note o di recente acclimatazione. Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine perché fitotossico. Dopo l'impiego lavare accuratamente la pompa e i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione del prodotto prima del loro riutilizzo.
Conservare il prodotto protetto dal gelo.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Non operare contro vento.

Contenitore previsto per l'uso con sistemi chiusi di travaso.
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori da 200 e 400 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

DA NON VENDERSI SFUSO

HELM AG

HELCOZEB 80 WP

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

HELCOZEB 80 WP

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Mancozeb puro	g 80
Coformulanti q.b. a	g 100

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO

Irritante per le vie respiratorie – Può provocare sensibilizzazione per inalazione e per con-tatto con la pelle - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non respirare gli aerosoli - Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza - In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]

Titolare della registrazione:
HELM AG – Nordkanalstrasse 28
D-20097 Hamburg (Germania) – Tel.: 0049 40 2375 0

Registrazione del Ministero della Salute n° 11640 d el 14/03/2003

Officina di produzione: DUSLO AS - 92703 Sala (Slovacchia)

Contenuto netto: g 500 / kg 1 – 5 – 10 - 25 **Partita n. ....**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. **Effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE

HELCOZEB 80 WP è un fungicida in polvere bagnabile caratterizzato da una elevata azione biologica e preventiva e da lunga persistenza fogliare; la vegetazione trattata con il prodotto beneficia, inoltre, di un certo effetto attivante.

COLTURE, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

POMACEE: contro Ticchiolatura, Ruggine, Alternaria, Septoria, Glomerella impiegare g 150-250/hl d'acqua.
VITE: contro Peronospora impiegare g 150-250/hl d'acqua; contro Escoriosi, Antracnosi, Marciume nero impiegare g 350/hl d'acqua. Contro Escoriosi effettuare due trattamenti: il primo a gemme rigonfie ed il secondo alla comparsa delle prime 2-3 foglie.
POMODORO (fino alla prima fioritura)**:** contro Peronospora, Septoria, Altemaria, Antracnosi, Cladosporiosi impiegare g 200-250/hl d'acqua.
FRUMENTO, ORZO, SEGALE, AVENA: contro Ruggine, Septoria, Alternaria, Elmintosporiosi, Rhynchosporium secalis, Fusarium sp., Cladosporium sp., Ophlobulus sp., Cercosporella sp., Rhizoctonia sp., impiegare, a scopo preventivo ed in relazione al calendario d'incubazione delle malattie, nel periodo compreso tra la fase di botticella e l'emissione della spiga kg 3-4/ha.
TABACCO: contro Peronospora tabacina, Antracnosi impiegare g 100-150/hl d'acqua in semenzaio e g 150-200/hl d'acqua in campo.
PIOPPO: contro Marssonina impiegare g 400-500/hl d'acqua pari a kg 3-3,5/ha per pioppeti fino a 3 anni; 4-4,5 kg/ha per pioppeti oltre i 3 anni.
GAROFANO, ROSA: contro Ruggine, Alternaria, Septoria, Ticchiolatura impiegare g 200-250/hl d'acqua.
Concia delle sementi orticole:
contro Fusarium sp., Rhizoctonia solani, Pythium sp.: impiegare 250-600 g/quintale di seme a seconda della dimensione del seme stesso.
Concia delle sementi di frumento, orzo, avena e segale:
contro Carie, Fusariosi: impiegare g 150/quintale di seme
Concia delle sementi di riso:
contro Brusone, Fusariosi: impiegare g 250/quintale di seme
Concia delle sementi di mais:
contro Carbone, Fusariosi, Gibberella: impiegare g 250/quintale di seme.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: g 600/quintale di seme contro: Fusarium sp., Gibberella Zeae, Pericularia Oryzae, Phoma Betae, Rhizoctonia solani, Cercospora Beticola.

Modalità d'impiego: bagnare abbondantemente ed in maniera uniforme la vegetazione ed i semi da trattare al fine di garantire una perfetta copertura anche nelle parti più nascoste.

DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA

COMPATIBILITÀ

HELCOZEB 80 WP non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. **Avvertenza**: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ Varietà di pero sensibili al mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. SU POMODORO EFFETTUARE TRATTAMENTI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA, OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

ALLEATO 80 WG

FUNGICIDA SISTEMICO IN GRANULI IDRODISPERSIBILI

ALLEATO 80 WG

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Fosetil Alluminio puro	g	80
Coformulanti q.b. a	g	100

IRRITANTE

Frasi di rischio
Rischio di gravi lesioni oculari - Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Titolare della registrazione:
HELM AG – Nordkanalstrasse 28
D-20097 Hamburg (Germania) – Tel.: 0049 40 2375 0

Officina di produzione:
SCHIRM AG Division Promacon – Kipperstrasse, 9c – D44174 Dortmund (Germania)

Registrazione del Ministero della Sanità n°11732 d el 31/07/2003

Contenuto netto: g 100-250-500-kg 1-5-10-25 Partita n°.................

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione informare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE
ALLEATO 80 WG è un fungicida sistemico che penetra rapidamente nei tessuti vegetali muovendosi all'interno della pianta in senso ascendente e discendente, stimolando le difese naturali della pianta e scongiurando, vista la velocità di assorbimento, i problemi legati al dilavamento.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Sciogliere la dose consigliata di prodotto in poca acqua; quindi portare a volume aggiungendo la rimanente acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione. Impiegare a volume normale; per impieghi a volume ridotto, adeguare la concentrazione in modo da distribuire la medesima quantità di principio attivo per ettaro.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

ORTICOLTURA

Cetriolo, Melone, Cocomero: contro Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), effettuare i trattamenti fin dalle prime bagnature infettanti alla dose di 200-300 g/hl d'acqua, distribuendo almeno 3 kg/ha di prodotto. Ripetere i trattamenti ogni 8-10 giorni

Carciofo contro Peronospora (*Bremia lactucae*), **Spinacio** contro Peronospora spinaciae: effettuare trattamenti preventivi alla dose di 200-300 g/hl d'acqua, assicurandosi di distribuire almeno 3 kg/ha di prodotto.

Lattuga: contro Peronospora (*Bremia lactucae*) effettuare trattamenti alla dose di 200-300 g/hl, fin dalle prime fasi vegetative, distribuendo almeno 3 kg/ha di prodotto. Ripetere il trattamento ogni 10-15 giorni. In presenza di forti sbalzi termici possono verificarsi problemi di sensibilità. Per impiego su lattuga romana effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto.

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Fragola: contro Peronospora (*Phytophthora cactorum e fragariae*). Per evitare il deperimento anche in terreni molto infestati immergere le piante, prima del trapianto, in una poltiglia contenente 250 g/hl d'acqua per 15 minuti e far seguire, alla medesima dose, 1 irrorazione in primavera e 2 in autunno; oppure, sempre prima del trapianto, immergerle in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti e far seguire 1 annaffiatura al piede in autunno e 2 in primavera alla dose di g 0,5 di formulato per pianta.

FRUTTICOLTURA

Melo, Pero, Pesco, Actinidia: contro Marciumi radicali (*Phytophthora spp.*) effettuare un trattamento al mese, dalla sfioritura fino al periodo di carenza, alla dose di 250 g/hl. Su piante già debilitate dalla malattia, il cui apparato fogliare non è più in grado di assorbire bene il fungicida, effettuare un'annaffiatura alla loro base (in modo da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino al periodo di carenza, con 1-2 litri per pianta di una poltiglia costituita da kg 5 di prodotto per 100 litri d'acqua.

Melo, Pero: contro Ticchiolatura (*Venturia inaequalis e pirina*) effettuare trattamenti preventivi a 150-250 g/hl; nelle fasi pre-fiorali ed immediatamente successive all'allegagione si consiglia l'associazione con fungicidi di copertura (rame escluso) o con dodina.

Pero: contro Maculatura bruna (*Stemphyllium sp.*), Colpo di fuoco (*Erwinia amylovora*) effettuare trattamenti preventivi alla dose di 250 g/hl d'acqua. Contro maculatura bruna ridurre la dose a 150 g/hl in caso di trattamenti in associazione con prodotti di copertura efficaci anche contro questa malattia.

Vite: contro Peronospora intervenire preventivamente ogni 10-12 giorni con trattamenti alla dose di 250 g/hl di acqua. Si consiglia sempre l'associazione con formulati di copertura (rame escluso).

Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo: contro Gommosi (*Phytophtora spp.*) effettuare trattamenti fogliari in primavera ed autunno alla dose di 200-300 g/hl d'acqua, utilizzando 10 litri di poltiglia per pianta. Quando le piante si presentano fortemente debilitate dalla malattia e gli apparati fogliari non sono più in grado di assorbire completamente il fungicida, integrare i trattamenti alla vegetazione con pennellature sulle parti infette del legno (tronco e branche).

Vivai di fruttiferi: effettuare, con cadenza mensile, irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl contro *Phytophthora*.

Vivai di agrumi: impiegare ad una dose di 400 g/hl d'acqua ogni 60 giorni contro *Phytophthora*.

COLTURE ORNAMENTALI (in pieno campo ed in serra): Contro Marciume radicale (*Phytophthora cinnamoni*) di conifere, Rododendro ed altre ericacee, Poinsettia, St. Paulia e Crisantemo, effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con g 5-10 di formulato per mq una volta al mese in primavera. Contro Ficomiceti (*Phytophtora, Plasmopara, Bremia*) che possono attaccare le colture ornamentali, effettuare trattamenti ogni 10-14 giorni alla dose di 200-300 g/hl d'acqua fin dalle prime fasi vegetative.

TAPPETI ERBOSI DI GRAMINACEE: contro i deperimenti causati da Pythium (*Pythium aphanidermatum, Pythium myriotylum, Pythium arrhenomanes, Pythium vanteropoolli, Pythium graminicola, Pythium perilum*) effettuare trattamenti alla dose di 24 kg/ha diluiti in 5-10 ettolitri d'acqua. Effettuare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia e ripetere ogni 2-3 settimane.

COMPATIBILITÀ ALLEATO 80 WG non è compatibile con formulati a base di rame o a reazione fortemente acida o alcalina e con concimi fogliari contenenti azoto. Non effettuare miscele con formulati oleosi, né irrorare il prodotto su colture che ne siano state precedentemente trattate in quanto si ostacolerebbe la penetrazione del prodotto nella pianta. Si consiglia di effettuare una prova di compatibilità prima di ogni miscela. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLI DI SICUREZZA
CARCIOFI, CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, LATTUGA, SPINACI: 15 GIORNI
FRAGOLE: 30 GIORNI
MELE, PERE, PESCHE, ACTINIDIE, UVE: 40 GIORNI
ARANCE, LIMONI, MANDARINI, POMPELMI: 80 GIORNI

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta formato ridotto per confezioni da g 100

ALLEATO 80 WG

FUNGICIDA SISTEMICO IN GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Fosetil Alluminio puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari - Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE

Registrazione n° **11732 del 31/07/2003** del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 100

Partita n......

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]

Titolare della registrazione **HELM AG**
Nordkanalstrasse 28 - D-20097 Hamburg (Germania) – Tel.: 0049 40 2375 0

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO – SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.a.

NU LURE®

ESCA PROTEICA PER LA PREPARAZIONE DI ESCHE INSETTICIDE CONTRO LA MOSCA DELLE OLIVE, LA MOSCA DEGLI AGRUMI E LA MOSCA DELLE CILIEGIE

LIQUIDO SOLUBILE

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Proteine idrolizzate pure g 36
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (BERGAMO)

OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
IRCA Service S.p.A. - S.S. Cremasca 591, n. 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
L.I.F.A. S.p.A. - Via C. Colombo 7/7a - 30030 Vigonovo (PD)

Registrazione n. 6816 del 29.10.1986 del Ministero della Sanità

Contenuto: 200 - 250 - 500 cc; 1 - 2 - 5 - 10 - 20 litri

Riferimento Partita n. _______________

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, mostrandogli l'etichetta del prodotto che é stato miscelato con NU LURE®.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Trattamenti da terra: impiegare NU LURE® alla concentrazione dell'1 % in miscela con l'insetticida alla dose ugualmente consigliata. A seconda dello sviluppo della chioma, impiegare da 250 a 500 cc di miscela insetticida per pianta. Eseguire il trattamento solo su alcuni rami preferibilmente quelli esposti ad un maggiore soleggiamento. Per l'applicazione usare preferibilmente pompe a volume normale ad alta pressione onde ottenere la perfetta nebulizzazione della miscela insetticida. Come insetticidi impiegare prodotti che abbiano una persistenza almeno pari a quella del NU LURE®. Per una buona riuscita della lotta è necessario eseguire 2 - 4 trattamenti, distanziati l'uno dall'altro di circa 20-30 giorni. Per un più preciso confronto tenere in evidenza la comparsa degli adulti usando opportune trappole per monitoraggio.

COMPATIBILITA'
Il prodotto deve essere miscelato ad insetticidi.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Per la sospensione dei trattamenti attenersi a quanto indicato sulle confezioni dell'insetticida usato in miscela.

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Rischi di nocività: quello previsto per l'insetticida al quale il prodotto viene aggiunto.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Rev. 0106

LEPINOX®

BIOINSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE A BASE DI BT SELETTIVO CONTRO LARVE DI LEPIDOTTERI

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Tossine attive contro larve di lepidotteri derivanti da *Bacillus thuringiensis* varietà Kurstaki sierotipo H-3A, 3b ceppo EG2371	g 10,00
Coformulanti q.b. a	g 100

Potenza: 24.000 UI T.ni/mg di formulato. Agisce per ingestione contro larve di lepidotteri.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo)

OFFICINA DI PRODUZIONE
ECOGEN INC. - 2005 Cabot Boulevard West - Langhorne, PA 19047 - 1810 (USA)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
ECOGEN INC. - 2005 Cabot Boulevard West - Langhorne, PA 19047 - 1810 (USA)
LIFA S.r.l. - Via Cristoforo Colombo 7/7 a - 30030 Vigonovo (VE)
SINAPAK S.n.c. - Via dell'Industria e dell'Artigianato, 7 - 27049 Stradella (PV)
FITOFORMULA S.r.l. - Via Nettunense km. 23,400 - 04011 Aprilia (LT)

Registrazione n. 8228 del 23.03.1993 del Ministero della Sanità

Contenuto: 50 - 100 - 500 g; 1 - 2 kg

Riferimento Partita n. ______________ **Data di fabbricazione** ________________

LEPINOX® è un marchio registrato da Intrachem Bio Italia S.p.A.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA PER LA CONSERVAZIONE
Conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato; a temperatura ambiente (21 - 24 °C) il prodotto è stabile per 2 anni; chiudere ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata.

CARATTERISTICHE
LEPINOX® è un insetticida biologico ad elevata specificità di azione contro le larve di lepidotteri. Le larve per infettarsi devono ingerire il prodotto: trattare larve giovani che si nutrono con voracità, prima che si sia verificato un eccessivo danno fogliare. Effettuare gli interventi quando i fitofagi sono all'esterno del vegetale e, in ogni caso, ai primi stadi larvali (I e II). Dopo aver consumato la dose letale di LEPINOX®, le larve cessano di alimentarsi ma possono rimanere sulle foglie parecchi giorni prima di morire. Le larve morenti si muovono adagio, scoloriscono, si accartocciano e anneriscono prima di morire. Una completa e ricoprente irrorazione è essenziale per un buon controllo degli insetti. Su alcune colture può essere necessario l'uso degli ugelli direzionali. Irrorare con attrezzature che, munite di pompe a volume, distribuiscano volumi medio alti di acqua.

CAMPI, DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO
FRUTTIFERI
- Pomacee (melo, pero, cotogno): Tortricidi (Archips, Pandemis, Capua, Eulia) 1 - 2 kg/ha.
- Drupacee (pesco, comprese nettarine e percoche, albicocco, susino, ciliegio): Cidia, Anarsia, Grapholita, Cheimatobia 1 - 2 kg/ha.
- Kiwi: Eulia e Tignole 1 - 2 kg/ha.
- Agrumi: Prays citri 1 - 2 kg/ha.
- Olivo: Prays oleae 1 - 2 kg/ha.

VITE DA VINO E DA TAVOLA
- Tignole 1 - 2 kg/ha.

ORTAGGI
- Cavoli (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo verza, cavolo cappuccio, cavolo cinese, cavolo di Bruxelles, cavolo rapa): Cavolaia 1 - 2 kg/ha; Mamestra 2 - 3 kg/ha.
- Carciofo: Gorthynia spp. (nottue del carciofo), Depressaria e. 1- 2 kg/ha.
- Ortaggi a foglia (lattuga, cicoria, indivia, radicchio, scarola, rucola, valerianella, spinacio, bietole da foglia e da costa, cardo, sedano, finocchio, prezzemolo, erba cipollina, basilico): Nottue 1 - 2 kg/ha; Mamestra 2 - 4 kg/ha.
- Fagiolo e fagiolino: Piralide 1-2 kg/ha.
- Cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo): Nottue 1 - 2 kg/ha.
- Solanacee (pomodoro, patata, peperone, melanzana): Nottue, Piralide, Ptorimea 1 - 2 kg/ha; Heliothis, Mamestra 2- 4 kg/ha.

FRAGOLA: Tortricidi (Argyrotaenia p.; Pandemis d.) 1 - 2 kg/ha.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: Agrotidi 1 - 2 kg/ha; Mamestra 2 - 4 kg/ha.
OLEAGINOSE
- Girasole, soia, colza, ravizzone: Nottue 1- 2 kg/ha.

Rev. 0106

MAIS: Piralide, Nottue 1 - 2 kg/ha.
TABACCO: Nottue 1 - 2 kg/ha; Heliothis 2 - 4 kg/ha.
FLOREALI ed ORNAMENTALI: Nottue 1 - 2 kg/ha.
PIOPPO: Hyphantria (bruco americano) 1 - 2kg/ha.
FORESTALI: Hyphantria (bruco americano), Limantria, Hyponomeuta, Processionarie, Tortrix, Euproctis c., Evertia b. 1 - 2 kg/ha.

Intervenire nella fase di schiusura uova e su larve giovani (1ª età). Ripetere il trattamento dopo 7 - 10 giorni in caso di infestazione prolungata. Condizioni locali possono consigliare l'uso di LEPINOX® in momenti specifici: in tal caso attenersi alle indicazioni tecniche regionali.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE
LEPINOX® può essere applicato con irroratori convenzionali che distribuiscono una quantità di acqua sufficiente a ricoprire completamente le piante infestate. Non applicare questo prodotto mediante sistemi di irrigazione. Per ottenere una appropriata dispersione in acqua, prima riempire il serbatoio dell'irroratore con la quantità di acqua desiderata e poi aggiungere lentamente LEPINOX® sotto continua ed energica agitazione fino a miscelazione completa. Mantenere l'agitazione durante il caricamento, il trasferimento e l'irrorazione. Non usare più il prodotto se non utilizzato entro le 12 ore. Svuotare e risciacquare completamente l'irroratore ogni volta dopo l'uso. Non contaminare le acque con i risciacqui dell'irroratore.

PRECAUZIONI
Evitare l'uso di acqua con pH superiore a 8 o utilizzare un prodotto tampone. Per migliorare la durata del trattamento si raccomanda l'utilizzo di un bagnante - adesivante su piante con difficile bagnatura.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con prodotti alcalini quali Poltiglia Bordolese etc.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservare le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Usare indumenti di protezione per agenti biologici, classificati come dispositivi di protezione individuale e con relativa marcatura CE per la protezione da agenti biologici, e guanti, quali dispositivi di protezione individuale con relativa marcatura CE e conformità alla EN 374.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Rev. 0106

- FOGLIO ILLUSTRATIVO -

LEPINOX®

BIOINSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE A BASE DI BT SELETTIVO CONTRO LARVE DI LEPIDOTTERI

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Tossine attive contro larve di lepidotteri derivanti da
Bacillus thuringiensis varietà Kurstaki sierotipo II-3A, 3b ceppo EG2371 g 10,00
Coformulanti q.b. a g 100

Potenza: 24.000 UI T.ni/mg di formulato. Agisce per ingestione contro larve di lepidotteri.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

AVVERTENZA PER LA CONSERVAZIONE
Conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato; a temperatura ambiente (21 - 24 °C) il prodotto è stabile per 2 anni; chiudere ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata.

CARATTERISTICHE
LEPINOX® è un insetticida biologico ad elevata specificità di azione contro le larve di lepidotteri. Le larve per infettarsi devono ingerire il prodotto: trattare larve giovani che si nutrono con voracità, prima che si sia verificato un eccessivo danno fogliare. Effettuare gli interventi quando i fitofagi sono all'esterno del vegetale e, in ogni caso, ai primi stadi larvali (I e II). Dopo aver consumato la dose letale di LEPINOX®, le larve cessano di alimentarsi ma possono rimanere sulle foglie parecchi giorni prima di morire. Le larve morenti si muovono adagio, scoloriscono, si accartocciano e anneriscono prima di morire. Una completa e ricoprente irrorazione è essenziale per un buon controllo degli insetti. Su alcune colture può essere necessario l'uso degli ugelli direzionali. Irrorare con attrezzature che, munite di pompe a volume, distribuiscano volumi medio alti di acqua.

CAMPI, DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO
FRUTTIFERI
- Pomacee (melo, pero, cotogno): Tortricidi (Archips, Pandemis, Capua, Eulia) 1 - 2 kg/ha.
- Drupacee (pesco, comprese nettarine e percoche, albicocco, susino, ciliegio): Cidia, Anarsia, Grapholita, Cheimatobia 1 - 2 kg/ha.
- Kiwi: Eulia e Tignole 1 - 2 kg/ha.
- Agrumi: Prays citri 1 - 2 kg/ha.
- Olivo: Prays oleae 1 - 2 kg/ha.

VITE DA VINO E DA TAVOLA
- Tignole 1 - 2 kg/ha.

ORTAGGI
- Cavoli (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo verza, cavolo cappuccio, cavolo cinese, cavolo di Bruxelles, cavolo rapa): Cavolaia 1 - 2 kg/ha; Mamestra 2 - 3 kg/ha.
- Carciofo: Gorthynia spp. (nottue del carciofo), Depressaria e. 1- 2 kg/ha.
- Ortaggi a foglia (lattuga, cicoria, indivia, radicchio, scarola, rucola, valerianella, spinacio, bietole da foglia e da costa, cardo, sedano, finocchio, prezzemolo, erba cipollina, basilico): Nottue 1 - 2 kg/ha; Mamestra 2 - 4 kg/ha.
- Fagiolo e fagiolino: Piralide 1-2 kg/ha.
- Cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo): Nottue 1 - 2 kg/ha.
- Solanacee (pomodoro, patata, peperone, melanzana): Nottue, Piralide, Ptorimea 1 - 2 kg/ha; Heliothis, Mamestra 2- 4 kg/ha.

FRAGOLA: Tortricidi (Argyrotaenia p.; Pandemis d.) 1 - 2 kg/ha.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: Agrotidi 1 - 2 kg/ha; Mamestra 2 - 4 kg/ha.
OLEAGINOSE
- Girasole, soia, colza, ravizzone: Nottue 1- 2 kg/ha.

MAIS: Piralide, Nottue 1 - 2 kg/ha.
TABACCO: Nottue 1 - 2 kg/ha; Heliothis 2 - 4 kg/ha.
FLOREALI ed ORNAMENTALI: Nottue 1 - 2 kg/ha.
PIOPPO: Hyphantria (bruco americano) 1 - 2kg/ha.
FORESTALI: Hyphantria (bruco americano), Limantria, Hyponomeuta, Processionarie, Tortrix, Euproctis c., Evertia b. 1 - 2 kg/ha.

Intervenire nella fase di schiusura uova e su larve giovani (1ª età). Ripetere il trattamento dopo 7 - 10 giorni in caso di infestazione prolungata. Condizioni locali possono consigliare l'uso di LEPINOX® in momenti specifici: in tal caso attenersi alle indicazioni tecniche regionali.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE
LEPINOX® può essere applicato con irroratori convenzionali che distribuiscono una quantità di acqua sufficiente a ricoprire completamente le piante infestate. Non applicare questo prodotto mediante sistemi di irrigazione. Per ottenere una appropriata dispersione in acqua, prima riempire il serbatoio dell'irroratore con la quantità di acqua desiderata e poi aggiungere lentamente LEPINOX® sotto continua ed energica agitazione fino a miscelazione completa. Mantenere l'agitazione durante il caricamento, il trasferimento e l'irrorazione. Non usare più il prodotto se non utilizzato entro le 12 ore. Svuotare e risciacquare completamente l'irroratore ogni volta dopo l'uso. Non contaminare le acque con i risciacqui dell'irroratore.

Rev. 0106

PRECAUZIONI
Evitare l'uso di acqua con pH superiore a 8 o utilizzare un prodotto tampone. Per migliorare la durata del trattamento si raccomanda l'utilizzo di un bagnante - adesivante su piante con difficile bagnatura.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservare le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Usare indumenti di protezione per agenti biologici, classificati come dispositivi di protezione individuale e con relativa marcatura CE per la protezione da agenti biologici, e guanti, quali dispositivi di protezione individuale con relativa marcatura CE e conformità alla EN 374.

Rev. 0106

- ETICHETTA RIDOTTA -

LEPINOX®

BIOINSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE A BASE DI BT
SELETTIVO CONTRO LARVE DI LEPIDOTTERI

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Tossine attive contro larve di lepidotteri derivanti da
Bacillus thuringiensis varietà Kurstaki sierotipo H-3A, 3b ceppo EG2371 g 10.00
Coformulanti q.b. a g 100

Potenza: 24.000 UI T.ni/mg di formulato. Agisce per ingestione contro larve di lepidotteri.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo)

OFFICINA DI PRODUZIONE
ECOGEN INC. - 2005 Cabot Boulevard West - Langhorne, PA 19047 - 1810 (USA)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
ECOGEN INC. - 2005 Cabot Boulevard West - Langhorne, PA 19047 - 1810 (USA)
LIFA S.r.l. - Via Cristoforo Colombo 7/7 a - 30030 Vigonovo (VE)
SINAPAK S.n.c. - Via dell'Industria e dell'Artigianato, 7 - 27049 Stradella (PV)
FITOFORMULA S.r.l. - Via Nettunense km. 23,400 - 04011 Aprilia (LT)

Registrazione n. 8228 del 23.03.1993 del Ministero della Sanità

Contenuto: 50 - 100 g

Riferimento Partita n. _______________ Data di fabbricazione ________________

LEPINOX® è un marchio registrato da Intrachem Bio Italia S.p.A

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con prodotti alcalini quali Poltiglia Bordolese etc.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO - DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Rev. 0106

RAPAX®

BIOINSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA A BASE DI BT
SELETTIVO CONTRO LARVE DI LEPIDOTTERI

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Tossine attive contro larve di lepidotteri derivanti da
Bacillus thuringiensis varietà Kurstaki sierotipo H-3A, 3b ceppo EG2348 g 7,50 (= 71,25 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Potenza: 24.000 UI T.ni/mg di formulato. Agisce per ingestione contro larve di lepidotteri.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo)

OFFICINA DI PRODUZIONE
ECOGEN INC. - 2005 Cabot Boulevard West - Langhorne, PA 19047 - 1810 (USA)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
ECOGEN INC. - 2005 Cabot Boulevard West - Langhorne, PA 19047 - 1810 (USA)
LIFA S.r.l. - Via Cristoforo Colombo 7/7 a - 30030 Vigonovo (VE)
I.R.C.A. Service S.p.A. - S.S. Cremasca 591, 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
Torre S.r.l. - Via Pian d'Asso - Torrenieri fraz. di Montalcino (SI)
ISAGRO COPPER S.r.l. - Loc. Cavanella Po - 45011 Adria (RO)

Registrazione n. 8229 del 23.03.1993 del Ministero della Sanità

Contenuto: 50 - 100 - 200 - 250 - 500 cc; 1 - 2 - 10 litri

Riferimento Partita n. ______________ **Data di fabbricazione** ________________

RAPAX® è un marchio registrato da Intrachem Bio Italia S.p.A.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA PER LA CONSERVAZIONE
Conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato; a temperatura ambiente (21 - 24 °C) il prodotto è stabile per 2 anni; chiudere ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata.

CARATTERISTICHE
RAPAX® è un insetticida biologico ad elevata specificità di azione contro le larve di lepidotteri. Le larve per infettarsi devono ingerire il prodotto: trattare larve giovani che si nutrono con voracità, prima che si sia verificato un eccessivo danno fogliare. Effettuare gli interventi quando i fitofagi sono all'esterno del vegetale e, in ogni caso, ai primi stadi larvali (I e II). Dopo aver consumato la dose letale di RAPAX®, le larve cessano di alimentarsi ma possono rimanere sulle foglie parecchi giorni prima di morire. Le larve morenti si muovono adagio, scoloriscono, si accartocciano e anneriscono prima di morire. Una completa e ricoprente irrorazione è essenziale per un buon controllo degli insetti. Su alcune colture può essere necessario l'uso degli ugelli direzionali. Intervenire con attrezzature che, munite di pompe a volume, distribuiscano volumi medio alti di acqua.

CAMPI, DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO
FRUTTIFERI
- Pomacee (melo, pero, cotogno): Tortricidi (Archips, Pandemis, Capua, Eulia) 1 - 2 l/ha.
- Drupacee (pesco, comprese nettarine e percoche, albicocco, susino, ciliegio): Cidia, Anarsia, Grapholita, Cheimatobia 1 - 2 l/ha.
- Kiwi: Eulia e Tignola 1 - 2 l/ha.
- Agrumi: Prays citri 1 - 2 l/ha.
- Olivo: Prays oleae 1 - 2 l/ha.

VITE DA VINO E DA TAVOLA
- Tignole 0,75-1 l/ha.

ORTAGGI
- Cavoli (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo verza, cavolo cappuccio, cavolo cinese, cavolo di Bruxelles, cavolo rapa): Cavolaia 1 - 2 l/ha; Mamestra 3 - 4 l/ha.
- Carciofo: Gorthynia spp. (nottua del carciofo), Depressaria e. 1- 2 l/ha.
- Ortaggi a foglia (lattuga, cicoria, indivia, radicchio, scarola, rucola, valerianella, spinacio, bietole da foglia e da costa, cardo, sedano, finocchio, prezzemolo, erba cipollina, basilico): Nottue 1 - 2 l/ha; Mamestra 3 - 4 l/ha.
- Fagiolo e fagiolino: Piralide 1-2 l/ha.
- Cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo): Nottue 1 - 2 l/ha.
- Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana): Nottue, Piralide, Ptorimea 1 - 2 l/ha; Heliothis, Mamestra 3 - 4 l/ha.

PATATA: Nottue, Ptorimea 1-2 l/ha.
FRAGOLA: Tortricidi (Argyrotaenia p.; Pandemis d.) 1 - 2 l/ha.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: Agrotidi 1 - 2 l/ha; Mamestra 3 - 4 l/ha.

Rev. 1105

OLEAGINOSE
- Girasole, soia, colza, ravizzone: Nottue 1- 2 l/ha.
MAIS: Piralide. Nottue 1 - 2 l/ha.
TABACCO: Nottue 1 - 2 l/ha; Heliothis 3 - 4 l/ha.
FLOREALI ed ORNAMENTALI: Nottue 1 - 2 l/ha.
PIOPPO: Hyphantria (bruco americano) 1- 2 l/ha.
FORESTALI: Hyphantria (bruco americano), Limantria, Hyponomeuta, Processionaria, Tortrix, Euproctis c., Evertia b. 1 - 2 l/ha.

Intervenire nella fase di schiusura uova e su larve giovani (1ª età). Ripetere il trattamento dopo 7 - 10 giorni in caso di infestazione prolungata. Condizioni locali possono consigliare l'uso di RAPAX® in momenti specifici: in tal caso attenersi alle indicazioni tecniche regionali.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE
RAPAX® può essere applicato con irroratori convenzionali che distribuiscono una quantità di acqua sufficiente a ricoprire completamente le piante infestate. Per ottenere una adeguata dispersione in acqua, prima riempire il serbatoio dell'irroratore con la quantità di acqua desiderata e poi aggiungere RAPAX®. Provvedere ad una moderata agitazione idraulica o meccanica durante la preparazione, il trasferimento e l'irrorazione della miscela. Per ottenere i migliori risultati agitare bene il flacone contenente il prodotto, versarne la metà nell'irroratore, riagitare nuovamente il flacone con metà prodotto e versarlo nell'irroratore. Non aggiungere acqua nel flacone fino a che non è completamente vuoto. Se si vuole aggiungere un adesivante alla soluzione, aggiungerlo per ultimo. Non usare più il prodotto se non utilizzato entro le 12 ore.
Svuotare e risciacquare completamente l'irroratore ogni volta dopo l'uso. Non contaminare le acque con i risciacqui dell'irroratore.

PRECAUZIONI
Evitare l'uso di acqua con pH superiore a 8 o utilizzare un prodotto tampone.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con prodotti alcalini quali Poltiglia Bordolese etc.

FITOTOSSICITA'
Fare attenzione alla miscele di RAPAX® con altri prodotti a base di olio o agenti bagnanti poiché potrebbero aumentare il rischio di fitotossicità. In caso si notino fenomeni di fitotossicità, sospendere immediatamente i trattamenti.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservare le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Usare indumenti di protezione per agenti biologici, classificati come dispositivi di protezione individuale e con relativa marcatura CE per la protezione da agenti biologici, e guanti, quali dispositivi di protezione individuale con relativa marcatura CE e conformità alla EN 374.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Rev. 1105

- FOGLIO ILLUSTRATIVO -

RAPAX®

BIOINSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA A BASE DI BT SELETTIVO CONTRO LARVE DI LEPIDOTTERI

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Tossine attive contro larve di lepidotteri derivanti da
Bacillus thuringiensis varietà Kurstaki sierotipo H-3A, 3b ceppo EG2348 g 7,50 (= 71,25 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Potenza: 24.000 UI T.ni/mg di formulato. Agisce per ingestione contro larve di lepidotteri.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

AVVERTENZA PER LA CONSERVAZIONE
Conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato; a temperatura ambiente (21 - 24 °C) il prodotto è stabile per 2 anni; chiudere ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata.

CARATTERISTICHE
RAPAX® è un insetticida biologico ad elevata specificità di azione contro le larve di lepidotteri. Le larve per infettarsi devono ingerire il prodotto: trattare larve giovani che si nutrono con voracità, prima che si sia verificato un eccessivo danno fogliare. Effettuare gli interventi quando i fitofagi sono all'esterno del vegetale e, in ogni caso, ai primi stadi larvali (I e II). Dopo aver consumato la dose letale di RAPAX®, le larve cessano di alimentarsi ma possono rimanere sulle foglie parecchi giorni prima di morire. Le larve morenti si muovono adagio, scoloriscono, si accartocciano e anneriscono prima di morire. Una completa e ricoprente irrorazione è essenziale per un buon controllo degli insetti. Su alcune colture può essere necessario l'uso degli ugelli direzionali. Intervenire con attrezzature che, munite di pompe a volume, distribuiscano volumi medio alti di acqua.

CAMPI, DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO
FRUTTIFERI
- Pomacee (melo, pero, cotogno): Tortricidi (Archips, Pandemis, Capua, Eulia) 1 - 2 l/ha.
- Drupacee (pesco, comprese nettarine e percoche, albicocco, susino, ciliegio): Cidia, Anarsia, Grapholita, Cheimatobia 1 - 2 l/ha.
- Kiwi: Eulia e Tignola 1 - 2 l/ha.
- Agrumi: Prays citri 1 - 2 l/ha.
- Olivo: Prays oleae 1 - 2 l/ha.
VITE DA VINO E DA TAVOLA
- Tignole 0,75-1 l/ha.
ORTAGGI
- Cavoli (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo verza, cavolo cappuccio, cavolo cinese, cavolo di Bruxelles, cavolo rapa): Cavolaia 1 - 2 l/ha; Mamestra 3 - 4 l/ha.
- Carciofo: Gorthynia spp. (nottua del carciofo), Depressaria e. 1- 2 l/ha.
- Ortaggi a foglia (lattuga, cicoria, indivia, radicchio, scarola, rucola, valerianella, spinacio, bietole da foglia e da costa, cardo, sedano, finocchio, prezzemolo, erba cipollina, basilico): Nottue 1 - 2 l/ha; Mamestra 3 - 4 l/ha.
- Fagiolo e fagiolino: Piralide 1-2 l/ha.
- Cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo): Nottue 1 - 2 l/ha.
- Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana): Nottue, Piralide, Ptorimea 1 - 2 l/ha; Heliothis, Mamestra 3 - 4 l/ha.
PATATA: Nottue, Ptorimea 1-2 l/ha.
FRAGOLA: Tortricidi (Argyrotaenia p.; Pandemis d.) 1 - 2 l/ha.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: Agrotidi 1 - 2 l/ha; Mamestra 3 - 4 l/ha.

OLEAGINOSE
- Girasole, soia, colza, ravizzone: Nottue 1- 2 l/ha.
MAIS: Piralide, Nottue 1 - 2 l/ha.
TABACCO: Nottue 1 - 2 l/ha; Heliothis 3 - 4 l/ha.
FLOREALI ed ORNAMENTALI: Nottue 1 - 2 l/ha.
PIOPPO: Hyphantria (bruco americano) 1- 2 l/ha
FORESTALI: Hyphantria (bruco americano), Limantria, Hyponomeuta, Processionaria, Tortrix, Euproctis c., Evertia b. 1 - 2 l/ha.

Intervenire nella fase di schiusura uova e su larve giovani (1ª età). Ripetere il trattamento dopo 7 - 10 giorni in caso di infestazione prolungata. Condizioni locali possono consigliare l'uso di RAPAX® in momenti specifici: in tal caso attenersi alle indicazioni tecniche regionali.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE
RAPAX® può essere applicato con irroratori convenzionali che distribuiscono una quantità di acqua sufficiente a ricoprire completamente le piante infestate. Per ottenere una adeguata dispersione in acqua, prima riempire il serbatoio dell'irroratore con la quantità di acqua desiderata e poi aggiungere RAPAX®. Provvedere ad una moderata agitazione idraulica o meccanica durante la preparazione, il trasferimento e l'irrorazione della miscela. Per ottenere i migliori risultati agitare bene il flacone contenente il prodotto, versarne la metà nell'irroratore, riagitare nuovamente il flacone con metà prodotto e versarlo nell'irroratore. Non aggiungere acqua nel flacone fino a che non è completamente vuoto. Se si vuole aggiungere un adesivante alla soluzione, aggiungerlo per ultimo. Non usare più il prodotto se non utilizzato entro le 12 ore.
Svuotare e risciacquare completamente l'irroratore ogni volta dopo l'uso. Non contaminare le acque con i risciacqui dell'irroratore.

Rev. 0106

PRECAUZIONI
Evitare l'uso di acqua con pH superiore a 8 o utilizzare un prodotto tampone.

FITOTOSSICITA'
Fare attenzione alla miscele di RAPAX® con altri prodotti a base di olio o agenti bagnanti poiché potrebbero aumentare il rischio di fitotossicità. In caso si notino fenomeni di fitotossicità, sospendere immediatamente i trattamenti.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservare le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Usare indumenti di protezione per agenti biologici, classificati come dispositivi di protezione individuale e con relativa marcatura CE per la protezione da agenti biologici, e guanti, quali dispositivi di protezione individuale con relativa marcatura CE e conformità alla EN 374.

Rev. 0106

- ETICHETTA RIDOTTA -

RAPAX®

BIOINSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA A BASE DI BT
SELETTIVO CONTRO LARVE DI LEPIDOTTERI

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Tossine attive contro larve di lepidotteri derivanti da
Bacillus thuringiensis varietà Kurstaki sierotipo H-3A, 3b ceppo EG2348 g 7,50 (= 71,25 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Potenza: 24.000 UI T.ni/mg di formulato. Agisce per ingestione contro larve di lepidotteri.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo)

OFFICINA DI PRODUZIONE
ECOGEN INC. - 2005 Cabot Boulevard West - Langhorne, PA 19047 - 1810 (USA)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
ECOGEN INC. - 2005 Cabot Boulevard West - Langhorne, PA 19047 - 1810 (USA)
LIFA S.r.l. - Via Cristoforo Colombo 7/7 a - 30030 Vigonovo (VE)
I.R.C.A. Service S.p.A. - S.S. Cremasca 591, 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
Torre S.r.l. - Via Pian d'Asso - Torrenieri fraz. di Montalcino (SI)
ISAGRO COPPER S.r.l. - Loc. Cavanella Po - 45011 Adria (RO)

Registrazione n. 8229 del 23.03.1993 del Ministero della Sanità

Contenuto: 50 - 100 cc

Riferimento Partita n. _______________ **Data di fabbricazione** ________________

RAPAX® è un marchio registrato da Intrachem Bio Italia S.p.A.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con prodotti alcalini quali Poltiglia Bordolese etc.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO - DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Rev. 0106

JACK POT® BFC

BIOINSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA A BASE DI BT SELETTIVO CONTRO LARVE DI COLEOTTERI

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Tossine attive contro larve di coleotteri derivanti da
Bacillus thuringiensis varietà Kurstaki sierotipo H-3A, 3b ceppo EG2424 g 7,50 (= 71,24 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Potenza: 26.000 UI L.d./mg di formulato. Agisce per ingestione contro larve di coleotteri.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo)

OFFICINA DI PRODUZIONE
ECOGEN INC. - 2005 Cabot Boulevard West - Langhorne, PA 19047 - 1810 (USA)
AGRIFORMULA S.r.l. - Caselle di Bazzano - Paganica - 67010 L'Aquila

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
I.R.C.A. Service S.p.A - S.S. Cremasca 591 n. 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via Pian d'Asso - Torrenieri fraz. di Montalcino (SI)
LIFA S.r.l. - Via Cristoforo Colombo 7/7 a - 30030 Vigonovo (VE)
CHEMIA S.p.A. - Strada Statale 255, km 46 - S. Agostino (FE)
AGRIFORMULA S.r.l. - Caselle di Bazzano - Paganica - 67010 L'Aquila

Registrazione n. 8230 del 23.03.1993 del Ministero della Sanità

Contenuto: 50 - 100 - 200 - 250 - 500 cc; 1 - 2 litri

Riferimento Partita n. ______________ **Data di fabbricazione** ________________

JACK POT® BFC è un marchio registrato da Intrachem Bio Italia S.p.A.

NORME PRECAZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE
Conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato; a temperatura ambiente (21 - 24 °C) il prodotto è stabile per 2 anni; chiudere ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata.

CARATTERISTICHE
JACK POT® BFC è un insetticida biologico ad elevata specificità di azione contro le larve di coleotteri. Le larve per infettarsi devono ingerire il prodotto: trattare larve giovani che si nutrono con voracità, prima che si sia verificato un eccessivo danno fogliare. Effettuare gli interventi quando i fitofagi sono all'esterno del vegetale e, in ogni caso, ai primi stadi larvali (I e II). Dopo aver consumato la dose letale di JACK POT® BFC, le larve cessano di alimentarsi ma possono rimanere sulle foglie parecchi giorni prima di morire. Le larve morenti si muovono adagio, scoloriscono, si accartocciano e anneriscono prima di morire. Una completa e ricoprente irrorazione è essenziale per un buon controllo degli insetti. Su alcune colture può essere necessario l'uso degli ugelli direzionali.

CAMPI, DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO
JACK POT® BFC è attivo contro le larve di Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*) che infestano: Patata, Peperone, Melanzana, Pomodoro.
* 2,5 - 3 l/ha su larve (I età)
* 3 - 5 l/ha su larve (II età)
Intervenire al comparire delle prime larve ripetendo il trattamento ogni 5 - 10 giorni secondo necessità.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE
JACK POT® BFC può essere applicato con irroratori convenzionali che distribuiscono una quantità d' acqua sufficiente a ricoprire completamente le piante infestate. Per ottenere una adeguata dispersione in acqua, prima riempire il serbatoio dell'irroratore con la quantità di acqua desiderata e poi aggiungere JACK POT® BFC. Provvedere ad una moderata agitazione idraulica o meccanica durante la preparazione, il trasferimento e l'irrorazione della miscela. Per ottenere i migliori risultati agitare bene il flacone contenente il prodotto, versarne la metà nell'irroratore, agitare nuovamente il flacone con metà prodotto e versarlo nello irroratore. Non aggiungere acqua nel flacone fino a che non è completamente vuoto. Se si vuole aggiungere un adesivante alla soluzione, aggiungerlo per ultimo. Non usare più il prodotto se non utilizzato entro le 12 ore.
Svuotare e risciacquare completamente l'irroratore ogni volta dopo l'uso. Non contaminare le acque con i residui dello irroratore. Intervenire con attrezzature che, munite di pompe a volume distribuiscano volumi medio alti di acqua.

PRECAUZIONI
Evitare l'uso di acqua con pH superiore a 8 o utilizzare un prodotto tampone.

Rev. 0106

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con prodotti alcalini quali Poltiglia Bordolese etc.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Fare attenzione alla miscele di JACK POT® BFC con altri prodotti a base di olio o agenti bagnanti poiché potrebbero aumentare il rischio di fitotossicità. In caso si notino fenomeni di fitotossicità, sospendere immediatamente i trattamenti.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Usare indumenti di protezione per agenti biologici, classificati come dispositivi di protezione individuale e con relativa marcatura CE per la protezione da agenti biologici, e guanti, quali dispositivi di protezione individuale con relativa marcatura CE e conformità alla EN 374.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Rev. 0106

- FOGLIO ILLUSTRATIVO -

JACK POT® BFC

BIOINSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA A BASE DI BT SELETTIVO CONTRO LARVE DI COLEOTTERI

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Tossine attive contro larve di coleotteri derivanti da
Bacillus thuringiensis varietà Kurstaki sierotipo H-3A, 3b ceppo EG2424 g 7,50 (= 71,24 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Potenza: 26.000 UI L.d./mg di formulato. Agisce per ingestione contro larve di coleotteri.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE
Conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato; a temperatura ambiente (21 - 24 °C) il prodotto è stabile per 2 anni; chiudere ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata.

CARATTERISTICHE
JACK POT® BFC è un insetticida biologico ad elevata specificità di azione contro le larve di coleotteri. Le larve per infettarsi devono ingerire il prodotto: trattare larve giovani che si nutrono con voracità, prima che si sia verificato un eccessivo danno fogliare. Effettuare gli interventi quando i fitofagi sono all'esterno del vegetale e, in ogni caso, ai primi stadi larvali (I e II). Dopo aver consumato la dose letale di JACK POT® BFC, le larve cessano di alimentarsi ma possono rimanere sulle foglie parecchi giorni prima di morire. Le larve morenti si muovono adagio, scoloriscono, si accartocciano e anneriscono prima di morire. Una completa e ricoprente irrorazione è essenziale per un buon controllo degli insetti. Su alcune colture può essere necessario l'uso degli ugelli direzionali.

CAMPI, DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO
JACK POT® BFC è attivo contro le larve di Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*) che infestano: Patata, Peperone, Melanzana, Pomodoro.
* 2,5 - 3 l/ha su larve (I età)
* 3 - 5 l/ha su larve (II età)
Intervenire al comparire delle prime larve ripetendo il trattamento ogni 5 - 10 giorni secondo necessità.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE
JACK POT® BFC può essere applicato con irroratori convenzionali che distribuiscono una quantità d' acqua sufficiente a ricoprire completamente le piante infestate. Per ottenere una adeguata dispersione in acqua, prima riempire il serbatoio dell'irroratore con la quantità di acqua desiderata e poi aggiungere JACK POT® BFC. Provvedere ad una moderata agitazione idraulica o meccanica durante la preparazione, il trasferimento e l'irrorazione della miscela. Per ottenere i migliori risultati agitare bene il flacone contenente il prodotto, versarne la metà nell'irroratore, agitare nuovamente il flacone con metà prodotto e versarlo nello irroratore. Non aggiungere acqua nel flacone fino a che non è completamente vuoto. Se si vuole aggiungere un adesivante alla soluzione, aggiungerlo per ultimo. Non usare più il prodotto se non utilizzato entro le 12 ore.
Svuotare e risciacquare completamente l'irroratore ogni volta dopo l'uso. Non contaminare le acque con i residui dello irroratore. Intervenire con attrezzature che, munite di pompe a volume distribuiscano volumi medio alti di acqua.

PRECAUZIONI
Evitare l'uso di acqua con pH superiore a 8 o utilizzare un prodotto tampone.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Fare attenzione alla miscele di JACK POT® BFC con altri prodotti a base di olio o agenti bagnanti poiché potrebbero aumentare il rischio di fitotossicità. In caso si notino fenomeni di fitotossicità, sospendere immediatamente i trattamenti.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Usare indumenti di protezione per agenti biologici, classificati come dispositivi di protezione individuale e con relativa marcatura CE per la protezione da agenti biologici, e guanti, quali dispositivi di protezione individuale con relativa marcatura CE e conformità alla EN 374.

Rev. 0106

- ETICHETTA RIDOTTA -

JACK POT® BFC

BIOINSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA A BASE DI BT
SELETTIVO CONTRO LARVE DI COLEOTTERI

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Tossine attive contro larve di coleotteri derivanti da
Bacillus thuringiensis varietà Kurstaki sierotipo H-3A, 3b ceppo EG2424 g 7,50 (= 71,24 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Potenza: 26.000 UI L.d./mg di formulato. Agisce per ingestione contro larve di coleotteri.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo)

OFFICINA DI PRODUZIONE
ECOGEN INC. - 2005 Cabot Boulevard West - Langhorne, PA 19047 - 1810 (USA)
AGRIFORMULA S.r.l. - Caselle di Bazzano - Paganica - 67010 L'Aquila

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
I.R.C.A. Service S.p.A - S.S. Cremasca 591 n. 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via Pian d'Asso - Torrenieri fraz. di Montalcino (SI)
LIFA S.r.l. - Via Cristoforo Colombo 7/7 a - 30030 Vigonovo (VE)
CHEMIA S.p.A. - Strada Statale 255, km 46 - S. Agostino (FE)
AGRIFORMULA S.r.l. - Caselle di Bazzano - Paganica - 67010 L'Aquila

Registrazione n. 8230 del 23.03.1993 del Ministero della Sanità

Contenuto: 50 - 100 cc

Riferimento Partita n. _______________ **Data di fabbricazione** ________________

JACK POT® BFC è un marchio registrato da Intrachem Bio Italia S.p.A.

NORME PRECAZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con prodotti alcalini quali Poltiglia Bordolese etc.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO - DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Rev. 0106

ULTRA FINE OIL®

OLIO INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Olio minerale raffinato (insolfonabilità minima 92 %)
50 % distillato a 213 °C

Campo di distillazione (10 % - 90 %) = _ 18 °C	g	98,8 (= 870 g/l)
Coformulanti	g	1,2

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano dagli alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo)

OFFICINA DI PRODUZIONE
SUN OIL COMPANY INC., PO Box 1135, Marcus Hook PA 19061-0835 USA

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
SUN OIL COMPANY - Ingherhoeveweg 4 - Aarselaar (Belgio)
I.R.C.A Service S.p.A. - S.S. Cremasca 591 n. 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
L.I.F.A. S.r.l. - Via C. Colombo 7/7a - 30030 Vigonovo (VE)
L.I.F.A. S.r.l. - Via Piave - Z.I. Isola Vicentina (VI)
Torre S.r.l.- Via Pian d'Asso - Torrenieri - Fraz. di Montalcino (SI)

Registrazione n. 8882 del 10.06.1996 del Ministero della Sanità

Contenuto: 50 - 100 - 200 - 250 - 500 cc; 1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 25 litri

Riferimento Partita n. _______________

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contato con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se ingerito non indurre vomito, chiamare immediatamente un medico.

AVVERTENZA PER LA CONSERVAZIONE
- conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato;
- chiudere ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata.

CARATTERISTICHE
ULTRA FINE OIL® agisce come un insetticida di contatto. Questo prodotto forma una delicata pellicola sopra l'insetto impedendone la respirazione e causandone quindi la morte. Presenta inoltre un'azione ovicida e anti-schiusura ed ha anche un'azione repellente contro alcuni insetti masticatori. In alcuni casi può avere un certo effetto fungicida. ULTRA FINE OIL® è un olio minerale che, grazie alle sue caratteristiche fisico - chimiche, può essere usato su colture arboree ed erbacee in piena vegetazione, colture orticole e ornamentali sia in pieno campo che in serra, piante d'appartamento.

MODALITA' D'IMPIEGO
Aggiungere sufficiente acqua nella botte per permettere un'agitazione ottimale della pompa. Aggiungere gli eventuali altri prodotti fitosanitari. Se viene usata una formulazione in polvere bagnabile, mescolare molto bene l'acqua e la polvere in modo che la polvere sia totalmente sciolta in acqua prima che l'olio venga aggiunto. Se il prodotto fitosanitario da aggiungere è in formulazione emulsionabile, aggiungerlo dopo che l'olio e l'acqua siano stati attentamente mescolati. Aggiungere l'olio sotto agitazione quando la botte è piena a 3/4. Riempire la botte con acqua fino a formare una soluzione lattescente. Mantenere una buona agitazione durante il caricamento, il trasferimento e durante l'irrorazione. Svuotare e risciacquare accuratamente l'irroratore ogni volta dopo l'uso.
L'insetto da controllare deve essere completamente ricoperto dalla soluzione irrorata.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
FRUTTIFERI
Agrumi (arancio, mandarino, limone, clementino, bergamotto, cedro, pompelmo, tangerino, limetta, chinotto, kumquat, arancio amaro): contro afide verde, cimice, cocciniglie, aleuroidi, tripidi, ragno rosso, in primavera-estate soluzioni al 1 % - 2 %, in inverno 2 % - 3 %.
Drupacee (pesco compresi nettarine e percoche, albicocco, ciliegio dolce e acido, susino, mandorlo): contro cocciniglie, afidi, tripidi, uova di lepidotteri, acari, in primavera-estate soluzioni al 1 % - 2 %, in inverno 2 % - 3 %.
Pomacee (melo, pero, cotogno): contro cocciniglie, afidi, psilla, tignole, uova di lepidotteri, acari, in primavera-estate soluzioni al 1 % - 2 %, in inverno 2 % - 3 %.
Caco, fico, ribes, noce, nocciolo: contro cocciniglie, afidi, uova di lepidotteri, acari, in primavera-estate soluzioni al 1%-2%, in inverno 2%-3%.
Vite (da vino e da tavola): contro afidi, tripidi, cocciniglie, uova di lepidotteri, acari, in primavera-estate soluzioni al 1 % - 2 %, in inverno 2 % - 3 %.
Olivo (olive da olio e da tavola): contro cocciniglie, tignole, in primavera-estate soluzioni al 1 % - 2 %, in inverno 2 % - 3 %.
ORTAGGI
Carciofo: contro afidi, mosca bianca, uova di lepidotteri, ditteri minatori, acari, in periodo vegetativo soluzioni 1 % - 2 %.
Sedano, finocchio: contro afidi, tripidi, mosca bianca, uova di minatori delle foglie, acari, in periodo vegetativo soluzioni al 1 % - 2 %.
Cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo); pomodoro, peperone, fagiolo: contro afidi, tripidi, mosca bianca, minatori delle foglie, uova di lepidotteri e coleotteri, acari, in periodo vegetativo soluzioni al 1 % - 2 %.
Patata: contro afidi, uova di dorifora, in periodo vegetativo soluzione al 1 % - 2 %.

Rev. 0106

Barbabietola da zucchero: contro afidi, adulti di altica e cassida, mosca delle bietole, in periodo vegetativo soluzioni al 1 % - 2 %.
Floreali, ornamentali e forestali: contro afidi, tripidi, cocciniglie, tignole, aleuroidi, acari, in fase vegetativa soluzioni al 1 % - 2 %, in inverno soluzioni al 2 % - 3 %.

FITOTOSSICITA'
Si può avere un rischio di fitotossicità se si trattano le piante durante periodi prolungati con temperature elevate prolungate e alta umidità relativa. Non trattare piante sotto stress idrico. Il prodotto è tossico per le api e gli insetti utili. Non impiegare in fioritura.

COMPATIBILITA'
ULTRA FINE OIL® non è compatibile con dimetoato e con fungicidi quali anilazine, captano, folpet, dinocap, oxythioquinox o qualsiasi altro prodotto contenente zolfo. Qualora si eseguano trattamenti separati con tali prodotti, si consiglia di osservare un intervallo di tempo di almeno 2 settimane. Non usare con dimetoato o carbaryl su alberi da frutto a foglia caduca.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Rev. 0106

- FOGLIO ILLUSTRATIVO -

ULTRA FINE OIL®

OLIO INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Olio minerale raffinato (insolfonabilità minima 92 %)		
50 % distillato a 213 °C		
Campo di distillazione (10 % - 90 %) – = 18 °C	g	98,8 (– 870 g/l)
Coformulanti	g	1,2

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano dagli alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

AVVERTENZA PER LA CONSERVAZIONE
- conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato;
- chiudere ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata.

CARATTERISTICHE
ULTRA FINE OIL® agisce come un insetticida di contatto. Questo prodotto forma una delicata pellicola sopra l'insetto impedendone la respirazione e causandone quindi la morte. Presenta inoltre un'azione ovicida e anti-schiusura ed ha anche un'azione repellente contro alcuni insetti masticatori. In alcuni casi può avere un certo effetto fungicida. ULTRA FINE OIL® è un olio minerale che, grazie alle sue caratteristiche fisico - chimiche, può essere usato su colture arboree ed erbacee in piena vegetazione, colture orticole e ornamentali sia in pieno campo che in serra, piante d'appartamento.

MODALITA' D'IMPIEGO
Aggiungere sufficiente acqua nella botte per permettere un'agitazione ottimale della pompa. Aggiungere gli eventuali altri prodotti fitosanitari. Se viene usata una formulazione in polvere bagnabile, mescolare molto bene l'acqua e la polvere in modo che la polvere sia totalmente sciolta in acqua prima che l'olio venga aggiunto. Se il prodotto fitosanitario da aggiungere è in formulazione emulsionabile, aggiungerlo dopo che l'olio e l'acqua siano stati attentamente mescolati. Aggiungere l'olio sotto agitazione quando la botte è piena a 3/4. Riempire la botte con acqua fino a formare una soluzione lattescente. Mantenere una buona agitazione durante il caricamento, il trasferimento e durante l'irrorazione. Svuotare e risciacquare accuratamente l'irroratore ogni volta dopo l'uso.
L'insetto da controllare deve essere completamente ricoperto dalla soluzione irrorata.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
FRUTTIFERI
Agrumi (arancio, mandarino, limone, clementino, bergamotto, cedro, pompelmo, tangerino, limetta, chinotto, kumquat, arancio amaro): contro afide verde, cimice, cocciniglie, aleuroidi, tripidi, ragno rosso, in primavera-estate soluzioni al 1 % - 2 %, in inverno 2 % - 3 %.
Drupacee (pesco compresi nettarine e percoche, albicocco, ciliegio dolce e acido, susino, mandorlo): contro cocciniglie, afidi, tripidi, uova di lepidotteri, acari, in primavera-estate soluzioni al 1 % - 2 %, in inverno 2 % - 3 %.
Pomacee (melo, pero, cotogno): contro cocciniglie, afidi, psilla, tignole, uova di lepidotteri, acari, in primavera-estate soluzioni al 1 % - 2 %, in inverno 2 % - 3 %.
Caco, fico, ribes, noce, nocciolo: contro cocciniglie, afidi, uova di lepidotteri, acari, in primavera-estate soluzioni al 1%-2%, in inverno 2%-3%.
Vite (da vino e da tavola): contro afidi, tripidi, cocciniglie, uova di lepidotteri, acari, in primavera-estate soluzioni al 1 % - 2 %, in inverno 2 % - 3 %.
Olivo (olive da olio e da tavola): contro cocciniglie, tignole, in primavera-estate soluzioni al 1 % - 2 %, in inverno 2 % - 3 %.
ORTAGGI
Carciofo: contro afidi, mosca bianca, uova di lepidotteri, ditteri minatori, acari, in periodo vegetativo soluzioni 1 % - 2 %.
Sedano, finocchio: contro afidi, tripidi, mosca bianca, uova di minatori delle foglie, acari, in periodo vegetativo soluzioni al 1 % - 2 %.
Cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo); pomodoro, peperone, fagiolo: contro afidi, tripidi, mosca bianca, minatori delle foglie, uova di lepidotteri e coleotteri, acari, in periodo vegetativo soluzioni al 1 % - 2 %.
Patata: contro afidi, uova di dorifora, in periodo vegetativo soluzione al 1 % - 2 %.
Barbabietola da zucchero: contro afidi, adulti di altica e cassida, mosca delle bietole, in periodo vegetativo soluzioni al 1 % - 2 %.
Floreali, ornamentali e forestali: contro afidi, tripidi, cocciniglie, tignole, aleuroidi, acari, in fase vegetativa soluzioni al 1 % - 2 %, in inverno soluzioni al 2 % - 3 %.

FITOTOSSICITA'
Si può avere un rischio di fitotossicità se si trattano le piante durante periodi prolungati con temperature elevate prolungate e alta umidità relativa. Non trattare piante sotto stress idrico. Il prodotto è tossico per le api e gli insetti utili. Non impiegare in fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

Rev. 0106

- ETICHETTA RIDOTTA -

ULTRA FINE OIL®

OLIO INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Olio minerale raffinato (insolfonabilità minima 92 %) 50 % distillato a 213 °C Campo di distillazione (10 % - 90 %) = + 18 °C	g	98,8 (= 870 g/l)
Coformulanti	g	1,2

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano dagli alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo)

OFFICINA DI PRODUZIONE
SUN OIL COMPANY INC., PO Box 1135, Marcus Hook PA 19061-0835 USA

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
SUN OIL COMPANY - Ingberhoeveweg 4 - Aarselaar (Belgio)
I.R.C.A Service S.p.A. - S.S. Cremasca 591 n. 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
L.I.F.A. S.r.l. - Via C. Colombo 7/7a - 30030 Vigonovo (VE)
L.I.F.A. S.r.l. - Via Piave - Z.I. Isola Vicentina (VI)
Torre S.r.l.- Via Pian d'Asso - Torrenieri - Fraz. di Montalcino (SI)

Registrazione n. 8882 del 10.06.1996 del Ministero della Sanità

Contenuto: 50 - 100 cc

Riferimento Partita n. _______________

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contato con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se ingerito non indurre vomito, chiamare immediatamente un medico.

COMPATIBILITA'
ULTRA FINE OIL® non è compatibile con dimetoato e con fungicidi quali anilazine, captano, folpet, dinocap, oxythioquinox o qualsiasi altro prodotto contenente zolfo. Qualora si eseguano trattamenti separati con tali prodotti, si consiglia di osservare un intervallo di tempo di almeno 2 settimane. Non usare con dimetoato o carbaryl su alberi da frutto a foglia caduca.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO - DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Rev. 0106

ULTRA CITRUS®

OLIO INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Olio minerale raffinato (insolfonabilità minima 92 %)	
50 % distillato a 213 °C	
Campo di distillazione (10 % - 90 %) ~ ± 18 °C	g 98,8 (~ 870 g/l)
Coformulanti	g 1,2

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano dagli alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo)

OFFICINA DI PRODUZIONE
SUN OIL COMPANY - Ingberhoeveweg 4 - Aarselaar (Belgio)
I.R.C.A Service S.p.A. - S.S. Cremasca 591 n. 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
L.I.F.A. S.r.l. - Via C. Colombo 7/7a - 30030 Vigonovo (VE)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
L.I.F.A. S.r.l. - Via Piave - Z.I. Isola Vicentina (VI)

Registrazione n. 9937 del 12.02.1999 del Ministero della Sanità

Contenuto: 50 - 100 - 200 - 250 - 500 cc; 1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 25 litri

Riferimento Partita n. _______________

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se ingerito non indurre vomito, chiamare immediatamente un medico.

AVVERTENZA PER LA CONSERVAZIONE:
- conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato;
- chiudere ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata.

CARATTERISTICHE
ULTRA CITRUS® agisce come un insetticida di contatto. Questo prodotto forma una delicata pellicola sopra l'insetto impedendone la respirazione e causandone quindi la morte. Presenta inoltre un'azione ovicida e anti-schiusura ed ha anche un'azione repellente contro alcuni insetti masticatori. In alcuni casi può avere un certo effetto fungicida. ULTRA CITRUS® è un olio minerale che, grazie alle sue caratteristiche fisico - chimiche, può essere usato su colture arboree ed erbacee in piena vegetazione, colture orticole e ornamentali sia in pieno campo che in serra, piante d'appartamento.

MODALITA' D'IMPIEGO
Aggiungere sufficiente acqua nella botte per permettere un'agitazione ottimale della pompa. Aggiungere gli eventuali altri prodotti fitosanitari. Se viene usata una formulazione in polvere bagnabile, mescolare molto bene l'acqua e la polvere in modo che la polvere sia totalmente sciolta in acqua prima che l'olio venga aggiunto. Se il prodotto fitosanitario da aggiungere è in formulazione emulsionabile, aggiungerlo dopo che l'olio e l'acqua siano stati attentamente mescolati. Aggiungere l'olio sotto agitazione quando la botte è piena a 3/4. Riempire la botte con acqua fino a formare una soluzione lattescente. Mantenere una buona agitazione durante il caricamento, il trasferimento e durante l'irrorazione. Svuotare e risciacquare accuratamente l'irroratore ogni volta dopo l'uso.
L'insetto da controllare deve essere completamente ricoperto dalla soluzione irrorata.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
FRUTTIFERI
Agrumi (arancio, mandarino, limone, clementino, bergamotto, cedro, pompelmo, tangerino, limetta, chinotto, kumquat, arancio amaro): contro afide verde, cimice, cocciniglie, aleuroidi, tripidi, ragno rosso, in primavera-estate soluzioni al 1 % - 2 %, in inverno 2 % - 3 %.
Drupacee (pesco compresi nettarine e percoche, albicocco, ciliegio dolce e acido, susino, mandorlo): contro cocciniglie, afidi, tripidi, uova di lepidotteri, acari, in primavera-estate soluzioni al 1 % - 2 %, in inverno 2 % - 3 %.
Pomacee (melo, pero, cotogno): contro cocciniglie, afidi, psilla, tignole, uova di lepidotteri, acari, in primavera-estate soluzioni al 1 % - 2 %, in inverno 2 % - 3 %.
Caco, fico, ribes, noce, nocciolo: contro cocciniglie, afidi, uova di lepidotteri, acari, in primavera-estate soluzioni al 1 % - 2 %, in inverno 2 % - 3 %.
Vite (da vino e da tavola): contro afidi, tripidi, cocciniglie, uova di lepidotteri, acari, in primavera-estate soluzioni al 1 % - 2 %, in inverno 2 % - 3 %.
Olivo (olive da olio e da tavola): contro cocciniglie, tignole, in primavera-estate soluzioni al 1 % - 2 %, in inverno 2 % - 3 %.
ORTAGGI
Carciofo: contro afidi, mosca bianca, uova di lepidotteri, ditteri minatori, acari, in periodo vegetativo soluzioni 1 % - 2 %.
Sedano, finocchio: contro afidi, tripidi, mosca bianca, uova di minatori delle foglie, acari, in periodo vegetativo soluzioni al 1 % - 2 %.
Cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo): pomodoro, peperone, fagiolo: contro afidi, tripidi, mosca bianca, minatori delle foglie, uova di lepidotteri e coleotteri, acari, in periodo vegetativo soluzioni al 1 % - 2 %.
Patata: contro afidi, uova di dorifora, in periodo vegetativo soluzione al 1 % - 2 %.

Rev. 0106

Barbabietola da zucchero: contro afidi, adulti di altica e cassida, mosca delle bietole, in periodo vegetativo soluzioni al 1 % - 2 %.
Floreali, ornamentali e forestali: contro afidi, tripidi, cocciniglie, tignole, aleuroidi, acari, in fase vegetativa soluzioni al 1 % - 2 %, in inverno soluzioni al 2 % - 3 %.

FITOTOSSICITA'
Si può avere un rischio di fitotossicità se si trattano le piante durante periodi prolungati con temperature elevate prolungate e alta umidità relativa. Non trattare piante sotto stress idrico. Il prodotto è tossico per le api e gli insetti utili. Non impiegare in fioritura.

COMPATIBILITA'
ULTRA CITRUS® non è compatibile con dimetoato e con fungicidi quali anilazine, captano, folpet, dinocap, oxythioquinox o qualsiasi altro prodotto contenente zolfo. Qualora si eseguano trattamenti separati con tali prodotti, si consiglia di osservare un intervallo di tempo di almeno 2 settimane. Non usare con dimetoato o carbaryl su alberi da frutto a foglia caduca.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Rev. 0106

- FOGLIO ILLUSTRATIVO -

ULTRA CITRUS®

OLIO INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Olio minerale raffinato (insolfonabilità minima 92 %)
50 % distillato a 213 °C
Campo di distillazione (10 % - 90 %) = ± 18 °C g 98,8 (= 870 g/l)
Coformulanti g 1,2

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano dagli alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

AVVERTENZA PER LA CONSERVAZIONE:
- conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato;
- chiudere ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata.

CARATTERISTICHE
ULTRA CITRUS® agisce come un insetticida di contatto. Questo prodotto forma una delicata pellicola sopra l'insetto impedendone la respirazione e causandone quindi la morte. Presenta inoltre un'azione ovicida e anti-schiusura ed ha anche un'azione repellente contro alcuni insetti masticatori. In alcuni casi può avere un certo effetto fungicida. ULTRA CITRUS® è un olio minerale che, grazie alle sue caratteristiche fisico - chimiche, può essere usato su colture arboree ed erbacee in piena vegetazione, colture orticole e ornamentali sia in pieno campo che in serra, piante d'appartamento.

MODALITA' D'IMPIEGO
Aggiungere sufficiente acqua nella botte per permettere un'agitazione ottimale della pompa. Aggiungere gli eventuali altri prodotti fitosanitari. Se viene usata una formulazione in polvere bagnabile, mescolare molto bene l'acqua e la polvere in modo che la polvere sia totalmente sciolta in acqua prima che l'olio venga aggiunto. Se il prodotto fitosanitario da aggiungere è in formulazione emulsionabile, aggiungerlo dopo che l'olio e l'acqua siano stati attentamente mescolati. Aggiungere l'olio sotto agitazione quando la botte è piena a 3/4. Riempire la botte con acqua fino a formare una soluzione lattescente. Mantenere una buona agitazione durante il caricamento, il trasferimento e durante l'irrorazione. Svuotare e risciacquare accuratamente l'irroratore ogni volta dopo l'uso.
L'insetto da controllare deve essere completamente ricoperto dalla soluzione irrorata.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
FRUTTIFERI
Agrumi (arancio, mandarino, limone, clementino, bergamotto, cedro, pompelmo, tangerino, limetta, chinotto, kumquat, arancio amaro): contro afide verde, cimice, cocciniglie, aleuroidi, tripidi, ragno rosso, in primavera-estate soluzioni al 1 % - 2 %, in inverno 2 % - 3 %.
Drupacee (pesco compresi nettarine e percoche, albicocco, ciliegio dolce e acido, susino, mandorlo): contro cocciniglie, afidi, tripidi, uova di lepidotteri, acari, in primavera-estate soluzioni al 1 % - 2 %, in inverno 2 % - 3 %.
Pomacee (melo, pero, cotogno): contro cocciniglie, afidi, psilla, tignole, uova di lepidotteri, acari, in primavera-estate soluzioni al 1 % - 2 %, in inverno 2 % - 3 %.
Caco, fico, ribes, noce, nocciolo: contro cocciniglie, afidi, uova di lepidotteri, acari, in primavera-estate soluzioni al 1 % - 2 %, in inverno 2 % - 3 %.
Vite (da vino e da tavola): contro afidi, tripidi, cocciniglie, uova di lepidotteri, acari, in primavera-estate soluzioni al 1 % - 2 %, in inverno 2 % - 3 %.
Olivo (olive da olio e da tavola): contro cocciniglie, tignole, in primavera-estate soluzioni al 1 % - 2 %, in inverno 2 % - 3 %.
ORTAGGI
Carciofo: contro afidi, mosca bianca, uova di lepidotteri, ditteri minatori, acari, in periodo vegetativo soluzioni 1 % - 2 %.
Sedano, finocchio: contro afidi, tripidi, mosca bianca, uova di minatori delle foglie, acari, in periodo vegetativo soluzioni al 1 % - 2 %.
Cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo): pomodoro, peperone, fagiolo: contro afidi, tripidi, mosca bianca, minatori delle foglie, uova di lepidotteri e coleotteri, acari, in periodo vegetativo soluzioni al 1 % - 2 %.
Patata: contro afidi, uova di dorifora, in periodo vegetativo soluzione al 1 % - 2 %.
Barbabietola da zucchero: contro afidi, adulti di altica e cassida, mosca delle bietole, in periodo vegetativo soluzioni al 1 % - 2 %.
Floreali, ornamentali e forestali: contro afidi, tripidi, cocciniglie, tignole, aleuroidi, acari, in fase vegetativa soluzioni al 1 % - 2 %, in inverno soluzioni al 2 % - 3 %.

FITOTOSSICITA'
Si può avere un rischio di fitotossicità se si trattano le piante durante periodi prolungati con temperature elevate prolungate e alta umidità relativa. Non trattare piante sotto stress idrico. Il prodotto è tossico per le api e gli insetti utili. Non impiegare in fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

Rev. 0106

- ETICHETTA RIDOTTA -

ULTRA CITRUS®

OLIO INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Olio minerale raffinato (insolfonabilità minima 92 %)		
50 % distillato a 213 °C		
Campo di distillazione (10 % - 90 %) = + 18 °C	g	98,8 (= 870 g/l)
Coformulanti	g	1,2

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano dagli alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo)

OFFICINA DI PRODUZIONE
SUN OIL COMPANY - Ingberhoeveweg 4 - Aarselaar (Belgio)
I.R.C.A Service S.p.A. - S.S. Cremasca 591 n. 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
L.I.F.A. S.r.l. - Via C. Colombo 7/7a - 30030 Vigonovo (VE)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
L.I.F.A. S.r.l. - Via Piave - Z.I. Isola Vicentina (VI)

Registrazione n. 9937 del 12.02.1999 del Ministero della Sanità

Contenuto: 50 - 100 cc

Riferimento Partita n. _______________

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contato con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se ingerito non indurre vomito, chiamare immediatamente un medico.

COMPATIBILITA'
ULTRA CITRUS® non è compatibile con dimetoato e con fungicidi quali anilazine, captano, folpet, dinocap, oxythioquinox o qualsiasi altro prodotto contenente zolfo. Qualora si eseguano trattamenti separati con tali prodotti, si consiglia di osservare un intervallo di tempo di almeno 2 settimane. Non usare con dimetoato o carbaryl su alberi da frutto a foglia caduca.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO - DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Rev. 0106

VAPOR GARD®

ANTITRASPIRANTE - PROTETTIVO

LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Pinolene (di-1-p-menthene) g 96
Emulsionante g 4

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo)

OFFICINA DI PRODUZIONE
MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORP. - Hanover, Pennsylvania - USA

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
I.R.C.A. Service S.p.A. - S.S. Cremasca 591 n. 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
LIFA S.r.l. - Via Cristoforo Colombo 7/7 a - 30030 Vigonovo (VE)
L.I.F.A. S.r.l. - Via Piave - Z.I. Fossanigo - 36033 Isola Vicentina (VI)

Registrazione n. 10116 del 30.07.1999 del Ministero della Sanità

Contenuto: 100 - 250 - 400 - 500 cc; 1 - 4 - 5 - 10 litri

Riferimento Partita n. ______________

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se ingerito chiamare immediatamente un medico.

AVVERTENZA PER LA CONSERVAZIONE
- conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato
- chiudere ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata
- non mettere in congelatore

CARATTERISTICHE
VAPOR GARD® è una emulsione concentrata naturale che ha proprietà antitraspiranti. Opportunamente diluito in acqua ed irrorato sulla vegetazione, VAPOR GARD® è in grado di formare sulle superfici irrorate un reticolo simile ad una pellicola in grado di regolare la traspirazione delle piante.
Il reticolo non ostacola la respirazione e mantiene inalterato lo scambio ossigeno - anidride carbonica, mentre rallenta la perdita di vapor d'acqua attraverso gli stomi.
La traspirazione, ovvero il processo di eliminazione dell'acqua, è una funzione fisiologica per la pianta ed è pertanto un fenomeno impossibile da eliminare specie in quegli organi che effettuano la fotosintesi. La sede principale è la foglia, ma si verifica ugualmente nei giovani germogli e nei fiori; nel caso di giovani tronchi si può avere anche la traspirazione lenticellare mediante la quale l'acqua evapora attraverso le lenticelle del sughero. Nelle piante coltivate può accadere di avere la necessità di controllare la traspirazione per diversi motivi: al fine di rendere più efficienti certe pratiche agronomiche o per evitare stress alle piante in momenti particolari o ancora per trattenere l'umidità fisiologica. In tutti questi casi, VAPOR GARD® può essere di valido aiuto ricoprendo il vegetale con una pellicola invisibile ma efficace, resistente ed elastica.

MODALITA' D'IMPIEGO
VAPOR GARD® è un'emulsione che si disperde facilmente in acqua formando una soluzione che può essere applicata sui vegetali con qualsiasi tipo di irroratrice manuale o meccanica, a volume normale a basso ed ultrabasso volume. Aggiungere sufficiente acqua nella botte per permettere un'agitazione ottimale della pompa. Aggiungere gli eventuali altri prodotti fitosanitari. Se viene usata una formulazione in polvere bagnabile, mescolare molto bene l'acqua e la polvere in modo che la polvere stessa sia totalmente sciolta in acqua prima di aggiungere VAPOR GARD®. Mantenere una buona agitazione durante il caricamento il trasferimento e durante l'irrorazione.
Si consiglia di lavare bene, subito dopo l'uso, l'apparecchiatura usata per l'irrorazione con acqua e kerosene onde evitare la polimerizzazione negli ugelli o nei piccoli orifizi che potrebbero otturarsi.

CAMPI D'IMPIEGO E DOSI

COLTURA	QUANTITA'	EPOCA	EFFETTO
TRATTAMENTI ANTI TRASPIRANTI VERI E PROPRI			
PIANTINE IN VIVAIO O SEMENZAIO	Soluzione 1 - 2 %	1 o 2 giorni prima della consegna per il trapianto	Maggiore resistenza a stress per mancanza di acqua, migliore attecchimento al trapianto
PIANTE APPENA POSTE A DIMORA	Soluzione 1 - 1,5 %	Immediatamente dopo il trapianto	Può migliorare l'attecchimento per minore perdita di umidità

Rev. 0106

COLTURA	QUANTITA'	EPOCA	EFFETTO
TRATTAMENTI ANTI TRASPIRANTI VERI E PROPRI			
TRAPIANTI DI ALBERI A FOGLIA CADUCA IN PRESENZA DI FOGLIE	Soluzione 2 %	Un giorno prima della estirpazione	Può migliorare la percentuale di attecchimento
PERO	Soluzione 0,4 - 0,6 %	Nei momenti di eccessiva evapotraspirazione	Riduce il fenomeno del brusone non parassitario
FIORI RECISI	Soluzione 1- 2 %	Un giorno prima della raccolta	Maggiore durata, aspetto brillante del fiore
TRATTAMENTI ANTITRASPIRANTI - PROTETTIVI			
AGRUMI (arancio – limone – mandarino – clementino)	Soluzione 1 %	25 giorni prima della raccolta	Può migliorare la pezzatura, può ridurre il disseccamento post-raccolta e può migliorare la conservazione
PESCO – NETTARINE – ALBICOCCO – SUSINE	Soluzione 1 %	10 - 15 giorni prima della raccolta	Aumento di peso e colorazione più intensa dei frutti, migliore conservabilità
	Soluzione 0,1 - 0,2 %	In pre raccolta	Può migliorare la conservabilità e può avere effetti positivi contro la monilia
UVA DA TAVOLA	Soluzione 1 %	Circa 20 giorni prima della maturazione	Maturazione più ritardata e migliore conservabilità
ACTINIDIA (Kiwi)	Soluzione 0,1 - 0,2 %	In pre raccolta	Può migliorare la conservabilità e può avere effetti positivi contro botritis
ORTICOLE A FRUTTO	Soluzione 1 – 2 %	Nel periodo in cui è frequente lo stress idrico e/o 10 - 15 giorni dalla raccolta	Aumenta la resistenza a lunghi periodi di siccità, migliora la qualità e conservabilità dei frutti
ORTICOLE A FOGLIA	Soluzione 0,5 – 1 %	Nel periodo in cui è frequente lo stress idrico	Riduce il "Tip burn", aumenta la resistenza alla siccità, aumenta la turgescenza
INNESTI ERBACEI DI ORTICOLE	Soluzione 1 - 1,5 %	Trattare le piante madri il giorno prima del taglio delle marze	Migliore attecchimento degli innesti (melanzane, melone, ecc.)
PATATA	Soluzione 2 %	Dalla piena fioritura fino a due settimane dopo	Aumento di produzione e tuberi più uniformi
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Soluzione 1- 2 %	Nel periodo più caldo della stagione	Protegge dalla disidratazione e aumenta la dimensione della radice

COLTURA	QUANTITA'	EPOCA	EFFETTO
TRATTAMENTI ANTITRASPIRANTI – PROTETTIVI DA AGENTI ATMOSFERICI E FISIOPATIE			
AGRUMI (arancio e mandarino cv. soggette a spacco)	Soluzione 0,2 - 0,3 %	Prima dell'invaiatura 2 - 3 interventi a 20 - 25 giorni	Riduce il fenomeno dello spacco
MELE: VARIETA' SENSIBILI ALLA SPACCATURA	Soluzione 0,6 - 0,8 %	45 giorni prima della raccolta: 3 - 4 interventi	Riduce la spaccatura, riduce l'incidenza dei colpi di sole e migliora la colorazione
CILIEGE	Soluzione 0,6 - 0,8 %	Prima dell'invaiatura 15 - 20 giorni prima della maturazione	Riduce la spaccatura dovuta alle piogge
ACTINIDIA (Kiwi)	Soluzione 0,6 - 0,8 %	Nei momenti di eccessiva evapotraspirazione	Riduce la disidratazione ed il disseccamento delle foglie ad opera del vento
PESCO: VARIETA' SENSIBILI ALLA SPACCATURA	Soluzione 0,6 - 0,8 %	2 - 3 trattamenti a dosi uguali iniziando 30 - 40 gg. prima della raccolta, comunque prima del verificarsi del fenomeno	Riduce la spaccatura, aumenta la pezzatura, migliora il colore
PIANTE SEMPREVERDI IN VIVAIO	Soluzione 2 - 3%	Prima dell'inverno	Protegge dal freddo intenso e dalle gelate moderate
PIANTE SEMPRE VERDI IN PARCHI E VIALI CITTADINI	Soluzione 2 - 3 %	Prima dell'inverno	Protegge dal freddo, dallo smog e dalle piogge acide
PIANTE ORNAMENTALI IN ZONE MARINE (palme, tamerici, cipressi)	Soluzione 2 - 3 %	Prima dell'inverno e dopo una pioggia che abbia dilavato la salsedine	Protegge da ustioni provocate dal vento salmastro

AVVERTENZA
Sospendere i trattamenti 25 giorni prima del raccolto degli agrumi, 3 giorni prima del raccolto delle altre colture.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
Non congelare il prodotto.
Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva nociva per l'ambiente acquatico.

COMPATIBILITA'
VAPOR GARD® antitraspirante - protettivo deve essere impiegato da solo. Tuttavia è compatibile con i normali prodotti impiegati in agricoltura: concimi fogliari, antiparassitari, prodotti biologici.

Rev. 0106

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE]

Rev. 0106

- FOGLIO ILLUSTRATIVO -

VAPOR GARD®

ANTITRASPIRANTE - PROTETTIVO

LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Pinolene (di-1-p-menthene) g 96
Emulsionante g 4

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AVVERTENZA PER LA CONSERVAZIONE
- conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato
- chiudere ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata
- non mettere in congelatore

CARATTERISTICHE
VAPOR GARD® è una emulsione concentrata naturale che ha proprietà antitraspiranti. Opportunamente diluito in acqua ed irrorato sulla vegetazione, VAPOR GARD® è in grado di formare sulle superfici irrorate un reticolo simile ad una pellicola in grado di regolare la traspirazione delle piante.
Il reticolo non ostacola la respirazione e mantiene inalterato lo scambio ossigeno - anidride carbonica, mentre rallenta la perdita di vapor d'acqua attraverso gli stomi.
La traspirazione, ovvero il processo di eliminazione dell'acqua, è una funzione fisiologica per la pianta ed è pertanto un fenomeno impossibile da eliminare specie in quegli organi che effettuano la fotosintesi.
La sede principale è la foglia, ma si verifica ugualmente nei giovani germogli e nei fiori; nel caso di giovani tronchi si può avere anche la traspirazione lenticellare mediante la quale l'acqua evapora attraverso le lenticelle del sughero. Nelle piante coltivate può accadere di avere la necessità di controllare la traspirazione per diversi motivi: al fine di rendere più efficienti certe pratiche agronomiche o per evitare stress alle piante in momenti particolari o ancora per trattenere l'umidità fisiologica. In tutti questi casi, VAPOR GARD® può essere di valido aiuto ricoprendo il vegetale con una pellicola invisibile ma efficace, resistente ed elastica.

MODALITA' D'IMPIEGO
VAPOR GARD® è un'emulsione che si disperde facilmente in acqua formando una soluzione che può essere applicata sui vegetali con qualsiasi tipo di irroratrice manuale o meccanica, a volume normale a basso ed ultrabasso volume. Aggiungere sufficiente acqua nella botte per permettere un'agitazione ottimale della pompa. Aggiungere gli eventuali altri prodotti fitosanitari. Se viene usata una formulazione in polvere bagnabile, mescolare molto bene l'acqua e la polvere in modo che la polvere stessa sia totalmente sciolta in acqua prima di aggiungere VAPOR GARD®. Mantenere una buona agitazione durante il caricamento il trasferimento e durante l'irrorazione.
Si consiglia di lavare bene, subito dopo l'uso, l'apparecchiatura usata per l'irrorazione con acqua e kerosene onde evitare la polimerizzazione negli ugelli o nei piccoli orifizi che potrebbero otturarsi.

CAMPI D'IMPIEGO E DOSI

COLTURA	QUANTITA'	EPOCA	EFFETTO
TRATTAMENTI ANTI TRASPIRANTI VERI E PROPRI			
PIANTINE IN VIVAIO O SEMENZAIO	Soluzione 1 - 2 %	1 o 2 giorni prima della consegna per il trapianto	Maggiore resistenza a stress per mancanza di acqua, migliore attecchimento al trapianto
PIANTE APPENA POSTE A DIMORA	Soluzione 1 - 1,5 %	Immediatamente dopo il trapianto	Può migliorare l'attecchimento per minore perdita di umidità
TRAPIANTI DI ALBERI A FOGLIA CADUCA IN PRESENZA DI FOGLIE	Soluzione 2 %	Un giorno prima della estirpazione	Può migliorare la percentuale di attecchimento
PERO	Soluzione 0,4 - 0,6 %	Nei momenti di eccessiva evapotraspirazione	Riduce il fenomeno del brusone non parassitario
FIORI RECISI	Soluzione 1- 2 %	Un giorno prima della raccolta	Maggiore durata, aspetto brillante del fiore
TRATTAMENTI ANTITRASPIRANTI - PROTETTIVI			
AGRUMI (arancio – limone – mandarino – clementino)	Soluzione 1 %	25 giorni prima della raccolta	Può migliorare la pezzatura, può ridurre il disseccamento post-raccolta e può migliorare la conservazione
PESCO – NETTARINE – ALBICOCCO – SUSINE	Soluzione 1 %	10 - 15 giorni prima della raccolta	Aumento di peso e colorazione più intensa dei frutti, migliore conservabilità
	Soluzione 0,1 - 0,2 %	In pre raccolta	Può migliorare la conservabilità e può avere effetti positivi contro la monilia

Rev. 0106

COLTURA	QUANTITA'	EPOCA	EFFETTO
TRATTAMENTI ANTITRASPIRANTI - PROTETTIVI			
UVA DA TAVOLA	Soluzione 1 %	Circa 20 giorni prima della maturazione	Maturazione più ritardata e migliore conservabilità
ACTINIDIA (Kiwi)	Soluzione 0,1 - 0,2 %	In pre raccolta	Può migliorare la conservabilità e può avere effetti positivi contro botritis
ORTICOLE A FRUTTO	Soluzione 1 – 2 %	Nel periodo in cui è frequente lo stress idrico e/o 10 - 15 giorni dalla raccolta	Aumenta la resistenza a lunghi periodi di siccità, migliora la qualità e conservabilità dei frutti
COLTURA	QUANTITA'	EPOCA	EFFETTO
TRATTAMENTI ANTITRASPIRANTI - PROTETTIVI			
ORTICOLE A FOGLIA	Soluzione 0,5 – 1 %	Nel periodo in cui è frequente lo stress idrico	Riduce il "Tip burn", aumenta la resistenza alla siccità, aumenta la turgescenza
INNESTI ERBACEI DI ORTICOLE	Soluzione 1 - 1,5 %	Trattare le piante madri il giorno prima del taglio delle marze	Migliore attecchimento degli innesti (melanzane, melone, ecc.)
PATATA	Soluzione 2 %	Dalla piena fioritura fino a due settimane dopo	Aumento di produzione e tuberi più uniformi
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Soluzione 1- 2 %	Nel periodo più caldo della stagione	Protegge dalla disidratazione e aumenta la dimensione della radice
TRATTAMENTI ANTITRASPIRANTI – PROTETTIVI DA AGENTI ATMOSFERICI E FISIOPATIE			
AGRUMI (arancio e mandarino cv. soggette a spacco)	Soluzione 0,2 - 0,3 %	Prima dell'invaiatura 2 - 3 interventi a 20 - 25 giorni	Riduce il fenomeno dello spacco
MELE: VARIETA' SENSIBILI ALLA SPACCATURA	Soluzione 0,6 - 0,8 %	45 giorni prima della raccolta: 3 - 4 interventi	Riduce la spaccatura, riduce l'incidenza dei colpi di sole e migliora la colorazione
CILIEGE	Soluzione 0,6 - 0,8 %	Prima dell'invaiatura 15 - 20 giorni prima della maturazione	Riduce la spaccatura dovuta alle piogge
ACTINIDIA (Kiwi) PESCO: VARIETA' SENSIBILI ALLA SPACCATURA	Soluzione 0,6 - 0,8 % Soluzione 0,6 - 0,8 %	Nei momenti di eccessiva evapotraspirazione 2 - 3 trattamenti a dosi uguali iniziando 30 - 40 gg. prima della raccolta, comunque prima del verificarsi del fenomeno	Riduce la disidratazione ed il disseccamento delle foglie ad opera del vento Riduce la spaccatura, aumenta la pezzatura, migliora il colore

COLTURA	QUANTITA'	EPOCA	EFFETTO
TRATTAMENTI ANTITRASPIRANTI – PROTETTIVI DA AGENTI ATMOSFERICI E FISIOPATIE			
PIANTE SEMPREVERDI IN VIVAIO	Soluzione 2 - 3%	Prima dell'inverno	Protegge dal freddo intenso e dalle gelate moderate
PIANTE SEMPRE VERDI IN PARCHI E VIALI CITTADINI	Soluzione 2 - 3 %	Prima dell'inverno	Protegge dal freddo, dallo smog e dalle piogge acide
PIANTE ORNAMENTALI IN ZONE MARINE (palme, tamerici, cipressi)	Soluzione 2 - 3 %	Prima dell'inverno e dopo una pioggia che abbia dilavato la salsedine	Protegge da ustioni provocate dal vento salmastro

AVVERTENZA
Sospendere i trattamenti 25 giorni prima del raccolto degli agrumi, 3 giorni prima del raccolto delle altre colture.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
Non congelare il prodotto.
Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva nociva per l'ambiente acquatico.

Rev. 0106

- ETICHETTA RIDOTTA -

VAPOR GARD®

ANTITRASPIRANTE - PROTETTIVO

LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Pinolene (di-1-p-menthene)	g	96
Emulsionante	g	4

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo)

OFFICINA DI PRODUZIONE
MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORP. - Hanover, Pennsylvania - USA

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
I.R.C.A. Service S.p.A. - S.S. Cremasca 591 n. 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
LIFA S.r.l. - Via Cristoforo Colombo 7/7 a - 30030 Vigonovo (VE)
L.I.F.A. S.r.l. - Via Piave - Z.I. Fossanigo - 36033 Isola Vicentina (VI)

Registrazione n. 10116 del 30.07.1999 del Ministero della Sanità

Contenuto: 100 cc

Riferimento Partita n. _______________

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se ingerito chiamare immediatamente un medico.

COMPATIBILITA'
VAPOR GARD® antitraspirante - protettivo deve essere impiegato da solo. Tuttavia è compatibile con i normali prodotti impiegati in agricoltura: concimi fogliari, antiparassitari, prodotti biologici.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO - DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE]

Rev. 0106

NATURALIS®

BIOINSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA A BASE DI BEAUVERIA BASSIANA

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Beauveria bassiana (ceppo JW-1, ATCC 74040) g 7,16 *
Coformulanti q.b. a g 100

* Contiene non meno di 2,3 x 10^7 spore vitali /ml.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo)

OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
TROY BIOSCIENCES INC. - 2620 N. 37th Drive, Phoenix, Arizona 85009 - USA
L.I.F.A. S.r.l. - Via C. Colombo 7/7a - 30030 Vigonovo (VE)
I.R.C.A. Service S.p.A. - S.S. Cremasca 591 n. 10 - 20040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione n. 10479 del 19.04.2000 del Ministero della Sanità

Contenuto: 50 - 100 - 250 - 500 cc; 1 - 2 - 5 - 10 litri

Riferimento Partita n. _______________ **Data di fabbricazione** _______________

NORME PRECAUZIONALI
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE
NATURALIS® è un prodotto biologicamente attivo in quanto contiene spore vitali del fungo *Beauveria bassiana* pertanto é importante che venga conservato con cura poiché potrebbe deteriorarsi. Conservare il prodotto al riparo dalla luce in luogo fresco e asciutto. NATURALIS® ha una stabilità garantita di 1 anno se conservato in frigorifero a 4 °C. Si osservi la data di confezionamento riportata sulla confezione. Non esporre il prodotto ad alte temperature in quanto diminuiscono notevolmente la sua attività biologica.

CARATTERISTICHE
NATURALIS® è un bioinsetticida a base di spore vitali del fungo *Beauveria bassiana.* Si tratta di un ceppo presente in natura e non manipolato geneticamente particolarmente attivo contro gli aleurodidi, i tripidi, gli afidi e il ragnetto rosso delle colture orticole e ornamentali. Agisce per contatto. I conidi della *Beauveria bassiana* aderiscono alla cuticola degli insetti e acari, germinano e penetrano diffondendo il micete all'interno dell'ospite. La morte è dovuta all'azione meccanica di penetrazione del micelio e conseguente perdita di acqua e nutrienti combinata alla secrezione di enzimi idrolitici.

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO
NATURALIS® è attivo contro tutti gli stadi ma particolarmente contro le forme giovanili degli aleurodidi (*Bemisia tabaci/argentifolii, Trialeurodes vaporariorum*), tripidi (*Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci*), ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*), ditteri tripetidi (*Ceratitis capitata, Rhagoletis cerasi, Bactrocera oleae*) ed alcune specie di afidi (*Nasonovia ribis-nigri, Myzus persicae, Aphis fabae*) che attaccano la maggior parte delle colture orticole e ornamentali in serra e pieno campo.

ORTAGGI

pomodoro, peperone, melanzana:
aleurodidi 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
tripidi 120 - 150 ml/hl, oppure 1 - 1,5 l/ha
ragnetto rosso 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
elateridi 80 - 120 ml/hl

cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo:
aleurodidi 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
tripidi 120 - 150 ml/hl, oppure 1 - 1,5 l/ha
ragnetto rosso 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
elateridi 80 - 120 ml/hl

lattuga, indivia, radicchio:
aleurodidi 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
afidi spp. 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
ragnetto rosso 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
elateridi 80 - 120 ml/hl

FRAGOLA:
aleurodidi 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
tripidi 120 - 150 ml/hl, oppure 1 - 1,5 l/ha,
afidi spp. 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
ragnetto rosso 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha

CAROTA - PATATA:
elateridi 400 - 600 ml/hl, oppure 2 - 3 litri/ha (trattamento al terreno in pre trapianto ed alla rincalzatura)

FLOREALI ED ORNAMENTALI:
aleurodidi 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
tripidi 120 - 150 ml/hl, oppure 1 - 1,5 l/ha
ragnetto rosso 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha

PESCO - NETTARINE - ALBICOCCO - SUSINO:
tripidi 80 - 120 ml/hl
mosca della frutta (Ceratitis capitata) 120 - 150 ml/hl

CILIEGIO:
tripidi 80 - 120 ml/hl
mosca delle ciliegie (Rhagoletis cerasi) 120 - 150 ml/hl

Rev. 0106

MELO - PERO:
tingide 80 - 120 ml/hl
mosca della frutta (Ceratitis capitata) 120 - 150 ml/hl
VITE:
cicaline 80 - 120 ml/hl
mosca della frutta (Ceratitis capitata) 120 - 150 ml/hl
NOCCIOLO - CASTAGNO:
balanino 400 - 600 ml/hl, oppure 2 - 3 litri/ha (trattamento al terreno prima dell'impupamento)
LAMPONE - ROVO:
tripidi 120 - 150 ml/hl, oppure 1 - 1,5 litri/ha
afidi 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 litro/ha
ragnetto rosso 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 litro/ha
BASILICO:
tripidi 120 - 150 ml/hl oppure 1 - 1,5 litri/ha
AGRUMI:
aleurodidi: 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 litro/ha
mosca della frutta (Ceratitis capitata) 120 - 150 ml/hl
OLIVO:
mosca delle olive (Bactrocera oleae) 120 - 150 ml/hl
COTOGNO - FICO - FICO D'INDIA - KIWI - KAKI - NESPOLO - NASHI:
mosca della frutta (Ceratitis capitata) 120 - 150 ml/hl

MODALITA' D'IMPIEGO

- NATURALIS® si impiega per irrorazione con apparecchiature e volumi di acqua sufficienti a garantire una copertura ottimale della vegetazione. Applicare preferibilmente la mattina presto o al tramonto, quando gli adulti volano di meno e l'umidità relativa è più elevata.

- NATURALIS® deve essere impiegato con bassi livelli di infestazione e comunque prima che i danni alla coltura diventino apparenti. In base alle condizioni climatiche ed al livello di infestazione sono necessarie 3-5 applicazioni con un intervallo di 5 - 7 giorni per avere un buon controllo dell'insetto. In caso di pioggia si consiglia di ripetere il trattamento.

NATURALIS® può essere utilizzato in agricoltura biologica e si integra perfettamente con gli insetticidi, compresi gli oli estivi, utilizzabili nei programmi di lotta integrata. NATURALIS® è un valido strumento per abbassare i livelli d'infestazione dei fitofagi agevolando l'utilizzo degli ausiliari (insetti ed acari utili).

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE
NATURALIS® può essere applicato con qualsiasi tipo di apparecchiatura purché assicuri una copertura ottimale della vegetazione. Non utilizzare ugelli di diametro inferiore a 25 mesh. Non applicare questo prodotto mediante sistemi di irrigazione. Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Mantenere la soluzione in agitazione durante la miscela e il trattamento. Per ottenere una corretta dispersione del prodotto in acqua, riempire la botte per metà, aggiungere NATURALIS® quindi portare a volume. **Applicare il prodotto subito dopo averlo miscelato in acqua. Assicurarsi che l'apparecchiatura utilizzata non contenga residui di precedenti trattamenti con fungicidi.**

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE
Non usare in prossimità di corsi d'acqua. Non impiegare il prodotto in prossimità di gelsi utilizzati per l'allevamento del baco da seta. Può provocare il calcino. Nell'applicazione del prodotto usare indumenti di protezione per agenti biologici, classificati come dispositivi di protezione individuali e con relativa marcatura CE per la protezione da agenti biologici, e guanti, quali dispositivi di protezione individuale con relativa marcatura CE e conformità alla EN 374.

COMPATIBILITA'
NATURALIS® può essere impiegato in miscela con altri prodotti insetticidi per ottenere un maggiore controllo dell'infestazione. E' inoltre compatibile in miscela con fungicidi a base di Zolfo e Rame. **Altri prodotti fungicidi di sintesi vanno impiegati con un intervallo di almeno 2 giorni dai trattamenti con NATURALIS®**.

FITOTOSSICITA'
Nelle normali condizioni di impiego il prodotto non è fitotossico.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Rev. 0106

- FOGLIO ILLUSTRATIVO -

NATURALIS®

BIOINSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA A BASE DI BEAUVERIA BASSIANA

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Beauveria bassiana (ceppo JW-1, ATCC 74040)	g 7,16 *
Coformulanti q.b. a	g 100

* Contiene non meno di 2,3 x 10^7 spore vitali /ml.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE
NATURALIS® è un prodotto biologicamente attivo in quanto contiene spore vitali del fungo *Beauveria bassiana* pertanto é importante che venga conservato con cura poiché potrebbe deteriorarsi. Conservare il prodotto al riparo dalla luce in luogo fresco e asciutto. NATURALIS® ha una stabilità garantita di 1 anno se conservato in frigorifero a 4 °C. Si osservi la data di confezionamento riportata sulla confezione. Non esporre il prodotto ad alte temperature in quanto diminuiscono notevolmente la sua attività biologica.

CARATTERISTICHE
NATURALIS® è un bioinsetticida a base di spore vitali del fungo *Beauveria bassiana*. Si tratta di un ceppo presente in natura e non manipolato geneticamente particolarmente attivo contro gli aleurodidi. i tripidi, gli afidi e il ragnetto rosso delle colture orticole e ornamentali. Agisce per contatto. I conidi della *Beauveria bassiana* aderiscono alla cuticola degli insetti e acari, germinano e penetrano diffondendo il micete all'interno dell'ospite. La morte è dovuta all'azione meccanica di penetrazione del micelio e conseguente perdita di acqua e nutrienti combinata alla secrezione di enzimi idrolitici.

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO
NATURALIS® è attivo contro tutti gli stadi ma particolarmente contro le forme giovanili degli aleurodidi (*Bemisia tabaci/argentifolii, Trialeurodes vaporariorum*), tripidi (*Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci*), ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*), ditteri tripetidi (*Ceratitis capitata, Rhagoletis cerasi, Bactrocera oleae*) ed alcune specie di afidi (*Nasonovia ribis-nigri, Myzus persicae, Aphis fabae*) che attaccano la maggior parte delle colture orticole e ornamentali in serra e pieno campo.

ORTAGGI
pomodoro, peperone, melanzana:
aleurodidi 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
tripidi 120 - 150 ml/hl, oppure 1 - 1,5 l/ha
ragnetto rosso 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
elateridi 80 - 120 ml/hl
cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo:
aleurodidi 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
tripidi 120 - 150 ml/hl, oppure 1 - 1,5 l/ha
ragnetto rosso 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
elateridi 80 - 120 ml/hl
lattuga, indivia, radicchio:
aleurodidi 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
afidi spp. 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
ragnetto rosso 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
elateridi 80 - 120 ml/hl
FRAGOLA:
aleurodidi 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
tripidi 120 - 150 ml/hl, oppure 1 - 1,5 l/ha,
afidi spp. 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
ragnetto rosso 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
CAROTA - PATATA:
elateridi 400 - 600 ml/hl, oppure 2 - 3 litri/ha (trattamento al terreno in pre trapianto ed alla rincalzatura)
FLOREALI ED ORNAMENTALI:
aleurodidi 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
tripidi 120 - 150 ml/hl, oppure 1 - 1,5 l/ha
ragnetto rosso 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
PESCO - NETTARINE - ALBICOCCO - SUSINO:
tripidi 80 - 120 ml/hl
mosca della frutta (Ceratitis capitata) 120 - 150 ml/hl
CILIEGIO:
tripidi 80 - 120 ml/hl
mosca delle ciliegie (Rhagoletis cerasi) 120 - 150 ml/hl
MELO - PERO:
tingide 80 - 120 ml/hl
mosca della frutta (Ceratitis capitata) 120 - 150 ml/hl
VITE:
cicaline 80 - 120 ml/hl
mosca della frutta (Ceratitis capitata) 120 - 150 ml/hl
NOCCIOLO - CASTAGNO:
balanino 400 - 600 ml/hl, oppure 2 - 3 litri/ha (trattamento al terreno prima dell'impupamento)
LAMPONE - ROVO:
tripidi 120 - 150 ml/hl, oppure 1 - 1,5 litri/ha
afidi 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 litro/ha
ragnetto rosso 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 litro/ha
BASILICO:
tripidi 120 - 150 ml/hl oppure 1 - 1,5 litri/ha

Rev. 0106

AGRUMI:
aleurodidi: 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 litro/ha
mosca della frutta (Ceratitis capitata) 120 - 150 ml/hl
OLIVO:
mosca delle olive (Bactrocera oleae) 120 - 150 ml/hl
COTOGNO - FICO - FICO D'INDIA - KIWI - KAKI - NESPOLO - NASHI:
mosca della frutta (Ceratitis capitata) 120 - 150 ml/hl

MODALITA' D'IMPIEGO

- NATURALIS® si impiega per irrorazione con apparecchiature e volumi di acqua sufficienti a garantire una copertura ottimale della vegetazione. Applicare preferibilmente la mattina presto o al tramonto, quando gli adulti volano di meno e l'umidità relativa è più elevata.

- NATURALIS® deve essere impiegato con bassi livelli di infestazione e comunque prima che i danni alla coltura diventino apparenti. In base alle condizioni climatiche ed al livello di infestazione sono necessarie 3-5 applicazioni con un intervallo di 5 - 7 giorni per avere un buon controllo dell'insetto. In caso di pioggia si consiglia di ripetere il trattamento.

NATURALIS® può essere utilizzato in agricoltura biologica e si integra perfettamente con gli insetticidi, compresi gli oli estivi, utilizzabili nei programmi di lotta integrata. NATURALIS® è un valido strumento per abbassare i livelli d'infestazione dei fitofagi agevolando l'utilizzo degli ausiliari (insetti ed acari utili).

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE
NATURALIS® può essere applicato con qualsiasi tipo di apparecchiatura purché assicuri una copertura ottimale della vegetazione. Non utilizzare ugelli di diametro inferiore a 25 mesh. Non applicare questo prodotto mediante sistemi di irrigazione. Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Mantenere la soluzione in agitazione durante la miscela e il trattamento. Per ottenere una corretta dispersione del prodotto in acqua, riempire la botte per metà, aggiungere NATURALIS® quindi portare a volume. **Applicare il prodotto subito dopo averlo miscelato in acqua. Assicurarsi che l'apparecchiatura utilizzata non contenga residui di precedenti trattamenti con fungicidi.**

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE
Non usare in prossimità di corsi d'acqua. Non impiegare il prodotto in prossimità di gelsi utilizzati per l'allevamento del baco da seta. Può provocare il calcino. Nell'applicazione del prodotto usare indumenti di protezione per agenti biologici, classificati come dispositivi di protezione individuali e con relativa marcatura CE per la protezione da agenti biologici, e guanti, quali dispositivi di protezione individuale con relativa marcatura CE e conformità alla EN 374.

FITOTOSSICITA'
Nelle normali condizioni di impiego il prodotto non è fitotossico.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Rev. 0106

- ETICHETTA RIDOTTA -

NATURALIS®

BIOINSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA
A BASE DI BEAUVERIA BASSIANA

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Beauveria bassiana (ceppo JW-1, ATCC 74040)	g 7,16 *
Coformulanti q.b. a	g 100

* Contiene non meno di 2,3 x 10^7 spore vitali /ml.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo)

OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
TROY BIOSCIENCES INC. - 2620 N. 37th Drive, Phoenix, Arizona 85009 - USA
L.I.F.A. S.r.l. - Via C. Colombo 7/7a - 30030 Vigonovo (VE)
I.R.C.A. Service S.p.A. - S.S. Cremasca 591 n. 10 - 20040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione n. 10479 del 19.04.2000 del Ministero della Sanità

Contenuto: 50 - 100 cc

Riferimento Partita n. _______________ **Data di fabbricazione** ________________

NORME PRECAUZIONALI
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

COMPATIBILITA'
NATURALIS® può essere impiegato in miscela con altri prodotti insetticidi per ottenere un maggiore controllo dell'infestazione. E' inoltre compatibile in miscela con fungicidi a base di Zolfo e Rame. **Altri prodotti fungicidi di sintesi vanno impiegati con un intervallo di almeno 2 giorni dai trattamenti con NATURALIS®**.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO - DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Rev. 0106

BIOROTEN

INSETTICIDA DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI ROTENONE

LIQUIDO EMULSIONABILE

BIOROTEN - Insetticida

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Rotenone	g 4 (= 48 g/l)
Coadiuvanti q. b. a	g 100

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo)

OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.p.A. - U.p. SIFA - S.S. Padana Superiore Km 185,800 - Caravaggio (BG)
ALTHALLER ITALIA S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)

Registrazione n. 11178 del 05.02.2002 del Ministero della Salute

Contenuto: 100 - 200 - 500 ml; 1 - 2 - 2,5 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 litri

Riferimento Partita n. _______________

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

INFORMAZIONI MEDICHE
Sintomi: irritante oculare e cutaneo, sensibilizzante; nausea, vomito, dolori addominali, tremori e convulsioni, bradicardia, anosmia; apparato respiratorio: stimolazione seguita da depressione. Terapia sintomatica. **AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
BIOROTEN è un insetticida di origine vegetale a base di Rotenone. Agisce energicamente per contatto ed ingestione ed è inoltre dotato di effetto stimolante sulle piante; viene impiegato alla dose di ml 300 per ettolitro d'acqua sulle seguenti colture :
AGLIO - ALBICOCCO - CAROTA - CETRIOLO - CIPOLLA - FAGIOLO - FLOREALI ED ORNAMENTALI - LATTUGA - OLIVO - PESCO - RADICCHIO - SOLANACEE - SUSINO - ZUCCHINO - AGRUMI - CARCIOFO - CAVOLI - CILIEGIO - COCOMERO - FINOCCHIO - INDIVIA - MELO - PERO - PORRO - SEDANO - SPINACIO - VITE, per combattere i seguenti parassiti: Aleurodidi, Tripidi, Afidi, Dorifora, Cocciniglie, Tignole, Oplocampa, Altica, Cimici, Tentredini, Antonomo, Criocera, Meligete, Psilla, Formiche, Carpocapsa, Piralide, Nottue, Dacus oleae, Acari, Mosche della frutta, Pandemis, trattando alla prima comparsa, preferibilmente di sera, in presenza degli insetti.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Non e' miscibile con prodotti a reazione alcalina (es. polisolfuri).

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, bestiame.

AVVERTENZE: Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 24 ore ed i tempi di carenza del formulato, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso agli animali domestici alle aree trattate prima che siano trascorsi i tempi di carenza.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Rev. 0106

- FOGLIO ILLUSTRATIVO -

BIOROTEN

INSETTICIDA DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI ROTENONE

LIQUIDO EMULSIONABILE

BIOROTEN - Insetticida

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Rotenone	g 4 (= 48 g/l)
Coadiuvanti q. b. a	g 100

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

MODALITA' D'IMPIEGO
BIOROTEN è un insetticida di origine vegetale a base di Rotenone. Agisce energicamente per contatto ed ingestione ed è inoltre dotato di effetto stimolante sulle piante; viene impiegato alla dose di ml 300 per ettolitro d'acqua sulle seguenti colture :
AGLIO - ALBICOCCO - CAROTA - CETRIOLO - CIPOLLA - FAGIOLO - FLOREALI ED ORNAMENTALI - LATTUGA - OLIVO - PESCO - RADICCHIO - SOLANACEE - SUSINO - ZUCCHINO - AGRUMI - CARCIOFO - CAVOLI - CILIEGIO - COCOMERO - FINOCCHIO - INDIVIA - MELO - PERO - PORRO - SEDANO - SPINACIO - VITE, per combattere i seguenti parassiti: Aleurodidi, Tripidi, Afidi, Dorifora, Cocciniglie, Tignole, Oplocampa, Altica, Cimici, Tentredini, Antonomo, Criocera, Meligete, Psilla, Formiche, Carpocapsa, Piralide, Nottue, Dacus oleae, Acari, Mosche della frutta, Pandemis, trattando alla prima comparsa, preferibilmente di sera, in presenza degli insetti.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, bestiame.

Rev. 0106

- ETICHETTA RIDOTTA -

BIOROTEN

INSETTICIDA DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI ROTENONE

LIQUIDO EMULSIONABILE

BIOROTEN - Insetticida

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Rotenone	g 4 (= 48 g/l)
Coadiuvanti q. b. a	g 100

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo)

OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.p.A. - U.p. SIFA - S.S. Padana Superiore Km 185,800 - Caravaggio (BG)
ALTHALLER ITALIA S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)

Registrazione n. 11178 del 05.02.2002 del Ministero della Salute

Contenuto: 100 ml

Riferimento Partita n. _______________

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

INFORMAZIONI MEDICHE
Sintomi: irritante oculare e cutaneo, sensibilizzante; nausea, vomito, dolori addominali, tremori e convulsioni, bradicardia, anosmia; apparato respiratorio: stimolazione seguita da depressione. Terapia sintomatica. **AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveleni.

COMPATIBILITA'
Non e' miscibile con prodotti a reazione alcalina (es. polisolfuri).

AVVERTENZE: Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 24 ore ed i tempi di carenza del formulato, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso agli animali domestici alle aree trattate prima che siano trascorsi i tempi di carenza.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO - DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Rev. 0106

ITROX®

BIOINSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA A BASE DI BT SELETTIVO CONTRO LARVE DI LEPIDOTTERI

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Tossine attive contro larve di lepidotteri derivanti da
Bacillus thuringiensis varietà Kurstaki sierotipo H-3A, 3b ceppo EG2348 g 7,50 (= 71,25 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Potenza: 24.000 UI T.ni/mg di formulato. Agisce per ingestione contro larve di lepidotteri.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo)

OFFICINA DI PRODUZIONE
ECOGEN INC. - 2005 Cabot Boulevard West - Langhorne, PA 19047 - 1810 (USA)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
LIFA S.r.l. - Via Cristoforo Colombo 7/7 a - 30030 Vigonovo (VE)
CIFO S.p.A. - Via Oradour 6 - 40116 S. Giorgio di Piano (BO)

Registrazione n. 11212 del 22.02.2002 del Ministero della Salute

Contenuto: 50 - 100 - 200 - 250 - 500 cc; 1 - 2 - 10 litri

Riferimento Partita n. ______________

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA PER LA CONSERVAZIONE
Conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato; a temperatura ambiente (21 - 24 °C) il prodotto è stabile per 2 anni; chiudere ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata.

CARATTERISTICHE
ITROX® è un insetticida biologico ad elevata specificità di azione contro le larve di lepidotteri. Le larve per infettarsi devono ingerire il prodotto: trattare larve giovani che si nutrono con voracità, prima che si sia verificato un eccessivo danno fogliare. Effettuare gli interventi quando i fitofagi sono all'esterno del vegetale e, in ogni caso, ai primi stadi larvali (I e II). Dopo aver consumato la dose letale di ITROX®, le larve cessano di alimentarsi ma possono rimanere sulle foglie parecchi giorni prima di morire. Le larve morenti si muovono adagio, scoloriscono, si accartocciano e anneriscono prima di morire. Una completa e ricoprente irrorazione è essenziale per un buon controllo degli insetti. Su alcune colture può essere necessario l'uso degli ugelli direzionali. Intervenire con attrezzature che, munite di pompe a volume distribuiscano volumi medio alti di acqua.

CAMPI, DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO
FRUTTIFERI
- Pomacee (melo, pero, cotogno): Tortricidi (Archips, Pandemis, Capua, Eulia) 1 - 2 l/ha.
- Drupacee (pesco, comprese nettarine e percoche, albicocco, susino, ciliegio): Cidia, Anarsia, Grapholita, Cheimatobia 1 - 2 l/ha.
- Kiwi: Eulia e Tignola 1 - 2 l/ha.
- Agrumi: Prays citri 1 - 2 l/ha.
- Olivo: Prays oleae 1 - 2 l/ha.

VITE DA VINO E DA TAVOLA
- Tignole 0,75 - 1 l/ha.

ORTAGGI
- Cavoli (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo verza, cavolo cappuccio, cavolo cinese, cavolo di Bruxelles, cavolo rapa): Cavolaia 1 - 2 l/ha; Mamestra 3 - 4 l/ha.
- Carciofo: Gorthynia spp. (nottua del carciofo), Depressaria e. 1 - 2 l/ha.
- Ortaggi a foglia (lattuga, cicoria, indivia, radicchio, scarola, rucola, valerianella, spinacio, bietole da foglia e da costa, cardo, sedano, finocchio, prezzemolo, erba cipollina, basilico): Nottue 1 - 2 l/ha; Mamestra 3 - 4 l/ha.
- Fagiolo e fagiolino: Piralide 1 - 2 l/ha.
- Cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo): Nottue 1 - 2 l/ha.
- Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana): Nottue, Piralide, Ptorimea, 1 - 2 l/ha; Heliothis, Mamestra 3 - 4 l/ha.

PATATA: Nottue, Ptorimea 1 - 2 l/ha.
FRAGOLA: Tortricidi (Argyrotaenia p.; Pandemis d.) 1 - 2 l/ha.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: Agrotidi 1 - 2 l/ha; Mamestra 3 - 4 l/ha.

Rev. 0106

OLEAGINOSE
- Girasole, soia, colza, ravizzone: Nottue 1- 2 l/ha.
MAIS: Piralide, Nottue 1 - 2 l/ha.
TABACCO: Nottue 1 - 2 l/ha; Heliothis 3 - 4 l/ha.
FLOREALI ed ORNAMENTALI: Nottue 1 - 2 l/ha.
PIOPPO: Hyphantria (bruco americano) 1 - 2l/ha.
FORESTALI: Hyphantria (bruco americano), Limantria, Hyponomeuta, Processionaria, Tortrix, Euproctis c., Evertia b. 1 - 2 l/ha.

Intervenire nella fase di schiusura uova e su larve giovani (1a età). Ripetere il trattamento dopo 7 - 10 giorni in caso di infestazione prolungata. Condizioni locali possono consigliare l'uso di ITROX® in momenti specifici: in tal caso attenersi alle indicazioni tecniche regionali.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE
ITROX® può essere applicato con irroratori convenzionali che distribuiscono una quantità di acqua sufficiente a ricoprire completamente le piante infestate. Per ottenere una adeguata dispersione in acqua, prima riempire il serbatoio dell'irroratore con la quantità di acqua desiderata e poi aggiungere ITROX®. Provvedere ad una moderata agitazione idraulica o meccanica durante la preparazione, il trasferimento e l'irrorazione della miscela. Per ottenere i migliori risultati agitare bene il flacone contenente il prodotto, versarne la metà nell'irroratore, riagitare nuovamente il flacone con metà prodotto e versarlo nell'irroratore. Non aggiungere acqua nel flacone fino a che non è completamente vuoto. Se si vuole aggiungere un adesivante alla soluzione, aggiungerlo per ultimo. Non usare più il prodotto se non utilizzato entro le 12 ore. Svuotare e risciacquare completamente l'irroratore ogni volta dopo l'uso. Non contaminare le acque con i risciacqui dell'irroratore.

PRECAUZIONI
Evitare l'uso di acqua con pH superiore a 8 o utilizzare un prodotto tampone.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con prodotti alcalini quali Poltiglia Bordolese etc.

FITOTOSSICITA'
Fare attenzione alla miscele di ITROX® con altri prodotti a base di olio o agenti bagnanti poiché potrebbero aumentare il rischio di fitotossicità. In caso si notino fenomeni di fitotossicità, sospendere immediatamente i trattamenti.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservare le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Usare indumenti di protezione per agenti biologici, classificati come dispositivi di protezione individuale e con relativa marcatura CE per la protezione da agenti biologici, e guanti, quali dispositivi di protezione individuale con relativa marcatura CE e conformità alla EN 374.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Rev. 0106

- FOGLIO ILLUSTRATIVO -

ITROX®

BIOINSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA A BASE DI BT SELETTIVO CONTRO LARVE DI LEPIDOTTERI

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Tossine attive contro larve di lepidotteri derivanti da
Bacillus thuringiensis varietà Kurstaki sierotipo H-3A, 3b ceppo EG2348 g 7,50 (= 71,25 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Potenza: 24.000 UI T.ni/mg di formulato. Agisce per ingestione contro larve di lepidotteri.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

AVVERTENZA PER LA CONSERVAZIONE
Conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato; a temperatura ambiente (21 - 24 °C) il prodotto è stabile per 2 anni; chiudere ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata.

CARATTERISTICHE
ITROX® è un insetticida biologico ad elevata specificità di azione contro le larve di lepidotteri. Le larve per infettarsi devono ingerire il prodotto: trattare larve giovani che si nutrono con voracità, prima che si sia verificato un eccessivo danno fogliare. Effettuare gli interventi quando i fitofagi sono all'esterno del vegetale e, in ogni caso, ai primi stadi larvali (I e II). Dopo aver consumato la dose letale di ITROX®, le larve cessano di alimentarsi ma possono rimanere sulle foglie parecchi giorni prima di morire. Le larve morenti si muovono adagio, scoloriscono, si accartocciano e anneriscono prima di morire. Una completa e ricoprente irrorazione è essenziale per un buon controllo degli insetti. Su alcune colture può essere necessario l'uso degli ugelli direzionali. Intervenire con attrezzature che, munite di pompe a volume distribuiscano volumi medio alti di acqua.

CAMPI, DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO
FRUTTIFERI
- Pomacee (melo, pero, cotogno): Tortricidi (Archips, Pandemis, Capua, Eulia) 1 - 2 l/ha.
- Drupacee (pesco, comprese nettarine e percoche, albicocco, susino, ciliegio): Cidia, Anarsia, Grapholita, Cheimatobia 1 - 2 l/ha.
- Kiwi: Eulia e Tignola 1 - 2 l/ha.
- Agrumi: Prays citri 1 - 2 l/ha.
- Olivo: Prays oleae 1 - 2 l/ha.

VITE DA VINO E DA TAVOLA
- Tignole 0,75 - 1 l/ha.

ORTAGGI
- Cavoli (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo verza, cavolo cappuccio, cavolo cinese, cavolo di Bruxelles, cavolo rapa): Cavolaia 1 - 2 l/ha; Mamestra 3 - 4 l/ha.
- Carciofo: Gorthynia spp. (nottua del carciofo), Depressaria e. 1 - 2 l/ha.
- Ortaggi a foglia (lattuga, cicoria, indivia, radicchio, scarola, rucola, valerianella, spinacio, bietole da foglia e da costa, cardo, sedano, finocchio, prezzemolo, erba cipollina, basilico): Nottue 1 - 2 l/ha; Mamestra 3 - 4 l/ha.
- Fagiolo e fagiolino: Piralide 1 - 2 l/ha.
- Cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo): Nottue 1 - 2 l/ha.
- Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana): Nottue, Piralide, Ptorimea, 1 - 2 l/ha; Heliothis, Mamestra 3 - 4 l/ha.

PATATA: Nottue, Ptorimea 1 - 2 l/ha.
FRAGOLA: Tortricidi (Argyrotaenia p.; Pandemis d.) 1 - 2 l/ha.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: Agrotidi 1 - 2 l/ha; Mamestra 3 - 4 l/ha.

OLEAGINOSE
- Girasole, soia, colza, ravizzone: Nottue 1- 2 l/ha.

MAIS: Piralide, Nottue 1 - 2 l/ha.
TABACCO: Nottue 1 - 2 l/ha; Heliothis 3 - 4 l/ha.
FLOREALI ed ORNAMENTALI: Nottue 1 - 2 l/ha.
PIOPPO: Hyphantria (bruco americano) 1 - 2l/ha.
FORESTALI: Hyphantria (bruco americano), Limantria, Hyponomeuta, Processionaria, Tortrix, Euproctis c., Evertia b. 1 - 2 l/ha.

Intervenire nella fase di schiusura uova e su larve giovani (1a età). Ripetere il trattamento dopo 7 - 10 giorni in caso di infestazione prolungata. Condizioni locali possono consigliare l'uso di ITROX® in momenti specifici: in tal caso attenersi alle indicazioni tecniche regionali.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE
ITROX® può essere applicato con irroratori convenzionali che distribuiscono una quantità di acqua sufficiente a ricoprire completamente le piante infestate. Per ottenere una adeguata dispersione in acqua, prima riempire il serbatoio dell'irroratore con la quantità di acqua desiderata e poi aggiungere ITROX®. Provvedere ad una moderata agitazione idraulica o meccanica durante la preparazione, il trasferimento e l'irrorazione della miscela. Per ottenere i migliori risultati agitare bene il flacone contenente il prodotto, versarne la metà nell'irroratore, riagitare nuovamente il flacone con metà prodotto e versarlo nell'irroratore. Non aggiungere acqua nel flacone fino a che non è completamente vuoto. Se si vuole aggiungere un adesivante alla soluzione, aggiungerlo per ultimo. Non usare più il prodotto se non utilizzato entro le 12 ore. Svuotare e risciacquare completamente l'irroratore ogni volta dopo l'uso. Non contaminare le acque con i risciacqui dell'irroratore.

Rev. 0106

PRECAUZIONI
Evitare l'uso di acqua con pH superiore a 8 o utilizzare un prodotto tampone.

FITOTOSSICITA'
Fare attenzione alla miscele di ITROX® con altri prodotti a base di olio o agenti bagnanti poiché potrebbero aumentare il rischio di fitotossicità. In caso si notino fenomeni di fitotossicità, sospendere immediatamente i trattamenti.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservare le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Usare indumenti di protezione per agenti biologici, classificati come dispositivi di protezione individuale e con relativa marcatura CE per la protezione da agenti biologici, e guanti, quali dispositivi di protezione individuale con relativa marcatura CE e conformità alla EN 374.

Rev. 0106

- ETICHETTA RIDOTTA -

ITROX®

BIOINSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA A BASE DI BT
SELETTIVO CONTRO LARVE DI LEPIDOTTERI

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Tossine attive contro larve di lepidotteri derivanti da
Bacillus thuringiensis varietà Kurstaki sierotipo H-3A, 3b ceppo EG2348 g 7,50 (= 71,25 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Potenza: 24.000 UI T.ni/mg di formulato. Agisce per ingestione contro larve di lepidotteri.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo)

OFFICINA DI PRODUZIONE
ECOGEN INC. - 2005 Cabot Boulevard West - Langhorne, PA 19047 - 1810 (USA)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
LIFA S.r.l. - Via Cristoforo Colombo 7/7 a - 30030 Vigonovo (VE)
CIFO S.p.A. - Via Oradour 6 - 40116 S. Giorgio di Piano (BO)

Registrazione n. 11212 del 22.02.2002 del Ministero della Salute

Contenuto: 50 - 100 cc

Riferimento Partita n. _______________

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con prodotti alcalini quali Poltiglia Bordolese etc.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO - DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Rev. 0106

CONTANS® WG

PRODOTTO BIOLOGICO A BASE DI *CONIOTHYRIUM MINITANS* DA IMPIEGARE NEL TERRENO PER LA LOTTA A SCLEROTINIA - 1.3) GRANULI DISPERSIBILI IN ACQUA

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Coniothyrium minitans(isolato CON/M/91-08)	g 5,3 *
Coformulanti q.b. a	g 100

* Contiene non meno di 1 x 10^9 spore/g.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo)

OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
PROPHYTA BIOLOGISCHER PFLANZENSCHUTZ GmbH
Inselstraße 12 D-23999 Malchow/Poel GERMANIA

Registrazione n. 11252 del 26.03.2002 del Ministero della Salute

Contenuto: 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,5 - 0,8 - 1 - 2 - 4 - 5 - 10 - 20 kg

Riferimento Partita n. ______________

CONTANS® è un marchio registrato da PROPHYTA GmbH.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE
CONTANS® WG è un prodotto biologicamente attivo in quanto contiene spore vitali del fungo *Coniothyrium minitans* pertanto é importante che venga conservato con cura poiché potrebbe deteriorarsi. Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto. CONTANS® WG ha una stabilità garantita di 6 mesi ad una temperatura compresa tra − 2° e + 6 °C. Non esporre il prodotto a temperature estreme, alte o basse. La confezione una volta aperta deve essere completamente utilizzata.

CARATTERISTICHE
Il biofungicida CONTANS® WG contiene spore vitali del fungo *Coniothyrium minitans*, un antagonista naturale e selettivo nei confronti di varie specie di Sclerotinia. Le spore contenute nel prodotto, una volta reidratate, germinano e distruggono gli sclerozi con cui vengono a contatto.

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO
CONTANS® WG è un prodotto biologico a base di *Coniothyrium minitans* da impiegare in colture orto-floro-frutticole suscettibili per la lotta a Sclerotinie.
Per contenere il parassita:
- nei primi 10 cm di terreno si deve impiegare il prodotto a 2 - 4 kg/ha in coltura protetta e 1 - 2 kg/ha in pieno campo.
- nei primi 20 cm di terreno si deve impiegare il prodotto a 3 - 6 kg/ha in coltura protetta e 2 - 3 kg/ha in pieno campo.

Utilizzare volumi d'acqua compresi tra 5 e 6 hl/ha.

MODALITA' D'IMPIEGO
Possono essere utilizzate le normali attrezzature aziendali, purché ben pulite. E' consigliabile trattare interamente l'appezzamento da coltivare. Dopo il trattamento lavorare il terreno alla profondità commisurata con la quantità di prodotto utilizzata. Da dopo il trattamento fino alla fine del ciclo colturale non possono essere effettuate lavorazioni del terreno a profondità maggiori. CONTANS® WG deve essere applicato 2 - 3 mesi prima dell'attacco di Sclerotinia, in modo da permettere all'antagonista fungino di avere il tempo necessario per estrinsecare la propria azione disinfettante nello strato di suolo interessato.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE
Preparare una soluzione concentrata versando 1 kg di CONTANS® WG in circa 3 - 4 litri d'acqua a temperatura ambiente. Lasciare riposare per 5 minuti quindi miscelare energicamente. Riempire la botte per metà, aggiungere la soluzione concentrata quindi portare a volume. Mantenere la sospensione in continua agitazione durante l'applicazione. Si consiglia di utilizzare la soluzione ottenuta immediatamente.

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

COMPATIBILITA'
CONTANS® WG è miscibile con diserbanti contenenti propyzamide e trifluralin. E' inoltre miscibile con fungicidi contenenti fosetyl alluminio e iprodione. Devono essere assolutamente evitate miscele con fungicidi, prodotti acidi o alcalini e con tutti i prodotti che possono reagire con la sostanza organica. Può essere applicato immediatamente dopo la disinfezione con vapore, mentre può essere utilizzato solo 20 giorni dopo il trattamento con disinfettanti di sintesi chimica.

FITOTOSSICITA'
Non è fitotossico, non provoca danni in caso di contatto accidentale con colture limitrofe. Può essere ripetuto nello stesso appezzamento più volte durante la stagione.

Rev. 0106

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Rev. 0106

- FOGLIO ILLUSTRATIVO -

CONTANS® WG

PRODOTTO BIOLOGICO A BASE DI *CONIOTHYRIUM MINITANS* DA IMPIEGARE NEL TERRENO PER LA LOTTA A SCLEROTINIA - 1.3) GRANULI DISPERSIBILI IN ACQUA

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Coniothyrium minitans(isolato CON/M/91-08)	g 5,3 *
Coformulanti q.b. a	g 100

* Contiene non meno di 1 x 10^9 spore/g.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE
CONTANS® WG è un prodotto biologicamente attivo in quanto contiene spore vitali del fungo *Coniothyrium minitans* pertanto è importante che venga conservato con cura poiché potrebbe deteriorarsi. Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto. CONTANS® WG ha una stabilità garantita di 6 mesi ad una temperatura compresa tra 2° e + 6 °C. Non esporre il prodotto a temperature estreme, alte o basse. La confezione una volta aperta deve essere completamente utilizzata.

CARATTERISTICHE
Il biofungicida CONTANS® WG contiene spore vitali del fungo *Coniothyrium minitans*, un antagonista naturale e selettivo nei confronti di varie specie di Sclerotinia. Le spore contenute nel prodotto, una volta reidratate, germinano e distruggono gli sclerozi con cui vengono a contatto.

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO
CONTANS® WG è un prodotto biologico a base di *Coniothyrium minitans* da impiegare in colture orto-floro-frutticole suscettibili per la lotta a Sclerotinie.
Per contenere il parassita:
- nei primi 10 cm di terreno si deve impiegare il prodotto a 2 - 4 kg/ha in coltura protetta e 1 - 2 kg/ha in pieno campo.
- nei primi 20 cm di terreno si deve impiegare il prodotto a 3 - 6 kg/ha in coltura protetta e 2 - 3 kg/ha in pieno campo.

Utilizzare volumi d'acqua compresi tra 5 e 6 hl/ha.

MODALITA' D'IMPIEGO
Possono essere utilizzate le normali attrezzature aziendali, purchè ben pulite. E' consigliabile trattare interamente l'appezzamento da coltivare. Dopo il trattamento lavorare il terreno alla profondità commisurata con la quantità di prodotto utilizzata. Da dopo il trattamento fino alla fine del ciclo colturale non possono essere effettuate lavorazioni del terreno a profondità maggiori. CONTANS® WG deve essere applicato 2 - 3 mesi prima dell'attacco di Sclerotinia, in modo da permettere all'antagonista fungino di avere il tempo necessario per estrinsecare la propria azione disinfettante nello strato di suolo interessato.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE
Preparare una soluzione concentrata versando 1 kg di CONTANS® WG in circa 3 - 4 litri d'acqua a temperatura ambiente. Lasciare riposare per 5 minuti quindi miscelare energicamente. Riempire la botte per metà, aggiungere la soluzione concentrata quindi portare a volume. Mantenere la sospensione in continua agitazione durante l'applicazione. Si consiglia di utilizzare la soluzione ottenuta immediatamente.

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non è fitotossico, non provoca danni in caso di contatto accidentale con colture limitrofe. Può essere ripetuto nello stesso appezzamento più volte durante la stagione.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Rev. 0106

- ETICHETTA RIDOTTA -

CONTANS® WG

PRODOTTO BIOLOGICO A BASE DI *CONIOTHYRIUM MINITANS* DA IMPIEGARE NEL TERRENO PER LA LOTTA A SCLEROTINIA - 1.3) GRANULI DISPERSIBILI IN ACQUA

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Coniothyrium minitans(isolato CON/M/91-08)	g 5,3 *
Coformulanti q.b. a	g 100

* Contiene non meno di 1 x 10^9 spore/g.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo)

OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
PROPHYTA BIOLOGISCHER PFLANZENSCHUTZ GmbH
Inselstraße 12 D-23999 Malchow/Poel GERMANIA

Registrazione n. 11252 del 26.03.2002 del Ministero della Salute

Contenuto: 0,1 kg

Riferimento Partita n. _______________

CONTANS® è un marchio registrato da PROPHYTA GmbH.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

COMPATIBILITA'
CONTANS® WG è miscibile con diserbanti contenenti propyzamide e trifluralin. E' inoltre miscibile con fungicidi contenenti fosetyl alluminio e iprodione. Devono essere assolutamente evitate miscele con fungicidi, prodotti acidi o alcalini e con tutti i prodotti che possono reagire con la sostanza organica. Può essere applicato immediatamente dopo la disinfezione con vapore, mentre può essere utilizzato solo 20 giorni dopo il trattamento con disinfettanti di sintesi chimica.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO - DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Rev. 0106

NEEMAZAL-T/S®

INSETTICIDA - NEMATOCIDA A BASE DI AZADIRACTINA
CONCENTRATO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:

Azadiractina A g 1 (= 10 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo)

OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
TRIFOLIO GmbH - Sonnerstrabe 22 - D-35633 Lahnau GERMANIA
L.I.F.A. S.r.l. - Via C. Colombo 7/7 - 30030 Vigonovo (VE)
I.R.C.A. Service S.p.A. - S.S. Cremasca 591, 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
TORRE S.r.l. - Via Pian d'Asso - Torrenieri fraz. di Montalcino (SI)

Registrazione n. 11561 del 20.01.2003 del Ministero della Salute

Contenuto: 50 - 100 - 250 - 500 cc; 1 - 2 - 5 - 10 litri

Partita n.___________ **Data di fabbricazione** ___________

NEEMAZAL-T/S® é un marchio registrato da TRIFOLIO GmbH.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
NEEMAZAL-T/S® é un insetticida di origine naturale estratto dall'albero del Neem (*Azadirachta indica*) che si caratterizza per un molteplice meccanismo di azione comprendente le attività di fagodetederrente, regolatore di crescita e con azione di riduzione della fecondità delle femmine. Per una migliore efficacia si consiglia di trattare popolazioni di insetti nei primi stadi di sviluppo.

CAMPI, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
NEEMAZAL-T/S® si impiega alle dosi indicate, riferite ad un ettaro di superficie, con pompe a volume normale e quantità di acqua sufficienti ad assicurare una completa ed uniforme bagnatura della vegetazione. Evitare l'uso di acqua con pH superiore a 7, altrimenti utilizzare un prodotto tampone. Aggiungere NEEMAZAL-T/S® sotto agitazione quando la botte è piena a ¾, quindi portare a volume. Utilizzare la soluzione ottenuta lo stesso giorno della preparazione. Eseguire di preferenza i trattamenti nelle prime ore del mattino o in serata. Il prodotto deve essere impiegato in modo tempestivo alla prima comparsa dei fitofagi, ripetendo eventualmente il trattamento con un intervallo di 7-10 giorni. In caso di piogge entro 8 ore dall'applicazione, si consiglia di ripetere il trattamento.

Colture	Parassiti	Dose (l/ha)	Dose (ml/hl)
	Ortaggi		
Ortaggi a foglia (lattuga, scarola, indivia, spinacio, bietola da foglia e da costa, prezzemolo, basilico, cicoria, rucola, radicchio)	Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (Ditteri), Nottue	2 - 3	200 - 300
Ortaggi a frutto (pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino, melone, cocomero, zucca)	Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (Ditteri), Nottue, Tripidi	2 - 3	200 - 300
Ortaggi a bulbo (cipolla, porro, aglio, scalogno)	Tripidi, Ditteri e Minatori fogliari (Lepidotteri)	2 - 3	200 - 300
Sedano	Afidi, Minatori fogliari (Ditteri e Lepidotteri), Nottue	2 - 3	200 - 300
Finocchio	Afidi, larve di Lepidotteri	2 - 3	200 - 300
Carota	Afidi, Ditteri, larve di Lepidotteri	2 - 3	200 - 300
Cavoli (cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza)	Afidi, Nottue, Tignole	2 - 3	200 - 300
Fagiolino	Afidi, larve di Lepidotteri	2 - 3	200 - 300
	Fruttiferi		
Actinidia, cachi	Aleurodidi, Cicaline	2 - 3	200 - 300
Agrumi (arancio, limone, pompelmo, mandarino)	Afidi, Minatori fogliari (Lepidotteri), Aleurodidi, Cicaline, Tripidi	2 - 3	200 - 300
Drupacee (albicocco, pesco, nettarine, susino)	Afidi, Cicaline, Minatori fogliari (Lepidotteri), Tripidi	2 - 3	200 - 300
Ciliegio	Afidi	2 - 3	200 - 300
Fragola	Afidi, Tripidi, Aleurodidi, Nottue	2 - 3	200 - 300
Pero	Afidi, Psilla	2 - 3	200 - 300
Melo	Afidi, Cheimatobia, Cicaline, Minatori fogliari (Lepidotteri), Tripidi	2 - 3	200 - 300

Rev. 0106

Olivo	Tignole, Tripidi	2 - 3	200 - 300
Vite	Cicaline, Tripidi, Tignole	2 - 3	200 - 300
Piccoli frutti (more, mora di rovo, lampone, mirtillo, ribes , uva spina)	Afidi, Tripidi, Metcalfa	2 - 3	200 - 300
Fico	Metcalfa	2 - 3	200 - 300
Mandorlo	Afidi, Cicaline, Minatori fogliari (Lepidotteri), Tripidi	2 - 3	200 - 300
Castagno	Afidi	2 - 3	200 - 300
Nocciolo	Cimici	2 - 3	200 - 300
Noce	Afidi	2 - 3	200 - 300
Altri impieghi			
Barbabietola da zucchero	Afidi	2 - 3	200 - 300
Cotone	Afidi, Aleurodidi	2 - 3	200 - 300
Patata	Afidi, Dorifora, Tignola, Tripidi, Aleurodidi, Nottue	2 - 3	200 - 300
Tabacco	Afidi, Aleurodidi	2 - 3	200 - 300
Floreali e ornamentali	Afidi, Tripidi, Minatori fogliari, Cicaline, Aleurodidi, Psille, larve di Lepidotteri	2 - 3	200 - 300
Funghi coltivati	Ditteri	2 - 3	200 - 300
Forestali	Afidi, Tripidi, Minatori fogliari, Cicaline, Aleurodidi, Psille, larve di Lepidotteri	2 - 3	200 - 300

Contro i nematodi galligeni (*Meloidogyne* sp) impiegare il prodotto in fertirrigazione alla dose di 5-7 l/ha.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere il trattamento:
7 giorni prima della raccolta per mandorlo, castagno, nocciolo e noce;
3 giorni prima della raccolta per le altre colture.

COMPATIBILITA'
NEEMAZAL-T/S® non é compatibile con prodotti a reazione molto acida (es. argille acide) o alcalina (es. polisolfuro di calcio, poltiglia bordolese, etc.).

AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. A temperatura ambiente il prodotto ha una stabilità garantita di almeno 2 anni.

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza del formulato aggiunto. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
NEEMAZAL-T/S® normalmente non è fitotossico ed il trattamento può essere ripetuto nello stesso appezzamento più volte durante la stagione. Alcune specie e/o varietà però si sono dimostrate sensibili all'azadiractina. Sulle seguenti varietà di pero si possono manifestare sintomi di fitotossicità: *Abate Fetel, Alexander Lukas, Bristol Cross, Coscia, Conference, Decana del Comizio, Decana d'Inverno, Guyot, HW 606, Illinois 13bars 83 Maxi Vereinsdechant, Trévoux, Lectier, Pierre Corneille, Santa Maria.*
Le specie ornamentali sensibili sono: *Begonia semperflorens, Chrysanthema, Euphorbia pulcherrima (Peter star, Cortez), Gerbera (Pretty red, Sigma, Luciana), Impatiens New Guinea, Impatiens walleriana, Pelargonium peltatum, P. zonale, Solanum rantonnetti, Saintpaulia, rosa (Papa Meilland).*
In considerazione dell'elevato numero di varietà di pero ed ornamentali si consiglia di effettuare trattamenti su superfici ridotte con alcune piante test per verificarne la selettività.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura alle dosi e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Rev. 0106

- FOGLIO ILLUSTRATIVO -

NEEMAZAL-T/S®

INSETTICIDA - NEMATOCIDA A BASE DI AZADIRACTINA
CONCENTRATO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:

Azadiractina A g 1 (= 10 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CARATTERISTICHE
NEEMAZAL-T/S® é un insetticida di origine naturale estratto dall'albero del Neem (*Azadirachta indica*) che si caratterizza per un molteplice meccanismo di azione comprendente le attività di fagodetederrente, regolatore di crescita e con azione di riduzione della fecondità delle femmine. Per una migliore efficacia si consiglia di trattare popolazioni di insetti nei primi stadi di sviluppo.

CAMPI, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
NEEMAZAL-T/S® si impiega alle dosi indicate, riferite ad un ettaro di superficie, con pompe a volume normale e quantità di acqua sufficienti ad assicurare una completa ed uniforme bagnatura della vegetazione. Evitare l'uso di acqua con pH superiore a 7, altrimenti utilizzare un prodotto tampone. Aggiungere NEEMAZAL-T/S® sotto agitazione quando la botte è piena a ¾, quindi portare a volume. Utilizzare la soluzione ottenuta lo stesso giorno della preparazione. Eseguire di preferenza i trattamenti nelle prime ore del mattino o in serata. Il prodotto deve essere impiegato in modo tempestivo alla prima comparsa dei fitofagi, ripetendo eventualmente il trattamento con un intervallo di 7-10 giorni. In caso di piogge entro 8 ore dall'applicazione, si consiglia di ripetere il trattamento.

Colture	Parassiti	Dose (l/ha)	Dose (ml/hl)
Ortaggi			
Ortaggi a foglia (lattuga, scarola, indivia, spinacio, bietola da foglia e da costa, prezzemolo, basilico, cicoria, rucola, radicchio)	Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (Ditteri), Nottue	2 - 3	200 - 300
Ortaggi a frutto (pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino, melone, cocomero, zucca)	Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (Ditteri), Nottue, Tripidi	2 - 3	200 - 300
Ortaggi a bulbo (cipolla, porro, aglio, scalogno)	Tripidi, Ditteri e Minatori fogliari (Lepidotteri)	2 - 3	200 - 300
Sedano	Afidi, Minatori fogliari (Ditteri e Lepidotteri), Nottue	2 - 3	200 - 300
Finocchio	Afidi, larve di Lepidotteri	2 - 3	200 - 300
Carota	Afidi, Ditteri, larve di Lepidotteri	2 - 3	200 - 300
Cavoli (cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza)	Afidi, Nottue, Tignole	2 - 3	200 - 300
Fagiolino	Afidi, larve di Lepidotteri	2 - 3	200 - 300
Fruttiferi			
Actinidia, cachi	Aleurodidi, Cicaline	2 - 3	200 - 300
Agrumi (arancio, limone, pompelmo, mandarino)	Afidi, Minatori fogliari (Lepidotteri), Aleurodidi, Cicaline, Tripidi	2 - 3	200 - 300
Drupacee (albicocco, pesco, nettarine, susino)	Afidi, Cicaline, Minatori fogliari (Lepidotteri), Tripidi	2 - 3	200 - 300
Ciliegio	Afidi	2 - 3	200 - 300
Fragola	Afidi, Tripidi, Aleurodidi, Nottue	2 - 3	200 - 300
Pero	Afidi, Psilla	2 - 3	200 - 300
Melo	Afidi, Cheimatobia, Cicaline, Minatori fogliari (Lepidotteri), Tripidi	2 - 3	200 - 300
Olivo	Tignole, Tripidi	2 - 3	200 - 300
Vite	Cicaline, Tripidi, Tignole	2 - 3	200 - 300
Piccoli frutti (more, mora di rovo, lampone, mirtillo, ribes , uva spina)	Afidi, Tripidi, Metcalfa	2 - 3	200 - 300
Fico	Metcalfa	2 - 3	200 - 300
Mandorlo	Afidi, Cicaline, Minatori fogliari (Lepidotteri), Tripidi	2 - 3	200 - 300
Castagno	Afidi	2 - 3	200 - 300
Nocciolo	Cimici	2 - 3	200 - 300
Noce	Afidi	2 - 3	200 - 300
Altri impieghi			
Barbabietola da zucchero	Afidi	2 - 3	200 - 300
Cotone	Afidi, Aleurodidi	2 - 3	200 - 300
Patata	Afidi, Dorifora, Tignola, Tripidi, Aleurodidi, Nottue	2 - 3	200 - 300
Tabacco	Afidi, Aleurodidi	2 - 3	200 - 300
Floreali e ornamentali	Afidi, Tripidi, Minatori fogliari, Cicaline, Aleurodidi, Psille, larve di Lepidotteri	2 - 3	200 - 300

Rev. 0106

Funghi coltivati	Ditteri	2 - 3	200 - 300
Forestali	Afidi, Tripidi, Minatori fogliari, Cicaline, Aleurodidi, Psille, larve di Lepidotteri	2 - 3	200 - 300

Contro i nematodi galligeni (*Meloidogyne* sp) impiegare il prodotto in fertirrigazione alla dose di 5-7 l/ha.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere il trattamento:
7 giorni prima della raccolta per mandorlo, castagno, nocciolo e noce;
3 giorni prima della raccolta per le altre colture.

COMPATIBILITA'
NEEMAZAL-T/S® non é compatibile con prodotti a reazione molto acida (es. argille acide) o alcalina (es. polisolfuro di calcio, poltiglia bordolese, etc.).

AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. A temperatura ambiente il prodotto ha una stabilità garantita di almeno 2 anni.

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza del formulato aggiunto. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
NEEMAZAL-T/S® normalmente non è fitotossico ed il trattamento può essere ripetuto nello stesso appezzamento più volte durante la stagione. Alcune specie e/o varietà però si sono dimostrate sensibili all'azadiractina. Sulle seguenti varietà di pero si possono manifestare sintomi di fitotossicità: *Abate Fetel, Alexander Lukas, Bristol Cross, Coscia, Conference, Decana del Comizio, Decana d'Inverno, Guyot, HW 606, Illinois 13bars 83 Maxi Vereinsdechant, Trévoux, Lectier, Pierre Corneille, Santa Maria.*
Le specie ornamentali sensibili sono: *Begonia semperflorens, Chrysanthema, Euphorbia pulcherrima (Peter star, Cortez), Gerbera (Pretty red, Sigma, Luciana), Impatiens New Guinea, Impatiens walleriana, Pelargonium peltatum, P. zonale, Solanum rantonnetti, Saintpaulia, rosa (Papa Meilland).*
In considerazione dell'elevato numero di varietà di pero ed ornamentali si consiglia di effettuare trattamenti su superfici ridotte con alcune piante test per verificarne la selettività.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura alle dosi e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Rev. 0106

- ETICHETTA RIDOTTA -

NEEMAZAL-T/S®

INSETTICIDA - NEMATOCIDA A BASE DI AZADIRACTINA
CONCENTRATO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:

Azadiractina A	g 1 (= 10 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. A temperatura ambiente il prodotto ha una stabilità garantita di almeno 2 anni.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere il trattamento:
7 giorni prima della raccolta per mandorlo, castagno, nocciolo e noce;
3 giorni prima della raccolta per le altre colture.

COMPATIBILITA'
NEEMAZAL-T/S® non è compatibile con prodotti a reazione molto acida (es. argille acide) o alcalina (es. polisolfuro di calcio, poltiglia bordolese, etc.).

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza del formulato aggiunto. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo)

OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
TRIFOLIO GmbH - Sonnerstrabe 22 - D-35633 Lahnau GERMANIA
L.I.F.A. S.r.l. - Via C. Colombo 7/7 - 30030 Vigonovo (VE)
I.R.C.A. Service S.p.A. - S.S. Cremasca 591, 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
TORRE S.r.l. - Via Pian d'Asso - Torrenieri fraz. di Montalcino (SI)

Registrazione n. 11561 del 20.01.2003 del Ministero della Salute

Contenuto: 50 - 100 cc

Partita n.___________ **Data di fabbricazione** ___________

NEEMAZAL-T/S® è un marchio registrato da TRIFOLIO GmbH.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO - DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Rev. 0106

BOVERAL OF®

BIOINSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA
A BASE DI *BEAUVERIA BASSIANA*

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Beauveria bassiana (ceppo ATCC 74040)	g 7,16 *
Coformulanti q.b. a	g 100

* Contiene non meno di 2,3 x 10^7 spore vitali/ml.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo)

OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
TROY BIOSCIENCES INC. - 2620 N. 37th Drive, Phoenix, Arizona 85009 - USA
I.R.C.A. Service S.p.A. - S.S. Cremasca 591 n. 10 - 20040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione n. 11578 del 06.02.2003 del Ministero della Salute

Contenuto: 50 - 100 - 250 - 500 cc; 1 - 2 - 5 - 10 litri

Riferimento Partita n. _______________ **Data di fabbricazione** ________________

BOVERAL OF® è un marchio registrato da Intrachem Bio Italia S.p.A.

NORME PRECAUZIONALI
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE
BOVERAL OF® è un prodotto biologicamente attivo in quanto contiene spore vitali del fungo *Beauveria bassiana* pertanto é importante che venga conservato con cura poiché potrebbe deteriorarsi. Conservare il prodotto al riparo dalla luce in luogo fresco e asciutto. BOVERAL OF® ha una stabilità garantita di 1 anno se conservato in frigorifero a 4 - 6 °C. Si osservi la data di confezionamento riportata sulla confezione. Non esporre il prodotto ad alte temperature in quanto potrebbe diminuire notevolmente la sua attività biologica.

CARATTERISTICHE
BOVERAL OF® è un bioinsetticida a base di spore vitali del fungo *Beauveria bassiana*. Si tratta di un ceppo presente in natura e non manipolato geneticamente particolarmente attivo contro gli aleurodidi, i tripidi, gli afidi e il ragnetto rosso delle colture orticole e ornamentali. Agisce per contatto. I conidi della *Beauveria bassiana* aderiscono alla cuticola degli insetti e acari, germinano e penetrano diffondendo il micete all'interno dell'ospite. La morte è dovuta all'azione meccanica di penetrazione del micelio e conseguente perdita di acqua e nutrienti combinata alla secrezione di enzimi idrolitici.

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO
BOVERAL OF® è attivo contro tutti gli stadi ma particolarmente contro le forme giovanili degli aleurodidi (*Bemisia tabaci/argentifolii*, *Trialeurodes vaporariorum*), tripidi (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabaci*), ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*) e alcune specie di afidi (*Nasonovia ribis-nigri*, *Myzus persicae*, *Aphis fabae*), che attaccano la maggior parte delle colture orticole e ornamentali in serra e pieno campo.

ORTAGGI
pomodoro, peperone, melanzana:
aleurodidi 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
tripidi 120 - 150 ml/hl, oppure 1 - 1,5 l/ha
ragnetto rosso 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
elateridi 80 - 120 ml/hl
cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo:
aleurodidi 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
tripidi 120 - 150 ml/hl, oppure 1 - 1,5 l/ha
ragnetto rosso 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
elateridi 80 - 120 ml/hl
lattuga, indivia, radicchio:
aleurodidi 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha,
afidi spp. 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
ragnetto rosso 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
elateridi 80 - 120 ml/hl
FRAGOLA:
aleurodidi 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
tripidi 120 - 150 ml/hl, oppure 1 - 1,5 l/ha,
afidi spp. 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
ragnetto rosso 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
CAROTA - PATATA:
elateridi 400 - 600 ml/hl, oppure 2 - 3 litri/ha (trattamento al terreno in pre trapianto ed alla rincalzatura)
FLOREALI ED ORNAMENTALI:
aleurodidi 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
tripidi 120 - 150 ml/hl, oppure 1 - 1,5 l/ha
ragnetto rosso 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
PESCO - ALBICOCCO - SUSINO - CILIEGIO:
tripidi 80 - 120 ml/hl
MELO - PERO:
tingide 80 - 120 ml/hl

Rev. 0106

VITE:
cicaline: 80 - 120 ml/hl
NOCCIOLO - CASTAGNO:
balanino 400 - 600 ml/hl, oppure 2-3 litri/ha (trattamento al terreno prima dell' impupamento)
LAMPONE - ROVO:
tripidi 120 - 150 ml/hl, oppure 1 - 1,5 litri/ha
afidi 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 litro/ha
ragnetto rosso 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 litro/ha
BASILICO:
tripidi 120 - 150 ml/hl, oppure 1 - 1,5 litri/ha
AGRUMI:
aleurodidi 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 litro/ha

MODALITA' D'IMPIEGO

- BOVERAL OF® si impiega per irrorazione con apparecchiature e volumi di acqua sufficienti a garantire una copertura ottimale della vegetazione. Applicare preferibilmente la mattina presto o al tramonto, quando gli adulti volano di meno e l'umidità relativa è più elevata.

- BOVERAL OF® deve essere impiegato con bassi livelli di infestazione e comunque prima che i danni alla coltura diventino evidenti. In base alle condizioni climatiche ed al livello di infestazione sono necessarie 3 - 5 applicazioni con un intervallo di 5 - 7 giorni per avere un buon controllo dell'insetto. In caso di pioggia si consiglia di ripetere il trattamento.

BOVERAL OF® può essere utilizzato in agricoltura biologica e si integra perfettamente con gli insetticidi, compresi gli oli estivi, utilizzabili nei programmi di lotta integrata. BOVERAL OF® è un valido strumento per abbassare i livelli d'infestazione dei fitofagi agevolando l'utilizzo degli ausiliari (insetti ed acari utili).

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE
BOVERAL OF® può essere applicato con qualsiasi tipo di apparecchiatura purché assicuri una copertura ottimale della vegetazione. Non utilizzare ugelli di diametro inferiore a 25 mesh. Non applicare questo prodotto mediante sistemi di irrigazione. Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Mantenere la soluzione in agitazione durante la miscela e il trattamento. Per ottenere una corretta dispersione del prodotto in acqua, riempire la botte per metà, aggiungere BOVERAL OF® quindi portare a volume. **Applicare il prodotto subito dopo averlo miscelato in acqua. Assicurarsi che l'apparecchiatura utilizzata non contenga residui di precedenti trattamenti con fungicidi.**

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE
Non usare in prossimità di corsi d'acqua. Non impiegare il prodotto in prossimità di gelsi utilizzati per l'allevamento del baco da seta. Può provocare il calcino.

COMPATIBILITA'
BOVERAL OF® può essere impiegato in miscela con altri prodotti insetticidi per ottenere un maggiore controllo dell'infestazione. E' inoltre compatibile in miscela con fungicidi a base di Zolfo e Rame. **Altri prodotti fungicidi di sintesi vanno impiegati con un intervallo di almeno 2 giorni dai trattamenti con BOVERAL OF®.**

FITOTOSSICITA'
Nelle normali condizioni di impiego il prodotto non è fitotossico.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura;ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Rev. 0106

- FOGLIO ILLUSTRATIVO -

BOVERAL OF®

BIOINSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA A BASE DI *BEAUVERIA BASSIANA*

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Beauveria bassiana (ceppo ATCC 74040)	g 7,16 *
Coformulanti q.b. a	g 100

* Contiene non meno di 2,3 x 10^7 spore vitali/ml.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE
BOVERAL OF® è un prodotto biologicamente attivo in quanto contiene spore vitali del fungo *Beauveria bassiana* pertanto è importante che venga conservato con cura poiché potrebbe deteriorarsi. Conservare il prodotto al riparo dalla luce in luogo fresco e asciutto. BOVERAL OF® ha una stabilità garantita di 1 anno se conservato in frigorifero a 4 - 6 °C. Si osservi la data di confezionamento riportata sulla confezione. Non esporre il prodotto ad alte temperature in quanto potrebbe diminuire notevolmente la sua attività biologica.

CARATTERISTICHE
BOVERAL OF® è un bioinsetticida a base di spore vitali del fungo *Beauveria bassiana*. Si tratta di un ceppo presente in natura e non manipolato geneticamente particolarmente attivo contro gli aleurodidi, i tripidi, gli afidi e il ragnetto rosso delle colture orticole e ornamentali. Agisce per contatto. I conidi della *Beauveria bassiana* aderiscono alla cuticola degli insetti e acari, germinano e penetrano diffondendo il micete all'interno dell'ospite. La morte è dovuta all'azione meccanica di penetrazione del micelio e conseguente perdita di acqua e nutrienti combinata alla secrezione di enzimi idrolitici.

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO
BOVERAL OF® è attivo contro tutti gli stadi ma particolarmente contro le forme giovanili degli aleurodidi (*Bemisia tabaci/argentifolii*, *Trialeurodes vaporariorum*), tripidi (*Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci*), ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*) e alcune specie di afidi (*Nasonovia ribis-nigri, Myzus persicae, Aphis fabae*), che attaccano la maggior parte delle colture orticole e ornamentali in serra e pieno campo.

ORTAGGI
pomodoro, peperone, melanzana:
aleurodidi 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
tripidi 120 - 150 ml/hl, oppure 1 - 1,5 l/ha
ragnetto rosso 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
elateridi 80 - 120 ml/hl
cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo:
aleurodidi 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
tripidi 120 - 150 ml/hl, oppure 1 - 1,5 l/ha
ragnetto rosso 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
elateridi 80 - 120 ml/hl
lattuga, indivia, radicchio:
aleurodidi 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha,
afidi spp. 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
ragnetto rosso 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
elateridi 80 - 120 ml/hl
FRAGOLA:
aleurodidi 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
tripidi 120 - 150 ml/hl, oppure 1 - 1,5 l/ha,
afidi spp. 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
ragnetto rosso 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
CAROTA - PATATA:
elateridi 400 - 600 ml/hl, oppure 2 - 3 litri/ha (trattamento al terreno in pre trapianto ed alla rincalzatura)
FLOREALI ED ORNAMENTALI:
aleurodidi 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
tripidi 120 - 150 ml/hl, oppure 1 - 1,5 l/ha
ragnetto rosso 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 l/ha
PESCO - ALBICOCCO - SUSINO - CILIEGIO:
tripidi 80 - 120 ml/hl
MELO - PERO:
tingide 80 - 120 ml/hl
VITE:
cicaline: 80 - 120 ml/hl
NOCCIOLO - CASTAGNO:
balanino 400 - 600 ml/hl, oppure 2-3 litri/ha (trattamento al terreno prima dell' impupamento)
LAMPONE - ROVO:
tripidi 120 - 150 ml/hl, oppure 1 - 1,5 litri/ha
afidi 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 litro/ha
ragnetto rosso 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 litro/ha
BASILICO:
tripidi 120 - 150 ml/hl, oppure 1 - 1,5 litri/ha
AGRUMI:
aleurodidi 80 - 120 ml/hl, oppure 0,75 - 1 litro/ha

Rev. 0106

MODALITA' D'IMPIEGO

- BOVERAL OF® si impiega per irrorazione con apparecchiature e volumi di acqua sufficienti a garantire una copertura ottimale della vegetazione. Applicare preferibilmente la mattina presto o al tramonto, quando gli adulti volano di meno e l'umidità relativa è più elevata.

- BOVERAL OF® deve essere impiegato con bassi livelli di infestazione e comunque prima che i danni alla coltura diventino evidenti. In base alle condizioni climatiche ed al livello di infestazione sono necessarie 3 - 5 applicazioni con un intervallo di 5 - 7 giorni per avere un buon controllo dell'insetto. In caso di pioggia si consiglia di ripetere il trattamento.

BOVERAL OF® può essere utilizzato in agricoltura biologica e si integra perfettamente con gli insetticidi, compresi gli oli estivi, utilizzabili nei programmi di lotta integrata. BOVERAL OF® è un valido strumento per abbassare i livelli d'infestazione dei fitofagi agevolando l'utilizzo degli ausiliari (insetti ed acari utili).

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE
BOVERAL OF® può essere applicato con qualsiasi tipo di apparecchiatura purché assicuri una copertura ottimale della vegetazione. Non utilizzare ugelli di diametro inferiore a 25 mesh. Non applicare questo prodotto mediante sistemi di irrigazione. Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Mantenere la soluzione in agitazione durante la miscela e il trattamento. Per ottenere una corretta dispersione del prodotto in acqua, riempire la botte per metà, aggiungere BOVERAL OF® quindi portare a volume. **Applicare il prodotto subito dopo averlo miscelato in acqua. Assicurarsi che l'apparecchiatura utilizzata non contenga residui di precedenti trattamenti con fungicidi.**

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE
Non usare in prossimità di corsi d'acqua. Non impiegare il prodotto in prossimità di gelsi utilizzati per l'allevamento del baco da seta. Può provocare il calcino.

FITOTOSSICITA'
Nelle normali condizioni di impiego il prodotto non è fitotossico.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura;ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Rev. 0106

- ETICHETTA RIDOTTA -

BOVERAL OF®

BIOINSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA
A BASE DI *BEAUVERIA BASSIANA*

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Beauveria bassiana (ceppo ATCC 74040)	g 7,16 *
Coformulanti q.b. a	g 100

* Contiene non meno di 2,3 x 10^7 spore vitali/ml.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo)

OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
TROY BIOSCIENCES INC. - 2620 N. 37th Drive, Phoenix, Arizona 85009 - USA
I.R.C.A. Service S.p.A. - S.S. Cremasca 591 n. 10 - 20040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione n. 11578 del 06.02.2003 del Ministero della Salute

Contenuto: 50 - 100 cc

Riferimento Partita n. _______________ Data di fabbricazione ________________

BOVERAL OF® è un marchio registrato da Intrachem Bio Italia S.p.A.

NORME PRECAUZIONALI
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

COMPATIBILITA'
BOVERAL OF® può essere impiegato in miscela con altri prodotti insetticidi per ottenere un maggiore controllo dell'infestazione. E' inoltre compatibile in miscela con fungicidi a base di Zolfo e Rame. **Altri prodotti fungicidi di sintesi vanno impiegati con un intervallo di almeno 2 giorni dai trattamenti con BOVERAL OF®.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO - DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Rev. 0106

AMINCO S.r.l.

FAST – SPEED TOP

FITORMONE - FITOSTIMOLANTE - ALLEGANTE

COMPOSIZIONE:
Acido gibberellico puro........................... g 0,150 (1,65 g/l)
NAA (Acido alfa-naftalenacetico)............. g 0,300 (3,3 g/l)
Coformulanti e coadiuvanti.................... q.b.a. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, ne fumare durante l'impiego del prodotto.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
FAST-SPEED TOP per la sua particolare composizione è un Fitoregolatore con azione di stimolo sullo sviluppo vegetativo, con attività complementari quali l'anticipo della fioritura e della maturazione, maggiore allegagione, pezzatura uniformi, migliore colore della frutta.

CAMPI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
AGRUMI: (Arancio, Limone, Pompelmo, Clementino)
Per una maggiore fioritura e allegagione. **Dosi**: ml 100-150/hl. Sono consigliati due trattamenti: il primo all'inizio della fioritura; il secondo durante l'allegagione.
Per una più uniforme pezzatura ed una più precoce ed uniforme colorazione. **Dosi**: ml 150-200/hl. Sono consigliati due trattamenti: il primo dopo l'allegagione, il secondo prima della invaiatura.
PERO E MELO:
per una migliore allegagione Dosi: ml 100-150/hl. Trattamento nella fase della fioritura con 20-30% dei fiori aperti.
Come anticascola. **Dosi**: ml 150-200/hl ai primi sintomi di cascola
COLTURE ORTICOLE: (Fragola, pomodoro, zucchino, carciofo, sedano, spinacio, patata)
Fragola - **Per l'anticipo della fioritura ed una più precoce raccolta**. **Dosi**: ml 100-150/hl con due o più trattamenti: il primo 20-30 giorni prima della prevista fioritura; il secondo dopo l'allegagione.
Carciofo - **Per anticipare la produzione dei capolini**. **Dosi**: ml 150-200/hl alla formazione del primo abbozzo fiorale.
Ripetere il trattamento ogni 15-20 giorni.
Pomodoro - **Per una maggiore fioritura, allegagione, pezzatura e colorazione dei frutti**. **Dosi**: ml 150-200/hl. Sono consigliati due o più trattamenti irrorando tutta la vegetazione. Il primo alla dose di 150 ml/hl prima della fioritura; il secondo ed i successivi dopo la formazione dei primi frutti.
Patata - **Per stimolare l'emissione dei germogli**. **Dosi**: ml 150-200/hl. Immergere i tuberi (interi o tagliati) per circa 5 minuti.
Zucchino - **Per favorire l'ingrossamento dei frutti ed una più uniforme e anticipata pezzatura**. **Dosi**: ml 150-200/hl. Sono consigliati due o più trattamenti. Il primo appena formati i primi frutticini, irrorando tutte le piante. Ripetere il trattamento ad intervalli di 15-20 giorni appena si sono formati i nuovi frutti.
Spinacio - **Per un più precoce sviluppo e dimensione fogliare**. **Dosi**: ml 150-200/hl. Sono consigliati due o più trattamenti distanziati di 15-20 giorni l'uno dall'altro.
Sedano - **Per una maggiore ed uniforme pezzatura**. **Dosi**: ml 150-200/hl. Sono consigliati due o più trattamenti distanziati di 15-20 giorni l'uno dall'altro.
COLTURE FLORICOLE IN SERRA E PIENO CAMPO
Per aumentare la fioritura e per la formazione di fiori più grossi. **Dosi**: ml 150-200/hl. Sono consigliati tre o più trattamenti distanziati di 10-20 giorni l'uno dall'altro a partire dalle prime fasi di piena attività vegetativa.

COMPATIBILITA':
Il prodotto è miscibile con i fertilizzanti fogliari.

AVVERTENZA : In caso di miscele deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto è fitotossico per le pere Decana del Comizio.
Sospendere i trattamenti 27 giorni prima della raccolta della fragola e 20 giorni per le altre colture edùli
ATTENZIONE :impiegare il prodotto esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

AMINCO SRL – Via Mandilli,14 12071 Bagnasco (CN)

Officina di Produzione:
TERRANALISI s.n.c., Via BIxio, 6 - Cento (Ferrara)
Registrazione n 9117 del29/11/1997 del Ministero della Salute
ml 20 - 100 - 250 - 500 - 1000 Partita n

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

TOTAL FRANCE

CITROLE®

CONCENTRATO EMULSIONABILE A BASE DI OLIO MINERALE PER TRATTAMENTI ANTICOCCIDICI E CONTRO LE UOVA DEGLI ACARI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Olio minerale paraffinico puro (U.R. 99 %) g 97 (=825 g/l)
- Coformulanti: q.b. a g 100

Titolare della registrazione:
TOTAL France
24 Cours Michelet - 92800 Puteaux - FRANCE

Officine di produzione:
TOTAL Fluides Z.I. du Havre - route du canal de Tancarville - 76430 St Romain de Colbosc - FRANCE

Officina di confezionamento:
ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT)
IRCA SERVICE S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione del Ministero della Sanità n°8534 del 30.07.1994

Contenuto netto: litri 0,5 - 1 - 5 - 10 – 20 – 50 - 100 – 200* – 275*

Partita n°...........................

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Liquido emulsionabile a base di olio paraffinico altamente raffinato. Agisce essenzialmente per asfissia, coprendo il corpo degli insetti con una sottile pellicola e penetrando per capillarità nei loro canali tracheali che rimangono perciò occlusi (a tale penetrazione fa seguito un'azione irritante e quindi la morte per asfissia). Insetticida per la lotta contro le cocciniglie e le uova di acari delle piante da frutto (pomacee e drupacee), fico, noce, nocciolo, ribes, agrumi, olivo e piante ornamentali.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Agrumi (arancio, limone, mandarino, clementine): 1,5-2 litri/hl. I trattamenti si eseguono durante il periodo estivo, da giugno (quando il frutto raggiunge la grandezza di una noce) fino al periodo che precede l'invaiatura o durante il periodo invernale, dalla raccolta alla pre-fioritura.
Fruttiferi (pomacee, drupacee, noce, nocciolo, ribes): 1,5-2 litri/hl. I trattamenti devono essere effettuati preferibilmente a fine inverno (al rigonfiamento delle gemme) e nel periodo primaverile-estivo all'apparire delle infestazioni.
Olivo: 1,5-2 litri/hl. Trattamenti alla fine dell'inverno (febbraio-marzo) o in estate.
Fico: 1,5-2 litri /hl. Effettuare i trattamenti durante il riposo delle piante.
Piante ornamentali: 2 litri/hl. Trattare durante l'inverno. Non trattare durante la fioritura.

COMPATIBILITÀ: CITROLE non è miscibile con prodotti a base di zolfo, polisolfuri, carbammati, captano, clorotalonil, ciclofuanide, dinocap, folpet, propargite, triclorfon. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

FITOTOSSICITÀ: Non applicare su Pero cv. Decana. Non applicare con temperature superiori a 30°C. Non trattare durante la fioritura. Qualora fossero effettuati trattamenti con formulati con i quali CITROLE è incompatibile (prodotti a base di zolfo, polisolfuri, carbammati, captano, clorotalonil, diclofuanide, dinocap, folpet, propargite, triclorfon) l'applicazione di CITROLE deve essere effettuata almeno 10 giorni prima o due settimane dopo quella dei prodotti citati, ad eccezione dei ditiocarbammati, per i quali può essere applicato 3-5 giorni prima o dopo.

ATTENZIONEI DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE, SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
NON OPERARE CONTRO VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

***LO STOCCAGGIO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE DEI CONTENITORI DA 200 E 275 LITRI DEVE ESSERE EFFETTUATO IN ZONA DOTATA DI BACINO DI CONTENIMENTO DI ADEGUATO VOLUME, ATTO A RACCOGLIERE EVENTUALI FUORIUSCITE ACCIDENTALI DEL PRODOTTO**

® Marchio depositato

05/04/06

OVISPRAY®

CONCENTRATO EMULSIONABILE A BASE DI OLIO MINERALE PER TRATTAMENTI INSETTICIDI SU COLTURE ARBOREE ED ERBACEE E COME COADIUVANTE DI ERBICIDI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Olio minerale paraffinico puro (U.R. 99%) g 97 (= 825 g/l)
- Coformulanti: q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Titolare della registrazione:
TOTAL FRANCE
24 Cours Michelet - 92800 Puteaux - FRANCE

Officine di produzione:
LBC SOGESTRAN - Route de la Chimie - 76700 Gonfreville L'Orcher – FRANCE
PETROLE & SYNTHESE – Saint Manvieu Norrey - 14740 Norrey en bessin - FRANCE

Officina di confezionamento: DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA – Caravaggio (BG)

Registrazione del Ministero della Sanità n°8726 del 27.02.1995

Distribuito da: CHIMIBERG – divisione agricoltura di DIACHEM s.p.a. Albano S. Alessandro (BG)

Contenuto netto: litri 1 - 5 - 10 - 20 – 200* **Partita n°..........................**

® Marchio depositato

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Liquido emulsionabile a base di olio paraffinico altamente raffinato ad azione insetticida. Agisce essenzialmente per asfissia, coprendo il corpo degli insetti con una sottile pellicola e penetrando per capillarità nei loro canali tracheali che rimangono perciò occlusi (a tale penetrazione fa seguito un'azione irritante e quindi la morte per asfissia). Efficace per la lotta contro le cocciniglie e le uova di acari, esplica anche un'attività ovicida ed antischiusura nonché un'azione repellente verso alcuni insetti masticatori.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE, SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

LO STOCCAGGIO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE DEI CONTENITORI DA 200 LITRI DEVE ESSERE EFFETTUATO IN ZONA DOTATA DI BACINO DI CONTENIMENTO DI ADEGUATO VOLUME, ATTO A RACCOGLIERE EVENTUALI FUORIUSCITE ACCIDENTALI DEL PRODOTTO

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Colture	Parassiti	Dosi (litri/hl)
Agrumi	cocciniglie, afide verde, cimice, aleurodidi, tripidi, ragno rosso In primavera-estate: In inverno:	 1,5-2 2,5-3,5
Drupacee, Mandorlo	cocciniglie, afidi, tripidi, uova di lepidotteri, acari In primavera-estate: In inverno:	 1,5-2 2,5-3,5
Pomacee	cocciniglie, afidi, psilla, tignole, uova di lepidotteri, acari In primavera-estate: In inverno:	 1,5-2 2,5-3,5
Noce, Nocciolo, Caco, Fico, Ribes	cocciniglie, afidi, uova di lepidotteri, acari In primavera-estate: In inverno:	 1,5-2 2,5-3,5
Vite (uva da vino e da tavola)	cocciniglie, afidi, tripidi, uova di lepidotteri, acari In primavera-estate: In inverno:	 1,5-2 2,5-3,5
Olivo (olive da olio e da tavola)	cocciniglie, tignole, acari In primavera-estate: In inverno:	 1,5-2 2,5-3,5
Cucurbitacee	afidi, mosca bianca, tripidi, uova di lepidotteri e coleotteri, minatori delle foglie, acari, in periodo vegetativo	1-2,5
Peperone, Pomodoro, Patata	afidi, uova di dorifora, ditteri, acari, in periodo vegetativo	1-2,5
Fagiolo	afidi, tripidi, acari, in periodo vegetativo	1-2,5
Carciofo	afidi, mosca bianca, uova di lepidotteri, ditteri minatori, acari, in periodo vegetativo	1-2,5
Sedano, Finocchio	afidi, tripidi, mosca bianca, uova di minatori delle foglie, acari, in periodo vegetativo	1-2,5
Barbabietola da zucchero	afidi, mosca delle bietole, adulti di altica e cassida, in periodo vegetativo	1-2,5
Floreali, Ornamentali, Forestali	cocciniglie, afidi, tripidi, tignole, aleurodidi, acari In fase vegetativa: In inverno:	 1,5-2 2-2,5

Il prodotto può essere utilizzato anche come coadiuvante degli erbicidi, nei trattamenti di post-emergenza sulle seguenti colture:

Colture	Erbicidi utilizzabili in miscela	Dosi (litri/ha)
Barbabietola da zucchero	phenmedipham, desmedipham, ethofumesate, lenacil, metamitron, chloridazon, fluazifop-p-butyl, sethoxydim, cycloxydim, haloxyfop-R-metile, quizalofop-etile, clopyralid, diclofop-methyl, propaquizafop, clethodim	0,3-1 l/ha
Mais	dicamba, bentazone, clopyralid, bromoxynil, fluroxypir	0,3-2 l/ha
Soia	bentazone, imazethapyr, fluazifop-p-butyl, sethoxydim, cycloxydim, haloxyfop-R-metile, quizalofop-etile, propaquizafop, clethodim	0,3-2 l/ha
Patata	metribuzin, fluazifop-p-butyl, sethoxydim, cycloxydim, diclofop-methyl	0,3-2 l/ha
Pomodoro	metribuzin, fluazifop-p-butyl, sethoxydim, cycloxydim, quizalofop-etile, propaquizafop, clethodim	0,3-2 l/ha
Peperone	fluazifop-p-butyl, sethoxydim, cycloxydim	0,3-2 l/ha
Fagiolo	fluazifop-p-butyl, cycloxydim, diclofop-methyl, propaquizafop	0,3-2 l/ha
Carciofo	fluazifop-p-butyl, sethoxydim, cycloxydim, haloxyfop-R-metile, quizalofop-etile	0,3-2 l/ha
Sedano	fluazifop-p-butyl, sethoxydim	0,3-2 l/ha
Finocchio	fluazifop-p-butyl, sethoxydim, cycloxydim, haloxyfop-R-metile	0,3-2 l/ha

COMPATIBILITÀ: OVISPRAY non è miscibile con prodotti a base di zolfo, polisolfuri, carbammati, captano, clorotalonil, diclofuanide, dimetoato, dinocap, folpet, propargite, triclorfon. Qualora fossero effettuati trattamenti con tali formulati l'applicazione di OVISPRAY deve essere effettuata almeno 10 giorni prima o due settimane dopo quella dei prodotti citati, ad eccezione dei ditiocarbammati, per i quali può essere applicato 3-5 giorni prima o dopo. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura. Si sconsigliano gli interventi su Pero cv. Decana. Non applicare con temperature superiori a 32-34°C e su piante stressate.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

OXON ITALIA S.p.a.

TERBAGRO 500

Erbicida selettivo per Mais e Sorgo
Tipo di formulazione: sospensione concentrata

Composizione:
- Terbutilazina pura: . . . . g 50 (= 560 g/litro)
- Cofonnulanti: quanto basta a . . . . g 100

OXON ITALIA S.p.A.
Sede legale: Via Manzoni 44 - Milano

Registrazione n. 10474 del 19.04.00
del Ministero della Sanità

Officina di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie autorizzate: ml. 250- 500
Litri 1 - 5 - 10 - 20

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n.

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: (non specifici e rilevati su animali con superdosaggi). Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratoria, salivazione.
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZE: consultare un centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Epoca d'impiego: in pre-semina, con o senza interramento superficiale, in pre-emergenza o in post-emergenza precoce delle infestanti.

DOSI
Impiegare al massimo 1,7.litri/ha; si consiglia l'aggiunta di altri erbicidi idonei per completarne lo spettro d'azione sulle infestanti graminacee.

Volume di irrorazione: Distribuire uniformemente 200 o più l/ha di poltiglia.

Erbe infestanti sensibili: Amaranto (Amaranthus spp.), Camomilla (Matricaria spp.), Centocchio comune (Stellaria media), Correggiola (Polygonum aviculare), Erba morella (Solanum nigrum), Farinello (Chenopodimn spp.), Galinsoga comune (Galinsoga parviflora), Mercorella comune (Mercurialis annua), Miagro liscio (Miagrum perfoliatum), Porcellana comune (Portulaca oleracea), Poligono convolvolo (Fallopia convolvolus), Poligono persicaria (Polygonum persicaria), Ravanello selvatico (Raphanus raphanistrum), Senape selvatica (Sinapis arvensis), Veccia (Vicia *spp.)*.
Erbe infestanti resistenti: Graminacee, esclusi il Cencio molle (Abutilon theophrasti), Stramonio comune (Datura stramonium) e quelle munite di rizomi, stoloni, bulbi e bulbilli.

Preparazione della poltiglia: stemperare in poca acqua la prestabilita dose di prodotto e versare poi nel totale quantitativo di acqua mescolando accuratamente.

Compatibilità: il prodotto può essere associato ad altri erbicidi per completare lo spettro d'azione sulle infestanti o ad insetticidi per la disinfestazione del terreno.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenze agronomiche: affinché il prodotto possa esercitare la sua azione è necessario che una pioggia di almeno 10-15 mm. cada entro due settimane dal trattamento, altrimenti provvedere ad una equivalente irrigazione.
Impiegare il prodotto solo su colture specializzate in assenza di sottocolture. Dal trattamento erbicida alla semina di eventuali sottocolture occorre un intervallo minimo di 12 mesi.
Sospendere il trattamento al massimo alla post-emergenza delle infestanti.
Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.
Il prodotto non agisce nei terreni torbosi.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine.
Dopo l'impiego, lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione della poltiglia erbicida, prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

OXONIL R

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO CON AZIONE CURATIVA E PREVENTIVA IN POLVERE BAGNABILE

OXONIL R - Fungicida
Composizione: 100 gr di prodotto contengono:

Metalaxyl puro	g. 2,2
Rame metallo puro	g. 18
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)	
Coformulanti: q.b. a	g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

OXON ITALIA S.p.A.
Sede legale: via Manzoni 44 – Milano

Registrazione Ministero della Sanità n° 8494 del 30.03.1994

Officine di produzione:
SIPCAM SpA-Salerano sul Lambro (LO)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia)

Partita n°

Taglie: g. 100 - 250 - 500; Kg 1 - 5 - 10

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXYL 2,2% + RAME METALLO 18%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXYL: Sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
RAME: Sintomi: Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica. Controindicazioni: --
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fungicida a base di Metalaxyl e Rame ossicloruro che agisce con azione preventiva e curativa. Eseguire trattamenti iniziali al verificarsi della prima pioggia infettante; per quelli successivi, l'attività sistemica del prodotto garantisce la possibilità di mantenere scadenze fisse, indipendentemente dalle piogge anche se abbondanti e ripetute, in quanto non diminuiscono l'efficacia del trattamento. L'attività sistemica del prodotto consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo che intercorre tra un trattamento e l'altro.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Effettuare i trattamenti con pompe a volume normale.
VITE: contro Peronospora: g 850-900/hl fino ad allegagione avvenuta eseguendo i trattamenti ad intervalli di 14 giorni. Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare la buona copertura della vegetazione. Per la lotta contemporanea contro l'Oidio, miscelare il prodotto agli anticrittogamici previsti per questo scopo. ATTENZIONE: non applicare il prodotto su vivai di vite.
POMODORO: contro Peronospora: g 850-900/hl alla cadenza di 14-16 giorni
PATATA: contro Peronospora: 9 Kg/ha effettuando non più di 2-3 trattamenti alla cadenza di 10-14 giorni. Iniziare le applicazioni al verificarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia; a partire dal 7° giorno dopo l'ultimo trattamento con il prodotto, utilizzare prodotti di copertura. Il prodotto va utilizzato esclusivamente per trattamenti preventivi.

COMPATIBILITA': Il prodotto non è miscibile con insetticidi ed anticrittogamici a reazione acida o basica.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non trattare in fioritura.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto per la Vite e 20 giorni per il Pomodoro e per la Patata.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

OXONIL R

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO CON AZIONE CURATIVA E PREVENTIVA IN POLVERE BAGNABILE

OXONIL R - Fungicida
Composizione: 100 gr di prodotto contengono:

Metalaxyl puro	g.	2,2
Rame metallo puro (sotto forma di ossicloruro tetraramico)	g.	18
Coformulanti: q.b. a	g.	100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

OXON ITALIA S.p.A.
Sede legale: via Manzoni 44 – Milano

Registrazione Ministero della Sanità n° 8494 del 30.03.1994

Officine di produzione:
SIPCAM SpA-Salerano sul Lambro (LO)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia)

Partita n°

Taglie: g. 100

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXYL 2,2% - RAME METALLO 18%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXYL: Sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
RAME: Sintomi: Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica. Controindicazioni: --
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

GEOFIT

Insetticida granulare con effetto collaterale nematocida, per impiego contro insetti terricoli su terreno destinato a Fragola, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Melone, Carota, Cavolo a testa, Cipolla, Barbabietola da Zucchero, Patata, Mais, Tabacco e Colture floreali ed ornamentali, semenzai e vivai.

Composizione:
- Benfuracarb(*)puro .... g. 4,7
- Coadiuvanti ed inerti: quanto basta a . . . . g. 100

(*) sostanza attiva originale Otsuka Chemical Co. Ltd. Osaka

IRRITANTE

OXON ITALIA S.p.A.
Sede legale: via Manzoni 44 - Milano

Registrazione n. 10716 del 15.02.2001 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: Kg. 1-5-10-25

Partita n.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi. nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina
Controindicazioni: ossime.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida con effetto collaterale nematocida, che agisce per contatto e ingestione.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega nei trattamenti al terreno al momento della semina o del trapianto, localizzato sulla fila di semina o di trapianto alla dose di 10-12 kg/ha, per la difesa di:

FRAGOLA: contro Ferretti, Nottue, Maggiolino, Tipule, Grillotalpa, Mosca.
POMODORO, PEPERONE, MELANZANA: contro Ferretti, Nottue, Maggiolino, Tipule, Grillotalpa, Miriapodi, Bibionidi.
CETRIOLO, MELONE: contro Ferretti, Nottue, Maggiolino, Tipule, Grillotalpa, Miriapodi, Bibionidi.
CAROTA: contro Ferretti, Nottue, Maggiolino, Tipule, Grillotalpa, Mosca.
CAVOLO A TESTA: contro Ferretti, Nottue, Maggiolino, Tipule, Grillotalpa, Mosca, Punteruolo.
CIPOLLA: contro Ferretti, Nottue, Maggiolino, Tipule, Grillotalpa, Tripidi, Miriapodi, Bibionidi.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Elateridi, Maggiolini, Atomaria, Altica, Tipule, Miriapodi.
PATATA: contro Elateridi, Maggiolini.
MAIS: contro Elateridi, Maggiolini, Tipule, Mosca.
TABACCO: contro Elateridi, Maggiolini.
COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI, SEMENZAI E VIVAI: contro Elateridi, Maggiolini, Tipule, Miriapodi.

Alle dosi più alte di impiego il prodotto ha un effetto collaterale anche nei confronti dei nematodi.

Compatibilità: il prodotto si usa da solo.

Attenzione:
da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Non operare contro vento.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

TERZINA 50 FLO

Erbicida selettivo per Mais e Sorgo
Tipo di formulazione: sospensione concentrata

Composizione:
- Terbutilazina pura: . . . . g 50 (= 560 g/litro)
- Coformulanti: quanto basta a . . . . g 100

OXON ITALIA S.p.A.
Sede legale: via Manzoni 44 - Milano

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Registrazione n. 10717 del 15.02.01
del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
AGROCHIMICA FAENTINA S.p.A. - Faenza (RA)
TERRANALISI S.r.l. - Cento (FE)

Taglie autorizzate: ml. 250 - 500
Litri 1 - 5 - 10 - 20

Partita n.

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: (non specifici e rilevati su animali con superdosaggi). Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratoria, salivazione.
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZE: consultare un centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Epoca d'impiego: in pre-semina, con o senza interramento superficiale, in pre-emergenza o in post-emergenza precoce delle infestanti.

DOSI
Impiegare al massimo 1,7 litri/ha; si consiglia l'aggiunta di altri erbicidi idonei per completarne lo spettro d'azione sulle infestanti graminacee.

Volume di irrorazione: Distribuire uniformemente 200 o più l/ha di poltiglia.

Erbe infestanti sensibili: Amaranto (Amaranthus spp.), Camomilla (Matricaria spp.), Centocchio comune (Stellaria media), Correggiola (Polygonum aviculare), Erba morella (Solanum nigrum), Farinello (Chenopodium spp.), Galinsoga comune (Galinsoga parviflora), Mercorella comune (Mercurialis annua), Miagro liscio (Miagrum perfoliatum), Porcellana comune (Portulaca oleracea), Poligono convolvolo (Fallopia convolvolus), Poligono persicaria (Polygonum persicaria), Ravanello selvatico (Raphanus raphanistrum), Senape selvatica (Sinapis arvensis), Veccia (Vicia spp.).
Erbe infestanti resistenti: Graminacee, esclusi il Cencio molle (Abutilon theophrasti), Stramonio comune (Datura stramonium) e quelle munite di rizomi, stoloni, bulbi e bulbilli.

Preparazione della poltiglia: stemperare in poca acqua la prestabilita dose di prodotto e versare poi nel totale quantitativo di acqua mescolando accuratamente.

Compatibilità: il prodotto può essere associato ad altri erbicidi per completare lo spettro d'azione sulle infestanti o ad insetticidi per la disinfestazione del terreno.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenze agronomiche: affinché il prodotto possa esercitare la sua azione è necessario che una pioggia di almeno 10-15 mm. cada entro due settimane dal trattamento, altrimenti provvedere ad una equivalente irrigazione.
Impiegare il prodotto solo su colture specializzate in assenza di sottocolture. Dal trattamento erbicida alla semina di eventuali sottocolture occorre un intervallo minimo di 12 mesi.
Sospendere il trattamento al massimo alla post-emergenza delle infestanti.
Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.
Il prodotto non agisce nei terreni torbosi.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine.
Dopo l'impiego, lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione della poltiglia erbicida, prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Da non vendersi sfuso.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Non operare contro vento.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

ALETIL 80

Fungicida sistemico in polvere bagnabile

Composizione:
- Fosetil Alluminio puro . . . . g. 80
- Coformulanti: quanto basta a . . . . g. 100

OXON ITALIA S.p.A.
Sede legale: via Manzoni 44 - Milano

Registrazione n. 10719 del 15.02.01 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
AGROCHIMICA FAENTINA SpA - Faenza (RA)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Cotignola (RA)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA Torrenieri (fraz. di Montalcino) (SI)

IRRITANTE

Taglie: g 25 - 50 - 100 - 200 - 500
Kg 1 - 5 - 10 - 25

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO

Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente. Tale attività è tanto più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita. La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

ORTICOLTURA

Lattuga: contro Bremia lactucae.
Effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl di acqua, avendo cura di distribuire almeno 3 Kg di prodotto/ha. Su lattuga romana effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto.
Con forti sbalzi termici la lattuga può essere sensibile al prodotto.

Melone: contro Pseudoperonospora cubensis.
Effettuare irrigazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl d'acqua ogni 14 giorni.

Cocomero, Cetriolo, Spinacio: contro Peronospora.
Effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl di acqua, avendo cura di distribuire, come minimo, 3 Kg di prodotto/ha.

Carciofo: contro Bremia lactucae.
Utilizzare 200-300 g/hl di acqua.

FRUTTICOLTURA

Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo: contro Phytophthora spp.
Effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl di acqua, utilizzando 10 litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione possono venire integrati da pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche). Questa pratica diventa indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida.

Melo e Pero: contro Ticchiolatura.
Trattamenti preventivi a 150-250 g/hl di acqua; particolarmente nelle fasi pre-fiorali e immediatamente successive all'allegagione si consiglia l'associazione con fungicidi di copertura (rame escluso) o con Dodina.

Pero: contro Maculatura bruna (Stemphyllium sp.), Erwinia amylovora (colpo di fuoco).
Trattamenti preventivi a 250 g/hl di acqua.

Melo, Pero, Pesco, Actinidia: contro Phytophthora cactorum.
- Effettuare trattamenti a cadenza mensile sulla vegetazione, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta (per Melo e Actinidia), con 250 g/hl di acqua.
- Su pianta già debilitata dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida, effettuare un'annaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, utilizzando per ogni pianta litri 1-2 di una poltiglia costituita da 5 Kg di prodotto per 100 litri di acqua.

Vivai di fruttiferi
Effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl di acqua con cadenza mensile.

Vivai di agrumi
Impiegare la dose di 400 g/hl di acqua ogni 60 giorni.

Vite: contro Peronospora.
Utilizzare 250 g/hl di acqua. Si consiglia sempre l'associazione con formulati di copertura (rame escluso).

Fragola: contro Peronospora (Phytophthora cactorum e fragariae).
L'immersione delle piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 irrorazioni alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immersione delle piante prima del trapianto in una poltiglia a 250 g/hl d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di g 0,5 di formulato per pianta.

COLTURE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO ED IN SERRA

Contro Phytophthora cinnamoni di Chamaecyparis e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee, Poinsettia, St. Paulia e Crisantemo.
Effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con g 5-10 di formulato per metro quadro, una volta al mese in primavera.

COMPATIBILITA'

Il prodotto può presentare problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame e alcuni concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale).
Non effettuare miscele con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI:

- **Carciofo, Cetriolo, Cocomero, Melone, Lattuga, Spinacio: 15 giorni prima della raccolta;**
- **Fragola: 30 giorni prima della raccolta;**
- **Melo, Pero, Pesco, Actinidia, Vite: 40 giorni prima della raccolta;**
- **Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo: 80 giorni prima della raccolta.**

Avvertenza

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

ALETIL 80

Fungicida sistemico in polvere bagnabile

Composizione:
- Fosetil Alluminio puro . . . . g. 80
- Coformulanti: quanto basta a . . . . g. 100

IRRITANTE

OXON ITALIA S.p.A.
Sede legale: via Manzoni 44 - Milano

Registrazione n. 10719 del 15.02.01 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
AGROCHIMICA FAENTINA SpA - Faenza (RA)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Cotignola (RA)
SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Torrenieri (fraz. di Montalcino) (SI)

Taglie: g 25 - 50 - 100

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ALETIL 80

Fungicida sistemico in polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

Composizione:
- Fosetil Alluminio puro .... g. 80
- Coformulanti: quanto basta a .... g. 100

IRRITANTE

OXON ITALIA S.p.A.
Sede legale: via Manzoni 44 - Milano
Registrazione n. 10719 del 15.02.01 del Ministero della Sanità
Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Cotignola (RA)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA – Torrenieri (fraz. di Montalcino) (SI)

Taglie: Kg. 1 (5 sacchetti da Kg 0,2 – 2 sacchetti da Kg 0,5)

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fungicida sistemico, caratterizato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente. Tale attività è tanto più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita. La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
ORTICOLTURA
Lattuga: contro Bremia lactucae.
Effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl di acqua, avendo cura di distribuire almeno 3 Kg di prodotto/ha. Su lattuga romana effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto.
Con forti sbalzi termici la lattuga può essere sensibile al prodotto.
Melone: contro Pseudoperonospora cubensis.
Effettuare irrigazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl d'acqua ogni 14 giorni.
Cocomero, Cetriolo, Spinacio: contro Peronospora.
Effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl di acqua, avendo cura di distribuire, come minimo, 3 Kg di prodotto/ha.
Carciofo: contro Bremia lactucae.
Utilizzare 200-300 g/hl di acqua.
FRUTTICOLTURA
Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo: contro Phytophthora spp.
Effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl di acqua, utilizzando 10 litri di poltiglia per pianta.
I trattamenti alla vegetazione possono venire integrati da pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche). Questa pratica diventa indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida.
Melo e Pero: contro Ticchiolatura.
Trattamenti preventivi a 150-250 g/hl di acqua; particolarmente nelle fasi pre-fiorali e immediatamente successive all'allegagione si consiglia l'associazione con fungicidi di copertura (rame escluso) o con Dodina.
Pero: contro Maculatura bruna (Stemphyllium sp.), Erwinia amylovora (colpo di fuoco).
Trattamenti preventivi a 250 g/hl di acqua.
Melo, Pero, Pesco, Actinidia: contro Phytophthora cactorum.
- Effettuare trattamenti a cadenza mensile sulla vegetazione, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta (per Melo e Actinidia), con 250 g/hl di acqua.
- Su pianta già debilitata dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida, effettuare un'annaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, utilizzando per ogni pianta litri 1-2 di una poltiglia costituita da 5 Kg di prodotto per 100 litri di acqua.

Vivai di fruttiferi: effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl di acqua con cadenza mensile.
Vivai di agrumi: impiegare la dose di 400 g/hl di acqua ogni 60 giorni.
Vite: contro Peronospora. Utilizzare 250 g/hl di acqua. Si consiglia sempre l'associazione con formulati di copertura (rame escluso).
Fragola: contro Peronospora (Phytophthora cactorum e fragariae).
L'immersione della piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 irrorazioni alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immersione delle piante prima del trapianto in una poltiglia a 250 g/hl d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di g 0,5 di formulato per pianta.
COLTURE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO ED IN SERRA
Contro Phytophthora cinnamoni di Chamaecyparis e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee, Poinsettia, St. Paulia e Crisantemo.
Effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con g 5-10 di formulato per metro quadro, una volta al mese in primavera.

COMPATIBILITA'
Il prodotto può presentare problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame e alcuni concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Non effettuare miscele con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI:
- **Carciofo, Cetriolo, Cocomero, Melone, Lattuga, Spinacio: 15 giorni prima della raccolta;**
- **Fragola: 30 giorni prima della raccolta;**
- **Melo, Pero, Pesco, Actinidia, Vite: 40 giorni prima della raccolta;**
- **Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo: 80 giorni prima della raccolta.**

Avvertenza: Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

AVVERTENZE D'USO
- Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti.
- Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi.
- Non toccare i sacchetti solubili con le mani bagnate.
- Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

20 ... 25%

1. Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua
2. Introdurre il numero di sacchetti idrosolubili chiusi, previsti (come da etichetta) nell'atomizzatore
3. Mettere in funzione l'agitatore
4. Attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti), ed.........
5. ....aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

ALETIL 80

Fungicida sistemico in polvere bagnabile

IRRITANTE

COMPOSIZIONE:
Fosetil Alluminio puro g. 80
Coformulanti: quanto basta a g. 100

Avvertenza: leggere attentamente la confezione prima di utilizzare il prodotto.

Kg. 0,2 – 0,5

OXON ITALIA S.p.A. - Sede legale: via Manzoni 44 - Milano

Registrazione n. 10719 del 15.02.2001 del Ministero della Sanità

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

SAMBA

Erbicida selettivo per Mais e Sorgo
Tipo di formulazione: sospensione concentrata

Composizione:
- Terbutilazina pura: . . . . .g 50 (= 560 g/litro)
- Coformulanti: quanto basta a . . . . .g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

OXON ITALIA S.p.A.
Sede legale: via Manzoni 44 - Milano

Registrazione n. 11944 del 19.12.03
del Ministero della Salute

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie autorizzate: ml. 250 - 500
Litri 1 - 5 - 10 - 20

Partita n.

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: (non specifici e rilevati su animali con superdosaggi). Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratoria, salivazione.
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZE: **consultare un centro Antiveleni.**

MODALITA' D'IMPIEGO
Epoca d'impiego: in pre-semina, con o senza interramento superficiale, in pre-emergenza o in post-emergenza precoce delle infestanti.

DOSI
Impiegare al massimo 1,7 litri/ha; si consiglia l'aggiunta di altri erbicidi idonei per completarne lo spettro d'azione sulle infestanti graminacee.

Volume di irrorazione: Distribuire uniformemente 200 o più l/ha di poltiglia.

Erbe infestanti sensibili: Amaranto (Amaranthus spp.), Camomilla (Matricaria spp.), Centocchio comune (Stellaria media), Correggiola (Polygonum aviculare), Erba morella (Solanum nigrum), Farinello (Chenopodium spp.), Galinsoga comune (Galinsoga parviflora), Mercorella comune (Mercurialis annua), Miagro liscio (Miagrum perfoliatum), Porcellana comune (Portulaca oleracea), Poligono convolvolo (Fallopia convolvolus), Poligono persicaria (Polygonum persicaria), Ravanello selvatico (Raphanus raphanistrum), Senape selvatica (Sinapis arvensis), Veccia (Vicia spp.).
Erbe infestanti resistenti: Graminacee, esclusi il Cencio molle (Abutilon theophrasti), Stramonio comune (Datura stramonium) e quelle munite di rizomi, stoloni, bulbi e bulbilli.

Preparazione della poltiglia: stemperare in poca acqua la prestabilita dose di prodotto e versare poi nel totale quantitativo di acqua mescolando accuratamente.

Compatibilità: il prodotto può essere associato ad altri erbicidi per completare lo spettro d'azione sulle infestanti o ad insetticidi per la disinfestazione del terreno.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenze agronomiche: affinché il prodotto possa esercitare la sua azione è necessario che una pioggia di almeno 10-15 mm. cada entro due settimane dal trattamento, altrimenti provvedere ad una equivalente irrigazione.
Impiegare il prodotto solo su colture specializzate in assenza di sottocolture. Dal trattamento erbicida alla semina di eventuali sottocolture occorre un intervallo minimo di 12 mesi.
Sospendere il trattamento al massimo alla post-emergenza delle infestanti.
Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.
Il prodotto non agisce nei terreni torbosi.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine.
Dopo l'impiego, lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione della poltiglia erbicida, prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Da non vendersi sfuso.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Non operare contro vento.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

GOLTIX COMBI DUO

Erbicida in formulazione granulare idrodispersibile di impiego in pre-semina, pre e post-emergenza della coltura della barbabietola da zucchero.

Composizione:
- Cloridazon puro g.25
- Metamitron puro g.40
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a ....g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

OXON ITALIA S.p.A.
Sede legale: via Manzoni 44 - Milano

Registrazione n. 12264 del 10.01.2000 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)
COLLAG TECHNOLOGY CENTRE - Southampton (Inghilterra)
SIDECO DR. SCHIRM GMBH - Lubecca (Svizzera)

Officina di confezionamento:
BAYER SpA - Filago (BG)

Taglie: Kg l - 5 - 10

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cloridazon 25% e Metamitron 40%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CLORIDAZON: Sintomi: nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici.
METAMITRON: ---
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto viene utilizzato per il diserbo di pre-semina, pre e post-emergenza della **Barbabietola da zucchero**. Il prodotto è efficace nei confronti delle seguenti infestanti:
Dicotiledoni: Amaranto *(Amaranthus retroflexus);* Camomilla inodora *(Anthemis arvensis);* Atriplice maggiore *(Atriplex patula),* Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris);* Farinaccio *(Chenopodium album);* Scannacavallo *(Euphorbia falcata);* Falso convolvolo *(Fallopia convololus);* Canapa selvatica *(Galeopsis tetrahit);* Galinsoga *(Galinsoga parviflora);* Erba ruota *(Lamium amplexicaule);* Camomilla *(Matricaria camomilla);* Papavero *(Papaver rhoeas);* Correggiola *(Polygonum aviculare);* Persicaria *(Polygonum persicaria);* Erba porcellana *(Portulaca oleracea);* Rafanistro *(Raphanus raphanistrum);* Senape *(Sinapis arvensis);* Erba morella *(Solanum nigrum);* Crespigno *(Sonchus oleraceus);* Centocchio *(Stellaria media);* Arenariola *(Spergula arvensis);* Erba storna *(Thlapsi arvense);* Ortica *(Urtica urens);* Veroniche *(Veronica spp.).*
Graminacee: Coda di volpe *(Alopecurus myosuroides);* Apera *(Apera spica venti);* Gramigna delle vie *(Poa annua);* Avena *(Avena spp.);* Digitaria *(Digitaria sanguinalis);* Setaria *(Setaria spp.).*

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Pre-semina e pre-emergenza:
4,5-6 Kg/ha di prodotto in 300-500 litri d'acqua. Utilizzare la dose minima in terreni sciolti, la dose massima in terreni argillosi. Nelle applicazioni di pre-emergenza l'efficacia è condizionata dal verificarsi di precipitazioni nel periodo che segue la distribuzione.
Post-emergenza (in miscela con erbicidi ad azione fogliare):
Trattamento in un'unica soluzione: intervenire alla dose di 2-2,5 Kg/ha di prodotto distribuiti in 300-400 litri di acqua; intervenire quando la bietola da zucchero ha raggiunto lo stadio di 4-6 foglie vere.
Trattamento frazionato: 1,5-2 Kg/ha di prodotto distribuiti in 200-300 litri di acqua; effettuare il primo intervento quando la coltura ha raggiunto lo stadio di 2-4 foglie vere, ripetendo il trattamento dopo 8-10 giorni.
Trattamento a microdosi: 0,8-1 kg/ha di prodotto distribuiti in 150-200 litri di acqua; effettuare il primo intervento quando le infestanti sono allo stadio di cotiledoni; ripetere il trattamento 1-2 volte a distanza di 8-10 giorni, in funzione dei tempi di rinascita delle infestanti.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

TECNO TREA S.r.l.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

RAMIDROS-LF

Fungicida polivalente a base di rame idrossido in formulazione liquida (flowable)

RAMIDROS-LF Registrazione Ministero della Sanità n. 9395 del 15/10/1997

Composizione
- RAME METALLO g. 15 (=190 g/l)
(sotto forma di idrossido)
- Coformulanti q.b. a g. 100

TecnoTrea Srl
Via Carlo Urbino, 9 - 26013 Crema (CR)

Stabilimento di produzione: **CHEMIA SpA** - S. Agostino (FE)

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n. Contenuto: 0,1-0,25-0,5-1–5– 10-20 L

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con 100 litri di acqua utilizzando pompe a volume normale.
Vite: contro peronospora e marciume nero degli acini ml 400-600; **Melo, Pero**: contro cancri rameali litri 0,85; contro ticchiolatura in pre-fioritura ml 350-450, in post-fioritura ml 250-300;
Drupacee: contro monilia e corineo (intervenire durante il riposo vegetativo) litri 0,85-1; **Mandorlo**: contro corineo, bolla e monilia ml 550-600; per trattamenti a caduta foglie, ingrossamento gemme e in pre-fioritura; **Agrumi**: contro mal secco, allupatura, melanosi, fumaggine, antracnosi ml 450-500; **Olivo**: contro fumaggine, occhio di pavone, lebbra (trattare inizio autunno) ml 550; **Noce**: contro mal secco in pre-fioritura ml 450; **Nocciolo**: contro batteriosi ml 550; **Nespolo**: contro ticchiolatura ml 250-300; **Patata, Pomodoro**: contro alternaria, peronospora, septoria ml 500; **Fagiolo, Pisello**: contro peronospora, antracnosi e ruggine ml 300-450; **Barbabietola da zucchero**: contro cercospora litri 5,5-6,5/ha; **Fragola**: contro vaiolatura litri 4/ha; **Cavolo, Cavolfiore, Broccolo, Cavolo di Bruxelles**: contro peronospora e alternaria ml 300-400; **Carota, Sedano, Finocchio**: contro alternaria, septoria, peronospora ml 340-480; **Melanzana**: contro peronospora e alternaria ml 330; **Melone, Cocomero, Cetriolo**: contro peronospora, antracnosi, batteriosi, cladosporiosi ml 330; **Cipolla, Aglio**: contro peronospora e alternaria ml 400; **Insalata, Cardo, Carciofo**: contro peronospora e alternaria per trattamenti preventivi e secondo le condizioni climatiche ml 250-340; **Riso**: contro alghe verdi litri 6,8/ha; **Floricole in pieno campo (rosa, ciclamino)**: contro ticchiolatura, peronospora e ruggine ml 340-450; **Cipresso**: contro cancro, per trattamenti invernali ml 950.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare durante la fioritura su Pesco, Nettarine, Susino e sulle seguenti varietà di Melo (Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard). Il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

RAMIDROS-LF

Fungicida polivalente a base di rame idrossido in formulazione liquida (flowable)

RAMIDROS-LF Registrazione Ministero della Sanità n. 9395 del 15/10/1997

Composizione
- RAME METALLO g. 15 (=190 g/l)
(sotto forma di idrossido)
- Coformulanti q.b. a g. 100

TecnoTrea Srl
Via Carlo Urbino, 9 - 26013 Crema (CR)

Stabilimento di produzione: **CHEMIA SpA -** S. Agostino (FE)

Partita n. Contenuto: 100 ml

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DL 65/2003

CIFO S.p.a.

ETICHETTA

Dazomet

Disinfestante del terreno destinato alle colture floreali ed ornamentali, per il controllo di nematodi, funghi, malerbe ed insetti terricoli.

Composizione:

Dazomet puro		g 85
Coformulanti	q.b. a	g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini.Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

CIFO S.p.A. – Via Oradour 6/8 S. Giorgio di Piano (BO) – tel. 051 6655511
Stabilimenti di produzione: L.I.F.A. Srl – Vigonovo (VE) / L.I.F.A. Srl – Isola Vicentina (VI) / TERRANALISI S.r.l. - CENTO (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 4638 del 11/02/1982
Peso netto: 200 - 500 g , 1 – 5 – 10 Kg - PARTITA N.:

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Conservare lontano dal calore. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali.. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Informazioni mediche: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

Modalità d'impiego e dosi:
il Dazomet è un fulmigante impiegato in pieno campo, in serra e per la disinfestazione dei terricciati.
Incorporato nel terreno si trasforma in composti gassosi attivi contro parassiti animali e vegetali.
L'azione disinfestante del DAZOMET si esplica verso Nematodi, Funghi, Malerbe ed insetti del terreno quali: marciumi degli steli, avvizzimenti dovuti a Fusarium sp., Verticillium sp.. Phoma, Nematodi (galligeni, a cisti), larve di Maggiolini ed Elateridi; inoltre combatte le infestanti mono e dicotiledoni che si propagano per seme, rizomi e bulbilli, mentre i semi vengono distrutti solo nella fase di germinazione. Il DIAZOMET viene impiegato alle seguenti dosi: in pieno campo ed in serra: 50/80 g per mq (500/800 Kg/Ha). Terricciati: 300/350 p per mc.
Le dosi minime e massime devono essere impiegate in relazione al grado di infestazione del terreno e per una profondità di incorporamento di 20 cm.
Volendo trattare strati più profondi di terreno bisogna aumentare le dosi prescelte di 18/23 g/mq (180/230 Kg/Ha) per ogni 10 cm di maggiore profondità. Al momento del trattamento il terreno deve essere ben livellato, sminuzzato e sufficientemente umido; inoltre deve essere privo di residui vegetali grossolani. Per il trattamento contro Nematodi galligeni delle radici bisogna far trascorrere un certo periodo tra la raccolta ed il trattamento stesso in modo che nematodi, liberati dalle galle a causa della decomposizione vegetale, vengano a contatto con i gas del DAZOMET.
Per favorire l'azione erbicida del prodotto, bisogna irrigare abbondantemente il terreno 5/7 giorni prima del trattamento in modo da facilitare la germinazione dei semi. Il letame deve essere distribuito almeno 5/6 settimane prima del trattamento disinfestante ed a partire da 2 settimane prima del trattamento fino a tutto il periodo durante il quale il prodotto rimane nel terreno trattato non distribuire concimi organici o fertilizzanti azotati a base di ammoniaca, In pieno campo osservare una distanza di applicazione di 50/100 cm da radici di alberi, cespugli, arbusti e siepi.
Non distribuire il DAZOMET con temperature inferiori ai 10°C.
L'umidità ottimale del terreno per il trattamento deve essere simile a quella per la semina.
Subito dopo la distribuzione incorporare il DAZOMET nel terreno alle profondità prestabilite impiegando un motocoltivatore o una fresa; quindi effettuare una rullatura se il terreno si presenta soffice. Intervenire infine con una irrigazione per aspersione in modo da favorire la decomposizione del prodotto; eventualmente ripetere l'irrigazione dopo 2 o 3 giorni.
Dopo 20 giorni dal trattamento (in caso di basse temperature aumentare questo periodo fino a 30 giorni) bisogna arieggiare il terreno mediante fresatura, in modo da permettere la fuoriuscita dei vapori tossici.
Trascorse 1 o 2 settimane (anche 3 in caso di basse temperature) da questa operazione accertarsi dell'assenza dei vapori del DAZOMET prima di procedere alla messa a coltura del terreno.
Quando si opera in serra si deve aver cura di chiudere ermeticamente tutte le fessure e bisogna mantenere l'isolamento fino alla scomparsa dei vapori; la temperatura deve essere intorno ai 25°C e l'umidità del terreno ad un livello piuttosto elevato.
Per i terricciati stendere il terreno su di un supporto impermeabile in strati di 20/25 cm di altezza distribuire la dose prescelta ed incorporare il prodotto nel terreno.
Sovrapporre un secondo strato e procedere come detto sopra fino a raggiungere una altezza massima di 1 m. Ricoprire poi il cumulo umido con materiale plastico per trattenere i vapori di DAZOMET.
Dopo circa 15 giorni dal trattamento togliere la copertura, arieggiare il terreno, ed accertarsi che i vapori siano completamente assenti.
Fitotossicità: i vapori del DAZOMET sono fitotossici per le colture in atto e pertanto va impiegato su terreno nudo.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua - Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

ETICHETTA

BULBEL

DISERBANTE SELETTIVO

Per cipolle e alcune colture ortive

NOCIVO

Composizione:
Clorthal- metil puro g 75
Coadiuvanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO - Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

CIFO S.p.A. Via Oradour 6/8 - San Giorgio di Piano (BO) – tel. 051 6655511

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.r.l. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI) / L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) / TORRE srl Torrenieri (SI) / STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione del Ministero della Sanità n° 2906 del 17/10/1978
Peso netto : 100- 200- 500 g 1 - 5 kg PARTITA N.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO
BULBEL è un erbicida in polvere bagnabile che agisce sui semi delle infestanti nella fase di germinazione per assorbimento radicale o per contatto. Si impiega subito dopo la semina, il trapianto o la messa a dimora dei bulbi delle colture ornamentali.
Il **BULBEL** è dotato di una lunga persistenza d'azione, inoltre non arreca alcun danno alla coltura successiva al diserbo perchè viene degradato nel suolo e non lascia alcun residuo tossico.
Risulta particolarmente efficace verso le erbe infestanti annuali provenienti da seme: papavero - centocchio - panicastrella - farinaccio - erba cicutaria - sanguinella - amaranto - erba porcellana.
Risultano invece resistenti le perennanti quali: equiseto - gramigna - vilucchio - stoppione e le poligonacee.
Il **BULBEL** si impiega alla dose di 150 - 200 g in almeno 10 litri d'acqua irrorando la soluzione su una superficie di 100 metri quadrati. Viene usato nelle seguenti colture: Cipolla - aglio - porro - finocchio - bulbose da fiore - fragola.
Eseguire il trattamento su terreno privo di erbe infestanti, con terreno ben lavorato e privo di zolle.
Dopo il trattamento diserbante può rendersi necessaria una irrigazione, indispensabile affinchè il prodotto esplichi la propria attività, inoltre dopo il trattamento con il **BULBEL** il terreno non deve essere lavorato ne rimosso per alcun motivo.
Il diserbo con **BULBEL** va eseguito subito dopo la semina o il trapianto, nel caso di impianti di fragole si interviene subito dopo la lavorazione di fine inverno.
COMPATIBILITA'
Il **BULBEL** è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Usare il prodotto in giornate senza vento, per non provocare danni alle colture adiacenti.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

ETICHETTA

Carbovis 50

Insetticida in polvere bagnabile

Composizione:
CARBARIL puro (esente da β-naftolo) g 49
Inerti, emulsionanti e bagnanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

CIFO S.p.A. – Via Oradour, 6/8 – S. Giorgio di Piano (BO) – Tel. 051/6655511

Stabilimenti di produzione: S.I.P.C.A.M. S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi) / STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Cotignola (RA) / TORRE – Torrenieri (SI)
Registrazione n. 2997 del 12/05/1979
Peso netto: 100 – 200 – 500 g 1 – 5 kg PARTITA N.:

Norme precauzionali: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

Informazioni per il medico: Carbaril: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime. **Consultare un Centro Antiveleni**

Modalità d'impiego
Caratteristiche tecniche: Il CARBOVIS 50 è un prodotto in polvere bagnabile che agisce come insetticida di contatto o d'ingestione su una grande varietà d'insetti. Le sue proprietà: non trasmette odori o sapori sgradevoli, possiede azione iniziale ad effetto residuo, è di facile impiego.
Dosi – Modalità d'impiego: Susine, Albicocche e Vite (contro Tignola) 200-250 g/100 litri d'acqua – Olivo (contro Tignola e Cocciniglia mezzo grano di pepe) 150-200 g/100 litri d'acqua – Noce (contro Carpocapsa e Cocciniglia) 200-250 g/100 litri d'acqua – Mandorlo (contro Campa) 200-250 g/100 litri d'acqua – Pesco (contro Cydia molesta e Anarsia lineatella) 200-250 g/100 litri d'acqua – Nocciolo (contro Balanino e Tortrici) 200-250 g/100 litri d'acqua – Pioppo (contro larve defogliatrici e Tortrici) 200-250 g/100 litri d'acqua – Conifere (contro Tortrici, Coleotteri e larve defogliatrici: Limantria, Processionaria) 200-250 g/100 litri d'acqua – Carciofo, Cardo (contro Vermi grigi, Nottue, Vanese, Depressaria e Coleotteri in genere) 200-250 g/100 litri d'acqua – Patata e Melanzana (contro Dorifora, Nottue, Tignola) 200-250 g/100 litri d'acqua – Pomodoro e Peperone (contro Nottue, Piralidi, Dorifora) 200-250 g/100 litri d'acqua – Cavolo e Rapa (contro Cavolaie, Mamestre, Nottue) 200-250 g/100 litri d'acqua – Asparago, Carota, Finocchio, Cipolla, Aglio, Fagiolo, Pisello, Insalata, Spinacio, Cucurbitacee (contro Agrotidi, Nottue, Altiche, Crisomelidi, Tignole) 200-250 g/100 litri d'acqua – Melo (contro il Verme delle pomacee [Carpocapsa], Ricamatrice della frutta [Cacoecia, Capua, Eulia, Pandemis, Orgyal]) 200-250 g/100 litri d'acqua – Limone e cedro (contro Tignola degli agrumi) 200-250 g/100 litri d'acqua – Piante ornamentali e fiori, colture foraggere (contro Fitonomo, Misurini, Crisomela, Piralide) 200-250 g/100 litri d'acqua.
Si diluisce in poca acqua il CARBOVIS 50 necessario per il trattamento, si agita vigorosamente e si versa lentamente il resto dell'acqua sino a raggiungere la concentrazione voluta. Le dosi sopra elencate verranno aumentate nel caso di irrorazioni a basso volume.
Compatibilità: Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari di uso più comune, ad eccezione di quelli a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri, Calce).
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischi di nocività: Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici e bestiame. Attenzione, il prodotto tal quale contiene sostanze altamente tossiche per gli organismi acquatici.
Intervallo di sicurezza: Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni causati da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua - Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

ETICHETTA

Fulvin

Polvere a base di zolfo tufo per trattamenti a secco minerale di zolfo molito e micronizzato.
Per la lotta contro l'oidio del grappolo d'uva ove la temperatura durante l'estate raggiunge punte molto alte

IRRITANTE

Composizione - 100 gr di prodotto contengono:
Zolfo puro (Esente da Selenio) gr 25
Inerti ed adesivanti q. b. a gr 100

FRASI DI RISCHIO: *Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.*

CONSIGLI DI PRUDENZA: *Conservare fuori della portata dei bambini.Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.*

CIFO S.p.A. via Oradour, 6/8 - 40016 S.Giorgio di Piano (BO) tel. 051 6655511
Stabilimenti di produzione:
BIMEX S. p. A. Via Cogolla, 5 Isola Vicentina (VI) / Cifo S.p.A. S.Giorgio di Piano (BO)
Reg. Min. della Sanità n. 3933 del 16/10/80.
Peso netto: 200 - 500 g ; 1 – 5 – 25 kg - Partita n.

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Modalità e dosi d'impiego:
Il FULVIN è uno Zolfo polverulento adesivo per il trattamento a secco ai grappoli dell'uva contro l'Oidio. E' indicato in quelle zone ove la temperatura raggiunge in estate punte molto elevate, onde evitare pericoli di ustione che potrebbero essere provocate da uno Zolfo normale. Il FULVIN si applica nei momenti in cui vengono usati i normali Zolfi polverulenti in base alla necessità della zona ed alla esperienza acquisita nel tempo per la lotta antioidica.
Dose d'impiego: g 300 per 100 metri quadri – Kg 30 – 50 per Ettaro.
Compatibilità: non è compatibile (o miscelabile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese ecc.) con captano.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i periodi più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA

POLICAR MZ

Fungicida

Composizione:
MANCOZEB puro g 80
Inerti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

IRRITANTE

CIFO S.p.A. – Via Oradour 6/8 S. Giorgio di Piano (BO) tel. 051 6655511
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.r.l. - CENTO (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 1568 del 22/4/1974
Peso netto: 100 - 200 - 500 g 1 - 5 - 25 Kg PARTITA N.:

Norme precauzionali: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità, e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

Informazioni per il medico: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; effetto antabuse, si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. Se ingerito non provocare il vomito, ma effettuare gastrolusi.
Consultare un centro antiveleni.

Modalità d'impiego
Caratteristiche tecniche: il POLICAR MZ è un fungicida costituito da una reazione di tre componenti: manganese, zinco etilenbisditiocarbammato
Dosi - Epoche - Modalità d'impiego: viene impiegato su Pomacee (Melo - Pero): si impiega alla dose di g. 150-250 per q.le di acqua contro la Ticchiolatura, Glomerella, Septoria, Ruggine ed Alternaria. Pomodoro solo fino alla prima fioritura: contro la Peronospora, Alternariosi e Septoriosi, Cladosporiosi e Antracnosi alla dose di g 150-250 per q.le d'acqua. Vite: contro la Peronospora, Escoriosi, Antracnosi e Marciume nero alla dose di g 200-250 per q.le d'acqua.
Garofano: contro la ruggine alla dose di g 200 -250 per trattamenti preventivi e g 350-400 per trattamenti curativi, per q.le d'acqua. Pioppo: contro la Marssonina e Ticchiolatura alla dose di g 400 - 500 per q.le d'acqua o kg 4-5 per ettaro per piante oltre i 3 anni. Tabacco: contro la Peronospora tabacina alla dose di g 100 - 150 per q.le d'acqua in semenzaio, impiegando litri 1.5-3 di soluzione per 10 mq oppure g 200 per q.le d'acqua in pieno campo.
Non impiegare in serra. Non Impiegare su colture diverse da quelle indicate.
Compatibilità: il POLICAR MZ è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci, eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
Fitotossicità: varietà di pere sensibili al MANCOZEB: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.
Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 28 giorni.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA

FITOCOR

FITOREGOLATORE RADICANTE

Composizione:

NAA puro		g 1,0 (= 8,05 g/lt)
Coformulanti e solventi	q.b.a.	g 100

FRASI DI RISCHIO: irritante per gli occhi.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Cifo S.p.A. via Oradour, 6/8 - San Giorgio di Piano (BO) tel.051 6655511

Stabilimento di produzione: CIFO S.p.A. San Giorgio di Piano (BO) / Terranalisi Cento (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 4781 del 26/04/1982
Contenuto netto: 100 – 200 – 500 ml ; 1 litro Partita N.:

NORME PRECAUZIONALI : Conservare la confezione ben chiusa – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il FITOCOR è un ormone che viene impiegato come radicante per talee erbacee e legnose. Il prodotto interferisce sui processi di crescita e sviluppo cellulare sostituendo laauxine naturali. S'impiega immergendo la base delle talee in una soluzione contenente da 2 a 10 ml di prodotto per litro d'acqua lasciandole per 24 ore circa. Viene consigliato per: Abies balsamea "Nana", Berberis rubrostilla, Berberis stenophylla, Chamaecyparis lawsoniana, Chamaecyparis nootkatensis, Chamaecyparis obtusa, Chamaecyparis pisifera, Cornus alba elegantissima, Corylopsis spicata, Cotinus coggygria rubriufolius, Cotoneaster salicifolia floccosa, Cryptomeria japonica, Cupressocyparis leylandii, Cytisus scoparius, Deutzia purpurascens, Ficus, Fuchsia, Halesia carolina, Juniperus chinensis, Juniperus communis, Juniperus procumbens, Juniperus sabina, Juniperus scopulorum repens, Juniperus squamata, Juniperus virginiana, Kolkwitzia amabilis, Malus, Metasequoia glyphostroboides, Neriumoleander, Olea europea, Philadephus purpureomaculatus, Populus canescens, Prunus triloba, Ribes grossularia, Syringa microphylla, Taxus baccata fastigiata standishii, Thuja koraiensis, Tsuga canadensis, Tsuga mertensiana, Tsuga sieboldii, Ulmus carpinifolia, Viburnum carlesii, Vitis vinifera, Weigelia.

Compatibilità: Da non miscelare con altri antiparassitari.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

ETICHETTA

FRAL 3

FITOREGOLATORE LIQUIDO ANTICASCOLA

Composizione:
NAA puro g 3 (= 31 g/l)
Coformulanti e solventi q.b.a. g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia, dispnea.
Terapia: sintomatica.

Caratteristiche: FRAL 3 è un fitoregolatore di sintesi a base di NAA (acido alfanaftalenacetico) che impedisce il distacco dei frutti dalla pianta nel periodo pre-raccolta.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Pero, melo: diluire 20 – 40 ml di **FRAL 3** in 100 litri di acqua e con tale soluzione bagnare la parte aerea delle piante, in particolare i frutti. Si consiglia di effettuare il trattamento su piante asciutte e nelle ore meno calde della giornata, quando si riscontrano i primi sintomi della cascola (generalmente 15 -20 giorni prima del raccolto).
Compatibilità: Non miscelare il prodotto con altri formulati.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

CIFO S.p.A. San Giorgio di Piano (BO)

Stabilimento di produzione: CIFO S.p.A. San Giorgio di Piano (BO)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 4879 del 07/09/1982
Contenuto netto: 50 – 100 – 250 – 500 ml 1 litro Partita n.

Da non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA RIDOTTA

FRAL 3

FITOREGOLATORE LIQUIDO ANTICASCOLA

Composizione:

NAA puro	g 3 (= 31 g/l)
Coformulanti e solventi q.b.a.	g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia, dispnea.
Terapia: sintomatica.

Compatibilità: Non miscelare il prodotto con altri formulati.
Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

CIFO S.p.A. San Giorgio di Piano (BO)

Stabilimento di produzione: CIFO S.p.A. San Giorgio di Piano (BO)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 4879 del 07/09/1982
Contenuto netto: 50 ml Partita n.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

ETICHETTA

Rigenal P

Ormone radicante in polvere

Composizione:

NAA puro		g 0,5
Supporti ed attivanti	q.b. a	g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia, dispnea.
Terapia: sintomatica.

Caratteristiche: Il **Rigenal P** è a base di auxinosimile sintetico, l'acido alfanaftalenacetico, che promuove il naturale trasporto discendente degli ormoni col risultante accumulo di auxine nella regione basale della talea e la produzione delle prime radici. Ciò rende il **Rigenal P** particolarmente indicato per tutte le talee erbacee, legnose e arbustive e per talee di viti.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Immergere la base delle talee in acqua per la profondità di circa 3 cm, successivamente lasciarle sgocciolare affinché rimangano leggermente inumidite. La base della talea inumidita va quindi immersa nella polvere **Rigenal P**. Prima di porre a dimora le talee nel modo usuale, scuoterle leggermente onde eliminare la polvere in eccesso.
Compatibilità: Non mescolare il formulato con altri prodotti.
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

CIFO S.p.A. S. Giorgio di Piano (BO)

Stabilimento di produzione : CIFO S.p.A. – S. Giorgio di Piano (BO)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 4896 del 7/09/1982
Contenuto netto: 50 – 100 – 200 – 250 – 300 – 500 – 800 g 1 Kg Partita N.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

ETICHETTA

Rigenal L

Ormone radicante liquido

Composizione:
NAA puro g 0,5 (= 5,1 g/l)
Coformulanti e solventi q.b. a g 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia, dispnea. **Terapia:** sintomatica.

Caratteristiche: Il **Rigenal L** è a base di auxinosimile sintetico, l'acido alfanaftalenacetico, che promuove il naturale trasporto discendente degli ormoni col risultante accumulo di auxine nella regione basale della talea e la produzione delle prime radici. Ciò rende il **Rigenal L** particolarmente indicato per tutte le talee erbacee, legnose e arbustive e per talee di viti.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Diluire 2 – 4 ml di **Rigenal** L per ogni litro d'acqua ed immergere le talee, riunite in mazzetti, per una profondità di 2 – 3 cm.
Le talee erbacee devono rimanere immerse nel bagno per almeno 12 ore, mentre le talee legnose devono rimanere immerse per 24 ore. Dopo tale trattamento si consiglia di sciacquare le talee con acqua e di porle a dimora nel più breve tempo possibile.
Compatibilità: Non mescolare il formulato con altri prodotti.
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

CIFO S.p.A. San Giorgio di Piano (BO)

Stabilimento di produzione: CIFO S.p.A. – S. Giorgio di Piano (BO)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 4897 del 07/09/1982
Contenuto netto: 50 – 100 – 200 – 250 – 500 – 800 ml 1 - 2 litri Partita N.

Da non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA

Grillostop

Esca granulare insetticida pronta all'uso

Composizione:
FENITROTHION puro g 5
Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere , né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

CIFO S.p.A. –Via Oradour 6/8 - S. Giorgio di Piano (BO) – tel. 051-6655511
Stabilimenti di produzione: L.I.F.A. s.r.l. – Vigonovo (VE) / L.I.F.A. s.r.l. – Isola Vicentina (VI)
Registrazione n. 5072 del 29/11/82 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: 100 – 200 – 500 g 1 – 5 Kg Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: *Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo. Sintomi di intossicazione: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Brachicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito pralidossima.*
Avvertenza: *consultare un centro antiveleni.*

Caratteristiche: E' un'esca insetticida granulare che agisce per contatto e per ingestione contro una vasta gamma di insetti terricoli quali: larve di lepidotteri, larve di ditteri, elateridi, grillo nero, maggiolino, bibione, tipule, agrotidi, grillotalpa, tripidi, nottue che danneggiano le colture floricole intensive a pieno campo o in serra, agrumi, drupacee, pomacee, fragola, castagno, noce, nocciolo, vite, olivo, ortaggi (esclusi i funghi), patata, barbabietola da zucchero, cereali, erba medica, tabacco, vivai, pioppo, piante ornamentali e forestali.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Si impiega alla dose di 40-60 g ogni 10 m^2 (40-60 Kg/ha) spargendo i granuli uniformemente sul terreno o alla dose di 10-20 g ogni 10 m^2 localizzando i granuli attorno alle piante.
Compatibilita': il prodotto va usato da solo.
Rischio di nocivita': il prodotto è tossico per gli animali domestici, il bestiame, la selvaggina, i pesci e gli insetti utili. E' necessario pertanto far trascorrere 20 giorni dal trattamento prima di far pascolare bestiame sulle zone trattate ed alimentarlo con vegetali che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto con il prodotto.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

ETICHETTA

Fixormon

ORMONE LIQUIDO POLIVALENTE

Composizione:

NAA puro	g 8 (= 85 g/l)
Coformulanti e solventi q.b.a.	g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia, dispnea. Terapia: sintomatica

Caratteristiche: Fixormon è un fitoregolatore di sintesi ad azione polivalente. Evita la cascola precoce dei frutti nel periodo di pre raccolta, perché una volta distribuito sulla pianta penetra nell'interno di questa e per un periodo di 15 – 20 giorni è in grado di interferire sulla suberificazione del picciolo e sulla caduta precoce dei frutti. **Fixormon** controlla l'emissione dei germogli laterali, dei polloni radicali ed esplica azione diradante.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
AZIONE ANTICASCOLA (**Melo, pero, pesco**): diluire 15 - 30 ml per 100 litri d' acqua irrorando uniformemente tutta la pianta. Sulle varietà estive ed autunnali eseguire il trattamento 3 - 4 settimane prima della raccolta. Si consiglia di impiegarlo nelle ore più fresche della giornata e su piante sane.
CONTROLLO DELL'EMISSIONE DEI GERMOGLI LATERALI (**Melo, pero, pesco**): eseguire 3 - 4 trattamenti, partendo da fine maggio ad intervalli di 8 - 10 giorni, alla dose di 10 - 15 ml ogni 100 litri di acqua.
AZIONE SPOLLONANTE (**Melo, pero, pesco, vite**): eseguire il trattamento con i polloni alti 10 - 30 cm, alla dose di 1 litro di **Fixormon** ogni 10 litri di acqua, avendo cura di bagnare bene foglie ed apici dei getti.
AZIONE DIRADANTE (**Melo, pero, pesco**): eseguire il trattamento quando i frutticini hanno raggiunto la dimensione di 10 - 15 mm, alla dose di 12 - 20 ml ogni 100 litri di acqua.
Compatibilità: Non miscelare il prodotto con altri formulati.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

CIFO S.p.A. San Giorgio di Piano (BO)
Stabilimento di produzione: CIFO S.p.A. – S. Giorgio di Piano (BO) / Terranalisi – Cento (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 5292 del 30/03/1983
Contenuto netto: 50 – 100 – 200 – 500 ml 1 litro Partita N.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Gibresol

FITOREGOLATORE
Tipo di formulazione: soluzione stabile contenente un agente di penetrazione

Composizione:
Acido Gibberellico puro g 4,9 (= 47,8 g/l)
Solventi, penetrante q.b. a g 100
(Contiene alcool etilico)

FACILMENTE INFIAMMABILE

FRASI DI RISCHIO: Facilmente infiammabile
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

CIFO S.p.A. Via Oradour 6/8, S. Giorgio di Piano (BO), tel 051-6655511
Stabilimenti di produzione: TORRE srl Torrenieri (SI) – ALTHALLER ITALIA S.r.l. San Colombano al Lambro (MI) - CIFO S.p.A. S. Giorgio di Piano (BO)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 5333 del 26/04/1983
Contenuto netto: 20 – 40 – 80 – 100 – 200 – 250 – 400 - 500 ml 1 litro Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche: fitoregolatore ad azione stimolante. Sui semi diminuisce la durata della germinazione; sui fiori, favorisce l'allegagione, contrasta i danni delle gelate, induce la partenocarpia; sulle piante induce precocità di fioritura e di maturazione, ne accresce lo sviluppo con maggiore pezzatura dei frutti, annulla l'alternanza della produzione, aumenta le dimensioni ed il colore dei fiori, favorisce il ricaccio delle foraggere. Tipo di formulazione: soluzione stabile, conservabile nel tempo e contenente un agente di penetrazione che favorisce l'assorbimento rapido del principio attivo da parte delle piante.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Avvertenza. I risultati dell'applicazione del prodotto dipendono in modo determinante dallo stato fisiologico delle piante, dallo stadio di sviluppo, dalle varietà, dalle condizioni climatiche, dal suolo ed in genere dalle situazioni locali. E' pertanto impossibile indicare condizioni standardizzate d'impiego, ma solo suggerire indicazioni di massima lasciando al coltivatore la messa a punto caso per caso con prove preliminari su piccola scala.
Colture e dosi per 100 litri d'acqua.

Carciofi: Per anticipare e concentrare il periodo di raccolta, si tratta alla dose di 20 – 40 ml impiegando 400 – 500 litri d'acqua per ettaro: per le prime produzioni, alla formazione del capolino centrale e ripetendo alla dose minore dopo la prima raccolta e per le successive produzioni, 20 giorni prima del periodo in cui s'intende concentrare il raccolto. Irrigare prima o subito dopo il trattamento. In caso di gelate, per stimolare la ripresa della coltura, trattare quando la temperatura è ritornata ai valori normali e le piante si sono riprese. Le varietà che meglio rispondono al trattamento sono quelle a capolini verdi. **Fragole**: Per anticipare e concentrare il periodo di raccolta, si tratta alla dose di 40 – 80 ml impiegando 500 – 800 litri d'acqua per ettaro, 4 – 6 settimane prima del periodo di normale fioritura. Nelle zone solite a freddi improvvisi si sconsiglia di anticipare la produzione e quindi l'impiego del fitoregolatore. **Patate**: Per stimolare l'emissione regolare dei germogli nei tuberi da seme, s'immergono per 10 minuti in una soluzione di 2 ml in caso di tuberi sezionati e 10 ml per tuberi interi, asciugando e seminando subito dopo. Per i tuberi provenienti da magazzino di conservazione, lasciare trascorrere 3 – 4 settimane di pregerminazione. **Pero**: Per migliorare l'allegagione nelle varietà di difficile impollinazione o partenocarpiche, si tratta alla dose di 20 – 40 ml impiegando 1000 litri d'acqua per ettaro quando il 20 – 30% di fiori sono aperti nelle aree settentrionali e quando il 90% dei fiori sono aperti nelle aree meridionali. In caso di gelate durante la fioritura, per contrastare i danni da sterilità dei fiori, trattare entro le 48 ore alla dose di 40 – 50 ml, impiegando 1000 – 1500 litri d'acqua per ettaro; in caso di gelate a fiore chiuso, attendere per trattare la piena fioritura. Si sconsiglia l'impiego sulla varietà William e simili, per non avere deformazione dei frutti. Dosi eccessive possono modificare l'aspetto dei frutti e ridurre la fioritura dell'anno successivo mentre trattamenti tardivi inducono un eccessivo sviluppo della parte fogliare. **Arancio e Clementino**: Per migliorare la qualità della buccia, si tratta alla dose di 20 –40 ml, impiegando 500 litri di acqua per ettaro, dopo l'invaiatura. **Limone**: Per ritardare la raccolta e ridurre la presenza di frutti piccoli, si tratta alla dose di 20 ml prima dell'invaiatura.
Uve da tavola e da vino: In epoche diverse, alla dose di 20 – 60 ml a seconda del risultato che si vuole ottenere.
- contro l'acinellatura: trattare al termine della fioritura:
- per ottenere acini apireni ed aumentare la precocità: intervenire dall'inizio alla piena fioritura;
- per allungare il grappolo e renderlo spargolo: applicare il prodotto 6 – 10 giorni prima della fioritura.

Floreali in pieno campo e in serra: per ottenere anticipo ed aumento della fioritura, con formazione di fiori più grossi, colorati e steli allungati, si tratta alla dose di 20 – 40 ml iniziando alla fase di comparsa dei boccioli e ripetendo dopo 20 – 30 giorni, avendo impiegato le dosi minime. Hanno reagito ai trattamenti: Ortensie, Crisantemi, Ciclamini, Anemoni, Fiordalisi, Rose.
Metodi d'impiego: Al momento dell'uso, aggiungere il contenuto del flaconcino, o parte aliquota di esso conformemente alla dose da impiegare, in poca acqua perfettamente pulita e diluire poi nel totale quantitativo. La soluzione acquosa è instabile e va utilizzata in giornata. La soluzione va distribuita a volume normale, nebulizzando finemente, evitando lo sgocciolamento e quindi il sovradosaggio.
Compatibilità: Il prodotto è tecnicamente miscibile con i prodotti a reazione neutra. E' comunque consigliabile impiegarlo da solo o con l'aggiunta di un fertilizzante fogliare e di un bagnante.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: il grande numero di varietà per le diverse specie vegetali rende impossibile una trattazione specifica; si consigliano prove preventive. Il prodotto può indurre indurre deformazioni indesiderate sui frutti del pero. La forzatura chimica rende le colture maggiormente sensibili alle improvvise variazioni climatiche.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua - Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

ETICHETTA RIDOTTA

Gibresol

FITOREGOLATORE
Tipo di formulazione: soluzione stabile contenente un agente di penetrazione

Composizione:
Acido Gibberellico puro g 4,9 (= 47,8 g/l)
Solventi, penetrante q.b. a g 100
(Contiene alcool etilico)

FACILMENTE INFIAMMABILE

FRASI DI RISCHIO: Facilmente infiammabile
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

CIFO S.p.A. Via Oradour 6/8, S. Giorgio di Piano (BO), tel 051-6655511
Stabilimenti di produzione: TORRE srl Torrenieri (SI) – ALTHALLER ITALIA S.r.l. San Colombano al Lambro (MI) - CIFO S.p.A. S. Giorgio di Piano (BO)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 5333 del 26/04/1983
Contenuto netto: 20 – 40 – 80 – 100 – 200 – 250 – 400 - 500 ml 1 litro Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche: fitoregolatore ad azione stimolante. Sui semi diminuisce la durata della germinazione; sui fiori, favorisce l'allegagione, contrasta i danni delle gelate, induce la partenocarpia; sulle piante induce precocità di fioritura e di maturazione, ne accresce lo sviluppo con maggiore pezzatura dei frutti, annulla l'alternanza della produzione, aumenta le dimensioni ed il colore dei fiori, favorisce il ricaccio delle foraggere. Tipo di formulazione: soluzione stabile, conservabile nel tempo e contenente un agente di penetrazione che favorisce l'assorbimento rapido del principio attivo da parte delle piante.
Compatibilità: Il prodotto è tecnicamente miscibile con i prodotti a reazione neutra. E' comunque consigliabile impiegarlo da solo o con l'aggiunta di un fertilizzante fogliare e di un bagnante.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

etichetta

Semisan

Insetticida in polvere secca

Composizione:
100 gr. di prodotto contengono:
Malathion puro g 1,0
Coformulanti e solventi q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

CIFO S.p.A. - via Oradour, 6/8 – San Giorgio di Piano (BO) tel. 051 6655511

Stabilimenti di produzione: LIFA srl Vigonovo (VE) – LIFA srl Isola Vicentina (VI)
Registrazione del Ministero della Sanità N. 5488 del 03/10/1983
Peso netto 100 - 200 - 500 g; 1 - 5 Kg Partita N.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, brachicardia, ipotensione, fibrillazione muscolare, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito la respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1 – 2 mg per adulti 0,2 – 1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24 – 48 ore.
Associare antidoto a base di Ossine come Toxogonin, Protopam chloride, Pam Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.
Caratteristiche: Insetticida per la disinfestazione delle sementi da fiore, piante ornamentali e boschive.
Uso e dosi e modalità di impiego: contro punteruoli, tignole, tonchi, triboli nei locali di conservazione. Mescolare accuratamente 1 g di prodotto per ogni chilo di sementi da conservare con pale o con apposite attrezzature.
Avvertenze: i semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame.
Compatibilità: Il prodotto va usato da solo.
Rischi di nocività: il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesce e bestiame.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Non impiegare su colture destinate ad alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

ETICHETTA
GIBREX
FITOREGOLATORE

Tipo di formulazione: polvere solubile in alcool.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Acido gibberellico puro 90 g
Coformulante qb a 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Norme precauzionali. Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

Informazioni mediche. In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Modalità d'impiego:
Caratteristiche: Fitoregolatore ad azione stimolante. Sui semi, diminuisce la durata della germinazione; sui fiori, favorisce l'allegagione, contrasta i danni delle gelate, induce la partenocarpia; sulle piante, induce precocità di fioritura e di maturazione, ne accresce lo sviluppo con maggio pezzatura dei frutti, annulla l'alternanza della produzione, aumenta le dimensioni ed il colore dei fiori, favorisce il ricaccio delle foraggiere. Il prodotto è allo stato puro cristallino e la sua particolare confezione sigillata ne permette una conservazione indefinita.
Avvertenza. I risultati dell'applicazione del prodotto dipendono in modo determinante dallo stato fisiologico delle piante, dallo stato di sviluppo, dalle varietà, dalle condizioni climatiche, dal suolo ed in genere dalle situazioni locali. E' pertanto impossibile indicare condizioni standardizzate d'impiego, ma solo suggerire indicazioni di massima lasciando al coltivatore la messa a punto caso per caso con prove preliminari su piccola scala.
Colture, dosi ed epoche d'impiego.
Carciofi: Per anticipare e concentrare il periodo di raccolta, si tratta alla dose di 1 – 2 g/hl impiegando 4 – 5 hl/ha; per le prime produzioni, alla formazione del capolino centrale e ripetendo alla dose minore dopo la prima raccolta e per le successive produzioni, 20 giorni prima del periodo in cui s'intende concentrare il raccolto. Irrigare prima o subito dopo il trattamento. In caso di gelate, per stimolare la ripresa della coltura, trattare quando la temperatura è ritornata ai valori normali e le piante si sono riprese. Le varietà che meglio rispondono al trattamento sono quelle a capolini verdi, meno bene quelle violette. Fragole: Per anticipare e concentrare il periodo di raccolta, si tratta alla dose di 2-4 g/hl impiegando 5-8 hl/ha, 4-6 settimane prima del periodo di normale fioritura. Le varietà che meglio rispondono al trattamento sono: Gorella, Pocahontas, Red Gauntlet, Csambridge Favourite, Surprise des Halles. Nelle zone solite a freddi improvvisi, si sconsiglia di anticipare la produzione e quindi l'impiego del fitoregolatore. Patate: per stimolare l'emissione regolare dei germogli nei tuberi da seme, s'immergono per 10 minuti in una soluzione di 0,1 g/hl in caso di tuberi sezionati e 0,5 g per tuberi interi, asciugando e seminando subito dopo. Per i tuberi provenienti da magazzino di conservazione, lasciare trascorrere 3-4 settimane di pregerminazione.
Frutti:
Pero: per migliorare l'allegagione nelle varietà di difficile impollinazione o partenocarpiche, si tratta alla dose di 1-2 g/hl impiegando 10 hl/ha quando il 20-30% di fiori sono aperti nelle aree settentrionali e quando il 90% dei fiori sono aperti nelle aree meridionali. In caso di gelate durante la fioritura, per contrastare i danni da sterilità dei fiori, trattare entro le 48 ore alla dose di 2-2,5 g/hl, impiegando 10-15 hl/ha; in caso di gelate a fiore chiuso, attendere per trattare la piena fioritura. Le varietà che meglio rispondono al trattamento sono: Passacrassana, Trionfo di Vienna, Butirra Giffard, Coscia, William, Spadona, Gentilona, Spadoncina, Buona Luisa d'Avranches. Si sconsiglia l'impiego sulla varietà Decana del Comizio.
Dosi eccessive possono modificare l'aspetto dei frutti e ridurre la fioritura dell'anno successivo mentre trattamenti tardivi inducono un eccessivo sviluppo della parte fogliare. Arancio: Per migliorare la qualità della buccia, si tratta alla dose di 1-2 g/hl impiegando 50 hl/ha, dopo l'invaiatura. Limone: Per ritardare la raccolta e ridurre la presenza di frutti piccoli, si tratta alla dose di 1-2 g/hl prima dell'invaiatura.Clementini e mandarini: Per migliorare l'allegagione, specie negli ibridi di scarsa produzione, si tratta alla dose di 1 g/hl bagnando completamente le piante, in piena fioritura per i mandarini e quando i 2/3 dei petali dei fiori sono caduti per i clementini.
Colture ornamentali e da fiore in pieno campo.
Per ottenere anticipo ed aumento della fioritura, con la formazione di fiori più grossi, colorati e steli allungati, si tratta alla dose di 1g/hl iniziando alla fase di comparsa dei boccioli e ripetendo dopo 20-30 giorni, avendo impiegato le dosi minime. Hanno reagito ai trattamenti: Ortensie, Crisantemi, Ciclamini, Anemoni, Fiordalisi, Rose.
Metodi d'impiego.
Al momento dell'uso, aggiungere al flaconcino alcool anche denaturato, ottenendo per agitazione una soluzione conservabile alcuni giorni, che va diluita nel totale d'acqua perfettamente pulita. La soluzione acquosa è instabile e va utilizzata in giornata. La soluzione va distribuita a volume normale, nebulizzando finemente, evitando lo sgocciolamento e quindi il sovradosaggio.
Compatibilità: Il prodotto è tecnicamente miscibile con i prodotti a reazione neutra. E' comunque consigliabile impiegarlo da solo o con l'aggiunta di un concime fogliare e di un bagnante che ne facilita l'assorbimento.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Il grande numero di varietà per le diverse specie vegetali rende impossibile una trattazione specifica; si consigliano prove preventive. Il prodotto può indurre deformazioni indesiderate sui frutti del pero, specie nella varietà Decana del Comizio. La forzatura chimica rende le colture maggiormente sensibili alle improvvise variazioni climatiche.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Cifo S.p.A. San Giorgio di Piano (BO)

Stabilimento di produzione: Cifo S.p.A. San Giorgio di Piano (BO);
Registrazione n° 5491 del 03-10-83 del Ministero della Sanità
Partita n. - Peso netto: 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 20 g

Da non applicare con i mezzi aerei Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua - Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente –
Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

GIBBERELLINA CIFO

REGOLATORE DI CRESCITA IN COMPRESSE

Composizione

Acido Gibberellico puro		g 18
Coformulanti, disperdenti e coloranti	q.b.a	g 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale in luogo asciutto e fresco.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Pero: a) per favorire l'allegagione: trattare quando il 20 - 40% dei fiori è aperto con 1,5 pastiglie per 100 litri d'acqua (per frutteti specializzati impiegare 6 – 8 pastiglie ad ettaro).

b) per contrastare i danni delle gelate trattare subito dopo l'avvento del freddo e non oltre le 48 ore con 1 – 2 pastiglie per 100 litri d'acqua. Dosi eccessive possono modificare l'aspetto dei frutti e ridurre la fioritura dell'anno successivo mentre trattamenti tardivi inducono un eccessivo sviluppo della parte fogliare.

Vite: in epoche diverse, con 1 – 3 pastiglie per 100 litri d'acqua a seconda del risultato che si vuole ottenere.

- contro l'acinellatura: trattare al termine della fioritura;
- per ottenere acini apireni ed aumentare la precocità: intervenire dall'inizio alla piena fioritura;
- per allungare il grappolo e renderlo spargolo: applicare il prodotto 6 – 10 giorni prima della fioritura.

Arancio, limone, clementino: per ottenere buccia liscia e ritardare la maturazione, trattare all'invaiatura con 0,5 – 1 pastiglia per 100 litri d'acqua.

Ciliegio: per sostenere i frutti allegati, intervenire da fine fioritura alla dose di 1 – 2 pastiglie per 100 litri d'acqua, ripetendo 2 – 3 volte a distanza di 8 – 10 giorni.

Patata da seme: per favorire il germogliamento del tubero-seme, intervenire prima della messa a dimora:

- 1 pastiglia ogni 1000 litri d'acqua su tuberi tagliati;
- 5 pastiglie ogni 1000 litri d'acqua su tuberi interi.

Effettuare saggi preliminari su pochi tuberi prima della messa a dimora per verificare la selettività varietale.

Carciofo: per ottenere capolini compatti e con gambo lungo e per favorire l'anticipo della raccolta e l'allungamento di questo periodo, trattare:

a) colture di primo anno, 25 giorni prima della raccolta con 1 pastiglia per 100 litri d'acqua.
b) colture di oltre un anno trattare entro la sesta foglia con 3 – 5 pastiglie per 100 litri d'acqua.

Floreali in pieno campo e serra: (rose, crisantemi, anemoni, ciclamini, fiordalisi, ortensie) irrorare con 1 pastiglia per 100 litri d'acqua alla comparsa dei boccioli fiorali, ripetendo il trattamento dopo 20 – 30 giorni per anticipare ed intensificare la fioritura ed ottenere steli più lunghi e fiori più grossi.

Nell'uso non impiegare acqua contenente cloro libero.

Non trattare in previsione di pioggia immediata.

Compatibilità: usare il prodotto da solo o in associazione soltanto con concimi fogliari neutri.

Fitotossicità: il grande numero di varietà per le diverse specie vegetali rende impossibile una trattazione specifica; si consigliano le prove preventive. Il prodotto può indurre deformazioni indesiderate sui frutti del pero. La forzatura chimica rende le colture maggiormente sensibili alle improvvise variazioni climatiche.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

CIFO S.p.A. San Giorgio di Piano (BO)

Stabilimento di produzione: CIFO S.p.A. S. Giorgio di Piano (BO)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 5581 del 21/1/1984
Tubetto da 50 g contenente 10 compresse da 5 g Partita N.

Da non applicare con i mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua - Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA RIDOTTA

GIBBERELLINA CIFO

REGOLATORE DI CRESCITA IN COMPRESSE

Composizione

Acido Gibberellico puro		g 18
Coformulanti, disperdenti e coloranti	q.b.a	g 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale in luogo asciutto e fresco.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Compatibilità: usare il prodotto da solo o in associazione soltanto con concimi fogliari neutri.
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

CIFO S.p.A. San Giorgio di Piano (BO)

Stabilimento di produzione: CIFO S.p.A. S. Giorgio di Piano (BO)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 5581 del 21/1/1984
Tubetto da 50 g contenente 10 compresse da 5 g Partita N.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA

Netbloc

LUMACHICIDA – LIMACCIDA IN PELLETS/GRANULI
CONTRO LUMACHE, LIMACCE E CHIOCCIOLE

Composizione

Metaldeide pura	5 g
Denatonio Benzoato (*)	0,003 g
Attrattivi, coformulanti q.b. a	100 g

(*) FORMULA SICURA: con repellente per l'uomo e gli animali domestici

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Non chiudere ermeticamente il recipiente. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle. Sintomi d'intossicazione: violenti dolori addominali, diarrea, vomito biancastro (aspetto di latte cagliato), shock, midriasi, ipotermia, convulsioni, obnubilazione del sensorio.
Consigli terapeutici di massima e condizioni al caso: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio (g. 5 per litro d'acqua) – riscaldare il paziente – cardiotonici – fleboclisi clorurate o glucosate con noradrenalina – diuretici – barbiturici – neuroplegici – anfetamina e derivati in caso di torpore.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

Preparato in granuli per combattere tutte le specie di molluschi gasteropodi (lumache, limacce, chiocciole) che attaccano le colture orticole , floreali e ornamentali.
Agisce per ingestione e per contatto. Il prodotto non viene asportato dal vento, né dilavato o reso inefficace dalla pioggia. La sua natura granulare lo rende pronto all'uso e di facile impiego.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: Colture in pieno campo (bietole, carciofi, lattughe e simili, spinaci, cucurbitacee, rose, crisantemi): 6-10 kg per ettaro su tutta la superficie.
NETBLOC va somministrato preferibilmente dopo una pioggia abbondante o una irrigazione, distribuendo una maggior quantità su una striscia larga circa 2 metri lungo il perimetro del campo. È opportuno effettuare una seconda somministrazione quando i granuli sono stati divorati.
Colture in serra (ortaggi e fiori): distribuire 10-15 granuli/mq.
Avvertenze: non mescolate il formulato con altri prodotti. Rischi di nocività: il prodotto è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Tempo di sicurezza: 20 giorni.
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

CIFO S.p.A. San Giorgio di Piano (BO)

Stabilimento di produzione: L.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE) – L.I.F.A. S.r.l. Isola Vicentina (VI) – SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (LODI) – VE.BI. S.a.s. Borgoricco (PD)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 6331 del 18/4/85
Contenuto netto: 200 – 500 g ; 1 – 5 kg Partita N.

Da non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA

KELT E 18

Acaricida polivalente

IRRITANTE PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione:
DICOFOL puro g 18,5 (= 205,35 g/l)
Solventi ed emulsionanti q.b. a g 100

Frasi di rischio: Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

CIFO S.p.A. –Via Oradour 6/8 S.Giorgio di Piano (BO) tel. 051 6655511

Stabilimento di produzione: DIACHEM – Via Tonale, 15 – Albano S. Alessandro (BG)
Registrazione n. 6463 del 04/09/1985
Contenuto netto: 500 ml 1 – 5 – 10 – 20 lt PARTITA N.:

Informazioni per il medico: Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Modalità d'impiego:
Caratteristiche tecniche: il KELT E 18 è un acaricida efficace contro i più importanti acari delle principali colture. La sua azione si estende a molte specie di acari resistenti agli altri acaricidi. Agisce per contatto contro gli adulti e le neanidi. Risulta meno efficace contro le uova, ma grazie alla sua azione residua agisce profondamente contro le ninfe in via di formazione. Il KELT E 18 è caratterizzato da una rapida azione abbattente e da una lunga attività residua (da 1 a 2 mesi).
Dosi, epoche, modalità d'impiego: il KELT E 18 viene impiegato per la lotta contro le neanidi e gli adulti di Ragni rossi e gialli che infestano le piante da frutto quali: Agrumi, Vite (esclusa vite da tavola), le colture ortive quali: Cucurbitacee con buccia commestibile (cetrioli, cetriolini, zucchine, altri), Cucurbitacee con buccia non commestibile (meloni, zucche, cocomeri, altri), le Colture Floreali in pieno campo o in serra e le Piante Ornamentali. La dose d'impiego è di ml 200-250 per 100 litri d'acqua. Si consiglia di effettuare il trattamento all'inizio della primavera alla schiusura della maggior parte delle uova invernali dei ragnetti rossi. Per controllare gli attacchi durante l'estate, iniziare i trattamenti appena compaiono gli adulti.
Nel caso di forte infestazione e con la presenza di numerose uova, effettuare due trattamenti alla distanza di 10-14 giorni allo scopo di distruggere totalmente anche gli adulti nati successivamente.
Con i due trattamenti a breve distanza le piante rimarranno immuni per molto tempo. I migliori risultati si ottengono irrorando abbondantemente le piante in modo da ottenere una completa copertura. In caso di foglie difficilmente bagnabili, aggiungere g 50 di bagnante.
Compatibilità: Nei trattamenti primaverili-estivi il KELT E 18 si può mescolare con un acaricida-ovicida. Il KELT E 18, inoltre, è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (poltiglia Bordolese Polisolfuri).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: si sconsiglia l'impiego del KELT E 18 sulle melanzane perché fitotossico.
Rischi di nocività: è tossico per gli insetti utili.
Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

etichetta

Alfrut

FITOREGOLATORE LIQUIDO ALLEGANTE

Composizione:
-NAA puro g 3,5 (= 37 g/l)
-Coformulanti e solventi q.b. a g 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia, dispnea.
Terapia: sintomatica.

Caratteristiche: Alfrut favorisce e stimola l'allegagione dei fruttiferi (pero, melo), arresta la caduta dei frutticini, induce la formazione di frutti con pezzatura maggiore e uniforme.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Fruttiferi (melo, pero): diluire 100 – 150 ml di Alfrut in 100 litri d'acqua e con tale soluzione bagnare completamente la chioma.
Effettuare un trattamento quando i fiori sono aperti solo per il 25 – 30%, ripetendo il trattamento a distanza di circa 8 – 10 giorni. Evitare irrorazioni quando tutti i fiori sono aperti.
Poiché le condizioni meteorologiche durante il trattamento e nelle prime ore successive influenzano l'efficacia di Alfrut, si sconsigliano applicazioni in giornate fredde, ventose e asciutte.
Nella fase di accrescimento dei frutticini è preferibile effettuare una concimazione fogliare per favorirne lo sviluppo.
COMPATIBILITA': Non mescolare il formulato con altri prodotti.
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA (PERO, MELO)

CIFO S.p.A. San Giorgio di Piano (BO)

Stabilimento di produzione: CIFO S.p.A. – San Giorgio di Piano (BO)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 7019 del 26/03/1987
contenuto netto: 250 – 500 ml; 1 – 2 litri Partita n.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

ETICHETTA

ZETA 80

Fungicida, acaricida
Preparato in polvere bagnabile di tipo colloidale.
Particolarmente attivo contro gli oidi
e con azione secondaria contro gli acari.
Protettivo e curativo per contatto superficiale esterno.

Xi

IRRITANTE

Composizione:
Zolfo puro (esente da selenio) g. 80
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

CIFO S.p.A. - via Oradour, 6/8 - San Giorgio di Piano (BO) tel.051 6655511
Stabilimenti di produzione: L.I.F.A. S.r.l. – Vigonovo (VE) / L.I.F.A. S.r.l. – Isola Vicentina (VI) / TERRANALISI S.r.l. - CENTO (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 7550 del 25/10/1988
Peso netto: 100 - 500 g - 1 Kg Partita N.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO:
Vite (Oidio o Mal Bianco) 100 – 150 g/hl (10-15 g/10 l) in pre-fioritura; 80 – 100 g/hl (8-10 g/10 l) in post – fioritura.
(Erinosi) 300 – 400 g/hl (30-40 g/10 l) prima della schiusura delle gemme; 80 g/hl (8 g/10 l) successivamente.
Melo o Pero (Oidio o Mal Bianco) 100 – 200 g/hl (10-20 g/10 l) in prefioritura; 80 – 150 g/hl (8-15 g/10 l) in post-fioritura.
Drupacee (Oidio o Mal Bianco) 80 – 150 g/hl (8-15 g/10 l) a partire dall'allegagione e per successive 3 o 4 volte.
Orticole (Oidio o Mal Bianco) 80-100 g/hl (8-10 g/10 l).
Rosa (Oidio o Mal Bianco) 150 – 200 g/hl (15-20 g/10 l) in pieno campo; 100-150 g/hl (10-15 g/10 l) in serra.
Compatibilità: non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con oli minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacril, diclofluanide.
Avvertenza: deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
mele: Black Ben Davis – Black Stayman – Calvilla bianca – Commercio – Golden delicious – Jonathan – Imperatore – Renetta – Rome Beauty – Stayman Red – Winesap.
pere: Buona Luisa Davranches – Contessa di Parigi – Kaiser Alexander – Olivier de Serres – William – Decana del Comizio. **vite:** Sangiovese. **cucurbitacee:** può essere fitotossico.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 5 giorni.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA

Energil 100 A

Fitoregolatore liquido fogliare auxinico

Composizione
Acido alfanaftalenacetico puro.......0,1% (= 1 g/l)
Coformulanti ....q.b. a 100%

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica. - **Consultare un centro antiveleni**

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Pomacee. Per ottenere frutti di maggiore pezzatura, migliore colorazione, eseguire 2-3 interventi distanziati di 15 giorni, a partire dall'inizio dell'accrescimento dei frutti, alla dose di ml 100-120 per 100 litri di acqua.
Il prodotto consente di ottenere un sensibile anticipo della maturazione.
Il prodotto va distribuito mediante irrorazione dopo diluizione con acqua.
ENERGIL 100 A, grazie alla presenza di una auxina (NAA), esercita sulle Pomacee gli effetti sopra indicati. In particolare le Pomacee così trattate sono in grado di superare più agevolmente i danni e i ritardi vegetativi conseguenti alle avversità climatiche o di produrre normalmente anche se con eccessiva allegagione.
Semenzai. Per anticipare la germinazione dei semi ed ottenere una germinazione completa immergere i semi per 12-24 ore in una soluzione di ENERGIL 100 A alla dose di 1 ml in 50 litri di acqua. Continuare il trattamento per stimolare la crescita irrorando le prime foglie della piantina con la stessa soluzione per 3-4 volte ad intervalli settimanali.
Trapianto di talee erbacee, talee legnose, arbustive e di vite. Immergere l'apparato radicale della piantina da trapiantare e irrorare subito dopo la messa a dimora le foglie con una soluzione di ENERGIL 100 A alla dose di 1 ml in 50 litri di acqua. Ripetere il trattamento per 4-5 volte ad intervalli settimanali. Si evita in questo modo la crisi tipica del trapianto.
Per anticipare la crescita di piante fruttifere (Pero, Melo, Pesco), Olivo, Fragola, Piante ortive (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Zucchino, Spinacio, Asparago, Carciofo, Radicchio), e vivai di forestali. Irrorare abbondantemente le foglie con la soluzione ottenuta diluendo ENERGIL 100 A alla dose di 2 ml in 100 litri di acqua. I trattamenti vanno effettuati durante il periodo di vegetazione e ripetuti almeno 4-5 volte a distanza di 10-15 giorni.
Fiori e piante ornamentali. Diluire ENERGIL 100 A alla dose di 1 ml in 50 litri di acqua ed irrorare una o due volte alla settimana per tutto il periodo della crescita.
Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto per Pero, Melo, Pesco, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Zucchino, Spinacio, Carciofo e Radicchio; 24 giorni prima per Olivo; 27 giorni prima per Fragola e Asparago.
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

CIFO S.p.A. - San Giorgio di Piano (BO)

Stabilimento di produzione: CIFO S.p.A. San Giorgio di Piano (BO)
Reg. Min. Sanità n. 7597 del 27/10/88
Contenuto netto 50, 100, 250, 500 ml e 1, 5, 10 litri Partita N.

Da non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA RIDOTTA

Energil 100 A

Fitoregolatore liquido fogliare auxinico

Composizione
Acido alfanaftalenacetico puro.......0,1% (= 1 g/l)
Coformulanti ....q.b. a 100%

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea.
Terapia sintomatica. **Consultare un centro antiveleni**

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

CIFO S.p.A. San Giorgio di Piano (BO)

Stabilimento di produzione: CIFO S.p.A. San Giorgio di Piano (BO)
Reg. Min. Sanità n. 7597 del 27/10/88
Contenuto netto 50, 100, 250, 500 ml e 1, 5, 10 litri Partita N.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA

CIFOZEB

Anticrittogamico fungicida-polivalente

Xi

IRRITANTE

Composizione
-MANCOZEB puro g 80
-Sospensivante, adesivanti ed eccipienti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

CIFO S.p.A. Via Oradour 6/8 Giorgio di Piano (BO), tel. 051-6655511
Stabilimenti di Produzione: TERRANALISI snc - Cento (FE); L.I.F.A. srl - Isola Vicentina (VI)
Registrazione del Ministero della Sanità n° 7598 del 27/10/1988
Peso Netto: 100 - 500 g / 1 kg Partita n.

NORME PRECAUZIONALI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio:congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; effetto antabuse, si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool , e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni

Caratteristiche tecniche: Preparato in polvere bagnabile. Gamma d' azione: fungicida molto vasto. Esplica la sua azione protettiva per contatto, con possibilità di penetrazione citotropica. Il CIFOZEB è caratterizzato da una buona persistenza.
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO:
Pero, melo (contro Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria, Glomerella): g 20-25/10 litri d'acqua per trattamenti preventivi. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli alle malattie.
Uve da tavola e da vino (contro Peronospora, Escoriosi, Antracnosi, Marciume nero): g 20-25/10 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli alle malattie.
Pioppo (contro Marsonnina, Ticchiolatura): g 40-50/10 litri d'acqua per trattamenti preventivi, irrorando accuratamente le piante.
Pomodoro (contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Clamidosporiosi, Antracnosi): solo fino alla prima fioritura g 25/10 litri d'acqua per trattamenti preventivi, irrorando accuratamente le piante.
Tabacco (contro Peronospora): g 20-25/10 litri d'acqua in pieno campo per trattamenti preventivi in funzione delle condizioni ambientali; g 20/10 litri d'acqua in semenzaio ogni 3-4 giorni.
Garofano (contro Ruggine): g 30/10 litri d'acqua per trattamenti preventivi quando si manifestano le condizioni per l'infezione.
Non impiegare in serra. Non Impiegare su colture diverse da quelle indicate.
Compatibilita': CIFOZEB è compatibile con tutti gli antiparassitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
Fitotossicita': varietà di pero sensibili al MANCOZEB: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipione, Spadone d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.
Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA

Rigenal fiori

Fitoregolatore liquido per colture ornamentali e floreali

Composizione:

NAA puro		g 1,0
Coformulanti e solventi	q.b. a	g 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI : Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
RIGENAL FIORI è un fitormone specifico per piante ornamentali e da fiore, in vivaio e a dimora. Sulle colture in vivaio stimola l'attività fotosintetica ed il metabolismo con conseguente accelerazione della crescita al fine di ottenere un sensibile anticipo sull'epoca del trapianto. Predispone le plantule a superare con più facilità gli stress derivanti da tale pratica o da avverse condizioni pedoclimatiche. Sulle piante ornamentali da foglia (ficus, filodendro, dieffembachia, potos, clorofito, croton, dracena, poinsettia, peperomia) i trattamenti con RIGENAL FIORI si traducono in un più armonico sviluppo in special modo dei soggetti più giovani ed in generale favoriscono la crescita anticipata e rigogliosa delle piante con foglie più grandi e intensamente colorate. Sulle colture da fiore (rosa, crisantemo, garofano, gerbera, strelitzia) viene stimolata la formazione di un maggior numero di boccioli che danno origine a fiori di dimensioni maggiori e dai colori più intensi e brillanti. La fioritura risulta anticipata, copiosa e più prolungata. Il fiore risulta più persistente sia sulla pianta sia dopo la sua recisione.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Per colture ornamentali e floreali: diluire ml. 80 - 100 di RIGENAL FIORI in 100 litri d'acqua; alla comparsa dei primi boccioli bagnare uniformemente la parte aerea delle piante e, in particolare, la pagina inferiore e gli apici vegetali, effettuando un trattamento ogni 7 giorni. Per colture deperite o a crescita stentata eseguire due interventi settimanali distribuendo eventualmente anche al terreno. In ambiente coperto (serre, tunnel) i trattamenti vanno eseguiti nelle ore pomeridiane e la concentrazione della soluzione non deve superare lo 0,1% (ml. 100 di RIGENAL FIORI per 100 litri di acqua). Per distribuire la soluzione si consiglia l'uso di atomizzatori o nebulizzatori. Concimare adeguatamente le colture da trattare poiché l'impiego di RIGENAL FIORI induce una maggiore attività metabolica.
Compatibilità: Non mescolare il formulato con altri prodotti.
Attenzione: ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

CIFO S.p.A. – S. Giorgio di Piano (BO)

Stabilimento di produzione:
CIFO S.p.A. – S. Giorgio di Piano (BO)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 7607 del 23/11/1988
Contenuto netto: 50 - 500 ml 1 – 2 lt. - PARTITA N.:

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA

Carbosett 49

Insetticida in polvere bagnabile
Composizione:
CARBARIL puro (esente da β-naftolo) g 49
Inerti, emulsionanti e bagnanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

CIFO S.p.A. – Via Oradour, 6/8 – S. Giorgio di Piano (BO) – Tel. 051/6655511
Stabilimenti di produzione: S.I.P.C.A.M. S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi) / STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Cotignola (RA) TORRE srl Torrenieri (SI)
Registrazione n. 7628 del 21/12/1988
Peso netto: 100 – 500 g 1 kg PARTITA N.:

Norme precauzionali: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Informazioni per il medico: Carbaril: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime. **Consultare un Centro Antiveleni**

Modalità d'impiego
Caratteristiche tecniche: Preparato in polvere bagnabile. Agisce per contatto e per ingestione, con azione citotropica contro una vasta gamma di insetti. Particolarmente indicato contro le larve di lepidotteri e contro la dorifora della patata. Caratterizzato da una buona persistenza sulle piante e assenza di effetti fitotossici. Se applicato su alcune cultivar di melo nei trenta giorni che seguono la caduta dei petali, può provocare il diradamento dei frutticini.
Dosi – Modalità d'impiego: Vite (Tignole, Cicaline, ecc.) 200-250 g/hl; Pesco, Susino, Albicocco (Tignole) 200-250 g/hl; Mandorlo (Bombice gallonato o Campa) 150-200 g/hl; Olivo (Tignola, Cocciniglia Mezzo grano di pepe) 200-250 g/hl; Agrumi (Tignola, Cocciniglia Mezzo grano di pepe) 200-250 g/hl; Nocciolo (Balanino, Cimici) 200 g/hl; Pioppo (Crisomela, Farfalla bianca) 200-400 g/hl; Melo, Pero (Carpocapsa, Microlepidotteri vari: Cacoecia, Eulia, Capua) 150 g/hl; Noce (Carpocapsa) 150 g/hl; Mais (Piralide e Sasamia) 350-400 g/hl; Foraggere (Fitonomo, Apione, Misurino) 200-250 g/hl; Orticole – escluso i funghi – (Cavolaia, Mamestra, Dorifora, Afidi, Insetti vari del carciofo) 150-200 g/hl; Floricole in pieno campo (Garofano) (Bega verde) 200 g/hl.
Compatibilità: CARBOSETT 49 è compatibile con tutti gli antiparassitari di uso più comune, ad eccezione di quelli a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri).
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischi di nocività: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame. Evitare l'impiego del prodotto durante la fioritura per non danneggiare le api e altri insetti pronubi. Attenzione, il prodotto tal quale contiene sostanze altamente tossiche per gli organismi acquatici.
Intervallo di sicurezza: 7 giorni.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni causati da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

ETICHETTA

Carbosett 5P

Insetticida in polvere secca

NOCIVO

Composizione:
CARBARIL puro (esente da β-naftolo) g 5
Coformulanti ed inerti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o da mangimi e da bevande.Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

CIFO S.p.A. – Via Oradour, 6/8 – S. Giorgio di Piano (BO) – Tel. 051/6655511
Stabilimenti di produzione: S.I.P.C.A.M. S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi) / TORRE srl – Torrenieri (SI) / STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Cotignola (RA)
Registrazione n. 8056 del 08/04/92
Peso netto: 100 – 200 – 300 – 500 g 1 – 5 kg PARTITA N.:

Norme precauzionali: non respirare le polveri. Evitare il contatto con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Informazioni per il medico: Carbaril: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; sciallorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime. Consultare un Centro Antiveleni

Modalità d'impiego
Caratteristiche tecniche: CARBOSETT 5P è un preparato in polvere secca che agisce a contatto e per ingestione nei confronti di numerosi insetti. Caratterizzato da una buona persistenza sulla pianta e resistenza all'aria. Combatte: carpocapsa, tignole della vite, cacoecia ed altri ricamatori, cydia, dorifora, nottue, cavolaia, bega del garofano, bombice dispari, tentredini, oplocampe, cocciniglia mezzo grano di pepe.
CARBOSETT 5P combatte gli insetti dannosi in pieno campo ed in serra come: formiche, elateridi, grilli, grillotalpe, larve di maggiolini, tignole in genere, tipule ed agrotidi.
Dosi – Epoche – Modalità d'impiego: pesco, pero, melo, albicocco, susino, vite: 30-40 kg/ha (30-40 g/10 mq); agrumi: 30-40 kg/ha (30/40 g/10 mq); ortaggi (escluso i funghi): 10-15 kg/ha (10-15 g/10 mq): colture floreali: 10-15 kg/ha (10-15 g/10 mq). Per il trattamento del terreno destinato a tali colture: 30-40 kg/ha (30-40 g/10 mq).
Distribuire con i comuni polverizzatori a mano o meccanici, avendo cura di coprire uniformemente tutta la vegetazione.
Per combattere gli insetti del terreno interrare CARBOSETT 5P.
Privilegiare, per i trattamenti, le ore mattutine.
Compatibilità: Il prodotto non è compatibile con altri preparati antiparassitari ad azione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischi di nocività: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici e bestiame. Attenzione, il prodotto tal quale contiene sostanze altamente tossiche per gli organismi acquatici.
Intervallo di sicurezza: Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni causati da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

ETICHETTA

MALAX

Acaricida liquido

Composizione:
DICOFOL puro g 18,5 (= 204,8 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

Frasi di rischio:
Irritante per gli occhi e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE **Pericoloso per l'ambiente**

Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

CIFO S.p.A. – Via Oradour 6/8 S. Giorgio di Piano (BO) tel. 051 6655511
Stabilimento di produzione: DIACHEM S.p.A. – Via Tonale, 15 – Albano S. Alessandro (BG)
Registrazione n. 8175 del 03/03/93
Contenuto netto: 100 – 200 – 500 – 1000 ml PARTITA N.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni. **Terapia:** sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa. **Consultare un Centro Antiveleni.**

MODALITÀ D'IMPIEGO
CARATTERISTICHE: preparato in soluzione. Agisce per contatto con azione rivolta prevalentemente contro adulti e ninfe degli acari. Risulta pure efficace contro le ninfe in formazione.
DOSI – EPOCHE – MODALITÀ D'IMPIEGO: preparare la soluzione acaricida diluendo la dose necessaria in acqua, agitare, riempire il contenitore della pompa irroratrice (o nebulizzatore) ed eseguire il trattamento avendo cura di bagnare entrambe le superfici fogliari. E' opportuno trattare in presenza di acari (adulti e ninfe), ripetendo il trattamento a seconda delle necessità.
Agrumi, vite (esclusa vite da tavola): 180-200 ml/hl
Cucurbitacee con buccia commestibile (cetrioli, cetriolini, zucchine, altri): 200-250 ml/hl
Cucurbitacee con buccia non commestibile (meloni, zucche, cocomeri, altri): 200-250 ml/hl
Piante ornamentali e da fiore: 180-200 ml/hl
Per piccoli trattamenti diluire 20-25 ml per 10 litri d'acqua.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.
COMPATIBILITÀ
Il MALAX può essere miscelato con qualsiasi altro insetticida od anticrittogamico avente reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può risultare fitotossico su melanzane e asparagus plumosus.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 15 giorni.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

ETICHETTA

GLIFO 41

DISERBANTE TOTALE

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Glifosate sale isopropilaminico puro (485g/litro) 41 g
Coformulanti q.b. a 100 g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

CIFO S.p.A. – Via Oradour 6/8 – San Giorgio di Piano (BO) tel. 051-6655511
Stabilimento di produzione: L.I.F.A. s.r.l. – Vigonovo (VE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 9330 del 12/09/97
Contenuto : 50 – 100 – 250 – 500 ml /1 – 5 – 10 – 25 litri Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche
Erbicida sistemico, non residuale; svolge la propria azione erbicida per assorbimento fogliare con traslocazione alle radici ed organi perenni. Viene applicato in post-emergenza delle malerbe e risulta efficace sulle diverse infestanti mono e dicotiledoni sia perenni (gramigna,vilucchio,cardo,cipero, ecc..) che annuali.
Trova impiego nel diserbo controllato di vigneti, agrumeti,frutteti ed oliveti,diserbo di terreni senza colture prima o dopo la coltivazione di carciofo, asparago, fava, pisello, fagiolino, pomodoro, melanzana, carota, barbabietola da zucchero, erba medica, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, prati e vivai.
Diserbo controllato sulla rosa, diserbo totale di sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Per il diserbo totale di aree incolte e diserbo controllato di vigneti, agrumeti,frutteti ed oliveti, 3-5 litri/ha contro la maggior parte delle infestanti annuali; 4-4,5 litri/ha contro sorghetta, gramignone, ranuncoli; 5,5 - 7 litri/ha contro cipero rotondo, cardo in fioritura, assenzio selvatico, pentafillo, piantaggine, soffione, romici, felci; 8 -10 litri/ha contro vilucchio ben sviluppato, gramigna, ortiche, carota selvatica, farfarella e cannucce (alte 50 - 80 cm).
Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari è inefficace.
Volume di irrorazione: 200 - 350 litri/ha di acqua.
Compatibilita': il prodotto si usa da solo.
Avvertenze : si consiglia di non trattare in giornate ventose, al fine di evitare fenomeni di deriva sulle colture vicine e con minaccia di pioggia entro breve termine (6 ore).
Evitare di irrorare le foglie ed altre parti verdi delle essenze coltivate.
Fitotossicita': il prodotto è fitotossico per le colture arboree in gemme (frutteti,vite,agrumi,olivi).Evitare che la nube irrorata giunga a contatto con tali colture.
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

ETICHETTA

OMIL 80

Anticoccidico a base di oli minerali
in forma emulsionabile

Composizione:

Olio minerale (U. R. 95%)	g. 80
Emulsionanti ed adesivanti q.b. a	g. 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI MEDICHE : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO
Anticoccidico efficace contro le Coccinigli e per i trattamenti di fine inverno. Con opportune precauzioni può essere usato anche nel periodo primaverile-estivo.
L'OMIL 80 non produce ustioni per cui il suo uso può essere esteso alle piante molto delicate anche in serra.
Viene impiegato nelle seguenti colture contro:
Pomacee-Drupacee: Aspidiotus Perniciosus, o S. Josè, Diaspis Pentagona e Leperii.
Agrumi: Cocciniglia biancorossa, Iceria Purchasi, Cocciniglia cotonosa, Pidocchi a virgola.
Olivo: Saissetia Oleae.
DOSI D'IMPIEGO: Trattamenti di fine inverno 15 – 25 ml/1 Lt d'acqua. Trattamenti Primaverili-estivi 5 – 10 ml/1 Lt. d'acqua. Agrumi 15 – 20 ml/1 Lt. d'acqua.
Compatibilita'
Il prodotto non è miscibile con i formulati contenenti Zolfo, Polisolfuri, Captano, Faltan, Dicloran, Dodina, Rami fissi, Binapacryl e Triclorfan. Pertanto qualora si fossero effettuati trattamenti con i formulati suddetti, l'applicazione dell'OMIL 80 deve essere distanziata di almeno 25 giorni.
Avvertenza
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicita'
Onde evitare l'insorgenza di fenomeni fitotossici, si consiglia di osservare un intervallo di tempo di almeno due settimane qualora si eseguano trattamenti separati con OMIL 80 e con gli Zolfi.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto se impiegato da solo.
Se in miscela con esteri fosforici 30 giorni.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

CIFO S.p.A. S. Giorgio di Piano (BO)
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.r.l. – Via Quattro Novembre - Renazzo di Cento (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 9621del 29/04/1998
Contenuto netto: 300 ml 1 – 5 – 20 – 25 – 50 l Partita N.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA

CAULISAN

Fungicida ad azione sistemica

CAULISAN
Composizione:
- PROPAMOCARB Cloridrato g 66,5 (= 722 g/l)
- Coadiuvanti q.b. a g 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CIFO S.p.A. S. Giorgio di Piano (BO)

Stabilimenti di produzione: IND. CHIMICHE CAFFARO S.p.A. Aprilia (LT)
SARIAF S.p.A. - Faenza (RA)
LIFA S.r.l. - Vigonovo (VE)
LIFA S.r.l. - Isola Vicentina (VI)

Registrazione n. 9823 del 23/11/98 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: 100 – 200 – 300 – 500 ml 1 – 5 – 10 – 20 l
Partita N.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: conservare la confezione ben chiusa - evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO: Fungicida sistemico indicato nella difesa di numerose colture nel combattere i seguenti ficomiceti: Pythium spp., Phytophthora sp.; Peronospora, Pseudoperonospora, Aphanomices sp., Bremia.
Viene assorbito prevalentemente dalle radici e poi traslocato nell'apparato fogliare, caratterizzato da una lunga e completa protezione ed elevata selettività sulle colture manifestando, su di esse, uno stimolo nei confronti della radicazione e sullo sviluppo vegetativo.
Il prodotto ha la caratteristica di poter essere impiegato con numerose tecniche quali: trattamenti fogliari, concia delle sementi, bagno dei bulbi e delle talee, disinfezione dei terricciati e dei letti di semina, trattamenti al terreno in pre e post-trapianto delle colture.
Viene impiegato sulle seguenti colture: Agrumi, Melo, Pero, Fragola, Cavoli, Lattuga, Cicoria, Indivia, Radicchio, Spinacio, Bietola da foglia e da costa , Sedano, Prezzemolo, Basilico, Cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo), Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana), Carota, Bietola da orto, Rapa, Cipolla, Aglio Porro, Tabacco, floreali, forestali, ornamentali, nei vivai, nei semenzai, nella concia delle sementi e bulbi, campi da golf e prati ornamentali.
Interventi:
TRATTAMENTI FOGLIARI: viene impiegato nella dose di 1,5 - 3 litri per ettaro di coltura in circa 15 - 20 ettolitri di acqua (pari a 7-15 ml per 50 mq in 7 – 10 litri d'acqua), sulle colture sopra menzionate.
CONCIA DELLE SEMENTI: la dose di impiego è di 1 - 4 ml per kg di seme di piccole dimensioni e 10 - 40 ml per kg di seme di dimensioni maggiori.
PREPARAZIONE DEI TERRICCIATI: impiegare 300 ml di prodotto per metro cubo di terriccio, disciolti in circa 20 litri di acqua.
TRATTAMENTI AI SEMENZAI: impiegare 8 - 12 ml per metro quadro di superficie disciolti in 4 - 5 litri di acqua con l'avvertenza di ripetere il trattamento cinque giorni prima del trapianto con l'utilizzo di 6 - 8 litri di acqua per metro quadrato.
TRATTAMENTI AL TERRENO: pre-trapianto: impiegare 8 - 12 ml per metro quadro in 3 - 5 litri di acqua; post- trapianto: impiegare 100 - 200 ml per pianta di una soluzione ottenuta diluendo 200 ml di prodotto per q.le acqua (pari a 20 ml per 10 litri d'acqua): trattare ogni 10 - 15 giorni con un massimo di 3 - 4 interventi.
COLTURE FLOREALI IN GENERALE: informazioni particolareggiate per le seguenti colture: Garofano - Gerbera, si impiega il prodotto specificatamente contro Pythium e Phytophtora alla dose di 12 - 15 ml per metro quadro, disciolto in circa 2 - 4 litri di acqua, trattando due giorni prima dell'impianto e quindi procedendo all'incorporamento. Successivamente impiegare 200 ml per q.le acqua (pari a 20 ml per 10 litri d'acqua), con trattamento fogliare, bagnando abbondantemente con 400 - 500 litri ogni 1000 metri quadri (pari a 4-5 litri ogni 10 mq), ad intervalli inizialmente di circa 8 - 10 giorni e successivamente ogni 15 - 25 giorni.
BULBOSE: per controllare Pythium ultimum e Phytophtora si immergono i bulbi per 20 - 30 minuti in una soluzione contenente 300 ml di prodotto per q.le acqua (pari a 30 ml per 10 litri d'acqua), poi, prima della messa a dimora, si tratta il terreno con 10 - 12 ml di prodotto per metro quadrato in 2 - 4 litri di acqua e successivo incorporamento a circa 10 - 12 cm di profondità.
PIANTE FORESTALI (VIVAI): contro Phytophtora cactorum, Phytophtora cinnamomi e Pythium, intervenendo trattando il substrato colturale con 300 ml di prodotto per metro cubo, disciolto in 8 - 10 litri di acqua; si deve intervenire in caso di necessità ogni 15 - 18 giorni con 200 ml di prodotto in 4 - 5 litri di acqua per metro quadro.
CAMPI DA GOLF – TAPPETI ERBOSI – PRATI ORNAMENTALI: per il controllo di Pythium ap. ed altre specie, trattare con interventi fogliari a 1 - 1,5 ml per metro quadro, impiegando non meno di 100 - 200 litri di soluzione per 1000 mq (pari a 1-2 litri di soluzione per 10 mq). Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia ripetendo i trattamenti ogni 14 - 15 giorni.

COMPATIBILITA': Non compatibile con i prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese) e gli oli minerali.
AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

ETICHETTA RIDOTTA

CAULISAN

Fungicida ad azione sistemica

CAULISAN
Composizione:
- PROPAMOCARB Cloridrato g 66,5 (722 g/l)
- Coadiuvanti q.b. a g 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CIFO S.p.A. S. Giorgio di Piano (BO)

Stabilimenti di produzione: IND. CHIMICHE CAFFARO S.p.A – Aprilia (LT)
SARIAF S.p.A. - Faenza (RA)
LIFA S.r.l. - Vigonovo (VE)
LIFA S.r.l. - Isola Vicentina (VI)

Registrazione n. 9823 del 23/11/98 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 ml

PARTITA N°:

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: conservare la confezione ben chiusa - evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

COMPATIBILITA': Non compatibile con i prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese) e gli oli minerali.
AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA

DIFTOR 5
Composizione:
- DIFLUBENZURON puro g 5
- Coadiuvanti q.b. a g 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CIFO S.p.A. - S. GIORGIO DI PIANO (BO)

Stabilimenti di produzione: IND. CHIMICHE CAFFARO S.p.A. - Aprilia (LT)
SARIAF S.p.A. - Faenza (RA)
LIFA S.r.l. - Vigonovo (VE)
LIFA S.r.l. - Isola Vicentina (VI)

Registrazione n. 9824 del 23/11/98 del Ministero della Sanità

Peso netto: 100 – 200 – 300 - 500 g 1 – 5 – 10 – 20 Kg

Partita N.

DIFTOR 5

Insetticida a vasto spettro d'azione
Tipo di formulazione: polvere bagnabile

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa– evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone – usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Il DIFTOR 5 è un insetticida a vasto spettro d'azione che agisce in modo prevalente per ingestione contro le forme larvali, inoltre possiede in certo effetto ovicida contro alcune specie di insetti quali i minatori fogliari.
Viene impiegato sulle seguenti colture e alle dosi sottoindicate:

MELO - PERO: Contro i microlepidotteri minatori (Cemiostoma, Lithocolletis, Nepticula) a 200 – 300 g/hl (pari a 20-30 g/10 litri) e contro i lepidotteri ricamatori (Capua, Archips, Orgya) e Psilla del pero a 400 g/hl (pari a 40g/10 litri).

FORESTALI: Contro Thaumetopea pityocampa, Lymantria dispar, Pristiphora abietina, Rhyacionia buoliana alla dose di 400 g/hl (pari a 40g/10 litri).

FLORICOLE – ORNAMENTALI: Contro Tignola, Nottua, Bega del garofano, Lepidotteri defogliatori e Mosche minatrici alla dose di 250 – 350 g/hl (pari a 25-35 g/10 litri).

FUNGHI: Contro Ditteri e Collemboli alla dose di 250- 300 g/hl (pari a 25-30 g/10 litri).

COMPATIBILITA': Non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
<u>Sospendere i trattamenti 45 giorni prima della raccolta.</u>
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

DIFTOR 5
Composizione:
- DIFLUBENZURON puro g 5
- Coadiuvanti q.b. a g 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CIFO S.p.A. - S. GIORGIO DI PIANO (BO)

Stabilimenti di produzione:IND. CHIMICHE CAFFARO S.p.A. - Aprilia (LT)
SARIAF S.p.A. - Faenza (RA)
LIFA S.r.l. - Vigonovo (VE)
LIFA S.r.l - Isola Vicentina (VI)

Registrazione n. 9824 del 23/11/98 del Ministero della Sanità
Peso netto: 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 g
Partita N.

FOGLIO ILLUSTRATIVO

DIFTOR 5

Insetticida a vasto spettro d'azione
Tipo di formulazione: polvere bagnabile

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa– evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone – usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Il DIFTOR 5 è un insetticida a vasto spettro d'azione che agisce in modo prevalente per ingestione contro le forme larvali, inoltre possiede in certo effetto ovicida contro alcune specie di insetti quali i minatori fogliari.
Viene impiegato sulle seguenti colture e alle dosi sottoindicate:
MELO - PERO: Contro i microlepidotteri minatori (Cemiostoma, Lithocolletis, Nepticula) a 200 – 300 g/hl (pari a 20-30 g/10 litri) e contro i lepidotteri ricamatori (Capua, Archips, Orgya) e Psilla del pero a 400 g/hl (pari a 40g/10 litri).

FORESTALI: Contro Thaumetopea pityocampa, Lymantria dispar, Pristiphora abietina, Rhyacionia buoliana alla dose di 400 g/hl (pari a 40g/10 litri).

FLORICOLE – ORNAMENTALI: Contro Tignola, Nottua, Bega del garofano, Lepidotteri defogliatori e Mosche minatrici alla dose di 250 – 350 g/hl (pari a 25-35 g/10 litri).

FUNGHI: Contro Ditteri e Collemboli alla dose di 250- 300 g/hl (pari a 25-30 g/10 litri).
COMPATIBILITA': Non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
Sospendere i trattamenti 45 giorni prima della raccolta.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

ETICHETTA RIDOTTA

DIFTOR 5

Insetticida a vasto spettro d'azione
Tipo di formulazione: polvere bagnabile

Composizione:
-DIFLUBENZURON puro g 5
-Coadiuvanti q.b. a g 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa– evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone – usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza**: Consultare un centro Antiveleni

COMPATIBILITA': Non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

CIFO S.p.A. S. GIORGIO DI PIANO (BO)

Stabilimenti di produzione: IND. CHIMICHE CAFFARO S.p.A. – Aprilia (LT) / SARIAF S.p.A. - Faenza (RA) / LIFA S.r.l. - Vigonovo (VE) / LIFA S.r.l. - Isola Vicentina (VI)
Registrazione n.9824 del 23/11/98 del Ministero della Sanità
Peso netto: 20-30-40-50-60-70-80-90 g - PARTITA N°:

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

ETICHETTA

DIFTOR 2000

Insetticida a vasto spettro d'azione
Tipo di formulazione : polvere bagnabile

Composizione:
- DIFLUBENZURON puro 5 g
- Coadiuvanti q.b. a 100 g

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza** Consultare un centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Il DIFTOR 2000 è un insetticida a vasto spettro d'azione che agisce in modo prevalente per ingestione contro le forme larvali, inoltre possiede un certo effetto ovicida contro alcune specie di insetti quali i minatori fogliari.
Viene impiegato sulle seguenti colture e alle dosi sottoindicate:
melo - pero: Contro i microlepidotteri minatori (Cemiostoma, Lithocolletis, Nepticula) a 200–300 g/hl (pari a 20-30g/10 litri) e contro i lepidotteri ricamatori (Capua, Archips, Orgya) e Psilla del pero a 400 g/hl (pari a 40 g/10 litri).
forestali: Contro Thaumetopea pityocampa, Lymantria dispar, Pristiphora abietina, Rhyacionia buoliana alla dose di 400 g/hl (pari a 40 g/10 litri).
floreali – ornamentali: Contro Tignola, Nottua, Bega del garofano, Lepidotteri defogliatori e Mosche minatrici alla dose di 250 – 350 g/hl (pari a 25-35 g/10 litri).
funghi: Contro Ditteri e Collemboli alla dose di 250- 300 g/hl (pari a 25-30 g/10 litri).
Compatibilita': Non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 45 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

CIFO S.p.A. – S. Giorgio di Piano (BO)

Stabilimenti di produzione:IND. CHIMICHE CAFFARO S.p.A. - Aprilia (LT) / LIFA S.r.l. - Vigonovo (VE) / LIFA S.r.l. - Isola Vicentina (VI) / Registrazione del Ministero della Sanità n. 10442 del 12/04/00
Peso netto: 100 – 200 – 300 – 500 g; 1 – 5 – 10 – 20 kg Partita N.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

FOGLIO ILLUSTRATIVO

DIFTOR 2000

Insetticida a vasto spettro d'azione
Tipo di formulazione : polvere bagnabile

Composizione:

- DIFLUBENZURON puro	5 g
- Coadiuvanti q.b. a	100 g

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza** Consultare un centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Il DIFTOR 2000 è un insetticida a vasto spettro d'azione che agisce in modo prevalente per ingestione contro le forme larvali, inoltre possiede un certo effetto ovicida contro alcune specie di insetti quali i minatori fogliari.
Viene impiegato sulle seguenti colture e alle dosi sottoindicate:
melo - pero: Contro i microlepidotteri minatori (Cemiostoma, Lithocolletis, Nepticula) a 200–300 g/hl (pari a 20-30g/10 litri) e contro i lepidotteri ricamatori (Capua, Archips, Orgya) e Psilla del pero a 400 g/hl (pari a 40 g/10 litri).
forestali: Contro Thaumetopea pityocampa, Lymantria dispar, Pristiphora abietina, Rhyacionia buoliana alla dose di 400 g/hl (pari a 40 g/10 litri).
floreali – ornamentali: Contro Tignola, Nottua, Bega del garofano, Lepidotteri defogliatori e Mosche minatrici alla dose di 250 – 350 g/hl (pari a 25-35 g/10 litri).
funghi: Contro Ditteri e Collemboli alla dose di 250- 300 g/hl (pari a 25-30 g/10 litri).
Compatibilita': Non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 45 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

CIFO S.p.A. – S. Giorgio di Piano (BO)

Stabilimenti di produzione:IND. CHIMICHE CAFFARO S.p.A. - Aprilia (LT) / LIFA S.r.l. - Vigonovo (VE) / LIFA S.r.l. - Isola Vicentina (VI) / Registrazione del Ministero della Sanità n. 10442 del 12/04/00
Peso netto: 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 g Partita N.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA RIDOTTA

DIFTOR 2000

Insetticida a vasto spettro d'azione
Tipo di formulazione : polvere bagnabile

Composizione:
- DIFLUBENZURON puro 5 g
- Coadiuvanti q.b. a 100 g

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza** Consultare un centro Antiveleni

Compatibilita': Non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

CIFO S.p.A. – S. Giorgio di Piano (BO)

Stabilimenti di produzione:IND. CHIMICHE CAFFARO S.p.A. - Aprilia (LT) / LIFA S.r.l. - Vigonovo (VE) / LIFA S.r.l. - Isola Vicentina (VI) / Registrazione del Ministero della Sanità n. 10442 del 12/04/00
Peso netto: 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 g Partita N.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA

CAULISAN 99

Fungicida ad azione sistemica

Composizione:
- PROPAMOCARB Cloridrato g 66,5 (– 722 g/l)
- Coadiuvanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Fungicida sistemico indicato nella difesa di numerose colture nel combattere i seguenti ficomiceti: Pythium spp., Phytophthora sp.; Peronospora, Pseudoperonospora, Aphanomices sp., Bremia.
Viene assorbito prevalentemente dalle radici e poi traslocato nell'apparato fogliare, caratterizzato da una lunga e completa protezione ed elevata selettività sulle colture.
Il prodotto ha la caratteristica di poter essere impiegato con numerose tecniche quali: trattamenti fogliari, concia delle sementi, bagno dei bulbi e delle talee, disinfezione dei terricciati e dei letti di semina, trattamenti al terreno in pre e post-trapianto delle colture.
Viene impiegato sulle seguenti colture: Agrumi, Melo, Pero, Fragola, Cavoli, Lattuga, Cicoria, Indivia, Radicchio, Spinacio, Bietola da foglia e da costa, Sedano, Prezzemolo, Basilico, Cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo), Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana), Carota, Bietola rossa, Rapa, Cipolla, Aglio, Porro, Tabacco, floreali, forestali, ornamentali, nei vivai, nei semenzai, nella concia delle sementi e bulbi, campi da golf e prati ornamentali.
Interventi:
TRATTAMENTI FOGLIARI: viene impiegato nella dose di 1,5 - 3 litri per ettaro di coltura in circa 15 - 20 ettolitri di acqua (pari a 7-15 ml per 50 mq in 7/10 litri d'acqua), sulle colture sopra menzionate.
CONCIA DELLE SEMENTI: la dose di impiego è di 1 - 4 ml per kg di seme di piccole dimensioni e 10 - 40 ml per kg di seme di dimensioni maggiori.
PREPARAZIONE DEI TERRICCIATI: impiegare 300 ml di prodotto per metro cubo di terriccio, disciolti in circa 20 litri di acqua.
TRATTAMENTI AI SEMENZAI: impiegare 8 - 12 ml per metro quadro di superficie disciolti in 4 - 5 litri di acqua con l'avvertenza di ripetere il trattamento cinque giorni prima del trapianto con l'utilizzo di 6 - 8 litri di acqua per metro quadrato.
TRATTAMENTI AL TERRENO: pre-trapianto: impiegare 8 - 12 ml per metro quadro in 3 - 5 litri di acqua; post- trapianto: impiegare 100 - 200 ml per pianta di una soluzione ottenuta diluendo 200 ml di prodotto per q.le acqua (pari a 20 ml per 10 litri d'acqua): trattare ogni 10 - 15 giorni con un massimo di 3 - 4 interventi.
COLTURE FLOREALI IN GENERALE: informazioni particolareggiate per le seguenti colture: Garofano - Gerbera, si impiega il prodotto specificatamente contro Pythium e Phytophthora alla dose di 12 - 15 ml per metro quadro, disciolto in circa 2 - 4 litri di acqua, trattando due giorni prima dell'impianto e quindi procedendo all'incorporamento. Successivamente impiegare 200 ml per q.le acqua (pari a 20 ml per 10 litri d'acqua), con trattamento fogliare, bagnando abbondantemente con 400 - 500 litri ogni 1000 metri quadri (pari a 4-5 litri ogni 10 mq), ad intervalli inizialmente di circa 8 - 10 giorni e successivamente ogni 15 - 25 giorni.
BULBOSE: per controllare Pythium ultimum e Phytophthora si immergono i bulbi per 20 - 30 minuti in una soluzione contenente 300 ml di prodotto per q.le acqua (pari a 30 ml per 10 litri d'acqua), poi, prima della messa a dimora, si tratta il terreno con 10 - 12 ml di prodotto per metro quadrato in 2 - 4 litri di acqua e successivo incorporamento a circa 10 - 12 cm di profondità.
PIANTE FORESTALI (VIVAI): contro Phytophthora cactorum, Phytophthora cinnamomi e Pythium, intervenendo trattando il substrato colturale con 300 ml di prodotto per metro cubo, disciolto in 8 - 10 litri di acqua; si deve intervenire in caso di necessità ogni 15 - 18 giorni con 4 - 5 litri per metro quadro di una soluzione ottenuta diluendo 200 ml di prodotto per q.le d'acqua.
CAMPI DA GOLF – PRATI ORNAMENTALI: per il controllo di Pythium ap. ed altre specie, trattare con interventi fogliari a 1 - 1,5 ml per metro quadro, impiegando non meno di 100 - 200 litri di soluzione per 1000 mq (pari a 1-2 litri di soluzione per 10 mq). Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia ripetendo i trattamenti ogni 14 - 15 giorni.
Avvertenza: I semi trattati o residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e/o del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.
Compatibilita': Non compatibile con i prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese) e gli oli minerali.
Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
Impedire l'accesso di animali nelle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

CIFO S.p.A. San Giorgio di Piano (BO)

Stabilimenti di produzione:
IND. CHIMICHE CAFFARO S.p.A. – Aprilia (LT)
LIFA S.r.l. - Vigonovo (VE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 10444 del 12/04/00
Contenuto netto: 100 - 200 - 300 - 500 ml; 1 - 5 - 10 - 20 l Partita N.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

FOGLIO ILLUSTRATIVO

CAULISAN 99

Fungicida ad azione sistemica

Composizione:
- PROPAMOCARB Cloridrato g 66,5 (= 722 g/l)
- Coadiuvanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Fungicida sistemico indicato nella difesa di numerose colture nel combattere i seguenti ficomiceti: Pythium spp., Phytophthora sp.; Peronospora, Pseudoperonospora, Aphanomices sp., Bremia.
Viene assorbito prevalentemente dalle radici e poi traslocato nell'apparato fogliare, caratterizzato da una lunga e completa protezione ed elevata selettività sulle colture.
Il prodotto ha la caratteristica di poter essere impiegato con numerose tecniche quali: trattamenti fogliari, concia delle sementi, bagno dei bulbi e delle talee, disinfezione dei terricciati e dei letti di semina, trattamenti al terreno in pre e post-trapianto delle colture.
Viene impiegato sulle seguenti colture: Agrumi, Melo, Pero, Fragola, Cavoli, Lattuga, Cicoria, Indivia, Radicchio, Spinacio, Bietola da foglia e da costa, Sedano, Prezzemolo, Basilico, Cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo), Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana), Carota, Bietola rossa, Rapa, Cipolla, Aglio, Porro, Tabacco, floreali, forestali, ornamentali, nei vivai, nei semenzai, nella concia delle sementi e bulbi, campi da golf e prati ornamentali.
Interventi:
TRATTAMENTI FOGLIARI: viene impiegato nella dose di 1,5 - 3 litri per ettaro di coltura in circa 15 - 20 ettolitri di acqua (pari a 7-15 ml per 50 mq in 7/10 litri d'acqua), sulle colture sopra menzionate.
CONCIA DELLE SEMENTI: la dose di impiego è di 1 - 4 ml per kg di seme di piccole dimensioni e 10 - 40 ml per kg di seme di dimensioni maggiori.
PREPARAZIONE DEI TERRICCIATI: impiegare 300 ml di prodotto per metro cubo di terriccio, disciolti in circa 20 litri di acqua.
TRATTAMENTI AI SEMENZAI: impiegare 8 - 12 ml per metro quadro di superficie disciolti in 4 - 5 litri di acqua con l'avvertenza di ripetere il trattamento cinque giorni prima del trapianto con l'utilizzo di 6 - 8 litri di acqua per metro quadrato.
TRATTAMENTI AL TERRENO: pre-trapianto: impiegare 8 - 12 ml per metro quadro in 3 - 5 litri di acqua; post- trapianto: impiegare 100 - 200 ml per pianta di una soluzione ottenuta diluendo 200 ml di prodotto per q.le acqua (pari a 20 ml per 10 litri d'acqua): trattare ogni 10 - 15 giorni con un massimo di 3 - 4 interventi.
COLTURE FLOREALI IN GENERALE: informazioni particolareggiate per le seguenti colture: Garofano - Gerbera, si impiega il prodotto specificatamente contro Pythium e Phytophthora alla dose di 12 - 15 ml per metro quadro, disciolto in circa 2 - 4 litri di acqua, trattando due giorni prima dell'impianto e quindi procedendo all'incorporamento. Successivamente impiegare 200 ml per q.le acqua (pari a 20 ml per 10 litri d'acqua), con trattamento fogliare, bagnando abbondantemente con 400 - 500 litri ogni 1000 metri quadri (pari a 4-5 litri ogni 10 mq), ad intervalli inizialmente di circa 8 - 10 giorni e successivamente ogni 15 - 25 giorni.
BULBOSE: per controllare Pythium ultimum e Phytophthora si immergono i bulbi per 20 - 30 minuti in una soluzione contenente 300 ml di prodotto per q.le acqua (pari a 30 ml per 10 litri d'acqua), poi, prima della messa a dimora, si tratta il terreno con 10 - 12 ml di prodotto per metro quadrato in 2 - 4 litri di acqua e successivo incorporamento a circa 10 - 12 cm di profondità.
PIANTE FORESTALI (VIVAI): contro Phytophthora cactorum, Phytophthora cinnamomi e Pythium, intervenendo trattando il substrato colturale con 300 ml di prodotto per metro cubo, disciolto in 8 - 10 litri di acqua; si deve intervenire in caso di necessità ogni 15 - 18 giorni con 4 - 5 litri per metro quadro di una soluzione ottenuta diluendo 200 ml di prodotto per q.le d'acqua.
CAMPI DA GOLF – PRATI ORNAMENTALI: per il controllo di Pythium ap. ed altre specie, trattare con interventi fogliari a 1 - 1,5 ml per metro quadro, impiegando non meno di 100 - 200 litri di soluzione per 1000 mq (pari a 1-2 litri di soluzione per 10 mq). Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia ripetendo i trattamenti ogni 14 - 15 giorni.
Avvertenza: I semi trattati o residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e/o del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.
Compatibilita': Non compatibile con i prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese) e gli oli minerali.
Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
Impedire l'accesso di animali nelle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

CIFO S.p.A. San Giorgio di Piano (BO)

Stabilimenti di produzione:
IND. CHIMICHE CAFFARO S.p.A. Aprilia (LT)
LIFA S.r.l. - Vigonovo (VE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 10444 del 12/04/00
Contenuto netto: 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 - 90 ml Partita N.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA RIDOTTA

CAULISAN 99

Fungicida ad azione sistemica

Composizione:
- PROPAMOCARB Cloridrato g 66,5 (= 722 g/l)
- Coadiuvanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Compatibilita': Non compatibile con i prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese) e gli oli minerali.
Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

CIFO S.p.A. San Giorgio di Piano (BO)

Stabilimenti di produzione:
IND. CHIMICHE CAFFARO S.p.A. – Aprilia (LT)
LIFA S.r.l. - Vigonovo (VE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 10444 del 12/04/00
Contenuto netto: 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 - 90 ml Partita N.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA

MIRAX A

INSETTICIDA AEROSOL

Composizione
Olio minerale 10 g
Solventi e propellenti q.b. a 100 g

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

FRASI DI RISCHIO: Estremamente infiammabile.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare , né bere, né fumare durante l'impiego.

Contenuto netto 200 ml	**270**	**e**	**3**
Contenuto netto 250 ml	**335**	**e**	**3**
Contenuto netto 300 ml	**405**	**e**	**3**
Contenuto netto 400 ml	**520**	**e**	**3**
Contenuto netto 500 ml	**650**	**e**	**3**
Contenuto netto 600 ml	**800**	**e**	**3**
Contenuto netto 750 ml	**1000**	**e**	**3**

Prodotto per piante ornamentali
Registrazione del Ministero della Sanità N. 10776/PPO del 11/04/01

CIFO SPA – Via Oradour 6/8 - S. GIORGIO DI PIANO (BO) - tel 051-6655511
Officine di produzione e riempimento: INCO S.n.c. Pianoro (BOLOGNA) - RODWER S.n.c. Castel S. Pietro, Gallo Bolognese (BO)
Partita N.

PRECAUZIONI D'USO: Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Non respirare gli aerosoli. Non disperdere il preparato nell'aria per evitare che vi si formino eventuali accumuli di gas infiammabile. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni.

AVVERTENZE:
Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione
MIRAX A, aerosol ad azione insetticida è particolarmente efficace per combattere le diverse specie di cocciniglie e le uova degli acari che infestano comunemente le piante ornamentali e da fiore.
MODALITA' D'IMPIEGO: Non usare il prodotto in quantità eccessiva od impropria. Applicare il prodotto sulle fronde azionando la valvola a piccoli spruzzi successivi e dirigendo il getto sopra e sotto le foglie da una distanza di circa 40-50 centimetri, senza giungere a farle gocciolare. Dovendo trattare numerose piante presenti nello stesso locale, effettuare distinti trattamenti parziali.
Non utilizzare in associazione con altri prodotti per piante ornamentali
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per uso floreale e di giardinaggio, per uso domestico da appartamento o giardino.
Da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone ed animali.
AGITARE PRIMA DELL'USO
NON CONTIENE GAS PROPELLENTI RITENUTI DANNOSI PER L'OZONO

ACC

Da non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA

Feni L

INSETTICIDA – ACARICIDA PRONTO ALL'USO PER PIANTE ORNAMENTALI

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione

Malathion	0,15 g
Dicofol	0,045 g
Acqua, emulsionanti	q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

CIFO S.p.A. - Via Oradour 6/8 – San Giorgio di Piano (BOLOGNA) – tel 051-6655511

Prodotto per piante ornamentali
Registrazione del Ministero della Sanità N. 10777/PPO del 11/04/2001
Stabilimenti di produzione: INCO S.n.c. Pianoro (BO) - Cifo S.p.A. San Giorgio di Piano (BO) - L.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE) - Althaller Italia s.r.l. San Colombano al Lambro (MI) - REA S.r.l. Marcianise (CE)
Contenuto netto 150 – 250 – 300 – 375 – 500 – 600 – 750 - 1000 ml Partita N.

PRECAUZIONI D'USO: Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : MALATHION Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. DICOFOL Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni. Terapia: sintomatica. Avvertenza: consultare un centro antiveleni

Caratteristiche
FENI L è efficace contro afidi, tingidi, tentredini, tripidi, aleurodidi, cicaline, bega del garofano, ragnetto rosso e tutti più comuni insetti delle piante da fiore e ornamentali.
MODALITA' D'IMPIEGO
FENI L è un prodotto pronto per l'uso da somministrare su tutte le piante da fiore e ornamentali infestate da parassiti (insetti ed acari). Spruzzare il prodotto su entrambi i lembi delle foglie ad una distanza di 40 – 50 cm circa preferibilmente nelle ore meno calde della giornata, evitando il pieno sole. Evitare di far gocciolare le foglie. Limitare strettamente l'applicazione alla zona occupata dalla pianta.
Non utilizzare in associazione con altri prodotti per piante ornamentali.
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per uso floreale e di giardinaggio, per uso domestico da appartamento o giardino. Da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate alla alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone ed animali.
AGITARE PRIMA DELL'USO - PRONTO PER L'USO

Da non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

ETICHETTA

Feni

INSETTICIDA – ACARICIDA AEROSOL PER PIANTE ORNAMENTALI

Composizione

Fenitrotion puro	0,05 g
Dicofol puro	0,06 g
Piretrine pure	0,1 g
Piperonilbutossido puro	0,3 g
Solventi e propellenti q.b. a	100 g

Contiene Dicofol: può provocare una reazione allergica.

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

FRASI DI RISCHIO: Estremamente infiammabile. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Contenuto netto 200 ml	270	e	3
Contenuto netto 250 ml	335	e	3
Contenuto netto 300 ml	405	e	3
Contenuto netto 400 ml	520	e	3
Contenuto netto 500 ml	650	e	3
Contenuto netto 600 ml	800	e	3
Contenuto netto 750 ml	1000	e	3

Prodotto per piante ornamentali

CIFO S.p.A., Via Oradour 6/8, S. Giorgio di Piano (BOLOGNA) tel 051-6655511

Stabilimenti di produzione e riempimento: INCO S.n.c. Pianoro (BOLOGNA) - RODWER S.n.c. Castel S. Pietro, Gallo Bolognese (BO)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 10778/PPO del 11/04/01 - Partita N.

PRECAUZIONI D'USO: Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione; Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. In caso di incendio usare estintori a polvere chimica, anidride carbonica o composti alogenati. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Fenitrothion Sintomi: colpisce il Sistema nervoso centrale e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Dicofol Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni. Terapia: sintomatica; barbiturici contro tremori e le convulsioni.

Piretrine Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Terapia: sintomatica e di rianimazione N.B.: Diluenti e propellenti possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

AVVERTENZE:

Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione - Non fumare.

Caratteristiche FENI combatte afidi, cocciniglie, acari ed i più comuni parassiti delle piante ornamentali da appartamento e giardino domestico.

Modalita' d'impiego: non usare il prodotto in quantità eccessiva od impropria. Non spruzzare nell'aria, ma solo lontano dalle persone dirigendo il getto sopra e sotto le foglie e tenendo la bombola ad una distanza di circa 40-50 cm dalla pianta. Nebulizzare il prodotto nella massa del fogliame in relazione alle dimensioni della pianta con moto uniforme senza giungere a far gocciolare le foglie (circa 5 secondi per una pianta di medie dimensioni). Limitare strettamente l'applicazione alla zona occupata dalla pianta. Dovendo trattare numerose piante presenti nello stesso locale, effettuare distinti trattamenti parziali.

Attenzione: non utilizzare in associazione con altri prodotti per piante ornamentali. Da impiegarsi esclusivamente per uso floreale e di giardinaggio, per uso domestico da appartamento o giardino. Da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone ed animali.

AGITARE PRIMA DELL'USO

NON CONTIENE GAS PROPELLENTI RITENUTI DANNOSI PER L'OZONO

Da non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

ACC

ETICHETTA - FOGLIO ILLUSTRATIVO

Fenix

INSETTICIDA-ACARICIDA LIQUIDO PER PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO – BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

Composizione

Malathion puro	15,7 g (= 157 g/l)
Dicofol puro	4,7 g (= 47 g/l)
Emulsionanti, solventi q.b. a	100 g

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Cifo S.p.A. via Oradour, 6/8 - San Giorgio di Piano (BO) tel.051 6655511

Stabilimenti di produzione: CIFO S.p.A. S.Giorgio di Piano (Bologna) – TERRANALISI S.r.l. Renazzo di Cento (FE) - L.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE)

Prodotto per piante ornamentali

Registrazione del Ministero della Sanità N. 10779/PPO del 11/04/01

Contenuto netto 100 ml e Partita N.

PRECAUZIONI D'USO: Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti, sciacquandoli dopo l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: MALATHION Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici: nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia. Sintomi nicotinici: astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
DICOFOL Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, fino alla eliminazione completa.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

Caratteristiche
Fenix è efficace contro afidi, tingidi, tentredini, aleurodidi, cicaline, bega del garofano, cocciniglie, ragnetto rosso e tutti i più comuni insetti delle piante ornamentali e da fiore.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Impiegare il prodotto alla dose di 6.5 - 10 ml per 1 litro d'acqua (pari a 1 tappo misurino in circa 1 l. di acqua) mescolando accuratamente. La soluzione deve essere irrorata uniformemente sulla pianta, anche dove non si nota la presenza di parassiti. Il trattamento può essere ripetuto dopo 5/6 giorni.

Compatibilità Il Fenix può essere utilizzato con qualsiasi altro insetticida od anticrittogamico a reazione neutra.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per uso floreale e di giardinaggio, per uso domestico da appartamento o giardino. Da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone ed animali.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

"DA APPORSI SUL CONTENITORE PER L'IRRORAZIONE DEL PRODOTTO DILUITO"

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

Fenix

INSETTICIDA-ACARICIDA LIQUIDO PER PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO – BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

Composizione

Malathion puro	15,7 g (= 157 g/l)
Dicofol puro	4,7 g (= 47 g/l)
Emulsionanti, solventi q.b. a	100 g

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Cifo S.p.A. via Oradour, 6/8 - San Giorgio di Piano (BO) tel.051 6655511

Stabilimenti di produzione: CIFO S.p.A. S.Giorgio di Piano (Bologna) – TERRANALISI S.r.l. Renazzo di Cento (FE) - L.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE)

Prodotto per piante ornamentali

Registrazione del Ministero della Sanità N. 10779/PPO del 11/04/01

Contenuto netto 100 ml e Riferimento partita:…..

PRECAUZIONI D'USO: Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti, sciacquandoli dopo l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: MALATHION Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici: nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia. Sintomi nicotinici: astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
DICOFOL Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, fino alla eliminazione completa.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

ETICHETTA

Lumabloc

LUMACHICIDA PER PIANTE ORNAMENTALI IN PELLETS/GRANULI

Composizione

Metaldeide acetica	5 g
Denatonio Benzoato (*)	0,003 g
Attrattivi e coformulanti q.b. a	100 g

(*) FORMULA SICURA: con repellente per l'uomo e gli animali domestici

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua; dose tossica uomo, circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un centro antiveleni

PRECAUZIONI D'USO: In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Dopo la manipolazione ed in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare guanti in gomma o PVC. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

Caratteristiche: Lumabloc è un preparato in granuli per combattere tutte le specie di molluschi gasteropodi (lumache, limacce, chiocciole) che attaccano le colture floreali e ornamentali.

Non danneggia per nulla le piante ed esplica un'azione prolungata nel tempo.

Agisce per ingestione e per contatto. Il prodotto non viene asportato dal vento, né dilavato o reso inefficace dalla pioggia. La sua natura granulare lo rende pronto all'uso e di facile impiego.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Distribuire 10-15 granuli (pari a circa 1 g) per mq. Per piante in vaso da 30 cm di diametro distribuire 3-5 granuli (pari a circa 0.3 g). Il prodotto va somministrato preferibilmente dopo una pioggia o una irrigazione.

Compatibilità: il prodotto va usato da solo.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per uso floreale e di giardinaggio, per uso domestico da appartamento o giardino. Da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone ed animali.

CIFO S.p.A. – San Giorgio di Piano (BOLOGNA)

Prodotto per piante ornamentali
Registrazione del Ministero della Sanità N. 10780/PPO del 11/04/2001
Stabilimenti di produzione: CIFO SPA Stab. di San Giorgio di Piano (BOLOGNA); TERRANALISI S.r.l. Cento (FE); L.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE)
Contenuto netto 200 – 500g ; 1 kg e Partita N.

Da non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA

Polvin E

POLVERE INSETTICIDA PER PIANTE ORNAMENTALI

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione
Endosulfan puro 2,8 g
Eccipienti polverulenti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Cifo S.p.A. via Oradour, 6/8 – San Giorgio di Piano (BO) tel. 051 6655511

Stabilimenti di produzione: CIFO S.p.A. –San Giorgio di Piano (BO) – TERRANALISI srl. – Cento (FE) - L.I.F.A. Srl – Vigonovo (VE)
Prodotto per piante ornamentali
Registrazione del Ministero della Sanità N. 10782/PPO del 11/04/01
Contenuto netto 100 – 150 – 200 – 500 g 1 kg c Partita N.

PRECAUZIONI D'USO: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare guanti in gomma o PVC. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non ingerire. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Conservare soltanto nel recipiente originale. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni. **Terapia sintomatica.** Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche
Combatte prontamente tutti i più comuni insetti che infestano il terreno delle piante ornamentali e da fiore (elateridi, larve di ditteri, larve di lepidotteri, cavallette, maggiolini, formiche ecc.).
Il POLVIN E si può impiegare su tutte le piante ornamentali in qualsiasi periodo.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Dopo aver inumidito il terreno, spargere il prodotto in modo uniforme avendo cura di non calpestare la superficie trattata. Applicare tenendo la confezione lontano dal viso e dal corpo e a non più di 20 centimetri di altezza. Annaffiare dopo il trattamento. Non utilizzare all'aperto in caso di vento. Per l'uso su piante da vaso avere cura di non spargere il prodotto fuori dal vaso. Non utilizzare in associazione con altri prodotti per piante ornamentali.
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per uso floreale e di giardinaggio, per uso domestico da appartamento o giardino domestico. Da non impiegare in agricoltura e su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone ed animali.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

ETICHETTA

Minerol

INSETTICIDA ANTICOCCIDICO PER PIANTE ORNAMENTALI

Composizione
Olio minerale ad alto grado di raffinazione g 80 (= 680 g/l)
Solventi, emulsionanti e bagnanti g 20

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRECAUZIONI D'USO : Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione e in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta). In caos d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Conservare soltanto nel recipiente originale. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti, sciacquandoli dopo l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni.

Caratteristiche: combatte cocciniglie e uova di acari. Lucida e protegge le foglie.
DOSI E MODALITÀ' D'IMPIEGO
10 cc di MINEROL (un tappo e mezzo) per 1 litro di acqua da preparare nel modo seguente:
versare 10 cc in 100 cc di acqua, agitare energicamente e successivamente versare acqua sino ad
ottenere 1 litro di soluzione pronta per l'uso. Distribuire con spruzzatore. Preparare sempre e solo per l'immediato impiego.
Non utilizzare in associazione con altri prodotti per piante ornamentali.
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per uso floreale e di giardinaggio, in appartamento o giardino domestico. Da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone ed animali.

CIFO S.p.A. – S. Giorgio di Piano (BO)

Stabilimenti di produzione: CIFO S.p.A. S. Giorgio di Piano (BO) - L.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE) - TERRANALISI S.r.l. Renazzo di Cento (FE)
Prodotto per piante ornamentali
Registrazione del Ministero della Sanità N. 10783/PPO del 11/04/2001
Contenuto netto: 100 ml e Partita N.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA

Fenicrit

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER PIANTE ORNAMENTALI

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione

Zolfo puro	28 g
Rame metallico puro da Ossicloruro di Rame (al 56% di rame)	4,8 g
Bagnanti ed inerti	q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Cifo S.p.A. via Oradour, 6/8 - San Giorgio di Piano (BO) tel.051 6655511
Stabilimenti di produzione: CIFO S.p.A. S.Giorgio di Piano (BO) – TERRANALISI S.r.l. Cento (FE) - L.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE)
Prodotto per piante ornamentali
Registrazione del Ministero della Sanità n. 10784/PPO del 11/04/01
Contenuto netto: 100 g e Partita N.

PRECAUZIONI D'USO: Non respirare le polveri. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: RAME - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamia se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche
FENICRIT previene e combatte le malattie crittogamiche delle piante ornamentali e da fiore (Oidio o Mal bianco, Peronospora, Ruggine, Ticchiolatura ed altri agenti dei marciume). Per la sua particolare composizione può essere usato senza pericolo anche sulle piante più delicate.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Per le piante in piena terra e in vaso: diluire il contenuto di 1 misurino (5 g) di FENICRIT polvere in 1 lt di acqua e con tale soluzione irrorare le foglie. Per prevenire la comparsa di malattie crittogamiche è consigliabile somministrare il FENICRIT ogni 10 giorni circa.
Nel caso si debbano combattere infezioni in atto, le applicazioni vanno ripetute ogni 7-8 giorni.
Non utilizzare in associazione con altri prodotti per piante ornamentali.
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per uso floreale e di giardinaggio, per uso domestico da appartamento o giardino.
Da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone ed animali.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

"DA APPORSI SUL CONTENITORE PER L'IRRORAZIONE DEL PRODOTTO DILUITO"

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

Fenicrit

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER PIANTE ORNAMENTALI

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

Composizione

Zolfo puro	28 g
Rame metallico puro da Ossicloruro di Rame (al 56% di rame)	4,8 g
Bagnanti ed inerti	q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Cifo S.p.A. via Oradour, 6/8 - San Giorgio di Piano (BO) tel.051 6655511
Stabilimenti di produzione: CIFO S.p.A. S.Giorgio di Piano (BO) – TERRANALISI S.r.l. Cento (FE) - L.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE)
Prodotto per piante ornamentali
Registrazione del Ministero della Sanità n. 10784/PPO del 11/04/01
Contenuto netto: 100 g e Riferimento partita:.....

PRECAUZIONI D'USO: Non respirare le polveri. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: RAME - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamia se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA

Polvin I

POLVERE INSETTICIDA PER PIANTE ORNAMENTALI

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione

Malation puro	5 g
Eccipienti polverulenti	q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Cifo S.p.A. via Oradour, 6/8 – San Giorgio di Piano (BO) tel. 051 6655511

Stabilimenti di produzione: CIFO S.p.A. –San Giorgio di Piano (BO) – TERRANALISI srl. – Cento (FE) - L.I.F.A. Srl – Vigonovo (VE)

Prodotto per piante ornamentali

Registrazione del Ministero della Sanità N. 10785/PPO del 11/04/01

Contenuto netto 100 – 200 g e Partita N.

PRECAUZIONI D'USO: Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare guanti in gomma o PVC. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non ingerire. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Conservare soltanto nel recipiente originale. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

MALATHION Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Elimina afidi, acari, tripidi, tingidi, larve di lepidotteri e tutti i più comuni insetti delle piante ornamentali e da fiore.

MODALITA' D'IMPIEGO

Contro gli insetti della parte aerea: Spargere il prodotto in modo uniforme sulle piante avendo cura di non toccare la superficie trattata. Applicare tenendo la confezione lontano dal viso e dal corpo e a non più di 20 centimetri di altezza sopra la pianta.

Contro gli insetti terricoli: Dopo aver inumidito il terreno, spargere il prodotto in modo uniforme avendo cura di non calpestare la superficie trattata. Applicare tenendo la confezione lontano dal viso e dal corpo e a non più di 20 centimetri di altezza. Annaffiare dopo il trattamento. Non utilizzare all'aperto in caso di vento. Per l'uso su piante da vaso avere cura di non spargere il prodotto fuori dal vaso.

Non utilizzare in associazione con altri prodotti per piante ornamentali.

Da impiegarsi esclusivamente per uso floreale e di giardinaggio, per uso domestico da appartamento o giardino.

ATTENZIONE: da non impiegare in agricoltura e su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone ed animali.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

ETICHETTA

Fenitan

INSETTICIDA LIQUIDO PER PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO – BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione

Fenitrothion puro 9,3 g (= 87 g/l)
Emulsionanti, solventi q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

CIFO S.p.A. Via Oradour 6/8 – S. Giorgio di Piano (BO) tel. 051-6655511

Prodotto per piante ornamentali
Registrazione del Ministero della Sanità N. 10786/PPO del 11/4/01
Stabilimento di produzione: CIFO SPA S. Giorgio di Piano (BO), TERRANALISI S.r.l. – Renazzo di Cento (FE), L.I.F.A. S.r.l. – Vigonovo (VE)
Contenuto netto 100 ml e Partita N.

PRECAUZIONI D'USO: Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici: nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Brachicardia.
Sintomi nicotinici: astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche

Insetticida attivo contro le mosche, afidi, psille, tingidi, tripidi, mosca bianca delle serre (Trialeurodes Vaporariorum) cocciniglie, tentredini, altiche, cleoni, lissi.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Impiegare il prodotto alla dose di 5 – 10 ml (pari ad 1 tappo misurino) per litro d'acqua. In caso di massiccia infestazione usare 15 ml (pari a 2 tappi) di prodotto per litro d'acqua.
Non utilizzare in associazione con altri prodotti per piante ornamentali
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per uso floreale e di giardinaggio, per uso domestico da appartamento o giardino.
Da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone ed animali.

Da non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

etichetta

OLEOCID

INSETTICIDA PER PIANTE ORNAMENTALI

Composizione
Olio minerale paraffinico g 80 (= 680 g/l)
Acqua ed emulsionanti q.b. a 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRECAUZIONI D'USO
Conservare il recipiente ben chiuso – Non respirare i vapori – Non ingerire – Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle – Dopo la manipolazione e in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone – In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta) – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore e l'etichetta – Conservare soltanto nel recipiente originale – In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione – Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione – Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti, sciacquandoli dopo l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: insetticida specifico per la lotta contro le cocciniglie e le uova degli acari.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
OLEOCID si usa alla dose di 10 ml per litro d'acqua da preparare nel modo seguente: versare 10 ml (pari al contenuto di 1 tappo e mezzo) in 100 ml d'acqua, agitare energicamente e successivamente versare acqua sino ad ottenere 1 litro di soluzione pronta per l'uso. Distribuire con spruzzatore.
Non utilizzare in associazione con altri prodotti per piante ornamentali.
Da impiegarsi esclusivamente per uso floreale e di giardinaggio, per uso domestico da appartamento o giardino.
ATTENZIONE: da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone ed animali.
FITOTOSSICITÀ: distanziare i trattamenti con zolfo e prodotti derivati di almeno 15 giorni.

CIFO S.p.A. S. Giorgio di Piano (BO)

Stabilimento di produzione: CIFO S.p.A. S. Giorgio di Piano (BO)
Prodotto per piante ornamentali
Registrazione del Ministero della Sanità N. 10787 del 11/04/01
Contenuto netto: 100 ml e - PARTITA N.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA

Met-bloc

Lumachicida – limaccida in pellets/granuli
Contro Lumache, Limacce e Chiocciole

Composizione

Metaldeide pura	5 g
Denatonio Benzoato (*)	0,003 g
Attrattivi, coformulanti q.b. a	100 g

(*) FORMULA SICURA: con repellente per l'uomo e gli animali domestici

Preparato in granuli per combattere tutte le specie di molluschi gasteropodi (lumache, limacce, chiocciole) che attaccano le colture orticole, floreali e ornamentali.
Agisce per ingestione e per contatto. Il prodotto non viene asportato dal vento, né dilavato o reso inefficace dalla pioggia. La sua natura granulare lo rende pronto all'uso e di facile impiego.

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle. Sintomi d'intossicazione: violenti dolori addominali, diarrea, vomito biancastro (aspetto di latte cagliato), shock, midriasi, ipotermia, convulsioni, obnubilazione del sensorio.
Consigli terapeutici di massima e condizioni al caso: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio (g. 5 per litro d'acqua) – riscaldare il paziente – cardiotonici – fleboclisi clorurate o glucosate con noradrenalina – diuretici – barbiturici – neuroplegici – anfetamina e derivati in caso di torpore.
Avvertenze: consultare un centro antiveleni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Colture in pieno campo (bietole, carciofi, lattughe e simili, spinaci, cucurbitacee, rose, crisantemi): 6-10 kg per ettaro (6-10 grammi/10 mq) su tutta la superficie.
MET-BLOC va somministrato preferibilmente dopo una pioggia abbondante o una irrigazione, distribuendo una maggior quantità su una striscia larga circa 2 metri lungo il perimetro del campo. È opportuno effettuare una seconda somministrazione quando i granuli sono stati divorati.
Colture in serra (ortaggi e fiori): distribuire 10-15 granuli/mq.
Avvertenze: non mescolate il formulato con altri prodotti. Rischi di nocività: il prodotto è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Tempo di sicurezza: 20 giorni.
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

CIFO S.p.A. – S. Giorgio di Piano (BO)

Stabilimenti di produzione: L.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE) – L.I.F.A. S.r.l. Isola Vicentina (VI) – SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (LODI)
Registrazione del Ministero della Salute n. 11027 del 25/09/01
Contenuto netto: 200 – 500 g ; 1 – 5 kg Partita N.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA

CAULISAN PR

Fungicida ad azione sistemica

CAULISAN PR
Composizione:
- PROPAMOCARB Cloridrato g 66,5 (= 722 g/l)
- Coadiuvanti q.b. a g 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CIFO S.p.A. S. Giorgio di Piano (BO)

Stabilimenti di produzione: CAFFARO S.p.A. – Aprilia (LT)
LIFA S.r.l. – Vigonovo (VE)

Registrazione n. 11051 del 23/10/2001del Ministero della Sanità
Contenuto netto: 100 – 200 – 300 – 500 ml 1 – 5 – 10 – 20 l
Partita N.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI: conservare la confezione ben chiusa - evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO: Fungicida sistemico indicato nella difesa di numerose colture nel combattere i seguenti ficomiceti: Pythium spp., Phytophthora sp.; Peronospora, Pseudoperonospora, Aphanomices sp., Bremia.
Viene assorbito prevalentemente dalle radici e poi traslocato nell'apparato fogliare, caratterizzato da una lunga e completa protezione ed elevata selettività sulle colture.
Il prodotto ha la caratteristica di poter essere impiegato con numerose tecniche quali: trattamenti fogliari, concia delle sementi, bagno dei bulbi e delle talee, disinfezione dei terricciati e dei letti di semina, trattamenti al terreno in pre e post-trapianto delle colture.
Viene impiegato sulle seguenti colture: Agrumi, Melo, Pero, Fragola, Cavoli, Lattuga, Cicoria, Indivia, Radicchio, Spinacio, Bietola da foglia e da costa , Sedano, Prezzemolo, Basilico, Cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo), Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana), Carota, Bietola rossa, Rapa, Cipolla, Aglio Porro, Tabacco, floreali, forestali, ornamentali, nei vivai, nei semenzai, nella concia delle sementi e bulbi, campi da golf e prati ornamentali.
Interventi:

TRATTAMENTI FOGLIARI: viene impiegato nella dose di 1,5 - 3 litri per ettaro di coltura in circa 15 - 20 ettolitri di acqua (pari a 7-15 ml per 50 mq in 7-10 litri d'acqua), sulle colture sopra menzionate.
CONCIA DELLE SEMENTI: la dose di impiego è di 1 - 4 ml per kg di seme di piccole dimensioni e 10 - 40 ml per kg di seme di dimensioni maggiori.
PREPARAZIONE DEI TERRICCIATI: impiegare 300 ml di prodotto per metro cubo di terriccio, disciolti in circa 20 litri di acqua.
TRATTAMENTI AI SEMENZAI: impiegare 8 - 12 ml per metro quadro di superficie disciolti in 4 - 5 litri di acqua con l'avvertenza di ripetere il trattamento cinque giorni prima del trapianto con l'utilizzo di 6 - 8 litri di acqua per metro quadrato.
TRATTAMENTI AL TERRENO: pre-trapianto: impiegare 8 - 12 ml per metro quadro in 3 - 5 litri di acqua; post- trapianto: impiegare 100 - 200 ml per pianta di una soluzione ottenuta diluendo 200 ml di prodotto per q.le acqua (pari a 20 ml per 10 litri d'acqua): trattare ogni 10 - 15 giorni con un massimo di 3 - 4 interventi.
COLTURE FLOREALI IN GENERALE: informazioni particolareggiate per le seguenti colture: Garofano - Gerbera, si impiega il prodotto specificatamente contro Pythium e Phytophthora alla dose di 12 - 15 ml per metro quadro, disciolto in circa 2 - 4 litri di acqua, trattando due giorni prima dell'impianto e quindi procedendo all'incorporamento. Successivamente impiegare 200 ml per q.le acqua (pari a 20 ml per 10 litri d'acqua), con trattamento fogliare, bagnando abbondantemente con 400 - 500 litri ogni 1000 metri quadri (pari a 4-5 litri ogni 10 mq), ad intervalli inizialmente di circa 8 - 10 giorni e successivamente ogni 15 - 25 giorni.
BULBOSE: per controllare Pythium ultimum e Phytophthora si immergono i bulbi per 20 - 30 minuti in una soluzione contenente 300 ml di prodotto per q.le acqua (pari a 30 ml per 10 litri d'acqua), poi, prima della messa a dimora, si tratta il terreno con 10 - 12 ml di prodotto per metro quadrato in 2 - 4 litri di acqua e successivo incorporamento a circa 10 - 12 cm di profondità.
PIANTE FORESTALI (VIVAI): contro Phytophthora cactorum, Phytophthora cinnamomi e Pythium, intervenendo trattando il substrato colturale con 300 ml di prodotto per metro cubo, disciolto in 8 - 10 litri di acqua; si deve intervenire in caso di necessità ogni 15 - 18 giorni con 4 - 5 litri per metro quadro di una soluzione ottenuta diluendo 200 ml di prodotto per q.le d'acqua.
CAMPI DA GOLF – PRATI ORNAMENTALI: per il controllo di Pythium sp. ed altre specie, trattare con interventi fogliari a 1 - 1,5 ml per metro quadro, impiegando non meno di 100 - 200 litri di soluzione per 1000 mq (pari a 1-2 litri di soluzione per 10 mq). iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia ripetendo i trattamenti ogni 14 - 15 giorni.
Avvertenza: I semi trattati o residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e/o del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

COMPATIBILITA': Non compatibile con i prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese) e gli oli minerali.

AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Impedire l'accesso di animali nelle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

FOGLIO ILLUSTRATIVO
CAULISAN PR
Fungicida ad azione sistemica

CAULISAN PR
Composizione:
- PROPAMOCARB Cloridrato g 66,5 (= 722 g/l)
- Coadiuvanti q.b. a g 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CIFO S.p.A. S. Giorgio di Piano (BO)

Stabilimenti di produzione: CAFFARO S.p.A. – Aprilia (LT)
LIFA S.r.l. – Vigonovo (VE)

Registrazione n. 11051 del 23/10/2001 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 ml

Partita N.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: conservare la confezione ben chiusa - evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO: Fungicida sistemico indicato nella difesa di numerose colture nel combattere i seguenti ficomiceti: Pythium spp., Phytophthora sp.; Peronospora, Pseudoperonospora, Aphanomices sp., Bremia.
Viene assorbito prevalentemente dalle radici e poi traslocato nell'apparato fogliare, caratterizzato da una lunga e completa protezione ed elevata selettività sulle colture.
Il prodotto ha la caratteristica di poter essere impiegato con numerose tecniche quali: trattamenti fogliari, concia delle sementi, bagno dei bulbi e delle talee, disinfezione dei terricciati e dei letti di semina, trattamenti al terreno in pre e post-trapianto delle colture.
Viene impiegato sulle seguenti colture: Agrumi, Melo, Pero, Fragola, Cavoli, Lattuga, Cicoria, Indivia, Radicchio, Spinacio, Bietola da foglia e da costa , Sedano, Prezzemolo, Basilico, Cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo), Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana), Carota, Bietola rossa, Rapa, Cipolla, Aglio Porro, Tabacco, floreali, forestali, ornamentali, nei vivai, nei semenzai, nella concia delle sementi e bulbi, campi da golf e prati ornamentali.
Interventi:
TRATTAMENTI FOGLIARI: viene impiegato nella dose di 1,5 - 3 litri per ettaro di coltura in circa 15 - 20 ettolitri di acqua (pari a 7-15 ml per 50 mq in 7-10 litri d'acqua), sulle colture sopra menzionate.
CONCIA DELLE SEMENTI: la dose di impiego è di 1 - 4 ml per kg di seme di piccole dimensioni e 10 - 40 ml per kg di seme di dimensioni maggiori.
PREPARAZIONE DEI TERRICCIATI: impiegare 300 ml di prodotto per metro cubo di terriccio, disciolti in circa 20 litri di acqua.
TRATTAMENTI AI SEMENZAI: impiegare 8 - 12 ml per metro quadro di superficie disciolti in 4 - 5 litri di acqua con l'avvertenza di ripetere il trattamento cinque giorni prima del trapianto con l'utilizzo di 6 - 8 litri di acqua per metro quadrato.
TRATTAMENTI AL TERRENO: pre-trapianto: impiegare 8 - 12 ml per metro quadro in 3 - 5 litri di acqua; post- trapianto: impiegare 100 - 200 ml per pianta di una soluzione ottenuta diluendo 200 ml di prodotto per q.le acqua (pari a 20 ml per 10 litri d'acqua): trattare ogni 10 - 15 giorni con un massimo di 3 - 4 interventi.
COLTURE FLOREALI IN GENERALE: informazioni particolareggiate per le seguenti colture: Garofano - Gerbera, si impiega il prodotto specificatamente contro Pythium e Phytophthora alla dose di 12 - 15 ml per metro quadro, disciolto in circa 2 - 4 litri di acqua, trattando due giorni prima dell'impianto e quindi procedendo all'incorporamento. Successivamente impiegare 200 ml per q.le acqua (pari a 20 ml per 10 litri d'acqua), con trattamento fogliare, bagnando abbondantemente con 400 - 500 litri ogni 1000 metri quadri (pari a 4-5 litri ogni 10 mq), ad intervalli inizialmente di circa 8 - 10 giorni e successivamente ogni 15 - 25 giorni.
BULBOSE: per controllare Pythium ultimum e Phytophthora si immergono i bulbi per 20 - 30 minuti in una soluzione contenente 300 ml di prodotto per q.le acqua (pari a 30 ml per 10 litri d'acqua), poi, prima della messa a dimora, si tratta il terreno con 10 - 12 ml di prodotto per metro quadrato in 2 - 4 litri di acqua e successivo incorporamento a circa 10 - 12 cm di profondità.
PIANTE FORESTALI (VIVAI): contro Phytophthora cactorum, Phytophthora cinnamomi e Pythium, intervenendo trattando il substrato colturale con 300 ml di prodotto per metro cubo, disciolto in 8 - 10 litri di acqua; si deve intervenire in caso di necessità ogni 15 - 18 giorni con 4 - 5 litri per metro quadro di una soluzione ottenuta diluendo 200 ml di prodotto per q.le d'acqua.
CAMPI DA GOLF – PRATI ORNAMENTALI: per il controllo di Pythium ap. ed altre specie, trattare con interventi fogliari a 1 - 1,5 ml per metro quadro, impiegando non meno di 100 - 200 litri di soluzione per 1000 mq (pari a 1-2 litri di soluzione per 10 mq). iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia ripetendo i trattamenti ogni 14 - 15 giorni.
Avvertenza: I semi trattati o residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e/o del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

COMPATIBILITA': Non compatibile con i prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese) e gli oli minerali.
AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Impedire l'accesso di animali nelle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

ETICHETTA RIDOTTA

CAULISAN PR

Fungicida ad azione sistemica

CAULISAN PR

Composizione:

- PROPAMOCARB Cloridrato g 66,5 (= 722 g/l)
- Coadiuvanti q.b. a g 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CIFO S.p.A. S. Giorgio di Piano (BO)

Stabilimenti di produzione: CAFFARO S.p.A. – Aprilia (LT)
LIFA S.r.l. – Vigonovo (VE)

Registrazione n. 11051 del 23/10/2001 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 ml

PARTITA N°:

CONSIGLI DI PRUDENZA:

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: conservare la confezione ben chiusa - evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

COMPATIBILITA': Non compatibile con i prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese) e gli oli minerali.
AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA

Rigenal 50

Ormone radicante in polvere

Composizione:

NAA puro	g 0,5
Supporti ed attivanti q.b. a	g 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia, dispnea.
Terapia: sintomatica.

Caratteristiche: Il **Rigenal 50** è a base di auxinosimile sintetico, l'acido alfanaftalenacetico, che promuove il naturale trasporto discendente degli ormoni col risultante accumulo di auxine nella regione basale della talea e la produzione delle prime radici. Ciò rende il **Rigenal 50** particolarmente indicato per tutte le talee erbacee, legnose e arbustive e per talee di viti.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Immergere la base delle talee in acqua per la profondità di circa 3 cm, successivamente lasciarle sgocciolare affinché rimangano leggermente inumidite. La base della talea inumidita va quindi immersa nella polvere **Rigenal 50.** Prima di porre a dimora le talee nel modo usuale, scuoterle leggermente onde eliminare la polvere in eccesso.
Compatibilità: Non mescolare il formulato con altri prodotti.
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

CIFO S.p.A. – S. Giorgio di Piano (BO)

Stabilimento di produzione: CIFO S.p.A. – S. Giorgio di Piano (BO)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 11052 del 23/10/01

Contenuto netto: 50 – 100 – 200 – 250 – 300 – 500 – 800 g 1 Kg - PARTITA N.:

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Fenix Tech

INSETTICIDA-ACARICIDA LIQUIDO PER PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO – BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

Composizione

Malathion puro	15,7 g (= 157 g/l)
Dicofol puro	4,7 g (= 47 g/l)
Emulsionanti, solventi q.b. a	100 g

Avvertenze: contiene Dicofol.

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Cifo S.p.A. via Oradour, 6/8 - San Giorgio di Piano (BO) tel.051 6655511

Stabilimento di produzione: CIFO S.p.A. S.Giorgio di Piano (Bologna)
Prodotto per piante ornamentali
Registrazione del Ministero della Sanità N. 11688/PPO del 12/06/03
Contenuto netto 100 ml e Partita N.

PRECAUZIONI D'USO: Non respirare i vapori. Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali. Evitare il contatto con la pelle. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti, sciacquandoli dopo l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
MALATHION Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici: nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia. Sintomi nicotinici: astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
DICOFOL Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, fino alla eliminazione completa.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

Caratteristiche
Fenix è efficace contro afidi, tingidi, tentredini, aleurodidi, cicaline, bega del garofano, cocciniglie, ragnetto rosso e tutti i più comuni insetti delle piante ornamentali e da fiore.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Impiegare il prodotto alla dose di 6.5 - 10 ml per 1 litro d'acqua (pari a 1 tappo misurino in circa 1 l. di acqua) mescolando accuratamente. La soluzione deve essere irrorata uniformemente sulla pianta, anche dove non si nota la presenza di parassiti. Il trattamento può essere ripetuto dopo 5/6 giorni.

Compatibilità Il Fenix può essere utilizzato con qualsiasi altro insetticida od anticrittogamico a reazione neutra.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per uso floreale e di giardinaggio, per uso domestico da appartamento o giardino. Da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone ed animali.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

"DA APPORSI SUL CONTENITORE PER L'IRRORAZIONE DEL PRODOTTO DILUITO"

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

Fenix Tech

INSETTICIDA-ACARICIDA LIQUIDO PER PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO – BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

Composizione

Malathion puro	15,7 g (= 157 g/l)
Dicofol puro	4,7 g (= 47 g/l)
Emulsionanti, solventi q.b. a	100 g

Avvertenze: contiene Dicofol.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO : Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Cifo S.p.A. via Oradour, 6/8 - San Giorgio di Piano (BO) tel.051 6655511

Stabilimento di produzione: CIFO S.p.A. S.Giorgio di Piano (Bologna)

Prodotto per piante ornamentali

Registrazione del Ministero della Sanità N. 11688/PPO del 12/06/03

Contenuto netto 100 ml e Riferimento partita:…..

PRECAUZIONI D'USO: Non respirare i vapori. Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali. Evitare il contatto con la pelle. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti, sciacquandoli dopo l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : MALATHION Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici: nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia. Sintomi nicotinici: astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
DICOFOL Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, fino alla eliminazione completa.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA

Fenitan Tech

INSETTICIDA LIQUIDO PER PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO – BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

Composizione

Fenitrothion puro 9,3 g (= 87 g/l)
Emulsionanti, solventi q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

CIFO S.p.A. Via Oradour 6/8 – S. Giorgio di Piano (BO) tel. 051-6655511
Registrazione del Ministero della Sanità N. 11689/PPO del 12/06/2003
Prodotto per piante ornamentali
Stabilimento di produzione: CIFO SPA S. Giorgio di Piano (BO)
Contenuto netto 100 ml e Partita N.

PRECAUZIONI D'USO: Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti, sciacquandoli dopo l'uso. Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici: nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Brachicardia.
Sintomi nicotinici: astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche

Insetticida attivo contro le mosche, afidi, psille, tingidi, tripidi, mosca bianca delle serre (Trialeurodes Vaporariorum) cocciniglie, tentredini, altiche, cleoni, lissi.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Impiegare il prodotto alla dose di 5 – 10 ml (pari ad 1 tappo misurino) per litro d'acqua. In caso di massiccia infestazione usare 15 ml (pari a 2 tappi) di prodotto per litro d'acqua.
Non utilizzare in associazione con altri prodotti per piante ornamentali
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per uso floreale e di giardinaggio, per uso domestico da appartamento o giardino.
Da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone ed animali.

Da non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

“DA APPORSI SUL CONTENITORE PER L’IRRORAZIONE DEL PRODOTTO DILUITO”

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

Fenitan Tech
INSETTICIDA LIQUIDO PER PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO – BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

IRRITANTE PERICOLOSO PER L’AMBIENTE

Composizione

Fenitrothion puro	9,3 g (= 87 g/l)
Emulsionanti, solventi	q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

CIFO S.p.A. Via Oradour 6/8 – S. Giorgio di Piano (BO) tel. 051-6655511

Prodotto per piante ornamentali
Registrazione del Ministero della Sanità N. 11689/PPO del 12/06/2003
Stabilimento di produzione: CIFO SPA S. Giorgio di Piano (BO)
Contenuto netto 100 ml e Riferimento partita: .....

PRECAUZIONI D’USO: Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l’applicazione. Evitare l’irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall’applicazione. Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti, sciacquandoli dopo l’uso. Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici: nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Brachicardia.
Sintomi nicotinici: astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

Prima dell’uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente.

Etichetta/Foglio illustrativo

Aficid Tech

INSETTICIDA LIQUIDO PER PIANTE ORNAMENTALI
DA APPARTAMENTO – BALCONE E DA GIARDINO DOMESTICO

Composizione

Diazinone puro	2,3 g (= 20.8 g/l)
Emulsionanti, solventi q.b. a	100 g

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

CIFO S.p.A. – Via Oradour 6/8 - S. Giorgio di Piano (BO) - tel.051 6655511

Prodotto per piante ornamentali
Registrazione del Ministero della Salute N. 11695/PPO del 30/06/2003
Stabilimento di produzione : CIFO SPA San Giorgio di Piano (BOLOGNA)
Contenuto netto 50 – 100 ml e - Partita n.

PRECAUZIONI D'USO : Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti, sciacquandoli dopo l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici: nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia.
Sintomi nicotinici: astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Insetticida specifico per la lotta contro gli insetti dannosi, in modo particolare contro le mosche, afidi (pidocchi), tignole, minatrici, cocciniglie, cimici e tripidi.**Dosi e modalità d'impiego:** impiegare il prodotto alla dose di 16 - 24 ml (pari a 2 - 3 tappi misurino) per litro d'acqua.COMPATIBILITA': Il prodotto deve essere usato da solo.Da impiegarsi esclusivamente per uso floreale e di giardinaggio, per uso domestico da appartamento o giardino. ATTENZIONE: da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone ed animali.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

“DA APPORSI SUL CONTENITORE PER L’IRRORAZIONE DEL PRODOTTO DILUITO”

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

Aficid Tech

INSETTICIDA LIQUIDO PER PIANTE ORNAMENTALI
DA APPARTAMENTO – BALCONE E DA GIARDINO DOMESTICO

Composizione
Diazinone puro 2,3 g (= 20.8 g/l)
Emulsionanti, solventi q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego. Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

CIFO S.p.A. – Via Oradour 6/8 - S. Giorgio di Piano (BO) - tel.051 6655511

Prodotto per piante ornamentali
Registrazione del Ministero della Salute N. 11695/PPO del 30/06/2003
Stabilimento di produzione : CIFO SPA San Giorgio di Piano (BOLOGNA)
Contenuto netto 50 – 100 ml e - Riferimento partita:……

PRECAUZIONI D’USO : Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l’applicazione. Evitare l’irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall’applicazione. Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti, sciacquandoli dopo l’uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici: nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia.
Sintomi nicotinici: astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

Prima dell’uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

COSMOTRIN

Insetticida liquido emulsionabile ad ampio spettro d'azione con effetto repellente

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

Composizione:
100g di prodotto contengono:
Cipermetrina pura 5 g (= 4,8 g/l)
Emulsionanti, solventi q.b. a 100g

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Cifo S.p.A. via Oradour, 6/8 - San Giorgio di Piano (BO) tel.051 6655511

Stabilimenti di produzione: L.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE) Althaller Italia s.r.l. San Colombano al Lambro (MI) CIFO S.p.A. S.Giorgio di Piano (Bologna)
Registrazione del Ministero della Salute n. 11730 del 31/07/03
Contenuto netto: 10 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 –100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 500 ml ; 1 –5 – 10 – 20 l Partita N.

NORME PRECAUZIONALI: evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: *sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione.Consultare un centro antiveleni.*

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: COSMOTRIN è un insetticida piretroide a bassa tossicità ed ampio spettro d'azione, impiegabile su un gran numero di colture erbacee ed arboree. È vietato l'impiego in serra. COSMOTRIN agisce per contatto e per ingestione nei confronti di numerose specie di fitofagi (Afidi, Aleurodidi, Tortricidi, Nottuidi, Tignole, Dorifora, Piralide, Tripidi, Microlepidotteri fillominatori, Coccinglie, ecc...). COSMOTRIN svolge un'azione repellente per le colture trattate. La particolare formulazione in olio vegetale ne rende pratico e sicuro l'impiego. COSMOTRIN può essere usato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi.
Tutte le dosi si riferiscono a trattamenti a volumi d'acqua di 1000–1200 litri/ha (10-12 litri/100 mq) per piante da frutto, ortaggi, fiori e di 400-600 litri/ha (4-6 litri/100 mq) per colture industriali (es. Tabacco, frumento ecc…).
Vite: contro le Tignole e Sigaraio 100-150 ml/hl (10-15 ml/10 litri).
Pesco, Ciliegio: contro Afide verde, Afide farinoso, Afide bruno, Afide nero 75-100 ml/hl (7.5-10 ml/10 litri) intervenendo prima dell'accartocciamento delle foglie. Contro Anarsia, Cidia, Tripidi e Mosca della frutta 100-150 ml/hl (10-15 ml/10 litri).
Pero: contro la Psilla 100-150 ml/hl (10-15 ml/10 litri) nei trattamenti di fine inverno contro gli adulti svernanti e 150-200 ml/hl (15-20 ml/10 litri) negli interventi primaverili-estivi. Contro Afidi, Carpocapsa, Microlepidotteri minatori 100-150 ml/hl (10-15 ml/10 litri).
Arancio, Limone: contro Afide verde, Afide bruno, Dialeurodidi, 75-100 ml/hl (7.5-10 ml/10 litri). contro Tignola della Zagara e mosca della frutta 100-150 ml/hl (10-15 ml/10 litri).
Cavolfiore, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Cavolo broccolo, Fagiolino, Pisello, Pomodoro, Cipolla, Patata: contro Afidi, Nottue, Cavolaie, Tripidi, Dorifora, Mosca bianca, Cimice 100-150 ml/hl (10-15 ml/10 litri).
Barbabietola da zucchero: contro Altica 1000-1200 ml/ha (10-12 ml/100 mq). Contro Afidi, Nottue, Cleono, Lisso, Casside 500-1000 ml/ha (5-10 ml/100 mq).
Tabacco: contro Afidi, Nottue, Mosca bianca 75-150 ml/hl (7.5-15 ml/10 litri).
Mais: contro Afidi e Piralide 75-150 ml/hl (7.5-15 ml/10 litri).
Frumento: contro Afidi e Lema 75-100 ml/hl (7.5-10 ml/10 litri).
Soia: contro Cimice verde e Piralide 100-150 ml/hl (10-15 ml/10 litri).
Fiori, vivai, Colture ornamentali in campo: contro Afidi e Mosca bianca 75-100 ml/hl (7.5-10 ml/10 litri). Contro bega del garofano, Tripidi, Nottue 100-200 ml/hl (10-20 ml/10 litri).
Pioppo: contro Afidi, Saperda, Criptorrinco 75-100 ml/hl (7.5-10 ml/10 litri)..
Compatibilità': COSMOTRIN non è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: COSMOTRIN è altamente selettivo per le colture riportate in etichetta; sulle colture floricole, in particolare su specie delicate, è opportuno effettuare saggi preliminari.
Intervallo di sicurezza che deve trascorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: Soia 3 giorni; Piselli, Fagiolino, Cavolfiore, Cavolo broccolo 7 giorni; Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cipolla, Patata, Pesco, Ciliegio, Pero, Arancio, Limone 14 giorni; Pomodoro, Barbabietola da zucchero 21 giorni; Vite, Mais 28 giorni; Frumento 42 giorni; Tabacco 60 giorni.
Attenzione. da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

ETICHETTA RIDOTTA

COSMOTRIN

Insetticida liquido emulsionabile ad ampio spettro d'azione
con effetto repellente

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

Composizione:
100g di prodotto contengono:
Cipermetrina pura 5 g (= 45,8 g/l)
Emulsionanti, solventi q.b. a 100g

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Cifo S.p.A. via Oradour, 6/8 - San Giorgio di Piano (BO) tel.051 6655511

Stabilimenti di produzione: L.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE) – Althaller Italia s.r.l. San Colombano al Lambro (MI) – CIFO S.p.A. S.Giorgio di Piano (Bologna)
Registrazione del Ministero della Salute n. 11730 del 31/07/03
Contenuto netto: 10 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 –100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 500 ml Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un centro antiveleni.

Compatibilità': COSMOTRIN non è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione. da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

DA APPORSI SUL CONTENITORE PER L'IRRORAZIONE DEL PRODOTTO DILUITO"

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

COSMOTRIN

Insetticida liquido emulsionabile ad ampio spettro d'azione con effetto repellente

IRRITANTE PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione:
100g di prodotto contengono:
Cipermetrina pura 5 g (= 45,8 g/l)
Emulsionanti, solventi q.b. a 100g

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Cifo S.p.A. via Oradour, 6/8 - San Giorgio di Piano (BO) tel.051 6655511

Stabilimenti di produzione: L.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE) – Althaller Italia s.r.l. San Colombano al Lambro (MI) – CIFO S.p.A. S.Giorgio di Piano (Bologna)
Registrazione del Ministero della Salute n. 11730 del 31/07/03
Contenuto netto: 10 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 –100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 500 ml Partita N.

Attenzione. da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA

CIPERBLOC

Insetticida in emulsione acquosa pronto all'uso per piante ornamentali da appartamento e giardino domestico.

Composizione:
100g di prodotto contengono:
Cipermetrina pura 0,2 g (= 1,97 g/l)
Emulsionanti, acqua q.b. a 100g

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di prudenza: conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Precauzioni d'uso: Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Conservare il recipiente ben chiuso - conservare soltanto nel recipiente originale. - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) – in caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - in caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Evitare di inalare direttamente. Evitare di spruzzare negli occhi.

Informazioni per il medico: sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un centro antiveleni.

Caratteristiche
CIPERBLOC è un insetticida piretroide a bassa tossicità ed ampio spettro d'azione contro gli insetti dannosi. CIPERBLOC agisce per contatto e per ingestione nei confronti di numerose specie di fitofagi (Afidi, Dialeurodidi, Tortrici, Nottuidi, Tignole, Dorifora, Piralide, Tripidi, Microlepidotteri filllominatori, Cocciniglie, ecc...). CIPERBLOC svolge un'azione repellente per le piante trattate. La particolare presentazione in nebulizzatore manuale ne rende pratico e sicuro l'impiego.
Modalità d'impiego
CIPERBLOC è un prodotto pronto per l'uso da applicare su tutte le piante da fiore e ornamentali infestate da parassiti. Spruzzare il prodotto su entrambi i lembi delle foglie ad una distanza di 40 – 50 cm circa preferibilmente nelle ore meno calde della giornata, evitando il pieno sole. Evitare di far gocciolare le foglie. Limitare strettamente l'applicazione alla zona occupata dalla pianta.
Compatibilità: il prodotto deve essere usato da solo.
Da impiegarsi esclusivamente per uso floreale e di giardinaggio, per uso domestico da appartamento o giardino.
ATTENZIONE: da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone ed animali.

Cifo S.p.A. San Giorgio di Piano (BO)

Stabilimenti di produzione: Cifo S.p.A. San Giorgio di Piano (BO) - L.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE) - L.I.F.A. S.r.l. Isola Vicentina (VI) – Althaller Italia s.r.l. San Colombano al Lambro (MI)
Partita n.
Contenuto netto: 250 – 500 – 750 - 1000 ml
Prodotto per Piante Ornamentali - Registrazione del Ministero della Salute n. 11744/PPO del 31/07/03

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CIPERBLOC C500

Insetticida liquido per piante ornamentali da appartamento e giardino domestico.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione:
100g di prodotto contengono:
Cipermetrina pura 5 g (45,8 g/l)
Emulsionanti, solventi q.b. a 100g

FRASI DI RISCHIO: irritante per gli occhi. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Cifo S.p.A. via Oradour, 6/8 San Giorgio di Piano (BO) – tel. 051 6655511
Contenuto netto: 10 – 20 – 25 – 30 – 40 - 50 – 60 – 70 – 80 – 90 –100 ml Partita n.
Prodotto per Piante Ornamentali - Registrazione del Ministero della Salute n. 11745/PPO del. 31/7/03
Stabilimenti di produzione: Cifo S.p.A. San Giorgio di Piano (BO) - L.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE) – Althaller Italia s.r.l. San Colombano al Lambro (MI).

Precauzioni d'uso: Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti sciacquandoli dopo l'uso. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare soltanto nel recipiente originale. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Informazioni per il medico: sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un centro antiveleni.

Caratteristiche
CIPERBLOC C500 è un insetticida piretroide a bassa tossicità ed ampio spettro d'azione contro gli insetti dannosi. CIPERBLOC C500 agisce per contatto e per ingestione nei confronti di numerose specie di fitofagi (Afidi, Dialeurodidi, Tortrici, Nottuidi, Tignole, Dorifora, Piralide, Tripidi, Microlepidotteri filllominatori, Cocciniglie, ecc...). CIPERBLOC C500 svolge un'azione repellente per le piante trattate. La particolare formulazione in olio vegetale ne rende pratico e sicuro l'impiego.
Dosi e modalità d'impiego
Impiegare il prodotto alla dose di 4 – 6 ml per 1 litro d'acqua (pari a 1 – 1.5 tappi misurino in 1.5 litri di acqua) mescolando accuratamente. La soluzione deve essere irrorata uniformemente sulla pianta, anche dove non si nota la presenza di parassiti. Il trattamento può essere ripetuto dopo 5/6 giorni.
Compatibilità: il prodotto deve essere usato da solo.
Da impiegarsi esclusivamente per uso floreale e di giardinaggio, per uso domestico da appartamento o giardino.
ATTENZIONE: da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone ed animali.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

DA APPORSI SUL CONTENITORE PER L'IRRORAZIONE DEL PRODOTTO DILUITO"

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CIPERBLOC C500

Insetticida liquido per piante ornamentali da appartamento e giardino domestico.

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

Composizione:
100g di prodotto contengono:
Cipermetrina pura 5 g (45,8 g/l)
Emulsionanti, solventi q.b. a 100g

FRASI DI RISCHIO: irritante per gli occhi. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Cifo S.p.A. via Oradour, 6/8 San Giorgio di Piano (BO) – tel. 051 6655511
Contenuto netto: 10 – 20 – 25 – 30 – 40 - 50 – 60 – 70 – 80 – 90 –100 ml Riferimento partita:......
Prodotto per Piante Ornamentali - Registrazione del Ministero della Salute n. 11745/PPO del. 31/7/03
Stabilimenti di produzione: Cifo S.p.A. San Giorgio di Piano (BO) - L.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE) – Althaller Italia s.r.l. San Colombano al Lambro (MI).

Precauzioni d'uso: Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti sciacquandoli dopo l'uso. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare soltanto nel recipiente originale. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Informazioni per il medico: sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un centro antiveleni.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA

FEROVAX 50

ESCA TOPICIDA - RATTICIDA IN PELLETS PARAFFINATI
PRONTA ALL'USO A BASE DI BROMADIOLONE ATTIVA ANCHE CONTRO I RODITORI "RESISTENTI"

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Bromadiolone puro	0,005 g
Denatonio Benzoato (*)	0,001 g
Supporti e adescanti	q.b. a 100 g.

(*) FORMULA SICURA: con repellente per l'uomo e gli animali domestici

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: avvelenamento grave per ingestione, inibizione della vitamina K, emorragie cutanee e mucose. La sintomatologia a carico di altri sistemi od apparati è prevalentemente emorragica. Terapia: in caso d'ingestione di grosse quantità provocare il vomito, lavanda gastrica, monitorare attività protrombinica, se diminuzione somministrare vitamina K. Controindicazioni: anticoagulanti. **Consultare un centro antiveleni.**

CARATTERISTICHE
FEROVAX 50 è attivo contro tutte le varietà di ratti e topi, anche nei confronti di quelle che hanno dimostrato resistenza agli altri topicidi ad azione anticoagulante.
Agisce per ingestione a dosi letali, basta che il roditore se ne cibi anche una sola volta per morire. La morte interviene nel giro di qualche giorno per emorragia interna, i topi, presi da un senso di soffocamento ricercano l'aria e quindi tendono a morire all'aperto.
MODALITÀ D'IMPIEGO
Disporre l'esca in mucchietti di almeno 20-40 g, nei luoghi frequentati dai roditori (sponde dei fossati, punti di normale passaggio dei topi, punti nascosti normalmente frequentati dai roditori, tane e gallerie scavate dai roditori, ecc...).
Rimpiazzare via via le esche consumate ed aumentare la quantità delle stesse se si è in presenza di una forte infestazione.
Non toccare l'esca con le mani in quanto i roditori avvertono l'odore dell'uomo.
In caso di presenza di animali domestici o bestiame, porre il FEROVAX 50 in luoghi ad essi non accessibili come: all'interno di un tubo, sotto una cassetta di legno, sotto una tegola, ecc.
COMPATIBILITA': il prodotto va impiegato da solo.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è nocivo per gli animali domestici, il pesce ed il bestiame.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

CIFO S.p.A. S. Giorgio di Piano (BO)

Registrazione del Ministero della Sanità N.12014 del 16/04/2004
Stabilimento di produzione: L.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE).
CONTENUTO netto : 10 – 25 – 50 – 100 – 200 – 250 – 500 – 750 g; 1 – 2 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25 kg
Partita N.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA RIDOTTA

FEROVAX 50

ESCA TOPICIDA - RATTICIDA IN PELLETS PARAFFINATI
PRONTA ALL'USO A BASE DI BROMADIOLONE ATTIVA ANCHE CONTRO I RODITORI "RESISTENTI"

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Bromadiolone puro	0,005 g
Denatonio Benzoato (*)	0,001 g
Supporti e adescanti	q.b. a 100 g.

(*) FORMULA SICURA: con repellente per l'uomo e gli animali domestici

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: avvelenamento grave per ingestione, inibizione della vitamina K, emorragie cutanee e mucose. La sintomatologia a carico di altri sistemi od apparati è prevalentemente emorragica. Terapia: in caso d'ingestione di grosse quantità provocare il vomito, lavanda gastrica, monitorare attività protrombinica, se diminuzione somministrare vitamina K. Controindicazioni: anticoagulanti. **Consultare un centro antiveleni.**

COMPATIBILITA': il prodotto va impiegato da solo.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

CIFO S.p.A. S. Giorgio di Piano (BO)

Registrazione del Ministero della Sanità N.12014 del 16/04/2004
Stabilimento di produzione: L.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE).
CONTENUTO netto : 10 – 25 – 50 – 100 – 200 – 250 – 500 – 750 g
Partita N.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CAMAFOREN 50

ESCA TOPICIDA-RATTICIDA IN GRANAGLIA
PRONTA ALL'USO A BASE DI CLOROFACINONE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Clorofacinone puro	0,005 g
Denatonio benzoato (*)	0,001 g
Supporti e adescanti	qb. a 100 g

(*) FORMULA SICURA: con repellente per l'uomo e gli animali domestici

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: avvelenamento grave per ingestione, inibizione della vitamina K, emorragie cutanee e mucose. La sintomatologia a carico di altri sistemi od apparati è prevalentemente emorragica. Terapia: in caso d'ingestione di grosse quantità provocare il vomito, lavanda gastrica, monitorare attività protrombinica, se diminuzione somministrare vitamina K. Controindicazioni: anticoagulanti.
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
CAMAFOREN 50 è attivo contro tutte le varietà di ratti e topi (ratti di fogna o norvegicus, ratti neri o dei tetti, topolini domestici o mus musculus, topi campagnoli, ecc.) e le arvicole.
Agisce a dosi letali, cioè una sola ingestione è sufficiente per provocare la morte causata da emorragie interne. Le sostanze adescanti garantiscono una sicura appetibilità del prodotto stimolando i topi, i ratti e le arvicole a cibarsene con estrema facilità.
MODALITA' D'IMPIEGO
Disporre le esche in mucchietti di almeno 20-40 g nei luoghi frequentati dai roditori (sponde dei fossati, punti di normale passaggio dei topi, punti nascosti normalmente frequentati dai roditori, tane e gallerie scavate dai roditori, ecc...) avendo cura di rinnovarle prima che vengano completamente consumate. Non toccare l'esca con le mani in quanto i roditori avvertono l'odore dell'uomo.
In caso di presenza di animali domestici o bestiame porre il CAMAFOREN 50 in luoghi ad essi non accessibili come: all'interno di un tubo, sotto una cassetta di legno, sotto una tegola, ecc.
COMPATIBILITA': il prodotto va impiegato da solo.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è nocivo per gli animali domestici, il pesce ed il bestiame.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

CIFO S.p.A. S. Giorgio di Piano (BO)

Registrazione del Ministero della Salute N.12015 del 26/04/2004
Stabilimenti di produzione: L.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE); VE.BI. S.a.s. Borgoricco (PD).
Partita n°...........
CONTENUTO netto : 10 – 25 – 50 – 100 – 200 – 250 – 500 – 750 g; 1 - 2 – 5 – 10 – 15 - 20 - 25 kg

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

ETICHETTA RIDOTTA

CAMAFOREN 50

ESCA TOPICIDA-RATTICIDA IN GRANAGLIA
PRONTA ALL'USO A BASE DI CLOROFACINONE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Clorofacinone puro	0,005 g
Denatonio benzoato (*)	0,001 g
Supporti e adescanti	q.b. a 100 g

(*) FORMULA SICURA: con repellente per l'uomo e gli animali domestici

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: avvelenamento grave per ingestione, inibizione della vitamina K, emorragie cutanee e mucose. La sintomatologia a carico di altri sistemi od apparati è prevalentemente emorragica. Terapia: in caso d'ingestione di grosse quantità provocare il vomito, lavanda gastrica, monitorare attività protrombinica, se diminuzione somministrare vitamina K. Controindicazioni: anticoagulanti.
Consultare un centro antiveleni.

COMPATIBILITA': il prodotto va impiegato da solo.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è nocivo per gli animali domestici, il pesce ed il bestiame.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.
Registrazione del Ministero della Salute N.12015 del 26/04/2004

CIFO S.p.A. S. Giorgio di Piano (BO)

Stabilimenti di produzione: L.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE); VE.BI. S.a.s. Borgoricco (PD).
Partita n°...........
CONTENUTO netto : 10 – 25 – 50 – 100 – 200 – 250 – 500 – 750 g;

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

SCAM S.p.a.

MINACID E

INSETTICIDA A LARGO SPETTRO D'AZIONE LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Metidation puro g 19 (= 182 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100
(contiene Xilene)

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito sclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui art. 25 del DPR 23 Aprile 2001, n.290.
FRASI DI RISCHIO: infiammabile. Molto tossico per ingestione. Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi e la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di Produzione: SCAM S.p.a. - Modena

Registrazione n. 2990 del 8/01/1979 del Ministero della Sanità

L 1/5 /10
Partita n.:

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia : atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO:
il MINACID E è un insetticida fosforganico con largo spettro di azione che agisce sia per contatto che per ingestione, eliminando gli insetti grazie alla propria azione citotropica. Il MINACID E viene impiegato per combattere fitofagi dell'**Olivo:** contro le Cocciniglie (*S. oleae, P. pollini, F. follicularis*) la Tignola (*P.oleae*) e Tripidi (*D.reuteri*) 200-250 ml/hl. MINACID-E deve essere impiegato esclusivamente nei trattamenti invernali e di pre-fioritura; per rafforzare l'azione può risultare conveniente aggiungere olio bianco.

COMPATIBILITA': il MINACID E non è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore.
Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi non meno di 20 giorni dal trattamento.
NOCIVITA': il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per insetti utili, animali domestici e bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 100 giorni prima della raccolta per l'Olivo.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

ALBENE

INSETTICIDA A BASE DI OLIO MINERALE IN EMULSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Olio minerale (residuo minimo insulfonabile 95%) g 80 (= 696 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
ALBENE è un olio minerale emulsionato ad elevato grado di insulfonabilità che agisce per asfissia contro tutte le forme svernanti degli insetti.
ALBENE può essere aggiunto agli erbicidi ad attività fogliare al fine di aumentarne l'efficacia.
MODALITA' DI IMPIEGO: (dose per 100 litri di acqua)
Pomacee: contro le Cocciniglie (*Q. Perniciosus, E. leperii, ecc.*), Afidi (*A. pomi, D. plantaginea, D. pyri, ecc.*), Acari (*P. ulmi*), Psilla (*Psylla spp.*) 2,5 - 3,0 l/hl nei trattamenti di fine inverno (in corrispondenza della fase fenologica delle orecchiette di topo del melo e dei "mazzetti affioranti" per il pero).
Drupacee: contro le Cocciniglie (*P. pentagona, Q. perniciosus, E. corni, ecc.*), Afidi (*Myzus spp., H. amygdali, Brachycaudus spp.*, ecc.) Ragnetto rosso (*P.ulmi*), 2,0 - 3,0 l/hl nei trattamenti di fine inverno (dalla fase fenologica di "gemma rigonfia" a "bottoni rosa").
Agrumi: contro le Cocciniglie (*C. hesperidium, S. oleae, P. pergandei, A. aurantii, I purchasi, Ceratoplastes spp.*, ecc.) 2,5 - 3,0 l/hl nei trattamenti invernali e 1,0 - 2,0 l/hl negli interventi estivi.
Olivo: contro le Cocciniglie (*S. oleae, P. pollini*) 2,0 - 3,0 l/hl nei trattamenti di fine inverno-primavera e 1,0 - 2,0 l/hl negli interventi estivi.
Vite: contro le Cocciniglie (*T. vitis, P. vitis, ecc.*), Ragnetto rosso (*P. ulmi*), Ragnetto giallo (*E. carpini*) 1,5 - 2,0 l/hl nei trattamenti di fine inverno-inizio primavera.
Kaki: contro le Cocciniglie (*Pseudococcus spp., E. corni*) 1,5 - 2,0 l/hl intervenendo alla caduta delle foglie.
Noce, Nocciolo: contro le Cocciniglie (*P. pentagona, E. coryli*) 2,0 - 3,0 l/hl nei trattamenti di fine inverno.
Piante Ornamentali: contro le Cocciniglie (*P. pentagona*, ecc.) e il Ragnetto rosso (*T. urticae, P. ulmi*) 2,0 - 3,0 l/hl nei trattamenti invernali e 1,0 - 1,5 l/hl nelle applicazioni estive.
In tutti i casi l'aggiunta di insetticidi ad ampio spettro d'azione (esteri fosforici, piretroidi, ecc.) consente di aumentare l'efficacia dell'intervento.
Barbabietola da zucchero: come coadiuvante degli erbicidi di post-emergenza 0,3 - 0,5 l/ha.
COMPATIBILITA'
ALBENE non é miscibile con prodotti contenenti zolfo, polisolfuri, captano, folpet, dinocap, tiram, dicloran, propargite, triclorfon.
FITOTOSSICITA'
Impiegare ALBENE con un intervallo di almeno 20 giorni dopo aver effettuato trattamenti con poltiglia bordolese, polisolfuri e prodotti contenenti captano, zolfo, tiram. Su piante ornamentali, data la notevole varietà di specie presenti, si consiglia di effettuare saggi preliminari prima di trattare l'intera superficie.
INTERVALLO AL CONSUMO: sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: (*) lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.
Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano-Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena

Reg. n. 0206 del 20/11/1971 del Ministero della Sanità

L 0,25/0,5/1/5/10/20/25/50/100/200/1000 **Partita n.**
(*) Relativamente alla conf. 200-1000

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

PIPERIL

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Piretro puro	**g**	**4 (= 3,7 g/l)**
- Piperonil butossido	**g**	**16 (= 14,8 g/l)**
- Coformulanti (contiene Xilene)	**q.b. a g**	**100**

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO: infiammabile. Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi e la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena

Registrazione n. 0213 del 1/12/1971 del Ministero della Sanità

L 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 / 5 / 10 **Partita n.:**

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: PIRETRO 4%, PIPERONIL BUTOSSIDO 16%, le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
PIRETRO **Sintomi:** bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanie, collasso vascolare periferico. Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
PIPERONIL BUTOSSIDO: --**Terapia:** atropina. **Controindicazioni**: ----. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: il PIPERIL esplica la sua azione prevalentemente per contatto ed in minor misura per ingestione. Il PIPERIL è indicato per combattere Afidi in genere. Per la sua limitata azione tossica per l'uomo e gli animali a sangue caldo, il Piperil trova applicazione sulle colture ortive. Il PIPERIL va impiegato alla dose di ml. 70-100 per hl. di acqua.
COMPATIBDILITA': incompatibile con poltiglie solfocalciche.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': alle dosi indicate non presenti fenomeni di fitotossicità
EVENTUALI RISCHI DI NOCIVITA', A SEGUITO DEI TRATTAMENTI PER GLI INSETTI UTILI, GLI ANIMALI DOMESTICI, I PESCI ED IL BESTIAME: se viene impiegato al momento della fioritura è nocivo per le api. Non immettere nel campo trattato bestiame prima di 2 giorni. Non contaminare corsi d'acqua.
INTERVALLO DI SICUREZZA: osservare un intervallo di 2 giorni dall'ultimo trattamento all'immissione al consumo.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

ROGATOX

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Dimetoato puro g 38 (= 403 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
(contiene solvente irritante)

FRASI DI RISCHIO: infiammabile. Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NOCIVO

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM S.p.a. - Modena
DIACHEM S.p.A. - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Torrenieri Fraz. di Montalcino (SI)
CHIMAC-AGRIPHAR S.A. - Ougrée (Belgio)

Registrazione n. 0234 del 20/11/1971 del Ministero della Sanità

Litri 1 / 5 / 10 **Partita n. :**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare, visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsione, coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Poco efficace la pralidossima.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO (dosi per 100 litri di acqua)
Olivo: massimo due trattamenti contro la Mosca ml 150, contro la Tignola in primavera sui boccioli prefiorali, in estate sui frutti e dall'autunno all'inverno sulle foglie e sui germogli ml 70-120, contro Liotripide, Punteruolo, Tripidi, Cocciniglia e Oziorrinco ml 100-120. **Pompelmo-Mandarancio (piante non in produzione):** contro la Cimicetta verde ml 80-100 dalla fine di aprile alla prima decade di maggio, contro Tortrice dei germogli ml 150 trattando dalla prima decade di aprile alla prima decade di maggio, contro le forme giovanili di cocciniglie ml 100-120, contro Ragno rosso, Afidi, Cocciniglia bianca, Cotonosa, Biancarossa ml 150. **Limone (piante non in produzione):** contro Eliotripide in maggio-giugno ml 100-150, contro la Tignola della zagara in agosto-settembre ml 100-150, contro le forme giovanili di Cocciniglie ml 100-120. **Pomacee (piante non in produzione):** contro Zeuzera, Psilla, Cemiostoma, Afidi ml 70-120. **Barbabietola da Zucchero:** contro la Mosca della bietola e gli Afidi L 1,5/ha. **Asparago:** contro la Mosca dell'asparago ml 70-100. Trattare solamente dopo la raccolta dei turioni. **Tabacco:** contro Aleurodidi ml 100. **Fumento, Segale, Triticale:** contro Afidi, Sminturide, Lema L 1/ha. **Cotone (non da olio):** contro Afidi, Verme rosa L 1/ha. **Floreali:** contro Striscino, Aleurodidi, Afidi, Tripidi L 1/ha. **Ornamentali:** contro Afidi, Tripidi, Acari, Ditteri, Collemboli L 2/ha. **Pioppo:** contro Crisomela, Gemmaiola, Punteruolo, Farfalla bianca L 2/ha.
COMPATIBILITA': è incompatibile con poltiglia bordolese, polisolfuri e prodotti oleosi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico sulle varietà di olivo Coratina, Simona, Canina, Vernina , Morsello, Frantoio, Itrana ed altre eventuali, sul cedro e sul limone internodato se impiegato con irroratrice a basso volume.
RISCHI DI NOCIVITA': è tossico per gli insetti utili.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere il trattamento 35 giorni prima della raccolta per olivo, 20 giorni prima della raccolta per le altre colture destinate all'alimentazione; per asparago trattare solamente dopo la raccolta dei turioni.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

SANAVIT

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
- Folpet puro g 15
- Zolfo puro (esente da Selenio) g 30
- Rame metallo g 17
(sottoforma di ossicloruro tetraramico)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: nocivo per inalazione e ingestione. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena

Registrazione n. 0452 del 29/02/1972 del Ministero della Sanità

Kg 1 / 5 / 10 / 20 **Partita n.:**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOLPET 15%; RAME METALLO 17%; ZOLFO 30%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: FOLPET - **Sintomi:** irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro-intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). RAME METALLO – **Sintomi:** denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. ZOLFO - ==. **Terapia**: sintomatica. **Controindicazioni**: === . **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' DI IMPIEGO (dosi per 100 litri di acqua)
Il SANAVIT è un anticrittogamico combinato con azione contro la Botrytis cinerea (Muffa Grigia), Peronospora e Oidio della VITE. In viticoltura consente di combattere la Botrytis della caliptra florale, che costituisce il maggior inoculo all'interno del grappolo e la causa principale degli attacchi massicci di Muffa Grigia all'inizio della maturazione.
Il SANAVIT influisce positivamente sull'allegagione e sullo sviluppo vegetativo della vite. Il SANAVIT esplica una specifica azione antiodica per il suo alto contenuto di zolfo e per l'azione secondaria del FOLPET. Il SANAVIT si impiega alla dose di: g 400-500 per 100 litri di acqua, abbassando la dose a g. 350 quando è molto caldo.
COMPATIBILITA': il SANAVIT non è miscibile con fitosanitari alcalini (Poltiglia bordolese, polisolfuri), olii minerali, DDVP, Binapacryl, Dicofluanide. **Avvertenza:** deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli Olii minerali, del Captano e dei Polisolfuri.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': può arrecare danno alla vite Sangiovese.
RISCHI DI NOCIVITA': è tossico per gli insetti utili ed i pesci.
INTERVALLO: che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta:20 giorni. Sulle uve da vino, sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

SEVILAN

Insetticida in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Carbaryl puro g 47,5
(esente da ß-naftolo)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: nocivo per ingestione. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena

Registrazione n. 0455 del 20/11/1971 del Ministero della Sanità

Kg 1 / 5 **Partita n.:**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
CARBARIL inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fribillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia : atropina. **Controindicazioni:** ossime. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO: (dosi per 100 litri di acqua)
Il SEVILAN agisce per contatto o per ingestione. Il SEVILAN è dotato di buona persistenza e stabilità in quanto mantiene il suo potere insetticida anche nei periodi di forte insolazione. Il SEVILAN per la sua composizione chimica, ha il vantaggio di unire all'alta efficacia una tossicità molto bassa per l'uomo e gli animali a sangue caldo.
Frutticoltura: contro la Carpocapsa del melo, pero, noce g. 120-150; contro la Cidia, l'Anarsia, la Tentredine e le Ricamatrici della frutta g. 150-200.
Viticoltura: contro le Tignole dell'uva e il Sigaraio g 150-200.
Olivicoltura: contro la Tignola dell'olivo e forme giovanili di Cocciniglia g. 120-200.
Orticoltura (escluso funghi): contro la Dorifora e Cavolaia g 150-200
Bieticoltura: contro l'Altica, Casside e Mamestra g 170-200.
COMPATIBILITA': il Sevilan è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari, tranne quelli a reazione alcalina e a formulazione solfocalcica.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': il SEVILAN alla dose consigliata non presenta fenomeni di fitotossicità.
RISCHI DI NOCIVITA': nocivo alle api, se irrorato in fioritura. Non immettere nel campo trattato pollame e bestiame prima di 7 giorni.
INTERVALLO DI SICUREZZA: osservare un intervallo di 7 gg. dall'ultimo trattamento all'immissione al consumo.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

FITOSAN 50

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Malation puro g 47,5 (= 495 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100
(contiene Xilene)

FRASI DI RISCHIO: infiammabile. Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena

Registrazione n. 0457 del 20/11/1971 del Ministero della Sanità

L 0,250 / 0,500 / 1 / 5 **Partita n.**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: **Sintomi**: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Contro: Afide Brunastro, Afide Verde del pesco, Afide grande della rosa, Afide nero della fava, Afide verde della patata, Tignola della vite ml. 250.
Contro: Altiche, Antonomo del melo, Casside, Sigarai, Tignola del melo, Carpocapsa, (verme della mela e della pera), Tentredine delle pere, delle mele, delle susine, Cecidomia delle perine, Afide rosa del melo e del pero, Afide degli agrumi, tingidi, vespe e formiche ml. 150-250.
COMPATIBILITÀ: incompatibile con i prodotti oleosi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Eventuali rischi di nocività a seguito dei trattamenti per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame: il prodotto se irrorato alla fioritura è nocivo alle api. Non immettere pollame e bestiame nel campo trattato prima di 20 gg.
FITOTOSSICITA': fitotossico per le piante ornamentali e per le florifere: antirrino, crassula, felci, petunie, zinnie.
INTERVALLO DI SICUREZZA: osservare un intervallo di 20 giorni fra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

AZITHION PB

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Azinfos metile puro g 22,5
- Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui art. 25 del DPR 23 Aprile 2001, n.290.
FRASI DI RISCHIO: molto tossico per inalazione e per ingestione. Tossico a contatto con la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511
Stabilimento di Produzione : **SCAM S.p.a. - Modena**
BAYER Cropscience Srl - Filago (BG)
ISAGRO S.p.A. - Aprilia (LT)
Registrazione n. 0596 del 16/02/1972 del Ministero della Sanità
kg 1 – 2,5 – 5 – 10 **Partita n.:**

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici (di prima comparsa):** nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, Edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici (di seconda comparsa):** astenia e paralisi muscolari. Tachicardia , ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali:** confusione , atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia : atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO : (dose per 100 litri d'acqua)
Drupacee-Pomacee: contro Anarsia del pesco, Carpocapsa (verme delle mele e delle pere), Tignola orientale del pesco, Tignola delle susine, Psilla del pero, Afidi, Minatrici delle foglie (appena si notano le prime mine) Antonomo del melo, Fillobio del pero, Rodilegno, Cocciniglie (stadio larvale), Cicaline, Cimici, Ricamatrici, g 200 - 250.
Vite: contro la Tignola dell'uva g 200.
Patata: contro la Dorifora g 200-250.
Fragola: contro la Nottua g 200-250.
Barbabietola da Zucchero: contro Cleono, Lixus, Altica, Mosca e Mamestra g 250.
Erba Medica: contro Fitodecta, Fitonomo e Misurino dei medicai g 150-200.
Ortaggi (cavoli, carciofo, finocchio, pomodoro):contro la Nottua g 200-250.
COMPATIBILITA': compatibile con tutti i formulati antiparassitari ad eccezione delle poltiglie solfocalciche.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame: non immettere bestiame e pollame nel campo prima di 20 giorni, non preparare la soluzione in prossimità di corsi d'acqua.
INTERVALLO : che deve essere osservato fra l'ultimo trattamento e la raccolta 20 giorni.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO-IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

AZITHION PB

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Azinfos metile puro g 22,5
- Coformulanti q.b. a g 100

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Da sciogliere in acqua senza rompere

Contenuto 500 g

Avvertenza: prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente l'etichetta

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164
41010 S.Maria di Mugnano-Modena
Tel. 059-586511

Registrazione n. 0596 del 16/02/1972 del Ministero della Sanità

AZITHION PB

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE **100 g di prodotto contengono:**

- Azinfos metile puro g 22,5
- Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui art. 25 del DPR 23 Aprile 2001, n.290.
FRASI DI RISCHIO: molto tossico per inalazione e per ingestione. Tossico a contatto con la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano-Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione : **SCAM S.p.a. - Modena**
BAYER Cropscience Srl - Filago (BG)
ISAGRO S.p.A. - Aprilia (LT)

Registrazione n. 0596 del 16/02/72 del Ministero della Sanità

kg 1 (= 2 sacchetti da 500 g), kg 2,5 (= 5 sacchetti da 500 g),
kg 5 (= 10 sacchetti da 500 g) **Partita n.:**

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici (di prima comparsa):** nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, Edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici (di seconda comparsa):** astenia e paralisi muscolari. Tachicardia , ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali:** confusione , atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte:** generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO : (dose per 100 litri d'acqua) Drupacee-Pomacee: contro Anarsia del pesco, Carpocapsa (verme delle mele e delle pere), Tignola orientale del pesco, Tignola delle susine , Psilla del pero, Afidi, Minatrici delle foglie (appena si notano le prime mine) Antonomo del melo, Fillobio del pero, Rodilegno, Cocciniglie (stadio larvale), Cicaline, Cimici, Ricamatrici. g 200 - 250. **Vite:** contro la Tignola dell'uva g 200. **Patata:** contro la Dorifora g 200-250. **Fragola:** contro la Nottua g 200-250. **Barbabietola da Zucchero:** contro Cleono, Lixus, Altica, Mosca e Mamestra g 250. **Erba Medica:** contro Fitodecta, Fitonomo e Misurino dei medicai g 150-200. **Ortaggi (cavoli, carciofo, finocchio, pomodoro):**contro la Nottua g 200-250.
COMPATIBILITA': compatibile con tutti i formulati antiparassitari ad eccezione delle poltiglie solfocalciche. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
AVVERTENZA D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all'introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione chiudere bene la scatola.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame; non immettere bestiame e pollame nel campo prima di 20 giorni, non preparare la soluzione in prossimità di corsi d'acqua.
INTERVALLO : che deve essere osservato fra l'ultimo trattamento e la raccolta 20 giorni .
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE - NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE - Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - DA NON VENDERE NE CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE - DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE.**

25%

1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua

2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti

3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore

4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ed...

5) ...aggiungere la restante parte d'acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

FENOGRAN DICAMBA L.S.

ERBICIDA IN FORMULAZIONE LIQUIDA PER IMPIEGO SU CEREALI E MELO

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- MCPA sale dimetilamminico g 25,2 corrispondenti ad acido libero g 20,5 (= 223 g/l)
- Dicamba sale dimetilamminico g 10,3 corrispondenti ad acido libero g 8,6 (= 93,5 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: rischio di gravi lesioni oculari.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena

Registrazione n. 0825 del 22/08/1972 del Ministero della Sanità

L 0,5 - 1 - 5 - 20 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: MCPA sale Dimetilamminico 31,5%; DICAMBA sale Dimetilamminico 10,3%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
MCPA Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione; gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
DICAMBA Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE
Il FENOGRAN DICAMBA L.S. é un diserbante ormonico che agisce per assorbimento principalmente fogliare contro numerose infestanti dicotiledoni annuali e perenni quali Amaranto (*Amarantus retroflexus*), Atriplice (*Atriplex spp.*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Stellaria (*Stellaria Media*), Senape selvatica (*Sinapis Arvensis*), Falsa ortica (*Lamium purpureum)*, Farinaccio (*Chenopodium Album*), Rafano (*Raphanus Raphanistrum*), Camomilla (*Matricaria Camomilla*), Ranuncolo (*Ranunculus spp.*), Stoppione (*Cirsium arvense*), Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Convolvolo (*Convolvolus spp.*), Forbicina (*Bidens spp.*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Attaccamani (*Galium aparine*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Poligono (*Poligonum spp.*), Portulaca (*Portulaca oleracea*), Sicio (*Sicius angulatus*), Stellaria (*Stellaria media),* Stramonio (*Datura stramonio*), Spino d'asino (*Xanthium spp.*), Veccia *(Vicia sativa)*, Veronica (*Veronica spp.),* Viola *(Viola spp.)*.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO
FRUMENTO: 2,0 - 2,5 l/ha intervenendo dall'inizio dell'accestimento fino all'inizio della levata.
ORZO, SEGALE, AVENA: 1,5 - 2,0 l/ha intervenendo dall'inizio dell'accestimento alla levata.
MAIS: 1,0 - 1,5 l/ha iniziando i trattamenti dopo la seconda-terza foglia della coltura e su infestanti non eccessivamente sviluppate.
SORGO da granella: 0,5-0,75 l/ha, intervenendo entro le 5 foglie.
MELO: 2,5 - 3,0 l/ha trattando quando le infestanti sono in piena crescita vegetativa. Il dosaggio è riferito ad interventi effettuati sull'intera superficie; nel caso di trattamenti localizzati lungo il filare ridurre proporzionalmente il dosaggio.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi ecc. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.
COMPATIBILITA': FENOGRAN DICAMBA L.S. non è miscibile con fungicidi ed insetticidi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto di frumento, orzo, segale, avena e mais, 30 giorni prima della raccolta delle mele, 130 giorni prima della raccolta del sorgo.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

TOXENE

INSETTICIDA IN POLVERE SOLUBILE

COMPOSIZIONE
- Triclorfon puro g 50
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena
STI SOLFOTECNICA ITALIANA Spa – Cotignola (RA) e Fraz. Torrenieri di Montalcino (SI)

Distribuito da: AGRISYSTEM Srl – C.da Rotoli – Lamezia Terme (CZ)

Registrazione n. 0942 del 05/09/1972 del Ministero della Sanità

Kg. 1 / 5 / 10 **Partita n. :**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare, visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsione, coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia :** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' D'IMPIEGO (dosi per 100 litri di acqua)
Il TOXENE é un insetticida che agisce per ingestione e per contatto, con azione molto rapida che decomponendosi rapidamente e non dando problemi per i residui, viene impiegato sulle seguenti colture:
Frutticoltura (melo, pero, pesco, ciliegio, susino): contro Carpocapsa, Cidia, Anarsia g 300-400, contro Mosca della frutta g 200.
Viticoltura: contro Tignola, Tignoletta, Sigaraio, Ciccadellidi g 200-300. **Orticoltura (patata, pomodoro, peperone, cipolla, sedano, cavoli, carciofo, asparago, insalata, zucca, cetriolo, fagiolo, fagiolino, fava, pisello, carota, aglio)**: contro Mosca, Nottue, Dorifora, Tignola, Grilli, Grillotalpa, Aleurodidi, Ciccadellidi, Cavolaia, Minatrici, Piralidi g 200-400. **Olivicoltura**: contro Tignola e Mosca g 200-400. **Barbabietola da Zucchero**: contro Nottua Kg 3/ha impiegando alti volumi di acqua (1000-1500 litri/ha), contro Mosca durante le prime fasi vegetative kg l/ha. **Agrumicoltura**: contro Tignole, Cimice verde, Mosca della frutta g 200-400. **Fragolicoltura**: contro Tortricidi, Aleurodidi, Ciccadellidi 2-3 Kg/ha. **Maisicoltura**: contro Nottue e la seconda generazione delle piralidi 3 kg/ha. **Risicoltura**: contro Coppette, Chironomidi, Idrocampo, Tipule 3 kg/ha. **Soia**: contro Nottue, Mosca, Tortricidi 2,5-3 kg/ha. **Tabacco**: contro Nottue, Mosca, Agrotidi 2-3 kg/ha. **Floreali, Forestali, Ornamentali, Pioppo**: contro Mosca, Aulerodidi, Tortricidi, Agrotidi, Processionaria g 200-400.
COMPATIBILITA': il TOXENE é incompatibile con le poltiglie solfocalciche e bordolesi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': sul melo cv. Stark Delicious può causare fenomeni di fitotossicità.
RISCHI DI NOCIVITA': se il formulato viene irrorato durante la fioritura é nocivo alle api; non immettere nel campo trattato, bestiame e pollame prima di 10 giorni. Non contaminare corsi d'acqua.
Intervallo al consumo: tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo osservare un intervallo di 10 giorni.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE PER RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE N PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERIFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

ZIRCAM 90

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE BAGNABILE A BASE DI ZIRAM

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Ziram puro g 86
- Coformulanti q.b. a g 100

Attenzione! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui art. 25 del DPR 23 Aprile 2001, n.290.

FRASI DI RISCHIO: nocivo per ingestione. Molto tossico per inalazione. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Irritante per le vie respiratorie. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa – Modena
UCB N.V. Chemicals - Gent (Belgio)
FMC FORET S.A. - Vinaros - Castellon de la Plana (Spagna)
Registrazione n. 0205 del 20/11/1971 del Ministero della Sanità

Kg 1 – 5 – 10 - 20 **Partita n. :**

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi : cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione.
Occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione. Apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione. SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO (dose per 100 litri d'acqua)
Drupacee: contro la Bolla e la Gommosi, la Ruggine, il Cancro dei rametti g 400-500 in trattamenti autunno-invernali, g 250-300 per trattamenti primaverili-estivi. **Pomacee:** contro la Ticchiolatura del melo e del pero g200-250 in trattamenti pre-fiorali e g 150-200 in trattamenti dopo la fioritura.
Olivo: contro l'Occhio di Pavone g 350. **Orticoltura:** contro la ruggine dell'asparago, dell'aglio, della cipolla , del fagiolo, del pisello, melone, cocomero, zucca, carota, ecc. g 150.
Abbassare la dose indicata nel caso di trattamenti su colture in serra o comunque protette.
Floricoltura: contro la Ruggine e l'Alternaria del garofano, la Septoria e Seccume del crisantemo e gladiolo, il Seccume delle margherite e narciso, la Ruggine e il Blak Spot della rosa g 150.
Abbassare la dose nel caso di trattamenti su colture in serra o comunque protette.
COMPATIBILITA': è miscibile con tutti i prodotti da impiegarsi in agricoltura eccetto quelli solfocalcici.
FITOTOSSICITA': alle dosi indicate non presenta fenomeni di fitotossicità.
AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITÀ: non immettere pollame nel campo trattato per 10 gg.
INTERVALLO: osservare un intervallo di 10 gg. fra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del propagato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

AZITHION E-20

INSETTICIDA IN EMULSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Azinfos-metile puro g 18 (= 205 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100
(contiene xilene, cicloesanone)

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui art. 25 del DPR 23 Aprile 2001, n.290.
FRASI DI RISCHIO: infiammabile. Molto tossico per inalazione e per ingestione. Nocivo a contatto con la pelle. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano-Modena
Tel. 059-586511
Stabilimento di Produzione : SCAM S.p.a. – Modena
ARAGONESAS AGRO S.A. – Tarrega (Lleida) Spagna
Registrazione n. 1438 del 2/5/1974 del Ministero della Sanità
L 1 / 5 / 10 / 20 **Partita n.:**

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici (di prima comparsa):** nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici (di seconda comparsa):** astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali:** confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte:** generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia :** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' D'IMPIEGO : (dose per 100 litri d'acqua)
DRUPACEE (Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino, Mandorlo) – POMACEE (Melo, Pero, Cotogno) – AGRUMI (Arancio, Mandarino, Limone, Clementino, Bergamotto, Cedro, Pompelmo) – OLIVO: contro Anarsia del pesco, Carpocapsa (verme delle mele e delle pere), Tignola orientale del pesco, Tignola delle susine, Psilla del pero, Afidi, Minatrici delle foglie (appena si notano le prime mine), Antonomo del melo, Fillobio del pero, Rodilegno, Cocciniglie (stadio larvale), Cicaline, Cimici, Ricamatrici ml. 175-220.
VITE: contro la Tignola dell'uva ml . 175.
PATATA: contro la Dorifora ml. 175-220.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cleono, Lixus, Altica, Mosca e Mamestra ml. 220.
ERBA MEDICA: contro Fitodecta, Fitonomo e Misurino dei medicai ml. 130-175.
CAVOLI – CARCIOFO – ASPARAGO - ORTAGGI A FOGLIA (Lattuga, Cicoria, Indivia, Radicchio, Scarola, Rucola, Spinacio, Bietola da foglia e da costa, Cardo, Sedano, Finocchio, Prezzemolo, Basilico) – ZUCCA - CETRIOLO – SOLANACEE (Pomodoro, Peperone, Melanzana) - LEGUMI – ORTAGGI A RADICE (Carota, Bietola rossa, Cicoria da radice, Rapa, Ravanello, Rafano, Sedano-rapa): contro le Nottue degli ortaggi ml. 175-220.
PIOPPO: contro gli insetti dei vivai ml. 250-300.
SOIA: contro Afidi, Cimici, Nottue, Cicaline e Tortricidi ml. 150-200.
FRAGOLA: contro Afidi e Oziorrinco (adulto) ml. 200.
FLOREALI: contro Bega del garofano, Tripidi, Minatrici delle foglie e degli steli, Tentredini, Afidi in genere ml. 200-250.
ORNAMENTALI (in pieno campo): contro Tripidi, Tentredini, Aleurodidi, Liryomiza, Minatori, Tortitrici ml. 250-300.
COMPATIBILITA': compatibile con tutti i formulati antiparassitari ad eccezione delle poltiglie solfocalciche. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto se irrorato alla fioritura è nocivo alle api; non immettere pollame e bestiame nel campo trattato prima di 20 giorni. L'AZITHION E-20 è tossico per i pesci, il bestiame, animali domestici e insetti utili.
INTERVALLO DI SICUREZZA: osservare un intervallo di 20 giorni dall'ultimo trattamento alla raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

UREON-FL

DISERBANTE SELETTIVO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Linuron puro g 36 (= 420 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui art. 25 del DPR 23 Aprile 2001, n.290.
FRASI DI RISCHIO: nocivo per ingestione. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Può danneggiare i bambini non ancora nati. Possibile rischio di ridotta fertilità.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione : SCAM Spa - Modena
Registrazione n. 1450 del 30/5/1974 del Ministero della Sanità

Litri 0,100 – 1 – 5 – 10
Partita n.

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: LINURON: derivato dell'urea. **Sintomi**: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
Per una buona riuscita del trattamento è fondamentale che il terreno sia ben sminuzzato, livellato e con riserve idriche notevoli. Nel caso non dovesse essere abbastanza umido, occorre irrigare in modo tale da favorire l'azione diserbante del prodotto. Dopo il trattamento non si eseguono lavorazioni al terreno. Nei terreni sabbiosi e poveri di sostanza organica e nei terreni torbosi si sconsiglia il diserbo in pre-emergenza. E' efficace contro le seguenti infestanti: Giavone, Setaria, Erba Porcellana, Camomilla, Veronica, Senape, Mercurella, Galinsoga, Coda di volpe, Borsa di pastore, Morella, Erba paperino, Piantaggine, Falso Convolvolo, Euforbiacee. Il trattamento viene eseguito con un getto sottile e uniforme, usando le normali pompe irroratrici a medio ed alto volume di acqua. **Mais**: pre-emergenza, subito dopo la semina e dopo 2 o 3 giorni al massimo in dosi di litri 1,150 nei terreni di medio impasto ed in miscela con altri prodotti, litri 1,400 nei terreni torbosi e argillosi, per Ha in 400-500 litri d'acqua. **Carote**: pre-emergenza litri 2,350 per Ha in 400-500 litri acqua, post-emergenza litri 1,400 per Ha in 400-600 litri d'acqua, quando le carote hanno le foglie vere (a 1 mese dalla nascita). **Sedano**: 8-10 gg. dal trapianto in pieno campo litri 1,400-2,300 per Ha in 400-600 litri acqua. **Finocchio**: post-emergenza dopo la 4' foglia vera litri 0,450-1,175 per Ha in 400-600 litri acqua. **Soia**: in pre-emergenza alla dose di litri 0,700-1,150 in miscela con prodotti a base di Alaclor o altri principi attivi autorizzati.
COMPATIBILITA': é generalmente miscibile con i principali diserbanti.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
AVVERTENZE: nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi. Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Il prodotto non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.
FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
RISCHI DI NOCIVITA': non immettere pollame e bestiame nel campo trattato prima di 60 giorni, é velenoso per i pesci, evitare di contaminare i corsi d'acqua.
INTERVALLO DI SICUREZZA: osservare un intervallo di 60 giorni dall'ultimo trattamento alla raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

POLTIGLIA BORDOLESE SCAM

Anticrittogamico in polvere bagnabile a base di rame

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Rame metallico (sotto forma di solfato) g 20
- Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena
DIACHEM Spa – Unità Produttiva SIFA – Caravaggio (BG)
Registrazione n. 1498 del 30/04/1974 del Ministero della Sanità

Kg 1 / 5/ 10 / 25 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: **Sintomi**: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia**: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **Avvertenza**: consultare un Centro Antiveleni.
MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO Il prodotto non é altro che la Poltiglia Bordolese preparata industrialmente e presenta pertanto praticità nell'uso. Per il suo grado di micronizzazione e di sospensibilità assicura una copertura omogenea del prodotto sulla foglia.
Vite: contro la Peronospora gr. 1000 **Melo-Pero**: contro la Ticchiolatura del melo e pero per i trattamenti invernali gr. 600-700 **Olivo**: contro l'Occhio di Pavone gr. 600-700.
Pomodoro-Patata: contro Peronospora gr. 600-700.
COMPATIBILITÀ La Poltiglia bordolese è compatibile con tutti i prodotti antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' Non si deve trattare durante la fioritura. Su varietà di melo (Abbondanza, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana); e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) il prodotto è cuprosensibile e può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
RISCHI DI NOCIVITA' il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE - NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE - Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

FOLTAN

Anticrittogamico in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Folpet puro g 47,5
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena

Registrazione n. 1711 del 3/9/1975 del Ministero della Sanità

Distribuito da: CHIMIBERG Srl – Albano S.Alessandro (BG)

Kg 1/5/10 **Partita n. :**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro-intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.
MODALITA' DI IMPIEGO (dosi per 100 litri d'acqua)
Il FOLTAN è un fungicida organico che esplica la sua azione contro la Peronospora e la Botrytis. Possiede anche un'azione collaterale antioidica.
Vite: contro la Peronospora e Botrytis gr. 150-200.
COMPATIBILITA': è incompatibile con oli bianchi, polisolfuri e poltiglia bordolese. Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con oli minerali e polisolfuri.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta
NOCIVITA': è tossico per gli insetti utili ed i pesci.
INTERVALLO: che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 10 giorni. Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

SERIAL W-75

DISERBANTE SELETTIVO PER LE COLTURE ORTIVE, ORNAMENTALI E FLOREALI
POLVERE BAGNABILE PER TRATTAMENTI LIQUIDI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Clortal dimetil puro		**g**	**75**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g**	**100**

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO: possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di produzione: SCAM Spa – Modena
A.D.I.C.A. Srl – Nera Montoro (TR)
S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola (Ra)

Registrazione n. 1862 del 1/09/1975 Ministero della Sanità

Kg 0,130 / 0,260 / 1 / 5 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE: il SERIAL W-75 è un diserbante per la fragola, per alcune colture ortive, ornamentali e floreali. Il SERIAL W-75 ha un'azione antigermogliante sui semi delle infestanti sensibili impedendone lo sviluppo. Pertanto, non esplica nessuna azione sulle infestanti già nate o sui loro semi già germogliati. E' efficace contro le seguenti erbe infestanti annuali provenienti da seme: *Digitaria sanguinalis* (sanguinella), *Amarantus retroflexus* (amaranto), *Chenopodium album* (farinaccio), *Setaria verticillata* (panicastrella), *Portulaca oleracea* (erba pocellana), *Stellaria media* (centocchio), *Erodium cicutarium* (erba cicutaria) *Beta vulgaris* (barbabietola), *Poa annua*, *Papaver rhoeas* (papavero).
Sono invece resistenti le infestanti perennanti come gramigna, cipero, vilucchio, stoppione (o cirsium) ed altre come: coda cavallina, capsella. Inoltre sono poco sensibili al prodotto le poligonacee come: convolvolo, persicaria, correggiola (*polygonum aviculare* ecc.).
CAMPI E DOSI D'IMPIEGO Dose normale d'impiego 15-18 kg/Ha in almeno 500 l di acqua. La dose più bassa va impiegata nei terreni sciolti o di medio impasto, la più alta nei terreni pesanti ed argillosi.
Post-semina o post-trapianto delle colture: cipolle, agli, porri, cavoli, cavolfiori, finocchi, sedani, piselli.
Post-trapianto: lattuga, scarola, peperoni, melanzane.
Può anche essere impiegato su cetriolo, anguria e meloni, dopo che le piantine hanno superato la crisi del trapianto e su pomodoro, effettuando il trattamento da 4 a 6 settimane dopo il trapianto. **Fragole ed asparagi:** il trattamento va eseguito dopo la messa a dimora per i nuovi impianti e prima della ripresa vegetativa primaverile per i vecchi impianti. **Bulbose da fiori** (Gladioli, Tulipani, Iris): il trattamento va eseguito dopo la messa a dimora dei bulbi, anche con piante già in fioritura. Qualora dopo 60-70 gg. dal trattamento avesse luogo una nuova apparizione delle erbe infestanti, sarà sufficiente applicare altri 10 kg/Ha di SERIAL W-75, avendo prima cura di erpicare e pulire bene il terreno.
Campi da golf, prati all'inglese: il trattamento va eseguito alla dose di 13 kg/Ha con 500-600 litri di acqua all'inizio della primavera, prima della germinazione delle infestanti da combattere e dopo aver eseguito il taglio del tappeto erboso, quanto più raso possibile. Dopo il trattamento effettuare un'abbondante irrigazione a pioggia, per facilitare la penetrazione del diserbante nel terreno.
MODALITA' D'IMPIEGO Il terreno, prima del trattamento, deve essere ben lavorato, ripulito da erbacce ed avere un sufficiente tenore di umidità (l'umidità richiesta in genere è quella necessaria per mettere a dimora la coltura). Per la preparazione della miscela aggiungere alla dose occorrente di SERIAL W-75 poca acqua, agitando a mezzo di un bastone fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Aggiungere quindi, sempre agitando, il rimanente dell'acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione. Distribuire la miscela acquosa uniformemente sulla superficie da disinfestare, usando normali pompe a mano o a motore. Durante il trattamento mantenere la miscela acquosa in costante agitazione. In periodi di siccità, è opportuno mantenere il terreno umido per almeno una settimana dopo il trattamento.
COMPATIBILITA': il prodotto va impiegato da solo. **FITOTOSSICITA':** evitare che, durante l'irrorazione, lo spruzzo giunga su altre colture vicine. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
AVVERTENZE: non effettuare il diserbo in terreni torbosi, perché il prodotto viene inattivato dalla sostanza organica. Se le colture dovessero fallire per cause ambientali, si possono subito ripiantare le stesse colture per le quali li prodotto è selettivo e raccomandato. Quando capita di seminare cereali che seguono, sullo stesso terreno, colture trattate con il SERIAL W-75 nel periodo estivo, è prudente effettuare prima una buon aratura e lasciare poi il terreno a riposo per qualche tempo (15-20 gg.). Lavare perfettamente dopo l'uso la pompa e i recipienti usati per l'irrorazione. Effettuare il trattamento con tempo buono e senza vento. Conservare il prodotto in locale asciutto. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA6 CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

Foglio illustrativo

SERIAL W-75

DISERBANTE SELETTIVO PER LE COLTURE ORTIVE, ORNAMENTALI E FLOREALI
POLVERE BAGNABILE PER TRATTAMENTI LIQUIDI

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
Dose normale d'impiego 15-18 kg/Ha in almeno 500 l di acqua. La dose più bassa va impiegata nei terreni sciolti o di medio impasto, la più alta nei terreni pesanti ed argillosi.
Post-semina o post-trapianto delle colture: cipolle, agli, porri, cavoli, cavolfiori, finocchi, sedani, piselli.
Post-trapianto: lattuga, scarola, peperoni, melanzane.
Può anche essere impiegato su cetriolo, anguria e meloni, dopo che le piantine hanno superato la crisi del trapianto e su pomodoro, effettuando il trattamento da 4 a 6 settimane dopo il trapianto.
Fragole ed asparagi: il trattamento va eseguito dopo la messa a dimora per i nuovi impianti e prima della ripresa vegetativa primaverile per i vecchi impianti.
Bulbose da fiori (Gladioli, Tulipani, Iris)**:** il trattamento va eseguito dopo la messa a dimora dei bulbi, anche con piante già in fioritura. Qualora dopo 60-70 gg. dal trattamento avesse luogo una nuova apparizione delle erbe infestanti, sarà sufficiente applicare altri 10 kg/Ha di SERIAL W-75, avendo prima cura di erpicare e pulire bene il terreno.
Campi da golf, prati all'inglese: il trattamento va eseguito alla dose di 13 kg/Ha con 500-600 litri di acqua all'inizio della primavera, prima della germinazione delle infestanti da combattere e dopo aver eseguito il taglio del tappeto erboso, quanto più raso possibile. Dopo il trattamento effettuare un'abbondante irrigazione a pioggia, per facilitare la penetrazione del diserbante nel terreno.
MODALITA' D'IMPIEGO Il terreno, prima del trattamento, deve essere ben lavorato, ripulito da erbacce ed avere un sufficiente tenore di umidità (l'umidità richiesta in genere è quella necessaria per mettere a dimora la coltura). Per la preparazione della miscela aggiungere alla dose occorrente di SERIAL W-75 poca acqua, agitando a mezzo di un bastone fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Aggiungere quindi, sempre agitando, il rimanente dell'acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione. Distribuire la miscela acquosa uniformemente sulla superficie da disinfestare, usando normali pompe a mano o a motore. Durante il trattamento mantenere la miscela acquosa in costante agitazione. In periodi di siccità, è opportuno mantenere il terreno umido per almeno una settimana dopo il trattamento.
COMPATIBILITA': il prodotto va impiegato da solo.
FITOTOSSICITA': evitare che, durante l'irrorazione, lo spruzzo giunga su altre colture vicine. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
AVVERTENZE: non effettuare il diserbo in terreni torbosi, perché il prodotto viene inattivato dalla sostanza organica. Se le colture dovessero fallire per cause ambientali, si possono subito ripiantare le stesse colture per le quali li prodotto è selettivo e raccomandato. Quando capita di seminare cereali che seguono, sullo stesso terreno, colture trattate con il SERIAL W-75 nel periodo estivo, è prudente effettuare prima una buon aratura e lasciare poi il terreno a riposo per qualche tempo (15-20 gg.). Lavare perfettamente dopo l'uso la pompa e i recipienti usati per l'irrorazione. Effettuare il trattamento con tempo buono e senza vento. Conservare il prodotto in locale asciutto. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Etichetta formato ridotto ai sensi dell'Art.16 comma 2 del D.L. 194/95 per le taglie da g 130 – 260

SERIAL W-75

DISERBANTE SELETTIVO PER LE COLTURE ORTIVE, ORNAMENTALI E FLOREALI
POLVERE BAGNABILE PER TRATTAMENTI LIQUIDI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Clortal dimetil puro		g 75
- Coformulanti	q.b. a	g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO: possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa – Modena
A.D.I.C.A. Srl – Nera Montoro (TR)
S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola (Ra)

Registrazione n. 1862 del 1/09/1975 Ministero della Sanità

g 0,130 / 0,260 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

POLTIGLIA BORDOLESE SCAM 25

FUNGICIDA A BASE DI SOLFATO DI RAME NEUTRALIZZATO IN CALCE IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Rame metallo (sotto forma di solfato neutralizzato con calce) g 25
- Coadiuvanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena

Registrazione n. 1958 del 02/07/1977 del Ministero della Sanità

Kg 1 / 5 / 10 / 25 **Partita n.:**

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: **Sintomi**: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia**: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **AVVERTENZA:** consultare un centro antiveleni.
MODALITÀ D'IMPIEGO La POLTIGLIA BORDOLESE SCAM 25 é un fungicida a base di rame solfato neutralizzato in calce (Poltiglia Bordolese), preparato industrialmente e pronto all'uso. Le particelle rameiche, caratterizzate da un'elevatissima micronizzazione, aderiscono tenacemente alle superfici trattate assicurando elevata attività nei confronti dei patogeni ed una notevole persistenza d'azione.
La POLTIGLIA BORDOLESE SCAM 25 può essere impiegata sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi:
VITE: contro la Peronospora (*P. viticola*) 500 -1000 g/hl effettuando interventi a cadenza di 6-8 giorni. Svolge un'efficace azione collaterale nei confronti del Marciume nero degli acini *(Black-rot)* e dell' Escoriosi (*P. viticola*) **ACTINIDIA**: contro la Fitoftora *(P. cactorum)* 800 g/hl distribuendo 10-15 l di soluzione alla base della pianta. **POMACEE**: contro i Cancri rameali (*N. galligena, C. mali*) 800 - 1000 g/hl intervenendo nel periodo autunno-invernale. Contro la Ticchiolatura (*V. inaequalis, V. pirina, F. dendriticum, F. pirinum)* 400 g/hl nei trattamenti pre-fiorali e 200-250 in quelli post- fiorali. Contro il colpo di fuoco batterico (*E. amylovora*) 100-150 g/hl. Contro la Maculatura bruna del pero *(Stenphylium spp.)* 100 g/hl intervenendo ogni 5-7 giorni. Contro Fitoftora (*F. cactorum)* 800 g/hl distribuendo circa 15 l di soluzione per pianta ed avendo cura di bagnare accuratamente la zona del colletto. **DRUPACEE**: contro Bolla (*E. deformans*), Corineo (*C. beijerickii*), Cancri rameali (*F. amygdali, ecc.*) e Batteriosi (*X. campestris vr. Pruni*) 800-1.000 g/hl intervenendo a caduta foglie e a gemma ferma. Contro le Batteriosi effettuare un ulteriore intervento alla dose di 100-120 g/hl all'ingrossamento delle gemme. **AGRUMI**: contro Mal secco (*D. tracheiphila*), Antracnosi (*C. gleosporioides*), Allupatura (*P. citrophtora)* , Fumaggine (*C. citri*) e le Batteriosi (*P.syringae*) 700-1000 g/hl. Contro la Fitoftora (*P. citrophthora*) 800 g/hl distribuendo circa 10-15 l di soluzione per pianta avendo cura di bagnare bene la zona del colletto. Per spennellature al tronco e alle branche utilizzare una soluzione allo 0,3%. **OLIVO**: contro Occhio di pavone (*S. oleaginea*), Lebbra (*G. olivarum*), Rogna (*P. savastanoi*) e le Fumaggini 700 - 1000 g/hl. **NOCCIOLO**: contro Cancri rameali, 700-900 g/hl. **NOCE**: contro l'Antracnosi (*G. juglandis*), 700 - 900 g/hl in primavera dopo la ripresa vegetativa. **NESPOLO**: contro la Ticchiolatura (*F. eriobotriae*) e la Maculatura fogliare (*P. mespili*) 600-1000 g/hl. **FRAGOLA**: contro la Vaiolatura (*M. fragarie*), 3,0 Kg/ha. **PATATA, POMODORO**: contro Peronospora (*P. infestans*), Alternaria (*A. porri*), Septoria (*S. lycopersici*) e le Batteriosi (*P. syringae pv. tomato, C. michiganense, X. campestris*) 500-1000 g/hl. **ORTAGGI (Ortaggi a radice, Aglio, Cipolla, Scalogno, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Zucchino, Melone, Cocomero, Zucca, Cavoli, Lattuga, Indivia, Cicoria, Scarola, Radicchio, Rucola, Spinacio, Bietola da foglia e da costa, Erbe fresche, Legumi, Asparago, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo, Porro)**: contro Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Cladosporiosi, Cercospora, Septoria, Ruggini, Batteriosi 500- 1.000 g/hl. **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO:** contro la Cercospora (*C. beticola*) e la Peronospora (*P. schachntii*) 7,5-10,0 Kg/ha. Nel caso di applicazioni in miscela con fungicidi endoterapici ridurre opportunamente la dose a 4,0-5,0 Kg/ha. **OLEAGINOSE (Soia, Lino, Arachide, Ravizzone, Sesamo, Colza, Girasole)**: contro la Peronospora (*P. manshurica, P. helianthi, ecc.*) e l'Alternaria (*Alternaria spp.*) 3,0-5,0 Kg/ha. **RISO**: per la lotta alle alghe con trattamenti preventivi mediante la concia 1,5-2,0 Kg/Q.le di seme. Negli interventi successivi sul tappeto algoso 4,0-5,0 Kg/Ha in funzione dell'entità e dell'estensione dello strato. In caso di elevata infestazione elevare il dosaggio a 8,0-10,0 Kg/Ha. **COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI e FORESTALI**: contro la Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Septoria, Ruggine, Ticchiolatura, ecc. 500 -1000 g/hl.

COMPATIBILITÀ: il prodotto non é miscibile con i fitosanitari a reazione alcalina, con gli olii minerali e con il Tiram. Su colture ripetutamente trattate con Tiram è opportuno distanziare di almeno 7 giorni gli interventi. Da evitare inoltre le miscele con fertilizzanti fogliari e integratori fisionutrizionali contenenti acidi umici e/o elevati tenori di azoto. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci.
FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (Abbondanza Belford, Black-Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard, General Leclerc) cupro-sensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

Z.M. 80

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Mancozeb puro g 80
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena
RHOM and HAAS FRANCE S.A. – LAUTERBOURG (FRANCIA)

Registrazione n. 1981 del 13/6/1977 del Ministero della Sanità

Kg 0,25 / 1 / 5 / 10 / 25 **Partita n.:**

NORME PRECAUZIONALI Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*
INFORMAZIONI PER IL MEDICO **Sintomi**: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia,cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO (Dosi per 100 litri d'acqua)
Lo Z.M. 80 è un sale organico complesso con zinco e manganese che possiede una rilevante azione biologica.
-**Frutticoltura**: contro la Ticchiolatura del melo e del pero g 200-300
-**Viticoltura:** contro la Peronospora della vite g. 250-300.
-**Orticoltura**: per il pomodoro (fino alla prima fioritura) contro la Peronospora g. 200-300, contro l'Alternaria g. 200.
-**Tabacchicoltura**: contro la Peronospora Tabacina g. 150-200.
-**Floricoltura**: contro la Ruggine del garofano g. 250-350.
-**Pioppicoltura**: contro la Marssonina Brunnea g. 400-500.
DIVIETO D'IMPIEGO: NON IMPIEGARE IN SERRA - NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.
COMPATIBILITA': lo Z.M. 80 è incompatibile con le miscele oleose, le poltiglie solfocalciche e bordolesi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': è sconsigliabile impiegarlo sulle coltivazioni di pero S. Maria, Precoce Morettini, Spadone d'estate, Coscia, Curato, Butirra estiva.
INTERVALLO: che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 28 giorni.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

OLEOVIS

OLIO MINERALE EMULSIONATO AD AZIONE INSETTICIDA
PER LA LOTTA CONTRO LE COCCINIGLIE E CONTRO LE UOVA DEGLI ACARI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Olio minerale (residuo minimo insulfonabile 95% - 96%) g 80 (= 696 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO: versare la dose occorrente di OLEOVIS in un recipiente pulito aggiungendo poi un'eguale quantità di acqua. Agitare energicamente ed infine diluire con acqua fino a volume richiesto.
Pomacee e Drupacee: l'OLEOVIS viene impiegato alla dose di l. 2-2,5 per quintale acqua con azione sulle Cocciniglie in genere (Cocciniglia di S.Josè in particolare) e contro le uova degli Acari. L'OLEOVIS per la sua formulazione viene impiegato in miscela con il PAMEXOL e MEDILIN restando collegato intimamente e dando origine ad un composto che svolge azione sinergica con azione sulle uova e larve di Afidi, uova di Ragno rosso, forme svernanti di Minatori ed altri insetti.
Impiegato alla dose di l. 2-2,5 aggiungendo ml 250-300 di Pamexol e Medilin.
Agrumi: contro la Cocciniglia cotonosa e la Icerya, l. 3,450 per quintale di acqua.
Piante ornamentali: contro le Cocciniglie della rosa, oleandro, alla dose di l. 1,150 per quintale acqua.
COMPATIBILITA': l'OLEOVIS è compatibile con la maggior parte degli fitosanitari in commercio eccezion fatta per prodotti a base di Captano, Folpet, Dicloran, Dodina, Rami fissi, Binapacryl, Propargil, Triclorfon e Zolfo. Dal trattamento con OLEOVIS al trattamento con formulati a base di zolfo devono intercorrere almeno 25 giorni.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta se impiegato da solo; 30 giorni se in miscela con esteri fosforici.
ATTENZIONE: (*) lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.
AVVERTENZA: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena

Reg. n. 2176 del 26/03/1976 del Ministero della Sanità

L 1/5/25/100/200/1000 **Partita n.**
(*) Relativamente alla conf. 200-1000

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

BOTRASCAM 75 W

FUNGICIDA ANTIBOTRITICO IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Dicloran puro		**g 75**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g 100**

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: (dose per 100 litri d'acqua)
BOTRASCAM 75 WP è un fungicida specifico per la lotta contro i marciumi del colletto e della parte aerea provocati da *Botrytis spp. e Sclerotinia spp.*. Svolge un'azione prevalentemente preventiva e può essere impiegato sia in pieno campo che in serra per la protezione delle colture di **Fragola, Carota, Aglio, Cipolla, Scalogno, Patata, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Melone, Cocomero, Zucca, Zucchino, Cetriolo, Cavoli, Lattuga, Indivia, Cicoria, Radicchio, Rucola, Crescione, Spinacio, Erba cipollina, Prezzemolo, Basilico, Rosmarino, Salvia, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Asparago, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo, Porro, Tabacco, Colture floreali e ornamentali, Campi da golf e Prati ornamentali** secondo le seguenti tecniche di intervento:
a) Applicazioni alla coltura: utilizzare BOTRASCAM 75 W alla dose di 100-150 g/hl, avendo cura di bagnare abbondantemente ed uniformemente la parte aerea delle piante e la zona del colletto.
b) Applicazioni al terreno (trattamenti di pre o post-semina e pre o post-trapianto): BOTRASCAM 75 W va impiegato alla dose di 1,0-1,5 g di formulato per m^2. Diluire il prodotto in acqua ed impiegare un volume di distribuzione sufficiente a garantire una abbondante ed uniforme bagnatura del terreno. Se possibile effettuare poi un leggero interramento del prodotto.
c) Trattamento dei terricciati destinati alla preparazione dei semenzai: BOTRASCAM 75 W va impiegato alla dose di 75-100 g/m^3 di terriccio. Diluire il prodotto in acqua e bagnare con cura ed uniformemente la composta
d) Campi da golf e prati ornamentali: impiegare BOTRASCAM 75 W alla dose di 1,0-2,0 g di formulato per m^2. Diluire il prodotto in acqua e distribuire circa 10 hl/Ha di soluzione. Segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso "non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento" mantenendo tale divieto per 24 ore dall'applicazione del prodotto.
COMPATIBILITA' : compatibile con tutti i formulati fitosanitari tranne gli oli bianchi, gialli ed antracenici. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non impiegare BOTRASCAM 75 W su piante giovani che non abbiano ancora emesso la 2°-3° foglia vera o sofferenti. Nel caso di colture trapiantate attendere che le stesse abbiano superato completamente la crisi di messa a dimora. Non intervenire quando la temperatura è molto elevata (superiore ai 28-30°C). Evitare le miscele con prodotti rameici a reazione fortemente alcalina o preparati a base oleosa.
INTERVALLO AL CONSUMO: osservare un intervallo di 20 giorni fra l'ultimo trattamento e la raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SCAM S.p.a. - Strada Belluria, 164 41010 S.Maria di Mugnano-Modena Tel. 059-586511

Officina di produzione: SCAM S.p.a. - Modena
A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)
S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola (RA) e Fraz.Torrenieri Montalcino (SI)

Reg. n. 2566 del 4/7/1977 del Ministero della Sanità

Kg 0,1-0,5-1 **Partita n.**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

IMIDAN 50 WP

INSETTICIDA - ACARICIDA FOSFORGANICO IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Fosmet puro g 52
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di produzione: SCAM S.p.a. - Modena

Registrazione n. 2592 del 13/06/1977 del Ministero della Sanità

Kg 1 / 5 / 10 /20 **Partita n. :**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
Pomacee: contro il verme delle pere e delle mele (*Carpocapsa pomonella*), contro gli adulti dei minatori fogliari (*Cemiostoma, Neoticula, Lythocolletis*), contro la Psilla del pero, contro i Punteruoli (*Fillobi*), contro il Ragno rosso (*Panonychus ulmi*) e altri acari trattare con IMIDAN 50 WP, alla dose di 150-200 g/hl d'acqua. Contro l'afide verde ed altri afidi la dose è di 150 g aggiungendo sempre 50-60 g di bagnante adesivo irreversibile.
Drupacee: contro la Tignola orientale del pesco (*Cydia molesta*), contro il Ragno rosso ed altri acari trattare con IMIDAN 50 WP alla dose di 150 g/hl d'acqua.
Agrumi: contro la Cocciniglia rossa degli agrumi (*Aonidiella aurantii*) trattare con IMIDAN 50 WP a 60-70 g/hl; contro la Mosca della frutta (*Ceratitis capitata*) e contro gli afidi (*Toxoptera aurantii*), intervenire con ripetuti trattamenti a seconda della intensità dell'attacco alla dose di 150 g/hl d'acqua. L'IMIDAN 50 WP si è inoltre rivelato attivo contro i ragni e i tripidi infestanti le colture agrumicole.
Olivo: contro la Mosca delle olive (*Dacus oleae*) impiegare l'IMIDAN 50 WP in forma preventiva o al massimo quando si notano le primissime punture fertili, alla dose di 125-150 g/hl d'acqua. Contro la Tignola dell'olivo (*Prays oleae*) ridurre la dose a 200 g/hl d'acqua. Contro la Cocciniglia nera (*Salssetia oleae*) la dose deve essere invece di 150 g/hl di acqua ed i trattamenti vanno eseguiti non appena si avvertono i sintomi della infestazione. Nella lotta contro la Mosca delle olive e della frutta, l'IMIDAN 50 WP può essere miscelato con un attrattivo proteico secondo il seguente rapporto: 150-300 g di insetticida più la dose consigliata di esca proteica in 100 litri di acqua. La dose d'impiego dell'IMIDAN 50 WP verrà scelta in relazione al prevedibile grado di attacco della mosca. Per la distribuzione della miscela IMIDAN 50 WP + attrattivo proteico si può impiegare la pompa a spalla, ottenendone pertanto gocce grosse, oppure qualsiasi altra pompa irroratrice. L'irrorazione deve interessare solamente una parte della chioma e perciò bastano solo 200-250 ml di miscela per pianta; è buona norma inoltre orientare il getto irrorante in modo da investire la pianta dal basso verso l'alto. Sull'Olivo sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta.
Patata: contro la Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*) intervenire con ripetuti trattamenti alla vegetazione alla comparsa delle larve sulle foglie alla dose di 150-200 g/hl d'acqua.
Preparazione della poltiglia riempire per metà con acqua il serbatoio della pompa, aggiungere l'IMIDAN 50 WP lentamente tenendo la miscela costantemente agitata- aggiungere la rimanente acqua.
COMPATIBILITA': l'IMIDAN 50 WP è compatibile con tutti gli anticrittogamici ed insetticidi di uso comune. Si consiglia però di eseguire una prova preventiva di miscelazione ed accertare l'effettiva compatibilità dei coformulanti. L'IMIDAN 50 WP non è compatibile con prodotti alcalini quali ad esempio poltiglia bordolese, poltiglia solfo-calcica e calce.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
INTERVALLO: sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

VISIR Combi

Fungicida in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- **Esaconazolo puro g 1,6**
- **Zolfo puro (esente da selenio) g 43**
- **Coformulanti q .b. a g 100**

FRASI DI RISCHIO: irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena

Registrazione n. 3901 del 20/12/1980 del Ministero della Sanità

Kg 0,100 / 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10 **Partita n. :**

NORME PRECAUZIONALI: non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ESACONAZOLO puro 1,6%; ZOLFO puro 43%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione: ESACONAZOLO – **Sintomi**: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo**: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. ZOLFO: == **Terapia**: sintomatica. **Controindicazioni**: ===. **Avvertenza**: consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE VISIR Combi è un fungicida che associa in sé l'attività sistemica e translaminare dell'Esaconazolo all'azione di contatto ed in fase di vapore dello zolfo. VISIR Combi agisce in via preventiva, curativa ed "eradicante". Non ha effetti negativi sull'acaroentomofauna utile, non interferisce con la fermentazione dei mosti e non influisce sulle caratteristiche organolettiche delle produzioni trattate.
MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO VISIR Combi può essere impiegato sulla **Vite**: contro l'Oidio o " Mal bianco" *(U. necator; O. tuckeri)*, il marciume nero degli acini o "Black rot" *(G. bidwellii)* e l'Escoriosi *(P. viticola)* 120-150 g/hl, intervenendo dalla pre-fioritura all'invaiatura ad intervalli di 10-14 giorni. Impiegare il dosaggio più basso sulle uve da vino ed in aree a bassa pressione della malattia.
COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con gli oli minerali e il Captano; se si eseguono trattamenti con questi preparati distanziarli di almeno 21 giorni da interventi con VISIR Combi. Non è miscibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglie bordolesi basiche, ecc) Diclorvos, Diclofluanide e Binapacril. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': a causa del suo contenuto in zolfo, VISIR Combi può essere fitotossico per le varietà di Melo Black Ben Davis, Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap e per il vitigno Sangiovese.
RISCHI DI NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per i pesci. Attenzione, il prodotto tal quale contiene sostanza tossica per gli organismi acquatici.
PERIODO DI CARENZA Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 15 giorni.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

VISIR Combi

Fungicida in polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Esaconazolo puro		g	1,6
- Zolfo puro (esente da selenio)		g	43
- Coformulanti	q .b. a	g	100

IRRITANTE

Da sciogliere in acqua senza rompere

Contenuto g 250 - 500 – kg 1

Avvertenza: leggere l'etichetta riportata sulla confezione prima di utilizzare il prodotto

DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164
41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Registrazione n. 3901 del 20/12/1980 del Ministero della Sanità

VISIR Combi

Fungicida in polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Esaconazolo puro g 1,6
- Zolfo puro (esente da selenio) g 43
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena

Registrazione n. 3901 del 20/12/1980 del Ministero della Sanità

Kg 1 (= 2 sacchetti da 500 g), Kg 1 (= 4 sacchetti da 250 g), Kg 1 (= 1 sacchetto da 1 kg),
Kg 5 (= 10 sacchetti da 500 g), Kg 5 (= 5 sacchetti da 1 kg), Kg 10 (= 10 sacchetti da 1 kg) **Partita n. :**

NORME PRECAUZIONALI: non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ESACONAZOLO puro 1,6%; ZOLFO puro 43%, le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: ESACONAZOLO – **Sintomi:** organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo:** dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. ZOLFO: == **Terapia:** sintomatica. **Controindicazioni:** ===. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE VISIR Combi è un fungicida che associa in sé l'attività sistemica e translaminare dell'Esaconazolo all'azione di contatto ed in fase di vapore dello zolfo. VISIR Combi agisce in via preventiva, curativa ed "eradicante". Non ha effetti negativi sull'acaroentomofauna utile, non interferisce con la fermentazione dei mosti e non influisce sulle caratteristiche organolettiche delle produzioni trattate.
MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO VISIR Combi può essere impiegato sulla **Vite**: contro l'Oidio o " Mal bianco" *(U. necator; O. tuckeri)*, il marciume nero degli acini o "Black rot" *(G. bidwellii)* e l'Escoriosi *(P. viticola)* 120-150 g/hl, intervenendo dalla pre-fioritura all'invaiatura ad intervalli di 10-14 giorni. Impiegare il dosaggio più basso sulle uve da vino ed in aree a bassa pressione della malattia
COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con gli oli minerali e il Captano; se si eseguono trattamenti con questi preparati distanziarli di almeno 21 giorni da interventi con VISIR Combi. Non è miscibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglie bordolesi basiche, ecc) Diclorvos, Diclofluanide e Binapacril. **AVVERTENZA D'USO:** nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all'introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione chiudere bene la scatola. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': a causa del suo contenuto in zolfo, VISIR Combi può essere fitotossico per le varietà di Melo Black Ben Davis, Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap e per il vitigno Sangiovese.
RISCHI DI NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per i pesci. Attenzione, il prodotto tal quale contiene sostanza tossica per gli organismi acquatici.
PERIODO DI CARENZA Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 15 giorni.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE--DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE - DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

25%

1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua

2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti

3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore

4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ed...

5) aggiungere la restante parte d'acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

CUPROSSIL

FUNGICIDA POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Rame metallo puro g 50
(soffo forma di ossicloruro)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: nocivo per inalazione e ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. – Non gettare i residui nelle fognature. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa – Modena
ISAGRO Spa – Cavanella Po Adria (RO)

Registrazione n. 4254 del 27/03/1981 del Ministero della Sanità

Kg 1 / 10 / 25 **Partita n.**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **Controindicazioni:** == **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO (dosi per 100 litri d'acqua)
Il CUPROSSIL è un ossicloruro tetraramico che ha dimostrato di poter svolgere un'attività fungicida pari a quella della poltiglia bordolese col vantaggio che la sua preparazione per l'uso è molto più sbrigativa.
Frutticoltura: a fine inverno, contro la Ticchiolatura del melo e del pero gr. 300-500. Contro il Cancro dei rametti del pesco alla caduta delle foglie gr. 500-700.
Viticoltura: contro la Peronospora della vite gr. 300-400.
Orticoltura: contro la Peronospora ed Alternaria della patata e del pomodoro, contro la Batteriosi del pomodoro, contro la Septoriosi e la Batteriosi del sedano gr. 250-350. Contro la Peronospora della cipolla gr. 300-400.
Olivicoltura: contro l'Occhio del Pavone dell'olivo gr. 300-500.
Bieticoltura: contro la Peronospora e Cercospora della bietola gr. 400-500.
COMPATIBILITA': il Cuprossil non è compatibile con antiparassitari a base di Thiram e con quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco e varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibile il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO: osservare un intervallo di 20 gg. tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

FLUWEED

ERBICIDA SELETTIVO DELLE COLTURE ORTICOLE, ERBACEEE, ARBOREE E PIANTE ORNAMENTALI IN LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Trifluralin puro g 44,5 (= 460 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature.- Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA Spa - Torrenieri Fraz.Montalcino (Siena)
ALTHALLER ITALIA Srl - San Colombano al Lambro (Milano)
Distribuito da: S.I.V.A.M. S.p.A. – Via Scarlatti, 30 - Milano
Registrazione n. 4393 del 25/05/1981 del Ministero della Sanità

Litri 0,100 / 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza**: consultare un Centro Antiveleni.
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
FLUWEED è un diserbante selettivo che combatte le seguenti infestanti: Erba codina (*Alopecurus myosuroides*), Fienarola annua (*Poa annua*), Forasacco delle messi (*Bromus secalinus*), Forasacco dei tetti (*Bromus tectorum*), Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), Pabbio rossastro (*Setaria glauca*), Panicella (*Eragrostis megastachya*), Panico falso (*Setaria viridis*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Sorghetto (*Sorghum halepense*), Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Centocchio comune (*Stellaria media*), Farinello comune (*Chenopodium album*), Ortica minore (*Urtica urens*), Poligono centinodia (*Polygonum aviculare*), Porcellana comune (*Portulaca oleracea*), Tribolo comune (*Tribulus terrestris*). Il FLUWEED viene impiegato sulle seguenti colture:
Asparago: applicare interrando il FLUWEED alla dose di lt. 1,5-2 due settimane prima dell'inizio del taglio dei turioni (non diserbare gli impianti nuovi).
Aglio: interrare il FLUWEED lt. 1 (terreni leggeri) lt. 1,5 (terreni medio impasto) lt. 2 (terreni pesanti ed argillosi) da 20 ad 1 giorno prima della semina.
Carota, Finocchio, Sedano, Prezzemolo: da trapiantare e da seme applicare ed interrare il FLUWEED lt. 1 (terreni leggeri) lt. 1,5 (terreni medio impasto) lt.2 (terreni pesanti ed argillosi) da 20 ad 1 giorno prima della semina o del trapianto.
Cavoli: (da seme e da trapianto) applicare ed interrare il FLUWEED con lt.1 (terreni leggeri) lt. 1,5-2 (terreni medio-impasto e pesanti ed argillosi) da 20 ad 1 giorno prima della semina o del trapianto .
Radicchio da seme: applicare ed interrare il FLUWEED con lt.1 (terreni leggeri) lt. 1,5 (terreni medio impasto) da 20 ad 1 giorno prima della semina.
Cocomero, Cetriolo, Melone: applicare il FLUWEED quando la coltura ha 3-4 foglie bagnando il suolo alla base della pianta ed interrare immediatamente. Impiegare lt.1 (terreni leggeri) lt. 1,5 (terreni medio-impasto) lt. 2 (terreni pesanti e/o argillosi).
Colza, Ravizzone: applicare ed interrare il FLUWEED lt. 1 (terreni leggeri) lt. 1,5 (terreni di medio impasto) lt. 2 (terreni pesanti ed argillosi) da 20 ad 1 giorno prima della semina.
Fagiolo e Fagiolino: applicare ed interrare il FLUWEED lt. 1 (terreni leggeri) lt. 1,5 (terreni medio-impasto) lt. 2 (terreni pesanti ed argillosi) da 20 ad 1 giorno prima della semina.
Pero, Melo, Vite, Arancio, Limone, Mandarino, Cedro, Bergamotto: impianti nuovi: prima dell'impianto applicare ed interrare il FLUWEED con lt. 1 (terreni leggeri) lt. 1,5 (terreni medio-impasto) lt. 2 (terreni pesanti ed argillosi); impianti di due o più anni - applicare ed interrare di FLUWEED lt. 2 per ettaro.
Girasole, Cotone, Arachide e Soia: applicare ed interrare il FLUWEED lt. 1 (terreni leggeri) lt. 1,5 (terreni medio impasto) lt. 2 (terreni pesanti ed argillosi) da 20 ad 1 giorno prima della semina.

Gladiolo: applicare ed interrare il FLUWEED quando i bulbi hanno un diametro di cm. 2,5 circa. Impiegando lt. 1 (terreni leggeri), lt. 1,5 (terreni medio impasto), lt. 2 (terreni pesanti e argillosi) da 20 ad 1 giorno prima della semina.
Indivia, Scarola, Lattuga e Radicchio da trapianto: applicare ed interrare il FLUWEED con lt. 1 (terreni leggeri) lt. 1,5 (terreni medio impasto) lt. 2 (terreni pesanti ed argillosi) da 20 ad 1 giorno prima della semina.
Patata: applicare il FLUWEED dopo la messa a dimora dei tuberi ed incorporarlo nel terreno senza danneggiare il seme. Usare lt. 1 (terreni leggeri) lt. 1,5 (terreni medio impasto) lt. 2 (terreno pesante ed argilloso).
Pisello: applicare ed interrare il prodotto da 20 a 1 giorno prima della semina, con lt. 1,200 di prodotto per ettaro.
Pomodoro, Peperone da trapianto: applicare ed interrare il FLUWEED lt. 1 (terreni leggeri) lt. 1,5 (terreni medio impasto) lt. 2 (terreni pesanti ed argillosi) da 20 ad 1 giorno prima del trapianto.
Pomodoro da seme: applicare il prodotto nelle interfile alla base delle piantine nel periodo del diradamento. Interrarlo subito impiegando lt. 1 (terreni leggeri) lt. 1,5 (terreni medio impasto) lt. 2 (terreni pesanti ed argillosi).
Grano-Orzo: viene impiegato in pre e post-emergenza delle colture senza incorporazione nel terreno, alla dose di litri 1,5 per ettaro in 400-600 litri d'acqua. Il seme della coltura deve essere interrato ad almeno cm. 3 di profondità per evitare possibili danni.
COMPATIBILITA': FLUWEED è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari eccezion fatta per quelli a reazione alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza può lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. **Istruzioni speciali:** qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del Trifluralin e la seguente semina di frumento, orzo, segale, masi, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocomero, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza e cavoli, spinacio. Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc.), nella primavera successiva all'applicazione del prodotto. Non deve essere applicata in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.
FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta quando è impiegato in post-emergenza.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

EPTANE L

Insetticida-Aficida in liquido emulsionabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Endosulfan puro g 32,9 (= 355 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100
(contiene Xilene)

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui art. 25 del DPR 23 Aprile 2001, n.290.
FRASI DI RISCHIO: infiammabile. - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. – Nocivo per inalazione. -Irritante per la pelle. – Rischio di gravi lesioni oculari. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. – Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. – Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena
Registrazione n. 4806 del 21/05/1982 del Ministero della Sanità

L 0,250 / 1 / 5 **Partita n.**

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica. Barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino all'eliminazione completa. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO (dosi per 100 litri d'acqua)
L'EPTANE L é un insetticida che agisce per contatto e per ingestione. Il prodotto va conservato in locale asciutto e fresco e protetto dal freddo nel periodo in cui si possono temere gelate.
L'EPTANE L trova applicazione durante tutto il periodo vegetativo (escluso fioritura) e alla comparsa dei Fitofagi.
Frutticoltura (melo, pero, pesco, mandorlo, nocciolo): contro Psilla del pero e melo, Afide verde ed altri afidi, Litocollete e altri minatori delle pomacee, Ricamatrici, Ciccadelle Tentredini, Maggiolini, Antonomo del pero e del melo, Tignola del pesco, Mosca della frutta, Tingidi, Fillobio, Eulia, Balanino, Aplidia, Anomala, Maggiolini e Eriofidi ml/hl 150-200. Per il Pesco sono ammessi al massimo n.3 trattamenti all'anno.
Vite: contro Tignola dell'uva, Sigaraio, Tripidi, Cicaline ml/hl 150-170. Sono ammessi al massimo n.2 trattamenti all'anno.
Orticoltura: (pomodoro, patata, melone): contro Dorifora, Afidi del pomodoro, della patata e melone, Altiche, Cavolaie, Antonomo, Punteruolo, Eriofide delle fragole ml/hl 150.
Barbabietola da zucchero: Altica, Cleono, Lisso, Afidi, Cassida, Mamestra ml/hl 200-300 (litri 1,2-1,5 per ettaro).
Agrumi: (arancio, clementino, mandarino, limone, cedro, pompelmo, mandarancio, arancio amaro, bergamotto): contro Cocciniglie, Afidi, Tripidi, Cimici ml/hl 150. Sono ammessi al massimo n.2 trattamenti all'anno.
Erba medica: contro Fitonomi, Apion, Sitone, Fitodecta, Misurino, Nottue, Afidi, Sputacchina litri 1,2-1,5 per ettaro
COMPATIBILITA': L'EPTANE L é incompatibile con le poltiglie solfocalciche e bordolesi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': é tossico per animali domestici, insetti utili, pesci e bestiame. Non immettere nel campo trattato pollame e bestiame prima di 25 giorni, non preparare la soluzione in prossimità di corsi d'acqua.
INTERVALLO DI SICUREZZA: tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo osservare un intervallo di 28 giorni per la Vite e 25 giorni per le colture restanti.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

DIMELFAN

Insetticida liquido emulsionabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Dimetoato puro		**g**	**9,5 (= 103 g/l)**
- Endosulfan puro		**g**	**23,5 (= 255 g/l)**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g**	**100**

(contiene Xilene)

FRASI DI RISCHIO: infiammabile. - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. - Irritante per gli occhi e la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: **SCAM Spa - Modena** **BAYER Cropscience Srl - Filago (BG)**
ISAGRO Spa - Aprilia (LT)
DIACHEM Spa - Albano S.Alessandro (BG)

Registrazione n. 4849 del 19/06/1982 del Ministero della Sanità

L 1 / 5 /10 **Partita n.**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: DIMETOATO 9,5%; ENDOSULFAN 23,5%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: **DIMETOATO - Sintomi:** colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, Edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **ENDOSULFAN - Sintomi:** cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni. **Terapia :** sintomatica (per il Dimetoato poco efficace la pralidossima). **Controindicazioni:** ENDOSULFAN - per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO: (dosi per 100 litri di acqua) il DIMELFAN é un insetticida che agisce per contatto, ingestione e per via citotropica contro i parassiti ad apparato boccale masticatore e succhiatore. Possiede uno spettro d'azione molto ampio e colpisce anche gli insetti situati nelle anfrattuosità e negli accartocciamenti fogliari. Indicato sulle seguenti colture: **Agrumi (non in produzione):** (arancio, mandarino, mandarancio, limone, cedro, bergamotto). Contro il Dialeuroide (farfallina bianca), Cocciniglia bianca, rossa e cotonosa ml. 140-185. **Melo, Pero (non in produzione):** contro Antonomo, ml .95-140, Afide verde, Tentredini, Cemiostoma e Litocollete ml. 110-140, Psilla ml. 140-185, Mosca della frutta ml. 140. **Barbabietola da zucchero:** contro Altiche, Cleono e Nottue ml. 150-200. Tutte le dosi sono riferite per q.le di acqua salvo diversa indicazione.
COMPATIBILITA': il DIMELFAN é incompatibile con la poltiglia solfocalcica e bordolese.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': è tossico per gli animali domestici, insetti utili, pesci e bestiame. Non immettere nel campo trattato pollame e bestiame prima di 25 giorni, non preparare la soluzione in prossimità di corsi d'acqua.
INTERVALLO DI SICUREZZA: osservare un intervallo di 20 giorni per la Barbabietola da zucchero.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

ARPEL TRIPLO BLU

Fungicida sistemico e di contatto, ad azione preventiva e curativa, per la lotta contro la Peronospora della vite, del pomodoro (fino alla prima fioritura) e del tabacco in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- **Fosetil-Alluminio** puro g 32,5
- **Cimoxanil** puro g 2,5
- **Mancozeb** puro g 25
- **Coformulanti** q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: irritante per le vie respiratorie. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena
Registrazione n. 5154 del 22/12/1982 del Ministero della Sanità

Kg 0,4 / 1 / 5 / 10 **Partita n. :**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi d'associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO puro 32,5%; CIMOXANIL puro 2,5%, MANCOZEB puro 25% le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: FOSETIL ALLUMINIO – **Sintomi**: == CIMOXANIL – Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. MANCOZEB – **Sintomi**: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. **Terapia:** sintomatica. **Controindicazioni:** === **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE
ARPEL TRIPLO BLU è un fungicida antiperonosporico che unisce le proprietà sistemiche del Fosetil-Alluminio, le caratteristiche di citotropicità del Cimoxanil e l'azione di contatto del Mancozeb. ARPEL TRIPLO BLU possiede attività preventiva e curativa, essendo in grado di inibire lo sviluppo del patogeno entro 2 giorni dal momento dell'infezione. ARPEL TRIPLO BLU è caratterizzato da una lunga persistenza d'azione che consente interventi a cadenza fissa assicurando la protezione sia la vegetazione presente al momento del trattamento che quella formatasi successivamente.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Colture	**Parassiti**	**Dosi**	**Applicazione**
VITE	Peronospora	400 g/hl (4 Kg/Ha)	Iniziare i trattamenti quando si verificano le prime condizioni favorevoli allo sviluppo della peronospora; proseguire quindi le applicazioni a cadenza di 12 giorni. Nei casi di andamento stagionale particolarmente piovoso ed in presenza di elevata pressione della malattia accorciare l'intervallo a 10 giorni.
POMODORO (fino alla prima fioritura)	Peronospora	400 g/hl	Trattamenti preventivi ogni 10-12 giorni
TABACCO	Peronospora	4 Kg/Ha	Interventi preventivi ogni 10-12 giorni

Nella preparazione della miscela diluire la quantità di prodotto occorrente in poca acqua e mescolare fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Versare quindi nel serbatoio dell'irroratrice e portare a volume di distribuzione mantenendo in funzione l'agitatore.
COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con gli olii minerali. In caso di miscela con concimi fogliari si consiglia di procedere a saggi preliminari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

ARPEL TRIPLO BLU

Fungicida sistemico e di contatto, ad azione preventiva e curativa, per la lotta contro la Peronospora della vite, del pomodoro (fino alla prima fioritura) e del tabacco in polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Fosetil alluminio puro g 32,5
- Cimoxanil puro g 2,5
- Mancozeb puro g 25
- Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Da sciogliere in acqua senza rompere

Contenuto 400 g – 2 Kg

Avvertenza: leggere l'etichetta riportata sulla confezione prima di utilizzare il prodotto

DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164
41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Registrazione n. 5154 del 22/12/1982 del Ministero della Sanità

ARPEL TRIPLO BLU

Fungicida sistemico e di contatto, ad azione preventiva e curativa, per la lotta contro la Peronospora della vite, del pomodoro (fino alla prima fioritura) e del tabacco in polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:

- **Fosetil-Alluminio** puro g 32,5
- **Cimoxanil** puro g 2,5
- **Mancozeb** puro g 25
- **Coformulanti** q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: irritante per le vie respiratorie. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena
Registrazione n. 5154 del 22/12/1982 del Ministero della Sanità

Kg 2 = (5 sacchetti da 400 g) Kg 4 = (10 sacchetti da 400 g) **Partita n. :**
Kg 8 = (4 sacchetti da 2 kg)

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi d'associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO puro 32,5%; CIMOXANIL puro 2,5%, MANCOZEB puro 25% le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: FOSETIL ALLUMINIO – **Sintomi**: == CIMOXANIL – Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. MANCOZEB – **Sintomi**: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. **Terapia**: sintomatica. **Controindicazioni**: === **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE ARPEL TRIPLO BLU è un fungicida antiperonosporico che unisce le proprietà sistemiche del Fosetil-Alluminio, le caratteristiche di citotropicità del Cimoxanil e l'azione di contatto del Mancozeb. ARPEL TRIPLO BLU possiede attività preventiva e curativa, essendo in grado di inibire lo sviluppo del patogeno entro 2 giorni dal momento dell'infezione. ARPEL TRIPLO BLU è caratterizzato da una lunga persistenza d'azione che consente interventi a cadenza fissa assicurando la protezione sia la vegetazione presente al momento del trattamento che quella formatasi successivamente.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Colture	Parassiti	Dosi	Applicazione
VITE	Peronospora	400 g/hl (4 Kg/Ha)	Iniziare i trattamenti cuando si verificano le prime condizioni favorevoli allo sviluppo della peronospora; proseguire quindi le applicazioni a cadenza di 12 giorni. Nei casi di ancamento stagionale particolarmente piovoso ed in presenza di elevata pressione della malattia accorciare l'intervallo a 10 giorni.
POMODORO (fino alla prima fioritura)	Peronospora	400 g/hl	Trattamenti preventivi ogni 10-12 giorni
TABACCO	Peronospora	4 Kg/Ha	Interventi preventivi ogni 10-12 giorni

Nella preparazione della miscela diluire la quantità di prodotto occorrente in poca acqua e mescolare fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Versare quindi nel serbatoio dell'irroratrice e portare a volume di distribuzione mantenendo in funzione l'agitatore.
COMPATIBILITÀ': il prodotto non è compatibile con gli olii minerali. In caso di miscela con concimi fogliari si consiglia di procedere a saggi preliminari.
AVVERTENZA D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all'introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione chiudere bene la scatola. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE - NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE - Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - DA NON VENDERE NE CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE-DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE**

25%

1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua

2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti

3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore

4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ed...

5) ... aggiungere la restante parte d'acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

TOXENE L

INSETTICIDA LIQUIDO SOLUBILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- TRICLORFON puro g 39,6 (= 443 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena

Registrazione n. 5485 del 03/10/1983 del Ministero della Sanità

L 0,100-0,200-0,250-0,500–1–5 -10-20 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare, visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsione, coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO (dosi per 100 litri d'acqua)
Il TOXENE L è un insetticida che agisce per ingestione, viene impiegato su:
Drupacee: contro la Mosca delle ciliegie e della frutta ml. 150-250.
Olivo: contro la Mosca delle olive (nei trattamenti in prossimità del raccolto 15-20 gg. prima); ml. 300-350 contro Tignola dell'olivo ml. 250.
Barbabietola: contro la Mosca della bietola, contro le Nottue ml. 200-300.
Vite: contro la Tignola dell'uva, l'Eulia ml. 200-250.
Radici e Tuberi da alimentazione: contro la Mosca del sedano e Dorifora della patata ml. 200-300.
Cereali: riso contro Coppetta, Idrocampo, Chironomidi ed altri insetti della risaia lt. 1-1,2 Ha. Occorre mantenere il livello dell'acqua per 2-3 gg. a 4-6 cm. dopo il trattamento.
Colture forestali: contro l'Ozziorinco del pioppo e la Processionaria del pino ml. 350-500.
COMPATIBILITA': il TOXENE L è incompatibile con le poltiglie solfocalciche e bordolesi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA': è tossico per gli animali domestici, insetti utili e bestiame. Non immettere nel campo trattato pollame, bestiame prima di 10 giorni. Non preparare la soluzione in prossimità di corsi d'acqua.
INTERVALLO DI SICUREZZA: osservare un intervallo di 10 gg. tra l'ultimo trattamento e la raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

EMISCAM

AFICIDA IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Pirimicarb puro g 23,75
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: nocivo per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM S.p.a. - Modena
ISAGRO Spa - Aprilia (LT)

Registrazione n. 5547 del 29/11/1983 del Ministero della Sanità

kg 0,100 / 0,200 /0,250 /0,500 /0,900 /1 /1,200 /5 /10 /20 **Partita n.:**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore della acetilcolesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia , può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia:
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.**Terapia :** atropina. **Controindicazioni:** ossime. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO : (dose per 100 litri di acqua)
L'EMISCAM è un aficida specifico caratterizzato da una notevole prontezza d'azione.
Contro tutti gli Afidi alla dose di g 100-150 da usarsi sulle seguenti colture:
Agrumi: (arancio, mandarino, mandarancio, limone, cedro, bergamotto);
Frutticoltura: (melo, pero, pesco, ciliegio, susino, albicocco, mandorlo);
Orticoltura: (insalate, lattughe, cicorie, pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, zucchino, cetriolo, fagiolino, fagiolo pisello;
Cereali: (frumento, orzo, mais).
COMPATIBILITA': è compatibile con tutti i formulati.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli insetti utili, è nocivo per gli animali domestici, pesci e bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA : osservare un intervallo di 14 giorni dall'ultimo trattamento alla raccolta .
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

EMISCAM

AFICIDA IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Pirimicarb puro g 23,75
- Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Da sciogliere in acqua senza rompere

Contenuto 300 g

Avvertenza: leggere l'etichetta riportata sulla confezione prima di utilizzare il prodotto

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164
41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Registrazione n. 5547 del 29/11/1983 del Ministero della Sanità

EMISCAM

AFICIDA IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Pirimicarb puro	**g**	**23,75**
- Coformulanti	**q.b. a g**	**100**

FRASI DI RISCHIO: nocivo per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM S.p.a. - Modena
ISAGRO S.p.A. - Aprilia (LT)

Registrazione n. 5547 del 29/11/83 del Ministero della Sanità

Kg 0,900 (=3 sacchetti da 300 g), 1,200 (= 4 sacchetti da 300 g) **Partita n.:**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: inibitore della acetilcolesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia , può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. **Sintomi muscarinici:** disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia. **Sintomi nicotinici:** tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia , paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. **Terapia :** atropina. **Controindicazioni:** ossime. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO : (dose per 100 litri di acqua)
L'EMISCAM è un aficida specifico caratterizzato da una notevole prontezza d'azione. Contro tutti gli Afidi alla dose di g 100-150 da usarsi sulle seguenti colture: **Agrumi:** (arancio, mandarino, mandarancio, limone,cedro,bergamotto); **Frutticoltura:** (melo, pero, pesco, ciliegio, susino, albicocco, mandorlo); **Orticoltura:** (insalate, lattughe, cicorie, pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, zucchino, cetriolo, fagiolino, fagiolo pisello; **Cereali:** (frumento, orzo, mais).
COMPATIBILITA': è compatibile con tutti i formulati. **AVVERTENZA D'USO:** nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all'introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione chiudere bene la scatola.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
RISCHI DI NOCIVITA' : il prodotto è tossico per gli insetti utili, è nocivo per gli animali domestici, pesci e bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA : osservare un intervallo di 14 giorni dall'ultimo trattamento alla raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO -DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE - NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE -
EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE - DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE.

25%

1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua

2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti

3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore

4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ecc...

5) ...aggiungere la restante parte d'acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

TIOWETTING 60

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

- Zolfo puro (esente da selenio) **g 59,70**
- Coformulanti e inerti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa – Modena

Registrazione n. 5585 del 15/11/1983 del Ministero della Sanità

Kg 0,1 / 0,2 / 0,25 / 0,5 / 1 / 5 / 10 / 20 / 25 **Partita n.:**

NFORMAZIONI PER IL MEDICO In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.
MODALITA' e CAMPI D'IMPIEGO (dosi per 100 litri d'acqua)
Il TIOWETTING 60 è uno zolfo in polvere bagnabile che può essere impiegato a dosi elevate senza creare problemi di fitotossicità, alle alte temperature.
Pomacee: melo, pero, contro l'oidio e azione complementare contro la ticchiolatura g 300-400.
Drupacee: pesco, albicocco, susino, mandorlo, contro l'oidio g 200-400.
Vite: uve da tavola e da vino contro l'0idio g. 300-400 nei primi trattamenti, g 200 con l'aumentare della temperatura.
Ortaggi a frutto: cucurbitacee, melone, zucchino, cetriolo, contro l'Oidio g 200-300, solanacee, pomodoro, g. 200, legumi, pisello g 200.
Cereali: frumento, orzo, avena, segale contro l'Oidio Kg. 6-8 ad Ha.
Floricoltura: in pieno campo contro l'Oidio della rosa, ortensia, crisantemo g 200-300.

COMPATIBILITA': non è compatibile con polisolfuri, poltiglia bordolese, con oli minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacryl, Diclofluanide. Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': può arrecare danno alle seguenti cultivar di mele - Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap; Pere – Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Oliver de Serres, William, Decana del Comizio; Vite – Sangiovese; Cucurbitacee può essere fitotossico.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

ZOCOLD 80

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Zolfo puro (esente da selenio)		**g 80**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g 100**

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano-Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM S.p.a. - Modena

Registrazione n. 5600 del 15/11/1983 del Ministero della Sanità

Kg 0,100 / 0,200/ 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10 / 20 / 25 **Partita n.**

INOFORMAZIONE PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interveneti di pronto soccorso. **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza**: consultare un centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO: (dosi per 100 litri d'acqua)
Lo ZOCOLD 80 è uno zolfo colloidale. La formulazione colloidale assicura elevata attività contro l'Oidio o Mal Bianco delle colture sotto indicate:
Pomacee: melo e pero contro l'Oidio g. 80-100.
Drupacee: pesco, albicocco, susino, mandorlo contro l'Oidio g. 80-100.
Vite: uve da vino e da tavola contro l'Oidio g 80-100.
Ortaggi a frutto: **Cucurbitacee**: melone, zucchino, cetriolo, contro l'Oidio g. 80-100.
Cereali: Frumento, segale, orzo, avena contro l'Oidio Kg. 5 ad Ha.
Floricoltura: in pieno campo contro l'Oidio della rosa, ortensia, e crisantemo g. 80-100.
COMPATIBILITA': non è compatibile con polisolfuri, poltiglia bordolese, oli minerali, captano, DDVP, Binapacril, Dicofluanide, deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualosa si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
Mele: Black Ben Davis, Black Stayman, Cavilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.
Pere: Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Oliveri de Serres, William, Decana del Comizio.
Vite: Sangiovese.
Cucurbitacee: può essere fitotossico.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 5 gg. prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

BAGNANTE SCAM

COADIUVANTE PER PRODOTTI FITOSANITARI
LIQUIDO SOLUBILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Alcool grasso etossilato puro g 10 (= 100 g/l)
- Coadiuvanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO : rischio di gravi lesioni oculari.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena

Reg. n. 5657 del 2/02/1984 del Ministero della Sanità

Litri 0,100 / 0,200 / 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10 / 20 / 25 **Partita n.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il BAGNANTE SCAM è un formulato non ionico che aumenta il potere "bagnante" delle poltiglie antiparassitarie.
Aggiunto alle miscele da distribuire riduce la tensione superficiale dell'acqua, migliora la sospensibilità e la miscibilità dei formulati assicurando una uniforme distribuzione sulla superficie fogliare dei principi attivi irrorati.
Il BAGNANTE SCAM esplica anche una azione adesivante; è quindi consigliabile impiegarlo unitamente a prodotti destinati al trattamento di colture come cipolle, cavolo, garofano,ecc., dove la natura delle superfici fogliari è di ostacolo ad una buona "bagnabilità" delle stesse.

Il BAGNANTE SCAM va impiegato, in aggiunta alle poltiglie anticrittogamiche e insetticide, alla dose di 30-50 ml/hl. Negli impieghi unitamente ad erbicidi ad applicazione fogliare, aumentare la dose di BAGNANTE SCAM a 100-200 ml/hl

COMPATIBILITA'
Il BAGNANTE SCAM è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari.
INTERVALLO
Viene rispettato il tempo di intervallo del formulato miscelato con il BAGNANTE SCAM.
INDICAZIONE D'IMPIEGO
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

GIBERLAN C

FITOREGOLATORE IN COMPRESSE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Acido gibberellico puro		**g 9**
- Diluenti e coadiuvanti	**q.b. a**	**g 100**

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
MODALITÀ D'IMPIEGO: (dosi per 100 litri d'acqua)
Il GIBERLAN C é un regolatore di crescita vegetale che trova impiego su molte piante coltivate, facendone aumentare la produzione.
Pero:
per favorire l'allegazione, quando il 20-30% dei fiori é aperto, a 2 g/hl; per evitare danni da gelate, trattare entro 48 ore dalla gelata con 2-3 g/hl.
Vite:
per prevenire l'acinellatura e allungare il rachide, trattare i bottoni fiorali 10 gg. prima della fioritura o 10 gg. dopo con 2 g/hl.
Agrumi:
per le arance, trattare i frutti in maturazione con g. 0,5-0,6/hl; usare 5000 l. di soluzione per Ha. Per i limoni, spruzzare i frutti subito dopo che sono diventati gialli con g. 0,6/hl; usare 5000 l. di soluzione ad Ha.
I trattamenti migliorano la qualità dei frutti (buccia più liscia). Per mandarini e clementini, spruzzare i fiori con 1 g. per 100 l. d'acqua, per diminuire la cascola dei frutti.
Patata
da seme: immergere i tuberi interi o tagliati nella soluzione per 10 minuti con 0,5 g. per 100 litri di acqua, se interi e 0,1 g. se tagliati. Si ottiene una crescita più rapida e un maggior raccolto.
Fragola:
trattare 30-40 gg. prima della fioritura, sotto serra, con 2,5-5 g/100 l. utilizzando 500-600 l/Ha.
Favorisce precocità di maturazione, maggiore produzione e frutti più grossi.
Carciofi:
trattare alla formazione del capolino centrale con 1-2 g per 100 l. d'acqua, utilizzando 500 l. d'acqua per Ha. Induce anticipo di maturazione, capolini di maggior pezzatura.
Fiori in pieno campo o in serra:
Rose: trattare alla comparsa dei primi getti con 1 g. per 100 l. d'acqua. Si ottengono fiori più precoci e di maggior dimensioni, rose intensamente colorate e con lungo stelo.
Iris, crisantemo, gladiolo: trattare con 1 g. per 100 l. d'acqua. Si ottengono fiori più precoci ed uniformità di fioritura.
COMPATIBILITA': é incompatibile con tutti i prodotti antiparassitari e pertanto evitare la miscela con altri formulati.
INTERVALLO AL CONSUMO: sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano-Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione:
AGRINDUSTRIAL S.A. - Carretera dei medio 193, nave 4, Hospitalet de Llobregat - Barcellona (Spagna)
ICI Plant Protection Division - Yalding, Kent (Inghilterra)
FAL Fine Agrochemicals Ltd - Hill End House - Whittington Worcester WR5 2RL - (Inghilterra)
Registrazione n. 6058 del 8/10/1984 del Ministero della Sanità

kg 0,100 **Partita n.**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

SUGARBETA

Erbicida selettivo di post-emergenza per la coltura della Barbabietola da zucchero, da foraggio e Spinacio in emulsione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Fenmedifam puro		**g 15,9**	**(= 157,4 g/l)**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g 100**	

(contiene Isoforone)

FRASI DI RISCHIO: nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini . Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena
Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Wolfenbuttel (Germania)
Registrazione n. 6124 del 8/11/1984 del Ministero della Sanità

Litri 20/10/5/4/1/0,5/0,25/0,1
Partita n.

Norme precauzionali: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Informazioni per il medico: sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari **Sintomi muscarinici (di prima comparsa):** nausea, vomito crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolare. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali:** confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte:** generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7 15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia** : atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Avvertenze**: consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO SUGARBETA è un erbicida selettivo di post-emergenza che viene impiegato per il diserbo della barbabietola da zucchero, da foraggio e lo spinacio. SUGARBETA controlla le seguenti infestanti a foglia larga: Anagallide (*Anagallis arvensis*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Farinaccio (*Chenopodium spp.*), Erba mercurella (*Mercurialis annua*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Aspraggine (*Picris echioides*), Convolvolo nero (*Poligonum convolvolus*), Erba porcellana (*Portulaca aleracea*), Rafano (*Raphanus raphanistrum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Erba Calderina (*Senecio ulgaris*), Cicerbita (*Souchus aleraceus*), Centocchio (*Stellaria media*), Veronica (*Veronica spp.*). **Barbabietola da zucchero e da foraggio: a) Tecnica delle "dosi molto ridotte" o "Microdosi" ("DMR"):** SUGARBETA va impiegato alla dose di 0,5-0,7 l/ha intervenendo alla primissima comparsa delle infestanti, qualunque sia lo stadio di sviluppo della Barbabietola. L'intervento va ripetuto per altre 2-3 volte a cadenze di 7-10 giorni in funzione dell'emergenza delle malerbe. Per ampliare lo spettro di efficacia è possibile impiegare SUGARBETA in combinazione con Etofumesate (0,5-0,7 l/ha di formulato commerciale al 21,1%) Lenacil (0,1-0,2 kg/ha di formulato commerciale all'80%), Metamitron (0,5-0,7 kg/ha di formulato commerciale al 70%), Cloridazon (0,5-0,7 kg/ha di formulato commerciale al 65%). Al fine di assicurare la migliore efficacia del trattamento impiegare volumi d'acqua compresi tra 100 e 150 l/ha. **b) Tecnica del trattamento "frazionato":** SUGARBETA va impiegato: 1) alla fase di sviluppo dei cotiledoni alla dose di 2,0-3,0 l/ha. 2) alla fase compresa tra le 2 e le 4 foglie vere (a circa 10 giorni di distanza dalla prima applicazione) alla dose di. 2,5-3,5 l /ha. Per ampliare lo spettro di efficacia è possibile impiegare SUGARBETA in combinazione con Etofumesate (1,0-1,5 l/ha di formulato commerciale al 21,1%), Lenacil (0,2 kg/ha di formulato commerciale all'80%), Metamitron (1,0-1,5 kg/ha di formulato commerciale al 70%), Cloridazon (1,0-1,5 kg/ha di formulato commerciale al 65%). Impiegare volumi d'acqua compresi tra 200 e 300 l/ha. **c) Tecnica del trattamento "unico":** SUGARBETA va impiegato alla dose di 4,0-6,0 l/ha quando la Barbabietola si trova tra le 2 e le 4 foglie vere con infestanti entro lo stadio di sensibilità. Per ampliare lo spettro di efficacia è possibile impiegare SUGARBETA in combinazione con Etofumesate (2,0-2.5 kg/ha di formulato commerciale al 21,1%), Lenacil (0,2 kg/ha di formulato commerciale all'80%), Metamitron (2,0-2,5 kg/ha di formulato commerciale al 70%), Cloridazon (2,0-2,5 kg/ha di formulato commerciale al 65%). Utilizzare volumi d'acqua pari a 300-400 l/ha. In presenza di infestanti "difficili" quali Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Sedano selvatico (*Ammi majus*), Stoppione (*Cirsium arvense*), ecc. è consigliabile utilizzare SUGARBETA in miscela con formulati a base di CLOPIRALID (0,8-1,2 l/ha di formulato commerciale al 9,5%) o TRIFLUSULFURON-METIL (40 g/ha di formulato commerciale al 50%). In tutti i casi l'aggiunta di olio bianco (0,3-0,5 l/ha) favorisce l'efficacia dell'intervento. **Spinacio**: SUGARBETA va impiegato quando la coltura ha raggiunto lo stadio delle 2-4 foglie vere alla dose di 3,0-4,0 l/ha. Per ampliare lo spettro d'azione è consigliabile aggiungere Lenacil (0,4-0,5 kg/ha di formulato commerciale all'80%).
COMPATIBILITA': il formulato è miscibile con i prodotti fitosanitari comunemente impiegati nel diserbo della barbabietola e dello spinacio ad esclusione di quelli a reazione fortemente alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. **FITOTOSSICITA':** il prodotto può essere fitotossico per le colture non riportate in etichetta. E' consigliabile evitare di intervenire con temperature elevate su colture sofferenti per siccità, danni da insetti o altre cause.
INTERVALLO: Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta dello spinacio.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE -
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO-NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

BEST-FL

DISERBANTE DI POST-EMERGENZA CONTRO IL GIAVONE ED ALTRE INFESTANTI DEL RISO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- PROPANIL puro g 35,0 (= 375 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena
DIACHEM Spa – Caravaggio (BG)
Registrazione n. 6284 del 14/03/1985 del Ministero della Sanità

L 1-5-10-25-50 **Partita n.**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure. **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza**: consultare un Centro Antiveleni.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO BEST-FL è un erbicida selettivo di post-emergenza del riso che agisce prevalentemente per contatto e, più limitatamente per assorbimento fogliare e radicale. E' particolarmente efficace contro i Giavoni (*Echinocloa crus-galli* e specie affini) e nei confronti di numerose specie di Ciperacee e Alismatacee provenienti da seme. L'attività migliore si esplica su infestanti nei primi stadi di sviluppo ed in fase di attiva crescita. BEST-FL impiega su risaia asciutta, togliendo l'acqua dalle camere 3-4 giorni prima dell'applicazione. Dopo il trattamento mantenere la risaia asciutta per almeno 24 ore, quindi ripristinare il livello dell'acqua mantenendolo il più alto possibile per 6 8 giorni. Successivamente riportare l'acqua ad un livello normale, tale comunque da evitare nuove ricrescite.
BEST-FL si impiega alle seguenti dosi:
Giavoni con 1-3 foglie: 9-10 l/Ha
Giavoni con 3-4 foglie: 11-13 l/Ha
Giavoni dalla 4° foglia all'inizio dell'acestimento: 15-18 l/Ha
Con andamento climatico caratterizzato da basse temperature, i Giavoni possono presentare uno sviluppo fogliare ridotto e un apparato radicale più robusto e profondo; in questo caso è necessario aumentare il dosaggio come segue:
Giavoni con 1-3 foglie: 11-13 l/Ha
Giavoni con 2-4 foglie: 14-17 l/Ha
Utilizzare un volume di acqua di 300-400 l/Ha, sufficiente a garantire una completa ed uniforme bagnatura delle foglie e della guaina delle infestanti, mantenendo la barra di distribuzione il più basso possibile (circa 50 cm da terra). Nel caso di interventi su Giavoni particolarmente sviulppati è opportuno aumentare il volume di acqua distribuito. Non trattare su piante bagnate o in presenza di rugiada.
COMPATIBILITA': BEST-FL può essere applicato in miscela con i seguenti erbicidi (Solfoniluree, MCPA, Triclopir, Quinclorac, Bentazone, Pretilaclor). Non deve essere miscelato con fertilizzanti e insetticidi Fosforganici e Carbammati in quanto può dare origine a fenomeni di fitotossicità nei confronti del riso. E' opportuno, anzi, mantenere un intervallo di almeno 5 giorni tra il trattamento con BEST-FL e l'impiego di questi ultimi.
FITOTOSSICITA': non trattare in giornate ventose al fine di evitare che la nube irrorata possa giungere per deriva a contatto con colture limitrofe sensibili al Propanile (leguminose, fruttiferi, vite, orticole in genere). Eventuali sintomi di fitotossicità sulle piantine di riso (ingiallimenti, necrosi degli apici fogliari, ecc.) sono transitori e si risolvono nell'arco d'alcuni giorni senza pregiudicare il normale sviluppo della coltura. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA – DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE – NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE – Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

TALONIL - FL

FUNGICIDA POLIVALENTE IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Clorotalonil puro g 40 (= 500 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui art. 25 del DPR 23 Aprile 2001, n.290.

FRASI DI RISCHIO: molto tossico per inalazione. Irritante per le vie respiratorie. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostragli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM SPA Modena

Registrazione n. 6296 del 13/03/1985 del Ministero della Sanità

Litri 0,1 / 0,2 / 0,25 / 0,5 / 1 / 5 / 10 / 20 **Partita n. :**

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
AVVERTENZA: nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi. Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitosanitario.Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - **Sintomi**: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO Il TALONIL FL è un fungicida con un vasto campo d'azione in grado di controllare numerose specie fungine e con una elevata resistenza al dilavamento e buona attività residuale. Possiede azione preventiva di contatto, ha come effetto collaterale un'azione frenante sullo sviluppo delle popolazioni di acari. MELO-PERO: (impiego previsto solo in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici) contro Ticchiolatura, Oidio, Ruggine e Gleosporium alla dose di lt. 1,2-2 per ettaro e per applicazione. Sono consentite 4 applicazioni massimo annue.
PESCO-SUSINO: (impiego solo in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici) contro Bolla, Corineo, Ruggine, Monilia, Nerume, Fusicocco e Citospora alla cose di lt.1,6-2 per ettaro e per applicazione. Si possono effettuare massimo 4 applicazioni annue. COCOMERO-MELONE-CETRIOLO contro Peronospora, Antracnosi, Vaiolatura, Alternariosi, Cladosporiosi, Botrite e Rizoctonia alla dose di lt. 2 - 3 per ettaro e per applicazione. Si possono effettuare massimo 3 applicazioni annue sia in campo che in serra. POMODORO: contro Peronospora, Alternaria,Cladosporiosi, Botrite, Septoriosi, Rizoctonia e Sclerotinia alla dose di lt. 2-3 per ha e per applicazione. Sono consentite un massimo di tre applicazioni all'anno in campo e cinque applicazioni all'anno in serra. PATATA: contro Peronospora, Alternaria, Cladosporiosi, Septoriosi, Rizoctonia alla dose di lt. 2-3 per ha e per applicazione. Sono consentite un massimo di due applicazioni all'anno. COLTURE FLOREALI-ORNAMENTALI: contro Ticchiolatura, Oidio, Botrite, Ruggini, Antracnosi, Septoriosi, Alternariosi alla dose di ml. 200-250 per ettolitro SEDANO: contro Septoria, Cercospora e Sclerotinia alla dose di lt. 2-3 per ha e per applicazione. Si possono effettuare massimo 3 applicazioni annue sia in campo che in serra.
FAGIOLO-FAGIOLINO-PISELLO contro Peronospora, Alternaria, e Ruggine alla dose di lt. 2-2.4 per ha e per applicazione. Si possono effettuare massimo 2 trattamenti, da effettuarsi fino alla prima fioritura (esclusa). CIPOLLA: contro Alternaria, Botrite e Peronospora alla dose di lt. 2-3 per ha e per applicazione. Sono consentite un massimo di due applicazioni all'anno in pieno campo.
Intervenire preventivamente secondo i normali calendari dei trattamenti. Le dosi sopra indicate si riferiscono a trattamenti con pompe a volume normale. Per la preparazione della poltiglia, stemperare la dose prescelta in poca acqua a parte e versare poi la miscela ottenuta nel totale quantitativo d'acqua, agitando alcuni minuti fino alla formazione di una poltiglia omogenea.
Tempi di rientro: 12 ore dopo l'impiego in campo e 24 ore dopo l'impiego in serra.
COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari in polvere bagnabile, ad eccezione di quelli a reazione alcalina quali Poltiglia Bordolese, Polisolfuri, Calce. La miscela con liquidi emulsionabili é sconsigliata nei casi in cui la compatibilità sia accertata preventivamente.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': il prodotto può provocare rugginosità su alcune varietà di melo a buccia gialla e rossa (Golden). Su colture floreali ed ornamentali prima di trattare eseguire saggi preliminari.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di sedano, pomodoro, cocomero, melone, cetriolo, fagiolo, fagiolino, pisello, cipolla e patata; e 21 giorni prima della raccolta per melo - pero - pesco - susino.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE -IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE - NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE - Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

DIOVAL

FUNGICIDA ORGANICO IN POLVERE BAGNABILE PER LA LOTTA ALLO OIDIO DEL MELO, DELLA VITE, DEL PESCO E DELLE CUCURBITACEE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- FENARIMOL puro g 6
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: possibile rischio di ridotta fertilità. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Possibile rischio per i bambini allattati al seno. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena

Reg. n. 6626 del 18/03/1986 del Ministero della Sanità

Kg 0,1/0,2/0,25/0,5/1/5/10/25 **Partita n.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' e CAMPI DI IMPIEGO: il DIOVAL è un fungicida organico a base di Fenarimol indicato per la lotta contro l'Oidio del melo, vite, pesco e cucurbitacee, e per il controllo della Ticchiolatura del melo.
Il prodotto, applicato alle foglie, viene presto da esse assorbito distribuendosi uniformemente all'interno e sottraendosi all'azione dilavante della pioggia.
Il DIOVAL viene impiegato alle seguenti dosi:
VITE: contro Oidio dell'uva da tavola:
g 20-25 per ettolitro d'acqua fino alla allegagione.
a) g 50-60 per ettolitro d'acqua dopo l'allegagione.
Contro Oidio dell'uva da vino:
a) g. 20-25 per ettolitro d'acqua fino alla allegagione
b) g 30-60 per ettolitro d'acqua dopo l'allegagione.
Effettuare i trattamenti alla vite ad intervalli di 7-10 giorni per quella da tavola e di 7-15 giorni per quella da vino, in funzione dell'andamento stagionale e dell'intensità dell'infezione.
MELO:
a) contro Oidio g 70-80 per ettolitro d'acqua.
Iniziare i trattamenti alla fase di orecchiette di topo, ripetendo il trattamento ad intervalli di 7-10 giorni in funzione dell'intensità dell'infezione.
b) contro Oidio e Ticchiolatura: g 70-80 per ettolitro di acqua, in miscela contemporanea con ORTHOSCAM 50 alla dose di 120-150 g o con DODOSCAM alla dose di 50-60 g, o con Z.M. 80 alla dose di 100-180 g per ettolitro d'acqua.
Intervenire ad intervalli di 7-8 giorni dall'apertura della gemma fino alla fase del frutto noce ed ad intervalli di 8-12 giorni dopo in funzione dell'andamento stagionale e dell'intensità delle infezioni.
PESCO: contro Oidio g 70-80 per ettolitro d'acqua intervenendo alla scamiciatura e 7 giorni dopo. Ripetere i trattamenti alla prima comparsa della malattia ad intervalli di 6-8 giorni in funzione dell'andamento stagionale e all'intensità della malattia.
CUCURBITACEE (Cetriolo, cocomero, melone, zucca e zucchino): contro Oidio g 40-50 per ettolitro d'acqua. Effettuare il trattamento alla prima comparsa della malattia e ripeterlo ad intervalli di 8-12 giorni in funzione dell'andamento stagionale e dell'intensità dell'infezione.
COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con i più comuni fitosanitari ad esclusione di quelli a reazione alcalina (Poltiglia bordolese, Polisolfuri, Calce).
FITOTOSSICITA': si raccomanda di attenersi alle dosi consigliate potendosi avere effetti fitotossici al verificarsi di avverse condizioni climatiche.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per le api.
INTERVALLO AL CONSUMO: sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta delle cucurbitacee, 21 giorni prima della raccolta delle mele e 14 giorni prima della raccolta delle pesche e delle uve.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

DIMIDE

INSETTICIDA PER INGESTIONE IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Diflubenzuron puro		**g**	**5**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g**	**100**

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
DOSI, MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO
Il DIMIDE è un insetticida che inibisce la deposizione di chitina negli insetti, con conseguente morte nella fase di muta. E' efficace per la difesa di piante di Melo e Pero, piante Forestali, Fiori e piante ornamentali.
Il DIMIDE viene impiegato alle seguenti dosi:
FRUTTICOLTURA (Melo – Pero):
- contro Microlepidotteri minatori (Litocollete, Cemiostoma): g 200 – 300 per Ettolitro.
  Effettuare il trattamento durante la fase di volo degli adulti, in corrispondenza dell'ovodeposizione.
- Contro Lepidotteri ricamatori (*Capua, Archips*), Carpocapsa ed Eulia: g 400 per ettolitro.
  Effettuare il trattamento durante la deposizione delle uova o in prossimità della schiusura.
- Contro la Psilla del Pero: g 400 per Ettolitro.
  Effettuare il trattamento alla schiusura delle uova.

PIANTE FORESTALI:
- Contro *Theumetopoea pityocampa* (Processionaria del Pino), *Lymantria dispar, Rhyacionia buoliana, Pristiphora abietina*: g. 250-350 per Ettolitro.

Per la totalità delle colture, si consiglia di effettuare il trattamento in corrispondenza dell'ovodeposizione oppure quando le uova stanno per schiudere.
COMPATIBILITA': il DIMIDE è miscibile con i più comuni antiparassitari, ad eccezione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, poltiglia bordolese).
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 45 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione : SCAM Spa - Modena

Registrazione n. 6790 del 1/10/1986 del Ministero della Sanità

kg 0,2/0,5/1/5/10 **Partita n.**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

CUPROSCAM MZ

Fungicida in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Rame metallo g 30
(sottoforma di ossicloruro tetraramico)
- Mancozeb puro g 10
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa – Modena
ISAGRO Spa – Cavanella Po Adria (RO)

Registrazione n. 7227 del 16/07/1987 del Ministero della Sanità

Kg 1/10/25 **Partita n. :**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive RAME METALLO 30%, MANCOZEB 10%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: RAME METALLO **Sintomi:** denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. MANCOZEB: **Sintomi:** cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa , sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia : sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO (dose per 100 litri d'acqua)
Il CUPROSCAM MZ é un fungicida cuprico, ad azione preventiva, dotato di buona persistenza e di pronta efficacia, viene impiegato sulle seguenti colture:
Vite: contro Peronospora, Antracnosi, Septoria gr. 300-400. **Pomodoro:** (solo fino alla prima fioritura) contro Peronospora, Alternaria, Cladosporio gr. 300-400. **Garofano in pieno campo:** contro la Ruggine ed Alternaria gr. 400. **Pomacee:** contro la Ticchiolatura, Septoria, Alternaria, Ruggine e Glomerella alla dose di gr. 300-350. **Tabacco:** contro la Peronospora alla dose di gr. 300-400. **Semenzai di Tabacco:** contro Phithium alla dose di gr. 30 per mq. in 10 litri d'acqua. **Cereali in campo (Frumento, Orzo, Avena, Segale):** contro Fusarium, Brusone, Carbone, Gibberella, Elmintosporiosi, Carie, Septoria alla dose di kg. 4-5/ha. **Concia anticarie delle sementi di Frumento, Orzo, Cereali minori:** alla dose di gr. 250-300 per q.le di seme.
COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con prodotti solfocalcici, a base alcalina e con olii bianchi..
FITOTOSSICITA': da non impiegare durante la fioritura. Inoltre le seguenti varietà di pero: Abate fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott.Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard. Melo: Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana, King Davis. cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione avvenuta.
NOCIVITÀ': il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 28 giorni.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

MINACID *DOUBLE*

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Metidation puro g 39,4 (= 420 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100
(contiene Xilene)

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui art. 25 del DPR 23 Aprile 2001, n.290.
FRASI DI RISCHIO: infiammabile. Molto tossico per ingestione. Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi e la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM S.p.a. - Modena
Registrazione n. 7246 del 26/11/1987 del Ministero della Sanità

L 0,1/ 0,2 / 0,25 / 0,5 / 1 / 5 / 10 / 20 **Partita n.:**

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO: MINACID *DOUBLE* è un insetticida fosforganico ad ampio spettro di azione che agisce sia per contatto che per ingestione contro insetti ad apparato boccale masticatore o succhiatore. Possiede proprietà citotropiche, potendo penetrare all'interno dei tessuti ed esplicando così la sua azione anche nei confronti di insetti riparati dalle foglie accartocciate (es: afidi, tortricidi, ecc.) o protetti da scudetti (es.: cocciniglie) o secrezioni naturali quali lanuggini e melate. MINACID *DOUBLE* è caratterizzato da una lunga persistenza d'azione e da una efficacia ottimale anche a basse temperature. Può essere impiegato sull'**Olivo:** contro le Cocciniglie (*S. oleae, P. pollini, F. follicularis, ecc.*) Tignola (*P.oleae*) e Tripidi (*D.reuteri*) 120-130 ml/hl. MINACID *DOUBLE* deve essere impiegato esclusivamente nei trattamenti invernali e di prefioritura; per rafforzare l'azione può risultare conveniente aggiungere olio bianco.
COMPATIBILITA': non è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore.
Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi non meno di 20 giorni dal trattamento.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per gli insetti utili, animali domestici e bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 100 giorni prima della raccolta per l'Olivo.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

RESTOSAN

INSETTICIDA LIQUIDO SOLUBILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Metomil puro g 19 (= 190,7 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui art. 25 del DPR 23 Aprile 2001, n.290.

FRASI DI RISCHIO: infiammabile. Molto tossico per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena

Registrazione n. 7261 del 26/11/1987 del Ministero della Sanità

L 0,1 / 0,2 / 0,25 / 0,5 / 1 / 5 / 10 / 20 **Partita n.:**

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. **Sintomi muscarinici:** disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia. **Sintomi nicotinici:** tremori e fribillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. **Terapia:** atropina. **Controindicazioni**: ossime. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: RESTOSAN è un insetticida che agisce per contatto e per ingestione. E' dotato di proprietà citotropiche e translaminari, potendo essere assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato ai tessuti circostanti. Presenta una notevole rapidità di azione ed elevato potere abbattente nei confronti di numerosi insetti dotati di apparato boccale masticatore e succhiatore.
RESTOSAN può essere impiegato sulle seguenti colture: **Melo-Pero:** contro Afidi *(A. pomi, D. plantaginea, D. piry, ecc.)*, Tortricidi Ricamatori *(Archips spp., Adoxophyes spp., Pandemis spp.,ecc.)*, Minatori fogliari *(L. blancardella, ecc.)*, Carpocapsa *(C. pomonella)*, Cidia *(C. molesta)*, Cecidomia *(D. piri, ecc.)* alla dose di 200-250 ml/hl. **Drupacee, Mandorlo:** contro Afidi *(M. persicae, H. amygdali, B. persicae, ecc)*, Minatori fogliari *(P. pomonella, ecc.)*, Tripidi *(T. meridionalis, ecc.)*, Miridi *(C. trivialis, ecc.)*, Cidia *(C. molesta, C. funebrana)*, Anarsia *(A. lineatella)*, Nottue *(P. saucia, ecc)*, Cicaline *(E. rosae, ecc.)*, Mosca della frutta *(C. capitata)*, neanidi di Cocciniglie alla dose di 150-200 ml/hl. **Agrumi, Olivo:** contro Afidi *(A. citricola, T. aurantii, A. gossypii, ecc.)*, Tortricidi *(A. rosanus, P. citri, ecc.)*, Mosca bianca *(T. vaporariorum)*, Tripidi *(H. haemorrhoidalis, ecc.)*, neanidi di Cocciniglie alla dose di 180-200 ml/hl. **Vite:** contro Tignole *(L. botrana, E. ambiguella)*, Eulia *(A. pulchellana)*, Cicaline *(E. flavescens, ecc)*, Metcalfa *(M. pruinosa)*, Nottue *(M. brassicae)*, neanidi di Cocciniglie alla dose di 200 ml/hl. Per la vite (uve da tavola) sono ammessi un massimo di n. 2 trattamenti all'anno. **Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Melone, Cocomero, Zucca, Zucchino, Cavoli (esclusi cavolfiore e cavolo cappuccio), Lattuga, Fagiolo, Pisello:** contro Afidi *(A. gossipii, H. lactucae, M. persicae, A. fabae, B. brassicae, ecc.)*, Nottue *(A. gamma, S. littoralis, H. armigera, M. brassicae, ecc.)*, Dorifora *(L. decemlineata)*, Mosca bianca *(T. vaporariorum, ecc.)*, Tripidi *(T. tabaci, ecc.)*, Limacce *(D. reticularum, ecc.)*, Tipule *(T. paludosa, ecc.)* alla dose di 200-250 ml/hl. **Barbabietola da Zucchero:** contro Altica *(C. tibialis)* alla dose di 1,5 l/Ha. Contro Cleono *(T. mendicus)*, Lisso *(L. junci)*, Atomaria *(A. linearis)*, Mosca *(P. betae,ecc.)*, Afidi *(A. fabae, M. persicae, ecc.)*, Nottue *(Agrotis spp., ecc.)*, Mamestra *(M. brassicae*, ecc.) alla dose di 2,0-2,5 l/Ha. **Tabacco:** contro Afidi *(M. persicae, A. fabae)*, Mosca bianca *(T. vaporariorum)*, Nottue *(Agrotis spp., M. brassicae, ecc.)*, Tipule *(Tipula spp.)*, Crisomela *(E. hirtipennis)* alla dose di 2,0-2,5 l/Ha. **Colture Floreali e Ornamentali:** contro Afidi, Bega, Mosche bianche, Nottue, Tortricidi, Tripidi, Tingidi alla dose di 200-250 ml/hl. **Pioppo:** contro Saperda *(Saperda spp.)*, Tarlo vespa *(P. tabaniformis)*, Criptorrinco *(C. lapathi)*, Gemmaiola *(G. acerina)*, Afidi *(P. passerinii, ecc.)* alla dose di 200-250 ml/hl.
COMPATIBILITA': RESTOSAN non è compatibile con i formulati a reazione fortemente alcalina. **Avvertenze:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci e gli animali domestici. Evitare di contaminare corsi d'acqua, laghi e stagni. Il prodotto è tossico per le api. Evitare i trattamenti nel periodo della fioritura e quando le api frequentano l'area trattata. Tenere lontane durante il trattamento le persone non protette, animali e bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere il trattamento 30 giorni prima della raccolta sulla vite, 14 giorni per la lattuga e 10 giorni su tutte le altre colture. ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO – SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

ALBA - B

Diserbante selettivo granulare per tappeti erbosi per infestanti monocotiledoni (Digitaria e Setaria)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Benfluralin puro g 2,5
- Coformulanti, inerti e disperdenti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena DIACHEM Spa - Albano S.Alessandro (BG)
A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)
Distribuito da: TERRANALISI S.r.l. Via N. Bixio, 6 - Cento (FE)

Registrazione n. 7837 del 20/6/1989 del Ministero della Sanità

Kg 0,100 / 0,250 / 0,500 / 1 / 3 / 5 / 6 / 10 / 25 **Partita n. :**

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
L'ALBA-B è un diserbante granulare particolarmente indicato per la lotta delle infestanti graminacee dei tappeti erbosi (Digitaria spp., Setaria spp., Poa annua). E' un erbicida ad azione antigerminello che agisce sui semi delle infestanti in fase di germinazione, e non controlla pertanto le infestanti già sviluppate. Deve essere impiegato su impianti di tappeti erbosi di almeno un anno di età.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
L' ALBA-B deve essere usato alla dose di kg 90 per ettaro avendo cura di spargere, con adeguate attrezzature, il prodotto uniformemente sulla superficie da trattare. Il periodo migliore per l'applicazione è in primavera, prima della germinazione dei semi delle infestanti precedentemente indicate.

COMPATIBILITA': il prodotto è incompatibile con tutti i formulati fitosanitari. E' compatibile con diserbanti a base di Linuron. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
AVVERTENZA: non applicare il prodotto su tappeti erbosi di nuovo impianto; su tappeti erbosi di Dicondra, di Agrostis, di Cynodon dactylon, fino a che questi sono ben sviluppati perché potrebbe provocare inibizioni alle radici nella fase iniziale di sviluppo; - non impiegare il prodotto quando le infestanti sono già sviluppate.
FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

ALBA - DIS

Diserbante selettivo granulare per tappeti erbosi contro infestanti dicotiledoni

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Dicamba puro		**g**	**0,50**
(sotto forma di sale dimetilamminico puro g 0,61)			
- 2,4 - D puro		**g**	**1,02**
(sotto forma di sale dimetilamminico puro g 1,22)			
- Coformulanti	**q.b. a**	**g**	**100**

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di produzione: DIACHEM SPA - Albano S.Alessandro (BG)
SCAM Spa - Modena
A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)
Distribuito da: TERRANALISI S.r.l. Via N. Bixio,6 - Cento (FE)
Registrazione n. 7839 del 20.6.1989 del Ministero della Sanità

Kg 0,8/1/2/3/5/10/25 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Sintomi di intossicazione: astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti di contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per la dermatosi.
Controindicazioni: è sconsigliata la digitale. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE
L'ALBA-DIS risulta particolarmente indicato per il diserbo dei tappeti erbosi di graminacee (prati all'inglese, campi da golf), nella lotta contro le infestanti a foglia larga (*Cirzium spp.; Convolvolo spp.; Veccia spp.; Ranuncolo spp.; Stellaria spp.; Senape spp.; Solanum spp.; Amaranthus spp.; Papaveri spp.; Camomilla spp*). Il prodotto esplica una completa azione sulle infestanti a foglia larga in qualsiasi stadio del loro sviluppo purché siano in fase attiva di vegetazione. Le epoche migliori per l'intervento vanno pertanto dal mese di marzo fino ad autunno inoltrato.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
L' ALBA-DIS deve essere applicato alla dose di kg 90 per ettaro avendo cura di distribuirlo uniformemente sulla superficie da trattare mediante una adeguata attrezzatura di distribuzione.
Per le infestanti di più difficile controllo può essere effettuato un secondo trattamento ad un intervallo di almeno 3 settimane dal primo. I migliori risultati si ottengono quando il prodotto viene applicato sul prato umido di rugiada al mattino presto o la sera.
COMPATIBILITA': da non miscelare con altri fitosanitari.
FITOTOSSICITA': il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, ecc.
Evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sottoforma di vapori portati dal vento.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è nocivo ai pesci, agli animali domestici e al bestiame.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

SEVILAN - FL

INSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA A LUNGA PERSISTENZA

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Carbaryl puro g 43 (= 495 g/l)
(esente da ß-naftolo)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM S.p.a. - Modena

Registrazione n. 7976 del 04/05/1991 del Ministero della Sanità

L 0,200 - 0,500 - 1 - 5 **Partita n.:**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: CARBARIL inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. **Sintomi muscarinici**: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia. **Sintomi nicotinici**: tremori e fribillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia : atropina. **Controindicazioni:** ossime. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO: il SEVILAN-FL è un insetticida che agisce essenzialmente per contatto e ingestione, particolarmente efficace contro le larve ed apparato boccale masticatore. E' anche indicato contro le cocciniglie. La formulazione flowable assicura una migliore adesività, una dispersione più uniforme e una maggiore resistenza al dilavamento perciò si ha una maggiore attività del fitofarmaco.
Melo e Pero: contro Carpocapsa (verme del melo, pero, noce) Ricamatrici della frutta ml. 100-125.
Drupacee: contro Cidia e Anarsia del pesco ml. 170-210.
Vite: contro le Tignole dell'uva, Sigaraio, larve ricamatrici ml. 125-170.
Olivo: contro la Tignola ml. 125-170 intervenendo in febbraio-marzo, oppure su fiori in aprile-maggio, oppure subito dopo l'allegagione in giugno. Contro Cocciniglia, Mezzograno di Pepe ml. 210 in trattamenti estivi (agosto-settembre).
Agrumi: contro la Tignola ml. 125-170, contro Cocciniglia "mezzograno di pepe", ml. 170-210.
Barbabietola da zucchero: contro l'Altica, Casside e Mamestra ml. 145-170.
Tabacco: contro Nottue ml. 125-170.
Soia: contro la cimice verde ml. 125-170.
Patata: contro Dorifora ml. 125.
Pomodoro, melanzana, peperone: contro Dorifora, Nottue, ml. 125-170.
Ortaggi: insalata, cavoli, carciofo, contro Nottue, Cavolaia ml. 125-170. Contro Depressaria ml. 170-210.
Fragola: contro larve ricamatrici ml. 125-170.
Medica: contro Misurino, Fitonomo, apion, Nottue ml. 170.
Fiori: contro Tortrice o Bega del garofano, Nottue del garofano ml. 170.
Ornamentali: contro Cocciniglie, Tignola, Tortrici ml. 170.
Forestali: contro Cocciniglia, Tortrici, Tignole ml. 170.
Pioppo: contro la Crisomela, Limantria ml. 125-170.
COMPATIBILITA': non è miscibile con olii minerali, polisolfuri e poltiglia bordolese.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA': nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

DISETALIN® - L

ERBICIDA SELETTIVO IN FORMULAZIONE LIQUIDA

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Pendimetalin puro g 31,7 (= 307 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100
® Marchio registrato Scam

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di produzione: SCAM Spa – Modena ISAGRO Spa - Aprilia (LT)
ALTHALLER ITALIA Srl - S.Colombano al Lambro (MI)

Registrazione n. 8020 del 16/03/1992 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: litri 1-5 -10 -20 **Partita n.**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: nell'animale da esperimento si osservano: depressione SNC, dispnea, diuresi, convulsioni. **Terapia:** sintomatica. **AVVERTENZA:** consultare un Centro Antiveleni.
MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO Il DISETALIN-L è un diserbante da distribuire sul terreno ove svolge la sua azione inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli delle più importanti infestanti annuali sia graminacee che dicotiledoni. Le infestanti sono anche controllate nello stadio di plantula a condizione che le graminacee non abbiano superato lo stadio di 1-1,5 foglie e le dicotiledoni le 2-3 foglie vere. GRAMINACEE: Coda di volpe (*Alopecurus spp.*), Agrostide (*Apera spica-venti*), Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), Giavone comune (*Echinocloa spp.*), Loglio (*Lollium spp.*), Giavone americano (*Panicum spp.*) Fienarola (*Poa spp.*), Pabbio (*Setaria spp.*), Sorghetta da seme (*Sorghum halepense*). DICOTILEDONI: Iva (*Ajuga spp.*), Amaranto (*Amaranthus retroflexus*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Atriplice (*Atriplex patula*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Dentaria (*Cardamine spp.*), Peverina (*Cerastium arvense*), Farinaccio (*Chenopodium spp.*), Erba calenzola (*Euphorbia heliscopia*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Attaccamano (*Galium aparine*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Linaria (*Linajola spp.*), Camomilla (*Matricaria camomilla*), Erba mercurella (*Mercurialis annua*), Miosotide (*Myosotis arvensis*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Persicaria (*Poligonum persicaria*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Ranuncolo (*Ranunculus spp.*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Grespino (*Sonchus oleraceus*), Spergola (*Spergula arvensis*), Erba strega (*Stachys spp.*), Centocchio (*Stellaria media*), Erba storna (*Thalaspi spp.*), Ortica (*Urtica spp.*), Veronica (*Veronica spp.*), Viola (*Viola spp.*). DISETALIN-L può essere impiegato sulle seguenti colture: **AGLIO**: 2-4 l/Ha in pre-emergenza e post-emergenza (da 2 foglie); **ARACHIDE**: 4 l/Ha in pre-emergenza; **ASPARAGO** (solo su asparagiaia impiantata): 3-4 l/Ha pre-ricaccio; **CARCIOFO**: 3-4 l/Ha pre-trapianto, pre-ricaccio o su coltura in vegetazione (solo nelle interfile ed intorno ai ceppi); **CAROTA**: 2-4 l/Ha in pre-emergenza e 2-3 l/Ha in post-emergenza (3-4 foglie); **CAVOLI**: 3 - 4 l/Ha in pre-trapianto; **CIPOLLA**: 2-4 l/Ha in pre-emergenza o pre-trapianto (fino ad un giorno prima) e 2-3 l/Ha in post-emergenza (da 2-3 foglie); **FINOCCHIO**: 2-4 l/Ha in pre-emergenza, in pre-trapianto, in post-emergenza o in post-trapianto (non usare su terreni sabbiosi); **GIRASOLE**: 3-4 l/Ha in pre-emergenza; **GRANO, ORZO, SEGALE**: 4 l/Ha in pre-emergenza o in post-emergenza (2-3 foglie); **MAIS**: 3-4 l/Ha in pre-emergenza e 2-3 l/Ha in post-emergenza (2 foglie); **MELANZANA**: 3 l/Ha in pre-trapianto; **PATATA**: 3-4 l/Ha in pre-emergenza; **PEPERONE**: 2-3 l/Ha in pre-trapianto; **PISELLO**: 3-4 l/Ha in pre-emergenza impiegando la dose più alta su colture a semina autunnale; **POMODORO**: 1,5-2 l/Ha in pre-trapianto; **RISO** (solo con semina in asciutta): 4-5 l/Ha in pre-emergenza e 3-4 l/Ha in post-emergenza (da 2-3 foglie prima della sommersione); **FAGIOLO, SOIA**: 2,5-3 l/Ha in pre-semina (incorporato) o in pre-emergenza; **TABACCO**: 3-4 l/Ha in pre-trapianto; **PIOPPO**: 4-5 l/Ha in post-trapianto; **ORNAMENTALI** (anche in vivaio): 3 l/Ha nelle interfile o tra pianta e pianta.
Nelle colture di GIRASOLE, MAIS e TABACCO si suggerisce di aumentare la dose a 4,5 l/Ha in caso di terreni molto argillosi o ricchi di sostanza organica o se si prevedono forti infestazioni di Sorghetta da seme (*S. halepense*), Giavone americano (*Panicum dicothomiflorum*) o di Crucifere. Nelle applicazioni di post-emergenza è necessario intervenire negli stadi in cui le infestanti risultano ancora sensibili.
ISTRUZIONI PER L'USO Effettuare una buona preparazione del letto di semina in modo da operare su terreno privo di zolle e ben livellato, provvedendo ad una eventuale irrigazione se non sopravvengono precipitazioni 7-10 giorni dal trattamento in modo da favorire la penetrazione del prodotto nello strato superficiale del terreno. Effettuare le semine in maniera uniforme e regolare, ad una profondità di almeno 3 cm. per carota, cipolla e riso e di 4 cm per le altre colture avendo cura di evitare che parte dei semi possano rimanere poco interrati o scoperti. Nel caso di colture trapiantate (carciofo, cavoli, finocchio, melanzana, peperone, pomodoro, tabacco) effettuare il trattamento sul terreno ben preparato facendo seguire subito una leggera irrigazione ed attendendo almeno 7-8 giorni prima di procedere al trapianto, dopo il quale va eseguita un'altra leggera irrigazione, in nessun caso si devono rincalzare le piantine prima che siano passati almeno 30 giorni dal trattamento. Nel caso di impianto di pioppi effettuare il trattamento dopo la crisi di trapianto verificando che la corteccia degli astoni nella zona del colletto si'èea integra e ben suberificata. Distribuire DISETALIN - L in un quantitativo di acqua (300-800 l/Ha) sufficiente ad assicurare una completa ed uniforme bagnatura del terreno; distribuire la miscela senza incorporarla (ad eccezione della soia in pre-semina) operando in modo da evitare lacune e/o sovrapposizioni.
Attenzione: debbono trascorrere 6 mesi dal trattamento alla semina di nuove colture. Nessun rischio esiste invece per le successive colture da trapianto. In caso di forte risemine su terreni già trattati con DISETALIN-L effettuare una aratura profonda almeno 20 cm.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': il prodotto svolge la sua azione a carico dei semi e dei germinelli localizzati nello stato superficiale del terreno. Pertanto la selettività verso le colture riportate in etichetta può essere ridotta se forti precipitazioni sopravvengono dopo il trattamento. Nei trattamenti su carciofo, pioppo e ornamentali assicurarsi che, direttamente o per deriva, il prodotto non giunga a contatto di foglie o di parti verdi. DISETALIN-L può essere fitotossico verso le colture non indicate in etichetta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 90 giorni prima della raccolta per GRANO, ORZO, SEGALE, RISO e MAIS; 75 giorni per AGLIO, CIPOLLA, FINOCCHIO, MELANZANA, PEPERONE e POMODORO; 100 giorni per i CAVOLI; 60 giorni per ASPARAGO, CARCIOFO, CAROTA e FAGIOLO.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

CIMORAM

Fungicida in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Cimoxanil puro		**g 4**
- Rame metallo puro (sottoforma di ossicloruro)		**g 38**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g 100**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.- Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena - BAYER Cropscience Srl - Filago (BG)
ISAGRO Spa - Aprilia (LT)

Registrazione n. 8105 del 09/11/1992 del Ministero della Sanità

Kg 0,100/0,250/0,500/1/5/10 **Partita n. :**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive CIMOXANIL 4%, RAME METALLO 38%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: **CIMOXANIL** derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
RAME Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica. **Controindicazioni: ---- Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO CIMORAM è un fungicida efficace contro la Peronospora della vite e di numerose colture orticole ed industriali. L'associazione dei due principi attivi che agiscono sia per penetrazione nei tessuti vegetali (Cimoxanil) che per contatto (Rame) assicura rapidità, persistenza d'azione e resistenza al dilavamento.
CIMORAM è indicato per la protezione delle seguenti colture:
Vite: contro la Peronospora (*P. viticola*) alla dose di 200-300 g/hl, iniziando gli interventi quando si verificano le condizioni (andamento climatico, fase fenologica della coltura, ecc.) favorevoli allo sviluppo delle infezioni primarie e proseguendoli ad intervalli di 6-8 giorni fino a quando persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
Patata, Pomodoro, Lattuga, Spinacio, Melone, Zucchino, Cipolla, Aglio, Porro, Pisello, Carciofo, Girasole, Soia, Tabacco, Rosa: contro la Peronospora (*Phytophtora infestans, Bremia lactucae, Peronospora spinaciae, Pseudoperonospora cubensis, Peronospora schledeni, Phytophtora porri, Peronospora pisi, Peronospora helianthi, Peronospora manshurica, Peronospora tabacina, Peronospora sparsa*) alla dose di 200-300 g/hl iniziando i trattamenti quando si verificano le condizioni idonee allo sviluppo del patogeno. Utilizzare sempre un volume di acqua appropriato al fine di garantire una completa ed uniforme bagnatura delle superfici vegetali ed un adeguato apporto di prodotto. Nelle applicazioni su Cipolla, Aglio e Porro aggiungere un bagnante adesivo.
COMPATIBILITA': il prodotto non é compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. **FITOTOSSICITA':** non si deve trattare durante la fioritura.
NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA Sospendere i trattamenti: 20 giorni prima della raccolta per Vite, Patata, Pomodoro, Lattuga, Spinacio, Melone, Zucchino, Cipolla, Aglio, Porro, Pisello, Tabacco. - 21 giorni per il Carciofo. - 28 giorni per Girasole e Soia.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

CIMORAM

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE
IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Cimoxanil puro g 4
- Rame metallo puro g 38
(sottoforma di ossicloruro)
- Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Da sciogliere in acqua senza rompere

Contenuto 0.250 – 0.500 - 1 Kg

Avvertenza: leggere l'etichetta riportata sulla confezione.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164
41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Registrazione n. 8105 del 09/11/1992 del Ministero della Sanità

CIMORAM

Fungicida in polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Cimoxanil puro		**g 4**
- Rame metallo puro (sottoforma di ossicloruro)		**g 38**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g 100**

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.- Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione : SCAM Spa - Modena

Registrazione n. 8105 del 09/11/1992 del Ministero della Sanità

kg 1 (= 2 sacchetti da 500 g), kg 1 (= 4 sacchetti da 250 g),
kg 5 (= 10 sacchetti da 500 g), kg 5 (= 5 sacchetti da 1 kg) **Partita n. :**

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive CIMOXANIL 4%, RAME METALLO 38%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: **CIMOXANIL** derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **RAME** Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** sintomatica. **Controindicazioni:** ---- **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO CIMORAM è un fungicida efficace contro la Peronospora della vite e di numerose colture orticole ed industriali. L'associazione dei due principi attivi che agiscono sia per penetrazione nei tessuti vegetali (Cimoxanil) che per contatto (Rame) assicura rapidità, persistenza d'azione e resistenza al dilavamento. CIMORAM è indicato per la protezione delle seguenti colture:
Vite: contro la Peronospora (*P. viticola*) alla dose di 200-300 g/hl, iniziando gli interventi quando si verificano le condizioni (andamento climatico, fase fenologica della coltura, ecc.) favorevoli allo sviluppo delle infezioni primarie e proseguendoli ad intervalli di 6-8 giorni fino a quando persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. **Patata, Pomodoro, Lattuga, Spinacio, Melone, Zucchino, Cipolla, Aglio, Porro, Pisello, Carciofo, Girasole, Soia, Tabacco, Rosa:** contro la Peronospora (*Phytophtora infestans, Bremia lactucae, Peronospora spinaciae, Pseudoperonospora cubensis, Peronospora schledeni, Phytophtora porri, Peronospora pisi, Peronospora helianthi, Peronospora manshurica, Peronospora tabacina, Peronospora sparsa*) alla dose di 200-300 g/hl iniziando i trattamenti quando si verificano le condizioni idonee allo sviluppo del patogeno. Utilizzare sempre un volume di acqua appropriato al fine di garantire una completa ed uniforme bagnatura delle superfici vegetali ed un adeguato apporto di prodotto. Nelle applicazioni su Cipolla, Aglio e Porro aggiungere un bagnante adesivo.
COMPATIBILITA': il prodotto non é compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.
AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all'introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura. **NOCIVITA'**: il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA Sospendere i trattamenti: 20 giorni prima della raccolta per Vite, Patata, Pomodoro, Lattuga, Spinacio, Melone, Zucchino, Cipolla, Aglio, Porro, Pisello, Tabacco. - 21 giorni per il Carciofo. - 28 giorni per Girasole e Soia.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI-PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO-DA NON VENDERSI SFUSO-IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE-IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE –NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE – EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE-DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE-DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

25%
1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua

2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti

3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore

4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ed...

5) ... aggiungere la restante parte d'acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

CIMOZEB

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Cimoxanil puro		**g 4**
- Mancozeb puro		**g 40**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g 100**

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO Irritante per le vie respiratorie – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego. – Non gettare i residui nelle fognature. – Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa – Modena
ISAGRO Spa – Aprilia (LT)

Registrazione n. 8106 del 9/11/1992 del Ministero della Sanità

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Kg 1/10 **Partita n.:**

NORME PRECAUZIONALI Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: MANCOZEB 40%, CIMOXANIL 4%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
MANCOZEB – Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
CIMOXANIL – Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica. **Controindicazioni**: ==**Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.
MODALITA' D'IMPIEGO:
Fungicida che agisce per contatto ed all'interno dei tessuti vegetali (azione endoterapica), con azione citotropica translaminare. Garantisce quindi prontezza d'azione e copertura totale, sulle seguenti colture:
VITE: contro la Peronospora, Alternariosi, con trattamenti preventivi alla dose di gr 200-300 per q.le acqua.
POMODORO (solo fino alla prima fioritura): contro la Peronospora e l'Alternariosi alla dose di gr. 250-300 per q.le acqua.
TABACCO: contro la Peronospora alla dose di gr. 300-350/hl.
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con la generalità dei prodotti eccetto quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

CATOR L 40

INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE A LARGO SPETTRO D'AZIONE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Clorpirifos g 40 (= 425 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100
(contiene Nafta solvente)

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui art. 25 del DPR 23 Aprile 2001, n.290.
FRASI DI RISCHIO: infiammabile. Tossico per ingestione. Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative, in materia di sicurezza.
SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511
Stabilimento di Produzione: SCAM S.p.a. - Modena
BAYER Cropscience S.r.l. - Filago (BG)
ISAGRO S.p.a. - Aprilia (LT)
Registrazione n. 8155 del 30/12/1992 del Ministero della Sanità

L 1 / 5 / 10 **Partita n.:**

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, Edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali:** confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica , delle estremità).
Terapia : atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' E CAMPI D' IMPIEGO:
Il CATOR L 40 é un insetticida in emulsione a vasto spettro d'azione che agisce per contatto, per ingestione e per inalazione. Viene impiegato sulle seguenti colture (tutte le dosi sono riferite a q.le acqua, salvo diversa indicazione): **Agrumi**: Dialeurodidi, Cocciniglie, alla dose di ml. 120-140 e contro la Formica Argentina a ml. 230-250 con irrorazioni al terreno con un quantitativo di circa hl. 10 di acqua ad ettaro. **Melo e Pero**: contro Carpocapsa, Psilla, Tortricidi alla dose di ml. 95-120. **Barbabietola da zucchero**: contro Altica, Nottue, Cleono, Lixus, alla dose di litri 1-1,200 /ha. **Tabacco, Mais, Patata**: contro le Nottue alla dose di litri 1-1,200 /ha. (Si può anche formare un composto con crusca e melasso con litri 2-2,5 di prodotto con una distribuzione di circa kg.50 di questa esca per ettaro di coltura). **Pioppo**: contro il Criptorrinco, Punteruolo e Saperda alla dose di ml. 220-250. **Pesco**: contro Tignola e Anarsia alla dose di ml. 100-120. **Floreali**: contro Nottue, Dialeurodidi, Tortricidi, Bega a ml. 100-150.
COMPATIBILITA': il CATOR L 40 é compatibile con la generalità degli antiparassitari, eccezion fatta per i prodotti a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Non ripetere il trattamento prima che siano trascorsi 12 mesi.
RISCHI DI NOCIVITA': é nocivo per le gli insetti utili, il bestiame, gli animali domestici ed é altamente tossico per i pesci
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto per le colture di melo, pesco, pero e patata; 60 giorni nel caso di agrumi, barbabietola da zucchero e tabacco; 30 giorni per il mais.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

DEVOX

INSETTICIDA IN EMULSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Clorpirifos-metile puro g 22,1 (= 223 g/l)

- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: rischio di gravi lesioni oculari. Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa Modena

Stabilimento di confezionamento:
I.R.C.A. Srl – S.S. Cremasca 591 n. 10 – Fornovo S. Giovanni (BG)

Distribuito da: GEOGREEN Srl – Via Piana, 16 – Castiglione del Lago (PG)

Registrazione n. 8156 del 30/12/1992 del Ministero della Sanità

L 0,010-0,020-0,050-0,100–0,250-0,500-1-5-10 **Partita n. :**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO DEVOX è un insetticida fosforganico che esplica la propria azione per contatto, per ingestione e, più limitatamente in fase di vapore. Risulta indicato sulle seguenti colture:

Melo, Pero, Pesco: contro tortricidi ricamatori *(Archips spp, Pandemis spp., A. orana, A. pulchellana, H. nubifera, Recurvaria spp., Hypomoneuta spp., ecc.)*, Carpocapsa *(C. pomonella)*, Cidia orientale (*C. molesta*), Anarsia (*A. lineatella*), Mosca della frutta (*C. capitata*), 200-250 ml/hl. Contro le neanidi di Cocciniglie *(Q. perniciosus, ecc.)* 200-250 ml/hl.

Arancio, Limone, Mandarino, Clementino: contro Tignola della zagara *(P. citri)*, Cimicetta verde *(C. trivialis)*, Formiche *(L. humile, C. nylanderi, ecc.)*, Metcalfa *(M. pruinosa)*, e neanidi di Cocciniglie *(A. aurantii, A. nerei, Coccus spp., Ceroplastes spp., S. oleae, ecc.)* 250 ml/hl

Vite: contro le Tignole *(L. botrana, C. ambiguella, A. pulchellana)*, Cicaline (*S. titanus, E. flavescens, ecc.*) Tripidi *(D. reuteri, Frankliniella spp., ecc.)*, Nottue *(Noctua spp.)*, Metcalfa *(M. pruinosa)*, e neanidi di Cocciniglie *(T. vitis, ecc.)* 100-200 ml/hl. Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cultivar sensibili; si raccomandano pertanto saggi zonali e varietali.

Fragola: contro Tripidi (*F. occidentalis, ecc.*), Nottue (*Agrotis spp., ecc.*), Afidi (*S. fragarie, ecc.*), Tortricidi (*E. pulchellana, P. dumetana, ecc.*) 300-400 ml/hl.

Pomodoro, Peperone, Melanzana, Pisello, Ravanello, Patata: contro Nottue *(Agrotis spp., Mamestra spp., ecc.)*, Tripidi *(T. tabaci, ecc.)*, Gortina *(Gortyna spp.)*, Cavolaia *(P. brassicae)*, Macaone *(Papilio spp.)*, Dorifora *(L. decemlineata)*, 1,5-2,0 l/Ha .

Mais: contro Nottue *(Agrotis spp.)*, Piralide *(O. nubilalis)* ed Elateridi *(Agroties spp.)* 300 ml/hl.

Pioppo: contro Saperda *(Saperda spp.)*, Gemmaiola *(G. acerina)*, Criptorrinco *(C. lapathi)*, Ifantria *(H. cunea)* 400-500 ml/hl.

Garofano, Crisantemo, Azalea, Ciclamino: contro Bega , Tortricidi, Oziorrinco e neanidi di Cocciniglie 200 ml/hl.

COMPATIBILITA': non è miscibile con formulati a reazione alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non impiegare il prodotto sulle varietà di melo Stayman Red, Stayman Winesap, Gloster, Gallia Beauty. In post-fioritura del melo non eseguire più di 2 trattamenti. Non effettuare trattamenti su Arancio nei mesi compresi tra gennaio ed aprile.

INTERVALLO DI SICUREZZA Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO-IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

Foglio illustrativo

DEVOX

INSETTICIDA IN EMULSIONE CONCENTRATA

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
DEVOX è un insetticida fosforganico che esplica la propria azione per contatto, per ingestione e, più limitatamente in fase di vapore.
Risulta indicato sulle seguenti colture:
Melo, Pero, Pesco: contro tortricidi ricamatori *(Archips spp, Pandemis spp., A. orana, A. pulchellana, H. nubifera, Recurvaria spp., Hypomoneuta spp., ecc.)*, Carpocapsa *(C. pomonella)*, Cidia orientale (*C. molesta*), Anarsia *(A. lineatella)*, Mosca della frutta *(C. capitata)*, 200-250 ml/hl. Contro le neanidi di Cocciniglie *(Q. perniciosus, ecc.)* 200-250 ml/hl.
Arancio, Limone, Mandarino, Clementino: contro Tignola della zagara *(P. citri)*, Cimicetta verde *(C. trivialis)*, Formche *(L. humile, C. nylanderi, ecc.)*, Metcalfa *(M. pruinosa)*, e neanidi di Cocciniglie *(A. aurantii, A. nereii, Coccus spp., Ceroplastes spp., S. oleae, ecc.)* 250 ml/hl
Vite: contro le Tignole *(L. botrana, C. ambiguella, A. pulchellana)*, Cicaline (*S. titanus, E. flavescens, ecc.*) Tripidi *(D. reuteri, Franklinella spp., ecc.)*, Nottue *(Noctua spp.)*, Metcalfa *(M. pruinosa)*, e neanidi di Cocciniglie *(T. vitis, ecc.)* 100-200 ml/hl. Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cultivar sensibili; si raccomandano pertanto saggi zonali e varietali.
Fragola: contro Tripidi (*F. occidentalis, ecc.*), Nottue (*Agrotis spp., ecc.*), Afidi (*S. fragarie, ecc.*), Tortricidi (*E. pulchellana, P. dumetana, ecc.*) 300-400 ml/hl.
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Pisello, Ravanello, Patata: contro Nottue *(Agrotis spp., Mamestra spp., ecc.)*, Tripidi *(T. tabaci, ecc.)*, Gortina *(Gortyna spp.)*, Cavolaia *(P. brassicae)*, Macaone *(Papillio spp.)*, Dorifora *(L. decemlineata)*, 1,5-2,0 l/Ha .
Mais: contro Nottue *(Agrotis spp.)*, Piralide *(O. nubilalis)* ed Elateridi *(Agroties spp.)* 300 ml/hl.
Pioppo: contro Saperda *(Saperda spp.)*, Gemmaiola *(G. acerina)*, Criptorrinco *(C. lapathi)*, Ifantria *(H. cunea)* 400-500 ml/hl.
Garofano, Crisantemo, Azalea, Ciclamino: contro Bega , Tortricidi, Oziorrinco e neanidi di Cocciniglie 200 ml/hl.
COMPATIBILITA': non è miscibile con formulati a reazione alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non impiegare il prodotto sulle varietà di melo Stayman Red, Stayman Winesap, Gloster, Gallia Beauty. In post-fioritura del melo non eseguire più di 2 trattamenti. Non effettuare trattamenti su Arancio nei mesi compresi tra gennaio ed aprile.
INTERVALLO DI SICUREZZA Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Etichetta formato ridotto ai sensi dell'Art.16 comma 2 del D.L. 194/95 per le taglie da ml 10-20-50-100

DEVOX

INSETTICIDA IN EMULSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Clorpirifos-metile puro g 22,1 (= 223 g/l)

- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: rischio di gravi lesioni oculari. Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa Modena

Stabilimento di confezionamento: I.R.C.A. Srl – S.S. Cremasca 591 n. 10 – Fornovo S. Giovanni (BG)

Distribuito da: GEOGREEN Srl – Via Piana, 16 – Castiglione del Lago (PG)

Registrazione n. 8156 del 30/12/1992 del Ministero della Sanità

ml 10-20-50-100 **Partita n. :**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia : atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

CUPROSSIL-DRY FLOW

FUNGICIDA A BASE DI RAME OSSICLORURO IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Rame metallo g 50
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: nocivo per inalazione e ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)

Stabilimento di Confezionamento: SCAM Spa - Modena

Registrazione n. 8262 del 04/05/1993 del Ministero della Sanità

Kg 1 / 5 / 10 / 25 **Partita n. :**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
CUPROSSIL-DRY FLOW è un fungicida a base di rame sotto forma di ossicloruro, in formulazione di microgranuli idrodispersibili. Le particelle rameiche, caratterizzate da un'elevatissima micronizzazione, aderiscono tenacemente alle superfici trattate, assicurando un'elevata efficacia nei confronti dei patogeni ed una notevole persistenza d'azione.
Può essere impiegato, ai dosaggi indicati e che si riferiscono ad applicazioni a "volume normale", sulle seguenti colture:
Vite: contro la Peronospora (*P. viticola*) 250-400 g/l effettuando interventi a cadenza di 6-8 giorni. Svolge un'efficace azione collaterale nei confronti del Marciume nero degli acini (*Black-rot*) e dell'Escoriosi (*P. viticola*). **Actinidia:** contro le Batteriosi *(Pseudomonas viridiflava)* 400 g/hl. Contro la Fitoftora (*F. cactorum*) 400 g/hl distribuendo 10-15 litri di soluzione alla base della pianta. **Pomacee:** contro i Cancri rameali (*N. galligena, S. mali*) alla dose di 500-1.000 g/hl intervenendo nel periodo autunno-invernale. Contro la Ticchiolatura (*V. inaequalis, V. pirina, F. dendriticum, F. pirinum*) alla dose di 400-500 nei trattamenti pre-fiorali e 200-250 in quelli post-fiorali (solo su colture non sensibili). Contro la Fitoftora (*F. cactorum*) alla dose di 400 g/hl distribuendo circa 10 l di soluzione per pianta ed avendo cura di bagnare accuratamente la zona del colletto. **Drupacee:** contro Bolla (*T. deformans*), Corineo (*C. beijerinckii*), Cancri rameali (*F. amygdali*) e Cancro batterico (*X. campestris vr. pruni*) 500-1.000 g/hl intervenendo a caduta foglie e a gemma ferma. Con forte presenza di Batteriosi effettuare un ulteriore intervento alla dose di 100-200 g/hl all'ingrossamento delle gemme. **Agrumi:** contro Mal secco (*D. tracheiphila*), Antracnosi (*C. gleosporioides*), Allupatura (*P. citrophtora*), Fumaggine (*C. citri*) e le Batteriosi (*P. syringae*) 300 -500 g/hl. Contro la Fitoftora (*P. citrophthora*) 400 g/hl distribuendo circa 10 l di soluzione per pianta avendo cura di bagnare accuratamente la zona del colletto. **Olivo:** contro Occhio di pavone (*S. oleaginea*), Lebbra (*G. olivarum*), Rogna (*P. savastanoi*) e le Fumaggini 250-400 g/hl. **Nocciolo e Noce:** cancri rameali trattamenti autunno invernali alla dose di 400 g/hl; nei trattamenti primaverili-estivi alla dose di 200-300 g/hl. **Nespolo:** contro la Ticchiolatura (*F. eriobotriae*) e la Maculatura fogliare (*P. mespili*) 250 g/hl. **Fragola:** contro la Vaiolatura (*M. fragarie*), Maculatura zonata (*G. fructicola*) con effetto collaterale sulle Batteriosi 1,5 Kg/Ha. **Patata-Pomodoro:** contro Peronospora (*P. infestans*), Alternaria (*A. porri*), Septoria (*S. lycopersici*), Cladosporio (*C. fulvum*) e le Batteriosi (*P. syringae vr. tomato, C. michiganense, X. campestris*) 250-400 g/hl. **Ortaggi** (Ortaggi a radice, Aglio, Cipolla, Scalogno, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Zucchino, Melone, Cocomero, Zucca, Cavoli, Lattughe e simili, Spinacio, Bietola da foglia e da costa, Erbe fresche, Legumi, Asparago, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo, Porro): contro Septoria, Cercospora, Peronospora, Antracnosi, Cladosporiosi, Alternaria, Ruggini, Batteriosi alla dose di g 250-400. **Barbabietola da zucchero:** contro Cercospora *(C. beticola)* e la Peronosposra *(P. schachtii)* kg 3-4/ha se impiegato da solo; se invece viene miscelato con prodotti endoterapici impiegare kg 2-2,5 per ettaro. **Oleaginose:** contro la Peronospora *(P. manshurica, P. helianthi, ecc.)* e l'Alternaria *(Alternaria spp.)* kg 3-4/ha. **Cereali:** contro Ruggini e Septoria alla dose di kg 1,5-2/ha. **Riso** (esclusa la concia anticarie delle sementi): kg 3-4 /ha contro le alghe verdi, con trattamenti alla comparsa dell'attacco. **Colture Floreali, Ornamentali e Forestali:** in pieno campo o in serra, contro Peronospora, Ticchiolatura, Ruggini, la Septoriosi, la Maculatura fogliare, Antracnosi alla dose di g 250-500.
COMPATIBILITA': il formulato non è miscibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina ed il Tiram. Evitare inoltre le miscele con fertilizzanti fogliari contenenti acidi umici e/o elevati tenori d'azoto. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (meli cupro-sensibili: Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben David, King David, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cupro-sensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego con la piena vegetazione.
NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

CIMORAM WG

Fungicida in microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Cimoxanil puro		**g 4**
- Rame metallo puro (sottoforma di ossicloruro)		**g 38**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g 100**

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. – Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta . – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)
Stabilimento di confezionamento: SCAM Spa - Modena

Registrazione n. 8278 del 4/05/1993 del Ministero della Sanità

Kg 0,200 / 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10 / 25 **Partita n. :**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive CIMOXANIL 4 %, RAME METALLO 38%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: **CIMOXANIL** derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **RAME** Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica. **Controindicazioni:** **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
CIMORAM WG è un fungicida efficace contro la Peronospora della vite e di numerose colture orticole ed industriali. L'associazione dei due principi attivi che agiscono sia per penetrazione nei tessuti vegetali (Cimoxanil) che per contatto (Rame) assicura rapidità, persistenza d'azione e resistenza al dilavamento. E' indicato per la protezione delle seguenti colture:
Vite: contro la Peronospora (*P. viticola*) alla dose di 200-300 g/hl (2,0-3,0 Kg/Ha), iniziando gli interventi quando si verificano le condizioni (andamento climatico, fase fenologica della coltura, ecc.) favorevoli allo sviluppo delle infezioni primarie e proseguendoli ad intervalli di 6-8 giorni fino a quando persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
Patata, Pomodoro, Lattuga, Spinacio, Melone, Zucchino, Cipolla, Aglio, Porro, Pisello, Carciofo, Girasole, Soia, Tabacco, Rosa: contro la Peronospora (*Phytophtora infestans, Bremia lactucae, Peronospora spinaciae, Pseudoperonospora cubensis, Peronospora schledeni, Phytophtora porri, Peronospora pisi, Peronospora helianthi, Peronospora manshurica, Peronospora tabacina, Peronospora sparsa, ecc.*) alla dose di 200-300 g/hl, iniziando i trattamenti quando si verificano le condizioni idonee allo sviluppo del patogeno. Utilizzare sempre un volume di acqua appropriato al fine di garantire una completa ed uniforme bagnatura delle superfici vegetali ed un adeguato apporto di prodotto (non inferiore ai 2,5-3,0 Kg/Ha). Nelle applicazioni su Cipolla, Aglio e Porro aggiungere un bagnante adesivo.
COMPATIBILITA': il prodotto non é compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura. **RISCHI DI NOCIVITA':** il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta per Vite, Patata, Pomodoro, Lattuga, Spinacio, Melone, Zucchino, Cipolla, Aglio, Porro, Pisello, Tabacco. - 21 giorni per il Carciofo. - 28 giorni per Girasole e Soia.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

MICOSPOR MGD

Fungicida in formulazione di microgranuli dispersibili efficace contro le crittogame delle pomacee

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
- Captano puro g 80
- Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui art. 25 del DPR 23 Aprile 2001, n.290.
FRASI DI RISCHIO: tossico per inalazione. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di Produzione: U.C.B. - B-900 - Ghent (Belgio)
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd.- Beer Sheva 84100 (Israele)
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A. - Mollet del Valles Barcellona (Spagna)
A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)
S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola (RA)
Arysta LifeScience S.a.s. - SBM – Marseille (France)
Stabilimento di Confezionamento: SCAM Spa – Modena
S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa - Fraz.Torrenieri Montalcino (SI)
Registrazione n. 8284 del 04/05/1993 del Ministero della Salute
Kg 1 / 5 / 10 / 20 **Partita n.:**

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro-intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO
In generale il MICOSPOR-MGD, prodotto in formulazione di microgranuli dispersibili, non solo consente la difesa contro le Crittogame parassite delle pomacee, durante il periodo vegetativo delle piante, ma l'irrorazione prima della raccolta, rispettando gli intervalli prescritti, aumenta la conservabilità dei frutti in magazzino ed in frigorifero.
Il MICOSPOR-MGD viene impiegato nelle seguenti dosi:
Pomacee: contro Ticchiolatura del pero e del melo g. 120-150 per 100 litri d'acqua. Il MICOSPOR-MGD si prepara versando la dose necessaria nel totale quantitativo di liquido rimescolando energicamente per alcuni minuti fino a formare una poltiglia completa.
COMPATIBILITA': il MICOSPOR-MGD é miscibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (Poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.) e di quelli a base di olii e di zolfo. L'impiego deve essere distanziato di almeno tre settimane da quello degli olii e dello zolfo.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': il MICOSPOR-MGD può risultare fitotossico su alcune colture di melo (Stark delicious, Winesap, Stayman, Renetta del Canadà) e di pero (Butirra d'Anyou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

Z.M. 75 DG

FUNGICIDA POLIVALENTE IN FORMULAZIONE DI MICROGRANULI DISPERSIBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Mancozeb puro	**g**	**75**
- Coformulanti	**q.b. a g**	**100**

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: Dow AgroSciences S.A. - Lauterbourg (Francia)
ELF ATOCHEM AGRI B.V. - 3196 XH Vondelingenplaat Rotterdam (Olanda)
GRIFFIN DE COLOMBIA S.A. - Via 40 n. 85-85 - Barranquilla (Colombia)

Registrazione n. 8351 del 14/07/1993 del Ministero della Sanità

Kg 1 / 5 / 10 / 25 **Partita n. :**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI: una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia : sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' DI IMPIEGO Lo Z.M. 75 DG é un anticrittogamico in microgranuli dispersibili che possiede una elevata attività biologica nei confronti di diverse malattie fungine delle colture agrarie.
Pero-Melo: (Ticchiolatura - Septoria - Ruggine - Alternaria - Glomerella): g. 150-200 /hl per trattamenti preventivi. Iniziare dall'apertura delle gemme.
Vite: (Peronospora - Escoriosi - Antracnosi - Marciume nero): g. 200-250 /hl., iniziare i trattamenti quando si presentano le condizioni favorevoli alle malattie, in trattamenti preventivi. **Pioppo**: (Marssonina - Ticchiolatura) kg. 4 /ha per trattamenti preventivi impiegando per piante adulte lt.1000 di acqua per ettaro. **Pomodoro**: (Peronospora - Alternaria - Septoria - Cladosporiosi - Antracnosi): solo fino alla prima fioritura, g. 200-250 /hl per trattamenti preventivi. **Tabacco**: (Peronospora tabacina): g. 175-225/hl in pieno campo per trattamenti preventivi in funzione delle condizioni ambientali: g. 100-150 /hl in semenzaio ogni 3-4 giorni. **Garofano**: (Ruggine) g. 150-200 /hl per trattamenti preventivi quando si manifestano le condizioni per l'infezione. **Frumento**: (Septoria - Ruggine - Nerume e in parte contro alcuni agenti del Mal del piede): kg. 2,5 /ha, due trattamenti, il primo all'inizio della levata e il secondo in pre-fioritura. **Concia Semi**: Metodo Slurry: disciogliere il prodotto nella quantità necessaria di acqua tale da permettere la distribuzione, mediante spruzzatura sui semi, con apposite attrezzature predisposte per la concia dei semi, g 150 per q.le di seme. **Concia semi di frumento**: contro Carie, Fusariosi. **Concia semi di riso**: contro Brusone e Fusariosi. **Concia semi di mais**: contro Carbone, Elmintosporiosi, contaminazioni esterne da Fusarium moniliforme e Gibberella zeae. **Concia sementi di orticole**: contro Fusarium spp., Rhizoctonia solani e Pythyua g. 150-300 per q.le di seme.
NON IMPIEGARE IN SERRA - NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
COMPATIBILITA': é incompatibile con le Poltiglie solfocalciche.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione avvenuta.
FITOTOSSICITA': varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate fetel, Armella, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

CONTRALEN WDG

DISERBANTE DI PRE-SEMINA, PRE-EMERGENZA E POST-EMERGENZA PER LA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, DA FORAGGIO E BIETOLA DA ORTO IN GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:

- Cloridazon puro		**g 65**
- Coadiuvanti, inerti	**q.b. a**	**g 100**

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)
Schirm GmbH Division Sideco - Mecklenburger Str.229, D-23568 Lübeck

Stabilimento di confezionamento: SCAM Spa - Modena

Registrazione n. 8476 del 14/02/1994 del Ministero della Sanità

Kg 1 / 5 **Partita n. :**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: **Sintomi:** nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE Il CONTRALEN WDG è un diserbante selettivo per la barbabietola che agisce prevalentemente per assorbimento radicale ed in parte per via fogliare. La sua azione si manifesta sui semi in fase di germinazione e sulle giovani plantule sia in fase di emergenza che appena spuntate dal terreno purché al momento del trattamento presentino le foglie cotiledonari e non più di 2 foglie vere. Erbe infestanti sensibili: *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Veronica spp.* (Veronica), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Lamium spp.* (Falsa ortica), *Stellaria media* (Centocchio comune), *Thlaspi arvense* (Erba storna), *Chenopodium album* (Farinello comune), *Atriplex spp.* (Atriplice), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga comune), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Fallopia convolvulus* (Convolvolo nero), *Polygonum lapathifolium* (Poligono nodoso). Erbe infestanti mediamente sensibili: *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galium aparine* (Gallio), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Senecio vulgaris* (Senecione), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Alopecurus spp.* (Coda di volpe), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Avena fatua* (Avena selvatica) *Lolium spp.* (Loglio), *Rumex spp*, (Romice), *Vicia spp.* (Veccia), *Ajuga spp.* (Iva artica). Erbe infestanti resistenti: tutte le malerbe perenni quali *Cirsium arvense* (Stoppione), *Cynodon dactylon* (Gramigna), *Convolvulus spp.* (Vilucchio), *Equisetum spp.* (Coda cavallina), *Sorghum halepense* (Sorghetta), *Cyperus spp.* (Zigolo delle risaie).
MODALITA' DI IMPIEGO In pre-semina con incorporazione a 2-3 cm. e pre-emergenza. **DOSI DI IMPIEGO** 3-6 kg/ha in funzione della natura del terreno: - in terreni sabbiosi: 3-3,5 kg/ha, - in terreni di medio impasto: 4-4,5 kg/ha - in terreni tendenti all'argilloso: 4,5-5,5 kg/ha - in terreni argillosi: 6 kg/ha. Nei terreni torbosi il diserbante viene bloccato dalla sostanza organica e difficilmente riesce ad esercitare un'azione erbicida soddisfacente. In post-emergenza dopo che la bietola ha le prime foglie vere, con infestanti nella fase di plantula (prime foglie vere) alla dose di 2-3 kg/ha, preferibilmente in miscela con erbicidi di contatto. Nei trattamenti anticipati frazionati con la bietola allo stadio cotiledonare ridurre la dose a 0,5-1 kg/ha in funzione della dose degli altri principi attivi ai quali viene associato. Il trattamento di post-emergenza si può effettuare fino allo stadio di due foglie vere delle erbe infestanti. VOLUME DI IRRORAZIONE: stemperare la prestabilita quantità di prodotto in 4-6 o più ettolitri di acqua per ettaro, irrorando con pompe a volume normale. NOTIZIE AGRONOMICHE: qualora si debba operare su terreno asciutto e non si abbiano successive piogge, è necessario procedere ad un'irrigazione entro 8-10 giorni dal diserbo. Preparazione della poltiglia: versare la prestabilita quantità di prodotto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.
COMPATIBILITA': non è miscibile con formulati in formulazione liquida emulsionabile. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsiglia il trattamento nel periodo che va dall'emergenza delle bietole indicate fino all'emissione della seconda foglia vera. La selettività del prodotto può essere compromessa da attacchi di insetti o di malattie fungine che determinano lesioni sulle radici o sulle foglie aprendo vie alla penetrazione del prodotto. Evitare che la miscela erbicida giunga a contatto con colture sensibili vicine. Se è necessario una ricoltivazione è sconsigliabile la semina o il trapianto di pomodoro, colza, ravizzone, cavoli e cavolfiori.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO-IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

CUPROSSIL FL

FUNGICIDA A BASE DI RAME IN FORMULAZIONE DI PASTA FLUIDA

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Rame metallo g 20 (= 272 g/l)
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione : SCAM S.p.a. - Modena
Registrazione n. 8510 del 30/04/1994 del Ministero della Sanità

L 0,500 / 1 / 10 / 20 **Partita n. :**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia :** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO Il CUPROSSIL FL è un fungicida a base di rame, sottoforma di ossicloruro tetraramico colloidale e micronizzato in formulazione di pasta fluida (flowable) che possiede in modo accentuato notevole stabilità, adesività persistenza d'azione e resistenza al dilavamento. Viene impiegato sulle seguenti colture: (dosi riferite a q.le acqua).
Vite: contro la Peronospora alla dose di ml. 400-500, con trattamenti preventivi.
Melo, Pero: contro Ticchiolatura e Cancri rameali, con trattamenti autunno-invernali alla dose di ml. 800-1000 e con trattamenti pre-fiorali alla dose di ml. 400-500 e post-fiorali a ml. 150 (solo su colture non sensibili).
Drupacee: contro Bolla e Corineo con trattamenti alla dose di ml. 800-1000 nei trattamenti autunno-invernali.
Agrumi: contro Mal secco, Antracnosi, Fumaggine alla dose di ml. 400-600 nei diversi stadi vegetativi.
Olivo: contro Occhio di Pavone e Lebbra alla dose di ml. 400-500.
Patata, Pomodoro: contro Peronospora, Alternaria, Batteriosi, Septoria, Cladosporiosi alla dose di ml. 400-500.
Ortaggi: contro Septoria, Cercospora, Peronospora, Antracnosi, Alternariosi, Batteriosi, Ruggine alla dose di ml. 400-500.
Barbabietola da zucchero: contro Cercospora e la Peronospora litri 4-5/ha.
Floricoltura: in pieno campo o in serra, contro la Peronospora, la Ticchiolatura, la Ruggine, la Septoriosi, la Maculatura fogliare, Antracnosi alla dose di ml. 400-500.
Oleaginose: contro la Peronospora litri 3-4/ha.
Cereali: contro Ruggine alla dose di litri 2,5-3,5/ha.
Tabacco: contro la Peronospora ml. 400-500;
Fragola: contro Vaiolatura rossa (sulla vegetazione autunnale) ml.500.
COMPATIBILITA': il prodotto è miscibile con i fertilizzanti fogliari. Non è miscibile con fitosanitari a reazione alcalina.**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (meli cupro-sensibili: Abbondanza, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgendurt, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero: (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cupro-sensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego.
NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

BASEL - FL

DISERBANTE SELETTIVO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA PER IL DISERBO DI MAIS E SORGO

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Terbutilazina pura g 45 (= 500 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.a-Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano-Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM S.p.a. - Modena
TERRRANALISI S.r.l. - Via N. Bixio 6 - Cento (FE)

Distribuito da: S.I.V.A.M. S.p.A. – Via Scarlatti, 30 – Milano

Registrazione n. 8572 del 03/12/1994 del Ministero della Sanità

Litri 0,250 / 1 / 5 / 10 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi di intossicazione: (non specifici e rilevanti su animali con superdosaggi). Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratoria. salivazione.
Consigli terapeutici: data la non specificità dei sintomi, la terapia è sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

Il BASEL-FL è un diserbante, in formulazione di sospensione concentrata, che agendo per assorbimento radicale controlla numerose infestanti quqli *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Capsella bursa - pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinello), *Echinochloa spp.* (Giavoni), *Geranium spp.* (Geranio), *Matricaria spp.* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Polygonum spp.* (Poligoni), *Plantago major* (Piantaggine), *Poa spp.* (Poa), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria spp.* (Centocchio), *Urtica spp.* (Ortica), Ver*onica spp.* (Veroniche) *Raphanus raphanistrum* (Rafano), ecc.
Mais: litri 1,5-2 per ettaro in miscela con prodotti a prevalente attività graminicida (S-metolaclor, Pendimetalin, ecc.) intervenendo in pre-semina, pre-emergenza o in post-emergenza precoce delle infestanti.
Sorgo: litri 1,5 -2 per ettaro, da solo in presenza di infestanti composte prevalentemente da dicotiledoni; in presenza di graminacee aggiungere un preparato ad azione specifica (es. Propaclor) riducendo la dose del prodotto a litri 1,2 - 1,7.
COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con i prodotti contenenti i principi attivi: Glifosate, Glufosinate-ammonio, Trifluralin, Pendimetalin, S-metolaclor, Propaclor.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
N.B. : impiegare il prodotto solo su colture specializzate in assenza di sottocolture. Dal trattamento erbicida alla semina di eventuali sottocolture o di colture in successione occorre un intervallo minimo di 12 mesi. Sospendere il trattamento al massimo alla post-emergenza delle infestanti.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

ARPEL

Fungicida ad azione sistemica in formulazione polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Fosetil Alluminio puro g 80
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511
Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena
TERRANALISI Srl - Via N.Bixio, 6 - Cento (FE)

Registrazione n. 8639 del 14/01/1995 del Ministero della Sanità
Kg 0,1 / 0,2 / 0,25 / 0,5 / 1 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevance e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione informare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.
CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO L'ARPEL è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grance mobilità nelle piante. La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente che risulta più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attività di crescita. La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
VITE: contro la Peronospora (*P. viticola*). Effettuare trattamenti preventivi alla dose di 170-250 g/hl in associazione con fungicidi sistemici (es. Metalaxyl), citotropici (es. Cimoxanil) e/o di copertura (es. Mancozeb, Folpet) o loro eventuali miscele. Evitare l'impiego in associazione con formulati rameici.
MELO, PERO, PESCO, ACTINIDIA: contro Phytophthora cactorum.
a) - effettuare un trattamento sulla vegetazione, una volta al mese, dalla sfioritura fino a quaranta giorni dalla raccolta (per melo e actinidia), con 250 g/hl.
b) - su pianta già debilitata dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida: effettuare un'annaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, con litri 1-2 per pianta di una poltiglia costituita da Kg 5 di prodotto per 100 litri di acqua.
FRAGOLA: contro peronospora (*Phytophora cactorum e fragariae).* L'immersione delle piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti, seguita da 2-3 irrorazioni alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immersione delle piante prima del trapianto in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti, seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di g 0,5 di formulato per pianta. **LATTUGA:** contro Bremia lactucae effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire almeno 3 Kg di prodotto per ettaro). Si consiglia di effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto; se si verificano forti sbalzi termici la lattuga può essere sensibile al prodotto. **MELONE:** contro Pseudoperonospora cubensis effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl avendo cura di distribuire, come minimo, 3 Kg di prodotto per ettaro, ogni 14 giorni. **COCOMERO, CETRIOLO, SPINACIO:** contro Peronospora, effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire come minimo, 3 Kg di prodotto per ettaro). **CARCIOFO:** contro Bremia lactucae a 200-300 g/hl. **ARANCIO, LIMONE, MANDARINO, POMPELMO:** contro Phytophthora spp. effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl utilizzando dieci litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione possono venire integrati da pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche); pratica indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida.
VIVAI DI FRUTTIFERI: effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl con cadenza mensile. **VIVAI DI AGRUMI:** impiegare la dose di 400 g/hl ogni 60 giorni.
COLTURE ORNAMENTALI in pieno campo e in serra: contro Phytophthora spp. di Chamaecyparis e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee di Poinsettia, St.Paulia e Crisantemo, effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con g 5-10 di formulato per mq. una volta al mese in primavera.
COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con i prodotti a base di Rame, di Dicofol e con concimi fogliari contenenti azoto. Non effettuare miscele con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta. Si consiglia inoltre di non irrorare il prodotto su colture precedentemente trattate con i suddetti formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI: -15 gg. prima del raccolto su carciofo, cetriolo, cocomero, melone, lattuga, spinacio. **-30 gg.** prima del raccolto su fragola. **-40 gg.** prima del raccolto su vite, melo, pero, pesco, actinidia. **-80 gg.** prima della raccolta di arancio, limone, mancarino, pompelmo.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

OXARIL

DISERBANTE SELETTIVO PER IL RISO, LA SOIA E IL GIRASOLE LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodtto contengono:

- Oxadiazon puro		**g 25,5 (= 257 g/l)**
- Coadiuvanti	**q.b. a**	**g 100**

FRASI DI RISCHIO: infiammabile. Irritante per gli occhi. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa Modena
TERRANALISI Snc – Via IV Novembre 19/1 Cento (Fe)
Registrazione n. 8728 del 27/02/1995 del Ministero della Sanità

L 1/5/10 **Partita n. :**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento.
INFORMAZIONI MEDICHE: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE: OXARIL è un diserbante selettivo per il riso, la soia e il girasole. E' efficace - su riso contro *Heteranthera limosa* (Eterantere), *Heteranthera reniformis* (Eterantere), *Echinochloa c. galli* (a nascita precoce) (Giavone comune), *Alisma plantago* (Cucchiaio) (da seme) – su soia, contro *Amaranthus retroflexus* (Amaranto spigato), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Chenopodium album* (Farinaccio selvatico), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana); è altresì parzialmente efficace contro *Echinocloa spp.*, *Alopecurus mysuroides* (Coda di volpe), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Polygonum aviculare* (Correggiola) e *Stachys annua* (Stregona annuale).
EPOCHE, DOSI D'IMPIEGO E MODALITA' D'IMPIEGO
Riso Il prodotto va impiegato su terreno ben livellato e finemente lavorato; intervenire prima della semina, su terreno asciutto, dopo aver preparato il letto di semina; allagare la risaia, attendere 1-2 giorni e quindi seminare il riso. Dose: 1,6-2 l/Ha.
Soia e Girasole Anche su queste colture il prodotto va impiegato su terreno ben livellato e finemente lavorato; intervenire subito dopo la semina e prima dell'emergenza della coltura e delle infestanti. Dose: 2 – 2,5 l/Ha.
In tutte le applicazioni utilizzare volumi d'acqua di 300-600 l/Ha.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA': tossico per i pesci.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

MICERAN

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Procimidone puro g 50
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego. – Non gettare i residui nelle fognature. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa – Modena
Registrazione n. 8765 del 25/9/1995 del Ministero della Sanità

Kg 0,1 / 0,2 / 0,25 / 0,5 / 0,9 / 1 / 1,2 **Partita n.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.
MODALITA' D'IMPIEGO Il MICERAN è un fungicida ad azione preventiva e bloccante che viene indicato sulle seguenti colture:
Vite: contro la Muffa grigia alla dose di g 100-150 per q.le acqua, effettuando 3-4 trattamenti nei periodi indicati: - a fine fioritura - poco prima della chiusura del grappolo - all'invaiatura, circa 7-8 settimane prima del raccolto - 3-4 settimane prima della raccolta.
Si consiglia di bagnare bene affinché vi sia una distribuzione uniforme del prodotto, la dose più alta impiegarla su varietà più sensibili all'attacco della malattia. Nel caso si eseguano trattamenti polverulenti con zolfo, è possibile utilizzare MICERAN alla dose di 0,5/1,0 Kg ogni 10 Kg di zolfo. **Fragola:** contro la Muffa grigia a g 80-100 per q.le acqua con 3 trattamenti alle seguenti epoche: - alla chiusura dei petali - con circa il 10-20% dei fiori aperti - alla completa sfioritura. Bagnare bene sia la pianta che il terreno circostante. **Lattuga e Indivia:** contro la Muffa grigia e la Sclerotinia 1,5-2,0 kg/Ha intervenendo quando la coltura ha superato la crisi da trapianto. Il trattamento può essere ripetuto dopo 10-12 giorni. Nei casi di colture non trapiantate le applicazioni devono essere iniziate quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo dell'infezione. Non effettuare più di due trattamenti per stagione. **Tabacco**: contro la Muffa grigia e la Sclerotinia 1,5-2,0 kg/Ha intervenendo dopo il superamento della crisi da trapianto. **Girasole**: (Concia) contro la Sclerotinia 100-200 g/100 kg di seme; (trattamenti alla parte aerea) contro Muffa grigia e Sclerotinia alla dose di g 100 per q.le acqua effettuando 1-2 trattamenti prima della fioritura. **Pesco, Albicocco, Susino:** contro il Marciume bruno (Monilia):
- Marciume sia dei fiori che dei rami g 150-200 per q.le acqua, con un primo trattamento ai bottoni fiorali, un altro con il 25% dei fiori aperti ed un successivo in piena fioritura. - Marciume dei frutti g 100-150 per q.le acqua, trattando 30-35 gg e 15-21 gg prima della raccolta. **Mandorlo**: contro il Marciume bruno (Monilia) dei fiori g 150-200 per q.le acqua intervenendo nel periodo compreso tra la comparsa dei bottoni fiorali e la piena fioritura. **Peperone, Melanzana**: contro la Muffa grigia e la Sclerotinia g 80-100 per q.le acqua intervenendo ogni 12-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti. **Pomodoro:** contro la Muffa grigia g 80-100 per q.le acqua, iniziando a trattare a fine fioritura del primo palco fiorale e ripetendo ogni 15 giorni sino a concludere 14 giorni prima della raccolta. Non effettuare più di tre trattamenti per stagione su MELANZANA ed uno su POMODORO. **Aglio**: contro la Muffa grigia e il Marciume bianco:
- Trattamento dei bulbilli g 30-50 per 100 Kg di materiale.
- Trattamenti alla parte aerea g 100-200 per q.le acqua a partire dalla prima comparsa dei sintomi sino alla quarta foglia. **Pero:** contro la Maculatura bruna g 100-150 per q.le acqua con trattamenti a partire dalla fioritura e ripetuti ad intervalli di 7-12 giorni in funzione del rischio di infezione. **Cipolla**: contro la Muffa grigia e il Marciume bianco: - Trattamento al seme g 1 per 100 Kg di seme. - Trattamenti alla parte aerea g 100-150 per q.le acqua dalla prima comparsa fino alla quarta foglia. Aggiungere eventualmente un bagnante adesivo. **Colza**: contro la Sclerotinia 1,0-1,5 Kg/Ha intervenendo ad inizio fioritura. **Cetriolo**: contro Muffa grigia e Sclerotinia g 100-150 per q.le acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti. **Fagiolino:** contro Muffa grigia e Sclerotinia g 100-150 per q.le di acqua ad intervalli di 10-14 giorni dall'allegagione dei frutti. **Actinidia**: contro la Muffa grigia e la Sclerotinia:
Trattamenti in pre raccolta g 75 100 per q.le d'acqua alla fine della fioritura inizio caduta petali ed eventualmente prima della raccolta
- Trattamenti in post-raccolta con doccia (drencher) o per immersione utilizzando una soluzione allo 0,012% (g 12 di prodotto ogni 100 litri di acqua). **Nocciolo**: contro il Marciume bruno g 75-100 per q.le di acqua intervenendo in prossimità dell'allegagione **Colture floreali in pieno campo ed in serra (escluso il Ciclamino):** contro la Muffa grigia a g 40-80 per q.le acqua intervenendo nei momenti di maggior rischio infettivo e ripetendo le applicazioni ad intervalli di 10-14 giorni. Contro Rhizoctonia e la Sclerotinia g 4 dispersi in 5-10 litri di acqua per mq. di superficie, intervenendo 10 gg. circa dopo la messa a dimora, quando è superata la crisi del trapianto.
COMPATIBILITA': miscibile con fitosanitari a reazione neutra.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per Pesco, Albicocco, Pero, Fragola, Cetriolo, Pomodoro, Peperone, Actinidia, Melanzana, Lattuga, Indivia, Fagiolino; 21 giorni per Susino, Vite, Girasole; 45 giorni per Colza; 60 giorni per l'Actinidia post-raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI- PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA -DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE – NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE – Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

MICERAN

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE
IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Procimidone puro g 50
- Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Da sciogliere in acqua senza rompere

Contenuto 250 - 300 - 500 g

Avvertenza: leggere l'etichetta riportata sulla confezione prima di utilizzare il prodotto

DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164
41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Registrazione n. 8765 del 25/9/1995 del Ministero della Sanità

MICERAN

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Procimidone puro g 50

- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego. – Non gettare i residui nelle fognature. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM SPA – Modena
ISAGRO S.p.a. - Aprilia (LT) STI-SOLFOTECNICA S.p.a. - Cotignola (Ravenna)

Registrazione n. 8765 del 25/9/1995 del Ministero della Sanità

Kg 1 = (2 sacchetti da 500 g) Kg 0,900 (= 3 sacchetti da 300 g)

Kg 1 = (4 sacchetti da 250 g) Kg 1,200 (= 4 sacchetti da 300 g) **Partita n.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO Il MICERAN è un fungicida ad azione preventiva e bloccante che viene indicato sulle seguenti colture:

Vite: contro la Muffa grigia alla dose di g 100-150 per q.le acqua, effettuando 3-4 trattamenti nei periodi indicati: - a fine fioritura - poco prima della chiusura del grappolo - all'invaiatura, circa 7-8 settimane prima del raccolto - 3-4 settimane prima della raccolta.

Si consiglia di bagnare bene affinché vi sia una distribuzione uniforme del prodotto. la dose più alta impiegarla su varietà più sensibili all'attacco della malattia. Nel caso si eseguano trattamenti polverulenti con zolfo, è possibile utilizzare MICERAN alla dose di 0,5/1,0 Kg ogni 10 Kg di zolfo. **Fragola:** contro la Muffa grigia a g 80-100 per q.le acqua con 3 trattamenti alle seguenti epoche: - alla chiusura dei petali - con circa il 10-20% dei fiori aperti - alla completa sfioritura. Bagnare bene sia la pianta che il terreno circostante. **Lattuga e Indivia:** contro la Muffa grigia e la Sclerotinia 1,5-2,0 kg/Ha intervenendo quando la coltura ha superato la crisi da trapianto. Il trattamento può essere ripetuto dopo 10-12 giorni. Nei casi di colture non trapiantate le applicazioni devono essere iniziate quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo dell'infezione. Non effettuare più di due trattamenti per stagione. **Tabacco**: contro la Muffa grigia e la Sclerotinia 1,5-2,0 kg/Ha intervenendo dopo il superamento della crisi da trapianto. **Girasole**: (Concia) contro la Sclerotinia 100-200 g/100 kg di seme; (trattamenti alla parte aerea) contro Muffa grigia e Sclerotinia alla dose di g 100 per q.le acqua effettuando 1-2 trattamenti prima della fioritura. **Pesco, Albicocco, Susino**: contro il Marciume bruno (Monilia):

- Marciume sia dei fiori che dei rami g 150-200 per q.le acqua, con un primo trattamento ai bottoni fiorali, un altro con il 25% dei fiori aperti ed un successivo in piena fioritura. - Marciume dei frutti g 100-150 per q.le acqua, trattando 30-35 gg e 15-21 gg prima della raccolta. **Mandorlo**: contro il Marciume bruno (Monilia) dei fiori g 150-200 per q.le acqua intervenendo nel periodo compreso tra la comparsa dei bottoni fiorali e la piena fioritura. **Peperone, Melanzana**: contro la Muffa grigia e la Sclerotinia g 80-100 per q.le acqua intervenendo ogni 12-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti. **Pomodoro:** contro la Muffa grigia g 80-100 per q.le acqua, iniziando a trattare a fine fioritura del primo palco fiorale e ripetendo ogni 15 giorni sino a concludere 14 giorni prima della raccolta. Non effettuare più di tre trattamenti per stagione su MELANZANA ed uno su POMODORO. **Aglio**: contro la Muffa grigia e il Marciume bianco:

- Trattamento dei bulbilli g 30-50 per 100 Kg di materiale.
- Trattamento alla parte aerea g 100-200 per q.le acqua a partire dalla prima comparsa dei sintomi sino alla quarta foglia. **Pero:** contro la Maculatura bruna g 100-150 per q.le acqua con trattamenti a partire dalla fioritura e ripetuti ad intervalli di 7-12 giorni in funzione del rischio di infezione. **Cipolla**: contro la Muffa grigia e il Marciume bianco: - Trattamento al seme g 1 per 100 Kg di seme. - Trattamenti alla parte aerea g 100-150 per q.le acqua dalla prima comparsa fino alla quarta foglia. Aggiungere eventualmente un bagnante adesivo. **Colza**: contro la Sclerotinia 1,0-1,5 Kg/Ha intervenendo ad inizio fioritura. **Cetriolo**: contro Muffa grigia e Sclerotinia g 100-150 per q.le acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti. **Fagiolino:** contro Muffa grigia e Sclerotinia g 100-150 per q.le di acqua ad intervalli di 10-14 giorni dall'allegagione dei frutti. **Actinidia**: contro la Muffa grigia e la Sclerotinia:
- Trattamenti in pre-raccolta g 75-100 per q.le d'acqua alla fine della fioritura-inizio caduta petali ed eventualmente prima della raccolta
- Trattamenti in post-raccolta con doccia (drencher) o per immersione utilizzando una soluzione allo 0,012% (g 12 di prodotto ogni 100 litri di acqua).

Nocciolo: contro il Marciume bruno g 75-100 per q.le di acqua intervenendo in prossimità dell'allegagione **Colture floreali in pieno campo ed in serra (escluso il Ciclamino):** contro la Muffa grigia a g 40-80 per q.le acqua intervenendo nei momenti di maggior rischio infettivo e ripetendo le applicazioni ad intervalli di 10-14 giorni. Contro Rhizoctonia e la Sclerotinia g 4 dispersi in 5-10 litri di acqua per mq. di superficie, intervenendo 10 gg. circa dopo la messa a dimora, quando è superata la crisi del trapianto.

COMPATIBILITA': miscibile con fitosanitari a reazione neutra.

AVVERTENZA D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all'introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione chiudere bene la scatola. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per Pesco, Albicocco, Pero, Fragola, Cetriolo, Pomodoro, Peperone, Actinidia, Melanzana, Lattuga, Indivia, Fagiolino; 21 giorni per Susino, Vite, Girasole; 45 giorni per Colza; 60 giorni per l'Actinidia post-raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO -IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - DA NON VENDERSI SFUSO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE - NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE – Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade
-DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE - DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

25%

1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua.

2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti

3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore

4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ed...

5) ...aggiungere la restante parte d'acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

CUPROSCAM MIX BLU

ANTIPERONOSPORICO IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- **Cimoxanil puro g 3,5**
- **Mancozeb puro g 18**
- **Rame metallo g 30**
  (sotto forma di ossicloruro)
- **Coformulanti q.b. a g 100**

FRASI DI RISCHIO: nocivo per inalazione. Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena
TERRANALISI Srl - Via Bixio, 6 - Cento (FE)

Registrazione n. 8823 del 19/04/1996 del Ministero della Sanità

Kg 0,250 / 1 / 5 / 10 / 25 Partita n.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli quest'etichetta. Durante il trattamento, proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
CIMOXANIL 3,5%; MANCOZEB 18%; RAME METALLO 30%; le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL: derivato dell'urea. **Sintomi**: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB: **sintomi**: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
RAME: **sintomi:** denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** sintomatica. **Controindicazioni:** ====== **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO
IL CUPROSCAM MIX BLU è un fungicida in polvere bagnabile indicato per la lotta contro le seguenti malattie:
Vite: contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*) alla dose di g 250-300 per q.le di acqua iniziando i trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia e proseguendoli ad intervalli di 7-8 giorni; svolge un'attività collaterale su Escoriosi (*Phomopsis viticola*) e Black rot (*Giugnardia bidwelli*).
Pomodoro (fino alla prima fioritura): contro la Peronosposra (*Phytophthora infestans*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Alternariosi (*Alternaria porri*) alla dose di g 250-300 per q.le di acqua. **Tabacco:** contro la Peronospora (*Peronospora tabacina*) alla dose di g 250-300 per q.le acqua iniziando gli interventi al verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione. Il CUPROSCAM MIX BLU agisce sia per contatto, grazie all'attività del Rame e del Mancozeb, che per penetrazione nei tessuti vegetali con azione citotropica traslaminare ad opera del Cimoxanil.
NON IMPIEGARE IN SERRA
FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura.
COMPATIBILITA': il formulato è compatibile con tutti i fitosanitari a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con fitosanitari a reazione alcalina e con zolfi. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta. Su Pomodoro trattamenti ammessi solo fino alla prima fioritura.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

CIMOX 25 WP

FUNGICIDA CITOTROPICO TRANSLAMINARE IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Cimoxanil puro g 25
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. – Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena

Registrazione n. 8875 del 10/06/1996 del Ministero della Sanità

Kg 0,050 / 0,100 / 0,200 / 0,500 / 1 **Partita n. :**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: derivato dell'urea. **Sintomi**: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia**: sintomatica. **Controindicazioni:** ---- **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO: CIMOX 25 WP è un fungicida caratterizzato da proprietà citotropiche e translaminari, particolarmente efficace contro le Peronospore.
CIMOX 25 WP esplica attività preventiva, curativa, (potendo controllare eventuali infezioni già in atto) con una persistenza d'azione di 4-5 giorni a seconda delle condizioni climatiche che si verificano dopo l'applicazione e dello stadio fenologico e di sviluppo delle colture.
Vite: contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*) alla dose di g 80-100 per q.le di acqua (dose minima 800 g/Ha), iniziando gli interventi quando si verificano le condizioni climatiche che favoriscono l'infezione fino all'ingrossamento degli acini. Nel caso s'intervenga su infezioni già in atto effettuare due interventi ravvicinati a distanza di 4-5 giorni l'uno dall'altro.
CIMOX 25 WP può essere impiegato alla dose di 50-60 g/hl di acqua (dose minima: 500 g/Ha) in miscela con prodotti a base di Rame, Ditiocarbammati, Folpet, Dithianon, Dodina, ecc..; questi ultimi dovranno essere impiegati ad un dosaggio non inferiore al 70% rispetto a quello "pieno" riportato nelle rispettive etichette.
Patata, Pomodoro, Lattuga, Spinacio, Melone, Zucchino, Cipolla, Aglio, Porro, Pisello, Carciofo, Girasole, Soia, Tabacco, Rosa: contro le Peronospore (*Phitophtora infestans, Bremia lactucae, Peronospora spinaciae, Pseudoperonospora cubensis, Peronospora scheledoni, Phytophtora porri, Peronospora pisi, Peronospora helianti, Peronospora manshurica, Peronospora tabacina, Peronospora sparsa*) alla dose di 80-100 g/hl iniziando i trattamenti allorché si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo dell'infezione. Su infezioni in atto con sintomi visibili effettuare due interventi ravvicinati a distanza di 4-5 giorni l'uno dall'altro.
Nel caso di impiego in miscela con altri fungicidi antiperonosporici, CIMOX 25 WP può essere applicato al dosaggio più basso previsto; è tuttavia consigliabile non impiegare mai meno di 500 g/Ha di formulato.
COMPATIBILITA': il formulato non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Poltiglia Solfocalcica ecc.).
AVVERTENZA: nel caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta della vite, patata, pomodoro, lattuga, spinacio, melone, zucchino, cipolla, aglio, porro, pisello, tabacco; 21 giorni per il carciofo e 28 giorni per girasole e soia.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

Foglio illustrativo

CIMOX 25 WP

FUNGICIDA CITOTROPICO TRANSLAMINARE IN POLVERE BAGNABILE

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO: CIMOX 25 WP è un fungicida caratterizzato da proprietà citotropiche e translaminari, particolarmente efficace contro le Peronospore.
CIMOX 25 WP esplica attività preventiva, curativa, (potendo controllare eventuali infezioni già in atto) con una persistenza d'azione di 4-5 giorni a seconda delle condizioni climatiche che si verificano dopo l'applicazione e dello stadio fenologico e di sviluppo delle colture.
Vite: contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*) alla dose di g 80-100 per q.le di acqua (dose minima 800 g/Ha), iniziando gli interventi quando si verificano le condizioni climatiche che favoriscono l'infezione fino all'ingrossamento degli acini. Nel caso s'intervenga su infezioni già in atto effettuare due interventi ravvicinati a distanza di 4-5 giorni l'uno dall'altro.
CIMOX 25 WP può essere impiegato alla dose di 50-60 g/hl di acqua (dose minima: 500 g/Ha) in miscela con prodotti a base di Rame, Ditiocarbammati, Folpet, Dithianon, Dodina, ecc..; questi ultimi dovranno essere impiegati ad un dosaggio non inferiore al 70% rispetto a quello "pieno" riportato nelle rispettive etichette.
Patata, Pomodoro, Lattuga, Spinacio, Melone, Zucchino, Cipolla, Aglio, Porro, Pisello, Carciofo, Girasole, Soia, Tabacco, Rosa: contro le Peronospore (*Phitophtora infestans, Bremia lactucae, Peronospora spinaciae, Pseudoperonospora cubensis, Peronospora scheledoni, Phytophtora porri, Peronospora pisi, Peronospora helianti, Peronospora manshurica, Peronospora tabacina, Peronospora sparsa*) alla dose di 80-100 g/hl iniziando i trattamenti allorché si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo dell'infezione. Su infezioni in atto con sintomi visibili effettuare due interventi ravvicinati a distanza di 4-5 giorni l'uno dall'altro.
Nel caso di impiego in miscela con altri fungicidi antiperonosporici, CIMOX 25 WP può essere applicato al dosaggio più basso previsto; è tuttavia consigliabile non impiegare mai meno di 500 g/Ha di formulato.
COMPATIBILITA': il formulato non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Poltiglia Solfocalcica ecc.).
AVVERTENZA: nel caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta della vite, patata, pomodoro, lattuga, spinacio, melone, zucchino, cipolla, aglio, porro, pisello, tabacco; 21 giorni per il carciofo e 28 giorni per girasole e soia.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Etichetta formato ridotto ai sensi dell'Art.16 comma 2 del D.L. 194/95 per le taglie da g 50

CIMOX 25 WP

FUNGICIDA CITOTROPICO TRANSLAMINARE IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Cimoxanil puro g 25
- Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. – Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena

Registrazione n. 8875 del 10/06/1996 del Ministero della Sanità

g 50 **Partita n. :**

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** sintomatica. **Controindicazioni:** ---- **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

CIMOX 25 WP

FUNGICIDA CITOTROPICO TRANSLAMINARE IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Cimoxanil puro		**g 25**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g 100**

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. – Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena

Registrazione n. 8875 del 10/06/1996 del Ministero della Sanità

Kg 1 (= 1 sacchetti da 1 kg) Kg 1 (= 2 sacchetti da 500 g) Kg 1 (= 4 sacchetti da 250 g)
Kg 0,500 (= 1 sacchetti da 500 g) Kg 0,500 (= 2 sacchetti da 250 g)

Partita n. :

NORME PRECAUZIONALI Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: derivato dell'urea. **Sintomi**: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia**: sintomatica. **Controindicazioni:** ----
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO: CIMOX 25 WP è un fungicida caratterizzato da proprietà citotropiche e translaminari, particolarmente efficace contro le Peronospore. CIMOX 25 WP esplica attività preventiva, curativa, (potendo controllare eventuali infezioni già in atto) con una persistenza d'azione di 4-5 giorni a seconda delle condizioni climatiche che si verificano dopo l'applicazione e dello stadio fenologico e di sviluppo delle colture. **Vite:** contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*) alla dose di g 80-100 per q.le di acqua (dose minima 800 g/Ha), iniziando gli interventi quando si verificano le condizioni climatiche che favoriscono l'infezione fino all'ingrossamento degli acini. Nel caso s'intervenga su infezioni già in atto effettuare due interventi ravvicinati a distanza di 4-5 giorni l'uno dall'altro.
CIMOX 25 WP può essere impiegato alla dose di 50-60 g/hl di acqua (dose minima: 500 g/Ha) in miscela con prodotti a base di Rame, Ditiocarbammati, Folpet, Dithianon, Dodina, ecc..; questi ultimi dovranno essere impiegati ad un dosaggio non inferiore al 70% rispetto a quello "pieno" riportato nelle rispettive etichette. **Patata, Pomodoro, Lattuga, Spinacio, Melone, Zucchino, Cipolla, Aglio, Porro, Pisello, Carciofo, Girasole, Soia, Tabacco, Rosa:** contro le Peronospore (*Phitophtora infestans, Bremia lactucae, Peronospora spinaciae, Pseudoperonospora cubensis, Peronospora scheledoni, Phytophtora porri, Peronospora pisi, Peronospora helianti, Peronospora manshurica, Peronospora tabacina, Peronospora sparsa*) alla dose di 80-100 g/hl iniziando i trattamenti allorché si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo dell'infezione. Su infezioni in atto con sintomi visibili effettuare due interventi ravvicinati a distanza di 4-5 giorni l'uno dall'altro.
Nel caso di impiego in miscela con altri fungicidi antiperonosporici, CIMOX 25 WP può essere applicato al dosaggio più basso previsto; è tuttavia consigliabile non impiegare mai meno di 500 g/Ha di formulato.
COMPATIBILITA': il formulato non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Poltiglia Solfocalcica ecc.).
AVVERTENZA D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all'introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione chiudere bene la scatola. **AVVERTENZA:** nel caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta della vite, patata, pomodoro, lattuga, spinacio, melone, zucchino, cipolla, aglio, porro, pisello, tabacco; 21 giorni per il carciofo e 28 giorni per girasole e soia.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO- DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE-IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE - NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE - EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE - DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE - DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE.**

25%

1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua.

2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti

3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore

4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ed..

5) ... aggiungere la restante parte d'acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

BITRON - DF

ERBICIDA SELETTIVO IN MICROGRANULI DISPERSIBILI DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Metamitron puro g 70
- Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative, in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)
A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)
Schirm GmbH Division Sideco - Lübeck (Germania)
Agan Chemical Manufacturers Ltd – Ashdod (Israel)

Stabilimento di confezionamento: SCAM Spa - Modena

Registrazione n. 8884 del 10/06/1996 del Ministero della Sanità

Kg 1/5/10 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI MEDICHE In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO Il BITRON-DF è un erbicida selettivo in microgranuli idrodispersibili, che agisce sulle malerbe per assorbimento radicale e, più limitatamente, per contatto con l'apparato fogliare. Interferisce sulla fotosintesi clorofilliana inibendo la reazione di Hill.
I sintomi visibili sulle infestanti sensibili son tipici ingiallimenti che evolvono rapidamente in necrosi dei tessuti con conseguente morte della pianta.
Viene impiegato sulla Barbabietola da zucchero per il controllo di numerose infestanti tra le quali Amaranto *(Amaranthus retroflexus)*, Anagallide *(Anagallis arvensis)*, Atriplice *(Atriplex spp.)*, Avena *(Avena spp.)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Camomilla *(Matricaria spp.)*, Canapa selvatica *(Galeopsis spp.)*, Centocchio *(Stellaria media)*, Coda di volpe *(Alopecurus myosuroides)*, Corregiola *(Polygonum aviculare)*, Erba calderina *(Senecio vulgaris)*, Erba calenzola *(Euphorbia spp)*, Erba morella *(Solanum nigrum)*, Erba strega *(Stachys spp.)*, Falaride *(Phalaris spp.)*, Falsa ortica *(Lamium spp.)*, Farinaccio *(Chenopodium spp.)*, Fienarola *(Poa annua)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Galinsoga *(Galinsoga parviflora)*, Miosotide *(Myosotis arvensis)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Poligoni *(Polygonum spp.)*, Ruchetta selvatica *(Diplotaxis erucoides)*, Spergola *(Spergula arvensis)*, Viola *(Viola spp.)*, ecc..

Pre-semina e pre-emergenza
- 4-5 Kg/Ha. Per ampliare lo spettro delle malerbe controllate e migliorare l'efficacia dell'intervento, è possibile impiegare BITRON-DF alla dose di 2,5-3,5 Kg/Ha in miscela con formulati a diverso meccanismo e spettro d'azione (Cloridazon, Etofumesate, Lenacil, Metolaclor, ecc.). Impiegare la dose massima nei terreni argillosi o ricchi di sostanza organica ed utilizzare un volume di acqua sufficiente a garantire una completa ed uniforme bagnatura della superficie trattata.

Post-emergenza
- Tecnica delle dosi molto ridotte (DMR)
- 0,3-0,7 Kg/Ha per ogni singola applicazione
-Tecnica del trattamento frazionato
- 0,5-1,0 Kg/Ha per ciascun intervento

BITRON-DF deve essere impiegato in miscela con formulati ad attività fogliare o ad assorbimento fogliare e/o radicale (Fenmedifam, Desmedifam, Etofumesate, Clopiralid, Triflusulfuron-metil, Lenacil, Cloridazon, ecc.).
Nel caso di un unico intervento tardivo elevare la dose di BITRON-DF a 1,5-2,5 Kg/Ha. Al fine di ottimizzare l'attività erbicida della miscela è consigliabile l'aggiunta di olii minerali, nonché l'applicazione di un volume di acqua adeguato alla tecnica di intervento adottata.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non si deve trattare durante la fioritura.
FITOTOSSICITA': effettuare solo le miscele consigliate ed evitare che la nube irrorante giunga a contatto con le colture adiacenti. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

DODOSCAM WDG

Fungicida citotropico in microgranuli idrodispersibili ad azione preventiva-curativa

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Dodina pura g 24
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi e la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: ADICA S.r.l. – Vera Montoro (TR)

Stabilimento di Confezionamento:
SCAM S.p.a. – Modena

Registrazione n. 8893 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: Kg 0,500 – 1 – 5 – 10

Partita n° ....

NORME PRECAUZIONALI: non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia. Irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE
DODOSCAM WDG è un fungicida endoterapico. Possiede non soltanto un'attività preventiva, ma anche una efficace azione curativa della malattia. S'impiega per la lotta contro le crittogame che attaccano le colture di seguito descritte.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

FRUTTICOLTURA	DOSI (g/hl)
Pomacee contro ticchiolatura del melo e del pero - trattamenti preventiv - trattamenti curativi	 200 300
Drupacee	
Ciliegio contro Antracnosi trattamenti preventiv contro Botrytis e Monilia	 200 220-250
Albicocco contro Corineo, Monilia e Ruggine trattamenti preventiv	 220-320
Pesco Contro bolla e corineo - trattamenti al bruno (caduta foglie e inizio rigonfiamento gemme) - trattamenti in vegetazione Contro Fusicoccum e Cytospora da inizio caduta foglie a rigonfiamento gemme - trattamenti in vegetazione Contro Monilia - trattamenti durante le fasi di fioritura-caduta petali - trattamenti nelle fasi di pre-raccolta Contro maculatura batterica (*Xanthomonas campestris pv. pruni*) Con andamento stagionale piovoso, trattamenti preventivi dopo la raccolta fino a inizio caduta foglie. La difesa autunno-invernale contro a batteriosi prosegue con i trattamenti eseguiti in tale periodo con Dodoscam wdg contro Bolla e Corineo da totale caduta foglie a bottone rosa	 220-320 220 320-400 250 220-250 220-320 320
Su pesche nettarine non impiegare il prodotto nella fase compresa fra la scamiciatura e l'accrescimento dei frutticini; nei trattamenti pre-raccolta evitare l'accumulo di irrorato nella zona apicale dei frutti	
Nespolo contro ticchiolatura - trattamenti preventiv - trattamenti curativi	 180-200 320
Olivicoltura contro "occhio di pavone"	240-320
Pioppicoltura contro Marssonina brunea - trattamenti preventiv - trattamenti curativi	 180-220 320
ORTICOLTURA **Cipolla** contro Peronospora - trattamenti preventiv - trattamenti curativi	 200-220 220-320
Lattuga e Spinacio contro Peronospora,Ramularia e Ruggine trattamenti preventiv	220-270
Sedano contro Septoriosi trattamenti preventiv	220-320
Finocchio e Carota contro Peronospora e Cercospora trattamenti preventiv	220-320
Pomodoro contro Peronospora e Septoriosi	220-320
- trattamenti preventivi - contro fusariosi	320 (8-10 g/mq)
Patata contro Peronospora trattamenti preventivi	220-320
Cucurbitacee (**melone e cocomero** in pieno campo) contro Peronospora e Antracnosi trattamenti preventivi	220-320
FLORICOLTURA **Garofano** contro fusariosi trattamenti preventivi	220-370

COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con formulati a reazione alcalina, con Dimetoato, Azinfos metile, con concimi fogliari minerali o a base di acidi umici. Miscele con formulati in emulsione concentrata o con olii minerali possono dare luogo a scarsa sospensibilità e a fenomeni di sensibilizzazione delle colture. Non trattare con acqua fredda e con temperature esterne prossime a 0°C.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: su mele Golden Delicious il prodotto può provocare rugginosità. Non impiegare il prodotto su pesche nettarine nella fase compresa fra la scamiciatura e l'accrescimento dei frutticini. Su pesche nettarine evitare nei trattamenti di pre-raccolta l'accumulo di irrorato nella zona apicale dei frutti. Su sedano, lattuga e spinacio, in corrispondenza di sbalzi termici e in associazione con prodotti in emulsione, il prodotto può essere fitotossico.
Su tutte le colture sopra indicate si raccomanda di effettuare saggi varietali onde accertare eventuali fenomeni di sensibilizzazione.
NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci.
Avvertenze: da non impiegare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi 10 giorni dal trattamento. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

FOSAL - SC

INSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Fosalone puro g 23 (= 250 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM S.p.a. - Modena
ISAGRO S.p.A. - Via Nettunense km. 23,400 Aprilia (LT)

Registrazione n. 8997 del 11/11/1996 del Ministero della Sanità

L 1/5/10 **Partita n.:**

NORME PRECAUZIONALI - Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Per lavorazioni sulla coltura da effettuare entro 21 giorni utilizzare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima che esse siano asciutte.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali:** confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' e CAMPI D'IMPIEGO: il FOSAL - SC è un insetticida in sospensione concentrata attivo per ingestione e, più limitatamente, per contatto. Possiede proprietà citotropiche, che conferiscono resistenza al dilavamento, accompagnate da una buona persistenza d'azione e da una elevata efficacia anche a temperature relativamente basse. E' caratterizzato da una bassa tossicità per l'uomo e l'acaroentomofauna utile, ed è pertanto indicato nei programmi di difesa guidata ed integrata. FOSAL - SC può essere impiegato sulle seguenti colture: **Pomacee, Drupacee, Agrumi, Vite, Fragola, Cavoli, Carciofo, Asparago, Lattuga, Indivia, Radicchio, Cardo, Sedano, Finocchio, Spinacio, Cucurbitacee, Melanzana, Peperone, Pomodoro, Patata, Fagiolo, Fava, Pisello, Cece, Lenticchia, Carota, Rapa, Ravanello, Aglio, Porro, Barbabietola da zucchero, Girasole, Erba medica, Lupinella, Sulla, Favino, Cereali, Floreali, Forestali e Ornamentali** contro i seguenti insetti: Afidi (*Mizus spp, ecc.)*, Tripidi *(Thryps spp., ecc.)*, Mosche *(Ceratitis spp., Pegomia spp., ecc)*, Tignole *(L. botrana, ecc.)*, Cimici *(Nezara spp., ecc)*, Bombici *(Leucoma spp., ecc.)*, Nottue *(Mamestra spp., ecc.)* , Processionaria (*T. phitocampa)*, Altiche *(Haltica spp., C. tibialis, ecc.)*, Antomi *(A.pomorum, ecc.)*, Rizotrogo *(Aequinoctialis spp.)*, Casside *(Cassida spp., ecc.)*, Cleono *(T. mendicus)*, Carpocapsa *(C. pomonella)*, Falene *(Lycia spp., ecc.)*, Rodilegni *(Z. pyrina, C. cossus, ecc.)*, Oplocampe *(Hoplocampa spp.)*, Cidia *(C. molesata, ecc.)*, Anarsia *(A. lineatella)*, Crioccre *(Crioceris spp., ecc)*, Ipopta *(Hypopta spp.)*, Fitonomo *(Hypera spp., ecc)*, Cecidomidi *(Desyneura spp., ecc.)*, Lema *(Oulema spp., ecc.)*, Piralide *(O. nubilalis, ecc.)*, Dorifora *(L. decemlineata)*. La dose d'uso, nelle applicazioni a "volume normale", è di 200-250 ml/hl di acqua. Negli interventi su colture erbacee impiegare 1,5 - 2,0 l/Ha di formulato.
COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': il prodotto è tossico per le gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame.
INERVALLI DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti per 21 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

CIMOFOL

FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO PER LA VITE
IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Cimoxanil puro		**g 8**
- Folpet puro		**g 63**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g 100**

FRASI DI RISCHIO: nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. – Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa – Modena
Registrazione n. 9085 del 20/01/1997 del Ministero della Sanità

Kg 1 / 5 / 10 **Partita n.**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOLPET 63%, CIMOXANIL 8%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FOLPET - Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia: irritazione gastro-intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica. **Controindicazioni:** == **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO Il CIMOFOL è un fungicida costituito da due principi attivi che agiscono sia per contatto che per penetrazione nei tessuti vegetali con azione citotropica translaminare.
Vite: contro la Peronospora, l'Escoriosi, ed attività collaterale contro la Botrytis cinerea alla dose di gr. 100-150 per q.le acqua con trattamenti che iniziano al verificarsi delle condizioni che possono provocare le infezioni e ripetuti fino a quando persistono.
COMPATIBILITA':
Il formulato non è miscibile con formulati a reazione alcalina (es. poltiglia bordolese, polisolfuri) e Olio Bianco. E' compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. I trattamenti devono essere distanziati di almeno 20 giorni dai trattamenti con prodotti a base di olii minerali e prodotti a base di zolfo.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Durante il trattamento si consiglia di tenere lontani gli animali domestici ed il bestiame. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore.
INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto sulle uve da tavola. Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.
NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

POLTIGLIA BORDOLESE 20 D.F.

FUNGICIDA CUPRICO TIPO BORDOLESE IN FORMULAZIONE DI MICROGRANULI DISPERDIBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- **Rame metallo** (sotto forma di solfato)		g 20
- **Coadiuvanti**	q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO: rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di produzione:
Industrias Quìmicas del Valles SA Mollet del Vallès – Barcellona (Spagna)
Stabilimento di confezionamento: SCAM Spa - Modena
Registrazione n. 9086 del 20/01/1997 del Ministero della Sanità
Kg 1/5/10/25 **Partita n.**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia**: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **Avvertenza**: consultare un Centro Antiveleni.
MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO La POLTIGLIA PORDOLESE 20 - D.F. é un fungicida a base di rame solfato neutralizzato alla calce, ad azione preventiva, con notevole persistenza, adesività e resistenza al dilavamento.
Viene impiegato sulle seguenti colture: (dosi riferite a q.le acqua, a meno che sia indicato diversamente)
VITE: contro la Peronospora alla dose di gr.650 - 1200 con trattamenti preventivi.
POMACEE: contro Ticchiolatura e Cancri rameali, con trattamenti autunno-invernali alla dose di gr. 1200 - 2000 e con trattamenti pre-fiorali alla dose di gr.600 e post-fiorali a gr.500 (solo su colture non sensibili).
DRUPACEE: contro Bolla e Corineo con trattamenti alla dose di gr.1200 - 1500 nei trattamenti autunno- invernali.
AGRUMI: contro Mal secco, Antracnosi, Fumaggine alla dose di gr. 600 - 1200 nei diversi stadi vegetativi.
OLIVO: contro Occhio di Pavone e Lebbra alla dose di gr. 600 - 1200.
PATATA, POMODORO: contro Peronospora, Alternaria, Batteriosi, Septoria, Cladosporiosi alla dose di gr. 600 - 1000.
ORTAGGI: contro Septoria, Cercospora, Peronospora, Antracnosi, Alternariosi, Batteriosi, Ruggine alla dose di gr. 600 - 1000.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cercospora e Vaiolatura delle foglie e la Peronospora alla dose di gr.700.
FLORICOLTURA: in pieno campo o in serra, contro la Peronospora, la Ticchiolatura, la Ruggine, la Septoriosi, Antracnosi alla dose di gr. 600 - 1000. **OLEAGINOSE**: contro la Peronospora gr. 4000 /Ha.
CEREALI: contro Ruggine alla dose di gr. 4000 /Ha. **TABACCO**: contro la Peronospora alla dose di gr. 700.
FRAGOLA: contro Vaiolatura rossa (sulla vegetazione autunnale) gr. 700 - 800 /hl.
RISO: gr. 6000 per ettaro contro le alghe verdi, con trattamenti alla comparsa dell'attacco.
NOCE: gr. 600 - 1000 per q.le acqua contro Antracnosi, con trattamenti iniziati in pre-fioritura e continuando in caso di necessità.
Nel periodo estivo si può aggiungere olio bianco (ml 150 per q.le acqua).
NOCCIOLO: gr. 600 - 800 per q.le acqua contro la Batteriosi (*Xanthomonas corylina*) con due trattamenti nel mese di ottobre, con 20-25 giorni di distanza tra gli stessi.
COMPATIBILITÀ: il prodotto é miscibile con gli zolfi bagnabili e colloidali, con i fertilizzanti fogliari. Non é miscibile con antiparassitari a reazione alcalina. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo, (meli cupro-sensibili: Abbondanza, Black-Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cupro-sensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego con la piena vegetazione.
RISCHI DI NOCIVITÀ': il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE- NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE - Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade**

TAMIFOS L.S.

INSETTICIDA-ACARICIDA IN CONCENTRATO SOLUBILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Methamidophos puro g 19,5 (= 228,11 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui art. 25 del DPR 23 Aprile 2001, n.290.

FRASI DI RISCHIO: molto tossico per inalazione e per ingestione. Tossico a contatto con la pelle. Irritante per gli occhi e la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM S.pa. - Modena

Registrazione n. 9151 del 28/02/97 del Ministero della Sanità

L 1/5/10 **Partita n.:**

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici (di prima comparsa):** nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici (di seconda comparsa):** astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali:** confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia :** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO
TAMIFOS L.S. è un'insetticida con buona efficacia acaricida ad azione sistemica che agisce per contatto e per ingestione. E' caratterizzato da proprietà citotropiche e translaminari e da una lunga persistenza d'azione. Può venire impiegato sulle seguenti colture:
Pomacee: contro Ricamatori (*Archips spp, C. reticulana , ecc*), Carpocapsa (*C. pomonella*), Afide verde (*A. pomi*), Orgia (*O. antiqua*), Acari (*P. ulmi, ecc.*), neanidi di Cocciniglie (*Q. perniciosus*) alla dose max. di 0.5 Kg/Ha di principio attivo (1-2 trattamenti).
Drupacee: (Albicocche – Pesche) contro Tripidi, Anarsia (*A. lineatella*), Cidia (*Cydia molesta*), Afidi (*M. persicae, ecc.*). Albicocche e Pesche: dose d'uso massimo 0,5 Kg/Ha per principio attivo (1-2 trattamenti). **Patata:** contro Afidi (*M. persicae, M. euphorbiae*), Dorifora (*L. decemlineata*) 2,0-2,5 l/ha.
Barbabietola da zucchero: contro Altica (*C. tibialis*), Cleono (*T. mendicus*), Afidi (*M.persicae , A. fabae*), Nottue (*Agrotis spp.*) alla dose di 2,0-2,5 l/ha.
Mais: contro la Piralide (*O. nubilalis*) 400-500 ml/hl. **Colture floreali:** (in pieno campo ed in serra): contro Afidi, Bega (*E. acerbella*), Tripidi, Aleurodidi (*T. vaporariorum*) alla dose di 200-250 ml/hl.
COMPATIBILITA': il prodotto non è miscibile con i preparati a reazione alcalina. Limitatamente alle pomacee il prodotto deve essere impiegato da solo.
FITOTOSSICITA': su colture di pero e melo non effettuare più di un trattamento al mese e non impiegare in miscela con altri prodotti fitosanitari. Non impiegare il prodotto su varietà molto sensibili (Golden delicious ad esempio). In floricoltura, data la molteplicità di specie e varietà coltivate, è consigliabile effettuare saggi preliminari su un numero limitato di piante.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per le api, gli insetti utili, per gli animali domestici, pesci, bestiame e selvaggina.
INTERVALLO : osservare un intervallo di 35 giorni dall'ultimo trattamento alla raccolta per Pomacee, Albicocche e Pesche; 21 giorni per le altre colture.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

DODOSCAM 65 WDG

FUNGICIDA IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Dodina pura		**g 65**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g 100**

FRASI DI RISCHIO: nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: **A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)**

Stabilimento di confezionamento: **SCAM Spa - Modena**
L.I.F.A. Srl - Isola Vicentina (VI) e Vigonovo (VE)

Registrazione n. 9340 del 15/09/1997 del Ministero della Sanità

kg 0,050 / 0,100 / 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10 **Partita n. :**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: **Sintomi:** a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia. Irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO DODOSCAM 65 WDG è un fungicida citotropico-translaminare dotato di attività preventiva e curativa. La formulazione in microgranuli idrodispersibili gli conferisce una migliore uniformità di distribuzione sulla vegetazione, praticità e sicurezza d'uso. DODOSCAM 65 WDG può essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi: **Melo, Pero:** contro la Ticchiolatura 70-80 g/hl nei trattamenti preventivi 120 g/hl nelle applicazioni curative (entro 60-72 ore dall'inizio della pioggia infettante). **Ciliegio:** contro la Cilindrosporiosi 80 g/hl e contro la Botrite 60-100 g/hl intervenendo preventivamente. **Albicocco:** contro la Monilia 80-100 g/hl con applicazioni preventive. **Pesco:** contro la Bolla e il Corineo 100 g/hl (1 kg/ha) intervenendo a caduta foglie; nei trattamenti in vegetazione 80 g/hl. Contro la Monilia 80-100 g/hl. **Nespolo:** contro la Ticchiolatura 60 g/hl nei trattamenti preventivi e 120 g/hl negli interventi curativi. **Vite:** contro la Peronospora 90-110 g/hl. **Olivo:** contro l'Occhio di Pavone e le Fumaggini 80-100 g/hl. **Fragola:** contro la Vaiolatura e la Botrite 75-100 g/hl con trattamenti preventivi. **Insalate:** contro la Peronospora, Botrite e Sclerotinia 70-100 g/hl. **Cipolla, Aglio, Porro:** contro la Peronospora 70-80 g/hl nei trattamenti preventivi e 100-120 g/hl negli interventi curativi ed eradicanti. **Spinacio:** contro la Peronospora e la Ramularia 80-100 g/hl. **Sedano:** contro la Septoria 100-120 g/hl. **Finocchio, Carota:** contro l'Alternaria e Sclerotinia 80-100 g/hl. **Basilico:** contro la Fusariosi 80-100 g/hl, distribuendo 4 l/m^2 di soluzione. **Pomodoro, Peperone, Melanzana:** contro la Peronospora e la Septoria 100-120 g/hl (1,0-1,2 kg/ha); contro la Fusariosi 120 g/hl distribuendo circa 3 - 4 l/m^2 di soluzione. **Cocomero, Melone, Zucca, Zucchino, Cetriolo:** contro la Peronospora e l'Antracnosi 100-120 g/hl intervenendo preventivamente. **Patata:** contro la Peronospora 100-120 g/hl. **Garofano:** contro la Fusariosi 80-100 g/hl nei trattamenti preventivi e 120 g/hl nelle applicazioni curative al piede delle piantine. **Rosa:** contro la Ticchiolatura 60-80 g/hl. **Pioppo:** contro la Marssonina 100 g/hl nei trattamenti preventivi e 120 g/hl nelle applicazioni curative.
COMPATIBILITA': DODOSCAM 65 WDG non è compatibile con clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina. Non è consigliabile miscelarlo con Carbaril, Dimetoato, Azinfos-metile e Diclorvos. In miscela con esteri fosforici emulsionabili e con olii minerali può dare origine a scarsa sospensività. Evitare i trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime allo 0°C.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': su varietà del gruppo Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%.
NOCIVITA': il prodotto è tossico per api, insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto. Da non impiegare durante la fioritura.
Avvertenza: non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

Foglio illustrativo

DODOSCAM 65 WDG

FUNGICIDA IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO DODOSCAM 65 WDG è un fungicida citotropico-translaminare dotato di attività preventiva e curativa. La formulazione in microgranuli idrodispersibili gli conferisce una migliore uniformità di distribuzione sulla vegetazione, praticità e sicurezza d'uso.
DODOSCAM 65 WDG può essere impiegato sulle colture ai seguenti dosaggi: **Melo, Pero:** contro la Ticchiolatura 70-80 g/hl nei trattamenti preventivi 120 g/hl nelle applicazioni curative (entro 60-72 ore dall'inizio della pioggia infettante). **Ciliegio:** contro la Cilindrosporiosi 80 g/hl e contro la Botrite 60-100 g/hl intervenendo preventivamente. **Albicocco:** contro la Monilia 80-100 g/hl con applicazioni preventive. **Pesco:** contro la Bolla e il Corineo 100 g/hl (1 kg/ha) intervenendo a caduta foglie; nei trattamenti in vegetazione 80 g/hl. Contro la Monilia 80-100 g/hl. **Nespolo:** contro la Ticchiolatura 60 g/hl nei trattamenti preventivi e 120 g/hl negli interventi curativi. **Vite:** contro la Peronospora 90-110 g/hl. **Olivo:** contro l'Occhio di Pavone e le Fumaggini 80-100 g/hl. **Fragola:** contro la Vaiolatura e la Botrite 75-100 g/hl con trattamenti preventivi. **Insalate:** contro la Peronospora, Botrite e Sclerotinia 70-100 g/hl. **Cipolla, Aglio, Porro:** contro la Peronospora 70-80 g/hl nei trattamenti preventivi e 100-120 g/hl negli interventi curativi ed eradicanti. **Spinacio:** contro la Peronospora e la Ramularia 80-100 g/hl. **Sedano:** contro la Septoria 100-120 g/hl. **Finocchio, Carota:** contro l'Alternaria e Sclerotinia 80-100 g/hl. **Basilico:** contro la Fusariosi 80-100 g/hl, distribuendo 4 l/m^2 di soluzione. **Pomodoro, Peperone, Melanzana:** contro la Peronospora e la Septoria 100-120 g/hl (1,0-1,2 kg/ha); contro la Fusariosi 120 g/hl distribuendo circa 3 - 4 l/m^2 di soluzione. **Cocomero, Melone, Zucca, Zucchino, Cetriolo:** contro la Peronospora e l'Antracnosi 100-120 g/hl intervenendo preventivamente. **Patata:** contro la Peronospora 100-120 g/hl. **Garofano:** contro la Fusariosi 80-100 g/hl nei trattamenti preventivi e 120 g/hl nelle applicazioni curative al piede delle piantine. **Rosa:** contro la Ticchiolatura 60-80 g/hl. **Pioppo:** contro la Marssonina 100 g/hl nei trattamenti preventivi e 120 g/hl nelle applicazioni curative.
COMPATIBILITA': DODOSCAM 65 WDG non è compatibile con clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina. Non è consigliabile miscelarlo con Carbaril, Dimetoato, Azinfos-metile e Diclorvos. In miscela con esteri fosforici emulsionabili e con olii minerali può dare origine a scarsa sospensività. Evitare i trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime allo 0°C.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': su varietà del gruppo Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%.
NOCIVITA': il prodotto è tossico per api, insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto. Da non impiegare durante la fioritura.
Avvertenza: non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Etichetta formato ridotto ai sensi dell'Art.16 comma 2 del D.L. 194/95 per le taglie da g 50 - 100

DODOSCAM 65 WDG

FUNGICIDA IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Dodina pura		**g 65**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g 100**

FRASI DI RISCHIO: nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Registrazione n. 9340 del 15/09/1997 del Ministero della Sanità

Stabilimento di produzione: A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)
Stabilimento di confezionamento: SCAM Spa - Modena
L.I.F.A. Srl - Isola Vicentina (VI) e Vigonovo (VE)

g 50 / 100 **Partita n. :**

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia. Irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

FOLTAN MGD

ANTICRITTOGAMICO IN FORMULAZIONE DI MICROGRANULI DISPERSIBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- **Folpet puro** g 80
- **Coformulanti** q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM S.p.a. - Modena
Schirm GmbH Division Sideco – Lübeck (Germania)
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A. - Mollet del Valles – Barcelona (E)
A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)

Registrazione n. 9629 del 14/05/98 del Ministero della Sanità

Kg 1/5/10/20 **Partita n.**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO
Il FOLTAN MGD formulato in microgranuli dispersibili é un fungicida organico che esplica la sua azione contro la Peronospora e la Botrytis (Muffa grigia). Possiede anche una azione collaterale antioidica.
VITE: contro la Peronospora e Botrytis g. 80/150 per q.le acqua.
COMPATIBILITA': é incompatibile con olii bianchi e polisolfuri. Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con oli minerali e polisolfuri.
AVVERTENZA: per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle; non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento; non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': é tossico per gli insetti utili ed i pesci.
INTERVALLO che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 10 giorni. Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 gg. prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

METRIN EC

INSETTICIDA PIRETROIDE A RIDOTTA TOSSICITÀ IN EMULSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- **Cipermetrina puro g 5 (= 49,28 g/l)**
- **Coformulanti q.b. a g 100**

FRASI DI RISCHIO: irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena
TERRANALISI Srl - Via IV Novembre, 19/1 - Renazzo di Cento (FE)
Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA Srl – S.Colombano al Lambro (MI)
Distribuito da: GUABER S.p.A. Via P.Gobetti, 4 – Funo (BO)

Registrazione n. 9631 del 14/05/1998 del Ministero della Sanità

Litri 0.010 / 0.050 / 0.100 / 0.250 / 0.500 / 1 / 5 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica e di rianimazione. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO METRIN EC è un insetticida piretroide a bassa tossicità ed ampio spettro d'azione, impiegabile su un gran numero di colture erbacee ed arboree. METRIN EC agisce per contatto e per ingestione nei confronti di numerose specie di fitofagi (Afidi, Dialeurodidi, Toritricidi, Nottuidi, Tignole, Dorifora, Piralide, Tripidi, Microlepidotteri fillominatori, Cocciniglie, ecc.). METRIN EC svolge inoltre un'azione repellente ed antirepellente delle colture trattate. La particolare formulazione in olio vegetale ne rende pratico e sicuro l'impiego. METRIN EC può essere usato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi: **Vite:** contro le Tignole (*L.botrana, C.ambiguella*) e Sigaraio (*B.betulae*) 100-150 ml/hl. **Pesco, Ciliegio:** contro Afide verde (*M.persicae*), Afide farinoso (*H.amygdali*), Afide bruno (*B.schwartzi*), Afide nero (*B.persicae*) 75-100 ml/hl intervenendo prima dell'accartocciamento delle foglie. Contro Anarsia (*A.lineatella*), Cidia (*C. Molesta*), Tripidi (*Thrips spp.*) e Mosca della frutta (*C.capitata*) 100-150 ml/hl. **Pero:** contro la Psilla (*P.piri*) 100-150 ml/hl nei trattamenti di fine inverno contro gli adulti svernanti e 150-200 negli interventi primaverili-estivi. Contro Afidi (*A.pomi*), Carpocapsa (*C.pomonella*), Microlepidotteri minatori (*L.scintella, L.blancardella*) 100-150 ml/hl. **Arancio, Limone:** contro Afide verde (*A.spiraecola, A.gossypii*), Afide bruno (*T.aurantii*), Dialeurodidi (*T. vaporariorum*), 75-100 ml/hl. Contro Tignola della Zagara (*P.citri*) e Mosca della frutta (*C.capitata*) 100-150 ml/hl. **Cavolo, Cavolfiore, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Cavolo broccolo, Fagiolino, Pisello, Pomodoro, Cipolla, Patata:** contro Afidi (*B.brassicae, A.fabae, A.pisum, M.persicae*), Nottue (*Agrotis spp.*), Cavolaie (*P.brassicae*), Tripidi (*Tripis spp.*), Dorifora (*L.decemlineata*), Mosca bianca (T.vaporarium), Cimice (*N.viridula*) 100-150 ml/hl. **Barbabietola da zucchero:** contro Altica (*C.tibialis*) 1000-1200 ml/ha. Contro Afidi (*A.fabae, M.persicae*), Nottue (*M.brassicae, A.gamma*), Cleono (*T.mendicus*), Lisso (*L.junci*), Casside (*Cassida spp.*) 500-1000 ml/ha. **Tabacco:** contro Afidi (*M.persicae, A.fabae*), Nottue (*Agrotis spp.*) Mosca bianca (*T.vaporariorum*) 75-150 ml/hl. **Mais:** contro Afidi (*R.padi*) e Piralide (*O.nubilalis*) 75-150 ml/hl. **Frumento:** contro Afidi (*S.avenae, S.graminum*) e Lema (*O.melanopa*) 75-100 ml/hl. **Soia:** contro Cimice verde (*N.viridula*) e Piralide (*U.ferrugalis*) 100-150 ml/hl. **Fiori, vivai, Colture ornamentali in campo:** contro Afidi e Mosca bianca (*T.vaporariorum*) 75-100 ml/hl. Contro Bega del garofano (*E.acerbella*), Tripidi (*Tripis spp.*), Nottue (*Agrotis spp.*) 100-200 ml/hl. **Pioppo:** contro Afidi, Saperda (*S.carcarians*), Criptorrinco (*C.lapathi*) 75-100 ml/hl.
DA NON IMPIEGARE IN SERRA
COMPATIBILITA' METRIN EC è compatibile con i più comuni prodotti fitosanitari ad eccezione di quelli a reazione fortemente alcalina.
AVVERTENZA In caso di miscela con latri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' METRIN EC è altamente selettivo per le colture riportate in etichetta; sulle colture floricole, in particolare su specie delicate è opportuno effettuate saggi preliminari.
INTERVALLO DI SICUREZZA Intervallo di tempo che deve trascorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: **3 giorni**: Soia; **7 giorni**:Piselli-Fagiolino-Cavolfiore-Cavolobroccolo, **14 giorni**: Cavolo-Cavolo cappuccio-Cavolo verza-Cipolla-Patata-Pesco-Ciliegio-Pero-Arancio-Limone.
21 giorni: Pomodoro-Barbabietola da zucchero, **28 giorni**: Vite-Mais, **42** giorni: Frumento, **60 giorni**: Tabacco.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO – SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE

Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

Foglio illustrativo

METRIN EC

Insetticida Piretroide a ridotta tossicità in emulsione concentrata

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO METRIN EC è un insetticida piretroide a bassa tossicità ed ampio spettro d'azione, impiegabile su un gran numero di colture erbacee ed arboree. METRIN EC agisce per contatto e per ingestione nei confronti di numerose specie di fitofagi (Afidi, Dialeurodidi, Toritricidi, Nottuidi, Tignole, Dorifora, Piralide, Tripidi, Microlepidotteri fillominatori, Cocciniglie, ecc.). METRIN EC svolge inoltre un'azione repellente ed antirepellente delle colture trattate. La particolare formulazione in olio vegetale ne rende pratico e sicuro l'impiego. METRIN EC può essere usato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi: **Vite:** contro le Tignole (*L.botrana, C.ambiguella*) e Sigaraio (*B.betulae*) 100-150 ml/hl. **Pesco, Ciliegio:** contro Afide verde (*M.persicae*), Afide farinoso (*H.amygdali*), Afide bruno (*B.schwartzi*), Afide nero (*B.persicae*) 75-100 ml/hl intervenendo prima dell'accartocciamento delle foglie. Contro Anarsia (*A.lineatella*), Cidia (*C. Molesta*), Tripidi (*Thrips spp.*) e Mosca della frutta (*C.capitata*) 100-150 ml/hl. **Pero:** contro la Psilla (*P.piri*) 100-150 ml/hl nei trattamenti di fine inverno contro gli adulti svernanti e 150-200 negli interventi primaverili-estivi. Contro Afidi (*A.pomi*), Carpocapsa (*C.pomonella*), Microlepidotteri minatori (*L.scintella, L.blancardella*) 100-150 ml/hl. **Arancio, Limone:** contro Afide verde (*A.spiraecola, A.gossypii*), Afide bruno (*T.aurantii*), Dialeurodidi (*T. vaporariorum*), 75-100 ml/hl. Contro Tignola della Zagara (*P.citri*) e Mosca della frutta (*C.capitata*) 100-150 ml/hl. **Cavolo, Cavolfiore, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Cavolo broccolo, Fagiolino, Pisello, Pomodoro, Cipolla, Patata:** contro Afidi (*B.brassicae, A.fabae, A.pisum, M.persicae*), Nottue (*Agrotis spp.*), Cavolaie (*P.brassicae*), Tripidi (*Tripis spp.*), Dorifora (*L.decemlineata*), Mosca bianca (T.vaporarium), Cimice (*N.viridula*) 100-150 ml/hl. **Barbabietola da zucchero:** contro Altica (*C.tibialis*) 1000-1200 ml/ha. Contro Afidi (*A.fabae, M.persicae*), Nottue (*M.brassicae, A.gamma*), Cleono (*T.mendicus*), Lisso (*L.junci*), Casside (*Cassida spp.*) 500-1000 ml/ha. **Tabacco:** contro Afidi (*M.persicae, A.fabae*), Nottue (*Agrotis spp.*) Mosca bianca (*T.vaporariorum*) 75-150 ml/hl. **Mais:** contro Afidi (*R.padi*) e Piralide (*O.nubilalis*) 75-150 ml/hl. **Frumento:** contro Afidi (*S.avenae, S.graminum*) e Lema (*O.melanopa*) 75-100 ml/hl. **Soia:** contro Cimice verde (*N.viridula*) e Piralide (*U.ferrugalis*) 100-150 ml/hl. **Fiori, vivai, Colture ornamentali in campo:** contro Afidi e Mosca bianca (*T.vaporariorum*) 75-100 ml/hl. Contro Bega del garofano (*E.acerbella*), Tripidi (*Tripis spp.*), Nottue (*Agrotis spp.*) 100-200 ml/hl. **Pioppo:** contro Afidi, Saperda (*S.carcarians*), Criptorrinco (*C.lapathi*) 75-100 ml/hl.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITA' METRIN EC è compatibile con i più comuni prodotti fitosanitari ad eccezione di quelli a reazione fortemente alcalina.

AVVERTENZA In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' METRIN EC è altamente selettivo per le colture riportate in etichetta; sulle colture floricole, in particolare su specie delicate è opportuno effettuate saggi preliminari.

INTERVALLO DI SICUREZZA Intervallo di tempo che deve trascorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: **3 giorni**: Soia; **7 giorni**: Piselli-Fagiolino-Cavolfiore-Cavolobroccolo. **14 giorni**: Cavolo-Cavolo cappuccio-Cavolo verza-Cipolla-Patata-Pesco-Ciliegio-Pero-Arancio-Limone.
21 giorni: Pomodoro-Barbabietola da zucchero, **28 giorni**: Vite-Mais, **42** giorni: Frumento, **60 giorni**: Tabacco.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Etichetta formato ridotto ai sensi dell'Art.16 comma 2 del D.L. 194/95 per le taglie da ml 10-50-100

METRIN EC

INSETTICIDA PIRETROIDE A RIDOTTA TOSSICITÀ IN EMULSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Cipermetrina puro g 5 (= 49,28 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena
Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA Srl – S.Colombano al Lambro (MI)
Distribuito da: GUABER S.p.A. Via P.Gobetti, 4 – Funo (BO)

Registrazione n. 9631 del 14/05/1998 del Ministero della Sanità

ml 10-50-100 **Partita n.**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica e di rianimazione. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SANAVIT COMBI

Fungicida polivalente ad azione antiperonosporica ed antioidica in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Cimoxanil puro	**g**	**2**
- Zolfo puro (esente da selenio)	**g**	**30**
- Rame metallo puro (sottoforma di ossicloruro)	**g**	**14,3**
- Coformulanti q.b. a	**g**	**100**

FRASI DI RISCHIO: nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena

Registrazione n. 9644 del 28/05/1998 del Ministero della Sanità

Kg 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10 **Partita n. :**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 2%, ZOLFO 30%, RAME METALLO 14,3%, le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. **Sintomi**: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
ZOLFO - === RAME - **Sintomi**: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori grastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica. **Controindicazioni**: === **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO: SANAVIT COMBI é un fungicida efficace contro le seguenti malattie:
Vite: contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*) e l'Oidio (*Uncinula necator. Oidium tuckeri*) alla dose di g 500-600 per q.le di acqua iniziando i trattamenti alla differenziazione dei grappolini e proseguendoli a cadenza di 6-8 giorni fino all'invaiatura.
Patata, Pomodoro: contro la Peronospora (*Phitophtora infestans*), Alternariosi (*Alternaria porri*), Oidio (*Levellula taurica, Erysiphe spp.*) alla dose di g/hl 600-800 intervenendo allorché si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia e distanziando gli interventi di 6-8 giorni in funzione dell'andamento stagionale. **Lattuga**: contro la Peronospora (*Bremia lactucae*) e l'Oidio (*Erysiphe cichoracearum*) alla dose di 500-600 g/hl. **Spinacio**: contro la Peronospora (*Peronospora spinaciae*) e l'Oidio (*Erysiphe cicoracearum*) alla dose di 500-600 g/hl. **Melone, Zucchino**: contro la Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*) e l'Oidio (*Erysiphe cicoracearum, Sphaerotheca fuligienea*) alla dose di 500-600 g/hl. **Cipolla, Aglio, Porro**: contro la Peronospora (*Peronospora schledeni, Phytophtora porri*), alla dose di 500-600 g/hl. **Pisello**: contro la Peronospora (*Peronospora pisi*) e l'Oidio (*Erysiphe polygoni*) alla dose di 500 g/hl. **Carciofo**: contro la Peronospora (*Bremia lactucae*) e l'Oidio (*Levellula taurica*) alla dose di 500 g/hl. **Girasole, Soia**: contro la Peronospora (*Peronospora Helianthi, Peronospora manshurica*) alla dose di 500 g/hl. **Tabacco**: contro la Peronospora (*Peronospora tabacina*) e l'Oidio (*Erysiphe cichoracearum*) alla dose di 500 g/hl. **Rosa**: contro la Peronospora (*Peronospora sparsa*) e l'Oidio (*Sphaerotheca pannosa*) alla dose di 500-600 g/hl.
COMPATIBILITA': il formulato è compatibile con tutti i fitosanitari a reazione neutra o acida, si sconsiglia di usarlo in associazione con fitosanitari a reazione alcalina e con prodotti oleosi; in caso di trattamento con questi ultimi, distanziare l'intervento di 3 settimane. Il formulato non è miscibile con polisolfuri. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura. Occorre che il formulato, come tutti i fitofarmaci, sia razionalmente impiegato, tenendo conto, tra l'altro, delle fasi fenologiche che presentano le piante da trattare.
RISCHI DI NOCIVITA': : è tossico per i pesci e gli insetti utili.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta per Vite, Patata, Pomodoro, Tabacco, Lattuga, Spinacio, Melone, Zucchino, Pisello, Cipolla, Aglio, Porro; 21 giorni per Carciofo e 28 giorni per Girasole e Soia.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del propagato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

VAMIK

INSETTICIDA SISTEMICO CON SPICCATA AZIONE AFICIDA
LIQUIDO SOLUBILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Vamidotion puro g 37,5 (= 401,25 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100
(contiene Cicloesanone)

Attenzione! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui art. 25 del DPR 23 Aprile 2001, n.290.

FRASI DI RISCHIO: infiammabile. Tossico per ingestione. Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM S.p.a. - Modena
Registrazione n. 9671 del 07/07/1998 del Ministero della Sanità

L 1/5 **Partita n.:**

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contengono il prodotto.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: **Sintomi:** colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali:** confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica , delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO: (dose per 100 litri d'acqua)
VAMIK è un insetticida sistemico che agisce per ingestione. Assorbito rapidamente dalle foglie, si diffonde all'interno della pianta con movimento acropeto arrivando a colpire anche i parassiti protetti dagli accartocciamenti fogliari e non direttamente raggiunti dal trattamento. Dotato di notevole persistenza d'azione (generalmente superiore alle 3 settimane) può svolgere la sua azione anche a temperature relativamente basse. Può essere utilizzato per la protezione delle seguenti colture: **Melo, Pero**: contro tutte le specie di Afidi *(E. lanigerum, A. pomi, R. insertum, D. reamuri, M. piraria, Dysaphis spp., ecc.)* 125 ml/h. Intervenire, dalla fase di post-fioritura in poi, alla prima comparsa dei parassiti. Per un controllo efficace di *Disaphis spp.* e *Aphis spp.* è consigliabile trattare a caduta petali. Contro Cecidomia *(Desineura spp.)* 125-150 ml/hl, intervenendo a caduta petali. Contro Tentredine *(M. abbreviatus)* 100-125 ml/hl trattando a caduta petali quando risultano infestati almeno il 5% dei mazzetti fiorali. Contro Cicaline *(E. rosae, ecc.)* 100-125 ml/hl.
VAMIK svolge inoltre, alle dosi sopra indicate, un'eccellente azione collaterale nei confronti di Acari ed Eriofidi.
COMPATIBILITA': non miscelare con sostanze alcaline (poltiglia bordolese, polisolfuri, permanganato di potassio). **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per animali domestici, insetti utili, pesci e bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA che deve essere osservato fra l'ultimo trattamento e la raccolta: 60 giorni.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

TIOWETTING DF

Fungicida a base di zolfo in microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Zolfo (esente da Selenio) g 80
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano-Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione:
ELF ATOCHEM AGRI S.A. - Usine de Canet, 3, Boulevard de la Louisiane - Marseille France
Agrostulln GmbH – Werk Stulln - Werksweg 2 – 92551 Stulln - Germania

Stabilimento di Confezionamento: SCAM S.p.a. - Modena

Registrazione n. 9724 del 03/09/1998 del Ministero della Sanità

Kg 1/10/25 **Partita n.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
Il TIOWETTING DF è un fungicida a base di zolfo in microgranuli idrodispersibili impiegabile per combattere l'Oidio o "mal bianco" delle colture. La particolare formulazione consente una elevata prontezza d'azione e una lunga persistenza sulla vegetazione. L'elevata qualità dello zolfo assicura una perfetta selettività nei confronti delle colture trattate anche facendo ricorso a dosaggi elevati e ad interventi ripetuti.
TIOWETTING DF può essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi:
Vite: 200-400 g/hl nelle zone a bassa pressione di oidio o nelle fasi di minore sensibilità al patogeno ad intervalli di 10-12 giorni; 400-600 g/hl nelle zone ad alta pressione di oidio o nei momenti di maggiore rischio di infezione intervenendo ogni 7-8 giorni.
Pomacee: 300-500 g/hl in pre-fioritura: 200-300 in post-fioritura. **Drupacee:** 200-400 g/hl in pre e post -fioritura; 400-600 g/hl nei trattamenti "estintivi" di post-raccolta. **Agrumi, Olivo:** 200-400 g/hl intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
Fragola: 200-500 g/hl iniziando gli interventi alla prima manifestazione della malattia. **Nocciolo:** 300-500 g/hl.
Ortaggi, Patata: 200-500 g/hl effettuando le prime applicazioni allorché insorgono i primi sintomi dell'infezione: impiegare i dosaggi più elevati nel periodo primaverile e nei momenti di maggiore pressione del patogeno.
Barbabietola da Zucchero: 6-8 Kg/Ha effettuando il primo trattamento alla comparsa dei sintomi ed effettuando i successivi ad intervalli di 15-20 giorni. **Cereali:** 6-8 Kg/Ha intervenendo alla comparsa della malattia sulle ultime due foglie del culmo.
Girasole, Soia, Tabacco: 4-6 Kg/Ha. **Vivai di Pioppo:** 200-400 g/hl.
Colture Floreali, Ornamentali e Forestali: 150-400 g/hl intervenendo ai primi sintomi della malattia.
FITOTOSSICITA': TIOWETTING DF può risultare fitotossico sulle seguenti cultivar: Mele: Black Ben Davis, Black Staiman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.
Pere: Buona Luisa D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser, Oliver de Serres, William, Decana del Comizio.
Vite: Sangiovese.
COMPATIBILITA': il TIOWETTING DF non è compatibile con antiparassitari a reazione alcalina, Olii minerali e Diclofluanide. TIOWETTING DF deve essere irrorato ad almeno tre settimane di distanza dall'applicazione di olii minerali.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto.
COMPATIBILITA': non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Diclofluanide.
Avvertenza: deve essere irrorato a distanze di almeno tre settimane dall'impiego di olii minerali e del Captano.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

TRIDAN COMBI

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE
PER LA LOTTA CONTRO L'OIDIO DELLE COLTURE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Triadimenol puro		g	2,5
- Zolfo puro (esente da selenio)		g	50
- Coformulanti	q.b. a	g	100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM S.p.a. - Modena
STI-SOLFOTECNICA Spa - Via Torricelli, 2 - Cotignola (RA)
STI-SOLFOTECNICA Spa - Via Pian d'Asso Fraz.Torrenieri - Montalcino (SI)
Registrazione n. 9725 del 03/09/1998 del Ministero della Sanità

Kg 0,200 / 0,500 / 1 / 5 / 10 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi dell'associazione delle seguenti sostanze attive: TRIADIMENOL 2,5%; ZOLFO PURO 50%; le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
TRIADIMENOL - Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni da tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
ZOLFO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO: TRIDAN COMBI è un fungicida che associa l'attività sistemica del Triadimenol con l'azione di contatto dello zolfo.
E' indicato per combattere l'oidio o "mal bianco" delle seguenti colture:
Vite: (da vino) 100-200 g/hl effettuando interventi ad intervalli di 10-14 giorni - (da tavola) 150-200 g/hl trattando a cadenza di 8-12 giorni.
Melo: 100-150 g/hl svolge azione collaterale contro la ticchiolatura.
Melone, Zucchino, Cetriolo, Peperone, Pomodoro: 100-200 g/hl intervenendo a cadenze di 7-10 giorni in funzione della sensibilità varietale e della pressione della malattia.
COMPATIBILITA': il TRIDAN COMBI é miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra. Non è miscibile con gli olii minerali. Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del captano. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico su vite Sangiovese e su cucurbitacee.
Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 7 giorni per lo zucchino, 14 giorni per il melo, la vite, il melone, il cetriolo, il peperone ed il pomodoro.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

TRIDAN COMBI

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE
PER LA LOTTA CONTRO L'OIDIO DELLE COLTURE
IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Triadimenol puro g 2,5
- Zolfo puro esente da selenio g 50
- Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

Da sciogliere in acqua senza rompere

Contenuto 0,250-1 kg

Avvertenza: leggere l'etichetta riportata sulla confezione prima di utilizzare il prodotto

DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164
41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Registrazione n. 9725 del 03/09/1998 del Ministero della Sanità

TRIDAN COMBI

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE
PER LA LOTTA CONTRO L'OIDIO DELLE COLTURE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Triadimenol puro		**g 2,5**
- Zolfo puro (esente da selenio)		**g 50**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g 100**

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM S.p.a. – Modena STI-SOLFOTECNICA Spa - Via Torricelli, 2 - Cotignola (RA)
STI-SOLFOTECNICA Spa - Via Pian d'Asso Fraz.Torrenieri - Montalcino (SI)
Registrazione n. 9725 del 03/09/1998 del Ministero della Sanità

kg 1 (=4 sacchetto da 0,250 kg) kg 1 (=1 sacchetto da 1 kg) kg 5 (=5 sacchetti da 1 kg) Partita n.

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi dell'associazione delle seguenti sostanze attive: TRIADIMENOL 2,5%; ZOLFO PURO 50%; le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
TRIADIMENOL - Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni da tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
ZOLFO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO: TRIDAN COMBI è un fungicida che associa l'attività sistemica del Triadimenol con l'azione di contatto dello zolfo. E' indicato per combattere l'oidio o "mal bianco" delle seguenti colture:
Vite: (da vino) 100-200 g/hl effettuando interventi ad intervalli di 10-14 giorni - (da tavola) 150-200 g/hl trattando a cadenza di 8-12 giorni.
Melo: 100-150 g/hl svolge azione collaterale contro la ticchiolatura.
Melone, Zucchino, Cetriolo, Peperone, Pomodoro: 100-200 g/hl intervenendo a cadenze di 7-10 giorni in funzione della sensibilità varietale e della pressione della malattia.
COMPATIBILITA': il TRIDAN COMBI é miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra. Non è miscibile con gli olii minerali. Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del captano. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all'introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.
FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico su vite Sangiovese e su cucurbitacee.
Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 7 giorni per lo zucchino, 14 giorni per il melo, la vite, il melone, il cetriolo, il peperone ed il pomodoro.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - DA NON VENDERSI SFUSO – SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE - NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE- EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE- DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE-DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

25%

1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua
2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti
3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore
4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti e...
5) ...aggiungere la restante parte d'acqua necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

GROLEN

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE
PER LA LOTTA CONTRO GLI AGENTI PATOGENI DEL TERRENO

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
- Tolclofos metile puro g 50
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511
Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena
TERRANALISI Srl - Via N.Bixio n.6 - Cento (FE)
Registrazione n. 9797 del 02/11/1998 del Ministero della Sanità

Kg 0,100 / 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10 Partita n.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO GROLEN è un fungicida ad ampio spettro d'azione in grado di controllare i più importanti patogeni (*Rhizoctonia* spp., *Corticium* spp., *Sclerotinia* spp., *Alternaria* spp., *Leptospharia* spp., *Typhula* spp., *Botritys* spp., ecc.) responsabili dei marciumi radicali e della vegetazione aerea di numerose colture. GROLEN possiede proprietà preventive e curative ed é in grado di controllare anche i ceppi fungini divenuti resistenti o tolleranti ai fungicidi di uso più comune.
GROLEN può essere impiegato sulle seguenti colture:
Lattuga, Radicchio: contro *R.Solani* e *S.Sclerotiorum* alla dose di 2-4 g/m^2 effettuando interventi sia durante la coltivazione in semenzaio che dopo il trapianto in pieno campo. In presenza di cultivar particolarmente sensibili ai patogeni aumentare la dose a 5-8 g/m^2. Nelle applicazioni fogliari utilizzare 1-2 Kg/Ha di prodotto effettuando 2-3 interventi ad intervalli di 15-20 giorni.
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cocomero, Zucchino, Cavoli, Carota, Fagiolo, Fagiolino: contro *R.Solani, S.Sclerotiorum, C.Rolfsii, A.Solani, Leptosphoria* spp., *Botritys* spp, alla dose di 2-4 g/m^2 nelle applicazioni al terreno e 1-2 Kg/Ha nelle irrorazioni fogliari.
Zucca, Aglio, Cipolla: contro *R.Solani, S.Sclerotiorum, C.Rolfsii,* alla dose di 2-4 g/m^2 nelle applicazioni al terreno.
Patata: contro la *R.Solani* alla dose di 200-300 g/hl effettuando l'immersione o il trattamento dei bulbi prima del loro trapianto. GROLEN può essere impiegato anche per applicazioni al terreno utilizzando 10-20 Kg/Ha nei trattamenti a pieno campo e 80-120 g/m lineare nei trattamenti localizzati lungo il solco di semina.
Barbabietola da Zucchero: contro *R.Solani* e *C.Rolfsii* alla dose di 1-2 Kg/Ha nei trattamenti localizzati al terreno.
Frumento: contro *R.Solani* alla dose di 1-2 Kg/ha nei trattamenti all'apparato fogliare.
Colture floreali: contro *R.Solani* alla dose di 3-5 g/m^2 avendo cura di distribuire uniformemente il prodotto sulla superficie del terreno e alla base della pianta. GROLEN può essere utilizzato anche nella concia a secco di tuberi, bulbi e rizomi alla dose di 1 g/Kg di materiale e nella concia umida alla dose di 200 g/hl immergendo il materiale da trattare per circa 10 minuti nella soluzione così preparata.
GROLEN può anche essere impiegato per la **concia delle sementi di Lattuga, Radicchio, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cocomero, Zucchino, Cavoli, Carota, Fagiolino, Fagiolo, Soia, Barbabietola da zucchero, Frumento** alla dose di 80-100 g/Kg di seme.
Campi da golf: contro la *Rhizoctonia* spp. alla dose di 2-5 g/m^2, avendo cura di bagnare uniformemente la superficie trattata.
GROLEN può infine essere usato per la disinfezione dei **terricci e dei letti di semina dei semenzai** impiegando 200-250 g/m^3 di formulato.
COMPATIBILITA': GROLEN é compatibile con i preparati fitosanitari a reazione acida.
FITOTOSSICITA': il prodotto, se impiegato secondo le modalità sopra prescritte, risulta perfettamente selettivo per le colture indicate in etichetta. Tuttavia su cultivar poco diffuse o di recente introduzione é consigliabile effettuare saggi preventivi. Non trattare colture sofferenti a seguito di abbassamenti termici, siccità o altre cause.
INTERVALLO DI SICUREZZA: intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 15 giorni per i Cavoli; 30 giorni per Lattuga, Radicchio, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Fagiolo, Fagiolino, Barbabietola da zucchero; 45 giorni per lo Zucchino; 60 giorni per il Cocomero.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI -PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

GROLEN

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI
PER LA LOTTA CONTRO GLI AGENTI PATOGENI DEL TERRENI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Tolclofos metile puro g 50
- Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Da sciogliere in acqua senza rompere

Contenuto 100 - 250 - 500 g

Avvertenza: prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente l'etichetta.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164
41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Registrazione n. 9797 del 02/11/1998 del Ministero della Sanità

GROLEN

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

PER LA LOTTA CONTRO GLI AGENTI PATOGENI DEL TERRENO IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Tolclofos metile puro	**g**	**50**
- Coformulanti q.b. a	**g**	**100**

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena
TERRANALISI Srl - Via N.Bixio n. 6 - Cento (FE)

Registrazione n. 9797 del 02/11/1998 del Ministero della Sanità

Kg 1 (= 4 x 0,250) **Partita n.**

Kg 1 (= 2 x 0,500) kg 0,500 (= 5 x 0,100)

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO GROLEN è un fungicida ad ampio spettro d'azione in grado di controllare i più importanti patogeni (*Rhizoctonia* spp., *Corticium* spp., *Sclerotinia* spp., *Alternaria* spp., *Leptospharia* spp., *Typhula* spp., *Botritys* spp., ecc.) responsabili dei marciumi radicali e della vegetazione aerea di numerose colture. GROLEN possiede proprietà preventive e curative ed é in grado di controllare anche i ceppi fungini divenuti resistenti o tolleranti ai fungicidi di uso più comune. GROLEN può essere impiegato sulle seguenti colture:

Lattuga, Radicchio: contro *R.Solani* e *S.Sclerotiorum* alla dose di 2-4 g/m^2 effettuando interventi sia durante la coltivazione in semenzaio che dopo il trapianto in pieno campo. In presenza di cultivars particolarmente sensibili ai patogeni aumentare la dose a 5-8 g/m^2. Nelle applicazioni fogliari utilizzare 1-2 Kg/Ha di prodotto effettuando 2-3 interventi ad intervalli di 15-20 giorni. **Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cocomero, Zucchino, Cavoli, Carota, Fagiolo, Fagiolino**: contro *R.Solani, S.Sclerotiorum, C.Rolfsii, A.Solani, Leptosphoria* spp., *Botritys* spp, alla dose di 2-4 g/m^2 nelle applicazioni al terreno e 1-2 Kg/Ha nelle irrorazioni fogliari. **Zucca, Aglio, Cipolla:** contro *R.Solani, S.Sclerotiorum, C.Rolfsii,* alla dose di 2-4 g/m^2 nelle applicazioni al terreno. **Patata**: contro la *R.Solani* alla dose di 200-300 g/hl effettuando l'immersione o il trattamento dei bulbi prima del loro trapianto. GROLEN può essere impiegato anche per applicazioni al terreno utilizzando 10-20 Kg/Ha nei trattamenti a pieno campo e 80-120 g/m lineare nei trattamenti localizzati lungo il solco di semina. **Barbabietola da Zucchero**: contro *R.Solani* e *C.Rolfsii* alla dose di 1-2 Kg/Ha nei trattamenti localizzati al terreno. **Frumento**: contro *R.Solani* alla dose di 1-2 Kg/ha nei trattamenti all'apparato fogliare. **Colture floreali**: contro *R.Solani* alla dose di 3-5 g/m^2 avendo cura di distribuire uniformemente il prodotto sulla superficie del terreno e alla base della pianta. GROLEN può essere utilizzato anche nella concia a secco di tuberi, bulbi e rizomi alla dose di 1 g/Kg di materiale e nella concia umida alla dose di 200 g/hl immergendo il materiale da trattare per circa 10 minuti nella soluzione così preparata. GROLEN può anche essere impiegato per la **concia delle sementi di Lattuga, Radicchio, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cocomero, Zucchino, Cavoli, Carota, Fagiolino, Fagiolo, Soia, Barbabietola da zucchero, Frumento** alla dose di 80-100 g/Kg di seme. **Campi da golf:** contro la *Rhizoctonia* spp. alla dose di 2-5 g/m^2, avendo cura di bagnare uniformemente la superficie trattata. GROLEN può infine essere usato per la disinfezione dei **terricci e dei letti di semina dei semenzai** impiegando 200-250 g/m^3 di formulato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': GROLEN é compatibile con i preparati fitosanitari a reazione acida. **AVVERTENZA D'USO**: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all'introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione chiudere bene la scatola. **AVVERTENZA**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il prodotto, se impiegato secondo le modalità sopra prescritte, risulta perfettamente selettivo per le colture indicate in etichetta. Tuttavia su cultivar poco diffuse o di recente introduzione é consigliabile effettuare saggi preventivi. Non trattare colture sofferenti a seguito di abbassamenti termici, siccità o altre cause.

INTERVALLO DI SICUREZZA: intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 15 giorni per i Cavoli; 30 giorni per Lattuga, Radicchio, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Fagiolo, Fagiolino, Barbabietola da zucchero; 45 giorni per lo Zucchino; 60 giorni per il Cocomero. **ATTENZIONE:** da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO-IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE - NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE - Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

- DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE.

25%

1) Riempire l'atomizzatore del 25% di acqua.

2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti

3) Introdurre i sacchetti ne l'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore

4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ec..

5) ... aggiungere a restante parte d'acqua necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

CLOPIX 100 LS

ERBICIDA SELETTIVO DEI CEREALI, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, CAVOLI, RAPA, CIPOLLA, BIETOLA DA ORTO, COLZA

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono
- Clopyralid puro sottoforma di acido g 9,5 (= 100 g/l) pari a g 12,5 (= 131,8 g/l) di sale monoetanolamminico
- Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione : SCAM Spa - Modena
TERRANALISI Srl - Via N.Bixio, 6 Cento (Ferrara)
CHIMAC-AGRIPHAR S.A. – Ougrée (Belgio)
Registrazione n. 9798 del 02/11/1998 del Ministero della Sanità

Litri 0,500 / 1 / 5 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE: CLOPIX 100 LS è un erbicida che agisce per assorbimento fogliare ed in parte radicale su numerose infestanti annuali e perenni quali: Anthemis arvensis (*Camomilla bastarda)*, Ammi majus (*Carota selvatica*), Bifora spp. (*Coriandolo fetido*), Cirsium arvense (*Stoppione*), Dacus carota (*Carota*), Matricaria Camomilla (*Camomilla*), Rumex spp. (*Romici*), Sonchus spp. (*Crespino*), Tussillago farfara (*Farfara*), Vicia spp. (*Veccia*), Xanthium italicum (*Spino d'asino*). E' parzialmente efficace nei confronti di Polygonum persicaria (*Persicaria maggiore*), Polygonum aviculare (*Corregiola*) e Solanum nigrum (*Erba morella*). Controlla inoltre gli eventuali ricacci di Girasole (*Heliantus spp.*).
NOCIVITA' Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
FRUMENTO, ORZO, SEGALE, AVENA: 0,8 - 1,0 l/ha
L'intervento va effettuato nel periodo intercorrente tra la fase di accestimento e la fase di botticella del cereale.
MAIS: 0,8 - 1,0 l/ha
L'applicazione deve essere eseguita su coltura alta 15-30 cm.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO:
a) Tecnica del trattamento unico: si deve intervenire quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa tra le 2 e le 4 foglie vere e le infestantinon risultano eccessivamente sviluppate alle seguenti dosi:
- con presenza prevalente di Cirsum arvense (Stoppione) 0,8 - 1,0 l/ha
- con infestazione di Matricaria Camomilla (Camomilla) 1,2 - 1,5 l/ha

b) Tecnica del trattamento frazionato: il primo trattamento va effettuato quando la barbabietola si trova nella fase compresa tra il massimo sviluppo cotiledonare e le 2 foglie vere alla dose di 0,5 - 0,8 l/ha. La successiva applicazione deve essere ripetuta, mantenendo inalterati i dosaggi, a distanza di 10-12 giorni in funzione dell'evoluzione della flora infestante.
CAVOLI (Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo verza, Cavolo bianco, Cavolo rosso, Cavolo cappuccio, Cavolo cinese, Cavolo di Bruxelles, Cavolo rapa, Cavolo nero), RAPA, CIPOLLA, BIETOLA da orto, COLZA: l'intervento va effettuato alla dose di 1,2 - 1,5 l/ha.
COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con gli erbici ormonici sotto forma di sali per i cereali.
FITOTOSSICITA' : il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non seminare Soia su terreno sodo dopo colture di cereali trattate con CLOPIX 100 LS.
INTERVALLO DI SICUREZZA: per il MAIS sospendere i trattamenti 45 giorni prima del raccolto.
Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva tossica per gli organismi acquatici. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità di impiego indicate.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO-SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

TRIDAN L.S.

Fungicida liquido solubile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Triadimenol puro g 22,9 (= 249,61 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: irritante per gli occhi e per la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511
Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena
Registrazione n. 9844 del 03/12/1998 del Ministero della Sanità

L 0,100 / 0,250 / 0,500 / 1 /5 **Partita n. :**

NORME PRECAUZIONALI Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Triadimenol organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.
MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO
TRIDAN L.S. è un fungicida triazolico ad attività sistemica particolarmente efficace contro l'oidio o "mal bianco" delle colture.
Agisce preventivamente, curativamente ed in modo "eradicante" assicurando una completa protezione della vegetazione. Può essere impiegato sulle seguenti colture:
VITE:
-(da vino); 10-15 ml/hl effettuando gli interventi ad intervalli di 12-14 giorni.
-(da tavola): 12,5-15 ml/hl trattando a cadenze di 10-12 giorni.
Nel caso si intervenga su infezioni già in atto o in situazioni di particolare criticità per la malattia, aumentare la dose a 20 ml/hl e ridurre prudenzialmente l'intervallo a 9-10 giorni.
TRIDAN L.S. esercita alle dosi maggiori tra quelle indicate attività collaterale nei riguardi del marciume nero o Black-Rot *(G. bidwelli).*
MELO: 10-15 ml//hl; svolge un'efficace azione collaterale nei confronti della Ticchiolatura (*V. inaequalis).*
MELONE, ZUCCHINO, CETRIOLO, PEPERONE, POMODORO: 10-20 ml/hl intervenendo ogni 7-10 giorni in funzione della sensibilità varietale e della pressione della malattia.
FRUMENTO, ORZO: 0,4-0,5 l/Ha intervenendo alla comparsa dei primi sintomi
TRIDAN L.S. controlla efficacemente anche Ruggini (*Puccinia spp., ecc.*), Septoria (*Septoria spp.*), Elmintosporiosi (*Helminthosporium spp.*) e Rincosporiosi (*Rincosporum spp.*)
COLTURE ORNAMENTALI: 10-20 ml/hl, avendo cura di bagnare accuratamente la vegetazione. TRIDAN L.S. controlla efficacemente anche Ruggini, Septoria.
COMPATIBILITÀ: evitare le miscele con preparati a reazione fortemente alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': su cultivar di Melo sensibili alla rugginosità della buccia impiegare solo fino alla fioritura.
PERIODO DI CARENZA Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta:
- 7 giorni per lo Zucchino, 14 giorni per Vite, Melo, Melone, Cetriolo, Peperone e Pomodoro - 30 giorni per Frumento e Orzo.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

ARPEL RAMATO

Fungicida sistemico e di copertura in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Fosetil Alluminio puro	**g**	**30**
- Rame metallo (da solfato di rame neutralizzato con calce spenta)	**g**	**15**
- Coformulanti	**q.b. a g**	**100**

FRASI DI RISCHIO: nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena

Registrazione n. 9853 del 04/12/1998 del Ministero della Sanità

Kg 0,100 / 0,250 / 0,500 / 1 / 2 / 5 / 10 **Partita n. :**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Fosetil Alluminio 30%, Rame metallo (da solfato neutralizzato con calce spenta) 15% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: FOSETIL-ALLUMINIO **Sintomi:** sedazione, dispnea, depressione. RAME METALLO **Sintomi:** denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia** : gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE ARPEL RAMATO è un fungicida antiperonosporico dotato di attività preventiva e notevole persistenza d'azione. Associa in sé l'efficacia del Fosetil-alluminio, principio attivo dotato di proprietà sistemiche in grado di proteggere anche la vegetazione formatasi successivamente all'effettuazione dei trattamenti, e del Rame, che assicura prolungata copertura della vegetazione e una notevole attività collaterale nei confronti delle batteriosi. In virtù di queste sue peculiari caratteristiche, ARPEL RAMATO può essere impiegato ad intervalli più ampi rispetto ai tradizionali fungicidi di copertura o ad attività citotropica.
MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO L'ARPEL RAMATO può essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi: **Vite**: contro la Peronospora *(P. viticola)* 400-500 g/hl con interventi preventivi ad intervalli di 10-14 giorni. Svolge un'azione collaterale nei confronti del marciume nero dei grappoli *(G. bidwellii)*. Nelle applicazioni su Moscato d'Asti, Schiava, sulle uve da tavola e in tutte le zone soggette a forti sbalzi termici ridurre la dose a 300 g/hl riducendo a 8 giorni l'intervallo tra i trattamenti. **Pero**: contro la Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) 300 g/hl in pre-fioritura e nelle applicazioni estintive di post-raccolta. Dalla fase di allegagione del frutto fino al mese di giugno ridurre il dosaggio a 150-200 g/hl trattando ogni ogni 7-8 giorni . **Pesco**: contro la Bolla *(T. deformans)* ed il Corineo *(C. beijerinckii)* 500-600 g/hl con trattamenti effettuati a caduta foglie e al rigonfiamento delle gemme. **Pomodoro**: contro la Peronospora *(P. infestans)*, Alternaria *(A. solani)*, Septoria *(S. lycopersici)*, Cladosporiosi (*C. fulvum*) 5,0-6,0 Kg/ha intervenendo a cadenze di 8-12 giorni. **Patata:** contro la Peronospora *(P. infestans)* 4 Kg/Ha trattando ogni 8-10 giorni. Non effettuare più di 4 applicazioni per anno. **Melone - Cocomero - Cetriolo - Spinacio**: contro la Peronospora *(P. cubensis, P. spinaciae)* 5,0-6,0 Kg/ha effettuando trattamenti ad intervalli di 8-12 giorni. **Lattuga - Carciofo**: contro la Peronospora *(B. lactucae)* 4,0-5,0 Kg/ha intervenendo ogni 8-12 giorni. **Arancio - Limone - Mandarino - Pompelmo**: contro la Fitoftora *(Phytophtora spp.)* Antracnosi *(C. gloesporioides)*, Mal secco *(D. tracheiphila)* 400-500 g/hl con applicazioni fogliari. **Colture ornamentali**: contro la Fitoftora *(P. cinnamomi)* 10-20 g/m² effettuando innaffiature alla base delle piante ad intervalli di 25-30 giorni a partire dall'inizio della primavera.
COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con i preparati a base oleosa, contenenti Dicofol e con i concimi fogliari ad elevato titolo di azoto.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non trattare durante la fioritura. Su Pesco e varietà di Pero cuprosensibili (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guynot, Favorite di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) il prodotto può dare origine a fenomeni fitotossici. Su colture di lattuga si possono verificare fenomeni di sensibilità al prodotto in concomitanza di sbalzi termici. Su vite alle dosi maggiori può essere fitotossico sulle varietà "Moscato d'Asti" e "Schiava"; sulle uve da tavola e in tutte le zone soggette a forti sbalzi termici.
NOCIVITÀ': il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 80 giorni per Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo; 40 giorni per Pesco, Pero, Vite; 20 giorni per Pomodoro, Patata, Melone, Cocomero, Cetriolo, Spinacio, Lattuga, Carciofo.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

ARPEL RAMATO

FUNGICIDA SISTEMICO E DI COPERTURA IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Fosetil Alluminio puro g 30
- Rame metallo
  (da solfato di rame neutralizzato con calce spenta) g 15
- Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

ATTENZIONE: prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente l'etichetta

Da sciogliere in acqua senza rompere

Non toccare con mani o guanti bagnati

Contenuto 500 – 1000 g

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164
41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Registrazione n. 9853 del 04/12/1998 del Ministero della Sanità

ARPEL RAMATO

Fungicida sistemico e di copertura in polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Fosetil Alluminio puro	**g**	**30**
- Rame metallo (da solfato di rame neutralizzato con calce spenta)	**g**	**15**
- Coformulanti	**q.b. a g**	**100**

FRASI DI RISCHIO: nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena

Registrazione n.9853 del 04/12/1998 del Ministero della Sanità

Kg 1 (= 2 sacchetti da 500 g), Kg 2 (= 2 sacchetti da 1000 g),
Kg 5 (= 10 sacchetti da 500 g), Kg 5 (= 5 sacchetti da 1000 g) Partita n. :

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Fosetil Alluminio 30%, Rame metallo (da solfato neutralizzato con calce spenta) 15% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: FOSETIL-ALLUMINIO **Sintomi:** sedazione, dispnea, depressione. RAME METALLO **Sintomi:** denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia** : gastrolusi con soluzione latto-albuminosa. se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale é agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro Antiveleni
CARATTERISTICHE ARPEL RAMATO é un fungicida antiperonosporico dotato di attività preventiva e notevole persistenza d'azione. Associa in sé l'efficacia del Fosetil-alluminio, principio attivo dotato di proprietà sistemiche in grado di proteggere anche la vegetazione formatasi successivamente all'effettuazione dei trattamenti, e del Rame, che assicura prolungata copertura della vegetazione e una notevole attività collaterale nei confronti delle batteriosi. In virtù di queste sue peculiari caratteristiche, ARPEL RAMATO può essere impiegato ad intervalli più ampi rispetto ai tradizionali fungicidi di copertura o ad attività citotropica.
MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO L'ARPEL RAMATO può essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi: **Vite**: contro la Peronospora *(P. viticola)* 400-500 g/hl con interventi preventivi ad intervalli di 10-14 giorni. Svolge un'azione collaterale nei confronti del marciume nero dei grappoli *(G. bidwellii)*. Nelle applicazioni su Moscato d'Asti, Schiava, sulle uve da tavola e in tutte le zone soggette a forti sbalzi termici ridurre la dose a 300 g/hl riducendo a 8 giorni l'intervallo tra i trattamenti. **Pero**: contro la Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) 300 g/hl in pre-fioritura e nelle applicazioni estintive di post-raccolta. Dalla fase di allegagione del frutto fino al mese di giugno ridurre il dosaggio a 150-200 g/hl trattando ogni ogni 7-8 giorni . **Pesco**: contro la Bolla *(T. deformans)* ed il Corineo *(C. beijerinckii)* 500-600 g/hl con trattamenti effettuati a caduta foglie e al rigonfiamento delle gemme. **Pomodoro**: contro la Peronospora *(P. infestans)*, Alternaria *(A. solani)*, Septoria *(S. lycopersici)*, Cladosporiosi (*C. fulvum*) 5,0-6,0 Kg/ha intervenendo a cadenze di 8-12 giorni. **Patata:** contro la Peronospora *(P. infestans)* 4 Kg/Ha trattando ogni 8-10 giorni. Non effettuare più di 4 applicazioni per anno. **Melone - Cocomero - Cetriolo - Spinacio**: contro la Peronospora *(P. cubensis, P. spinaciae)* 5,0-6,0 Kg/ha effettuando trattamenti ad intervalli di 8-12 giorni. **Lattuga - Carciofo**: contro la Peronospora *(B. lactucae)* 4,0-5,0 Kg/ha intervenendo ogni 8-12 giorni. **Arancio - Limone - Mandarino - Pompelmo**: contro la Fitoftora *(Phytophtora spp.)* Antracnosi *(C. gloesporioides)*, Mal secco *(D. tracheiphila)* 400-500 g/hl con applicazioni fogliari. **Colture ornamentali**: contro la Fitoftora *(P. cinnamomi)* 10-20 g/m² effettuando innaffiature alla base delle piante ad intervalli di 25-30 giorni a partire dall'inizio della primavera.
COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con i preparati a base oleosa, contenenti Dicofol e con i concimi fogliari ad elevato titolo di azoto. **AVVERTENZE D'USO**: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all'introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione chiudere bene la scatola.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non trattare durante la fioritura. Su Pesco e varietà di Pero cuprosensibili (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guynot, Favorite di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) il prodotto può dare origine a fenomeni fitotossici. Su colture di lattuga si possono verificare fenomeni di sensibilità al prodotto in concomitanza di sbalzi termici. Su vite alle dosi maggiori può essere fitotossico sulle varietà "Moscato d'Asti" e "Schiava" sulle uve da tavola e in tutte le zone soggette a forti sbalzi termici.
NOCIVITÀ': il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 80 giorni per Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo; 40 giorni per Pesco, Pero, Vite; 20 giorni per Pomodoro, Patata, Melone, Cocomero, Cetriolo, Spinacio, Lattuga, Carciofo. **ATTENZIONE:** da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE - NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE - Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade -DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE-DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE**

25%

1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua

2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti

3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore

4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ed...

5) ...aggiungere la restante parte d'acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

SOL MICRO GD

Fungicida a base di zolfo in microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Zolfo (esente da Selenio) g 80
- Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione : Agrostulln GmbH - Werk Stulln - Werksweg 2 - Stulln Germania

Stabilimento di confezionamento: SCAM Spa - Modena

Distribuito da: S.I.V.A.M. S.p.A. Via Scarlatti, 30 – Milano (MI)
Registrazione n. 9880 del 11/01/1999 del Ministero della Sanità

Kg 1 / 10 / 25 **Partita n.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
Il SOL MICRO GD è un fungicida a base di zolfo in microgranuli idrodispersibili impiegabile per combattere l'Oidio o "mal bianco" delle colture. La particolare formulazione consente una elevata prontezza d'azione e una lunga persistenza sulla vegetazione. L'elevata qualità dello zolfo assicura una perfetta selettività nei confronti delle colture trattate anche facendo ricorso a dosaggi elevati e ad interventi ripetuti. SOL MICRO GD può essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi:
Vite: 200-400 g/hl nelle zone a bassa pressione di oidio o nelle fasi di minore sensibilità al patogeno ad intervalli di 10-12 giorni; 400-600 g/hl nelle zone ad alta pressione di oidio o nei momenti di maggiore rischio di infezione intervenendo ogni 7-8 giorni.
Pomacee: 300-500 g/hl in pre-fioritura; 200-300 in post-fioritura. **Drupacee:** 200-400 g/hl in pre e post -fioritura; 400-600 g/hl nei trattamenti "estintivi" di post-raccolta. **Agrumi, Olivo:** 200-400 g/hl intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
Fragola: 200-500 g/hl iniziando gli interventi alla prima manifestazione della malattia. **Nocciolo:** 300-500 g/hl.
Ortaggi, Patata: 200-500 g/hl effettuando le prime applicazioni allorché insorgono i primi sintomi dell'infezione; impiegare i dosaggi più elevati nel periodo primaverile e nei momenti di maggiore pressione del patogeno.
Barbabietola da Zucchero: 6-8 Kg/Ha effettuando il primo trattamento alla comparsa dei sintomi ed effettuando i successivi ad intervalli di 15-20 giorni. **Cereali:** 6-8 Kg/Ha intervenendo alla comparsa della malattia sulle ultime due foglie del culmo.
Girasole, Soia, Tabacco: 4-6 Kg/Ha. **Vivai di Pioppo:** 200-400 g/hl.
Colture Floreali, Ornamentali e Forestali: 150-400 g/hl intervenendo ai primi sintomi della malattia.
FITOTOSSICITA': SOL MICRO GD può risultare fitotossico sulle seguenti cultivar: Mele: Black Ben Davis, Black Staiman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore , Renetta, Rome Beauty, Staiman Red, Winesap.
Pere: Buona Luisa D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser, Oliver de Serres, William, Decana del Comizio.
Vite: Sangiovese.
COMPATIBILITA': SOL MICRO GD non è compatibile con antiparassitari a reazione alcalina, Olii minerali e Diclofluanide. SOL MICRO GD deve essere irrorato ad almeno tre settimane di distanza dall'applicazione di olii minerali.
Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto.
COMPATIBILITA': non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Diclofluanide.
Avvertenza: deve essere irrorato a distanze di almeno tre settimane dall'impiego di olii minerali e del Captano.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

MECLIN

DISERBANTE SELETTIVO IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Metribuzin puro g 35
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM S.p.a. - Modena

Registrazione n. 9951 del 12/02/1999 del Ministero della Sanità

Kg 0,250 / 0,500 / 0,600 / 1 / 5

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n.

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee di base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo:** dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE: MECLIN è un erbicida selettivo che agisce per assorbimento radicale e fogliare nei confronti di numerose erbe infestanti quali: Coda di volpe (*Alopecurus spp.*), Lollio (*Lolium spp.*), Fienarola (*Poa spp.*), Setaria (*S. viridis*), Amaranto (*A. retroflexus*), Centocchio (*A. arvensis*), Borsa del pastore (*C. bursa-pastoris*), Farinaccio (*C. album*), Cencio molle (*A. theophrasti*), Stramonio (*D. stramonio*), Sanguinella (*D. sanguinalis*), Euforbia (*Euphorbia spp.*), Fumaria (*F. officinalis*), Canapetta (*Galeopsis spp.*), Camomilla (*M. camomilla*), Papavero (*P. rhoeas*), Poligoni (*Poligonum spp.*), Erba porcellana (*P. oleracea*), Ravanello (*R. raphanistrum*), Erba calderina (*S. vulgaris*), Senape selvatica (*S. arvensis*), Crespino (*S. oleraceus*), Centocchio (*S.media*), Erba storna (*T. arvense*).
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO MECLIN può essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi:
Patata:
a) trattamenti di pre-emergenza: 0,5-0,75 Kg/ha, impiegando la dose più elevata nei terreni di medio impasto o tendenti all'argilloso. Nei terreni argillosi o particolarmente ricchi di sostanza organica elevare il dosaggio a 1 Kg/ha di formulato.
b) Trattamenti di post-emergenza: 0,3-0,5 Kg/ha. MECLIN si è dimostrato perfettamente tollerato dalle seguenti varietà di patata: Admirandus, Alkmaria, Apollo, Bea, Bintje, Desirée, Favorita, Hulmada, Kardinal, Kennebec, Majestic, Primura, Resy, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal.
Pomodoro:
a) trattamenti di pre-semina: 0,3-0,5 Kg/ha, intervenendo 7-14 giorni prima della semina su terreno già preparato senta interrare.
b) Trattamenti di post-emergenza o post-trapianto: 0,3-0,6 Kg/ha, utilizzando la dose più alta nei terreni argillosi o ricchi di sostanza organica ed intervenendo dopo il diradamento quando le piantine hanno emesso almeno 8-9 foglie (generalmente corrispondente alla fase di pre-fioritura).
Soia: trattamenti di pre-semina o di pre-emergenza: 0,5-0,7 Kg/ha in miscela con formulati a prevalente attività graminicida (Metolaclor, ecc.).
Asparago: trattamenti prima dell'emergenza dei turrioni: 0,8-1 Kg/ha intervenendo su asparagiaie di almeno due anni di impianto.
Erba medica: 0,8 - 1 Kg/ha applicando il dosaggio più elevato nei terreni più argillosi ed intervenendo quando la coltura, a seguito degli abbassamenti termici, è entrata in pieno riposo vegetativo.
AVVERTENZE: eseguire i trattamenti in giornate senza vento, avendo cura di distribuire uniformemente la soluzione su tutta la superficie da trattare, evitando sovrapposizioni o contaminazioni di colture adiacenti. Dopo l'applicazione, non effettuare alcuna lavorazione al terreno. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': MECLIN non deve essere impiegato nel diserbo del pomodoro in serra o sotto tunnel. MECLIN non deve inoltre essere utilizzato nel diserbo del pomodoro qualora: - venga impiegato un quantitativo di seme inferiore ai 2,5 Kg/ha e su terreni che diano origine a crosta; - la coltura presenti sintomi di sofferenza (per siccità, alte temperature, ecc.); - si debbano effettuare lavorazioni del terreno o irrigazioni entro 6-7 giorni dall'intervento erbicida. Il prodotto non deve essere applicato su Patate appartenenti alle cultivar Draga, Jurla e Vivax in quanto sensibili all'erbicida. MECLIN può dare origine a fenomeni di fitotossicità su colture di Soia in terreni particolarmente sabbiosi.
INTERVALLO DI SICUREZZA Intervallo di tempo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 30 giorni per il Pomodoro, 60 giorni per Patata, Soia, Asparago ed Erba medica. Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI- PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO -DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE - NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE- Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

MECLIN

DISERBANTE SELETTIVO IN POLVERE BAGNABILE
IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Metribuzin puro g 35
- Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Da sciogliere in acqua senza rompere

Contenuto 100 - 200 - 250 g

Avvertenza: leggere l'etichetta riportata sulla confezione prima di utilizzare il prodotto

DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164
41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Registrazione n. 9951 del 12/02/1999 del Ministero della Sanità

MECLIN

DISERBANTE SELETTIVO IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:
- Metribuzin puro g 35
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti nega per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mang e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Qu materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Rife alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di Produzione: SCAM S.p.a. - Modena

Registrazione n. 9951 del 12/02/1999 del Ministero della Sanità **Partita n.**

Kg 0,500 (= 5 sacchetti da 100 g) Kg 0,500 (= 2 sacchetti da 250 g) Kg 0,600 (= 3 sacchetti da 200 g) Kg 1 (= 4 sacchetti da 250 g)

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee di base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo:** dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE: MECLIN è un erbicida selettivo che agisce per assorbimento radicale e fogliare nei confronti di numerose erbe infestanti quali: Coda di volpe (*Alopecurus spp.*), Lollio (*Lolium spp.*), Fienarola (*Poa spp.*), Setaria (*S. viridis*), Amaranto (*A. retroflexus*), Centocchio (*A. arvensis*), Borsa del pastore (*C. bursa-pastoris*), Farinaccio (*C. album*), Cencio molle (*A. theophrasti*), Stramonio (*D. stramonio*), Sanguinella (*D. sanguinalis*), Euforbia (*Euphorbia spp.*), Fumaria (*F. officinalis*), Canapetta (*Galeopsis spp.*), Camomilla (*M. camomilla*), Papavero (*P. rhoeas*), Poligoni (*Poligonum spp.*), Erba porcellana (*P. oleracea*), Ravanello (*R. raphanistrum*), Erba calderina (*S. vulgaris*), Senape selvatica (*S. arvensis*), Crespino (*S. oleraceus*), Centocchio (*S.media*), Erba storna (*T. arvense*).
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO MECLIN può essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi: **Patata: a)** trattamenti di pre-emergenza: 0,5-0,75 Kg/ha, impiegando la dose più elevata nei terreni di medio impasto o tendenti all'argilloso. Nei terreni argillosi o particolarmente ricchi di sostanza organica elevare il dosaggio a 1 Kg/ha di formulato. **b)** Trattamenti di post-emergenza: 0,3-0,5 Kg/ha. MECLIN si è dimostrato perfettamente tollerato dalle seguenti varietà di patata: Admirandus, Alkmaria, Apollo, Bea, Bintje, Desirée, Favorita, Hulmada, Kardinal, Kennebec, Majestic, Primura, Resy, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal. **Pomodoro: a)** trattamenti di pre-semina: 0,3-0,5 Kg/ha, intervenendo 7-14 giorni prima della semina su terreno già preparato senta interrare. **b)** Trattamenti di post-emergenza o post-trapianto: 0,3-0,6 Kg/ha, utilizzando la dose più alta nei terreni argillosi o ricchi di sostanza organica ed intervenendo dopo il diradamento quando le piantine hanno emesso almeno 8-9 foglie (generalmente corrispondente alla fase di pre-fioritura). **Soia:** trattamenti di pre-semina o di pre-emergenza: 0,5-0,7 Kg/ha in miscela con formulati a prevalente attività graminicida (Metolaclor, ecc.). **Asparago:** trattamenti prima dell'emergenza dei turrioni: 0,8-1 Kg/ha intervenendo su asparagiaie di almeno due anni di impianto. **Erba medica:** 0,8 - 1 Kg/ha applicando il dosaggio più elevato nei terreni più argillosi ed intervenendo quando la coltura, a seguito degli abbassamenti termici, è entrata in pieno riposo vegetativo.
AVVERTENZE: eseguire i trattamenti in giornate senza vento, avendo cura di distribuire uniformemente la soluzione su tutta la superficie da trattare, evitando sovrapposizioni o contaminazioni di colture adiacenti. Dopo l'applicazione, non effettuare alcuna lavorazione al terreno. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.
FITOTOSSICITA': MECLIN non deve essere impiegato nel diserbo del pomodoro in serra o sotto tunnel. MECLIN non deve inoltre essere utilizzato nel diserbo del pomodoro qualora: - venga impiegato un quantitativo di seme inferiore ai 2,5 Kg/ha e su terreni che diano origine a crosta; - la coltura presenti sintomi di sofferenza (per siccità, alte temperature, ecc.); - si debbano effettuare lavorazioni del terreno o irrigazioni entro 6-7 giorni dall'intervento erbicida. Il prodotto non deve essere applicato su Patate appartenenti alle cultivar Draga, Jurla e Vivax in quanto sensibili all'erbicida. MECLIN può dare origine a fenomeni di fitotossicità su colture di Soia in terreni particolarmente sabbiosi.
INTERVALLO DI SICUREZZA Intervallo di tempo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 30 giorni per il Pomodoro, 60 giorni per Patata, Soia, Asparago ed Erba medica. Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI- PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO-- DA NON VENDERSI SFUSO- IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE - NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE - Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade- DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE - DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE.-**

25%

1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua
2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti
3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore
4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ed..
5) ...aggiungere la restante parte d'acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

NEWOIL

OLIO PARAFFINICO INSETTICIDA AD ELEVATO GRADO DI INSULFONABILITA'

LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Olio minerale puro (insulfonabilità minima 95%) g 85 (= 717 g/l)

- Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: NEWOIL è un nuovo olio minerale "Narrow range" che per le sue caratteristiche fisico-chimiche, residuo insulfonabile 95% e stretto intervallo di distillazione, può essere usato su colture erbacee e arboree in piena vegetazione. Trova un utile impiego nella lotta contro diversi tipi di insetti sia nella fase invernale che in quella primaverile-estiva; in miscela con insetticidi o erbicidi è un ottimo sinergizzante e coadiuvante.

MODALITA' DI IMPIEGO: Agrumi: contro Afide verde, Cimice, Cocciniglie, Aleurodidi, Tripidi, Ragno rosso, Minatori fogliari, 1- 2 l/hl. **Drupacee:** contro Cocciniglie, Afidi, Tripidi, Acari, Cicaline, Eriofidi, Metcalfa, 1- 1,5 l/hl.

Pomacee (melo, pero, cotogno): contro Cocciniglie, Afidi, Psilla, Acari, Eriofidi, Cicaline, Metcalfa, 1 - 1,5 l/hl. **Vite:** contro Cocciniglie, Acari, Cicaline, Metcalfa, Afidi, Tripidi, 1 - 1,5 l/hl. **Olivo:** contro Cocciniglie, 1 - 1,5 l/hl. **Kako, Fico:** contro Cocciniglie, Afidi, Psilla, Cicaline, Metcalfa, 0,5 - 1,2 l/hl.. **Floreali, Ornamentali e Forestali:** contro Afidi, Metcalfa, Tripidi, Cocciniglie, Psille, Ditteri, Cicaline, Tingidi, Aleurodidi, Acari in fase vegetativa, 1 - 2 l/hl. **Ribes, Noce, Nocciolo:** Afidi, Acari, Cocciniglie, Cimice, Eriofidi, 1 - 1,5 l/hl. **Carciofo, Sedano, Finocchio:** contro Afidi, Aleurodidi, Ditteri minatori, Acari, Tripidi, Lepidotteri, 0,5 - 1,2 l/hl. **Cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo):** contro Afidi, Tripidi, Aleurodidi, Minatori delle foglie, Acari, Ditteri agromizidi, 0,5 - 1,5 l/hl. **Pomodoro, Peperone, Patata:** contro Afidi, Tripidi, Mosca bianca, Minatori delle foglie, uova di lepidotteri e coleotteri, Acari, 0,5 - 1,2 l/hl. **Fagiolo:** Afidi, Acari, Tripidi, 0,5 - 1,2 l/hl.; come coadiuvante in associazione a erbicidi 0,5 - 1 l/ha. **Barbabietola da zucchero:** come coadiuvante in associazione a erbicidi 0,3 - 1 l/ha. **Mais:** come coadiuvante in associazione a erbicidi, 0,5 - 2 l/ha.

COMPATIBILITÀ NEWOIL non è compatibile con prodotti a base di Zolfo e le seguenti molecole: Polisolfuri, Captano, Folpet, Chinometionato, Bupirimate, Diclofluanide, Ometoato, Dimetoato, Formothion, Propargite, Tetradifon. Inoltre non è miscibile con Calce, Clorotalonil, Dinocap, Carbammati, Triclorfon, Ciexatin, Azociclotin, Dicofol, Poltiglia bordolese. Non miscelabile con concimi fogliari (amminoacidi, microelementi, nitrato di calcio, alghe, etc.).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' Impiegare NEWOIL con intervallo di tempo di almeno 2/3 settimane dopo aver eseguito trattamenti con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e prodotti a base di captano, zolfo, thiram. Il trattamento con NEWOIL può essere ripetuto rispettando un intervallo minimo di 6-7 giorni. Non trattare con temperature superiori a 32-34°C, e su piante in condizioni di stress.

INTERVALLO: sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: (*) lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena
TERRANALISI Srl - Renazzo di Cento (FE)
ISAGRO Spa - Aprilia (LT)

Reg. n. 9962 del 23/02/1999 del Ministero della Sanità

L 0,1/0,25/0,5/1/5/10/20/25/50/100/200 **Partita n.**

(*) Relativamente alla conf. 200

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO-IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

OXARIL FLOW

DISERBANTE A BASE DI OXADIAZON IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono
- Oxadiazon puro g 35,8 (= 380 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena

Registrazione n. 9986 del 16/03/1999 del Ministero della Sanità

Litri 0,5 / 1 / 5 / 10 **Partita n.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO OXARIL FLOW è un formulato in sospensione concentrata (flowable) che agisce per assorbimento radicale sui germinelli e per contatto su steli e foglie della malerbe; viene indicato per combattere: acetosella, alisma, amaranto, atriplice maggiore, borsa del pastore, giunco fiorito, camomilla comune, correggiola, erba calderina, erba morella, erba porcellana, eterantera, euforbia, falso panico, farinaccio selvatico, fumaria, galinsoga, giavoni, mercorella, papavero, poa, poligoni, ravanello selvatico, romice, sanguinella, scirpus, senape, veronica, vilucchio; sono invece mediamente resistenti: avena selvatica, attaccamani, cencio molle, falsa gramigna, fienarola, forbicina, lappa, loglio.
Riso: Contro l'Heteranthera l/Ha 0,650-1,300 impiegando la dose maggiore nei terreni di medio impasto, impiegando 400 -600 l. di acqua per ettaro. Contiene anche lo sviluppo di Giavone, Alisma, Giunco fiorito e Ciperacee. Trattare in pre-semina della coltura sia con risaia in asciutta che su risaia allagata dopo la slottatura e con livello di acqua normale (10-12 cm). Dopo il trattamento attendere 48 ore prima di procedere alla semina per lasciare sedimentare le particelle limose. Si consiglia di mantenere, nelle camere, un livello di acqua moderato (max 10 - 12 cm), nelle prime fasi vegetative. Su riso in asciutta il trattamento deve essere effettuato subito dopo la semina in pre-emergenza della coltura e delle infestanti a 1,5 - 2 l/Ha. **Girasole, Soia:** alla dose di 1,5 l/Ha in pre-emergenza della coltura e delle infestanti. Si possono verificare a causa del trattamento ingiallimenti della coltura che sono momentanei e non causano alcun danno alla produzione. In caso di mancata pioggia dopo il trattamento effettuare una irrigazione dopo massimo 10-12 giorni. **Garofano:** trattare dopo la messa a dimora delle talee, oppure dopo una sarchiatura manuale in pre-emergenza delle infestanti a 1,5 - 2 l/Ha (infestanti annuali); per la lotta contro il Vilucchio elevare la dose a 5-6 l/Ha.
Aglio, Finocchio: 1-2 l/Ha in pre-emergenza della coltura e delle infestanti.
Colture trapiantate di Carciofo, Cavolfiore, Cicoria, Finocchio, Indivia, Lattuga, Melanzana, Peperone, Pomodoro, Tabacco: 1-2 l/Ha prima del trapianto della coltura, in pre-emergenza delle infestanti.
POST-IMPIANTO
Asparago: dopo la rincalzatura trattare con totale copertura delle zampe; per la lotta contro il Vilucchio trattare prima dell'emergenza dei turioni o dopo la totale raccolta degli stessi a 5-6,5 l/Ha.
Carciofo: contro l'Acetosella (Oxalis spp.) a 5 - 6,5 l/Ha in pre-emergenza dell'infestante, non bagnando la vegetazione della coltura.
Actinidia, Albicocco, Arancio, Clementino, Limone, Mandarino, Melo, Nocciolo, Olivo, Pero, Pesco, Pioppo, Susino, Vite: nei vivai a 5-6,5 l/Ha dopo la messa a dimora e prima della ripresa vegetativa: non trattare vivai di vite, piante madri o barbatelle appena messe a dimora.
Sugli impianti di produzione a 2,5 l/Ha (infestanti annuali) e 6,5 l/Ha (contro il Convolvolo); sulla vite trattare solo su impianti in produzione e con vegetazione sollevata da terra.
Sulle piante con foglia caduca trattare a fine inverno, prima che avvenga il risveglio vegetativo. Sulle colture sopraindicate non colpire la vegetazione se presente o parti che non siano lignificate. Dopo il trattamento non lavorare il terreno ed in caso di siccità fare una irrigazione entro 10-12 giorni dall'applicazione.
COMPATIBILITA': non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su asparago in caso di ristagno idrico e con coltura poco sviluppata, i turioni possono dare origine a curvature apicali.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO- IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

ARPEL WDG

Fungicida ad azione sistemica in formulazione microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:
- Fosetil Alluminio puro g 80
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: Schirm GmbH – Division Sideco - Lübeck (Germania)
A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)
Stabilimento di Confezionamento: SCAM Spa - Modena
Registrazione n. 10057 del 03/06/1999 del Ministero della Sanità
Kg 1 / 5 / 10 / 25 **Partita n.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione informare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE L'ARPEL WDG è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante. La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente che risulta più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attività di crescita. La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO **VITE**: contro la Peronospora (*P. viticola*). Effettuare trattamenti preventivi alla dose di 170-250 g/hl in associazione con fungicidi sistemici (es. Metalaxyl), citotropici (es. Cimoxanil) e/o di copertura (es. Mancozeb, Folpet) o loro eventuali miscele. Evitare l'impiego in associazione con formulati rameici. **MELO, PERO**: contro Ticchiolatura (*V. inaequalis, V. pirina*), trattamenti preventivi a 150-200 g/hl; si consiglia l'associazione con fungicidi di copertura (escluso rame) o citotropici (Dodina, ecc.) in particolare nelle fasi pre-fiorali e immediatamente successive all'allegagione. Su PERO contro Maculatura bruna (*Stemphyllium spp.*) trattamenti preventivi a 250 g/hl.
MELO, PERO, PESCO, ACTINIDIA: contro Fitoftora (*Phytophthora cactorum*).
a) - Effettuare un trattamento sulla vegetazione, una volta al mese, dalla sfioritura fino a quaranta giorni dalla raccolta (per melo e actinidia), con 250 g/hl.
b) - Su pianta già debilitata dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida: effettuare un'annaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, con litri 1-2 per pianta di una poltiglia costituita da Kg 5 di prodotto per 100 litri di acqua. **FRAGOLA**: contro Fitoftora (*Phytophthora cactorum, Phytophthora fragariae*). L'immersione delle piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti, seguita da 2-3 irrorazioni alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immersione delle piante prima del trapianto in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di g 0,5 di formulato per pianta. **LATTUGA**: contro Peronospora (*Bremia lactucae*) effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire almeno 3 kg. di prodotto per ettaro). Su Lattuga romana si consiglia di effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto: se si verificano forti sbalzi termici la coltura può risultare sensibile al prodotto. **MELONE, COCOMERO**: contro Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*) effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl avendo cura di distribuire, come minimo, 3 Kg di prodotto per ettaro, ogni 10-14 giorni. **CETRIOLO, SPINACIO**: contro Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis, Peronospora spinaciae*), effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire come minimo, 3 Kg di prodotto per ettaro). **CARCIOFO**: contro Peronospora (*Bremia lactucae*) a 200-300 g/hl. **ARANCIO, LIMONE, MANDARINO, POMPELMO**: contro Fitoftora (*Phytophthora spp.*) effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl utilizzando dieci litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione possono venire integrati da pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche); pratica indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida.
VIVAI DI FRUTTIFERI: effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl con cadenza mensile. **VIVAI DI AGRUMI**: impiegare la dose di 400 g/hl ogni 60 giorni.
COLTURE ORNAMENTALI in pieno campo e in serra: contro Fitoftora (*Phytophthora spp.*) di Chamaecyparis e altre Conifere, di Rododendro ed altre Ericacee, di Poinsettia, St.Paulia e Crisantemo effettuare un'innaffiatura alla base delle piante con g 5-10 di formulato per mq. una volta al mese in primavera. Su Colture Ornamentali contro Fitoftora (*Phytophthora spp.*) in vaso, bancali e contenitori di radicazione e coltivazione delle talee in genere, ARPEL WDG può essere impiegato secondo la tecnica di seguito riportata:

Tecnica di applicazione	*Dose di impiego*	*Volume di soluzione da distribuire*	*Note*
a) Applicazioni al suolo di coltivazione	1 g/l	10l/m³	Effettuare il primo intervento dopo la messa a dimora o il rinvaso. Successivamente un trattamento al mese per il periodo di massima sensibilità della coltura. Di norma 3-5 trattamenti all'anno sono in grado di garantire una protezione completa.
b) Trattamento dei terricci destinati alla coltivazione			
1) Incorporazione del prodotto *tal quale* al substrato	300 g di formulato/m³		Questa tecnica assicura una protezione delle colture per un periodo di circa 2-3 mesi.
2) Successivo trattamento liquido al terreno (in caso di forti attacchi durante il periodo estivo)	1 g/l	10 l/m²	Effettuare un'applicazione al mese

E' anche possibile effettuare l'immersione delle talee prima della messa a dimora:
- talee non radicate: immersione di 2 ore in una soluzione di 500 g/hl di ARPEL WDG
- talee radicate: immersione da ½ ora ad 1 ora in una soluzione con 250 g/hl di formulato.

TAPPETI ERBOSI DI GRAMINACEE: contro la Moria delle piantine *(Pythium aphanidermatum, Pythium arrenomanes, Pythium vanterpolii, Pythium graminicola, Pythium perillium)* effettuare trattamenti fogliari alla dose di 2,4 g/m² di formulato (24 Kg/Ha). Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo del patogeno (temperature diurne superiori ai 30 °C e notturne oltre i 20 °C, umidità relativa attorno al 75-80%) e proseguirli ad intervalli di circa 3 settimane fino a quando esistono rischi di eventi infettanti.

COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con i prodotti a base di Rame, di Dicofol e con concimi fogliari contenenti azoto. Non effettuare miscele con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta. Si consiglia inoltre di non irrorare il prodotto su colture precedentemente trattate con i suddetti formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto. Nella miscelazione del prodotto con altri formulati si consiglia l'effettuazione di saggi preliminari, onde verificarne la compatibilità. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

TOMATODOR

FITOREGOLATORE LIQUIDO SOLUBILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Etefon puro g 39,70 (= 479,58 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: nocivo per inalazione e contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena
TERRANALISI Srl - Via N.Bixio, 6 Cento (Ferrara)

Distribuito da: SARIAF S.p.A. – Via Morgagni, 68 – Faenza (RA)

Registrazione n. 10076 del 06/07/1999 del Ministero della Sanità

Litri 0,250 / 0,500 / 1 / 5 **Partita n.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO TOMATODOR è un fitoregolatore dotato di proprietà sistemiche. Penetrato all'interno dei tessuti vegetali, viene traslocato attraverso i flussi linfatici andando incontro a fenomeni di decomposizione dai quali si origina etilene.
Questa sostanza, naturalmente già presente nelle piante, stimola i processi di maturazione dei frutti migliorandone la qualità e rendendo più omogenea la raccolta.
TOMATODOR può essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi:
POMODORO:
a) da industria: 2-4 l/Ha intervenendo al 40-60% di frutti maturi. In taluni casi, può risultare conveniente frazionare le applicazioni in due momenti diversi, di cui la prima al 20% circa dei frutti maturi e la seconda a distanza di alcuni giorni quando vi è il 60% circa di frutti maturi.
I dosaggi più alti vanno impiegati su cultivar tardive o a maturazione scalare ed in presenza di temperature inferiori ai 12-15 gradi.
b) da mensa: 200-250 ml/hl effettuando il trattamento esclusivamente sulle bacche in fase di invaiatura. Nel caso s'intenda portare a contemporanea maturazione tutti i frutti presenti bagnare accuratamente tutta la pianta.
MELO:
a) cultivar precoci: 40-50 ml/hl intervenendo 8-10 giorni prima della raccolta prevista.
b) cultivar medio-tardive: 80-100 ml/hl effettuando il trattamento prima della raccolta. E' indispensabile associare a TOMATODOR un preparato anticascola.
- Trattamento su vegetazione dopo la raccolta dei frutti
50-70 ml/hl per rallentare la vegetazione della pianta ed accelerare la lignificazione favorendo l'evoluzione a fiore delle gemme miste
- Trattamento per il diradamento dei frutti
20-50 ml/hl, impiegando TOMATODOR sia da solo che in miscela con altri prodotti diradanti (Carbaril, NAA, 6-Benziladenina) dalla fioritura al frutticino formato.
- Trattamento in fase di accrescimento
Applicazioni ripetute con TOMATODOR da solo, alla dose di 20-50 ml/hl nella fase di accrescimento, inducono un effetto di contenimento della vegetazione ed un aumento di gemme a fiore nell'anno successivo.
La risposta della pianta agli interventi con TOMATODOR può risultare più o meno accentuata in funzione delle condizioni ambientali (temperatura, umidità relativa), stadio vegetativo e fase fenologica della pianta, cultivar trattata. Poiché il prodotto accelera il processo di maturazione un suo impiego sui frutti può influire negativamente sulla durata del periodo di conservazione. Non impiegare comunque mai più di 1,6 l/Ha di TOMATODOR per ciclo vegetativo. Data la variabilità delle condizioni operative locali che possono influire sui risultati del trattamento se ne consiglia l'impiego dopo aver effettuato saggi sperimentali o su indicazione degli Organismi Ufficiali preposti.
TABACCO:
a) varietà a maturazione scalare: 200 ml/hl (1 l/Ha) trattando esclusivamente i settori di pianta recanti foglie già fisiologicamente mature.
b) varietà a maturazione contemporanea: 350 ml/hl (2 l/Ha) irrorando l'intera pianta quando le foglie hanno raggiunto la maturazione fisiologica.
COMPATIBILITA': è consigliabile, al fine di ottenere i migliori risultati, non impiegare TOMATODOR in miscela con altri formulati ad eccezione dei preparati diradanti e anticascola.
FITOTOSSICITA' : TOMATODOR può risultare fitotossico per le colture non riportate in etichetta. Su pomodoro è possibile riscontrare un parziale ingiallimento delle foglie ed una accentuata colatura dei fiori aperti al momento dell'intervento se direttamente irrorati dalla soluzione.
INTERVALLO DI SICUREZZA: intervallo di tempo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 7 giorni per il Melo, 10 giorni per il Pomodoro.

ATTENZIONE: in caso di fuoriuscita accidentale di prodotto, arginare ed assorbire con una sostanza inerte polverulenta (sabbia, argilla, segatura), non tentare di neutralizzare con alcali (il prodotto libera gas altamente infiammabile). Evitare il contatto con materiali alcalini, sali metallici e metalli quali ferro, rame, alluminio e leghe. Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

MEXIL® 5 G

FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO SISTEMICO IN FORMULAZIONE GRANULARE PER APPLICAZIONI AL TERRENO

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
- Metalaxil puro g 5
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimenti di produzione: SCAM S.p.a. - Modena
A.D.I.C.A. S.r.l. - Nera Montoro (TR)
Registrazione n. 10113 del 27/07/1999 del Ministero della Sanità

Kg 0,5/1/5/10 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esofalmo, dispnea, spasmi muscolari. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO MEXIL 5 G é un fungicida sistemico per la lotta contro le malattie fungine appartenenti ai generi *Pythium, Fitoftora, Peronospora, Aphanoyices* responsabili di numerosi marciumi radicali e del colletto di diverse colture e dei tappeti erbosi.
MEXIL 5 G può essere impiegato sulle seguenti colture ai rispettivi dosaggi:
Melo: contro la *Fitoftora spp.* alla dose di 20-40 g/mq distribuiti alla base della pianta, intervenendo alla ripresa vegetativa. Il trattamento va ripetuto dopo 2-3 mesi.
Pomodoro: contro la *Fitoftora spp.* effettuando un primo intervento alla dose di 20 g/mq in pre-trapianto, un secondo trattamento alla dose di 20 g/mq dopo circa 20 giorni ed un terzo intervento alla dose di 40 g/mq dopo 30-40 giorni dalla seconda applicazione. Il prodotto deve essere incorporato al terreno lungo la fila su una banda di circa 30-40 cm.
Fragola: contro la *Fitoftora spp.* alla dose di 40 Kg/Ha, localizzando il prodotto su una banda di 30-40 cm e incorporandolo superficialmente prima del trapianto. Il trattamento può essere effettuato anche prima della ripresa vegetativa utilizzando 1 g/pianta di formulato.
Lattuga, Carciofo, Cavolo verza, Melone, Cocomero, Fagiolo: contro *Pythium spp.* e *Fitoftora spp.* alla dose di 2-4 g/mq intervenendo alla semina o in pre-trapianto. Il trattamento deve essere ripetuto dopo circa 25-30 giorni.
Soia: contro *Pythium spp.* e *Fitoftora spp.* alla dose di 5-10 kg/Ha incorporato al terreno lungo la fila al momento della semina.
Colture floricole e ornamentali: contro *Pythium spp.* e *Fitoftora spp.* alla dose di 2-4 g/mq intervenendo alla semina o in pre-trapianto. L'applicazione deve essere ripetuta dopo circa 25-30 giorni. Per le colture in vaso impiegare 120-140 g di prodotto per m^3 di terriccio o substrato di coltura, avendo cura di incorporarlo uniformemente.
Conifere e Latifoglie: contro *Fitoftora spp.* intervenendo: - in vivaio prima dell'impianto alla dose di 20-50 g /pianta - in vivaio dopo l'impianto alla dose di 50-150 g/pianta - dopo la messa dimora alla ripresa vegetativa alla dose di 20-40 g/pianta.
Il trattamento deve essere ripetuto dopo 3-6 mesi.
Tappeti erbosi: contro *Pythium spp.* alla dose di 1,5-3,0 g/mq (15-30 Kg/Ha). Nei tappeti erbosi di nuovo impianto effettuare un primo trattamento subito dopo la semina o la rizollatura ed eventualmente irrigare. Ripetere il trattamento ad intervalli di 7-14 giorni; non effettuare più di 3 applicazioni per stagione. Nei tappeti erbosi già esistenti intervenire durante il periodo favorevole allo sviluppo del patogeno effettuando un massimo di 3 applicazioni all'anno ad intervalli di 10-21 giorni.
Rispettare rigorosamente le norme di impiego anche per contrastare i ceppi resistenti. Qualora insorga la resistenza ricorrere all'impiego di un fungicida di copertura. Non applicare mai su vivai di vite.
COMPATIBILITA': il prodotto deve essere impiegato preferibilmente da solo; nel caso di miscele con altri formulati verificarne preventivamente la compatibilità.
NOCIVITA': moderatamente pericoloso per i mammiferi.
FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: - 14 giorni: Pomodoro -15 giorni: lattuga - 20 giorni: Melo, Carciofo, Melone, Cocomero - 40 giorni: Fragola - 60 giorni: Cavolo verza - 120 giorni: Fagiolo - 150 giorni: Soia.
Per applicazioni su tappeti erbosi destinati ad uso pubblico, l'obbligo di segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

LOTAN

Fungicida per la difesa delle colture floricole ed ornamentali, dei funghi coltivati e per la concia delle sementi di cereali in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Procloraz puro	g	46,1
- Coformulanti	q.b. a g	100

FRASI DI RISCHIO: altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena

Registrazione n. 10129 del 02/09/1999 del Ministero della Sanità

Kg 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10

Partita n. :

NORME PRECAUZIONALI Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Durante la manipolazione ed il trattamento si dovranno usare guanti, occhiali protettivi e maschere antipolvere.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea), deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE LOTAN è un fungicida dotato di proprietà translaminari efficace contro i marciumi radicali e del colletto delle colture floricole ed ornamentali, gli agenti patogeni dei funghi coltivati e le malattie fungine delle sementi di cereali. Agisce sia in via preventiva che curativa, mediante contatto e penetrazione con diffusione translaminare.
MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO LOTAN può essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi:
Colture floricole ed ornamentali: LOTAN è indicato per il controllo dei marciumi che si insediano sul colletto e sull'apparato radicale (*Fusarium spp., Verticillium spp., Sclerotinia spp., ecc.*). Su rosa e garofano contro i marciumi sopra indicati, oidio e muffa grigia, il prodotto può essere impiegato anche per la disinfezione del terreno alla dose di 15 g/100 m² o per trattamenti alla parte aerea alla dose di 50-100 g/hl di formulato; per immersione dei bulbi (gladiolo, tulipano, icsia) o delle talee delle colture floricole ed ornamentali alla dose di 50-100 g/hl di formulato.
Funghi coltivati: LOTAN è attivo nei confronti degli agenti delle malattie dei funghi coltivati quali *Verticillium fungicola, Mycogone perniciosa, Cladobotryum dendroides,* Tricoderma viridis, ecc. sia nelle coltivazioni in capannone che in grotta. Si impiega alla dose di 3 g/m² intervenendo 5-7 giorni dopo la copertura del composto. L'applicazione va fatta coincidere di norma con l'irrigazione operando a bassa pressione al fine di distribuire 1-2 litri di acqua /m².
LOTAN è perfettamente selettivo sul prataiolo coltivato (*Agaricus bisporus, Agaricus bitorquis*) sia nei confronti del micelio che sui funghi in attiva crescita.
Concia delle sementi di cereali (frumento, orzo, mais, riso, sorgo): LOTAN è indicato contro le malattie del piede (*Cercosporella herpotrichoides, Cochliobolus spp., Fusarium spp., Septoria tritici, Rhizoctonia spp., Helmintosporium spp., ecc.*) alla dose di 40-50 g di prodotto per quintale di seme rimescolando accuratamente al fine di assicurare una distribuzione uniforme. La concia dei semi di riso può essere eseguita facendo pregerminare le cariossidi ed immergendole per 24 ore in una soluzione contenente lo 0,03-0,04% di formulato (30-40 g/hl). I semi trattati non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame, ma essere avviati allo smaltimento secondo le norme vigenti per i prodotti tossici.
COMPATIBILITÀ: Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci . Non contaminare stagni, fossi, vie d'acqua con i residui del lavaggio delle attrezzature usate per il trattamento.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta dei funghi.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle precette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

SPOLEN

Fungicida per la difesa dei funghi coltivati in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Procloraz puro		g 46,1
- Coformulanti	q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO: altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena

Distribuito da: CHEMICALS BRA S.r.l. – Via S.Giovanni Lupatoto, 24/b – Verona

Registrazione n. 10228 del 20/12/1999 del Ministero della Sanità

Kg 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10 **Partita n. :**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Durante la manipolazione ed il trattamento si dovranno usare guanti, occhiali protettivi e maschere antipolvere.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea), deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici. **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE SPOLEN è un fungicida dotato di proprietà translaminari efficace contro gli agenti patogeni dei funghi coltivati. Agisce sia in via preventiva che curativa, mediante contatto e penetrazione con diffusione translaminare.
MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO SPOLEN può essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi:
Funghi coltivati: SPOLEN è attivo nei confronti degli agenti delle malattie dei funghi coltivati quali *Verticillium fungicola, Mycogone perniciosa, Cladobotryum dendroides, Tricoderma viridis*, ecc. sia nelle coltivazioni in capannone che in grotta. Si impiega alla dose di 3 g/m^2 intervenendo 5-7 giorni dopo la copertura del composto. L'applicazione va fatta coincidere di norma con l'irrigazione operando a bassa pressione al fine di distribuire 1-2 litri di acqua /m^2.
SPOLEN è perfettamente selettivo sul prataiolo coltivato (*Agaricus bisporus, Agaricus bitorquis*) sia nei confronti del micelio che sui funghi in attiva crescita.
COMPATIBILITÀ: Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci; non contaminare stagni, fossi, vie d'acqua con i residui del lavaggio delle attrezzature usate per il trattamento.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta dei funghi.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI- PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO -DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE- NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE-Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

SPOLEN

FUNGICIDA PER LA DIFESA DEI FUNGHI COLTIVATI
IN POLVERE BAGNABILE
IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Procloraz puro g 46,1
- Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Da sciogliere in acqua senza rompere

Contenuto 200 - 250 - 500 g

Avvertenza: leggere l'etichetta riportata sulla confezione prima di utilizzare il prodotto

DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164
41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Registrazione n. 10228 del 20/12/1999 del Ministero della Sanità

SPOLEN

Fungicida per la difesa dei funghi coltivati in polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- **Procloraz puro g 46,1**
- **Coformulanti q.b. a g 100**

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena
Distribuito da: CHEMICALS BRA S.r.l. – Via S.Giovanni Lupatoto, 24/b – Verona
Registrazione n. 10228 del 20/12/1999 del Ministero della Sanità

kg 1 (= 5 sacchetti da 200 g), kg 1 (= 4 sacchetti da 250 g), kg 1 (= 2 sacchetti da 500 g) **Partita n. :**

NORME PRECAUZIONALI Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Durante la manipolazione ed il trattamento si dovranno usare guanti, occhiali protettivi e maschere antipolvere.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea), deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE SPOLEN è un fungicida dotato di proprietà translaminari efficace contro gli agenti patogeni dei funghi coltivati. Agisce sia in via preventiva che curativa, mediante contatto e penetrazione con diffusione traslaminare.
MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO SPOLEN può essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi:
Funghi coltivati: SPOLEN è attivo nei confronti degli agenti delle malattie dei funghi coltivati quali *Verticillium fungicola, Mycogone perniciosa, Cladobotryum dendroides, Tricoderma viridis*, ecc. sia nelle coltivazioni in capannone che in grotta. Si impiega alla dose di 3 g/m^2 intervenendo 5-7 giorni dopo la copertura del composto. L'applicazione va fatta coincidere di norma con l'irrigazione operando a bassa pressione al fine di distribuire 1-2 litri di acqua /m^2. SPOLEN è perfettamente selettivo sul prataiolo coltivato (*Agaricus bisporus, Agaricus bitorquis*) sia nei confronti del micelio che sui funghi in attiva crescita.
AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.
COMPATIBILITÀ: Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci; non contaminare stagni, fossi, vie d'acqua con i residui del lavaggio delle attrezzature usate per il trattamento.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta dei funghi.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI- PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE - NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE-Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE - DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE.

25%

1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua

2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti

3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore

4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ed...

5) ...aggiungere la restante parte d'acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

BIETOFLEX

DISERBANTE DI PRE-SEMINA, PRE-EMERGENZA E POST-EMERGENZA PER LA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, DA FORAGGIO E BIETOLA DA ORTO IN GRANULI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Cloridazon puro		**g 65**
- Coadiuvanti, inerti	**q.b. a**	**g 100**

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di produzione: A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)
Schirm GmbH Division Sideco Mecklenburger Str.229,D-23568 Lübeck

Stabilimento di confezionamento: SCAM Spa - Modena
Distribuito da: S.I.V.A.M. S.p.A. - Via Scarlatti, 30 - Milano
Registrazione n. 10255 del 10/01/2000 del Ministero della Sanità

Kg 1 / 5 **Partita n. :**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE Il BIETOFLEX è un diserbante selettivo per la barbabietola che agisce prevalentemente per assorbimento radicale ed in parte per via fogliare. La sua azione si manifesta sui semi in fase di germinazione e sulle giovani plantule sia in fase di emergenza che appena spuntate dal terreno purché al momento del trattamento presentino le foglie cotiledonari e non più di 2 foglie vere. Erbe infestanti sensibili: *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Veronica spp.* (Veronica), *Raphanus rophanistrum* (Ravanello selvatico), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Lamium spp.* (Falsa ortica), *Stellaria media* (Centocchio comune), *Thlaspi arvense* (Erba storna), *Chenopodium album* (Farinello comune), *Atriplex spp.* (Atriplice), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga comune), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Fallopia convolvulus* (Convolvolo nero), *Polygonum lapathifolium* (Poligono nodoso). Erbe infestanti mediamente sensibili: *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galium aparine* (Gallio), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Senecio vulgaris* (Senecione), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Alopecurus spp.* (Coda di volpe), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Avena fatua* (Avena selvatica) *Lolium spp.* (Loglio), *Rumex spp.* (Romice), *Vicia spp.* (Veccia), *Ajuga spp.* (Iva artica). Erbe infestanti resistenti: tutte le malerbe perenni quali *Cirsium arvense* (Stoppione), *Cynodon dactylon* (Gramigna), *Convolvulus spp.* (Vilucchio), *Equisetum spp.* (Coda cavallina), *Sorghum halepense* (Sorghetta), *Cyperus spp.* (Zigolo delle risaie).
MODALITA' DI IMPIEGO In pre-semina con incorporazione a 2-3 cm. e pre-emergenza.
DOSI DI IMPIEGO 3-6 kg/ha in funzione della natura del terreno: - in terreni sabbiosi: 3-3,5 kg/ha, - in terreni di medio impasto: 4-4,5 kg/ha - in terreni tendenti all'argilloso: 4,5-5,5 kg/ha - in terreni argillosi: 6 kg/ha. Nei terreni torbosi il diserbante viene bloccato dalla sostanza organica e difficilmente riesce ad esercitare un'azione erbicida soddisfacente. In post-emergenza dopo che la bietola ha le prime foglie vere, con infestanti nella fase di plantula (prime foglie vere) alla dose di 2-3 kg/ha, preferibilmente in miscela con erbicidi di contatto. Nei trattamenti anticipati frazionati con la bietola allo stadio cotiledonare ridurre la dose a 0,5-1 kg/ha in funzione della dose degli altri principi attivi ai quali viene associato. Il trattamento di post-emergenza si può effettuare fino allo stadio di due foglie vere delle erbe infestanti. VOLUME DI IRRORAZIONE: stemperare la prestabilita quantità di prodotto in 4-6 o più ettolitri di acqua per ettaro, irrorando con pompe a volume normale. NOTIZIE AGRONOMICHE: qualora si debba operare su terreno asciutto e non si abbiano successive piogge, è necessario procedere ad un'irrigazione entro 8-10 giorni dal diserbo. Preparazione della poltiglia: versare la prestabilita quantità di prodotto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.
COMPATIBILITA': non è miscibile con formulati in formulazione liquida emulsionabile.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsiglia il trattamento nel periodo che va dall'emergenza delle bietole indicate fino all'emissione della seconda foglia vera. La selettività del prodotto può essere compromessa da attacchi di insetti o di malattie fungine che determinano lesioni sulle radici o sulle foglie aprendo vie alla penetrazione del prodotto. Evitare che la miscela erbicida giunga a contatto con colture sensibili vicine. Se è necessario una ricoltivazione è sconsigliabile la semina o il trapianto di pomodoro, colza, ravizzone, cavoli e cavolfiori.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

CUPROSCAM MZ BLEU

Fungicida in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Rame metallo g 30
(sottoforma di ossicloruro tetraramico)
- Mancozeb puro g 10
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa – Modena

Registrazione n. 10256 del 10/01/2000 del Ministero della Sanità

Kg 1 / 10 / 25 **Partita n. :**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive RAME METALLO 30%, MANCOZEB 10%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: RAME METALLO **Sintomi:** denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. MANCOZEB: **Sintomi:** cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa , sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO (dose per 100 litri d'acqua) Il CUPROSCAM MZ BLEU è un fungicida cuprico, ad azione preventiva, dotato di buona persistenza e di pronta efficacia, viene impiegato sulle seguenti colture: **Vite:** contro Peronospora, Antracnosi, Septoria gr. 300-400. **Pomodoro:** (solo fino alla prima fioritura) contro Peronospora, Alternaria, Cladosporio gr. 300-400. **Garofano in pieno campo**: contro la Ruggine ed Alternaria gr. 400. **Pomacee**: contro la Ticchiolatura, Septoria, Alternaria, Ruggine e Glomerella alla dose di gr. 300-350. **Tabacco**: contro la Peronospora alla dose di gr. 300-400. **Semenzai di Tabacco**: contro Phithium alla dose di gr. 30 per mq. in 10 litri d'acqua. **Cereali in campo (Frumento, Orzo, Avena, Segale):** contro Fusarium, Brusone, Carbone, Gibberella, Elmintosporiosi, Carie, Septoria alla dose di kg. 4-5/ha. **Concia anticarie delle sementi di Frumento, Orzo, Cereali minori:** alla dose di gr. 250-300 per q.le di seme.
COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con prodotti solfocalcici, a base alcalina e con olii bianchi.
FITOTOSSICITA': da non impiegare durante la fioritura. Inoltre le seguenti varietà di pero: Abate fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott.Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard. Melo: Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana, King Davis, cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione avvenuta.
NOCIVITÀ': il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA: intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 28 giorni.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

BANG

INSETTICIDA PIRETROIDE A RIDOTTA TOSSICITÀ IN EMULSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:
- Cipermetrina puro g 5 (= 49,28 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena
TERRANALISI Srl - Via IV Novembre, 19/1 - Renazzo di Cento (FE)
I.R.C.A. Service S.p.A.– Fornovo S.Giovanni (BG)
Distribuito da: SUN COMPANY S.r.l. – Corso Buenos Aires, 77/A - Milano
S.I.V.A.M. S.p.A. - Via Scarlatti, 30 – Milano

Registrazione n. 10257 del 10/01/2000 del Ministero della Sanità

Litri 0,100 / 0,250 / 0,500 / 1 / 5 **Partita n.**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia**: sintomatica e di rianimazione. **Avvertenza**: consultare un Centro Antiveleni.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO BANG è un insetticida piretroide a bassa tossicità ed ampio spettro d'azione, impiegabile su un gran numero di colture erbacee ed arboree. BANG agisce per contatto e per ingestione nei confronti di numerose specie di fitofagi (Afidi, Dialeurodidi, Tortricidi, Nottuidi, Tignole, Dorifora, Piralide, Tripidi, Microlepidotteri filllominatori, Cocciniglie, ecc.). BANG svolge inoltre un'azione repellente ed antirepellente delle colture trattate. La particolare formulazione in olio vegetale ne rende pratico e sicuro l'impiego. BANG può essere usato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi: **Vite:** contro le Tignole (*L.botrana, C.ambiguella*) e Sigaraio (*B.betulae*) 100-150 ml/hl. **Pesco, Ciliegio:** contro Afide verde (*M.persicae*), Afide farinoso (*H.amygdali*), Afide bruno (*B.schwartzi*), Afide nero (*B.persicae*) 75-100 ml/hl intervenendo prima dell'accartocciamento delle foglie. Contro Anarsia (*A.lineatella*), Cidia (*C. Molesta*), Tripidi (*Thrips spp.*) e Mosca della frutta (*C.capitata*) 100-150 ml/hl. **Pero:** contro la Psilla (*P.piri*) 100-150 ml/hl nei trattamenti di fine inverno contro gli adulti svernanti e 150-200 negli interventi primaverili-estivi. Contro Afidi (*A.pomi*), Carpocapsa (*C.pomonella*), Microlepidotteri minatori (*L.scintella, L.blancardella*) 100-150 ml/hl. **Arancio, Limone:** contro Afide verde (*A.spiraecola, A.gossypii*), Afide bruno (*T.aurantii*), Dialeurodidi (*T. vaporariorum*), 75-100 ml/hl. Contro Tignola della Zagara (*P.citri*) e Mosca della frutta (*C.capitata*) 100-150 ml/hl. **Cavolo, Cavolfiore, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Cavolo broccolo, Fagiolino, Pisello, Pomodoro, Cipolla, Patata:** contro Afidi (*B.brassicae, A.fabae, A.pisum, M.persicae*), Nottue (*Agrotis spp.*), Cavolaie (*P.brassicae*), Tripidi (*Tripis spp.*), Dorifora (*L.decemlineata*), Mosca bianca (T.vaporarium), Cimice (*N.viridula*) 100-150 ml/hl. **Barbabietola da zucchero:** contro Altica (*C.tibialis*) 1000-1200 ml/ha. Contro Afidi (*A.fabae, M.persicae*), Nottue (*M.brassicae, A.gamma*), Cleono (*T.mendicus*), Lisso (*L.junci*), Casside (*Cassida spp.*) 500-1000 ml/ha. **Tabacco:** contro Afidi (*M.persicae, A.fabae*), Nottue (*Agrotis spp.*) Mosca bianca (*T.vaporariorum*) 75-150 ml/hl. **Mais:** contro Afidi (*R.padi*) e Piralide (*O.nubilalis*) 75-150 ml/hl. **Frumento:** contro Afidi (*S.avenae, S.graminum*) e Lema (*O.melanopa*) 75-100 ml/hl. **Soia:** contro Cimice verde (*N.viridula*) e Piralide (*U.ferrugalis*) 100-150 ml/hl. **Fiori, vivai, Colture ornamentali in campo:** contro Afidi e Mosca bianca (*T.vaporariorum*) 75-100 ml/hl. Contro Bega del garofano (*E.acerbella*), Tripidi (*Tripis spp.*), Nottue (*Agrotis spp.*) 100-200 ml/hl. **Pioppo:** contro Afidi, Saperda (*S.carcarians*), Criptorrinco (*C.lapathi*) 75-100 ml/hl.
DA NON APPLICARE IN SERRA
COMPATIBILITA' BANG è compatibile con i più comuni prodotti fitosanitari ad eccezione di quelli a reazione fortemente alcalina.
AVVERTENZA In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' BANG è altamente selettivo per le colture riportate in etichetta; sulle colture floricole, in particolare su specie delicate è opportuno effettuate saggi preliminari.
INTERVALLO DI SICUREZZA Intervallo di tempo che deve trascorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: **3 giorni**: Soia; **7 giorni**: Piselli-Fagiolino-Cavolfiore-Cavolobroccolo, **14 giorni**: Cavolo-Cavolo cappuccio-Cavolo verza-Cipolla-Patata-Pesco-Ciliegio-Pero-Arancio-Limone. **21 giorni**: Pomodoro-Barbabietola da zucchero, **28 giorni**: Vite-Mais, **42 giorni**: Frumento, **60 giorni**: Tabacco.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI- PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE - NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE -Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

OXARIL 2 G

DISERBANTE SELETTIVO GRANULARE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Oxadiazon puro		**g 2**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g 100**

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

FRASI DI RISCHIO Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
MODALITÀ' E CAMPI DI IMPIEGO OXARIL 2 G é un erbicida granulare selettivo efficace contro numerose infestanti graminacee e dicotiledoni quali Acetosella *(Oxalis spp.)*, Alisma *(Alisma spp.)*, Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Atriplice maggiore *(Atriplex patula)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa-pastoris)*, Giunco *(Butomus umbellatus)*, Camomilla *(M. camomilla)*, Sanguinella *(Digitaria sanguinalis)*, Farinaccio *(Chenopodium spp.)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Erba calderina *(Senecius vulgaris)*, Erba morella *(Solanum nigrum)*, Eterantera *(Heterantera spp.)*, Euforbia *(Euphorbia spp.)*, Giavone *(Echinocloa spp.)*, Galinsoga *(Galinsoga parviflora)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Fienarola *(Poa spp.)*, Poligoni *(Poligonum spp.)*, Erba porcellana *(Portulaca oleracea)*, Ravanello*(Rafanus raphanistrum)*, Romice *(Rumex spp.)*, Scirpus *(Scirpus spp.)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Veronica *(Veronica spp.)* Vilucchio (*Convolvolus arvensis)*. Parziale risulta invece l'attività nei confronti di Avena selvatica *(Avena spp.)*, Attacamani *(Galium aparine)*, Cencio molle *(Abutilon theophrasti)*, Forbicina *(Bidens tripartita)*, Spino d'asino *(Xantium italicum)*, Loglio *(Lolium spp.)* OXARIL 2 G puo' essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi

Riso:
- 25 kg/Ha nei terreni di medio impasto
- 20 kg/Ha nei terreni argillosi

Il prodotto va distribuito 6-7 giorni prima della semina del riso, dopo la preparazione del terreno e mantenendo un normale livello dell'acqua. In terreni perfettamente livellati il trattamento può essere effettuato 2-3 giorni prima della semina in acqua limpida. Dopo la distribuzione del formulato mantenere l'acqua ferma e ad un livello costante per almeno 48 ore.
Immediatamente prima della semina effettuare il ricambio dell'acqua nella risaia.

Actinidia:
- 150 kg/Ha. Intervenire in pre-emergenza delle infestanti su terreni dotati di un buon livello di umidità o effettuare una leggera irrigazione dopo l'applicazione. La chioma delle piante deve essere asciutta. Non trattare su vivai.

Colture trapiantate di **Asparago, Carciofo, Cavolfiore, Melanzana, Peperone, Pomodoro, Tabacco:**
- 20-40 Kg/Ha. Intervenire in pre o in post-trapianto, prima dell'emergenza delle infestanti. Nelle applicazioni di post-trapianto applicare su colture asciutte ed irrigare entro 24 ore allo scopo di rimuovere i granuli di formulato eventualmente depositatisi sulla vegetazione ed attivare il prodotto nel terreno.

Impianti di colture arboree di **Albicocco, Pesco, Melo, Pero, Susino, Arancio, Clementino, Limone, Mandarino, Olivo, Nocciolo, Pioppo:**
- 50 Kg/Ha (infestanti annuali) - 150 Kg/Ha (Vilucchio e infestanti poliennali). Trattare in pre-emergenza delle infestanti, prima della ripresa vegetativa della coltura. Adattare la dose in funzione della flora infestante da combattere e della durata di efficacia programmata.

Vite
- 50 Kg/Ha (infestanti annuali) - 150 Kg/Ha (Vilucchio e infestanti poliennali). Impiegare solo su impianti in produzione, evitando che il prodotto venga a contatto con la vegetazione. Applicare il prodotto prima della ripresa vegetativa della coltura, adattando dose in funzione della flora infestante da combattere.

Vivai di piante di **Pesco, Melo, Pero, Albicocco, Susino, Arancio, Clementino, Mandarino, Limone, Olivo, Pioppo e Ornamentali:**
- 150 Kg/Ha. Intervenire dopo la messa a dimora, a fine inverno (Febbraio) e prima dell'emergenza delle infestanti.

Tappeti erbosi di graminacee
150-180 Kg/Ha. L'operazione di diserbo va eseguita prima dell'emergenza delle infestanti.
COMPATIBILITA': il prodotto va impiegato da solo.
FITOTOSSICITA': nei trattamenti in vivaio non intervenire su piante non sufficientemente lignificate. Non trattare vivai di vite, piante madri o barbatelle appena messe a dimora. Nei terreni particolarmente asciutti il prodotto non esplica completamente la sua azione. Pertanto, nei casi di siccità, è necessario prevedere un'irrigazione entro 10-12 giorni dal trattamento.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci.. Nel corso degli interventi tenere lontani dalla zona interessata persone non protette, animali domestici e bestiame.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena
A.D.I.C.A Spa - Nera Montoro (TR) Schirm GmbH Division Sideco - Lübeck (Germania)
Registrazione n. 10311 del 3/02/2000 del Ministero della Sanità
Kg 1 / 5 / 10 / 25 **Partita n.**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO – SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

MECLIN MGD

ERBICIDA SELETTIVO IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Metribuzin puro g 35
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di produzione: A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)
Schirm GmbH Division Sideco, Mecklenburger Str. 229, D-23568 Lübeck
Stabilimento di confezionamento: SCAM Spa - Modena
Distribuito da: S.I.V.A.M. S.p.A. – Via Scarlatti, 30 - Milano

Registrazione n. 10386 del 22/03/2000 del Ministero della Sanità
kg 0,250 / 0,500 / 0,600 / 1 / 5 / 10 **Partita n.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee di base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo:** dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE: MECLIN MGD è un erbicida selettivo che agisce per assorbimento radicale e fogliare nei confronti di numerose erbe infestanti quali: Coda di volpe (*Alopecurus spp.*), Lollio (*Lolium spp.*), Fienarola (*Poa spp.*), Setaria (*Setaria viridis*), Amaranto (*Amarantus retroflexus*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Farinaccio (*Chenopodium album*), Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Stramonio (*Datura stramonio*), Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), Euforbia (*Euphorbia spp.*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Canapetta (*Galeopsis spp.*), Camomilla (*Matricaria camomilla*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Poligoni (*Poligonum spp.*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Ravanello (*Raphanus raphanistrum*), Erba calderina (*Senecio vulgaris*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Crespino (*Sonchus oleraceus*), Centocchio (*Stellaria media*), Erba storna (*Thlaspi arvense*)
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO MECLIN MGD può essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi:
Patata: a) trattamenti di pre-emergenza: 0,5-0,8 Kg/ha, impiegando la dose più elevata nei terreni di medio impasto o tendenti all'argilloso. Nei terreni argillosi o particolarmente ricchi di sostanza organica elevare il dosaggio a 1 Kg/ha di formulato.
b) Trattamenti di post-emergenza: 0,5-0,6 Kg/ha. MECLIN MGD si è dimostrato perfettamente tollerato dalle seguenti varietà di patata: Admirandus, Alkmaria, Apollo, Bea, Bintje, Desirée, Favorita, Hulmada, Kardinal, Kennebec, Majestic, Primura, Resy, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal. **Pomodoro: a)** trattamenti di pre-semina e pre-trapianto: 0,5-0,6 Kg/ha, intervenendo 7-14 giorni prima della semina su terreno già preparato senza interrare. **b)** Trattamenti di post-emergenza o post-trapianto: 0,3-0,5 Kg/ha, utilizzando la dose più alta nei terreni argillosi o ricchi di sostanza organica ed intervenendo dopo il diradamento quando le piantine hanno emesso almeno 8-9 foglie (generalmente corrispondente alla fase di pre-fioritura). **Frumento e Orzo:** interventi di post-emergenza dallo stadio di 2 foglie a fine accestimento: 0,2 Kg/Ha. **Soia:** trattamenti di pre-semina o di pre-emergenza: 0,5-0,7 Kg/ha in miscela con formulati a prevalente attività graminicida (S-Metolaclor, ecc.). **Carota:** trattamenti di post-emergenza a partire dallo stadio di 3 foglie vere: 0,5-0,7 Kg/Ha. **Asparago:** trattamenti prima dell'emergenza dei turioni: 1,0-1,2 Kg/ha intervenendo su asparagiaie di almeno due anni di impianto. **Erba medica:** 1,0 - 1,5 Kg/ha applicando il dosaggio più elevato nei terreni più argillosi ed intervenendo quando la coltura, a seguito degli abbassamenti termici, è entrata in pieno riposo vegetativo.
In tutte le applicazioni impiegare il prodotto con 500-700 litri d'acqua ad ettaro.
Avvertenze: eseguire i trattamenti in giornate senza vento, avendo cura di distribuire uniformemente la soluzione su tutta la superficie da trattare, evitando sovrapposizioni o contaminazioni di colture adiacenti. Dopo l'applicazione, non effettuare alcuna lavorazione al terreno.
COMPATIBILITA': MECLIN MGD può essere miscelato con altri erbicidi a reazione neutra.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': MECLIN MGD non deve essere impiegato nel diserbo del pomodoro in serra o sotto tunnel. MECLIN MGD non deve inoltre essere utilizzato nel diserbo del pomodoro qualora: - venga impiegato un quantitativo di seme inferiore ai 2,5 Kg/ha e su terreni che diano origine a crosta; - la coltura presenti sintomi di sofferenza (per siccità, alte temperature, ecc.); - si debbano effettuare lavorazioni del terreno o irrigazioni entro 6-7 giorni dall'intervento erbicida. Il prodotto non deve essere applicato su Patate appartenenti alle cultivar Draga, Jurla e Vivax in quanto sensibili all'erbicida. MECLIN MGD può dare origine a fenomeni di fitotossicità su colture di Soia in terreni particolarmente sabbiosi.
INTERVALLO DI SICUREZZA Intervallo di tempo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 30 giorni per il Pomodoro, Frumento e Orzo, 60 giorni per Patata, Carota, Soia, Asparago ed Erba medica. ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA – DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE - NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE – Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

MECLIN MGD

ERBICIDA SELETTIVO IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Metribuzin puro g 35
- Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Da sciogliere in acqua senza rompere

Contenuto 100 – 200 – 250 g

Avvertenza: leggere l'etichetta riportata sulla confezione prima di utilizzare il prodotto

DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164
41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Registrazione n. 10386 del 22/03/2000 del Ministero della Sanità

MECLIN MGD

ERBICIDA SELETTIVO IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Metribuzin puro g 35
- Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di formulazione: Schirm GmbH Division Sideco, Mecklenburger Str. 229, D-23568 Lübeck
A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)
Stabilimenti di confezionamento: SCAM Spa - Modena

Distribuito da: S.I.V.A.M. S.p.A. – Via Scarlatti, 30 - Milano

Registrazione n.10386 del 22/03/2000 del Ministero della Sanità **Partita n.**

Kg 0,500 (= 5 sacchetti da 100 g) Kg 0,500 (= 2 sacchetti da 250 g) Kg 0,600 (= 3 sacchetti da 200 g) Kg 1 (= 4 sacchetti da 250 g)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee di base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo:** dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE: MECLIN MGD è un erbicida selettivo che agisce per assorbimento radicale e fogliare nei confronti di numerose erbe infestanti quali: Coda di volpe (*Alopecurus spp.*), Lollio (*Lolium spp.*), Fienarola (*Poa spp.*), Setaria (*Setaria viridis*), Amaranto (*Amarantus retroflexus*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Farinaccio (*Chenopodium album*), Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Stramonio (*Datura stramonio*), Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), Euforbia (*Euphorbia spp.*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Canapetta (*Galeopsis spp.*), Camomilla (*Matricaria camomilla*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Poligoni (*Poligonum spp.*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Ravanello (*Raphanus raphanistrum*), Erba calderina (*Senecio vulgaris*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Crespino (*Sonchus oleraceus*), Centocchio (*Stellaria media*), Erba storna (*Thlaspi arvense*).
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO MECLIN MGD può essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi: **Patata: a)** trattamenti di pre-emergenza: 0,5-0,8 Kg/ha, impiegando la dose più elevata nei terreni di medio impasto o tendenti all'argilloso. Nei terreni argillosi o particolarmente ricchi di sostanza organica elevare il dosaggio a 1 Kg/ha di formulato. **b)** Trattamenti di post-emergenza: 0,5-0,6 Kg/ha. MECLIN MGD si è dimostrato perfettamente tollerato dalle seguenti varietà di patata: Admirandus, Alkmaria, Apollo, Bea, Bintje, Desirée, Favorita, Hulmada, Kardinal, Kennebec, Majestic, Primura, Resy, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal. **Pomodoro: a)** trattamenti di pre-semina e pre-trapianto: 0,5-0,6 Kg/ha, intervenendo 7-14 giorni prima della semina su terreno già preparato senza interrare. **b)** Trattamenti di post-emergenza o post-trapianto: 0,3-0,5 Kg/ha, utilizzando la dose più alta nei terreni argillosi o ricchi di sostanza organica ed intervenendo dopo il diradamento quando le piantine hanno emesso almeno 8-9 foglie (generalmente corrispondente alla fase di pre-fioritura). **Frumento e Orzo:** interventi di post-emergenza dallo stadio di 2 foglie a fine accestimento: 0,2 Kg/Ha. **Soia:** trattamenti di pre-semina o di pre-emergenza: 0,5-0,7 Kg/ha in miscela con formulati a prevalente attività graminicida (S-Metolaclor, ecc.). **Carota:** trattamenti di post-emergenza a partire dallo stadio di 3 foglie vere: 0,5-0,7 Kg/Ha. **Asparago:** trattamenti prima dell'emergenza dei turrioni: 1,0-1,2 Kg/ha intervenendo su asparagiaie di almeno due anni di impianto. **Erba medica:** 1,0 - 1,5 Kg/ha applicando il dosaggio più elevato nei terreni più argillosi ed intervenendo quando la coltura, a seguito degli abbassamenti termici, è entrata in pieno riposo vegetativo.
In tutte le applicazioni impiegare il prodotto con 500-700 litri d'acqua ad ettaro.
Avvertenze: eseguire i trattamenti in giornate senza vento, avendo cura di distribuire uniformemente la soluzione su tutta la superficie da trattare, evitando sovrapposizioni o contaminazioni di colture adiacenti. Dopo l'applicazione, non effettuare alcuna lavorazione al terreno.
COMPATIBILITA': MECLIN MGD può essere miscelato con altri erbicidi a reazione neutra.
AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': MECLIN MGD non deve essere impiegato nel diserbo del pomodoro in serra o sotto tunnel. MECLIN MGD non deve inoltre essere utilizzato nel diserbo del pomodoro qualora: - venga impiegato un quantitativo di seme inferiore ai 2,5 Kg/ha e su terreni che diano origine a a crosta; - la coltura presenti sintomi di sofferenza (per siccità, alte temperature, ecc.); - si debbano effettuare lavorazioni del terreno o irrigazioni entro 6-7 giorni dall'intervento erbicida. Il prodotto non deve essere applicato su Patate appartenenti alle cultivar Draga, Jurla e Vivax in quanto sensibili all'erbicida. MECLIN MGD può dare origine a fenomeni di fitotossicità su colture di Soia in terreni particolarmente sabbiosi.
INTERVALLO DI SICUREZZA Intervallo di tempo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 30 giorni per il Pomodoro, Frumento e Orzo, 60 giorni per Patata, Soia, Carota, Asparago ed Erba medica.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE - NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE – Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE - DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

25%

1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua

2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti

3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore

4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ed .

5) aggiungere la restante parte d'acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

LENIC 80 WDG

ERBICIDA SELETTIVO MICROGRANULARE IDRODISPERSIBILE

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:

- **Lenacil puro g 80**
- **Coformulanti q.b. a g 100**

FRASI DI RISCHIO: altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di produzione: A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)
Schirm GmbH Division Sideco – Lübeck (Germania)
Stabilimento di confezionamento: SCAM Spa - Modena

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Registrazione n. 10393 del 22/03/2000 Ministero della Sanità
Kg 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 **Partita n.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza**: consultare un Centro Antiveleni.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO LENIC 80 WDG é un erbicida selettivo in formulazione microgranulare idrodispersibile impiegabile nel diserbo della barbabietola da zucchero e da foraggio, nonchè per il controllo delle infestanti dello spinacio. E' efficace contro numerose malerbe, sia graminacee che dicotiledoni quali Anagallide *(Anagallis arvensis)*, Atriplice *(Atriplex spp.)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa-pastoris)*, Camomilla *(M. camomilla)*, Camomilla inodore *(Anthemis spp.)*, Canapetta selvatica *(Galeopsis spp.)*, Centocchio *(Stellaria media)*, Crespino *(Sonchus spp.)*, Coda di volpe *(A. myosuroides)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvolus)*, Correggiola *(Polygonum aviculare)*, Erba storna *(Thalspi spp.)*, Erba calderina *(Senecius vulgaris)*, Erba strega *(Stachys spp.)*, Euforbia *(Euphorbia spp.)*, Farinaccio *(Chenopodium spp.)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Galinsoga *(Galinsoga parviflora)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Fienarola *(Poa spp.)*, Lollio *(Lollium spp.)* Miosotide *(Myosotis spp.)*, Poligoni *(Poligonum spp.)*, Ravanello selvatico *(Rafanus raphanistrum)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Spergola *(Spergola arvensis)*, Stellaria *(Stellaria media)*. LENIC 80 WDG puo' essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi:

<u>Barbabietola da zucchero e da foraggio</u>
a) Coltura a semina primaverile
- Pre-semina anticipata (dicembre-gennaio): 0,7-0,8 Kg/Ha.
- Pre-emergenza: 0,5-0,6 Kg/Ha. Per ampliare lo spettro di efficacia dell'intervento e mantenere un'elevata selettività nei confronti della coltura è possibile impiegare LENIC 80 WDG alla dose di 0,2-0,3 Kg/Ha in miscela con Metamitron (2,5-4,0 Kg/Ha di formulato al 70% di p.a.) o Cloridazon (2,5-3,5 Kg/Ha di formulato al 65%) o Etofumesate (1,5-2,0 l/Ha di fomulato 500 g/l) o Metolaclor (0,5-0,6 l/Ha di formulato 728 g/l).
- Post-emergenza in miscela con erbicidi a prevalente attività fogliare.

1) Tecnica delle "dosi molto ridotte " o Microdosi - 0,1 Kg/Ha per ciascun intervento;
2) Tecnica del trattamento frazionato - 0,15-0,2 Kg/Ha per ogni singola applicazione;
3) Tecnica del trattamento unico - 0,2-0,3 Kg/Ha.

b) Coltura a semina autunnale
- Pre-emergenza: 0,75-1,0 Kg/Ha. Per aumentare l'attività erbicida del trattamento è possibile impiegare LENIC 80 WDG in miscela con Etofumesate (1,5-2,0 l/Ha di formulato 500 g/l) o Cloridazon (2,5-3,0 Kg/Ha di formulato 65% di p.a.) o Metolaclor (0,5-0,8 l/Ha di formulato 943 g/l) .
- Post-emergenza: 0,2-0,3 Kg/Ha in miscela con preparati a prevalente attività fogliare.

<u>Spinacio</u> Pre semina: 0,8 1,0 Kg/Ha.
- Pre-emergenza: 1,0 Kg/Ha.
- Post-emergenza: 0,5 Kg/Ha. Per migliorare l'intervento erbicida è possibile impiegare LENIC 80 WDG alla dose di 0,3-0,4 Kg/Ha in miscela con Fenmedifam (2,0-3,0 l/Ha di formulato 157,4 g/l di p.a.).

COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina.
FITOTOSSICITA': rispettare scrupolosamente le dosi d'impiego e le modalità d'uso consigliate. Utilizzare i dosaggi più elevati nei terreni più argillosi e/o ricchi di sostanza organica. Non impiegare LENIC 80 WDG, sia da solo che in miscela, nei terreni sabbiosi, sciolti, ricchi di calcare o di scheletro. Evitare di impiegare il prodotto su colture geodisinfestate con preparati a base di Forate o Disulfuton. Nei casi di forzate risemine effettuare una lavorazione profonda del terreno trattato o reimpiantare solo colture previste in etichetta.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI -PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

LENIC 80 WDG

ERBICIDA SELETTIVO MICROGRANULARE IDRODISPERSIBILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Lenacil puro g 80
- Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Da sciogliere in acqua senza rompere

Contenuto 100 - 250 g

Avvertenza: leggere l'etichetta riportata sulla confezione.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164
41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Registrazione n.10393 del 22/03/2000 del Ministero della Sanità

LENIC 80 WDG

ERBICIDA SELETTIVO MICROGRANULARE IDRODISPERSIBILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Lenacil puro g 80
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: Schirm GmbH Division Sideco - Lübeck (Germania)
Stabilimento di formulazione: A.D.I.C.A. Srl – Nera Montoro (Terni)
Stabilimento di confezionamento: SCAM Spa – Modena
Registrazione n. 10393 del 22/03/2000 Ministero della Sanità

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Kg 0,500 (= 5 sacchetti da 100 g) Kg 0,500 (= 2 sacchetti da 250 g) Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO LENIC 80 WDG é un erbicida selettivo in formulazione microgranulare idrodispersibile impiegabile nel diserbo della barbabietola da zucchero e da foraggio, nonchè per il controllo delle infestanti dello spinacio. E' efficace contro numerose malerbe, sia graminacee che dicotiledoni quali Anagallide *(Anagallis arvensis)*, Atriplice *(Atriplex spp.)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa-pastoris)*, Camomilla *(M. camomilla)*, Camomilla inodore *(Anthemis spp.)*, Canapetta selvatica *(Goleopsis spp.)*, Centocchio *(Stellaria media)*, Crespino *(Sonchus spp.)*, Coda di volpe *(A. myosuroides)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvolus)*, Correggiola *(Polygonum aviculare)*, Erba storna *(Thalspi spp.)*, Erba calderina *(Senecius vulgaris)*, Erba strega *(Stachys spp.)*, Euforbia *(Euphorbia spp.)*, Farinaccio *(Chenopodium spp.)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Galinsoga *(Galinsoga parviflora)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Fienarola *(Poa spp.)*, Lollio *(Lollium spp.)* Miosotide *(Myosotis spp.)*, Poligoni *(Poligonum spp.)*, Ravanello selvatico *(Rafanus raphanistrum)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Spergola *(Spergola arvensis)*, Stellaria *(Stellaria media)*. LENIC 80 WDG puo' essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi: **<u>Barbabietola da zucchero e da foraggio</u>**
a) Coltura a semina primaverile
- Pre-semina anticipata (dicembre-gennaio): 0,7-0,8 Kg/Ha.
- Pre-emergenza: 0,5-0,6 Kg/Ha. Per ampliare lo spettro di efficacia dell'intervento e mantenere un'elevata selettività nei confronti della coltura è possibile impiegare LENIC 80 WDG alla dose di 0,2-0,3 Kg/Ha in miscela con Metamitron (2,5-4,0 Kg/Ha di formulato al 70% di p.a.) o Cloridazon (2,5-3,5 Kg/Ha di formulato al 65%) o Etofumesate (1,5-2,0 l/Ha di fomulato 500 g/l) o Metolaclor (0,5-0,6 l/Ha di formulato 728 g/l).
- Post-emergenza in miscela con erbicidi a prevalente attività fogliare.
1) Tecnica delle "dosi molto ridotte " o Microdosi - 0,1 Kg/Ha per ciascun intervento;
2) Tecnica del trattamento frazionato - 0,15-0,2 Kg/Ha per ogni singola applicazione;
3) Tecnica del trattamento unico - 0,2-0,3 Kg/Ha.
b) Coltura a semina autunnale
- Pre-emergenza: 0,75-1,0 Kg/Ha. Per aumentare l'attività erbicida del trattamento è possibile impiegare LENIC 80 WDG in miscela con Etofumesate (1,5-2,0 l/Ha di formulato 500 g/l) o Cloridazon (2,5-3,0 Kg/Ha di formulato 65% di p.a.) o Metolaclor (0,5-0,8 l/Ha di formulato 943 g/l) .
- Post-emergenza: 0,2-0,3 Kg/Ha in miscela con preparati a prevalente attività fogliare.
<u>Spinacio</u> - Pre-semina: 0,8-1,0 Kg/Ha.
- Pre-emergenza: 1,0 Kg/Ha.
- Post-emergenza: 0,5 Kg/Ha. Per migliorare l'intervento erbicida è possibile impiegare LENIC 80 WDG alla dose di 0,3-0,4 Kg/Ha in miscela con Fenmedifam (2,0-3,0 l/Ha di formulato 157,4 g/l di p.a.).
COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. **AVVERTENZA D'USO:** nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all'introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione chiudere bene la scatola. **FITOTOSSICITA'**: rispettare scrupolosamente le dosi d'impiego e le modalità d'uso consigliate. Utilizzare i dosaggi più elevati nei terreni più argillosi e/o ricchi di sostanza organica. Non impiegare LENIC 80 WDG, sia da solo che in miscela, nei terreni sabbiosi, sciolti, ricchi di calcare o di scheletro. Evitare di impiegare il prodotto su colture geodisinfestate con preparati a base di Forate o Disulfuton. Nei casi di forzate risemine effettuare una lavorazione profonda del terreno trattato o reimpiantare solo colture previste in etichetta. **Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.**
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE-Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade-- DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE - DA SCIOGLIERE IN ACQUA

25%

TICKET-SC

Acaricida in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Fenbutatin-ossido puro g 44 (= 500 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: **data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui art. 25 del DPR 23 Aprile 2001, n.290.**
FRASI DI RISCHIO: molto tossico per inalazione. Irritante per gli occhi e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena

Registrazione n. 10397 del 22/03/2000 Ministero della Sanità

L 0,100 / 0,250 / 0,500 / 1 **Partita n. :**

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: irritante per cute e mucose, cefalea, tinnitus, vertigini, dolori lombari e addominali, insufficienza respiratoria e circolatoria, interessamento del SNC e periferico con nevralgie e paralisi. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE TICKET-SC è un acaricida che agisce per contatto contro le forme mobili degli acari (larve, adulti). La sua azione, cui si associa un effetto "antifeeding" che riduce progressivamente la capacità degli acari di nutrirsi, si sviluppa in maniera progressiva e si mantiene su livelli ottimali per un notevole periodo (4-6 settimane). E' pertanto necessario intervenire ai primi sintomi dell'infestazione bagnando accuratamente la vegetazione. TICKET-SC è caratterizzato da una elevata selettività verso l'acaroentomofauna utile.
MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO
TICKET-SC può essere impiegato sulle seguenti colture ai dosaggi di seguito indicati: **Vite**: contro il Ragnetto rosso e giallo (*Panonychus ulmi, Eotetranychus carpini)* e gli Eriofidi (*Calepitrimerus vitis*) alla dose di 100-110 ml/hl. **Melo, Pero**: contro il Ragnetto rosso (*Panonychus ulmi, Tetranychus urticae)* e gli Eriofidi *(Epitrimerus pyri, Aculus schlechtendali, Aculus fockeui, Eriophyes similis)* alla dose di 100-110 ml/hl. **Agrumi** : contro i Ragnetti rossi (*Panonychus citri, Tetranychus urticae)* e gli Eriofidi (*Aculops pelekassi*) alla dose di 100-110 ml/hl. **Cetriolo, Pomodoro**: contro il Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*) e gli Eriofidi (*Aculops lycopersici*) alla dose di 100-110 ml/hl. **Colture Floreali e Ornamentali:** contro il Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae, Panunychus ulmi, Eotetranychus tiliarus, Oligonychus ununguis, Trisetacus juniperinus, ecc.)* e gli Eriofidi (*Stenacis triradiatus, Phytoptus spp., Phyllocoptes trotteri, ecc.)* alla dose di 100-110 ml/hl.
COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con i preparati fitosanitari a reazione alcalina. Evitare le miscele con preparati contenenti zolfo in presenza di temperature elevate.**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': negli interventi su colture di rosa è opportuno effettuare, data la notevole varietà di specie presenti, saggi preliminari di sensibilità al prodotto. Evitare l'impiego del prodotto con olii minerali negli interventi su agrumi. L'efficacia di TICKET-SC può risultare ridotta se applicato in concomitanza con Poltiglia Bordolese o Captano, per cui conviene distanziare tra loro i trattamenti di alcuni giorni
RISCHI DI NOCIVITÀ': il prodotto è tossico per i pesci.
PERIODO DI CARENZA Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta:
- 30 giorni per Melo, Pero, Cetriolo, Pomodoro
- 45 giorni la Vite
- 60 giorni per gli Agrumi

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

ATRAC 500 FL

Acaricida specifico in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Clofentezine puro g 42 (= 500 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511
Stabilimento di Produzione: SCAM S.p.a. – Modena
Safapac Ltd – Cambridge (GB)
Registrazione n. 10400 del 22/03/2000 del Ministero della Sanità
L 0,100 / 0,200 / 0,250 / 0,500 / 1 **Partita n.**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.
CAMPI E MODALITÀ D'IMPIEGO ATRAC 500 FL è un acaricida che agisce per contatto sulle uova invernali ed estive degli acari tetranidi. E' inoltre attivo nei confronti dei primi stadi di sviluppo di questi fitofagi (larve e protoninfe), assicurando un controllo prolungato nel tempo delle infestazioni. Sensibili all'attività del prodotto risultano *Panonychus ulmi, Panonychus citri, Tetranichus urticae, Eotetranychus carpini.* Negli interventi sulle popolazioni con contemporanea presenza di diversi stadi di sviluppo degli acari è necessario associare ad ATRAC 500 FL un prodotto a prevalente azione adulticida per completare l'azione sulle forme mobili più sviluppate (deutoninfe e adulti). ATRAC 500 FL presenta caratteristiche estremamente favorevoli nei confronti dell'acaroentomofauna utile; non interferisce con la biologia degli insetti utili quali Antocoridi, Crisopidi, Coccinellidi, Sirfidi, Stafilinidi, Imenotteri. Nei confronti degli acari utili (Fitoseidi), applicazioni precoci (uova invernali di *P. ulmi*) o effettuate nel corso della stagione non compromettono l'azione esercitata da questa specie nei confronti di *T. pyri, A. potentillae, P. persimilis.* Ciò lo rende particolarmente idoneo per l'impiego nei programmi di difesa guidata ed integrata. L'irrorazione del prodotto può essere fatta con pompe a volume normale (1500-2000 litri di acqua per ettaro) o con attrezzature in grado di operare a "basso volume"(non impiegare mai meno di 500 l/Ha di soluzione). In tal caso la dose andrà determinata in base alla superficie da trattare e non dovrà comunque mai essere inferiore a 400 ml/Ha nei trattamenti sulle uova invernali e 500 ml/Ha nelle applicazioni in piena vegetazione.
<u>VITE:</u> (uve da vino): Intervenire alla comparsa di forme mobili di *P. ulmi* sui giovani germogli (5-30 cm) con ATRAC 500 FL alla dose di 20-25 ml/hl in associazione con un acaricida ad azione adulticida. Su infestazioni più tardive di Ragnetto rosso e Ragnetto giallo l'intervento deve essere compiuto con la massima tempestività, allorché si notano i primi acari sulle foglie. Nei casi in cui è prevalente la presenza di Ragnetto giallo (*E. carpini*), elevare la dose a 25-30 ml/hl.
<u>MELO, PERO, PRUGNA:</u> **Interventi sulle uova invernali di *P. ulmi*:** Utilizzare ATRAC 500 FL alla dose di 40 ml/hl, intervenendo 10-15 giorni prima della schiusura (nelle Pomacee non oltre le orecchiette di topo - fase C3D -). Nel caso si aggiunga Olio bianco è possibile ridurre la dose a 30 ml/hl. **Interventi in presenza di forme mobili di Ragnetto rosso:** Intervenire con ATRAC 500 FL alla dose di 30 ml/hl in miscela con un acaricida ad azione adulticida in post-fioritura o alla prima comparsa dell'infestazione (1-3 acari per foglia). Le modalità di intervento sopra indicate sono da considerarsi alternative. Nei casi di reinfestazioni tardive durante il periodo estivo intervenire con un prodotto efficace nei confronti delle forme mobili. Su Pero l'associazione di ATRAC 500 FL (30 ml/hl) con formulati a base di Amitraz in concomitanza dell'intervento contro la Psilla di inizio estate consente di controllare efficacemente le infestazioni di acari che causano il "Brusone". Il formulato non da origine a fenomeni di rugginosità su Golden Delicious e su Pero.
<u>ARANCIO, MANDARINO, CLEMENTINO, LIMONE, POMPELMO, BERGAMOTTO:</u> Intervenire alla prima comparsa delle forme mobili sulle foglie. Per il controllo di *P. citri* impiegare ATRAC 500 FL alla dose di 30 ml/hl in miscela con un acaricida ad attività adulticida. In presenza di *T. urticae* è consigliabile aumentare la dose di ATRAC 500 FL a 40 ml/hl.
<u>FRAGOLA, MELONE, POMODORO, COLTURE FLOREALI e ORNAMENTALI</u> (in serra ed in pieno campo): intervenire prima della fioritura con ATRAC 500 FL alla dose di 40 ml/hl in combinazione con un acaricida efficace sulle forme adulte. Applicazioni precoci con ATRAC 500 FL da solo alla dose di 50-60 ml/hl impediscono la comparsa degli acari nel periodo più critico della maturazione.
Diluire accuratamente il prodotto in circa metà del quantitativo totale di acqua da irrorare, quindi portare a volume. Mantenere in agitazione la miscela sia durante l'impiego che per brevi interruzioni. Non lasciare la miscela pronta nel serbatoio dell'irroratrice per un lungo periodo di tempo. Lavare accuratamente l'attrezzatura subito dopo l'utilizzazione. Assicurare una completa ed uniforme bagnatura delle piante. Effettuare il trattamento in condizioni di scarsa ventosità, utilizzando pompe operanti a basso regime. Non trattare in presenza di temperature elevate o con bassa umidità relativa dell'aria. Rispettare rigorosamente le norme di impiego al fine di evitare l'insorgenza di ceppi resistenti. Nel caso questi dovessero comparire, utilizzare un preparato acaricida alternativo.
COMPATIBILITÀ: il prodotto è miscibile con gli Olii bianchi, Ossicloruri di rame e Poltiglie Bordolesi neutre, DNOC. Non miscelare ATRAC 500 FL con formulati a reazione fortemente alcalina (Polisolfuri, ecc.). Trattamenti con Polisolfuro precedenti l'applicazione di ATRAC 500 FL non ne compromettono l'efficacia sulle uova invernali di *P. ulmi*.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': su varietà poco note o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi preliminari su superficie ridotte prima di trattare l'intera superficie.
INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti-15 gg. prima del raccolto di Fragola, Melone, Pomodoro. **-30 gg.** prima del raccolto delle altre colture.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alla persone ed agli animali. **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI -PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE – NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE – Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade**

ARIC 480 L.S.

Erbicida selettivo in soluzione acquosa

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- DICAMBA acido puro g 40,3 (= 480 g/l)
(sotto forma di sale dimetilamminico)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: irritante per gli occhi. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena

Registrazione n. 10415 del 29/03/2000 del Ministero della Sanità

L 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10 **Partita n.**

INFORMAZIONI MEDICHE Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia.
Terapia : sintomatica. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE ARIC 480 L.S. è un erbicida di post-emergenza che agisce per assorbimento fogliare e, in misura più limitata, per assorbimento radicale. Viene traslocato mediante i flussi linfatici all'interno delle piante. Svolge la sua azione nei confronti delle malerbe sensibili alterandone il metabolismo enzimatico.
MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO
ARIC 480 L.S. può essere impiegato per il controllo delle seguenti malerbe: Cencio molle *(Abutilon theophrasti)*, Amaranto *(Amarantus spp.)*, Forbicina *(Bidens spp.)*, Villucchione *(Calistegia sepium)*, Fiordaliso *(Centaurea cianus)*, Farinaccio *(Chenopodium spp.)*, Stoppione *(Cirsium spp.)*, Convolvolo *(Convolvulus spp.)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvolus)*, Stramonio *(Datura stramonium)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Attaccamani *(Galium aparine)*. Uva turca *(Phytolacca decandra)*. Poligoni *(Poliganum spp.)*, Romice *(Rumex spp.)*, Sicio *(Sicius angulatus)*, Senecio *(Senecio vulgaris)*, Erba morella *(Solanum nigrum)*, Spergola *(Spergula arvensis)*, Centocchio *(Stellaria media)*, Soffione *(Taraxacum officinalis)*, Veccia *(Vicia spp.)*, Spino d'asino *(Xantium spp.)*.
Parziale risulta invece l'attività nei confronti di Anagallide *(Anagallis arvensis)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa-pastoris)*, Camomilla *(Matricaria camomilla)*, Crisantemo selvatico *(Chrysanthemum segetum)*, Cocomero asinino *(Eobalium elaterium)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Rafano *(Raphanus raphanistrum)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Ortica *(Urtica urens)*, Veronica *(Veronica spp.)*.
ARIC 480 L.S. può essere utilizzato sulle seguenti colture:
Frumento, Orzo, Segale, Avena: 0,200-0,250 ml/Ha, intervenendo dallo stadio fenologico delle 4-5 foglie fino alla fase di levata. In presenza di infestanti mediamente sensibili all'azione del Dicamba è consigliabile aggiungere prodotti a base di MCPA (1,5-2,0 l/Ha di formulato commerciale 280 g/l) o MCPP (2,0 l/Ha). **Mais**: 0,500-0,600 ml/Ha, intervenendo dall'emissione delle prime foglie fino ad una altezza massima della coltura di 40 cm. Nel caso di infestazioni complesse ed al fine di rendere completo lo spettro di efficacia dell'intervento erbicida è consigliabile utilizzare ARIC 480 L.S. alla dose di 0,3-0,4 ml/Ha in miscela con formulati a base di Primisulfuron, Prosulfuron, Nicosulfuron, Rimsulfuron, Sulcotrione, Bromoxynil ottanoato. In terreni sabbiosi il prodotto può dare origine a fenomeni di fitotossicità per cui ne è sconsigliato l'impiego. Non impiegare ARIC 480 L.S. su linee pure di mais da seme e su colture di mais dolce. **Sorgo**: 0,350-0,400 ml/Ha, intervenendo dall'emergenza della coltura fino allo stadio di 5° foglia. Su varietà di nuova introduzione è consigliabile verificare preventivamente la selettività. **Asparago**: 0,100-0,250 ml/Ha, effettuando il trattamento all'inizio della primavera, prima dell'emissione dei turioni su terreno sarchiato e con un sufficiente grado di umidità. **Melo**: 0,300-0,400 ml/Ha, intervenendo su infestanti in fase di attiva crescita. In presenza di infestazioni complesse e di malerbe mediamente sensibili è opportuno aggiungere preparati a base di MCPA (3,0-4,0 l/Ha di formulato commerciale 280 g/l). Nel caso di interventi localizzati lungo il filare della coltura, ridurre proporzionalmente i dosaggi impiegati in funzione della superficie di terreno effettivamene trattata. **Prati di graminacee** (da foraggio) e **Tappeti erbosi** (prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi): 0,500 ml/Ha, applicando il prodotto quando le infestanti si trovano nei primi stadi di sviluppo e lasciando trascorrere almeno 4 giorni prima dello sfalcio successivo. Nel caso di interventi su prati di nuovo impianto, iniziare i trattamenti solo dopo il secondo sfalcio. Nel caso l'intervento non venga effettuato sull'intera superfice ma localizzato su determinate zone, utilizzare una soluzione all'1% (10 ml in 10 litri di acqua) di formulato. **Terreni agricoli senza coltura**: 0,25-0,30 l/Ha per il contenimento delle infestanti dicotiledoni al fine di evitarne la disseminazione e mantenere una copertura vegetale del terreno atta ad impedire l'erosione. 0,6 l/Ha per l'eliminazione completa della vegetazione. Lasciare trascorrere almeno 20 giorni dal trattamento alla semina della coltura successiva.
ARIC 480 L.S. deve essere impiegato su infestanti nei primi stadi di sviluppo. Utilizzare un volume di acqua adeguato (200-400 l/Ha) ed impiegare ugelli a ventaglio.
FITOTOSSICITA': evitare che la nube irrorata possa giungere a contatto con colture vicine. Effettuare un risciacquo accurato della botte in caso di impiego successivo su colture non indicate in etichetta.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
PERIODO DI CARENZA: intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 130 giorni per il Sorgo; 30 giorni per il Melo, 20 giorni per le altre colture.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE

Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

SPIKE

Acaricida in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Fenbutatin-ossido puro g 44 (= 500 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: **data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui art. 25 del DPR 23 Aprile 2001, n.290.**
FRASI DI RISCHIO: molto tossico per inalazione. Irritante per gli occhi e per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.
SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM S.p.a. - Modena
Distribuito da: S.I.V.A.M. S.p.A. – Via Scarlatti, 30 - Milano
Registrazione n. 10646 del 6/12/2000 Ministero della Sanità

L 0,100 / 0,250 / 0,500 / 1 **Partita n. :**

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI Non contaminare altre colture. alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: irritante per cute e mucose, cefalea, tinnitus, vertigini, dolori lombari e addominali, insufficienza respiratoria e circolatoria, interessamento del SNC e periferico con nevralgie e paralisi. **Terapia :** sintomatica. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE SPIKE é un acaricida che agisce per contatto contro le forme mobili degli acari (larve, adulti). La sua azione, cui si associa un effetto "antifeeding" che riduce progressivamente la capacità degli acari di nutrirsi, si sviluppa in maniera progressiva e si mantiene su livelli ottimali per un notevole periodo (4-6 settimane). E' pertanto necessario intervenire ai primi sintomi dell'infestazione bagnando accuratamente la vegetazione. SPIKE è caratterizzato da un'elevata selettività verso l'acaroentomofauna utile.
MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO SPIKE può essere impiegato sulle seguenti colture ai dosaggi di seguito indicati: **Vite**: contro il Ragnetto rosso e giallo (*Panonychus ulmi, Eotetranychus carpini)* e gli Eriofidi (*Calepitrimerus vitis*) alla dose di 100-110 ml/hl. **Melo, Pero**: contro il Ragnetto rosso (*Panonychus ulmi, Tetranychus urticae)* e gli Eriofidi *(Epitrimerus pyri, Aculus schlechtendali, Aculus fockeui, Eriophyes similis)* alla dose di 100-110 ml/hl. **Agrumi**: contro i Ragnetti rossi (*Panonychus citri, Tetranychus urticae)* e gli Eriofidi (*Aculops pelekassi*) alla dose di 100-110 ml/hl. **Cetriolo, Pomodoro**: contro il Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*) e gli Eriofidi (*Aculops lycopersici*) alla dose di 100-110 ml/hl. **Colture Floreali e Ornamentali:** contro il Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae, Panunychus ulmi, Eototetranychus tiliarus, Oligonychus ununguis, Trisetacus juniperinus, ecc.)* e gli Eriofidi (*Stenacis triradiatus, Phytoptus spp., Phyllocoptes trotteri, ecc.)* alla dose di 100-110 ml/hl.
COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con i preparati fitosanitari a reazione alcalina. Evitare le miscele con preparati contenenti zolfo in presenza di temperature elevate. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': negli interventi su colture di rosa è opportuno effettuare, data la notevole varietà di specie presenti, saggi preliminari di sensibilità al prodotto. Evitare l'impiego del prodotto con olii minerali negli interventi su agrumi. L'efficacia di SPIKE può risultare ridotta se applicato in concomitanza con Poltiglia Bordolese o Captano, per cui conviene distanziare tra loro i trattamenti di alcuni giorni
RISCHI DI NOCIVITÀ': il prodotto è tossico per i pesci.
PERIODO DI CARENZA Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta:
- 30 giorni per Melo, Pero, Cetriolo, Pomodoro
- 45 giorni la Vite
- 60 giorni per gli Agrumi.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

TRIAD

Fungicida ad azione sistemica in formulazione microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Fosetil Alluminio puro g 80
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di Produzione: A.D.I.C.A. S.r.l. - Via dello Stabilimento, 11 - Nera Montoro (TR)
Stabilimento di Confezionamento: SCAM Spa – Modena
Distribuito da: S.I.V.A.M. S.p.A. – Via Scarlatti, 30 - Milano
Registrazione n. 10647 del 6/12/2000 del Ministero della Sanità

Kg 1 / 5 / 10 / 25 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione informare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza**: consultare un Centro Antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO TRIAD è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante. La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente che risulta più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attività di crescita. La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
Vite: contro la Peronospora (*P. viticola*). Effettuare trattamenti preventivi alla dose di 170-250 g/hl in associazione con fungicidi sistemici (es. Metalaxyl), citotropici (es. Cimoxanil) e/o di copertura (es. Mancozeb, Folpet) o loro eventuali miscele. Evitare l'impiego in associazione con formulati rameici.
Melo, Pero: contro Ticchiolatura (*V. inaequalis, V. pirina*), trattamenti preventivi a 150-200 g/hl; si consiglia l'associazione con fungicidi di copertura (escluso rame) o citotropici (Dodina, ecc.) in particolare nelle fasi pre-fiorali e immediatamente successive all'allegagione. Su PERO contro Maculatura bruna (*Stemphylium spp.*) trattamenti preventivi a 250 g/hl. **Melo, Pero, Pesco, Actinidia:** contro Fitoftora (*Phytophthora cactorum*).
a) - Effettuare un trattamento sulla vegetazione, una volta al mese, dalla sfioritura fino a quaranta giorni dalla raccolta (per melo e actinidia), con 250 g/hl.
b) - Su pianta già debilitata dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida: effettuare un'annaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, con litri 1-2 per pianta di una poltiglia costituita da Kg 5 di prodotto per 100 litri di acqua.
Fragola: contro Fitoftora (*Phytophtora cactorum, Phytophtora fragariae*). L'immersione delle piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti, seguita da 2-3 irrorazioni alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immersione delle piante prima del trapianto in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di g 0,5 di formulato per pianta. **Lattuga:** contro Peronospora (*Bremia lactucae*) effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire almeno 3 kg. di prodotto per ettaro) Si consiglia di effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto: se si verificano forti sbalzi termici la lattuga può essere sensibile al prodotto. **Melone:** contro Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*) effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl avendo cura di distribuire, come minimo, 3 Kg di prodotto per ettaro, ogni 14 giorni. **Cocomero, Cetriolo, Spinacio:** contro Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis, Peronospora spinaciae*), effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire come minimo, 3 Kg di prodotto per ettaro). **Carciofo:** contro Peronospora (*Bremia lactucae*) a 200-300 g/hl. **Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo:** contro Fitoftora (*Phytophthora spp.*) effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl utilizzando dieci litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione possono venire integrati da pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche); pratica indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida.
Vivai di fruttiferi: effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl con cadenza mensile. **Vivai di agrumi:** impiegare la dose di 400 g/hl ogni 60 giorni.
Colture ornamentali in pieno campo e in serra: contro Fitoftora (*Phytophthora spp.*) di Chamaecyparis e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee di Poinsettia, St.Paulia e Crisantemo, effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con g 5-10 di formulato per mq. una volta al mese in primavera.
COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con i prodotti a base di Rame, di Dicofol e con concimi fogliari contenenti azoto. Non effettuare miscele con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta. Si consiglia inoltre di non irrorare il prodotto su colture precedentemente trattate con i suddetti formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto. Nella miscelazione del prodotto con altri formulati si consiglia l'effettuazione di saggi preliminari, onde verificarne la compatibilità.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI: - 15 gg. prima del raccolto su carciofo, cetriolo, cocomero, melone, lattuga, spinacio. **-30 gg.** prima del raccolto su fragola. **-40 gg.** prima del raccolto su vite, melo, pero, pesco, actinidia. **- 80 gg.** prima della raccolta di arancio, limone, mandarino, pompelmo.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

CLEANER

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Clorpirifos-Metile puro g 22,1 (= 223 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: rischio di gravi lesioni oculari. Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di produzione: SCAM S.p.a. Modena
Distribuito da: S.I.V.A.M. S.p.A. – Via Scarlatti, 30 - Milano

Registrazione n. 10659 del 29/12/2000 del Ministero della Sanità

L 1/5/10 Partita n.:

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO CLEANER è un insetticida fosforganico che esplica la propria azione per contatto, per ingestione e, più limitatamente in fase di vapore. Risulta indicato sulle seguenti colture:
Melo, Pero, Pesco: contro tortricidi ricamatori *(Archips spp, Pandemis spp., A. orana, A. pulchellana, H. nubifera, Recurvaria spp., Hypomoneuta spp., ecc.)*, Carpocapsa *(C. pomonella)*, Cidia orientale (*C. molesta*), Anarsia (*A. lineatella*), Mosca della frutta *(C. capitata)*, 200-250 ml/hl. Contro le neanidi di Cocciniglie *(Q. perniciosus, ecc.)* 200-250 ml/hl.
Arancio: contro Tignola della zagara *(P. citri)*, Cimicetta verde *(C. trivialis)*, Formche *(L. humile, C. nylanderi, ecc.)*, Metcalfa *(M. pruinosa)*, e neanidi di Cocciniglie *(A. aurantii, A. nereii, Coccus spp., Ceroplastes spp., S. oleae, ecc.)* 250 ml/hl
Vite: contro le Tignole *(L. botrana, C. ambiguella, A. pulchellana)*, Tripidi *(D. reuteri, Franklinella spp., ecc.)*, Nottue *(Noctua spp.)*, Metcalfa *(M. pruinosa)*, e neanidi di Cocciniglie *(T. vitis, ecc.)* 100-200 ml/hl. Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cultivar sensibili; si raccomandano pertanto saggi zonali e varietali.
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Pisello, Ravanello, Patata: contro Nottue *(Agrotis spp., Mamestra spp., ecc.)*, Tripidi *(T. tabaci, ecc.)*, Gortina *(Gortyna spp.)*, Cavolaia *(P. brassicae)*, Macaone *(Papillio spp.)*, Dorifora *(L. decemlineata)*, 1,5-2,0 l/Ha .
Mais: contro Nottue *(Agrotis spp.)*, Piralide *(O. nubilalis)* ed Elateridi *(Agroties spp.)* 300 ml/hl.
Pioppo: contro Saperda *(Saperda spp.)*, Gemmaiola *(G. acerina)*, Criptorrinco *(C. lapathi)*, Ifantria *(H. cunea)* 400-500 ml/hl.
Garofano, Crisantemo, Azalea, Ciclamino: contro Bega, Tortricidi, Oziorrinco e neanidi di Cocciniglie 200 ml/hl.
COMPATIBILITA': non è miscibile con formulati a reazione alcalina.
FITOTOSSICITA': non impiegare il prodotto sulle varietà di melo Stayman Red, Stayman Winesap, Gloster, Gallia Beauty.
In post-fioritura del melo non eseguire più di 2 trattamenti.
Non effettuare trattamenti su Arancio nei mesi compresi tra gennaio ed aprile.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle precette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

VAPOR PIR 22

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Clorpirifos-Metile puro g 22,1 (= 223 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi, guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa Modena

Distribuito da: IQV Italia Srl – Via Vittorio Veneto, 31 – Garbagnate Milanese (MI)
Registrazione n. 10689 del 31/01/2001 del Ministero della Sanità

L 1/5/10 **Partita n.:**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO VAPOR PIR 22 è un insetticida fosforganico che esplica la propria azione per contatto, per ingestione e, più limitatamente in fase di vapore. Risulta indicato sulle seguenti colture:
Melo, Pero, Pesco: contro tortricidi ricamatori *(Archips spp, Pandemis spp., A. orana, A. pulchellana, H. nubifera, Recurvaria spp., Hypomoneuta spp., ecc.)*, Carpocapsa *(C. pomonella)*, Cidia orientale (*C. molesta*), Anarsia *(A. lineatella)*, Mosca della frutta *(C. capitata)*, 200-250 ml/hl. Contro le neanidi di Cocciniglie *(Q. perniciosus, ecc.)* 200-250 ml/hl.
Arancio: contro Tignola della zagara *(P. citri)*, Cimicetta verde *(C. trivialis)*, Formiche *(L. humile, C. nylanderi, ecc.)*, Metcalfa *(M. pruinosa)*, e neanidi di Cocciniglie *(A. aurantii, A. nereii, Coccus spp., Ceroplastes spp., S. oleae, ecc.)* 250 ml/hl
Vite: contro le Tignole *(L. botrana, C. ambiguella, A. pulchellana)*, Tripidi *(D. reuteri, Franklinella spp., ecc.)*, Nottue *(Noctua spp.)*, Metcalfa *(M. pruinosa)*, e neanidi di Cocciniglie *(T. vitis, ecc.)* 100-200 ml/hl. Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cultivar sensibili: si raccomandano pertanto saggi zonali e varietali.
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Pisello, Ravanello, Patata: contro Nottue *(Agrotis spp., Mamestra spp., ecc.)*, Tripidi *(T. tabaci, ecc.)*, Gortina *(Gortyna spp.)*, Cavolaia *(P. brassicae)*, Macaone *(Papillio spp.)*, Dorifora *(L. decemlineata)*, 1,5-2,0 l/Ha .
Mais: contro Nottue *(Agrotis spp.)*, Piralide *(O. nubilalis)* ed Elateridi *(Agroties spp.)* 300 ml/hl.
Pioppo: contro Saperda *(Saperda spp.)*, Gemmaiola *(G. acerina)*, Criptorrinco *(C. lapathi)*, Ifantria *(H. cunea)* 400-500 ml/hl.
Garofano, Crisantemo, Azalea, Ciclamino: contro Bega , Tortricidi, Oziorrinco e neanidi di Cocciniglie 200 ml/hl.
COMPATIBILITA': non è miscibile con formulati a reazione alcalina.
FITOTOSSICITA': non impiegare il prodotto sulle varietà di melo Stayman Red, Stayman Winesap, Gloster, Gallia Beauty.
In post-fioritura del melo non eseguire più di 2 trattamenti.
Non effettuare trattamenti su Arancio nei mesi compresi tra gennaio ed aprile.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

ALBENE GIARDINO

INSETTICIDA A BASE DI OLIO PER UN IMPIEGO ESCLUSIVO FLOREALE IN GIARDINO DOMESTICO E PER PIANTE DA APPARTAMENTO

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Olio Bianco (residuo insulfonabile minimo 95%) = g 80 (= 696 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
ALBENE GIARDINO un'insetticida polivalente a base di olio minerale bianco neutro ad alto grado di insulfonabilità (superiore al 95%), per un impiego floreale in giardino od in appartamento. Esplica la sua azione per contatto e per asfissia su insetti, acari e loro uova. E' particolarmente attivo contro Cocciniglie (*P. pentagona, ecc.*) e Ragnetto rosso (*T. urticae, P.ulmi*).
ALBENE GIARDINO si usa versando 30 ml / litro d'acqua (pari ad un misurino pieno) spruzzando, con l'utilizzo di un normale spruzzatore, uniformemente tutta la pianta.

COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con i prodotti contenenti zolfo, polisolfuri, captano, folpet, dinocap, tiram, dicloran, propargite, triclorfon.

Intervallo fra le singole applicazioni: in determinati periodi (primavera-autunno) è consigliabile effettuare due trattamenti con un intervallo di 8-10 giorni l'uno dall'altro.

FITOTOSSICITA': incompatibile con lo zolfo. Distanziare i trattamenti di almeno 15 giorni.
AVVERTENZA: da non applicare in agricoltura e comunque su piante destinate all'alimentazione.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano-Modena Tel. 059-586511

Officina di produzione: SCAM S.p.a.
A.D.I.C.A. Srl – Via S.Silvestro 1 – Faenza (RA)
I.R.C.A. Service Spa – Fornovo S.Giovanni (BG)
S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa – Fraz. Torrenieri di Montalcino (SI)
Distribuito da: Geogreen Srl Via Piana, 16 – Castiglion del Lago (PG)
Grenn Ravenna Srl – Via Matteotti, 16 – Ravenna (RA)

Reg. n. 10868 del 11/04/2001 del Ministero della Sanità

Contenuto: ml. 10/20/50/100 **Partita n.**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Foglio illustrativo

ALBENE GIARDINO

INSETTICIDA A BASE DI OLIO PER UN IMPIEGO ESCLUSIVO FLOREALE IN GIARDINO DOMESTICO E PER PIANTE DA APPARTAMENTO

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
ALBENE GIARDINO un'insetticida polivalente a base di olio minerale bianco neutro ad alto grado di insulfonabilità (superiore al 95%), per un impiego floreale in giardino od in appartamento. Esplica la sua azione per contatto e per asfissia su insetti, acari e loro uova. E' particolarmente attivo contro Cocciniglie (*P. pentagona, ecc.*) e Ragnetto rosso (*T. urticae, P.ulmi*).
ALBENE GIARDINO si usa versando 30 ml / litro d'acqua (pari ad un misurino pieno) spruzzando, con l'utilizzo di un normale spruzzatore, uniformemente tutta la pianta.

COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con i prodotti contenenti zolfo, polisolfuri, captano, folpet, dinocap, tiram, dicloran, propargite, triclorfon.

Intervallo fra le singole applicazioni: in determinati periodi (primavera-autunno) è consigliabile effettuare due trattamenti con un intervallo di 8-10 giorni l'uno dall'altro.

FITOTOSSICITA': incompatibile con lo zolfo. Distanziare i trattamenti di almeno 15 giorni.
AVVERTENZA: da non applicare in agricoltura e comunque su piante destinate all'alimentazione.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Etichetta formato ridotto ai sensi dell'Art.16 comma 2 del D.L. 194/95 per le taglie da ml 10-20-50-100

ALBENE GIARDINO

INSETTICIDA A BASE DI OLIO PER UN IMPIEGO ESCLUSIVO FLOREALE IN GIARDINO DOMESTICO E PER PIANTE DA APPARTAMENTO

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Olio Bianco (residuo insulfonabile minimo 95%) = g 80 (= 696 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa
A.D.I.C.A. Srl – Via S.Silvestro 1 – Faenza (RA)
I.R.C.A. Service Spa – Fornovo S.Giovanni (BG)
S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa – Fraz. Torrenieri di Montalcino (SI)

Distribuito da: Geogreen Srl Via Piana, 16 – Castiglion del Lago (PG)
Grenn Ravenna Srl – Via Matteotti, 16 – Ravenna (RA)

Reg. n. 10868 del 11/04/2001 del Ministero della Sanità

Contenuto: ml. 10/20/50/100 **Partita n.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SANAVIT GIARDINO

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER IMPIEGO ESCLUSIVO SU COLTURE ORNAMENTALI E FLOREALI IN GIARDINO DOMESTICO E APPARTAMENTO

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Cimoxanyl puro g 2
- Rame metallo puro (sottoforma di rame solfato neutralizzato alla calce) g 15
- Zolfo (esente da Selenio) g 30
- Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali /schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa – Modena
A.D.I.C.A. Srl – Faenza (RA)
S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola (RA)
ZAPI Industrie Chimiche SpA – Conselve (PD)
Distribuito da: Green Ravenna Srl – Via Matteotti, 16 – Ravenna (RA)
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE Spa – Via Terza Strada, 12 Z.I. – Conselve (PD)

Registrazione n. 10869 del 11/04/2001 del Ministero della Sanità
g 5 / 10 / 50 / 100 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanyl 2%. Rame metallo (sotto forma di rame solfato neutralizzato alla calce), 15%, Zolfo (esente da selenio), 30% le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: CIMOXANYL - Sintomi: derivato dell'urea, durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. RAME – Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. ZOLFO – Sintomi: ===**Terapia:** sintomatica. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Il SANAVIT GIARDINO è un fungicida combinato polivalente per un impiego floreale in giardino od in appartamento. E' Efficace contro numerose malattie crittogamiche che colpiscono le piante verdi e da fiore. SANAVIT GIARDINO è un formulato in polvere che per il suo ampio spettro d'azione agisce contro i più comuni agenti patogeni (Mal bianco, Peronospora, Antracnosi). Per avere una migliore efficacia è indispensabile effettuare trattamenti preventivi ad intervalli di 8-10 giorni per tutto il periodo vegetativo. E' buona norma comunque intervenire appena si notano i primi sintomi della malattia.
Impiegare SANAVIT GIARDINO alla dose di 5 g / litro d'acqua (pari a due tacche del misurino) e spruzzare, con l'utilizzo di un normale spruzzatore, uniformemente tutta la pianta.
COMPATIBILITA': non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri, olii minerali, Captano, Diclofluanide. Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.
Intervallo fra le singole applicazioni: occorre che il formulato sia razionalmente impiegato tenendo conto, tra l'altro, dello stadio di sviluppo della coltura da trattare e della pressione del patogeno da combattere.
AVVERTENZA: da non applicare in agricoltura e comunque su piante destinate all'alimentazione.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

Foglio illustrativo

SANAVIT GIARDINO

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER IMPIEGO ESCLUSIVO SU COLTURE ORNAMENTALI E FLOREALI IN GIARDINO DOMESTICO E APPARTAMENTO

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Il SANAVIT GIARDINO è un fungicida combinato polivalente per un impiego floreale in giardino od in appartamento. E' Efficace contro numerose malattie crittogamiche che colpiscono le piante verdi e da fiore. SANAVIT GIARDINO è un formulato in polvere che per il suo ampio spettro d'azione agisce contro i più comuni agenti patogeni (Mal bianco, Peronospora, Antracnosi). Per avere una migliore efficacia è indispensabile effettuare trattamenti preventivi ad intervalli di 8-10 giorni per tutto il periodo vegetativo. E' buona norma comunque intervenire appena si notano i primi sintomi della malattia.
Impiegare SANAVIT GIARDINO alla dose di 5 g / litro d'acqua (pari a due tacche del misurino) e spruzzare, con l'utilizzo di un normale spruzzatore, uniformemente tutta la pianta.
COMPATIBILITA': non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri, olii minerali, Captano, Diclofluanide. Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.
Intervallo fra le singole applicazioni: occorre che il formulato sia razionalmente impiegato tenendo conto, tra l'altro, dello stadio di sviluppo della coltura da trattare e della pressione del patogeno da combattere.
AVVERTENZA: da non applicare in agricoltura e comunque su piante destinate all'alimentazione.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Etichetta formato ridotto ai sensi dell'Art.16 comma 2 del D.L. 194/95 per le taglie da g 5-10-50-100

SANAVIT GIARDINO

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER IMPIEGO ESCLUSIVO SU COLTURE ORNAMENTALI E FLOREALI IN GIARDINO DOMESTICO E APPARTAMENTO

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- **Cimoxanyl puro g 2**
- **Rame metallo puro (sottoforma di rame solfato neutralizzato alla calce) g 15**
- **Zolfo (esente da Selenio) g 30**
- **Coformulanti q.b. a g 100**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali /schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa – Modena
A.D.I.C.A. Srl – Faenza (RA)
S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola (RA)
ZAPI Industrie Chimiche SpA – Conselve (PD)
Distribuito da: Green Ravenna Srl – Via Matteotti, 16 – Ravenna (RA)
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE Spa – Via Terza Strada, 12 Z.I. – Conselve (PD)

Registrazione n. 10869 del 11/04/2001 del Ministero della Sanità
g 5 / 10 / 50 / 100 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanyl 2%. Rame metallo (sotto forma di rame solfato neutralizzato alla calce), 15%, Zolfo (esente da selenio), 30% le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: CIMOXANYL - Sintomi: derivato dell'urea, durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. RAME – Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. ZOLFO – Sintomi: ===**Terapia:** sintomatica. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

TIANON WG

FUNGICIDA A BASE DI DITIANON IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
- Ditianon puro g 70
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione:
Schirm GmbH Division Sideco - Mecklenburger Straβe 229 - D-23568 Lübeck
A.D.I.C.A. Srl – Nera Montoro (TR)
Stabilimento di Confezionamento: SCAM S.p.a. – Modena

Registrazione n. 10977 del 12/07/2001 del Ministero della Sanità

Kg 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10 **Partita n.:**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO **Sintomi:** irritante oculare e cutaneo; per ingestione: scialorrea, vomito e diarrea.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITÀ e CAMPI DI IMPIEGO TIANON WG è un fungicida in microgranuli idrodispersibili a base di Ditianon ad azione preventiva e curativa. TIANON WG viene impiegato alle seguenti dosi:
Melo: contro Ticchiolatura *(V. inaequalis)*, Marciume lenticellare (*Gleosporium spp.)* e Cancri rameali (*N. galligena, ecc.*)
1) Trattamenti preventivi:
- 100/120 g/hl in zone ad elevata virulenza dei patogeni
- 80/90 g/hl in zone a bassa pressione della malattia e/o nei periodi meno favorevoli allo sviluppo dell'infezione
2) Trattamenti curativi contro la Ticchiolatura *(V. inaequalis)*
- 120 g/hl, intervenendo entro 48-60 ore dall'inizio dell'evento infettante.
Pero: contro Ticchiolatura (*V. pirina)* 80 g/hl; per la lotta ai Cancri rameali (*N. galligena)* 150 g/hl**. Pesco**: contro Bolla (*T. deformans),* Corineo (*C. beeijerinckii*), Cancri rameali (*F. amygdali, C. leucostoma, Valsa spp.)*, Monilia (*Monilia spp.*) 100-150 g/hl. **Vite:** contro Peronospora (*P. viticola)* 100-120 g/hl. **Patata, Pomodoro:** contro Peronospora (*P. infestans)* 150 g/hl. **Peperone:** contro Peronospora *(P. capsici)* 120 g/hl. **Pisello:** contro Peronospora (*P. pisi)* e Antracnosi (*A. pisi)* 120 g/hl. **Spinacio:** contro Peronospora (*P. spinaciae)* 100 g/hl. **Fragola**: contro Vaiolatura (*M. fragarie)* 100 g/hl. **Colture Floreali e Ornamentali** (in pieno campo): contro Ruggini della Rosa (*Phragmidium spp.,)* del Garofano *(U. caryophyllinus),* dell'Azalea e del Rododendro *(C. rhododendri),* e dell'Erica *(P. ericae, ecc.),* Antracnosi del Ciclamino *(G. ciclaminis), e del Ficus (C. elasticae)*, Botrite del Ciclamino, della Primula, dell'Azalea e dell'Erica (*B. cinerea)*, Septoriosi dell'Oleandro, dell'Azalea e del Ciclamino (*S. oleandrina, S. azaleae, S. ciclaminis, ecc.)*, Vaiolatura del Garofano (*H. echinulatum, ecc.)*, Ticchiolatura della Rosa *(D. rosae)*, Maculature fogliari della Primula (*A. primulae, C. primulae, P. primulae)* 80-100 g/hl.
COMPATIBILITÀ: il prodotto é miscibile con formulati emulsionabili a base di difenconazole, etofenprox, lufenuron, clorpirifos metile, ecc..., purché la miscela venga preparata con cura e distribuita prontamente. Per i trattamenti effettuati nei mesi estivi è consigliabile aggiungere un bagnante adesivo.
FITOTOSSICITA': dato l'elevato potere marcante del formulato, evitare di trattare su melo Golden Delicious e cultivar similari in prossimità della raccolta .
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto su vite e 21 giorni prima del raccolto delle altre colture.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

SKORPIO

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Clorpirifos-metile puro g 22,1 (= 223 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: rischio di gravi lesioni oculari. Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa Modena
Distribuito da: CASTALDO S.p.A. – Via Nazionale delle Puglie Loc.tà Salice – Afragola (NA)
AGRISYSTEM Srl – C.da Rotoli – Lamezia Terme (CZ)

Registrazione n. 10990 del 12/07/2001 del Ministero della Sanità

L 0,250 / 1 / 5 / 10 Partita n. :

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralicossima. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO SKORPIO è un insetticida fosforganico che esplica la propria azione per contatto, per ingestione e, più limitatamente in fase di vapore. Risulta indicato sulle seguenti colture:
Melo, Pero, Pesco: contro tortricidi ricamatori *(Archips spp, Pandemis spp., A. orana, A. pulchellana, H. nubifera, Recurvaria spp., Hypomoneuta spp., ecc.),* Carpocapsa *(C. pomonella),* Cidia orientale (*C. molesta*), Anarsia (*A. lineatella*), Mosca della frutta *(C. capitata),* 200-250 ml/hl. Contro le neanidi di Cocciniglie *(Q. perniciosus, ecc.)* 200-250 ml/hl.
Arancio: contro Tignola della zagara *(P. citri),* Cimicetta verde *(C. trivialis),* Formiche *(L. humile, C. nylanderi, ecc.),* Metcalfa *(M. pruinosa),* e neanidi di Cocciniglie *(A. aurantii, A. nereii, Coccus spp., Ceroplastes spp., S. oleae, ecc.)* 250 ml/hl
Vite: Contro le Tignole *(L. botrana, C. ambiguella, A. pulchellana),* Tripidi *(D. reuteri, Franklinella spp., ecc.),* Nottue *(Noctua spp.),* Metcalfa *(M. pruinosa),* e neanidi di Cocciniglie *(T. vitis, ecc.)* 100-200 ml/hl. Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cultivar sensibili; si raccomandano pertanto saggi zonali e varietali.
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Pisello, Ravanello, Patata: contro Nottue *(Agrotis spp., Mamestra spp., ecc.),* Tripidi *(T. tabaci, ecc.),* Gortina *(Gortyna spp.),* Cavolaia *(P. brassicae),* Macaone *(Papillio spp.),* Dorifora *(L. decemlineata),* 1,5-2,0 l/Ha .
Mais: contro Nottue *(Agrotis spp.),* Piralide *(O. nubilalis)* ed Elateridi *(Agroties spp.)* 300 ml/hl.
Pioppo: contro Saperda *(Saperda spp.),* Gemmaiola *(G. acerina),* Criptorrinco *(C. lapathi),* Ifantria *(H. cunea)* 400-500 ml/hl.
Garofano, Crisantemo, Azalea, Ciclamino: contro Bega , Tortricidi, Oziorrinco e neanidi di Cocciniglie 200 ml/hl.
COMPATIBILITA': non è miscibile con formulati a reazione alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non impiegare il prodotto sulle varietà di melo Stayman Red, Stayman Winesap, Gloster, Gallia Beauty.
In post-fioritura del melo non eseguire più di 2 trattamenti. Non effettuare trattamenti su Arancio nei mesi compresi tra gennaio ed aprile.
Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO-IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

SOLARIS

Acaricida in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE100 g di prodotto contengono:

- Fenbutatin-ossido puro g 44 (= 500 g/l)
- Coformulanti q .b. a g 100

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui art. 25 del DPR 23 Aprile 2001, n.290.
FRASI DI RISCHIO: molto tossico per inalazione. Irritante per gli occhi e per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena
Stabilimento di Confezionamento: ALTHALLER ITALIA S.r.l. –S.Colombano al Lambro (MI)
Distribuito da: CASTALDO S.p.A. – Via Nazionale delle Puglie Loc.tà Salice – Afragola (NA)
AGRISYSTEM Srl – C.da Rotoli - Lamezia Terme (CZ)
Autorizzazione Ministero della Salute n. 11023 del 25/09/2001

L 0.050 / 0.100 / 0.250 / 0.500 / 1 **Partita n. :**

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: irritante per cute e mucose, cefalea, tinnitus, vertigini, dolori lombari e addominali, insufficienza respiratoria e circolatoria, interessamento del SNC e periferico con nevralgie e paralisi. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE SOLARIS è un acaricida che agisce per contatto contro le forme mobili degli acari (larve, adulti). La sua azione, cui si associa un effetto "antifeeding" che riduce progressivamente la capacità degli acari di nutrirsi, si sviluppa in maniera progressiva e si mantiene su livelli ottimali per un notevole periodo (4-6 settimane). E' pertanto necessario intervenire ai primi sintomi dell'infestazione bagnando accuratamente la vegetazione. SOLARIS è caratterizzato da una elevata selettività verso l'acaroentomofauna utile.
MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO SOLARIS può essere impiegato sulle seguenti colture ai dosaggi di seguito indicati: **Vite**: contro il Ragnetto rosso e giallo (*Panonychus ulmi, Eotetranychus carpini)* e gli Eriofidi (*Calepitrimerus vitis*) alla dose di 100-110 ml/hl. **Melo, Pero**: contro il Ragnetto rosso (*Panonychus ulmi, Tetranychus urticae)* e gli Eriofidi *(Epitrimerus pyri, Aculus schlechtendali, Aculus fockeui, Eriophyes similis)* alla dose di 100-110 ml/hl. **Agrumi** : contro i Ragnetti rossi (*Panonychus citri, Tetranychus urticae)* e gli Eriofidi (*Aculops pelekassi*) alla dose di 100-110 ml/hl. **Cetriolo, Pomodoro**: contro il Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*) e gli Eriofidi (*Aculops lycopersici*) alla dose di 100-110 ml/hl. **Colture Floreali e Ornamentali:** contro il Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae, Panunychus ulmi, Eototetranychus tiliarus, Oligonychus ununguis, Trisetacus juniperinus, ecc.)* e gli Eriofidi (*Stenacis triradiatus, Phytoptus spp., Phyllocoptes trotteri, ecc.)* alla dose di 100-110 ml/hl.
COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con i preparati fitosanitari a reazione alcalina. Evitare le miscele con preparati contenenti zolfo in presenza di temperature elevate.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': negli interventi su colture di rosa è opportuno effettuare, data la notevole varietà di specie presenti, saggi preliminari di sensibilità al prodotto. Evitare l'impiego del prodotto con olii minerali negli interventi su agrumi. L'efficacia di SOLARIS può risultare ridotta se applicato in concomitanza con Poltiglia Bordolese o Captano, per cui conviene distanziare tra loro i trattamenti di alcuni giorni
RISCHI DI NOCIVITÀ': il prodotto è tossico per i pesci.
PERIODO DI CARENZA Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta:
- 30 giorni per Melo, Pero, Cetriolo, Pomodoro
- 45 giorni la Vite
- 60 giorni per gli Agrumi

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

Foglio illustrativo

SOLARIS

Acaricida in sospensione concentrata

CARATTERISTICHE SOLARIS é un acaricida che agisce per contatto contro le forme mobili degli acari (larve, adulti). La sua azione, cui si associa un effetto "antifeeding" che riduce progressivamente la capacità degli acari di nutrirsi, si sviluppa in maniera progressiva e si mantiene su livelli ottimali per un notevole periodo (4-6 settimane). E' pertanto necessario intervenire ai primi sintomi dell'infestazione bagnando accuratamente la vegetazione. SOLARIS è caratterizzato da una elevata selettività verso l'acaroentomofauna utile.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO SOLARIS può essere impiegato sulle seguenti colture ai dosaggi di seguito indicati: **Vite**: contro il Ragnetto rosso e giallo (*Panonychus ulmi, Eotetranychus carpini)* e gli Eriofidi (*Calepitrimerus vitis*) alla dose di 100-110 ml/hl. **Melo, Pero**: contro il Ragnetto rosso (*Panonychus ulmi, Tetranychus urticae)* e gli Eriofidi *(Epitrimerus pyri, Aculus schlechtendali, Aculus fockeui, Eriophyes similis)* alla dose di 100-110 ml/hl. **Agrumi** : contro i Ragnetti rossi (*Panonychus citri, Tetranychus urticae)* e gli Eriofidi (*Aculops pelekassi*) alla dose di 100-110 ml/hl. **Cetriolo, Pomodoro**: contro il Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*) e gli Eriofidi (*Aculops lycopersici*) alla dose di 100-110 ml/hl. **Colture Floreali e Ornamentali:** contro il Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae, Panunychus ulmi, Eototetranychus tiliarus, Oligonychus ununguis, Trisetacus juniperinus, ecc.)* e gli Eriofidi (*Stenacis triradiatus, Phytoptus spp., Phyllocoptes trotteri, ecc.)* alla dose di 100-110 ml/hl.

COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con i preparati fitosanitari a reazione alcalina. Evitare le miscele con preparati contenenti zolfo in presenza di temperature elevate.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': negli interventi su colture di rosa è opportuno effettuare, data la notevole varietà di specie presenti, saggi preliminari di sensibilità al prodotto. Evitare l'impiego del prodotto con olii minerali negli interventi su agrumi. L'efficacia di SOLARIS può risultare ridotta se applicato in concomitanza con Poltiglia Bordolese o Captano, per cui conviene distanziare tra loro i trattamenti di alcuni giorni

RISCHI DI NOCIVITÀ': il prodotto è tossico per i pesci.

PERIODO DI CARENZA Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta:
- 30 giorni per Melo, Pero, Cetriolo, Pomodoro
- 45 giorni la Vite
- 60 giorni per gli Agrumi

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Etichetta formato ridotto ai sensi dell'Art.16 comma 2 del D.L. 194/95 per le taglie da ml 50

SOLARIS

Acaricida in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Fenbutatin-ossido puro g 44 (= 500 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui art. 25 del DPR 23 Aprile 2001, n.290.
FRASI DI RISCHIO: molto tossico per inalazione. Irritante per gli occhi e per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena
Stabilimento di Confezionamento: ALTHALLER ITALIA S.r.l. – S.Colombano al Lambro (MI)
Distribuito da: CASTALDO S.p.A. – Via Nazionale delle Puglie Loc.tà Salice – Afragola (NA)
AGRISYSTEM Srl – C.da Rotoli - Lamezia Terme (CZ)

Autorizzazione Ministero della Salute n.11023 del 25/09/2001
ml 50 **Partita n. :**

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: irritante per cute e mucose, cefalea, tinnitus, vertigini, dolori lombari e addominali, insufficienza respiratoria e circolatoria, interessamento del SNC e periferico con nevralgie e paralisi. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Silveiss® 5G

FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO SISTEMICO IN FORMULAZIONE GRANULARE PER APPLICAZIONI AL TERRENO

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Metalaxil puro		**g 5**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g 100**

® marchio registrato dalla Scotts International B.V.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare della registrazione:
SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511
Stabilimento di produzione: **SCAM S.p.a. – Modena- A.D.I.C.A. S.r.l. - Nera Montoro (TR)**
Distribuito da: **Scotts Italia Srl Viale Montegrappa, 18 - Treviso**

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11024 del 25/09/2001

Kg 0,5 – 1 – 2 – 5 – 10 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI - non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO Silveiss®5G é un fungicida sistemico per la lotta contro le malattie fungine appartenenti ai generi *Pythium, Fitoftora, Peronospora, Aphanoyices* responsabili di numerosi marciumi radicali e del colletto di diverse colture e dei tappeti erbosi. Silveiss®5G può essere impiegato sulle seguenti colture ai rispettivi dosaggi:
Melo: contro la *Fitoftora spp.* alla dose di 20-40 g/mq distribuiti alla base della pianta, intervenendo alla ripresa vegetativa. Il trattamento va ripetuto dopo 2-3 mesi.
Pomodoro: contro la *Fitoftora spp.* effettuando un primo intervento alla dose di 20 g/mq in pre-trapianto, un secondo trattamento alla dose di 20 g/mq dopo circa 20 giorni ed un terzo intervento alla dose di 40 g/mq dopo 30-40 giorni dalla seconda applicazione. Il prodotto deve essere incorporato al terreno lungo la fila su una banda di circa 30-40 cm.
Fragola: contro la *Fitoftora spp.* alla dose di 40 Kg/Ha, localizzando il prodotto su una banda di 30-40 cm e incorporandolo superficialmente prima del trapianto. Il trattamento può essere effettuato anche prima della ripresa vegetativa utilizzando 1 g/pianta di formulato.
Lattuga, Carciofo, Cavolo verza, Melone, Cocomero, Fagiolo: contro *Pythium spp.* e *Fitoftora spp.* alla dose di 2-4 g/mq intervenendo alla semina o in pre-trapianto. Il trattamento deve essere ripetuto dopo circa 25-30 giorni.
Soia: contro *Pythium spp.* e *Fitoftora spp.* alla dose di 5-10 kg/Ha incorporato al terreno lungo la fila al momento della semina.
Colture floricole e ornamentali: contro *Pythium spp.* e *Fitoftora spp.* alla dose di 2-4 g/mq intervenendo alla semina o in pre-trapianto. L'applicazione deve essere ripetuta dopo circa 25-30 giorni. Per le colture in vaso impiegare 120-140 g di prodotto per m^3 di terriccio o substrato di coltura, avendo cura di incorporarlo uniformemente.
Conifere e Latifoglie: contro *Fitoftora spp.* intervenendo: - in vivaio prima dell'impianto alla dose di 20-50 g /pianta - in vivaio dopo l'impianto alla dose di 50-150 g/pianta - dopo la messa dimora alla ripresa vegetativa alla dose di 20-40 g/pianta. Il trattamento deve essere ripetuto dopo 3-6 mesi.
Tappeti erbosi: contro *Pythium spp.* alla dose di 1,5-3,0 g/mq (15-30 Kg/Ha). Nei tappeti erbosi di nuovo impianto effettuare un primo trattamento subito dopo la semina o la rizollatura ed eventualmente irrigare. Ripetere il trattamento ad intervalli di 7-14 giorni; non effettuare più di 3 applicazioni per stagione. Nei tappeti erbosi già esistenti intervenire durante il periodo favorevole allo sviluppo del patogeno effettuando un massimo di 3 applicazioni all'anno ad intervalli di 10-21 giorni.
Rispettare rigorosamente le norme di impiego anche per contrastare i ceppi resistenti. Qualora insorga la resistenza ricorrere all'impiego di un fungicida di copertura. Non applicare mai su vivai di vite.
COMPATIBILITA': il prodotto deve essere impiegato preferibilmente da solo; nel caso di miscele con altri formulati verificarne preventivamente la compatibilità. **RISCHI DI NOCIVITA':** moderatamente pericoloso per i mammiferi.
FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: - 14 giorni: Pomodoro -15 giorni: lattuga - 20 giorni: Melo, Carciofo, Melone, Cocomero - 40 giorni: Fragola - 60 giorni: Cavolo verza - 120 giorni: Fagiolo - 150 giorni: Soia. Per applicazioni su tappeti erbosi destinati ad uso pubblico, l'obbligo di segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - DA NON VENDERSI SFUSO – SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

BITRON 90 WG

ERBICIDA SELETTIVO IN MICROGRANULI DISPERSIBILI DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Metamitron puro g 90
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di Produzione: A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)
Stabilimento di Confezionamento: SCAM Spa - Modena

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11037 del 11/10/2001

Kg 1 / 5 / 10 **Partita n.**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI MEDICHE In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE Il BITRON 90 WG è un erbicida selettivo in microgranuli idrodispersibili, che agisce sulle malerbe per assorbimento radicale e, più limitatamente, per contatto con l'apparato fogliare. Interferisce sulla fotosintesi clorofilliana inibendo la reazione di Hill. I sintomi visibili sulle infestanti sensibili son tipici ingiallimenti che evolvono rapidamente in necrosi dei tessuti con conseguente morte della pianta.
Viene impiegato sulla **Barbabietola da zucchero** per il controllo di numerose infestanti tra le quali Amaranto *(Amaranthus retroflexus)*, Anagallide *(Anagallis arvensis)*, Atriplice *(Atriplex spp.)*, Avena *(Avena spp.)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Camomilla *(Matricaria spp.)*, Canapa selvatica *(Galeopsis spp.)*, Centocchio *(Stellaria media)*, Coda di volpe *(Alopecurus myosuroides)*, Corregiola *(Polygonum aviculare)*, Erba calderina *(Senecio vulgaris)*, Erba calenzola *(Euphorbia spp)*, Erba morella *(Solanum nigrum)*, Erba strega *(Stachys spp.)*, Falaride *(Phalaris spp.)*, Falsa ortica *(Lamium spp.)*, Farinaccio *(Chenopodium spp.)*, Fienarola *(Poa annua)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Galinsoga *(Galinsoga parviflora)*, Miosotide *(Myosotis arvensis)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Poligoni *(Polygonum spp.)*, Ruchetta selvatica *(Diplotaxis erucoides)*, Spergola *(Spergula arvensis)*, Viola *(Viola spp.)*, ecc..
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO Pre-semina e pre-emergenza (applicazioni a pieno campo)
3,5-4,0 Kg/Ha. Per ampliare lo spettro delle malerbe controllate e migliorare l'efficacia dell'intervento, è possibile impiegare BITRON 90 WG alla dose di 2,0-3,0 Kg/Ha in miscela con formulati a diverso meccanismo e spettro d'azione (Cloridazon, Etofumesate, Lenacil, Metolaclor, ecc.). Qualora si faccia ricorso all'applicazione localizzata lungo la fila di semina, ridurre proporzionalmente il quantitativo di prodotto impiegato in funzione della superficie di terreno effettivamente trattata, mantenendo in ogni caso inalterato il rapporto dose/superficie diserbata indicato sopra. Impiegare la dose massima nei terreni argillosi o ricchi di sostanza organica ed utilizzare un volume di acqua di 200 – 300 l/Ha sufficiente a garantire una completa ed uniforme bagnatura della superficie trattata.
Post-emergenza
- Tecnica delle dosi molto ridotte (DMR)
- 0,3-0,4 Kg/Ha per ogni singola applicazione
-Tecnica del trattamento frazionato
- 0,5-1,0 Kg/Ha per ciascun intervento

BITRON 90 WG deve essere impiegato in miscela con formulati ad attività fogliare o ad assorbimento fogliare e/o radicale (Fenmedifam, Desmedifam, Etofumesate, Clopiralid, Triflusulfuron-metil, Lenacil, Cloridazon, ecc.).
Nel caso di un unico intervento tardivo elevare la dose di BITRON 90 WG a 1,5-2,0 Kg/Ha. Al fine di ottimizzare l'attività erbicida della miscela è consigliabile l'aggiunta di olii minerali, nonché l'applicazione di un volume di acqua adeguato alla tecnica di intervento adottata.
COMPATIBILITA': il prodotto è miscibile con i prodotti fitosanitari consigliati nel diserbo della Barbabietola da zucchero (Cloridazon, Etofumesate, Lenacil, Metolaclor), nonché con i comuni insetticidi impiegati nella lotta contro i parassiti epigei di questa coltura.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non si deve trattare durante la fioritura.
FITOTOSSICITA': effettuare solo le miscele consigliate ed evitare che la nube irrorante giunga a contatto con le colture adiacenti. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE

Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

CLEAN

Diserbante selettivo granulare per tappeti erbosi contro infestanti dicotiledoni

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Dicamba puro (sotto forma di sale dimetilamminico puro g 0,61)		**g 0,50**
- 2,4 - D puro (sotto forma di sale dimetilamminico puro g 1,22)		**g 1,02**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g 100**

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO : può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a-Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano-Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: DIACHEM SPA - Albano S.Alessandro (BG)
SCAM Spa- Modena
A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA Spa – Cotignola (RA)
Stabilimento di confezionamento: DIACHEM SPA – Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA Spa – Fraz. Torrenieri Montalcino (SI)
Distribuito da: Green Ravenna Srl -Via Matteotti 16 – Ravenna
Blumen Srl – Via E. Mattei 2 – Gariga di Podenzano (PC)
Autorizzazione Ministero della Salute n. 11048 del 23/10/2001

Kg 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 25 **Partita n.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Sintomi di intossicazione: astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti di contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per la dermatosi. **Controindicazioni:** è sconsigliata la digitale. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE
Il CLEAN risulta particolarmente indicato per il diserbo dei tappeti erbosi di graminacee (prati all'inglese, campi da golf), nella lotta contro le infestanti a foglia larga (*Cirzium spp.; Convolvolo spp.; Veccia spp.; Ranuncolo spp.; Stellaria spp.; Senape spp.; Solanum spp.; Amaranthus spp.; Papaveri spp.; Camomilla spp*). Il prodotto esplica una completa azione sulle infestanti a foglia larga in qualsiasi stadio del loro sviluppo purché siano in fase attiva di vegetazione. Le epoche migliori per l'intervento vanno pertanto dal mese di marzo fino ad autunno inoltrato.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il CLEAN deve essere applicato alla dose di kg 90 per ettaro avendo cura di distribuirlo uniformemente sulla superficie da trattare mediante una adeguata attrezzatura di distribuzione. Per le infestanti di più difficile controllo può essere effettuato un secondo trattamento ad un intervallo di almeno 3 settimane dal primo. I migliori risultati si ottengono quando il prodotto viene applicato sul prato umido di rugiada al mattino presto o la sera.
COMPATIBILITA': da non miscelare con altri antiparassitari.
FITOTOSSICITA': il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, ecc.
Evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sottoforma di vapori portati dal vento.
NOCIVITA': il prodotto è nocivo ai pesci, agli animali domestici e al bestiame.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

ARIC 70 WSG

DISERBANTE SELETTIVO IN MICROGRANULI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- DICAMBA acido puro (sotto forma di sale sodico)	g	70
- Coformulanti	q.b. a g	100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

FRASI DI RISCHIO: nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI: conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE ARIC 70 WSG è un erbicida di post-emergenza che agisce per assorbimento fogliare e, in misura più limitata, per assorbimento radicale. Viene traslocato mediante i flussi linfatici all'interno delle piante. Svolge la sua azione nei confronti delle malerbe sensibili alterandone il metabolismo enzimatico.
MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO ARIC 70 WSG può essere impiegato per il controllo delle seguenti malerbe: Cencio molle *(Abutilon theophrasti)*, Amaranto *(Amarantus spp.)*, Forbicina *(Bidens spp.)*, Villucchione *(Calistegia sepium)*, Fiordaliso *(Centaurea cianus)*, Farinaccio *(Chenopodium spp.)*, Stoppione *(Cirsium spp.)*, Convolvolo *(Convolvolus spp.)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvolus)*, Stramonio *(Datura stramonium)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Attaccamani *(Galium aparine)*, Uva turca *(Phytolacca decandra)*, Poligoni *(Poligonum spp.)*, Romice *(Rumex spp.)*, Sicio *(Sycius angulatus)*, Senecio *(Senecio vulgaris)*, Erba morella *(Solanum nigrum)*, Spergola *(Spergula arvensis)*, Centocchio *(Stellaria media)*, Soffione *(Taraxacum officinalis)*, Veccia *(Vicia spp.)*, Spino d'asino *(Xantium spp.)*.
Parziale risulta invece l'attività nei confronti di Anagallide *(Anagallis arvensis)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa-pastoris)*, Camomilla *(Matricaria Chamomilla)*, Crisantemo selvatico *(Chrysanthemum segetum)*, Cocomero asinino *(Eobalium elaterium)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Rafano *(Raphanus raphanistrum)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Ortica *(Urtica urens)*, Veronica *(Veronica spp.)*.
ARIC 70 WSG può essere utilizzato sulle seguenti colture:
Frumento, Orzo, Segale, Avena: 0,150-0,200 Kg/Ha, intervenendo dallo stadio fenologico delle 4-5 foglie fino alla fase di inizio levata. In presenza di infestanti mediamente sensibili all'azione del Dicamba, è consigliabile aggiungere prodotti a base di MCPA (1,5-2,0 l/Ha di formulato commerciale 280 g/l) o MCPP (2,0 l/Ha).
Mais: 0,35-0,40 Kg/Ha, intervenendo dall'emissione delle prime foglie fino ad un'altezza massima della coltura di 40 cm. Nel caso di infestazioni complesse ed al fine di rendere completo lo spettro di efficacia dell'intervento erbicida è consigliabile utilizzare ARIC 70 WSG alla dose di 0,20-0,30 Kg/Ha in miscela con formulati a base di Primisulfuron, Prosulfuron, Nicosulfuron, Rimsulfuron, Sulcotrione, Bromoxynil ottanoato. In terreni sabbiosi il prodotto può dare origine a fenomeni di fitotossicità per cui ne è sconsigliato l'impiego. Non impiegare ARIC 70 WSG su linee pure di mais da seme e su colture di mais dolce. **Sorgo:** 0,25-0,30 Kg/Ha, intervenendo dall'emergenza della coltura fino allo stadio di 5° foglia. Su varietà di nuova introduzione è consigliabile verificare preventivamente la selettività.
Asparago: 0,100-0,175 Kg/Ha, effettuando il trattamento all'inizio della primavera, prima dell'emissione dei turioni su terreno sarchiato e con un sufficiente grado di umidità. **Melo:** 0,20 Kg/Ha, intervenendo su infestanti in fase di attiva crescita. In presenza di infestazioni complesse e di malerbe mediamente sensibili, è opportuno aggiungere preparati a base di MCPA (1,0-1,5 Kg/Ha di formulato commerciale 80%). Nel caso di interventi localizzati lungo il filare della coltura, ridurre proporzionalmente i dosaggi impiegati in funzione della superficie di terreno effettivamente trattata. **Prati di graminacee (da foraggio)** e **Tappeti erbosi (prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi)**: 0,35 Kg/Ha, applicando il prodotto quando le infestanti si trovano nei primi stadi di sviluppo e lasciando trascorrere almeno 4 giorni prima dello sfalcio successivo. Nel caso di interventi su prati di nuovo impianto, iniziare i trattamenti solo dopo il secondo sfalcio. Nel caso l'intervento non venga effettuato sull'intera superficie ma localizzato su determinate zone, utilizzare una soluzione all'0,07% (7 g in 10 litri di acqua) di formulato.
Terreni agricoli senza coltura: 0,15-0,25 Kg/Ha per il contenimento delle infestanti dicotiledoni al fine di evitarne la disseminazione e mantenere una copertura vegetale del terreno atta ad impedire l'erosione. 0,45 Kg/Ha per l'eliminazione completa della vegetazione. Lasciare trascorrere almeno 20 giorni dal trattamento alla semina della coltura successiva.
ARIC 70 WSG deve essere impiegato su infestanti nei primi stadi di sviluppo. Utilizzare un volume di acqua adeguato (200-400 l/Ha) ed impiegare ugelli a ventaglio.
FITOTOSSICITA': evitare che la nube irrorata possa giungere a contatto con colture vicine. Effettuare un risciacquo accurato della botte in caso di impiego successivo su colture non indicate in etichetta.
COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con gli erbicidi riportati in etichetta. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta- 130 giorni per il Sorgo, 30 giorni per il Melo, 20 giorni per Frumento, Orzo, Segale, Avena, Mais, Asparago e prati di graminacee (da foraggio).
Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate, prima che sia trascorso il tempo di carenza. Per i tappeti erbosi (campi da golf, prati ornamentali e campi sportivi) indicare in etichetta l'obbligo di segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena – DIACHEM Spa - Caravaggio (BG)
Autorizzazione Ministero della Salute n. 11274 del 04/04/2002
Kg 0,250 / 0,500 / 1 **Partita n.**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

OXITURF

ERBICIDA SELETTIVO GRANULARE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Oxadiazon puro		**g 2**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g 100**

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

FRASI DI RISCHIO Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali /schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO OXITURF é un erbicida granulare selettivo efficace contro numerose infestanti graminacee e dicotiledoni quali Acetosella *(Oxalis spp.),* Alisma *(Alisma spp.),* Amaranto *(Amaranthus spp.),* Atriplice maggiore *(Atriplex patula),* Borsa del pastore *(Capsella bursa-pastoris),* Giunco *(Butomus umbellatus),* Camomilla *(M. camomilla),* Sanguinella *(Digitaria sanguinalis),* Farinaccio *(Chenopodium spp.),* Fumaria *(Fumaria officinalis),* Erba calderina *(Senecius vulgaris),* Erba morella (*Solanum nigrum),* Eterantera *(Heterantera spp.),* Euforbia *(Euphorbia spp.),* Giavone *(Echinocloa spp.),* Galinsoga *(Galinsoga parvifiora),* Papavero *(Papaver rhoeas),* Fienarola *(Poa spp.),* Poligoni *(Poligonum spp.*), Erba porcellana *(Portulaca oleracea),* Ravanello*(Rafanus raphanistrum),* Romice *(Rumex spp.),* Scirpus *(Scirpus spp.),* Senape selvatica *(Sinapis arvensis),* Veronica *(Veronica spp.)* Vilucchio (*Convolvolus arvensis).* Parziale risulta invece l'attività nei confronti di Avena selvatica *(Avena spp.),* Attacamani *(Galium aparine),* Cencio molle *(Abutilon theophrasti),* Forbicina *(Bidens tripartita),* Spino d'asino *(Xantium italicum),* Loglio *(Lolium spp.)* OXITURF puo' essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi:
Riso: - 25 kg/Ha nei terreni di medio impasto
- 20 kg/Ha nei terreni argillosi
Il prodotto va distribuito 6-7 giorni prima della semina del riso, dopo la preparazione del terreno e mantenendo un normale livello dell'acqua. In terreni perfettamente livellati il trattamento può essere effettuato 2-3 giorni prima della semina in acqua limpida. Dopo la distribuzione del formulato mantenere l'acqua ferma e ad un livello costante per almeno 48 ore.
Immediatamente prima della semina effettuare il ricambio dell'acqua nella risaia.
Actinidia:
- 150 kg/Ha. Intervenire in pre-emergenza delle infestanti su terreni dotati di un buon livello di umidità o effettuare una leggera irrigazione dopo l'applicazione. La chioma delle piante deve essere asciutta. Non trattare su vivai.
Colture trapiantate di **Asparago, Carciofo, Cavolfiore, Melanzana, Peperone, Pomodoro, Tabacco:**
- 20-40 Kg/Ha. Intervenire in pre o in post-trapianto, prima dell'emergenza delle infestanti. Nelle applicazioni di post-trapianto applicare su colture asciutte ed irrigare entro 24 ore allo scopo di rimuovere i granuli di formulato eventualmente depositatisi sulla vegetazione ed attivare il prodotto nel terreno.
Impianti di colture arboree di **Albicocco, Pesco, Melo, Pero, Susino, Arancio, Clementino, Limone, Mandarino, Olivo, Nocciolo, Pioppo:**
- 50 Kg/Ha (infestanti annuali) - 150 Kg/Ha (Vilucchio e infestanti poliennali). Trattare in pre-emergenza delle infestanti, prima della ripresa vegetativa della coltura. Adattare la dose in funzione della flora infestante da combattere e della durata di efficacia programmata.
Vite:
- 50 Kg/Ha (infestanti annuali) - 150 Kg/Ha (Vilucchio e infestanti poliennali). Impiegare solo su impianti in produzione, evitando che il prodotto venga a contatto con la vegetazione. Applicare il prodotto prima della ripresa vegetativa della coltura, adattando la dose in funzione della flora infestante da combattere.
Vivai di piante di **Pesco, Melo, Pero, Albicocco, Susino, Arancio, Clementino, Mandarino, Limone, Olivo, Pioppo e Ornamentali:**
- 150 Kg/Ha. Intervenire dopo la messa a dimora, a fine inverno (Febbraio) e prima dell'emergenza delle infestanti.
Tappeti erbosi di graminacee 150-180 Kg/Ha. L'operazione di diserbo va eseguita prima dell'emergenza delle infestanti.
COMPATIBILITA': il prodotto va impiegato da solo.
FITOTOSSICITA': nei trattamenti in vivaio non intervenire su piante non sufficientemente lignificate. Non trattare vivai di vite, piante madri o barbatelle appena messe a dimora. Nei terreni particolarmente asciutti il prodotto non esplica completamente la sua azione. Pertanto, nei casi di siccità, è necessario prevedere un'irrigazione entro 10-12 giorni dal trattamento.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci. Nel corso degli interventi tenere lontani dalla zona interessata persone non protette, animali domestici e bestiame.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena
A.D.I.C.A Srl - Nera Montoro (TR) Schirm GmbH Division Sideco - Lübeck (Germania)
Distribuito da: Geogreen Srl - Via Piana, 16 – Castiglione del Lago (PG)
Autorizzazione Ministero della Salute n. 11308 del 9/05/2002
Kg 0,500 / 1 / 5 / 10 / 25 **Partita n.**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

GRAVITY W-75

FUNGICIDA ANTIBOTRITICO IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Dicloran puro		**g 75**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g 100**

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: (dose per 100 litri d'acqua)
GRAVITY W-75 è un fungicida specifico per la lotta contro i marciumi del colletto e della parte aerea provocati da *Botrytis spp. e Sclerotinia spp.*. Svolge un'azione prevalentemente preventiva e può essere impiegato sia in pieno campo che in serra per la protezione delle colture di **Fragola, Carota, Aglio, Cipolla, Scalogno, Patata, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Melone, Cocomero, Zucca, Zucchino, Cetriolo, Cavoli, Lattuga, Indivia, Cicoria, Radicchio, Rucola, Crescione, Spinacio, Erba cipollina, Prezzemolo, Basilico, Rosmarino, Salvia, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Asparago, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo, Porro, Tabacco, Colture floreali e ornamentali, Campi da golf e Prati ornamentali** secondo le seguenti tecniche di intervento:
a) Applicazioni alla coltura: utilizzare GRAVITY W-75 alla dose di 100-150 g/hl, avendo cura di bagnare abbondantemente ed uniformemente la parte aerea delle piante e la zona del colletto.
b) Applicazioni al terreno (trattamenti di pre o post-semina e pre o post-trapianto): GRAVITY W-75 va impiegato alla dose di 1,0-1,5 g di formulato per m^2. Diluire il prodotto in acqua ed impiegare un volume di distribuzione sufficiente a garantire una abbondante ed uniforme bagnatura del terreno. Se possibile effettuare poi un leggero interramento del prodotto.
c) Trattamento dei terricciati destinati alla preparazione dei semenzai: GRAVITY W-75 va impiegato alla dose di 75-100 g/m^3 di terriccio. Diluire il prodotto in acqua e bagnare con cura ed uniformemente la composta
d) Campi da golf e prati ornamentali: impiegare GRAVITY W-75 alla dose di 1,0-2,0 g di formulato per m^2. Diluire il prodotto in acqua e distribuire circa 10 hl/Ha di soluzione. Segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso "non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento" mantenendo tale divieto per 24 ore dall'applicazione del prodotto.
COMPATIBILITA' : compatibile con tutti i formulati fitosanitari tranne gli oli bianchi, gialli ed antracenici. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non impiegare GRAVITY W-75 su piante giovani che non abbiano ancora emesso la 2°-3° foglia vera o sofferenti. Nel caso di colture trapiantate attendere che le stesse abbiano superato completamente la crisi di messa a dimora. Non intervenire quando la temperatura è molto elevata (superiore ai 28-30°C). Evitare le miscele con prodotti rameici a reazione fortemente alcalina o preparati a base oleosa.
INTERVALLO AL CONSUMO: osservare un intervallo di 20 giorni fra l'ultimo trattamento e la raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena
A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)
S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola (RA) e Fraz.Torrenieri Montalcino (SI)
Distribuito da: AGRISYSTEM S.r.l. – C.da Rotoli – Lamezia Terme (CZ)

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11334 del 22/05/2002

Kg 0,1-0,5-1-5 **Partita n.**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

MITRAL W-75

DISERBANTE SELETTIVO PER LE COLTURE ORTIVE, ORNAMENTALI E FLOREALI
POLVERE BAGNABILE PER TRATTAMENTI LIQUIDI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Clortal dimetil puro g 75
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa – Modena A.D.I.C.A. Srl – Nera Montoro (TR) S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola (RA) S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa – Fr. Torrenieri di Montalcino (SI)

Distribuito da: AGRISYSTEM Srl C.da Rotoli – Lamezia Terme (CZ)
Autorizzazione Ministero della Salute n. 11335 del 22/05/2002

Kg 1 / 5 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE: il MITRAL W-75 è un diserbante per la fragola, per alcune colture ortive, ornamentali e floreali. Il MITRAL W-75 ha un'azione antigermogliante sui semi delle infestanti sensibili impedendone lo sviluppo. Pertanto, non esplica nessuna azione sulle infestanti già nate o sui loro semi già germogliati. E' efficace contro le seguenti erbe infestanti annuali provenienti da seme: *Digitaria sanguinalis* (sanguinella), *Amarantus retroflexus* (amaranto), *Chenopodium album* (farinaccio), *Setaria verticillata* (panicastrella), *Portulaca oleracea* (erba pocellana), *Stellaria media* (centocchio), *Erodium cicutarium* (erba cicutaria) *Beta vulgaris* (barbabietola), *Poa annua*, *Papaver rhoeas* (papavero).
Sono invece resistenti le infestanti perennanti come gramigna, cipero, vilucchio, stoppione (o cirsium) ed altre come: coda cavallina, capsella. Inoltre sono poco sensibili al prodotto le poligonacee come: convolvolo, persicaria, correggiola (*polygonum aviculare* ecc.).
CAMPI E DOSI D'IMPIEGO Dose normale d'impiego 15-18 kg/Ha in almeno 500 l di acqua. La dose più bassa va impiegata nei terreni sciolti o di medio impasto, la più alta nei terreni pesanti ed argillosi.
Post-semina o post-trapianto delle colture: cipolle, agli, porri, cavoli, cavolfiori, finocchi, sedani, piselli.
Post-trapianto: lattuga, scarola, peperoni, melanzane.
Può anche essere impiegato su cetriolo, anguria e meloni, dopo che le piantine hanno superato la crisi del trapianto e su pomodoro, effettuando il trattamento da 4 a 6 settimane dopo il trapianto.
Fragole ed asparagi: il trattamento va eseguito dopo la messa a dimora per i nuovi impianti e prima della ripresa vegetativa primaverile per i vecchi impianti.
Bulbose da fiori (Gladioli, Tulipani, Iris): il trattamento va eseguito dopo la messa a dimora dei bulbi, anche con piante già in fioritura. Qualora dopo 60-70 gg. dal trattamento avesse luogo una nuova apparizione delle erbe infestanti, sarà sufficiente applicare altri 10 kg/Ha di MITRAL W-75, avendo prima cura di erpicare e pulire bene il terreno.
Campi da golf, prati all'inglese: il trattamento va eseguito alla dose di 13 kg/Ha con 500-600 litri di acqua all'inizio della primavera, prima della germinazione delle infestanti da combattere e dopo aver eseguito il taglio del tappeto erboso, quanto più raso possibile. Dopo il trattamento effettuare un'abbondante irrigazione a pioggia, per facilitare la penetrazione del diserbante nel terreno.
MODALITA' D'IMPIEGO Il terreno, prima del trattamento, deve essere ben lavorato, ripulito da erbacce ed avere un sufficiente tenore di umidità (l'umidità richiesta in genere è quella necessaria per mettere a dimora la coltura). Per la preparazione della miscela aggiungere alla dose occorrente di MITRAL W-75 poca acqua, agitando a mezzo di un bastone fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Aggiungere quindi, sempre agitando, il rimanente dell'acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione. Distribuire la miscela acquosa uniformemente sulla superficie da disinfestare, usando normali pompe a mano o a motore. Durante il trattamento mantenere la miscela acquosa in costante agitazione. In periodi di siccità, è opportuno mantenere il terreno umido per almeno una settimana dopo il trattamento.
COMPATIBILITA': il prodotto va impiegato da solo.
FITOTOSSICITA': evitare che, durante l'irrorazione, lo spruzzo giunga su altre colture vicine. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
AVVERTENZE: non effettuare il diserbo in terreni torbosi, perché il prodotto viene inattivato dalla sostanza organica. Se le colture dovessero fallire per cause ambientali, si possono subito ripiantare le stesse colture per le quali li prodotto è selettivo e raccomandato. Quando capita di seminare cereali che seguono, sullo stesso terreno, colture trattate con il MITRAL W-75 nel periodo estivo, è prudente effettuare prima una buon aratura e lasciare poi il terreno a riposo per qualche tempo (15-20 gg.). Lavare perfettamente dopo l'uso la pompa e i recipienti usati per l'irrorazione. Effettuare il trattamento con tempo buono e senza vento. Conservare il prodotto in locale asciutto. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

DIMIDE-FL

INSETTICIDA CHITINO-INIBITORE IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Diflubenzuron puro		**g 40,2 (= 480 g/l)**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g 100**

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO : può provocare sensibilizzazione per contatto per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11405 del 23/07/2002

L 0,100 - 0,250 - 0,500 -1 **Partita n.**

INFORMAZIONI MEDICHE: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO

DIMIDE-FL è un insetticida ad attività ovo-larvicida che interferisce sui processi che portano alla formazione della chitina negli insetti. I parassiti svolgono così una muta irregolare che li porta alla morte. E' efficace contro numerose specie di fitofagi che infestano il Melo, il Pero, le colture Forestali, Ornamentali e Forestali. Può essere inoltre utilizzato nel controllo di alcuni fitofagi dei funghi.

DIMIDE-FL può essere impiegato sulle seguenti colture:

Melo, Pero:

contro i Microlepidotteri minatori *(Lithocolletis spp., Leucoptera spp., Phyllonoricter spp., Stigmella spp., ecc),* alla dose di 20-30 ml/hl. Effettuare il trattamento durante la fase di volo degli adulti, in corrispondenza della ovideposizione. Contro i Tortricidi ricamatori *(Archips spp., Adoxophyes spp., Pandemis spp., ecc.),* Carpocapsa, Orgya alla dose di 30-40 ml/hl intervenendo durante la deposizione delle uova o in prossimità della loro schiusa. Contro le Psylle *(Psylla spp., ecc)* alla dose di 30-40 ml/hl effettuando il trattamento all'inizio della schiusa delle uova.

Piante forestali:

contro Processionaria del pino *(T. phytocampa), Lymantria dispar, Rhyacionia buoliana, Pristiphora abietina* alla dose di 25-35 ml/hl intervenendo in corrispondenza dell'ovodeposizione o in prossimità della loro schiusa.

Colture ornamentali e floreali (in pieno campo):

contro le Mosche bianche, Tignole, Nottue, Bega del garofano, Lepidotteri, Minatori fogliari alla dose di 35-50 ml/hl.

I dosaggi indicati si riferiscono ad applicazioni a "volume normale"; nel caso di interventi a "basso volume" aumentare proporzionalmente la dose del prodotto.

Funghi: contro Foridi *(Megasella spp., ecc.)* e Sciaridi *(L. auripila, ecc.)*

a) miscelazione al substrato di coltivazione:
- 2 ml per metro cubo, avendo cura di trattare in maniera completa ed uniforme il substrato durante la sua preparazione.

b) bagnatura dopo l'incassettamento:
- 2 ml per metro cubo diluiti in 2,5 litri di acqua. Tale quantità è riferibile ad un substrato di normale peso specifico (3 tonnellate per 100 metri cubi).

COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con i preparati fitosanitari a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese alcalina, ecc.).

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto tal quale contiene sostanza tossica per gli organismi acquatici.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 45 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Sclerotveiss®

FUNGICIDA ANTIBOTRITICO IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Dicloran puro g 75
- Coformulanti q.b. a g 100

® marchio registrato dalla Scotts International B.V.

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: (dose per 100 litri d'acqua)
SCLEROTVEISS è un fungicida specifico per la lotta contro i marciumi del colletto e della parte aerea provocati da *Botrytis spp. e Sclerotinia spp.*. Svolge un'azione prevalentemente preventiva e può essere impiegato sia in pieno campo che in serra per la protezione delle colture di **Fragola, Carota, Aglio, Cipolla, Scalogno, Patata, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Melone, Cocomero, Zucca, Zucchino, Cetriolo, Cavoli, Lattuga, Indivia, Cicoria, Radicchio, Rucola, Crescione, Spinacio, Erba cipollina, Prezzemolo, Basilico, Rosmarino, Salvia, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Asparago, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo, Porro, Tabacco, Colture floreali e ornamentali, Campi da golf e Prati ornamentali** secondo le seguenti tecniche di intervento:
a) Applicazioni alla coltura: utilizzare SCLEROTVEISS alla dose di 100-150 g/hl, avendo cura di bagnare abbondantemente ed uniformemente la parte aerea delle piante e la zona del colletto.
b) Applicazioni al terreno (trattamenti di pre o post-semina e pre o post-trapianto): SCLEROTVEISS va impiegato alla dose di 1,0-1,5 g di formulato per m^2. Diluire il prodotto in acqua ed impiegare un volume di distribuzione sufficiente a garantire una abbondante ed uniforme bagnatura del terreno. Se possibile effettuare poi un leggero interramento del prodotto.
c) Trattamento dei terricciati destinati alla preparazione dei semenzai: SCLEROTVEISS va impiegato alla dose di 75-100 g/m^3 di terriccio. Diluire il prodotto in acqua e bagnare con cura ed uniformemente la composta
d) Campi da golf e prati ornamentali: impiegare SCLEROTVEISS alla dose di 1,0-2,0 g di formulato per m^2. Diluire il prodotto in acqua e distribuire circa 10 hl/Ha di soluzione. Segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso "non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento" mantenendo tale divieto per 24 ore dall'applicazione del prodotto.
COMPATIBILITA': compatibile con tutti i formulati fitosanitari tranne gli oli bianchi, gialli ed antracenici. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non impiegare SCLEROTVEISS su piante giovani che non abbiano ancora emesso la 2°-3° foglia vera o sofferenti. Nel caso di colture trapiantate attendere che le stesse abbiano superato completamente la crisi di messa a dimora. Non intervenire quando la temperatura è molto elevata (superiore ai 28-30°C). Evitare le miscele con prodotti rameici a reazione fortemente alcalina o preparati a base oleosa.
INTERVALLO AL CONSUMO: osservare un intervallo di 20 giorni fra l'ultimo trattamento e la raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena
A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)
S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola (RA)

Distibuito da: Scotts Italia Srl Viale Montegrappa, 18 - Treviso

Reg. n. 11424 del 16/09/2002 del Ministero della Salute

Kg 0,1 - 0,5 - 1 **Partita n.**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

PotClean Osmocare®

DISERBANTE SELETTIVO GRANULARE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Oxadiazon puro		**g 2**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g 100**

® marchio registrato dalla Scotts International B.V.

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

FRASI DI RISCHIO Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
MODALITÀ E CAMPI DI IMPIEGO POTCLEAN OSMOCARE é un diserbante granulare selettivo efficace contro numerose infestanti graminacee e dicotiledoni quali Acetosella *(Oxalis spp.)*, Alisma *(Alisma spp.)*, Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Atriplice maggiore *(Atriplex patula)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa-pastoris)*, Giunco *(Butomus umbellatus)*, Camomilla *(M. camomilla)*, Sanguinella *(Digitaria sanguinalis)*, Farinaccio *(Chenopodium spp.)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Erba calderina *(Senecius vulgaris)*, Erba morella (*Solanum nigrum)*, Eterantera *(Heterantera spp.)*, Euforbia *(Euphorbia spp.)*, Giavone *(Echinocloa spp.)*, Galinsoga *(Galinsoga parviflora)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Fienarola *(Poa spp.)*, Poligoni *(Poligonum spp.)*, Erba porcellana *(Portulaca oleracea)*, Ravanello *(Rafanus raphanistrum)*, Romice *(Rumex spp.)*, Scirpus *(Scirpus spp.)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Veronica *(Veronica spp.)* Vilucchio (*Convolvolus arvensis)*. Parziale risulta invece l'attività nei confronti di Avena selvatica *(Avena spp.)*, Attacamani *(Galium aparine)*, Cencio molle *(Abutilon theophrasti)*, Forbicina *(Bidens tripartita)*, Spino d'asino *(Xantium italicum)*, Loglio *(Lolium spp.)* POTCLEAN OSMOCARE po' essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi
Riso:
- 25 kg/Ha nei terreni di medio impasto
- 20 kg/Ha nei terreni argillosi

Il prodotto va distribuito 6-7 giorni prima della semina del riso, dopo la preparazione del terreno e mantenendo un normale livello dell'acqua. In terreni perfettamente livellati il trattamento può essere effettuato 2-3 giorni prima della semina in acqua limpida. Dopo la distribuzione del formulato mantenere l'acqua ferma e ad un livello costante per almeno 48 ore.
Immediatamente prima della semina effettuare il ricambio dell'acqua nella risaia.
Actinidia:
- 150 kg/Ha .Intervenire in pre-emergenza delle infestanti su terreni dotati di un buon livello di umidità o effettuare un una leggera irrigazione dopo l'applicazione. La chioma delle piante deve essere asciutta. Non trattare su vivai.

Colture trapiantate di **Asparago, Carciofo, Cavolfiore, Melanzana, Peperone, Pomodoro, Tabacco:**
- 20-40 Kg/Ha. Intervenire in pre o in post-trapianto, prima dell'emergenza delle infestanti. Nelle applicazioni di post-trapianto applicare su colture asciutte ed irrigare entro 24 ore allo scopo di rimuovere i granuli di formulato eventualmente depositatisi sulla vegetazione ed attivare il prodotto nel terreno.

Impianti di colture arboree di **Albicocco, Pesco, Melo, Pero, Susino, Arancio, Clementino, Limone, Mandarino, Olivo, Nocciolo, Pioppo:**
- 50 Kg/Ha (infestanti annuali) - 150 Kg/Ha (Vilucchio e infestanti poliennali). Trattare in pre-emergenza delle infestanti, prima della ripresa vegetativa della coltura. Adattare la dose in funzione della flora infestante da combattere e della durata di efficacia programmata.

Vite
- 50 Kg/Ha (infestanti annuali) - 150 Kg/Ha (Vilucchio e infestanti poliennali). Impiegare solo su impianti in produzione, evitando che il prodotto venga a contatto con la vegetazione. Applicare il prodotto prima della ripresa vegetativa della coltura, adattando dose in funzione della flora infestante da combattere. Vivai di piante di **Pesco, Melo, Pero, Albicocco, Susino, Arancio, Clementino, Mandarino, Limone, Olivo, Pioppo e Ornamentali:**
- 150 Kg/Ha. Intervenire dopo la messa a dimora, a fine inverno (Febbraio) e prima dell'emergenza delle infestanti.

Tappeti erbosi di graminacee 150-180 Kg/Ha. L'operazione di diserbo va eseguita prima dell'emergenza delle infestanti.
COMPATIBILITA': il prodotto va impiegato da solo.
FITOTOSSICITA': nei trattamenti in vivaio non intervenire su piante non sufficientemente lignificate. Non trattare vivai di vite, piante madri o barbatelle appena messe a dimora. Nei terreni particolarmente asciutti il prodotto non esplica completamente la sua azione. Pertanto, nei casi di siccità, è necessario prevedere un'irrigazione entro 10-12 giorni dal trattamento.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci. Nel corso degli interventi tenere lontani dalla zona interessata persone non protette, animali domestici e bestiame.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di produzione: SCAM Spa – Modena - A.D.I.C.A. Srl – Nera Montoro (TR)
Schirm GmbH Division Sideco - Lübeck (Germania)
Distribuito da: Scotts Italia Srl Viale Montegrappa, 18 - Treviso
Autorizzazione Ministero della Salute n. 11426 del 16/09/2002
Kg 1 / 5 / 10 / 25 **Partita n.**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO – SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI –
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

Patchveiss®

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE
PER LA LOTTA CONTRO GLI AGENTI PATOGENI DEL TERRENO

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:

- Tolclofos metile puro		**g 50**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g 100**

® marchio registrato dalla Scotts International B.V.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. – Usare indumenti protettivi e guanti adatti. – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511
Stabilimento di produzione: SCAM Spa – Modena
S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola (RA)
Distribuito da: Scotts Italia Srl Viale Montegrappa, 18 - Treviso
Autorizzazione Ministero della Salute n. 11427 del 16/09/2002
Kg 0,100 / 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO PATCHVEISS è un fungicida ad ampio spettro d'azione in grado di controllare i più importanti patogeni (*Rhizoctonia* spp., *Corticium* spp., *Sclerotinia* spp., *Alternaria* spp., *Leptospharia* spp., *Typhula* spp., *Botritys* spp., ecc.) responsabili dei marciumi radicali e della vegetazione aerea di numerose colture. PATCHVEISS possiede proprietà preventive e curative ed é in grado di controllare anche i ceppi fungini divenuti resistenti o tolleranti ai fungicidi di uso più comune.
PATCHVEISS può essere impiegato sulle seguenti colture:
<u>**Lattuga, Radicchio**</u>: contro *R.Solani* e *S.Sclerotiorum* alla dose di 2-4 g/m^2 effettuando interventi sia durante la coltivazione in semenzaio che dopo il trapianto in pieno campo. In presenza di cultivar particolarmente sensibili ai patogeni aumentare la dose a 5-8 g/m^2. Nelle applicazioni fogliari utilizzare 1-2 Kg/Ha di prodotto effettuando 2-3 interventi ad intervalli di 15-20 giorni.
<u>**Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cocomero, Zucchino, Cavoli, Carota, Fagiolo, Fagiolino**</u>: contro *R.Solani, S.Sclerotiorum, C.Rolfsii, A.Solani, Leptosphoria* spp., *Botritys* spp. alla dose di 2-4 g/m^2 nelle applicazioni al terreno e 1-2 Kg/Ha nelle irrorazioni fogliari.
<u>**Zucca, Aglio, Cipolla:**</u> contro *R.Solani, S.Sclerotiorum, C.Rolfsii,* alla dose di 2-4 g/m^2 nelle applicazioni al terreno.
<u>**Patata**</u>: contro la *R.Solani* alla dose di 200-300 g/hl effettuando l'immersione o il trattamento dei bulbi prima del loro trapianto. PATCHVEISS può essere impiegato anche per applicazioni al terreno utilizzando 10-20 Kg/Ha nei trattamenti a pieno campo e 80-120 g/m lineare nei trattamenti localizzati lungo il solco di semina.
<u>**Barbabietola da Zucchero**</u>: contro *R.Solani* e *C.Rolfsii* alla dose di 1-2 Kg/Ha nei trattamenti localizzati al terreno.
<u>**Frumento**</u>: contro *R.Solani* alla dose di 1-2 Kg/ha nei trattamenti all'apparato fogliare.
<u>**Colture floreali**</u>: contro *R.Solani* alla dose di 3-5 g/m^2 avendo cura di distribuire uniformemente il prodotto sulla superficie del terreno e alla base della pianta. PATCHVEISS può essere utilizzato anche nella concia a secco di tuberi, bulbi e rizomi alla dose di 1 g/Kg di materiale e nella concia umida alla dose di 200 g/hl immergendo il materiale da trattare per circa 10 minuti nella soluzione così preparata.
PATCHVEISS può anche essere impiegato per la <u>**concia delle sementi di Lattuga, Radicchio, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cocomero, Zucchino, Cavoli, Carota, Fagiolino, Fagiolo, Soia, Barbabietola da zucchero, Frumento**</u> alla dose di 80-100 g/Kg di seme.
<u>**Campi da golf:**</u> contro la *Rhizoctonia* spp. alla dose di 2-5 g/m^2, avendo cura di bagnare uniformemente la superficie trattata.
PATCHVEISS può infine essere usato per la disinfezione dei <u>**terricci e dei letti di semina dei semenzai**</u> impiegando 200-250 g/m^3 di formulato.
COMPATIBILITA': PATCHVEISS é compatibile con i preparati fitosanitari a reazione acida.
FITOTOSSICITA': il prodotto, se impiegato secondo le modalità sopra prescritte, risulta perfettamente selettivo per le colture indicate in etichetta. Tuttavia su cultivar poco diffuse o di recente introduzione é consigliabile effettuare saggi preventivi. Non trattare colture sofferenti a seguito di abbassamenti termici, siccità o altre cause.
INTERVALLO DI SICUREZZA: intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 15 giorni per i Cavoli; 30 giorni per Lattuga, Radicchio, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Fagiolo, Fagiolino, Barbabietola da zucchero; 45 giorni per lo Zucchino; 60 giorni per il Cocomero.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

Patchveiss®

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI
PER LA LOTTA CONTRO GLI AGENTI PATOGENI DEL TERRENI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Tolclofos metile puro g 50
- Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Da sciogliere in acqua senza rompere

Contenuto 100 - 250 - 500 g

Avvertenza: leggere l'etichetta riportata sulla confezione prima di utilizzare il prodotto

DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164
41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11427 del 16/09/2002

Patchveiss®

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER LA LOTTA CONTRO GLI AGENTI PATOGENI DEL TERRENO IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono:

- Tolclofos metile puro		**g 50**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g 100**

® marchio registrato dalla Scotts International B.V.

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. – Usare indumenti protettivi e guanti adatti. – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511
Stabilimento di produzione: SCAM Spa Modena
S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa Cotignola (RA)

Distribuito da: Scotts Italia Srl Viale Montegrappa, 18 - Treviso

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11427 del 16/09/2002

kg 1 (= 4 x 0,250) **kg 1 (= 2 x 0,500)** **kg 0,500 (= 5 x 0,100)** **Partita n.**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO PATCHVEISS è un fungicida ad ampio spettro d'azione in grado di controllare i più importanti patogeni (*Rhizoctonia* spp., *Corticium* spp., *Sclerotinia* spp., *Alternaria* spp., *Leptospharia* spp., *Typhula* spp., *Botritys* spp., ecc.) responsabili dei marciumi radicali e della vegetazione aerea di numerose colture. PATCHVEISS possiede proprietà preventive e curative ed é in grado di controllare anche i ceppi fungini divenuti resistenti o tolleranti ai fungicidi di uso più comune.
PATCHVEISS può essere impiegato sulle seguenti colture: **Lattuga, Radicchio**: contro *R.Solani* e *S.Sclerotiorum* alla dose di 2-4 g/m^2 effettuando interventi sia durante la coltivazione in semenzaio che dopo il trapianto in pieno campo. In presenza di cultivar particolarmente sensibili ai patogeni aumentare la dose a 5-8 g/m^2. Nelle applicazioni fogliari utilizzare 1-2 Kg/Ha di prodotto effettuando 2-3 interventi ad intervalli di 15-20 giorni.
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cocomero, Zucchino, Cavoli, Carota, Fagiolo, Fagiolino: contro *R.Solani, S.Sclerotiorum, C.Rolfsii, A.Solani, Leptosphoria* spp., *Botritys* spp, alla dose di 2-4 g/m^2 nelle applicazioni al terreno e 1-2 Kg/Ha nelle irrorazioni fogliari.
Zucca, Aglio, Cipolla: contro *R.Solani, S.Sclerotiorum, C.Rolfsii*, alla dose di 2-4 g/m^2 nelle applicazioni al terreno.
Patata: contro la *R.Solani* alla dose di 200-300 g/hl effettuando l'immersione o il trattamento dei bulbi prima del loro trapianto. PATCHVEISS può essere impiegato anche per applicazioni al terreno utilizzando 10-20 Kg/Ha nei trattamenti a pieno campo e 80-120 g/m lineare nei trattamenti localizzati lungo il solco di semina. **Barbabietola da Zucchero**: contro *R.Solani* e *C.Rolfsii* alla dose di 1-2 Kg/Ha nei trattamenti localizzati al terreno. **Frumento**: contro *R.Solani* alla dose di 1-2 Kg/ha nei trattamenti all'apparato fogliare.
Colture floreali: contro *R.Solani* alla dose di 3-5 g/m^2 avendo cura di distribuire uniformemente il prodotto sulla superficie del terreno e alla base della pianta. PATCHVEISS può essere utilizzato anche nella concia a secco di tuberi, bulbi e rizomi alla dose di 1 g/Kg di materiale e nella concia umida alla dose di 200 g/hl immergendo il materiale da trattare per circa 10 minuti nella soluzione così preparata.
PATCHVEISS può anche essere impiegato per la **concia delle sementi di Lattuga, Radicchio, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cocomero, Zucchino, Cavoli, Carota, Fagiolino, Fagiolo, Soia, Barbabietola da zucchero, Frumento** alla dose di 80-100 g/Kg di seme.
Campi da golf: contro la *Rhizoctonia* spp. alla dose di 2-5 g/m^2, avendo cura di bagnare uniformemente la superficie trattata.
PATCHVEISS può infine essere usato per la disinfezione dei **terricci e dei letti di semina dei semenzai** impiegando 200-250 g/m^3 di formulato.
COMPATIBILITA': PATCHVEISS é compatibile con i preparati fitosanitari a reazione acida. **AVVERTENZA D'USO**: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all'introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione chiudere bene la scatola. **AVVERTENZA**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': il prodotto, se impiegato secondo le modalità sopra prescritte, risulta perfettamente selettivo per le colture indicate in etichetta. Tuttavia su cultivar poco diffuse o di recente introduzione é consigliabile effettuare saggi preventivi. Non trattare colture sofferenti a seguito di abbassamenti termici, siccità o altre cause.

INTERVALLO DI SICUREZZA: intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 15 giorni per i Cavoli; 30 giorni per Lattuga, Radicchio, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Fagiolo, Fagiolino, Barbabietola da zucchero; 45 giorni per lo Zucchino; 60 giorni per il Cocomero.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE- DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

25%

1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua

2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti

3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore

4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ed...

5) ... aggiungere la restante parte d'acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

Dicogramplus®

DISERBANTE SELETTIVO PER LE COLTURE ORTIVE, ORNAMENTALI E FLOREALI
POLVERE BAGNABILE PER TRATTAMENTI LIQUIDI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Clortal dimetil puro		**g 75**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g 100**

® marchio registrato dalla Scotts International B.V.

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO: possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a-Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano-Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa – Modena A.D.I.C.A. Srl – Nera Montoro (TR)
S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola (Ra)
Distribuito da: Scotts Italia Srl Viale Montegrappa, 18 - Treviso

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11428 del 16/09/2002

Kg 0,130 / 0,260 / 1 / 5 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza**: consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE: il DICOGRAMPLUS è un diserbante per la fragola, per alcune colture ortive, ornamentali e floreali. Il DICOGRAMPLUS ha un'azione antigermogliante sui semi delle infestanti sensibili impedendone lo sviluppo. Pertanto, non esplica nessuna azione sulle infestanti già nate o sui loro semi già germogliati. E' efficace contro le seguenti erbe infestanti annuali provenienti da seme: *Digitaria sanguinalis* (sanguinella), *Amarantus retroflexus* (amaranto), *Chenopodium album* (farinaccio), *Setaria verticillata* (panicastrella), *Portulaca oleracea* (erba porcellana), *Stellaria media* (centocchio), *Erodium cicutarium* (erba cicutaria) *Beta vulgaris* (barbabietola), *Poa annua*, *Papaver rhoeas* (papavero).
Sono invece resistenti le infestanti perennanti come gramigna, cipero, vilucchio, stoppione (o cirsium) ed altre come: coda cavallina, capsella. Inoltre sono poco sensibili al prodotto le poligonacee come: convolvolo, persicaria, correggiola (*polygonum aviculare* ecc.).
CAMPI E DOSI D'IMPIEGO Dose normale d'impiego 15-18 kg/Ha in almeno 500 l di acqua. La dose più bassa va impiegata nei terreni sciolti o di medio impasto, la più alta nei terreni pesanti ed argillosi.
Post-semina o post-trapianto delle colture: cipolle, agli, porri, cavoli, cavolfiori, finocchi, sedani, piselli.
Post-trapianto: lattuga, scarola, peperoni, melanzane.
Può anche essere impiegato su cetriolo, anguria e meloni, dopo che le piantine hanno superato la crisi del trapianto e su pomodoro, effettuando il trattamento da 4 a 6 settimane dopo il trapianto.
Fragole ed asparagi: il trattamento va eseguito dopo la messa a dimora per i nuovi impianti e prima della ripresa vegetativa primaverile per i vecchi impianti. **Bulbose da fiori** (Gladioli, Tulipani, Iris)**:** il trattamento va eseguito dopo la messa a dimora dei bulbi, anche con piante già in fioritura. Qualora dopo 60-70 gg. dal trattamento avesse luogo una nuova apparizione delle erbe infestanti, sarà sufficiente applicare altri 10 kg/Ha di DICOGRAMPLUS, avendo prima cura di erpicare e pulire bene il terreno.
Campi da golf, prati all'inglese: il trattamento va eseguito alla dose di 13 kg/Ha con 500-600 litri di acqua all'inizio della primavera, prima della germinazione delle infestanti da combattere e dopo aver eseguito il taglio del tappeto erboso, quanto più raso possibile. Dopo il trattamento effettuare un'abbondante irrigazione a pioggia, per facilitare la penetrazione del diserbante nel terreno.
MODALITA' D'IMPIEGO Il terreno, prima del trattamento, deve essere ben lavorato, ripulito da erbacce ed avere un sufficiente tenore di umidità (l'umidità richiesta in genere è quella necessaria per mettere a dimora la coltura). Per la preparazione della miscela aggiungere alla dose occorrente di DICOGRAMPLUS poca acqua, agitando a mezzo di un bastone fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Aggiungere quindi, sempre agitando, il rimanente dell'acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione. Distribuire la miscela acquosa uniformemente sulla superficie da disinfestare, usando normali pompe a mano o a motore. Durante il trattamento mantenere la miscela acquosa in costante agitazione. In periodi di siccità, è opportuno mantenere il terreno umido per almeno una settimana dopo il trattamento. **COMPATIBILITA':** il prodotto va impiegato da solo. **FITOTOSSICITA':** evitare che, durante l'irrorazione, lo spruzzo giunga su altre colture vicine. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. **AVVERTENZE:** non effettuare il diserbo in terreni torbosi, perché il prodotto viene inattivato dalla sostanza organica. Se le colture dovessero fallire per cause ambientali, si possono subito ripiantare le stesse colture per le quali li prodotto è selettivo e raccomandato. Quando capita di seminare cereali che seguono, sullo stesso terreno, colture trattate con il DICOGRAMPLUS nel periodo estivo, è prudente effettuare prima una buon aratura e lasciare poi il terreno a riposo per qualche tempo (15-20 gg.). Lavare perfettamente dopo l'uso la pompa e i recipienti usati per l'irrorazione. Effettuare il trattamento con tempo buono e senza vento. Conservare il prodotto in locale asciutto. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE- NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE- Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

Foglio illustrativo

Dicogramplus®

DISERBANTE SELETTIVO PER LE COLTURE ORTIVE, ORNAMENTALI E FLOREALI
POLVERE BAGNABILE PER TRATTAMENTI LIQUIDI

® marchio registrato dalla Scotts International B.V.

CARATTERISTICHE: il DICOGRAMPLUS è un diserbante per la fragola, per alcune colture ortive, ornamentali e floreali. Il DICOGRAMPLUS ha un'azione antigermogliante sui semi delle infestanti sensibili impedendone lo sviluppo. Pertanto, non esplica nessuna azione sulle infestanti già nate o sui loro semi già germogliati. E' efficace contro le seguenti erbe infestanti annuali provenienti da seme: *Digitaria sanguinalis* (sanguinella), *Amarantus retroflexus* (amaranto), *Chenopodium album* (farinaccio), *Setaria verticillata* (panicastrella), *Portulaca oleracea* (erba porcellana), *Stellaria media* (centocchio), *Erodium cicutarium* (erba cicutaria) *Beta vulgaris* (barbabietola), *Poa annua*, *Papaver rhoeas* (papavero).
Sono invece resistenti le infestanti perennanti come gramigna, cipero, vilucchio, stoppione (o cirsium) ed altre come: coda cavallina, capsella. Inoltre sono poco sensibili al prodotto le poligonacee come: convolvolo, persicaria, correggiola (*polygonum aviculare* ecc.).

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

Dose normale d'impiego 15-18 kg/Ha in almeno 500 l di acqua. La dose più bassa va impiegata nei terreni sciolti o di medio impasto, la più alta nei terreni pesanti ed argillosi.
Post-semina o post-trapianto delle colture: cipolle, agli, porri, cavoli, cavolfiori, finocchi, sedani, piselli.
Post-trapianto: lattuga, scarola, peperoni, melanzane.
Può anche essere impiegato su cetriolo, anguria e meloni, dopo che le piantine hanno superato la crisi del trapianto e su pomodoro, effettuando il trattamento da 4 a 6 settimane dopo il trapianto.
Fragole ed asparagi: il trattamento va eseguito dopo la messa a dimora per i nuovi impianti e prima della ripresa vegetativa primaverile per i vecchi impianti.
Bulbose da fiori (Gladioli, Tulipani, Iris)**:** il trattamento va eseguito dopo la messa a dimora dei bulbi, anche con piante già in fioritura. Qualora dopo 60-70 gg. dal trattamento avesse luogo una nuova apparizione delle erbe infestanti, sarà sufficiente applicare altri 10 kg/Ha di DICOGRAMPLUS, avendo prima cura di erpicare e pulire bene il terreno.
Campi da golf, prati all'inglese: il trattamento va eseguito alla dose di 13 kg/Ha con 500-600 litri di acqua all'inizio della primavera, prima della germinazione delle infestanti da combattere e dopo aver eseguito il taglio del tappeto erboso, quanto più raso possibile. Dopo il trattamento effettuare un'abbondante irrigazione a pioggia, per facilitare la penetrazione del diserbante nel terreno.
MODALITA' D'IMPIEGO Il terreno, prima del trattamento, deve essere ben lavorato, ripulito da erbacce ed avere un sufficiente tenore di umidità (l'umidità richiesta in genere è quella necessaria per mettere a dimora la coltura). Per la preparazione della miscela aggiungere alla dose occorrente di DICOGRAMPLUS poca acqua, agitando a mezzo di un bastone fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Aggiungere quindi, sempre agitando, il rimanente dell'acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione. Distribuire la miscela acquosa uniformemente sulla superficie da disinfestare, usando normali pompe a mano o a motore. Durante il trattamento mantenere la miscela acquosa in costante agitazione. In periodi di siccità, è opportuno mantenere il terreno umido per almeno una settimana dopo il trattamento.
COMPATIBILITA': il prodotto va impiegato da solo.
FITOTOSSICITA': evitare che, durante l'irrorazione, lo spruzzo giunga su altre colture vicine. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
AVVERTENZE: non effettuare il diserbo in terreni torbosi, perché il prodotto viene inattivato dalla sostanza organica. Se le colture dovessero fallire per cause ambientali, si possono subito ripiantare le stesse colture per le quali li prodotto è selettivo e raccomandato. Quando capita di seminare cereali che seguono, sullo stesso terreno, colture trattate con il DICOGRAMPLUS nel periodo estivo, è prudente effettuare prima una buon aratura e lasciare poi il terreno a riposo per qualche tempo (15-20 gg.). Lavare perfettamente dopo l'uso la pompa e i recipienti usati per l'irrorazione. Effettuare il trattamento con tempo buono e senza vento. Conservare il prodotto in locale asciutto. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SCAM S.p.a-Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano-Modena Tel. 059-586511

Etichetta formato ridotto ai sensi dell'Art.16 comma 2 del D.L. 194/95 per le taglie da g 130 – 260

Dicogramplus®

DISERBANTE SELETTIVO PER LE COLTURE ORTIVE, ORNAMENTALI E FLOREALI
POLVERE BAGNABILE PER TRATTAMENTI LIQUIDI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Clortal dimetil puro		**g**	**75**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g**	**100**

® marchio registrato dalla Scotts International B.V.

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO: possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a-Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano-Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa – Modena A.D.I.C.A. Srl – Nera Montoro (TR)
S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola (Ra)
Distribuito da: Scotts Italia Srl Viale Montegrappa, 18 - Treviso

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11428 del 16/09/2002

g 0,130 / 0,260 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Cokill®

OLIO PARAFFINICO INSETTICIDA AD ELEVATO GRADO DI INSULFONABILITA'

LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Olio minerale puro (insulfonabilità minima 95%) g 85 (= 717 g/l)

- Coformulanti q.b. a g 100

® marchio registrato dalla Scotts International B.V.

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se ingerito, non indurre vomito, chiamare immediatamente un medico.
CARATTERISTICHE: COKILL è un nuovo olio minerale "Narrow range" che per le sue caratteristiche fisico-chimiche, residuo insulfonabile 95% e stretto intervallo di distillazione, può essere usato su colture erbacee e arboree in piena vegetazione. Trova un utile impiego nella lotta contro diversi tipi di insetti sia nella fase invernale che in quella primaverile-estiva; in miscela con insetticidi o erbicidi è un ottimo sinergizzante e coadiuvante.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO: Agrumi: contro Afide verde, Cimice, Cocciniglie, Aleurodidi, Tripidi, Ragno rosso, Minatori fogliari, 1- 2 l/hl. **Drupacee:** contro Cocciniglie, Afidi, Tripidi, Acari, Cicaline, Eriofidi, Metcalfa, 1- 1,5 l/hl.
Pomacee (melo, pero, cotogno): contro Cocciniglie, Afidi, Psilla, Acari, Eriofidi, Cicaline, Metcalfa, 1 - 1,5 l/hl. **Vite:** contro Cocciniglie, Acari, Cicaline, Metcalfa, Afidi, Tripidi, 1 - 1,5 l/hl. **Olivo:** contro Cocciniglie, 1 - 1,5 l/hl. **Kako, Fico:** contro Cocciniglie, Afidi, Psilla, Cicaline, Metcalfa, 0,5 - 1,2 l/hl.. **Floreali, Ornamentali e Forestali:** contro Afidi, Metcalfa, Tripidi, Cocciniglie, Psille, Ditteri, Cicaline, Tingidi, Aleurodidi, Acari in fase vegetativa, 1 - 2 l/hl. **Ribes, Noce, Nocciolo:** Afidi, Acari, Cocciniglie, Cimice, Eriofidi, 1 - 1,5 l/hl. **Carciofo, Sedano, Finocchio:** contro Afidi, Aleurodidi, Ditteri minatori, Acari, Tripidi, Lepidotteri, 0,5 - 1,2 l/hl. **Cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo):** contro Afidi, Tripidi, Aleurodidi, Minatori delle foglie, Acari, Ditteri agromizidi, 0,5 - 1,5 l/hl. **Pomodoro, Peperone, Patata:** contro Afidi, Tripidi, Mosca bianca, Minatori delle foglie, uova di lepidotteri e coleotteri, Acari, 0,5 - 1,2 l/hl. **Fagiolo:** Afidi, Acari, Tripidi, 0,5 - 1,2 l/hl.; come coadiuvante in associazione a erbicidi 0,5 - 1 l/ha. **Barbabietola da zucchero:** come coadiuvante in associazione a erbicidi 0,3 - 1 l/ha. **Mais:** come coadiuvante in associazione a erbicidi, 0,5 - 2 l/ha.
COMPATIBILITÀ COKILL non è compatibile con prodotti a base di Zolfo e le seguenti molecole: Polisolfuri, Captano, Folpet, Chinometionato, Bupirimate, Diclofluanide, Ometoato, Dimetoato, Formothion, Propargite, Tetradifon. Inoltre non è miscibile con Calce, Clorotalonil, Dinocap, Carbammati, Triclorfon, Ciexatin, Azociclotin, Dicofol, Poltiglia bordolese. Non miscelabile con concimi fogliari (amminoacidi, microelementi, nitrato di calcio, alghe, etc.).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' Impiegare COKILL con intervallo di tempo di almeno 2/3 settimane dopo aver eseguito trattamenti con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e prodotti a base di captano, zolfo, thiram. Il trattamento con COKILL può essere ripetuto rispettando un intervallo minimo di 6-7 giorni. Non trattare con temperature superiori a 32-34°C, e su piante in condizioni di stress.
INTERVALLO: sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: (*) lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.
Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SCAM S.p.a-Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano-Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena
TERRANALISI S.r.l. – Renazzo di Cento (FE)
A.D.I.C.A. Srl – Faenza (RA) – via S.Silvestro 1
I.R.C.A. Service Spa – Fornovo S.Giovanni (BG)

Distribuito da: Scotts Italia Srl Viale Montegrappa, 18 - Treviso

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11450 del 9/10/2002

L 0,1/0,25/0,5/1/5/10/20/25/50/100/200 **Partita n.**

(*) Relativamente alla conf. 200

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

LOTON

**Fungicida per la difesa di frumento e orzo,
dei campi da golf, tappeti erbosi e prati ornamentali in polvere bagnabile**

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Procloraz puro	g	46,1
- Coformulanti	q.b. a g	100

FRASI DI RISCHIO: altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11482 del 22/10/2002

Kg 0,100 / 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10 **Partita n. :**

NORME PRECAUZIONALI Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea), deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici. **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE
LOTON è un fungicida imidazolico efficace contro numerosi patogeni di frumento, orzo e dei manti erbosi quali Fusariosi *(Michrodochium (Fusarium) nivale, Fusarium spp.)*, Cercosporella (*Cercosporella herpotricoides*), Elmintosporiosi *(Helmynthosporium gramineum, Dreschlera spp.)*, Rincosporiosi *(Rhyncosporium secalis)*, Antracnosi *(Colletotricum graminicola)*, Botrite *(Botrytis spp.)*, Alternaria *(Alternaria spp.)*, Dollar spot (*Sclerotinia homeocarpa)*. Agisce sia in via preventiva che curativa, mediante contatto e penetrazione con diffusione traslaminare.
MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO
Frumento e Orzo: LOTON va impiegato alla dose di 1,0-1,3 Kg/Ha, intervenendo fra la fine dell'accestimento e l'inizio della fioritura. In caso di forte presenza di Cercosporella aumentare la dose a 1,5-1,8 Kg/Ha. Per ampliare lo spettro d'azione alle Ruggini e all'Oidio ed aumentare l'efficacia del trattamento, utilizzare LOTON alla dose di 1,0 Kg/Ha in miscela con prodotti efficaci contro questi patogeni. Intervenire alla prima comparsa delle malattie.
Campi da golf, tappeti erbosi e prati ornamentali: LOTON va impiegato alla dose di 100 g/100mq, avendo cura di bagnare abbondantemente ed in maniera accurata il manto erboso contro Marciume rosa (*Fusarium nivale*) utilizzare 50-70 g/100mq. Iniziare le applicazioni quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo dei patogeni e ripeterle 2-3 volte ad intervalli di 10-14 giorni.
COMPATIBILITA': Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci. Non contaminare stagni, fossi, vie d'acqua con i residui del lavaggio delle attrezzature usate per il trattamento.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta di frumento e orzo. Sui campi da golf, tappeti erbosi e prati ornamentali "non rientrare nelle aree trattate prima di 24 ore dal trattamento". Segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del prodotto fitosanitario.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

CIMOX 50 WDG

FUNGICIDA CITOTROPICO TRANSLAMINARE IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Cimoxanil puro g 50

- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano-Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione:
A.D.I.C.A. Srl – Via dello Stabilimento 11 – Nera Montoro (TR)
Stabilimento di confezionamento: SCAM Spa – Modena

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11520 del 4/12/2002

Kg 0,050 / 0,100 / 0,200 / 0,500 / 1 **Partita n.**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: derivato dell'urea. **Sintomi**: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia**: sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO: CIMOX 50 WDG è un fungicida caratterizzato da proprietà citotropiche e translaminari, particolarmente efficace contro le Peronospore. CIMOX 50 WDG esplica attività preventiva, curativa (potendo controllare eventuali infezioni nei primi stadi del periodo d'incubazione) con una persistenza d'azione di 4-5 giorni a seconda delle condizioni climatiche che si verificano dopo l'applicazione e dello stadio fenologico e di sviluppo delle colture.
Vite: contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*) alla dose di g 40-50 per q.le di acqua (dose minima 400 g/Ha), iniziando gli interventi quando si verificano le condizioni climatiche che favoriscono l'infezione fino all'ingrossamento degli acini. Nel caso s'intervenga su infezioni già in atto effettuare due interventi ravvicinati a distanza di 4-5 giorni l'uno dall'altro.
CIMOX 50 WDG può essere impiegato alla dose di 25-30 g/hl di acqua (dose minima: 250 g/Ha) in miscela con prodotti a base di Rame, Ditiocarbammati, Folpet, Dithianon, Diclofluanide, Dodina, ecc..; questi ultimi dovranno essere impiegati ad un dosaggio non inferiore al 70% rispetto a quello "pieno" riportato nelle rispettive etichette.
Patata, Pomodoro, Lattuga, Spinacio, Melone, Zucchino, Cipolla, Aglio, Porro, Pisello, Carciofo, Girasole, Soia, Tabacco, Rosa: contro le Peronospore (*Phitophtora infestans, Bremia lactucae, Peronospora spinaciae, Pseudoperonospora cubensis, Peronospora scheledoni, Phytophtora porri, Peronospora pisi, Peronospora helianti, Peronospora manshurica, Peronospora tabacina, Peronospora sparsa*) alla dose di 40-50 g/hl iniziando i trattamenti allorché si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo dell'infezione. Su infezioni in atto con sintomi visibili effettuare due interventi ravvicinati a distanza di 4-5 giorni l'uno dall'altro.
Nel caso di impiego in miscela con altri fungicidi antiperonosporici, CIMOX 50 WDG può essere applicato al dosaggio più basso previsto; è tuttavia consigliabile non impiegare mai meno di 250 g/Ha di formulato.
COMPATIBILITA': il formulato non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Poltiglia Solfocalcica ecc..).
AVVERTENZA: nel caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta della vite, patata, pomodoro, tabacco, lattuga, spinacio, melone, zucchino, pisello, cipolla, aglio, porro; 21 giorni per il carciofo e 28 giorni per girasole e soia.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI FUSO-IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

Foglio illustrativo

CIMOX 50 WDG

FUNGICIDA CITOTROPICO TRANSLAMINARE IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO: CIMOX 50 WDG è un fungicida caratterizzato da proprietà citotropiche e translaminari, particolarmente efficace contro le Peronospore. CIMOX 50 WDG esplica attività preventiva, curativa (potendo controllare eventuali infezioni nei primi stadi del periodo d'incubazione) con una persistenza d'azione di 4-5 giorni a seconda delle condizioni climatiche che si verificano dopo l'applicazione e dello stadio fenologico e di sviluppo delle colture.
Vite: contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*) alla dose di g 40-50 per q.le di acqua (dose minima 400 g/Ha), iniziando gli interventi quando si verificano le condizioni climatiche che favoriscono l'infezione fino all'ingrossamento degli acini. Nel caso s'intervenga su infezioni già in atto effettuare due interventi ravvicinati a distanza di 4-5 giorni l'uno dall'altro.
CIMOX 50 WDG può essere impiegato alla dose di 25-30 g/hl di acqua (dose minima: 250 g/Ha) in miscela con prodotti a base di Rame, Ditiocarbammati, Folpet, Dithianon, Diclofluanide, Dodina, ecc..; questi ultimi dovranno essere impiegati ad un dosaggio non inferiore al 70% rispetto a quello "pieno" riportato nelle rispettive etichette.
Patata, Pomodoro, Lattuga, Spinacio, Melone, Zucchino, Cipolla, Aglio, Porro, Pisello, Carciofo, Girasole, Soia, Tabacco, Rosa: contro le Peronospore (*Phitophtora infestans, Bremia lactucae, Peronospora spinaciae, Pseudoperonospora cubensis, Peronospora scheledoni, Phytophtora porri, Peronospora pisi, Peronospora helianti, Peronospora manshurica, Peronospora tabacina, Peronospora sparsa*) alla dose di 40-50 g/hl iniziando i trattamenti allorché si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo dell'infezione. Su infezioni in atto con sintomi visibili effettuare due interventi ravvicinati a distanza di 4-5 giorni l'uno dall'altro.
Nel caso di impiego in miscela con altri fungicidi antiperonosporici, CIMOX 50 WDG può essere applicato al dosaggio più basso previsto; è tuttavia consigliabile non impiegare mai meno di 250 g/Ha di formulato.
COMPATIBILITA': il formulato non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Poltiglia Solfocalcica ecc..).
AVVERTENZA: nel caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta della vite, patata, pomodoro, tabacco, lattuga, spinacio, melone, zucchino, pisello, cipolla, aglio, porro; 21 giorni per il carciofo e 28 giorni per girasole e soia.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano-Modena Tel. 059-586511

Etichetta formato ridotto ai sensi dell'Art.16 comma 2 del D.L. 194/95 per le taglie da g 50

CIMOX 50 WDG

FUNGICIDA CITOTROPICO TRANSLAMINARE IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Cimoxanil puro g 50
- Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano-Modena
Tel. 059-586511
Stabilimento di produzione:
A.D.I.C.A. Srl – Via dello Stabilimento 11 – Nera Montoro (TR)
Stabilimento di confezionamento: SCAM Spa – Modena

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11520 del 4/12/2002

g 50 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: derivato dell'urea. **Sintomi**: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

CUPROSSIL IDRO 50 DF

FUNGICIDA A BASE DI RAME IDROSSIDO IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:
- Rame metallo g 50
(sotto forma di idrossido)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: nocivo per ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: A.D.I.C.A. Srl – Nera Montoro (TR)
Agri-Estrella S. de R.L. de C.V.– Chihuahua (Messico)
Stabilimento di Confezionamento: SCAM Spa – Modena
Autorizzazione Ministero della Salute n. 11529 del 6/12/2002

Kg 0,100 - 0,250 - 0,500 – 1 – 5 – 10 - 25 Partita n. :

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO CUPROSSIL IDRO 50 DF é un fungicida a base di rame idrossido ottenuto mediante un particolare processo di produzione e formulazione. Le particelle rameiche, caratterizzate da un'elevatissima micronizzazione, aderiscono tenacemente alle superfici trattate assicurando elevata attività nei confronti dei patogeni ed una notevole persistenza d'azione. CUPROSSIL IDRO 50 DF può essere impiegato sulle seguenti colture ai dosaggi di seguito riportati: **VITE**: contro la Peronospora (*P. viticola*) 150 g/hl (1,5 Kg/Ha) effettuando interventi a cadenza di 6-8 giorni. Se l'andamento stagionale è umido e piovoso e la pressione della malattia elevata aumentare la dose a 200 g/hl (2,0 Kg/Ha). Svolge un'efficace azione collaterale nei confronti del Marciume nero degli acini *(Black-rot)* e dell' Escoriosi (*P. viticola*) **KIWI**: contro la Fitoftora *(P. cactorum)* 300 g/hl distribuendo 10-15 l di soluzione alla base della pianta. **POMACEE**: contro i Cancri rameali (*N. galligena, P. mali*) 200 - 300 g/hl intervenendo dopo la caduta delle foglie e a rigonfiamento gemme. Contro la Ticchiolatura (*V. inaequalis, V. pirina, F. dendriticum, F. pirinum)* 150 g/hl nei trattamenti pre-fiorali e 120-130 in quelli post- fiorali. Contro il colpo di fuoco batterico (*E. amylovora*) 200 g/hl intervenendo nella fase di rigonfiamento gemme e alle prime "punte verdi". Contro Fitoftora (*F. cactorum)* 250 g/hl distribuendo circa 15 l di soluzione per pianta ed avendo cura di bagnare accuratamente la zona del colletto. **DRUPACEE**: contro Bolla (*E. deformans*), Corineo (*C. beijerickii*), Cancri rameali (*F. amygdali, ecc.*) e Batteriosi (*X. campestris vr. Pruni*) 200-250 g/hl intervenendo a caduta foglie e a gemma ferma. Contro la Batteriosi effettuare un ulteriore intervento alla dose di 30 g/hl dopo fioritura. **AGRUMI**: contro Mal secco (*D. tracheiphila*), Antracnosi (*C. gleosporioides*), Allupatura (*P. citrophtora)* e Fumaggine (*C. citri*) 150-200 g/hl. Contro la Fitoftora (*P. citrophthora*) 300 g/hl distribuendo circa 10-15 l di soluzione per pianta avendo cura di bagnare bene la zona del colletto. Per spennellature al tronco e alle branche utilizzare una soluzione allo 0,3%. **OLIVO**: contro Occhio di pavone (*S. oleaginea*), Lebbra (*G. olivarum*), Rogna (*P. savastanoi*) e le Fumaggini 150 - 200 g/hl. **NOCCIOLO-NOCE**: contro l'Antracnosi *(G. juglandis)* e le batteriosi *(X. Corylina, ecc.)* 200 g/hl. **NESPOLO**: contro la Ticchiolatura (*F. eriobotriae*) 100-150 g/hl. **FRAGOLA**: contro la Vaiolatura (*M. fragariae*), e la Batteriosi *(X. Fragaria)* 1,0-1,2 Kg/ha. **PATATA, POMODORO**: contro Peronospora (*P. infestans*), Alternaria (*A. porri*), Septoria (*S. lycopersici*) e le Batteriosi (*P. syringae pv. tomato, C. michiganense, X. campestris*) 150-200 g/hl. **ORTAGGI (Ortaggi a radice, Aglio, Cipolla, Scalogno, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Zucchino, Melone, Cocomero, Zucca, Cavoli, Lattuga, Indivia, Cicoria, Scarola, Radicchio, Rucola, Spinacio, Bietola da foglia e da costa, Erbe fresche, Legumi, Asparago, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo, Porro)**: contro Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Cladosporiosi, Cercospora, Septoria, Ruggini, Batteriosi 100-150 g/hl. **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO**: contro la Cercospora (*C. beticola*) e la Peronospora (*P. schachntii*) 1,5-2,0 Kg/ha. Utilizzare il dosaggio più basso nel caso di applicazioni in miscela con fungicidi endoterapici. **OLEAGINOSE (Soia, Lino, Arachide, Ravizzone, Sesamo, Colza, Girasole)**: contro la Peronospora (*P. manshurica, P. helianthi, ecc.*) e l'Alternaria (*Alternaria spp.*) 1,5-2,0 Kg/ha. **RISO**: per la lotta alle alghe verdi 2,0-2,5 Kg/Ha. **COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI e FORESTALI**: contro la Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Septoria, Ruggine, Ticchiolatura, ecc. 100-150 g/hl. Effettuare saggi preliminari al fine di verificarne la selettività sulla coltura da trattare.
COMPATIBILITA': il prodotto non è miscibile con fitosanitari a reazione alcalina ed il Tiram. Evitare inoltre le miscele con fertilizzanti fogliari contenenti acidi umici e/o elevati tenori di azoto. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (meli cupro-sensibili: Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guynot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cupro-sensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego fatta eccezione della lotta contro le Batteriosi in cui la fitotossicità può diventare un problema accettato. **NOCIVITA'**: il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE - NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE - Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

VISIR-SC

Fungicida in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Esaconazolo puro g 4,8 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena
Autorizzazione Ministero della Salute n. 11530 del 6/12/2002

L 0,100 / 0,250 / 0,500 / 1 /5 **Partita n. :**

NORME PRECAUZIONALI Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE VISIR-SC é un fungicida triazolico dotato di attività sistemica e translaminare. Penetra rapidamente all'interno delle parti verdi trattate sfuggendo all'azione dilavante delle piogge. Agisce in via preventiva, curativa ed "eradicante". VISIR-SC non ha effetti negativi sull'acaroentomofauna utile e non influisce sulle caratteristiche organolettiche delle produzioni trattate.
MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO VISIR-SC può essere impiegato sulle seguenti colture ai dosaggi di seguito indicati: **Melo, Pero**: contro la Ticchiolatura *(V. inaequalis, F. dendridoicum)* e il "Mal Bianco" *(P. leucotrica)* 50 ml/hl (dose minima: 750 ml/Ha), intervenendo quando si verificano le condizioni idonee allo sviluppo dell'infezione e proseguendoli ad intervalli di 7-8 giorni. Nella lotta contro la Ticchiolatura può risultare conveniente, al fine di migliorare l'efficacia e la persistenza d'azione, impiegare VISIR-SC in miscela con preparati di copertura quali Mancozeb, Captano, Dithianon, ecc.. **Vite**: contro l'Oidio o " Mal bianco" *(U. necator; O. tuckeri)* e il marciume nero degli acini o "Black rot" *(G. bidwellii)* 35-40 ml/hl (dose minima: 350 ml/Ha), intervenendo dalla pre- fioritura all'invaiatura ad intervalli di 10-14 giorni. Su vite da tavola aumentare il dosaggio a 40-50 ml/hl. **Carciofo, Pomodoro**: contro l'Oidio o "Mal Bianco" *(Eriysiphe spp., S. fuliginea, ecc.)* 30-40 ml/hl (dose minima: 240 ml/Ha) iniziando i trattamenti quando si notano i primissimi sintomi dell'infezione e proseguendoli ad intervalli di 8-12 giorni. **Rosa, Astri, Zinnia:** Contro l'Oidio o "Mal Bianco" *(Erysiphe spp., Sphaerotheca spp.)*, Ticchiolatura *(D. rosae)*, Ruggini *(Puccinia spp., ecc.)* 50-100 ml/hl. **Pioppo**: Contro Marsonnina *(M. brunnea)* e Ruggini *(Puccinia spp., ecc.)* 50-70 ml/hl.
COMPATIBILITÀ: il prodotto è compatibile con i preparati fitosanitari (Tiowetting, Erisan, Foltan, Mexil® Oro, Sumit WG, ecc.) comunemente impiegati nella difesa delle colture riportate nella presente etichetta. Evitare le miscele con preparati a reazione fortemente alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': su cultivar di Melo "Mc Intoche" relativi incroci impiegare solo fino alla fioritura. Eventuali miscele con Clorotalonil possono dare origine a rugginosità su Golden Delicious e Granny Smith.
PERIODO DI CARENZA Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta:
- 7 giorni per Carciofo, Pomodoro - 15 giorni Vite, Melo, Pero.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

SUMIT WG

Insetticida fosforganico a bassa tossicità in microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:
- Fenitrotion puro g 40
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. – Non gettare i residui nelle fognature. – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Stabilimento di Produzione: Schirm GmbH – Division Sideco – Lübeck (Germania)
A.D.I.C.A. Srl – Nera Montoro (TR)
Stabilimento di Confezionamento: SCAM Spa – Modena
Distribuito da: S.I.V.A.M. Spa – Via Scarlatti 30 - Milano
Registrazione n. 11545 del 16/01/2003 del Ministero della Salute

Kg 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10 / 20 **Partita n.:**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO **Sintomi:** colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali:** confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte**: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE SUMIT WG è un insetticida a bassa tossicità ed ampio spettro d'azione, impiegabile su un gran numero di colture arboree ed erbacee. Agisce per contatto e per ingestione nei confronti di numerose specie di insetti (afidi, tortricidi, tignole, nottue, cavolaie, dorifora, piralide, tripidi, cocciniglie, tingidi, ecc.).
MODALITA' e CAMPI DI IMPIEGO SUMIT WG può essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi:
Vite: contro le Tignole (*L. botrana, C. ambiguella, A. pulchellana*), Metcalfa (*M. pruinosa*), Nottue (*Noctua spp.)* 150-175 g/hl. Contro Scafoideo *(S. titanus)*, Cicaline (*E. flavescens, ecc.*), Tripidi (*D. reuteri, ecc.*), Acariosi *(C. vitis)* 175-200 g/hl. **Pomacee:** contro Carpocapsa (*C. pomonella*), Cidia (*C. molesta*), Mosca della frutta (*C. capitata*), Rodilegni (*C. cossus, Z. pyrina*) e Sesia (*S. myopaeformis, ecc.*) 200 g/hl. Svolge un'azione collaterale nei confronti di Falene, Tingidi, Orgia, Cicaline. **Fragola:** contro Eulia *(A. pulchellana)*, Pandemis (*P. dumetana),* Nottue *(Agrotis spp., ecc.)* e Cicaline (*E. flavescens, ecc*) 175-200 g/hl. **Drupacee:** contro Anarsia (*A. lineatella*), Cidia (*Cydia spp.*), Tentredini *(Hoplocampa spp.)*, Tripidi (*T. major, ecc.*), Cicaline *(E. flavescens, ecc.)*, Mosca (*C. capitata*), Forbicina *(Forficula spp.)* 175-200 g/hl; neanidi di Cocciniglie *(P. pentagona, ecc.)* 200-220 g/hl. **Agrumi**: contro Mosca (*C. capitata),* Cimice verde (*C. trivialis*), Metcalfa (*M. pruinosa*), Formiche (*T. nigerrimum, ecc.*), Tortricidi (*A. rosanus, ecc.*), Tignola della zagara *(P. citri)* e Tripide (*H. haemorrhadalis*) 200 g/hl; neanidi di Cocciniglie (*S.oleae, P.citri,A. aurantii, ecc.*) 200-250 g/hl. **Castagno, Noce, Nocciolo**: contro Afidi (*C. avellanae, ecc.*), Cimici *(G. acuteangulaus, ecc.),* Balanino *(C. nucum),* Anomala *(A. juni),* Maggiolino *(Melolontha spp.),* Carpocapsa (*C. pomonella, ecc.),* Lecanio (*E. coryli*) e Altica (*H. brevicollins*) 175-200 g/hl. **Olivo**: contro Mosca (*D. Oleae)*, Tignola (*P.oleae*), Liotripide (*L. oleae*), Margaronia (*M. unionalis*), Tripide *(D. reuteri, ecc.)* 200 g/hl. **Cavoli**: contro Mosca *(H. brassicae)*, Nottue e Cavolaie (*M. brassicae, Pieris spp., ecc.*), Punteruoli *(Baris spp., ecc.)* 175-200 g/hl. **Carciofo, Cardo, Asparago, Sedano, Finocchio, Porro**: contro Casside (*C.deflorata*), Vanessa (*V. cardui*), Mosche *(P. heraclei, D. platura, ecc.)*, Criocere *(C. asparagi, ecc.),* Nottue e Depressaia (*D. erinaceella, ecc.*) 175-200 g/hl. **Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Rucola, Spinacio, Bietola da foglia e da costa, Prezzemolo, Erba cipollina**: contro Afidi, Tipule, Nottue, Mamestra, Mosca 150-200 g/hl. **Patata, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Zucca, Zucchino, Melone, Cocomero, Mais dolce**: contro Afidi, Cimici, Nottue, Dorifora (*L. decemlineata*) 200-250 g/hl. **Legumi**: contro Nottue *(Agrotis spp.)*, Calocoride (*C. norvegicus*) e Mosca *(D. platura)* 150-200 g/hl. **Bietola rossa, Carota, Sedano rapa, Ravanello, Rapa**: contro Afidi, Punteruolo, Mosca 150-200 g/hl. **Cipolla Aglio, Scalogno**: contro Tignola (*A. assectella*), Mosca (*Delia spp.*) Tripide *(T. tabaci)* e Cosside (*D. ulula*) 200 g/hl aggiungendo bagnante adesivo. **Barbabietola da zucchero**: contro Altica (*C. tibialis*), Cleono (*T. mendicus*), Lisso (*L. junci*), Casside *(Cassida spp.),* Nottue e Mamestra *(Agrotis spp., ecc.)* 1,5-2,0 Kg/ha. **Cereali**: contro Lema (*O. melanopa*), Nottue *(Agrotis spp.)*, Coppette (*T. cancriformis*) e Chironomi (*Chironomus spp.*) 1,5-2,0 Kg/ha. **Erba medica**: contro il Misurino (*N. florentina*) 150-200 g/hl. **Tabacco**: contro Pulce *(E. hirtipenniis)* e Nottue (*Agrotis spp, ecc..*) 150-200 g/hl.
Floreali, Ornamentali e Forestali in pieno campo ed in vivaio: contro Tripidi *(Thrips spp., ecc.),* Bega *(C. pronubana),* Tortricidi *(E. acerbella)* Tentredini *(A. rosae)* e Nottue *(Agrotis spp., ecc.)* 150-200 g/hl. **Pioppo**: contro Saperda *(Saperda spp.)*, Crisomela *(M. populi)*, Cimicetta *(M. unicostata)*, Ifantria *(H. cunea),* Bucefala *(P. bucephala),* Bombice *(L. salicis)* e Tarlo vespa *(P. tabaniformis)* 200-250 g/hl.
COMPATIBILITÀ: il prodotto non é miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': dato l'elevato potere marcante del formulato, evitare di trattare su melo Golden Delicious e cultivar similari in prossimità della raccolta.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per la fauna selvatica, gli insetti utili e le api. Non trattare durante la fioritura.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto su tutte le colture.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO- IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE - NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE - Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

ROTIOFEN 40 WG

Insetticida fosforganico a bassa tossicità in microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Fenitrotion puro g 40
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511
Stabilimento di Produzione: Schirm GmbH – Division Sideco – Lübeck (Germania)
A.D.I.C.A. Srl – Nera Montoro (TR)
Isagro Spa – Aprilia (LT)
Stabilimento di Confezionamento: SCAM Spa – Modena
Distribuito da: SIAPA Srl – Via Caldera, 21 - Milano
Autorizzazione Ministero della Salute n. 11581 del 6/02/2003

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Kg 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10 / 20 **Partita n.:**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosfatici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica delle estremità). **Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Avvertenza**: consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE ROTIOFEN 40 WG è un insetticida a bassa tossicità ed ampio spettro d'azione, impiegabile su un gran numero di colture arboree ed erbacee. Agisce per contatto e per ingestione nei confronti di numerose specie di insetti (afidi, tortricidi, tignole, nottue, cavolaie, dorifora, piralide, tripidi, cocciniglie, tingidi, ecc.).
MODALITA' e CAMPI DI IMPIEGO ROTIOFEN 40 WG può essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi:
Vite: contro le Tignole (*L. botrana, C. ambiguella, A. pulchellana*), Metcalfa (*M. pruinosa*), Nottue (*Noctua spp.)* 150-175 g/hl. Contro Scafoideo *(S. titanus)*, Cicaline (*E. flavescens, ecc.*), Tripidi (*D. reuteri, ecc.*), Acariosi *(C. vitis)* 175-200 g/hl. **Pomacee:** contro Carpocapsa (*C. pomonella*), Cidia (*C. molesta*), Mosca della frutta (*C. capitata*), Rodilegni (*C. cossus, Z. pyrina*) e Sesia (*S. myopaeformis, ecc.*) 200 g/hl. Svolge un'azione collaterale nei confronti di Falene, Tingidi, Orgia, Cicaline. **Fragola:** contro Eulia *(A. pulchellana)*, Pandemis (*P. dumetana)*, Nottue *(Agrotis spp., ecc.)* e Cicaline (*E. flavescens, ecc*) 175-200 g/hl. **Drupacee:** contro Anarsia (*A. lineatella*), Cidia (*Cydia spp.*), Tentredini *(Hoplocampa spp.)*, Tripidi (*T. major, ecc.)*, Cicaline *(E. flavescens, ecc.)*, Mosca (*C. capitata*), Forbicina *(Forficula spp.)* 175-200 g/hl; neanidi di Cocciniglie *(P. pentagona, ecc.)* 200-220 g/hl. **Agrumi**: contro Mosca (*C. capitata)*, Cimice verde (*C. trivialis*), Metcalfa (*M. pruinosa*), Formiche (*T. nigerrimum, ecc.*), Tortricidi (*A. rosanus, ecc.*), Tignola della zagara *(P. citri)* e Tripide (*H. haemorrhadalis*) 200 g/hl; neanidi di Cocciniglie (*S.oleae, P.citri,A. aurantii, ecc.*) 200-250 g/hl. **Castagno, Noce, Nocciolo**: contro Afidi (*C. avellanae, ecc.*), Cimici *(G. acuteangulaus, ecc.)*, Balanino *(C. nucum)*, Anomala *(A. juni)*, Maggiolino *(Melolontha spp.)*, Carpocapsa (*C. pomonella, ecc.)*, Lecanio (*E. coryli*) e Altica (*H. brevicollins*) 175-200 g/hl. **Olivo**: contro Mosca (*D. Oleae)*, Tignola (*P.oleae*), Liotripide (*L. oleae*), Margaronia (*M. unionalis*). Tripide *(D. reuteri, ecc.)* 200 g/hl. **Cavoli**: contro Mosca *(H. brassicae)*, Nottue e Cavolaie (*M. brassicae, Pieris spp., ecc.*), Punteruoli *(Baris spp., ecc.)* 175-200 g/hl. **Carciofo, Cardo, Asparago, Sedano, Finocchio, Porro**: contro Casside (*C.deflorata*), Vanessa (*V. cardui*), Mosche *(P. heraclei, D. platura, ecc.)*, Criocere *(C. asparagi, ecc.)*, Nottue e Depressaia (*D. erinaceella, ecc.*) 175-200 g/hl. **Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Rucola, Spinacio, Bietola da foglia e da costa, Prezzemolo, Erba cipollina**: contro Afidi, Tipule, Nottue, Mamestra, Mosca 150-200 g/hl. **Patata, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Zucca, Zucchino, Melone, Cocomero, Mais dolce**: contro Afidi. Cimici, Nottue, Dorifora (*L. decemlineata*) 200-250 g/hl. **Legumi**: contro Nottue *(Agrotis spp.)*, Calocoride (*C. norvegicus*) e Mosca *(D. platura)* 150-200 g/hl. **Bietola rossa, Carota, Sedano rapa, Ravanello, Rapa**: contro Afidi, Punteruolo, Mosca 150-200 g/hl. **Cipolla Aglio, Scalogno**: contro Tignola (*A. assectella*), Mosca (*Delia spp.*) Tripide *(T. tabaci)* e Cosside (*D. ulula*) 200 g/hl aggiungendo bagnante adesivo. **Barbabietola da zucchero**: contro Altica (*C. tibialis*), Cleono (*T. mendicus*), Lisso (*L. junci*), Casside *(Cassida spp.)*, Nottue e Mamestra *(Agrotis spp., ecc.)* 1,5-2,0 Kg/ha. **Cereali**: contro Lema (*O. melanopa*), Nottue *(Agrotis spp.)*, Coppette (*T. cancriformis*) e Chironomi (*Chironomus spp.*) 1,5-2,0 Kg/ha. **Erba medica**: contro il Misurino (*N. florentina*) 150-200 g/hl. **Tabacco**: contro Pulce *(E. hirtipenniis)* e Nottue (*Agrotis spp, ecc..*) 150-200 g/hl.
Floreali, Ornamentali e Forestali in pieno campo ed in vivaio: contro Tripidi *(Thrips spp., ecc.)*, Bega *(C. pronubana)*, Tortricidi *(E. acerbella)* Tentredini *(A. rosae)* e Nottue *(Agrotis spp., ecc.)* 150-200 g/hl. **Pioppo**: contro Saperda *(Saperda spp.)*, Crisomela *(M. populi)*, Cimicetta *(M. unicostata)*, Ifantria *(H. cunea)*, Bucefala *(P. bucephala)*, Bombice *(L. salicis)* e Tarlo vespa *(P. tabaniformis)* 200-250 g/hl.
COMPATIBILITÀ: il prodotto non é miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': dato l'elevato potere marcante del formulato, evitare di trattare su melo Golden Delicious e cultivar similari in prossimità della raccolta. **RISCHI DI NOCIVITA'**: il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per la fauna selvatica, gli insetti utili e le api. Non trattare durante la fioritura. **INTERVALLO DI SICUREZZA**: sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto su tutte le colture.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO -IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

AFIDINA 40 WG

Insetticida fosforganico a bassa tossicità in microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Fenitrotion puro g 40
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materie di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: Schirm GmbH – Division Sideco – Lübeck (D)
A.D.I.C.A. Srl – Nera Montoro (TR)
ISAGRO Spa – Aprilia (LT)
Stabilimento di Confezionamento: SCAM Spa – Modena

Distribuito da: ISAGRO ITALIA Srl - Via Caldera, 21 - Milano

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11582 del 6/02/2003

Kg 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10 / 20 **Partita n. :**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO **Sintomi:** colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali**: confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte**: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE AFIDINA 40 WG è un insetticida a bassa tossicità ed ampio spettro d'azione, impiegabile su un gran numero di colture arboree ed erbacee. Agisce per contatto e per ingestione nei confronti di numerose specie di insetti (afidi, tortricidi, tignole, nottue, cavolaie, dorifora, piralide, tripidi, cocciniglie, tingidi, ecc.).
MODALITA' e CAMPI DI IMPIEGO AFIDINA 40 WG può essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi:
Vite: contro le Tignole (*L. botrana, C. ambiguella, A. pulchellana*), Metcalfa (*M. pruinosa*), Nottue (*Noctua spp.)* 150-175 g/hl. Contro Scafoideo *(S. titanus)*, Cicaline (*E. flavescens, ecc.*), Tripidi (*D. reuteri, ecc.*), Acariosi *(C. vitis)* 175-200 g/hl. **Pomacee:** contro Carpocapsa (*C. pomonella*), Cidia (*C. molesta*), Mosca della frutta (*C. capitata*), Rodilegni (*C. cossus, Z. pyrina*) e Sesia (*S. myopaeformis, ecc.*) 200 g/hl. Svolge un'azione collaterale nei confronti di Falene, Tingidi, Orgia, Cicaline. **Fragola:** contro Eulia *(A. pulchellana)*, Pandemis (*P. dumetana)*, Nottue *(Agrotis spp., ecc.)* e Cicaline (*E. flavescens, ecc*) 175-200 g/hl. **Drupacee:** contro Anarsia (*A. lineatella*), Cidia (*Cydia spp.*), Tentredini *(Hoplocampa spp.)*, Tripidi (*T. major, ecc.)*, Cicaline *(E. flavescens, ecc.)*, Mosca (*C. capitata*), Forbicina *(Forficula spp.)* 175-200 g/hl; neanidi di Cocciniglie *(P. pentagona, ecc.)* 200-220 g/hl. **Agrumi**: contro Mosca (*C. capitata)*, Cimice verde (*C. trivialis*), Metcalfa (*M. pruinosa*), Formiche (*T. nigerrimum, ecc.*), Tortricidi (*A. rosanus, ecc.*), Tignola della zagara *(P. citri)* e Tripide (*H. haemorrhadalis*) 200 g/hl; neanidi di Cocciniglie (*S.oleae, P.citri,A. aurantii, ecc.*) 200-250 g/hl. **Castagno, Noce, Nocciolo**: contro Afidi (*C. avellanae, ecc.*), Cimici *(G. acuteangulaus, ecc.)*, Balanino *(C. nucum)*, Anomala *(A. juni)*, Maggiolino *(Melolontha spp.)*, Carpocapsa (*C. pomonella, ecc.)*, Lecanio (*E. coryli*) e Altica (*H. brevicollins*) 175-200 g/hl. **Olivo**: contro Mosca (*D. Oleae)*, Tignola (*P.oleae*), Liotripide (*L. oleae*), Margaronia (*M. unionalis*), Tripide *(D. reuteri, ecc.)* 200 g/hl. **Cavoli**: contro Mosca *(H. brassicae)*, Nottue e Cavolaie (*M. brassicae, Pieris spp., ecc.*), Punteruoli *(Baris spp., ecc.)* 175-200 g/hl. **Carciofo, Cardo, Asparago, Sedano, Finocchio, Porro**: contro Casside (*C.deflorata*), Vanessa (*V. cardui*), Mosche *(P. heraclei, D. platura, ecc.)*, Criocere *(C. asparagi, ecc.)*, Nottue e Depressaia (*D. erinaceella, ecc.*) 175-200 g/hl. **Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Rucola, Spinacio, Bietola da foglia e da costa, Prezzemolo, Erba cipollina**: contro Afidi, Tipule, Nottue, Mamestra, Mosca 150-200 g/hl. **Patata, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Zucca, Zucchino, Melone, Cocomero, Mais dolce**: contro Afidi, Cimici, Nottue, Dorifora (*L. decemlineata*) 200-250 g/hl. **Legumi**: contro Nottue *(Agrotis spp.)*, Calocoride (*C. norvegicus*) e Mosca *(D. platura)* 150-200 g/hl. **Bietola rossa, Carota, Sedano rapa, Ravanello, Rapa**: contro Afidi, Punteruolo, Mosca 150-200 g/hl. **Cipolla Aglio, Scalogno**: contro Tignola (*A. assectella*), Mosca (*Delia spp.*) Tripide *(T. tabaci)* e Cosside (*D. ulula*) 200 g/hl aggiungendo bagnante adesivo. **Barbabietola da zucchero**: contro Altica (*C. tibialis*), Cleono (*T. mendicus*), Lisso (*L. junci*), Casside *(Cassida spp.)*, Nottue e Mamestra *(Agrotis spp., ecc.)* 1,5-2,0 Kg/ha. **Cereali**: contro Lema (*O. melanopa*), Nottue *(Agrotis spp.)*, Coppette (*T. cancriformis*) e Chironomi (*Chironomus spp.*) 1,5-2,0 Kg/ha. **Erba medica**: contro il Misurino (*N. florentina*) 150-200 g/hl. **Tabacco**: contro Pulce *(E. hirtipennis)* e Nottue (*Agrotis spp, ecc.*.) 150-200 g/hl.
Floreali, Ornamentali e Forestali in pieno campo ed in vivaio: contro Tripidi *(Thrips spp., ecc.)*, Bega *(C. pronubana)*, Tortricidi *(E. acerbella)* Tentredini *(A. rosae)* e Nottue *(Agrotis spp., ecc.)* 150-200 g/hl. **Pioppo**: contro Saperda *(Saperda spp.)*, Crisomela *(M. populi)*, Cimicetta *(M. unicostata)*, Ifantria *(H. cunea)*, Bucefala *(P. bucephala)*, Bombice *(L. salicis)* e Tarlo vespa *(P. tabaniformis)* 200-250 g/hl.
COMPATIBILITÀ: il prodotto non é miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': dato l'elevato potere marcante del formulato, evitare di trattare su melo Golden Delicious e cultivar similari in prossimità della raccolta.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per la fauna selvatica, gli insetti utili e le api. Non trattare durante la fioritura.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto su tutte le colture.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

MICOCUR R 4-38

Fungicida in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Cimoxanil puro		**g**	**4**
- Rame metallo puro (sottoforma di ossicloruro)		**g**	**38**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g**	**100**

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena

Distribuito da: SUN COMPANY S.r.l. – Corso Buenos Aires, 77/A - Milano

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11601 del 20/02/2003

Kg 0,100 / 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10 **Partita n.:**

NORME PRECAUZIONALI Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive CIMOXANIL 4%, RAME METALLO 38%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: **CIMOXANIL** derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
RAME Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica. **Controindicazioni: ---- Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
MICOCUR R 4-38 è un fungicida efficace contro la Peronospora della vite e di numerose colture orticole ed industriali. L'associazione dei due principi attivi che agiscono sia per penetrazione nei tessuti vegetali (Cimoxanil) che per contatto (Rame) assicura rapidità, persistenza d'azione e resistenza al dilavamento.
MICOCUR R 4-38 è indicato per la protezione delle seguenti colture:
Vite: contro la Peronospora (*P. viticola*) alla dose di 200-300 g/hl, iniziando gli interventi quando si verificano le condizioni (andamento climatico, fase fenologica della coltura, ecc.) favorevoli allo sviluppo delle infezioni primarie e proseguendoli ad intervalli di 6-8 giorni fino a quando persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
Patata, Pomodoro, Lattuga, Spinacio, Melone, Zucchino, Cipolla, Aglio, Porro, Pisello, Carciofo, Girasole, Soia, Tabacco, Rosa: contro la Peronospora (*Phytophtora infestans, Bremia lactucae, Peronospora spinaciae, Pseudoperonospora cubensis, Peronospora schledeni, Phytophtora porri, Peronospora pisi, Peronospora helianthi, Peronospora manshurica, Peronospora tabacina, Peronospora sparsa*) alla dose di 200-300 g/hl iniziando i trattamenti quando si verificano le condizioni idonee allo sviluppo del patogeno. Utilizzare sempre un volume di acqua appropriato al fine di garantire una completa ed uniforme bagnatura delle superfici vegetali ed un adeguato apporto di prodotto. Nelle applicazioni su Cipolla, Aglio e Porro aggiungere un bagnante adesivo.
COMPATIBILITA': il prodotto non é compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura. **NOCIVITA'**: il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA Sospendere i trattamenti: 20 giorni prima della raccolta per Vite, Patata, Pomodoro, Lattuga, Spinacio, Melone, Zucchino, Cipolla, Aglio, Porro, Pisello, Tabacco. - 21 giorni per il Carciofo. - 28 giorni per Girasole e Soia.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO-IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

MICOCUR R 4-38

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE
IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Cimoxanil puro g 4
- Rame metallo puro g 38
(sottoforma di ossicloruro)
- Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Da sciogliere in acqua senza rompere

Contenuto 0,250 – 0,500 – 1 Kg

Avvertenza: leggere l'etichetta riportata sulla confezione prima di utilizzare il prodotto

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164
41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11601 del 20/02/2003

MICOCUR R 4-38

Fungicida in polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Cimoxanil puro		**g**	**4**
- Rame metallo puro (sottoforma di ossicloruro)		**g**	**38**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g**	**100**

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena -

Distribuito da: SUN COMPANY S.r.l. – Corso Buenos Aires, 77/A - Milano

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11601 del 20/02/2003

kg 1 (= 2 sacchetti da 500 g), kg 1 (= 4 sacchetti da 250 g),
kg 5 (= 10 sacchetti da 500 g), kg 5 (= 5 sacchetti da 1 kg) Partita n.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive CIMOXANIL 4%, RAME METALLO 38%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: **CIMOXANIL** derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **RAME** Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** sintomatica. **Controindicazioni:** ---- **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO CIM/ORAM è un fungicida efficace contro la Peronospora della vite e di numerose colture orticole ed industriali. L'associazione dei due principi attivi che agiscono sia per penetrazione nei tessuti vegetali (Cimoxanil) che per contatto (Rame) assicura rapidità, persistenza d'azione e resistenza al dilavamento. CIMORAM è indicato per la protezione delle seguenti colture:
Vite: contro la Peronospora (*P. viticola*) alla dose di 200-300 g/hl, iniziando gli interventi quando si verificano le condizioni (andamento climatico, fase fenologica della coltura, ecc.) favorevoli allo sviluppo delle infezioni primarie e proseguendoli ad intervalli di 6-8 giorni fino a quando persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. **Patata, Pomodoro, Lattuga, Spinacio, Melone, Zucchino, Cipolla, Aglio, Porro, Pisello, Carciofo, Girasole, Soia, Tabacco, Rosa:** contro la Peronospora (*Phytophtora infestans, Bremia lactucae, Peronospora spinaciae, Pseudoperonospora cubensis, Peronospora schledeni, Phytophtora porri, Peronospora pisi, Peronospora helianthi, Peronospora manshurica, Peronospora tabacina, Peronospora sparsa*) alla dose di 200-300 g/hl iniziando i trattamenti quando si verificano le condizioni idonee allo sviluppo del patogeno. Utilizzare sempre un volume di acqua appropriato al fine di garantire una completa ed uniforme bagnatura delle superfici vegetali ed un adeguato apporto di prodotto. Nelle applicazioni su Cipolla, Aglio e Porro aggiungere un bagnante adesivo.
COMPATIBILITA': il prodotto non é compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.
AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all'introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura. **NOCIVITA':** il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA Sospendere i trattamenti: 20 giorni prima della raccolta per Vite, Patata, Pomodoro, Lattuga, Spinacio, Melone, Zucchino, Cipolla, Aglio, Porro, Pisello, Tabacco. - 21 giorni per il Carciofo. - 28 giorni per Girasole e Soia.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO-NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE - NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE – Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE - DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE**

25%

1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua

2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti

3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore

4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti e ...

5) ... aggiungere la restante parte d'acqua, necessaria alla corretta bagnatura de la vegetazione.

DUOVEISS®

Fungicida per la difesa di frumento e orzo,
dei campi da golf, tappeti erbosi e prati ornamentali in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Procloraz puro g 46,1
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materie di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano-Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena

Distribuito da: Scotts Italia Srl Viale Montegrappa, 18 - Treviso

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11602 del 20/02/2003

Kg 0,100 / 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10

Partita n. :

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento.
INFORMAZIONI PER IL MEDICOSintomi: nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea), deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE
DUOVEISS è un fungicida imidazolico efficace contro numerosi patogeni quali Fusariosi *(Michrodochium (Fusarium) nivale, Fusarium spp.),* Cercosporella (*Cercosporella herpotricoides*), Elmintosporiosi *(Helmynthosporium gramineum, Dreschlera spp.),* Rincosporiosi *(Rhyncosporium secalis),* Antracnosi *(Colletotricum graminicola),* Botrite *(Botrytis spp.),* Alternaria *(Alternaria spp.),* Dollar spot (*Sclerotinia homeocarpa).* Agisce sia in via preventiva che curativa, mediante contatto e penetrazione con diffusione traslaminare.
MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO
Colture floreali ed ornamentali: DUOVEISS è indicato per il controllo dei marciumi che si insediano sul colletto e sull'apparato radicale (*Fusarium spp., Verticillium spp., Sclerotinia spp., ecc.*) per immersione dei bulbi (gladiolo, tulipano, icsia) o delle talee delle colture floreali ed ornamentali alla dose di 50-100 g/hl di formulato. Su rosa e garofano contro i marciumi sopra indicati, oidio e muffa grigia, il prodotto può essere impiegato anche per la disinfezione del terreno alla dose di 15 g/100 m² o per trattamenti alla parte aerea (massimo 2 applicazioni all'anno) alla dose di 50-100 g/hl di formulato;
Campi da golf, tappeti erbosi e prati ornamentali: DUOVEISS va impiegato alla dose di 100 g/100 m², avendo cura di bagnare abbondantemente ed in maniera accurata il manto erboso; contro Marciume rosa (*Fusarium nivale*) utilizzare 50-70 g/100m². Iniziare le applicazioni quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo dei patogeni e ripeterle 2-3 volte ad intervalli di 10-14 giorni.
COMPATIBILITA': Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA': non contaminare stagni, fossi, vie d'acqua con i residui del lavaggio delle attrezzature usate per il trattamento.
INTERVALLO DI SICUREZZA: non rientrare nelle aree trattate prima di 24 ore dal trattamento. Segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del prodotto fitosanitario.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

® marchio registrato dalla Scotts International B.V.

CLEANER 22

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Clorpirifos-metile puro g 22,1 (= 223 g/l)

- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: rischio di gravi lesioni oculari. Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa Modena

Distribuito da: S.I.V.A.M. S.p.A. – Via Scarlatti, 30 - Milano

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11603 del 20/02/2003

L 1 - 5 - 10 **Partita n. :**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralicossima. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

CLEANER 22 è un insetticida fosforganico che esplica la propria azione per contatto, per ingestione e, più limitatamente in fase di vapore.

Risulta indicato sulle seguenti colture:

Melo, Pero, Pesco: contro tortricidi ricamatori *(Archips spp, Pandemis spp., A. orana, A. pulchellana, H. nubifera, Recurvaria spp., Hypomoneuta spp., ecc.)*, Carpocapsa *(C. pomonella)*, Cidia orientale (*C. molesta*), Anarsia (*A. lineatella*), Mosca della frutta *(C. capitata)*. 200-250 ml/hl. Contro le neanidi di Cocciniglie *(Q. perniciosus, ecc.)* 200-250 ml/hl.

Arancio, Limone, Mandarino, Clementino: contro Tignola della zagara *(P. citri)*, Cimicetta verde *(C. trivialis)*, Formiche *(L. humile, C. nylanderi, ecc.)*, Metcalfa *(M. pruinosa)*, e neanidi di Cocciniglie *(A. aurantii, A. nerei, Coccus spp., Ceroplastes spp., S. oleae, ecc.)* 250 ml/hl

Vite: contro le Tignole *(L. botrana, C. ambiguella, A. pulchellana)*, Cicaline (*S. titanus, E. flavescens, ecc*) Tripidi *(D. reuteri, Franklinella spp., ecc.)*, Nottue *(Noctua spp.)*, Metcalfa *(M. pruinosa)*, e neanidi di Cocciniglie *(T. vitis, ecc.)* 100-200 ml/hl. Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cultivar sensibili; si raccomandano pertanto saggi zonali e varietali.

Fragola: contro Tripidi (*F. occidentalis, ecc*.), Nottue (*Agrotis spp., ecc*.), Afidi (*S. fragarie, ecc*.), Tortricidi (*E. pulchellana, P. dumetana, ecc*.) 300-400 ml/hl.

Pomodoro, Peperone, Melanzana, Pisello, Ravanello, Patata: contro Nottue *(Agrotis spp., Mamestra spp., ecc.)*, Tripidi *(T. tabaci, ecc.)*, Gortina *(Gortyna spp.)*, Cavolaia *(P. brassicae)*, Macaone *(Papillio spp.)*, Dorifora *(L. decemlineata)*, 1,5-2,0 l/Ha .

Mais: contro Nottue *(Agrotis spp.)*, Piralide *(O. nubilalis)* ed Elateridi *(Agroties spp.)* 300 ml/hl.

Pioppo: contro Saperda *(Saperda spp.)*, Gemmaiola *(G. acerina)*, Criptorrinco *(C. lapathi)*, Ifantria *(H. cunea)* 400-500 ml/hl.

Garofano, Crisantemo, Azalea, Ciclamino: contro Bega , Tortricidi, Oziorrinco e neanidi di Cocciniglie 200 ml/hl.

COMPATIBILITA': non è miscibile con formulari a reazione alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non impiegare il prodotto sulle varietà di melo Stayman Red, Stayman Winesap, Gloster, Gallia Beauty. In post-fioritura del melo non eseguire più di 2 trattamenti. Non effettuare trattamenti su Arancio nei mesi compresi tra gennaio ed aprile.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

CIROCHAMP

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER L'IMPIEGO IN FUNGICOLTURA

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
- Ciromazina pura g 15
- Coformulanti q.b. a g

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: non si conoscono casi di avvelenamento nell'uomo. In condizioni sperimentali si sono osservati nei ratti i seguenti sintomi di avvelenamento aspecifici: sedazione, dispnea, esoftalmo, posizione curva e pelo arruffato.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO
CIROCHAMP è un insetticida sistemico regolatore di crescita particolarmente efficace contro le larve di ditteri Sciaridi *(Licoriella spp.)* e Foridi *(Megaselia spp., ecc.)* che infestano i funghi coltivati.
Agisce interferendo nei processi di muta degli insetti, inibendo lo sviluppo delle larve e alterando la morfologia delle pupe.
CIROCHAMP viene assorbito dal micelio dei funghi e traslocato al corpo fruttifero ove esplica la sua azione; si caratterizza per la notevole rapidità e la lunga persistenza dell'attività insetticida.
Il prodotto va applicato alla terra di copertura della coltura alla dose di 250 g per 100 mq, diluito in 200 litri di acqua e applicato subito dopo la distribuzione della terra di copertura stessa.
Con forti attacchi ed in presenza di ditteri Foridi, è necessario effettuare precedentemente un trattamento direttamente sul composto alla dose di 25 g per tonnellata di composto diluiti in 20-30 litri di acqua.
CIROCHAMP deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione dei funghi, sia in capannone che in grotta o serra.

COMPATIBILITA': il prodotto può essere miscelato con i fungicidi (Procloraz, Tiobendazolo, ecc..) utilizzati in fungicoltura.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': CIROCHAMP è perfettamente selettivo per la coltivazione se impiegato nel momento e alle dosi consigliate; anzi si nota uno stimolo alla crescita del micelio fungino.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM S.p.a. - Modena

Distribuito da: CHEMICALS BRA S.r.l. – Via S.Giovanni Lupatoto, 24/b – Verona

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11622 del 05/03/2003

Kg 0,100 / 0,200 / 0,250 / 0,500 / 1 **Partita n.:**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

CIROCHAMP

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE
PER L'IMPIEGO IN FUNGICOLTURA
IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Ciromazina pura g 15
- Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

Da sciogliere in acqua senza rompere

Contenuto 250 – 500 g

Avvertenza: leggere l'etichetta riportata sulla confezione prima di utilizzare il prodotto

DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164
41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11622 del 05/03/2003

CIROCHAMP

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER L'IMPIEGO IN FUNGICOLTURA IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
- Ciromazina pura g 15
- Coformulanti q.b. a g

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: non si conoscono casi di avvelenamento nell'uomo. In condizioni sperimentali si sono osservati nei ratti i seguenti sintomi di avvelenamento aspecifici: sedazione, dispnea, esoftalmo, posizione curva e pelo arruffato.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO
CIROCHAMP è un insetticida sistemico regolatore di crescita particolarmente efficace contro le larve di ditteri Sciaridi *(Licoriella spp.)* e Foridi *(Megaselia spp., ecc.)* che infestano i funghi coltivati.
Agisce interferendo nei processi di muta degli insetti, inibendo lo sviluppo delle larve e alterando la morfologia delle pupe.
CIROCHAMP viene assorbito dal micelio dei funghi e traslocato al corpo fruttifero ove esplica la sua azione; si caratterizza per la notevole rapidità e la lunga persistenza dell'attività insetticida.
Il prodotto va applicato alla terra di copertura della coltura alla dose di 250 g per 100 mq, diluito in 200 litri di acqua e applicato subito dopo la distribuzione della terra di copertura stessa.
Con forti attacchi ed in presenza di ditteri Foridi, è necessario effettuare precedentemente un trattamento direttamente sul composto alla dose di 25 g per tonnellata di composto diluiti in 20-30 litri di acqua.
CIROCHAMP deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione dei funghi, sia in capannone che in grotta o serra.
COMPATIBILITA': il prodotto può essere miscelato con i fungicidi (Procloraz, Tiobendazolo, ecc..) utilizzati in fungicoltura.
AVVERTENZA D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all'introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione chiudere bene la scatola. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': CIROCHAMP è perfettamente selettivo per la coltivazione se impiegato nel momento e alle dosi consigliate; anzi si nota uno stimolo alla crescita del micelio fungino.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM S.p.a. - Modena

Distribuito da: CHEMICALS BRA S.r.l. – Via S.Giovanni Lupatoto, 24/b – Verona

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11622 del 05/03/2003

Kg 1 (= 4 sacchetti da 250 g) kg 1 (= 2 sacchetti da 500 g) Partita n.:

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE - DA NON VENDERSI SFUSO -DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE - DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE.

25%

1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua

2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti

3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore

4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ed…

5) …aggiungere la restante parte d'acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

GRIZZLY EC

DISERBANTE SELETTIVO IN EMULSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Oxifluorfen puro g 22 (= 240 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: infiammabile. Irritante per gli occhi e la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa Modena

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11654 del 18/04/2003

L 1/5/10 **Partita n.:**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento.
INFORMAZIONI MEDICHE: Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. **Terapia:** Sintomatica. Ospedalizzare. **Controindicazioni:** non provocare il vomito. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE: GRIZZLY EC è un diserbante selettivo per il diserbo di colture arboree ed erbacee, vivai di piante ornamentali e forestali, nonché argini, aree industriali e civili, bordi stradali, sedi ferroviarie. Agisce nei confronti delle infestanti essenzialmente per contatto; la sua efficacia e persistenza d'azione vengono esaltate durante il periodo autunno-primaverile. Controlla numerose malerbe, sia a foglia larga quali Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Anagallide *(Anagallis arvensis)*, Chenopodio *(Chenopodium spp.)*, Crisantemo *(Chrysantemum spp.)*, Stramonio *(Datura stramonium)*, Falsa ortica *(Lamium purpureum)*, Miagro *(Myagrum spp.)*, Erba mercorella *(Mercurialis annua)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Poligoni *(Poligonum spp.)*. Lattaiola *(Picris echioides)*, Erba porcellana *(Portulaca oleracea)*, Rafano *(Raphanus raphanistrum)*, Rapistro *(Raphistrum rugosum)*, Romici *(Rumex spp.)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Erba morella *(Solanum nigrum)*, Grespino *(Souchus oleraceus)*, Erba strega *(Stachys spp.)*, Veronica *(Veronica spp.)*, Spino d'asino *(Xantium spp.)*, *ecc.* che graminacee del tipo Avena *(Avena spp.)*, Coda di volpe *(Alopecurus spp.)*, Lollio *(Lolium spp.)*, *ecc.*
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO Vite, Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Susino, Arancio, Limone, Pompelmo, Mandorlo, Nocciolo:
a) Pre-emergenza delle infestanti: il prodotto va impiegato preferibilmente nel tardo autunno-inizio inverno su terreno lavorato, privo di infestanti emerse alla dose di 3-4 litri Ha. La dose più elevata deve essere utilizzata nei trattamenti primaverili.
b) Post-emergenza delle infestanti: GRIZZLY EC deve essere impiegato alla dose di 4-5 l/Ha in miscela con erbicidi ad attività fogliare (dipiridillici, ecc.). Per ottenere un controllo completo delle malerbe per tutta la stagione devono essere effettuati di norma due trattamenti all'anno.
c) Post-emergenza su graminacee perenni: in presenza di *Cynodon spp., Agropyron spp., Agrostis spp., Bromus spp.*, utilizzare GRIZZLY EC alla dose di 5 l/Ha in miscela con graminicidi specifici. Intervenire su infestanti sufficientemente sviluppate ed in fase di attiva crescita.
Olivo:
a) Pre e Post-emergenza delle infestanti: GRIZZLY EC può essere utilizzato su impianti in produzione durante tutto il ciclo della coltura e fino ad una settimana prima della raccolta delle olive alla dose di 2-3 l/Ha.
Cipolla, Aglio: GRIZZLY EC deve essere utilizzato alla dose di 1,5 l/Ha prima dell'emergenza (o all'inizio dell'emergenza) delle infestanti, con la coltura allo stadio delle 2-4 foglie vere. L'Aglio può essere diserbato anche in pre-emergenza alla dose di 1,0-1,5 l/Ha. La Cipolla può presentare, dopo il trattamento, qualche tacca biancastra sulle foglie e gli apici vegetativi clorotici. Tale fenomeno, assolutamente transitorio, non ha alcuna influenza sull'accrescimento e sulla produttività della coltura.
Girasole: il prodotto va utilizzato alla dose di 1 l/Ha in pre-emergenza della coltura. Piogge violente durante l'emergenza possono produrre temporanei effetti fitotossici sulle prime foglie che scompaiono in breve tempo.
Carciofo: GRIZZLY EC può essere impiegato
a) Pre-emergenza della coltura: (subito dopo l'impianto o la riattivazione della coltura) alla dose di 1,0-1,5 l/Ha
b) Post-emergenza della coltura: quando *l'Oxalis spp.* si trova nelle prime fasi fenologiche alla dose di 2-3 l/Ha, eventualmente in miscela con erbicidi totali ad attività fogliare (dipiridillici, ecc.). Le piante di Carciofo devono essere protette con un'opportuna schermatura al fine di evitare fenomeni di fitotossicità.

Cavoli: il prodotto va impiegato in pre-trapianto (da alcuni giorni fino ad 1 giorno prima della messa a dimora) alla dose di 2,0-3,0 l/Ha, su terreno già pronto per accogliere la coltura. Utilizzare piantine ben sviluppate (12-15 cm) e non filate.
Vivai di Piante Ornamentali e Forestali: utilizzare il prodotto prima dell'emergenza delle infestanti annuali alla dose di 5.0-8.0 l/Ha, trattando uniformemente la superficie da diserbare. Per il controllo del convolvolo effettuare 2 trattamenti rispettivamente all'inizio della fioritura e sui ricacci lunghi 40-50 cm. Su essenze resinose GRIZZLY EC può essere distribuito sulla vegetazione prima dell'emissione dei nuovi germogli. Su Pioppo e Eucalipto intervenire a fine inverno prima della ripresa vegetativa.
Argini, Aree Industriali e Civili, Bordi stradali, Sedi ferroviarie:
GRIZZLY EC va impiegato nel diserbo non selettivo in pre-emergenza delle malerbe alla dose di 4-5 l/Ha. Nel caso fossero presenti infestanti già sviluppate, applicare il GRIZZLY EC alla dose di 2-3 l/Ha in miscela con un erbicida di post-emergenza.
Utilizzare volumi d'acqua compresi fra i di 300 e gli 800 l/Ha, in grado di garantire una completa ed uniforme bagnatura del terreno e delle infestanti.
COMPATIBILITA': GRIZZLY EC è compatibile con formulati a base di Triazine, Glifosate, Glifosate-trimesio, Glufosinate-ammonio, Paraquat.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Negli interventi su Vite, Pomacee, Drupacee, Mandorlo, Nocciolo deve essere prestata particolare attenzione a non colpire la vegetazione, direttamente o per deriva, delle colture poiché, se inavvertitamente bagnata, potrà dare origine a necrosi localizzate dei tessuti. Tale fenomeno può verificarsi anche in concomitanza di violente precipitazioni che determinano schizzi di terreno contenenti l'erbicida sull'apparato fogliare; di norma non si hanno conseguenze sullo sviluppo e sulla produttività della coltura. Impiegare impianti di distribuzione operanti a basse pressioni e muniti di ugelli antideriva. Non applicare GRIZZLY EC con temperature superiori a 25° al fine di evitare fenomeni di deriva ed evaporazione che potrebbero dare luogo a fitotossicità.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIOEN IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

PUZZLE L.S.

Fungicida liquido solubile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- **Triadimenol puro g 22,9 (= 249,61 g/l)**
- **Coformulanti q.b. a g 100**

FRASI DI RISCHIO: irritante per gli occhi e la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena

Distribuito da: AGRISYSTEM Srl - C.da Rotoli – Lamezia Terme (CZ)

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11665 del 18/04/2003

L 0,100 / 0,250 / 0,500 / 1 /5 **Partita n. :**

NORME PRECAUZIONALI: non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Triadimenol organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.
MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO PUZZLE L.S. è un fungicida triazolico ad attività sistemica particolarmente efficace contro l'oidio o "mal bianco" delle colture. Agisce preventivamente, curativamente ed in modo "eradicante" assicurando una completa protezione della vegetazione. Può essere impiegato sulle seguenti colture:
VITE:
-(da vino); 10-15 ml/hl effettuando gli interventi ad intervalli di 12-14 giorni.
-(da tavola): 12,5-15 ml/hl trattando a cadenze di 10-12 giorni.
Nel caso si intervenga su infezioni già in atto o in situazioni di particolare criticità per la malattia, aumentare la dose a 20 ml/hl e ridurre prudenzialmente l'intervallo a 9-10 giorni.
PUZZLE L.S. esercita alle dosi maggiori tra quelle indicate attività collaterale nei riguardi del marciume nero o Black-Rot *(G. bidwelli).*
MELO: 10-15 ml//hl; svolge un'efficace azione collaterale nei confronti della Ticchiolatura (*V. inaequalis).*
MELONE, ZUCCHINO, CETRIOLO, PEPERONE, POMODORO: 10-20 ml/hl intervenendo ogni 7-10 giorni in funzione della sensibilità varietale e della pressione della malattia. **FRUMENTO, ORZO:** 0,4-0,5 l/Ha intervenendo alla comparsa dei primi sintomi
PUZZLE L.S. controlla efficacemente anche Ruggini (*Puccinia spp., ecc.*), Septoria (*Septoria spp.*), Elmintosporiosi (*Helminthosporium spp.*) e Rincosporiosi (*Rincosporum spp.*) **COLTURE ORNAMENTALI:** 10-20 ml/hl, avendo cura di bagnare accuratamente la vegetazione. PUZZLE L.S. controlla efficacemente anche Ruggini, Septoria.
COMPATIBILITÀ: evitare le miscele con preparati a reazione fortemente alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': su cultivar di Melo sensibili alla rugginosità della buccia impiegare solo fino alla fioritura.
PERIODO DI CARENZA Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta:
- 7 giorni per lo Zucchino, 14 giorni per Vite, Melo, Melone, Cetriolo, Peperone e Pomodoro - 30 giorni per Frumento e Orzo.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

FENNY WDG

Insetticida fosforganico a bassa tossicità in microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Fenitrotion puro g 40
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: Schirm GmbH – Division Sideco – Lübeck (D)
A.D.I.C.A. Srl – Nera Montoro (TR)
Stabilimento di Confezionamento: SCAM Spa – Modena

Distribuito da: S.I.V.A.M. S.p.A. – Via Scarlatti, 30 - Milano

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11676 del 13/05/2003

Kg 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10 / 20 **Partita n.:**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO **Sintomi:** colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali**: confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte**: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE FENNY WDG è un insetticida a bassa tossicità ed ampio spettro d'azione, impiegabile su un gran numero di colture arboree ed erbacee. Agisce per contatto e per ingestione nei confronti di numerose specie di insetti (afidi, tortricidi, tignole, nottue, cavolaie, dorifora, piralide, tripidi, cocciniglie, tingidi, ecc.).
MODALITA' e CAMPI DI IMPIEGO FENNY WDG può essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi:
Vite: contro le Tignole (*L. botrana, C. ambiguella, A. pulchellana*), Metcalfa (*M. pruinosa*), Nottue (*Noctua spp.)* 150-175 g/hl. Contro Scafoideo *(S. titanus)*, Cicaline (*E. flavescens, ecc.*), Tripidi (*D. reuteri, ecc.*), Acariosi *(C. vitis)* 175-200 g/hl. **Pomacee:** contro Carpocapsa (*C. pomonella*), Cidia (*C. molesta*), Mosca della frutta (*C. capitata*), Rodilegni (*C. cossus, Z. pyrina*) e Sesia (*S. myopaeformis, ecc.*) 200 g/hl. Svolge un'azione collaterale nei confronti di Falene, Tingidi, Orgia, Cicaline. **Fragola**: contro Eulia *(A. pulchellana)*, Pandemis (*P. dumetana*), Nottue *(Agrotis spp., ecc.)* e Cicaline (*E. flavescens, ecc*) 175-200 g/hl. **Drupacee:** contro Anarsia (*A. lineatella*), Cidia (*Cydia spp.*), Tentredini *(Hoplocampa spp.)*, Tripidi (*T. major, ecc.)*, Cicaline *(E. flavescens, ecc.)*, Mosca (*C. capitata*), Forbicina *(Forficula spp.)* 175-200 g/hl; neanidi di Cocciniglie *(P. pentagona, ecc.)* 200-220 g/hl. **Agrumi**: contro Mosca (*C. capitata)*, Cimice verde (*C. trivialis*), Metcalfa (*M. pruinosa*), Formiche (*T. nigerrimum, ecc.*), Tortricidi (*A. rosanus, ecc.*), Tignola della zagara *(P. citri)* e Tripide (*H. haemorrhadalis*) 200 g/hl; neanidi di Cocciniglie (*S.oleae, P.citri,A. aurantii, ecc.*) 200-250 g/hl. **Castagno, Noce, Nocciolo**: contro Afidi (*C. avellanae, ecc.*), Cimici *(G. acuteangulaus, ecc.),* Balanino *(C. nucum),* Anomala *(A. juni),* Maggiolino *(Melolontha spp.),* Carpocapsa (*C. pomonella, ecc.),* Lecanio (*E. coryli*) e Altica (*H. brevicollins*) 175-200 g/hl. **Olivo**: contro Mosca (*D. Oleae)*, Tignola (*P.oleae*), Liotripide (*L. oleae*), Margaronia (*M. unionalis*), Tripide *(D. reuteri, ecc.)* 200 g/hl. **Cavoli**: contro Mosca *(H. brassicae)*, Nottue e Cavolaie (*M. brassicae, Pieris spp., ecc.*). Punteruoli *(Baris spp., ecc.)* 175-200 g/hl. **Carciofo, Cardo, Asparago, Sedano, Finocchio, Porro**: contro Casside (*C.deflorata*), Vanessa (*V. cardui*), Mosche *(P. heraclei, D. platura, ecc.)*, Criocere *(C. asparagi, ecc.)*, Nottue e Depressaia (*D. erinaceella, ecc.*) 175-200 g/hl. **Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Rucola, Spinacio, Bietola da foglia e da costa, Prezzemolo, Erba cipollina**: contro Afidi. Tipule, Nottue, Mamestra, Mosca 150-200 g/hl. **Patata, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Zucca, Zucchino, Melone, Cocomero, Mais dolce**: contro Afidi, Cimici, Nottue, Dorifora (*L. decemlineata*) 200-250 g/hl. **Legumi**: contro Nottue *(Agrotis spp.)*, Calocoride (*C. norvegicus*) e Mosca *(D. platura)* 150-200 g/hl. **Bietola rossa, Carota, Sedano rapa, Ravanello, Rapa**: contro Afidi, Punteruolo, Mosca 150-200 g/hl. **Cipolla Aglio, Scalogno**: contro Tignola (*A. assectella*), Mosca (*Delia spp.*) Tripide *(T. tabaci)* e Cosside (*D. ulula*) 200 g/hl aggiungendo bagnante adesivo. **Barbabietola da zucchero**: contro Altica (*C. tibialis*), Cleono (*T. mendicus*), Lisso (*L. junci*), Casside *(Cassida spp.)*, Nottue e Mamestra *(Agrotis spp., ecc.)* 1,5-2,0 Kg/ha. **Cereali**: contro Lema (*O. melanopa*), Nottue *(Agrotis spp.)*, Coppette (*T. cancriformis*) e Chironomi (*Chironomus spp.*) 1,5-2,0 Kg/ha. **Erba medica**: contro il Misurino (*N. florentina*) 150-200 g/hl. **Tabacco**: contro Pulce *(E. hirtipenniis)* e Nottue (*Agrotis spp, ecc..*) 150-200 g/hl.
Floreali, Ornamentali e Forestali in pieno campo ed in vivaio: contro Tripidi *(Thrips spp., ecc.)*, Bega *(C. pronubana)*, Tortricidi *(E. acerbella)* Tentredini *(A. rosae)* e Nottue *(Agrotis spp., ecc.)* 150-200 g/hl. **Pioppo**: contro Saperda *(Saperda spp.)*, Crisomela *(M. populi)*, Cimicetta *(M. unicostata)*, Ifantria *(H. cunea)*, Bucefala *(P. bucephala)*, Bombice *(L. salicis)* e Tarlo vespa *(P. tabaniformis)* 200-250 g/hl.
COMPATIBILITÀ: il prodotto non é miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': dato l'elevato potere marcante del formulato, evitare di trattare su melo *Golden Delicious* e cultivar similari in prossimità della raccolta.

RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per la fauna selvatica, gli insetti utili e le api. Non trattare durante la fioritura.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto su tutte le colture.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

Metcalkill®

Insetticida fosforganico a bassa tossicità in microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Fenitrotion puro g 40
- Coformulanti q.b. a g 100
® marchio registrato dalla Scotts International B.V.

FRASI DI RISCHIO: altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: Schirm GmbH – Division Sideco – Lübeck (Germania)
A.D.I.C.A. Srl – Nera Montoro (TR)
ISAGRO Spa – Aprilia (LT)
Stabilimento di Confezionamento: SCAM Spa – Modena

Distribuito da: Scotts Italia Srl Viale Montegrappa, 18 - Treviso

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11777 del 09/09/2003

Kg 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10 / 20 **Partita n.:**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO **Sintomi:** colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali**: confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte**: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE METCALKILL è un insetticida a bassa tossicità ed ampio spettro d'azione, impiegabile su un gran numero di colture arboree ed erbacee. Agisce per contatto e per ingestione nei confronti di numerose specie di insetti (afidi, tortricidi, tignole, nottue, cavolaie, dorifora, piralide, tripidi, cocciniglie, tingidi, ecc.).
MODALITA' e CAMPI DI IMPIEGO METCALKILL può essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi:
Vite: contro le Tignole (*L. botrana, C. ambiguella, A. pulchellana*), Metcalfa (*M. pruinosa*), Nottue (*Noctua spp.)* 150-175 g/hl. Contro Scafoideo *(S. titanus)*, Cicaline (*E. flavescens, ecc.*), Tripidi (*D. reuteri, ecc.*), Acariosi *(C. vitis)* 175-200 g/hl. **Pomacee**: contro Carpocapsa (*C. pomonella*), Cidia (*C. molesta*), Mosca della frutta (*C. capitata*), Rodilegni (*C. cossus, Z. pyrina*) e Sesia (*S. myopaeformis, ecc.*) 200 g/hl. Svolge un'azione collaterale nei confronti di Falene, Tingidi, Orgia, Cicaline. **Fragola**: contro Eulia *(A. pulchellana)*, Pandemis (*P. dumetana)*, Nottue *(Agrotis spp., ecc.)* e Cicaline (*E. flavescens, ecc*) 175-200 g/hl. **Drupacee**: contro Anarsia (*A. lineatella*), Cidia (*Cydia spp.*), Tentredini *(Hoplocampa spp.)*, Tripidi (*T. major, ecc.)*, Cicaline *(E. flavescens, ecc.)*, Mosca (*C. capitata*), Forbicina *(Forficula spp.)* 175-200 g/hl; neanidi di Cocciniglie *(P. pentagona, ecc.)* 200-220 g/hl. **Agrumi**: contro Mosca (*C. capitata*), Cimice verde (*C. trivialis*), Metcalfa (*M. pruinosa*), Formiche (*T. nigerrimum, ecc.*), Tortricidi (*A. rosanus, ecc.*), Tignola della zagara *(P. citri)* e Tripide (*H. haemorrhadalis*) 200 g/hl; neanidi di Cocciniglie (*S.oleae, P.citri,A. aurantii, ecc.*) 200-250 g/hl. **Castagno, Noce, Nocciolo**: contro Afidi (*C. avellanae, ecc.*), Cimici *(G. acuteangulaus, ecc.)*, Balanino *(C. nucum)*, Anomala *(A. juni)*, Maggiolino *(Melolontha spp.)*, Carpocapsa (*C. pomonella, ecc.)*, Lecanio (*E. coryli*) e Altica (*H. brevicollins*) 175-200 g/hl. **Olivo**: contro Mosca (*D. Oleae*), Tignola (*P.oleae*), Liotripide (*L. oleae*), Margaronia (*M. unionalis*), Tripide *(D. reuteri, ecc.)* 200 g/hl. **Cavoli**: contro Mosca *(H. brassicae)*, Nottue e Cavolaie (*M. brassicae, Pieris spp., ecc.*), Punteruoli *(Baris spp., ecc.)* 175-200 g/hl. **Carciofo, Cardo, Asparago, Sedano, Finocchio, Porro**: contro Casside (*C.deflorata*), Vanessa (*V. cardui*), Mosche *(P. heraclei, D. platura, ecc.)*, Criocere *(C. asparagi, ecc.)*, Nottue e Depressaia (*D. erinaceella, ecc.*) 175-200 g/hl. **Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Rucola, Spinacio, Bietola da foglia e da costa, Prezzemolo, Erba cipollina**: contro Afidi, Tipule, Nottue, Mamestra, Mosca 150-200 g/hl. **Patata, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Zucca, Zucchino, Melone, Cocomero, Mais dolce**: contro Afidi, Cimici, Nottue, Dorifora (*L. decemlineata*) 200-250 g/hl. **Legumi**: contro Nottue *(Agrotis spp.)*, Calocoride (*C. norvegicus*) e Mosca *(D. platura)* 150-200 g/hl. **Bietola rossa, Carota, Sedano rapa, Ravanello, Rapa**: contro Afidi, Punteruolo, Mosca 150-200 g/hl. **Cipolla Aglio, Scalogno**: contro Tignola (*A. assectella*), Mosca (*Delia spp.*) Tripide *(T. tabaci)* e Casside (*D. ulula*) 200 g/hl aggiungendo bagnante adesivo. **Barbabietola da zucchero**: contro Altica (*C. tibialis*), Cleono (*T. mendicus*), Lisso (*L. junci*), Casside *(Cassida spp.)*, Nottue e Mamestra *(Agrotis spp., ecc.)* 1,5-2,0 Kg/ha. **Cereali**: contro Lema (*O. melanopa*), Nottue *(Agrotis spp.)*, Coppette (*T. cancriformis*) e Chironomi (*Chironomus spp.*) 1,5-2,0 Kg/ha. **Erba medica**: contro il Misurino (*N. florentina*) 150-200 g/hl. **Tabacco**: contro Pulce *(E. hirtipennis)* e Nottue (*Agrotis spp, ecc.*.) 150-200 g/hl.
Floreali, Ornamentali e Forestali in pieno campo ed in vivaio: contro Tripidi *(Thrips spp., ecc.)*, Bega *(C. pronubana)*, Tortricidi *(E. acerbella)* Tentredini *(A. rosae)* e Nottue *(Agrotis spp., ecc.)* 150-200 g/hl. **Pioppo**: contro Saperda *(Saperda spp.)*, Crisomela *(M. populi)*, Cimicetta *(M. unicostata)*, Ifantria *(H. cunea)*, Bucefala *(P. bucephala)*, Bombice *(L. salicis)* e Tarlo vespa *(P. tabaniformis)* 200-250 g/hl.
COMPATIBILITÀ: il prodotto non é miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': dato l'elevato potere marcante del formulato, evitare di trattare su melo Golden Delicious e cultivar similari in prossimità della raccolta.

RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per la fauna selvatica, gli insetti utili e le api. Non trattare durante la fioritura.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto su tutte le colture.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

SKORPIO EC

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Clorpirifos-metile puro g 22,1 (= 223 g/l)

- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: rischio di gravi lesioni oculari. Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa Modena

Distribuito da: AGRISYSTEM Srl – C.da Rotoli – Lamezia Terme (CZ)

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11849 del 10/11/2003

L 0,250 - 0,500 - 1 - 5 - 10 **Partita n. :**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia : atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO SKORPIO EC è un insetticida fosforganico che esplica la propria azione per contatto, per ingestione e, più limitatamente in fase di vapore. Risulta indicato sulle seguenti colture:

Melo, Pero, Pesco: contro tortricidi ricamatori *(Archips spp, Pandemis spp., A. orana, A. pulchellana, H. nubifera, Recurvaria spp., Hypomoneuta spp., ecc.),* Carpocapsa *(C. pomonella),* Cidia orientale (*C. molesta*), Anarsia (*A. lineatella*), Mosca della frutta *(C. capitata)*, 200-250 ml/hl. Contro le neanidi di Cocciniglie *(Q. perniciosus, ecc.)* 200-250 ml/hl.

Arancio, Limone, Mandarino, Clementino: contro Tignola della zagara *(P. citri)*, Cimicetta verde *(C. trivialis)*, Formiche *(L. humile, C. nylanderi, ecc.)*, Metcalfa *(M. pruinosa)*, e neanidi di Cocciniglie *(A. aurantii, A. nerei, Coccus spp., Ceroplastes spp., S. oleae, ecc.)* 250 ml/hl

Vite: contro le Tignole *(L. botrana, C. ambiguella, A. pulchellana)*, Cicaline (*S. titanus, E. flavescens, ecc.*) Tripidi *(D. reuteri, Franklinella spp., ecc.)*, Nottue *(Noctua spp.)*, Metcalfa *(M. pruinosa)*, e neanidi di Cocciniglie *(T. vitis, ecc.)* 100-200 ml/hl. Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cultivar sensibili; si raccomandano pertanto saggi zonali e varietali.

Fragola: contro Tripidi (*F. occidentalis, ecc.*), Nottue (*Agrotis spp., ecc.*), Afidi (*S. fragarie, ecc.*), Tortricidi (*E. pulchellana, P. dumetana, ecc.*) 300-400 ml/hl.

Pomodoro, Peperone, Melanzana, Pisello, Ravanello, Patata: contro Nottue *(Agrotis spp., Mamestra spp., ecc.)*, Tripidi *(T. tabaci, ecc.)*, Gortina *(Gortyna spp.)*, Cavolaia *(P. brassicae)*, Macaone *(Papillio spp.)*, Dorifora *(L. decemlineata)*, 1,5-2,0 l/Ha .

Mais: contro Nottue *(Agrotis spp.)*, Piralide *(O. nubilalis)* ed Elateridi *(Agroties spp.)* 300 ml/hl.

Pioppo: contro Saperda *(Saperda spp.)*, Gemmaiola *(G. acerina)*, Criptorrinco *(C. lapathi)*, Ifantria *(H. cunea)* 400-500 ml/hl.

Garofano, Crisantemo, Azalea, Ciclamino: contro Bega , Tortricidi, Oziorrinco e neanidi di Cocciniglie 200 ml/hl.

COMPATIBILITA': non è miscibile con formulati a reazione alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non impiegare il prodotto sulle varietà di melo Stayman Red, Stayman Winesap, Gloster, Gallia Beauty. In post-fioritura del melo non eseguire più di 2 trattamenti. Non effettuare trattamenti su Arancio nei mesi compresi tra gennaio ed aprile.

INTERVALLO DI SICUREZZA Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO- IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

GROCER SC

Fungicida in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Esaconazolo puro g 4,8 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena
Distribuito da: AGRISYSTEM Srl – C.da Rotoli - Lamezia Terme (CZ)

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12024 del 27/02/2004

L 0,100 / 0,250 / 0,500 / 1 / 5 Partita n. :

NORME PRECAUZIONALI Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE GROCER SC è un fungicida triazolico dotato di attività sistemica e translaminare. Penetra rapidamente all'interno delle parti verdi trattate sfuggendo all'azione dilavante delle piogge. Agisce in via preventiva, curativa ed "eradicante". GROCER SC non ha effetti negativi sull'acaroentomofauna utile e non influisce sulle caratteristiche organolettiche delle produzioni trattate.
MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO GROCER SC può essere impiegato sulle seguenti colture ai dosaggi di seguito indicati: **Melo, Pero**: contro la Ticchiolatura *(V. inaequalis, F. dendridoicum)* e il "Mal Bianco" *(P. leucotrica)* 50 ml/hl (dose minima: 750 ml/Ha), intervenendo quando si verificano le condizioni idonee allo sviluppo dell'infezione e proseguendoli ad intervalli di 7-8 giorni. Nella lotta contro la Ticchiolatura può risultare conveniente, al fine di migliorare l'efficacia e la persistenza d'azione, impiegare GROCER SC in miscela con preparati di copertura quali Mancozeb, Captano, Dithianon, ecc.. **Vite**: contro l'Oidio o " Mal bianco" *(U. necator; O. tuckeri)* e il marciume nero degli acini o "Black rot" *(G. bidwellii)* 35-40 ml/hl (dose minima: 350 ml/Ha), intervenendo dalla pre- fioritura all'invaiatura ad intervalli di 10-14 giorni. Su vite da tavola aumentare il dosaggio a 40-50 ml/hl. **Carciofo, Pomodoro**: contro l'Oidio o "Mal Bianco" *(Eriysiphe spp., S. fuliginea, ecc.)* 30-40 ml/hl (dose minima: 240 ml/Ha) iniziando i trattamenti quando si notano i primissimi sintomi dell'infezione e proseguendoli ad intervalli di 8-12 giorni. **Rosa, Astri, Zinnia:** contro l'Oidio o "Mal Bianco" *(Erysiphe spp., Sphaerotheca spp.)*, Ticchiolatura *(D. rosae)*, Ruggini *(Puccinia spp., ecc.)* 50-100 ml/hl. **Pioppo**: contro Marsonnina *(M. brunnea)* e Ruggini *(Puccinia spp., ecc.)* 50-70 ml/hl.
COMPATIBILITÀ: il prodotto è compatibile con i preparati fitosanitari (Tiowetting, Erisan, Foltan, Mexil® Oro, Sumit WG, ecc.) comunemente impiegati nella difesa delle colture riportate nella presente etichetta. Evitare le miscele con preparati a reazione fortemente alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': su cultivar di Melo "Mc Intoche" relativi incroci impiegare solo fino alla fioritura. Eventuali miscele con Clorotalonil possono dare origine a rugginosità su Golden Delicious e Granny Smith.
PERIODO DI CARENZA Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta:
- 7 giorni per Carciofo, Pomodoro - 15 giorni Vite, Melo, Pero.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

LARIEM Duo

Fungicida antiperonosporico ad azione sistemica e citotropica in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Fosetil Alluminio puro		g 60
- Cimoxanil puro		g 4
- Coformulanti	q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO: irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511
Stabilimento di Produzione: SCAM S.p.a. – Modena

Distribuito da: Agrisystem Srl – C.da Rotoli – Lamezia Terme (CZ)

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12044 del 16/04/2004

Kg 0,500 / 1 / 5 / 10 Partita n. :

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO puro 60%; CIMOXANIL puro 4%, le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: FOSETIL ALLUMINIO – **Sintomi:** --- CIMOXANIL derivato dall'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.. **Terapia**: sintomatica. **Controindicazioni**: === **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE
LARIEM Duo è un fungicida antiperonosporico che unisce le proprietà sistemiche del Fosetil Alluminio a quelle citotropiche del Cimoxanil. LARIEM Duo possiede attività preventiva e curativa, essendo in grado di inibire lo sviluppo del patogeno entro 2-3 giorni dal momento dell'infezione. LARIEM Duo è caratterizzato da una buona persistenza d'azione che gli consente di proteggere sia la vegetazione presente al momento del trattamento che quella formatasi successivamente.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: LARIEM Duo può essere impiegato sulle seguenti colture:
Vite: contro la Peronospora *(P. viticola)* alla dose di 250 g/hl, sempre in miscela con un prodotto di copertura (Mancozeb, Folpet). Iniziare gli interventi quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo dell'infezione e proseguirli ad intervalli di 10-12 giorni. Nei casi di forte pressione della malattia in concomitanza delle fasi fenologiche di maggiore sensibilità della vite (pre-fioritura, sfioritura) può risultare opportuno ridurre l'intervallo fra i trattamenti a 10 giorni.
Pomodoro, Patata: contro la Peronospora *(P. infestans)* alla dose di 250 g/hl in miscela con un prodotto di copertura non rameico, iniziando i trattamenti in concomitanza con il verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo del patogeno e proseguendoli ad intervalli di 8-12 giorni in funzione dell'andamento stagionale e della virulenza della malattia.
Spinacio, Melone: contro la Peronospora (*P. spinaciae, P. cubensis*) alla dose di 250 g/hl, in miscela con un prodotto di copertura non rameico, iniziando i trattamenti in concomitanza con il verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo del patogeno e proseguendoli ad intervalli di 8-12 giorni in funzione dell'andamento stagionale e della virulenza della malattia.
Carciofo, Lattuga: contro la Peronospora o Bremia *(B. lactucae)* alla dose di 250 g/hl, in miscela con un prodotto di copertura non rameico, iniziando le applicazioni allorché si verificano le condizioni idonee allo sviluppo del patogeno e proseguendoli ad intervalli di 10-12 giorni. Su Lattuga Romana e su varietà di nuova introduzione effettuare saggi preliminari al fine di verificare la selettività del prodotto.
Ornamentali e Floreali da appartamento e da giardino domestico: contro la Peronospora alla dose di 250 g/hl in miscela con un prodotto di copertura non rameico. Iniziare i trattamenti quando si verificano condizioni idonee allo sviluppo dell'infezione e proseguirli ad intervalli di 10-12 giorni.
I dosaggi sopra riportati si riferiscono ad applicazioni effettuate con sistemi di distribuzione operanti a "volume normale", dove è previsto l'utilizzo di 10-15 hl/Ha (in relazione alla forma di allevamento ed alla fase fenologica) per la Vite, 8-10 hl/Ha per le Colture Orticole ed il Tabacco, da 10 a 20 hl/Ha per le colture Ornamentali e Floreali in funzione della specie e della massa di vegetazione da proteggere. Nel caso i trattamenti vengano effettuati impiegando volumi ridotti di acqua è necessario prevedere un aumento proporzionale delle dosi al fine ci assicurare un adeguato apporto di prodotto per ettaro.
COMPATIBILITA': il prodotto non è miscibile con i preparati fitosanitari a reazione alcalina. Non è compatibile con formulati rameici. Non utilizzare LARIEM Duo in miscela con concimi fogliari contenenti alti titoli di azoto. Verificarne la compatibilità e la selettività in utilizzo associato a biostimolanti e fitoregolatori. Non applicare in combinazione (o a ridosso di trattamenti) con formulati a base oleosa o olii minerali o vegetali.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': in concomitanza con forti sbalzi termici, LARIEM Duo può dare origine a fenomeni di sensibilità su Lattuga e Spinacio.
INTERVALLO DI SICUREZZA: osservare un intervallo di 40 giorni fra l'ultimo trattamento e la raccolta della Vite, 21 giorni per il Carciofo, 20 giorni per Pomodoro e Patata, 15 giorni per Spinacio, Melone, Lattuga.
ATTENZIONE: durante le fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi. Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO – SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLA ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

ARACNEL

ACARICIDA PER IMPIEGO SU NUMEROSE COLTURE
IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- EXITIAZOX puro g 10
- Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano-Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: TERRANALISI Srl, Via Nino Bixio n. 6, Cento (FE)
SCAM Spa, Strada Bellaria n. 164, Modena
Distributore: Agrisystem Srl, C.da Rotoli, Lamezia Terme (CZ)

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12124 del 06/09/2004

g 50-100-200-250-500 Kg 1-5-10-20 **Partita n.:**

NORME PRECAUZIONALI: non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
L' ARACNEL è un prodotto acaricida in polvere bagnabile che agisce per contatto ed ingestione, ed inoltre è dotato di effetto translaminare, con notevole persistenza d'azione ed estrema selettività nei confronti delle api e degli acari predatori.
La sua azione acaricida è mirata a combattere uova, larve e ninfe di acari tetranichidi rossi e gialli (*Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini f. vitis).*
Viene impiegato sulle seguenti colture: **melo - pero - pesco - agrumi - vite - fragola - actinidia - melone - cetriolo - peperone - melanzana - pomodoro - fagiolino - soia - colture floreali in pieno campo ed in serra**, trattando in presenza di pochissime forme mobili (1 - 2 acari per foglia) alla dose di g. 50 per ettolitro di acqua, nel caso vi sia necessità si miscela con prodotti acaricidi adulticidi per avere una rapida azione iniziale sugli adulti. Per ottenere un risultato migliore bagnare abbondantemente la vegetazione trattata.
COMPATIBILITA': non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta di fragola, peperoni, melanzane, fagiolini, pomodoro, melone, cetriolo - 14 giorni prima della raccolta di pesco, melo, pero, actinidia, agrumi, vite - 34 giorni prima della raccolta della soia.
FITOTOSSICITA': sulle floricole si consiglia un saggio preliminare su piccole superfici.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro impiego è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

Foglio illustrativo

ARACNEL

ACARICIDA PER IMPIEGO SU NUMEROSE COLTURE
IN POLVERE BAGNABILE

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
L' ARACNEL è un prodotto acaricida in polvere bagnabile che agisce per contatto ed ingestione, ed inoltre è dotato di effetto translaminare, con notevole persistenza d'azione ed estrema selettività nei confronti delle api e degli acari predatori.
La sua azione acaricida è mirata a combattere uova, larve e ninfe di acari tetranichidi rossi e gialli (*Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini f. vitis*).
Viene impiegato sulle seguenti colture: **melo - pero - pesco - agrumi - vite - fragola - actinidia - melone - cetriolo - peperone - melanzana - pomodoro - fagiolino - soia - colture floreali in pieno campo ed in serra**, trattando in presenza di pochissime forme mobili (1 - 2 acari per foglia) alla dose di g. 50 per ettolitro di acqua, nel caso vi sia necessità si miscela con prodotti acaricidi adulticidi per avere una rapida azione iniziale sugli adulti. Per ottenere un risultato migliore bagnare abbondantemente la vegetazione trattata.
COMPATIBILITA': non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta di fragola, peperoni, melanzane, fagiolini, pomodoro, melone, cetriolo - 14 giorni prima della raccolta di pesco, melo, pero, actinidia, agrumi, vite - 34 giorni prima della raccolta della soia.
FITOTOSSICITA': sulle floricole si consiglia un saggio preliminare su piccole superfici.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano-Modena Tel. 059-586511

Etichetta formato ridotto ai sensi dell'Art.16 comma 2 del D.L. 194/95 per le taglie da g 50-100

ARACNEL

ACARICIDA PER IMPIEGO SU NUMEROSE COLTURE
IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- EXITIAZOX puro g 10
- Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Stabilimento di produzione: TERRANALISI Srl, Via Nino Bixio n. 6, Cento (FE)
SCAM Spa, Strada Bellaria n. 164, Modena
Distributore: Agrisystem Srl, C.da Rotoli, Lamezia Terme (CZ)

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12124 del 06/09/2004

g 50 - 100 **Partita n.:**

NORME PRECAUZIONALI: non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
L' ARACNEL è un prodotto acaricida in polvere bagnabile che agisce per contatto ed ingestione, ed inoltre è dotato di effetto translaminare, con notevole persistenza d'azione ed estrema selettività nei confronti delle api e degli acari predatori.
La sua azione acaricida è mirata a combattere uova, larve e ninfe di acari tetranichidi rossi e gialli (*Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini f. vitis).*
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro impiego è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

ARPEL TRIPLO

Fungicida sistemico e di contatto, ad azione preventiva e curativa, per la lotta contro la Peronospora della vite, del pomodoro (fino alla prima fioritura) e del tabacco in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- **Fosetil-Alluminio** puro g 32,5
- **Cimoxanil** puro g 2,5
- **Mancozeb** puro g 25
- **Coformulanti** q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: irritante per le vie respiratorie. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore e l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12208 del 08/09/2004

Kg 0,4 / 1 / 5 / 10 **Partita n. :**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi d'associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO puro 32,5%; CIMOXANIL puro 2,5%, MANCOZEB puro 25% le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: FOSETIL ALLUMINIO – **Sintomi**: == CIMOXANIL – Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. MANCOZEB – **Sintomi**: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. **Terapia:** sintomatica. **Controindicazioni:** === **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE
ARPEL TRIPLO è un fungicida antiperonosporico che unisce le proprietà sistemiche del Fosetil-Alluminio, le caratteristiche di citotropicità del Cimoxanil e l'azione di contatto del Mancozeb. ARPEL TRIPLO possiede attività preventiva e curativa, essendo in grado di inibire lo sviluppo del patogeno entro 2 giorni dal momento dell'infezione. ARPEL TRIPLO è caratterizzato da una lunga persistenza d'azione che consente interventi a cadenza fissa assicurando la protezione sia la vegetazione presente al momento del trattamento che quella formatasi successivamente.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Colture	Parassiti	Dosi	Applicazione
VITE	Peronospora	400 g/hl (4 Kg/Ha)	Iniziare i trattamenti quando si verificano le prime condizioni favorevoli allo sviluppo della peronospora; proseguire quindi le applicazioni a cadenza di 12 giorni. Nei casi di andamento stagionale particolarmente piovoso ed in presenza di elevata pressione della malattia accorciare l'intervallo a 10 giorni.
POMODORO (fino alla prima fioritura)	Peronospora	400 g/hl	Trattamenti preventivi ogni 10-12 giorni
TABACCO	Peronospora	4 Kg/Ha	Interventi preventivi ogni 10-12 giorni

Nella preparazione della miscela diluire la quantità di prodotto occorrente in poca acqua e mescolare fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Versare quindi nel serbatoio dell'irroratrice e portare a volume di distribuzione mantenendo in funzione l'agitatore.
COMPATIBILITÀ': il prodotto non è compatibile con gli olii minerali. In caso di miscela con concimi fogliari si consiglia di procedere a saggi preliminari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

ARPEL TRIPLO

Fungicida sistemico e di contatto, ad azione preventiva e curativa, per la lotta contro la Peronospora della vite, del pomodoro (fino alla prima fioritura) e del tabacco in polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Fosetil alluminio puro g 32,5
- Cimoxanil puro g 2,5
- Mancozeb puro g 25
- Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Da sciogliere in acqua senza rompere

Contenuto 400 g – 2 Kg

Avvertenza: leggere l'etichetta riportata sulla confezione prima di utilizzare il prodotto

DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164
41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12208 del 08/09/2004

ARPEL TRIPLO

Fungicida sistemico e di contatto, ad azione preventiva e curativa, per la lotta contro la Peronospora della vite, del pomodoro (fino alla prima fioritura) e del tabacco in polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- **Fosetil-Alluminio** puro g 32,5
- **Cimoxanil** puro g 2,5
- **Mancozeb** puro g 25
- **Coformulanti** q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: irritante per le vie respiratorie. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore e l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena
Autorizzazione Ministero della Salute n. 12208 del 08/09/2004

Kg 2 = (5 sacchetti da 400 g) Kg 4 = (10 sacchetti da 400 g) Partita n.:
Kg 8 = (4 sacchetti da 2 kg)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi d'associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO puro 32,5%; CIMOXANIL puro 2,5%, MANCOZEB puro 25% le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: FOSETIL ALLUMINIO – **Sintomi**: == CIMOXANIL – Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. MANCOZEB – **Sintomi**: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. **Terapia**: sintomatica. **Controindicazioni**: === **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE ARPEL TRIPLO è un fungicida antiperonosporico che unisce le proprietà sistemiche del Fosetil-Alluminio, le caratteristiche di citotropicità del Cimoxanil e l'azione di contatto del Mancozeb. ARPEL TRIPLO possiede attività preventiva e curativa, essendo in grado di inibire lo sviluppo del patogeno entro 2 giorni dal momento dell'infezione. ARPEL TRIPLO è caratterizzato da una lunga persistenza d'azione che consente interventi a cadenza fissa assicurando la protezione sia la vegetazione presente al momento del trattamento che quella formatasi successivamente.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Colture	Parassiti	Dosi	Applicazione
VITE	Peronospora	400 g/hl (4 Kg/Ha)	Iniziare i trattamenti quando si verificano le prime condizioni favorevoli allo sviluppo della peronospora; proseguire quindi le applicazioni a cadenza di 12 giorni. Nei casi di ancamento stagionale particolarmente piovoso ed in presenza di elevata pressione della malattia accorciare l'intervallo a 10 giorni.
POMODORO (fino alla prima fioritura)	Peronospora	400 g/hl	Trattamenti preventivi ogni 10-12 giorni
TABACCO	Peronospora	4 Kg/Ha	Interventi preventivi ogni 10-12 giorni

Nella preparazione della miscela diluire la quantità di prodotto occorrente in poca acqua e mescolare fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Versare quindi nel serbatoio dell'irroratrice e portare a volume di distribuzione mantenendo in funzione l'agitatore.
COMPATIBILITÀ': il prodotto non è compatibile con gli olii minerali. In caso di miscela con concimi fogliari si consiglia di procedere a saggi preliminari.
AVVERTENZA D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all'introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione chiudere bene la scatola. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE - NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE - Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE-DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE.**

25%

1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua

2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti

3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore

4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ed...

5) ...aggiungere la restante parte d'acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

BAGNANTE AGRISYSTEM

COADIUVANTE PER PRODOTTI FITOSANITARI
LIQUIDO SOLUBILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Alcool grasso etossilato puro g 10 (= 100 g/l)
- Coadiuvanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: rischio di gravi lesioni oculari.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena
Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena
Distribuito da: AGRISYSTEM Srl – C.da Rotoli - Lamezia Terme (CZ)

Autorizzazione Ministero della Salute. n. 12216 del 08/09/2004

Litri 0,100 / 0,200 / 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10 / 20 / 25 **Partita n.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il BAGNANTE AGRISYSTEM è un formulato non ionico che aumenta il potere "bagnante" delle poltiglie antiparassitarie.
Aggiunto alle miscele da distribuire riduce la tensione superficiale dell'acqua, migliora la sospensibilità e la miscibilità dei formulati assicurando una uniforme distribuzione sulla superficie fogliare dei principi attivi irrorati.
Il BAGNANTE AGRISYSTEM esplica anche una azione adesivante; è quindi consigliabile impiegarlo unitamente a prodotti destinati al trattamento di colture come cipolle, cavolo, garofano,ecc., dove la natura delle superfici fogliari è di ostacolo ad una buona "bagnabilità" delle stesse.

Il BAGNANTE AGRISYSTEM va impiegato, in aggiunta alle poltiglie anticrittogamiche e insetticide, alla dose di 30-50 ml/hl. Negli impieghi unitamente ad erbicidi ad applicazione fogliare, aumentare la dose di BAGNANTE AGRISYSTEM a 100-200 ml/hl

COMPATIBILITA'
Il BAGNANTE AGRISYSTEM è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari.
INTERVALLO
Viene rispettato il tempo di intervallo del formulato miscelato con il BAGNANTE AGRISYSTEM
INDICAZIONE D'IMPIEGO
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

BENTIL FL

FUNGICIDA ORGANICO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
- Tiofanato metile puro g 38,3 (= 450 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: nocivo per inalazione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibilità di effetti irreversibili. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa – Modena
TERRANALISI S.r.l. – Via N.Bixio, 6 - Cento (FE)
Autorizzazione Ministero della Salute n. 12327 del 17/11/2004

L 0,500 / 1 / 5 **Partita n.:**

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. - Non operare contro vento.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni
MODALITA' D'IMPIEGO - Fungicida organico in sospensione concentrata, ad azione preventiva e curativa che viene impiegato sulle seguenti colture:
Pesco, albicocco, susino:
- contro la Monilia, l'Oidio e la Ticchiolatura alla dose di ml 80-90/hl;
- contro il Fusicoccum e la Citospora alla dose di ml 100-120/hl.

Vite - contro la Muffa grigia e l'Oidio alla dose di ml 100/hl, trattando a fine fioritura, prima della chiusura del grappolo e successivamente ad intervalli di 3 settimane circa sino a 2-3 settimane dalla vendemmia.
Melo, pero:
- contro la Ticchiolatura e l'Oidio a ml 100-140/hl fino ai primi trattamenti post-fiorali e ml 70-85/hl nelle applicazioni successive;
- contro la Ticchiolatura tardiva in pre-raccolta a ml 85-100/hl;
- contro Gloeosporium trattamenti di post-raccolta per aspersione o immersione a ml 105-210/hl. "I trattamenti dovranno essere effettuati, per non più di 30 secondi, in ambienti appositamente attrezzati per le operazioni meccanizzate, che escludano l'intervento diretto dell'operatore e che consentono l'immagazinamento con frigo-conservazione. La soluzione eccedente ai trattamenti dovrà essere prelevata da ditte specializzate per la sua depurazione (fisica o microbiologica)". L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 283/1962. Le mele e le pere trattate possono essere messe in commercio dopo almeno 15 giorni dal trattamento.

Frumento - contro le Malattie del piede a litri 1-1,2 per ettaro, durante la fase dell'accestimento o in levata.
Garofano - contro la Fusariosi, la Verticilliosi e la Fialofora a ml 2-3/mq sciolto in 10 litri di acqua; trattare in modo preventivo e ripetendo i trattamenti.
Fiori, piante ornamentali - contro la Muffa grigia, l'Oidio e la Septoria a ml 85-100/hl.
Gladiolo, tulipano, bulbose - contro i Marciumi da Fusarium, Penicilium, Sclerotinia, Botrytis alla dose di litri 1-1,4/hl per immersione dei bulbi prima dell'impianto.
Nocciolo - contro Gleosporium delle gemme a ml 125 con 1-2 interventi ad intervallo di 20-25 giorni, trattando in autunno all'inizio della caduta delle foglie.
Cipresso, platano - contro Cancro o Corineo del cipresso a ml 125 per q.le acqua intervenendo in autunno e primavera con 2-3 trattamenti.
COMPATIBILITA' – Per una buona miscelazione procedere stemperando in acqua il prodotto e poi versare nell'irroratrice (sotto agitazione) piena a metà, poi aggiungere un bagnante adesivo. Non è compatibile con sostanze alcaline. **AVVERTENZA** - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA' – Il prodotto contiene una sostanza attiva che può avere effetti negativi su acari fitoseidi.
SU COLTURE ORNAMENTALI E FLOREALI SONO CONSENTITE SOLO APPLICAZIONI IN PIENO CAMPO
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere il trattamento 30 giorni prima della raccolta del frumento e 15 sulle altre colture.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

VEBITHRIN 5 EC

INSETTICIDA PIRETROIDE A RIDOTTA TOSSICITÀ IN EMULSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:

- Cipermetrina puro g 5 (= 49,28 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena
Stabilimento di confezionamento:
VE.BI Sas del Dr. L.Bazzolo & C. – S.Eufemia di Borgoricco (PD)
Distribuito da:
VE.BI Sas del Dr. L.Bazzolo & C. – Via Desman, 43 – S.Eufemia di Borgoricco (PD)
Autorizzazione Ministero della Salute n. 12344 del 23/11/2004

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

ml 20-25-50-100-200-250-500-750 Litri 1 / 2 / 5 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica e di rianimazione. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO VEBITHRIN 5 EC è un insetticida piretroide a bassa tossicità ed ampio spettro d'azione, impiegabile su un gran numero di colture erbacee ed arboree. VEBITHRIN 5 EC agisce per contatto e per ingestione nei confronti di numerose specie di fitofagi (Afidi, Dialeurodidi, Toritricidi, Nottuidi, Tignole, Dorifora, Piralide, Tripidi, Microlepidotteri fillominatori, Cocciniglie, ecc.). VEBITHRIN 5 EC svolge inoltre un'azione repellente ed antirepellente delle colture trattate. La particolare formulazione in olio vegetale ne rende pratico e sicuro l'impiego. VEBITHRIN 5 EC può essere usato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi: **Vite:** contro le Tignole (*L.botrana, C.ambiguella*) e Sigaraio (*B.betulae*) 100-150 ml/hl. **Pesco, Ciliegio:** contro Afide verde (*M.persicae*), Afide farinoso (*H.amygdali*), Afide bruno (*B.schwartzi*), Afide nero (*B.persicae*) 75-100 ml/hl intervenendo prima dell'accartocciamento delle foglie. Contro Anarsia (*A.lineatella*), Cidia (*C. Molesta*), Tripidi (*Thrips spp.*) e Mosca della frutta (*C.capitata*) 100-150 ml/hl. **Pero:** contro la Psilla (*P.piri*) 100-150 ml/hl nei trattamenti di fine inverno contro gli adulti svernanti e 150-200 negli interventi primaverili-estivi. Contro Afidi (*A.pomi*), Carpocapsa (*C.pomonella*), Microlepidotteri minatori (*L.scintella, L.blancardella*) 100-150 ml/hl. **Arancio, Limone:** contro Afide verde (*A.spiraecola, A.gossypii*), Afide bruno (*T.aurantii*), Dialeurodidi (*T. vaporariorum*), 75-100 ml/hl. Contro Tignola della Zagara (*P.citri*) e Mosca della frutta (*C.capitata*) 100-150 ml/hl. **Cavolo, Cavolfiore, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Cavolo broccolo, Fagiolino, Pisello, Pomodoro, Cipolla, Patata:** contro Afidi (*B.brassicae, A.fabae, A.pisum, M.persicae*). Nottue (*Agrotis spp.*), Cavolaie (*P.brassicae*), Tripidi (*Tripis spp.*), Dorifora (*L.decemlineata*), Mosca bianca (T.vaporarium), Cimice (*N.viridula*) 100-150 ml/hl. **Barbabietola da zucchero:** contro Altica (*C.tibialis*) 1000-1200 ml/ha. Contro Afidi (*A.fabae, M.persicae*), Nottue (*M.brassicae, A.gamma*), Cleono (*T.mendicus*), Lisso (*L.junci*), Casside (*Cassida spp.*) 500-1000 ml/ha. **Tabacco:** contro Afidi (*M.persicae, A.fabae*), Nottue (*Agrotis spp.*) Mosca bianca (*T.vaporariorum*) 75-150 ml/hl. **Mais:** contro Afidi (*R.padi*) e Piralide (*O.nubilalis*) 75-150 ml/hl. **Frumento:** contro Afidi (*S.avenae, S.graminum*) e Lema (*O.melanopa*) 75-100 ml/hl. **Soia:** contro Cimice verde (*N.viridula*) e Piralide (*U.ferrugalis*) 100-150 ml/hl. **Fiori, vivai, Colture ornamentali in campo:** contro Afidi e Mosca bianca (*T.vaporariorum*) 75-100 ml/hl. Contro Bega del garofano (*E.acerbella*), Tripidi (*Tripis spp.*), Nottue (*Agrotis spp.*) 100-200 ml/hl. **Pioppo:** contro Afidi, Saperda (*S.carcarians*), Criptorrinco (*C.lapathi*) 75-100 ml/hl.
DA NON IMPIEGARE IN SERRA
COMPATIBILITA' VEBITHRIN 5 EC è compatibile con i più comuni prodotti fitosanitari ad eccezione di quelli a reazione fortemente alcalina.
AVVERTENZA In caso di miscela con latri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' VEBITHRIN 5 EC è altamente selettivo per le colture riportate in etichetta; sulle colture floricole, in particolare su specie delicate è opportuno effettuate saggi preliminari.
INTERVALLO DI SICUREZZA Intervallo di tempo che deve trascorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: **3 giorni**: Soia; **7 giorni**:Piselli-Fagiolino-Cavolfiore-Cavolobroccolo, **14 giorni**: Cavolo-Cavolo cappuccio-Cavolo verza-Cipolla-Patata-Pesco-Ciliegio-Pero-Arancio-Limone.
21 giorni: Pomodoro-Barbabietola da zucchero, **28 giorni**: Vite-Mais, **42** giorni: Frumento, **60 giorni**: Tabacco.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli aventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO – SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

Foglio illustrativo

VEBITHRIN 5 EC

INSETTICIDA PIRETROIDE A RIDOTTA TOSSICITÀ IN EMULSIONE CONCENTRATA

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO VEBITHRIN 5 EC è un insetticida piretroide a bassa tossicità ed ampio spettro d'azione, impiegabile su un gran numero di colture erbacee ed arboree. VEBITHRIN 5 EC agisce per contatto e per ingestione nei confronti di numerose specie di fitofagi (Afidi, Dialeurodidi, Tortricidi, Nottuidi, Tignole, Dorifora, Piralide, Tripidi, Microlepidotteri fillominatori, Cocciniglie, ecc.). VEBITHRIN 5 EC svolge inoltre un'azione repellente ed antirepellente delle colture trattate. La particolare formulazione in olio vegetale ne rende pratico e sicuro l'impiego.
VEBITHRIN 5 EC può essere usato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi: **Vite:** contro le Tignole (*L.botrana, C.ambiguella*) e Sigaraio (*B.betulae*) 100-150 ml/hl. **Pesco, Ciliegio:** contro Afide verde (*M.persicae*), Afide farinoso (*H.amygdali*), Afide bruno (*B.schwartzi*), Afide nero (*B.persicae*) 75-100 ml/hl intervenendo prima dell'accartocciamento delle foglie. Contro Anarsia (*A.lineatella*), Cidia (*C. Molesta*), Tripidi (*Thrips spp.*) e Mosca della frutta (*C.capitata*) 100-150 ml/hl. **Pero:** contro la Psilla (*P.piri*) 100-150 ml/hl nei trattamenti di fine inverno contro gli adulti svernanti e 150-200 negli interventi primaverili-estivi. Contro Afidi (*A.pomi*), Carpocapsa (*C.pomonella*), Microlepidotteri minatori (*L.scintella, L.blancardella*) 100-150 ml/hl. **Arancio, Limone:** contro Afide verde (*A.spiraecola, A.gossypii*), Afide bruno (*T.aurantii*), Dialeurodidi (*T. vaporariorum*), 75-100 ml/hl. Contro Tignola della Zagara (*P.citri*) e Mosca della frutta (*C.capitata*) 100-150 ml/hl. **Cavolo, Cavolfiore, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Cavolo broccolo, Fagiolino, Pisello, Pomodoro, Cipolla, Patata:** contro Afidi (*B.brassicae, A.fabae, A.pisum, M.persicae*), Nottue (*Agrotis spp.*), Cavolaie (*P.brassicae*), Tripidi (*Tripis spp.*), Dorifora (*L.decemlineata*), Mosca bianca (T.vaporarium), Cimice (*N.viridula*) 100-150 ml/hl. **Barbabietola da zucchero:** contro Altica (*C.tibialis*) 1000-1200 ml/ha. Contro Afidi (*A.fabae, M.persicae*), Nottue (*M.brassicae, A.gamma*), Cleono (*T.mendicus*), Lisso (*L.junci*), Casside (*Cassida spp.*) 500-1000 ml/ha. **Tabacco:** contro Afidi (*M.persicae, A.fabae*), Nottue (*Agrotis spp.*) Mosca bianca (*T.vaporariorum*) 75-150 ml/hl. **Mais:** contro Afidi (*R.padi*) e Piralide (*O.nubilalis*) 75-150 ml/hl. **Frumento:** contro Afidi (*S.avenae, S.graminum*) e Lema (*O.melonopa*) 75-100 ml/hl. **Soia:** contro Cimice verde (*N.viridula*) e Piralide (*U.ferrugalis*) 100-150 ml/hl. **Fiori, vivai, Colture ornamentali in campo:** contro Afidi e Mosca bianca (*T.vaporariorum*) 75-100 ml/hl. Contro Bega del garofano (*E.acerbella*), Tripidi (*Tripis spp.*), Nottue (*Agrotis spp.*) 100 200 ml/hl. **Pioppo:** contro Afidi, Saperda (*S.carcarians*), Criptorrinco (*C.lapathi*) 75 100 ml/hl.
DA NON IMPIEGARE IN SERRA
COMPATIBILITA' VEBITHRIN 5 EC è compatibile con i più comuni prodotti fitosanitari ad eccezione di quelli a reazione fortemente alcalina.
AVVERTENZA In caso di miscela con latri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' VEBITHRIN 5 EC è altamente selettivo per le colture riportate in etichetta; sulle colture floricole, in particolare su specie delicate è opportuno effettuate saggi preliminari.
INTERVALLO DI SICUREZZA Intervallo di tempo che deve trascorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: **3 giorni**: Soia; **7 giorni**:Piselli-Fagiolino-Cavolfiore-Cavolobroccolo, **14 giorni**: Cavolo-Cavolo cappuccio-Cavolo verza-Cipolla-Patata-Pesco-Ciliegio-Pero-Arancio-Limone. **21 giorni**: Pomodoro-Barbabietola da zucchero, **28 giorni**: Vite-Mais. **42** giorni: Frumento, **60 giorni**: Tabacco.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Etichetta formato ridotto ai sensi dell'Art.16 comma 2 del D.L. 194/95 per le taglie da ml 20-25-50-100

VEBITHRIN 5 EC

INSETTICIDA PIRETROIDE A RIDOTTA TOSSICITÀ IN EMULSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:

- Cipermetrina puro g 5 (= 49,28 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena
Stabilimento di confezionamento:
VE.BI Sas del Dr. L.Bazzolo & C. – S.Eufemia di Borgoricco (PD)
Distribuito da:
VE.BI Sas del Dr. L.Bazzolo & C. – Via Desman, 43 – S.Eufemia di Borgoricco (PD)
Autorizzazione Ministero della Salute n. 12344 del 23/11/2004

ml 20-25-50-100 **Partita n.**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia: irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea: reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica e di rianimazione. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO VEBITHRIN 5 EC è un insetticida piretroide a bassa tossicità ed ampio spettro d'azione, impiegabile su un gran numero di colture erbacee ed arboree. VEBITHRIN 5 EC agisce per contatto e per ingestione nei confronti di numerose specie di fitofagi (Afidi, Dialeurodidi, Tortricidi, Nottuidi, Tignole, Dorifora, Piralide, Tripidi, Microlepidotteri fillominatori, Cocciniglie, ecc.). VEBITHRIN 5 EC svolge inoltre un'azione repellente ed antirepellente delle colture trattate. La particolare formulazione in olio vegetale ne rende pratico e sicuro l'impiego.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli aventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

GRENADIER 75 WG

Diserbante selettivo per il diserbo in post-emergenza del Frumento (tenero e duro) e dell'Orzo in granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- **Tribenuron metile** puro g 75
- **Coformulanti** q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: A.D.I.C.A. Srl – Nera Montoro (TR)

Stabilimento di Confezionamento: SCAM S.p.a. – Modena

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12346 del 14/09/2004

g 10 – 15 – 20 – 50 - 100 **Partita n. :**

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: in caso di intossicazione ricorrere al medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE
GRENADIER 75 WG è un diserbante di post-emergenza per il controllo delle principali infestanti a foglia larga nelle colture di frumento (tenero e duro) e di orzo. Viene rapidamente assorbito dalle foglie e dalle radici delle piante trattate e traslocato, mediante i flussi linfatici, agli apici vegetativi. GRENADIER 75 WG blocca la crescita delle malerbe subito dopo la penetrazione all'interno degli organi vegetali eliminandone la competizione con la coltura; i sintomi visibili (ingiallimenti, necrosi dei tessuti e successiva morte) si manifestano da 1 a 3 settimane dal momento dell'applicazione. Andamenti stagionali caldi e umidi dopo il trattamento favoriscono la rapidità d'azione del diserbante.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
GRENADIER 75 WG si impiega su **Frumento** (tenero e duro) e su **Orzo** alla dose di 10-15 g/Ha, intervenendo dallo stadio delle tre foglie fino alla fase di "botticella " della coltura.
GRENADIER 75 WG è particolarmente efficace nei confronti di Aneto *(Anethum gravelescens)*, Coriandolo fetido *(Bifora radians)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Ruchetta selvatica *(Diplotaxis spp.)*, Camomilla *(Matricaria camomilla)*, Miagro *(Miagrum perfoliatum)*, Acetosella *(Oxalis cernua)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Correggiola *(Polygonum aviculare)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvolus)*, Rapistro *(Rapistrum rugosum)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Centocchio *(Stellaria media)*. Per il contollo di malerbe "difficili" quali Fiordaliso *(Centaurea cianus)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Geranio selvatico *(Geranium dissectum)*, Falsa ortica *(Lamium purpureum)*, Ranuncoli *(Ranunculus spp.)*, Romici *(Rumex spp.)*, Pettine di Venere *(Scandix pecten veneris)*, Veronica *(Veronica spp.)*, Veccia *(Vicia spp.)*, Viola *(Viola tricolor)* si consiglia l'utilizzo della dose di 15 g/Ha, aggiungendo un bagnante non ionico all'1%. Nel caso di infestazioni complesse con presenza di Crisantemo delle messi *(Chrisantemum segetum)* e Rafano *(Raphanus raphanistrum)* applicare GRENADIER alla dose di 20 g/Ha con l'aggiunta di bagnante non ionico all 1%.
Distribuire il prodotto con volumi di acqua di 200-400 l/Ha.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
GRENADIER 75 WG , dopo essere stato dosato, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito per circa un quarto mantenendo l'agitatore in funzione; portato a volume il serbatoio, effettuare il trattamento mantenendo costantemente la poltiglia in agitazione, anche durante eventuali soste con irriratore chiuso.
La sospensione diserbante di GRENADIER 75 WG deve essere preparata poco prima della sua distribuzione in campo.
AVVERTENZE
- Nell'esecuzione del trattamento evitare le sovrapposizioni di prodotto e chiudere la barra irroratrice durante le svolte e le fermate.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotato il serbatoio, risciacquarlo accuratamente con acqua pulita unitamente alla pompa e alla barra di distribuzione; svuotare quindi nuovamente l'impianto di distribuzione.

b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione al 6% di ammoniaca per uso domestico nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barra di distribuzione mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto precedentemente.
d) Eliminare accuratamente le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barra con acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con la soluzione di ammoniaca per uso domestico.
- Dopo un trattamento con GRENADIER 75 WG si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.
- Al fine di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un diserbante, è consigliabile alternare prodotti aventi differente meccanismo d'azione.

COMPATIBILITA': GRENADIER 75 WG è compatibile con i più comuni diserbanti del Frumento (tenero e duro) e dell'Orzo. In caso di miscela con altri formulati versare nella botte prima GRENADIER 75 WG e successivamente gli altri prodotti.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare di contaminare corpi idrici.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Foglio illustrativo

GRENADIER 75 WG

Diserbante selettivo per il diserbo in post-emergenza del Frumento (tenero e duro) e dell'Orzo in granuli idrodispersibili

CARATTERISTICHE
GRENADIER 75 WG è un diserbante di post-emergenza per il controllo delle principali infestanti a foglia larga nelle colture di frumento (tenero e duro) e di orzo. Viene rapidamente assorbito dalle foglie e dalle radici delle piante trattate e traslocato, mediante i flussi linfatici, agli apici vegetativi. GRENADIER 75 WG blocca la crescita delle malerbe subito dopo la penetrazione all'interno degli organi vegetali eliminandone la competizione con la coltura; i sintomi visibili (ingiallimenti, necrosi dei tessuti e successiva morte) si manifestano da 1 a 3 settimane dal momento dell'applicazione. Andamenti stagionali caldi e umidi dopo il trattamento favoriscono la rapidità d'azione del diserbante.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
GRENADIER 75 WG si impiega su **Frumento** (tenero e duro) e su **Orzo** alla dose di 10-15 g/Ha, intervenendo dallo stadio delle tre foglie fino alla fase di "botticella " della coltura.
GRENADIER 75 WG è particolarmente efficace nei confronti di Aneto *(Anethum gravelescens)*, Coriandolo fetido *(Bifora radians)*, Borsa del pastore *(Capselia bursa pastoris)*, Ruchetta selvatica *(Diplotaxis spp.)*, Camomilla *(Matricaria camomilla)*, Miagro *(Miagrum perfoliatum)*, Acetosella *(Oxalis cernua)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Correggiola *(Polygonum aviculare)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvolus)*, Rapistro *(Rapistrum rugosum)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Centocchio *(Stellaria media)*. Per il contollo di malerbe "difficili" quali Fiordaliso *(Centaurea cianus)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Geranio selvatico *(Geranium dissectum)*, Falsa ortica *(Lamium purpureum)*, Ranuncoli *(Ranunculus spp.)*, Romici *(Rumex spp.)*, Pettine di Venere *(Scandix pecten veneris)*, Veronica *(Veronica spp.)*, Veccia *(Vicia spp.)*, Viola *(Viola tricolor)* si consiglia l'utilizzo della dose di 15 g/Ha, aggiungendo un bagnante non ionico all'1%. Nel caso di infestazioni complesse con presenza di Crisantemo delle messi *(Chrisantemum segetum)* e Rafano *(Raphanus raphanistrum)* applicare GRENADIER alla dose di 20 g/Ha con l'aggiunta di bagnante non ionico all 1%.
Distribuire il prodotto con volumi di acqua di 200-400 l/Ha.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
GRENADIER 75 WG , dopo essere stato dosato, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito per circa un quarto mantenendo l'agitatore in funzione; portato a volume il serbatoio, effettuare il trattamento mantenendo costantemente la poltiglia in agitazione, anche durante eventuali soste con irriratore chiuso.
La sospensione diserbante di GRENADIER 75 WG deve essere preparata poco prima della sua distribuzione in campo.
AVVERTENZE
- Nell'esecuzione del trattamento evitare le sovrapposizioni di prodotto e chiudere la barra irroratrice durante le svolte e le fermate.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotato il serbatoio, risciacquarlo accuratamente con acqua pulita unitamente alla pompa e alla barra di distribuzione; svuotare quindi nuovamente l'impianto di distribuzione.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione al 6% di ammoniaca per uso domestico nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barra di distribuzione mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto precedentemente.
d) Eliminare accuratamente le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barra con acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con la soluzione di ammoniaca per uso domestico.
- Dopo un trattamento con GRENADIER 75 WG si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.
- Al fine di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un diserbante, è consigliabile alternare prodotti aventi differente meccanismo d'azione.
COMPATIBILITA': GRENADIER 75 WG è compatibile con i più comuni diserbanti del Frumento (tenero e duro) e dell'Orzo. In caso di miscela con altri formulati versare nella botte prima GRENADIER 75 WG è successivamente gli altri prodotti.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare di contaminare corpi idrici.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Etichetta formato ridotto ai sensi dell'Art.16 comma 2 del D.L. 194/95 per le taglie da g 10 – 15 – 20 - 50

GRENADIER 75 WG

Diserbante selettivo per il diserbo in post-emergenza del Frumento (tenero e duro) e dell'Orzo in granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- **Tribenuron metile** puro	g	75
- **Coformulanti**	q.b. a g	100

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di Produzione: A.D.I.C.A. Srl – Nera Montoro (TR)

Stabilimento di Confezionamento: SCAM S.p.a. – Modena

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12346 del 14/09/2004

g 10 – 15 – 20 – 50 **Partita n. :**

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: in caso di intossicazione ricorrere al medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

OROVIT TRIPLO

Fungicida sistemico e di contatto, ad azione preventiva e curativa, per la lotta contro la Peronospora della vite, del pomodoro (fino alla prima fioritura) e del tabacco in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- **Fosetil-Alluminio** puro g 32,5
- **Cimoxanil** puro g 2,5
- **Mancozeb** puro g 25
- **Coformulanti** q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: irritante per le vie respiratorie. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena
Distributore: S.I.V.A.M. S.p.A. – Via Scarlatti, 30 - Milano
Autorizzazione Ministero della Salute n. 12364 del 23/11/2004

Kg 0,4 / 1 / 5 / 10 Partita n. :

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi d'associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO puro 32,5%; CIMOXANIL puro 2,5%, MANCOZEB puro 25% le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: FOSETIL ALLUMINIO – **Sintomi**: == CIMOXANIL – Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. MANCOZEB – **Sintomi**: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. **Terapia**: sintomatica. **Controindicazioni**: === **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE OROVIT TRIPLO è un fungicida antiperonosporico che unisce le proprietà sistemiche del Fosetil-Alluminio, le caratteristiche di citotropicità del Cimoxanil e l'azione di contatto del Mancozeb. OROVIT TRIPLO possiede attività preventiva e curativa, essendo in grado di inibire lo sviluppo del patogeno entro 2 giorni dal momento dell'infezione. OROVIT TRIPLO è caratterizzato da una lunga persistenza d'azione che consente interventi a cadenza fissa assicurando la protezione sia la vegetazione presente al momento del trattamento che quella formatasi successivamente.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Colture	Parassiti	Dosi	Applicazione
VITE	Peronospora	400 g/hl (4 Kg/Ha)	Iniziare i trattamenti quando si verificano le prime condizioni favorevoli allo sviluppo della peronospora; proseguire quindi le applicazioni a cadenza di 12 giorni. Nei casi di andamento stagionale particolarmente piovoso ed in presenza di elevata pressione della malattia accorciare l'intervallo a 10 giorni.
POMODORO (fino alla prima fioritura)	Peronospora	400 g/hl	Trattamenti preventivi ogni 10-12 giorni
TABACCO	Peronospora	4 Kg/Ha	Interventi preventivi ogni 10-12 giorni

Nella preparazione della miscela diluire la quantità di prodotto occorrente in poca acqua e mescolare fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Versare quindi nel serbatoio dell'irroratrice e portare a volume di distribuzione mantenendo in funzione l'agitatore.
COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con gli olii minerali. In caso di miscela con concimi fogliari si consiglia di procedere a saggi preliminari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

OROVIT TRIPLO

Fungicida sistemico e di contatto, ad azione preventiva e curativa, per la lotta contro la Peronospora della vite, del pomodoro (fino alla prima fioritura) e del tabacco in polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Fosetil alluminio puro g 32,5
- Cimoxanil puro g 2,5
- Mancozeb puro g 25
- Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Da sciogliere in acqua senza rompere

Contenuto 400 g – 2 Kg

Avvertenza: leggere l'etichetta riportata sulla confezione prima di utilizzare il prodotto

DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164
41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12364 del 23/11/2004

OROVIT TRIPLO

Fungicida sistemico e di contatto, ad azione preventiva e curativa, per la lotta contro la Peronospora della vite, del pomodoro (fino alla prima fioritura) e del tabacco in polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- **Fosetil-Alluminio** puro g 32,5
- **Cimoxanil** puro g 2,5
- **Mancozeb** puro g 25
- **Coformulanti** q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: irritante per le vie respiratorie. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena
Distributore: S.I.V.A.M. S.p.A. – Via Scarlatti, 30 - Milano
Autorizzazione Ministero della Salute n. 12364 del 23/11/2004

Kg 2 = (5 sacchetti da 400 g) Kg 4 = (10 sacchetti da 400 g)
Kg 8 = (4 sacchetti da 2 kg)

Partita n.:

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi d'associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO puro 32,5%; CIMOXANIL puro 2,5%, MANCOZEB puro 25% le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: FOSETIL ALLUMINIO – **Sintomi**: == CIMOXANIL – Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. MANCOZEB – **Sintomi**: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. **Terapia**: sintomatica. **Controindicazioni**: === **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE OROVIT TRIPLO è un fungicida antiperonosporico che unisce le proprietà sistemiche del Fosetil-Alluminio, le caratteristiche di citotropicità del Cimoxanil e l'azione di contatto del Mancozeb. OROVIT TRIPLO possiede attività preventiva e curativa, essendo in grado di inibire lo sviluppo del patogeno entro 2 giorni dal momento dell'infezione. OROVIT TRIPLO è caratterizzato da una lunga persistenza d'azione che consente interventi a cadenza fissa assicurando la protezione sia la vegetazione presente al momento del trattamento che quella formatasi successivamente.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Colture	Parassiti	Dosi	Applicazione
VITE	Peronospora	400 g/hl (4 Kg/Ha)	Iniziare i trattamenti cuando si verificano le prime condizioni favorevoli allo sviluppo della peronospora; proseguire quindi le applicazioni a cadenza di 12 giorni. Nei casi di ancamento stagionale particolarmente piovoso ed in presenza di elevata pressione della malattia accorciare l'intervallo a 10 giorni.
POMODORO (fino alla prima fioritura)	Peronospora	400 g/hl	Trattamenti preventivi ogni 10-12 giorni
TABACCO	Peronospora	4 Kg/Ha	Interventi preventivi ogni 10-12 giorni

Nella preparazione della miscela diluire la quantità di prodotto occorrente in poca acqua e mescolare fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Versare quindi nel serbatoio dell'irroratrice e portare a volume di distribuzione mantenendo in funzione l'agitatore.
COMPATIBILITÀ': il prodotto non è compatibile con gli olii minerali. In caso di miscela con concimi fogliari si consiglia di procedere a saggi preliminari.
AVVERTENZA D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all'introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione chiudere bene la scatola. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI -PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - DA NON VENDERSI SFUSO-SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE - NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE - Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade -DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE - DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE.**

25%

1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua

2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti

3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore

4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ed

5) ...aggiungere la restante parte d'acqua necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

GARDENOX 2G

DISERBANTE SELETTIVO GRANULARE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Oxadiazon puro		**g 2**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g 100**

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

FRASI DI RISCHIO Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
MODALITÀ E CAMPI DI IMPIEGO GARDENOX 2G é un erbicida granulare selettivo efficace contro numerose infestanti graminacee e dicotiledoni quali Acetosella *(Oxalis spp.)*, Alisma *(Alisma spp.)*, Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Atriplice maggiore *(Atriplex patula)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa-pastoris)*, Giunco *(Butomus umbellatus)*, Camomilla *(M. camomilla)*, Sanguinella *(Digitaria sanguinalis)*, Farinaccio *(Chenopodium spp.)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Erba calderina *(Senecius vulgaris)*, Erba morella *(Solanum nigrum)*, Eterantera *(Heterantera spp.)*, Euforbia *(Euphorbia spp.)*, Giavone *(Echinocloa spp.)*, Galinsoga *(Galinsoga parviflora)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Fienarola *(Poa spp.)*, Poligoni *(Poligonum spp.)*, Erba porcellana *(Portulaca oleracea)*, Ravanello(*Rafanus raphanistrum)*, Romice *(Rumex spp.)*, Scirpus *(Scirpus spp.)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Veronica *(Veronica spp.)* Vilucchio (*Convolvolus arvensis)*. Parziale risulta invece l'attività nei confronti di Avena selvatica *(Avena spp.)*, Attacamani *(Galium aparine)*, Cencio molle *(Abutilon theophrasti)*, Forbicina *(Bidens tripartita)*, Spino d'asino *(Xantium italicum)*, Loglio *(Lolium spp.)* GARDENOX 2G puo' essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi:
Tappeti erbosi di graminacee
150-180 Kg/Ha. L'operazione di diserbo va eseguita prima dell'emergenza delle infestanti.
Vivai di piante di Pesco, Melo, Pero, Albicocco, Susino, Arancio, Clementino, Mandarino, Limone, Olivo, Pioppo e Ornamentali:
- 150 Kg/Ha. Intervenire dopo la messa a dimora, a fine inverno (Febbraio) e prima dell'emergenza delle infestanti.

Vite
- 50 Kg/Ha (infestanti annuali) - 150 Kg/Ha (Vilucchio e infestanti poliennali). Impiegare solo su impianti in produzione, evitando che il prodotto venga a contatto con la vegetazione. Applicare il prodotto prima della ripresa vegetativa della coltura, adattando dose in funzione della flora infestante da combattere.

Actinidia:
- 150 kg/Ha. Intervenire in pre-emergenza delle infestanti su terreni dotati di un buon livello di umidità o effettuare una leggera irrigazione dopo l'applicazione. La chioma delle piante deve essere asciutta. Non trattare su vivai.

Riso:
- 25 kg/Ha nei terreni di medio impasto
- 20 kg/Ha nei terreni argillosi

Il prodotto va distribuito 6-7 giorni prima della semina del riso, dopo la preparazione del terreno e mantenendo un normale livello dell'acqua. In terreni perfettamente livellati il trattamento può essere effettuato 2-3 giorni prima della semina in acqua limpida. Dopo la distribuzione del formulato mantenere l'acqua ferma e ad un livello costante per almeno 48 ore.
Immediatamente prima della semina effettuare il ricambio dell'acqua nella risaia.
COMPATIBILITA': il prodotto va impiegato da solo.
FITOTOSSICITA': **nei trattamenti in vivaio non intervenire su piante non sufficientemente lignificate**. Non trattare vivai di vite, piante madri o barbatelle appena messe a dimora. Nei terreni particolarmente asciutti il prodotto non esplica completamente la sua azione. Pertanto, nei casi di siccità, è necessario prevedere un'irrigazione entro 10-12 giorni dal trattamento.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci. Nel corso degli interventi tenere lontani dalla zona interessata persone non protette, animali domestici e bestiame.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena
A.D.I.C.A Srl - Nera Montoro (TR)
Schirm GmbH – Division Sideco – Lübeck (Germania)

Distribuito da: COMPO Agricoltura Spa – Via Marconato, 8 – Cesano Maderno (MI)

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12402 del 09/12/2004

Kg 0,5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 25 **Partita n.**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO – SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

VEBIPHOS M 223

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Clorpirifos-metile puro g 22,1 (= 223 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa Modena
Stabilimento di confezionamento:
VE.BI Sas del Dr. L.Bazzolo & C. – Via Desman, 43 – S.Eufemia di Borgoricco (PD)
Distribuito da:
VE.BI Sas del Dr. L.Bazzolo & C. – Via Desman, 43 – S.Eufemia di Borgoricco (PD)

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12408 del 09/12/2004

L 0,100 - 0,500 **Partita n. :**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia : atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
VEBIPHOS M 223 è un insetticida fosforganico che esplica la propria azione per contatto, per ingestione e, più limitatamente in fase di vapore.
Risulta indicato sulle seguenti colture:
Melo, Pero, Pesco: contro tortricidi ricamatori *(Archips spp, Pandemis spp., A. orana, A. pulchellana, H. nubifera, Recurvaria spp., Hypomoneuta spp., ecc.),* Carpocapsa *(C. pomonella),* Cidia orientale (*C. molesta*), Anarsia (*A. lineatella*), Mosca della frutta *(C. capitata),* 200-250 ml/hl. Contro le neanidi di Cocciniglie *(Q. perniciosus, ecc.)* 200-250 ml/hl.
Arancio, Limone, Mandarino, Clementino: contro Tignola della zagara *(P. citri),* Cimicetta verde *(C. trivialis),* Formiche *(L. humile, C. nylanderi, ecc.),* Metcalfa *(M. pruinosa)*, e neanidi di Cocciniglie *(A. aurantii, A. nerei, Coccus spp., Ceroplastes spp., S. oleae, ecc.)* 250 ml/hl
Vite: contro le Tignole *(L. botrana, C. ambiguella, A. pulchellana),* Cicaline (*S. titanus, E. flavescens, ecc.*) Tripidi *(D. reuteri, Franklinella spp., ecc.),* Nottue *(Noctua spp.),* Metcalfa *(M. pruinosa),* e neanidi di Cocciniglie *(T. vitis, ecc.)* 100-200 ml/hl. Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cultivar sensibili; si raccomandano pertanto saggi zonali e varietali.
Fragola: contro Tripidi (*F. occidentalis, ecc.*), Nottue (*Agrotis spp., ecc.*), Afidi (*S. fragarie, ecc.*), Tortricidi (*E. pulchellana, P. dumetana, ecc.*) 300-400 ml/hl.
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Pisello, Ravanello, Patata: contro Nottue *(Agrotis spp., Mamestra spp., ecc.),* Tripidi *(T. tabaci, ecc.),* Gortina *(Gortyna spp.),* Cavolaia *(P. brassicae),* Macaone *(Papillio spp.),* Dorifora *(L. decemlineata),* 1,5-2,0 l/Ha .
Mais: contro Nottue *(Agrotis spp.),* Piralide *(O. nubilalis)* ed Elateridi *(Agroties spp.)* 300 ml/hl.
Pioppo: contro Saperda *(Saperda spp.),* Gemmaiola *(G. acerina),* Criptorrinco *(C. lapathi),* Ifantria *(H. cunea)* 400-500 ml/hl.
Garofano, Crisantemo, Azalea, Ciclamino: contro Bega , Tortricidi, Oziorrinco e neanidi di Cocciniglie 200 ml/hl.
COMPATIBILITA': non è miscibile con formulati a reazione alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non impiegare il prodotto sulle varietà di melo Stayman Red, Stayman Winesap, Gloster, Gallia Beauty. In post-fioritura del melo non eseguire più di 2 trattamenti. Non effettuare trattamenti su Arancio nei mesi compresi tra gennaio ed aprile.
INTERVALLO DI SICUREZZA Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO -IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

Foglio illustrativo

VEBIPHOS M 223

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
VEBIPHOS M 223 è un insetticida fosforganico che esplica la propria azione per contatto, per ingestione e, più limitatamente in fase di vapore.
Risulta indicato sulle seguenti colture:
Melo, Pero, Pesco: contro tortricidi ricamatori *(Archips spp, Pandemis spp., A. orana, A. pulchellana, H. nubifera, Recurvaria spp., Hypomoneuta spp., ecc.)*, Carpocapsa *(C. pomonella)*, Cidia orientale (*C. molesta*), Anarsia (*A. lineatella*), Mosca della frutta *(C. capitata)*, 200-250 ml/hl. Contro le neanidi di Cocciniglie *(Q. perniciosus, ecc.)* 200-250 ml/hl.
Arancio, Limone, Mandarino, Clementino: contro Tignola della zagara *(P. citri)*, Cimicetta verde *(C. trivialis)*, Formche *(L. humile, C. nylanderi, ecc.)*, Metcalfa *(M. pruinosa)*, e neanidi di Cocciniglie *(A. aurantii, A. nereii, Coccus spp., Ceroplastes spp., S. oleae, ecc.)* 250 ml/hl
Vite: contro le Tignole *(L. botrana, C. ambiguella, A. pulchellana)*, Cicaline (*S. titanus, E. flavescens, ecc.*) Tripidi *(D. reuteri, Franklinella spp., ecc.)*, Nottue *(Noctua spp.)*, Metcalfa *(M. pruinosa)*, e neanidi di Cocciniglie *(T. vitis, ecc.)* 100-200 ml/hl. Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cultivar sensibili; si raccomandano pertanto saggi zonali e varietali.
Fragola: contro Tripidi (*F. occidentalis, ecc.*), Nottue (*Agrotis spp., ecc.*), Afidi (*S. fragarie, ecc.*), Tortricidi (*E. pulchellana, P. dumetana, ecc.*) 300-400 ml/hl.
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Pisello, Ravanello, Patata: contro Nottue *(Agrotis spp., Mamestra spp., ecc.)*, Tripidi *(T. tabaci, ecc.)*, Gortina *(Gortyna spp.)*, Cavolaia *(P. brassicae)*, Macaone *(Papillio spp.)*, Dorifora *(L. decemlineata)*, 1,5-2,0 l/Ha .
Mais: contro Nottue *(Agrotis spp.)*, Piralide *(O. nubilalis)* ed Elateridi *(Agroties spp.)* 300 ml/hl.
Pioppo: contro Saperda *(Saperda spp.)*, Gemmaiola *(G. acerina)*, Criptorrinco *(C. lapathi)*, Ifantria *(H. cunea)* 400-500 ml/hl.
Garofano, Crisantemo, Azalea, Ciclamino: contro Bega , Tortricidi, Oziorrinco e neanidi di Cocciniglie 200 ml/hl.
COMPATIBILITA': non è miscibile con formulati a reazione alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non impiegare il prodotto sulle varietà di melo Stayman Red, Stayman Winesap, Gloster, Gallia Beauty. In post-fioritura del melo non eseguire più di 2 trattamenti. Non effettuare trattamenti su Arancio nei mesi compresi tra gennaio ed aprile.
INTERVALLO DI SICUREZZA Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Etichetta formato ridotto ai sensi dell'Art.16 comma 2 del D.L. 194/95 per le taglie da ml 100

VEBIPHOS M 223

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Clorpirifos-metile puro g 22,1 (= 223 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa Modena

Stabilimento di confezionamento:
VE.BI Sas del Dr. L.Bazzolo & C. – Via Desman, 43 – S.Eufemia di Borgoricco (PD)

Distribuito da:
VE.BI Sas del Dr. L.Bazzolo & C. – Via Desman, 43 – S.Eufemia di Borgoricco (PD)

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12408 del 09/12/2004

ml 100 **Partita n. :**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia : atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

VICTRIX-SC

Acaricida in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Fenbutatin-ossido puro g 44 (= 500 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

Attenzione! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui art. 25 del DPR 23 Aprile 2001, n.290.
FRASI DI RISCHIO: molto tossico per inalazione. Irritante per gli occhi e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena
Distribuito da: Agrosol Srl – Via Matteotti, 16 - Ravenna
Autorizzazione Ministero della Salute n. 11049 del 23/10/2001

L 0,100 / 0,250 / 0,500 / 1 **Partita n. :**

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: irritante per cute e mucose, cefalea, tinnitus, vertigini, dolori lombari e addominali, insufficienza respiratoria e circolatoria, interessamento del SNC e periferico con nevralgie e paralisi. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE VICTRIX-SC è un acaricida che agisce per contatto contro le forme mobili degli acari (larve, adulti). La sua azione, cui si associa un effetto "antifeeding" che riduce progressivamente la capacità degli acari di nutrirsi, si sviluppa in maniera progressiva e si mantiene su livelli ottimali per un notevole periodo (4-6 settimane). E' pertanto necessario intervenire ai primi sintomi dell'infestazione bagnando accuratamente la vegetazione. VICTRIX-SC è caratterizzato da una elevata selettività verso l'acaroentomofauna utile.
MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO VICTRIX-SC può essere impiegato sulle seguenti colture ai dosaggi di seguito indicati: **Vite**: contro il Ragnetto rosso e giallo (*Panonychus ulmi, Eotetranychus carpini*) e gli Eriofidi (*Calepitrimerus vitis*) alla dose di 100-110 ml/hl. **Melo, Pero**: contro il Ragnetto rosso (*Panonychus ulmi, Tetranychus urticae*) e gli Eriofidi (*Epitrimerus pyri, Aculus schlechtendali, Aculus fockeui, Eriophyes similis*) alla dose di 100-110 ml/hl. **Agrumi** : contro i Ragnetti rossi (*Panonychus citri, Tetranychus urticae*) e gli Eriofidi (*Aculops pelekassi*) alla dose di 100-110 ml/hl. **Cetriolo, Pomodoro**: contro il Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*) e gli Eriofidi (*Aculops lycopersici*) alla dose di 100-110 ml/hl. **Colture Floreali e Ornamentali**: contro il Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae, Panunychus ulmi, Eototetranychus tiliarus, Oligonychus ununguis, Trisetacus juniperinus, ecc.*) e gli Eriofidi (*Stenacis triradiatus, Phytoptus spp., Phyllocoptes trotteri, ecc.*) alla dose di 100-110 ml/hl.
COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con i preparati fitosanitari a reazione alcalina. Evitare le miscele con preparati contenenti zolfo in presenza di temperature elevate.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': negli interventi su colture di rosa è opportuno effettuare, data la notevole varietà di specie presenti, saggi preliminari di sensibilità al prodotto. Evitare l'impiego del prodotto con olii minerali negli interventi su agrumi. L'efficacia di VICTRIX-SC può risultare ridotta se applicato in concomitanza con Poltiglia Bordolese o Captano, per cui conviene distanziare tra loro i trattamenti di alcuni giorni.
RISCHI DI NOCIVITÀ': il prodotto è tossico per i pesci.
PERIODO DI CARENZA Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta:
- 30 giorni per Melo, Pero, Cetriolo, Pomodoro
- 45 giorni la Vite
- 60 giorni per gli Agrumi

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

06A05237

SEGUE IV ELENCO

Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 162 del 14 luglio 2006 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 luglio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

MINISTERO DELLA SALUTE

Etichette di prodotti fitosanitari riclassificati ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, con decreti dirigenziali del Ministero della salute.

ELENCO IV

S O M M A R I O

MINISTERO DELLA SALUTE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo alle etichette di prodotti fitosanitari riclassificati ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 con decreti dirigenziali del Ministero della salute. (IV Elenco).

Si pubblica il quarto elenco di etichette di prodotti fitosanitari riclassificati ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65.

Il presente comunicato raccoglie le etichette, fornite dalle Imprese, dei prodotti fitosanitari riclassificati con decreti dirigenziali i cui allegati sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

La vendita e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in questione, confezionati con le etichette precedentemente autorizzate, è consentito fino al 30 gennaio 2007.

I N D I C E

QUARTO ELENCO

TERRANALISI S.r.l.

ACARED 40 S

ACARICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

ACARED 40 S
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
DICOFOL puro g 34 (g/l 340)
Coformulanti q. b. a 100

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. – Irritante per la pelle. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. - In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. – Via IV Novembre n. 19/1 – Renazzo di Cento (FE) / ALTHALLER ITALIA S.R.L. - Strada Comunale Per Campagna - San Colombano Al Lambro (MI) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164 - Modena

Registrazione del Ministero della Sanità: n. 1151 del 26/03/1973
CONTENUTO: ℓ 1
Riferimento partita n.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica: barbiturici contro i tremori e le convulsioni
Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Acaricida per la lotta contro neanidi ed adulti dei ragnetti rossi ed acari in genere, infestanti: **viti da vino, agrumi, cucurbitacee, colture floreali in pieno campo.**
ACARED 40 S possiede efficacia e persistenza d'azione.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
ACARED 40 S si impiega alla dose di ml 100 per 100 litri di acqua.
In caso di forti infestazioni la dose può essere opportunamente aumentata.
I trattamenti si effettuano alla comparsa delle formi mobili degli acari e se necessario vanno ripetuti.
Diluire il prodotto nel quantitativo totale di acqua rimescolando bene.

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con i più comuni prodotti fitosanitari eccetto quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA' - E' nocivo per gli insetti utili.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ACARPLUS

ACARICIDA SELETTIVO IN SOSPENSIONE ACQUOSA

ACARPLUS
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
FENBUTATIN OSSIDO puro g 50 (g/l 570)
Coformulanti q. b. a 100

MOLTO TOSSICO

Pericoloso per l'ambiente

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290 del 23/04/2001.
FRASI DI RISCHIO - Molto tossico per inalazione. – Irritante per gli occhi e la pelle. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, nè fumare durante l'impiego. - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE)
Registrazione del Ministero della Salute n. 12002 del 23/03/2004
CONTENUTO: ml 200-250-500 ℓ 1-5-10
Riferimento partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose, cefalea, tinnitus, vertigini, dolori lombari e addominali, insufficienza respiratoria e circolatoria, interessamento del SNC e periferico con nevralgie e paralisi.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
ACARPLUS è un acaricida di superficie attivo nei confronti delle forme mobili degli acari (Panonychus ulmi, Tetranichus urticae, Eotetranychus carpini, E. vitis, Ectetranychus pruni), che infestano pero, melo, vite, agrumi, nonché pomodoro, cetriolo ed ornamentali.
L'attività acaricida dell'ACARPLUS aumenta progressivamente dopo il trattamento e mantiene valori elevati, per un periodo di 4-6 settimane. Nei trattamenti d'estate inoltrata si previene quindi, in buona misura, con conseguente minore infestazione nella primavera successiva, la deposizione delle uova d'inverno che hanno luogo verso la fine stagione da parte delle femmine di P. ulmi.
ACARPLUS nei trattamenti a volume normale s'impiega alla dose di ml 88 ogni 100 litri di acqua. L'intervento va effettuato alla comparsa dei primi sintomi d'infestazione bagnando accuratamente tutta la chioma.

COMPATIBILITÀ' - Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari normalmente impiegati sulle colture citate.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ - Il prodotto può essere fitotossico nei confronti di alcune varietà di rose.

NOCIVITÀ - Il prodotto è tossico per i pesci

INTERVALLO DI SICUREZZA:
- 60 giorni per agrumi
- 45 giorni per la vite
- 30 giorni per pomacee, pomodoro e cetriolo

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ACARTOX

PRODOTTO ACARICIDA PER IMPIEGO SU NUMEROSE COLTURE
TIPO DI FORMULAZIONE: POLVERE BAGNABILE

ACARTOX
COMPOSIZIONE: g 100 di prodotto contengono
EXITIAZOX puro g 10
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / CHEMIA S.P.A., Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / SCAM S.R.L. - Strada Bellaria n. 164 - Modena / S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. - Via Evangelista Torricelli n. 2 - Cotignola (RA) / TORRE S.r.l. – Via Pian d'Asso – Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Registrazione del Ministero della Salute n. 11322 del 09/05/2002
Riferimento partita n.: CONTENUTO: g 50-100-200-250-500 Kg 1-5-10-20

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO – In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
ACARTOX è un prodotto acaricida in polvere bagnabile che agisce per contatto ed ingestione, ed inoltre è dotato di effetto translaminare, con notevole persistenza d'azione ed estrema selettività nei confronti delle api e degli acari predatori.
La sua azione acaricida è mirata a combattere uova, larve e ninfe di acari tetranichidi rossi e gialli (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini f. vitis).
Viene impiegato sulle seguenti colture: *melo - pero - pesco - agrumi - vite - fragola - actinidia - melone - cetriolo - peperone - melanzana - pomodoro - fagiolino - soia - colture floreali in pieno campo ed in serra,* trattando in presenza di pochissime forme mobili (1 - 2 acari per foglia) alla dose di g. 50 per ettolitro di acqua, nel caso vi sia necessità si miscela con prodotti acaricidi adulticici per avere una rapida azione iniziale sugli adulti. Per ottenere un risultato migliore bagnare abbondantemente la vegetazione trattata.

COMPATIBILITA' - Non compatibile con i prodotti a reazione alcalina.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta di fragola, peperoni, melanzane, fagiolini, pomodoro, melone, cetriolo - 14 giorni prima della raccolta di pesco, melo, pero, actinidia, agrumi, vite - 34 giorni prima della raccolta della soia.
FITOTOSSICITA' - Sulle floricole si consiglia un saggio preliminare su piccole superfici.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro impiego è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ACARTOX

PRODOTTO ACARICIDA PER IMPIEGO SU NUMEROSE COLTURE
TIPO DI FORMULAZIONE: POLVERE BAGNABILE

ACARTOX
COMPOSIZIONE: g 100 di prodotto contengono
EXTIAZOX puro g 10
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO - Tossico per gli organismi acquatici, puòprovoca re a lungo termine effetti negativi per lambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante limpiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Non disperdere nellambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Registrazione del Ministero della Salute n. 11322 del 09/05/2002
Riferimento partita n.: CONTENUTO: g 50-100

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "
OPPURE:
" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

AGRIFEN 11 SC

(SOSPENSIONE CONCENTRATA) FUNGICIDA ORGANICO CON AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA, SPECIFICO PER IL CONTROLLO DELL'OIDIO E DELLA TICCHIOLATURA

AGRIFEN 11 SC
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
FENARIMOL puro g 11 (g/l 122)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
- Possibile rischio di ridotta fertilità. - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. – Possibile rischio per i bambini allattati al seno. – Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
– Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164 - Modena

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9043 del 23/12/1996
CONTENUTO: ml 20-50-100-150-200-250-500 ℓ 1-3-5-10
Riferimento partita N.

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
AGRIFEN 11 SC è un fungicida con azione preventiva e bloccante specifico per il controllo dell'Oidio e della Ticchiolatura. Il prodotto penetra all'interno dei tessuti verdi irrorati ed agisce dall'interno al riparo di eventuali piogge dilavanti. **Malattie combattute:** Oidi, (Podosphaera leucotricha, Sphaeroteca pannosa, Sphaeroteca fuliginea, Sphaeroteca macularis, Erysiphe polygoni, Erysiphe cichoracearum, Leivellula taurica, Mycrosphaera betae) e Ticchiolatura. **Colture protette:** melo, pero, pesco, vite, melone, cocomero, zucca, zucchino, cetriolo, peperone, pomodoro, fragola.

ISTRUZIONI PER L'USO
Modalità d'impiego: AGRIFEN 11 SC si usa alle dosi indicate impiegando irroratrici a volume normale e la quantità di acqua necessaria per bagnare abbondantemente tutta la vegetazione. Per l'impiego con irroratrici a basso volume, la concentrazione va proporzionalmente aumentata in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro. **Preparazione della miscela:** versare la quantità richiesta di AGRIFEN 11 SC nella botte piena a metà ed agitare bene durante il completamento del riempimento. Non è necessaria l'aggiunta di bagnanti.

SETTORI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
MELO: Oidio ml 30-40/hl ad intervalli di 7-10 giorni, iniziando i trattamenti alla fase delle orecchiette di topo. MELO: (Oidio e Ticchiolatura), PERO (Ticchiolatura): ml 30-40/hl in miscela estemporanea con Captano, Dodina e Mancozeb. VITE da tavola: (Oidio) ml 10-15/hl ad intervalli di 7-10 giorni da quando i germogli sono lunghi cm 10 fino all'allegagione. Dopo l'allegagione aumentare la dose a ml 25-30/hl. VITE da vino: (Oidio) ml 10-15/hl ad intervalli di 7-15 giorni da quando i germogli sono lunghi cm 10 fino all'allegagione. Dopo l'allegagione aumentare la dose a ml 15-30/hl. PESCO: (Oidio) ml 35-40/hl dalla sfioritura per 2-3 trattamenti ad intervalli di 7 giorni e alla comparsa dei primi sintomi dell'eventuale infezione secondaria trattare ad intervalli di 6-8 giorni. CUCURBITACEE (cetriolo, zucca, zucchino, cocomero, melone); SOLANACEE (pomodoro, peperone); FRAGOLA (fino alla prima fioritura): (Oidio) ml 30-40/hl dalla prima comparsa dei sintomi ogni 8-12 giorni.

COMPATIBILITA'- AGRIFEN 11 SC è compatibile con i più comuni fungicidi quali sali rameici, Captano, Mancozeb, Ziram. Non è compatibile con i formulati a reazione alcalina (es.:Poltiglia bordolese, Polisolfuri). Dato l'elevato numero di possibili combinazioni con i numerosi formulati commerciali, si suggerisce di saggiare la compatibilità fisica di ciascuna miscela estemporanea preparandone una piccola quantità prima dell'uso.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Nel caso di miscela con altri principi attivi con i quali l'AGRIFEN 11 SC è compatibile, fare attenzione alle eventuali controindicazioni riportate nelle etichette dei prodotti con i quali si è fatta la miscela. Non impiegare l'AGRIFEN 11 SC su varietà soggette a rugginosità quali la Golden Delicious.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta su pesco, pero e vite; 21 giorni prima della raccolta su melo; 7 gioni prima della raccolta su altre colture. Per la fragola: trattamenti ammessi solo fino alla prima fioritura.
Avvertenza: per lavorazioni agricole da effettuare entro 48 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non immettere bestiame al pascolo prima che siano trascorsi 21 giorni dal trattamento.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

AGRIFEN 11 SC

(SOSPENSIONE CONCENTRATA) FUNGICIDA ORGANICO CON AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA. SPECIFICO PER IL CONTROLLO DELL'OIDIO E DELLA TICCHIOLATURA

AGRIFEN 11 SC
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
FENARIMOL puro g 11 (g/l 122)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
- Possibile rischio di ridotta fertilità. - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. – Possibile rischio per i bambini allattati al seno. – Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
– Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9043 del 23/12/1996
CONTENUTO: ml 20-50-100
Riferimento partita N.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO"
OPPURE:
"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA"

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

ALTER

FUNGICIDA POLVERE BAGNABILE AD AZIONE SISTEMICA

ALTER
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
FOSETIL Alluminio puro g 80
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO - Rischio di gravi lesioni oculari. - Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. – Via Nino Bixio n. 6 – Cento (FE) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / CHIMAC-AGRIPHAR S.A. - Rue de Renory n. 26 - B-4102 Ougree, Belgium / SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164 - Modena / S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. - Via Evangelista Torricelli n. 2 - Cotignola (RA) / TORRE S.r.l. - Via Pian D'Asso - Torrenieri, Fraz. di Montalcino (SI) / VE.BI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. - Via Desman n. 43 - Borgoricco (PD)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9739 del 07/09/1998 CONTENUTO: g 100-200-250-500 Kg 1-5-10
Riferimento partita n. :

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni
MODALITA' D'IMPIEGO - ALTER è un fungicida ad azione sistemica ed è dotato da grande mobilità nelle piante trattate, la sua sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente che risulta più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita e gli permette di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
VITE - E' indicato per combattere la peronospora alla dose di g 250 per q.le acqua trattando sempre in miscela con prodotti di copertura. MELO, PERO, PESCO, ACTINIDIA - E' indicato per combattere la phytophthora cactorum trattando sulla vegetazione, una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta (per melo e actinidia), con g 250/hl. Nel caso di colture già debilitate dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida: effettuare un'innaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, con litri 1-2 per pianta di una poltiglia costituita da Kg 5 di prodotto per 100 litri d'acqua. MELO, PERO E' indicato per combattere la ticchioltura con trattamenti preventivi a g 150 250, nelle fasi pre fiorali e subito dopo l'allegagione si consigli l'associazione con fungicidi di copertura o con Dodina. PERO - E' indicato per combattere la maculatura bruna (stemphyllium sp.), erwinia amylovora (colpo di fuoco), trattamenti preventivi a g 250 per q.le acqua.
FRAGOLA - E' indicato per combattere peronospora (phytophthora cactorum e fragariae). L'immersione delle piante, prima del trapianto, in una poltiglia a g 250/hl per 15 minuti, seguita da 2-3 irrorazioni alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immersione delle piante prima del trapianto in una poltiglia a g 250/hl per 15 minuti, seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di g 0,5 di formulato per pianta. LATTUGA - E' indicato per combattere bremia lactucae effettuare irrorazioni in ragione di g 200-300/hl (avendo cura di distribuire almeno Kg 3 di prodotto per ettaro). Si consiglia di effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto; se si verificano forti sbalzi termici la lattuga può essere sensibile al prodotto. MELONE - E' indicato per combattere pseudoperonospora cubensis effettuare irrorazioni fogliari in ragione di g 200-300/hl avendo cura di distribuire, come minimo, Kg 3 di prodotto per ettaro.
COCOMERO, CETRIOLO, SPINACIO - E' indicato per combattere peronospora, effettuare irrorazioni fogliari alla dose di g 200-300/hl (avendo cura di distribuire, come minimo, Kg 3 di prodotto per ettaro). CARCIOFO - E' indicato per combattere bremia lactucae a g 200-300/hl. POMODORO - E' indicato per combattere la peronospora e come preventivo è indicato per combattere le batteriosi alla dose di Kg 3 per ettaro, trattando ogni 8-12 giorni in modo preventivo. ARANCIO, LIMONE, MANDARINO, POMPELMO - E' indicato per combattere phytophthora spp. effettuare irrorazioni fogliari in ragione di g 200-300/hl, utilizzando 10 litri di poltiglia per pianta.
I tratamenti alla vegetazione possono venire integrati da pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche) impiegando una poltiglia contenente g 250 di prodotto per litro d'acqua; pratica indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida. VIVAI DI FRUTTIFERI - effettuare irrorazioni fogliari alla dose di g 250/hl con cadenza mensile. VIVAI DI AGRUMI - impiegare la dose di g 400/hl ogni 60 giorni. COLTURE ORNAMENTALI in pieno campo ed in serra - E' indicato per combattere phytophthora cinnamoni di chamaecyparis e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee. Poinsettia, St. Paulia e Crisantemo, effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con g 5-10 di formulato per mq una volta al mese in primavera.

COMPATIBILITA' - Il prodotto non è compatibile con i prodotti a base di Rame, Dicofol e con concimi fogliari contenenti Azoto. Si consiglia inoltre di non irrorare il prodotto su colture precedentemente trattate con i suddetti formualti oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto. Nella miscelazione del prodotto con altri formulati si consigliano comunque saggi preliminari..
Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di inotssicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta del carciofo, cetriolo, cocomero, melone, lattuga, spinacio; 20 giorni per il pomodoro; 30 giorni per la fragola; 40 giorni per il melo, pero, pesco, actinidia e vite; 80 giorni per l' arancio, limone, mandarino, pompelmo.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - NON OPERARE CONTRO VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ALTER

FUNGICIDA POLVERE BAGNABILE AD AZIONE SISTEMICA

ALTER
COMPOSIZIONE: g 100 di prodotto contengono
FOSETIL Alluminio puro g 80
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO – Rischio di gravi lesioni oculari. - Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. – In caso di contatto con gli occhi , lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. – Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Registrazione del Ministero della Salute n. 9739 del 07/09/1998
Riferimento partita n.: CONTENUTO: g 100

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

“ PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO ”
OPPURE:
“ PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA ”

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

APOR 500

Acaricida in sospensione concentrata, efficace nella lotta contro gli acari Tetranichidi di melo, pero, prugne, vite (uve da vino), agrumi, fragola, melone, pomodoro e delle colture floricole ed ornamentali in genere.

APOR 500
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
CLOFENTEZINE puro g 42 (g/l 500)
Coformulanti q. b. a 100

IRRITANTE

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO - Irritante per la pelle. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Evitare il contatto con la pelle. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. – Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE)
Registrazione del Ministero della Salute n. 11189 del 05/02/2002
CONTENUTO: ml 10-20-25-50-100-200-250-500 ℓ 1-5
Riferimento partita n.:

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. – Conservare la confezione ben chiusa. – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - In caso di contaminazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO
APOR 500 è un preparato che agisce per contatto sulle uova invernali ed estive degli acari tetranichidi. E' inoltre attivo nei confronti dei primi stadi di sviluppo di questi fitofagi (larve e protoninfe) e assicura un controllo molto prolungato nel corso della stagione, facilitando notevolmente la lotta acaricida. Tra i fitofagi controllati, il Panonychus ulmi risulta molto sensibile al prodotto che controlla efficacemente anche Panonychus citri, Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini. Negli interventi sulle popolazioni con contemporanea presenza di diversi stadi di sviluppo degli acari è necessario associare ad APOR 500 un prodotto a prevalente azione adulticida per completare l'azione sulle forme mobili più sviluppate (deutoninfe e adulti). APOR 500 presenta caratteristiche estremamente favorevoli e tali da giustificarne l'impiego nei programmi di lotta guidata o integrata; infatti oltre a permettere la riduzione del numero degli interventi acaricidi rispetto ai programmi attuati con i prodotti tradizionali, non interferisce con la biologia degli insetti utili quali Antocoridi, Crisopidi, Coccinellidi, Sirfidi, Stafilinidi, Imenotteri. Nei confronti degli acari utili (Fitoseidi), applicazioni precoci, sulle uova invernali di P. ulmi, o nel corso della stagione, non compromettono l'importante azione di difesa esercitata da T. pyri, A. potentillae, P. persimilis. L'applicazione del prodotto può essere fatta con pompe a volume normale (circa litri 1500-2000/ha). E' inoltre possibile impiegare attrezzature operanti a basso volume (usare non meno di ℓ 500/ha di soluzione); in tal caso la dose andrà determinata in base alla superficie da trattare e non sarà inferiore a ml 400 (sulle uova invernali) e ml 500 (in piena vegetazione) di prodotto per ettaro.

ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO
Diluire il prodotto in metà del quartitativo totale di acqua da irrorare e successivamente aggiungere la restante quantità di acqua. Mantenere in agitazione la miscela sia durante l'impiego che dopo brevi interruzioni. Non lasciare la miscela nel serbatoio della pompa irroratrice per un lungo periodo di tempo o durante la notte. Lavare accuratamente l'attrezzatura subito dopo l'utilizzazione. Assicurare una completa ed uniforme bagnatura delle piante. Effettuare l'applicazione in condizioni di scarsa ventosità e con pompe operanti a bassa velocità. Evitare di trattare in condizioni di alta temperatura e bassa umidità relativa.
MELO, PERO, PRUGNE
Sulle uova invernali di Panonychus ulmi
Dose d'impiego: ml 40/hl di APOR 500 intervenendo 10-15 giorni prima della schiusura (ad es.: non oltre le orecchiette di topo C_3-D sulle Pomacee). L'aggiunta di olio bianco consente di ridurre la dose di APOR 500 a ml 30/hl.
In presenza di forme mobili (Ragno rosso)
Intervenire con APOR 500 a ml 30/hl + un adulticida autorizzato, in post-fioritura o al primo apparire della infestazione (1-3 acari per foglia).
I trattamenti sopra indicati sono da considerarsi alternativi. Nell'eventualità di una reinfestazione estiva (ad esempio in zone particolarmente infestate o con scarsa presenza di predatori) intervenire con un prodotto dotato di buona azione sulle forme mobili. Il prodotto, anche a dosi superiori a quelle consigliate, non evidenzia problemi di rugginosità sulla Golden Delicious e sul Pero.
VITE (uve da vino) - Intervenire con APOR 500 a ml 20-25/hl (+ un prodotto ad azione adulticida) in presenza di forme mobili di P. ulmi, sui giovani germogli (lunghi 5-30 cm). Su infestazioni più tardive (Ragno rosso e giallo), eseguire il trattamento con tempestività e cioè in presenza di pochi acari per foglia. Contro E. carpini si raccomanda di usare una dose leggermente più elevata (ml 25-30/hl). Una sola applicazione per stagione è generalmente sufficiente ad assicurare il controllo del fitofago.
AGRUMI (arancio, mandarino, clementino, limone, pompelmo, bergamotto) - Intervenire nelle fasi iniziali di sviluppo dell'infestazione con pochi acari per foglia. Per il controllo di P. citri impiegare ml 30/hl di APOR 500 + un adulticida. In presenza di T. urticae è consigliabile aumentare a ml 40/hl la dose di APOR 500 sempre in miscela con un prodotto adulticida.
FRAGOLA, MELONE, POMODORO, COLTURE FLORICOLE ED ORNAMENTALI (in serra ed in campo) - Per il controllo del T. urticae intervenire prima della fioritura con APOR 500 alla dose di ml 40/hl + un adulticida autorizzato sulla coltura da trattare. Interventi molto precoci con APOR 500 da solo a ml 50-60/hl impediscono la comparsa del fitofago anche nel periodo più critico della maturazione.
AVVERTENZA – Rispettare rigorosamente le norme di impiego anche per contrastare ceppi resistenti. In caso di presenza di ceppi resistenti si deve ricorrere all'impiego di un prodotto acaricida alternativo.

COMPATIBILITA' – Il prodotto è miscibile con olio bianco, rame ossicloruro, prodotti a base di DNOC. Sono decisamente sconsigliate le miscele con prodotti fortemente alcalini (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri, ecc.). Tuttavia una precedente applicazione di Polisolfuri non compromette l'efficacia di APOR 500 sulle uova invernali di Panonychus ulmi. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' – Dato l'ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà di colture floreali ed ornamentali, e soprattutto in serra, è consigliabile effettuare dei saggi preliminari di selettività prima di estendere il trattamento a tutto l'impianto.
INTERVALLO DI SICUREZZA – Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto su fragola, pomodoro, melone; 30 giorni per le altre colture.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

APOR 500

Acaricida in sospensione concentrata, efficace nella lotta contro gli acari Tetranichidi di melo, pero, prugne, vite (uve da vino), agrumi, fragola, melone, pomodoro e delle colture floricole ed ornamentali in genere.

APOR 500
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
CLOFENTEZINE puro g 42 (g/l 500)
Coformulanti q. b. a 100

IRRITANTE

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO - Irritante per la pelle. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Evitare il contatto con la pelle. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 Cento (FE) tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Salute n. 11189 del 05/02/2002
CONTENUTO: ml 10-20-25-50-100
Riferimento partita n.:

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "
oppure:
" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

AZITION 20 L

INSETTICIDA A BASE DI AZINFOS-METILE IN FORMULAZIONE LIQIDA

AZITION 20 L
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
AZINFOS METILE puro g 18 (g/l 205)
Coformulanti q. b. a 100

MOLTO TOSSICO **Pericoloso per l'ambiente**

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290 del 23/04/2001.
FRASI DI RISCHIO - Nocivo a contatto con la pelle. - Molto tossico per inalazione e per ingestione. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'am biente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non gettare i residui nelle fognature. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: CHEMIA S.p.a. – Strada Statale n. 255 Km 46 – Sant'Agostino (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 8380 del 07/08/1993
Riferimento partita N. CONTENUTO: ℓ 1

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsione, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE
AZITION 20 L agisce per contatto, ingestione ed asfissia colpendo numerosi insetti nocivi. Penetra nei tessuti fogliari ed è dotato di buona persistenza.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Dosi per 100 litri d' acqua.

colture	*parassiti*	*Dosi/hl*
Melo, pero	Carpocapsa, Ricamatrici, Cicaline, Fillominatori, Cocciniglie	ml 270-350
	Psilla del pero	ml 350-400
	Tentredini	ml 270-350
Drupacee	Tignole, Tentredini	ml 270-350
Vite	Tignole, Cicaline, Ragnetti	ml 270
Agrumi	Cocciniglie, Tignole, Mosca	ml 270-350
Barbabietola da zucchero	Cleono, Altica, Punteruolo, Nottue	ml 350
Cavolo, carciofo, asparago, sedano, zucca, cetriolo, solanacee, fagiolo, pisello, carota, patata	Dorifora della patata, Nottue, Afidi, Mamestra, Ricamatrici	ml 270-350
Fragola	Oziorrinco	ml 270-350
Pioppo	Punteruolo, Tripidi, Afidi	ml 270-400
Colture ornamentali e da fiore in pieno campo	Tripidi, Tentredini, Fillominatori, Afidi	ml 270

Preparazione della poltiglia: versare il prodotto direttamente nella quantità di acqua necessaria, mescolare bene.

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piùtossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione inf ormare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA'
AZITION 20 L è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci, il bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

AZITION 25

INSETTICIDA POLIVALENTE IN POLVERE BAGNABILE

AZITION 25
COMPOSIZIONE – g 100 di prodotto contengono:
AZINFOS-METILE puro g 25
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290 del 23/04/2001.
FRASI DI RISCHIO – Tossico a contatto con la pelle. - Molto tossico per inalazione e per ingestione. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

MOLTO TOSSICO

Pericoloso per l'ambiente

Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164 - Modena / ISAGRO S.P.A. - Via Nettunese Km 23,400 - Aprilia (LT)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 0584 del 21/12/1971
Riferimento partita N.: CONTENUTO: Kg 1-5

NORME PRECAUZIONALI - Conservare il recipiente ben chiuso. - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsione, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
AZITION 25 si usa stemperando il quantitativo richiesto in poca acqua, versando poi il resto dell'acqua fino a raggiungere la concentrazione voluta.
AZITION 25 si impiega: 100-200 grammi per 100 litri di acqua contro i seguenti parassiti:
Frutticoltura - Psilla del pero, Carpocapsa o Verme del pero e del melo, Cydia e Anarsia del pesco, Antonomo del melo, Minatrici delle foglie, Capua reticulana, Pandemis, Cacoecia del pero e del melo.
Viticoltura - Tignola dell'uva, Tortrici.
Floricoltura - Minatrici delle foglie, Tentredini, Afidi in genere, Bega del garofano.
Agrumicoltura - Tignola, Cocciniglie.
Bieticoltura - Cleono, Punteruolo e Altica.
Orticoltura - Dorifora della patata

COMPATIBILITA'- Il prodotto e miscibile con tutti gli antiparassitari in commercio, eccetto quelli a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, calce).
AVVERTENZA In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto a seguito dei trattamenti è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto
ATTENZIONE da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

BETAMIN L

DISERBANE SPECIFICO DELLE BIETOLE
FORMULAZIONE LIQIDA SOTTOFORMA DI
SOSPENSIONE CONCENTRATA

BETAMIN L
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
CLORIDAZON puro g 35 (g/l 414)
Coformulanti q. b. a 100

IRRITANTE

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per lam biente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante llmpieg o. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di ngestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o letichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. – Qesto mat eriale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nellambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / TERRANALISI S.R.L. – Via IV Novembre n. 19/1 – Renazzo di Cento (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità: n. 5700 del 12/01/1984
CONTENUTO: *ℓ* 5
Riferimento partita n.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
Nei trattamenti di pre-semina e pre-emergenza BETAMIN L si usa alla dose di:
- litri 6/ha nei terreni sciolti,
- litri 7/ha nei terreni di medio impasto.
- litri 8/ha nei terreni argillosi.

Nei trattamenti di post-emergenza si usa alla dose di:
- litri 5/ha per ogni tipo di terreno.

La quantità di acqua da usare per ettaro va da 3 a 6 ettolitri per ettaro.
Il trattamento in pre-semina può essere eseguito già a partire dalla fine di Gennaio dove il letto di semina è stato preparato in autunno - quando la preparazione del terreno si fa a fine inverno (avendo cura che il terreno risulti finemente sminuzzato) il trattamento va fatto a partire da alcune settimane prima della semina interrando il prodotto di qualche centimetro con erpici snodati o a denti.
Il trattamento in pre-emergenza risulta molto efficace quando il terreno è ben preparato e sufficientemente umido, l'efficacia si riduce se non cade la pioggia entro 15 giorni.
In post-emergenza BETAMIN L si impiega in miscela con un erbicida di contatto quando la bietola ha raggiunto lo stadio di 2 foglie vere.
Preparazione della poltiglia
Disperdere la quantità di prodotto richiesta in poca acqua e versare nel quantitativo totale di acqua da spargere.

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscelabile con gli altri diserbanti per bietole impiegati in pre e post-emergenza. E' miscibile pure con gli insetticidi usati contro gli insetti delle bietole con i fertilizzanti fogliari.
AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qalora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Evitare che la miscela erbicida giunga a contatto con colture sensibili utili.
NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per i pesci e gli insetti utili.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

BLEND

FUNGICIDA CUPRICO MISTO – POLVERE BAGNABILE

BLEND
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:

MANCOZEB puro	g	32
RAME metallo puro (da Ossicloruro tetraramico)	g	15
Coformulanti q.b. a	g	100

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per inalazione ed ingestione. - Irritante per le vie respiratorie. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / CHEMIA S.P.A - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164 - Modena
Registrazione del Ministero della Sanità n. 5434 del 14/07/1983
Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 100-200-250-500 Kg 1-5-10-20

NORME PRECAUZIONALI - Conservare il recipiente ben chiuso. - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI - Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. - Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore. - Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Mancozeb 32% Rame 15% le quali , sepa ratamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Per il Mancozeb - Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.
Per il Rame - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
BLEND è un anticrittogamico finemente micronizzato a base di Mancozeb e Ossicloruro di Rame dotato di ampio spettro di azione, di buona persistenza, adesività e resistenza al dilavamento.
BLEND controlla:
Vite: contro la Peronospora, Escoriosi, Antracnosi e in parte contro il Marciume a g 250-350 per q.le d'acqua.
Pomacee: contro la Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria e Glomerella a g 300 per q.le d'acqua.
Pomodoro solo fino alla prima fioritura: contro Antracnosi, Peronospora, Alternariosi, Clodosporiosi a g 250-350 per q.le d'acqua.

COMPATIBILITA' - BLEND è compatibile con tutti gli antiparassitari in commercio eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono anche essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'- varietà sensibili al BLEND:Melo: Abbondanza, Belfort, BlackStayman, Golden Deliciou s, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Wesap, BlackDavis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana. Pe ro: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. Wiam, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.
NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

BLEND

FUNGICIDA CUPRICO MISTO – POLVERE BAGNABILE

BLEND

COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:

MANCOZEB puro	g	32
RAME metallo puro (da Ossicloruro tetraramico)	g	15
Coformulanti q.b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per inalazione ed ingestione. - Irritante per le vie respiratorie. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

N

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Sanità n. 5434 del 14/07/1983

Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 100

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "
OPPURE:
" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

CARBOSAN – CARBOFURAN TERRANALISI

INSETTICIDA GRANULARE PER LA DISINFESTAZIONE DEL TERRENO DESTINATO ALLA COLTURA DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, MAIS, PATATA, CIPOLLA, AGLIO

CARBOSAN – CARBOFURAN TERRANALISI
COMPOSIZIONE – g 100 di prodotto contengono:
CARBOFURAN puro g 4,5
Coformulanti q.b. a g 100

TOSSICO

Pericoloso per l'ambiente

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290 del 23/04/2001.
FRASI DI RISCHIO – Tossico per inalazione e ingestione. - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non gettare i residui nelle fognature. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: CHEMIA S.p.a. – Strada Statale n. 255 Km 46 – Sant'Agostino (FE) / ISAGRO S.P.A. - Via Nettunese Km 23,400 - Aprilia (LT) / SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164 - Modena
Registrazione del Ministero della Sanità n. 8394 del 07/08/1993
Riferimento partita N.: CONTENUTO: Kg 10-20

NORME PRECAUZIONALI
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: Atropina. Controindicazioni: Ossime.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Trattamento parziale del terreno
Barbabietola da zucchero - Kg 10-12/ha distribuendo il prodotto alla semina, localizzata lungo le file a messo microgranulatori.
Mais, patata, cipolla, aglio - Kg 8-12/ha su mais, in pre-emergenza
- Kg 15-20/ha su patata, in pre-emergenza
- Kg 15-20/ha su cipolla e aglio in pre-semina o pre-trapianto.

Dopo la distribuzione il prodotto deve essere interrato.
Trattamento generale del terreno
Kg 40-60/ha distribuendo il prodotto uniformemente a mezzo di spandiconcimi e quindi interrando.
CARBOSAN non trasmette alcun odore o sapore alle piante che crescono sul terreno trattato.

COMPATIBILITA'- Il prodotto può essere distribuito in miscela con concimi granulari.
NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per gli animali domestici. i pesci e il bestiame e gli insetti utili.
CARBOSAN va usato solo in pre-emergenza.
ATTENZIONE da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

CERESAN

DISERBANTE SELETTIVO IN POLVERE BAGNABILE PER
FRUMENTO, PISELLO, GIRASOLE, AGLIO, ERBA MEDICA, MAIS

CERESAN
COMPOSIZIONE: g 100 di prodotto contengono
METABENZTIAZURON puro g 70
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

N

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: ISAGRO S.P.A. – Via Nettunese Km 23,400 - Aprilia (LT) /
TORRE S.r.l. – Via Pian d'Asso – Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 6532 del 03/10/1985
Riferimento partita n.: CONTENUTO: Kg 1

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Grano - CERESAN si usa alla dose di Kg 2-3 per ettaro in 500-800 litri di acqua, in autunno subito dopo la semina, per combattere le infestanti graminacee: Alopecurus, Poa e le infestanti a foglia larga: Camomilla, Veronica, Stellaria, Senape, Garofano.
Kg 1,5 2 per ettaro a fine inverno prima della fine dell'accestimento.
Pisello, Girasole - Kg 2-3 per ettaro in 500-600 litri di acqua contro le comuni infestanti, intervenendo in pre-emergenza delle colture.
Aglio - Kg 2-3 per ettaro in 500-600 litri di acqua, in autunno in pre-emergenza delle colture o a fine inverno.
Erba medica - Kg 2-3 per ettaro in 500-600 litri di acqua in autunno dopo l'ultimo sfalcio, nella fase del riposo vegetativo della coltura.
Mais - Kg 3-4 per ettaro per 500 litri di acqua, in pre-emergenza della coltura, contro le graminacee e le dicotiledoni nate da seme.

Avvertenze - Il diserbo con CERESAN non deve essere eseguito su terreno torboso. Non si deve fare il trattamento di fine inverno prima di 15 giorni da una concimazione azotata.

COMPATIBILITA' - Il prodotto nel trattamento di fine inverno può essere associato con diserbanti ormonici (Fitonex 54 D, Fitonex Combi, Fitonex MC 30)
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto
ATTENZIONE da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

CIMOTER 4-40

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER LA DIFESA DELLA VITE, POMODORO E TABACCO

CIMOTER 4-40
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:

CIMOXANIL puro	g	4
MANCOZEB puro	g	40
Coformulanti q.b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO - Irritante per le vie respiratorie. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Non disperdere nell' ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI SRL - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / A.D.I.C.A. S.R.L. - Via dello Stabilimento n. 11 - Nera Montoro (TR) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. - Via Evangelista Torriecelli n. 2 - Cotignola (RA) / SULPHUR MILLS LIMITED, 1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist. Bharuch - Gujarat (India) / TORRE S.r.l. – Via Pian d'Asso – Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Registrazione del Ministero della Salute n. 11284 del 12/04/2002
Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 100-200-250-500 Kg 1-10

NORME DI SICUREZZA - Conservare questo prodotto ben chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. **Precauzioni particolari:** una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. - Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. - Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Mancozeb 40%Cimoxanil 4% le quali s eparatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
MANCOZEB - Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
CIMOXANIL - Derivato dall'urea. Sintomi: curante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche: CIMOTER 4-40 è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la Peronospora della vite del tabacco e del pomodoro. Sulla vite può essere usato per tutta la stagione e nella lotta contro l'Escoriosi. Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Può essere usato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione.
DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO
Peronospora della vite: usare g 200-300 di prodotto per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti cuando i germogli raggiungono i 10 cm. di lunghezza e proseguirli fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
Peronospora del pomodoro: usare g 200-300 di prodotto per 100 litri d' acqua. La dose massima va usata in presenza di forti attacchi di Peronospora o in presenza di Alternaria. I trattamenti al pomodoro sono consentiti solo fino alla prima fioritura.
Peronospora del tabacco: usare g 300 ci prodotto per 100 litri di acqua.
Preparazione della poltiglia: formare una pasta fluida sciogliendo la dose in poca acqua e portare a volume mantenendo la miscela in costante agitazione.

NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'- CIMOTER 4-40 è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare in associazione a prodotti con reazione alcalina.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA' - Durante il trattamento si consiglia di tenere lontani gli animali domestici ed il bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere il trattamento 28 giorni prima del raccolto
ATTENZIONE da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CIMOTER 4-40

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER LA DIFESA DELLA VITE, POMODORO E TABACCO

CIMOTER 4-40
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:

CIMOXANIL puro	g	4
MANCOZEB puro	g	40
Coformulanti q.b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO - Irritante per le vie respiratorie. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Non disperdere nello ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

N

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Registrazione del Ministero della Salute n. 11284 del 12/04/2002

Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 100

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "
OPPURE:
" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

Etichetta per confezione contenente sacchetti idrosolubili

CIMOTER 4-40

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER LA DIFESA DELLA VITE, POMODORO E TABACCO

CONTIENE SACCHETTI IDROSOLUBILI

CIMOTER 4-40
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:

CIMOXANIL puro	g 4
MANCOZEB puro	g 40
Coformulanti q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO - Irritante per le vie respiratorie. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Non disperdere nello ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. - Via Evangelista Torriecelli n. 2 - Cotignola (RA) / TORRE S.r.l. – Via Pian d'Asso – Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Registrazione del Ministero della Salute n. 11284 del 12/04/2002
CONTENUTO: g 500 (5 x g 100) – Kg 1 (5x g 200; 4 x g 250; 2 x g 500) – Kg 2,5 (5x g 500) – Kg 5 (10 x g 500; 5 x Kg 1)
Riferimento partita N.:

NORME DI SICUREZZA - Conservare questo prodotto ben chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. **Precauzioni particolari:** una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. - Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. - Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Mancozeb 40%Cimoxanil 4% le quali s eparatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione. **MANCOZEB -** Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. **CIMOXANIL** - Derivato dall'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche: CIMOTER 4-40 è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la Peronospora della vite del tabacco e del pomodoro. Sulla vite può essere usato per tutta la stagione e nella lotta contro l'Escoriosi. Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Può essere usato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione.
DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO
Peronospora della vite: usare g 200-300 di prodotto per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti cuando i germogli raggiungono i 10 cm. di lunghezza e proseguirli fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
Peronospora del pomodoro: usare g 200-300 di prodotto per 100 litri d' acqua. La dose massima va usata in presenza di forti attacchi di Peronospora o in presenza di Alternaria. I trattamenti al pomodoro sono consentiti solo fino alla prima fioritura.
Peronospora del tabacco: usare g 300 di prodotto per 100 litri di acqua.
Preparazione della poltiglia: formare una pasta fluida sciogliendo la dose in poca acqua e portare a volume mantenendo la miscela in costante agitazione.
NON IMPIEGARE IN SERRA - NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
COMPATIBILITA'- CIMOTER 4-40 è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare in associazione a procotti con reazione alcalina. **AVVERTENZA** - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il perioco di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. **RISCHI DI NOCIVITA'** - Durante il trattamento si consiglia di tenere lontani gli animali domestici ed il bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere il trattamento 28 giorni prima del raccolto
ATTENZIONE da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

MODO DI UTILIZZO DEI SACCHETTI IDROSOLUBILI

25%

1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua.

2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chi si previsti.

3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore.

4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ecc.

5) ... aggiungere la restante parte d'acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato.
STOCCAGGIO - Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

Etichetta per sacchetti idrosolubili

CIMOTER 4-40

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER LA DIFESA DELLA VITE, POMODORO E TABACCO

ATTENZIONE: SACCHETTO IDROSOLUBILE DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

CIMOTER 4-40
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:

CIMOXANIL puro	g	4
MANCOZEB puro	g	40
Coformulanti q.b. a	g	100

AVVERTENZA: LEGGERE ATTENTAMENTE IL TESTO DELL'ETICHETTA RIPORTATO SUL CONTENITORE

IRRITANTE

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Salute n. 11284 del 12/04/2002

DA NON VENDERSI NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

Riferimento partita N.:

CONTENUTO: g 100–200-250-500 Kg 1

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

CIMOTER 30

FUNGICIDA CITOTROPICO TRANSLAMINARE - FORMULAZIONE IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

CIMOTER 30
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
CIMOXANIL puro g 30
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per ingestione. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

N Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: A.D.I.C.A. S.R.L. - Via Dello Stabilimento n. 11 - Nera Montoro (Terni) / SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164 - Modena / S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. - Via E. Torricelli n. 2 - Cotignola (RA) / SULPHUR MILLS LIMITED, 1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist. Bharuch - Gujarat (India) / TORRE S.r.l. – Via Pian d'Asso – Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Stabilimento di confezionamento: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9733 del 03/09/1998
Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 40-80-160-200-250-480-800 Kg 1-5-10

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Derivato dall'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, riniti nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
CIMOTER 30 è un fungicida in formulazione di microgranuli idrodispersibili ad azione citotropica translaminare indicato per il trattamento contro la Peronospora, possiede una persistenza d'azione di circa 5 giorni.
VITE - Contro la Peronospora alla dose di g 65-80 per q.le acqua trattando da quando si hanno le infezioni della malattia e fino alla fine della fioritura. Quindi dall'allegagione impiegare g 30-40 per q.le acqua miscelato con i prodotti di copertura quali i rameici, i ditiocarbammati ed il Folpet a un dosaggio pari al 60%70% della dose comunemente impiegata.
CARCIOFO - PATATA - POMODORO - CIPOLLA - AGLIO - PORRO - GIRASOLE - SOIA - LATTUGA - ROSA - ZUCCHINO - MELONE - PISELLO - SPINACIO - TABACCO - Contro la Peronospora a g 65-80 per q.le acqua, iniziando al verificarsi delle condizioni di infestazioni e proseguendo. Nel caso di infezioni in atto effettuare due trattamenti ravvicinati alla dose più alta (5-7 giorni l'uno dall'altro). Si può ridurre la dose a g 30-40 per q.le acqua se si effettuano trattamenti in miscela con rameici o ditiocarbammati, comunque tenere presente che la dose minima riferita ad ettaro non deve essere inferiore ai 400 g/ettaro.

COMPATIBILITA' - Non compatibile con i prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese) e gli olii minerali.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA' - Quando si tratta tenere lontano gli animali domestici e il bestiame; tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto di girasole e soia; 21 giorni per il carciofo; 10 giorni per le altre colture.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CIMOTER 30

FUNGICIDA CITOTROPICO TRANSLAMINARE - FORMULAZIONE IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

CIMOTER 30
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
CIMOXANIL puro g 30
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per ingestione. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

N

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9733 del 03/09/1998
Riferimento partita N.:

CONTENUTO: g 40-80

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "
OPPURE:
" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

etichetta per confezione contenente sacchetti idrosolubili

CIMOTER 30

FUNGICIDA CITOTROPICO TRANSLAMINARE - FORMULAZIONE IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

CONTIENE SACCHETTI IDROSOLUBILI

CIMOTER 30
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
CIMOXANIL puro g 30
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per ingestione. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164 - Modena / S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. - Via E. Torricelli n. 2 - Cotignola (RA) / TORRE S.r.l. – Via Pian d'Asso – Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Stabilimento di confezionamento: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 9733 del 03/09/1998
CONTENUTO: g 200 (5 x g 40) -g 400 (5 x g 80) -g 480 (6 x g 80; 3 x g 160) - g 800 (5 x g 160) - Kg 1,6 (10 x g 160) - Kg 4, 8 (30 x g 160)
Riferimento partita N.:

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Derivato dall'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
CIMOTER 30 è un fungicida in formulazione di microgranuli idrodispersibili ad azione citotropica translaminare indicato per il trattamento contro la Peronospora, possiede una persistenza d'azione di circa 5 giorni.
VITE - Contro la Peronospora alla dose ci g 65-80 per q.le acqua trattando da quando si hanno le infezioni della malattia e fino alla fine della fioritura. Quindi dall'allegagione impiegare g 30-40 per q.le acqua miscelato con i prodotti di copertura quali i rameici, i ditiocarbammati ed il Folpet a un dosaggio pari al 60%70%della dose comunemente impiegata.
CARCIOFO - PATATA - POMODORO - CIPOLLA - AGLIO - PORRO - GIRASOLE - SOIA - LATTUGA - ROSA - ZUCCHINO - MELONE - PISELLO - SPINACIO - TABACCO - Contro la Peronospora a g 65-80 per q.le acqua, iniziando al verificarsi delle condizioni di infestazioni e proseguendo. Nel caso di infezioni in atto effettuare due trattamenti ravvicinati alla dose più alta (5-7 giorni l'uno dall'altro). Si può ridurre la dose a g 30-40 per q.le acqua se si effettuano trattamenti in miscela con rameici o ditiocarbammati, comunque tenere presente che la dose minima riferita ad ettaro non deve essere inferiore ai 400 g/ettaro.

COMPATIBILITA' - Non compatibile con i prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese) e gli olii minerali.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA' - Quando si tratta tenere lontano gli animali domestici e il bestiame; tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto di girasole e soia; 21 giorni per il carciofo; 10 giorni per le altre colture.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

MODO DI UTILIZZO DEI SACCHETTI IDROSOLUBILI

25%

1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua

2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti

3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore.

4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ed...

5) ... aggiungere la restante parte d'acqua necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato.
STOCCAGGIO - Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

etichetta per sacchetto idrosolubile

CIMOTER 30

FUNGICIDA CITOTROPICO TRANSLAMINARE - FORMULAZIONE IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

CIMOTER 30
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
CIMOXANIL puro g 30
Coformulanti q.b. a g 100

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SULLA CONFEZIONE ESTERNA

N

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9733 del 03/09/1998

SACCHETTO IDROSOLUBILE – CONTENUTO: g 40-80-160

DA NON VENDERSI NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

Riferimento partita N.:

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

CIMOTER RAME

FUNGICIDA A BASE DI CIMOXANIL E RAME OSSICLORURO IN POLVERE BAGNABILE

CIMOTER RAME
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:

CIMOXANIL puro	g	2
RAME metallico (sotto forma di ossicloruro)	g	20
Coformulanti q.b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per inalazione e ingestione. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / ISAGRO S.P.A. - Via Nettunese Km 23,400 - Aprilia (LT) / SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164 - Mocena / S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. - Via Evangelista Torricelli n. 2 - Cotignola (RA)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 8628 del 23/12/1994
Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 100-200-250-500 Kg 1-5-10-20

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 2%Rame metallo20%(da Ossicloruro); le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
p.a. Cimoxanil - Derivato dall'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica.
p.a. Rame metallico - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **Avvertenza**: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE E DOSI D'IMPIEGO
CIMOTER RAME è un fungicida a base di Cimoxanil e Rame sotto forma di Ossicloruro, in polvere bagnabile, che agisce per contatto e con azione citotropica translaminare, con penetrazione fogliare e per contatto nei primi stadi di sviluppo dell'infestazione.
Vite - patata - pomodoro - tabacco impiegato contro la Peronospora, l'Alternaria, l'Antracnosi, la Septoria, la Batteriosi e con effetto secondario contro la Botrytis cinerea.
DOSI D'IMPIEGO - g 450-550 per q.le d'acqua quando vi sono i primi pericoli di infezione peronosporica, ripetendo i trattamenti ad ogni necessità.

COMPATIBILITA' - Incompatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono anche essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora di verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto
FITOTOSSICITA' - Non trattare durante la fioritura.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CIMOTER RAME

FUNGICIDA A BASE DI CIMOXANIL E RAME OSSICLORURO IN POLVERE BAGNABILE

CIMOTER RAME
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
CIMOXANIL puro g 2
RAME metallico (sotto forma di ossicloruro) g 20
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per inalazione e ingestione. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8628 del 23/12/1994
Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 100

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

“ PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO ”
OPPURE:
“ PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA ”

Etichetta per confezione contenente sacchetti idrosolubili

CIMOTER RAME

FUNGICIDA A BASE DI CIMOXANIL E RAME OSSICLORURO IN POLVERE BAGNABILE

CONTIENE SACCHETTI IDROSOLUBILI

CIMOTER RAME
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
CIMOXANIL puro g 2
RAME metallico (sotto forma di ossicloruro) g 20
Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per inalazione e ingestione. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: ISAGRO S.P.A. - Via Nettunese Km 23,400 - Aprilia (LT)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 8628 del 23/12/1994
Riferimento partita N.: CONTENUTO: Kg 1 (4 x g 250; 2 x g 500) - Kg 2,5 (5 x g 500) - Kg 5 (10 x g 500)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 2%Rame metallo20%(da Ossicloruro); le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
p.a. Cimoxanil - Derivato dall'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica.
p.a. Rame metallico - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **Avvertenza**: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE E DOSI D'IMPIEGO
CIMOTER RAME è un fungicida a base di Cimoxanil e Rame sotto forma di Ossicloruro, in polvere bagnabile, che agisce per contatto e con azione citotropica translaminare, con penetrazione fogliare e per contatto nei primi stadi di sviluppo dell'infestazione.
Vite - patata - pomodoro - tabacco impiegato contro la Peronospora, l'Alternaria, l'Antracnosi, la Septoria, la Batteriosi e con effetto secondario contro la Botrytis cinerea.
DOSI D'IMPIEGO - g 450-550 per q.le d'acqua quando vi sono i primi pericoli di infezione peronosporica, ripetendo i trattamenti ad ogni necessità.

COMPATIBILITA' - Incompatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono anche essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora di verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto
FITOTOSSICITA' - Non trattare durante la fioritura.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

MODO DI UTILIZZO DEI SACCHETTI IDROSOLUBILI

25%

1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua
2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti
3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore
4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ed...
5) ...aggiungere la restante parte d'acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato.
STOCCAGGIO - Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

Etichetta sacchetti idrosolubili

CIMOTER RAME

FUNGICIDA A BASE DI CIMOXANIL E RAME OSSICLORURO IN POLVERE BAGNABILE

ATTENZIONE: SACCHETTO IDROSOLUBILE DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

CIMOTER RAME
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:

CIMOXANIL puro	g	2
RAME metallico (sotto forma di ossicloruro)	g	20
Coformulanti q.b. a	g	100

AVVERTENZA: LEGGERE ATTENTAMENTE IL TESTO DELL'ETICHETTA RIPORTATO SUL CONTENITORE

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8628 del 23/12/1994

DA NON VENDERSI NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

Riferimento partita N.:

CONTENUTO: g 250-500

CLORMETIL

INSETTICIDA - CONCENTRATO EMULSIONABILE

CLORMETIL
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
CLORPIRIFOS METILE puro g 22 (g/l 217,8)
Coformulanti q. b. a 100

IRRITANTE **Pericoloso per l'ambiente**

FRASI DI RISCHIO - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. – Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. – Evitare il contatto con la pelle. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: ALTHALLER ITALIA S.R.L. - Strada Comunale per Campagna n. 5 - San Colombano al Lambro (MI) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / CHIMAC-AGRIPHAR S.A. - Rue De Renory n. 26B - 4102 Ougree - Belgium / SCAM S.R.L. - VIA Bellaria n. 164 - Modena / TORRE S.r.l. - Via Pian D'Asso - Torrenieri Fraz. di Montalcino (SI) / VE.BI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. - Via Desman n. 43 - Borgoricco (PD)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 10507 del 31/05/2000
CONTENUTO: ml 200-250-500 ℓ 1-5
Riferimento partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa) : nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia(incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa,fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsione,coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE - CLORMETIL è un insetticida fosforganico, agisce per contatto, ingestione ed in parte per azione di vapore. È particolarmente indicato per combattere le larve di lepidotteri e le neanidi di cocciniglie. Esplica inoltre azione frenante dello sviluppo delle popolazioni di acari tetranichidi come Panonychus, Tetranychus, Eotetranychus.

DOSI D'IMPIEGO

- **Melo, Pero e Pesco:** 200 ml/hl contro Lepidotteri, Tortricidi (Capua, Cacoecia, Pandemis, Eulia), Tignola orientale (Cydia molesta), Anarsia (Anarsia); 200 - 250 ml/hl contro neanidi di Cocciniglie (Aspidiotus ed altre).
- **Arancio:** 250 ml/hl contro neanidi di Cocciniglie (Saissetia, Ceroplastes, Pseudococcus).
- **Vite:** 100-150 ml/hl contro Tignole (Polycrosis, Clysia). Il prodotto potrebbe risultare fitotossico per alcune varietà sensibili: si raccomandano pertanto saggi zonali e varietali.
- **Fragola:** 300 - 400 ml/hl contro Frankliniella o Nottue ed Afidi.
- **Ortaggi (pomodoro, peperone, melanzana, pisello, ravanello, patata):** 1,5 - 2 l/ha contro Nottue (Agrotis, Mamestra ed altre), Macaone (Papilio), Dorifora (Leptinotarsa).
- **Mais:** 300 ml/hl contro Nottue (Agrotis), Piralide (Ostrinia) ed Elateridi.
- **Pioppo:** 400 - 500 ml/hl contro Saperda e Criptorrinco.
- **Ornamentali (garofano, crisantemo, azalea, ciclamino):** 200 ml/hl contro Bega, Tortricidi, Cocciniglie, Oziorrinco.

COMPATIBILITÀ' - CLORMETIL non è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ' - Non impiegare il prodotto sulle varietà di melo Stayman Red, Stayman Winesap, Gloster, Gallia Beauty.
In post-fioritura del melo non eseguire più di due trattamenti.
Non effettuare trattamenti su arancio nei mesi compresi tra Gennaio ed Aprile.
NOCIVITÀ' - Nocivo per i pesci. - Nocivo per api ed insetti utili. - Tossico per i crostacei.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

CUPROCIM

FUNGICIDA A BASE DI CIMOXANIL E RAME OSSICLORURO IN POLVERE BAGNABILE

CUPROCIM
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
CIMOXANIL puro g 2
RAME metallico (sotto forma di ossicloruro) g 20
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per inalazione e ingestione. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / AGRINDUSTRIA S.R.L. - Via Cantarana n. 17 - San Cipriano Po (PV)
Distribuito da: ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A. - Via Marco Polo n. 2 - Mestrino (PD) - Tel. 049 9000855
Registrazione del Ministero della Sanità n. 9197 del 10/04/1997
Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 50-100-200-250-500 Kg 1-5-10

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 2%Rame metallo20%(da Ossicloruro); le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
p.a. Cimoxanil - Derivato dall'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica.
p.a. Rame metallico - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC. emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde. bruciori gastroesofagei, diarrea ematica. coliche addominali, ittero emolitico. insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **Avvertenza**: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE E DOSI D'IMPIEGO
CUPROCIM è un fungicida a base di Cimoxanil e Rame sotto forma di Ossicloruro, in polvere bagnabile, che agisce per contatto e con azione citotropica translaminare, con penetrazione fogliare e per contatto nei primi stadi di sviluppo dell'infestazione.
Vite - patata - pomodoro - tabacco impiegato contro la Peronospora, l'Alternaria, l'Antracnosi. la Septoria, la Batteriosi e con effetto secondario contro la Botrytis cinerea.
DOSI D'IMPIEGO - g 450-550 per q.le d'acqua quando vi sono i primi pericoli di infezione peronosporica. ripetendo i trattamenti ad ogni necessità.

COMPATIBILITA' - Incompatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono anche essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora di verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto
FITOTOSSICITA' - Non trattare durante la fioritura.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CUPROCIM

FUNGICIDA A BASE DI CIMOXANIL E RAME OSSICLORURO IN POLVERE BAGNABILE

CUPROCIM
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
CIMOXANIL puro g 2
RAME metallico (sotto forma di ossicloruro) g 20
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per inalazione e ingestione. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

N
Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Distribuito da: ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A. - Via Marco Polo n. 2 - Mestrino (PD) - Tel. 049 9000855
Registrazione del Ministero della Sanità n. 9197 del 10/04/1997
Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 50-100

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "
OPPURE:
" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

CUPRORAM

FUNGICIDA CUPRICO IN POLVERE BAGNABILE ALTAMENTE MICRONIZZATA

CUPRORAM
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
RAME Metallo (sotto forma di Ossicloruro) puro g 30
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / DIACHEM S.P.A.- Unità produttiva SIFA - S.S. Padana Superiore - Caravaggio (BG) / INDUSTRIA CHIMICA SCARMAGNAN ALBERTO &C. S.A.S. - V.le Ungheria n. 8 3 - Minerbe (VR) / SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164 - Modena / S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. - Via Evangelista Torricelli n. 2 - Cotignola (RA)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 5062 del 24/11/1982
Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 100-200-250-500 Kg 1-5-10-20

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali. ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **Avvertenza**: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO – CUPRORAM si versa nel totale quantitativo di acqua agitando per alcuni minuti fino alla formazione di una poltiglia omogenea.
Frutticoltura - **Melo e pero**: contro Ticchiolatura dopo la ripresa vegetativa; **albicocco**: contro Monilia nei trattamenti pre-fiorali; **nespolo**: contro Ticchiolatura e Brusone g 400-500/hl. **Melo e pero**: contro Ticchiolatura alla ripresa vegetativa (ingrossamento delle gemme) g 600-800/hl. **Melo e pero**: contro Ticchiolatura; **albicocco**: contro Monilia o Marciume bruno, Corineo, Bozzacchioni; **ciliegio**: contro Sclerotinia, Corineo e Scopazzi nei trattamenti invernali g 1000-1200/hl. **Vite**: contro Peronospora della vite g 400-500/hl. **Olivo**: contro Occhio di pavone e Lebbra dell'olivo g 400-500/hl. **Agrumi**: contro Allupatura e Mal secco degli agrumi g 400-500/hl. **Carciofo, cardo, cavoli, cicoria, cipolla, pisello, cucurbitacee e spinacio**: contro Peronospora; **patata**: contro Peronospora ed Alternaria; **pomodoro**: contro Peronospora, Alternaria, Septoriosi e Batteriosi; **sedano**: contro Septoriosi; **pisello:** contro Antracnosi g 400-500/hl. **Barbabietola da zucchero**: contro Cercospora della barbabietola Kg 3-4/ha. Floricoltua in pieno campo – **Rosa**: contro Ruggine, Ticchiolatura e Peronospora g 400-500/hl

COMPATIBILITA' – CUPRORAM è compatibile con i prodotti fitosanitari ad eccezione di quelli a base di Polisolfuri.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (Abbondanza, Belfort, BlackStayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Sta yman, Stayman Red, Stayman Winesap, BlackDavis, Ki ng Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. W lliam, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili. Il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
NOCIVITA' – Il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CUPRORAM

FUNGICIDA CUPRICO IN POLVERE BAGNABILE ALTAMENTE MICRONIZZATA

CUPRORAM
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
RAME Metallo (sotto forma di Ossicloruro) puro g 30
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere nè fumare durante l'impiego. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Sanità n. 5062 del 24/11/1982

Riferimento partita N.:

CONTENUTO: g 100

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "
OPPURE:
" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

DIAZOL 20

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE PER LA DIFESA DI COLTURE ARBOREE, ERBACEE, ORNAMENTALI

DIAZOL 20
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
DIAZINONE puro g 18 (g/l 170)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

N

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via IV Novembre n. 19/1 - Renazzo di Cento (FE) / ALTHALLER ITALIA S.R.L. - Strada Comunale Per Campagna - San Colombano Al Lambro (MI) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / SCAM S.R.L. Via Bellaria n. 164 Modena
Registrazione del Ministero della Sanità: n. 1167 del 15/02/1973
Riferimento partita n.: CONTENUTO: ℓ 1

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsione, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche - DIAZOL 20 è un insetticida emulsionabile in acqua efficace contro i più comuni insetti nocivi delle colture arboree, erbacee, fiori e piante ornamentali in pieno campo.
DOSI - EPOCHE - MODALITA' D'IMPIEGO - Per 100 litri di acqua.
Effettuare i trattamenti alla prima comparsa dei parassiti, rispettando le seguenti indicazioni. **Pompelmo, arancio, pomelo** - contro afidi, coccíniglie, minatrici, cimici, tripidi: ml 150-250. **Pesco, Susino** - contro afidi, cidia, anarsia, coccíniglie, tripidi: ml 150-250 (per il pesco numero massimo di applicazioni: 1). **Ciliegio:** contro afidi, cidia, anarsia, coccíniglie, tripidi, mosca delle ciliege: ml 150-250. **Melo** - contro afidi, coccíniglie, carpocapsa: ml 150-250. **Pero** - contro afidi, coccíniglie, carpocapsa, cecidomia: ml 150-250. **Melograno** - contro afidi: ml 150-250. **Nocciolo** - contro: balanino: ml 150-250. **Barbabietola da zucchero** - contro cassida, altica, lisso, cleono: ml 150-250. **Floricole** (in pieno campo e in serra), **ornamentali, forestali, pioppo** - contro tripidi, minatrici, afidi: ml 150-250.

NON TRATTARE IN FIORITURA PERCHE' IL PRODOTTO E' TOSSICO PER LE API.

COMPATIBILITA'
DIAZOL 20 è miscibile con tutti gli antiparassitari in commercio esclusi quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, pesci e bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere il trattamento su pesco 30 giorni prima del raccolto. 15 giorni sulle altre colture.
"**Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso". Chi impiega il prodotto è respo nsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto". Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali".

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

DATIOCID L

INSETTICIDA AGRICOLO IN FORMULAZIONE LIQUIDA

DATIOCID L
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
METIDATION puro g 19 (g/l 179)
Coformulanti q. b. a 100
Contiene Xilene

MOLTO TOSSICO

Pericoloso per l'ambiente

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290 del 23/04/2001.
FRASI DI RISCHIO – Infiammabile. - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. - Molto tossico per ingestione. - Irritante per la pelle. - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non gettare i residui nelle fognature. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via IV Novembre n.19/1 - Renazzo di Cento (FE) / ALTHALLER ITALIA S.R.L. - Strada Comunale Per Campagna - San Colombano Al Lambro (MI) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / CHIMAC-AGRIPHAR S.A. - Rue de Renory n.26 - B-4102 Ougree (Belgium) / SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164 - Modena
Registrazione del Ministero della Sanità n. 6311 del 03/04/1985
Riferimento partita N. CONTENUTO: ℓ 1

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsione, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida in seguito spastica, delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
Il prodotto è un insetticida a largo spettro di azione che agisce per ingestione e per contatto; è inoltre, dotato di azione citotropica (penetra nei tessuti vegetali) la quale gli permette di raggiungere quegli insetti che si annidano nelle foglie accartocciate.
DOSI - EPOCHE - MODALITA' D'IMPIEGO
Olivo - contro tripidi, cocciniglie, tignole: ml 200-300/hl di acqua.

Preparazione della poltiglia: diluire DATIOCID L in poca acqua e versare la sospensione ottenuta nella restante quantità di acqua mescolando accuratamente.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con gli antiparassitari a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, calce).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame; è altamente tossica per gli organismi acquatici.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere il trattamento100 giorni prima della raccolta.
Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente almeno 20 giorni dopo il trattamento.
Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

DIMITER

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE
PER LA DIFESA DEL MELO E DEL PERO, DELLE PIANTE FORESTALI ED ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO

COMPOSIZIONE - 100 g di prodotto contengono:
DIFLUBENZURON puro g 5
Bagnanti, disperdenti e inerti q. b. a 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE - DIMITER provoca la morte degli insetti in fase di muta. E' efficace contro i microlepidotteri minatori e i lepidotteri ricamatori del melo; la Carpocapsa, l'Orgia e la Psilla del pero. Sulle piante forestali combatte la Processionaria del pino, la Limantria dispari. Pristifora abietina.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Meli e peri - g 200-300 per ettolitro di acqua, contro Cemiostoma e Litocolletis, intervenendo nella fase dell'ovodeposizione;
-g 400 per ettolitro di acqua contro la Psilla del pero nella fase della schiusura delle uova;
-g 400 per ettolitro di acqua contro Orgia antiqua, Capua reticulana, Carpocapsa, durante la deposizione delle uova.
Piante forestali e ornamentali in pieno campo - g 250-350 per ettolitro di acqua, contro Processionaria del pino, Limantria dispari, Pristifora abietina, intervenenco durante l'ovodeposizione.

COMPATIBILITA' - DIMITER è miscibile con tutti i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 45 giorni prima del raccolto
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TERRANALISI S.R.L. – Via Nino Bixio N. 6 – Cento (FE) Tel. 051 6836207

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / L.I.F.A. S.P.A. - Via Piave (Zona industriale) - Isola Vicentina (VI) / L.I.F.A. S.P.A. - Via C. Colombo n. 7/7° Vigonovo (VE) / TORRE S.r.l. – Via P ian d'Asso – Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI) / SCAM - Via Bellaria n. 164 - Modena - VE.BI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. - Via Desman n. 43 – Borgoricco (PD)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6572 del 21/11/1985 CONTENUTO: g 100-200-500 Kg 1

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Riferimento partita n.:

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

DIMITER

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE
PER LA DIFESA DEL MELO E DEL PERO, DELLE PIANTE FORESTALI ED ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO

COMPOSIZIONE - 100 g di prodotto contengono:
DIFLUBENZURON puro g 5
Bagnanti, disperdenti e inerti q. b. a 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

TERRANALISI S.R.L. – Via Nino Bixio N. 6 – Cento (FE) Tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6572 del 21/11/1985 CONTENUTO: g 100

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "
oppure:
" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

Riferimento partita N.:

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

DITER

ERBICIDA SELETTIVO

COMPOSIZIONE - 100 g di prodotto contengono:
DICAMBA acido puro g 14 (g/l 155)
Coformulanti q. b. a 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa.. – Evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti. – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. **Terapia:** sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 Cento (FE) Tel 051 6836207

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via IV Novembre n. 19/1 - Renazzo di Cento (FE) / ALTHALLER ITALIA S.R.L. - Strada Comunale per Campagna r. 5 - S. Colombano al Lambro (MI) / VE.BI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. - Via Desman r. 43 – Borgoricco (PD)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9946 del 12/02/1999
CONTENUTO: ml 100-500 ℓ 1-5-10
Riferimento partita:

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
DITER è un erbicida selettivo assorbito dalle infestanti per via fogliare e radicale e traslocato nella pianta tramite la circolazione linfatica con rapido assorbimento, per cui eventuali piogge dopo poche ore dal trattamento non influiscono sull'attività erbicida.
Viene impiegato sulle seguenti infestanti: amaranto, borsa del pastore, caglio, camomilla, canapa selvatica, cencio molle, centocchio comune, centocchio dei campi, erba correggiola, erba morella, erba storra comune, farinello comune, fiordaliso vero, fumaria comune, galinsoga comune, iva, ortica minore, papavero comune, poligono certinodia, poligono convolvolo, poligono persicaria, ravanello selvatico, renaiola comune, senape selvatica, senecione comune, veccia, veronica spp., stoppione, vilucchio bianco, vilucchio comune.

FRUMENTO – ORZO – AVENA - SEGALE - allo stadio delle 5-6 foglie della coltura sino allo stadio di botticella: ml 650/ha.
MELO – litri 0,650-1,400/ha da solo o in miscela con altri erbicidi, utilizzando la dose minima.
RISO - ml 550-850/ha
PRATI – PASCOLI – PRATI ORNAMENTALI – litri 0,650-1,400/ha
ASPARAGO - in primavera, prima dell'emergenza dei turioni, con terreno ben sarchiato e leggermente umido: ml 300-650/ha.
MAIS - in post-emergenza, con piante già nate, quando la coltura non ha ancora superato l'altezza di cm 40: litri 1-1,500/ha

AVVERTENZA – Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza"
Su prati, pascoli, prati ornamentali trattati, se gnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione." In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta."
FITOTOSSICITA' – Il prodotto è fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta sul melo e 20 giorni sulle altre colture.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

DITER

ERBICIDA SELETTIVO

COMPOSIZIONE - 100 g di prodotto contengono:
DICAMBA acido puro g 14 (g/l 155)
Coformulanti q. b. a 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel 051 6836207

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9946 del 12/02/1999
CONTENUTO: ml 100
Riferimento partita:

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO"
oppure:
"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA"

DIVUTOX

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE A BASE DI D.D.V.P.

DIVUTOX
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
DICLORVOS puro g 45,6 (g/l 480)
Coformulanti q. b. a 100
Contiene Xilene

MOLTO TOSSICO **Pericoloso per l'ambiente**

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290 del 23/04/2001.
FRASI DI RISCHIO – Infiammabile. - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. - Molto tossico per inalazione. - Irritante per la pelle. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. - In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via IV Novembre n.19/1 - Renazzo di Cento (FE) / ALTHALLER ITALIA S.R.L. - Strada Comunale Per Campagna - San Colombano Al Lambro (MI) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / CHIMAC-AGRIPHAR S.A. - Rue de Renory n.26 - B-4102 Ougree (Belgium) / SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164 - Modena
Registrazione del Ministero della Sanità n. 0623 del 17/02/1972
Riferimento partita N. CONTENUTO: ℓ 1

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsione, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
DIVUTOX è un insetticida liquido emulsionabile usato per la lotta contro le larve minatrici e ricamatrici delle piante da frutto.
DOSI - EPOCHE - MODALITA' D'IMPIEGO
Dosi per 100 litri di acqua
Frutticoltura: pomacee (melo e pero) e drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino):
- contro capua e cacoecia (archips podana) ml 150-200
- contro larve minatrici in tutti gli stadi di sviluppo e contro altre larve e coleotteri e ragno rosso ml 150-200
N.B. L'impiego del DIVUTOX sulla Golden Delicious può essere iniziato 2 mesi dopo la fioritura.
Vite: contro tignola e tignoletta ml 150-200
Cavoli, pomodoro, melanzana, cipolla: contro fillominatori e tortricidi, lepidotteri, ricamatori, tingidi, cocciniglia, afidi ml 150-200
Barbabietola da zucchero: contro larve di lepidotteri, nottue e afidi ml 150-200
Frumento: contro larve di lepidotteri e afidi ml 150-200
Floreali, ornamentali, forestali: contro afidi, tripidi, cicaline, aleurodidi, minatrici delle foglie e degli steli ml 150-200
I trattamenti debbono essere fatti verso sera o comunque nelle ore fresche per evitare la troppa rapida evaporazione del prodotto.
Cereali da immagazzinare: ml 12, ml 18 oppure ml 24 diluiti in 1 litro d'acqua per ogni tonnellata (10 quintali) di cereali, spruzzando la soluzione sul cereale mentre viene immesso con nastro trasportatore nei silos, oppure quando viene trasferito con lo stesso sistema da un magazzino ad un altro.
N.B. Data la sua limitata durata d'azione anche se usato alla dose massima consigliata, il prodotto è indicato solo per la disinfestazione dei cereali e non per la protezione durante la conservazione stessa.

E' VIETATO L'IMPIEGO IN SERRE, FUNGAIE E MAGAZZINI

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. E' molto velenoso per le api, pertanto è consigliabile tenere lontane il più possibile le arnie dai luoghi trattati e non effettuare trattamenti alle piante durante la fioritura.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto
Far trascorrere lo stesso periodo prima di far pascolare il bestiame in zone trattate od alimentarlo con foraggi o mangimi che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto col prodotto.
ATTENZIONE da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

EGRID

DISERBANTE SELETTIVO PER IL DISERBO DEI FRUMENTI

EGRID

COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
MCPA puro (sotto forma di sale sodico o potassico o miscela dei due) g 25 (g/l 283)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

CONSIGLI DI PRUDENZA
– Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
- Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NOCIVO

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE
Registrazione del Ministero della Salute n. 11877 del 10/12/2003
CONTENUTO: ℓ 1-5-10
Riferimento partita N.

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per la cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi.
Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: =
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
EGRID combatte efficacemente veccia, capsella, fiordalisi, senape, colza, ranuncoli, papaveri.

MODALITA' D'IMPIEGO
Per il diserbo dei frumenti EGRID si impiega alle dosi di:
litri 2,5-3,5 diluiti in litri 200-600 di acqua per ettaro, a seconda del tipo di irroratore che si usa.
Trattare dalla fine della fase di accestimento a poco prima della fase di botticella.
Operare in giornate serene con temperatura non inferiore a 16-18°C.

COMPATIBILITA
Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, ecc. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.
Le pompe e gli utensili usati per il trattamento diserbante non devono essere impiegati per altri trattamenti antiparassitari se non sono stati ripetutamente lavati con acqua calda e soda.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli animali domestici, pesci e bestiame.
ATTENZIONE da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ENDOSELE

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE PER LA LOTTA AI PRINCIPALI PARASSITI DELLE COLTURE DA FRUTTO, DA FIORE E DEGLI ORTAGGI

ENDOSELE
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
ENDOSULFAN puro g 32,9 (g/l 355)
Coformulanti q. b. a 100
Contiene Xilene

TOSSICO

Pericoloso per l'ambiente

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290 del 23/04/2001.
FRASI DI RISCHIO – Infiammabile. – Nocivo per inalazione. - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. - Irritante per la pelle. - Rischio di gravi lesioni oculari. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164 – Modena / SULPHUR MILLS LIMITED. 1904-1905 G.I.D.C. Panoli, Dist. Bharuch, Gujarat (India)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 1754 del 07/09/1974
Riferimento partita N. CONTENUTO: ml 100-500 ℓ 1-5-10-20

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - **Sintomi:** cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica. Barbiturici contro i tremori e le convulsini
Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
ENDOSELE è un prodotto indicato per la lotta contro insetti dotati di apparato boccale masticatore e succhiatore.
Il prodotto agisce soprattutto per contatto ed ingestione ed è dotato di un'azione pronta e duratura sulle colture irrorate.
ENDOSELE può essere impiegato, sulle diverse colture, alle seguenti dosi:
Frutticoltura – Agrumi, Mandorlo, Nocciolo, Pomacee, Pesche, Vite: contro Afidi, Psille, Larve minatrici, Cicadelle, Tentredini, Antonomo, Eriofidi, Tignole, ml 150/hl. Per Agrumi e Vite sono ammessi al massimo n. 2 trattamenti all'anno, per il Pesco al massimo n. 3 trattamenti all'anno.
Orticoltura - Pomodoro, Melone, Zucca, Cocomero: contro Cavolaia, Dorifora ed Afidi ml 130-150/hl.
Floricoltura: contro Tripidi e Bega del garofano ml 130-150/hl.
Barbabietola da zucchero, Patata, Soia, Erba medica, Tabacco: contro Afidi, Altica, Cleono della barbabietola litri 1,2-1,8/ha, distribuiti con 400-800 litri di acqua.

Le dosi sopra indicate possono essere aumentate a ml 200/hl allorquando si devono combattere stadi avanzati di larve e nel caso di insetti altamente resistenti (ad es. Afidi).

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti fitosanitari, ad esclusione di quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
In condizioni normali di ambiente e di impiego il prodotto non è fitotossico.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto non è nocivo per il bestiame, gli insetti utili, per i pesci e gli animali domestici se impiegato secondo le istruzioni e con le precauzioni consigliate.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta per la vite e 25 giorni per le colture restanti.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali."

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

FALTEX COMBI

ANTICRITTOGAMICO PER LA VITICOLTURA – POLVERE BAGNABILE

FALTEX COMBI
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
FOLPET puro g 30
RAME METALLICO puro (sotto forma di ossicloruro) g 15
Inerti, disperdenti, bagnanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per inalazione ed ingestione. - Irritante per gli occhi. - Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / CHEMIA S.P.A - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / SULPHUR MILLS LIMITED, 1904-1905 G.I.D.C. Panoli, Dist. Bharuch, Gujarat (India)
Registrazione del Ministero della Salute n. 11993 del 27/02/2004
Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 500 Kg 1-5-10-20

NORME PRECAUZIONALI - Conservare la confezione ben chiusa. – Evitare di respirarne i vapori. – Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Folpet puro g 30 e Rame metallico puro g 15 le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FOLPET - **Sintomi:** irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). **Terapia:** sintomatica.
RAME - **Sintomi:** denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
FALTEX COMBI trova impiego sulla vite, alle dosi valide per 100 litri di acqua e per trattamenti a volume normale:
Vite: contro peronospora g 250-300; contro botrytis g 300.
Preparazione della sospensione
FALTEX COMBI, nella dose necessaria, deve essere prima stemperato in poca acqua a parte e poi aggiunto al quantitativo di acqua totale; aggiungere nella miscela antiparassitaria il bagnante adesivo, ove le condizioni del trattamento lo consigliano.

COMPATIBILITA' - Miscibile con la maggior parte degli antiparassitari in commercio e con tutti quelli nostra produzione ad esclusione degli olii minerali e polisolfuri.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' – Non si deve trattare durante la fioritura.
RISCHI DI NOCIVITA' – E' tossico per gli insetti utili e per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta per le uve da tavola. Su uve da vino sospendere i trattamenti almeno 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

FITONEX 54 D

DISERBANTE SELETTIVO A BASE DI ESTERI DELL'ACIDO 2-4 D
PER IL DISERBO DEL FRUMENTO

FITONEX 54 D
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
2-4 D puro (sotto forma di estere isottilico) g 35,5 (g/l 358)
Coformulanti q. b. a 100
Contiene XILENE

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO – Infiammabile. - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. - Irritante per la pelle. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI SRL - Via IV Novembre n. 19/1 - Renazzo di Cento (FE) / AGRICHEM - Koopvaardijweg 9 - 4906 CV Oosterhout, Olanda / AGRO-SAN Kimya Sarayi ve Ticaret A.S. - Valikonagi Cad. Sonu - Yapi Kredi Bankasi Vakfi Apt. Kat:3/3 - 80220 Nisantasi – Istanbul - Turkiye / ALTHALLER ITALIA S.R.L. - Strada Comunale per Campagna n. 5 - San Colombano al Lambro (MI) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / CHIMAC-AGRIPHAR S.A. - Rue De Renory n. 26B - 4102 Ougree - Belgium / DIACHEM SPA - U.P. SIFA - S.S. Padana Superiore - Caravaggio (BG) / A.H. MARKS AND COMPANY LIMITED - Wyke Bradford - West Yorkshire BD129 EJ- England / SCAM S.R.L. - ViA Bellaria n. 164 - Modena / TORRE S.r.l. - Via Pian D'Asso - Torrenieri Fraz. di Montalcino (SI)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 1148 del 26/04/1973
Riferimento partita n.: CONTENUTO: ℓ 1

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. - Conservare lontano da fiamme e scintille. - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per la cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi.
Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, neviti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni.
Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. **Terapia**: sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE
FITONEX 54 D è efficace per il diserbo di veccia, capsella, senape, ranuncoli, colza, fiordaliso, coda cavallina, scardaccione, veronica, papavero, persicaria, aderella terrestre.
MODALITA' D'IMPIEGO
FITONEX 54 D si impiega a dosi comprese tra litri 0,400-1,250/ha diluiti in 200-600 litri d'acqua a seconda del mezzo irroratore adoperato.
A temperatura bassa (13C circa) e se prevalgono specie resistenti (stellaria, vilucchio, camomilla fumaria) si usano dosi prossime alla massima -
mentre per le temperature superiori ai 17-18C si usano dosi più basse o intermedie secondo l'esperienza locale.
Il momento più adatto per il diserbo del frumento va dalla fine della fase di accestimento o figliatura a poco prima della fase di botticella.

COMPATIBILITA'
Il prodotto va impiegato da solo.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, ecc. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.
Le pompe e gli utensili usati per il trattamento diserbante non devono essere impiegati per altri trattamenti antiparassitari se non sono stati ripetutamente lavati con acqua calda e soda.
RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli animali domestici, pesci e bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

FITONEX COMBI

DISERBANTE SELETTIVO A VASTO SPETTRO
D'AZIONE PER IL DISERBO DEL FRUMENTO

FITONEX COMBI
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:

2-4 D puro	g	31	(g/l 356)
MCPA puro	g	25	(g/l 280)
Coformulanti q. b. a		100	

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO – Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI SRL - Via IV Novembre n. 19/1 - Renazzo di Cento (FE) / TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / CHIMAC-AGRIPHAR S.A. - Rue De Renoryn. 26B - 4102 Ougree - Belgium / DIACHEM SP A - U.P. SIFA - S.S. Padana Superiore - Caravaggio (BG) / SCAM S.R.L. - ViA Bellaria n. 164 - Modena
Registrazione del Ministero della Sanità n. 1147 del 26/04/1973
Riferimento partita n.: CONTENUTO: ℓ 1-5

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. - Non distarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: 2 4 D 31% MCPA 25%le quali entrambe separatamente danno i s eguenti sintomi di intossicazione:
Sintomi: irritante per la cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi.
Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, neviti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni.
Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte.
Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: =
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE
L'associazione dei due sali del 2-4 D e dell'MCPA consente di ottenere un'azione diserbante contro la quasi totalità delle infestanti a foglia larga.
MODALITA' D'IMPIEGO
In condizioni normali FITONEXCOMBI si impiega alla dose di 0,750-1,500 litri per 600 litri di acqua per ettaro; ricorrendo alle dosi più alte per il diserbo di Piantaggine, Farinaccio, Vilucchio, Fiordaliso, Erba ruota, Papavero, Gallio, Centocchi.
Diluire la quantità di FITONEXCOMBI nel totale qu antitativo di acqua, agitando con cura.
Il momento piùadatto per il diserbo del frumento va dalla fine della fase di accestimento o figliatura e poco prima della fase di botticella.

COMPATIBILITA'
Il prodotto va impiegato da solo.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, ecc. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.
Le pompe e gli utensili usati per il trattamento diserbante non devono essere impiegati per altri trattamenti antiparassitari se non sono stati ripetutamente lavati con acqua calda e soda.
RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli animali domestici, pesci e bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FITONEX MC 30

DISERBANTE SELETTIVO PER IL DISERBO DEI FRUMENTI

FITONEX MC 30
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
MCPA puro (sotto forma di sale sodico o potassico o miscela dei due) g 25 (g/l 283)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
CONSIGLI DI PRUDENZA
– Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
- Non mangiare, nè bere, nè fumare durante limpiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso dingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o letichetta.

NOCIVO

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via IV Novembre n.19/1 Renazzo di Cento (FE) / TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / ALTHALLER ITALIA S.R.L. - Strada Comunale per Campagna n. 5 - S. Colombano al Lambro (MI) / CHIMAC-AGRIPHAR S.A. - Rue De Renoryn. 26 - B-4102 Ougree (Belgium)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 1149 del 26/04/1973
CONTENUTO: ml 50-100-200-250-500 ℓ 1
Riferimento partita N.

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per la cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi.
Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: =
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
FITONEX MC 30 combatte efficacemente veccia, capsel la, fiordalisi, senape, colza, ranurcoli, papaveri.
MODALITA' D'IMPIEGO
Per il diserbo dei frumenti FITONEXMC 30 si impieg a alle dosi di: litri 2,5-3,5 diluiti in litri 200-600 di acqua per ettaro, a seconda del tipo di irroratore che si usa.
Trattare dalla fine della fase di accestimento a poco prima della fase di botticella.
Operare in giornate serene con temperatura non inferiore a 16-18C.

COMPATIBILITA'
Il prodotto va impiegato da solo.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, ecc. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.
Le pompe e gli utensili usati per il trattamento diserbante non devono essere impiegati per altri trattamenti antiparassitari se nor sono stati ripetutamente lavati con acqua calda e soda.
RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli animali domestici, pesci e bestiame.
ATTENZIONE da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

FITONEX MC 30

DISERBANTE SELETTIVO PER IL DISERBO DEI FRUMENTI

FITONEX MC 30
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
MCPA puro (sotto forma di sale sodico o potassico o miscela dei due) g 25 (g/l 283)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

CONSIGLI DI PRUDENZA
– Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NOCIVO

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Registrazione del Ministero della Sanità n. 1149 del 26/04/1973
CONTENUTO: ml 50-100
Riferimento partita N.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO"
oppure:
"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA"

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FITOTAB

FITOREGOLATORE - TIPO DI FORMULAZIONE: COMPRESSE EFFERVESCENTI SOLUBILI IN ACQUA

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono
ACIDO GIBBERELLICO puro g 9
Coformulanti q. b. a g 100
(una compressa contiene g 0,9 di p.a. puro)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO – In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
FITOTAB è un fitoregolatore di crescita a base di Acido Gibberellico, che interferisce in alcuni processi biologici delle piante (sviluppo, fioritura, anticipo produzione) producendo effetti positivi ai fini desiderati (allegagione, precocità).
VITE – Uve da tavola senza semi: trattare per allungare il rachide in pre-fioritura con tralci di 4-8 cm alla dose di 1-2 compresse per hl, per diradare il grappolo trattare al 30-40% della fioritura alla dose di 2 compresse per ettolitro; per aumentare le dimensioni degli acini trattare dopo l'allegagione con acini di 3-4 mm di diametro, alla dose di 3 compresse.
Uva da vino con semi – per allungare il rachide sulle varietà a grappolo compatto tipo Tocai, Picolit, Chardonnay ecc. si tratta prima della fioritura con tralci di 10-15 cm alla dose di 0,5-1 compressa per ettolitro ed impiegando 200-300 litri d'acqua per ettaro.
PERO – Per favorire la partenocarpia e stimolare lo sviluppo della fruttificazione normale, si deve trattare nel periodo compreso fra l'inizio (20-30% di fiori aperti e la piena fioritura alla dose di 1-2 compresse / hl di acqua, impiegando non meno di 10 hl di soluzione per ettaro. Per ridurre i danni da gelate: 2-3 compresse.
ARANCIO – Per avere la buccia liscia e un ritardo di maturazione sulla varietà Moro, Tarocco e Sanguinella, trattare poco prima della colorazione dei frutti, trattare alla dose di 1-2 compresse / hl d'acqua, avendo cura di bagnare abbondantemente.
CLEMENTINE – MANDARINI – Per favorire l'allegagione, trattare quando la maggior parte dei fiori è in piena fioritura o inizia a perdere petali, trattare alla dose di 1 compressa / hl di acqua.
LIMONI – Per aumentare colore e pezzatura dei frutti e per unificare le raccolte, usare 1-2 compresse per hl circa, 5-7 settimane prima della prima raccolta e con il colore della maggioranza dei frutti che comincia a virare al giallo – argenteo.
CARCIOFO – Per anticipare la produzione, trattare al momento in cui si nota la formazione delle infiorescenze, trattare alla dose di 1-2 compresse / hl di acqua.
FRAGOLA IN COLTURA PROTETTA – Per stimolare l'allegagione, applicare il prodotto 15-20 giorni prima della fioritura, trattare alla dose di 2-4 compresse / hl di acqua impiegando 5-8 hl di soluzione per ettaro.
FLOREALI – Per anticipare ed aumentare la fioritura e migliorare talvolta la qualità dei fiori stessi, trattare quando compaiono i boccioli trattare alla dose di 1 compressa / hl di acqua.
PATATA – Per stimolare l'emissione regolare dei germogli nei tuberi da seme, s'immergono per 10 minuti in una soluzione di 1/10 di compressa per ettolitro in caso di tuberi selezionati e ½ di compressa per ettolitro per tuberi interi, asciugando e seminando subito dopo; nel caso di tuberi provenienti da magazzino di conservazione, lasciare trascorrere 3-4 settimane di pre-germinazione.
CILIEGIO DOLCE – Per aumentare la consistenza e la pezzatura, impiegare 1-2 compresse per ettolitro all'epoca dell'invaiatura.
CILIEGIO ACIDO – Per la riduzione dei danni provocati dal Giallume virotico, per la scarsa vigoria e bassa produzione, trattare 10-14 giorni dopo la caduta dei petali con 1-2 compresse per ettolitro.
SEDANO – POMODORO – SPINACIO – ZUCCHINO – Per la stimolazione dello sviluppo e limitare lo stress da freddo, impiegare 2-3 compresse per ettolitro in 300-500 l/ha, 4-5 settimane prima della raccolta.
NOTE – E' molto importante aggiungere sempre 50 ml/hl di un bagnante. In linea generale il prodotto deve essere impiegato in giornate di tempo buono e stabile (evitare l'impiego quando si prevedono piogge imminenti).

COMPATIBILITA' – Non compatibile con prodotti a reazione alcalina. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA – Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

TERRANALISI S.R.L. – Via Nino Bixio n. 6 – Cento (FE) Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: CIFO S.P.A. – Via Oradour n. 6 – San Giorgio di Piano (BO) / GUANGDONG PANYU SHILOU FINE CHEMICAL FACTORY – Jiao Tan Wk Area Shilou, Panyu Guangzhou People's repubic of China / KHARA CHEMICALS LIMITED – Wellington in Telford - England
Stabilimento di confezionamento: BIOLCHIM S.P.A. – Via San Carlo n. 2130 – 40059 Medicina (BO)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 10592 del 06/09/2000
CONTENUTO: g 50 (10 compresse da g 5) – g 100 (20 compresse da g 5) – g 150 (30 compresse da g 5) – g 200 (40 compresse da g 5) – g 250 (50 compresse da g 5) – g 500 (100 compresse da g 5)

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Riferimento partita N.:

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

FITOTAB

FITOREGOLATORE - TIPO DI FORMULAZIONE: COMPRESSE EFFERVESCENTI SOLUBILI IN ACQA

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono
ACIDO GIBBERELLICO puro g 9
Coformulanti q. b. a g 100
(una compressa contiene g 0,9 di p.a. puro)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

TERRANALISI S.R.L. – Via Nino Bixio n. 6 – Cento (FE) Tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10592 del 06/09/2000
CONTENUTO: g 50 (10 compresse da g 5) – g 100 (20 compresse da g 5)

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "
oppure:
" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

Riferimento partita N.:

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

FITOVIS

FITOREGOLATORE A BASE DI ACIDO GIBBERELLICO
FORMULAZIONE: LIQIDO SOLUBILE

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono
ACIDO GIBBERELLICO puro g 1,8 (g/l 18,8)
Coadiuvanti q. b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel 051 6836207

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / L.I.F.A. S.P.A. - Via Piave (Zona industriale) - Isola Vicentina (VI) / L.I.F.A. S.P.A. - Via C. Colombo n. 7/7º Vigonovo (VE) / VE.BI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. - Via Desman n. 43 - Borgoricco (PD)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 9215 del 24/04/1997
CONTENUTO: ℓ
Riferimento partita N.:

SCOPI, MODALITA', DOSI E EPOCHE D'IMPIEGO
FITOVIS si usa sulle colture di melo, pero, arancio, clementino, mandarino, limone, ciliegio, vite, fragola, pomodoro, melanzana, zucchino, lattuga, spinacio, sedano, carciofo, patata, floreali per gli scopi e le modalità qui di seguito indicate:
MELO - per favorire l'allegagione e stimolare lo sviluppo dei frutti, proteggere fiori dalle gelate tardive, alle dosi e nelle epoche di seguito indicate: ml 50-100/hl di acqua, all'inizio della fioritura, impiegando 10-15 q.li di acqua per ettaro.
In caso di gelate in fioritura trattare entro 48 ore dalla gelata usando ml 100-150 di FITOVIS per 100 litri di acqua.
PERO - per favorire l'allegagione e stimolare lo sviluppo dei frutti, proteggere fiori dalle gelate tardive sulle seguenti varietà: Passa Crassana, Abate Fethel, Coscia, S. Maria, Wiliam, Conference, Dr. Guyot, Kaiser, alle dosi e nelle epoche di seguito indicate: ml 50-100/hl di acqua, all'inizio della fioritura, impiegando 10-15 q.li di acqua per ettaro.
In caso di gelate in fioritura trattare entro 48 ore dalla gelata usando ml 100-150 di FITOVIS per 100 litri di acqua.
ARANCIO – Per avere la buccia liscia e un ritardo di maturazione sulla varietà Moro, Tarocco e Sanguinella, trattare poco prima della colorazione dei frutti, alla dose di ml 50-100/hl di acqua, avendo cura di bagnare abbondantemente.
CLEMENTINE – MANDARINI – Per favorire l'allegagione, trattare quando la maggior parte dei fiori è in piena fioritura o inizia a perdere petali, alla dose di ml 50/hl di acqua.
LIMONI – Per aumentare colore e pezzatura dei frutti e per unificare le raccolte, alla dose di ml 50-100/hl di acqua, 5-7 settimane prima della prima raccolta e con il colore della maggioranza dei frutti che comincia a virare al giallo – argenteo.
CILIEGIO DOLCE – per aumentare la consistenza e la pezzatura, alla dose di ml 50-100/hl di acqua all'epoca dell'invaiatura.
CILIEGIO ACIDO – per la riduzione dei danni provocati dal Giallume virotico, per la scarsa vigoria e bassa produzione, trattare 10-14 giorni dopo la caduta dei petali, alla dose di ml 50-100/hl di acqua.
VITE – Uve da tavola senza semi: trattare per allungare il rachide in pre-fioritura con tralci di 4-8 cm alla dose di ml 50-100/hl di acqua; per diradare il grappolo trattare al 30-40% della fioritura alla dose ml 100/hl di acqua; per aumentare le dimensioni degli acini trattare dopo l'allegagione con acini di 3-4 mm di diametro, alla dose di ml 150/hl di acqua. Uva da vino con semi – per allungare il rachide sulle varietà a grappolo compatto tipo Tocai, Picolit, Chardonnay ecc. si tratta prima della fioritura con tralci di 10-15 cm alla dose di ml 25-50/hl di acqua, impiegando 200-300 litri d'acqua per ettaro.

FRAGOLE - in serra - per anticipare e aumentare il raccolto delle seguenti varietà coltivate in serra: Gorella, Pocahontas, Red Gauentlet, Gambridge Favourite, alla dose di ml 50-100/hl di acqua, 30 giorni prima della fioritura usando 300-400 litri di acqua per ettaro.
Non è consigliabile impiegare FITOVIS su colture di fragole in pieno campo, perchè l'eventuale caduta della temperatura può causare l'aborto dei fiori.
POMODORO, MELANZANA, ZUCCHINO, LATTUGA, SPINACIO, SEDANO – per la stimolazione dello sviluppo e limitare lo stress da freddo, alla dose di ml 100-150/hl impiegando 200-300 litri di acqua per ettaro, 4-5 settimane prima della raccolta.
CARCIOFO - per anticipare la produzione dei capolini e ottenere un prodotto di qualità migliore con gambi piùlunghi e capolini compatti e affusolati, sulle seguenti varietà: Cestellamare, Carciofo di ogni mese, Carciofo Molese, Masedu, alla dose di ml 50-100/hl di acqua al momento della formazione del capolino centrale e bagnando bene tutte le piante.
Il trattamento si può ripetere dopo la prima raccolta.
PATATA – Per stimolare l'emissione regolare dei germogli nei tuberi da seme, s'immergono per 10 minuti in una soluzione di ml 5/hl di acqua in caso di tuberi tagliati e ml 25/hl di acqua per tuberi interi, asciugando e seminando subito dopo; nel caso di tuberi provenienti da magazzino di conservazione, lasciare trascorrere 3-4 settimane di pre-germinazione.
FLOREALI (cactacee, crisantemi, anemoni, ciclamini, ortensie, fiordalisi, margherite, garofani, rose) – Per anticipare ed aumentare la fioritura e migliorare talvolta la qualità dei fiori stessi, trattare quando compaiono i boccioli, alla dose di ml 50/hl di acqua.

COMPATIBILITA' - Il prodotto va impiegato da solo.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto
ATTENZIONE da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

FITOVIS

FITOREGOLATORE A BASE DI ACIDO GIBBERELLICO
FORMULAZIONE: LIQIDO SOLUBILE

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono
ACIDO GIBBERELLICO puro g 1,8 (g/l 18.8)
Coadiuvanti q. b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel 051 6836207

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9215 del 24/04/1997
CONTENUTO: ml 10-50-100
Riferimento partita N.:

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO"
oppure:
"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA"

FOSFOMAL 50

INSETTICIDA LIQIDO EMULSIONABILE A BASE DI MALATION

FOSFOMAL 50
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
MALATION puro g 48 (g/l 494)
Coformulanti q. b. a 100
Contiene XILENE

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per ingestione. - Irritante per la pelle. - Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI SRL - Via IV Novembre n. 19/1 - Renazzo di Cento (FE) / SCAM S.R.L. - ViA Bellaria n. 164 - Modena
Registrazione del Ministero della Sanità n. 1328 del 06/12/1973
CONTENUTO: ℓ 1
Riferimento partita n.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsione, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Melo, pero, susino, vite e bietole -
Contro: Afidi in genere, Tignole, Tentredini, Larve e adulti di Lepidotteri a dosi varianti da 80 a 150 ml per ettolitro di acqua.

COMPATIBILITA'
FOSFOMAL 50 è miscibile con tutti i prodotti di comune impiego.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, pesci e bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
"**Attenzione** da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso." Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato." Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali."

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

FRUGON FA

FITOREGOLATORE IN FORMULAZIONE LIQIDA
A BASE DI ORMONI VEGETALI

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono
N.A.A. puro g 1,6 (g/l 16)
Coformulanti q. b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel 051 6836207

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L.
- Via IV Novembre n. 19/1- Renazzo di Cento (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 5287 del 30/03/1983

CONTENUTO: ℓ 1

Riferimento partita N.:

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

FRUGON FA va impiegato sul **Pero** per favorire la allegagione.

Si usa alla dose di g 100 per hl di acqua nella fase che va dai bottoni fiorali ingrossati alla fase dei fiori a palloncino.

COMPATIBILITA': FRUGON FA va usato da solo.

ATTENZIONE da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

FRUGON T

FITOREGOLATORE IN FORMULAZIONE LIQIDA
PREVIENE LA CASCOLA DEI FRUTTI

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono
N.A.A. puro g 2 (g/l 22)
Coformulanti q. b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel 051 6836207

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L.
- Via IV Novembre n. 19/1- Renazzo di Cento (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6096 del 24/10/1984

CONTENUTO: ml 500

Riferimento partita N.:

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

FRUGON T si impiega su **meli** e **peri** per evitare la caduta prematura dei frutti.

La dose d'impiego va da 50 a 100 ml per 100 litri di acqua, intervenendo 10-20 giorni prima della raccolta.
Le dosi basse si usano sulle varietà precoci e quando la temperatura è elevata.

COMPATIBILITA': FRUGON T va usato da solo.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

FRUGON TF

FITOREGOLATORE IN FORMULAZIONE LIQIDA

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono
N.A.A. puro g 7 (g/l 77)
Coformulanti q. b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel 051 6836207

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L.
- Via IV Novembre n. 19/1- Renazzo di Cento (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6092 del 24/10/1984

CONTENUTO: ml 200

Riferimento partita N.:

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

FRUGON TF si impiega su **meli** e **peri** per evitare la caduta prematura dei frutti.

La dose d'impiego va da 20 a 40 ml per 100 litri di acqua, intervenendo 10-20 giorni prima della raccolta.
Le dosi basse si usano sulle varietà precoci e quando la temperatura è elevata.
E' consigliabile trattare con cielo coperto o poco prima del tramonto.

COMPATIBILITA' – Il prodotto va impiegato da solo.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - NON OPERARE CONTRO VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

FUNGITER 50

FUNGICIDA ORGANICO CONTRO SCLEROTRINE E BOTRYTIS
DELLE COLTURE ORTICOLE, FLOREALI E FRAGOLE

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono
DICLORAN puro g 50
Bagnanti e disperdenti q. b. a 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. – Conservare la confezione ben chiusa. – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO
FUNGITER 50 è un fungicida organico in polvere bagnabile, specifico per combattere tutte le forme di marciume provocate da Botrytis e Sclerotinia delle colture ortive, fruttico le e floreali.
Insalata*: FUNGITER 50 si impiega contro il marciume alla dose di g 200/q.le di acqua, praticando 2-3 trattamenti alla distanza di 3-4 settimane l'uno dall'altro. **Avvertenza**: si raccomanda di non trattare le piantine di insalata prima della comparsa delle prime 2 foglie vere e prima che siano trascorsi 14 giorni almeno dal trapianto.
Fragola: contro la Botrytis (muffa grigia) si applica il F UNGITER 50 poco prima dell'inizio della fioritura continuando ogni 10-15 giorni, effettuando dai 3 ai 5 trattamenti, alla dose di g 150-200/q.le di acqua.
Colture ortive: in semenzai – letti caldi – serre (pomodori – zucchini – cetrioli – peperoni – melanzane – basilico). Per combattere varie forme di marciumi pedali e radicali, fare spruzzare con il FUNGITER 50 alla dose di g 200/q.le di acqua, con trattamenti distanziati 3-4 settimane l'uno dall'altro.
Piante ornamentali in serra e in pieno campo: per prevenire attacchi di Botrytis ed altre muffe il FUNGITER 50 alla dose di g 150/q.le di acqua.
Botrytis su gladioli: usare FUNGITER 50 alla dose di g 800/q.le di acqua, usando 5 litri della soluzione per ogni 20 metri di solco destinato a ricevere i bulbi a dimora. Sulla coltura in atto usare il prodotto alla dose di g 200 ad intervalli di 3-4 settimane, bagnando bene le foglie.
Colture di garofani ed altri fiori: per prevenire il Mal del Colletto dei garofani ed altri marciumi pedali ad altri fiori, trattare il terreno prima del trapianto con spruzzature di FUNGITER 50 alla dose di g 200/q.le di acqua.

COMPATIBILITA' – FUNGITER 50 è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari in commercio, eccezion fatta per quelli a reazione alcalina ed oleosa.
Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSICCITA' – Prestare attenzione nelle avvertenze indicate nella coltura dell'insalata.
INTERVALLO DI SICUREZZA – Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio, 6 - Cento (FE) – Tel 051 6836207

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. – Via Nino Bixio n. 6 – Cento (FE) / A.D.I.C.A. S.R.L. - Via dello Stabilimento n. 11 - Nera Montoro (TR) / CHEMIA SPA - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE)

Registrazione del Ministero della Salute n. 12254 del 15/10/2004
Riferimento partita n. CONTENUTO: g 200-250-500 Kg 1 -5-10

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

GRAMIN FL

DISERBANTE SELETTIVO IN FORMULAZIONE LIQUIDA SOTTOFORMA DI SOSPENSIONE ACQUOSA PER LA LOTTA CONTRO LE INFESTANTI DI FRUMENTO E ORZO

GRAMIN FL
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
CLORTOLURON puro g 40 (g/l 488)
Coformulanti q. b. a 100

NOCIVO

N
Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO – Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI SRL - Via IV Novembre n. 19/1 - Renazzo di Cento (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 7326 del 16/12/1987
Riferimento partita n.: CONTENUTO: ℓ 1

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il GRAMIN FL si usa cortro le seguenti graminacee infestanti del **frumento** e dell'**ozo**: Alopecurus, Apera, Avena, Lolium e Poa.
Agisce inoltre su dicotiledoni quali: Capsella, Centaurea, Cerastium, Galeopsis, Lamium, Matricaria, Mercuialis, Poligonum, Raphanus, Sinapis, Stellaria.
Alle seguenti dosi:
- litri 4-5/ha in 6-10 ettolitri di acqua prima dell'emergenza della coltura;
- litri 2-3/ha in 6-10 ettolitri di acqua in post-emergenza quando la coltura è nello stadio che va dalle 2-3 foglie fino all'inizio dello accestimento.
Avvertenza: evitare i super dosaggi.

COMPATIBILITA'- Il prodotto è miscibile con altri erbicidi derivati dall'urea, triazine e fenossiderivati.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Il trattamento con GRAMIN FL non è consigliabile in terreni molto sabbiosi e in quelli soggetti a ristagni di acqua.
Dopo l'applicazione del prodotto possono manifestarsi fenomeri transitori di sofferenza delle colture.
Non deve essere impiegato sul frumento tenero Demar e sul frumento duro Ktl. sensibili al Chlortoluron.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere il trattamento 60 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

GRAMINEX PB

DISERBANTE SELETTIVO IN POLVERE BAGNABILE PER FRUMENTO E ORZO

GRAMINEX PB
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
CLORTOLURON puro g 77,6
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO – Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TORRE S.r.l. – Via Pian d'Asso – Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 6350 del 16/05/1985

Riferimento partita N.: CONTENUTO: Kg 1

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il GRAMINEX PB si usa contro le seguenti infestanti del frumento e dell'orzo: alopecurus, apera, lolium, poa (fra le graminacee) - capsella, centaurea, galeopsis, lamium, matricaria, mercurialis, polygonum, raphanus, sinapsis, stellaria (fra le dicotiledoni) - alle seguenti dosi:
- Kg 2,5-3/ha in 6-10 hl di acqua in pre-emergenza della coltura
- Kg 2-2,5/ha in 6-10 hl di acqua in post-emergenza, quando la coltura è nello stadio delle 2-3 foglie.
Avvertenza - Evitare super dosaggi.

COMPATIBILITA'- Il prodotto è miscibile con altri erbicidi derivati dall'urea, triazine e fenossiderivati.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Il trattamento con GRAMINEX PB non è consigliabile nei terreni molto sabbiosi e in quelli soggetti a ristagni di acqua. Dopo l'applicazione del prodotto possono manifestarsi fenomeni transitori di sofferenza delle colture. Non deve essere impiegato sul frumento tenero DEMAR e sul frumento duro KD sensibili al Clortoluron e sugli orzi polistici. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto
ATTENZIONE ad impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

INSETTICIDA ACARICIDA RTU

INSETTICIDA-ACARICIDA
Tipo di formulazione: pronto all'uso

INSETTICIDA ACARICIDA RTU
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
CIPERMETRINA pura g 0,1 (g/l 1)
DICOFOL puro g 0,3 (g/l 3)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari. - Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
- Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. - Proteggersi gli occhi/la faccia. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE)
Registrazione del Ministero della Salute n. 11366 del 10/06/2002
CONTENUTO: ml 10-20-50-100-500 ℓ 1
Riferimento partita N.

NORME PRECAUZIONALI – Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. - Conservare il recipiente ben chiusa. – Non respirare i vapori. – Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. – In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). – Conservare soltanto nel recipiente originale. – Se il prodotto è applicato in ambiente chiuso, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. – Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cipermetrina 0,1%Dicofo l 0,3% quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIPERMETRINA : SINTOMI: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione alle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
DICOFOL : SINTOMI: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica. Controindicazioni (dicofol): per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.

CARATTERISTICHE
INSETTICIDA ACARICIDA RTU è un prodotto fitosanitario per trattamenti alle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico, efficace nei confronti degli afidi, ragnetti rossi, tripidi, lepidotteri e coleotteri che infestano le piante da appartamento e giardino. Il prodotto è pronto all'uso e non necessita di diluizione.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Spruzzare il prodotto sulla parte aerea delle piante da proteggere. Iniziare i trattamenti alla prima comparsa dei parassiti e ripeterli secondo necessità. Non eccedere nell'uso. Dopo il trattamento arieggiare il locale.

COMPATIBILITA' - Il prodotto si impiega da solo.
FITOTOSSICITA' - Non impiegare nelle ore piùcalde del giorno.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente secondo etichetta: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - NON OPERARE CONTRO VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

INSETTICIDA ACARICIDA RTU

INSETTICIDA-ACARICIDA
Tipo di formulazione: pronto all'uso

INSETTICIDA ACARICIDA RTU
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
CIPERMETRINA pura g 0,1 (g/l 1)
DICOFOL puro g 0,3 (g/l 3)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari. - Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. - Proteggersi gli occhi/la faccia. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Salute n. 11366 del 10/06/2002
CONTENUTO: ml 10-20-50-100
Riferimento partita N.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "
oppure:
" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

LAS VEGAS

ERBICIDA GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA
SELETTIVO PER NUMEROSE COLTURE SIA ERBACEE
SIA ARBOREE - CONCENTRATO EMULSIONABILE

LAS VEGAS
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
FLUAZIFOP-P BUTILE puro g 13,3 (g/l 125)
Coformulanti q. b. a 100

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA -- Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. -- Qesto materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione:TERRANALISI S.R.L. - Via IV Novembre n. 19/1 - Renazzo di Cento (FE) / ALTHALLER ITALIA S.R.L. - Strada Comunale per Campagna n. 5 - San Colombano al Lambro (MI) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 10477 del 19/04/2000
CONTENUTO: ml 50-100-200-250-500 ℓ 1-5
Riferimento partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO – Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, neviti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia e rigidità, fascicolazione; gli spasmi muscolari ir genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE – LAS VEGAS è un erbicida selettivo specifico per il controllo delle infestanti graminacee. Esso è assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato, per via sistemica, sia verso gli apici vegetativi, sia verso le radici, i rizomi e gli stoloni. Il prodotto è assorbito rapidamente (entro 3 ore dal trattamento) ed i primi sintomi appaiono nell'ambito di una settimana.
MODALITA' D'IMPIEGO - LAS VEGAS si distribuisce con attrezzature a bassa pressione (2-3 atm.) utilizzando ugelli a ventaglio o a specchio. Intervenire durante le ore fresche del giorno, su infestanti in attiva crescita, impiegando volumi d'acqua medi (litri 200-400/ha), onde favorire la uniforme copertura della vegetazione ed aggiungendo ml 350-500/hl di un bagnante non ionico.
Trattare quando le infestanti graminacee si trovano nello stadio:
- di 1-3 foglie/accestimento per le annuali e le bienni, quali Avena (Avena spp.), Bromo (Bromus spp.), Coda di volpe (Alopecurus spp.), Digitaria (Digitaria sanguinalis), Giavone (Echinochloa spp.), Setaria (Setaria spp.), Sorghetta da seme (Sorghum halepense), Loglio (Lolium spp.), Falaride (Phalaris spp.), ricacci di frumento e orzo; di 30-50 cm di altezza per la Sorghetta da rizoma (Sorghum halepense). L'erba fienarola (Poa annua) è mediamente resistente.

CAMPO E DOSI D'IMPIEGO

COLTURE	INFESTANTI	DOSE L/HA
agrumi: arancio, mandarino, limone, clementino, cedro, pompelmo, tangerino, chinotto, kumquat, arancio amaro drupacee: pesco, ciliegio, susino pomacee: melo, pero nocciolo, olivo, vite	graminacee annuali e bienni	1,5-2
ortaggi: cavoli, lattuga, cicoria, carciofo, sedano, finocchio, cocomero, melone, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, carota, ravanello, cipolla	graminacee annuali e bienni	1,5-2
fagiolo, fagiolino, pisello, fava (intervenire prima della fioritura)	sorghetta da rizoma	2-2,5
patata	graminacee annuali e perenni	1,5-2
barbabietola da zucchero	graminacee annuali e bienni	1,25-2
	sorghetta da rizoma	2-2,5
oleaginose: girasole, soia, colza	graminacee annuali e bienni	1,5-2
foraggiere leguminose: trifoglio	sorghetta da rizoma	2-2,5
tabacco floreali: in pieno campo ed in serra (rosa, garofano, liliacee, bulbose, gerbera, geranio, viola, petunia, crisantemo, strelizia)	graminacee annuali e bienni	1,5-2

Attenzione: adottare le dosi minori con infestanti nello stadio più giovanile e in condizioni ottimali d'impiego. Nelle applicazioni localizzate adottare la concentrazione del 2%litr i 2 di LAS VEGAS in 100 litri d'acqua). Non trattare infestanti che si trovano in stato di stress (siccità, danneggiamento, abbassamento di temperatura, pascolo, ecc.). L'efficacia del prodotto può essere ridotta in presenza di terreno secco ed umidità relativa dell'aria inferiore al 60%

FITOTOSSICITA' – Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
COMPATIBILITA' – **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qalora si verificasser o casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA' – Evitare di contaminare corsi d'acqua, perché il prodotto è nocivo per i pesci.
Avvertenze agronomiche - Da non usare su terreni grossolanamente sabbiosi. Da non usare sullo stesso appezzamento piùdi due volte l'anno.
INTERVALLO DI SICUREZZA – Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta: agrumi, pesco, ciliegio, susino, melo, pero, nocciolo, olivo, vite, cavoli, carciofo, lattuga, cicoria, sedani, finocchio, cocomero, melone, cetriolo, solanacee, carota, ravanello, cipolla 30 giorni – patata 50 giorni – barbabietola da zucchero, girasole, soia, colza, trifoglio, tabacco 60 giorni.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

LAS VEGAS

ERBICIDA GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA
SELETTIVO PER NUMEROSE COLTURE SIA ERBACEE
SIA ARBOREE - CONCENTRATO EMULSIONABILE

LAS VEGAS
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
FLUAZIFOP-P BUTILE puro g 13,3 (g/l 125)
Coformulanti q. b. a 100

NOCIVO **Pericoloso per l'ambiente**

FRASI DI RISCHIO - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'am biente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impieg o. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. – Qesto materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10477 del 19/04/2000
CONTENUTO: ml 50-100
Riferimento partita n.:

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO"
oppure:
"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA"

LIOSOL BETA

BAGNANTE ADESIVO NON SCHIUMOGENO IN FORMULAZIONE LIQIDA

COMPOSIZIONE: g 100 di prodotto contengono
ALCOL LAURILICO ETOSSILATO puro g 0,2 (g/l 2)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel 051 6836207

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 – Cento (FE) / TERRANALISI S.R.L. – Via IV Novembre n. 19/1 – Renazzo di Cento (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6719 del 04/06/1986

CONTENUTO: ℓ 1-5-20

Riferimento partita N.:

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE
LIOSOL BETA esplica un'azione antidilavante sulle piante trattate e permette una più omogenea copertura e un a maggiore persistenza degli antiparassitari.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
LIOSOL BETA va usato alla dose di ml 50 per ettolitro di acqua come coadiuvante nei trattamenti antiparassitari.

COMPATIBILITA'
LIOSOL BETA è miscibile con tutti i prodotti antiparassitari e diserbanti di comune impiego.
AVVERTENZA In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qalora si verificassero casi di intos sicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA - Intervallo che deve essere rispettato fra l'ultimo trattamento e la raccolta: **quello del formulato al quale viene aggiunto.**

ATTENZIONE da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

LIQUICARB 20

AFICIDA IN SOSPENSIONE ACQOSA

LIQUICARB 20
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
PIRIMICARB puro g 20 (g/l 212)
Coformulanti q. b. a 100

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per ingestione. - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, nè bere, nè fumare durante limpiego. - In caso dingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o letichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Non disperdere nellambiente. Riferirsi alle istruz ioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI SRL - Via IV Novembre n. 19/1 - Renazzo di Cento (FE) / CHEMIA S.p.a. – Strada Statale n. 255 Km 46 – Sant'Agostino (FE) / DIACHEM S.P.A. - Unità produttiva SIFA - S.S. Padana Superiore Km. 185,800 - Caravaggio (BG) / SCAM S.R.L. - ViA Bellaria n. 164 - Modena
Registrazione del Ministero della Sanità n. 7280 del 26/11/1987
CONTENUTO: ℓ 1
Riferimento partita n.:

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare il recipiente ben chiuso. - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione: sciallorea e broncorrea con broncospasmo: vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: Atropina.
Controindicazioni: Ossime.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
Si usa impiegando pompe a volume normale alla dose di
ml 100-150 per ettolitro di acqua, per la difesa delle seguenti colture:
Pomacee (melo e pero) - contro afide verde e afide brunastro.
Drupacee - contro afide verde e afide farinoso.
Pomodoro, patata, fagiolo, pisello, fragola contro afide verde e afide nero.
Colture floreali - in pieno campo - contro afide verde della rosa.
Colture arboree: pioppo, olmo, salice - contro afide verde.
Colture erbacee: fava, mais, frumento, bietola rossa - contro afide verde e afide nero.

COMPATIBILITA'
LIQICARB 20 è miscibile con tutti gli antiparassi tari di comune impiego. Non è miscibile con polisolfuri e poltiglia bordolese.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piùtossici. Qalora si verificassero casi di intossicazione inf ormare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili e nocivo per gli animali domestici, il pesce e il bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto (per i cereali)
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto (per le altre colture)
ATTENZIONE ad impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

LIQUIFOL 40

FUNGICIDA LIQIDO SOTTOFORMA DI
SOSPENSIONE CONCENTRATA

LIQUIFOL 40
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
FOLPET puro g 40 (g/l 480)
Coformulanti q. b. a 100

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per inalazione. – Irritante per gli occhi. - Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso dl ngestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o letichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Qesto mat eriale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nellambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI SRL - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / CHEMIA S.p.a. – Strada Statale n. 255 Km 46 – Sant'Agostino (FE) / SCAM S.R.L. - ViA Bellaria n. 164 - Modena / SULPHUR MILLS LIMITED - 1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist. Bharuch - Gujarat (India)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 8581 del 03/12/1994
CONTENUTO: ℓ 1-5-10-20
Riferimento partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione: possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
Il prodotto ha un'azione preventiva nei confronti della peronospora e botrite ed un'azione collaterale nell'oidio della vite.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO
Vite - effettuare i trattamenti alle dosi di ml 200-250/hl di acqua alla fine della fioritura e successivamente altri 2-3 trattamenti fino a 40 giorni prima della raccolta sulle uve da vino, mentre sulle uve da tavola si può intervenire fino a 10 giorni prima della raccolta.
Non intervenire in caso di umidità e di temperature elevate.

Preparazione della miscela acquosa: versare direttamente la quantità necessaria di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice, mantenendo l'acqua in agitazione.

N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

COMPATIBILITA' - Il prodotto non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuro e Olio bianco.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piùtossici. Qalora si verificassero casi di intossicazione inf ormare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con olii minerali e prodotti a base di zolfo.
RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta sulle uve da tavola. Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta per non ostacolare la fermentazione del mosto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

LIQUIGEL

ANTICRITTOGAMICO IN FORMULAZIONE LIQIDA AUTOSOSPENSIBILE A BASE DI ZOLFO

LIQUIGEL
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
ZOLFO puro (esente da selenio) g 56 (g/l 820)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
– Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
- Non mangiare, nè bere, nè fumare durante limpiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso dingestione consultare immediata-mente il medico e mostrargli il contenitore o leti chetta.

IRRITANTE

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 Cento (FE) / TERRANALISI S.R.L. Via IV Novembre n. 19/1 Renazzo di Cento (FE) / VE.BI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. - Via Desman n. 43 – Borgoricco (PD)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6872 del 11/11/1986

CONTENUTO: ℓ 1-5

Riferimento partita N.

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche
Anticrittogamico ad azione preventiva e curativa. La finezza delle particelle consente adesività ed una adeguata copertura degli organi vegetali da proteggere.
Malattie e parassiti combattuti
Oidio (Mal bianco) in genere - (Sphaerotheca, Erisiphe, Uncinula, Podosphaera).
Esercita inoltre contemporaneamente qualche azione di contenimento su altre malattie (Ticchiolatura, Ruggine, Corineo) e sugli acari.
Colture protette
Vite, colture arboree da frutta, ortive, erbacee da pieno campo, ornamentali, da fiore e piante forestali.
DOSI D'IMPIEGO IN PIENO CAMPO: ogni 100 litri di acqua.
Vite - dalla ripresa vegetativa alla raccolta: ml 100-150.
Pero e melo - trattamenti pre-fiorali ml 300-400, post-fiorali ml 150-200.
Pesco - dopo la fioritura ml 100-150.
Albicocco - durante la vegetazione ml 150.
Ortaggi e fiori - pomodoro, peperone, melanzana, rosa, ml 100-150
Piante forestali - frassino. acero, salice, ml 150-200 all'inizio della ripresa vegetativa.
Epoche d'impiego
A scopo preventivo a seconda delle malattie.
A scopo curativo ad ogni necessità.
Modalità d'impiego
Poichè lo Zolfo esplica in piero la sua attività in giornate soleggiate, ripetere piùfrequentemente i trattamen ti se la stagione è fredda e le giornate sono coperte.

COMPATIBILITA' - Non è compatibile, (miscibile) con antiparassi-tari alcalini (Polisolfuri, Poltiglia bordolese, ecc.) con Olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacril, Diclofluanide.
AVVERTENZA Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli Olii minerali e del Captano.
In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza piùlungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piùt ossici. Qalora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Può arrecare danno alle seguenti colture di:
Mele: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome BeautyStayman Red, Wesap.
Pere: Buona Luisa Davranches, Contessa di Parigi, Kiser Alexander, Olivier de Serres, Wiam, Decana del C omizio.
Vite: Sangiovese.
Non usare il prodotto durante le ore molto calde.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

LIQUIRAM 20

FUNGICIDA - LIQUIDO SOTTOFORMA DI SOSPENSIONE CONCENTRATA

LIQUIRAM 20
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
RAME (sotto forma di Ossicloruro) puro g 20 (g/l 270)
Coformulanti q. b. a 100

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per inalazione e ingestione. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164 – Modena

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8506 del 30/04/1994
CONTENUTO: ml 100-200-250-500 litri 1-5-10-20
Riferimento partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - **Sintomi**: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO - **Caratteristiche**: la natura colloidale e di finezza del LIQUIRAM 20 permettono: ricoprimento uniforme e completo - adesività utile - resistenza ai dilavamenti. Per questa proprietà LIQUIRAM 20 consente una lotta anticrittogamica efficace, riducendo il carico di rame metallico sulla parte vegetativa delle colture, le quali non vengono pertanto ostacolate nel loro sviluppo.
DOSI - EPOCHE - MODALITA' D'IMPIEGO - Agitare energicamente la confezione prima dell'uso. Dosi per 100 litri di acqua usando pompe a volume normale.
Vite - peronospora della vite: ml 370-460
Melo e pero - ticchiolatura e cancri rameali:
- ml 740-926 in trattamenti autunnali e di fine inverno
- ml 280-370 in trattamenti pre-fiorali.
E' consigliabile non usarlo durante il periodo vegetativo sulle varietà sensibili al rame.
Pesco - susino - ciliegio - bolla e corineo: ml 740-926 in trattamenti invernali.
Olivo - occhio del pavone e lebbra dell'ulivo: ml 460.
Agrumi - mal secco, antracnosi, fumaggine degli agrumi: ml 460.
Pomodoro e patata - peronospora, alternaria, septoria, cladosporiosi: ml 550.
Barbabietola da zucchero - cercospora delle barbabietole: litri 3,7/ha in 500-600 litri di acqua, 2-3 trattamenti distanziati di 15-20 giorni.
Sedano e carota - septoria e cercospora: ml 460.
Melone - anguria - zucchine - cavolo ed altre crucifere - peronospora e antracnosi: ml 460.
Pisello - fagiolo - fagiolino - antracnosi e ruggine: ml 460.
Garofano - rosa - crisantemo - ruggine, peronospora, ticchiolatura, septoria: ml 460.
Riso - per la lotta contro le alghe delle risaie intervenire alla prima comparsa delle alghe, impiegando litri 3-4 per ettaro diluiti in 200-300 o più litri di acqua.
Preparazione della poltiglia - la sospensibilità del LIQUIRAM 20 facilita la preparazione della poltiglia. Si consiglia di stemperare la prevista quantità di LIQUIRAM 20 in poca acqua. In modo da ottenere una sospensione uniforme a cui andrà aggiunto il rimanente quantitativo di acqua, agitando lentamente.

COMPATIBILITA' - Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione fortemente alcalina (Polisolfuri e calce) e con prodotti a base di Thiram.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e alcune varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Commercio, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta Del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passa Crassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibile, il prodotto può essere fitotosscico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

LIQUIRAM 20

FUNGICIDA - LIQIDO SOTTOFORMA DI SOSPENSIONE CONCENTRATA

LIQUIRAM 20
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
RAME (sotto forma di Ossicloruro) puro g 20 (g/l 270)
Coformulanti q. b. a 100

N

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per inalazione e ingestione. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per lambiente acqua tico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, nè bere, nè fumare durante limpiego. - In caso dingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o letichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Qesto materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nellambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8506 del 30/04/1994
CONTENUTO: ml 100
Riferimento partita n.:

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO"
oppure:
"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA"

LIQUIRAM IDROSSIDO

FUNGICIDA A BASE DI IDROSSIDO DI RAME
SOSPENSIONE CONCENTRATA

LIQUIRAM IDROSSIDO
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
RAME metallo (sotto forma di idrossido) g 24 (g/l 350)
Coformulanti q. b. a g 100

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per ingestione. - Rischio di gravi lesioni oculari. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'am biente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. - Proteggersi gli occhi/la faccia. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / CHEMIA S.p.a. – Strada Statale n. 255 Km 46 – Sant'Agostino (FE) / SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164 – Modena

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8580 del 03/12/1994
Riferimento partita N. CONTENUTO: ℓ 1-5-10

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - **Sintomi:** denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.
MODALITA' D'IMPIEGO - LIQIRAM IDROSSIDO è un anticrittogamico polivalente da impiegarsi nella lotta alle malattie fungine, sulle seguenti colture: **Vite** - ml 300-400 per hl contro Peronospora e Marciume nero degli acini, intervenendo dalla formazione degli acini alla vendemmia. **Melo e pero** - ml 400-500/hl contro cancri del legno (Nectria Galligena, Phomopsis mali, Spaeropsis malorum, Pseudomonas syringae). Inter venire alla caduta totale delle foglie ed al ringonfiamento delle gemme, ml 300-400/hl contro il colpo di fuoco. Intervenire con due trattamenti nelle fasi di rigonfiamento delle gemme e delle punte verdi. Sul pero applicare ml 50 o litri 0,9/ha, durante la fioritura ogni 5 giorni. ml 400/hl contro Phytophtora cactorum applicando 15 litri di soluzione alla base di ogni pianta ammalata, intervenire ogni anno in primavera e alla fine della raccolta. Contro la Ticchiolatura: ml 230-280/hl prima della fioritura; ml 160-200/hl dopo la fioritura e successivamente ml 160/hl. **Albicocco e susino** - ml 350-400/hl contro Corineo, Monilia e Cytospora leucostoma. Intervenire durante il riposo vegetativo. Non trattare mai dopo la fioritura. **Ciliegio** - ml 450/hl più ml 150 di olio minerale bianco contro Corineo, Monilia, Scopazzi. In frutteti fortemente ammalati ripetere l'applicazione anche in Agosto. ml 200/hl contro la Monilia dei fiori, intervenendo subito prima ed immediatamente dopo la fioritura. **Pesco - nettarine** - ml 400-500/hl contro Bolla e Corineo con interventi subito dopo la caduta delle foglie ed a fine inverno. ml 200-250/hl contro la Monilia nella fase dei bottoni rosa. ml 400-500/hl contro la Batteriosi con trattamenti durante il riposo vegetativo; per applicazioni in post-fioritura usare ml 60/hl per due trattamenti. Non trattare nelle tre settimane che precedono la raccolta nè usare dosaggi superiori. **Mandorlo** - ml 350/hl contro Corineo, Bolla e Monilia con interventi alla caduta delle foglie, all'ingrossamento delle gemme e subito prima della fioritura. Per interventi post-floral mantenere inalterata la dose. ml 300-400/hl contro Batteriosi (Pseudomonas) intervenendo prima della fase dei bottoni rosa.
Agrumi - ml 250-325/hl contro Mal secco, Allupatura, Melanosi, Fumaggine, Antracnosi e Scabbia del limone e dell'arancio. Intervenire prima e dopo la fioritura in funzione della gravità della malattia. **Olivo** - ml 250-350/hl contro Occhio di pavone, Fumaggine e Lebbra. Intervenire alla fine di Settembre - inizio Ottobre, dopo la raccolta ed eventualmente dopo la potatura. **Nocciolo** - ml 350/hl contro la Batteriosi (Xanthomonas corylina) con due trattamenti in Ottobre distanziati di circa 20-25 giorni uno dall'altro. **Noce** - ml 260/hl contro Antracnosi. Intervenendo in pre-fioritura; in caso di piogge frequenti sono necessarie applicazioni supplementari, in estate si consiglia di aggiungere ml 125/hl di olio minerale bianco. **Nespolo** - ml 200/hl contro la Ticchiolatura. **Cipresso** - ml 400/h contro il cancro (Corineum cardinale) intervenire in pieno inverno. **Patata** - ml 300-400/hl contro Peronospora e Alternaria. Iniziare i trattamenti quando le piante hanno raggiunto l'altezza di circa 15 cm proseguendoli in funzione dell'andamento climatico. **Pomodoro** - ml 300-400/hl contro Peronospora, Alternaria e Septoria. Intervenire ogni 10 giorni circa ed in funzione dell'andamento climatico. ml 400/hl contro le Batteriosi (Cancro o Avvizzimento, Maculatura e Picchiettatura) intervenire a intervalli regolari (10-15 giorni). Si consigliano combinazioni con Mancozeb solo fino alla prima fioritura. **Barbabietola da zucchero** - l 3/ha contro la Cercospora. Iniziare i trattamenti alla fine di Giugno inizio Luglio continuandoli ogni 20-25 giorni fino a 20 giorni dalla raccolta. **Fragola** - l 2/ha contro Vaiolatura. Iniziare a trattare quando le piante hanno attecchito proseguendo ogni settimana per tutta la stagione. Cessare le applicazioni ai primi eventuali segni di fitotossicità. **Fagiolo-pisello** - ml 200-260/hl contro Peronospora, Antracnosi e Ruggine. Intervenire quando si creano le condizioni per lo sviluppo delle malattie e proseguire secondo il caso. Questi interventi controllano pure le Batteriosi. **Cavoli-cavolfiori-cavoli di bruxelles-broccoli** - ml 130-160/hl contro Peronospora e Alternaria. ml 280/hl contro Batteriosi (Xanthomonas). Iniziare le applicazioni dopo il trapianto e dopo l'emergenza delle coltivazioni seminate a intervalli di 10-15 giorni in funzione delle condizioni climatiche. Alle dosi più alte potrebbero verificarsi, in alcune varietà, leggeri arrossamenti delle foglie vecchie dei broccoli e macchie sulle foglie esterne dei cavoli. **Carota** - ml 200-280/hl contro l'Alternaria. Iniziare le applicazioni al verificarsi delle condizioni per lo sviluppo della malattia. **Sedano e finocchio** - ml 200-280/hl contro Septoria, Cercospora e Peronospora. Trattare secondo l'andamento stagionale. **Melanzana** - ml 200/hl contro Alternaria, Peronospora, intervenire ogni 15 giorni circa; in tal modo si controlla pure la Phomopsis vexans. **Cetriolo** - ml 160-200/hl contro Peronospora, Antracnosi, Cladosporiosi e Batteriosi (Pseudomonas). Intervenire a cadenze fisse in funzione delle condizioni climatiche. **Melone-anguria** - ml 200/hl contro Peronospora, Antracnosi. Si consigliano interventi cadenzati in funzione delle condizioni climatiche. **Cipolla-aglio** - ml 230/hl contro Peronospora e Alternaria. Iniziare i trattamenti quando le piante hanno raggiunto l'altezza di circa cm 15. **Insalata-cardo-carciofo** - ml 160-200/hl contro Peronospora e Alternaria con trattamenti preventivi in funzione delle condizioni climatiche. **Riso** - l 4/ha contro le alghe verdi. Intervenire alla comparsa dell'attacco con un quantitativo di soluzione sufficiente per coprire l'intera superficie. **Rosa** - ml 200-250/hl contro Ticchiolatura, Peronospora e Ruggine. **Ciclamino** - ml 200/hl contro Antracnosi e Maculatura fogliare. Filodendro - ml 200/h contro le Batteriosi (Erwinia spp.) con applicazioni settimanali ad iniziare prima della comparsa della malattia.
COMPATIBILITA' - Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina. **AVVERTENZA** - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. **FITOTOSSICITA'** - Non si deve trattare durante la fioritura ad eccezione dei casi menzionati nel capitolo "MODALITA' D' IMPIEGO". Su pesco, nettarine, susino e alcune varietà di melo (Abbondanza Belford, BlackStayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta Del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C.Williams, Dott. Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibile il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la ripresa vegetativa. Ad eccezione della lotta contro le Batteriosi menzionate nel capitolo "MODALITA' D'IMPIEGO", in cui la fitotossicità può diventare un problema secondario.
RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto. **ATTENZIONE**: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

MANCOCIM 4-40

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER LA DIFESA DELLA VITE, POMODORO E TABACCO

MANCOCIM 4-40
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
CIMOXANIL puro g 4
MANCOZEB puro g 40
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO - Irritante per le vie respiratorie. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Non disperdere nell' ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI SRL - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / AGRINDUSTRIA S.R.L. – Via Cantarana n. 17 - San Cipriano Po (PV) Distribuito da: **ZAPI S.R.L.** - Via Marco Polo n. 2 - Mestrino (PD) - Tel. 049 9000855

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9119 del 29/01/1997 CONTENUTO: g 50-100-200-250-500 Kg 1-5- 10
Riferimento partita N.:

NORME DI SICUREZZA - Conservare questo prodotto ben chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. **Precauzioni particolari:** una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. - Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. - Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Mancozeb 40%Cimoxanil 4% le quali s eparatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
MANCOZEB - Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
CIMOXANIL - Derivato dall'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche: MANCOCIM 4-40 è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la Peronospora della vite del tabacco e del pomodoro. Sulla vite può essere usato per tutta la stagione e nella lotta contro l'Escoriosi. Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Può essere usato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione.
DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO
Peronospora della vite: usare g 200-300 di prodotto per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti quando i germogli raggiungono i 10 cm. di lunghezza e proseguirli fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
Peronospora del pomodoro: usare g 200-300 di prodotto per 100 litri d' acqua. La dose massima va usata in presenza di forti attacchi di Peronospora o in presenza di Alternaria. I trattamenti al pomodoro sono consentiti solo fino alla prima fioritura.
Peronospora del tabacco: usare g 300 di prodotto per 100 litri di acqua.
Preparazione della poltiglia: formare una pasta fluida sciogliendo la dose in poca acqua e portare a volume mantenendo la miscela in costante agitazione.

NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA' MANCOCIM 4 40 è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare in associazione a prodotti con reazione alcalina.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza piùlungo. Dev ono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piùtossici . Qualora di verificassero casi di intossicazione i nformare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA' - Durante il trattamento si consiglia di tenere lontani gli animali domestici ed il bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere il trattamento 28 giorni prima del raccolto
ATTENZIONE da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

MANCOCIM 4-40

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER LA DIFESA DELLA VITE, POMODORO E TABACCO

MANCOCIM 4-40
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:

CIMOXANIL puro	g	4
MANCOZEB puro	g	40
Coformulanti q.b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO - Irritante per le vie respiratorie. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Distribuito da: **ZAPI S.R.L.** - Via Marco Polo n. 2 - Mestrino (PD) - Tel. 049 9000855
Registrazione del Ministero della Sanità n. 9119 del 29/01/1997

CONTENUTO: g 50-100

Riferimento partita N.:

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "
oppure:
" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

MANEB GIARDINO

FUNGICIDA PER TRATTAMENTI DELLE PIANTE ORNAMENTALI
E DEI FIORI DA BALCONE, DA APPARTAMENTO E DA GIARDINO DOMESTICO
TIPO DI FORMULAZIONE: POLVERE BAGNABILE

MANEB GIARDINO
COMPOSIZIONE – 100 g di prodotto contengono:
MANEB puro g 35
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO - Irritante per le vie respiratorie.
- Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. – Usare indumenti protettivi e guanti adatti. – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 10790 del 11/04/2001
Riferimento partita: Contenuto: g 10-20-30-40-50-100

NORME PRECAUZIONALI – Se il prodotto è applicato in ambiente chiuso, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. – Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.
INFORMAZIONI MEDICHE - Sintomi - cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme. Sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il MANEB GIARDINO si impiega sciogliendo 2-3 grammi di prodotto, pari ad apposito misurino dosatore pieno, in un litro di acqua contro:
ruggine, alternaria, septoria, ticchiolatura, peronospora delle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico.
Intervenire sulle piante da proteggere al primo insorgere della malattia, inizio primavera, ripetendo il trattamento ogni 10 giorni.
Per l'irrorazione del prodotto si consiglia di utilizzare una comune pompetta spruzzatrice (1 litro).

- da non impiegare in agricoltura
- da non impiegare su colture destinate all'alimentazione
- chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio.
- il rispetto delle istruzioni è condizione fondamentale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - NON OPERARE CONTRO VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

"DA APPORSI SUL CONTENITORE PER L'IRRORAZIONE DEL PRODOTTO DILUITO"

MANEB GIARDINO

FUNGICIDA PER TRATTAMENTI DELLE PIANTE ORNAMENTALI
E DEI FIORI DA BALCONE, DA APPARTAMENTO E DA GIARDINO DOMESTICO
TIPO DI FORMULAZIONE: POLVERE BAGNABILE

MANEB GIARDINO
COMPOSIZIONE – 100 g di prodotto contengono:
MANEB puro g 35
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO - Irritante per le vie respiratorie.
- Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, né bere, nèumare durante l'impiego. – Usare indumenti protettivi e guanti adatti. – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) Tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10790 del 11/04/2001
Riferimento partita: Contenuto: g 10-20-30-40-50-100

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULL'ETICHETTA "

METACID

ESCA LUMACHICIDA PRONTA PER L'USO

COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono
METALDEIDE pura g 5
Coformulanti q. b. a 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa, lontano dal fuoco e dalle fonti di calore. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica uomo, circa 50 mg/Kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
E' un'esca lumachicida che agisce per contatto e per ingestione. Da spargere su terreni coltivati a colture floreali ed ornamentali.
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Per leggere e medie infestazioni: Kg 6-10 per ettaro.
Per forti infestazioni (40-50 individui per m2): Kg 15 per ettaro.
E' consigliabile spargere il prodotto lungo il perimetro del campo su una striscia larga circa m 1,50.
Internamente a questa striscia il prodotto si sparge più rado.

COMPATIBILITA' - Il prodotto si sparge da solo.
RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il pesce ed il bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere il trattamento 20 giorni prima dalla raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TERRANALISI S.R.L. – Via Nino Bixio N. 6 – Cento (FE) Tel. 051 6836207

Stabilimento di produzione:
- L.I.F.A. S.P.A. - Via Piave (Zona industriale) - Isola Vicentina (VI)
- L.I.F.A. S.P.A. - Via C. Colombo n. 7/7º Vigono vo (VE)
- VE.BI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. - Via Desman n. 43 – Borgoricco (PD)
- BAM DI BENAZZI &UTTINI S.N.C. - Via Nuova Selice n. 20 - San Patrizio di Conselice (RA)
- Confezionamento: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6955 del 28/01/1987 CONTENUTO: g 200-500 Kg 1-5

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Riferimento partita N.:

METOM L

INSETTICIDA - LIQUIDO SOLUBILE

METOM L
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
METOMIL puro g 18,4 (g/l 195)
Coformulanti q. b. a 100

N

MOLTO TOSSICO

Pericoloso per l'ambiente

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290 del 23/04/2001.
FRASI DI RISCHIO - Molto tossico per ingestione. - Irritante per gli occhi e la pelle. - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non gettare i residui nelle fognature. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via IV Novembre n.19/1 - Renazzo di Cento (FE) / ARAGONESAS AGRO, S.A. - Paseo de Recoletos 27,4° 28004 Madrid - Sp ain / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. - Beer – Sheva - (Is rael) / SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164 - Modena
Registrazione del Ministero della Sanità n. 7136 del 24/06/1987
Riferimento partita N. CONTENUTO: ℓ 1-5

NORME PRECAUZIONALI - Conservare il recipiente ben chiuso. - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo, vomito, diarrea; bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: Atropina. Controindicazioni: Ossime.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE - METOM L è un insetticida che agisce in modo sistemico per contatto ed ingestione; possiede un forte potere abbattente con rapido ed esteso controllo degli attacchi degli insetti, possiede inoltre una limitata azione residua che ne permette l'impiego a breve distanza dalla raccolta.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

colture	parassiti	dosi/hl di acqua
MELO - PERO	afidi, larve 1°stadio di lithocolletis e leucoptera, le larve dei ricamatori quali pandemis, eulia, archips, carpocapsa pomonella, capua reticulana, cacoecia padana, orgya antigua	ml 200-250
DRUPACEE (pesco, susino, ciliegio, albicocco) e MANDORLO	cydia molesta, diaspis pentagona, tignola, afidi, anarsia	ml 200
VITE DA VINO - VITE DA TAVOLA (dose massima: g 400 s.a./ha, numero massimo di applicazioni: 2)	tignola, tignoletta, afidi	ml 200-250
OLIVO - AGRUMI	cocciniglia mezzograno di pepe (saissetia oleae) e le cocciniglie in genere	ml 200-250
POMODORO – MELANZANA - PEPERONE	nottue, aleurodidi, cavolaia, afidi	ml 200
CUCURBITACEE	afidi, nottue, aleurodidi	ml 200
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	afidi, cleono, nottue, altica	ℓ 2,5/ha in 750-1000 ℓ d'acqua
CAVOLI BROCCOLI, CAVOLI DI BRUXELLES, CAVOLO BIANCO, CAVOLO ROSSO, CAVOLO VERZA, CAVOLI A FOGLIA - LATTUGA	nottue, cavolaie, afidi	ml 200
FAGIOLO – PISELLO	larve di lepidotteri	ml 200
TABACCO – ORNAMENTALI E FLOREALI (solo in pieno campo)	nottue, tortricidi, afidi, tripidi e le larve di lepidotteri	ml 200-250
PIOPPO	afidi e lepidotteri	ml 400-600

COMPATIBILITA' - Il METOM L non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti prima della raccolta 14 giorni su lattuga – su vite da tavola 30 giorni - 10 giorni su tutte le altre colture
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

METIOL

ESCA GRANULARE INSETTICIDA-LUMACHICIDA A BASE DI METIOCARB

COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono
METIOCARB puro g 1
Coformulanti q. b. a 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO - Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - **Sintomi:** inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo, vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina. Controindicazione: ossime. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
METIOL è un insetticida - lumachicida a base di Metiocarb che agisce sugli insetti per contatto ed ingestione ed esercita azione contro: lumache, limacce, nottue, maggiolino, grillotalpa, chiocciole, tipule, blaniuli, zabro gobbo, agrotidi e grilli.
Viene impiegato sulle seguenti colture:
drupacee - pomacee - fragola - vite - cavoli - asparago - lattuga e simili - cucurbitacee - solanacee - fagiolo - pisello - fagiolino - carota - ravanello - patata - barbabietola da zucchero - erba medica - trifoglio - tabacco - floreali - ornamentali - forestali.
La dose d'impiego del METIOL è di Kg 6-10 per ettaro a seconda della gravità dell'attacco, si distribuisce il prodotto nel modo più uniforme possibile, solo sul terreno sottostante la coltura e preferibilmente al mattino o alla sera. Per evitare le infestazioni dall'esterno si deve distribuire il prodotto in quantità abbondante lungo i bordi dell'appezzamento per circa una striscia larga 1 - 2 metri.

COMPATIBILITÀ: il prodotto deve essere impiegato da solo.
INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro impiego è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

TERRANALISI S.R.L. – Via Nino Bixio N. 6 – Cento (FE) Tel. 051 6836207

Distribuito da: VE.BI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. - Via Desman n. 43 - Borgoricco (PD)

Stabilimento di produzione:
- L.I.F.A. S.R.L. - Via Piave (Zona industriale) - Isola Vicentina (VI)
- L.I.F.A. S.R.L. - Via C. Colombo n. 7/7A - Vigonovo (VE)
- VE.BI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. - Via Desman n. 43 – Borgoricco (PD)
- ZAPI Industrie Chimiche S.P.A. - Z.I. III Strada n. 12 - Conselve (PD)
- Confezionamento: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9774 del 01/10/1998 CONTENUTO: Kg 1-5

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Riferimento partita N.:

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

METIOL

ESCA GRANULARE INSETTICIDA-LUMACHICIDA A BASE DI METIOCARB

COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono
METIOCARB puro g 1
Coformulanti q. b. a 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO - Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L. – Via Nino Bixio N. 6 – Cento (FE) Tel. 051 6836207

Distribuito da: VE.BI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. - Via Desman n. 43 - Borgoricco (PD)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9774 del 01/10/1998 CONTENUTO: g 100

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "
oppure:
" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

Riferimento partita N.:

METOM VERDE

INSETTICIDA - LIQUIDO SOLUBILE
PER INIEZIONI AL TRONCO SU PIANTE NON EDULI

METOM VERDE
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
METOMIL puro g 18 (g/l 173)
Coformulanti q. b. a 100
Contiene N-Metil-2-Pirrolidone

MOLTO TOSSICO

Pericoloso per l'ambiente

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290 del 23/04/2001.
FRASI DI RISCHIO - Molto tossico per ingestione. - Irritante per gli occhi e la pelle. - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non gettare i residui nelle fognature. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via IV Novembre n.19/1 - Renazzo di Cento (FE) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164 - Modena
Registrazione del Ministero della Sanità n. 10222 del 09/12/1999
Riferimento partita N. CONTENUTO: ℓ 1-5-10

NORME PRECAUZIONALI - Conservare il recipiente ben chiuso. - **INFORMAZIONI PER IL MEDICO** - **Sintomi:** inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorea e broncorrea con broncospasmo, vomito, diarrea; bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: Atropina. Controindicazioni: Ossime.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE - METOM VERDE può essere utilizzato su alberature ad alto fusto su piante non eduli: latifoglie e conifere ad alto fusto mediante iniezioni al tronco.
Su latifoglie contro: limantria, litocollete, ifantria, tentredini, scolitidi, coccinigile, saperda, cossus, zeuzera, afidi, sesia, galerucella, criptorrinco, tingide del platano (Corythucha ciliata), fillossera del leccio (Phylloxera quercus).
Su conifere contro: scolitidi, coccinigile, afidi, Mascalina ellenica, Processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), Blastophagus piniperda.
DOSI - EPOCHE - MODALITA' D'IMPIEGO - L'iniezione avviene introducendo la dose del prodotto calcolata mediante la tabella di utilizzo sotto riportata, nell'apposito iniettore predisposto per l'applicazione.

TABELLA DI UTILIZZO

specie	dose: formulato per cm di circonferenza del tronco	pressione esercitata in BAR	diametro foro iniezione mm	numero fori per cm di circonferenza
LATIFOGLIE	da 58 a 200 ml/litro	da 3 a 10	6	entro i primi 40 cm di circonferenza due fori, uno ogni 40cm
CONIFERE	da 58 a 200 ml/tal quale	pressione ambiente o infusione	6-8-10-12	entro i primi 40 cm di circonferenza due fori, uno ogni 40cm (i primi quattro fori su di un piano i successivi su di un piano diverso e praticati in diagonale).

L'applicazione deve essere effettuata da personale specializzato nella tecnica. Si consiglia di effettuare il trattamento sia preventivo che curativo. Una sola iniezione, di norma, consente il controllo del parassita per uno o più anni.

COMPATIBILITA'
Per le iniezioni al tronco il prodotto deve essere utilizzato da solo.
"Durante la preparazione, l'impiego e la pulizia delle attrezzature, usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi." "Richiudere con mastice inerte ed atossico i fori effettuati." "Durante le fasi di preparazione ed applicazione transennare l'area onde impedire l'accesso a personale estraneo." "Durante le fasi di preparazione ed applicazione utilizzare bacinetti di contenimento posizionati sotto i contenitori/serbatoi atti a contenere spandimenti accidentali."
Avvertenza - Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame, se vengono a contatto. Tossico per le api.
INTERVALLO DI SICUREZZA: =
"**Attenzione** da impiegare esclusivamente per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso". "Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato". "Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali".

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - NON OPERARE CONTRO VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

MICOZEB 45

ANTICRITTOGAMICO – POLVERE BAGNABILE

MICOZEB 45
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
MANCOZEB puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / SCAM S.R.L. – Via Bellaria n. 164 – Modena / S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. - Via E. Torricelli n. 2 - Cotignola (RA) / SULPHUR MILLS LIMITED, 1904-1905 G.I.D.C. Panoli, Dist. Bharuch, Gujarat (India)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 1187 del 06/04/1973
Riferimento partita N.: CONTENUTO: Kg 5-10-25

IRRITANTE

NORME PRECAUZIONALI - Conservare il recipiente ben chiuso. - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI - Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. - Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore. - Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - **Sintomi:** cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni

Anticrittogamico agricolo per la lotta contro le principali malattie del melo, pero, vite e garofano in pieno campo.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
MICOZEB 45 si impiega alle seguenti dosi per 100 litri di acqua:
VITE - contro la peronospora g 200-250
MELO, PERO - contro la ticchiolatura g 150-200
GAROFANO in pieno campo - contro ruggine g 150-200.
Stemperare il prodotto in poca acqua e sotto agitazione, portare al volume desiderato con acqua.

- NON IMPIEGARE IN SERRA
- NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA' - MICOZEB 45 è miscibile con i più comuni fitosanitari, eccetto quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese) e Olii bianchi. **AVVERTENZA** - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Varietà di pere sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana Del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona D'Estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

MICOZEB L 30

ANTICRITTOGAMICO AGRICOLO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA PER LA LOTTA CONTRO LE PRINCIPALI MALATTIE DEL MELO, PERO, VITE E GAROFANO IN PIENO CAMPO

MICOZEB L 30
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
MANCOZEB puro g 27 (g/l 330)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO - Irritante per le vie respiratorie. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
– Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
- Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / LIFA S.R.L. – Via Piave (Zona industriale) - Isola Vicentina (VI) / LIFA S.R.L. – Via C. Colombo n. 7/7A - Vigonovo (VE) / SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164 - Modena

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8216 del 16/03/1993
CONTENUTO: ml 100-250-500 ℓ 1-5-10-20
Riferimento partita N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparto respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcol e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
MICOZEB L 30 si impiega alle seguenti dosi per 100 litri di acqua:
VITE - contro la peronospora ml 400-500
MELO - contro la ticchiolatura ml 400-500
PERO - contro ticchiolatura e maculatura bruna ml 400-500
GAROFANO in pieno campo - contro ruggine ml 300-400.

Stemperare il prodotto in poca acqua e sotto agitazione, portare al volume desiderato con acqua.

- NON IMPIEGARE IN SERRA
- NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA' - MICOZEB L 30 è miscelabile con i più comuni fitosanitari, eccetto quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese) e Olii bianchi.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - varietà di pere sensibili al Mancozeb:
Abate Fetel, Armella, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana Del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona D'Estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

MICOZEB L 30

ANTICRITTOGAMICO AGRICOLO IN SOSPENSIONE
CONCENTRATA PER LA LOTTA CONTRO LE
PRINCIPALI MALATTIE DEL
MELO, PERO, VITE E GAROFANO IN PIENO CAMPO

MICOZEB L 30
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
MANCOZEB puro g 27 (g/l 330)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO - Irritante per le vie respiratorie. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
– Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8216 del 16/03/1993
CONTENUTO: ml 100
Riferimento partita N.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO"
oppure:
"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA"

MIRANDA VERDE

BAGNANTE A SCHIUMA LABILE PER USO AGRICOLO

COMPOSIZIONE: g 100 di prodotto contengono
DIOTTIL SOLFOSUCCINATO DI SODIO puro g 10 (g/l 100)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel 051 6836207

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 – Cento (FE) / TERRANALISI S.R.L. – Via IV Novembre n. 19/1 – Renazzo di Cento (FE) / VE.BI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. - Via Desman n. 43 – Borgoricco (PD)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 1683 del 24/10/1974

CONTENUTO: ℓ 1-3-5-10-20
Riferimento partita N.:

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. -- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il bagnante MIRANDA VERDE è una soluzione di sostanza tensioattiva a basso potere schiumogeno, che evita la formazione di gocciole separate di liquido antiparassitario su foglie e frutti, perchè conferisce alle irrorazioni la proprietà di diffondersi in velo liquido, non interrotto e bene aderente, anche su superfici cerose e tegumentose.
Per ogni 100 litri di irrorazione si impiegano da ml 30 fino a ml 50 di MIRANDA VERDE, regolandosi a seconda che i vegetali da trattare sono più o meno facilmente bagnabili.
La dose in casi particolarmente difficili può essere aumentata, ma si cerchi di evitare un eccesso di bagnante che è sempre poco vantaggioso.
MIRANDA VERDE va addizionato nel liquido per irrorazione preferibilmente prima degli antiparassitari perchè così facilita la loro dispersione.

COMPATIBILITA' - Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

MITO

FUNGICIDA ORGANICO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA
AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA

MITO
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
TIOFANATO METILE puro g 38,3 (g/l 450)
Coformulanti q. b. a 100

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per inalazione. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Possibilità di effetti irreversibili. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. - Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / CHIMAC-AGRIPHAR S.A. - Rue de Renory n. 26 - B-4102 Ougree - Belgium / DIACHEM S.P.A. - Unità produttiva SIFA - S.S. Padana Superiore - Caravaggio (BG) / SCAM S.R.L - Via Bellaria n. 164 - Modena
Confezionamento: ALTHALLER ITALIA S.R.L. - Strada Comunale per Campagna n. 5 - San Colombano al Lambro (MI)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 8627 del 23/12/1994
CONTENUTO: ml 100-200-250-500 ℓ 1-5
Riferimento partita n.:

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antive

MODALITA' D'IMPIEGO - Fungicida organico in sospensione concentrata, ad azione preventiva e curativa che viene impiegato sulle seguenti colture:
PESCO, ALBICOCCO, SUSINO:
contro la Monilia, l'Oidio e la Ticchiolatura alla dose di ml 80 90/hl;
- contro il Fusicoccum e la Citospora alla dose di ml 100-120/hl.
VITE - contro la Muffa grigia e l'Oidio alla dose di ml 100/hl, trattando a fine fioritura, prima della chiusura del grappolo e successivamente ad intervalli di 3 settimane circa sino a 2-3 settimane dalla vendemmia.
MELO, PERO:
- contro la Ticchiolatura e l'Oidio a ml 100-140/hl fino ai primi trattamenti post-fiorali e ml 70-85/hl nelle applicazioni successive;
- contro la Ticchiolatura tardiva in pre-raccolta a ml 85-100/hl;
- contro Gloeosporium trattamenti di post-raccolta per aspersione o immersione a ml 105-210/hl. "I trattamenti dovranno essere effettuati, per non più di 30 secondi, in ambienti appositamente attrezzati per le operazioni meccanizzate, che escludano l'intervento diretto dell'operatore e che consentono l'immagazinamento con frigo-conservazione. La soluzione eccedente ai trattamenti dovrà essere prelevata da ditte specializzate per la sua depurazione (fisica o microbiologica)". L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 283/1962. Le mele e le pere trattate possono essere messe in commercio dopo almeno 15 giorni dal trattamento.
FRUMENTO - contro le Malattie del piede a litri 1-1,2 per ettaro, durante la fase dell'accestimento o in levata.
GAROFANO - contro la Fusariosi, la Verticilliosi e la Fialofora a ml 2-3/mq sciolto in 10 litri di acqua; trattare in modo preventivo e ripetendo i trattamenti.
FIORI, PIANTE ORNAMENTALI - contro la Muffa grigia, l'Oidio e la Septoria a ml 85-100/hl.
GLADIOLO, TULIPANO, BULBOSE - contro i Marciumi da Fusarium, Penicilium, Sclerotinia, Botrytis alla dose di litri 1-1,4/hl per immersione dei bulbi prima dell'impianto.
NOCCIOLO - contro Gleosporium delle gemme a ml 125 con 1-2 interventi ad intervallo di 20-25 giorni, trattando in autunno all'inizio della caduta delle foglie.
CIPRESSO, PLATANO - contro Cancro o Corineo del cipresso a ml 125 per q.le acqua intervenendo in autunno e primavera con 2-3 trattamenti.

COMPATIBILITA' – Per una buona miscelazione procedere stemperando in acqua il prodotto e poi versare nell'irroratrice (sotto agitazione) piena a metà, poi aggiungere un bagnante adesivo. Non è compatibile con sostanze alcaline.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA' – Il prodotto contiene una sostanza attiva che può avere effetti negativi su acari fitoseidi.
"Attenzione, il prodotto tal quale contiene sostanza altamente tossica per gli organismi acquatici."
SU COLTURE ORNAMENTALI E FLOREALI SONO CONSENTITE SOLO APPLICAZIONI IN PIENO CAMPO
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere il trattamento 30 giorni prima della raccolta del frumento e 15 sulle altre colture.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

MITO

FUNGICIDA ORGANICO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA
AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA

MITO
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
TIOFANATO METILE puro g 38,3 (g/l 450)
Coformulanti q. b. a 100

NOCIVO **Pericoloso per l'ambiente**

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per inalazione - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Possibilità di effetti irreversibili. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. - Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Registrazione del Ministero della Sanità n. 8627 del 23/12/1994
CONTENUTO: ml 100
Riferimento partita n.:

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO"
oppure:
"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA"

MITRON L

DISERBANTE SELETTIVO PER
BARBABIETOLE DA ZUCCHERO
IN FORMULAZIONE LIQUIDA AUTOSOSPENSIBILE

MITRON L
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
METAMITRON puro g 45 (g/l 500)
Coformulanti q. b. a 100

NOCIVO **Pericoloso per l'ambiente**

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per ingestione.
- Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI SRL - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 6597 del 25/01/1986
Riferimento partita n.: CONTENUTO: ℓ 1-5-10-20

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE
Diserbante selettivo per la barbabietola da zucchero contro le principali infestanti quali: chenopodium album, amaranthus sp., solanum nigrum, polygonum sp., matricaria sp., veronica sp., stachis annua, diplotaxis sp., poa annua.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Barbabietole da zucchero a semina primaverile:
a) In autunno-inverno: litri 6-8/ha in 600 litri di acqua avendo cura di eliminare le eventuali infestanti già presenti.
b) A fine inverno in pre-semina: litri 6-8/ha in 600 litri di acqua provvedendo all'interramento - Si usa la dose maggiore nei terreni più pesanti.
c) In primavera in post-emergenza: litri 6/ha in miscela con litri 4 di Betafil nella fase che va dalle 2e alle 4e foglie vere.

COMPATIBILITA' - Il prodotto può essere miscelato in caso di necessità col Betafil
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Effettuare solo le miscele consigliate: evitare di irrorare colture adiacenti. A lavoro ultimato lavare accuratamente le pompe e i recipienti usati prima di utilizzarli per altri antiparassitari.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto
ATTENZIONE da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

OLEOTER

(OLIO BIANCO EMULSIONATO AL 95-96% DI R.I.)
INSETTICIDA AGRICOLO SPECIFICO PER LA LOTTA CONTRO LE COCCINIGLIE IN FRUTTICOLTURA, AGRUMICOLTURA E FLORICOLTURA

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono
OLIO BIANCO PARAFFINICO al 95-96% di R.I. g 80 (g/l 688)
Emulsionanti, tensioattivi e acqua q. b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel 051 6836207

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via IV Novembre n. 19/1 - Renazzo di Cento (FE) / L.I.F.A. S.R.L. - Via Piave (Zona Industriale) - Isola Vicentina (VI) / L.I.F.A. S.R.L. - Via C. Colombo n. 7/7° Vigonovo (VE) / V E.BI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. - Via Desman n. 43 – Borgoricco (PD)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 3102 del 25/05/1979
CONTENUTO: ml 200-250-500 ℓ 1-5-10-20-25
Riferimento partita N.:

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
OLEOTER si usa su:
POMACEE E DRUPACEE contro cocciniglie, alla dose di litri 1,5-2 per 100 litri di acqua a fine inverno e alla dose di litri 0,5-1 in primavera-estate.
Sugli AGRUMI si impiega nel periodo che va dopo la raccolta dei frutti alla fioritura alla dose di litri 1,5-2,5 contro la cocciniglia cotonosa e le altre cocciniglie.
Sulle PIANTE ORNAMENTALI la dose va da litri 0,5 a litri 1 per ettolitro contro le cocciniglie in genere.

COMPATIBILITA' - Il prodotto è miscibile con tutti i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (Poltiglia bordolese e Polisolfuri).
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA – NON OPERARE CONTRO VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

OLEOTER ESTATE

OLIO MINERALE ESTIVO ALTAMENTE RAFFINATO
INSETTICIDA - LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono
OLIO MINERALE RAFFINATO g 85 (g/l 870)
Coformulanti q. b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel 051 6836207

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via IV Novembre n. 19/1 - Renazzo di Cento (FE) / VE.BI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. - Via Desman n. 43 – Borgoricco (PD)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 3082 del 04/05/1979

CONTENUTO: ml 100-200-250-500 ℓ 1-5-10-20-25-50-200*

Riferimento partita N.:

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO – In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se ingerito non indurre vomito, chiamare immediatamente il medico.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
OLEOTER ESTATE è un olio insetticida liquido emulsionabile che agisce per contatto contro le uova e le forme adulte degli insetti, ricoprendone il corpo con una leggera pellicola ed occludendo i condotti tracheali e causandone la morte per asfissia ed agendo anche come repellente contro alcuni insetti masticatori.
Per il suo alto grado di raffinazione (elevato residuo insolfonabile e ristretto intervallo di distillazione) e la conseguente ridotta fitotossicità, OLEOTER ESTATE può essere impiegato anche in piena vegetazione oltre che nelle applicazioni invernali. L'elevata stabilità della emulsione garantisce l'uniforme distribuzione.
Viene impiegato sulle seguenti colture:
ORTAGGI (carciofo, sedano, finocchio, cucurbitacee, pomodoro, peperone, fagiolo) - AGRUMI - POMACEE (melo, pero, cotogno) - DRUPACEE – RIBES – FICO – CACO - MANDORLO - OLIVO - VITE – NOCE – NOCCIOLO -PATATA - BARBABIETOLA DA ZUCCHERO – MAIS - PIANTE ORNAMENTALI, FLOREALI, FORESTALI, contro i seguenti parassiti: Cocciniglie, Afidi, Psilla, Tignole, uova di Lepidotteri, Acari, Eriofidi, Cicaline, Metcalfa, Tripidi, Cotonello, Minatori fogliari, Cimice verde, Aleurodidi, Iceria, Mosca bianca, Coleotteri, Ditteri minatori, Lepidotteri, uova di Dorifora, Psille, Tingidi, Cleono, Lisso, Altica, Pegonia betae, Casside, Atomaria, Piralide, Nottue alla dose di litri 0,5 – 2 per ettolitro per trattamenti in vegetazione e litri 2 - 3 per trattamenti invernali.

COMPATIBILITA' - OLEOTER ESTATE non è compatibile con formulati a base di zolfo (compresi i polisolfuri) i cui trattamenti devono essere distanziati di almeno 2 settimane. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo e, inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Non applicare quando la temperatura è inferiore a 5°C e superiore a 30°C, quando ci sia rischio di pioggia o quando è attesa una umidità superiore al 90% nelle successive 36-48 ore. Irrorare su foglie asciutte. Non applicare quando la coltura si trova in uno stato di stress idrico; annaffiare prima dell'irrorazione. Durante la stagione estiva è conveniente distanziare i trattamenti ad intervalli di almeno 2 settimane. Non applicare in fioritura. Per le piante ornamentali, floreali e forestali, dato il gran numero di specie e varietà, si consigliano saggi preliminari; in ogni caso si sconsigliano le applicazioni su acero (particolarmente quello rosso), le felci, le conifere (in particolare quelle grigio-bluastre – es. Picea Pungens Glauca" – che potrebbero perdere irreversi bilmente la loro caratteristica colorazione). In piena vegetazione si sconsiglia l'impiego sulla varietà di pero Anjou e di melo Newton.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Per la confezione contrassegnata da *:
LO STOCCAGGIO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE DEL CONTENITORE DEVE ESSERE EFFETTUATO IN ZONA DOTATA DI BACINO DI CONTENIMENTO DI ADEGUATO VOLUME ATTO A RACCOGLIERE EVENTUALI FUORIUSCITE ACCIDENTALI DEL PRODOTTO." " **ATTENZIONE:** CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO."

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

OLEOTER ESTATE

OLIO MINERALE ESTIVO ALTAMENTE RAFFINATO
INSETTICIDA - LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono
OLIO MINERALE RAFFINATO g 85 (g/l 870)
Coformulanti q. b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel 051 6836207

Registrazione del Ministero della Sanità n. 3082 del 04/05/1979

CONTENUTO: ml 100

Riferimento partita N.:

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO"
oppure:
"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA"

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

OLIO OGNISTAGIONE

OLIO MINERALE ESTIVO ALTAMENTE RAFFINATO
INSETTICIDA - LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono
OLIO MINERALE RAFFINATO g 85 (g/l 870)
Coformulanti q. b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel 051 6836207

Distribuito da: VE.BI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. - Borgoricco (PD)

Stabilimento di produzione: VE.BI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. - Via Desman n. 43 – Borgoricco (PD)

Registrazione del Ministero della Salute n. 11704 del 17/07/2003

CONTENUTO: ml 100-200-250-500 ℓ 1-5-10-20-25-50-200*

Riferimento partita N.:

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO – In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se ingerito non indurre vomito, chiamare immediatamente il medico.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
OLIO OGNISTAGIONE è un olio insetticida liquido emulsionabile che agisce per contatto contro le uova e le forme adulte degli insetti, ricoprendone il corpo con una leggera pellicola ed occludendo i condotti tracheali e causandone la morte per asfissia ed agendo anche come repellente contro alcuni insetti masticatori.
Per il suo alto grado di raffinazione (elevato residuo insolfonabile e ristretto intervallo di distillazione) e la conseguente ridotta fitotossicità, OLIO OGNISTAGIONE può essere impiegato anche in piena vegetazione oltre che nelle applicazioni invernali. L'elevata stabilità della emulsione garantisce l'uniforme distribuzione.
Viene impiegato sulle seguenti colture:
ORTAGGI (carciofo, sedano, finocchio, cucurbitacee, pomodoro, peperone, fagiolo) - AGRUMI - POMACEE (melo, pero, cotogno) - DRUPACEE – RIBES – FICO – CACO - MANDORLO - OLIVO - VITE – NOCE – NOCCIOLO - PATATA - BARBABIETOLA DA ZUCCHERO – MAIS - PIANTE ORNAMENTALI, FLOREALI, FORESTALI, contro i seguenti parassiti: Cocciniglie, Afidi, Psilla, Tignole, uova di Lepidotteri, Acari, Eriofidi, Cicaline, Metcalfa, Tripidi, Cotonello, Minatori fogliari, Cimice verde, Aleurodidi, Iceria, Mosca bianca, Coleotteri, Ditteri minatori, Lepidotteri, uova di Dorifora, Psille, Tingidi, Cleono, Lisso, Altica, Pegonia betae, Casside, Atomaria, Piralide, Nottue alla dose di litri 0,5 – 2 per ettolitro per trattamenti in vegetazione e litri 2 - 3 per trattamenti invernali.

COMPATIBILITA' - OLIO OGNISTAGIONE non è compatibile con formulati a base di zolfo (compresi i polisolfuri) i cui trattamenti devono essere distanziati di almeno 2 settimane. **AVVERTENZA**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo e, inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Non applicare quando la temperatura è inferiore a 5°C e superiore a 30°C, quando ci sia rischio di pioggia o quando è attesa una umidità superiore al 90% nelle successive 36-48 ore. Irrorare su foglie asciutte. Non applicare quando la coltura si trova in uno stato di stress idrico; annaffiare prima dell'irrorazione. Durante la stagione estiva è conveniente distanziare i trattamenti ad intervalli di almeno 2 settimane. Non applicare in fioritura. Per le piante ornamentali, floreali e forestali, dato il gran numero di specie e varietà, si consigliano saggi preliminari; in ogni caso si sconsigliano le applicazioni su acero (particolarmente quello rosso), le felci, le conifere (in particolare quelle grigio-bluastre – es. Picea Pungens "Glauca" – che potrebbero perdere irreversibilmente la loro caratteristica colorazione). In piena vegetazione si sconsiglia l'impiego sulla varietà di pero Anjou e di melo Newtown.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Per la confezione contrassegnata da *:
"LO STOCCAGGIO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE DEL CONTENITORE DEVE ESSERE EFFETTUATO IN ZONA DOTATA DI BACINO DI CONTENIMENTO DI ADEGUATO VOLUME ATTO A RACCOGLIERE EVENTUALI FUORIUSCITE ACCIDENTALI DEL PRODOTTO." "**ATTENZIONE:** CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO."

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

OLIO OGNISTAGIONE

OLIO MINERALE ESTIVO ALTAMENTE RAFFINATO
INSETTICIDA - LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono
OLIO MINERALE RAFFINATO g 85 (g/l 870)
Coformulanti q. b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel 051 6836207

Distribuito da: VE.BI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. - Borgoricco (PD)

Registrazione del Ministero della Salute n. 11704 del 17/07/2003

CONTENUTO: ml 100

Riferimento partita N.:

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO"
oppure:
"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA"

PANTOX 360

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA
TIPO DI OFRMULAZIONE: LIQUIDA

PANTOX 360
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
GLIFOSATE acido puro g 30,4 * (g/l 360)
Coformulanti q. b. a 100
* Il contenuto di p.a. acido equivalente corrispondente a 360 g/l pari a g 41 di p.a. sale isopropilamminico per g 100 di prodotto

FRASI DI RISCHIO - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / VE.BI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. - Via Desman n. 43 – Borgoricco (PD)

Registrazione del Ministero della Sanità: n. 9675 del 07/07/1998
CONTENUTO: ml 100-200-250-500 ℓ 1-5-10-20-25-50
Riferimento partita n.:

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni

CAMPI E DOSI D' IMPIEGO
PANTOX 360 è un diserbante sistemico che trova impiego in post-emergenza, agisce per assorbimento fogliare e viene traslocato sino alle radici e agli organi di propagazione. Dopo alcuni giorni si ha ingiallimento ed arrossamento delle infestanti e successivo disseccamento. Il trattamento si effettua su infestanti in attiva crescita e che non siano sofferenti per qualsiasi causa (siccità, freddo, parassiti ecc.). Viene impiegato per il diserbo di:
AGRUMI (arancio, mandarino, clementino, limone, cedro, pompelmo); POMACEE (melo e pero); NOCE, OLIVO, VITE; DRUPACEE (albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino); CARCIOFO, POMODORO, MELANZANA, FAGIOLINO, FAVA, PISELLO, CAROTA, PATATA, MAIS (solo interfila), SOIA, ERBA MEDICA, PRATI, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, ROSA, VIVAI E SEMENZAI DI FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI E PIOPPO, ASPARAGO (prima dell'emergenza);
SU TERRENI IN ASSENZA DI COLTURE e destinati alla coltivazione di: fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segala, avena, mais, riso, soia, prati, vivai con trattamenti prima della semina e trattando con malerbe emerse ed effettuando il trapianto o la semina non prima di 48 ore;
AREE NON DESTINATE ALLA COLTIVAZIONE (sedi ferroviarie, argini di canali, fossi, scoline, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili). Non spruzzare le parti legnose e verdi in quanto il prodotto non è selettivo;
impiegare 2-3 q.li di acqua per ettaro con le seguenti dosi:
- **Infestanti annuali e biennali:** veronica sp., stellaria sp., sinapis sp., senecio sp., riso crodo, raphanus sp., portulaca sp., poa sp., orobanche sp., mercurialis sp., lolium sp., chenopodium sp., calendula sp., avena sp., amaranthus sp., alopecurus spp., alla dose di litri 1,5-3,5 per ettaro.
- **Infestanti perenni ed arbustive quali**: agropyron repens, car x sp., cirsium sp., euphorbia sp., glyceria sp., hipericum sp., laersia oryzoides, phalaris sp., rumex sp., sonchus sp., sorghum halepense, alisma sp., butomus sp., cyperus sp., ferula sp., juncus sp., nardus sp., scirpus sp., sparganium sp., tussilago sp., agrostis sp., allium sp., artemisia sp., cynodon sp., gleochoma sp., oxalis sp., paspalum sp., phragmites sp., ranunculus sp., tipha sp., urtica sp., clematis sp., convolvulus sp., rubia, alla dose di litri da 5 a 10 per ettaro, a seconda della infestante.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

* L'addizione di solfato ammonico, in ragione di Kg 8-10 per ettaro consente di impiegare le dosi inferiori prescritte.
Con presenza di infestanti nate da seme far seguire un trattamento con un prodotto residuale (es. Simazina, Diuron).
Se dopo il trattamento entro massimo 8 ore vi fosse una pioggia essa ridurrebbe l'efficacia del trattamento; evitare la deriva; togliere i succhioni e ricacci sulle colture arboree prima del trattamento; non lavorare il terreno per 3 settimane dopo il trattamento; tra il trattamento e l'impiego di prodotti residuali far trascorrere almeno 1-2 settimane.

COMPATIBILITA' - Il prodotto non è miscibile con i formulati a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Il prodotto è fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Dopo il trattamento lavare accuratamente tutte le attrezzature impiegate.
Avvertenza: non impiegare materiali zincati o in ferro se non sono protetti da vernici plastiche.
Nocività: durante il trattamento tener lontano animali domestici e bestiame.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

PANTOX 360

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA
TIPO DI OFRMULAZIONE: LIQUIDA

PANTOX 360
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
GLIFOSATE acido puro g 30,4 * (g/l 360)
Coformulanti q. b. a 100
*Il contenuto di p.a. acido equivalente corrispond ente a 360 g/l pari a g 41 di p.a. sale isopropilamminico per g 100 di prodotto

FRASI DI RISCHIO - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

N

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Sanità: n. 9675 del 07/07/1998
CONTENUTO: ml 100
Riferimento partita n.:

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO"
oppure:
"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA"

PIRIFOS G

INSETTICIDA PER LA LOTTA CONTRO GLI INSETTI DEL TERRENO

PIRIFOS G
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:

CLORPIRIFOS puro	g	7,5
Coformulanti q.b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per Ingestione. – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: A.D.I.C.A. S.r.l. – Via dello Stabilimento n. 11 – Nera Montoro (TR) / CHEMIA S.P.A - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / DIACHEM S.P.A. – Albano S. Alessandro (BG) / Stabilimento di confezionamento: DIACHEM S.P.A. U.P. SIFA – S.S. Pacana Superiore Km 185,800 – Caravaggio (BG)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 10262 del 10/01/2000
Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 250-500 Kg 1-5-10-20

NORME DI SICUREZZA - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsione, coma. **Cause di morte:** generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).**Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.
RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, il bestiame, gli animali domestici ed è altamente tossico per i pesci.

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche – PIRIFOS G è un insetticida granulare per la lotta contro gli insetti che vivono nel terreno e sulla sua superficie ed è efficace anche nei terreni umidi ed in quelli irrigui.
PIRIFOS G si impiega per la difesa delle colture seguenti: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, MAIS, TABACCO, PATATA, OLEAGINOSE (girasole, soia), CAVOLI (cavolo cappuccio, cavolo cinese), SOLANACEE (pomodoro, peperone, melanzana), FAGIOLO, PISELLO, CAROTA, CIPOLLA, COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI.
Dosi d'impiego – PIRIFOS G è consigliato per la disinfestazione del terreno contro elateridi, nottue, grillotalpa, maggiolino, tipule, bibio, mosca del cavolo, formiche, alla dose di 32-40 Kg/ha, incorporandolo al terreno con leggera erpicatura o fresatura.
Nel caso di trattamenti localizzati, PIRIFOS G va distribuito a 10-16 Kg/ha nei solchi preparati per la semina, per il trapianto o all'atto della rincalzatura. In terreni molto leggeri si consiglia la dose minima.
AVVERTENZA – PATATA: l'uso è raccomandato alle dosi sopra indicate **esclusivamente alla semina.**
Nella distribuzione di PIRIFOS G in miscela con concimi, è necessario che la granulometria dei singoli componenti non sia molto diversa: in caso contrario non si avrebbe una uniforme distribuzione dei prodotti.

COMPATIBILITA' – Tale prodotto, data la sua formulazione granulare, non si applica in miscela con altri formulati.
FITOTOSSICITA' – Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
INTERVALLO DI SICUREZZA Sospendere i trattamenti 120 giorni prima della raccolta per soia e girasole; 60 giorni per barbabietola da zucchero, tabacco e patata; 30 giorni per mais e cavoli; 21 giorni per pomodoro, peperone, carota e cipolla; 15 giorni per le altre colture.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

PIREFLOR

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

PIREFLOR
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:

PIRETRINA	g	2	(g/l 18)
(da estratto di Piretro al 25%g 8)			
PIPERONIL BUTOSSIDO	g	8	(g/l 72)
Coformulanti q. b. a	g	100	

FRASI DI RISCHIO - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

N
Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. Via IV Novembre n. 19/1 - Renazzo di Cento (FE) / ALTHALLER ITALIA S.R.L. - Strada Comunale Per Campagna - San Colombano Al Lambro (MI) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / TORRE S.r.l. – Via Pian d'Asso – Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI) / VE.BI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. - Via Desman n. 43 – Borgoricco (PD)
Registrazione del Ministero della Sanità: n. 10158 del 20/09/1999
CONTENUTO: ml 10-20-100-200-250-500 ℓ 1-5-10-15-20
Riferimento partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: PIRETRO 2%PIPERONIL BUT OSSIDO 8%le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
PIRETRO - **Sintomi**: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
PIPERONIL BUTOSSIDO - =
TERAPIA: sintomatica e di rianimazione.
CONTROINDICAZIONI: =
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
PIREFLOR esplica la sua azione prevalentemente per contatto ed in minor misura per ingestione, la sua azione è rapida (forte potere abbattente) e di breve persistenza. I trattamenti devono essere eseguiti bagnando abbondantemente le piante alla comparsa delle infestazioni e in giornate di tempo buono. Possiede limitata azione tossica per l'uomo e gli animali a sangue caldo.
AGRUMI contro ogni tipo di insetto parassita a ml 150 200. POMACEE – FICO – MELOGRANO - NOCCIOLO – contro gli afidi a ml 150-200. DRUPACEE – contro mosca ed afidi a ml 150-200. VITE – OLIVO – contro mosca, acari ed afidi a ml 150-200. ORTAGGI (escluso i funghi) – FRAGOLA – contro afidi, mosca, cavolaia, bemisia, moscerino, farfalle di minatori, psilla, tripidi e aleurodidi a ml 150-200. PATATA – contro dorifora a ml 150-200. BARBABIETOLA DA ZUCCHERO – GIRASOLE – FORAGGERE LEGUMISORE – contro tutti gli insetti ml 150-200. TABACCO – contro tutti gli insetti a ml 100-150. CEREALI – per la disinfezione in genere ml 150-200. FLORICOLTURA – ORNAMENTALI – contro gli afidi, cicaline, tingidi, coleotteri, lepidotteri defogliatori, aleurodidi e tentredini a ml 140-160.

COMPATIBILITA' - Incompatibile con poltiglie solfocalciche.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Alle dosi indicate non presente fenomeni di fitotossicità.
"Tossico per gli insetti utili e per i pesci "
EVENTUALI RISCHI DI NOCIVITA', A SEGUITO DEI TRATTAMENTI PER GLI INSETTI UTILI, GLI ANIMALI DOMESTICI, I PESCI ED IL BESTIAME – Se viene impiegato al momento della fioritura è nocivo per le api. Non immettere nel campo trattato bestiame prima di 2 giorni. Non contaminare corsi d'acqua.
INTERVALLO DI SICUREZZA – Osservare un intervallo di 2 giorni dall'ultimo trattamento all'immissione al consumo.
"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso". Chi impiega il prodotto è respo nsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto".

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

PIREFLOR

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

PIREFLOR

COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:

PIRETRINA	g	2	(g/l 18)
(da estratto di Piretro al 25% g 8)			
PIPERONIL BUTOSSIDO	g	8	(g/l 72)
Coformulanti q. b. a	g	100	

FRASI DI RISCHIO - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

N

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L.

Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Sanità: n. 10158 del 20/09/1999

CONTENUTO: ml 10-20-100

Riferimento partita n.:

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO"
oppure:
"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA"

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

POLVERE TIPO BORDOLESE BLU

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

POLVERE TIPO BORDOLESE BLU
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
Rame metallico (sotto forma di Solfato di rame) g 20,2
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per inalazione. - Rischio di gravi lesioni oculari. – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. - Proteggersi gli occhi/la faccia. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / INDUSTRIA CHIMICA CAFFARO S.P.A. – Adria Cavanella Po (RO) / INDUSTRIA CHIMICA SCARMAGNAN ALBERTO &C. s.a.s. – Via Ungheria n. 83 – Minerbe (VR) / MANICA S.P.A. – Via all'Adige n. 4 – Rovereto (TN)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 5608 del 06/12/1983
Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 100-200-250-500 Kg 1-5-10-20

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE - La POLVERE TIPO BORDOLESE BLU è essiccata e preparata con procedimento industriale e formulata in polvere bagnabile pronta per l'uso. La POLVERE TIPO BORDOLESE BLU pertanto si impiega sospendendola direttamente in acqua senza l'aggiunta di calce. il contenuto in rame metallo attivo conferisce al prodotto una azione fungicida, contro le seguenti malattie crittogamiche sensibili al rame come sotto specificato.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
VITE - contro Peronospora: g 700-1200/hl d'acqua; applicare secondo i tradizionali calendari di lotta, specialmente nel periodo di "chiusura".
POMACEE - contro Ticchiolatura e cancri: g 1000-1500/hl d'acqua nei trattamenti "eradicanti" alla caduta delle foglie.
DRUPACEE - contro Bolla, Corineo, Sclerotinia, Marciume bruno del mandorlo: g 1200-2000/hl d'acqua nei trattamenti autunnali e invernali "al bruno".
OLIVO - contro Occhio di pavone, Lebbra, Fumaggine: g 1000-1500/hl d'acqua nei trattamenti primaverili ed autunnali.
AGRUMI - contro Allupatura, Gommosi, Batteriosi, Fumaggine, Mal secco: g 800-1500-3000/hl d'acqua.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - contro Cercosporiosi: Kg 7.5-10 ad ettaro con 5-8/hl d'acqua.
PATATA, POMODORO E COLTURE ORNAMENTALI in pieno campo - contro Alternariosi, Septoriosi, Antracnosi, Peronospora: g 700-1200/hl d'acqua.
Sospendere in poca acqua la dose di prodotto, mescolare sino ad ottenere una poltiglia fluida, aggiungere altra acqua e versare nel totale quantitativo d'acqua richiesto.

COMPATIBILITA' - La POLVERE TIPO BORDOLESE BLU è miscibile con i principali prodotti fitosanitari ed in particolare con lo Zolfo bagnabile e colloidale, con i fertilizzanti fogliari. Sono sconsigliabili le miscele con i prodotti a base di Maneb.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (*) cuprosensibili, il prodotto pu̇essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego.
(*) Meli cuprosensibili: Abbondanza (Belfort) - Black Stayman - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rame Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Wesap - Black Ben Davis - Renetta del Canadà - Rosa mantovana.
(*) Peri cuprosensibili: Abate fetel Buona Luigia d'Avranches Butirra Clairgeau Passa Crassana B.C.Wiliam Dottor Jules Guyot Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard.
NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

POLVERE TIPO BORDOLESE BLU

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

POLVERE TIPO BORDOLESE BLU
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
Rame metallico (sotto forma di Solfato di rame) g 20,2
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per inalazione. - Rischio di gravi lesioni oculari. – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. - Proteggersi gli occhi/la faccia. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Sanità n. 5608 del 06/12/1983
Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 100

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "
OPPURE:
" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

PREVITER

FUNGICIDA AD AZIONE SISTEMICA
FORMULAZIONE: LIQUIDA

COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
PROPAMOCARB CLOROIDRATO g 66,5 (g/l 722)
Coformulanti q. b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. -- Conservare la confezione ben chiusa. – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel 051 6836207

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / CHIMAC-AGRIPHAR S.A. - Rue de Renory n. 26 - B-4102 Ougree - Belgium / ISAGRO S.P.A. - Via Nettunese Km 23,400 - Aprilia (LT) / VE.BI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. - Via Desman n. 43 – Borgoricco (PD)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9705 del 28/07/1998

CONTENUTO: ml 10-20-50-100-150-200-250-500 ℓ 1-5-10-20
Riferimento partita N.:

MODALITA' D'IMPIEGO
Fungicida sistemico indicato nella difesa di numerose colture nel combattere i seguenti ficomiceti: Pythium spp., Phytophthora sp., Peronospora, Pseudoperonospora, Aphanomices sp., Bremia.
Viene assorbito prevalentemente dalle radici e poi traslocato nell'apparato fogliare, caratterizzato da una lunga e completa protezione ed elevata selettività sulle colture manifestando, su esse, uno stimolo nei confronti della radicazione e sullo sviluppo vegetativo. Il prodotto ha la caratteristica di poter essere impiegato con numerose tecniche quali: trattamenti fogliari, concia delle sementi, bagno dei bulbi e delle talee, disinfezione dei terricciati e dei letti di semina, trattamenti al terreno in pre e post-trapianto delle colture. Viene impiegato sulle seguenti colture: agrumi, melo, pero, fragola, cavoli, lattuga, cicoria, indivia, radicchio, spinacio, bietola da foglia e da costa, sedano, prezzemolo, basilico, cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo), solanacee (pomodoro, peperone, melanzana), carota, bietola da orto, rapa, cipolla, aglio, porro, tabacco, floreali, forestali, ornamentali, nei vivai, nei semenzai, nella concia delle sementi e bulbi, campi da golf e prati ornamentali.
Interventi:
TRATTAMENTI FOGLIARI: viene impiegato alla dose di litri 1,5-3 per ettaro di coltura in circa 15-20 ettolitri di acqua, sulle colture sopra menzionate.
CONCIA DELLE SEMENTI: la dose d'impiego è di ml 1-4 per Kg di seme di piccole dimensioni e ml 10-40 per Kg di seme di dimensioni maggiori.
PREPARAZIONE DEI TERRICCIATI: impiegare 300 ml di prodotto per metro cubo di terriccio, disciolti in circa 20 litri di acqua.
TRATTAMENTI AI SEMENZAI: impiegare ml 8-12 per metro quadro di superficie disciolti in 4-5 litri di acqua con l'avvertenza di ripetere il trattamento cinque giorni prima del trapianto con l'utilizzo di 6-8 litri di acqua per metro quadrato.
TRATTAMENTI AL TERRENO: pre-trapianto: impiegare ml 8-12 per metro quadro in 3-5 litri di acqua; post-trapianto: impiegare 100-200 ml per pianta di una soluzione ottenuta diluendo 200 ml di prodotto per q.le acqua: trattare ogni 10-15 giorni con un massimo di 3-4 interventi.
COLTURE FLOREALI IN GENERE: informazioni particolareggiate per le seguenti colture: garofano - gerbera, si impiega il prodotto specificatamente contro Pythium e Phytophtora alla dose di ml 12-15 per metro quadro, disciolto in circa 2-4 litri di acqua, trattando due giorni prima dell'impianto e quindi procedendo all'incorporamento. Successivamente impiegare 200 ml per q.le acqua, con trattamento fogliare, bagnando abbondantemente con 400-500 litri ogni 1000 metri quadrati, ad intervalli inizialmente di circa 8-10 giorni e successivamente ogni 15-25 giorni.
BULBOSE: per controllare Pythium ultimum e Phytophthora si immergono i bulbi per 20-30 minuti in una soluzione contenente 300 ml di prodotto per q.le acqua, poi, prima della messa a dimora, si tratta il terreno con 10-12 ml di prodotto, per metro quadrato in 2-4 litri di acqua e successivo incorporamento a circa 10-12 cm di profondità.
PIANTE FORESTALI (VIVAI): contro Phytophthora cactorum, Phytophthora cinnamomi e Pythium, intervenendo trattando il substrato colturale con 300 ml di prodotto per metro cubo, disciolto in 8-10 litri di acqua: si deve intervenire, in caso di necessità ogni 15-18 giorni con 200 ml di prodotto in 4-5 litri di acqua per metro quadro.
CAMPI DA GOLF - TAPPETI ERBOSI - PRATI ORNAMENTALI: per il controllo di Pythium a p. ed altre specie: trattare con interventi fogliari a ml 1-1,5 per metro quadro, impiegando non meno di 100-200 litri di soluzione per 1000 mq. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia ripetendo i trattamenti ogni 14-15 giorni.

COMPATIBILITA'- Non compatibile con i prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese) e gli Olii minerali.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere il trattamento 20 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

PREVITER

FUNGICIDA AD AZIONE SISTEMICA
FORMULAZIONE: LIQUIDA

COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
PROPAMOCARB CLORCIDRATO g 66,5 (g/l 722)
Coformulanti q. b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel 051 6836207

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9705 del 28/07/1998

CONTENUTO: ml 10-20-50-100
Riferimento partita N.:

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO"
oppure:
"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA"

PROPANEX

DISERBANTE SELETTIVO PER LA LOTTA CONTRO LE INFESTANTI DEL RISO - LIQUIDO EMULSIONABILE

PROPANEX
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
PROPANIL p.a. puro g 35 (g/l 355)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene solvente irritante: Isoforone

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. - Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. - Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. - Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. – Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via IV Novembre n. 19/1 - Renazzo di Cento (FE) / ALTHALLER ITALIA S.R.L. - Strada Comunale per Campagna n. 5 - San Colombano al Lambro (MI) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / INQUIPORT – Parque Industrial Llanos Occidentales - Araure - Edo. Portuguesa - Venezuela / TORRE S.r.l. – Via Pian d'Asso – Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 8395 del 07/08/1993
CONTENUTO: ℓ 1-5-10-20
Riferimento partita n.:

NORME PRECAUZIONALI - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - **Sintomi**: Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE
Il PROPANEXè un formulato a base di Propanil avent e la caratteristica di venire assorbito molto rapidamente dalle infestanti delle risaie per cui la sua azione erbicida è più pronta e più sicura.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

- Contro giavone con 2-3 foglie, ma in prevalenza sulla terza foglia: litri 10-12 per ettaro.
- Contro giavone con 3-4 foglie e qualche pianta all'inizio dell'accestimento: litri 13-16 per ettaro.
- Contro giavone allo stadio di accestimento con non più di 2 germogli secondari per pianta: litri 19-20 per ettaro.

PROPANEXsi applica in post-emergenza, con la segue nte tecnica applicativa: asciutta della risaia prima del trattamento, reimmissione dell'acqua 24-48 ore dopo l'esecuzione dello stesso, mantenimento di un alto livello d'acqua per 8-10 giorni, avendo l'avvertenza di non eccedere nei volumi d'acqua quando la vegetazione del riso è debole e poco sviluppata.
PROPANEXha dimostrato di svolgere una rapida azion e erbicida anche nel confronto delle ciperacee e delle alismatacee non che una certa efficacia anche contro lo scirpus marittimus et il butomus umbellatus.
PROPANEXpuò essere distribuito con volumi d'acqua molto bassi: litri 280-300 per ettaro, impiegando pompe montate su trattrici o trainate. Le pompe usate per il diserbo con PROPANEXdevono erogare una pressione minima di 25 Atm. e avere ugelli di diametro non superiore a millimetri 1-1,2.
Effettuare il trattamento in giornate prive di vento, onde evitare che la nube irrorante possa essere trasportata su culture vicine sensibili: medica, trifoglio, pisello, fagiolo, frutteti od altro.
Preparazione della poltiglia: versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria.

COMPATIBILITA' - PROPANEXper la sua formulazione e lo specifico campo d'impiego non deve essere miscelato con insetticidi, fungicidi e concimi e non deve essere distribuito 5 giorni prima o dopo l'impiego di questi prodotti, altrimenti il riso può subire delle bruciature. Non eseguire il trattamento nel caso in cui si preveda una pioggia a distanza di 3-6 ore.
AVVERTENZE - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - PROPANEXè selettivo nei confronti del riso; tuttavia talvolta in caso di temperature elevate si può riscontrare qualche ustione sulle foglie che però scompare dopo qualche giorno.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

PENCOR 10 EC

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
FUNGICIDA SISTEMICO AD ATTIVITÀ PREVENTIVA, CURATIVA E BLOCCANTE PER LA LOTTA CONTRO LA TICCHIOLATURA E L'OIDIO DEL MELO, LA TICCHIOLATURA DEL PERO E L'OIDIO DEL PESCO, DELLA VITE, DEL TABACCO E DI ALCUNE COLTURE ORTIVE ED ORNAMENTALI

COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:

PENCONAZOLO puro	g	10,20 (g/l 100)
Coformulanti * q. b. a	g	100

* contiene Cicloesanone

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

FRASI DI RISCHIO – Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. – Conservare la confezione ben chiusa. – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - **Sintomi**: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. **Avvertenza**: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE - PENCOR 10 EC è un fungicida sistemico ad ampio spettro d'azione ad attività di tipo preventivo, curativo e bloccante con alcune differenze nell'importanza relativa ai suddetti meccanismi d'azione in riferimento ai diversi patogeni e alle condizioni ambientali.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
VITE: contro Oidio (Uncinula necator)
- Trattamenti preventivi: ml 25-30/hl in pre e post-fioritura intervenendo ogni 14-16 giorni; ml 15-20/hl in pre e post-fioritura effettuando i trattamenti alla cadenza di 7-10 giorni.
Con attacchi di Oidio in atto (primi sintomi) effettuare 2 trattamenti ad intervallo di 5-7 giorni con PENCOR 10 EC alla dose di ml 50/hl, quindi continuare con trattamenti di tipo preventivo. Il prodotto esplica un'attività collaterale su Guignardia spp. e in minor misura su Pseudopezipa spp.
MELO: contro Ticchiolatura (Venturia inaequalis)
- Trattamenti preventivi: ml 30-40/hl alla cadenza di 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce; successivamente si tratta ogni 10-15 giorni. In entrambe le epoche utilizzare gli intervalli più brevi in condizioni ambientali favorevoli alla malattia. I normali trattamenti antiticchiolatura con PENCOR 10 EC sono sufficienti per controllare efficacemente anche l'Oidio.
- Trattamenti curativi: ml 40-45/hl intervenendo entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
- Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): ml 40-45/hl effettuando 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali.
Si raccomanda l'impiego di PENCOR 10 EC in miscela con un prodotto di copertura.
Contro Oidio (Podosphaera leucotricha)
- Trattamenti preventivi: interventi primaverili alla dose di ml 30-40/hl alla cadenza di 10 giorni. Nei trattamenti estivi trattare alla cadenza di 10-14 giorni. Impiegare le dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia.
- Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): trattamenti alla dose di ml 30-35/hl a cadenza settimanale in numero di 3-4 permettono il controllo delle infezioni in atto e la protezione della nuova vegetazione.
- Contro malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp.) effettuare 2-3 trattamenti a cadenza settimanale in pre-raccolta alla dose di ml 40-45/hl.
PERO: contro Ticchiolatura (Venturia pirina)
- Trattamenti preventivi: ml 25-35/hl alla cadenza di 10-12 giorni per tutta la stagione. Usare la dose maggiore e gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo della malattia.
- Trattamenti curativi: ml 30-40/hl intervenendo entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
- Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): ml 30-40/hl effettuando 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali. Si raccomanda l'impiego di PENCOR 10 EC in miscela con un prodotto di copertura.
PESCO: contro Oidio - Trattamenti preventivi: in zone ad alta pressione di infezione e in presenza di varietà particolarmente sensibili effettuare i trattamenti alla dose di ml 40-50/hl dalla caduta petali ad intervalli di 10-14 giorni. In zone a bassa pressione di infezione trattare ogni 14-21 giorni. Qualora sia necessario intervenire in presenza dei primi sintomi utilizzare il dosaggio più elevato.
Contro Monilia, Bolla, Corineo il PENCOR 10 EC esplica un'attività collaterale che può essere sufficiente in zone dove sono stati effettuati i normali trattamenti invernali.
Contro malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp.) effettuare 2-3 trattamenti a cadenza settimanale in pre-raccolta alla dose di ml 50/hl.
TABACCO: contro Oidio ml 35-50/hl effettuando 2-4 trattamenti preventivi a partire dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.
COLTURE ORTICOLE (melone, zucchino, zucca, cetriolo, carciofo, pomodoro, peperone, pisello): contro Oidio in pieno campo e dopo la rimozione del telo di protezione effettuare 2-4 trattamenti ad intervalli di 14-16 giorni alla dose di ml 25-50/hl a seconda della coltura e della pressione di infezione. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.
COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE: contro Oidio e Ruggini utilizzare ml 25-50/hl ad intervalli di 10-14 giorni a seconda della coltura e dell'incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.
N.B. Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale. Il prodotto va diluito in una quantità di acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione evitando lo sgocciolamento.

COMPATIBILITA' - **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA – Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via IV Novembre n. 119/1 - Renazzo di Cento (FE) / ALTHALLER ITALIA S.R.L. - Strada Comunale per Campagna n. 5 - S. Colombano al Lambro (MI) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 – Sant'Agostino (FE) / L.I.F.A. S.R.L. - Via C. Colombo n. 7/7° - Vigonovo (VE) / TORRE S.r.l. – Via Pian d'Asso – Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Registrazione del Ministero della Salute n. 11190 del 05/02/2002
CONTENUTO: ml 10-20-25-50-100-200-250-500 ℓ 1-5
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.
Riferimento partita N.:

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

PENCOR 10 EC

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
FUNGICIDA SISTEMICO AD ATTIVITÀ PREVENTIVA, CURATIVA E BLOCCANTE PER LA LOTTA CONTRO LA TICCHIOLATURA E L'OIDIO DEL MELO, LA TICCHIOLATURA DEL PERO E L'OIDIO DEL PESCO, DELLA VITE, DEL TABACCO E DI ALCUNE COLTURE ORTIVE ED ORNAMENTALI

COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:

PENCONAZOLO puro	g	10,20 (g/l 100)
Coformulanti * q. b. a	g	100

*contiene Cicloesanone

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

FRASI DI RISCHIO –Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. **CONSIGLI DI PRUDENZA** - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel 051 6836207

CONTENUTO: ml 10-20-25-50-100

Riferimento partita N.:

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO"
oppure:
"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA"

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

PROTER SC

ANTICRITTOGAMICO AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA
IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

PROTER SC
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
PROCIMIDONE puro g 26 (g/l 281)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / CHEMIA S.P.A., Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / DIACHEM S.P.A., Unità produttiva SIFA - S.S. Padana Superiore - Caravaggio (BG) / HOCKLEYINTERNATIONAL LTD - Calder Road, Ravensthorpe -Dewsbury - West Yorkshire - WF12 9EA - U.K. / SCAM S.R.L. - Strada Bellaria n. 164 - Modena / VE.BI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. - Via Desman n. 43 -Borgoricco (PD)
Registrazione del Ministero della Sanità: n. 9466 del 13/01/1998
CONTENUTO: ml 100-250-500 ℓ 1-5-10
Riferimento partita n.:

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO – In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE - PROTER SC è un fungicida dotato di azione preventiva e curativa, particolarmente efficace nella lotta contro le muffe grigie ed i marciumi delle piante causati da botrytis, sclerotinia, monilia ed alternaria. La formulazione flowable ne migliora gli aspetti applicativi, assicurando migliore uniformità di copertura e resistenza al dilavamento. PROTER SC non influisce sulla fermentazione dei mosti e non conferisce sapori e odori sgradevoli alle colture trattate.

DOSI - EPOCHE - MODALITA' D'IMPIEGO - Dosi per 100 litri di acqua

colture	parassiti	epoche d'impiego	dosi
VITE	muffa grigia (botrytis cinerea)	a) fine fioritura; b) pre-chiusura del grappolo; c) invaiatura; d) 3-4 settimane prima della raccolta	ml 200-300
PESCO, SUSINO,	moniliosi dei fiori e dei rami (monilia laxa)	dalla fase di pre-fioritura alla piena fioritura	ml 300-400
ALBICOCCO	moniliosi dei frutti (monilia fructigena)	da 5 a 3 settimane prima della raccolta	ml 200-300
MANDORLO	moniliosi (monilia laxa e fructigena)	fino alla piena fioritura	ml 300-400
NOCCIOLO	moniliosi (monilia laxa e fructigena)	in prossimità della fase di piena allegagione	ml 150-200
FRAGOLA	botrite (botrytis cinerea)	a) apertura dei petali; b) durante la fioritura; c) a fine fioritura	ml 160-200
ACTINIDIA	muffa grigia (botrytis cinerea)	in piena fioritura, inizio allegagione, ingrossamento dei frutti, 2-3 settimane prima della raccolta;	ml 300-400
		nei trattamenti di post-raccolta in magazzino per immersione o a doccia.	soluzione allo 0,02%
PERO	moniliosi (monilia laxa e fructigena), macultura bruna (stemphylium versicarium)	con interventi ripetuti a partire dalla fase di fine fioritura	ml 200-300
POMODORO, MELANZANA, PEPERONE	alternaria (alternaria alternata), muffa grigia (botrytis cinerea), sclerotinia (sclerotinia sclerotiorum)	su pomodoro: ogni 2 settimane iniziando dalla fase di fioritura del 1°palco fiorale; su peperone: non più di una volta; su melanzana: non più di 3 volte	ml 160-200
CETRIOLO, AGLIO, CIPOLLA	botrite, sclerotinia, alternaria e marciume bianco (sclerotium cepivorum)	in funzione dello sviluppo della malattia fungina	ml 200-300
LATTUGA, INDIVIA	sclerotinia e botrite	non più di 2 interventi dopo la crisi di trapianto	litri 2-3/ha
COLZA, GIRASOLE	botrite e sclerotinia	prima della fioritura	litri 2/ha
TABACCO	muffa grigia e sclerotinia	in funzione dello sviluppo della malattia fungina	litri 2-3/ha
COLTURE FLOREALI (rosa in pieno campo, gerbera, geranio, crisantemo, garofano, ciclamino)	muffa grigia e sclerotinia	ripetere in funzione degli attacchi fungini	ml 80-160
		trattamenti al terreno	ml 6 8/mq

COMPATIBILITA' - Il prodotto risulta compatibile con i più comuni fungicidi ed insetticidi in commercio. Occorre effettuare la miscelazione estemporaneamente prima dell'impiego, diluendo dapprima in poca acqua ed aggiungendo la rimanente quantità sino al volume desiderato. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Nei trattamenti a colture floricole ed orticole, specie se in serra, si consiglia di effettuare saggi preliminari.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Vite, susino, girasole: 21 giorni / Pesco, albicocco, actinidia, pero, fragola, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, lattuga, indivia: 14 giorni / Colza: 45 giorni
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

PROTER SC

ANTICRITTOGAMICO AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

PROTER SC
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
PROCIMIDONE puro g 26 (g/l 281)
Coformulanti q. b. a 100

N

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Registrazione del Ministero della Sanità: n. 9466 del 13/01/1998
CONTENUTO: ml 100
Riferimento partita n.:

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO"
oppure:
"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA"

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PROTER

FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE
FORMULAZIONE: POLVERE BAGNABILE

PROTER
COMPOSIZIONE: g 100 di prodotto contengono
PROCIMIDONE puro g 50
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / CHEMIA S.P.A., Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / SCAM S.R.L. - Strada Bellaria n. 164 - Modena / S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. - Via Evangelista Torricelli n. 2 - Cotignola (RA)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 9771 del 01/10/1998
Riferimento partita n.: CONTENUTO: g 100-200-500 Kg 1-5-10-15-20

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO – In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO - PROTER è un fungicida a base di Procimidone, che esplica la propria azione preventivamente ed in modo curativo nelle prime fasi di incubazione: risulta essere dotato di moderata attività sistemica.
Colture protette:
VITE - indicato contro la muffa grigia alla dose di g 100-150/hl, effettuando 3-4 trattamenti nei periodi di fine fioritura, poi quando gli acini hanno il diametro di ca. 3 mm (in coincidenza della chiusura del grappolo), poi si tratta all'invaiatura 7-8 settimane prima del raccolto per finire 3-4 settimane prima della raccolta. Si consiglia di bagnare molto affinchè vi sia una distribuzione uniforme del prodotto; l'impiego della dose più alta è su varietà più sensibili all'attacco della malattia.
PESCO - NETTARINE - indicato contro il marciume bruno (monilia) sia dei fiori e dei rami (g 150-200 per q.le acqua, con un primo trattamento ai bottoni fiorali ed un altro con il 25% dei fiori aperti ed un successivo in piena fioritura) e dei frutti (g 100-150 per q.le acqua, trattando 30-35 gg e 15-20 giorni prima della raccolta.
PERO - indicato contro la maculatura bruna g 100-150 per q.le acqua con trattamenti a partire dalla fioritura e ripetuti.
ALBICOCCO - SUSINO - indicato contro la muffa grigia e marciumi da sclerotinia alla dose di g 100-200 per q.le acqua.
MANDORLO - indicato contro la monilia alla dose di g 150-200 per q.le acqua.
ACTINIDIA - indicato contro i marciumi da botrytis e marciumi da sclerotinia, a g 75-100/hl alla caduta dei petali ed eventualmente in pre-raccolta; in post-raccolta con doccia (drencher) g 12/hl; trattamenti per immersione: g 12/hl.
NOCCIOLO - indicato contro la maculatura fogliare del nocciolo a g 75-100/hl.
FRAGOLA - indicato contro la muffa grigia a g 80-100 per q.le acqua con 3 trattamenti alle seguenti epoche: alla schiusura dei petali, poi con circa il 10-20% dei fiori aperti ed alla completa sfioritura. Bagnare bene sia la pianta che il terreno circostante.
POMODORO - indicato contro la muffa grigia g 80-100 per q.le acqua, iniziando a trattare a fine fioritura del primo palco fiorale e ripetendo ogni 15 giorni sino a concludere 28 giorni prima della raccolta.
LATTUGA - indicato contro il mal dello sclerozio alla dose di Kg 1,5-2 per ettaro.
INDIVIA - indicato contro il mal dello sclerozio e la muffa grigia alla dose di Kg 1,5-2 per ettaro.
TABACCO - indicato contro i marciumi da botrytis e marciumi da sclerotini alla dose di Kg 1,5-2 per ettaro.
PEPERONE - MELANZANA - indicato contro la muffa grigia e marciumi da sclerotinia alla dose di g 80-100 per q.le acqua.
AGLIO - indicato contro la muffa grigia e mal dello sclerozio alla dose di g 30 per Kg 100 di seme.
CIPOLLA - indicato contro la muffa grigia e marciume bianco dei bulbi alla dose di g 100-150/hl.
CETRIOLO - indicato contro la marcescenza dei semi e morte delle plantule, marciumi da botrytis a g 100-150/hl.
GIRASOLE - indicato contro la sclerotinia a g 100/hl prima della fioritura e g 100 -200 per q.le di seme nella concia.
COLZA - indicato contro la sclerotinia alla dose di Kg 1-1,5 per ettaro all'inizio della fioritura.
ORNAMENTALI - Indicato contro i marciumi da botrytis a g 40-80/hl.
FLORICOLTURA (in pieno campo ed in serra) - viene indicato contro la muffa grigia della rosa a g 40-80 per q.le acqua, effettuando almeno 3 trattamenti iniziando dal germogliamento sino ad inizio fioritura, bagnando molto bene tutta la vegetazione. Indicato contro la muffa grigia della Gerbera, Geranio, Crisantemo, Garofano g 40-80 per q.le acqua trattando con presenza della malattia a ripetuti interventi. Indicato contro la rhizoctonia del garofano ed altri ornamentali g 4 dispersi in 5-10 litri di acqua per mq di superficie, intervenendo 10 gg circa dopo la messa a dimora, quando è superata la crisi del trapianto e con comparsa dei primi sintomi della malattia ed eventualmente ripetendo l'intervento dopo circa un mese.

COMPATIBILITA' - Miscibile con antiparassitari a reazione neutra. **Avvertenza** - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Sui trattamenti alle colture orticole e floricole, specie se in serra, fare saggi preliminari.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto della vite, girasole, susino; 60 giorni per l'actinidia (derrata post-raccolta); 45 giorni per la colza; 14 giorni prima del raccolto sulle altre colture.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

PROTER

FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE
FORMULAZIONE: POLVERE BAGNABILE

PROTER
COMPOSIZIONE: g 100 di prodotto contengono
PROCIMIDONE puro g 50
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

N
Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Registrazione del Ministero della Sanità n. 9771 del 01/10/1998

Riferimento partita n.: CONTENUTO: g 100

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "
OPPURE:
" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

ROGOTER 40

INSETTICIDA – LIQUIDO EMULSIONABIULE

ROGOTER 40
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
DIMETOATO puro g 37,6 (g/l 390)
Coformulanti q. b. a 100
Contiene Xilene

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
- Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
– Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
- Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NOCIVO

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via IV Novembre 19/1 - Renazzo di Cento (FE) / ALTHALLER ITALIA S.R.L. - Strada Comunale Per Campagna - San Colombano Al Lambro (MI) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / CHIMAC-AGRIPHAR S.A. - Rue De Renory – 26 - B-4102 Ougree/Belgium / DIACHEM S.P.A., U.P. SIFA - S.S. Padana Superiore - Caravaggio (BG) / SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164 - Modena / TORRE S.r.l. – Via Pian d'Asso – Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 1168 del 15/02/1973

CONTENUTO: ℓ 1-5

Riferimento partita N.

NORME PRECAUZIONALI - Conservare il recipiente ben chiuso. - - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - **Sintomi:** colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsione, coma. **Cause di morte:** generalmente insufficienza respiratoria. A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO - Caratteristiche: ROGOTER 40 è un prodotto ad azione citotropica, penetra nei tessuti vegetali eliminando le forme di insetti ed esplica inoltre una azione tossica per contatto.

DOSI - EPOCHE - MODALITA' D'IMPIEGO - Dosi per ettolitro di acqua

AGRUMI - contro cocciniglie allo stadio di neanidi, mosca della frutta (ceratitis capitata), afidi, tignola, acaro delle meraviglie: ml 125, trattare piante non ancora in produzione.

OLIVO
- contro mosca dell'olivo: ml 140, in trattamenti preventivi o curativi da Giugno ad ottobre – massimo 2 trattamenti
- contro tignola dell'olivo: ml 95-140, da Marzo a Giugno contro le tre generazioni dell'insetto. Non irrorare a bsso volume sulle varietà di olivo Coratina, Simona, Canin, Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana, Bosana, Terza grande e la Dritta.

PERO – contro afide, tripidi, tingidi, tentredini, psilla, acari e maggiolini: ml 70, quando compaiono le prime infestazioni. Trattare piante non ancora in produzione.

MELO
– contro cemiostoma: ml 70, quando le mine hanno raggiunto mezzo centimetro di diametro. Trattare piante non ancora in produzione.
- contro acaro, afidi: ml 75-150, trattare piante non ancora in produzione.

FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE – afidi: litri 0,8-1/ha.

ASPARAGO - mosca, afidi, tortricidi e aleurodidi: ml 100, trattamenti in estate solamente dopo la raccolta dei turioni.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, COTONE (non da olio), TABACCO – afidi e nottue: ml 75-150.

FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI, PIOPPO – mosca e striscino: ml 75-100.

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale; effettuando i trattamenti con pompe a volume ridotto (somministrando cioè un minor quantitativo di acqua per ettaro), le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate, in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti, aggiungere alla miscela ml 50/hl di bagnante adesivo (LIOSOL). **Preparazione del prodotto:** versare il ROGOTER 40 a poco a poco nell'acqua agitando energicamente. Lavare accuratamente le pompe prima dell'uso, soprattutto se contengono residui di calce e di altri prodotti alcalini. Il prodotto deve essere conservato in ambiente fresco.

Non trattare in fioritura perchè il prodotto è tossico per le api

COMPATIBILITA' - ROGOTER 40 non è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, pesci e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 35 giorni su olivo, 20 giorni prima del raccolto sulle altre colture eduli, per asparago trattare solamente dopo la raccolta dei turioni

"**Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso". "Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto". "Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ".

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

SEVITOX 50

INSETTICIDA - POLVERE BAGNABILE
PER LA LOTTA CONTRO VERMI E TIGNOLE ED ALTRI INSETTI IN FRUTTICOLTURA, VITICOLTURA E ORTICOLTURA

SEVITOX 50
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
CARBARIL puro (esente da β-naftolo) g 47,5
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per Ingestione. – Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. - Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. – Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / A.D.I.C.A. S.r.l. – Via dello Stabilimento n. 11 – Nera Montoro (TR) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 6309 del 03/04/1985
Riferimento partita N.: CONTENUTO: Kg 1

NORME PRECAUZIONALI - Conservare il recipiente ben chiuso. - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Carbaril: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialloreа e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. **Terapia**: Atropina. **Controindicazioni**: Ossime. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
SEVITOX 50 si usa alla dose di g 200 in 100 litri di acqua sulle colture:
POMACEE - contro Carpocapsa e larve Ricamatrici
DRUPACEE - contro Anarsia e Cidia molesta
VITE – contro Tignola della vite
PATATE - contro Dorifora
POMODORO - contro Dorifora
SEDANO - contro la Nottua
FRAGOLE - contro larve di Lepidotteri
FAGIOLI - contro larve di Lepidotteri

COMPATIBILITA' - Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA' - Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, il pesce ed il bestiame. "Attenzione, il prodotto tal quale contiene sostanza altamente tossica per gli organismi acquatici."
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall' uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

SEVITOX L

INSETTICIDA - LIQUIDO

SEVITOX L
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
CARBARIL puro (esente da β-naftolo) g 47,5 (g/l 527)
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene Glicole Etilenico

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per ingestione. – Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. - Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA –- Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. – Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / TERRANALISI S.R.L. - Via IV Novembre n. 19/1 - Renazzo di Cento (FE) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 7137 del 24/06/1987
CONTENUTO: ℓ 1
Riferimento partita n.:

NORME PRECAUZIONALI - Conservare il recipiente ben chiuso. - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - **Carbaril:** inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo: vomito, diarrea; bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: Atropina. Controindicazioni: Ossime.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Insetticida in formulazione liquida a base di Carbaril, per la difesa di: fruttiferi (melo, pero, pesco, noce) - vite - agrumi (limoni, arancio, mandarino, clementino) - olivo - ortaggi (patata, cavolo, cavolfiore, carciofo, asparago, insalata, cipolla, pisello, fagiolo, fagiolino, pomodoro, melanzana, peperone) -bietola -medicai - fiori - colture ornamentali e vivai. Si usa per trattamenti liquidi contro Tignola e Tignoletta della vite, Tignola e Cocciniglia dell'olivo e degli agrumi, Dorifora della patata, Carpocapsa, Capua, Eulia. Cacoecia ed altri Tortrici, Cidia e Anarsia del pesco, Bega o Tortrice del garofano, Lepidotteri e Coleotteri in genere. Il prodotto agisce nei confronti dei vari parassiti per contatto e per ingestione.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto va usato alle seguenti dosi impiegando pompe a volume normale contro i seguenti Lepidotteri e Coleotteri:
VITE - Tignola e Tignoletta ml 150-200/hl;
OLIVO E AGRUMI (limone, arancio, mandarino, clementino) - Tignola e larve di Cocciniglie ml 150-200/hl;
PATATA - Dorifora ml 200-250/hl;
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - Altica e Mamestra ml 200-250/hl;
MEDICAI - Fitonomo e Misurino ml 200-250/hl;
MELO, PERO, NOCE - Carpocapsa ml 120-150/hl;
PESCO - Cidia,Anarsia, Capua, Eulia ml 200-250/hl;
ORTICOLE (cavolo, cavolfiore, carciofo, asparago, insalata, cipolla, pisello, fagiolo, fagiolino, pomodoro, melanzana, peperone) e FLOREALI in pieno campo - Cavolaie, Lepidotteri o Coleotteri ml 150-250/hl;
GAROFANO in pieno campo - Bega e Tortrice ml 200-250/hl.

Preparazione della poltiglia: agitare la confezione prima dell'uso, diluire la prestabilita dose di prodotto in poca acqua e poi versare il tutto nel totale quantitativo di acqua da irrorare, rimescolando.

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo ad eccezione dei prodotti alcalini quali Polisolfuri, Poltiglia bordolese, Calce.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, il pesce ed il bestiame. "Attenzione, il prodotto tal quale contiene sostanza molto tossica per gli organismi acquatici." Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

TAMAFOS

INSETTICIDA ACARICIDA SISTEMICO
LIQUIDO SOLUBILE

TAMAFOS
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
METAMIDOFOS puro g 19,5 (g/l 228,15)
Coformulanti q. b. a g 100

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290 del 23/04/2001.
FRASI DI RISCHIO - Nocivo a contatto con la pelle. - Molto tossico per inalazione e per ingestione
CONSIGLI DI PRUDENZA

MOLTO TOSSICO

- Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via IV Novembre n.19/1 - Renazzo di Cento (FE) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / CHIMAC-AGRIPHAR S.A. - Rue de Renory r.26, B-4102 Ougree (Belgium) / SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164 – Modena / ISAGRO S.P.A. - Via Nettunese Km. 23,400 - Aprilia (LT)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 8504 del 30/04/1994
Riferimento partita N. CONTENUTO: ℓ 1-5

NORME PRECAUZIONALI - Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsione, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche - TAMAFOS agisce per contatto e per ingestione e viene facilmente assorbito dai tessuti vegetali. Controlla molte specie di acari fitofagi e di insetti ad apparato boccale masticatore e succhiatore, compresi quelli resistenti e quelle difficili da combattere perchè protette dalle foglie o perchè scavano gallerie in varie parti delle piante.
ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
PERO E MELO 1 2 trattamenti, contro: carpocapsa, orgia, ricamatrici (cacoecia, capua, eulia), neanidi di cocciniglie, ragnetto rosso, afidi: ml 145/hl in un massimo di 15 hl di acqua per trattamento e per ettaro.
PESCO, ALBICOCCO – 1-2 trattamenti, contro: afidi, anarsia, cydia, neanidi della cocciniglia bianca, acari: ml 145/hl in un massimo di 15 hl di acqua per trattamento e per ettaro.
SUSINO – contro: afidi, anarsia, cydia, neanidi della cocciniglia bianca, acari: 150-250 ml/hl
BARBABIETOLA – contro: altica, casside, cleono, lisso, mosca, afidi, nottue: 1,7-2,5 l/ha.
PATATA – contro: afidi, dorifora, cicaline, tignole: 2,5 l/ha.
ORNAMENTALI - contro bega del garofano, tripidi, fillominatori, aleurodidi, afidi, acari: 200-250 ml/hl.
MAIS - contro piralide 375-500 ml/hl impiegando 700-800 litri d'acqua per ettaro.

Per la preparazione della miscela acquosa, versare direttamente la quantità necessaria di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice, mantenendo l'acqua in agitazione.

COMPATIBILITA'
TAMAFOS è miscibile con i fungicidi a reazione neutra; in genere non è necessario aggiungere insetticidi o acaricidi dato il vasto campo d'azione del prodotto.
Limitatamente alle pomacee TAMAFOS non deve essere miscelato con altri antiparassitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Non impiegare su crisantemi
RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto è tossico a insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere il trattamento 21 giorni prima del raccolto escluso pomacee albicocche e pesche 35 giorni.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

TERB SC

ERBICIDA SELETTIVO IN SOSPENSIONE
CONCENTRATA

TERB SC
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
TERBUTILAZINA pura g 43,5 (g/l 508,4)
Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per ingestione. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. – Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164 - Modena

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9467 del 13/01/1998
CONTENUTO: ml 200-500 ℓ 1-5-10
Riferimento partita n.:

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Sintomi di intossicazione: (Non specifici e rilevati su animali con superdosaggi) Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratoria, salivazione. Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso. **Terapia:** sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO - TERB SC è un formulato per il diserbo del mais, sorgo. Agisce prevalentemente per assorbimento radicale sulla maggior parte delle infestanti annuali mono e dicotiledoni provenienti da seme. Il trattamento viene effettuato in pre-emergenza delle infestanti od al massimo quando queste sono appena spuntate. Il formulato si impiega alle seguenti dosi per ettaro diluite nella quantità di acqua necessaria a coprire uniformemente la superficie da trattare:

DOSI - EPOCHE - MODALITA' D'IMPIEGO

colture	infestanti	dosi per ettaro	epoche d'impiego
MAIS – SORGO	annuali mono e dicotiledoni provenienti da seme	litri 1.950 in ℓ 200-300 d'acqua	- dopo la semina - in casi particolari in post-emergenza del mais fino allo stadio di 2-3 foglie

Nel caso in cui entro 10-15 giorni dopo il trattamento non cadesse una pioggia occorre intervenire con una irrigazione

Preparazione della sospensione - Il formulato nelle dosi indicate deve essere stemperato in poca acqua a parte e poi diluito nella quantità di acqua necessaria a raggiungere la diluizione voluta.

COMPATIBILITA' - Può essere miscelato con diserbanti triazinici, ammidici e dinitroanilinici autorizzati sulle colture da trattare.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA - Se al trattamento erbicida segue la semina di colture sensibili occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento o di almeno 12 mesi per altre colture (bietole, tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.

"**Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso". "Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto". "Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali."

- Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo fresco.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

TETRACAP DG

FUNGICIDA ORGANICO AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA – GRANULI IDRODISPERSIBILI

TETRACAP DG
COMPOSIZIONE – g 100 di prodotto contengono:
CAPTANO puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100
ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito elusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290 del 23/04/2001.
FRASI DI RISCHIO – Tossico per inalazione. - Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. - Rischio di gravi lesioni oculari. – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. - In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TOSSICO

N

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. - Beer – Sheva, (Israel) – SIPCAM S.P.A. - Salerano sul Lambro (Lodi) / SULPHUR MILLS LIMITED, 1904-1905 G.I.D.C. Panoli, Dist. Bharuch, Gujarat, India / STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. - Via Torricelli n. 2 - Cotignola (RA) / Stabilimento di confezionamento: TORRE S.r.l. – Via Pian d'Asso – Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI) Registrazione del Ministero della Sanità n. 10416 del 29/03/2000
Riferimento partita N.: CONTENUTO: Kg 1-5-10

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia: sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE – TETRACAP DG è un fungicida ad attività preventiva e curativa raccomandato contro la ticchiolatura (Venturia inaequalis e pirina) e diversi marciumi delle pomacee (Gloeosporium, marciume bruno dei frutti) nei trattamenti in pre-raccolta di melo e pero e nella concia delle sementi, nei confronti delle crittogame che attaccano le plantule nei primi stadi di crescita (Pythium spp., Phytophtora spp., Diplodia spp., Macrophomina phaseolina, ecc.)

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

colture	avversità	volume d'acqua	Dosi g/hl	Dosi g/ha
POMACEE: MELO - PERO	Ticchiolatura, Gloeosporium, Marciume bruno dei frutti	ℓ 1500	125-160	1875-2400

Nel trattamento curativo, è bene intervenire entro 24-36 ore dall'inizio delle piogge infettanti. Qualora si effettuassero trattamenti con pompe a volume ridotto (somministrando cioè un minore quantitativo di acqua per ettaro) le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate, in modo da distribuire per unità di superficie la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Preparazione della miscela: versare la dose di prodotto in poca acqua, mescolare fino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea, versate gradualmente questa poltiglia nel quantitativo di acqua richiesto, agitando ripetutamente.

CONCIA DELLE SEMENTI

sementi	avversità	Dosi: g / 100 Kg di seme
MAIS	moria e avvizzimento dei germinelli (Pythium spp., Diplodia spp.); marciumi delle piantine (Pythium spp., Diplodia spp., Macrophomina phaseolina, ecc.)	55-70
SORGO	moria e avvizzimento dei germinelli (Pythium spp., Diplodia spp.); marciumi delle piantine (Pythium spp., Diplodia spp., ecc.)	145-180
CAVOLO E CAVOLFIORE	marciumi	45-70
COCOMERO E MELONE	Pythium e Phytophtora spp.	100-150
SPINACIO		180-270
FAGIOLO E PISELLO		80-120
ALTRE ORTICOLE		60-180 in funzione delle dimensioni del seme da trattare

Il prodotto va stemperato in una quantità di acqua pari a 1-1,5 litri per ogni 100 Kg di semente e la miscela così ottenuta può essere mescolata direttamente alla semente da trattare o spruzzata tramite apposita apparecchiatura.
AVVERTENZA – I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.
COMPATIBILITA' – Il prodotto non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.), con oli e con gli zolfi. La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di oli e zolfi.
AVVERTENZA – In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' – Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious, Winesap, Stayman, Renetta del Canadà) e di pero (Butirra d'Anyou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna), per le quali si sconsiglia.
AVVERTENZA – Conservare la confezione di prodotto in luogo fresco e asciutto. – Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. – Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. – Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
INTERVALLO DI SICUREZZA – Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Etichetta per confezione contenente sacchetti idrosolubili

TETRACAP DG

FUNGICIDA ORGANICO AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA – GRANULI IDRODISPERSIBILI

TETRACAP DG
COMPOSIZIONE – g 100 di prodotto contengono:
CAPTANO puro g 80 **CONTIENE SACCHETTI IDROSOLUBILI**
Coformulanti q.b. a g 100
ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito elusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290 del 23/04/2001.
FRASI DI RISCHIO – Tossico per inalazione. - Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. - Rischio di gravi lesioni oculari. – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. - In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TOSSICO

N

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: SIPCAM S.P.A. - Salerano sul Lambro (Lodi) / SULPHUR MILLS LIMITED, 1904-1905 G.I.D.C. Panoli, Dist. Bharuch, Gujarat, India / STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. - Via Torricelli n. 2 - Cotignola (RA) / Stabilimento di confezionamento: TORRE S.r.l. – Via Pian d'Asso – Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI) Registrazione del Ministero della Sanità n. 10416 del 29/03/2000
Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 600 (6 x g 100; 4 x g 150) – Kg 1 (5 x g 200)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia: sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE – TETRACAP DG è un fungicida ad attività preventiva e curativa raccomandato contro la ticchiolatura (Venturia inaequalis e pirina) e diversi marciumi delle pomacee (Gloeosporium, marciume bruno dei frutti) nei trattamenti in pre-raccolta di melo e pero e nella concia delle sementi, nei confronti delle crittogame che attaccano le plantule nei primi stadi di crescita (Pythium spp., Phytophtora spp., Diplodia spp., Macrophomina phaseolina, ecc.)

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

colture	avversità	volume d'acqua	Dosi g/hl	Dosi g/ha
POMACEE: MELO - PERO	Ticchiolatura, Gloeosporium, Marciume bruno dei frutti	ℓ 1500	125-160	1875-2400

Nel trattamento curativo, è bene intervenire entro 24-36 ore dall'inizio delle piogge infettanti. Qualora si effettuassero trattamenti con pompe a volume ridotto (somministrando cioè un minore quantitativo di acqua per ettaro) le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate, in modo da distribuire per unità di superficie la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Preparazione della miscela: versare la dose di prodotto in poca acqua, mescolare fino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea, versate gradualmente questa poltiglia nel quantitativo di acqua richiesto, agitando ripetutamente.

CONCIA DELLE SEMENTI

sementi	avversità	Dosi: g / 100 Kg di seme
MAIS	moria e avvizzimento dei germinelli (Pythium spp., Diplodia spp.); marciumi delle piantine (Pythium spp., Diplodia spp., Macrophomina phaseolina, ecc.)	55-70
SORGO	moria e avvizzimento dei germinelli (Pythium spp., Diplodia spp.); marciumi delle piantine (Pythium spp., Diplodia spp., ecc.)	145-180
CAVOLO E CAVOLFIORE	marciumi	45-70
COCOMERO E MELONE	Pythium e Phytophtora spp.	100-150
SPINACIO		180-270
FAGIOLO E PISELLO		80-120
ALTRE ORTICOLE		60-180 in funzione delle dimensioni del seme da trattare

Il prodotto va stemperato in una quantità di acqua pari a 1-1,5 litri per ogni 100 Kg di semente e la miscela così ottenuta può essere mescolata direttamente alla semente da trattare o spruzzata tramite apposita apparecchiatura.
AVVERTENZA – I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi. **COMPATIBILITA'** – Il prodotto non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.), con oli e con gli zolfi. La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di oli e zolfi.
AVVERTENZA – In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. **FITOTOSSICITA'** – Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious, Winesap, Stayman, Renetta del Canadà) e di pero (Butirra d'Anyou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna), per le quali si sconsiglia. **AVVERTENZA** – Conservare la confezione di prodotto in luogo fresco e asciutto. – Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. – Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. – Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
INTERVALLO DI SICUREZZA – Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta. **ATTENZIONE:** da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

MODO DI UTILIZZO DEI SACCHETTI IDROSOLUBILI

25%

1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua

2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti

3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore

4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ed...

5) ... aggiungere la restante parte d'acqua necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa sì che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. **STOCCAGGIO** - Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

Etichetta per sacchetti idrosolubili

TETRACAP DG

FUNGICIDA ORGANICO AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA – GRANULI IDRODISPERSIBILI

ATTENZIONE: SACCHETTO IDROSOLUBILE DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

TETRACAP DG
COMPOSIZIONE – g 100 di prodotto contengono:
CAPTANO puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100

AVVERTENZA: LEGGERE ATTENTAMENTE IL TESTO DELL'ETICHETTA RIPORTATO SUL CONTENITORE

TOSSICO

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10416 del 29/03/2000

DA NON VENDERSI NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

Riferimento partita N.: SACCHETTO IDROSOLUBILE CONTENUTO: g 100-150-200)

TETRARAM

POLVERE BAGNABILE A BASE DI OSSICLORURO DI RAME

TETRARAM
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
RAME Metallo (sotto forma di Ossicloruro tetraramico) puro g 50
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per inalazione e ingestione. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A. - Milano Stab. di Adria Cavanella Po (RO) / INDUSTRIA CHIMICA SCARMAGNAN ALBERTO & C. S.A.S. - V.le Ungheria n. 83 - Minerbe (VR) / SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164 – Modena / ISAGRO S.P.A. - Via Nettunese Km. 23.400 - Aprilia (LT) / S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. - Via Evangelista Torricelli n. 2 - Cotignola (RA)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 1995 del 13/04/1976
Riferimento partita N.: CONTENUTO: Kg 5

NORME PRECAUZIONALI - Conservare il recipiente ben chiusa. - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
TETRARAM si usa contro la ticchiolatura del **melo** e del **pero**, la gommosi e la bolla del **pesco** e del **susino**, la peronospora della **vite** e le malattie fungine del **pomodoro** e delle **cucurbitacee**, la peronospora della **patata** e della **bietola**, le dosi d'impiego variano da g 700-900 per q.le di acqua nei trattamenti autunno-invernali alle piante da frutto a g 300-400 nei trattamenti pre-fiorali e si riducono a g 100-200 nei trattamenti post-fiorali. Contro la peronospora della **vite**, la cercospora della **bietola** e le malattie fungine delle **piante orticole** la dose va da g 300-600 per ettolitro.

COMPATIBILITA' - TETRARAM è miscibile con tutti i prodotti di comune impiego.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Da non trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo e di pero cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego. Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza, Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana, Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.
NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per i pesci
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

TETRASOL 50

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

TETRASOL 50
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
TIRAM puro g 47,5
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per inalazione e ingestione. - Irritante per gli occhi e la pelle. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164 – Modena
Registrazione del Ministero della Sanità n. 4190 del 17/02/1981
Riferimento partita N.: CONTENUTO: Kg 5

NORME PRECAUZIONALI - Conservare il recipiente ben chiuso. - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - **Sintomi:** cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
<u>TETRASOL 50 si usa in primavera-estate alla dose di g 200-300 per ettolitro di acqua su</u>:
melo e pero - contro la Ticchioloatura
fragola - contro Vaiolatura e Botritis cinerea
pesco e susino - contro Monilia laxa
vite - contro la Muffa grigia (Botrytis cinerea) dell'uva
colture floreali in pieno campo - contro Septoriosi e Antracnosi
<u>In autunno-inverno si usa alla dose di g 600-700 per ettolitro di acqua su:</u>
albicocco, ciliegio, pesco e susino - contro Bolla e Gommosi.

COMPATIBILITA' - TETRASOL 50 è miscibile con i più comuni prodotti fitosanitari ad eccezione di quelli alcalini come Poltiglia bordolese e Polisolfuri, con Sali di rame, con Methidathion, Chinomethionato, Thioquinox, Difolatan e Tepp, Parathion e Metilparathion.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - varietà di pere sensibili al Tiram: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipione, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.
E' sconsigliabile impiegare il prodotto nelle cv. dei peri Butirra Clargeau, Trionfo di Vienna e Contessa di Parigi.
Non deve essere irrorato su piante precedentemente trattate con sali di rame.
RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto fitosanitario è nocivo per le api e altri insetti utili, gli animali domestici, pesci e bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

TETRASOL LIQUIDO

ANTICRITTOGAMICO LIQUIDO
IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

TETRASOL LIQUIDO
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
TIRAM puro g 40 (g/l 450)
Coformulanti q. b. a g 100

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per inalazione e ingestione. – Irritante per gli occhi e la pelle. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI SRL - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / TERRANALISI S.R.L. - Via IV Novembre 19/1 - Renazzo di Cento (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 7370 del 06/01/1988
CONTENUTO: ℓ 1
Riferimento partita n.:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparto respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. **Terapia:** sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

In primavera-estate alla dose di ml 200-300 per ettolitro di acqua contro le seguenti malattie:
MELO E PERO - contro Ticchiolatura e Marciume bruno
PESCO E SUSINO - contro Gommosi, Bolla e Monilia
VITE E FRAGOLA - contro Botrytis (Muffa grigia) e Vaiolatura
POMODORO - contro Peronospora e Septoria
FAGIOLO E CUCURBITACEE - contro Vaiolo e Antracnosi
GAROFANO - contro Ruggine e Alternariosi
ROSA - contro Ruggine e Peronospora

In autunno-inverno alla dose di ml 600-700 per ettolitro di acqua contro le seguenti malattie:
PESCO E SUSINO - contro Bolla e Gommosi
ALBICOCCO E CILIEGIO - contro Gommosi e Monilia

COMPATIBILITA' - TETRASOL LIQUIDO è miscibile con tutti i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli contenenti Rame, non è miscibile con i prodotti alcalini come Poltiglia bordolese e Polisolfuri con Sali di rame, con Metidation, Chinometionato, Tioquinox, Difolatan e Tepp, Parathion e Metilparathion.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - varietà di pere sensibili al Tiram:
Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana Del Comizio, Gentil Bianca, Gertilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona D'Estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.
E' sconsigliabile, impiegare il prodotto nelle CV dei peri Butirra clairgeau, Trionfo di Vienna e Contessa di Parigi, non deve essere irrorato su piante precedentemente trattate con Sali di rame.
RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto è nocivo per le api e altri insetti utili, gli animali domestici, pesci e bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

TIOGEL 80

ZOLFO BAGNABILE MICRONIZZATO – TIPO DI FORMULAZONE: POLVERE BAGNABILE

TIOGEL 80
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
ZOLFO (esente da Selenio) puro g 79,6
Supporti, disperdenti e coadiuvanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. – Usare indumenti protettivi e guanti adatti. – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207

IRRITANTE

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. – Via Nino Bixio n. 6 – Cento (FE) / S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. - Via Evangelista Torricelli n. 2 - Cotignola (RA)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 4317 del 16/04/1981
Riferimento partita N.: CONTENUTO: Kg 5-10-25

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

CARATTERISTICHE - Anticrittogamico ad azione preventiva e curativa. La finezza delle sue particelle consente adesività ed una adeguata copertura degli organi vegetali da proteggere.
Malattie e parassiti combattuti - Oidio (mal bianco) in genere (sphaeritheca, erisiphe, uncinula, podosphaera). Esercita inoltre contemporaneamente una qualche azione di contenimento di altre malattie (ticchiolatura, ruggine, corineo) e degli acari.
Colture protette - Vite, colture arboree da frutto, ortive, erbacee da pieno campo, ornamentali, da fiore e piante forestali.
DOSI DI IMPIEGO IN PIENO CAMPO - Ogni 100 litri di acqua.
Vite - dalla ripresa vegetativa al raccolto g 200
Pero e melo - trattamenti prefiorali g 500-600, trattamenti postfiorali g 200-300
Pesco - dalla fioritura g 200-300
Albicocco - durante la vegetazione g 250
Ortaggi e fiori - pomodoro, peperone, melanzana, rosa g 200-250
Piante forestali - frassino, acero, salice g 200-300 all'inizio della ripresa vegetativa.
EPOCHE D'IMPIEGO - A scopo preventivo a seconda delle malattie. A scopo curativo ad ogni necessità.
MODALITA' D'IMPIEGO - Poichè lo zolfo esplica in pieno la sua attività in giornate soleggiate, ripetere più frequentemente i trattamenti se la stagione è fredda e le giornate sono coperte.

COMPATIBILITA' - Non è compatibile (o miscelabile) con antiparassitari alcalini (Polisolfuri, Poltiglia bordolese, ecc.) con Olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacril, Diclofluanide.
AVVERTENZA - Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli Olii minerali e del Captano. In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Può arrecare danno alle seguenti colture di: **Mele -** Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap. **Pere -** Buona Luisa D'Avraaches, Contessa di Parigi, Kaiser, Alexancer, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio. **Vite -** Sangiovese. **Cucurbitacee -** può essere fitotossico.
Non usare il prodotto durante le ore molto calde.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

TMTD 40 L

FUNGICIDA LIQUIDO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

TMTD 40 L
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
TIRAM puro g 40 (g/l 450)
Coformulanti q. b. a g 100

NOCIVO **Pericoloso per l'ambiente**

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per inalazione e ingestione. – Irritante per gli occhi e la pelle. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI SRL - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 10089 del 13/07/1999
CONTENUTO: ml 100-250-500 ℓ 1-5-10-20
Riferimento partita n.:

NORME PRECAUZIONALI - Conservare la confezione ben chiusa. - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - **Sintomi:** cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione: apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

DOSI - EPOCHE - MODALITA' D'IMPIEGO
TMTD 40 L, se non diversamente specificato, si impiega alla prima comparsa dei sintomi delle avversità controllate, alle seguenti dosi per ogni 100 litri di acqua sulle seguenti colture.
MELO, PERO, COTOGNO, NESPOLO – contro ticchiolatura, monilia: ml 300 in pre-fioritura, ml 250 in post-fioritura, ml 300 in pre-raccolta.
PESCO, SUSINO, ALBICOCCO, CILIEGIO, MANDORLO – contro bolla, corineo, cancro dei rametti, monilia: ml 600-700 in autunno-inverno, ml 200-300 in primavera-estate.
VITE – contro botrite o muffa grigia: ml 250-300.
FRAGOLA – contro botrite, vaiolatura rossa: ml 250-300.
CIPOLLA, AGLIO – contro botrite: ml 300-400.
CAVOLO – contro ruggine bianca, botrite, marciumi da phoma: ml 250-300.
CARCIOFO – contro botrite, sclerotinia, rhizoctonia ed ascochyta: ml 250-300.
ASPARAGO – contro botrite, ruggine, rhizoctonia: ml 250-300.
LATTUGA, INDIVIA, CICORIA, RADICCHIO, RUCOLA, SPINACI – contro antracnosi, alternaria, sclerotinia, rhyzoctonia, septoria, cladosporiosi, botrite, ascochyta: ml 300.
BIETOLA ROSSA, RAPA, CAROTA, RAVANELLO, PREZZEMOLO a grossa radice – contro alternaria, botrite, septoria, antracnosi: ml 250-300.
CETRIOLO, ZUCCHINA, MELONE, ZUCCA, COCOMERO – contro botrite, antracnosi, cladosporiosi, alternaria, sclerotinia: ml 250-300.
FAGIOLO – contro botrite, antracnosi, ruggine: ml 300-400.
PISELLO, FAGIOLINO – contro ruggine, alternaria, antracnosi, botrite, septorisi: ml 250-300.
POMODORO - contro ticchiolatura, alternariosi, septoriosi, peronospora: ml 200-250.
PEPERONE, MELANZANA – contro antracnosi, septoria, alternaria, sclerotinia, cladosporiosi, peronospora, phoma, botrite: ml 250-300.
PATATA – contro alternaria, peronospora: ml 250-300.
TABACCO contro peronospora: ml 300 400.
GAROFANO – contro ruggine: ml 200-400.
ROSA – contro peronospora, ruggine: ml 200-400.
TULIPANO, CRISANTEMO, CICLAMINO – contro botrite: ml 200-400.
SEMENZAI E LETTI CALDI – disinfezione del terreno contro il mal della tela: ml 300 usare 4 litri di miscela per mq.
Trattamento al materiale di propagazione (SEMENTI, BULBI, TUBERI, RIZOMI): **cereali** – contro tilletia spp., septoria spp.; **mais** contro malattie da funghi all'esterno del seme: rhyzoctonia spp., fusarium spp.; **cavoli e colza** contro alternaria brassicae; **pisello** contro antracnosi: ascochyta pisi; **melone** contro cladosporiosi: cladosporium cucumerinum; **lattuga** contro antracnosi marssonina spp.; **altre orticole** (escluso sedano, finocchio, prezzemolo ed erba cipollina) contro pythium, rhyzoctoria, phoma, fusarium: alla dose di ml 200-300 per quintale di materiale in 0,5-1,5 litri di acqua.
Barbabietola da zucchero contro mal del piede (phoma betae), rhyzoctonia spp.: ml 600 per quintale di seme.
Tulipano, crisantemo, ciclamino contro botrytis spp., fusarium spp., (specie situate sulla superficie dell'organo trattato), antracnosi (colletotrichum spp.): ml 300-400 per quintale di seme.
Altre floreali contro pythium, rhyzoctonia, phoma, fusarium: ml 200-300 per quintale di materiale.
Trattamento repellente: **alberi, arbusti** contro roditori , selvaggina: sospensione al 20% (2 Kg di prodotto in 10 litri d'acqua) da applicare sulle parti di tronco da proteggere.

COMPATIBILITA' - TMTD 40 L non è miscibile con antiparassitari contenenti rame, non è miscibile con i prodotti alcalini come Poltiglia bordolese e Polisolfuri con Sali di rame, con Metidation, Chinometionato, Tioquinox, Difolatan e Tepp, Parathion e Metilparathion.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
"Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle."
"Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento."
"Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza."
FITOTOSSICITA' - Il prodotto può risultare fitotossico per le cultivar di pesco: Red Haven, Cardinal, Dixired. Sensibili sono anche alcune varietà di pero: Butirra Clargeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna, Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Geardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona D'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna. Non deve essere irrorato su piante precedentemente trattate con Sali di rame. **RISCHI DI NOCIVITA'** - Il prodotto è nocivo per le api e altri insetti utili, gli animali domestici, pesci e bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

TMTD 40 L

FUNGICIDA LIQUIDO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

TMTD 40 L
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
TIRAM puro g 40 (g/l 450)
Coformulanti q. b. a g 100

NOCIVO **Pericoloso per l'ambiente**

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per inalazione e ingestione. – Irritante per gli occhi e la pelle. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10089 del 13/07/1999
CONTENUTO: ml 100
Riferimento partita n.:

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO"
oppure:
"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA"

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

TOP-GUN

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO - TIPO DI FORMULAZIONE POLVERE BAGNABILE

TOP-GUN

COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:

MICLOBUTANIL puro	g	1
ZOLFO (esente da Selenio) puro	g	30
Coadiuvanti q. b. a		100

FRASI DI RISCHIO - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. – Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207

Stabilimento di produzione: A.D.I.C.A. S.R.L. - Via San Silvestro n. 1 - Faenza (RA) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. - Via Evangelista Torricelli n. 2 - Cotignola (RA) / TORRE S.R.L. - Via Pian D'Asso - Torrenieri Fraz. di Montalcino (SI) - SULPHUR MILLS LIMITED - 1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist. Bharuch. Gujarat (India)

Registrazione del Ministero della Salute n. 11533 del 20/12/2002

Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 100-200-500 Kg 1-5-10

NORME PRECAUZIONALI - Conservare il recipiente ben chiuso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, brancospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. - Terapia sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CAMPI E MODALITÀ D'IMPIEGO

TOP-GUN è un fungicida ad azione sistemica e di copertura, dato dall'unione di due p.a., il Miclobutanil e lo Zolfo.

Viene impiegato sulle seguenti colture:

Vite - contro l'Oidio e il Marciume nero (Black-rot) alla dose di 200-300 g/hl d'acqua ad intervalli di 10-14 giorni a seconda della intensità delle malattie e della differente suscettibilità varietale.

Pesco - contro l'Oidio alla dose di 350-400 g/hl iniziando alla scamiciatura del frutto e proseguendo ad intervalli di 10-14 giorni.

Melo - contro l'Oidio alla dose di 350-400 g/hl ad intervalli di 7-14 giorni in funzione dello sviluppo vegetativo e della intensità della malattia. Contro la Ticchiolatura alla dose di 400 g/hl in miscela con un fungicida di contatto. Inoltre possiede azione cosmetica nei confronti delle varietà sensibili alla rugginosità dei frutti.

Melone, Cocomero, Zucchino, Cetriolo – trattare in pieno campo contro l'Oidio alla dose di 350-400 g/hl d'acqua, alla prima comparsa della malattia e proseguire ad intervalli di 8-10 giorni. Non impiegare su coltura sotto serra o tunnel: lo zolfo contenuto nella miscela potrebbe provocare fitotossicità.

Nota: le dosi sopra riferite sono per trattamenti a volume normale, con bagnatura accurata delle parti suscettibili di malattia; in caso di trattamenti a basso volume impiegare la stessa dose per ettaro di prodotto impiegata in trattamenti a volume normale.

COMPATIBILITA' – Non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina, compatibile con gli insetticidi fosforganici o carbammati.

Avvertenza, in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA': il prodotto contiene una sostanza attiva altamente tossica per gli organismi acquatici

"Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano professionalmente esposte". "Prima di rientrare nelle aree trattate attendere l'asciugatura della vegetazione". "Per lavorazioni agricole successive al trattamento ed entro i tempi di carenza, indossare guanti ed indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle". "Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza".

INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta su melone, cocomero, zucchino, cetriolo; 7 giorni per il pesco e 15 giorni prima della raccolta sulle altre colture.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

TOP-GUN

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO - TIPO DI FORMULAZIONE POLVERE BAGNABILE

TOP-GUN

COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:

MICLOBUTANIL puro	g	1
ZOLFO (esente da Selenio) puro	g	30
Coadiuvanti q. b. a		100

FRASI DI RISCHIO - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Salute n. 11533 del 20/12/2002

Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 100

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO"
oppure:
"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA"

TRIFLURAN

ERBICIDA SELETTIVO
IN FORMULAZIONE LIQUIDA EMULSIONABILE
PER IL CONTROLLO IN PRE-EMERGENZA DI INFESTANTI
GRAMINACEE E DICOTILEDONI DI VARIE COLTURE

TRIFLURAN
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
TRIFLURALIN puro g 45 (g/l 459)
Coformulanti q. b. a 100

IRRITANTE **Pericoloso per l'ambiente**

FRASI DI RISCHIO - Irritante per gli occhi. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / TERRANALISI S.R.L. – Via IV Novembre n. 19/1 – Renazzo di Cento (FE) / ALTHALLER ITALIA S.R.L. - Strada Comunale per Campagna n. 5 - S. Colombano al Lambro (MI) / LIFA S.R.L. – Via Piave (Zona industriale). Isola Vicentina (VI) / LIFA S.R.L. – Via C. Colombo n. 7/7A - Vigonovo (VE) / VE.BI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. - Via Desman n. 43 – Borgoricco (PD)
Registrazione del Ministero della Sanità: n. 6549 del 29/10/1985
CONTENUTO: ml 100-200-250-500 l 1-5-10-20-25
Riferimento partita n.:

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Non conservare presso sorgenti di calore o di fiamme. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Non contaminare corsi d'acqua con l'applicazione diretta del prodotto, con la pulizia delle attrezzature o con l'eliminazione dei rifiuti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE - TRIFLURAN controlla una vasta gamma di infestanti uccidendone i semi all'atto della germinazione. **Infestanti controllate - Graminacee:** digitaria sanguinalis, sorgum halepense, poa annua, setaria glauca, alopecurus agrestis, alopecurus miosuroides, setaria viridis, lolium temulentum. **Infestanti a foglia larga -** Portulaca oleracea, polygonum convolvulus, polygonum oviculare, papaver rhoeas, amarantus retroflexus, galium aparine, chenopodium album, stellaria, veronica, urtica urens, atriplex patula, galeopsis laudanum.

COLTURE PROTETTE - DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
ASPARAGO: interrare 2 settimane prima dell'inizio del taglio dei turioni (non diserbare gli impianti nuovi) alla dose di ℓ 1,5-2/ha. FAGIOLO, FAGIOLINO, CAROTA, FINOCCHIO, RADICCHIO, SEDANO E PREZZEMOLO DA SEMINA, AGLIO, GIRASOLE, COTONE, ARACHIDE E SOIA: interrare da 6 settimane a 1 giorno prima della semina; POMODORO DA SEMINA: trattare irrorando direttamente il terreno tra le file all'epoca del diradamento - interrare immediatamente; POMODORO E PEPERONE DA TRAPIANTO, INDIVIA, SCAROLA, LATTUGA E RADICCHIO DA TRAPIANTO, CAROTA, FINOCCHIO, SEDANO E PREZZEMOLO DA TRAPIANTO: interrare da 1 mese a 1 giorno prima del trapianto; COLZA, RAVIZZONE: interrare da 20 a 1 giorno prima della semina; CAVOLO, CAVOLFIORE, CIPOLLA da trapianto: interrare da 15 giorni a 1 giorno prima del trapianto; CAVOLO, CAVOLFIORE da semina: interrare da 3 settimane a 1 giorno prima della semina; MELONE, COCOMERO, CETRIOLO: applicare al momento del diradamento quando la coltura ha raggiunto lo stadio vegetativo di 3-4 foglie, interrando subito dopo; CARCIOFO: distribuire prima dell'impianto dei carducci o dopo l'impianto degli ovuli ed incorporare, per impianti in produzione distribuire tra le file dopo il ricaccio o l'attecchimento ed incorporare immediatamente; MENTA: distribuire il prodotto prima dell'impianto o prima del ricaccio ed incorporare immediatamente; FRAGOLA: incorporare subito dopo la distribuzione, quando si interviene in primavera dopo la ripresa vegetativa; senza incorporamento se il prodotto si applica nei mesi invernali. Si consiglia di effettuare preventive prove parcellari; PORRO: applicare ed interrare nel periodo tra 3 settimane prima del trapianto fino ad 1 giorno prima del trapianto; PATATA: interrare dopo la piantagione dei tuberi nel terreno ad essi sovrastante; PIANTE ORNAMENTALI: applicare ed interrare prima del trapianto delle piante (di un anno) od irrorare direttamente il terreno tra le piante già radicate interrando immediatamente ed avendo cura di distruggere con tale operazione le erbe nate prima del trattamento, in quanto il prodotto agisce solo contro le erbe in stadio di germinello o di plantula; GLADIOLO: applicare ed interrare quando i bulbi hanno un diametro di cm 2,5 circa da 20 a 1 giorno prima della semina; PERO, MELO, PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO, MANDORLO, ARANCIO, LIMONE, MANDARINO, POMPELMO,

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CEDRO, BERGAMOTTO, VITE impianti nuovi: prima dell'impianto applicare ed interrare Trifluran;
- terreni leggeri: ℓ 1/ha
- terreni medio impasto: ℓ 1,5/ha
- terreni pesanti e/o argillosi: ℓ 2/ha.

PERO, MELO, PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO, MANDORLO, ARANCIO, LIMONE, MANDARINO, POMPELMO, CEDRO, BERGAMOTTO, VITE impianti di 2 o più anni: applicare ed interrare Trifluran alla dose di ℓ 2/ha. PISELLO: interrare da 6 settimane a 1 giorno prima della semina: su tutti i terreni: ℓ 1,2-1,5/ha. FRUMENTO, ORZO, SEGALE (a semina autunnale): applicare in pre-emergenza, senza incorporazione nel terreno: terreni leggeri: ℓ 1,2/ha – terreni medi e argillosi: ℓ 1,5/ha. CAMPI DA GOLF: applicare contro le graminacee annuali nel periodo della germinazione dei semi (Marzo-Aprile) senza interramento, ma facendo seguire al più presto una abbondante irrigazione alla dose di ℓ 2/ha.
Istruzioni speciali - Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del TRIFLURAN e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocomero, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza e cavoli, spinacio. Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc.), nella primavera successiva all'applicazione del prodotto. Dopo l'impiego autunnale sui cereali non si devono effettuare altre semine prima di 12 mesi. Non deve essere applicata in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.

COMPATIBILITA' - Il prodotto va impiegato da solo. **FITOTOSSICITA'** - Può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. **AVVERTENZA** - Evitare il congelamento del prodotto conservandolo in locali a temperatura non inferiore ai 5°C. **INTERVALLO DI SICUREZZA** - Per i trattamenti in post-emergenza sospendere le applicazioni 30 giorni prima del raccolto. **ATTENZIONE** da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

TRIFLURAN

ERBICIDA SELETTIVO
IN FORMULAZIONE LIQUIDA EMULSIONABILE
PER IL CONTROLLO IN PRE EMERGENZA DI INFESTANTI
GRAMINACEE E DICOTILEDONI DI VARIE COLTURE

TRIFLURAN
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
TRIFLURALIN puro g 45 (g/l 459)
Coformulanti q. b. a 100

IRRITANTE

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO - Irritante per gli occhi. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Sanità: n. 6549 del 29/10/1985

Riferimento partita n.: CONTENUTO: ml 100

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO"
oppure:
"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA"

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

TRIS DG

FUNGICIDA A BASE DI TRIADIMENOL - FORMULAZIONE: MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono
TRIADIMENOL puro g 5
Coformulanti q. b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su basa allergica (da semplici dermatiti a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia** sintomatica. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
TRIS DG è un fungicida appartenente al gruppo dei triazoli con attività sistemica, preventiva, curativa ed eradicante contro numerose malattie fungine. La sua rapida penetrazione gli permette di sfuggire ad eventuali piogge dilavanti. Indicato contro le seguenti malattie fungine: Mal bianco, Ruggini, sulle seguenti colture: (dosi riferite a q.le acqua)
POMODORO - PEPERONE: contro Oidio g 50 - 100
MELO: contro Oidio g 50 - 80
VITE: contro Oidio g 50 - 100, per trattamenti curativi effettuare 2 - 3 interventi ad intervalli di 7 - 10 giorni di cui il primo all'inizio dell'attacco.
CETRIOLO - MELONE - ZUCCHINO: contro Oidio g 50 - 100
FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE, TRITICALE: contro Oidio e Ruggini a kg 2,5 per ettaro in litri 600 - 800 di acqua trattando alla prima comparsa dei sintomi.
ORNAMENTALI: contro Oidio g 50 - 100

COMPATIBILITA' - Non compatibile con i prodotti alcalini
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di vite, peperone, cetriolo, melone, pomodoro, melo, 7 giorni per lo zucchino. 30 giorni per frumento, orzo, avena, segale, triticale.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

TERRANALISI S.R.L. – Via Nino Bixio, 6 - Cento (FE)

Stabilimento produttore: A.D.I.C.A. S.R.L. - Via Dello Stabilimento n. 11 - Nera Montoro (Terni) / S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. – Via Evangelista Torricelli n. 2 - Cotignola (RA)

Registrazione del Ministero della Salute n. 11087 del 09/11/2001

CONTENUTO: g 50-100-200-500 Kg 1-5-10

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Riferimento partita:

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

TRIS DG

FUNGICIDA A BASE DI TRIADIMENOL - FORMULAZIONE: MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono
TRIADIMENOL puro g 5
Coformulanti q. b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L. – Via Nino Bixio, 6 - Cento (FE)

Registrazione del Ministero della Salute n. 11087 del 09/11/2001
Riferimento partita: CONTENUTO: g 50-100

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO"
oppure:
"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA"

Etichetta per confezione contenente sacchetti idrosolubili

TRIS DG

FUNGICIDA A BASE DI TRIADIMENOL - FORMULAZIONE: MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono
TRIADIMENOL puro g 5
Coformulanti q. b. a g 100

CONTIENE SACCHETTI IDROSOLUBILI

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: organi interessati: occhi, cute. mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su basa allergica (da semplici dermatiti a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea. vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia** sintomatica. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
TRIS DG è un fungicida appartenente al gruppo dei triazoli con attività sistemica, preventiva, curativa ed eradicante contro numerose malattie fungine. La sua rapida penetrazione gli permette di sfuggire ad eventuali piogge dilavanti. Indicato contro le seguenti malattie fungine: Mal bianco, Ruggini, sulle seguenti colture: (dosi riferite a q.le acqua)
POMODORO - PEPERONE: contro Oidio g 50 - 100
MELO: contro Oidio g 50 - 80
VITE: contro Oidio g 50 - 100, per trattamenti curativi effettuare 2 - 3 interventi ad intervalli di 7 - 10 giorni di cui il primo all'inizio dell'attacco.
CETRIOLO - MELONE - ZUCCHINO: contro Oidio g 50 - 100
FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE, TRITICALE: contro Oidio e Ruggini a kg 2,5 per ettaro in litri 600 - 800 di acqua trattando alla prima comparsa dei sintomi.
ORNAMENTALI: contro Oidio g 50 - 100

COMPATIBILITA' - Non compatibile con i prodotti alcalini
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di vite, peperone, cetriolo, melone, pomodoro, melo, 7 giorni per lo zucchino, 30 giorni per frumento, orzo, avena, segale, triticale.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

TERRANALISI S.R.L. – Via Nino Bixio, 6 - Cento (FE)

Stabilimento produttore: S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. – Via Evangelista Torricelli n. 2 - Cotignola (RA)
Registrazione del Ministero della Salute n. 11087 del 09/11/2001
Riferimento partita: CONTENUTO: g 500 (5 x g 50) – Kg 1 (10 x g 100; 5 x g 200)

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

MODO DI UTILIZZO DEI SACCHETTI IDROSOLUBILI

25%

1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua

2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti

3) Introdurre i sacchetti nel l'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore

4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ed...

5)... aggiungere la restante parte d acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato.
STOCCAGGIO - Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

Etichetta per sacchetti idrosolubili

TRIS DG

FUNGICIDA A BASE DI TRIADIMENOL - FORMULAZIONE: MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

ATTENZIONE: SACCHETTO IDROSOLUBILE DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono
TRIADIMENOL puro g 5
Coformulanti q. b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

AVVERTENZA: LEGGERE ATTENTAMENTE IL TESTO DELL'ETICHETTA RIPORTATO SUL CONTENITORE

TERRANALISI S.R.L. – Via Nino Bixio, 6 - Cento (FE)

Registrazione del Ministero della Salute n. 11087 del 09/11/2001

DA NON VENDERSI NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

Riferimento partita: CONTENUTO: g 50-100-200

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

TRISAN

INSETTICIDA DI CONTATTO, INGESTIONE ED ASFISSIA
TIPO DI FORMULAZIONE: LIQUIDO

TRISAN
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
TRICLORFON puro g 40 (g/l 440)
Coformulanti q. b. a g 100
(Contiene Metanolo)

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. – Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA –- Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. – Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI SRL - Via IV Novembre n. 19/1 - Renazzo di Cento (FE) / CHEMIA S.p.a. – Strada Statale n. 255 Km 46 – Sant'Agostino (FE) / SCAM S.R.L. – Via Belluria n. 164 – S. Maria di Mugnano (MO) / TORRE S.r.l. – Via Pian d'Asso – Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 9950 del 12/02/1999
CONTENUTO: ml 100-200-250-500 ℓ 1-5-10-20
Riferimento partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - **Sintomi:** colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsione, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità) **Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
TRISAN è un insetticida che agisce per ingestione, per contatto ed anche per asfissia e viene impiegato sulle seguenti colture:

colture	parassiti	dosi/hl di acqua
agrumi, pesco, ciliegio, susino, melo, pero, fragola, vite, olivo, cavoli, carciofo, asparago, lattughe e simili, sedano, zucca, fagiolo, fava, pisello, fagiolino, carota, cipolla, aglio, patata, barbabietola da zucchero, mais, riso, soia, tabacco, forestali, pioppo, cetriolo, pomodoro, peperone, floreali, ornamentali	larve defogliatrici (tignole, cavolaie, tortricidi) larve minatrici delle foglie, mosche, tentredini, tipule, maggiolini, altiche, dorifora, elateridi, nottue, oziorrinchi, punteruoli, carpocapsa, minatori, grilli, grillotalpa, afidi, aleurodidi, cicadellidi, cimici	ml 120-250
olivo, agrumi, vite, pioppo, pino	mosca dell'olivo, mosca degli agrumi, eulia della vite, criptorrinco del pioppo, processionaria del pino	ml 350-500
risaie	coppette, chironomidi, idrocampo ed altri insetti delle risaie	ℓ 1-1,2/ha
mais	agrotidi, tortricidi e contro la 2^ generazione della piralide del mais	ℓ 3,5/ha

COMPATIBILITA' – Non compatibile con le poltiglie solfocalciche e bordolesi.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA' Il prodotto è tossico per i pesci nocivo per api e artropodi utili, animali domestici e bestiame.
"Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle"; "non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento"; "non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza".
INTERVALLO DI SICUREZZA – Osservare un intervallo di 10 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - NON OPERARE CONTRO VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE - NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

TRISAN

INSETTICIDA DI CONTATTO, INGESTIONE ED ASFISSIA
TIPO DI FORMULAZIONE: LIQUIDO

TRISAN
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
TRICLORFON puro g 40 (g/l 440)
Coformulanti q. b. a g 100
(Contiene Metanolo)

NOCIVO

N

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. – Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. – Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Registrazione del Ministero della Sanità n. 9950 del 12/02/1999
CONTENUTO: ml 100
Riferimento partita n.:

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO"
OPPURE:
"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA"

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

TRITER 75 WP

INSETTICIDA SISTEMICO A BASE DI CIROMAZINA - POLVERE BAGNABILE

TRITER 75 WP
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
CIROMAZINA pura g 75
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO - Irritante per gli occhi e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. – Usare indumenti protettivi e guanti adatti. – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. – Via Nino Bixio n. 6 – Cento (FE)
Registrazione del Ministero della Salute n. 12018 del 18/03/2004
Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 50-100-200-250-500

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare al riparo dall'umidità. - Non respirare le polveri. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non si conoscono casi di avvelenamento nell'uomo. In condizioni sperimentali si sono osservati nei ratti i seguenti sintomi di avvelenamento aspecifici: sedazione, dispnea, esoftalmo, posizione curva e pelo arruffato. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE
TRITER 75 WP è un insetticida sistemico appartenente al gruppo dei regolatori di crescita (IGR), caratterizzato da un' azione prolungata e da una rapida penetrazione nei tessuti vegetali.
Applicato per via radicale viene assorbito dalle radici e traslocato all'interno della pianta.
Trova impiego nella difesa delle colture orticole, floricole, patata e tabacco. Presenta una spiccata azione nei confronti delle larve di ditteri, sulle quali ne inibisce lo sviluppo, risultando specificatamente indicato nella lotta alle larve minatrici del genere Lyriomyza spp.
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
TRITER 75 WP si impiega in serra e pieno campo sulle colture seguenti:
ORTICOLE: carciofo, cetriolo, cocomero, lattuga (solo pieno campo), **melanzana, melone, pomodoro, sedano, zucchino, FLORICOLE** (crisantemo, garofano, gerbera, gipsofila), **PATATA, TABACCO.**
Trattamenti fogliari: in serra alla dose di g 500 per ettaro di superficie, aumentando la dose a g 600 negli interventi di pieno campo. Intervenire alla comparsa delle prime mine, ripetendo l'intervento a distanza di 7-14 giorni.
Trattamenti al terreno: alla dose di g 0,1-0,25/pianta, pari a Kg 1-2 per ettaro di superficie.
TRITER 75 WP può essere applicato anche con l'ausilio dei tradizionali impianti d'irrigazione a goccia o a manichetta, alla dose di g 300-600 per ettaro di superficie, avendo cura di ripetere l'intervento a distanza di 15-20 giorni.

FITOTOSSICITA' - Si consiglia di eseguire saggi preliminari su piccole superfici al fine di verificare eventuali sensibilità varietali.
COMPATIBILITA' - Il prodotto risulta compatibile con fungicidi ed insetticidi purché a reazione non fortemente alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA:
35 GIORNI patata
14 GIORNI carciofo, cetriolo, cocomero, lattuga, melanzana, melone, pomodoro, sedano, zucchino, tabacco

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante. alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

TRITER 75 WP

INSETTICIDA SISTEMICO A BASE DI CIROMAZINA - POLVERE BAGNABILE

TRITER 75 WP
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
CIROMAZINA pura g 75
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO - Irritante per gli occhi e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. – Usare indumenti protettivi e guanti adatti. – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207

IRRITANTE

Registrazione del Ministero della Salute n. 12018 del 18/03/2004
Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 50-100

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO"
oppure:
"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA"

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

VAMITER

AFICIDA-INSETTICIDA SISTEMICO
CON AZIONE SECONDARIA SUGLI ACARI
FORMULAZIONE: CONCENTRATO EMULSIONABILE

VAMITER
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
VAMIDOTION puro g 37,5 (g/l 402)
Coformulanti q. b. a 100

TOSSICO

Pericoloso per l'ambiente

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290 del 23/04/2001.
FRASI DI RISCHIO - Nocivo a contatto con la pelle. - Tossico per ingestione. - Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. – Via IV Novembre n. 19/1- Renazzo di Cento (FE) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164 – Modena / TORRE S.r.l. – Via Pian d'Asso – Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 9770 del 01/10/1998
CONTENUTO: ml 100-200-500 ℓ 1-5-10-15
Riferimento partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsione, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
VAMITER è un insetticida sistemico con persistenza d'azione di oltre tre settimane, rapidamente assorbito dalle foglie e distribuito in tutta la pianta riuscendo a colpire anche i fitofagi in posizione riparata e, per la sua persistenza, a proteggere i giovani germogli in crescita.

colture	parassiti	dosi/q.le acqua
POMACEE	afidi, ragnetti rossi (acari), ditteri, cecidomidi e cicaline	ml 125

COMPATIBILITA' - Non miscelare con sostanze alcaline.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

"Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle"; "non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore"; "non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza".

"**ATTENZIONE**: il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate".

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

VAMITER

AFICIDA-INSETTICIDA SISTEMICO
CON AZIONE SECONDARIA SUGLI ACARI
FORMULAZIONE: CONCENTRATO EMULSIONABILE

VAMITER
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
VAMIDOTION puro g 37,5 (g/l 402)
Coformulanti q. b. a 100

TOSSICO **Pericoloso per l'ambiente**

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290 del 23/04/2001.
FRASI DI RISCHIO - Nocivo a contatto con la pelle. - Tossico per ingestione. - Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Registrazione del Ministero della Sanità n. 9770 del 01/10/1998
CONTENUTO: ml 100
Riferimento partita N.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO"
OPPURE:
"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA"

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

VENTUREX 65 DG

ANTICRITTOGAMICO ACUPRICO AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA – GRANULI IDRODISPERSIBILI

VENTUREX 65 DG
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
DODINA pura g 65
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per ingestione. - Irritante per gli occhi e la pelle. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il mecico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

N

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.a. – Via Evangelista Torricelli n. 2 – Cotignola (RA)
Registrazione del Ministero della Salute n. 11246 del 19/03/2002
Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 50-100-250-500 Kg 1-5-10-20

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardio-circolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia. Irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE – VENTUREX 65 DG è un anticrittogamico organico dotato di azione preventiva e curativa nei confronti della Ticchiolatura delle pomacee e per la lotta contro numerose altre crittogame che attaccano le colture eduli, ornamentali e floreali.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

POMACEE - Melo, Pero contro Ticchiolatura (Venturia inaequalis, pirina): trattamento preventivo in primavera **(gemme rigonfie) g 70-80/hl – trattamento curativo** dalla comparsa dei primi sintomi fino alla fase di frutto a noce (entro 60 ore dalla pioggia infettante) g 120/hl. **Nespolo** contro Ticchiolatura: trattamento preventivo in primavera alla fase di gemme rigonfie g 70/hl – trattamento curativo dalla comparsa dei primo sintomi alla fase di frutto sviluppato g 80-120/hl. **DRUPACEE – Ciliegio** contro Antracnosi (Sphaceloma spp.) e Cilindroporiosi (Cylindrosporium padi): trattamenti preventivi da subito dopo la fioritura eseguire 3 interventi distanti circa 10-15 giorni alla dose di g 80-100/hl – contro Marciume bruno (Monilia laxa, fructigena): trattamenti preventivi dalla fase di pre-fioritura alla dose di g 80-100/hl. **Albicocco** contro Ruggine (Tranzschelia pruni): trattamenti preventivi durante l'estate alla dose di g 80-100/hl - contro Marciume bruno (Monilia laxa, fructigena): trattamenti preventivi dalla pre-fioritura fino alla scamiciatura g 80-100/hl - contro Corineo (Coryneum beijerinkii): trattamenti preventivi alla caduta delle foglie (trattamenti al bruno) e alla ripresa vegetativa alla dose di g 80-100/hl. **Pesco** contro Bolla (Taphrina deformans): trattamenti preventivi alla caduta delle foglie (trattamenti al bruno) e inizio rigonfiamento delle gemme g 80-120/hl – contro Corineo (Coryneum beijerinkii): trattamenti curativi in piena vegetazione g 80/hl – contro Marciume bruno (Monilia laxa, fructigena): interventi preventivi dalla pre-fioritura alla scamiciatura; interventi curativi in pre-raccolta alla dose di g 80-120/hl – contro Ticchiolatura (Megacladosporium carpophilum): interventi preventivi in primavera alla fase di gemme rigonfie g 80/hl – interventi curativi dalla comparsa dei primi sintomi alla fase di frutto sviluppato g 80-120/hl. **ORTICOLTURA – Cipolla** contro Peronospora (Plasmopara destructor): trattamenti preventivi, intervenire a seconda dell'andamento pluviometrico e termico g 100/hl – trattamenti curativi dalla comparsa dei primi sintomi dell'infezione sino allo stadio di maturazione da consumo g 120/hl. **Spinacio** contro Peronospora (P. farinosa) e Ramularia (Ramularia spp.): trattamenti preventivi intervenendo a seconda dell'andamento pluviometrico e termico g 80-100/hl. **Sedano** contro Septoriosi (Septoria apiicola): trattamenti preventivi con irrorazioni all'apparato fogliare da ripetersi se il clima è umido g 100-120/hl. **Finocchio** contro Peronospora (Plasmipara nivea): trattamenti preventivi a cadenza settimanale se le condizioni climatiche sono favorevoli allo sviluppo della crittogama g 80-120/hl. **Lattuga e simili** contro Peronospora (Bremia lactucae) e Septoria (Septoria spp.): trattamenti preventivi a cadenza settimanale se le condizioni climatiche sono favorevoli allo sviluppo della crittogama g 80-120/hl. **Carota** contro Peronospora (Plasmopara nivea) e Cercospora (Cercospora carotae): trattamenti preventivi a cadenza settimanale se le condizioni climatiche sono favorevoli allo sviluppo della crittogama g 80-120/hl. **Pomodoro** contro Peronospora (Phytophtora infestans) e Septoriosi (Septoria lycopersici): trattamenti preventivi appena dopo che si sono manifestate le condizioni favorevoli allo sviluppo dell'infezione e ripetere il trattamento a cadenza quindicinale, a seconda dell'andamento pluviometrico e termico g 100-120/hl – contro Fusariosi (Fusarium oxysporum): trattamenti preventivi, irrorare il terreno e il colletto delle piantine g 200/hl (distribuire g 3-4/mq). **Cocomero, Melone, Zucca, Zucchino, Cetriolo** contro Peronospora (Pseudoperonospora cubensis) e Antracnosi (Colletotrichum lagenarium): trattamenti preventivi in post-trapianto a seconda dell'andamento pluviometrico e climatico g 80-120/hl. **PATATA** contro Peronospora (Phytophtora infestans): trattamenti preventivi intervenendo poco prima della fioritura a g 80-120/hl. **FRAGOLA** contro Muffa grigia (Botrytis cinerea) e Vaiolatura (Mycosphaerella fragarie): trattamenti preventivi intervenendo dalla fase ci pre-fioritura a g 120/hl. **VITE** contro Peronospora (Plasmopara viticola): trattamenti preventivi intervenendo alla formazione dei grappoli, all'inizio cella fioritura e poco dopo l'allegagione a g 90-120/hl. **OLIVO** contro Occhio di pavone (Cycloconium oleaginum): trattamenti preventivi intervenendo in pre-fioritura a g 90-120/hl - trattamenti curativi intervenendo nella fase di frutto ingrossato a g 100/hl. **PIOPPICOLTURA** contro Bronzatura del pioppo (Marssonina brunnea): trattamenti preventivi intervenendo al risveglio vegetativa a g 80/hl - trattamenti curativi intervenendo sulla vegetazione primaverile ed estiva a g 120/hl. **ROSA** contro Ticchiolatura (Diplocarpon rosae): trattamenti curativi intervenendo alla prima comparsa dei sintomi a g 60/hl. **GAROFANO** contro Fusariosi (Fusarium culmorum, dianthi, poae): trattamenti preventivi intervenendo sul terreno a g 80-100/hl. **ORNAMENTALI** (Dracaena, Sanseveria, Yucca, Ficus, ecc.) contro Alternaria (Alternaria spp.), Antracnsi (Colletotrichum spp.), Fusariosi (Fusarium spp.), Cladosporiosi (Cladosporium spp.), Peronospora (Plasmopara spp.), Ruggine (Puccinia spp.), Septoria (Septoria spp.), Ticchiolatura (Fusicladium spp.): trattare alla comparsa dei primi sintomi delle crittogame a g 100-150/hl. **CONCIA DI BULBI DEI FIORI** contro Marciumi (Fusarium spp.): trattamenti preventivi immergendo il materiale da disinfettare in una soluzione allo 1,3-1,5 g/l di VENTUREX 65 DG per circa 15-20 minuti (g 130-150/hl).

COMPATIBILITA'- Il prodotto non è compatibile con formulati a reazione alcalina, clorobenzilati, dimetoato, azinfos metile, carbaril. Miscele con formulazioni emulsionabili a base di esteri fosforici e con oli minerali possono dare luogo a scarsa sospensibilità. Non trattare con acque troppo fredde con temperature prossime a 0°C. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. **FITOTOSSICITA' –** Per la Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%. Su tutte le colture sopraindicate si raccomanda di effettuare saggi varietali onde accertare fenomeni di sensibilizzazione al formulato. **Avvertenza:** da non impiegare durate la fioritura. **RISCHI DI NOCIVITA'** – Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona, persone non protette, animali domestici e bestiame. Tossico per le api. **INTERVALLO DI SICUREZZA** - Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.
Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore cal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle; non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

VENTUREX 65 DG

ANTICRITTOGAMICO ACUPRICO AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA – GRANULI IDRODISPERSIBILI

VENTUREX 65 DG
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
DODINA pura g 65
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per ingestione. - Irritante per gli occhi e la pelle. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Salute n. 11246 del 19/03/2002
Riferimento partita N.:
CONTENUTO: g 50-100

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "
OPPURE:
" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

VENTUREX D 65

FUNGICIDA ORGANICO IN POLVERE BAGNABILE AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA

VENTUREX D 65
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
DODINA pura g 65
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per ingestione. - Irritante per gli occhi e la pelle. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / CHEMIA S.p.a. – Strada Statale n. 255 Km 46 – Sant'Agostino (FE) / SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164 – Modena / S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.a. – Via Evangelista Torricelli n. 2 – Cotignola (RA)
Riferimento partita N.: Registrazione del Ministero della Sanità n. 1994 del 12/04/1976 CONTENUTO: Kg 1

NORME PRECAUZIONALI - Conservare il recipiente ben chiuso. - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciosi gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia. Irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia. **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni

DOSI- EPOCHE - MODALITA' D'IMPIEGO - Per 100 litri di acqua

Colture	Parassiti	Dosi	Note
Melo, pero	ticchiolatura	g 60-120	
		g 60-80	In funzione preventiva intervenendo ogni 6-7 giorni
		g 90-120	Intervenire entro 48-72 ore dall'inizio della pioggia infettante esplica una buona azione curativa
Nespolo	ticchiolatura	g 80-100	Un completo schema di interventi prevede 6 trattamenti da effettuarsi in corrispondenza delle seguenti fasi vegetative: bottoni floreali chiusi, caduta dei petali, allegagione, frutticini formati, frutticini ingrossati, prima dell'invaiatura
Pioppo	marsonnina	g 80-100	Intervenire a fine Aprile e nella seconda metà di Maggio, eventualmente ripetendo il trattamento a distanza di 3-4 settimane
Cipolla	peronospora	g 60-80	Trattamenti preventivi
		g 100-200	Trattamenti curativi
Pesco, albicocco, ciliegio	monilia, sclerotinia	g 80-100	Trattamenti preventivi - effettuare almeno 3 trattamenti all'apertura dei petali, alla fine della fioritura ed alla petalocaduta
Pesco	bolla	g 130-180	In autunno dopo caduta foglie e in pre-fioritura
Ciliegio	antracnosi	g 80	Trattamenti preventivi - effettuare almeno 3 trattamenti, iniziando subito dopo la fioritura ad intervalli di ca. 10-15 giorni
Olivo	occhio di pavone	g 100-120	Effettuare 2 interventi - primaverile: alla ripresa vegetativa delle gemme; autunnale: fra fine Settembre ed i primi di Ottobre
Vite	peronospora	g 50-100	Trattamenti preventivi
		g 100-120	Trattamenti curativi
Fragola	muffa grigia, vaiolatura	g 60-100	Trattamenti preventivi
		g 100-120	Trattamenti curativi
Insalata, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, zucche, patata, cocomeri, cavoli, carota, aglio, cipolle	varie crittogame	g 60-100	Tratamenti preventivi
		g 100-120	Trattamenti curativi
Floreali, pioppo, ornamentali (garofano, rosa, bulbose ed altre ornamentali)	alternarie, antracnosi, cladosporiosi, fusariosi, peronospore, ruggini, septoriosi, ticchiolature	g 100	Trattamenti preventivi
		g 150	Trattamenti curativi e ripetere ad intervalli di 7-10 giorni

COMPATIBILITA'- Non è compatibile con i Clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina; non è consigliabile miscelarlo con Carbaril, Dimetoato, Metilazinfos, D.D.V.P.; le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e di olii minerali possono dar luogo a scarsa sospensività; evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0°C.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - per la Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05 %.
TOSSICITA' - Il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci. Da non impiegare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ZOLFO-FEN

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE BAGNABILE CONTRO L'OIDIO DELLA VITE

ZOLFO-FEN
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
FENARIMOL puro g 0,35
ZOLFO puro (selenio assente) g 50
Coadiuvanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. – Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. – Via Nino Bixio N. 6 – Cento (FE) / CHEMIA S.P.A. – Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / DIACHEM S.P.A.- Unità produttiva SIFA - S.S. Padana Superiore – Caravaggio (BG) / SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164 – Modena / S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. - Via Evangelista Torricelli n. 2 - Cotignola (RA) / VEBI s.a.s. di Bazzolo Dr. Luigi - Via Desman n. 43 - Borgoricco (PD)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 8867 del 10/06/1996
Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 100-200-250- 500 Kg 1-5-10-20-25

NORME PRECAUZIONALI Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE – ZOLFO-FEN è una miscela di due principi attivi, il Fenarimol e lo Zolfo, efficace per il controllo dell'Oidio della vite. Il prodotto è in grado di esplicare attività protettiva esterna, tipica dello Zolfo ed endoterapica per la presenza di Fenarimol.
SETTORI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
VITE: contro Oidio impiegare g 150-200/hl. Effettuare i trattamenti ogni 7-14 giorni nel caso di uve da vino e ogni 7-10 giorni nel caso di uve da tavola, in funzione delle condizioni ambientali. Dopo l'allegagione adottare la dose più alta.

COMPATIBILITA' – ZOLFO-FEN non è compatibile con gli antiparassitari alcalini (Polisolfuri, Poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, DDVP, Diclofluanide.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' Il prodotto può arrecare danno alla vite Sangiovese. Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali. In estate non effettuare i trattamenti nelle ore più calde del giorni. In caso di temperature elevate usare la dose più bassa.
INTERVALLO DI SICUREZZA – Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ZOLFO-FEN

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE BAGNABILE CONTRO L'OIDIO DELLA VITE

ZOLFO-FEN
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
FENARIMOL puro g 0,35
ZOLFO puro (selenio assente) g 50
Coadiuvanti q. b. a 100
FRASI DI RISCHIO - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. – Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207

IRRITANTE

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8867 del 10/06/1996
Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 100

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "
OPPURE:
" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

ZOLVIS 90

ZOLFO BAGNABILE MICRONIZZATO

ZOLVIS 90

COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
ZOLFO attivo micronizzato puro (esente ca Selenio) g 90.16
Disperdenti ed inerti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. – Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207

IRRITANTE

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / L.I.F.A. S.r.l. – Via Piave (Zona Industriale) – Isola Vicentina (VI) / L.I.F.A. S.r.l. – Via C. Colombo n. 7/7° - Vigonovo (VE) / S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. - Via Evangelista Torricelli n. 2 - Cotignola (RA) / SULPHUR MILLS LIMITED, 1904-1905 G.I.D.C. Panoli, Dist. Bharuch, Gujarat (India)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 4283 del 01/04/1981
Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 100-200-250-500 Kg 1-5-10-20-25

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
ZOLVIS 90 è un fungicida a base di Zolfo bagnabile finemente micronizzato, con alto titolo di principio attivo, adesivo, indicato per combattere tutte le forme di oidio o mal bianco e più specificatamente:
- Oidio o mal bianco e ticchiolatura delle **pomacee** alle seguenti dosi: trattamenti pre-fiorali g 300, in fioritura g 200, nel periodo primaverile-estivo g 100.
- Oidio o mal bianco della **vite,** g 100-150 con dose minima nel periodo più caldo.
- Oidio o mal bianco delle **colture ortive (zucca, zucchino, cetriolo, radicchio, carciofo, cocomero, melone) ed ornamentali** a g 120-180 durante il periodo vegetativo.
Le dosi sono riferite a quintale acqua.

COMPATIBILITA'- Non è compatibile con prodotti fitosanitari alcalini (Polisolfuri, Poltiglia bordolese, ecc.) con Olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacril, Diclofluanide.
Avvertenza - Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli Olii minerali e del Captano.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Può essere dannoso alle seguenti cultivar di:
Mele - Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap. **Pere** - Buona Luisa D'Avraaches, Contessa di Parigi, Kaiser, Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio. **Vite** - Sangiovese.
Cucurbitacee - può essere fitotossico.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta
ATTENZIONE da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ZOLVIS 90

ZOLFO BAGNABILE MICRONIZZATO

ZOLVIS 90

COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:

ZOLFO attivo micronizzato puro (esente da Selenio) g 90,16

Disperdenti ed inerti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. – Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207

IRRITANTE

Registrazione del Ministero della Sanità n. 4283 del 01/04/1981

Riferimento partita N.:

CONTENUTO: g 100

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "
OPPURE:
" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ZOLVIS 80 COLLOIDALE

ANTICRITTOGAMICO A BASE DI ZOLFO COLLOIDALE

ZOLVIS 80 COLLOIDALE
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
Zolfo attivo puro (esente da Selenio) g 80.36
Disperdenti ed inerti q.b. a g 100
FRASI DI RISCHIO - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. – Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207

IRRITANTE

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. – Via Nino Bixio N. 6 – Cento (FE) /
LIFA S.R.L. – Via Piave (Zona industriale) - Isola Vicentina (VI) / LIFA S.R.L. – Via C. Colombo n. 7/7A - Vigonovo (VE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 4286 del 01/04/1981
Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 100-200-250- 500 Kg 1-5-10-20-25

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
ZOLVIS 80 COLLOIDALE è un fungicida a base di Zolfo colloidale che si ottiene mediante un procedimento chimico che conferisce alle particelle la caratteristica di essere estremamente fini, permettendo una uniforme dispersibilità in acqua.
ZOLVIS 80 COLLOIDALE viene impiegato per combattere le varie forme di oidio o mal bianco che attaccano le seguenti colture:
Vite - g 100 per trattamenti preventivi, g 150 per trattamenti curativi.
Pomacee (melo - pero) - g 200-250 sul verde, g 350-450 per trattamenti invernali, anche con effetti sulla ticchiolatura.
Olivo, pesco, colture ortive (zucca, zucchino, cetriolo, radicchio, carciofo, cocomero, melone) ornamentali e floreali in campo in serra - g 150-200 nel periodo vegetativo.
Le dosi sono riferite a quintale acqua.

COMPATIBILITA'- Non è compatibile con prodotti fitosanitari alcalini (Polisolfuri, Poltiglia bordolese, ecc.) con Olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacryl, con Diclofluanide
Avvertenza - Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli Olii minerali e del Captano.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di inotssicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Può essere dannoso alle seguenti cultivar di:
Mele - Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap. **Pere -** Buona Luisa D'Avraanches, Contessa di Parigi, Kaiser, Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio. **Vite -** Sangiovese. **Cucurbitacee:** può essere fitotossico.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta
ATTENZIONE da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ZOLVIS 80 COLLOIDALE

ANTICRITTOGAMICO A BASE DI ZOLFO COLLOIDALE

ZOLVIS 80 COLLOIDALE
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
Zolfo attivo puro (esente da Selenio) g 80,36
Disperdenti ed inerti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. – Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Sanità n. 4286 del 01/04/1981
Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 100

IRRITANTE

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "
OPPURE:
" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

ZERO

ANTICRITTOGAMICO LIQUIDO A BASE DI ZIRAM

ZERO
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
ZIRAM puro g 27 (g/l 300)
Coformulanti q. b. a 100

MOLTO TOSSICO

Pericoloso per l'ambiente

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290 del 23/04/2001.
FRASI DI RISCHIO - Nocivo per ingestione. - Molto tossico per inalazione. - Irritante per le vie respiratorie. - Rischio di gravi lesioni oculari. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. - In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: CHEMIA SPA - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / CHIMAC-AGRIPHAR S.A. - Rue De Renory 26 - B-4102 Ougree-Belgio / SCAM SRL - Via Bellaria n. 164 - Modena
Registrazione del Ministero della Sanità n. 8218 del 16/03/1993
CONTENUTO: ml 100-250-500 ℓ 1-5-10-20
Riferimento partita N.

NORME PRECAUZIONALI - Conservare il recipiente ben chiuso.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparto respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC**: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia:** sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
ZERO si impiega nei trattamenti primaverili-estivi nelle seguenti dosi per ettolitro di acqua:
melo e pero - contro Ticchiolatura: ml 500-600
peschi e susini - contro Bolla e Gommosi: ml 300-400
colture orticole (fagioli, sedani, patate, pomodori) - contro Septoria e Alternaria: ml 400-500
colture floreali (rose, garofani, crisantemi, gladioli, fiori di pesco) - contro Ticchiolatura e Peronospora delle rose, Botritis e Peronospora del Crisantemo, Botritis e Septoria del gladiolo, Alternaria del garofano, Bolla e Gommosi del fiore di pesco: ml 400-500.

Nei trattamenti autunno-inverno alle seguenti dosi per ettolitro di acqua:
peschi, susini, ciliegi, albicocchi - contro Gommosi parassitaria e Bolla: ml 1200-1400.

MISCIBILITA' - Non è miscibile con prodotti a reazione alcalina (poltiglia bordolese e polisolfuri) e con olii minerali.
AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono anche essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può arrecare qualche danno ai giovani rametti delle CV di pesco: Dixired, Cardinal e Red Haven. Sono inoltre sensibili allo Ziram le seguenti varietà di pero: Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona d'estate.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ACUPRICO 90

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE BAGNABILE A BASE DI ZIRAM

ACUPRICO 90
COMPOSIZIONE – g 100 di prodotto contengono:
ZIRAM puro g 85,5
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290 del 23/04/2001.
FRASI DI RISCHIO – Nocivo per ingestione. – Molto tossico per inalazione. - Irritante per le vie respiratorie. - Rischio di gravi lesioni oculari. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

MOLTO TOSSICO

N

Pericoloso per l'ambiente

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. - In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: CHEMIA S.p.a. – Strada Statale n. 255 Km 46 – Sant'Agostino (FE) / ISAGRO S.P.A. – Via Nettunense Km 23,400 – Aprilia (LT) / TAMINCO N.V. – Pantserschipstraat 207, B-9000 Gent (Belgium) / SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164 - Modena
Registrazione del Ministero della Sanità n. 0599 del 17/02/1972
Riferimento partita N.: CONTENUTO: Kg 5-10

NORME PRECAUZIONALI Conservare il recipiente ben chiuso. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - **Sintomi: cute:** eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
ACUPRICO 90 si impiega a **dosi variabili da 100 a 250 grammi per ettolitro di acqua nei <u>trattamenti al verde</u>** contro la Ticchiolatura del melo e del pero, cancro dei rametti. Septoria, Alternaria, Ruggine delle colture orticole (fragola, patata, sedano, cocomero, melone) e floreali in pieno campo.
Alla dose di 400-600 grammi per ettolitro di acqua si usa nei <u>trattamenti autunno-invernali</u> alle drupacee contro la gommosi parassitaria e la bolla.

COMPATIBILITA'- Il prodotto è miscibile con tutti i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono anche essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ACUPRICO L 30

ANTICRITTOGAMICO LIQUIDO A BASE DI ZIRAM

CUPRICO L 30
OMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
RAM puro g 27 (g/l 300)
oformulanti q. b. a 100

MOLTO TOSSICO Pericoloso per l'ambiente

TTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è nsentito esclusivamente al personale qualificato munito del tentino di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290 del 23/04/2001.

RASI DI RISCHIO - Nocivo per ingestione. - Molto tossico per alazione. - Irritante per le vie respiratorie. - Rischio di gravi lesioni ulari. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - ocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione olungata per ingestione. - Altamente tossico per gli organismi quatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per mbiente acquatico.

ONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare sotto chiave e fuori della rtata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e bondantemente con acqua e consultare un medico. - In caso di ntatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente n acqua e sapone. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare dumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. - caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il edico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Questo materiale e il o contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non spardere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede formative in materia di sicurezza. - In caso di incidente per alazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e antenerlo a riposo.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
abilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L - Via IV Novembre 19/1 - Renazzo di Cento (FE) / CHEMIA S.p.a. – Strada Statale n. 5 Km 46 – Sant'Agostino (FE)
egistrazione del Ministero della Sanità n. 4275 del 27/03/1981
CONTENUTO: ml 250-500 ℓ 1-5-10-20
ferimento partita N.

NORME PRECAUZIONALI - Conservare il recipiente ben chiuso.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato **respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia:** sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
ACUPRICO L 30 si impiega secondo le seguenti dosi e modalità:

in primavera-estate su:
melo e pero - contro Ticchiolatura, Cancro dei rametti, Maculatura bruna: ml 500-600/hl di acqua;
colture orticole (fagioli, sedani, patate, pomodori) - contro Septoria e Alternaria: ml 500-600/hl di acqua;
colture floreali (rose, garofani, crisantemi) - contro Septoria, Alternaria, Antracnosi: ml 500-600/hl di acqua.

In autunno-inverno su:
peschi , susini, ciliegi, albicocchi - contro Gommosi parassitaria, Bolla, Cancro dei rametti: ml 1200-1400/hl di acqua.

COMPATIBILITA'
Non è miscibile con prodotti a reazione alcalina (poltiglia bordolese e polisolfuri) e con olii minerali.
AVVERTENZE
In caso di miscela con altri prodotti fitosanitari deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono anche essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può arrecare qualche danno ai giovani rametti delle CV di pesco: Dixired, Cardinal e Red Haven. Sono inoltre sensibili allo Ziram le seguenti varietà di pero: Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona d'estate.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

CLORAL FL

FUNGICIDA ORGANICO IN PASTA LIQUIDA

:ORAL FL
OMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
.ORTALONIL puro g 40 (g/l 478)
)formulanti q. b. a 100

MOLTO TOSSICO

Pericoloso per l'ambiente

TTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è ınsentito esclusivamente al personale qualificato munito del ıtentino di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290 del 23/04/2001.

RASI DI RISCHIO - Molto tossico per inalazione. - Irritante per le e respiratorie. - Possibilità di effetti cancerogeni - prove sufficienti. - Rischio di gravi lesioni oculari. - Può provocare ınsibilizzazione per contatto con la pelle. - Altamente tossico per organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti ıgativi per l'ambiente acquatico.

ONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare sotto chiave e fuori della ıtata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e ı bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e ›bondantemente con acqua e consultare un medico. - In caso di ıntatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente ın acqua e sapone. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare dumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. - caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il edico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Questo materiale e il ›o contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non sperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede formative in materia di sicurezza. - In caso di incidente por alazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e antenerlo a riposo.

TERRANALISI S.R.L.

Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
abilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L - Via IV Novembre 19/1 - Renazzo di Cento (FE) / CHEMIA S.p.a. – Strada Statale n. 35 Km 46 – Sant'Agostino (FE) / CHIMAC-AGRIPHAR S.A., Rue e Renory n. 26, B-4102 Ougree (Belgium) / SCAM S.R.L. - Via ellaria n. 164 - Modena
egistrazione del Ministero della Sanità n. 8199 del 16/03/1993
ferimento partita N. CONTENUTO: ℓ 1-5

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare il recipiente ben chiuso. - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per la cute le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzazione. Può provocare danni renali ed atassia.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche - Fungicida organico in pasta liquida ad ampio spettro di efficacia e con alta persistenza di azione, attivo per la difesa di alcuni ortaggi, patata, pesco, colture ornamentali e floreali.
Si impiega in trattamenti liquidi contro: Botrytis, Peronospora, Ticchiolatura, Alternaria, Septoria, Antracnosi delle colture orticole, floreali e ornamentali; Botritys e Sclerotinia, Rhizopus, Gloeosporium, Penicillum del pesco.
DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi di seguito indicate per 100 litri di acqua distribuiti con pompe a volume normale (pari a 500-1000 litri/ha di colture erbacee, secondo il loro sviluppo vegetativo).
Pomodoro - contro Peronospora, Septoria, Ticchiolatura, Alternaria, Antracnosi e Botrytis: ml 250-400 (massimo tre trattamenti).
Cetriolo, melone - contro Antracnosi e Botrytis: ml 200-250,
- contro Alternaria e Septoria: ml 250-300 (massimo tre trattamenti).
Colture floricole (rosa, garofano, gladiolo e crisantemo) e ornamentali - contro Botrytis, Peronospora, Ticchiolatura, Alternaria, Septoria: ml 250-400.
Patata - contro Peronospora e Alternaria: ml 250-300 (= 2-2,5 ℓ/ha) (massimo due trattamenti).
Pesco - in trattamenti in vegetazione, contro Botrytis, Sclerotinia, Rhizopus, Gloeosporium, Penicillium: ml 250-300;
- in trattamenti pre-raccolta: ml 300-400 (impiego consentito solo se miscelato con fungicidi sistemici) (massimo 4 trattamenti).
Per tutti gli impieghi sopra indicati, intervenire principalmente con trattamenti preventivi secondo i normali calendari dei trattamenti.

Preparazione delle poltiglie - diluire la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte, indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

COMPATIBILITA' - Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari in polvere bagnabile di impiego primaverile-estivo ad eccezione delle miscele alcaline come poltiglia bordolese e polisolfuri. Qualora si desiderasse effettuare miscela con liquidi emulsionabili, normalmente sconsigliate, controllare la compatibilità degli stessi con prove preliminari.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Dato l'elevato numero di varietà delle specie orticole, floreali e frutticole, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici, prima di passare al trattamento di superfici più ampie.
RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta per gli ortaggi. Per il pesco 21 giorni.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

OVERTY S.r.l.

ETICHETTA

RAPIDOGREEN

Insetticida in emulsione acquosa pronto all'uso per piante ornamentali da appartamento e giardino domestico

Composizione:
100g di prodotto contengono:
Cipermetrina pura 0,2 g (= 1.97 g/l)
Emulsionanti, acqua q.b. a 100g

Attenzione: manipolare con prudenza

Consigli di prudenza: conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Precauzioni d'uso: conservare il recipiente ben chiuso. Conservare soltanto nel recipiente originale. Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Evitare di inalare direttamente. Evitare di spruzzare negli occhi.
Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

Informazioni per il medico: sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un centro antiveleni.

Caratteristiche
RAPIDOGREEN è un insetticida piretroide a bassa tossicità ed ampio spettro d'azione contro gli insetti dannosi. RAPIDOGREEN agisce per contatto e per ingestione nei confronti di numerose specie di fitofagi (Afidi, Dialeurodidi, Tortrici, Nottuidi, Tignole, Dorifora, Piralide, Tripidi, Microlepidotteri fillominatori, Cocciniglie, ecc...). RAPIDOGREEN svolge un'azione repellente per le piante trattate. La particolare presentazione in nebulizzatore manuale ne rende pratico e sicuro l'impiego.
Modalità d'impiego
RAPIDOGREEN è un prodotto pronto per l'uso da applicare su tutte le piante da fiore e ornamentali infestate da parassiti. Spruzzare il prodotto su entrambi i lembi delle foglie ad una distanza di 40 – 50 cm circa preferibilmente nelle ore meno calde della giornata, evitando il pieno sole. Evitare di far gocciolare le foglie. Limitare strettamente l'applicazione alla zona occupata dalla pianta.
Compatibilità: il prodotto deve essere usato da solo.
Da impiegarsi esclusivamente per uso floreale e di giardinaggio, per uso domestico da appartamento o giardino.
ATTENZIONE: da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone ed animali.
Prodotto per Piante Ornamentali - Registrazione del Ministero della Salute n. 11747/PPO del 31/07/03

Overty s.r.l. via Vinca 9/11 San Giorgio di Piano (BO)

Stabilimenti di produzione: L.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE) - L.I.F.A. S.r.l. Isola Vicentina (VI) – A.D.I.C.A. S.r.l. Faenza (RA) - Althaller Italia s.r.l. San Colombano al Lambro (MI)
Contenuto netto: 250 – 500 – 750 - 1000 ml - Partita N.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA

Polvin

Polvere insetticida per piante ornamentali

Composizione

Malation puro	5 g
Eccipienti polverulenti	q.b. a 100 g

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Overty srl – Via Vinca 9/11 San Giorgio di Piano (BO) tel. 051 6651816

Stabilimenti di produzione: TERRANALISI srl. – Cento (FE) - L.I.F.A. Srl – Vigonovo (VE)
Prodotto per piante ornamentali
Registrazione del Ministero della Sanità N. 10823/PPO del 11/04/01
Contenuto netto 100 – 200 – 500 g 1 kg e Partita N.

PRECAUZIONI D'USO: Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare guanti in gomma o PVC. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non ingerire. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Conservare soltanto nel recipiente originale. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
MALATHION Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Elimina afidi, acari, tripidi, tingidi, larve di lepidotteri e tutti i più comuni insetti delle piante ornamentali e da fiore.
MODALITA' D'IMPIEGO
Contro gli insetti della parte aerea: Spargere il prodotto in modo uniforme sulle piante avendo cura di non toccare la superficie trattata. Applicare tenendo la confezione lontano dal viso e dal corpo e a non più di 20 centimetri di altezza sopra la pianta.
Contro gli insetti terricoli: Dopo aver inumidito il terreno, spargere il prodotto in modo uniforme avendo cura di non calpestare la superficie trattata. Applicare tenendo la confezione lontano dal viso e dal corpo e a non più di 20 centimetri di altezza. Annaffiare dopo il trattamento. Non utilizzare all'aperto in caso di vento. Per l'uso su piante da vaso avere cura di non spargere il prodotto fuori dal vaso.
Non utilizzare in associazione con altri prodotti per piante ornamentali.
Da impiegarsi esclusivamente per uso floreale e di giardinaggio, per uso domestico da appartamento o giardino.
ATTENZIONE: da non impiegare in agricoltura e su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone ed animali.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

OLIGREEN

INSETTICIDA ANTICOCCIDICO PER PIANTE ORNAMENTALI

Composizione
Olio minerale paraffinico g 80 (= 680 g/l)
Acqua ed emulsionanti q.b. a 100

Attenzione: manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRECAUZIONI D'USO
Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare i vapori. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle. Dopo la manipolazione e in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore e l'etichetta. Conservare soltanto nel recipiente originale. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare I locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti, sciacquandoli dopo l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: OLIGREEN combatte cocciniglie ed uova di acari.
DOSI E MODALITÀ' D'IMPIEGO
10 ml di OLIGREEN (pari al contenuto di 1 tappo e mezzo) in 1 litro d'acqua da preparare nel modo seguente: versare 10 ml in 100 ml d'acqua, agitare energicamente e successivamente versare acqua sino ad ottenere 1 litro di soluzione pronta per l'uso. Distribuire con spruzzatore. Preparare sempre e solo il quantitativo necessario per l'impiego immediato.
Non utilizzare in associazione con altri prodotti per piante ornamentali
Da impiegarsi esclusivamente per uso floreale e di giardinaggio, per uso domestico da appartamento o giardino.
ATTENZIONE: da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone ed animali

OVERTY S.r.l. – S. Giorgio di Piano (Bologna)

Stabilimenti di produzione:
L.I.F.A. S.r.l. – Vigonovo (VE)
TERRANALISI S.r.l. – Renazzo di Cento (FE)
Prodotto per piante ornamentali
Registrazione del Ministero della Sanità N. 10824/PPO del 11/04/01
Contenuto netto: 100 ml e
Partita N.

Da non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

"DA APPORSI SUL CONTENITORE PER L'IRRORAZIONE DEL PRODOTTO DILUITO"

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

Oligreen

INSETTICIDA ANTICOCCIDICO PER PIANTE ORNAMENTALI

Composizione
-Olio minerale paraffinico g. 80 (= 680 g/lt)
-Acqua ed emulsionanti q.b. a 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

OVERTY S.r.l. – S. Giorgio di Piano (Bologna)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 10824/PPO del 11/04/01
Officine di produzione : L.I.F.A. S.R.L. – VIGONOVO (VE) / TERRANALISI S.r.l. – Renazzo di Cento (FE)
Contenuto 100 ml Riferimento partita : ....

NORME PRECAUZIONALI *: se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione – Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate – durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti sciacquandoli dopo l'uso.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO *: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi pronto soccorso.*

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

METRIGREEN

Insetticida liquido per piante ornamentali da appartamento e giardino domestico

Composizione:
100g di prodotto contengono:
-Cipermetrina pura 5 g (= 45,8 g/l)
-Emulsionanti, solventi q.b. a 100g

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Overty S.r.l. via Vinca 9/11 - San Giorgio di Piano (BO) tel.051 6651816

Stabilimenti di produzione: L.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE) – A.D.I.C.A. S.r.l. Faenza (RA) – Althaller Italia s.r.l. San Colombano al Lambro (MI).
Prodotto per piante ornamentali
Registrazione del Ministero della Salute N. 11746/PPO del 31/07/03
Contenuto netto: 10 – 20 – 25 – 30 – 40 - 50 – 60 – 70 – 80 – 90 –100 ml - Partita N.

PRECAUZIONI D'USO: Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare soltanto nel recipiente originale. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti sciacquandoli dopo l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un centro antiveleni.

Caratteristiche
METRIGREEN è un insetticida piretroide a bassa tossicità ed ampio spettro d'azione contro gli insetti dannosi. METRIGREEN agisce per contatto e per ingestione nei confronti di numerose specie di fitofagi (Afidi, Dialeurodidi, Tortrici, Nottuidi, Tignole, Dorifora, Piralide, Tripidi, Microlepidotteri fillominatori, Cocciniglie, ecc...). METRIGREEN svolge un'azione repellente per le piante trattate. La particolare formulazione in olio vegetale ne rende pratico e sicuro l'impiego.

Dosi e modalità d'impiego
Impiegare il prodotto alla dose di **4 – 6** ml per 1 litro d'acqua (pari a 1 – 1.5 tappi misurino in 1.5 litri di acqua) mescolando accuratamente. La soluzione deve essere irrorata uniformemente sulla pianta, anche dove non si nota la presenza di parassiti. Il trattamento può essere ripetuto dopo 5/6 giorni.
Compatibilità: il prodotto deve essere usato da solo.
Da impiegarsi esclusivamente per uso floreale e di giardinaggio, per uso domestico da appartamento o giardino.
ATTENZIONE: da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone ed animali.

Da non applicare con i mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua - Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

"DA APPORSI SUL CONTENITORE PER L'IRRORAZIONE DEL PRODOTTO DILUITO"
ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

METRIGREEN

INSETTICIDA LIQUIDO PER PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO E GIARDINO DOMESTICO

Composizione del prodotto non diluito
Cipermetrina pura 5 g (45.8 g/l)
Emulsionanti, solventi q.b. a 100g

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Overty S.r.l.
via Vinca 9/11 - San Giorgio di Piano (BO) tel.051 6651816

Stabilimenti di produzione: I.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE) – A.D.I.C.A. S.r.l. Faenza (RA) - Althaller Italia s.r.l. San Colombano al Lambro (MI).

Prodotto per piante ornamentali
Registrazione del Ministero della Salute N. 11746/PPO del 31/07/03
Contenuto netto: 10 – 20 – 25 – 30 – 40 - 50 – 60 – 70 – 80 – 90 –100 ml
Riferimento partita:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA

Luxigreen

INSETTICIDA ANTICOCCIDICO PER PIANTE ORNAMENTALI

Composizione

Olio minerale g. 10
Acqua, emulsionanti, propellenti q.b. a g. 100

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

FRASI DI RISCHIO: Estremamente infiammabile. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di incendio usare estintori a polvere chimica, anidride carbonica o composti alogenati. Usare soltanto in luogo ben ventilato.

Contenuto netto 200 ml	**270**	**e**	**3**
Contenuto netto 250 ml	**335**	**e**	**3**
Contenuto netto 300 ml	**405**	**e**	**3**
Contenuto netto 400 ml	**520**	**e**	**3**
Contenuto netto 500 ml	**650**	**e**	**3**
Contenuto netto 600 ml	**800**	**e**	**3**

Prodotto per piante ornamentali
Registrazione del Ministero della Sanità N. 10821/PPO del 11/04/01
OVERTY S.r.l. – Via Vinca 9/11 S. Giorgio di Piano (BOLOGNA) tel. 051-6651816
Stabilimento di produzione e riempimento: INCO S.n.c. Pianoro (BOLOGNA) - Partita n.

PRECAUZIONI D'USO: Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Conservare soltanto nel recipiente originale. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni.

AVVERTENZE:
Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione - Non fumare.

CARATTERISTICHE
LUXIGREEN, ad azione insetticida, è particolarmente efficace per combattere le diverse specie di cocciniglie e le uova degli acari che infestano comunemente le piante ornamentali e da fiore.
MODALITA' D'IMPIEGO
Non usare il prodotto in quantità eccessiva o impropria. Applicare il prodotto sulle fronde azionando la valvola a piccoli spruzzi successivi e dirigendo il getto sopra e sotto le foglie da una distanza di circa 40-50 centimetri, senza giungere a farle gocciolare. Trattare preferibilmente nelle ore meno calde della giornata, evitando il pieno sole.
Non utilizzare in associazione con altri prodotti per piante ornamentali.
Da impiegarsi esclusivamente per uso floreale e di giardinaggio, per uso domestico da appartamento o giardino.
Attenzione: da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone ed animali.
AGITARE PRIMA DELL'USO - NON CONTIENE GAS PROPELLENTI RITENUTI DANNOSI PER L'OZONO

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

AL

ETICHETTA

Lumagreen

LUMACHICIDA PER PIANTE ORNAMENTALI

Composizione
Metaldeide acetica 5 g
Attrattivi e coformulanti q.b. a 100 g

Attenzione manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRECAUZIONI D'USO: Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Conservare il recipiente ben chiuso. Non ingerire. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Dopo la manipolazione ed in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare guanti in gomma o PVC. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Conservare soltanto nel recipiente originale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua; dose tossica uomo, circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE: Lumagreen è indicato per combattere molluschi gasteropodi (lumache, limacce e chiocciole) nocivi alle piante. La formulazione granulare rende il preparato pronto per l'uso e di facile spargimento. Inoltre i granuli, colorati per attirare i molluschi, si sciolgono lentamente esplicando un'azione prolungata nel tempo. Il lumagreen agisce per ingestione e non presenta alcuna fitotossicità per le colture trattate.
Non danneggia per nulla le piante ed esplica un'azione prolungata nel tempo.
Agisce per ingestione e per contatto. Il prodotto non viene asportato dal vento, né dilavato o reso inefficace dalla pioggia. La sua natura granulare lo rende pronto all'uso e di facile impiego
MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI
Distribuire 10-15 granuli (pari a circa 1 g) per mq. vicino alle piante, preferibilmente dopo una pioggia abbondante o una irrigazione. Per piante in vaso da 30 cm di diametro distribuire 3-5 granuli (pari a circa 0.3 g).
COMPATIBILITA': il prodotto va usato da solo.
Da impiegarsi esclusivamente per uso floreale e di giardinaggio, per uso domestico da appartamento o giardino.
ATTENZIONE: da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone ed animali.

OVERTY S.r.l. – S. Giorgio di Piano (BOLOGNA)

Prodotto per piante ornamentali
Registrazione del Ministero della Sanità N. 10826/PPO del 11/04/01
Stabilimenti di produzione : TERRANALISI S.r.l. – Cento (FE) / L.I.F.A. S.r.l. – Vigonovo (VE) / L.I.F.A. S.r.l. – Isola Vicentina (VI)
Contenuto netto 200 g e - Partita N.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

ETICHETTA

Idrofeni

INSETTICIDA ACARICIDA PER PIANTE ORNAMENTALI

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE **ESTREMAMENTE INFIAMMABILE**

Composizione

-Malathion 0,5 g
-Dicofol 0,15 g
-Propellenti, emulsionanti, acqua q.b. a 100 g

Contiene Dicofol: Può provocare una reazione allergica

FRASI DI RISCHIO: Estremamente infiammabile. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di incendio usare estintori a polvere chimica, anidride carbonica o composti alogenati. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza..

Prodotto per piante ornamentali
Registrazione del Ministero della Sanità N. 10822/PPO del 11/04/01

OVERTY S.r.l. Via Vinca 9/11 S. Giorgio di Piano (BOLOGNA) tel. 051 6651816

Stabilimento di produzione e riempimento: INCO S.n.c. Pianoro (BOLOGNA)

Contenuto netto 250 ml Partita N.

270	e	3

PRECAUZIONI D'USO: Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta). In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
MALATHION Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche , le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
DICOFOL Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica. Avvertenza: consultare un centro antiveleni

Avvertenze:
Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione - Non fumare.

CARATTERISTICHE: IDROFENI è un insetticida a base acqua appositamente studiato per combattere prontamente tutti i parassiti animali (afidi o pidocchi, ragnetti, cimici, cocciniglie, tripidi ecc.) dannosi alle piante ornamentali e da fiore negli appartamenti e nei giardini. le piante trattate vengono protette a lungo e non sono danneggiate dal trattamento.

MODALITA' D'IMPIEGO: Non usare il prodotto in quantità eccessiva od impropria. Spruzzare solo sopra e sotto le foglie e tenendo la bombola ad una distanza di circa 40-50 cm dalla pianta. Nebulizzare il prodotto nella massa del fogliame in relazione alle dimensioni della pianta, con moto uniforme, senza giungere a far gocciolare le foglie (circa 5 secondi per una pianta di medie dimensioni). Non effettuare i trattamenti nelle ore più calde della giornata e su piante giovani.
Non utilizzare in associazione con altri prodotti per piante ornamentali.
Da impiegarsi esclusivamente per uso floreale e di giardinaggio, per uso domestico da appartamento o giardino.
Attenzione: da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone ed animali.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti. bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

AL

ETICHETTA

CRITTOGREEN P.B.

Fungicida in polvere bagnabile per piante ornamentali

Composizione
Zolfo puro (esente da Selenio) 28 g
Rame metallico puro da Ossicloruro di Rame (al 56% di rame) 4,8 g
Bagnanti ed inerti q .b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Overty srl Via Vinca 9/11 - San Giorgio di Piano (BO) tel.051 6651816
Stabilimenti di produzione: Terranalisi S.r.l.– Cento (FE) ; L.I.F.A. S.r.l. – Vigonovo (VE)
Prodotto per piante ornamentali
Registrazione del Ministero della Sanità N. 10825/PPO del 11/04/01
Contenuto netto 100 g e Partita N.

PRECAUZIONI D'USO: Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non ingerire. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore e l'etichetta. Conservare soltanto nel recipiente originale. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: RAME
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamia se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
CRITTOGREEN P.B. previene e combatte le malattie crittogamiche delle piante ornamentali e da fiore (Oidio o Mal bianco, Peronospora, Ruggine, Ticchiolatura ed altri agenti di marciumi). Per la sua particolare composizione può essere usato senza pericolo anche sulle piante più delicate.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Per le piante in piena terra e in vaso: diluire il contenuto di 1 misurino (5 g) di CRITTOGREEN P.B. polvere in 1 litro di acqua e con tale soluzione irrorare le foglie, utilizzando lo spruzzatore. Per prevenire la comparsa di malattie crittogamiche è consigliabile somministrare il CRITTOGREEN P.B. ogni 10 giorni circa.
Nel caso si debbano combattere infezioni in atto, le applicazioni vanno ripetute ogni 7-8 giorni.
Non utilizzare in associazione con altri prodotti per piante ornamentali.
Da impiegarsi esclusivamente per uso floreale e di giardinaggio, per uso domestico da appartamento o giardino.
ATTENZIONE: da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone ed animali.

Da non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

LABIOTOX 90

Fungicida in polvere bagnabile

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Zolfo puro 90 g
(esente da selenio)
Coformulanti q.b.a 100 g

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

L.B.I. - LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - SAN VITTORE OLONA (MI)

Officine di produzione:
L.B.I. S.r.l. - S. Vittore Olona (MI)
L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI)
S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)
VEBI S.r.l. – S. Eufemia di Borgoricco (PD)
Zolfindustria – S. Cipriano Po (PV)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 4809 del 21.05.1982

Contenuto: 1 – 5 - 10 - 25 kg

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico peri consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
LABIOTOX 90 è un antioidico di elevata qualità e purezza, di notevole finezza, adesività e persistenza. La sua attività antioidica si manifesta in funzione della temperatura (l'azione inizia entro i 15 °C e aumenta man mano fino a 38-40 °C.) e dell' umidità relativa (aumenta con il calare dell'umidità).
LABIOTOX 90 è particolarmente indicato sia in fase preventiva che curativa per la lotta di tutte le forme di oidio o mal bianco delle pomacee, drupacee, vite, colture orticole e floreali.
LABIOTOX 90 esplica anche una certa azione sugli acari ed eriofidi della vite e del pesco.

EPOCHE E DOSI D' IMPIEGO.
Sono consigliabili i trattamenti preventivi. Le dosi sotto riportate si riferiscono a quantità di prodotto in 100 litri di acqua.

Pero e melo	
- In pre-fioritura	250-350 g
- in post-fioritura	150-250 g
Ciliegio e Susino	
- dopo la scamiciatura	150-250 g
Vite	
- in pre-fioritura	300-350 g
- in post-fioritura	150-200 g
- a grappoli serrati e all'invaiatura	1 00-150 g
Cotture orticole (cavoli, carciofo, zucche, zucchini, asparago, ortaggi a foglia, fagiolo, fagiolino, piselli, melone, peperone e melanzane)	
- In ogni periodo	200-300 g
Cotture floreali	
- primavera-estate	120-180 g

Per una migliore aderenza è consigliabile aggiungere alla miscela un bagnante adesivante. Contemporaneamente ai trattamenti con zolfo sono consigliabili fertilizzazioni con concimi di pronta assimilazione.

COMPATIBILITA'
LABIOTOX 90 non è miscibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, captano, binapacril, diclorofluanide.

FITOTOSSICITA'
Deve essere irrorato ad almeno tre settimane dall'impiego di olii minerali o captano. Non effettuare i trattamenti a temperature troppo basse (5-6 °C) o nelle ore più calde della giornata.
Su colture zolfo sensibili come: Melo (Delicious, Imperatore, Calvilla Bianca, Rome Beauty, Commercio, Jonathan); Pero (Williams); Pesco; Albicocco.
Si raccomanda di utilizzare le dosi minime.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

OLIO BIANCO L.B.I.

Emulsione liquida di olio minerale

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Olio minerale ....79 g (672 g/l)
(insolfonabilità minima 95%)
Solventi ed emulsionanti q.b. a 100 g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico; L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle; L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Evitare l'esposizione - procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

L.B.I. LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5
20028 - SAN VITTORE OLONA (MI)

Officine di produzione:
DIACHEM S.p.A. - ALBANO S. ALESSANDRO (BG) / L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) / TERRANALISI S.r.l. – Renazzo di Cento (RA) / ALTHALLER Italia S.r.l. – San Colombano (MI) / VE.BI. S.r.l. – S. Eufemia Borgoricco (PD)
Officina di Confezionamento :
L:B.I. – San Vittore Olona (MI)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 4901 del 08.09.1982

CONTENUTO: 200 - 500 - 200 ml 1 - 5 – 10 -25 – 200(*) litri

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE.
L' OLIO BIANCO L.B.I. è un olio minerale leggero raffinato. La tecnica di preparazione di questo formulato fa dell'OLIO BIANCO L.B.I. un preparato per la lotta contro vari tipi di cocciniglie, inoltre ha una certa azione nei confronti delle uova di acari. Agisce prevalentemente per asfissia ricoprendo il corpo degli insetti con una leggera pellicola che occlude i loro canali tracheali impedendone così la respirazione.
I trattamenti sono prevalentemente invernali e primaverili, anche se su certe colture (come il Mais) si interviene in estate.

COLTURE E DOSI DI IMPIEGO: le dosi indicate sono riferite a 100 litri di acqua.
- Arancio, mandarino, limone, cedro, pesco, albicocco, ciliegio, susino, melo, pero, cotogno, vite, olivo:
- nei trattamenti invernali (prima della ripresa vegetativa) .... lt. 3-4
- negli interventi primaverili (con gemme chiuse o leggermente gonfie) .... lt. 1-2
- Orticoltura (carciofo, sedano, pomodoro, peperone, fagiolo,
cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo) .... ml. 200-300
- Patata, barbabietola da zucchero .... ml. 300-400
- Mais come coadiuvante dei diserbi .... ml. 200-300
- Piante floreali a pieno campo o in serra:
a gemme chiuse... lt. 2-3
al verde .... lt. 1-2

COMPATIBILITA'
OLIO BIANCO L.B.I. è miscibile con i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli contenenti calce, zolfo, dinocap, captano, mancozeb, e derivati. Distanziare di almeno tre settimane i trattamenti con OLIO BIANCO L.B.I., sia prima che dopo, l'applicazione dei formulati contenenti i principi attivi sopra elencati.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega l prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone, alle piante e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

(*) Avvertenza limitata alla taglia da 200 litri :
Attenzione : contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

AGRIDIM 20

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Dimetoato puro 20 g (=200 g/litro)
Coformulanti q.b. a 100 g

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - San Vittore Olona (MI)

Officine di produzione:
FITOQUIMICA LDA - LISBONA (Portogallo) / STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Cotignola (RA) / TERRANALISI S.r.l. – Cento (FE) / VE.BI. S.r.l. – Borgoricco (PD) / ALTHALLER Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)
Officine di Confezionamento:
L.B.I. – San Vittore Olona (MI)

Riferimento partita n°

Registrazione del Ministero della Sanità n° 5118 del 29.11.1982

CONTENUTO: 50 – 100 – 200 – 500 ml / 1 -5 - 10 litri

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): Nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare.Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un'effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica. delle estremità). Terapia: Atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Poco efficace la pralidossima. CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
L'AGRIDIM 20 è un'insetticida fosforganico che agisce sugli insetti direttamente per contatto o mediante azione citotropica. Infatti in questo secondo caso, penetra nei tessuti vegetali (specialmente nei frutti) ed uccide le larve in fase di sviluppo. Il prodotto agisce anche per ingestione e risulta mortale soprattutto per i ditteri (mosca domestica) quando lo ingeriscono attraverso esche attrattive.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: AGRIDIM 20 in trattamenti ad alto volume e per 100 litri di acqua si impiega alle seguenti dosi:
FRUTTICULTURA: Ciliegio contro la mosca 20/100 ml all'invaiatura dei frutti (cambiamento di colore); Pero e Melo (piante non in produzione) contro afidi, tripidi, tentredini, psylla, tingidi, maggiolini, cecidonia, 75/100 ml quando compaiono le prime infestazioni contro cemiostoma e nepticula 75/100 ml quando cominciano a formarsi le mine.
OLIVICOLTURA: contro la mosca delle olive 280 ml in trattamenti preventivi e curativi da giugno a ottobre. Contro le tignole 180/240 ml da marzo a giugno. Contro il liotripide 180 ml.
ORTICOLTURA: Asparago contro la mosca 75/100 ml quando compaiono le prime infestazioni.
AGRUMICOLTURA (piante non in produzione): Contro la mosca degli agrumi 100 ml quando inizia la deposizione delle uova - contro le cocciniglie 150 ml.
Quando si effettuano i trattamenti a medio e basso volume le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire per unità di superfice la stessa quantità di prodotto. Si consiglia inoltre di usare un comune adesivo bagnante alla dose consigliata dalla ditta produttrice. L'emulsione si prepara versando AGRIDIM 20 lentamente nell'acqua e agitando energicamente.

COMPATIBILITA': AGRIDIM 20 è compatibile con i più comuni fitofarmaci. eccetto a quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': L'AGRIDIM 20 non va impiegato in trattamenti a basso volume sulle varietà di Olivo Coratina, Simona, Canina, Vernina. Marsella, Frantoio, Itana, Bosana. Torza Grande, Dritta.
Si sconsiglia inoltre l'impiego su cedro, arancio, limone, interdente nocciole, crisantemo. NOCIVITA' : il prodotto è nocivo per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU OLIVO E 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER LE ALTRE COLTURE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Foglio illustrativo

AGRIDIM 20

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

CARATTERISTICHE
L'AGRIDIM 20 è un'insetticida fosforganico che agisce sugli insetti direttamente per contatto o mediante azione citotropica. Infatti in questo secondo caso, penetra nei tessuti vegetali (specialmente nei frutti) ed uccide le larve in fase di sviluppo. Il prodotto agisce anche per ingestione e risulta mortale soprattutto per i ditteri (mosca domestica) quando lo ingeriscono attraverso esche attrattive.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: AGRIDIM 20 in trattamenti ad alto volume e per 100 litri di acqua si impiega alle seguenti dosi:
FRUTTICULTURA: Ciliegio contro la mosca 20/100 ml all'invaiatura dei frutti (cambiamento di colore); Pero e Melo (piante non in produzione) contro afidi, tripidi, tentredini, psylla, tingidi, maggiolini, cecidonia, 75/100 ml quando compaiono le prime infestazioni contro cemiostoma e nepticula 75/100 ml quando cominciano a formarsi le mine.
OLIVICOLTURA: contro la mosca delle olive 280 ml in trattamenti preventivi e curativi da giugno a ottobre. Contro le tignole 180/240 ml da marzo a giugno. Contro il liotripide 180 ml.
ORTICOLTURA: Asparago contro la mosca 75/100 ml quando compaiono le prime infestazioni.
AGRUMICOLTURA (piante non in produzione): Contro la mosca degli agrumi 100 ml quando inizia la deposizione delle uova - contro le cocciniglie 150 ml.
Quando si effettuano i trattamenti a medio e basso volume le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire per unità di superfice la stessa quantità di prodotto. Si consiglia inoltre di usare un comune adesivo bagnante alla dose consigliata dalla ditta produttrice. L'emulsione si prepara versando AGRIDIM 20 lentamente nell'acqua e agitando energicamente.

COMPATIBILITA': AGRIDIN 20 è compatibile con i più comuni fitofarmaci. eccetto a quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': L'AGRIDIM 20 non va impiegato in trattamenti a basso volume sulle varietà di Olivo Coratina, Simona, Canina, Vernina. Marsella, Frantoio, Itana, Bosana. Torza Grande, Dritta.
Si sconsiglia inoltre l'impiego su cedro, arancio, limone, interdente nocciole, crisantemo. NOCIVITA' : il prodotto è nocivo per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU OLIVO E 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER LE ALTRE COLTURE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - San Vittore Olona (MI)

Etichetta Ridotta

AGRIDIM 20

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Dimetoato puro 20 g (=200 g/litro)
Coformulanti q.b. a 100 g

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - San Vittore Olona (MI)

Officine di produzione:
FITOQUIMICA LDA - LISBONA (Portogallo) / STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Cotignola (RA) / TERRANALISI S.r.l. – Cento (FE) / VE.BI. S.r.l. – Borgoricco (PD) / ALTHALLER Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)
Officine di Confezionamento:
L.B.I. – San Vittore Olona (MI)

Riferimento partita n°

Registrazione del Ministero della Sanità n° 5118 del 29.11.1982

CONTENUTO: 50 – 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ZOLFO FLOR P.B. 90

FUNGICIDA - ZOLFO IN POLVERE BAGNABILE

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Zolfo puro...90 g
(esente da selenio)
Adesivanti, bagnanti, Sospensivanti ed inerti ....q.b. a100 g

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tifo Speri, 3/5 - San Vittore Olona (MI)

Officine di produzione:
STI - SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA) / FITOQUIMICA LDA - Lisbona (Portogallo) / L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) / L.I.F.A. S.rl. - Isola Vicentina (VI) / VE.BI. S.r.l. - Borgoricco (PD) / L.B.I. – San Vittore Olona (MI) / ZOLFINDUSTRIA S.r.l. – S. Cipriano Po (PV)

Registrazione Ministero della Sanità n° 5119 del 29.11.1982

CONTENUTO : 100 - 200 - 500 g / 1 – 5 -10 - 25 kg

Partita n°

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Lo ZOLFO FLOR P.B. 90 è un fungicida dotato di adesività. Il prodotto viene impiegato contro tutte le forme di oidio o mal bianco delle varie colture ornamentali e da fore in pieno campo o in serra.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Lo ZOLFO FLOR P.B. 90 si impiega alle dosi di 100-200 g/hl d'acqua in funzione della coltura e del campo di applicazione. Le dosi minime si usano nei periodi di caldo intenso. Le dosi indicate si riferiscono ai trattamenti a volume normale: quando si effettuano i trattamenti con pompe a volume ridotto, le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unità di superfice, la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale.
Per aumentare l'efficacia dei trattamenti, aggiungere, alla miscela, un adesivo-bagnante. Il prodotto va diluito in acqua fino ad ottenere una densa crema; il resto dell'acqua si aggiunge successivamente.

COMPATIBILITA' : Lo ZOLFO FLOR P.B. 90 è miscibile con i più comuni prodotti fitosanitari. Lo ZOLFO FLOR P.B. 90 non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacryl, Diclofluanide.

AVVERTENZA: Lo ZOLFO FLOR P.B. 90 deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano. In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere riservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN FLORICOLTURA E SULLE PIANTE ORNAMENTALI NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI; OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

VERDEXANE

- Fungicida polvere bagnabile -

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Mancozeb puro	40 g
Rame metallo (da rame solfato)	11 g
Coformulanti	q.b. a 100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione; Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con la pelle; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

L.B.I. -LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - SAN VITTORE OLONA (MI)

Officine di produzione: .
DIACHEM S.pA Albano S. Alessandro (BG) / LIFA S.r.l. - Vigonovo (VE) / VE.BI. S.r.l. - Borgoricco (PD) / Terranalisi S.r.l. – Renazzo di Cento (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 5163 del 22.12.1982

CONTENUTO: 100-250-500 g 1-5-10-15 kg

RIFERIMENTO PARTITA:

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi dell'associazione delle seguenti sostanze attive: mancozeb 40%; rame metallo 11%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Per il Mancozeb: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione. depressione, iporefiessia.
TERAPIA: sintomatica; effetto antabuse: si verifica in caso di .concomitante o pregressiva assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precoridale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e (ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Per il Rame: denaturazione delle proteine con lesione a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC. emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritazione cutanea e oculare.
TERAPIA; gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovenosa e BAL intramuscolare: per il resto terapia sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
VERDEXANE è una speciale formulazione appositamente studiata per avere un ampio spettro di azione, caratterizzato da un'azione pronta e da una buona persistenza contro diverse malattie fungine in particolare della vite. Combatte in qualsiasi periodo dell'anno le seguenti malattie: peronospora, alternaria, septoria, antracnosi, ruggine, fusariosi, cercospora, cladosporiosi. La finezza e l'adesività del prodotto assicurano una uniforme copertura della vegetazione

DOSI D'IMPIEGO; si consiglia di non eseguire i trattamenti con basse temperature (iniziare i trattamenti con almeno 10° C) Le quantità sotto indicate devono essere disperse in 100 litri di acqua.
VITE: contro la peronospora in pre-fioritura 300/400 g, in post-fioritura 350/400 g, in chiusura 400/500 g
POMACEE (melo, pero) contro ticchiolatura, septoria, alternaria, ruggine (in qualsiasi periodo) 250/300 g
CEREALI (grano, avena, orzo, segale): contro: fusariosi, carbone, giberella, elmintosporiosi, carie (in ogni periodo) 250/300 g POMODORO; contro peronospora, alternaria, antracnosi, septoria, cladosporiosi (fino alla prima fioritura) 250/350 g
TABACCO; contro peronospora 200/300 g
ROSA E GAROFANO; contro ruggine, alternaria, (in pieno campo in qualsiasi periodo) 250/500 g

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITA': VERDEXANE è miscibile con gli antiparassitari di uso normale quali esteri fosforici e zolfi bagnabili. Risulta incompatibile con la poltiglia solfocalcica, con i prodotti ad alto tenore di boro ed alcalini in genere.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura. Il prodotto può essere fitotossico per alcune varietà di pero sensibili quali. Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni. Santa Daria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'Estate, Spinacarpi, Zucchermanna, anche del melo come Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis. renetta del Canadà. Rosa Mantovana

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO (pomodori, ammesso fino alla prima fioritura)

ATTENZIONE; da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni alto uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONSERVARE IL RECIPIENTE BEN CHIUSO; DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Etichetta / Foglietto illustrativo

PIRETRIX 10

Insetticida concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Piretrine pure 2.5g (22 g/l)
Piperonil butossido puro 16.5g (142 g/l)
Solvente ed emulsionanti q.b. a 100g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

L.B.I. LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO s.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - 20028 San Vittore Olona (MI)

Officine di produzione:
DIACHEM s.p.a. - Albano S. Alessandro (BG)
L.I.F.A. s.r.l. - Vigonovo (VE)
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO s.r.l. - Borgoricco (PD)

Officina di confezionamento:
LBI s.r.l. - S. Vittore Olona (MI)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 5454 del 14.09.1983

CONTENUTO: 10-20-25-50-100-200-500 ML / 1-5-10 LT

Riferimento partita.......

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertemia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Può provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache. Terapia: sintomatica e di rianimazione. CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
PIRETRIX 10 è un insetticida concentrato emulsionabile da diluire in acqua , agisce per contatto. La sua azione è rapida ma di poca persistenza, specialmente alla luce e al calore, con una conseguente bassa carenza.

MODALITÀ EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO
PIRETRIX 10 può essere impiegato in qualsiasi periodo dell'anno, si consiglia però di effettuare i trattamenti nella tarda serata e non quando la temperatura super i 25 °C.
Le dosi che di seguito vengono indicate sono riferite a 100 litri di acqua.

AGRUMI	(arancio, mandarino, limone, bergamotto, cedro, pompelmo): contro ogni tipo di insetto	100-200 ml
POMACEE	(melo, pero, cotogno) contro l'afide	120-150 ml
DRUPACEE	(ciliegio, pesco, albicocco, susino, mandorlo) contro mosca e afide	90-120 ml
VITE E OLIVO	contro mosche, acari e afidi	100-150 ml
ORTICOLTURA	contro afidi del carciofo, fagiolo, fragola, lattuga	80-100 ml
	contro mosca dell'asparago, cipolla carota, cavolo	100-130 ml
	contro cavolaia, bermisia e moscerino del pomodoro	70-100 ml
	contro farfalle dei minatori, psille, tripodi	120-150 ml
TABACCO	contro tutti gli insetti	70-100 ml
CEREALI	(frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, sorgo) per la disinfezione in genere	120-150 ml
FLORICOLTURA	contro gli afidi del crisantemo, del garofano e della rosa	70-100 ml

Il prodotto diluito in acqua può essere distribuito con pompe a mano a motore, impiegando le dosi più alte per la distribuzione manuale.
COMPATIBILITÀ: dato il tipo di formulazione sinergizzata dal piperonil butossido, si raccomanda di utilizzare il formulato da solo e non in miscela con altri prodotti.
TOSSICITA': PIRETRIX 10 risulta essere tossico per gli insetti utili

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 2 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI ;PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

PIRETRIX 10

Insetticida concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Piretrine pure 2.5g (22 g/l)
Piperonil butossido puro 16.5g (142 g/l)
Solvente ed emulsionanti q.b. a 100g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
onsigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

L.B.I. LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO s.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - 20028 San Vittore Olona (MI)

Officine di produzione:
DIACHEM s.p.a. - Albano S. Alessandro (BG)
L.I.F.A. s.r.l. - Vigonovo (VE)
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO s.r.l. - Borgoricco (PD)

Officina di confezionamento:
LBI s.r.l. - S. Vittore Olona (MI)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 5454 del 14.09.1983

CONTENUTO: 10-20-25-50 ml

Riferimento partita.......

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

foglietto illustrativo

PIRETRIX 10

Insetticida concentrato emulsionabile

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertemia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Può provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache. Terapia: sintomatica e di rianimazione.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
PIRETRIX 10 è un insetticida concentrato emulsionabile da diluire in acqua , agisce per contatto. La sua azione è rapida ma di poca persistenza, specialmente alla luce e al calore, con una conseguente bassa carenza.

MODALITÀ EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO
PIRETRIX 10 può essere impiegato in qualsiasi periodo dell'anno, si consiglia però di effettuare i trattamenti nella tarda serata e non quando la temperatura super i 25 °C.
Le dosi che di seguito vengono indicate sono riferite a 100 litri di acqua.

AGRUMI	(arancio, mandarino, limone, bergamotto, cedro, pompelmo): contro ogni tipo di insetto	100-200 ml
POMACEE	(melo, pero, cotogno) contro l'afide	120-150 ml
DRUPACEE	(ciliegio, pesco, albicocco, susino, mandorlo) contro mosca e afide	90-120 ml
VITE E OLIVO	contro mosche, acari e afidi	100-150 ml
ORTICOLTURA	contro afidi del carciofo, fagiolo, fragola, lattuga	80-100 ml
	contro mosca dell'asparago, cipolla carota, cavolo	100-130 ml
	contro cavolaia, bermisia e moscerino del pomodoro	70-100 ml
	contro farfalle dei minatori, psille, tripodi	120-150 ml
TABACCO	contro tutti gli insetti	70-100 ml
CEREALI	(frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, sorgo) per la disinfezione in genere	120-150 ml
FLORICOLTURA	contro gli afidi del crisantemo, del garofano e della rosa	70-100 ml

Il prodotto diluito in acqua può essere distribuito con pompe a mano a motore, impiegando le dosi più alte per la distribuzione manuale.
COMPATIBILITÀ: dato il tipo di formulazione sinergizzata dal piperonil butossido, si raccomanda di utilizzare il formulato da solo e non in miscela con altri prodotti.
TOSSICITA': PIRETRIX 10 risulta essere tossico per gli insetti utili

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 2 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI ;PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA: DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

L.B.I. LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO s.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - 20028 San Vittore Olona (MI)

METADENE

ESCA MICROGRANULARE A BASE DI METALDEIDE

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Metaldeide acetica pura 5 g
Eccipienti e attrattivi q.b. a 100 g

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica uomo circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali.
Terapia: sintomatica
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

CARATTERISTICHE E DOSI
Il "METADENE" è un efficace mezzo di lotta contro le lumache grandi e piccole, limacee e chiocciole

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO:
Orti: 100 - 300 g per 100 m^2.
Eseguire il trattamento preferibilmente la sera o subito dopo una pioggia, distribuendo il "METADENE" a piccoli mucchietti o a file.

COMPATIBILITA': "METADENE" va distribuito da solo.

NOCIVITA': nocivo per gli insetti utili, animali domestici e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA 20 GIORNI:

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 -San Vittore Olona (MI)

Officine di produzione:
L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE)
L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI)
VE.BI. Srl – S. Eufemia di Borgoricco (PD)
L.B.I. Srl – San Vittore Olona (Mi)

Registrazione del Ministero della Sanità n^ 5467 del 14-09-1983

Contenuto: 250 - 500 g 1-5 - 10 kg

RIFERIMENTO PARTITA:

TORVIS 50

INSETTICIDA POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Carbaril puro (esente da Beta - naftolo) 50 g
Coadiuvanti e inerti q. b. a 100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione; Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti;
Altamente tossico per gli organismi acquatici

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - S. Vittore Olona (MI)

Officine di produzione: DIACHEM S.p.A. - Albano S. Alessandro (BG) / Terranalisi S.r.l. – Renazzo di Cento (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 5593 del 19.07.84 CONTENUTO: 50 - 100 – 200 – 500 g / 1 - 5 -10 - 20kg

Riferimento partita:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Carbaril: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, sciallorea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sitomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
E' un carbammato sotto forma di polvere bagnabile che agisce per contatto ed ingestione contro numerosi insetti. E' dotato di una lunga persistenza. TORVIS 50 è attivo contro larve di insetti quali: nelle colture floricole in pieno campo: contro la bega del garofano. Negli agrumi: contro la saissetia oleae (mezzo grano di pepe). Nella bietola contro: altica, cleono, lixo. Nelle foraggere: contro filonomo e piralide. Nei frutteti (pomacee e drupacee): contro carpocapsa, larve ricamatrici (cacoecia, eulia, capua) e tignole del pesco (cidja e anarsia). Nel mais: contro piralide e sesamia. Nell'olivo: contro tignola, seissetia oleae (mezzo grano di pepe). Nelle orticole (patata, carciofo): contro dorifora della patata, cavolaie, nottue, tignole, tortitricidi, depressaria e altri lepidotteri, Nel riso: contro coppetta, chironomo e idrocampa. Nella vite: contro tignole e larve ricamatrici.
Epoca di applicazione: si impiega alla comparsa delle prime larve.
Dosi d'impiego: 200 g per ettolitro.

COMPATIBILITA': non è miscibile con oli minerali, polisolfuri e poltiglia bordolese.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA': il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici e bestiame.
Attenzione: il prodotto tal quale contiene sostanza altamente tossica per gli organismi acquatici. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE. ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Etichetta per confezioni formato ridotto

TORVIS 50

INSETTICIDA POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Carbaril puro (esente da Beta - naftolo) 50 g
Coadiuvanti e inerti q. b. a 100 g

NOCIVO

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione; Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti;
Altamente tossico per gli organismi acquatici

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - S. Vittore Olona (MI)

Officine di produzione: DIACHEM S.p.A. - Albano S. Alessandro (BG) / Terranalisi S.r.l. – Renazzo di Cento (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 5593 del 19.07.84 CONTENUTO: 50 - 100

Riferimento partita:

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Foglio Illustrativo

TORVIS 50

INSETTICIDA POLVERE BAGNABILE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Carbaril: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, sciallorea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sitomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
E' un carbammato sotto forma di polvere bagnabile che agisce per contatto ed ingestione contro numerosi insetti. E' dotato di una lunga persistenza. TORVIS 50 è attivo contro larve di insetti quali: nelle colture floricole in pieno campo: contro la bega del garofano. Negli agrumi: contro la saissetia oleae (mezzo grano di pepe). Nella bietola contro: altica, cleono, lixo. Nelle foraggere: contro filonomo e piralide. Nei frutteti (pomacee e drupacee): contro carpocapsa, larve ricamatrici (cacoecia, eulia, capua) e tignole del pesco (cidja e anarsia). Nel mais: contro piralide e sesamia. Nell'olivo: contro tignola, seisselia oleae (mezzo grano di pepe). Nelle orticole (patata, carciofo): contro dorifora della patata, cavolaie, nottue, tignole, tortitricidi, depressaria e altri lepidotteri, Nel riso: contro coppetta, chironomo e idrocampa. Nella vite: contro tignole e larve ricamatrici.
Epoca di applicazione: si impiega alla comparsa delle prime larve.
Dosi d'impiego: 200 g per ettolitro.

COMPATIBILITA': non è miscibile con oli minerali, polisolfuri e poltiglia bordolese.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA': il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici e bestiame.
Attenzione: il prodotto tal quale contiene sostanza altamente tossica per gli organismi acquatici. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - S. Vittore Olona (MI)

TORVIS 5

Insetticida in polvere a lunga persistenza

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono
Carbaril puro (esente da Beta-Naftolo) 5 g
Coformulanti e inerti q. b. a 100 g

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 315 - S. VITTORE OLONA (MI)

Officina di produzione:
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG) / TERRANALISI S.r.l. Cento (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 5613 del 19/07/1984

Contenuto: 100 - 200 - 250 - 500 g / 1 - 5 - 10 - 20 kg

Riferimento partita:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Carbaril: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia. Sintomi nicotinici:: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime.
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
Insetticida in polvere che agisce per contatto e ingestione nei confronti di numerosi insetti. E' dotato di una lunga persistenza ed è formulato espressamente per trattamenti polverulenti. Il "TORVIS 5" è particolarmente attivo contro le larve di insetti quali: nel garofano in pieno campo: contro le beghe del garofano - Nelle pomacee: contro il verme, capua, cacoccia, culia - Nel pesco: contro la tignola orientale - Nella patata: contro la cavolaia e la dorifora. - Nella vite, nell'olivo e negli agrumi: contro la tignola.

EPOCA DI APPLICAZIONE: intervenire alla prima comparsa dei parassiti ripetendo i trattamenti in corrispondenza dei nuovi attacchi.

DOSI D'IMPIEGO: 20 - 40 kg per ettaro.

COMPATIBILITA': miscibile con la maggioranza dei pesticidi ad eccezione di quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA': nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame.
Attenzione il prodotto tal quale contiene sostanza altamente tossica per gli organismi acquatici. Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

LABIOGAMMA

-Fitoregolatore-

COMPOSIZIONE:
Acido Giberellico puro 90 g
Inerti q.b. a 100 g

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

MODALITA' D'USO: In un litro d'acqua, preparare una soluzione con le dosi di impiego, agitare fino ad avvenuta dissoluzione. La soluzione così ottenuta versarla in 100 Lt d'acqua e agitare.

DOSI D'IMPIEGO: Il LABIOGAMMA può essere impiegato sulle seguenti colture :
Carciofo: per ottenere un anticipo di maturazione, dei capolini più grossi ed in maggior quantità. Trattare non oltre la formazione della 6^ foglia, dose: 1-3 g per 100 litri di acqua.
Floricole - Ornamentali: per ottenere un anticipo ed un aumento di fioritura. Trattare alla comparsa dei primi boccioli, eventualmente ripetere dopo 20-30 giorni. Dose: 1-10 g per 100 litri d' acqua.
Fragola: per stimolare l'allegagione. Trattare 15-20 giorni prima della fioritura. Dose: 10-20 g per 100 litri d'acqua
Patata: per ottenere un aumento di produzione dei tuberi. Immergere i tuberi prima della messa a dimora per 10 minuti in una soluzione di 1g o 5g per 100 litri d'acqua, rispettivamente se i tuberi sono tagliati o interi.
Vite: per accelerare la maturazione. Trattare i bottoni floreali 10 giorni prima della fioritura oppure 10 giorni dopo. Dose: 5-10 g per 100 litri d'acqua.
Agrumi : per la riduzione delle fisiopatie della buccia, ritardo raccolta e migliore conservabilità. Trattare i frutti immaturi, dose: 10-50 g per 100 litri d'acqua.
Pero : per favorire l'allegagione. Trattare quando il 20-30% dei fiori è aperto. Per contrastare i danni delle gelate, trattare subito dopo l'avvento del freddo e non oltre le 40 ore. Dose: 1-2 g per 100 litri d'acqua.

"DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI"

COMPATIBILITA': Il prodotto è miscibile solo con i concimi fogliari.
FITOTOSSICITA': E' bene tenere presente che fare una prova preliminare su piccola superficie può essere utile data l'influenza che vari fattori possono avere sull'acido gibberellico.

"INTERVALLO DI SICUREZZA 20 GIORNI"

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle personne ed agli animali.

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 -San Vittore Olona (MI)
Tel 0331/518550 – Fax 0331/514104

Officine di produzione:
L.B.I. Srl – San Vittore Olona (Mi)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 5961 del 19.07.84

CONTENUTO: 1-3-5-10-50-100-250-500-1000 gr.

RIFERIMENTO PARTITA:

DIAZINONE L.B.I. 20

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

PERICOLOSO
PER
L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Diazinone puro 19,6 g (188 g/litro)
Solventi ed emulsionanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - S. Vittore Olona (MI)

Officine di produzione:
DIACHEM - Albano S.Alessandro (BG) / TERRANALISI S.r.l. Renazzo di Cento (FE) /ALTHALLER Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI) / VE.BI. S.r.l – S. Eufemia di Borgoricco (PD)
Officine di Confezionamento:
L.B.I. S.r.l. – San Vittore Olona (MI)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6054 del 12.09.1984
Riferimento partita:

Contenuto: 20 - 50 – 100 - 200 - 500 ml 1 – 5 – 10 litri

NORME PRECAUZIONALI: Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. visione offuscata, miosi, salivazione e sudorazione, bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari, tachicardia, ipertensione arteriosa. Fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia. convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
A distanza di 7 -- 15 giorni dall'episodio acuto, può provocare un'effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida in seguito spastica delle estremità). TERAPIA: Atropina ad alte dosi. fino a comparsa dei primi segni di airopinizzazione, Somministrare subito la pralidossima.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

CARATTERISTICHE
DIAZINONE L.B.I. 20 è un'insetticida ad azione polivalente, con largo spettro di azione ed azione citotropica in quanto penetra nei primi strati dei tessuti vegetali. DIAZINONE L.B.I. 20 è particolarmente indicato per la lotta in frutticoltura, floricoltura, contro afidi, cocciniglie, tripidi.
DIAZINONE L.B.I. 20 non danneggia la vegetazione.

EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO: le dosi sotto riportate sono per 100 litri di acqua.
AGRUMI (arancio, mandarino, limone, bergamotto, cedro e pompelmo) contro afidi, cocciniglie, minatrici, cimici, tripidi 150-200 ml .
DRUPACEE (pesco, ciliegio, albicocco, susino e mandorlo) contro afidi, cidia, anarsia, cocciniglie, mosca (ciliegio) 150-200 ml contro tripidi (in fase di scamiciatura) 250 ml.
MELO, PERO contro afidi, cocciniglie, carpocapsa, cecidonia (pero) 200-250 ml.
OLIVO contro mosca, cocciniglie, tignole 150-200 ml.
FLORICOLE (rosa, garofano) contro tripidi, minatrici, afidi 150 ml.

COMPATIBILITA': da non miscelare con altri prodotti.

NOCIVITA': il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato. rispetto delle predette Istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Etichetta per confezioni formato ridotto

DIAZINONE L.B.I. 20

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

PERICOLOSO
PER
L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Diazinone puro 19,6 g (188 g/litro)
Solventi ed emulsionanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - S. Vittore Olona (MI)

Officine di produzione:
DIACHEM - Albano S.Alessandro (BG) / TERRANALISI S.r.l. Renazzo di Cento (FE) /ALTHALLER Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI) / VE.BI. S.r.l – S. Eufemia di Borgoricco (PD)
Officine di Confezionamento:
L.B.I. S.r.l. – San Vittore Olona (MI)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6054 del 12.09.1984
Riferimento partita:

Contenuto: 20 - 50 – 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Foglio illustrativo

DIAZINONE L.B.I. 20

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE
LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - S. Vittore Olona (MI)

NORME PRECAUZIONALI: Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. visione offuscata, miosi, salivazione e sudorazione, bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari, tachicardia, ipertensione arteriosa. Fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia. convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
A distanza di 7 -- 15 giorni dall'episodio acuto, può provocare un'effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida in seguito spastica delle estremità). TERAPIA: Atropina ad alte dosi. fino a comparsa dei primi segni di airopinizzazione, Somministrare subito la pralidossima.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

CARATTERISTICHE
DIAZINONE L.B.I. 20 è un'insetticida ad azione polivalente, con largo spettro di azione ed azione citotropica in quanto penetra nei primi strati dei tessuti vegetali. DIAZINONE L.B.I. 20 è particolarmente indicato per la lotta in frutticoltura, floricoltura, contro afidi, cocciniglie, tripidi. DIAZINONE L.B.I. 20 non danneggia la vegetazione.

EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO: le dosi sotto riportate sono per 100 litri di acqua.
AGRUMI (arancio, mandarino, limone, bergamotto, cedro e pompelmo) contro afidi, cocciniglie, minatrici, cimici, tripidi 150-200 ml .
DRUPACEE (pesco, ciliegio, albicocco, susino e mandorlo) contro afidi, cidia, anarsia, cocciniglie, mosca (ciliegio) 150-200 ml contro tripidi (in fase di scamiciatura) 250 ml.
MELO, PERO contro afidi, cocciniglie, carpocapsa, cecidonia (pero) 200-250 ml.
OLIVO contro mosca, cocciniglie, tignole 150-200 ml.
FLORICOLE (rosa, garofano) contro tripidi, minatrici, afidi 150 ml.

COMPATIBILITA': da non miscelare con altri prodotti.

NOCIVITA': il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato. rispetto delle predette Istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

TORVIS
INSETTICIDA IN POLVERE

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Malathion puro 4 g
Coformulanti q.b. a 100 g

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi: Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO s.r.l.
Via Tito Speri,3/5 - San Vittore Olona (MI)

Officine di produzione:
L.B.I. s.r.l. -S. Vittore Olona (MI)
L.I.F.A. s.r.l. stabilimento di Vigonovo (VE)
L.I.F.A. s.r.l. stabilimento di Isola Vicentina (VI)
Vebi srl – S.Eufemia Borgoricco (Pd)
Terranalisi srl – Renazzo – Cento (Fe)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 6216 del 31.01.85

CONTENUTO: 1-5 10 Kg

INFORMAZIONI MEDICHE
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante) Sintomi nicotinici: (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. A distanza di 7 -15 giorni dall'episodio acuto, può provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
Insetticida fosforganico per trattamenti polverulenti che trova valido impiego per combattere gli insetti del terreno che infestano le colture floreali, mediante interramento. Può essere utilizzato per polverizzazioni sui fiori in pieno campo per il controllo di Afidi, Psillidi, Tignole o Tripidi, nonchè per la disinfestazione di stagni, prati e fossi, con ottimo risultato.

EPOCA E DOSI D'IMPIEGO
Impolverare con cura tutta la superficie da disinfestare mediante comuni polverizzatori, 4-5 Kg per 1000 m2. Per il controllo degli insetti terricoli spargere uniformemente il prodotto sul terreno lungo le fili dei fiori, incorporandolo mediante una leggera erpicatura, usando mediatamente Kg 30-40 per ettaro.

MISCIBILITA': il prodotto si usa da solo.

AVVERTENZE
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

FITOCUPRYL 50 PB

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE A BASE DI RAME

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rame metallo 50 g
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)
Coformulanti q.b. a 100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione e ingestione; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

LABORATORIO BIOFARMA CO TECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - San Vittore Olona (MI)

Officine di produzione:
FITOQUIMICA LDA - LISBONA (Portogallo) / TERRANALISI - Cento (FE) / STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - Cotignola (RA)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 6.829 del 29.10.86

Riferimento partita:
CONTENUTO: 1 - 5 - 10 - 20 kg

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi.
Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
Il FITOCUPRYL 50 PB è una formulazione cuprica. Il prodotto risulta idoneo per il controllo della peronospora della vite; ticchiolatura delle pomacee, bolla e corineo delle drupacee (solo in trattamenti invernali); cercospora della bietola, antracnosi, alternariosi e septoriosi delle colture orticole: (patate, pomodoro, peperone, melanzana, melone, sedano, Finocchio, fragola) ed ornamentali in pieno campo (garofano, rosa, gladiolo); occhio di pavone dell'olivo.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO (dosi per 100 litri d'acqua)
Frutticoltura: in pre-fioritura, contro la ticchiolatura del melo e del pero, 300-500 g. Contro il cancro dei rametti del pesco, alla caduta delle foglie, 500-700 g. In post-fioritura 100-200 g
Viticoltura: contro la Peronospora della vite 300-400 g
Orticoltura: contro la Peronospora e Alternaria delle patate e del pomodoro, contro la Batteriosi del pomodoro, contro la Septoriosi e Batteriosi del sedano 250350 g. Contro la Peronospora della cipolla 300-400 g
Olivicoltura: contro l'occhio di pavone dell'olivo 300 - 500 g
Bieticoltura: contro la Peronospora e la Cercospora della Bietola 400-500 g
Floricoltura: contro la Peronospora, Antracnosi, Septoriosi, Ticchiolatura 250-300 g
-e dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale.
Quando si effettuano trattamenti con pompa a volume ridotto le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire per unità di superfice la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere alla miscela un adesivo bagnante.
Per la preparazione della miscela si consiglia di diluire la giusta dose di prodotto in poca acqua ed agitare fino ad ottenere una pasta cremosa; aggiungere poi il resto dell'acqua continuando ad agitare fino a raggiungere la concentrazione desiderata.

COMPATIBILITA': FITOCUPRYL 50 PB è compatibile con i più comuni antiparassitari di sintesi.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravestein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Gujot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa Vegetativa.

SDSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

BICUPRO L

Fungicida in Pasta Fluida

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rame metallico puro 22 g
(sottoforma di ossicloruro tetraramico)
Diluenti, bagnanti e disperdenti q.b. a 100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - S. Vittore Olona (MI)

Officine di produzione:
DIACHEM S.p.A. - Albano S. Alessandro (BG) / TERRANALISI - Cento (FE) / SARIAF S.p.A. - Faenza (RA)
Officine di confezionamento:
ALTHALLER Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 8171 del 03.03.1993
CONTENUTO: 100 -150 - 200 - 300 - 500 - 750 ml / 1 - 5 - 20 litri
Riferimento partita

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare la confezione ben chiusa - Dopo,- la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Evitare di respirare i vapori

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi- Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. irritante cutaneo e oculare
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chetanti, penicillamina se le via orale è agibile, oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
BICUPRO L è il classico anticrittogamico rameico, particolarmente indicato per la lotta preventiva a molte crittogame. La forma fisica, particelle finemente micronizzate disperse in pasta fluida, consentono una pronta azione, con persistenza prolungata, data la notevole resistenza al dilavamento. Il BICUPRO L può essere adoperato su molte colture dalla vite, ai fruttiferi, alle orticole, alle floreali.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: per la preparazione della miscela si consiglia di diluire il prodotto in poca acqua. Aggiungere poi la rimanente acqua per ottenere la concentrazione voluta. Le dosi consigliate per 100 litri di acqua sono le seguenti: - Vite: contro Peronospora 300-600 ml; - Pero, Melo (esclusi le cultivar sensibili al rame): contro Ticchiolatura per trattamenti autunno-invernali 900-1000 ml; in pre-fioritura 400-500 ml; in post-fioritura 300-350 ml. - Olivo: contro "occhio di pavone" 400-500 ml. - Fruttiferi (pesco, ciliegio, albicocco, mandorlo) solo trattamenti invernali contro Corineo, Bolla 1000-1200 ml - Patata: contro Alternariosi e Peronospora 500-600 ml - Orticole (pomodoro, sedano, pisello, cardo, ecc,) contro Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Ruggine: 400-600 ml. - Floricole (rosa, ciclamino) in pieno campo contro Ruggine, Antracnosi, Ticchiolatura: 400-600 ml - Per trattamenti con pompe a volume ridotto aumentare le dosi in proporzione:

COMPATIBILITA': BICUPRO L è miscibile con i comuni antiparassitari.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura ed inoltre sulle seguenti specie e varietà cuprosensibili pesco, susino, melo (varietà: Abbondanza, Betford, Black Stayman, Golden Delicius, Gravenstein Jonatham, Rome Beauty, Morgen Tuft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana), pero (varietà: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau. Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard)

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da l'uso improprio dei preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'afficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

RADICAL LIQUIDO

ERBICIDA TOTALE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Sodio Clorato puro 38 g (=510 g/litro)
Acqua q.b. a 100 g

COMBURENTE NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Esplosivo in miscela con materie combustibili; Nocivo per ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Tenere lontano da sostanze combustibili; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

L.B.I. - LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - S. VITTORE OLONA (MI)

Officina di produzione:
L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8485 del 30.03.94

CONTENUTO: 500 ml / 1-2-5-10-20 litri

Riferimento partita:

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: forte azione ossidante sui tessuti e distruzione dei globuli rossi. Emolisi e metaemoglobinemia in caso esposizione prolungata. Nausea, vomito, coliche, cianosi, sintomi ematologici.
Terapia: diluire e inattivare il veleno nello stomaco con soluzione Na-tiosolfato 1 - 2,5 % in Na-bicarbonato 5 %; gastrolusi od emesi seguita da somministrazione di carbone attivo e catarsi salina; endoscopia se sangue nel vomito.
Se emolisi trasfusioni, rimuovere l' Hb libera con plasmaferesi; diuresi forzata se oliguria od anuria; emodialisi per rimuovere il tossico e vicariare la funzione renale insufficiente. Ospedalizzare.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
RADICAL LIQUIDO è un prodotto idoneo per eliminare le erbe infestanti da viali, strade, piazzali, linee ferroviarie, cimiteri, cortili.
Dopo poche ore dal trattamento le infestanti colpite perdono vitalità e in breve tempo le piante essiccano non solo come parte aerea ma anche come radici.
Prima di procedere al trattamento con RADICAL LIQUIDO, se il terreno è secco, effettuare una abbondante innaffiatura, indi distribuire la soluzione del prodotto diserbante. I periodi più adatti per ottenere buoni risultati sono la primavera e l'autunno.
Le dosi consigliate sono:
In presenza di media infestazione da 2,3 a 3 litri di RADICAL LIQUIDO diluiti in 100 litri di acqua;
In presenza di forte infestazione da 3 a 4,5 litri di RADICAL LIQUIDO sempre in 100 litri di acqua.
Un litro di detta soluzione và distribuito uniformemente in 1 m^2 di superfice da diserbare.
Se le infestanti sono molto alte procedere, prima del trattamento con RADICAL LIQUIDO, ad una sfalciatura.

AVVERTENZE: Non mettere il prodotto a contatto con sostanze combustibili avendo cura di preparare la soluzione solo in recipienti metallici o in plastica evitando l'impiego di quelli in legno. Lavare accuratamente, dopo l'impiego, i recipienti e gli attrezzi che sono serviti per l'esecuzione dei trattamenti.

COMPATIBILITÀ: RADICAL LIQUIDO si impiega da solo.

FITOTOSSICITA': RADICAL LIQUIDO è fitotossico per le piante coltivate, si raccomanda di effettuare i trattamenti in assenza di colture agricole.

ATTENZIONE: da usarsi solo per gli usi sopra indicati, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

RADICAL

ERBICIDA TOTALE

- POLVERE SOLUBILE -

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Sodio Clorato puro 38 g
Inerti q.b. a 100 g

COMBURENTE NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Esplosivo in miscela con materie combustibili; Nocivo per ingestione
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Tenere lontano da sostanze combustibili; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

L.B.I. - LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - SAN VITTORE OLONA (Mi)
Officina di produzione: L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) I
Registrazione del Ministero della Sanità n. 8486 del 30.03.94
CONTENUTO: 500 g / 1 - 1,5 – 2 – 5 -10 - 20 kg
Riferimento partita:

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: forte azione ossidante sui tessuti e distruzione dei globuli rossi. Emolisi e metaemoglobinemia in caso esposizione prolungata. Nausea, vomito, coliche, cianosi, sintomi ematologici.
Terapia: diluire e inattivare il veleno nello stomaco con soluzione Na-tiosolfato 1 - 2,5 % in Na-bicarbonato 5 %; gastrolusi od emesi seguita da somministrazione di carbone attivo e catarsi salina; endoscopia se sangue nel vomito.
Se emolisi trasfusioni, rimuovere l' Hb libera con plasmaferesi; diuresi forzata se oliguria od anuria; emodialisi per rimuovere il tossico e vicariare la funzione renale insufficiente. Ospedalizzare.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
RADICAL è un prodotto idoneo per eliminare le erbe infestanti di viali, strade, piazzali, linee ferroviarie, cimiteri, cortili.
Dopo poche ore dal trattamento le infestanti colpite perdono vitalità e in breve tempo le piante essiccano non solo come parte aerea ma anche come radici. Prima di procedere al trattamento con RADICAL, se il terreno è secco, procedere ad una abbondante innaffiatura indi distribuire la soluzione del prodotto diserbante. I periodi più adatti per ottenere buoni risultati sono la primavera e l'autunno.
Le dosi consigliate sono:
In presenza di media infestazione da 3 a 4 Kg di RADICAL sciolti in 100 litri di acqua (30-40 g per m^2);
In presenza di forti infestazioni da 4 a 6 Kg di RADICAL sempre in 100 litri di acqua (40-60 g per m^2).
Un litro di detta soluzione va distribuito uniformemente in un m^2 di superfice da diserbare.
Se le infestanti sono molto alte procedere, prima del trattamento ad una sfalciatura.

AVVERTENZE: Non mettere il prodotto a contatto con sostanze combustibili, avendo anche cura di utilizzare solo recipienti di metallo o plastica evitando l'impiego di quelli in legno. Lavare dopo l'impiego accuratamente con acqua gli attrezzi e i recipienti che sono serviti per l'esecuzione dei trattamenti.

COMPATIBILITA': RADICAL si impiega da solo.

FITOTOSSICITA': RADICAL è fitotossico per le piante coltivate, si raccomanda di effettuare i trattamenti in assenza di colture agricole.

ATTENZIONE: da impiegare solo per gli usi sopra indicati ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da l'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

VILURAM 30 PB

FUNGICIDA CUPRICO IN POLVERE BAGNABILE ALTAMENTE MICRONIZZATA

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rame metallo 30 g
(Sotto forma di ossicloruro)
Coformulanti q.b.a 100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - San Vittore Olona (MI)

Officine di produzione: FITOQUIMICA LDA - LISBONA (Portogallo) / TERRANALISI s.n.c. - Cento (FE) / STI - SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA) /STI - SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Torrenieri (fraz. di Montalcino SI) ; / L.I.F.A, S.r.l. - Vigonovo (VE) / L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI) VE / VE.BI. S.r.l. - Borgoricco (PD)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 9293 del 28.08.97

Riferimento partita:

CONTENUTO: 25 - 50 - 100 - 200 - 500 g / 1 - 5 - 10 - 25 kg

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica. coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
VILURAM 30 PB si versa nel totale quantitativo di acqua agitando per alcuni minuti fino alla formazione di una poltiglia omogenea.
Frutticoltura:
Melo e Pero: contro Ticchiolatura dopo la ripresa vegetativa;
Albicocco: contro Monilia nei trattamenti pre-fiorali; Nespolo: contro Ticchiolatura e Brusone 400-500 g/hl
Melo e Pero: contro Ticchiolatura alla ripresa vegetativa (ingrossamento delle gemme) 600-800 g/hl
Melo e Pero: contro la Ticchiolatura; Albicocco: contro la Monilia o Marciume bruno, Corineo e Bozzacchioni: Ciliegio: contro Sclerotinia, Corineo e Scopazzi trattamenti invernali 1000-1200 g/hl
Vite: contro Peronospora della vite 400-500 g/hl
Olivo: contro Occhio di Pavone e Lebbra dell'Olivo 400-500 g/hl
Agrumi: contro Allupatura e Mal secco degli agrumi 400-500 g/hl
Carciofo. Cardo, Cavolo. Cicoria. Cipolla. Pisello. Cucurbitacee e Spinacio: contro Peronospora; Patata: contro Peronospora ed Alternaria; Pomodoro: contro Peronospora. Alternariosi, Septoriosi e Batteriosi: Sedano: contro Septoriosi: Pisello: contro Antracnosi 400-500 g/hl
Barbabietola da zucchero: contro Cercospora della barbabietola 3-4 kg/ha
Floricoltura in Pieno campo:
Rosa: contro Ruggine, Ticchiolatura e Peronospora 400-500 g/hl

COMPATIBILITA': VILURAM 30 PB è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a base di Polisolfuri.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Non si deve trattare durante la fioritura. Su alcune varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravestein. Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fe'el, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Gujot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili. Il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piene ripresa vegetativa.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA : OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Etichetta per confezioni formato ridotto

VILURAM 30 PB

FUNGICIDA CUPRICO IN POLVERE BAGNABILE ALTAMENTE MICRONIZZATA

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rame metallo 30 g
(Sotto forma di ossicloruro)
Coformulanti q.b.a 100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - San Vittore Olona (MI)

Officine di produzione: FITOQUIMICA LDA - LISBONA (Portogallo) / TERRANALISI s.n.c. - Cento (FE) / STI - SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA) /STI - SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Torrenieri (fraz. di Montalcino SI) ; / L.I.F.A, S.r.l. - Vigonovo (VE) / L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI) VE / VE.BI. S.r.l. - Borgoricco (PD)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 9293 del 28.08.97

Riferimento partita:

CONTENUTO: 25 - 50 - 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Foglio illustrativo

VILURAM 30 PB

FUNGICIDA CUPRICO IN POLVERE BAGNABILE ALTAMENTE MICRONIZZATA

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - San Vittore Olona (MI)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica. coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
VILURAM 30 PB si versa nel totale quantitativo di acqua agitando per alcuni minuti fino alla formazione di una poltiglia omogenea.
Frutticoltura:
Melo e Pero: contro Ticchiolatura dopo la ripresa vegetativa;
Albicocco: contro Monilia nei trattamenti pre-fiorali; Nespolo: contro Ticchiolatura e Brusone 400-500 g/hl
Melo e Pero: contro Ticchiolatura alla ripresa vegetativa (ingrossamento delle gemme) 600-800 g/hl
Melo e Pero: contro la Ticchiolatura; Albicocco: contro la Monilia o Marciume bruno, Corineo e Bozzacchioni: Ciliegio: contro Sclerotinia, Corineo e Scopazzi trattamenti invernali 1000-1200 g/hl
Vite: contro Peronospora della vite 400-500 g/hl
Olivo: contro Occhio di Pavone e Lebbra dell'Olivo 400-500 g/hl
Agrumi: contro Allupatura e Mal secco degli agrumi 400-500 g/hl
Carciofo. Cardo, Cavolo. Cicoria. Cipolla. Pisello. Cucurbitacee e Spinacio: contro Peronospora; Patata: contro Peronospora ed Alternaria; Pomodoro: contro Peronospora. Alternariosi, Septoriosi e Batteriosi: Sedano: contro Septoriosi: Pisello: contro Antracnosi 400-500 g/hl
Barbabietola da zucchero: contro Cercospora della barbabietola 3-4 kg/ha
Floricoltura in Pieno campo:
Rosa: contro Ruggine, Ticchiolatura e Peronospora 400-500 g/hl

COMPATIBILITA': VILURAM 30 PB è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a base di Polisolfuri.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Non si deve trattare durante la fioritura. Su alcune varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravestein. Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Gujot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili. Il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piene ripresa vegetativa.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA : OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

VILURFEN

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)
FUNGICIDA ORGANICO CON AZIONE PREVENTIVA E BLOCCANTE, SPECIFICO
PER IL CONTROLLO DELL'OIDIO E DELLA TICCHIOLATURA

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Fenarimol puro (=122 g/litro)		11 g
Coformulanti	q.b. a	100 g

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Possibile rischio di ridotta fertilità; Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati; Possibile rischio per i bambini allattati al seno; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - San Vittore Olona (MI)
Officine di produzione: TERRANALISI - Cento (FE) / DIACHEM S p.A - Albano S Alessandro (BG) FITOQUIMICA LDA - Lisbona (Portogallo) / L.I.F A. S r l - Vigonovo (VE) / ALTHALLER Italia S.r.l. – San Colombano (MI)
Officina solo per il confezionamento: DIACHEM SpA UP SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n° 9.295 del 28.08.1997

CONTENUTO : 10 - 20 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 ml / 1 - 5 - 10 litri

Partita n .:

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
VILURFEN è un fungicida con azione preventiva e bloccante specifico per il controllo dell'Oidio e della Ticchiolatura. Il prodotto penetra all'interno dei tessuti verdi irrorati ed agisce dall'interno al riparo da eventuali piogge dilavanti.
Malattie combattute: Oidi (Podosphaera leucotricha, Sphaeroteca pannosa, Sphaeroteca fuliginea, Sphaeroteca macularis, Erysiphe polygoni, Erysiphe cichoracearum, Leivellula taurica. Mycrosphaera betae) e Ticchiolatura.
Colture: melo. pero. pesco. vite. melone, cocomero. zucca. zucchino. cetriolo. peperone. melanzana. pomodoro. fragola. carciofo. pisello.

ISTRUZIONI PER L'USO
Modalità d'impiego: Il VILURFEN si usa alle dosi indicate impiegando irroratrici a volume normale e la quantità d'acqua necessaria per bagnare abbondantemente tutta la vegetazione. Per (l'impiego con irroratrici a basso volume, la concentrazione va proporzionalmente aumentata in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro.
Preparazione della miscela: versare la quantità richiesta di VILURFEN nella botte piena a metà ed agitare bene durante il completamento del riempimento. Non é necessaria l'aggiunta di bagnanti.

SETTORI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Melo: contro l'Oidio 30-40 ml/hl ad intervalli di 7-10 giorni iniziando i trattamenti alla fase delle orecchiette di topo.
Melo e Pero: (Oidio e Ticchiolatura): 30-40 ml/hl in miscela estemporanea con Captano, Dodina, e Mancozeb.
Vite da tavola: contro Oidio 10-15 ml/hl ad intervalli di 7-10 giorni da quando i germogli sono lunghi 10 cm fino all'allegagione. Dopo l'allegagione aumentare la dose a 25-30 ml/hl.
Vite da vino: contro Oidio 10-15 ml/hl ad intervalli di 7-15 giorni da quando i germogli sono lunghi 10 cm fino all'allegagione. Dopo l'allegagione aumentare la dose a 15-30 ml/hl.
Pesco: contro l'Oidio 35-40 ml/hl dalla sfioritura per 2-3 trattamenti ad intervalli di 7 giorni e alla comparsa dei primi sintomi dell'eventuale infestazione secondaria trattare ad intervalli di 6-8 giorni.
Cucurbitacee (cetriolo, zucca, zucchino, cocomero, melone); Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana): Carciofo; Fragola (fino alla prima fioritura): Pisello:contro Oidio 20-40 ml/hl dalla prima comparsa dei sintomi ogni 8-12 giorni.
Floreali (in pieno campo): contro Oidio 20-50 ml/hl dalla comparsa dei primi sintomi intervenendo ogni 8-12 giorni.

COMPATIBILITA': VILURFEN é compatibile con i più comuni fungicidi quali sali rameici, Captano, Mancozeb, Ziram, e con i più comuni insetticidi e acaricidi impiegati nelle colture indicate in etichetta. Dato l'elevato numero di possibili combinazioni con i numerosi formulati commerciali, si suggerisce di saggiare la compatibilità fisica di ciascuna miscela estemporanea preparandone una piccola quantità prima dell'uso.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Nel caso di miscela con altri principi attivi con i quali il VILURFEN e compatibile, fare attenzione alle eventuali controindicazioni riportate nelle etichette dei prodotti con i quali si è fatta la miscela. Non impiegare il VILURFEN su varietà soggette a rugginosità quali Golden Delicious.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU MELO; 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU VITE, PESCO E PERO: 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SULLE ALTRE COLTURE.
ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA, OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante. alle persone ed agli animali

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Etichetta per confezioni ridotte

VILURFEN

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)
FUNGICIDA ORGANICO CON AZIONE PREVENTIVA E BLOCCANTE, SPECIFICO PER IL CONTROLLO DELL'OIDIO E DELLA TICCHIOLATURA

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Fenarimol puro (=122 g/litro)		11 g
Coformulanti	q.b. a	100 g

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Possibile rischio di ridotta fertilità; Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati; Possibile rischio per i bambini allattati al seno; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo temine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - San Vittore Olona (MI)
Officine di produzione: TERRANALISI - Cento (FE) / DIACHEM S.p.A - Albano S.Alessandro (BG) FITOQUIMICA LDA - Lisbona (Portogallo) / L.I.F.A. S.r.l - Vigonovo (VE) / ALTHALLER Italia S.r.l. – San Colombano (MI)
Officina solo per il confezionamento: DIACHEM SpA UP SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n° 9.295 del 28.08.1997

CONTENUTO : 10 - 20 - 25 - 50 - 100 ml

Partita n.:

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Foglio illustrativo

VILURFEN

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)
FUNGICIDA ORGANICO CON AZIONE PREVENTIVA E BLOCCANTE, SPECIFICO PER IL CONTROLLO DELL'OIDIO E DELLA TICCHIOLATURA

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
VILURFEN è un fungicida con azione preventiva e bloccante specifico per il controllo dell'Oidio e della Ticchiolatura. Il prodotto penetra all'interno dei tessuti verdi irrorati ed agisce dall'interno al riparo da eventuali piogge dilavanti.
Malattie combattute: Oidi (Podosphaera leucotricha, Sphaeroteca pannosa, Sphaeroteca fuliginea, Sphaeroteca macularis, Erysiphe polygoni, Erysiphe cichoracearum, Leivellula taurica. Mycrosphaera betae) e Ticchiolatura.
Colture: melo, pero, pesco, vite, melone, cocomero. zucca, zucchino, cetriolo, peperone, melanzana, pomodoro, fragola, carciofo, pisello.

ISTRUZIONI PER L'USO
Modalità d'impiego: Il VILURFEN si usa alle dosi indicate impiegando irroratrici a volume normale e la quantità d'acqua necessaria per bagnare abbondantemente tutta la vegetazione. Per (l'impiego con irroratrici a basso volume, la concentrazione va proporzionalmente aumentata in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro.
Preparazione della miscela: versare la quantità richiesta di VILURFEN nella botte piena a metà ed agitare bene durante il completamento del riempimento. Non è necessaria l'aggiunta di bagnanti.

SETTORI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Melo: contro l'Oidio 30-40 ml/hl ad intervalli di 7-10 giorni iniziando i trattamenti alla fase delle orecchiette di topo.
Melo e Pero: (Oidio e Ticchiolatura): 30-40 ml/hl in miscela estemporanea con Captano, Dodina, e Mancozeb.
Vite da tavola: contro Oidio 10-15 ml/hl ad intervalli di 7-10 giorni da quando i germogli sono lunghi 10 cm fino all'allegagione. Dopo l'allegagione aumentare la dose a 25-30 ml/hl.
Vite da vino: contro Oidio 10 15 ml/hl ad intervalli di 7 15 giorni da quando i germogli sono lunghi 10 cm fino all'allegagione. Dopo l'allegagione aumentare la dose a 15-30 ml/hl.
Pesco: contro l'Oidio 35-40 ml/hl dalla sfioritura per 2-3 trattamenti ad intervalli di 7 giorni e alla comparsa dei primi sintomi dell'eventuale infestazione secondaria trattare ad intervalli di 6-8 giorni.
Cucurbitacee (cetriolo, zucca, zucchino, cocomero, melone); Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana): Carciofo; Fragola (fino alla prima fioritura); Pisello:contro Oidio 20-40 ml/hl dalla prima comparsa dei sintomi ogni 8-12 giorni.
Floreali (in pieno campo): contro Oidio 20-50 ml/hl dalla comparsa dei primi sintomi intervenendo ogni 8-12 giorni.

COMPATIBILITA': VILURFEN é compatibile con i più comuni fungicidi quali sali rameici, Captano, Mancozeb, Ziram, e con i più comuni insetticidi e acaricidi impiegati nelle colture indicate in etichetta. Dato l'elevato numero di possibili combinazioni con i numerosi formulati commerciali, si suggerisce di saggiare la compatibilità fisica di ciascuna miscela estemporanea preparandone una piccola quantità prima dell'uso.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Nel caso di miscela con altri principi attivi con i quali il VILURFEN e compatibile, fare attenzione alle eventuali controindicazioni riportate nelle etichette dei prodotti con i quali si è fatta la miscela. Non impiegare il VILURFEN su varietà soggette a rugginosità quali Golden Delicious.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU MELO; 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU VITE, PESCO E PERO: 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SULLE ALTRE COLTURE.
ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA, OGNI ALTRO USO E PERICOLOSO Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante. alle persone ed agli animali

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - San Vittore Olona (MI)

VILURFEN COMBI

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE BAGNABILE
CONTRO L'OIDIO DELLA VITE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Fenarimol puro	0,35 g
Zolfo puro (esente da selenio)	50,00 g
Coformulanti	q.b. a 100,00 g

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - San Vittore Olona (MO

Officine di produzione e/o confezionamento:
TERRANALISI - Cento (FE) / DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
TORRE S.r.l. - Torrenieri (fraz. Montalcino - SI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA. - Cotignola (RA) / FITOQUIMICA LDA - Lisbona (Portogallo)
L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) / L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI)
L.B.I – S. Vittore Olona (MI)
VE.BI. S.r.l. – Borgoricco (PD)
ZOLFINDUSTRIA S.r.l. – S. Cipriano Po (PV)

Registrazione Ministero della Sanità n° 9296 del 28.08.1997

CONTENUTO : 50 - 100 - 200 - 250 - 400 - 500 g / 1 - 5 - 10 kg

Partita n°

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
VILURFEN COMBI è una miscela di due principi attivi, il Fenarmol e lo Zolfo, efficace per il controllo dell'oidio della vite. Il prodotto è in grado di esplicare attività protettiva esterna, tipica dello Zolfo, ed endoterapeutica per la presenza di Fenarimol.

SETTORI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Vite: contro l'Oidio impiegare 150/200 g/hl: effettuare i trattamenti ogni 7-14 giorni nel caso di uve da vino e ogni 7-10 giorni nel caso di uve da tavola, in funzione delle condizioni ambientali. Dopo l'allegagione adottare la dose più alta.

COMPATIBILITA' : VILURFEN COMBI non è compatibile con gli antiparassitari alcalini (Polisolfuri, Poltiglia bordolese, ecc.), con olii minerali, DDVP, Diclofluanide.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può arrecare danno alla vite Sangiovese. Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali. In estate non effettuare i trattamenti nelle ore più calde del giorno. In caso di temperature elevate usare la dose più bassa.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA; OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Etichetta ridotta

VILURFEN COMBI

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE BAGNABILE
CONTRO L'OIDIO DELLA VITE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Fenarimol puro	0,35 g
Zolfo puro (esente da selenio)	50,00 g
Coformulanti	q.b. a 100,00 g

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - San Vittore Olona (MO

Officine di produzione e/o confezionamento:
TERRANALISI - Cento (FE) / DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
TORRE S.r.l. - Torrenieri (fraz. Montalcino - SI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA. - Cotignola (RA) / FITOQUIMICA LDA - Lisbona (Portogallo)
L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) / L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI)
L.B.I – S. Vittore Olona (MI)
VE.BI. S.r.l. – Borgoricco (PD)
ZOLFINDUSTRIA S.r.l. – S. Cipriano Po (PV)

Registrazione Ministero della Sanità n° 9296 del 28.08.1997

CONTENUTO : 50 - 100

Partita n°

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Foglio illustrativo

VILURFEN COMBI

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE BAGNABILE
CONTRO L'OIDIO DELLA VITE

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
VILURFEN COMBI è una miscela di due principi attivi, il Fenarmol e lo Zolfo, efficace per il controllo dell'oidio della vite. Il prodotto è in grado di esplicare attività protettiva esterna, tipica dello Zolfo, ed endoterapeutica per la presenza di Fenarimol.

SETTORI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Vite: contro l'Oidio impiegare 150/200 g/hl: effettuare i trattamenti ogni 7-14 giorni nel caso di uve da vino e ogni 7-10 giorni nel caso di uve da tavola, in funzione delle condizioni ambientali. Dopo l'allegagione adottare la dose più alta.

COMPATIBILITA' : VILURFEN COMBI non è compatibile con gli antiparassitari alcalini (Polisolfuri, Poltiglia bordolese, ecc.), con olii minerali, DDVP, Diclofluanide.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può arrecare danno alla vite Sangiovese. Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego de°li olii minerali. In estate non effettuare i trattamenti nelle ore più calde del giorno. In caso di temperature elevate usare la dose più bassa.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA; OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - San Vittore Olona (MO

EURPHOS

(POLVERE BAGNABILE)
Fungicida sistemico

Partita n°

COMPOSIZIONE
- FOSETIL ALLUMINIO puro g. 80
- Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari.;
Nocivo per gli organismi acquatici,
può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano Srl
Via Tito Speri, 3 - 20028 San Vittore Olona (MI)

Stabilimenti di produzione:
S.T.I.-Solfotecnica Italiana SpA -Cotignola (RA)
Torre S.r.l. - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
Terranalisi S.r.l. – Cento (FE)
L.B.I. – San Vittore Olona (MI)

Reg. del Ministero della Sanità n° 10208 del 02/12/1999

Contenuto: 50-100-250-500 g. e 1-5 Kg.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di Intossicazione chiamare Il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
L'Eurphos è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante. La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente ed è tanto più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita. La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

- ORTICOLTURA
Fragola: contro Peronospora (Phytophthora cactorum e fragariae). L'immersione delle piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 irrorazioni alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immersione delle piante prima del trapianto in una poltiglia a 250 g/hl d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di 0,5 grammi di formulato per pianta.
Lattuga: contro Bremia lactucae effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl di acqua (avendo cura di distribuire almeno 3 Kg di prodotto per ettaro). Su lattuga romana effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici la lattuga può essere sensibile al prodotto.
Melone: contro Pseudoperonospora cubensis effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl di acqua ogni 14 giorni.
Cocomero, Cetriolo, Spinacio: contro Peronospora, effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl di acqua (avendo cura di distribuire come minimo 3 Kg di prodotto per ettaro).
Carciofo: contro Bremia lactucae a 200-300 g/hl di acqua.

- FRUTTICOLTURA
Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo: contro Phytophthora spp. effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl di acqua, utilizzando 10 litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione possono venire integrati da pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche). Questa pratica diventa indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida.
Melo e Pero: contro Ticchiolatura, trattamenti preventivi a 150-250 g/hl di acqua; particolarmente nelle fasi prefiorali e immediatamente successive all'allegagione, si consiglia l'associazione con fungicidi di copertura (rame escluso) o con Dodina.
Pero: contro Maculatura bruna (Stemphylium sp.), trattamenti preventivi a 250 g/hl di acqua.
Melo, Pero, Pesco, Actinidia: contro Phytophthora cactorum.
a) effettuare un trattamento sulla vegetazione, una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta (per melo e actinidia), con 250 g/hl di acqua.
b) su pianta già debilitata dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida: effettuare un'annaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, con litri 1-2 per pianta di una poltiglia costituita da 5 Kg di Eurphos per 100 litri di acqua.
Vivai di fruttiferi: effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl di acqua con cadenza mensile.
Vivai di agrumi: impiegare la dose di 400 g/hl di acqua ogni 60 giorni.
Vite: contro Peronospora, a 250 g/hl di acqua. Si consiglia sempre l'associazione con formulati di copertura (rame escluso).

- COLTURE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO E IN SERRA
Contro Phytophthora spp. di Chamaecyparis e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee, Poinsettia, St. Paulia e Crisantemo, effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con g 5-10 di formulato per mq. una volta al mese in primavera.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i prodotti a base di rame, di dicofol e con concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Non effettuare miscele con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta. Si consiglia inoltre di non irrorare il prodotto su colture precedentemente trattate con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato Il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER CARCIOFO, CETRIOLO, COCOMERO, MELONE, LATTUGA, SPINACIO; 30 GIORNI PER FRAGOLA; 40 GIORNI PER MELO, PERO, PESCO, ACTINIDIA, VITE; 80 GIORNI PER ARANCIO, LIMONE, MANDARINO, POMPELMO.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

Etichetta per confezioni formato ridotto

EURPHOS

(POLVERE BAGNABILE)
Fungicida sistemico

Partita n°

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
- FOSETIL ALLUMINIO puro g. 80
- Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari ; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano Srl
Via Tito Speri, 3 - 20028 San Vittore Olona (MI)

Stabilimenti di produzione:
S.T.I.-Solfotecnica Italiana SpA -Cotignola (RA)
Torre S.r.l. - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)
Terranalisi S.r.l. – Cento (FE)
L.B.I. – San Vittore Olona (MI)

Reg. del Ministero della Sanità n° 10208 del 02/12/1999

Contenuto: 50-100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Foglio illustrativo

EURPHOS

(POLVERE BAGNABILE)
Fungicida sistemico

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di Intossicazione chiamare Il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
CARATTERISTICHE
L'Eurphos è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante. La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente ed è tanto più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita. La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

- ORTICOLTURA
Fragola: contro Peronospora (Phytophthora cactorum e fragariae). L'immersione delle piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 irrorazioni alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immersione delle piante prima del trapianto in una poltiglia a 250 g/hl d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di 0,5 grammi di formulato per pianta.
Lattuga: contro Bremia lactucae effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl di acqua (avendo cura di distribuire almeno 3 Kg di prodotto per ettaro). Su lattuga romana effettuare saggi preliminari per verificare la selettività dei prodotto. Con forti sbalzi termici la lattuga può essere sensibile al prodotto.
Melone: contro Pseudoperonospora cubensis effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl di acqua ogni 14 giorni.
Cocomero, Cetriolo, Spinacio: contro Peronospora, effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl di acqua (avendo cura di distribuire come minimo 3 Kg di prodotto per ettaro).
Carciofo: contro Bremia lactucae a 200-300 g/hl di acqua.

- FRUTTICOLTURA
Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo: contro Phytophthora spp. effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl di acqua, utilizzando 10 litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione possono venire integrati da pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche). Questa pratica diventa indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida.
Melo e Pero: contro Ticchiolatura, trattamenti preventivi a 150-250 g/hl di acqua; particolarmente nelle fasi prefiorali e immediatamente successive all'allegagione, si consiglia l'associazione con fungicidi di copertura (rame escluso) o con Dodina.
Pero: contro Maculatura bruna (Stemphylium sp.), trattamenti preventivi a 250 g/hl di acqua.
Melo, Pero, Pesco, Actinidia: contro Phytophthora cactorum.
a) effettuare un trattamento sulla vegetazione, una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta (per melo e actinidia), con 250 g/hl di acqua.
b) su pianta già debilitata dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida: effettuare un'annaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, con litri 1-2 per pianta di una poltiglia costituita da 5 Kg di Eurphos per 100 litri di acqua.
Vivai di fruttiferi: effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl di acqua con cadenza mensile.
Vivai di agrumi: impiegare la dose di 400 g/hl di acqua ogni 60 giorni.
Vite: contro Peronospora, a 250 g/hl di acqua. Si consiglia sempre l'associazione con formulati di copertura (rame escluso).

- COLTURE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO E IN SERRA Contro Phytophthora spp. di Chamaecyparis e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee, Poinsettia, St. Paulia e Crisantemo, effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con g 5-10 di formulato per mq. una volta al mese in primavera.
COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i prodotti a base di rame, di dicofol e con concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Non effettuare miscele con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta. Si consiglia inoltre di non irrorare il prodotto su colture precedentemente trattate con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato Il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER CARCIOFO, CETRIOLO, COCOMERO, MELONE, LATTUGA, SPINACIO; 30 GIORNI PER FRAGOLA; 40 GIORNI PER MELO, PERO, PESCO, ACTINIDIA, VITE; 80 GIORNI PER ARANCIO, LIMONE, MANDARINO, POMPELMO.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano Srl
Via Tito Speri, 3 - 20028 San Vittore Olona (MI)

Etichetta per sacchetti idrosolubili

Eurphos

POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

Fungicida Sistemico

Composizione:
Fosetil Alluminio puro g 80
Coformulanti q.b. a g.100

IRRITANTE

Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano Srl
Via Tito Speri, 3 - 20028 San Vittore Olona (MI)

Stabilimenti di produzione:
S.T.I.-Solfotecnica Italiana SpA -Cotignola (RA)
Torre S.r.l. - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)

Reg. del Ministero della Sanità n° 10208 del 02/12/1999

Contenuto: 0,5 kg (1 s.i. da 0,5 kg); 1 kg (1 s.i. da 1 kg)

Avvertenza : leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione esterna

Non toccare con mani o guanti bagnati
Sciogliere in acqua senza rompere

EURPHOS

(POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI)
Fungicida sistemico

Partita n°

COMPOSIZIONE
- **FOSETIL ALLUMINIO** puro g. 80
- Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari.;
Nocivo per gli organismi acquatici,
può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano Srl
Via Tito Speri, 3 - 20028 San Vittore Olona (MI)

Stabilimenti di produzione:
S.T.I.-Solfotecnica Italiana SpA -Cotignola (RA)
Torre S.r.l. - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)

Reg. del Ministero della Sanità n° 10208 del 02/12/1999

Contenuto: 0,5 kg (1 s.i. da 0,5 kg); 1 kg (1 s.i. da 1 kg)

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
L'Eurphos è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante. La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente ed è tanto più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita. La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

- ORTICOLTURA
Fragola: contro Peronospora (Phytophthora cactorum e fragariae). L'immersione delle piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 irrorazioni alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immersione delle piante prima del trapianto in una poltiglia a 250 g/hl d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di 0,5 grammi di formulato per pianta.
Lattuga: contro Bremia lactucae effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl di acqua (avendo cura di distribuire almeno 3 Kg di prodotto per ettaro). Su lattuga romana effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici la lattuga può essere sensibile al prodotto.
Melone: contro Pseudoperonospora cubensis effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl di acqua ogni 14 giorni.
Cocomero, Cetriolo, Spinacio: contro Peronospora, effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl di acqua (avendo cura di distribuire come minimo 3 Kg di prodotto per ettaro).
Carciofo: contro Bremia lactucae a 200-300 g/hl di acqua.

- FRUTTICOLTURA
Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo: contro Phytophthora spp. effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl di acqua, utilizzando 10 litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione possono venire integrati da pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche). Questa pratica diventa indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida.
Melo e Pero: contro Ticchiolatura, trattamenti preventivi a 150-250 g/hl di acqua; particolarmente nelle fasi preflorali e immediatamente successive all'allegagione, si consiglia l'associazione con fungicidi di copertura (rame escluso) o con Dodina.
Pero: contro Maculatura brura (Stemphylium sp.), trattamenti preventivi a 250 g/hl di acqua.
Melo, Pero, Pesco, Actinidia: contro Phytophthora cactorum.
a) effettuare un trattamento sulla vegetazione, una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta (per melo e actinidia), con 250 g/hl di acqua.
b) su pianta già debilitata dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida: effettuare un'annaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, con litri 1-2 per pianta di una poltiglia costituita da 5 Kg di Eurphos per 100 litri di acqua.
Vivai di fruttiferi: effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl di acqua con cadenza mensile.
Vivai di agrumi: impiegare la dose di 400 g/hl di acqua ogni 60 giorni.
Vite: contro Peronospora, a 250 g/hl di acqua. Si consiglia sempre l'associazione con formulati di copertura (rame escluso).

- COLTURE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO E IN SERRA
Contro Phytophthora spp. di Chamaecyparis e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee, Poinsettia, St. Paulia e Crisantemo, effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con g 5-10 di formulato per mq. una volta al mese in primavera.
COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i prodotti a base di rame, di dicofol e con concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Non effettuare miscele con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta. Si consiglia inoltre di non irrorare il prodotto su colture precedentemente trattate con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER CARCIOFO, CETRIOLO, COCOMERO, MELONE, LATTUGA, SPINACIO; 30 GIORNI PER FRAGOLA; 40 GIORNI PER MELO, PERO, PESCO, ACTINIDIA, VITE; 80 GIORNI PER ARANCIO, LIMONE, MANDARINO, POMPELMO.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

MODO DI UTILIZZO DEI SACCHETTI IDROSOLUBILI

25%

Assicurare la completa pulizia della botte e riempire l'atomizzatore con il 25% di acqua.

Con manigaunti asciutti prelevare il numero di sacchetti idrosolubili, chiusi, previsti.

Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore.

Attendere qualche minuto fino a completa solubilizzazione.

Aggiungere la restante parte di acqua necessaria ed eventuali altri prodotti da miscelare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

LABGARDEN Z

ESCA INSETTICIDA GRANULARE
IMPIEGO FLOREALE PER PIANTE DA APPARTAMENTO E GIARDINO

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Diazinone puro 5 g
Coformulanti, inerti e adescanti q.b. a 100 g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO s.r.l.
Via Tito Speri,3/5 - San Vittore Olona (MI)

Officine di produzione:
L.B.I. s.r.l. -S. Vittore Olona (MI)
L.I.F.A. s.r.l. stabilimento di Vigonovo (VE) - L.I.F.A. s.r.l. stabilimento di Isola Vicentina (VI)
Vebi srl – S.Eufemia Borgoricco (Pd)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 10836/PPO del 11.04.2001
Lotto N° .... del....... CONTENUTO: 100-200-250-300-500-750 G / 1 Kg

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente per insufficienza respiratoria. A distanza di 7-15 giorni dall' episodio acuto può provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). Terapia: Atropina ad alte dosi fino a scomparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
LABGARDEN Z è un insetticida granulare idoneo alla distribuzione degli insetti del terreno e delle piante in vaso, sui davanzali, balconi e giardino. LABGARDEN Z distrugge afidi, tentredini, grillotalpe, elateridi, vermi del terreno, cocciniglie, dorifore, formiche, larve di coleotteri, agrotidi.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Alla ripresa e per tutto il periodo vegetativo spargere LABGARDEN Z nella dose di 10 g (un tappo misurino) per m2 (100 g per 10 m2) prima dell'invaso o semina, indi interrare. Per trattamenti localizzati su singole piantine o vaso 5 g (mezzo tappo misurino) (50 g per 10 m2) sia interrato che sparso in superficie. Si consigliano i trattamenti di primo mattino su vegetazione umida da rugiada o dopo averla spruzzata con acqua.

COMPATIBILITA': il prodotto va usato da solo.

ATTENZIONE: da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

DIAZINONE LBI ESCA

Esca insetticida indicata per combattere gli insetti del terreno
Impiego floreale per piante da appartamento e giardino

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Diazinone puro 5 g
Coformulanti, inerti e adescanti q.b. a 100 g

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO s.r.l.
Via Tito Speri,3/5 - San Vittore Olona (MI)

Officine di produzione:
L.B.I. s.r.l. -S. Vittore Olona (MI)
L.I.F.A. s.r.l. stabilimento di Vigonovo (VE) - L.I.F.A. s.r.l. stabilimento di Isola Vicentina (VI)
Vebi srl – S.Eufemia Borgoricco (Pd)
Terranalisi srl – Renazzo di Cento (Fe)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 10837/PPO del 11.04.2001

Lotto N° .... del....... CONTENUTO NETTO: 100-200-250-300-500-750 G / 1 Kg

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa). nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente per insufficienza respiratoria. A distanza di 7-15 giorni dall' episodio acuto può provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI**

CARATTERISTICHE
DIAZINONE LBI ESCA è un insetticida per la distribuzione degli insetti del terreno nelle piante in vaso, sui davanzali, balconi e giardino. Indicato per la lotta contro grillotalpe, elateridi, vermi, larve di coleotteri, agrotidi, dorifore, formiche.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Spargere DIAZINONE LBI ESCA nella dose di 10 g (un tappo misurino) per m2 (100 g per 10 m2) prima dell'invaso o semina, indi interrare. Per trattamenti localizzati su singole piantine o vaso 5 g (mezzo tappo misurino) (50 g per 10 m2) sia interrato che sparso in superficie.

COMPATIBILITA': il prodotto va usato da solo.

ATTENZIONE: da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

PANESCA

Esca lumachicida indicata per combattere lumache, limacce, chiocciole
Impiego floreale per piante da appartamento e giardino

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Metaldeide acetica pura 5 g
Coformulanti, inerti e adescanti q.b. a 100 g

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica uomo circa 50 mg/Kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali; ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali. Terapia: sintomatica.
consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE
PANESCA è un formulato con particolari supporti che servono per attirare lumache, limacce e chiocciole. Agisce per contatto e ingestione. Il prodotto si presenta sotto forma di esche inattaccabili dalle muffe e resistenti all'azione della pioggia e del vento. Grazie alla sua formulazione è di facile impiego.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Spargere le esche di PANESCA preferibilmente di sera dopo una eventuale pioggia o una buona irrigazione. La confezione da 100 g serve per circa 3 m2 (30-40 g per m2) di superficie da disinfestare. Per trattamenti localizzati e per vasi da 20 cm di diametro 4-5 g di prodotto (20-25 granuli)

COMPATIBILITA': il prodotto va usato da solo.

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO s.r.l.
Via Tito Speri,3/5 - San Vittore Olona (MI)

Officine di produzione:
L.B.I. s.r.l. -S. Vittore Olona (MI)
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO s.r.l. - Borgoricco (PD)
L.I.F.A. s.r.l. stabilimento di Vigonovo (VE) - L.I.F.A. s.r.l. stabilimento di Isola Vicentina (VI)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 10878/PPO del 11.04.2001

Lotto N° .... del....... CONTENUTO: 100-200-250-500-750 g / 1 Kg

ATTENZIONE: da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

GARDEN HOUSE

INSETTICIDA SPRAY AD IMPIEGO FLOREALE
PER PIANTE DA APPARTAMENTO E GIARDINO

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Cipermetrina 0.1g
Piperonilbutossido 0.4g
Solvente, coformulanti e propellenti q.b. a 100g

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

Frasi di Rischio
Estremamente infiammabile; Irritante per la pelle; Tossico per organismi acquatici; Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico; L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle; L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO s.r.l.
Via Tito Speri,3/5 - San Vittore Olona (MI)

Officine di produzione:
RODWER s.n.c. Castel S. Pietro Terme (BO) / **NUOVA TECNOSOL s.r.l.** Assago (MI)
Registrazione del Ministero della Sanità n° 10881/PPO del 11/04/2001
CONTENUTO: 200-250-300-350-400-450-500-750 ml
Lotto N° .... del.......

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Non usare nei locali dove si soggiorna o nelle camere da letto. Evitare l'irrorazione nelle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Non nebulizzare nell'aria ambiente. Recipiente sotto pressione: proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori ai 50 °C. Non perforare nè bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente. Conservare al riparo qualsiasi fonte di combustione. Non fumare.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea, reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertemia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Può provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache. Terapia: sintomatica e di rianimazione.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE: GARDEN HOUSE è un insetticida contenente un piretroide (cipermetrina) sinergizzato dal piperonilbutossido. Efficace per la lotta contro molti insetti che possono infestare le colture floricole, piante verdi e ornamentali e da fiore dei giardini, case e balconi come: afidi, acari, cimici, tripidi, ragnetti, ecc...
MODALITA' D'IMPIEGO: Irrorare uniformemente alla distanza di 30-50 cm le parti verdi e legnose delle piante alla mattina o alla sera (evitare i trattamenti su piante esposte al sole). Durante il trattamento in fase distributiva cercare di bagnare bene gli insetti. Ripetere i trattamenti in caso di necessità con intervalli di 10 giorni. In fase preventiva trattare ogni 20-25 giorni
ATTENZIONE: da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

SARIAF S.p.a.

MANTIR 80

Fungicida a base di mancozeb
Tipo di formulazione: polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
Mancozeb puro . . . . g 80
Bagnanti, disperdenti . . . . .q.b. a g 100

IRRITANTE

Titolare della registrazione:
SARIAF SpA
via Morgagni,68 - Faenza (RA)

Registrazione Ministero della Sanità
n° 1379 del 06.12.1973

Officine Di Produzione:
Baslini Industrie Chimiche – Bergamo
Chemia S.p.A. - Dosso (Fe)
Scam S.r.l. - Modena
Isagro S.p.A. - Aprilia (Lt)
Dow Agrosciences S.A. Lauterbourg (Francia)

Taglie Autorizzate: 1-5-10-20-25 kg

Partita n............

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il MANTIR 80 è un fungicida organico a base di Mancozeb preparato in polvere bagnabile. È un prodotto idoneo per combattere: Ticchiolatura delle pomacee, Peronospora della vite, del tabacco, del pomodoro in pre-fioritura, Marsonnina del pioppo.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE
POMACEE, contro: Ticchiolatura g. 150-200
VITE, contro: Peronospora g. 150-200
POMODORO, solo fino alla prima fioritura contro: Peronospora g. 150-200
GAROFANO, in pieno campo contro: Ruggine g. 150-200
TABACCO, contro: Peronospora (Muffa blu) g. 150-200 (la dose inferiore in semenzaio)
PIOPPO, contro: Marsonnina g. 400-450
Sospendere la dose di prodotto in poca acqua: mescolare e versare la poltiglia nel quantitativo totale di acqua agitando ripetutamente.

Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA': Il MANTIR 80 è compatibile con la generalità degli antiparassitari purché non eccessivamente alcalini (come calce, poltiglia bordolese alcalina).

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Si sconsiglia l'uso del prodotto sulle seguenti cv di pero: Scipiona, Spadona, S. Maria, Coscia, Curato, Decana, Kaiser.

RISCHI DI NOCIVITA': Il MANTIR 80 è tossico per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

OSSITAN

Fungicida cuprorganico in polvere bagnabile, per la lotta contro la Peronospora e la Botrite dell'uva

COMPOSIZIONE:

FOLPET puro	g. 29,4
RAME METALLO (sotto forma di ossicloruro)	g. 17,5
Disperdenti e bagnanti	q. b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SARIAF S.p.A. – Faenza - Via Morgagni, 68

Registrazione n. 1523 del 07/03/1974
del Ministero della Sanità

Officina di produzione:
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)

Quantità Netta Del Preparato: 1 kg.

Partita n.: vedere margine inferiore etichetta

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
FOLPET 29,4%
RAME OSSICLORURO 17,5% di Cu metallo
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FOLPET
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica.
RAME OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità e dosi d'impiego

L'OSSITAN è indicato in VITICOLTURA: contro la Peronospora e la Muffa grigia con trattamenti preventivi a 250 – 350 g / hl. Gli ultimi due trattamenti devono essere effettuati rispettivamente a 6 e 4 settimane prima della raccolta. Su uve da vino, sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta per non compromettere la normale fermentazione alcolica.

Per ottenere un'omogenea sospensione acquosa, si consiglia di sciogliere la dose scelta di OSSITAN in metà della quantità totale di acqua necessaria e di agitare accuratamente per qualche minuto. Aggiungere quindi la quantità rimanente di acqua, ripetendo il rimescolamento. Si consiglia di usare di preferenza pompe irroranti munite di agitatore.

Compatibilità:

L'OSSITAN è miscibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi.
Non è miscelabile con le poltiglie solfocalciche e le sostanze fortemente alcaline.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:

Nelle normali condizioni di impiego e di ambiente, l'OSSITAN non è fitotossico per le colture indicate.

Rischi di nocività:

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, e quindi nuoce all'equilibrio biologico.
Per gli animali domestici ed il bestiame non è dannoso.

Su uve da vino, sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta per non compromettere la normale fermentazione alcoolica. Su uve da tavola, sospendere i trattamenti almeno 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Da non vendersi sfuso.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Non operare contro vento.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

HYDROFIL

LIQUIDO TENSIOATTIVO

Composizione
100 gr. di prodotto contengono:
- 7 gr. di eteri alchil aril poliglicolici, pari a gr. 7,35 di prodotto tecnico al 95%
- 25 gr. di esteri di acidi grassi, pari a gr. 26,30 di prodotto tecnico al 95%
- Diluenti q. b. a 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SARIAF S.p.A.
Via Morgagni, 68 – Faenza (RA)

Registrazione n. 1765 del 23.10.1975 del Ministero della Sanità

Officine di produzione: SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: ml 100; Lt. 1-5-10

Partita n.:

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

Tensione superficiale acqua Dine / cm 75
Tensione superficiale acqua con aggiunta 0,05% Hydrofil Dine / cm 47

CARATTERISTICHE
Questo preparato ad azione bagnante si può addizionare a tutti i trattamenti liquidi (compresi i rameici) usati per la cura e la prevenzione delle malattie delle piante.
L'aggiunta di Hydrofil, in dosi varianti da 30 a 50 gr. per q.le di liquido, a seconda dell'effetto che si vuol ottenere, provoca la distribuzione del liquido su tutta la superficie fogliare, eliminando la formazione e lo slittamento delle gocce, con conseguente perdita.
E' indicato nei trattamenti aficidi in unione ai normali insetticidi in quanto provoca la migliore bagnatura degli afidi, raggiungendo una più rapida loro eliminazione.
E' indicato nei trattamenti a foglie giovani o a quelle di certe piante (garofano, rosa, cavolfiore, frutti quasi maturi) protette da una cuticola cerosa che ostacola la bagnatura.
Può servire, all'occorrenza, per rendere sospensibile in acqua lo zolfo ed altre sostanze difficilmente bagnabili.

Compatibilità:
Il prodotto non reagisce con i vari prodotti con i quali viene mescolato e si può quindi usare con tutti gli insetticidi ed anticrittogamici.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali e le informazioni per il medico previste o possibili prescritte per i prodotti più tossici.

Fitotossicità: il prodotto non è fitotossico.

Rischi di nocività: il prodotto non è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame.

L'intervallo da rispettare tra l'ultimo trattamento e la raccolta deve essere quello del o dei principi attivi ai quali viene aggiunto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

HYDROFIL

LIQUIDO TENSIOATTIVO

Composizione
100 gr. di prodotto contengono:
- 7 gr. di eteri alchil aril poliglicolici, pari a gr. 7,35 di prodotto tecnico al 95%
- 25 gr. di esteri di acidi grassi, pari a gr. 26,30 di prodotto tecnico al 95%
- Diluenti q. b. a 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SARIAF S.p.A.
Via Morgagni, 68 – Faenza (RA)

Registrazione n. 1765 del 23.10.1975 del Ministero della Sanità

Officine di produzione: SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: ml 100; Lt. 1-5-10

Partita n.:

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

RUMITION

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE A BASE DI AZINPHOS METILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE
Azinphos metile puro g 25,5
Sostanze bagnanti ed adesive q.b. a g 100

SARIAF S.p.A. - Via Morgagni, 68 FAENZA (RA)
Registrazione Ministero della Sanità n. 2202 del 10.4.1976
Officina di produzione ISAGRO S.p.A. - Aprilia (LT).

Taglie: kg 1 (1 sacchetto idrosolubile da kg 1); (2 sacchetti idrosolubili da g 500);
(4 sacchetti idrosolubili da g 250); (5 sacchetti idrosolubili da g 200)
g. 500 (5 sacchetti da g 100); (10 sacchetti idrosolubili da g 50).

Partita n.:

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23/04/2001

FRASI DI RISCHIO
Tossico a contatto con la pelle. Molto tossico per inalazione e per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicarda (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): asteria e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida in seguito spastica, delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossina. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il RUMITION è un formulato in polvere bagnabile a base di azinphos-metile, principio attivo insetticida di azione verso numerosi insetti delle coltivazioni, in particolare: psilla del pero, microlepidotteri e ditteri minatori, afidi, tripidi, tingidi, adulti di acari, coleotteri. Il prodotto formulato in polvere bagnabile ha il vantaggio, rispetto alle preparazioni liquide emulsionabili, di essere meglio tollerato dalle cultivar soggette alla rugginosità dei frutti (Golden Delicious).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE
IN FRUTTICOLTURA (Melo, Pero, Pesco) contro:
Microlepidotteri minatori (Litocollete, Nepticula, Cemiostoma) g 150-200.
Psilla del pero g 200.Ricamatrici della frutta (Pandemis, Cacoecia, Capua, Eulia) g 150.Afidi, adulti di Acari, Cocciniglie, Aleurodidi ed altri insetti ad apparato boccale succhiatore g 200.Oplocampe g 200.Verme delle pomacee, Tignola orientale e Anarsia del pesco g 200.
IN VITICOLTURA contro:Cicaline, Tignole, Ragnetti rossi e gialli g 200.
IN AGRUMICOLTURA contro:Cocciniglie, Acari, Tignola, Fetola g 200.
IN BIETICOLTURA contro:Cleono, Altica, Cassida, Pegomia delle bietole g 150-200.
IN FLORICOLTURA in pieno campo contro:Bega del garofano, Tripidi, Minatrici delle foglie, Tentredini, Ragnetti rossi g 200.
IN ORTICOLTURA (Patata) contro:Dorifora g 200.
Sospendere la dose di RUMITION in poca acqua e mescolare sino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea. Versare gradualmente questa poltiglia nel quantitativo totale di acqua richiesto, agitando ripetutamente.

COMPATIBILITA': il RUMITION è compatibile con la generalità dei fungicidi, insetticidi, acaricidi. Devono essere evitate le miscele con prodotti fortemente alcalini quali calce, poltiglia bordolese e polisolfuri minerali.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA': il RUMITION è tossico per insetti utili, animali domestici e bestiame.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
AVVERTENZE D'USO: Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE. DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

20% 25%

1 **Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua**

2 **Introdurre il numero di sacchetti idrosolubili chiusi, previsti (come da etichetta) nell'atomizzatore**

3 **Mettere in funzione l'agitatore**

4 **Attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti), ed........**

5 **.......aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione**

RUMITION

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE A BASE DI AZINPHOS METILE

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE

Azinphos metile puro g 25,5

Sostanze bagnanti ed adesive q.b. a g 100

Avvertenza: leggere attentamente la confezione prima di utilizzare il prodotto.

g. 50-100-200-250-500 - Kg. 1

SARIAF S.p.A. - Via Morgagni, 68 – FAENZA (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2202 del 10.4.1976

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

COCCITOX FLUIDO

INSETTICIDA in Emulsione concentrata
Olio minerale bianco anticoccidico

Composizione	
-Olio paraffinico bianco (residuo insolfonabile minimo 95%)	g 80
-Emulsionanti e solventi	q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SARIAF S.p.A. - Via Morgagni,68 - Faenza (RA)

Officine di produzione: A.D.I.C.A. Srl, Faenza (RA) / SIPCAM S.p.A., Salerano sul Lambro (LO) / I.R.C.A. Service S.p.A. Fornovo S.Giovanni (BG).
Officine di produzione: SIPCAM S.p.A., Salerano sul Lambro (LO) per la taglia da litri 1.000 (**Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto**).

Registrazione n° 2863 del 04.10.1978 del Ministero della Sanità

Taglie: lt 1-5-20-25-50-200-1000

Partita n.:

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Informazioni per il medico: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

Caratteristiche
Il Coccitox Fluido è un olio bianco anticoccidico preparato sotto forma di emulsione fluida che consente un più pratico impiego nei confronti degli usuali formulati di consistenza cremosa.
La sua attività insetticida è specifica contro le specie di Cocciniglie fisse e mobili delle colture: fruttiferi in genere, agrumi, piante ornamentali.
I trattamenti possono essere eseguiti sia nel periodo invernale o di fine inverno, che in quello primaverile-estivo.
Campi e dosi d'impiego
Contro le cocciniglie di fruttiferi e delle piante ornamentali.
- Trattamenti invernali: eseguire un trattamento a fine inverno alla schiusura delle gemme quando i parassiti sono più sensibili, impiegando litri 2,5-3 di Coccitox Fluido per ettolitro d'acqua.
- Per combattere le Cocciniglie resistenti nel pesco (Diaspis) e dell'olivo (Saissetia) è consigliabile aggiungere un estere fosforico (parathion, metilparathion).
- Trattamenti primaverili-estivi: eseguire i trattamenti alla comparsa delle nuove infestazioni in qualsiasi periodo vegetativo, impiegando litri 1,2-2,5 di prodotto per ettolitro d'acqua.
Contro le cocciniglie degli agrumi.
- Trattamenti invernali (in gennaio-febbraio dalla raccolta alla fioritura): litri 2,5 di Coccitox Fluido per ettolitro d'acqua. Elevare la dose a litri 3,5 per ettolitro d'acqua contro la Iceria e Cocciniglia cotonosa.
- Trattamenti estivi (giugno-settembre): litri 0,9-1,8 di Coccitox Fluido per ettolitro d'acqua.
Contro la Cocciniglia-mezzo grano di pepe (Saissetia) si consiglia di effettuare trattamenti con Coccitox Fluido e carbaryl, dalla terza decade di luglio alla seconda di agosto, alla totale uscita delle neanidi.

Preparazione dell'emulsione:agitare la confezione prima dell'uso. Versare il quantitativo richiesto di Coccitox Fluido in un piccolo recipiente, aggiungere un poco d'acqua (circa pari alla metà del prodotto impiegato) rimescolando con cura. Aggiungere altra acqua e versare questa emulsione nel quantitativo totale di acqua prestabilito.

Compatibilità: il Coccitox Fluido è miscibile con la maggioranza dei prodotti antiparassitari. Non è miscibile con gli zolfi, i polisolfuri, i formulati a base di Captan, di Faltan. Distanziare di una quindicina di giorni i trattamenti a base di Coccitox Fluido da quelli con i prodotti sopra citati.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : Non eseguire i trattamenti nei periodi eccessivamente caldi.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto - In caso di miscela con esteri fosforici tale periodo è elevato a 30 giorni

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

DICLOR 50

Fungicida in polvere bagnabile per la lotta contro tutte le forme di marciumi provocati da "Botryte" e da "Sclerotinia". La sua attività si esplica anche contro i marciumi pedali e radicali provocati da funghi del terreno.

Composizione:
- Dicloran (2,6-dicloro-4-nitroanilina) puro gr. 50
  (da p.a. tecnico al 95%)
- Sostanze bagnanti, disperdenti ed inerti q.b. a gr. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Sariaf S.p.A. – Via Morgagni, 68 – Faenza (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2929 del 16.10.1979

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)

Peso: 1 Kg

Partita n.:

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Lattuga, Radicchio: contro il *Marciume dell'insalata,* su piantine di insalata in semenzaio e in letti caldi applicare mediante irrorazione.
Dose: gr. 200 per 100 lt. d'acqua.
Effettuare i trattamenti a seconda dell'andamento stagionale, a distanza di 3-4 settimane. Sospenderli circa 1 mese prima della raccolta.
Trattare le piantine di insalata dopo la comparsa delle prime due foglie vere (quattro foglie totali).
Fragola: contro la *Muffa grigia,* iniziare i trattamenti poco prima della fioritura e ripeterli a distanza di 10-15 giorni, per un totale da 3 a 5 trattamenti a seconda dell'andamento stagionale.
Dose: gr. 150-200 per 100 lt. d'acqua.
Ortaggi in semenzai, letti caldi, serre: contro varie forme di *Marciumi pedali e radicali,* effettuare i trattamenti sulle colture con irrorazioni al colletto, alla distanza di 3-4 settimane l'uno dall'altro.
Dose: gr. 200 per 100 lt. d'acqua.
Gladioli: contro *Botryte* e *Sclerotinia,* applicare il Diclor 50 mediante irrorazioni al terreno lungo il solco, prima della messa a dimora dei bulbi.
Dose: gr. 800 per 100 lt. d'acqua, usando circa 5 lt. di soluzione per ogni 20 mt. di solco.
Per trattamenti alla coltura, la dose di impiego è di 200 gr. per 100 lt. d'acqua.
Ripeterli ad intervalli di 3-4 settimane.
Colture floreali: contro il *Mal del colletto* dei garofani ed altri *Marciumi pedali,* trattare mediante irrorazioni alle colture, soprattutto nella zona del colletto e ripeterli, a seconda dell'andamento stagionale, a 4 settimane l'uno dall'altro.
Dose: gr. 200 per 100 lt. d'acqua.
Il trattamento al terreno può rallentare talvolta la crescita delle giovani piantine di garofano, ma queste si riprendono rapidamente e la produzione non ne risente.

Compatibilità: il Diclor 50 è compatibile con gli antiparassitari di uso normale.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non impiegare il Diclor 50 su piantine giovani quando la temperatura è molto elevata.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

SARCAP

Anticrittogamico in polvere bagnabile

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
- Captano puro g 45
- inerti,disperdenti e bagnanti q.b. a 100

SARIAF spa – Faenza (RA)

Registrazione n. 3314 Ministero della Sanità del 20.11.1979

Officina di Produzione: SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)

Taglic: kg 1 –5

Partita n.:

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Tossico per inalazione. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro-intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipertensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

Usi consigliati:
Il SARCAP è un anticrittogamico efficace contro: Ticchiolatura del melo e del pero, Marciume bruno delle pomacee.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO:
Contro le varie malattie fungine il SARCAP viene impiegato alla dose di 200-300 g per 100 litri d'acqua.
Dovendo combattere infestazioni particolarmente forti, la dose può essere innalzata fino a 450 g per 100 litri d'acqua.
Per ottenere una sospensione omogenea, disperdere accuratamente la dose necessaria di SARCAP in poca acqua, poi diluire fino all'opportuno volume.
La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi.

Compatibilità:
Non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.) con olii e zolfi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità:
Può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious - Winesap - Stayman - Renetta del Canadà) e di pero (Butirra d'Anyou – Butirra Clairgeau - Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

Il suo impiego deve essere sospeso 15 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Da non vendersi sfuso.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Non operare contro vento.

l contenitore non può essere riutilizzato.

MA

ERBICIDA selettivo per cereali
Emulsione concentrata

Composizione
100 gr. di prodotto contengono:
MCPA (acido 4-cloro-2-metilfenossiacetico) puro g 22,20 (=244,2 g/lt)
Diluenti q.b. a g 100

IRRITANTE

SARIAF Spa, via Morgagni,68 Faenza (RA)

Registrazione n° 3343 del 08.02.1980 del Ministero della Sanità della SARIAF Spa, - via Morgagni,68- Faenza(RA)

Distribuito da: SIPCAM Spa ,via Carroccio,8 - Milano

Stabilimenti di produzione:
NUFARM GmbH&Co Kg com-Linz (Austria)

Taglie: lt 1-5.

Partita n°:

FRASI DIR RISCHIO
Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Informazioni mediche:
Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Sintomi di intossicazione: Astenia di grado notevole. Aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare. Ipotensione. Dermatiti da contatto. Senso di costrizione toracica. Cefalea, vertigini, convulsioni, coma.
Consigli terapeutici: Abbondante lavaggio gastrico. Ossigenoterapia. Sedativi. Diuretici. Solfato di chinidina. Pomate cortisoniche per le dermatosi.
Controindicazioni: è sconsigliata la digitale.

USI
L'MA è un erbicida selettivo da impiegarsi nelle colture di cereali (grano, riso, orzo, avena) per combattere le erbe spontanee che le infestano, quali: veccia, senape, fiordaliso, farfara, convolvo, matricaria, rafane, rosolaccio, acetosella.
L'MA diluito in acqua va distribuito quando il cereale da diserbare si trova nella fase vegetativa compresa fra la fine dell'accestimento e l'inizio della botticella e quando le infestanti sono in attivo sviluppo. Si possono anche eseguire trattamenti dopo la fioritura, oppure in pre-emergenza subito dopo la semina.

Dosi e modalità d'impiego
GRANO: da un minimo di lt. 1,8 = Kg. 2 ad un massimo di lt. 4,1 = kg. 4,5 di MA per ettaro.
RISO, ORZO, AVENA: da un minimo di lt. 1,8 = Kg. 2 ad un massimo di lt. 5,5 = kg. 6 di MA per ettaro.
Le dosi maggiori si consigliano quando le infestanti sono numerose e molto sviluppate, oppure in condizioni climatiche instabili; in tutti gli altri casi è bene adottare le dosi inferiori.
È importante non superare le dosi prescritte. La quantità di acqua da impiegare nella distribuzione del prodotto non è determinante, tuttavia essa deve essere sufficiente a distribuire uniformemente la dose di Ma su tutte la superficie da trattare.

Compatibilità
Il prodotto non si impiega in miscela con anticrittogamici ed insetticidi.

Avvertenze
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Fiori, viti, alberi da frutta e ornamentali e in genere tutte le piante coltivate sono sensibili all'azione di questo erbicida e non devono assolutamente essere colpite durante il trattamento, neanche dai vapori portati dal vento.
Sono consigliabili le applicazioni a bassa pressione ed alto volume perché meno pericolose per le colture sensibili vicine. I trattamenti a basso volume devono essere evitati in giornate di vento e non devono mai essere effettuati nelle vicinanze di medicai, melonaie, vigne ed altre coltivazioni sensibili al principio attivo contenuto nel MA.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

RL 40

Insetticida fosforganico in emulsione concentrata

COMPOSIZIONE
Dimetoato puro .g 38 (=402 g/l)
Solventi ed emulsionanti q. b. a g 100
Contiene: Cicloesanone e Xilene

NOCIVO

SARIAF S.p.A. - Via Morgagni, 68 – Faenza (RA)

Registrazione n° 3383 del Ministero della Sanità del 07/01/1980

Officina di produzione:
ALTHALLER ITALIA Srl - S. Colombano al Lambro (MI)
CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE)
ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LATINA)
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: Lt 1–10

Partita n°

FRASI DI RISCHIO
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Dimeotoato: sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo. Ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia. Ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali confusione, atassia, convulsioni, coma.
Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida in seguito spastica delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino alla comparsa dei primi segni di atropinizzazione
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

USI FITOFARMACI
L'RL 40 è particolarmente adatto per la lotta contro i parassiti dell'olivo: Mosca (*Dacus oleae*), Punteruolo (*Coenorrhynus cribripennis*), Tignola (*Prays oleellus*), Tripide (*Liothrips oleae*), Oziorrinco (*Otiorrynchus*); contro la Mosca delle ciliegie (*Rhagoletis cerasi*), gli Afidi, Tripidi, Tingidi, Psille.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA
Olivo (effettuare massimo due trattamenti): contro
- Mosca: nel periodo Giugno-Ottobre, sia come trattamento curativo che preventivo ml 150
- Tignola: contro le 3 generazioni, da marzo a giugno ml 100-150
- Liotripide: prima dell'apertura dei fiori ml 100
- Punteruolo e Oziorrinco: ml 75

Ciliegio: contro
- mosca delle ciliegie e afide nero al cambiamento di colore del frutto: ml 50

Pero (piante non in produzione): contro afidi, tripidi, tingidi, psille: ml 100
Agrumi (piante non in produzione): contro afidi: ml 75
Lattuga in campo, asparago (dopo la raccolta dei turioni), pomodoro in campo, melanzana in campo: afidi ml 100
Frumento: contro afidi a fine fioritura:ml 75

Compatibilità: non è compatibile con i pesticidi aventi reazione alcalina, per esempio poltiglia bordolese, polisolfuro di calcio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: non impiegare l'RL 40 per irrorazioni a basso volume sulle varietà di olivo: Coratina, Simona, Canino, Verdina, Marsella, Frantoio, Itrana, Bosana ed eventuali altre sensibili. Non trattare l'arancio amaro, i cedri, i limoni, della varietà interdonato.

Rischio di nocività: tossico per gli insetti utili, nocivo per gli animali domestici, gli uccelli e il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta su Frumento, Ciliegio, Lattuga,Pomodoro, Melanzana; 35 giorni su Olivo; per Asparago trattare solamente dopo la raccolta dei turioni.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

FALON

Insetticida Specifico per la lotta contro il Ragnetto rosso allo stato di adulto, larva, uovo
Tipo di formulazione: emulsione concentrata

COMPOSIZIONE:
DICOFOL puro g. 18 (= 178 g/l)
Solventi ed emulsionanti q.b. a g. 100
Contiene XILENE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IRRITANTE

SARIAF S.p.A. – Faenza – Via Morgagni, 68

Officina Di Produzione:
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi)

Registrazione n. 3693 del 30/05/1980 del Ministero della Sanità

Quantità netta del preparato: 1 litro

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica: barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il FALON si impiega in frutticoltura (pomacee, drupacee), viticoltura, agrumicoltura, orto–floricoltura, colture industriali e nocciolo.
Il FALON si usa alla dose di **150 ml/hl.**
Eseguire i trattamenti avendo cura di bagnare completamente ed abbondantemente le piante.

Compatibilità
Il FALON può essere miscelato con qualsiasi altro insetticida od anticrittogamico avente reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il FALON è fitotossico per la melanzana.

Rischi di nocività
Il FALON è tossico per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

CUPROSARIAF

Fungicida a base di Rame ossicloruro
Tipo di formulazione: Polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
- Rame metallo (sotto forma di ossicloruro) g. 50
- Coadiuvanti q.b. a g. 100

SARIAF S.p.A. - Via .Morgagni,68 - Faenza (RA)
Stabilimento produttore:
MONTAWERKE BRIXLEGG AG-A-6230 Brixlegg - Austria
Registrazione n. 3701del 13/06/1980 del Ministero della Sanità
Taglie: Kg 1-5-20

Partita n. :

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

Il CUPROSARIAF si usa senza aggiunta di calce e può essere miscelato con gli Zolfi bagnabili, ecc.
Combatte: Peronospora della vite, delle patate e dei pomodori, Ticchiolatura del melo e del pero, Bolla e Gommosi del pesco (trattamenti invernali) , Occhio di pavone degli olivi, Mal secco degli agrumi, Vaiolo delle bietole.

Dosi e modalità d'impiego per 100 litri d'acqua:
Vite: nei trattamenti liquidi contro la Peronospora Kg 0,3-0,5
Melo e Pero: contro la Ticchiolatura Kg 0,3-0,4
Pesco: nei trattamenti invernali contro la Bolla e la Gomma del pesco Kg 1-1,5
Olivo: contro l'Occhio del pavone degli olivi Kg 0,3-0,4
Patate e Pomodori: contro la Peronospora Kg 0,3-0,5
Barbabietola: contro il Vaiolo delle bietole Kg 3,5-4 per ettaro
Agrumi: contro il Mal secco degli agrumi Kg 0,3
Le irrorazioni dovranno essere iniziate verso la terza decade di ottobre e dovranno essere ripetute, ad un mese di intervallo, fino alla fine di gennaio.

Compatibilità: è miscibile con i più comuni insetticidi e anticrittogamici ad eccezione di Tiram (Tetrasar 50) e polisolfuro di bario (Florbario).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco, alcune varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, Willia, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

BASIRAM

Fungicida rameico in formulazione liquida.

Composizione:
Rame metallo (da rame solfato tribasico) . . . . . . gr 15 (=190 g/l)
Coformulanti . . . . q. b. a gr 100

SARIAF S.p.A. – via Morgagni, 68 - Faenza (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 3873 del 13.10.1980

Stabilimenti di produzione:
PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours – LA CHAMBRE (Francia)
DIACHEM S.p.A. – U.p. SIFA – Caravaggio (BG)
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)

Contenuto netto: ml 100-250-500; lt 1-5-10-20

Partita n°

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico, renale, e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso, febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, pencillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche: BASIRAM, per le sue particolari caratteristiche formulative, permette di ottenere una ottima azione fungicida mediante l'utilizzo di rame metallo a bassi dosaggi .
Dosi di impiego: Le dosi indicate si riferiscono a 100 litri di acqua e per trattamenti a volume normale.

Coltura	Patogeno	Dose ml/hl	Epoca di impiego
	Fruttiferi		
Vite	Peronospora, Marciume nero degli acini	300 – 600	Intervenire ogni 7-10 giorni dalla formazione degli acini a 20 giorni dalla vendemmia. In caso di forte attacco attenersi alla dose massima e ridurre l'intervallo del trattamento
Melo, Pero, Cotogno	Ticchiolatura, Cancri rameali, azione di contenimento verso Erwinia amilovora (colpo di fuoco batterico), Nectria, Batteriosi	300-400 700-800	Nei trattamenti primaverili, intervenire ogni 7-10 giorni dalle prime fasi vegetative fino alla raccolta in funzione dell'andamento climatico. Trattamenti autunno-invernali.
Drupacee Mandorlo	Corineo, Fusicocco, Bolla, Monilia, Cancri rameali, Cancro batterico del pesco (Pseudomonas Syringae)	800 700	Trattamenti autunno-invernali con piante in pieno riposo vegetativo Trattamenti alla caduta foglie
Nocciolo	Necrosi batterica (Xanthomonas campestris corylina)	800	Effettuare due trattamenti in ottobre distanziati di circa tre-quattro settimane
Olivo	Occhio di pavone, Fumaggine, Lebbra, Rogna, Batteriosi	500-600	In pre-fioritura e in vegetazione
Agrumi	Mal secco, Allupatura, Melanosi, Fumaggine, Antracnosi, Scabbia, Batteriosi	500-600	Intervenire prima e dopo la fioritura in funzione della gravità dell'attacco.
Noce	Antracnosi	650	Intervenire in pre-fioitura; in caso di piogge frequenti si consigliano applicazioni supplementari. In estate è opportuno aggiungere 150 ml di olio minerale bianco
Nespolo	Ticchiolatura	300-400	In vegetazione
Fragola	Vaiolatura rossa (Mycosphaerrella), Maculatura rosso-bruna (Marssonina e Gnomonia), Batteriosi (X. Fragariae)	2-3 l/ha	Iniziare i trattamenti quando le piante hanno attecchito proseguendo ogni settimana per tutta la stagione. Intervenire prevalentemente in pre-fioritura e sulla vegetazione autunnale. Nel caso l'applicazione del preparato manifesti segni di fitotossicità sospendere i trattamenti.
Actinidia	Batteriosi	600-700	Caduta foglie

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

	Ortaggi		
Ortaggi	Peronospora, Alternaria, Septoria, Cladosporiosi, Cercospora, Antracnosi, Ruggini, Bremia, Phoma, Sclerotinia Batteriosi	300-400 400-500	In vegetazione, iniziare le applicazioni al verificarsi delle condizioni per lo sviluppo della malattia, proseguendole ad intervalli di 7-12 giorni, in funzione dell'andamento climatico e dello sviluppo della vegetazione. Per le colture trapiantate Iniziare le applicazioni dopo il trapianto ad intervalli di 7-12 giorni in funzione delle condizioni climatiche. Per i cavoli, applicando le dosi più alte potrebbero verificarsi leggeri arrossamenti o macchie delle foglie esterne.
	Oleaginose		
Oleaginose	Peronospora, Antracnosi	5 l/Ha	

	Colture a pieno campo		
Barbabietola da zucchero	Cercospora	5-6 l/ha	In vegetazione, trattamenti ripetuti.
Patata	Peronospora, Alternaria, Batteriosi	6 l/ha	In vegetazione
Tabacco	Peronospora, Antracnosi	400	In vegetazione
Cereali	Ruggine, Septoria	800	In vegetazione, iniziando i trattamenti al verificarsi delle condizioni per lo sviluppo delle malattie
Riso	Disalgante/molluschicida	4-5 l/ha	Trattamento delle risaie
	Floreali, ornamentali, forestali		
Floreali, ornamentali, forestali	Ticchiolatura, Peronospora, Ruggine, Septoria, Sclerotinia, Antracnosi, Batteriosi	300-600	In vegetazione, iniziando i trattamenti al verificarsi delle condizioni per lo sviluppo delle malattie
Cipresso	Cancro (Coryneum cardinale)	500	in pieno inverno
Rosa	Peronospora, Ticchiolatura, Ruggine	300 - 400	Applicazioni settimanali ad iniziare al verificarsi delle condizioni per lo sviluppo della malattia, proseguendo a cadenza settimanale, in funzione dell'andamento climatico e dello sviluppo della vagetazione.
Ciclamino	Antracnosi, Maculatura fogliare, Batteriosi (Pectobacterium philodendri)	300	Applicazioni settimanali

Compatibilità: Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina, quali polisolfuri di calcio e bario. Miscelare il prodotto con altri formulati solo se vi è evidenza di sufficiente sicurezza di compatibilità; è comunque consigliabile procedere ad una prova preventiva per sincerarsi che i prodotti che si vogliono associare non presentino incompatibilità chimico-fisica.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Non trattare durante la fioritura. Non trattare piante in condizioni di stress o in caso di forti escursioni termiche. Su *Pesco, Nettarine, Susino e alcune varietà di melo* quali: Abbondanza, Black Ben Davis, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Mongendurf, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, di pero: Abate fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrasana, B.C. Williams, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard, cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa .

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

BASIRAM

Fungicida rameico in formulazione liquida.

Composizione:
Rame metallo (da rame solfato tribasico) . . . . . . gr 15 (=190 g/l)
Coformulanti . . . . q. b. a gr 100

SARIAF S.p.A. – via Morgagni, 68 - Faenza (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 3873 del 13.10.1980

Stabilimenti di produzione:
PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours – LA CHAMBRE (Francia)
DIACHEM S.p.A. – U.p. SIFA – Caravaggio (BG)
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)

Contenuto netto: ml 100

Partita n°

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico, renale, e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso, febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, pencillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

PIKKE

Insetticida, in forma di liquido emulsionabile particolarmente indicato per la difesa contro i parassiti di olivo

PIKKE – Composizione:
- Metidation puro 19 (– 186 g/litro)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a g. 100

Contiene Xilene

MOLTO TOSSICO

SARIAF S.p.A.-Via Morgagni, 68 Faenza (RA)

Registrazione n. 4578 del 28.12.81 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
SIPCAM SpA – Salerano sul Lambro (Lodi)
ALTHALLER ITALIA Srl
S. Colombano al Lambro (MI)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Taglie: ml. 250 Litri 1-5-10-20

Partita n.: ....

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290

FRASI DI RISCHIO

Infiammabile. Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. Molto tossico per ingestione. Irritante per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto è un insetticida a largo spettro di azione che agisce per ingestione e per contatto; è inoltre, dotato di azione citotropica (penetra nei tessuti vegetali) la quale gli permette di raggiungere quegli insetti che si annidano nelle foglie accartocciate come Afidi, Cemiostoma, Cacoecia.

Il prodotto viene impiegato contro i seguenti parassiti:
Olivo: cocciniglie, tignole, tripidi

Dose di impiego: ml. 160-300 per 100 litri di acqua in relazione al grado di infestazione.

Preparazione della poltiglia: versare la prestabilita dose di prodotto direttamente nel totale quantitativo di acqua, rimescolando con cura.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni fitofarmaci ad esclusione di quelli a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri, ecc.).

Avvertenze: in caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 100 giorni prima della raccolta delle olive.

Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente almeno 20 giorni dopo il trattamento.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Non operare contro vento.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

FITOP

Prodotto ormonico per impedire la prematura caduta dei frutti (mele e pere)

Composizione	
- NAA puro	g. 4
- Solventi	q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SARIAF S.p.A. - Faenza (RA)

Registrazione n. 5980 del 26/07/1984 Ministero della Sanità

Stabilimenti di produzione: TERRANALISI Srl - Cento(FE); SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO); I.R.C.A.Service S.p.A., Fornovo S.Giovanni (BG)

Taglie: ml 250 lt 1

Partita n° ....

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il FITOP consente di trattare i frutti (mele e pere) sugli alberi, fino a completa maturazione, evitando il fenomeno della cascola che si verifica normalmente alcune settimane prima della maturazione. L'azione del FITOP è più evidente nelle varietà di mele e pere aventi frutti con peduncolo verde, mentre quelle con peduncolo giallo e legnoso risentono meno del vantaggio del trattamento. Le qualità di mele sulle quali i risultati sono più evidenti sono: Winesap, Worchester, Coxs' Orange, Delicious rosso, King David, Renetta Ananas, Golden Delicious, Jonathan, Stayman, ecc., fra le pere: Williams, Butirra Clairgeau, Decana del Comizio, Curato, Luisa buona d'Avranches, Favorita di Clapp.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il FITOP si usa alla dose di 50 ml. per 100 litri di acqua. E' assolutamente indispensabile che le dosi siano esattamente calcolate onde evitare effetti contrari. Il FITOP deve essere irrorato non appena si prevede l'inizio della cascola, cercando di colpire con il getto i frutti ed i loro peduncoli.

Avvertenza: usare il prodotto da solo, con recipienti pulitissimi ed effettuare i trattamenti verso sera.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

BI-FEN

Diserbante ormonico selettivo per la lotta contro le erbe infestanti dei cereali.
Tipo di formulazione: liquido

COMPOSIZIONE:
2,4 D (Sale dimetillaminico) puro g 28,3 (= 331 g/l)
MCPA (Sale dimetillaminico) puro g 28,8 (= 337 g/l)
Solventi q.b. a g 100

SARIAF S.p.A. - Via Morgagni,68 - Faenza (RA)
Registrazione n° 6438 del 13.06.1985 del Ministero della Sanità
Stabilimento di produzione:
CHEMIA S.p.A. – S. Agostino (Fe);
SIAPA S.p.A. – S. Vincenzo di Galliera (Bo);
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Montalcino, fraz. Torrenieri (Si)
TERRANALISI Snc – Renazzo di Cento (Fe);
ISAGRO S.p.A. – Aprilia (Lt).

NOCIVO

Taglie: 1 litro
Partita n°

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Irritante per le vie respiratorie e la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: 2,4-D 28,3% e MCPA 28,8%; le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi, nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, neviti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazione ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione; gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica: ospedalizzare.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
Il BI-FEN è un diserbante ormonico selettivo per la lotta contro le erbe infestanti dei cereali, costituito dalla miscela di 2,4-D ed MCPA associati in una formulazione che permette di ottenere risultati superiori a quelli dei due principi attivi presi singolarmente. Il BI-FEN combatte le erbe infestanti non graminacee quali: Papaveri, Capsella, Senape, Fiordalisi, Vecce, Convolvoli, Ranuncoli, Ramolacci, Stoppione, Galinsoga, Erba Calderina, Vilucchio, Borsa del pastore, Gallinaccia, Centocchio.
Il BI-FEN viene impiegato alla seguente dose: litri 0,850-2,100 = Kg 1-2,5 per ettaro in 250-400 litri d'acqua.
Il trattamento deve essere eseguito dopo l'inizio della "levata" (a partire dall'epoca in cui il culmo del cereale presenta già 5 foglie) e prima della fase di "botticella".
Si consiglia di effettuare i trattamenti in giornate calme e non piovose e con temperature non inferiori ai 12°C.
In caso di temperature superiori ai 18/20°C, diminuire la dose del 10-20% circa.
La soluzione erbicida si prepara versando la quantità prestabilita di BI-FEN direttamente nel totale quantitativo di acqua necessario per il trattamento, agitando con cura.

COMPATIBILITA'
Il BI-FEN è miscibile con altri prodotti ormonici.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il BI-FEN è fitotossico per frutteti, ortaggi e colture floreali; evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

ORTAL

Fungicida organico a lunga persistenza efficace contro la Botrytis e la Peronospora per applicazioni in viticoltura

Tipo di formulazione: polvere

COMPOSIZIONE:	
FOLPET puro	g. 50
Inerti, disperdenti e bagnanti	q. b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SARIAF S.p.A. – Faenza
Via Morgagni, 68

Registrazione n. 6439 del 13/06/1985 del Ministero della Sanità

Officina di produzione:
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)

Quantità netta del preparato: Kg 1-10.

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro–intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno delle urine).

Terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

Modalità e dosi d'impiego

L'ORTAL è un fungicida organico a lunga persistenza, indicato per combattere la Peronospora e la Muffa Grigia della Vite.

Il suo impiego è consigliabile specialmente a cavallo della fioritura poiché in questo periodo non possono essere impiegati i composti rameici.

L'ORTAL si impiega alle seguenti dosi per 100 litri d'acqua:

- VITICOLTURA: contro la Peronospora e la Botrytis (Muffa Grigia) g. 200

Compatibilità:

L'ORTAL è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri, ecc.) e di quelli a base di olii minerali (semplici ed attivati).

L'impiego deve essere distanziato di almeno tre settimane da quello degli olii minerali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. Sulle uve da vino bisogna sospendere i trattamenti almeno 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare il normale decorso della fermentazione del mosto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Da non vendersi sfuso.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Non operare contro

Il contenitore non può essere riutilizzato.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

RISAN

Erbicida selettivo in post-emergenza contro il giavone del riso

Emulsione concentrata

COMPOSIZIONE:
Propanil puro g 35 (= 362 g/l)
Solventi ed emulsionanti q.b. a g 100
Contiene inoltre:
Cicloesanone e Xilene

SARIAF SPA - Via Morgagni,68 - Faenza (RA)

Officine di produzione:
INQUIPORT S.A. - Caracas - Venezuela
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)

NOCIVO

Registrazione n° 6442 del 13.06.85
del Ministero della Sanità

Quantità netta del preparato:
Litri: 0,1 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 - 50 (*)

Partita n.:

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia: sintomatica
AVVERTENZA:Consultare un Centro Antiveleni.

(*) Contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo (limitatamente alla taglia da lit. 50)

MODALITA', CAMPO D'IMPIEGO E DOSI
Il RISAN è un erbicida selettivo d'impiego in post-emergenza per il diserbo del Riso dal Giavone. Il prodotto agisce per contatto e successiva traslocazione ed è efficace, oltre che sul Giavone, anche su altre infestanti nate da seme o che si trovano nel loro primo stadio di sviluppo come: Scirpus mucronatus (Quadrello), Heleocharis spp. (Puretta), Cyperus spp. (Porro), Alisma (Cucchiaio). Per il controllo completo delle infestanti non graminacee quali Alisma plantago-acquatica (Mestolaccia), Eleocharis spp., Sagittaria spp. (Erba saetta), Butomus umbellatus (Giunco fiorito), Scirpus spp. (Giunco), il RISAN può essere impiegato in miscela con l'MA, variando le dosi di quest'ultimo in funzione dello sviluppo delle infestanti.
Il RISAN viene impiegato alle seguenti dosi:
1) Giavone con 1-2-3 foglie, ma in prevalenza con 2 foglie: lt. 9,5-11,4 = kg. 10-12 per ha
2) Giavone con 3-4 foglie: lt. 11,4-14,2 = kg. 12-15 per ha
3) Giavone dalla quarta foglia all'inizio dell'accestimento: lt. 14,2-17,1 = kg. 15-18 per ha
Nel caso che il Giavone sia "invecchiato", cioè cresciuto in condizioni di basse temperature, quindi dotato di radici robuste e profonde rispetto all'apparato fogliare, si consiglia di usare le dosi più alte.
Si consiglia di effettuare il trattamento quando il Giavone si trova nella fase compresa fra la prima e la terza foglia, poiché in questo stadio presenta la massima sensibilità.
Il Giavone si presenta nello stadio di 2-3 foglie in genere da 12/15 a 20/22 giorni dopo la semina del Riso.
Il RISAN va diluito in un quantitativo di acqua che varia in funzione del mezzo impiegato per la distribuzione:
con una motopompa a barra (8 m. e ugelli da 1 mm.): lt. 300/400 per ettaro; con pompa a spalla: lt. 400/500 per ettaro. Alle dosi massime è consigliabile aumentare il quantitativo di acqua a 600/700 lt. per ettaro.
Il trattamento deve essere eseguito con la risaia in asciutta; a tal fine è sufficiente togliere l'acqua 24 ore prima del trattamento. Dopo il trattamento la risaia deve rimanere in asciutta almeno 24 ore.
Ripristinare poi un livello d'acqua relativamente alto, mantenendolo in queste condizioni per 8/12 giorni.

Compatibilità: Il RISAN può essere usato in miscela con l'MA.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il RISAN alle dosi più alte può provocare parziali necrosi o ingiallimenti degli apici delle foglie del riso che comunque scompaiono nel giro di 6/7 giorni, senza pregiudicare lo sviluppo delle piantine di riso.
Non eseguire il trattamento nel caso si preveda una pioggia entro le successive 3-6 ore.
Effettuare il trattamento in giornate prive di vento, per evitare che la nube possa essere trasportata su colture sensibili vicine come: medica, trifoglio, pisello, fagiolo, frutteti, vigneti, ecc.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

RISAN

Erbicida selettivo in post-emergenza contro il giavone del riso

Emulsione concentrata

COMPOSIZIONE:
Propanil puro g 35 (= 362 g/l)
Solventi ed emulsionanti q.b. a g 100
Contiene inoltre:
Cicloesanone e Xilene

SARIAF SPA - Via Morgagni,68 - Faenza (RA)

Officine di produzione:
INQUIPORT S.A. - Caracas - Venezuela
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)

Registrazione n° 6442 del 13.06.85 del Ministero della Sanità

Quantità netta del preparato:
Litri: 0,1

Partita n.:

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia: sintomatica
AVVERTENZA:Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

SARILIN

Insetticida in polvere bagnabile
per la lotta contro i parassiti di melo, pero e colture forestali

Composizione:
100 gr. di prodotto contengono:
5 gr. di diflubenzuron puro
q.b. a gr.100 di bagnanti, disperdenti ed inerti.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SARIAF S.p.A.
Sede legale: Faenza (RA) – Via Morgagni,68,

Registrazione Ministero della Sanità n. 6616 del 4/2/1986

Officina di produzione:
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: kg. 1

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Informazioni mediche:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche:
Il SARILIN è un nuovo insetticida che agisce soprattutto per ingestione e inibisce il regolare sviluppo della cuticola e quindi il normale svolgimento delle mute. E' efficace verso gli stadi larvali di numerose specie di insetti. Sulle colture agrarie il SARALIN agisce contro i microlepidotteri minatori e i lepidotteri ricamatori del melo, la Carpocapsa, l'Orgya e la Psilla del pero. In foresta combatte: Thaumetopoea pitycampa, (Processionaria del pino), Lymatria dispar, Rhyacionia buoliana, Pritiphora abetina. Risulta particolarmente selettivo nei confronti degli entomofagi e dei pronubi per cui si presta per programmi di lotta integrata.
Dosi e modalità d'impiego:
- MELO e PERO: gr. 250-300 in 100 litri di acqua contro i minatori del melo e del pero (Lithocolletis, Cemiostoma) effettuando i trattamenti durante la fase di volo degli adulti in corrispondenza dell'ovideposizione.
- gr.400 in 100 litri d'acqua contro i lepidotteri ricamatori (Capua, Archips), Carpocapsa, Orgya, Psilla del pero, trattando durante le deposizione delle uova o in prossimità della loro schiusura.
- PIANTE FORESTALI: gr. 250-350 in 100 litri d'acqua contro Processionaria, Lymatria, Pristiphora e Tortrice delle gemme apicali dei pini e degli abeti, trattando durante la ovideposizione o quando le uova stanno per schiudere.

Preparazione della poltiglia:
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.
Compatibilità:
Il SARALIN è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, poltiglia bordolese).
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 45 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

TRILIN

Diserbante selettivo in formulazione liquida emulsionabile per il controllo in pre-emergenza di infestanti annuali Graminacee e Dicotiledoni in diverse colture - Tipo di formulazione: emulsione concentrata

COMPOSIZIONE
- Trifluralin puro ....g. 42,75 (= 440 g/lt)
- Coformulanti e solventi..........q. b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SARIAF S.p.A. - FAENZA (RA)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 6740 del 19/06/1986

Officina di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)
ALTHALLER ITALIA Srl
S.Colombano al Lambro (MI)
TERRANALISI Srl - Cento (FE)
TORRE Srl - Torrenieri (SN)
CHEMIA S.p.A. - Dosso (FE)

Confezioni lt: lt 1-5-20-25

Partita n.

FRSASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI MEDICHE In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il TRILIN è un diserbante di pre-emergenza delle infestanti che controlla una vasta gamma di malerbe, distruggendo i semi al momento della germinazione; non controlla le infestanti già sviluppate. Il TRILIN controlla le graminacee quali: Coda di volpe (Alopecurus myosuroides) Giavone (Echinochloa crus-galli), Loglio (Lolium perenne), Sanguinella (Digitaria sanguinalis), Setaria (Setaria glauca), Sorghetta da seme (Sorghum halepense), Spica venti (Apera spica-venti), e le infestanti a foglia larga quali: Amaranto (Amaranthus retroflexus), Aparine (Galium aparine), Atriplice (Atriplex papula), Centocchio (Stellaria media), Correggiola (Polygonum aviculare), Erba porcellana (Portulaca oleracea), Falso convolvolo (Polygonum convolvolus), Lamio (Lamium spp.), Ortica piccola (Urtica urens), Papavero (Papaver roheas), Veronica (Veronica spp.).

DOSI, MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO

Il TRILIN deve essere incorporato nel terreno (tranne quando è impiegato sui cereali indicati) ad una profondità di 5-10 cm immediatamente dopo l'applicazione (entro 30 minuti in estate ed entro 3-4 ore nei periodi freddi e piovosi) in modo da evitare perdite di efficacia. L'interramento del prodotto assicura una prontezza di azione anche in assenza di pioggia e permette di effettuare lavorazioni superficiali senza ridurne l'efficacia. L'attrezzatura impiegata per l'interramento deve assicurare una frantumazione delle zolle più grosse e mescolare in modo uniforme il prodotto nel terreno.

L'interramento può essere effettuato con frese, erpici a disco, motocoltivatori e motozappe. Il prodotto và applicato impiegando volumi d'acqua di 400-600 lt/Ha.

Il TRILIN viene impiegato alle seguenti dosi:

COLTURE TRAPIANTATE

Intervenire da 6 settimane a 1 giorno prima del trapianto, sulle seguenti colture :
- Pomodoro, Peperone, Indivia, Lattuga, Scarola, Carota, Finocchio, Sedano, Prezzemolo: applicare ed interrare il prodotto pochi giorni prima del trapianto alla dose di litri 1 - 1,5 - 2 per ettaro rispettivamente per terreni leggeri, di medio impasto e pesanti o argillosi.
- Cavolo, Cavolfiore, Cipolla: applicare ed interrare il prodotto pochi giorni prima del trapianto alla dose di litri 1 - 1,5 - 2 per ettaro, rispettivamente per terreni leggeri, di medio impasto e pesanti o argillosi.

COLTURE SEMINATE

Intervenire da 6 settimane a 1 giorno prima della semina, sulle seguenti colture :
- Fagiolo, Fagiolino, Carota, Finocchio, Sedano, Prezzemolo, Aglio, Girasole, Cotone, Arachide, Soia: applicare ed interrare il prodotto pochi giorni prima della semina alla dose di litri 1 - 1,5 - 2 per ettaro rispettivamente per terreni leggeri, di medio impasto e pesanti o argillosi.

PISELLO: applicare ed interrare il prodotto pochi giorni prima della semina alla dose di litri 1,2 per ettaro per tutti i tipi di terreno.

CAVOLO, CAVOLFIORE da semina: applicare ed interrare il prodotto pochi giorni prima della semina alla dose di litri 1 - 1,5 - 2 per ettaro rispettivamente per terreni leggeri, di medio impasto e pesanti o argillosi.

COLZA, RAVIZZONE: applicare ed interrare il prodotto pochi giorni prima della semina alla dose di litri 1 - 1,5 - 2 per ettaro rispettivamente per terreni leggeri, di medio impasto e pesanti o argillosi.

GLADIOLO: applicare ed interrare il prodotto pochi giorni prima della messa a dimora alla dose di litri 1 - 1,5 - 2 per ettaro, rispettivamente per terreni leggeri, di medio impasto e pesanti o argillosi, con bulbi di Gladiolo di almeno 2,5 cm di diametro.

AGRUMETI, VIGNETI, DRUPACEE, MELO E PERO; PIANTE ORNAMENTALI:
1) Nuovi impianti: applicare ed interrare il prodotto prima del impianto alla dose di litri 1 - 1,5 - 2 per ettaro rispettivamente per terreni leggeri, di medio impasto e pesanti o argillosi.
2) Impianti già radicati con almeno 2 anni di età: applicare ed interrare il prodotto alla dose di litri 2 per ettaro in funzione della natura del terreno.

MELONE, COCOMERO, CETRIOLO: applicare il prodotto al momento del diradamento, quando la coltura ha raggiunto lo stadio di 4 foglie vere, irrorando direttamente il terreno evitando di bagnare le piante ed interrando il prodotto subito dopo il trattamento. La dose è di litri 1 - 1,5 - 2 per ettaro, rispettivamente per terreni leggeri, di medio impasto e pesanti o argillosi.

PATATA: applicare ed interrare il prodotto dopo la messa a dimora dei tuberi, alla dose di litri 1 - 1,5 - 2 per ettaro rispettivamente per terreni leggeri, di medio impasto e pesanti o argillosi. Durante l'operazione di interramento bisogna avere cura di non danneggiare i tuberi.

FRUMENTO, ORZO, SEGALE (a semina autunnale): applicare il prodotto senza interrare, a partire da subito dopo la semina, ma prima dell'emergenza delle infestanti graminacee annuali e prima che le infestanti dicotiledoni annuali abbiano raggiunto lo stadio di 4 foglie vere. La dose deve essere di litri 1,2 - 1,5 per ettaro rispettivamente per terreni leggeri e per terreni medi e pesanti, quando il prodotto viene applicato prima dell'emergenza delle infestanti graminacee e di quelle dicotiledoni. Quando, invece, l'applicazione è fatta in post-emergenza delle infestanti dicotiledoni, la dose deve essere di litri 2 per ettaro per tutti i tipi di terreno. Per ottenere buoni risultati è necessario che il letto di semina sia ben preparato con l'eliminazione delle zolle grosse, e che tutti i semi siano ricoperti dal terreno; a tal fine, può essere utile rullare il terreno dopo la semina e prima del trattamento, evitando qualsiasi lavorazione a trattamento avvenuto e prima dell'emergenza della coltura.

CARCIOFO: applicare ed interrare prima dell'impianto dei carducci o dopo l'impianto degli ovuli. Per impianti in produzione applicare tra le file dopo il ricaccio o l'attecchimento ed interrare immediatamente. La dose deve essere di litri 1 - 1,5 - 2 per ettaro rispettivamente per terreni leggeri, di medio impasto e pesanti o argillosi.

ASPARAGO: applicare prima dell'emissione dei turioni ed incorporare immediatamente alla dose di litri 1 - 1,5 - 2 per ettaro, rispettivamente per terreni leggeri, di medio impasto e pesanti o argillosi.

MENTA: applicare il prodotto prima dell'impianto o del ricaccio ed incorporare immediatamente alla dose di litri 1 - 1,5 - 2 per ettaro rispettivamente per terreni leggeri, di medio impasto e pesanti o argillosi.

FRAGOLA: applicare il prodotto alla dose di litri 1 - 1,5 - 2 per ettaro rispettivamente per terreni leggeri, di medio impasto e pesanti o argillosi, interrando subito dopo l'applicazione in trattamenti primaverili dopo la ripresa vegetativa, senza interrare quando il prodotto viene applicato nei mesi invernali. Si consigliano comunque, prove preventive.

CAMPI DA GOLF: applicare il prodotto contro le graminacee annuali durante la germinazione dei semi (marzo - aprile), senza interrare, ma effettuando subito dopo una abbondante irrigazione. Usare la dose di litri 2 per ettaro.

"Obbligo di segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nelle aree trattate mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del pesticida"

COMPATIBILITÀ: TRILIN è compatibile con glifosate, glufosinate d'ammonio, paraquat, diquat e linuron; Per miscele con prodotti differenti dai sopracitati è consigliabile eseguire saggi preliminari."

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ISTRUZIONI SPECIALI : Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione di TRILIN e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocomero, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza e cavoli, spinacio. Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc.), nella primavera successiva all'applicazione del prodotto. Non deve essere applicato in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta, quando l'applicazione viene effettuata in post-emergenza della coltura.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

METOMIL SARIAF

Insetticida in polvere bagnabile, a base di Metomil per l'impiego in Viticoltura, Frutticoltura, Orticoltura

Composizione:
- Metomil puro .... g. 23
- Inerti, disperdenti, bagnanti q. b. a .... g 100

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Sariaf S.p.A.
Via Morgagni, 68 – Faenza (RA)

Registrazione n. 6849 del 11.11.1986 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
STI Solfotecnica Italiana S.p.A. Cotignola (RA)

Quantità netta del preparato: 1 Kg

Partita n.:

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290

FRASI DI RISCHIO

Molto tossico per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una falice regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO

il Metomil Sariaf è un insetticida che agisce per contatto e per via sistemica contro i Microlepidotteri fogliari del melo e del pero, gli Afidi dei fruttiferi, la Tignola della vite, gli Afidi delle colture orticole.
Viene impiegato alle seguenti dosi ogni 100 litri d'acqua:

Melo e Pero
- contro larve di Minatori quali *Lythocolletis* e *Cemiostoma* g 200
  I trattamenti vanno effettuati in primavera contro la larva di prima generazione, cioè non appena il primo stadio delle larve è visibile sulle foglie. I successivi trattamenti devono essere effettuati contro le larve di primo stadio.
- contro *Afidi* g 150-180
  Il trattamento va effettuato alla prima comparsa degli insetti sulle foglie e ripetuto in caso di nuova infestazione.

Drupacee
- contro *Afidi* (Afide verde del pesco, Afide farinoso) g 150-180
  Il trattamento va effettuato alla prima comparsa degli insetti e ripetuto in caso di nuove infestazioni

Vite
- contro le Tignole g 150-200
  Il trattamento va effettuato in base allo stadio vegetativo della pianta ed all'intensità dell'infestazione. Il trattamento può essere effettuato sia in via preventiva che curativa.

Barbabietola da zucchero
- contro *Afidi* g. 150
  Eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione e ripeterlo in caso di nuova infestazione.
- contro *Cleono* g. 180
  Effettuare il trattamento alla comparsa degli insetti e ripeterlo ad intervalli di 12-15 giorni. La dose non deve essere inferiore a Kg 1,8 per ettaro.
- contro *Altica* g. 160
  Effettuare il trattamento alla comparsa dell'insetto.

Tabacco
- contro *Afidi* g. 150-180
  Effettuare il trattamento all'inizio dell'infestazione e ripeterlo in caso di nuova infestazione.

Pomodoro, Melanzana, Cucurbitacee
- contro *Afidi* g. 150
  Effettuare il trattamento all'inizio dell'infestazione e ripeterlo in caso di nuova infestazione.
- contro *Nottue* g. 150
  Effettuare il trattamento all'apparire delle prime larve sui frutti e ripeterlo ad intervalli di 5-7 giorni in funzione dell'intensità dell'infestazione.

Cavolo e Lattuga
- contro *Cavolaie* g. 150-200
  Effettuare il trattamento all'inizio dell'infestazione e ripeterlo a intervalli di 5-7 giorni durante il periodo vegetativo. Si consigli l'aggiunta di Bagnante Sariaf.
- contro *Afidi* g. 150-180
  Effettuare il trattamento all'inizio dell'infestazione e ripeterlo in caso di nuova infestazione. Si consigli l'aggiunta di Bagnante Sariaf.

Fagiolo e Pisello
- contro *Afidi* e *larve di Lepidotteri* g. 150-180
  Effettuare il trattamento all'inizio dell'infestazione e ripeterlo in caso di nuova infestazione. Distribuire il prodotto avendo cura di bagnare in modo completo ed uniforme le parti trattate. Si consiglia la dose d'impiego più bassa per gli intervalli brevi tra i trattamenti e la dose più alta per gli intervalli più lunghi.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari, ad eccezione di quelli a reazione alcalina come Polisolfuri, Poltiglia Bordolese e Calce.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta; per le lattughe 14 giorni.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

SARIAFID

Aficida selettivo attivo contro gli afidi resistenti
Polvere Bagnabile

Composizione
- PIRIMICARB puro . . . . g 23,7
- Inerti, disperdenti e bagnanti q b a . . . . g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SARIAF S.p.A.
Via Morgagni, 68 - FAENZA (RA)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6915 del 18/12/1986

Officina di produzione:
CHEMIA S.p.A. – S. Agostino (FE)
ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT)
SII SOLFOTECNICA ITALIANA – Cotignola (RA)

Taglie autorizzate: g 200 Kg 1

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. **Sintomi muscarinici:** disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. **Sintomi nicotinici:** tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata; collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il SARIAFID è un aficida a base di Pirimicarb che agisce rapidamente per azione di vapore e per ingestione. Citotropico, ha una buona azione traslaminare e pertanto è in grado di colpire anche gli afidi nascosti e protetti nelle foglie accartocciate.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Si impiega alla dose di 150 g/hl sulle seguenti colture:
- Pesco: contro Afide verde, Afide bruno, Afide farinoso;
- Susino: contro Afide farinoso;
- Albicocco: contro Afide verde;
- Ciliegio: contro Afide nero;
- Melo e Pero: contro Afide gridio, Afide verde, Afide lanigero;
- Fragola: contro Afide giallastro, Afide nero, Afide verde;
- Cavolo contro: Afide verde, Afide nero;
- Lattuga, Indivia, Peperone, Pomodoro, Fagiolo, Fava, Carota, Bietola rossa, Rapa, Cipolla e Patata: contro Afide verde e Afide nero;
- Barbabietola da zucchero contro: Afide nero;
- Frumento, orzo, Avena: contro Afide verde e Afide nero;
- Tabacco: contro Aide verde e Afide a stria verde;
- Colture floreali e ornamentali in pieno campo, forestali: contro Afide verde, Afide nero, Afide lanigero.

Per una più completa efficacia è consigliabile l'aggiunta di 50-70 ml di Bagnante Sariaf e irrorare le piante con non meno di 10 hl di soluzione per ettaro, bagnando uniformemente la vegetazione.

Compatibilità: È compatibile con la maggior parte degli anticrittogamici ed insetticidi di uso comune; tuttavia si consiglia di eseguire una prova preventiva di miscelazione per accertare l'effettiva compatibilità dei coformulanti. Non è miscibile con polisolfuri e poltiglia bordolese.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività : Il prodotto può essere nocivo per gli animali domestici e per il bestiame. È nocivo per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta dei cereali e 14 giorni prima della raccolta delle altre colture.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Non operare contro vento.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

CEREBAS

Erbicida selettivo di post-emergenza dei cereali attivo contro le dicotiledoni
Tipo Di Formulazione: Emulsione Concentrata

Composizione
Ioxinil ottanoato . . . . g. 14,7 (=161,259 g/l)
Mecoprop . . . . g. 48,2 (=528,754 g/l)
Coformulanti . . . . q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SARIAF S.p.A. - via Morgagni,68 – Faenza (RA)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 7306 del 10.12.1987

Officine di produzione:
NUFARM S.A., Gennevilliers - FRANCIA.

Taglie: lt 1-5

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: IOXINIL OTTANOATO; MECOPROP le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
IOXINIL OTTANOATO: sintomi: - casi lievi: sensazione soggettiva di calore, sudorazione intensa, arrossamento del viso; - casi gravi: sudorazione e sete intense, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpiressia, nausea, vomito, diarrea; - casi molto gravi: sudorazione profusa, tremore, coma con convulsioni, edema polmonare, cianosi e disturbi respiratori. Terapia: sintomatica. L'iperpiressia va combattuta raffreddando il corpo del paziente applicando compresse fredde alla radice degli arti. Con gli antipiretici non si ottiene l'effetto desiderato.
MECOPROP: sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare; miosi. Nausea, vomito, cefalea ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, neviti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Cerebas é un diserbante di post-emergenza per il frumento, orzo, segale, avena. Controlla le infestanti dicotiledoni quali: ranuncolo, senape, veccia, capsella, stoppione, fiordaliso, gallio, stellaria, camomilla, papavero, farinello, persicaria, anagallide. Agisce per contatto, ma ha anche un'azione sistemica sui germogli delle dicotiledoni annuali.
Dosi di impiego:
Cerebas va utilizzato in post-emergenza alla dose di 2-2,5 lt/Ha dall'inizio dell'accestimento a prima della fase di botticella con temperatura minima di 10°C. Lasciare 10-12 giorni tra l'applicazione del prodotto e la trasemina del trifoglio o dell'erba medica, previa un'erpicatura per rompere lo strato superficiale.

Compatibilità: può essere miscelato con la maggior parte degli antiparassitari in commercio salvo quelli a reazione alcalina. Non usare con Poltiglia bordolese, Polisolfuri di bario e di calcio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Rischi di nocività: è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici ed il bestiame.

Intervallo di sicurezza: 30 giorni.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

PROPAMOCARB SARIAF

Fungicida ad azione sistemica
Tipo di formulazione: Liquida

Composizione:
- PROPAMOCARB cloridrato g. 66,5 (=722 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SARIAF S.pA
Via Morgagni, 68- Faenza (Ra)

Officina di produzione:
SILIA S.p.A. - Aprilia (LT)
DIACHEM S.p.A. - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
SCAM S.r.l. - Modena

Registrazione n. 9583 del 06.04.1998 del Ministero della Sanità

Taglie: litri 0,1 - 0,250 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20

Partita n.:

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA D'IMPIEGO
Fungida sistemico indicato nella difesa di numerose colture nel combattere i seguenti ficomiceti: Pythium spp., Phytophthora sp., Peronospora, Pseudoperonospora, Aphanomices sp., Bremia. Viene assorbito prevalentemente dalle radici e poi traslocato nell'apparato fogliare, caratterizzato da una lunga e completa protezione ed elevata selettività sulle colture manifestando, su esse, uno stimolo nel confronti della radicazione e sullo sviluppo vegetativo.
Il prodotto ha la caratteristica di poter essere impiegato con numerose tecniche quali: trattamenti fogliari, concia delle sementi, bagno dei bulbi e delle talee, disinfezione dei terricciati e dei letti di semina, trattamenti al terreno in pre e post-trapianto delle colture.
Viene impiegalo sulle seguenti colture: **Agrumi, Melo, Pero, Fragola, Cavoli, Lattuga, Cicoria, Indivia, Radicchio, Spinacio, Bietola da foglia e da costa, Sedano, Prezzemolo Basilico, Cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino), cetriolo, Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana), Carola, Bietola da orto, Rapa, Cipolla, Aglio, Porro, Tabacco, fioreali, forestali, ornamentali, nei vivai, nel semenzai, nella concia delle sementi e bulbi, campi da golf e prati ornamentali.**
Interventi:
TRATTAMENTI FOGLIARI: viene impiegato alla dose di litri 1,5-3 per ettaro di coltura in circa 15-20 ettolitri di acqua, sulle colture sopramenzionate.
CONCA DELLE SEMENTI: la dose d'impiego è di ml 1-4 per kg di seme di piccole dimensioni e ml 10-40 per kg di seme di dimensioni maggiori.
PREPARAZIONE DEI TERRICCIATI: impiegare 300 ml di prodotto per metro cubo di terriccio, disciolti in drca20 litri di acqua.
TRATTAMENTI AI SEMENZAI: impiegare ml 6-12 per metro quadro di superfide disciolti in 4-5 litri di acqua con l'avvertenza di ripetere il trattamento cinque giorni prima del trapianto con l'utilizzo di 6-8 litri di acqua per metro quadrato.
TRATTAMENTI ALTERRENO: pre-trapianto: impiegare ml 8-12 per metro quadro in 3-5 litri di acqua; post-trapianto: impiegare 100- 200 ml per pianta di una soluzione ottenuta diluendo 200 ml di prodotto per q.le acqua: trattare ogni 10-15 giorni con un massimo di 3-4 interventi.
COLTURE FLOREALI IN GENERALE: Informazioni particolareggiale per le seguenti colture: Garofano - Gerbera, si impiega il prodotto specificatamente contro Pythium e Phytophtora alla dose di ml 12-15 per metro quadro, disciolto in circa 2-4 litri di acqua, trattando due giorni prima dell'impianto e quindi procedendo all'incorporamento. Successivamente impiegare 200 ml per q.le acqua, con trattamento fogliare, bagnando abbondantemente con 400-500 litri ogni 1000 metri quadri, ad intervalli inizialmente di circa 8-10 giorni e successivamente ogni 15-25 giorni.
BULBOSE: per controllare Pythlum ultimum e Phytophthorasi immergono i bulbi per 20-30 minuti in una soluzione contenente 300 ml di prodotto per q.le acqua, poi, prima della messa a dimora, si tratta il terreno con 10-12 ml di prodotto, per metro quadrato in 2-4 litri di acqua e successivo incorporamento a circa 10-12 cm di profondità.
PIANTE FORESTALI (VIVAI): contro Phytophthora cactorum, Phytophtora dnnamomi e Pythium, intervenendo trattando il substrato colturale con 300 ml di prodotto per metro cubo, disciolto in 8-10 litri di acqua: si deve intervenire, in caso di necessità ogni 15-18 giorni con 200 ml di prodotto in 4-5 litri di acqua per metro quadro.
CAMPI DA GOLF - TAPPETI ERBOSI - PRATI ORNAMENTALI: per il controllo di Pythlum a p. ed altre specie, trattare con interventi fogliari a ml 1-1,5 per metro quadro, impiegando non meno di 100-200 litri di soluzione per 1000 mq. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia ripetendo i trattamenti ogni 14-15 giorni.

COMPATIBILITÀ:
non compatibile con i prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese) e gli olii minerali.

Avvertenze:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservale le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di Intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

PROPAMOCARB SARIAF

Fungicida ad azione sistemica
Tipo di formulazione: Liquida

Composizione:
- PROPAMOCARB cloridrato g. 66,5 (~722 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SARIAF S.pA
Via Morgagni, 68- Faenza (Ra)

Officina di produzione:
ISAGRO S.p.A. - Aprilia (LT)
DIACHEM S.p.A. - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
SCAM S.r.l. - Modena

Registrazione n. 9583 del 06.04.1998 del Ministero della Sanità

Taglie: litri 0,1

Partita n.:

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

SARMOX 30 WDG

Fungicida citotropico translaminare impiegato su Vite, Carciofo, Pomodoro, Patata e Tabacco contro la Peronospora

Tipo di formulazione: granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE:
Cimoxanil puro gr. 30
Coformulanti q.b. a gr. 100

NOCIVO

SARIAF S.p.A. – Faenza (RA)
Via Morgagni, 68

Registrazione n° 9594 del 08/04/1998 del Ministero della Sanità

Officina Di Produzione:
Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)

Kg 0,1 – 0,5 – 1 – 5 – 10 – 20

Partita n.: ....

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO:
Il SARMOX 30 WDG è un fungicida in formulazione di microgranuli idrodisperdibili ad azione citotropica translaminare indicato per il trattamento contro la Peronospora; possiede una persistenza d'azione di circa 5 giorni.
VITE: contro la Peronospora alla dose di g. 65-80 per q.le acqua trattando da quando si hanno le infezioni della malattia e fino alla fine della fioritura.
Quindi dall' allegagione impiegare g. 30-40 per q.le acqua miscelato con i prodotti di copertura quali i rameici, i ditiocarbammati ed il Folpet a un dosaggio pari a 60%-70% della dose comunemente impiegata.
CARCIOFO, PATATA, POMODORO, CIPOLLA, AGLIO, PORRO, GIRASOLE, SOIA, LATTUGA, ROSA, ZUCCHINO, MELONE, PISELLO, SPINACIO, TABACCO: contro la Peronospora a g. 65-80 per 100 q.le acqua, iniziando al verificarsi delle condizioni di infezioni e proseguendo. Nel caso di infezioni in atto effettuare due trattamenti ravvicinati alla dose più alta (5-7 giorni l'uno dall'altro). Si può ridurre la dose a g. 30-40 per q.le acqua se si effettuano trattamenti in miscela con rameici o ditiocarbammati, comunque tenere presente che la dose minima riferita ad ettaro non deve essere inferiore ai 400 g/ettaro.

COMPATIBILITA':
Non compatibile con i prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese) e gli oli minerali.

AVVERTENZA:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA':
Quando si tratta tenere lontano gli animali domestici e il bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto di girasole e soia; 21 giorni per il carciofo; 10 giorni per le altre colture.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Da non vendersi sfuso.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Non operare contro vento.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

SARMOX 30 WDG

Fungicida citotropico translaminare impiegato su Vite, Carciofo, Pomodoro, Patata e Tabacco contro la Peronospora

Tipo di formulazione: granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE:
Cimoxanil puro gr. 30
Coformulanti q.b. a gr. 100

SARIAF S.p.A. – Faenza (RA)
Via Morgagni, 68

Registrazione n° 9594 del 08/04/1998 del Ministero della Sanità

Officina Di Produzione:
Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)

Kg 0,1

Partita n.: ....

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

GLIFOSAR

Erbicida sistemico di post – emergenza

Tipo di formulazione: liquido

COMPOSIZIONE:
- GLIFOSATE g. 30,4 (*)(sotto forma di sale isopropilamminico)
- COFORMULANTI q. b. a g. 100(*)

Il contenuto di Glifosate acido equivalente corrisponde a 360 g/l ed è pari a g. 41 di Glifosate sale isopropilamminico per 100 g. di prodotto.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SARIAF S.p.A. – Via Morgagni, 68 - Faenza (RA)

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.p.A. - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
SCAM S.r.l. – Modena
ISAGRO .S..p..A. – Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)

Registrazione n. 9602 del 14/04/1998 del Ministero della Sanità

Taglie: ml 100-200-500 – LT 1–5–10–20–50

Partita n.

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO:
Il GLIFOSAR è un erbicida sistemico di post – emergenza delle infestanti, che agisce per assorbimento fogliare e viene traslocato sino alle radici e agli organi di propagazione con inibizione della sintesi proteica con effetto visivo dopo alcuni giorni con ingiallimento ed arrossamento delle infestanti e successivo disseccamento. Trattare su infestanti in attiva crescita e che non siano sofferenti per qualsiasi causa (siccità, freddo, parassiti, ecc.). Il prodotto non ha attività residua ed è degradato rapidamente dai microrganismi dell'ambiente. Con l'addizione di solfato ammonico, in ragione di 8 – 10 kg. per ettaro consente di impiegare le dosi inferiori prescritte. Se dopo il trattamento entro massimo 8 ore vi fosse una pioggia essa ridurrebbe l'efficacia del trattamento; evitare la deriva; togliere i succhioni e ricacci sulle colture arboree prima del trattamento; non lavorare il terreno per 3 settimane dopo il trattamento.

Viene impiegato sulle seguenti colture o applicazioni:
Colture che se la deriva colpisce il tronco non hanno evidenziato sensibilità: ARANCIO – CEDRO – CLEMENTINE –MANDARINO – LIMONE – POMPELMO – KUMQUAT – MELO – PERO – NOCE – OLIVO – VITE
Colture che se la deriva colpisce il tronco possono manifestare sensibilità: ALBICOCCO – CILIEGIO – MANDORLO –NETTARINE – PESCO – SUSINO.
Colture dove il diserbo deve essere effettuato con attrezzature selettive (umettanti, lambenti ed a goccia) per evitare assolutamente ogni contatto: CARCIOFO – POMODORO – MELANZANA – FAGIOLINO – FAVA – PISELLO – CAROTA – PATATA – MAIS (solo interfila) – SOIA – PRATI (Legeminose e Graminacee) – ERBA MEDICA –BARBABIETOLA DA ZUCCHERO – ROSA – VIVAI E SEMENZAI DI FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI E PIOPPO.
Colture da diserbare prima dell'emergenza: ASPARAGO.
TERRENI AGRARI IN ASSENZA DI COLTURE (prima o dopo la coltivazione di: ORTAGGI – FRAGOLA – BARBABIETOLA DA ZUCCHERO – FRUMENTO – ORZO – SEGALE – AVENA – MAIS (l'impiego su mais è consentito solo nelle interfile, da non impiegare in pre–raccolta) – RISO – SOIA – PRATI – VIVAI: effettuare il trattamento pre–semina o pre–trapianto con infestanti emerse e procedere al trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.

AREE NON DESTINATE ALLE COLTURE AGRARIE:
il trattamento si effettua a piena superficie o per il diserbo controllato con attrezzature selettive: sedi ferroviarie, argini di canale, fossi e scoline, aree rurali e industriali, aree ed opere civili.

DOSI DI IMPIEGO:
Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata:
Contro malerbe annuali e biennali: 1,5 – 4 lt / ha contro Alopecurus sp., Avena sp., Lolium sp., Mercurialis sp., Poa sp., Riso crodo,Amnimalus, Amaranthus sp., Calendula sp., Chenopodium sp., Orobanche sp., Portulaca sp., Raphanus sp., Senecio sp., Sinapsi sp., Stellaria sp., Veronica sp.
Contro malerbe perennanti: 4 – 5 lt / ha contro Agropyron repens; Carex sp., Cirsium sp., Euphorbia sp., Glyceria sp., Hipericum sp., Laersia oryzoides, Phalaris sp., Rumex sp., Sonchus sp., Sorghum halepense; 5 – 7 lt / ha contro Alisma sp., Asfodelus sp.,Botomus sp., Cyperus sp., Ferula sp., Juncus sp., Nardus sp., Scirpus sp., Sparganium sp., Tussilago sp., 8 – 10 lt / ha contro Agrostis sp., Allium sp., Artemisia sp., Arundo sp., Cynodon sp., Eracleum sp., Glechoma sp., Oxalis sp., Paspalum sp.,Phragmites sp., Pteridium sp., Ranunculus sp., Rubus sp., Tipha sp., Urtica sp.; 12 lt / ha contro Aristolochia sp., Clematis sp.,Convolvulus sp., Rubia peregrina.
Contro gli arbusti: 4 – 6 lt / ha contro Acer sp., Fraxinus sp., Genista sp., Salix sp., Sambucus sp., Vaccinium sp.; 10 – 12 lt / ha contro Calluna sp., Cistus sp., Erica sp., Lonicera sp.

AVVERTENZE:
Impiegare pressioni basse ed attrezzature che siano selettive (a sgocciolamento o di tipo umettante – lambente) oppure con schermo protettivo oppure munite di ugelli con spruzzo controllato (G.D.C., specchio ventaglio). Impiegare litri 200 – 300 di acqua per ettaro e se vi è la nascita di infestanti dopo il trattamento, impiegare prodotti ad azione residua di tipo simazina o diuron in miscela con kg. 10 di solfato ammonico e tra il trattamento con GLIFOSAR e l'impiego di tali prodotti far trascorrere almeno 1 – 2 settimane. Agitare la confezione prima dell'uso, non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o di ferro se non sono protetti da vernici plastiche; il prodotto teme il gelo.

COMPATIBILITA': Il prodotto si impiega generalmente da solo, in caso di miscela verificare l'efficacia e la compatibilità.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto non è selettivo, è fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Dopo il trattamento lavare accuratamente tutte le attrezzature impiegate.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

GLIFOSAR

Erbicida sistemico di post – emergenza
Tipo di formulazione: liquido

COMPOSIZIONE:
- GLIFOSATE g. 30,4 (*)(sotto forma di sale isopropilamminico)
- COFORMULANTI q. b. a g. 100(*)

Il contenuto di Glifosate acido equivalente corrisponde a 360 g/l ed è pari a g. 41 di Glifosate sale isopropilamminico per 100 g. di prodotto.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SARIAF S.p.A. – Via Morgagni, 68 - Faenza (RA)

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.p.A.. - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
SCAM S.r.l. – Modena
ISAGRO .S..p..A. – Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)

Registrazione n. 9602 del 14/04/1998 del Ministero della Sanità

Taglie: ml 100

Partita n.

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRIMOIL ES

Olio bianco emulsionato

COMPOSIZIONE	
-olio minerale (al 95% di insulfonabilita')	g 80
-emusionanti e inerti	q.b.a.g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SARIAF s.p.a. - via Morgagni,68 - 48018 Faenza (Ra)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 9834 del 30.11.'98

Officina di produzione: SIPCAM spa-Salerano sul Lambro (Lodi) / SCAM S.p.A. – S. Maria Mugnano (MO)

Taglie: ml 100-250-500; lt 1-5-10-20-25

Partita n°

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
INFORMAZIONI MEDICHE: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.Se ingerito, non indurre il vomito, chiamare immediatamente un medico.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE: Il prodotto agisce come insetticida di contatto; forma una delicata pellicola sopra l'insetto impedendone la respirazione e causandone quindi la morte. Presenta un'azione ovicida e anti-schiusura ed ha anche un'azione repellente contro alcuni insetti masticatori.Il prodotto per le sue caratteristiche chimico-fisiche può essere usato sia nel periodo invernale che nel periodo primaverile-estivo con piante in piena vegetazione. Il prodotto puo' essere impiegato da solo o come coadiuvante, in miscela con altri fitofarmaci, quali insetticidi di impiego primaverile-estivo o gli erbicidi.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Per un corretto impiego del prodotto e' opportuno avere l'avvertenza di utilizzare ugelli che permettano di nebulizzare finemente e in modo uniforme il formulato su vegetazione asciutta.Si raccomanda, prima di ripetere il trattamento,di rispettare un intervallo minimo di 15 gg sulle colture arboree e di 10 gg sulle colture erbacee. **Si sconsiglia** di trattare con temperature superiori a 30 °C o su piante sofferenti.
Le dosi di seguito indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

COLTURA	PARASSITI	DOSI l/hl IMPIEGO PRIMAVERA-ESTATE	DOSI l/hl IMPIEGO INVERNALE
FRUTTIFERI			
Pomacee	Acari,Afidi,Cocciniglie, Tignole,uova di lepidotteri Cicaline,Psilla	0,75-1,5	1,5-3
Drupacee	Acari,Afidi,Cocciniglie,Tignole, uova di lepidotteri,Cicaline	0,75-1,5	1,5-3
Noce;Nocciolo, Fico,Kaki,Ribes	Acari,Afidi,Cocciniglie Cicaline,Uova di lepidotteri	0,75-1,5	1,5-3
Vite	Acari,Afidi,Cocciniglie, uova di lepidotteri,Cicaline, Tignole	0,75-1,5	1,5-3
Olivo	Cocciniglie	0,75-1,5	1,5-3
Agrumi	Cocciniglie,Afidi,Cimici,Acari, Aleurodidi	0,75-1,5	1,5-3
ORTAGGI			
Peperone,Pomodoro, Patata, Fagiolo, Cucurbitacee	Afidi,Tripidi,Acari,Ditteri, Lepidotteri,Aleurodidi ,uova di lepidotteri e coleotteri	0,75-1,5	
Carciofo	Afidi,Acari,Ditteri,Tripidi Lepidotteri,Aleurodidi	0,75-1,5	
Sedano,Finocchio	Afidi,Acari,Ditteri Tripidi, Lepidotteri, Aleurodidi	0,75-1,5	
FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI	Afidi, Aleurodidi, Lepidotteri Cocciniglie ,Ditteri, Psille, Cicaline, Acari, Tingidi	0,75-1,5	1,5-3

Il prodotto trova impiego anche come coadiuvante di prodotti erbicidi di impiego in post -emergenza delle infestanti sulle colture e alle dosi di seguito indicate:
Barbabietola da zucchero:in miscela con Cloridazon,Metamitron,Desmedifam,Fenmedifam,Etofumesate,Triflusulfuron,Cycloxycim,Fluazifop-p-buthyl, Quizalofop-ethyl alla dose di 0,5-1 l/h
Mais: in miscela con Nicosulfuron, Rimsulfuron,Sulcotrione,Terbutilazina alla dose di 0,75-1,5 l/ha
Peperone: in miscela con Setossidim,Cycloxydim,Fluazifop-p-buthyl,Fenoxaprop-p-ethyl alla dose di 0,75-1 l/ha
Pomodoro: in miscela con Setossidim,Rimsulfuron,Cycloxydim, Fluazifop-p-buthyl, Fenoxaprop-p-ethyl alla dose di 0,75-1 l/ha
Patata: in miscela con Setossidim, Cycloxydim, Fluazifop-p-buthyl, Fenoxaprop-p-ethyl alla dose di 0,75-1 l/ha
Fagiolo: in miscela con Setossidim, Cycloxydim, Fluazifop-p-buthyl, Haloxyfop-R-methyl alla dose di 0,75-1 l/ha
Anguria: in miscela con Setossidim, Fluazifop-p-buthyl alla dose di 0,75-1l/ha
Cetriolo,Melone: in miscela con Setossidim, Fenoxaprop-p-ethyl, Fluazifop-p-buthyl alla dose di 0,75-1 l/ha
Zucca: in miscela con Setossidim alla dose di 0,75-1 l/ha
Zucchino: in miscela con Setossidim, Fenoxaprop-p-ethyl, Quizalofop ethyl 0,75-1 l/ha
Carciofo: Linuron, Setossidim,Cycloxydim, Fluazifop-p-buthyl, Fenoxaprop-p-ethyl alla dose di 0,75-1 l/ha
Sedano: in miscela con Linuron, Setossidim, Cycloxydim, Fluazifop-p-buthyl alla dose di 0,75-1 l/ha
Finocchio: in miscela con Linuron,Setossidim, Cycloxydim, Fluazifop-p-buthyl alla dose di 0,75-1 l/ha
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Aggiungere sufficiente acqua nella botte per permettere un'agitazione ottimale. Se il prodotto deve essere miscelato con polveri bagnabili occorre disperdere bene la polvere prima di aggiungere l'olio. Se il prodotto da aggiungere e' un liquido emulsionabile deve essere aggiunto dopo che l'olio e' stato disperso nell'acqua.Ulitizzare in un breve lasso di tempo la miscela preparata. Mantenere un a buona agitazione durante il trattamento.
COMPATIBILITA': Il prodotto non e' miscibile con prodotti a base di calce,Zolfo,Poltiglia bordolese, Carbammati, Dimetoato, Anilazina Captano, Folpet, Dinocap, Chinometionato, Thioquinox, Dicloran, Propargite, Triclorfon, Diclofuanide, Ometoato, Oxythioquinox o qualsiasi altro principio attivo contenente Zolfo. Comunque prima di effettuare miscele estemporanee si consiglia effettuare prove di compatibilita' chimico-fisica.Qualora si eseguano trattamenti separati con tali prodotti si consiglia di osservare un intervallo di almeno tre settimane. Non miscelare con concimi fogliari.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico su alcune cultivar di Pero; stante l'elevato numero di specie e cultivar da trattare ed i numerosi prodotti miscelabili, e' consigliabile effettuare sempre un saggio su piccole superfici prima dell'impiego su larga scala.Si puo' avere rischio di fitotossicita' se si trattano le piante durante periodi prolungati caratterizzati da temperature elevate e alta umidita' relativa.Non trattare piante sotto stress idrico. Non usare con Dimetoato o Carbaryl su alberi da frutto a foglia caduca.
RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto e' tossico per le api e gli insetti utili. Non trattare in fioritura.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER TUTTE LE COLTURE
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

PRIMOIL ES

Olio bianco emulsionato

COMPOSIZIONE		
-olio minerale (al 95% di insulfonabilita')		g 80
-emusionanti e inerti	q.b.a.g	100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SARIAF s.p.a. - via Morgagni,68 - 48018 Faenza (Ra)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 9834 del 30.11.'98

Officina di produzione:
SIPCAM spa-Salcrano sul Lambro (Lodi)
SCAM S.p.A. – S. Maria Mugnano (MO)

Taglie: ml 100

Partita n°

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.Se ingerito, non indurre il vomito, chiamare immediatamente un medico.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

CUPROSARIAF B.T.

Fungicida cuprico in polvere bagnabile

Composizione 100 gr di prodotto contengono:
- Rame metallico . . . . gr. 22,5
(sottoforma di ossicloruro tetraramico)
- Coformulanti di inerti q.b. a . . . . gr. 100

NOCIVO

SARIAF S.p.A.
Via Morgagni n. 68 - 48018 Faenza (RA)

Registrazione del Ministero della Salute n. 9981 del 09/03/1999

Officina di produzione:
A.D.I.C.A. Srl – Nera Montoro (Terni)
DIACHEM S.p.A. – Unità produttiva SIFA Caravaggio (BG)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Cotignola (RA)
TORRE Srl - Torrenieri (Fraz.Montalcino)- Siena

Contenuto netto kg. 0,2–0,5–1–5–10–20–25

Partita n.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per inalazione e ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto–albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
AVVERTENZE: consultare un centro antiveleni.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Utilizzare Cuprosariaf BT sulle seguenti colture
- **ORTICOLE (carciofo, cardo, carote, cavolo, cetriolo, cicoria, cipolla, fagiolo, insalata, melanzana, melone, patata, pomodoro, pisello, rapa, ravanello, sedano, spinacio, zucca)** contro Peronospora, Septoriosi, Alternariosi, gr. 350-500 / hl;
- **VITE:** contro Peronospora gr. 350-500 / hl;
- **POMACEE (melo, pero):** contro Ticchiolatura e Cancri dei rami, trattamenti primaverili gr. 350-500 / hl, trattamenti autunno–invernali kg. 1-1,5 / hl;
- **DUPACEE:** Contro Bolla, Corineo, Sclerotinia, Ruggine, trattamenti primaverili gr. 350-500 / hl, trattamenti autunno-invernali kg. 1-1,5 / hl;
- **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO:** contro cercospora e peronospora kg. 5-6 / hl;
- **AGRUMI:** contro Mal Secco, Allupatura, Gommosi, Batteriosi, Fumaggine gr. 350-500 / hl;
- **OLIVO:** contro Occhio di pavone, Lebbra, Fumaggine gr. 400-600 / hl;
- **FLORICOLE IN PIENO CAMPO:** contro Septoriosi, Alternariosi, Ticchiolatura, Ruggine gr. 250-300 / hl.

Le dosi si riferiscono a trattamenti effettuati con pompa a volume normale.

COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con la generalità degli antiparassitari in commercio.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

FITOTOSSICITA': non trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
(*) Meli cuprosensibili: Abbondanza Belfort – Black Stayman – Golden Delicious – Gravenstein Jonathan – Rome Beauthy – Morgenduft – Stayman – Stayman Red – Stayman Winesap – Black Davis – Renetta del Canada – Rosa Mantovana.
(**) Peri cuprosensibili: Abate fetel – Buona Luigia d'Avranches – Butirra Clargeau – Passacrassana – B.C. William – Dott. Jules Guyot – Favorita di clapp – Kaiser – Butirra Giffard.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

MONILEX 50 WDG

Fungicida in granulari idrodispersibili ad azione preventiva e curativa per il controllo della muffa grigia, della sclerotinia e di altri patogeni di numerose colture eduli ed ornamentali

COMPOSIZIONE:
Procimidone puro...g 50
Coformulanti...q.b.a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SARIAF S.p.A. - via Morgagni,68 Faenza (RA)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 10349 del 8.03.2000

Stabilimenti di produzione:
PRO.PHY.M Sarl Z.I. Les Attignours
LA CHAMBRE (Francia)
SIPCAM S.p.A. - Salerano Sul Lambro (LO)
ADICA Srl - Nera Montoro(TR)
ISAGRO S.p.A. - Aprilia (LT)
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.
Cotignola (RA)
TORRE Srl,Torrenieri(SI).

Distribuito nelle taglie da g 50–250–500 da:
ERREGI Srl, C.rso D'Azeglio,112- Torino.

Partita n°

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE:
MONILEX 50 WDG è un fungicida attivo nei confronti dei seguenti patogeni: Botrytis cinerea (Muffa grigia), Sclerotinia spp. (Slerotinia), Rhizoctonia spp (Rhizoctonia), Monilia spp. (Monilia), Sclerotium cepivorum (Marciume bianco dei bulbi), Botrytis allii (Botrite dell'aglio), Botrytis squamosa (Botrite della cipolla), Alternaria spp., Stemphylium spp. (Maculatura bruna) che affligono le colture eduli ed ornamentali.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Le quantità indicate si riferiscono all'utilizzo con volumi normali di acqua (2000 l/ha per le pomacee e le drupacee, 1000 l/ha per la vite e 500-800 per le colture erbacee).
Aver cura di distribuire una adeguata quantità di sospensione in modo da consentire l'uniforme distribuzione del fungicida ed adottare la dose più elevata sulle varietà più sensibili alla malattia, specie quando la stagione è particolarmente piovosa.
Vite: contro Muffa grigia (Botrytis cinerea): Intervenire alla dose di 80-150 g/hl nelle epoche di maggior rischio di infezione: - fine fioritura, - pre-chiusura grappolo, - invaiatura, - tre settimane prima del raccolto. In annate di normale pressione infettiva sono sufficienti due trattamenti: il primo in pre-chiusura grappolo e il secondo all'invaiatura. Nel caso di varietà particolarmente suscettibili (Pinot, Tocai, Merlot, Riesling, Verdicchio, Schiava, Barbera, Moscato bianco), è opportuno intervenire anche alla fine fioritura.
Fragola: contro Muffa grigia: Intervenire alla dose di 80-100 g/hl nelle epoche di maggior rischio di infezione: - inizio fioritura, - quando il 10-20% dei fiori sono aperti, - alla sfioritura. E' indispensabile un'ottima bagnatura della pianta e dei frutti.
Mandorlo: contro Marciume bruno o Moniliosi (Monilia spp.): intervenire nel periodo intercorrente tra la comparsa dei bottoni fiorali e la piena fioritura, alla dose di 150-200 g/hl.
Drupacee (Pesco, Albicocco, Susino): contro Marciume o Moniliosi (Monilia spp.) dei fiori: effettuare due o tre trattamenti nel periodo intercorrente tra la comparsa dei bottoni fiorali e la piena fioritura alla dose di 150-200 g/hl.
Contro Marciume bruno o Moniliosi (Monilia spp.) dei frutti: effettuare due trattamenti rispettivamente 4 e 2 settimane prima della raccolta, alle dose di 100-150 g per 100 l di acqua.
Actinidia: contro Muffa grigia (Botrytis cinerea) e Sclerotinia (Sclerotinia spp.): trattamenti in pre-raccolta: applicare 75-100 g/hl alla fine della fioritura-inizio caduta petali ed eventualmente prima della raccolta. Difesa in post-raccolta: nei trattamenti con doccia (drencher) utilizzare una sospensione allo 0,05% (50 g/hl); trattamenti mediante immersione: immergere il materiale in una sospensione allo 0,05% (50 g/hl).
Nocciolo: contro Marciume bruno (Monilia spp.). Applicare 75-100 g/hl in prossimità dell'allegagione.
Pero:contro Maculatura bruna (Alternaria spp., Stemphylium spp.): intervenire alla dose di 100-150 g/hl a partire dalla fine fioritura, ogni 7-10 giorni, in funzione del periodo di infezione.
Pomodoro: contro Muffa grigia (Botrytis cinerea): intervenire alla dose di 80-100 g/hl a partire dalla fioritura del primo palco fiorale ripetendoli ogni 15 giorni.
Lattuga, Indivia: contro Muffa grigia (Botrytis cinerea) e Sclerotinia (Sclerotinia spp.): applicare 1,5-2 Kg/Ha dopo il superamento della crisi di trapianto; il trattamento può essere ripetuto ogni 10-12 giorni. Nel caso di colture non trapiantate intervenire quando la stagione decorre particolarmente piovosa. Si consiglia l'alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. Non effettuare più di due trattamenti per stagione.
Peperone e Melanzana: contro Muffa grigia (Botrytis cinerea) e Sclerotinia (Sclerotinia spp.). Trattamenti alla parte aerea: 80-100 g/hl ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti. (Si consiglia l'alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. Non effettuare più di tre trattamenti su melanzana e un intervento su peperone).
Aglio: contro Muffa grigia (Botrytis allii): trattamenti alla parte aerea alla dose di 100-200 g/hl a partire dalla prima comparsa dei sintomi e sino alla quarta foglia.
Contro Marciume bianco (Sclerotium cepivorum): trattamento ai bulbilli: 30g/100Kg di materiale.
Cipolla: contro Marciume bianco (Sclerotium cepivorum), trattamento al seme: 1 g per Kg di seme
Contro Muffa grigia (Botrytis spp.): trattamenti alla parte aerea: 100-150 g/hl avendo cura di utilizzare attrezzature a basso volume, a partire dalla prima comparsa dei sintomi e sino alla 4a foglia. Per migliorare la copertura del trattamento sulle superfici cerose, aggiungere alla sospensione un tensioattivo non ionico.
Cetriolo:contro Muffa grigia (Botrytis cinerea) e Sclerotinia (Sclerotinia spp.): trattamenti alla parte aerea alla dose di 100-150 g/hl ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti.
Fagiolino: contro Muffa grigia (Botrytis cinerea) e Sclerotinia (Sclerotinia spp.): trattamenti alla parte aerea alla dose di 100-150 g/hl ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti.
Colza: contro Sclerotinia sclerotiorum: intervenire ad inizio fioritura alla dose di 1-1,5 Kg/Ha.
Tabacco: contro Muffa grigia (Botrytis cinerea) e Sclerotinia (Sclerotinia spp.): applicare 1,5-2 Kg/ha dopo il superamento della crisi di trapianto.
Girasole: concia contro Sclerotinia (Sclerotinia spp.): 100-200 g per 100 Kg di seme. Trattamenti alla parte aerea contro Muffa grigia (Botrytis cinerea) e Sclerotinia (Sclerotinia spp.): intervenire alla dosi di 100 g per 100 litri di acqua effettuando uno-due trattamenti prima della fioritura.
Floreali (escluso il ciclamino): contro Muffa grigia (Botrytis spp.): intervenire alla dose di 40-80 g/hl di acqua nei periodi di maggior rischio infettivo, rispettando eventualmente i trattamenti ogni 10-14 giorni. Contro Rizottoniosi (Rhizoctonia spp.) e Sclerotinia (Sclerotinia spp.): 4 g/mq di superficie in 5-10 litri di acqua, dopo la crisi di trapianto.Contro Marciume bianco (Sclerotinia): trattamento ai bulbilli 30 g/100 Kg di materiale.
AVVERTENZA PER LA CONCIA DELLE SEMENTI: I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate, non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici e nocivi.
FITOTOSSICITA': Sulle colture floreali ed ornamentali, data la grande variabilità di specie e cultivars, è consigliabile effettuare saggi preliminari su piccole superfici.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI :14 giorni prima del raccolto del Pero, Pesco, Fragola, Cetriolo, Pomodoro, Peperone, Actinidia, Melanzana, Lattuga, Indivia, Fagiolino, Albicocco; 21 giorni per Vite, Susino, Girasole; 45 giorni per Colza; 60 giorni per Actinidia post-raccolta.
COMPATIBILITA': In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

MONILEX 50 WDG

Fungicida in granulari idrodispersibili ad azione preventiva e curativa per il controllo della muffa grigia, della sclerotinia e di altri patogeni di numerose colture eduli ed ornamentali

COMPOSIZIONE:

Procimidone puro. . . . . g 50
Coformulanti . . . . q.b.a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SARIAF S.p.A. - via Morgagni,68 Faenza (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10349 del 8.03.2000

Stabilimenti di produzione:
PRO.PHY.M Sarl Z.I. Les Attignours LA CHAMBRE (Francia)
SIPCAM S.p.A. Via V. Veneto, 81, Salerano Sul Lambro (LO)
ADICA Srl, Nera Montoro(TR)
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (RA)
TORRE Srl,Torrenieri(SI).

Distribuito nelle taglie da g 50 da: ERREGI Srl, C.rso D'Azeglio,112- Torino.

Partita n°

FRASI DI RISCHIO

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

SCUDEX

Fungicida sistemico con azione preventiva, curativa e bloccante
sulle colture di VITE, PERO, MELO, PESCO, ORTIVE, TABACCO, ORNAMENTALI E FLOREALI
Tipo di formulazione: liquido emulsionabile

SCUDEX
Composizione
- Penconazolo puro g. 10,20 (100 g/lt)
- coformulanti q.b. a g 100

SARIAF S.p.A. – Faenza (RA)

Registrazione n. 10425 del 29/03/2000 del Ministero della Sanità

Stabilimenti di produzione:
A.D.I.C.A. S.r.l. – Faenza (RA)
SIPCAM S.p.A.– Salerano sul Lambro (Lodi)

IRRITANTE

Taglie: ml 100-200-250-500-750
Lt 1-5-10-20

Partita n°

FRASI DI RISCHIO

Irritante per gli occhi e la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: sintomi e organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acute ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergenico. in caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del S.N.C.. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escerezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Fungicida sistemico che può essere utilizzato come preventivo, curativo e come bloccante; agisce all'interno della pianta e l'assorbimento del prodotto avviene velocemente (poche ore).

VITE

Oidio (Uncinula necator): Trattamenti preventivi: ml 25-30 hl in pre post-fioritura intervenendo ogni 14-16 giorni e ml 15-20 hl in pre e post-fioritura effettuando i trattamenti ogni 7-10 giorni. Con attacchi in atto (primi sintomi) fare 2 trattamenti ogni 5-7 giorni alla dose di ml 50 hl, poi continuare con trattamenti di tipo preventivo. Il prodotto esplica un' attività collaterale su Guignardia spp. e in minor misura su Pseudopezia spp.

MELO

Ticchiolatura (Venturia inaequalis)
-Trattamenti preventivi: ml 30-40 hl ogni 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce, poi ogni 10-15 giorni. I trattamenti contro la Ticchiolatura sono sufficienti per controllare efficacemente anche l'Oidio.
-Trattamenti curativi: ml 40-50 hl, si può intervenire entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
-Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): ml 40-45 hl effettuando 2 applicazioni ogni 5-7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali. E' bene aggiungere un prodotto di copertura.
Oidio (Podosphaera leucotricha)
-Trattamenti preventivi: in primavera ml 30-40 hl ogni 10 giorni; nei trattamenti estivi ogni 10-14 giorni con dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia.
-Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): ml 30-35 hl ogni settimana, con un totale di 3-4, che consentono il controllo delle infezioni in atto e la protezione della nuova vegetazione.
Malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp.): fare in totale 2-3 trattamenti a cadenza settimanale in pre raccolta alla dose di 40-45 ml/hl.

PERO

Ticchiolatura (Venturia pirina):
-Trattamenti preventivi: ml 25-35 hl ogni 10-12 giorni, impiegando la dose maggiore e gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo della malattia.
-Trattamenti curativi: ml 30-40 hl trattando entro massimo 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
-Trattamenti bloccanti:(in presenza di sintomi) ml 30-40 hl con 2 trattamenti ogni 5-7 giorni, proseguire con cadenze e dosi normali. E' bene aggiungere un prodotto di copertura.

PESCO

Oidio: Trattamenti preventivi: In zone dove il rischio di infezione è alto e con cultivar particolarmente sensibili trattare a ml 40-50 hl dalla caduta petali ed ogni 10-14 giorni. In zone a minor rischio intervenire ogni 14-21 giorni.
Malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp.)
fare 2-3 interventi a cadenza settimanale in pre-raccolta alla dose di 50 ml/hl.

TABACCO

Oidio: ml 35-50 hl facendo da 2 a 4 trattamenti in modo preventivo, iniziando dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.

MELONE - ZUCCHINO - ZUCCA - CETRIOLO - CARCIOFO - PEPERONE (solo in pieno campo) - POMODORO (solo in pieno campo) - PISELLO

Oidio: In pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione, fare da 2 a 4 trattamenti ogni 14 - 16 giorni a ml 25 - 50 hl a seconda della coltura e del rischio di infezione. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.

COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE:

Oidio e ruggini: 25-50 ml/hl ogni 10-14 giorni a seconda della coltura e della incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.

Data di scadenza in normali condizioni di conservazione del preparato (se la durata dello stesso è inferiore a due anni)

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

SCUDEX

Fungicida sistemico con azione preventiva, curativa e bloccante sulle colture di VITE, PERO, MELO, PESCO, ORTIVE, TABACCO, ORNAMENTALI E FLOREALI

Tipo di formulazione: liquido emulsionabile.

SCUDEX

Composizione

- Penconazolo puro g. 10,20 (100 g/lt)
- coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

SARIAF S.p.A. – Faenza (RA)

Registrazione n. 10425 del 29/03/2000 del Ministero della Sanità

Stabilimenti di produzione:
A.D.I.C.A. S.r.l. – Faenza (RA)
SIPCAM S.p.A.– Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: ml 100

Partita n°

FRASI DI RISCHIO

Irritante per gli occhi e la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: sintomi e organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cu-tanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acute ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergenico. in caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del S.N.C.. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.

Terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

SUPERBA

Erbicida selettivo in formulazione liquida, consigliato per la lotta contro le infestanti resistenti ai più comuni diserbanti ormonici in cerealicoltura, nelle asparagiaie, sorgo, prati, pascoli, prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi, terreni agricoli senza coltura.

SUPERBA - Erbicida

Composizione

- Dicamba puro gr 21,2 (=243 g/l)
- Coformulanti q. b. a gr 100

SARIAF S.p.A., via Morgagni,68 Faenza (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. 10564 del 01.08.2000

Stabilimento di produzione:
DIACHEM S.p.A. – U.p. SIFA Caravaggio (BG)
PRO.PHY.M. Sarl, Z.I. Les Attignours La Chambre (Francia)
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
ALTHALLER ITALIA Srl - S. Colombano al Lambro (MI).

IRRITANTE

Taglie: ml 20-50-100-250-500; lt 1-2-5-10

Partita n°

FRASI DI RISCHIO

Irritante per gli occhi. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE: SUPERBA è un erbicida di post-emergenza che viene assorbito dalle infestanti sia per via fogliare che radicale. **SUPERBA** è in grado di controllare le infestanti dicotiledoni perennanti quali Convolvulus arvensis e Cirsium arvense; la sua azione si estende poi alla generalità delle malerbe annuali. Le infestanti sensibili al prodotto sono: Abutilon theophrasti (Cencio molle), Amaranthus spp. (Amaranti), Bidens spp (Forbicida), Calistegia sepium (Vilucchione), Centaurea cyanus (Fiordaliso), Chenopodium album (Farinello), Cirsium arvense (Stoppione), Datura stramonium (Stramonio), Fumaria officinalis (Fumaria), Fallopia convolvulus (Convolvolo nero), Galium aparine (Attaccamano), Phytolacca dacandra (Uva turca), Polygonum aviculare (Correggiola), Plygonum persicaria (Persicaria), Portulaca oleracea (Erba Porcellana), Rumex spp. (Romice), Sycios angulatus (Sicio), Senecio vulgaris (Senecione), Solanum nigrum (Erba morella), Spergula arvensis (Spergola), Stellaria media (Centocchio), Taraxacum officinalis (Soffione), Vicia spp. (Veccia), Xantium spp. (Spino). Le infestanti mediamente sensibili sono: Anagallis arvensis (Anagallide), Capsella bursa-pastoris (Borsa pastore), Crisantemun segetum (Crisantemo selvatico), Convolvulus arvensis (Villucchio), Ecbalium elantenum (Cocomero selvatico), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Papaver spp. (Papavero), Polygonum lapathifolium (Persicaria maggiore), Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Sinapis arvensis (Senape comune), Urtica urens (Ortica), Veronica spp. (Veronica).

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO:

Frumento ,Orzo, Segale, Avena: Il trattamento può essere effettuato dallo stadio di 4-6 foglie vere fino all'inizio della levata o allo stadio di botticella. E' comunque consigliabile intervenire il più precocemente possibile. La dose di impiego è di 0,4-0,6 l/ha. Per combattere le erbe infestanti mediamente sensibili si consiglia di associare prodotti a base di MCPA o Mecoprop. (Impiegare con temperature ambientali superiori ai 10°C e nel periodo che intercorre dalla fine della fase di accestimento a poco prima dell'inizio della formazione della botticella).

Mais: Il prodotto si impiega dopo che il Mais ha raggiunto lo stadio di due foglie vere fino allo stadio di sei foglie e comunque quando la coltura non ha superato l'altezza di 40-50 cm. Dosi di impiego: 0,8-1,2 l/ha (trattamento a pieno campo). Non impiegare il prodotto su coltura di mais impiantata su terreni sabbiosi in quanto in questi terreni potrebbe essere fitotossico. Non impiegare su linee pure di mais da seme e su mais dolce.

Asparago: Impiegare il prodotto in primavera prima dell'emergenza dei turioni. Il trattamento va eseguito preferibilmente su terreno sarchiato e leggermente umido. Dose di impiego: 0,2-0,5 l/ha.

Sorgo da granella: Impiegare il prodotto prima che le piantine di sorgo abbiano superato la 5ª foglia. Dose di impiego: 0,8 l/ha. Controllare preventivamente la selettività del prodotto su nuove varietà.

Prati e pascoli di graminacee: Effettuare il diserbo contro le infestanti a foglia larga quando sono nei primi stadi di sviluppo, lasciando trascorrere almeno quattro giorni prima del taglio successivo. Il diserbo su prati di nuovo impianto deve essere effettuato dopo il secondo taglio. Dose di applicazione: 1 l/ha per applicazione in pieno campo.

Prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi: Effettuare il diserbo contro le infestanti a foglia larga quando sono nei primi stadi di sviluppo, lasciando trascorrere almeno quattro giorni prima del taglio successivo. Il diserbo su prati di nuovo impianto deve essere effettuato dopo il secondo taglio. Si consiglia di effettuare il diserbo preferibilmente in primavera o fine estate. Dose di applicazione: 1 l/ha (pari a 10 ml per 100 mq) per applicazioni in pieno campo o preparando una soluzione allo 0.2% (20ml ogni 10 litri di acqua) se utilizzato per trattamenti localizzati.

Terreni agricoli senza coltura: Per il contenimento delle infestanti dicotiledoni, al fine di evitare la disseminazione e mantenere una copertura vegetale al terreno utile a limitare l'erosione, utilizzare una dose di 0,5-0,6 l/ha. Per l'eliminazione totale della vegetazione utilizzare la dose di 1,2 l/ha (pari a 12 ml per 100 mq).

AVVERTENZE AGRONOMICHE: Evitare che la nube irrorante giunga a contatto con colture vicine. Il prodotto in associazione ai diserbanti ormonici è dannoso per le viti, gli ortaggi ed i fruttiferi. Dal trattamento alla semina delle colture successive è opportuno lasciare trascorrere almeno 20 giorni. Impiegare il prodotto su infestanti nei primi stadi di sviluppo al fine di eliminare quanto più precocemente possibile la competizione delle malerbe utilizzando 200-400 litri di acqua per ettaro utilizzando ugelli a ventaglio.

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto è dannoso per le viti, gli ortaggi, i fruttiferi.

Sospendere il trattamento 130 giorni prima del raccolto per il sorgo; 20 giorni per le altre colture

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che siano trascorse 24 ore dal trattamento. Per gli impieghi su campi da golf, campi sportivi e prati ornamentali, segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

SUPERBA

Erbicida selettivo in formulazione liquida, consigliato per la lotta contro le infestanti resistenti ai più comuni diserbanti ormonici in cerealicoltura, nelle asparagiaie, sorgo, prati, pascoli, prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi, terreni agricoli senza coltura.

SUPERBA - Erbicida

Composizione

- Dicamba gr 21,2 (=243 g/l)
- Coformulanti q. b. a gr 100

IRRITANTE

SARIAF S.p.A., via Morgagni,68 Faenza (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. 10564 del 01.08.2000

Stabilimento di produzione:
DIACHEM S.p.A. – U.p. SIFA Caravaggio (BG)
PRO.PHY.M. Sarl, Z.I. Les Attignours La Chambre (Francia)
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
ALTHALLER ITALIA Srl - S. Colombano al Lambro (MI).

Taglie: ml 20-50-100

Partita n°

FRASI DI RISCHIO

Irritante per gli occhi. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: **consultare un Centro Antiveleni**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

PULIFRUT – L

Bagnante a schiuma labile per uso agricolo

COMPOSIZIONE : 100 g di prodotto contengono
-Diottil solfosuccinato di sodio puro g 10 (= 100 g/lt)
-Coformulanti q.b.a. g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SARIAF S.p.A. - Via Morgagni,68 - Faenza (RA)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10675 del 22.1.2001

Officina di produzione e confezionamento:
TERRANALISI srl – via N.Bixio, 6 – Cento (FE)
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi)

Contenuto netto: litri 0,1-0,250-0,5-1-5-10-15-20-25

Partita n :

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il bagnante PULIFRUT - L è una soluzione di sostanza tensioattiva a basso potere schiumogeno, che evita la formazione di gocciole separate di liquido antiparassitario su foglie e frutti, perchè conferisce alle irrorazioni la proprietà di diffondersi in velo liquido, non interrotto e bene aderente, anche su superfici cerose e tegumentose.
Per ogni 100 litri di irrorazione si impiegano da ml 30 fino a 50 di PULIFRUT - L, regolandosi a seconda che i vegetali da trattare sono più o meno facilmente bagnabili.
La dose in casi particolarmente difficili può essere aumentata, ma si cerchi di evitare un eccesso di bagnante che è sempre poco vantaggioso.
Il PULIFRUT - L và addizionato nel liquido per irrorazione preferibilmente prima degli antiparassitari perché così facilita la loro dispersione.

COMPATIBILITA' : il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

PULIFRUT – L

Bagnante a schiuma labile per uso agricolo

COMPOSIZIONE : 100 g di prodotto contengono
-Diottil solfosuccinato di sodio puro g 10 (= 100 g/lt)
-Coformulanti q.b.a. g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SARIAF S.p.A. - Via Morgagni,68 - Faenza (RA)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10675 del 22.1.2001

Officina di produzione e confezionamento:
TERRANALISI srl – via N.Bixio, 6 – Cento (FE)
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi)

Contenuto netto: litri 0,1

Partita n :

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

OXASAR – EC

(concentrato emulsionabile)
Erbicida per il diserbo di riso, soia, garofano, colture orticole, fruttiferi, pioppo e tabacco.

COMPOSIZIONE
OXADIAZON puro g. 25,5 (= 250 g/l)
Coformulanti* q. b. a g. 100
*Contiene Cicloesanone

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SARIAF S.p.A. – Faenza (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10705 del 15/02/01

Stabilimenti di produzione:
ALTHALLER ITALIA Srl
S. Colombano al Lambro (MI)
TORRE S.r.l.
Torrenieri, fraz. Di Montalcino (SI)
SIPCAM S.p.A.-Salerano sul Lambro (LO)

Contenuto: ml. 25–50–100–250–500
L 1–5–10

Partita n.

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Può causare danni polmonari se ingerito. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
L'OXASAR–EC è caratterizzato da una notevole durata d'azione nel terreno.
Infestanti Sensibili: Acetosella (Oxalis spp.), Alisma (Alisma plantago), Amaranto (Amaranthus spp.), Atriplice maggiore (Atriplex papula), Borsa pastore (Capsella bursapastoris), Camomilla comune (Matricaria chamo-milla), Correggiola (Polygonum aviculare), Erba calderina (Senecio vulga-ris), Erba morella (Solanum nigrum), Erba porcellana (Portulaca oleracea), Eterantera (Heteranthera spp.), Euforbia (Euphorbia spp.), Giunco fiorito (Butomus umbellatus), Loglio italico Lolium italicum), Mercorella (Mercu-rialis annua), Papavero (Papaver rhoeas), Poa (Poa pratensis), Poligoni (Polygonum spp.), Sanguinella (Digitaria sanguinalis), Scirpus (Scirpus spp.), Senape (Sinapis arvensis), Veronica (Veronica spp.), Vilucchio (Convolvulus arvensis).
Infestanti mediamente resistenti: Avena selvatica (Avena spp.), Attaccamani (Galium aparine), Cencio molle (Abutilon theophrasti), Forbicina (Bi-dens tripartita), Falsa gramigna (Agropyrum repens), Fienarola (Poa annua), Lappa (Xanthium italicum), Loglio (Lolium spp.).
Infestanti resistenti: Gittaione (Agrostemma githago), Assenzio selvatico (Artemisia vulgaris), Carice (Carex spp.), Stoppione (Cirsium arvense), Gramigna comune (Cynodon dactylon), Cipero (Cyperus rotundus), Sorghetta (Sorghum halepense), Centocchio (Stellaria media), Soffione (Taraxaxum officinalis).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
RISO: contro Heteranthera 1-2 litri/ettaro in funzione della pressione di infestazione, attenendosi al dosaggio più elevato nei terreni di medio impasto. Il trattamento è in grado di contenere emergenze precoci di Giavone, Alisma da seme, Ciperacee e Giunco fiorito da seme. Il prodotto va applicato in presemina del riso, sia su risaie ancora asciutte, perfettamente livellate prima dell'immissione di acqua, oppure su risaia allagata, dopo la slottatura e con livello di acqua normale (10-12 cm.). Dopo l'applicazione lasciare sedimentare per circa 48 ore le particelle limose prima di procedere alla semina. Evitare le semine in presenza di acque torbide. Nelle prime fasi vegetative del riso si consiglia di mantenere nelle camere un livello di acqua moderato (massimo 10-12 cm.).
L'OXASAR – EC è selettivo anche sul riso coltivato in asciutta; in tal caso il trattamento va effettuato subito dopo la semina, in pre-emergenza della coltura e delle infestanti alla dose di 2-3 litri/ettaro.
GIRASOLE E SOIA: contro infestanti graminacee e dicotiledoni annuali (esclusa Stellaria spp.): 2,5 litri/ettaro in pre-emergenza della coltura e delle infestanti. Il trattamento può causare ingiallimenti passeggeri della coltura appena emersa, che però non influiscono sulla produzione. Se non piove effettuare un'irrigazione dopo 10-12 giorni dal trattamento. Operare a bassa pressione, massimo 2-3 atmosfere. Dopo il trattamento non lavorare il terreno.
GAROFANO: 2,5-3 litri/ettaro in pre-emergenza delle avventizie 5-8 giorni dopo la messa a dimora delle talee o dopo una sarchiatura manuale.
AGLIO E FINOCCHIO: 1,5-3 litri/ettaro in pre-emergenza della coltura e delle infestanti.
COLTURE TRAPIANTATE: - Carciofo, Cavolfiore, Cicoria, Finocchio, Indivia, Lattuga, Melanzana, Peperone, Pomodoro, Tabacco: 1,5-3 litri/ettaro intervenendo prima del trapianto della coltura, in pre-emergenza delle infestanti.
POST-IMPIANTO – **Asparago**: intervenire dopo aver effettuato la rincalzatura, con completa copertura delle zampe. Su asparagiaia, per la lotta contro il Villucchio (C. arvensis e C. sepium) intervenire prima dell'emergenza dei turioni o dopo la totale raccolta degli stessi a 8-10 litri/ettaro. **Carciofo**: su carciofaia per la lotta contro l'Acetosella (Oxalis spp.) intervenire a 8-10 litri/ettaro in pre-emergenza dell'infestante, evitando di bagnare le vegetazioni della coltura.
ACTINIDIA, ALBICOCCO, ARANCIO, CLEMENTINO, LIMONE, MANDARINO, MELO, PERO, NOCCIOLO, OLIVO, PESCO, SUSINO, VITE, PIOPPO:
- Vivai: 8-10 litri/ettaro, intervenendo dopo la messa a dimora e prima della ripresa vegetativa. Non trattare vivai di vite, piante madri o barbatelle appena messe a dimora.
- Impianti di produzione: 4 litri/ettaro (infestanti annuali) – 8 litri/ettaro (convolvolo). Su vite intervenire solo su impianti in produzione e con vegetazione sollevata del terreno.

Su piante a foglia caduca eseguire il trattamento a fine inverno, prima del risveglio vegetativo. Su tutte le colture sopraindicate, evitare di colpire la vegetazione eventualmente presente o parti lignificate. Dopo il trattamento non lavorare il terreno; in caso di siccità praticare un'irrigazione entro 10-12 giorni dall'applicazione. Operare a bassa pressione (1-3 bar) impiegando almeno 300 litri di acqua per ettaro.
COMPATIBILITA'
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. In caso di piogge battenti dopo il trattamento, la vegetazione delle giovani colture può venire colpita da particelle di terreno che hanno assorbito il prodotto con conseguenti leggere ustioni. Su asparago, in caso di ristagno idrico e con emergenza della coltura rallentata da basse temperature, i turioni possono presentare leggere incurvature apicali. Su terreni con ristagni d'acqua e con basse temperature che rallentano le emergenze della soia possono manifestarsi fallanze nella stessa. Su vivai non intervenire su piante non sufficientemente lignificate.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

OXASAR – EC

(concentrato emulsionabile)

Erbicida per il diserbo di riso, soia, garofano, colture orticole, fruttiferi, pioppo e tabacco.

COMPOSIZIONE
OXADIAZON puro g. 25,5 (= 250 g/l)
Coformulanti* q. b. a g. 100
*Contiene Cicloesanone

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SARIAF S.p.A. – Faenza (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10705 del 15/02/01

Stabilimenti di produzione:
ALTHALLER ITALIA Srl - S. Colombano al Lambro (MI)
TORRE S.r.l. - Torrenieri, fraz. Di Montalcino (SI)
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)

Contenuto: 25–50–100 ml

Partita n.

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Può causare danni polmonari se ingerito. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI MEDICHE: in caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

TURBOFEN 35 CS

INSETTICIDA LIQUIDO MICROINCAPSULATO

Composizione
100 grammi di prodotto contengono
FENITROTION, puro g 35 (= 381 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Titolare della registrazione:
SARIAF S.p.A. - Via Morgagni,68 - 48018 FAENZA (RA)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10724 del 16.2.2001

Officina di produzione:
IRCA SERVICE S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)

Contenuto netto: millilitri 50, 100, 250, 500, litri 1, 5

Partita n. ....

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici (di prima comparsa)**: nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici (di seconda comparsa)**: astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali**: confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte**: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
TURBOFEN 35 CS è un insetticida liquido microincapsulato a base della sostanza attiva fenitrotion, efficace nei confronti di vari parassiti delle colture agricole quali Psilla, Afidi, Mosca della frutta, Carpocapsa e Microlepidotteri.
Il prodotto possiede inoltre un'azione acaricida.
COLTURE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
AGRUMI: contro cocciniglie, afidi, tripidi e mosca della frutta 200/260 ml/hl;
MELO, PERO: contro carpocapsa, psylla, afidi e tentredini 200 ml/hl;
ALBICOCCO, CILIEGIO, PESCO, SUSINO: contro cocciniglie, afidi e tortricidi (Cydia) 180-200 ml/hl;
VITE: contro tignole e cicaline 170-200 ml/hl;
OLIVO: contro mosche, tortricidi e cocciniglie 200 ml/hl;
CARCIOFI, CAROTE, CIPOLLE, PATATE, POMODORI: contro afidi, tripidi, mosche e dorifora 170-200 ml/hl;
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cleono e Lisso 260-330 ml/hl;
COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI (in pieno campo): contro mosche, tripidi e cocciniglie 130 ml/hl;
PIOPPO: contro afide lanigero 130 ml/hl.
Impiegare il prodotto con pompe a volume normale aventi ugelli e filtri con fori di diametro superiore a 0,30 mm (50 mesh).

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: Agitare e mescolare prima dell'uso. Stemperare la necessaria dose di prodotto in poca acqua, rimescolando con cura, quindi diluire nel totale quantitativo d'acqua, mantenendo la massa in agitazione.
COMPATIBILITÀ: TURBOFEN 35 CS non è compatibile con formulati a reazione alcalina. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
AVVERTENZE: Tabellare le zone trattate con cartelli indicanti il trattamento ed il divieto di accesso agli estranei. Non rientrare nelle aree trattate prima che la superficie fogliare sia completamente asciutta. Per operazioni agricole da effettuarsi sulle colture trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza, utilizzare dispositivi di protezione personale al fine di evitare il contatto cutaneo. Non immettere il bestiame al pascolo prima di 20 giorni.
NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per le api, gli insetti utili, il bestiame, gli animali domestici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

TURBOFEN 35 CS

INSETTICIDA LIQUIDO MICROINCAPSULATO

Composizione
100 grammi di prodotto contengono
FENITROTION, puro g 35 (= 381 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Titolare della registrazione:
SARIAF S.p.A. - Via Morgagni,68 - 48018 FAENZA (RA)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10724 del 16.2.2001

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Officina di produzione:
IRCA SERVICE S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)

Contenuto netto: millilitri 50, 100

Partita n. ....

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici (di prima comparsa)**: nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici (di seconda comparsa)**: astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali**: confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte:** generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

CUPROSEI

Fungicida cupro-organico in polvere bagnabile per irrorazioni

Composizione
Mancozeb puro .... g 10
Rame metallico .... g 30
(sotto forma di ossicloruro)
Coformulanti q.b. a g. 100

SARIAF S.p.A. - Faenza (RA)
Registrazione Ministero della Sanità n. 10725 del 16.02.2001
Officine di produzione :
STI-Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
TORRE S.r.l. - Torrenieri (SI)

Quantità netta del preparato:
g 100 - 250 - kg 1 - 5 -10 - 25

Partita n.:

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Mancozeb g 10
Rame metallo g 30 (sotto forma di ossicloruro)
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Mancozeb
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Terapia: sintomatica.; Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Rame ossicloruro
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ, EPOCHE E DOSI DI IMPIEGO
Il CUPROSEI và impiegato alle seguenti dosi per ettolitro di acqua, in trattamenti a volume normale, sulle seguenti colture:

- **VITE:**
200-300 g contro la Peronospora in trattamenti preventivi pre-fiorali; 300-400 g in quelli post-fiorali, intervenendo tutte le volte che le condizioni di temperatura o di umidità (pioggia), rendano possibile un'infezione.

- **POMODORO:**
250-350 g intervenendo solo fino alla prima fioritura contro Peronospora, Alternariosi e Septoriosi.

- **GAROFANO** (in pieno campo):
300-400 g contro la Ruggine.

Per la preparazione della sospensione : stemperare il prodotto in poca acqua sino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea; diluire quindi alla concentrazione desiderata con la rimanente quantità di acqua, agitando.

DIVIETO DI IMPIEGO
Divieto di impiego in serra
Divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.
COMPATIBILITÀ
Il CUPROSEI è compatibile con gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare durante la fioritura.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 28 giorni

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Da non vendersi sfuso.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Non operare contro vento.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

CUPROSEI

Fungicida cupro-organico in polvere
bagnabile per irrorazioni

Composizione
Mancozeb puro .... g 10
Rame metallico .... g 30
(sotto forma di ossicloruro)
Coformulanti q.b. a g. 100

SARIAF S.p.A. - Faenza (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10725 del 16.02.2001

Officine di produzione :
STI-Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
TORRE S.r.l. - Torrenieri (SI)

Quantità netta del preparato: g 100

Partita n.:

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Mancozeb g 10
Rame metallo g 30 (sotto forma di ossicloruro)
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Mancozeb
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Terapia: sintomatica.; Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Rame ossicloruro
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

SARCAP 80 WDG

Fungicida organico ad azione preventiva e curativa
GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Captano puro . . . . g 80
Coformulanti . . . . q.b. a g 100

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SARIAF S.p.A. – Faenza (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10726 del 16/02/2001

Officina di Produzione :
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A., Cotignola (RA)
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)

Officina di confezionamento:
TORRE Srl - Torrenieri (SI)

Taglie: g 10-20-50-100-250-500
kg 1-5-10-20

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Tossico per inalazione. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per le mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con foto-sensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del S.N.C. con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il SARCAP 80 WDG è un fungicida ad attività preventiva e curativa raccomandato contro la ticchiolatura (*Venturia inaequalis e pirina*) e diversi marciumi delle pomacee (*Gloeosporium*, marciume bruno dei frutti) nei trattamenti in pre-raccolta di melo e pero e nella concia delle sementi, nei confronti delle crittogame che attaccano le plantule nei primi stadi di crescita (*Pythium spp., Phytophtora spp., Diplodia spp., Macrophomina phaseolina*, ecc.)

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
POMACEE :

Coltura	Avversità	Volume d'acqua	Dosi g/hl	g/Ha
melo, pero	Ticchiolatura, Gloeosporium, Marciume bruno dei frutti	1500 litri	125 - 160	1875 2400

Nel trattamento curativo, è bene intervenire entro 24 - 36 ore dall'inizio delle piogge infettanti. Qualora si effettuassero trattamenti con pompe a volume ridotto (somministrando cioè un minore quantitativo di acqua per ettaro) le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate, in modo da distribuire per unità di superficie la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA : versare la dose di prodotto in poca acqua, mescolare fino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea, versate gradualmente questa poltiglia nel quantitativo di acqua richiesto, agitando ripetutamente.

CONCIA DELLE SEMENTI :

Sementi di	Avversità	Dosi g/100 kg di seme
mais	moria e avvizzimento dei germinelli (Pythium spp., Diplodia spp.); marciumi delle piantine (Pythium spp., Diplodia spp., Macrophomina phaseolina, ecc.)	55 - 70
sorgo	moria e avvizzimento dei germinelli (*Pythium spp., Diplodia spp.*); marciumi delle piantine (*Pythium spp., Diplodia spp.*, ecc.)	145 - 180
cavolo e cavolfiore	Marciumi	45 - 70
cocomero e melone	Pythium e Phytophtora spp.	100 - 150
spinacio	Pythium e Phytophtora spp.	180 - 270
fagiolo e pisello	Pythium e Phytophtora spp.	80 - 120
altre orticole	Pythium e Phytophtora spp.	60 – 180 in funzione delle dimensioni del seme da trattare

Il prodotto va stemperato in una quantità di acqua pari a 1 - 1,5 litri per ogni 100 kg di semente e la miscela così ottenuta può essere mescolata direttamente alla semente da trattare o spruzzata tramite apposita apparecchiatura.

AVVERTENZA: i semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

COMPATIBILITA': il prodotto non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.), con oli e con gli zolfi. La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di oli e zolfi.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il prodotto può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious, Winesap, Stayman, Renetta del Canadà) e di pero (Butirra d'Anyou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna), per le quali si sconsiglia.

Avvertenze :
- Conservare la confezione di prodotto in luogo fresco e asciutto.
- Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
- Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento.
- Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

SARCAP 80 WDG

Fungicida organico ad azione preventiva e curativa

GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Captano puro ....g 80
Coformulanti .... q.b. a g 100

TOSSICO

SARIAF S.p.A. – Faenza (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10726 del 16/02/2001

Officina di Produzione :
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A., Cotignola (RA)
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)

Officina di confezionamento:
TORRE Srl - Torrenieri (SI)

Taglie: g 10-20-50-100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Tossico per inalazione. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per le mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con foto-sensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del S.N.C. con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

MEDOR DF

ERBICIDA SELETTIVO IN FORMULAZIONE GRANULARE IDRODISPERSIBILE

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodotto contengono:
- Metribuzin puro .... gr 35
- Coformulanti q. b. a .... gr 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SARIAF S.p.A. – via Morgagni,68 - Faenza (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10727 del 16/2/2001

Stabilimenti di produzione:
ADICA srl – Nera Montoro (TR)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA – Cotignola (RA)
SIDECO Dr.SCHIRM GMBH - Mecklenburger Strasse 229 - D-23568 Lubeck
SIPCAM S.p.A.–Salerano sul Lambro (LO)

Peso netto: Kg 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10

Partita n°

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Queste materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee di base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistematica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento o depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata; l'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto agisce per assorbimento fogliare e radicale.
Erbe infestanti sensibili: Alopecurus spp. (coda di volpe), Amaranthus retroflexus (Amaranto comune), Anagallis arvensis (Centocchio dei campi), Capsella bursa pastoris (Borsa pastore comune), Centaurea cianus (fiordaliso), Chenopodium album (farinello), Digitaria sanguinalis (Sanguinella comune), Euphorbia spp. (Euforbia), Fumaria officinalis (Fumaria), Galeopsis spp. (Canapetta), Lolium spp. (Loiessa), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Papaver rhoeas (Papavero), Poa annua (Fienarola comune), Polygonum spp. (Poligoni), Portulaca oleracea (Porcellana), Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Senecio vulgaris (Erba calderina), Sinapsis arvensis (Senape selvatica), Sonchus oleraceus (Crespino comune), Stellaria media (Centocchio comune), Thlapsi arvense (Erba storna).

MODALITA' DI IMPIEGO
Applicare il prodotto utilizzando pompe a volume normale, distribuendo 500-700 litri di acqua per ettaro.

COLTURE E DOSI DI IMPIEGO
Pomodoro da semina
- pre-semina: 0,4-0,6 Kg/ha intervenendo 7-14 giorni prima della semina su terreno già preparato, senza interrare.
- post-emergenza: 0,5 Kg/ha in terreni sabbiosi, 0,75 Kg/ha in terreni di medio impasto, 1 Kg/ha in terreni argillosi, intervenendo dopo il diradamento quando le piantine hanno emesso almeno 8-9 foglie (pre-fioritura).

Pomodoro trapiantato: 0,5 Kg/ha in terreni sabbiosi, 0,7 Kg/ha in terreni di medio impasto, 1 Kg/ha in terreni argillosi, intervenendo in post-trapianto quando le piantine hanno la crisi di trapianto ed hanno differenziato almeno 8-9 foglie (pre-fioritura).
Soia: 0,5-0,7 Kg/ha in pre-semina/pre-emergenza, in miscela con altri prodotti (es: a base di metolaclor o alaclor). Non impiegare in terreni molto sabbiosi o torbosi.
Medica (in riposo vegetativo): 1,5 Kg/ha, intervenendo in autunno dopo l'ultimo sfalcio, quando la coltura è entrata in riposo vegetativo a seguito delle prime brinate e riservando la dose più elevata per i terreni pesanti.
Carota: 0,5-0,7 Kg/ha a partire dallo stadio di tre foglie vere. Si consiglia di eseguire dei saggi varietali prima dell'applicazione.
Asparago: 1-1,5 Kg/ha in pre-emergenza in asparagiaie di almeno 2 anni.
Patata: trattamento in pre-emergenza: 0,7-1 Kg/ha impiegando la dose minore nei terreni leggeri e quella maggiore nei terreni pesanti, escludendo i terreni sabbiosi. Trattamenti in post-emergenza: 0,4-0,5 Kg/ha riservando la dose maggiore in terreni pesanti.
Il prodotto è tollerato dalle seguenti varietà di patata: Admirandus, Alkamaria, Apollo, Arsy, Bea, Bintje, Cardinal, Desiree, Favorita, Humalda, Kennebec, Majestic, Monnalisa, Primura, Resj, Rosanda, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal.
Mais: 0,5-0,7 Kg/ha in pre-semina/pre-emergenza, in miscela con altri prodotti (es: a base di metolaclor o alaclor). Non impiegare in terreni molto sabbiosi o torbosi. Trattamenti in post-emergenza: 0,5-0,6 Kg/ha riservando la dose maggiore in terreni pesanti.
Carciofo: trattamento in pre-emergenza: 0,7-1 Kg/ha impiegando la dose minore nei terreni leggeri e quella maggiore nei terreni pesanti.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Eseguire il trattamento in giornate senza vento, avendo cura di distribuire uniformemente la soluzione su tutta la superficie da trattare, evitando sovrapposizioni e di raggiungere altre colture adiacenti. A lavoro ultimato lavare accuratamente pompe e recipienti usati per la preparazione della sospensione. Dopo il trattamento diserbante non deve essere eseguita alcuna lavorazione del terreno.
COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con prodotti a reazione neutra. Non trattare in giornate ventose per evitare fenomeni di deriva.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Non effettuare il diserbo su pomodoro in serra e sotto tunnel e nei terreni molto sabbiosi; nel diserbo in pre-semina del pomodoro non intervenire quando:
- si usi un quantitativo di seme inferiore a 2,5 Kg/ha in quanto la coltura risulterebbe più sensibile in caso di repentini abbassamenti di temperatura;
- su terreni che formano la crosta al momento dell'emergenza delle piantine (terreni bianchi); per l'intervento in post-emergenza post trapianto attenersi a quanto segue:
- in caso di necessità di irrigazioni o fresature eseguirle almeno 6-7 giorni prima del trattamento;
- non diserbare una coltura sofferente (ad esempio per siccità o alte o basse temperature, ristagni d'acqua etc);
- le eventuali fresature devono essere superficiali per non danneggiare l'apparato radicale del pomodoro e devono essere eseguite 5-10 giorni prima del trattamento. Per quanto riguarda la patata non effettuare il trattamento sulle seguenti varietà: Draga, Jarla e Vivax in quanto sensibili al prodotto. In terreni molto leggeri il prodotto può essere fitotossico per il diserbo della soia.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto per il pomodoro e 60 giorni prima per le altre colture.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

MEDOR DF

ERBICIDA SELETTIVO IN FORMULAZIONE GRANULARE IDRODISPERSIBILE

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodotto contengono:
- Metribuzin puro .... gr 35
- Coformulanti q. b. a .... gr 100

SARIAF S.p.A. – via Morgagni,68 - Faenza (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10727 del 16/2/2001

Stabilimenti di produzione:
ADICA srl – Nera Montoro (TR)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA – Cotignola (RA)
SIDECO Dr.SCHIRM GMBH - Mecklenburger Strasse 229 – D-23568 Lubeck
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)

Peso netto: Kg 0,1

Partita n°

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee di base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistematica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubolonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento o depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata; l'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

OXIDOR-FL

Diserbante selettivo in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
Oxadiazon puro g 33,4 (~370g/l)
Coadiuvanti q. b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SARIAF S.p.A. – via Morgagni,68 Faenza (RA)

Registrazione n. 10900 del 20/4/2001 del Ministero della Sanità

Stabilimento di produzione:
TERRANALISI Srl, via Bixio, Cento (FE)
UNITED PHOSPHOROUS Ltd, Sandback, Chesire (UK)
DIACHEM Spa, U.P. SIFA Caravaggio (BG)
SIPCAM Spa,Salerano sul Lambro(LO).

Taglie: Lt 1-5-10-20

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI MEDICHE: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: **OXIDOR-FL** è un diserbante selettivo efficace sulle seguenti erbe infestanti:
Oxalis spp (Acetosella), Atriplice patula (Atriplice maggiore), Burtomus umbellatus (Giunco fiorito), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Capsella bursa pastoris (Borsa del pastore), Polygonum aviculare (Correggiola), Polygonum persicaria (Persicaria), Senecio vulgaris (Erba calderina), Euphorbia spp. (Euforbia), Chenopodium album (Farinaccio selvatico), Fumaria officinalis (Fumaria), Alisma plantago (Cucchiaio), Amaranthus retroflexus (Amaranto spigato), Amaranthus spp., Solanum nigrum (Erba morella), Portulaca oleracea (Erba porcellana); Heteranthera limosa (Eterantere), Heteranthera reniformis (Eterantere), Panicum spp, Galisoga parviflora (Gallisoga), Echinochloa c. galli (Giavone comune), Echinochloa spp. (Giavoni), Mercurialis annua (Mercorella), Papaver rhoeas (Papavero), Poa pratensis (Poa), Raphanus raphanistum (ravanello selvatico), Rumex spp (Romice), Digtaria sanguinalis (Sanguinella), Scirpus spp., Sinapis arvensis (Senape) Veronica spp (Veronica), Convolvulus arvensis (Vilucchio), Anagallis arvensis (Anagallide), Fallopia convolvulus (Convolvolo nero), Alopecurus mysuroides (Coda di volpe), Stachys annua (Stregona annuale).
Le seguenti erbe infestanti risultano meno sensibili al formulato: Avena spp (Avena selvatica), Galium aparine (Attaccamani), Abutilon theaphrasi (Cencio molle), Agropirum repena (Falsa gramigna), Poa annua (Erba fienarola), Bidens tripartita (Forbicina), Xanthium italicum (Lappa), Lolium spp. (Loglio)
Erbe infestanti resistenti: Artemisia vulgaris (Assenzio selvatico), Carex spp (Carice), Stellaria media (Centocchio), Cyperus rotundus (Cipero), Agrostemma githago (Gittaione), Cynodon dactylon (Gramigna comune), Taraxacum officinale (Soffione), Sorghum halepense (Sorghetta), Cirsium arvense (Stoppione)

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
RISO: dose: 0,70-1,3 l/ha contro Heteranthera limosa (Eterantere), Heteranthera reniformis (Eterantere), Echinochloa c. galli (a nascita precoce) (Giavone comune), Alisma plantago (Cucchiaio da seme). Il prodotto va impiegato su terreno ben livellato e finemente lavorato; intervenire prima della semina, su terreno asciutto, dopo aver preparato il letto di semina; allagare la risaia, attendere 1-2 giorni e quindi seminare il riso.
SOIA E GIRASOLE: dose: 1,5 l/ha contro graminacee e dicotiledoni annuali (esclusa Stellaria spp.). Anche su queste colture il prodotto va impiegato su terreno ben livellato e finemente lavorato; intervenire subito dopo la semina e prima dell'emergenza della coltura e delle infestanti.
AGLIO: dose 1-2 l/ha in pre-emergenza della coltura e delle infestanti.
CARCIOFO, CAVOLFIORE, CICORIA, FINOCCHIO, INDIVIA, LATTUGA, MELANZANA, PEPERONE, POMODORO, TABACCO: dose 1-2 l/ha solo su colture trapiantate prima del trapianto e in pre-emergenza delle infestanti.
GAROFANO: dose 1,5-2 l/ha dopo la messa a dimora delle talee, in pre-emergenza delle infestanti (si può trattare anche dopo una sarchiatura) contro il Vilucchio 5-6,5 l/ha.
ASPARAGO: contro il Vilucchio alla dose di 5-6,5 l/ha prima dell'emergenza dei turrioni
CARCIOFO: contro l'Acetosella nelle carciofaie alla dose di 5-6,5 l/ha in pre-emergenza delle infestanti.
VITE, OLIVO, ARANCIO, CLEMENTINO, LIMONE, MANDARINO, MELO, PERO, NOCCIOLO, PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, ACTINIDIA, PIOPPO:
- vivai: dose 5-6,5 l/ha trattare prima della ripresa vegetativa. non trattare vivai di vite, piante madri o barbatelle appena messe a dimora.
- piante in produzione: dose 2,5 l/ha contro infestanti annuali e 6,5 l/ha contro convolvolo. Su vite intervenire solo su piante in produzione e con vegetazione sollevata dal terreno.Trattare a fine inverno prima della ripresa vegetative sulle piante a foglia caduca.Durante il trattamento evitare di colpire la vegetazione o parti non lignificate. Non lavorare il terreno dopo il trattamento e in caso di siccità intervenire con una irrigazione dopo 10-12 giorni dal trattamento.
In tutte le applicazioni utilizzare volumi d'acqua di 200-400 l/ha

COMPATIBILITÀ
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. In caso di pioggia battente, dopo il trattamento, la vegetazione delle giovani colture può venire colpita da particelle di terreno che hanno adsorbito il prodotto con conseguente leggere ustioni. Su asparago, in caso di ristagno idrico e con emergenza della coltura rallentata da basse temperature, i turrioni possono presentare leggere incurvature apicali. Su terreni con ristagni d'acqua e con basse temperature che rallentano l'emergenza della soia possono manifestarsi fallanze della stessa. Su vivai non intervenire su piante non sufficientemente lignificate.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

TIOFLOR - DF

Zolfo micronizzato sotto forma di microgranuli idrodispersibili contro
le forme di Oidio in frutticoltura, viticoltura, orticoltura e fioricoltura.

Composizione - 100 gr di prodotto contengono:
-ZOLFO puro (esente da selenio) gr. 80
-Disperdenti, bagnanti q. b.a gr. 100

SARIAF S.p.A. - Via Morgagni,68 - Faenza (RA)

Registrazione n. 10921dei 15.5.2001 dei Ministero della Sanità

Officina di produzione :
AGROSTULLN GMBH – Werk Stulin, Werksweg 2 – D-92551 STULIN (Germania)

IRRITANTE

Taglie di confezione: Kg. 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15-20-25

Partita n.: ......

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

DOSI E MODALITA'D'IMPIEGO: riferite a 100 litri d'acqua
VITICOLTURA: trattamenti preventivi: gr. 200-400; trattamenti ad infezione da Oidio avvenuta: gr. 400-500.
FRUTTICOLTURA: pomacee: trattamenti prefiorali: gr. 200-500; in fioritura e postfiorali: gr. 200-300. Pesco, Susino, Ciliegio, Agrumi: gr. 200-500.
ORTICOLTURA: patate, pomodoro, bietole, cavoli, fragole, cucurbitacee gr. 200-500.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: Kg. 8/Ha effettuando il primo trattamento alla comparsa dei sintomi ed effettuando i successivi ad intervalli di 15-20 giorni.
CEREALI: Kg. 8/Ha intervenendo alla comparsa della malattia sulle ultime due foglie dei culmo.
GIRASOLE-SOIA-TABACCO: Kg. 4-6/Ha.
VIVAI Di PIOPPO: gr. 200-400.
COLTURE FLOREALI-ORNAMENTALI-FORESTALI: gr. 150-400 intervenendo ai primi sintomi della malattia.
Preparazione della poltiglia: mettere in un recipiente il quantitativo di prodotto necessario, aggiungere 1-2 lt. di acqua per chilo di TIOFLOR - DF e agitare fino ad ottenere un liquido cremoso che dovrà essere versato nella botte, (con l'agitatore in funzione), entro 30 minuti dalla sua preparazione, quindi portare a volume con acqua mescolando bene.
COMPATIBILITA': Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese), con oli minerali, DNOC, Captano, DDVP, Binapacryl, Diclofluanide. Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano. Non applicare su colture sofferenti o stressate. Mantenere l'agitatore sempre in funzione.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': TIOFLOR - DF può arrecare danno alle seguenti cultivars di: MELE: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla Bianca - Commercio - Golden delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap. PERE: Buona Luigia D'Avranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio. VITE: Sangiovese. CUCURBITACEE: Può essere fitotossico
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

TIOFLOR - DF

Zolfo micronizzato sotto forma di microgranuli idrodispersibili contro
le forme di Oidio in frutticoltura, viticoltura, orticoltura e floricoltura.

Composizione - 100 gr di prodotto contengono:
-ZOLFO puro (esente da selenio) gr. 80
-Disperdenti, bagnanti q. b.a gr. 100

SARIAF S.p.A. - Via Morgagni,68 - Faenza (RA)

Registrazione n. 10921dei 15.5.2001 dei Ministero della Sanità

IRRITANTE

Officina di produzione :
AGROSTULLN GMBH – Werk Stulin, Werksweg 2 – D-92551 STULIN (Germania)

Taglie di confezione: Kg. 0,1

Partita n.: ......

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

KASKO R

Fungicida ad azione preventiva e curativa
in sospensione concentrata

KASKO R
Composizione:

RAME METALLO (sotto forma di idrossido)	g. 19,04 (259 g/l)
METALAXIL puro	g. 3,6 (49 g/l)
Coformulanti q.b. a	g. 100

Titolare della registrazione: SARIAF SpA, via Morgagni 68, Faenza (RA)
Autorizzazione Ministero della Sanità n. 10986 del 12.07.2001

Officine di produzione:
CHIMAC-AGRIPHAR S.A., Ougrèe (Belgio)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA, Caravaggio (BG)
I.M.C. LIMITED, Naxxar (Malta)
TERRANALISI S.r.l., Cento (FE)
SIPCAM S.p.A., Salerano sul Lambro (LO)
IQV Industrias Quimica del Valles s.a., Barcellona (Spagna)

Contenuto: ml. 50, 100, 200, 250, 300, 400, 500 - lt. 1, 2, 3, 5, 10, 20
Partita n............

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME METALLO 19,04% e METALAXIL 3,6% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione. RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. METALAXIL: sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
KASKO R è una miscela fungicida ad azione preventiva e curativa. La presenza di metalaxil, dotato di attività sistemica, permette di proteggere la vegetazione agendo all'interno della pianta e di assicurare protezione anche sulla vegetazione sviluppatasi successivamente al trattamento. La componente rameica invece, presente sotto forma di idrossido, consente una protezione esterna di contatto, garantendo ottimo grado di copertura, resistenza al dilavamento e contemporanea attività nei confronti delle batteriosi.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
VITE: contro peronospora (Plasmopora viticola) alla dose di 400 ml/hl intervenire entro il 30% del periodo di incubazione dell'infezione primaria, proseguendo ad intervalli di 14 giorni fino ad allegazione. Ridurre l'intervallo a 12 giorni in presenza di piogge persistenti o di elevata pressione della malattia.
POMODORO: 400 ml/hl contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria porri sp solani) e Batteriosi. Intervenire al verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione, cadenzando i trattamenti a distanza di 10-14 giorni e per un massimo di 4 interventi.
PATATA: contro Peronospora (Phytophthora infestans) e Alternaria (Alternaria porri sp. Solani) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.
FRAGOLA: contro marciume bruno (Phytophthora cactorum) alla dose di 4 l/ha intervenendo dopo 15 e 30 giorni dall'impianto. Possibile immersione delle piantine prima dell'impianto in una soluzione al 3 per mille.
COLTURE ORTICOLE (cocomero, melone, cetriolo, carciofo, cavolo verza, fagiolo*, fagiolino*): contro Peronospora (Peronospora spp., Pseudoperonospora cubensis, Bremia lactucae), Alternariosi (Alternaria spp) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.
N.B. * fagiolo e fagiolino: impiego consentito solo per trattamenti al terreno.
LATTUGA: contro Peronospora (Bremia lactucae) alla dose di 2-3 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.
SOIA: contro Peronospora (Peronospora manshurica) e Fitoftora (Phytophthora megasperma var. sojae) alla dose di 4 l/ha con 1-2 interventi a distanza di 10-14 giorni.
MELO: contro marciume del colletto (Phytophthora spp) alla dose di 100-150 ml/pianta, dopo la ripresa vegetativa. Irrorare accuratamente la zona del colletto ed il terreno circostante. Ripetere eventualmente l'intervento 3-5 settimane dopo. In presenza di lesioni del tronco, spennellature con una soluzione al 20%.

AVVERTENZA: rispettare rigorosamente le norme di impiego anche per contrastare i ceppi resistenti. Non applicare mai su vivai di vite.

COMPATIBILITA'
Non è compatibile con i formulati a reazione alcalina quali polisolfuri, poltiglia bordolese, calce.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura.

INTERVALLO DI SICUREZZA: VITE: 28 giorni; FRAGOLA: 40 giorni; FAGIOLINO: 56 giorni; CAVOLO VERZA: 60 giorni; FAGIOLO: 120 giorni; SOIA: 150 giorni; ALTRE COLTURE: 20 giorni.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato

KASKO R

Fungicida ad azione preventiva e curativa in sospensione concentrata

KASKO R

Composizione:

RAME METALLO (sotto forma di idrossido)		g. 19,04 (259 g/l)
METALAXIL puro		g. 3,6 (49 g/l)
Coformulanti	q.b. a	g. 100

Titolare della registrazione:
SARIAF SpA, via Morgagni 68, Faenza (RA)

Autorizzazione Ministero della Sanità n. 10986 del 12.07.2001

IRRITANTE

Officine di produzione:
CHIMAC-AGRIPHAR S.A., Ougrèe (Belgio)
DIACHEM S.p.A. – U.P. SIFA, Caravaggio (BG)
I.M.C. LIMITED, Naxxar (Malta)
TERRANALISI S.r.l., Cento (FE)
SIPCAM S.p.A., Salerano sul Lambro (LO)
IQV Industrias Quimica del Valles s.a., Barcellona (Spagna)

Partita n. ....

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME METALLO 19,04% e METALAXIL 3,6% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione. RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. METALAXIL: sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

50-100 ml

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.

Il contenitore non puo' essere riutilizzato.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

SKAKKO

Fungicida sistemico e di copertura

Tipo di formulazione : polvere bagnabile

SKAKKO

Composizione:

g. 100 di prodotto contengono:
- Fosetil Alluminio puro g. 20
- Rame metallo puro g. 20
  (sottoforma di ossicloruro)
- Coformulanti q.b. a 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SARIAF S.p.A. - Via Morgagni, 68
Faenza (RA)

Registrazione Ministero della Salute
n. 11035 del 11/10/2001

Stabilimento di produzione :
SIPCAM S.p.A., Salerano sul Lambro (LO)
A.D.I.C.A. srl, Faenza (RA)

Taglie: g 100-200-500
Kg. 1-5-10-15-20-25

Partita Nr.

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi / la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO 20% e RAME 20% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

FOSETIL ALLUMINIO: sintomi: sedazione, dispnea, depressione.

RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi, vomito e con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo, irritante cutaneo ed oculare. Terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un centro anti-veleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Lo SKAKKO è un fungicida antiperonosperico ad ampio spettro d'azione, con effetto preventivo, dato dalla combinazione di Fosetil Alluminio, ad azione sistemica, in grado di proteggere anche la vegetazione che si forma successivamente ai trattamenti e l'Ossicloruro di rame, dotato di prolungata azione di copertura, resistenza al dilavamento e ampio spettro fungicida, compresa una apprezzabile attività di contenimento delle batteriosi.

Per queste caratteristiche viene impiegato ad intervalli più ampi rispetto ai fungicidi tradizionali di contatto o penetranti nella difesa delle seguenti culture dalle sottoelencate malattie:
- **VITE**: contro la Peronospora alla dose di 500-700 g / hl (5-7 Kg / Ha) intervenendo preventivamente ogni 8 – 12 giorni; Impiegare le dosi più elevate quando si adotta il turno di intervento più lungo e in caso di elevata pressione di malattia.
- **POMODORO:** contro la Peronospora, l'Alternaria, e la Septoria, e con azione preventiva di contenimento delle Batteriosi, intervenire ogni 8-12 giorni a 5-7 Kg/ha.
- **CARCIOFO**: contro la Peronospora intervenire ogni 8-12 giorni, a 5-7 Kg/ha.
- **CUCURBITACEE** (cetriolo, melone, cocomero): contro la Peronospora, intervenire ogni 8-12 giorni a 7 Kg/ha.
- **AGRUMI** (arancio, limone, pompelmo, mandarino): contro la Phythophtora spp. (gommosi parassitaria del colletto e allupatura dei frutti), Antracnosi e Mal secco, a 625 g/hl.
- **PESCO:** contro Bolla e Corineo, 500-700 g/hl in trattamenti effettuati durante la caduta delle foglie e al rigonfiamento delle gemme.
- **LATTUGA - SPINACIO**: contro Peronospora, Antracnosi, Alternariosi e Septoriosi alla dose di g. 500 - 700 per. q.le acqua
- **ORNAMENTALI** : contro Peronospora, Antracnosi, Alternariosi, Batteriosi alla dose di g. 500 - 700 per q.le acqua

COMPATIBILITA': Il formulato non è compatibile con prodotti a formazione oleosa, i concimi fogliari a base azotata e i formulati a base di Dicofol. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Su vite non trattare in fioritura.

NOCIVITA': Nel corso del trattamento tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti: 80 giorni prima della raccolta sugli agrumi, 40 giorni prima della raccolta su pesco e vite, 20 giorni prima della raccolta di tutte le altre colture

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

SKAKKO

Fungicida sistemico e di copertura
Tipo di formulazione : polvere bagnabile

SKAKKO
Composizione:
g. 100 di prodotto contengono:
- Fosetil Alluminio puro g. 20
- Rame metallo puro g. 20
(sottoforma di ossicloruro)
- Coformulanti q.b. a 100

NOCIVO

SARIAF S.p.A. - Via Morgagni, 68 Faenza (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. 11035 del 11/10/2001

Stabilimento di produzione :
SIPCAM S.p.A., Salerano sul Lambro (LO)
A.D.I.CA. srl, Faenza (RA)

Taglie: g 100

Partita Nr.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi / la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associa-zione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMI-NIO 20% e RAME 20% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: FOSETIL ALLUMINIO: sintomi: sedazione, dispnea, de-pressione. RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emo-lisi, vomito e con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo, irritante cutaneo ed oculare. Terapia sintomatica
Avvertenza: Consultare un centro anti-veleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

SKAKKO

Fungicida sistemico e di copertura
Tipo di formulazione: polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

SKAKKO
Composizione:
g. 100 di prodotto contengono:
- Fosetil Alluminio puro g. 20
- Rame metallo puro g. 20
(sottoforma di ossicloruro)
- Coformulanti q.b. a 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SARIAF S.p.A.
Via Morgagni, 68 Faenza (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. 11035 del 11/10/2001

Stabilimento di produzione :
SIPCAM S.p.A., Salerano sul Lambro (LO)
A.D.I.CA. srl, Faenza (RA)

Taglie: Kg 1 (1 sacchetto idrosolubile da kg 1); (2 sacchetti idrosolubili da g 500); (4 sacchetti idrosolubili da g 250); (5 sacchetti idorosolubili da g 200)

Partita Nr.

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi / la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associa-zione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMI-NIO 20% e RAME 20% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FOSETIL ALLUMINIO: sintomi: sedazione, dispnea, de-pressione.
RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emo-lisi, vomito e con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo, irritante cutaneo ed oculare. Terapia sintomatica
Avvertenza: Consultare un centro anti-veleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Lo SKAKKO è un fungicida antiperonosperico ad ampio spettro d'azione, con effetto preventivo, dato dalla combinazione di Fosetil Alluminio, ad azione sistemica, in grado di proteggere anche la vegetazione che si forma successivamente ai trattamenti e l'Ossicloruro di rame, dotato di prolungata azione di copertura, resistenza al dilavamento e ampio spettro fungicida, compresa una apprezzabile attività di contenimento delle batteriosi.
Per queste caratteristiche viene impiegato ad intervalli più ampi rispetto ai fungicidi tradizionali di contatto o penetranti nella difesa delle seguenti culture dalle sottoelencate malattie:
- **VITE**: contro la Peronospora alla dose di 500-700 g / hl (5-7 Kg / Ha) intervenendo preventivamente ogni 8 – 12 giorni; Impiegare le dosi più elevate quando si adotta il turno di intervento più lungo e in caso di elevata pressione di malattia.
- **POMODORO**: contro la Peronospora, l'Alternaria, e la Septoria, e con azione preventiva di contenimento delle Batteriosi, intervenire ogni 8-12 giorni a 5-7 Kg/ha.
- **CARCIOFO**: contro la Peronospora intervenire ogni 8-12 giorni, a 5-7 Kg/ha.
- **CUCURBITACEE** (cetriolo, melone, cocomero): contro la Peronospora, intervenire ogni 8-12 giorni a 7 Kg/ha.
- **AGRUMI** (arancio, limone, pompelmo, mandarino): contro la Phythophtora spp. (gommosi parassitaria del colletto e allupatura dei frutti), Antracnosi e Mal secco, a 625 g/hl.
- **PESCO**: contro Bolla e Corineo, 500-700 g/hl in trattamenti effettuati durante la caduta delle foglie e al rigonfiamento delle gemme.
- **LATTUGA - SPINACIO**: contro Peronospora, Antracnosi, Alternariosi e Septoriosi alla dose di g. 500 - 700 per. q.le acqua
- **ORNAMENTALI** : contro Peronospora, Antracnosi, Alternariosi, Batteriosi alla dose di g. 500 - 700 per q.le acqua
COMPATIBILITA': Il formulato non è compatibile con prodotti a formazione oleosa, i concimi fogliari a base azotata e i formulati a base di Dicofol. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Su vite non trattare in fioritura.
NOCIVITA': Nel corso del trattamento tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti: 80 giorni prima della raccolta sugli agrumi, 40 giorni prima della raccolta su pesco e vite, 20 giorni prima della raccolta di tutte le altre colture

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
AVVERTENZE D'USO: Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE. DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

20-25%

1 Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua

2 Introdurre il numero di sacchetti idrosolubili chiusi, previsti (come da etichetta) nell'atomizzatore

3 Mettere in funzione l'agitatore

4 Attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti), ed.........

5 ....aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

SKAKKO

Fungicida sistemico e di copertura
Tipo di formulazione: polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
Fosetil Alluminio puro g. 20
Rame metallo puro g. 20 (sottoforma di ossicloruro)
Coformulanti q.b. a 100

Avvertenza: leggere attentamente la confezione prima di utilizzare il prodotto.

g. 200-250-500 - Kg. 1

SARIAF S.p.A. - Via Morgagni, 68 – FAENZA (RA)
Registrazione Ministero della Salute n. 11035 del 11/10/2001

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

KIDO'

Acaricida ovo-larvicida in polvere bagnabile per la lotta contro gli acari o ragnetti su Melo, Pero, Pesco, Agrumi (Arancio, Mandarino, Limone, Clementino, Bergamotto, Cedro, Pompelmo, Pomelo, Tangerino, Limetta, Chinotto, Kumquat, Arancio amaro), Vite, Fragola, Actinidia, Cucurbitacee (Melone, Cetriolo), Peperone, Melanzana, Pomodoro, Fagiolino, Soia, Colture floricole, in pieno campo o in serra.

Composizione:
- Exitiazox * puro . . . . g. 10
- Coadiuvanti ed inerti: quanto basta a . . . . g. 100

prodotto originale Nippon - Soda Co. Ltd. - Giappone

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SARIAF s.p.a. – via Morgagni,68 Faenza(RA)

Registrazione n. 11142 del 8/01/2002 del Ministero della Salute

Officine di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: g 50-100-200-250-500 Kg. 1-5-10-25

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega su Melo, Pero, Pesco, Agrumi (Arancio, Mandarino, Limone, Clementino, Bergamotto, Cedro, Pompelmo, Pomelo, Tangerino, Limetta, Chinotto, Kumquat, Arancio amaro), Vite, Fragola, Actinidia, Cucurbitacee (Melone, Cetriolo), Solanacee (Peperone, Melanzana, Pomodoro), Fagiolino, Soia, Colture floricole, in pieno campo o in serra alla dose di g. 50 per 100 litri di acqua, utilizzando irroratrici a volume normale.

Per ottenere una più completa efficacia del prodotto si consiglia di bagnare abbondantemente la vegetazione con un sufficiente quantitativo di acqua per ettaro.

Il prodotto possiede un'azione translaminare nelle foglie ed agisce per contatto sulle uova e sulle larve nei vari stadi di sviluppo dei Ragnetti rossi (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae) e di quelli gialli (Eotetranychus carpini f. vitis).

EPOCHE DI INTERVENTO

Il prodotto si impiega in presenza di pochissime forme mobili (1-2 acari per foglia) da solo o alla dose di 50 g/hl sul ragnetto dei fruttiferi (Panonychus ulmi) o in miscela con un adulticida per ottenere, oltre ad una lunga persistenza anche una più rapida azione iniziale sugli adulti presenti al momento del trattamento. In presenza di popolazioni di adulti più numerose o comunque contro Tetranychus urticae impiegare il prodotto alla dose di 50 g/hl sempre in miscela con un adulticida.

Preparazione della poltiglia: stemperare la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

Sospendere i trattamenti:
- 7 giorni prima della raccolta di Fragole, Peperoni, Melanzane, Fagiolini, Pomodoro, Melone, Cetriolo;
- 14 giorni prima della raccolta di Mele, Pere, Pesche, Arancio, Mandarino, Limone, Clementino, Bergamotto, Cedro, Pompelmo, Pomelo, Tangerino, Limetta, Chinotto, Kumquat, Arancio amaro, Actinidia, Vite;
- 34 giorni prima della raccolta della Soia.

Compatibilità: il prodotto è miscibile con i comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo ad eccezione delle miscele alcaline come Polisolfuri e Calce. Comunque non tutte le miscele sono state provate per cui è consigliabile effettuare saggi preliminari di miscibilità.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: dato l'elevato numero di varietà floricole, si consiglia di effettuare un trattamento preliminare su piccole superfici prima di passare a trattare superfici più ampie.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

KIDO'

Acaricida ovo-larvicida in polvere bagnabile per la lotta contro gli acari o ragnetti su Melo, Pero, Pesco, Agrumi (Arancio, Mandarino, Limone, Clementino, Bergamotto, Cedro, Pompelmo, Pomelo, Tangerino, Limetta, Chinotto, Kumquat, Arancio amaro), Vite, Fragola, Actinidia, Cucurbitacee (Melone, Cetriolo), Peperone, Melanzana, Pomodoro, Fagiolino, Soia, Colture floricole, in pieno campo o in serra.

Composizione:
- Exitiazox * puro . . . . g. 10
- Coadiuvanti ed inerti: quanto basta a . . . . g. 100

prodotto originale Nippon - Soda Co. Ltd. – Giappone

SARIAF s.p.a. – via Morgagni,68
Faenza(RA)

Registrazione n. 11142 del 8/01/2002 del Ministero della Salute

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Officine di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: g 50-100-200-250-500 Kg. 1-5-10-25

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

TOREX

Insetticida in polvere solubile
Attivo contro larve e adulti di ditteri, lepidotteri e numerosi altri fitofagi

Composizione:
- Triclorfon puro g 48
- Coformulanti q.b.a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SARIAF S.p.A. – Faenza (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. 11144 del 8/1/2002

Stabilimento di produzione:
Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE)
Torre Srl - Torrenieri (fraz. di Montalcino) (SI)
DIACHEM S.p.A. - unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

Peso Netto kg 0,1-0,5-1-5-10-15-20-25

Partita n°

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: **Sintomi**: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi, Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali**: confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte**: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia**: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: TOREX agisce per ingestione e per contatto con azione rapida.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: Le dosi si riferiscono a trattamenti con 100 litri di acqua, utilizzando pompe a volume normale.

FRUTTICOLE
- VITE: contro Tignola, Tortricidi gr 150-250
- PESCO: contro Cidia e Anarsia gr 250-400
- MELO, PERO: contro Ricamatrici gr 250-400
- AGRUMI, OLIVO: contro Tignola e Mosca gr 250-400
- SUSINO, CILIEGIO: contro Mosca gr 150-250
- FRAGOLA: contro Tortricidi gr 250-400

ORTICOLE
- CAVOLO, CIPOLLA, SEDANO, AGLIO contro Mosca gr 150-250
- PATATA: contro Dorifora gr 250-400
- PISELLO, FAGIOLO, FAGIOLINO, FAVA, CAVOLO, POMODORO, PEPERONE: contro Tortricidi, Cavolaia gr 250-400
- BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Mosca kg 1/ha
  contro Nottue kg 3/ha
- MAIS: contro la seconda generazione della Piralide kg 3/ha
- SOIA: contro Mosca, Nottue, Tortricidi gr 300-350
- RISO: contro Coppette, Chironomidi, Idrocampo kg 1,2-1,4/ha
- PIOPPO: contro Criptorrinco gr 250-400
- PINO : contro Processionaria gr 250-400
- FLORICOLE IN PIENO CAMPO (Rosa, garofano, Crisantemo) contro Tortricidi, Larve defogliatrici gr 250-400

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ: Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Da non vendersi sfuso.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Non operare contro vento.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

TOREX

Insetticida in polvere solubile

Attivo contro larve e adulti di ditteri, lepidotteri e numerosi altri fitofagi

Composizione:
- Triclorfon puro g 48
- Coformulanti q.b.a g 100

SARIAF S.p.A. – Faenza (RA)

Registrazione Ministero della Salute
n. 11144 del 8/1/2002

Stabilimento di produzione:
Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE)
TORRE S.r.l. - Torrenieri (fraz. di Montalcino) (SI)
DIACHEM S.p.A. - unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

Peso Netto kg 0,1

Partita n°

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali**: confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte**: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia**: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

TOREX

Sacchetti idrosolubili - Insetticida in polvere solubile
Attivo contro larve e adulti di ditteri, lepidotteri e numerosi altri fitofagi

Composizione:
- Triclorfon puro .g 48
- Coformulanti . q.b.a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SARIAF S.p.A. – Faenza (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. 11144 del 8/1/2002

Stabilimento di produzione:
Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE)
Torre S.r.l. - Torrenieri (fraz. di Montalcino) (SI)
DIACHEM S.p.A. - unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

Peso Netto
kg 1 (1 sacchetto idrosolubile da kg 1)
(2 sacchetti idrosolubili da g 500)
(4 sacchetti idrosolubili da g 250)
(5 sacchetti idrosolubili da g 200)
(10 sacchetti idrosolubili da g 100)

Partita n°

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: **Sintomi**: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali:** confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte**: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

CARATTERISTICHE: TOREX agisce per ingestione e per contatto con azione rapida.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: Le dosi si riferiscono a trattamenti con 100 litri di acqua, utilizzando pompe a volume normale.

FRUTTICOLE
- VITE: contro Tignola, Tortricidi gr 150-250
- PESCO: contro Cidia e Anarsia gr 250-400
- MELO, PERO: contro Ricamatrici gr 250-400
- AGRUMI, OLIVO: contro Tignola e Mosca gr 250-400
- SUSINO, CILIEGIO: contro Mosca gr 150-250
- FRAGOLA: contro Tortricidi gr 250-400

ORTICOLE
- CAVOLO, CIPOLLA, SEDANO, AGLIO contro Mosca gr 150-250
- PATATA: contro Dorifora gr 250-400
- PISELLO, FAGIOLO, FAGIOLINO, FAVA, CAVOLO, POMODORO, PEPERONE: contro Tortricidi, Cavolaia gr 250-400
- BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Mosca kg 1/ha contro Nottue kg 3/ha
- MAIS: contro la seconda generazione della Piralide kg 3/ha
- SOIA: contro Mosca, Nottue, Tortricidi gr 300-350
- RISO: contro Coppette, Chironomidi, Idrocampo kg 1,2-1,4/ha
- PIOPPO: contro Criptorrinco gr 250-400
- PINO : contro Processionaria gr 250-400
- FLORICOLE IN PIENO CAMPO (Rosa, garofano, Crisantemo) contro Tortricidi, Larve defogliatrici gr 250-400

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ: Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

AVVERTENZE D'USO
- Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti.
- Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi.
- Non toccare i sacchetti solubili con le mani bagnate.
- Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

Da sciogliere in acqua senza rompere
Da non vendere nè conservare fuori dalla confezione

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

20% 25%

1 Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua

2 Introdurre il numero di sacchetti idrosolubili chiusi, previsti (come da etichetta) nell'atomizzatore

3 Mettere in funzione l'agitatore

4 Attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti), ed........

5 ....aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

TOREX

Sacchetti idrosolubili - Insetticida in polvere solubile
Attivo contro larve e adulti di ditteri, lepidotteri e numerosi altri fitofagi

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
- Triclorfon puro g 48
- Coformulanti q.b.a g 100

Avvertenza: leggere attentamente la confezione prima di utilizzare il prodotto.

g. 100-200-250-500 - Kg. 1

SARIAF S.p.A. - Via Morgagni, 68 – FAENZA (RA)
Registrazione Ministero della Sanità n. 11144 del 8/1/2002

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

RIZOSOL 50

Fungicida a lunga persistenza per il controllo degli agenti patogeni del terreno
Tipo di formulazione. Polvere bagnabile

Composizione:
- Tolclofos metile puro g 50
- Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione:
SARIAF S.p.A.
via Morgagni,68 - Faenza (RA)

Registrazione del Ministero della Salute n.11204 del 22.2.2002

Stabilimento di produzione:
STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA).
TORRE S.r.l. - Torrenieri (SI)
SCAM Srl - s. Maria di Mugnano (MO)
CHEMIA S.p.A. - Dosso (FE)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO).

Taglie autorizzate: g 50 - g 100 - g 250
kg 0,5 - kg 1 - kg 5

Partita n.

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: Fungicida fosforganico. E' dotato sia d'attività fungicida sia fungistatica nei confronti dei principali funghi patogeni del terreno, tra cui Rhizoctonia spp., Corticium spp., Sclerotinia spp., Alternaria spp., Leptosphaeria spp., Botritys spp. Si dimostra efficace anche nei confronti dei ceppi resistenti ad altri prodotti.

CAMPI D'IMPIEGO: Fungicida per applicazioni alla coltura ed al terreno per la difesa d'ortaggi, patata, barbabietola da zucchero, frumento, floreali e ornamentali, sui manti erbosi dei campi da golf, per la concia delle sementi, tuberi e rizomi delle colture ammesse.

MODO D'AZIONE: Agisce per contatto diretto con i funghi patogeni presenti nel terreno o sugli organi ipogei delle piante. Il p.a. non viene traslocato nei vegetali ma manifesta una certa attività in fase di vapore.

MODALITA' D'IMPIEGO: Il prodotto può essere impiegato in pre-semina, pre-emergenza o post-emergenza o nel caso di colture che si pro-pagano per via vegetativa (talea, rizoma, tubero o bulbo) in pre o post-trapianto.
In particolare ne è indicato l'impiego:
- su **LATTUGA e RADICCHIO** contro Sclerotinia sclerotiorum e Rhizoctonia solani con applicazioni al terreno (sia in semenzaio sia in pieno campo) alla dose di 2-4 g/mq fino a 8 g/mq o con applicazioni fogliari (2-3 applicazioni a 2-3 settimane d'intervallo) alla dose di 1-2 kg/ha;
- su **POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, FAGIOLO, FAGIOLINO, ZUCCHINO, CAROTA, COCOMERO, CAVOLI**, contro Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum, Corticium rolfsii, Alternaria solani, Leptosphaeria spp., Botritys sp. con applicazioni al terreno alla dose di 2-4 g/mq o trattamenti fogliari alla dose di 1-2 kg/ha, per la concia sementi alla dose di 1-2 g/kg di materiale;
- su **PATATA** contro Rhizoctonia solani per immersione o aspersione dei tuberi alla dose di 200-300 g/hl, per applicazione al terreno alla dose di 10-20 kg/ha, per trattamento localizzato dei solchi alla dose di 80-120 g/100 m;
- per **AGLIO, CIPOLLA e ZUCCA** contro Rhizoctonia solani per trattamento al terreno solo in assenza di coltura alla dose di 2-4 g/mq, per concia del materiale di propagazione alla dose di 1-2 g/kg di materiale.
- su **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO** contro Corticium rolfsii per il trattamento al terreno alla dose di 1-3 g/mq e Rhizoctonia spp. per la concia del seme alla dose di 80 g/100 kg di seme;
- su **FRUMENTO** contro Rhizoctonia solani con trattamento fogliare alla dose di 1-2 kg/ha;
- su **FLOREALI e ORNAMENTALI** contro Rhizoctonia spp. e Corticium spp. per trattamento al terreno alla dose di 3-5 g/mq, per concia dei tuberi e rizomi alla dose di 1-2 g/kg di materiale. Sui **CAMPI DA GOLF** contro Rhizoctonia spp. alla dose di 1-2 g/mq, avendo cura di bagnare uniformemente la superficie trattata. Intervenire preventivamente ai primi sintomi visibili, ripetendo il trattamento dopo 30 giorni in caso permangano le condizioni di rischio.
"NON RIENTRARE NELLE AREE TRATTATE PRIMA CHE SIANO TRASCORSE 24 ORE"
COMPATIBILITA': Non è compatibile con i fungicidi a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Non presenta fenomeni di fitotossicità alle dosi consigliate sulle colture indicate. Tuttavia su varietà particolarmente delicate o di recente introduzione si consiglia di eseguire prove preliminari.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 15 GIORNI prima della raccolta dei CAVOLI, 30 GIORNI per LATTUGA, RADICCHIO POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, FAGIOLO, FAGIOLINO, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, 45 GIORNI per ZUCCHINO, 60 GIORNI per COCOMERO.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

RIZOSOL 50

Fungicida a lunga persistenza per il controllo degli agenti patogeni del terreno
Tipo di formulazione. Polvere bagnabile

Composizione:

- Tolclofos metile puro g 50
- Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione:
SARIAF S.p.A.
via Morgagni,68 - Faenza (RA)

Registrazione del Ministero della Salute n. 11204 del 22.2.2002

Stabilimento di produzione:
STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA).
TORRE S.r.l. - Torrenieri (SI)
SCAM Srl - s. Maria di Mugnano (MO)
CHEMIA S.p.A. - Dosso (FE)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO).

Taglie autorizzate: g 50 - g 100

Partita n.

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

GLADIOR WDG

Fungicida dotato di attività preventiva e curativa, in granuli idrodispersibili

Composizione:
Ditianon puro .... gr 66
Coformulanti .... q.b. a gr 100

SARIAF S.p.A. – Faenza (RA)

Officina di produzione: SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)

Registrazione Ministero della Salute n. 11295 del 24.04.2002

Taglie:g 100-500 - kg 1-5-10-15-20-25

Partita n°

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO. Sintomi: irritante oculare e cutaneo; per ingestione scialorrea, vomito e diarrea. Terapia: sintomatica.
ATTENZIONE: Consultare Un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: GLADIOR WDG esplica una azione preventiva e curativa per contatto fogliare nei confronti di diverse malattie fungine. La sua attività risulta maggiore quando la temperatura e l'umidità sono elevate.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

Melo: Ticchiolatura, Gloeosporium, Cancri rameali: trattamenti preventivi in periodi caratterizzati da frequenti piogge: 100–120 g/hl; trattamenti preventivi in periodi di piovosità media o scarsa 80–100 g/hl. Il prodotto è in grado di esplicare una attività curativa se somministrato entro 60 ore dall'inizio della pioggia.
Pero: Ticchiolatura: 80-90 g/hl; Cancri rameali: 120–150 g/hl effettuando i trattamenti in autunno-inverno
Pesco: Bolla, Corineo, Fusicoccum, Cytospora, Monilia: 120-150 g/hl in autunno alla caduta foglie.
Vite: Peronospora 100 g/hl durante la stagione vegetativa con trattamenti preventivi; impiegare la dose di 100-120 g/hl in caso di sintomi in atto. Il prodotto è efficace anche nei confronti dell'Escoriosi.
Pomodoro, Patata: contro Peronospora 120-150 g/hl avendo l'avvertenza di effettuare trattamenti preventivi durante il periodo di maggior piovosità.
Fragola: Vaiolatura, Botrytis: 100 g/hl effettuando trattamenti preventivi nei periodi di maggior rischio.
Peperone: contro Phytophtora della parte aerea: 100-120 g/hl nei periodi più umidi.
Spinacio: Peronospora: 100-120 g/hl.
Pisello: Antracnosi, Cilindrosporiosi, Cladosporiosi, Colletotrichum: 120 g/hl
Colture floreali e ornamentali: Ticchiolatura, Ruggine, Vaiolatura, Antracnosi, Muffa grigia, Septoria: 80-100 g/hl.

COMPATIBILITA': Non effettuare miscele con Oli minerali. Nel caso di miscelazione con formulati liquidi emulsionabili è consigliabile effettuare saggi preliminari di compatibilità. Impiegare la sospensione di prodotto subito dopo la sua preparazione.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': evitare di trattare il melo Golden Delicious in prossimità della raccolta causa il potere marcante del prodotto.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto, 40 giorni per la vite.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

GLADIOR WDG

Fungicida dotato di attività preventiva e curativa, in granuli idrodispersibili

Composizione:
Ditianon puro . . . . gr 66
Coformulanti . . . . q.b. a gr 100

SARIAF S.p.A. – Faenza (RA)

Officina di produzione:
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Registrazione Ministero della Salute n. 11295 del 24.04.2002

Taglie:g 100

Partita n°

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO. Sintomi: irritante oculare e cutaneo; per ingestione scialorrea, vomito e diarrea. Terapia: sintomatica.
ATTENZIONE: Consultare Un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

CAMBEL S

Erbicida selettivo in soluzione acquosa per il controllo delle malerbe dicotiledoni nei cereali (mais, frumento, orzo, avena, sorgo), nelle asparagiaie, per i terreni agricoli senza coltura e per prati di graminacee (da foraggio e tappeti erbosi)

COMPOSIZIONE
- Dicamba puro .g 21,2 (=243,8 g/l)
- Coformulanti quanto basta a . . . . .g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SARIAF Spa , via Morgagni,68 – Faenza (RA)

Registrazione n. 11587 del 11.02.2003 Ministero della Salute

Officina di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)
ALTHALLER ITALIA Srl, - S.Colombano al Lambro (MI)
SYNGENTA AGRO S.A.S. - Usine d'Aigues-Vives (Francia)

Taglie: Litri 1-5-10

Partita n.:

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
Sintomi: Irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'AZIONE
CAMBEL S è un erbicida di post-emergenza, che viene assorbito per via fogliare e radicale e traslocato in tutta la pianta dalla circolazione linfatica e svolge la sua azione alterando il metabolismo enzimatico delle malerbe.
Infestanti sensibili.
- Abutilon theophrasti (Cencio molle), Amaranthus spp. (Amaranti), Bidens spp. (Forbicina), Calistegia sepium (Vilucchione), Centaurea cyanus (Fiordaliso), Chenopodium album (Farinello), Cirsium arvense (Stoppione), Convolvulus arvensis (Vilucchio), Datura stramonium (Stramonio), Fumaria officinalis (Fumaria), Galium aparine (Attaccamano), Phytolacca decamdra (Uva turca), Polygonum aviculare (Correggiola), Polygonum persicaria (Persicaria), Fallopia convolvulus (Convolvolo nero), Rumex spp (Romice), Sycios angulatus (Sicio), Senecio vulgaris (Senecione), Solanum nigrum (Erba morella), Spergula arvensis (Spergola), Stellaria media (Centocchio), Taraxacum officinalis (Soffione), Vicia spp. (Vecce), Xanthium spp (Nappola italiana).
Infestanti mediamente sensibili:
- Anagallis arvensis (Anagallide), Capsella bursa pastoris (Borsa del pastore), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Crisantemum segetum (Crisantemo selvatico), Ecbalium elaterium (Cocomero asinino), Papaver spp.(Papaveri), Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Sinapis arvensis (Senape comune), Urtica urens (Ortica), Veronica spp. (Veronica).

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Frumento e cereali minori (orzo, avena, segale)
Epoca: dallo stadio di 4-5 foglie della coltura fino all'inizio della levata.
Dosi: 0,4 - 0,5 l/ha.
In presenza diffusa di infestanti mediamente sensibili, si consiglia di miscelare Cambel S con formulati contenenti MCPA e Mecoprop.

Mais
Epoca: applicare il prodotto in post-emergenza, quando la coltura non ha ancora superato l'altezza di 40 cm.
Dosi: 0,75 - 1,2 l/ha.
Non applicare il prodotto su colture di mais impiantate su terreni sabbiosi in quanto in questi terreni potrebbe essere fitotossico per la coltura.
Non applicare su linee pure di mais da seme e su mais dolce.
Asparago
Epoca: in primavera, prima dell'emergenza dei turioni. Il trattamento va eseguito preferibilmente su terreno sarchiato e leggermente umido. Dosi: 0,2 - 0,5 l/ha.
Sorgo da granella
Epoca: in post-emergenza prima che le piantine di sorgo abbiano superato la 5° foglia.
Dose: 0,75 l/ ha .
In caso di impiego su nuove varietà controllare preventivamente la selettività.
Prati di graminacee (da foraggio e tappeti erbosi)
Effettuare l'applicazione contro le infestanti a foglia larga quando sono nei primi stadi di sviluppo, lasciando trascorrere almeno 4 giorni prima del taglio successivo.
Dose: 1 l/ha per applicazioni a pieno campo o preparando una soluzione allo 0,2 %
(20 ml di prodotto ogni 10 litri di acqua) se utilizzato per trattamenti localizzati.
In caso di interventi su prati di nuovo impianto trattare dopo il secondo taglio.
Terreni agricoli senza coltura
Per il contenimento delle infestanti dicotiledoni, per evitare la disseminazione e mantenere una copertura vegetale al terreno utile a limitare l'erosione utilizzare la dose di 0,5 - 0,6 l/ha.
Per l'eliminazione totale della vegetazione utilizzare la dose di 1,2 l/ha.
Avvertenza: dal trattamento alla semina delle colture successive è opportuno lasciare trascorrere almeno 20 giorni.
Avvertenze agronomiche:
Impiegare CAMBEL S su infestanti nei primi stadi di sviluppo al fine di eliminare quanto più precocemente possibile la competizione delle malerbe.
Volume di irrorazione :
Diluire CAMBEL S in 200 - 400 litri di acqua per ettaro utilizzando ugelli a ventaglio.
Avvertenze
- Sciacquare bene la botte in caso di impiego successivo su colture non indicate in questa etichetta.
- Evitare che la nube irrorante giunga a contatto con colture vicine.

COMPATIBILITA': CAMBEL S è compatibile con tutti i formulati impiegati per il diserbo di post-emergenza delle dicotiledoni e registrati per le colture citate nel testo.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 130 giorni prima della raccolta su sorgo, 20 giorni prima della raccolta per le altre colture

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

SPRINTER AG

Fitoregolatore in pastiglie idrodispersibile a base di Acido Giberellico per impiego su alcuni fruttiferi, Vite, Carciofo, Patata, colture floreali.

Composizione:
- Acido Giberellico A3 puro . . . . g. 20
- Inerti: quanto basta a . . . . g. 100

peso di una pastiglia: g. 5, contenente g. 1 di p.a. puro

IRRITANTE

SARIAF S.p.A. - via Morgagni, 68
Faenza (Ravenna)

Registrazione n. 11679 del 23.05.2003 del Ministero della Salute

Officina di produzione:
SIPCAM INAGRA - Sueca (Spagna)

Taglie: g. 5-10-20-50-100-250-500
Kg 1-1,250.

Partita n.

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle seguenti dosi per 100 lt. di acqua:
FRUTTIFERI
- **Pero:** sulle cultivar (Butirra Giffard, Precoce di Trevoux, Trionfo di Vienna) a difficile impollinazione si può indurre la partenocarpia dei frutti impiegando 1-2 pastiglie/hl usando la dose più bassa su piante adulte e la più alta su piante giovani o con piante in annata di scarica. È consigliabile impiegare un atomizzatore e distribuire circa 1000 litri di soluzione per ettaro effettuando i trattamenti fra l'inizio della fioritura e la piena fioritura (quando cade il primo petalo).
Nel caso di una gelata effettuare un trattamento entro 48 ore alla dose di 2,5 pastiglie/hl con 1000-1500 litri di acqua per ettaro in modo da ottenere la fecondazione per partenocarpia dei fiori resi sterili dal gelo (privi però di annerimento interno).
- **Fragola:** per ottenere una migliore produzione effettuare un trattamento 6 settimane prima della fioritura alla dose di 4-5 pastiglie/hl distribuendo 600 litri di acqua/ha.
- **Vite:** Impiegare il prodotto alla dose di 0,5-1 pastiglia distribuendolo in 300-1000 litri di acqua per ettaro, secondo lo sviluppo vegetativo delle viti, ad epoche diverse secondo il risultato che si vuole ottenere.
- Contro l'acinellatura dei grappoli e per aumentare il volume degli acini intervenire al termine della fioritura.
- Per aumentare la precocità ed ottenere acini senza seme, effettuare il trattamento dall'inizio della fioritura a piena fioritura.
- Per allungare il grappolo onde renderlo spargolo e ridurre l'incidenza della Botrytis, trattare 6-10 giorni prima della fioritura.
- **Limoni:** per aumentare le dimensioni dei frutti e mantenerli più a lungo verdi dilazionando la raccolta, usare il prodotto alla dose di 1 pastiglia/hl in 30-50 hl/ha, effettuando il trattamento prima che il colore dei frutti da verde incominci a diventare giallo.
- **Aranci:** per aumentare la resistenza della buccia e renderla più liscia in modo da rendere i frutti più conservabili, usare 0,5-2 pastiglie/hl in acqua in 30-50 hl/Ha.

SU AGRUMI SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ORTAGGI E FIORI
- **Carciofo:** per anticipare la raccolta impiegare il prodotto alla dose di 2-4 pastiglie/hl effettuando il trattamento alla comparsa delle infiorescenze.
- **Patata:** per stimolare la germinazione dei tuberi ed aumentare il raccolto immergere i tuberi per 30-60 minuti in una soluzione con 4-8 pastiglie/hl.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: Prima di preparare la miscela del prodotto, sciogliere sempre nel totale quantitativo di acqua il BAGNANTE AG, specifico per l'Acido Giberellico, alla dose di g. 100 per 100 litri di acqua. Rimescolare con cura sino a completa dissoluzione in acqua del Bagnante, e solo successivamente aggiungere al totale quantitativo di acqua, così preparato, le pastiglie, sempre rimescolando.
Avvertenze: poiché l'impiego del prodotto stimola la crescita vegetativa delle piante trattate, è necessario che tali piante siano provviste di una adeguata concimazione da impiegarsi in corrispondenza con l'uso del prodotto.
COMPATIBILITÀ: Evitare di effettuare miscele tranne che con BAGNANTE AG ovvero con concimi fogliari neutri (es. Nutrilene, Fertilene).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico sulle colture non indicate in etichetta. Sulle viti effettuare preferibilmente trattamenti diretti ai grappoli onde evitare eventuali influenze sfavorevoli sulle gemme dei tralci in formazione che si devono sviluppare nell'annata successiva.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

SPRINTER AG

Fitoregolatore in pastiglie idrodispersibile a base di Acido Giberellico per impiego su alcuni fruttiferi, Vite, Carciofo, Patata, colture floreali.

Composizione:
- Acido Giberellico A3 puro . . . . g. 20
- Inerti: quanto basta a . . . . g. 100

peso di una pastiglia: g. 5, contenente g. 1 di p.a. puro

SARIAF S.p.A. - via Morgagni, 68
Faenza (Ravenna)

Registrazione n. 11679 del 23.05.2003 del Ministero della Salute

Officina di produzione:
SIPCAM INAGRA - Sueca (Spagna)

Taglie: g. 5-10-20-50-100

Partita n.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

SCUDEX COMBI

Fungicida sistemico e di contatto ad azione preventiva, curativa e bloccante

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

Composizione
- Penconazolo puro g. 1,5
- Zolfo puro (esente da Selenio) g. 40
- coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

SARIAF S.p.A. - Via Morgagni, 68
Faenza (RA)

Registrazione n. 11827 del 30/09/2003
Ministero della Salute

Officina di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.
Cotignola (RA)
A.D.I.C.A. Srl, Nera Montoro (TR).

Taglie: g 100-200-250-500 - kg 1-5-10-15-20

Partita n.

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore .

Informazioni per il medico: sintomi e organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuto ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergenico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del S.N.C.. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabo-lizzata. L'esecrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
Fungicida sistemico e di contatto che può essere impiegato come preventivo, curativo e come bloccante; viene rapidamente assorbito all'interno dei tessuti vegetali.

VITE
Oidio (Uncinula necator)
- Trattamenti preventivi: : in pre e post-fioritura g. 150 - 200 hl intervenendo ogni 14 giorni, g. 100 - 150 hl effettuando il trattamento ogni di 7-10 giorni. Scudex combi possiede azione collaterale contro Erinosi, Guignardia spp e Pseudopeziza spp .

MELO
Ticchiolatura (Venturia inaequalis)
-Trattamenti preventivi: g. 200 - 250 hl ogni 6 - 8 giorni fino alla fase di frutto noce, poi ogni 10-12 giorni.
-Trattamenti curativi : g. 250 - 300 hl, si può intervenire entro 96 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
-Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi) : g. 250 - 300 hl facendo 2 applicazioni ogni 5 - 7 giorni e poi continuando con le dosi normali.

Oidio (Podosphaera leucotricha)
-Trattamenti preventivi : in primavera g. 220 - 250 hl ogni 10 giorni; nei trattamenti estivi ogni 10 - 14 giorni impiegando le dosi più alte e gli intervalli più brevi su varietà Oidio-sensibili.
-Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): g. 200 - 230 hl ogni 7 giorni per un totale di 3 – 4 applicazioni.
Malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp.)
- fare in totale 2 - 3 trattamenti a cadenza settimanale in pre raccolta alla dose di 340 g/hl.

PESCO (comprese le NETTARINE ed IBRIDI SIMILI)
Oidio
-Trattamenti preventivi: in zone dove il rischio di infezione è alto e con cultivar particolarmente sensibili trattare a g. 250 - 340 hl dalla caduta petali ed ogni 10 - 14 giorni. In zone a minor rischio intervenire ogni 14-21 giorni.
Malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp.)
- fare 2 - 3 interventi a cadenza settimanale in pre-raccolta alla dose di 340 g/hl.

TABACCO
Oidio : g. 240 - 340 hl facendo da 2 a 4 trattamenti in modo preventivo, iniziando dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10 - 14 giorni.

CARCIOFO - CETRIOLO - MELONE - PEPERONE (solo in campo) - PISELLO – POMODORO (solo in campo) - ZUCCHINO - ZUCCA
Oidio : In pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione, fare da 2 a 4 trattamenti ogni 12-14 giorni a g. 170 - 340 hl a seconda della coltura e del rischio di infezione. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.

COLTURE ORNAMENTALI E FLOREALI:
Oidio e ruggini : g. 170 - 340 hl ogni 10 - 14 giorni a seconda della coltura e della incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.

Compatibilità: Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) olii minerali, captano, diclorvos. **Avvertenza** : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto può risultare fitotossico sulle seguenti varietà di **Mele** : Balck Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Coomercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap. **Vite** : Sangiovese. **Cucurbitacee** : può essere fitotossico. Irrorare a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.

Data di scadenza in normali condizioni di conservazione del preparato (se la durata dello stesso è inferiore a due anni)

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

SCUDEX COMBI

Fungicida sistemico e di contatto ad azione preventiva, curativa e bloccante

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

Composizione
- Penconazolo puro g. 1,5
- Zolfo puro (esente da Selenio) g. 40
- coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

SARIAF S.p.A. - Via Morgagni, 68 Faenza (RA)

Registrazione n. 11827 del 30/09/2003 Ministero della Salute

Officina di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Cotignola (RA)
A.D.I.C.A. Srl, Nera Montoro (TR).

Taglie: g 100

Partita n.

FRASI DI RISCHIO

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Informazioni per il medico: sintomi e organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acute ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergenico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evi-denziano segni di eccitamento e depressione del S.N.C.. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabo-lizzata. L'esecrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

BETACIL

Diserbante.
Tipo di formulazione: polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

Composizione:
- Lenacil puro .... g. 80
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a .... g. 100

SARIAF spa- via Morgagni,68-Faenza (RA)

Registrazione n. 11864 del 10.12.2003 del Ministero della Salute

Officine di produzione:
-SCAM Srl, - Modena;
-TORRE Srl – Torrenieri (SI)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Taglie: kg 1 (1 sacchetto idrosolubile da kg 1) - (2 sacchetti idrosolubili da g 500) - (4 sacchetti idrosolubili da g 250) - (5 sacchetti idrosolubili da g 200) g 500 (5 sacchetti idrosolubilida g 100) - (10 sacchetti idrosolubili da g 50).

Partita n.:........

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il prodotto agisce prevalentemente per assorbimento radicale nei confronti delle infestanti annuali nate da seme, nonchè per assorbimento fogliare nelle primissime fasi di sviluppo.
Il prodotto alle dosi consigliate, in relazione al tipo di terreno ed in condizioni di umidità favorevoli, controlla la maggior parte delle infestanti annuali quali Anagallis, Alopecurus, Anthemis, Atriplex, Brassica, Capsella, Chenopodium, Chrysanthemum, Fumaris, Galeopsis, Lamium, Linaria, Matricaria chamomilla, Myosotis, Poligonum convolvulus e persicaria, Poa, Papaver, Ranunculus arv., Raphanus, Senecio, Sinapis, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, Spergula, Stellaria, Silene, Stachys, Thlapsi, Urtica urens, Veccia.
Risultano meno sensibili o resistenti: Amaranthus, Avena fatua, Centaurea cyanus, Euphorbia, Galinsoga, Gallum, Poligonum aviculare, Veronica e tutte le perennanti.

DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO
Barbabietola da zucchero e da foraggio
BARBABIETOLA SEMINA PRIMAVERILE:
Pre-semina anticipata (dicembre-gennaio) con incorporazione: preparare accuratamente il terreno, distribuire uniformemente e regolarmente il prodotto alle dosi sotto indicate, facendone seguire l'incorporazione nel terreno per una profondità di 2-3 cm a mezzo di un erpice leggero snodato che non produca uno spostamento del terreno.
Dosi di impiego:
Terreni di medio impasto 0,50 Kg/ha; terreni pesanti Kg. 0,75 per ettaro.
Pre-emergenza: 0,3-0,4 Kg/ha.
Post-emergenza: 0,1-0,2 Kg/ha intervenendo quando la coltura è nello stadio tra i cotiledoni e le 2-4 foglie vere.

BARBABIETOLA SEMINA AUTUNNALE:
Pre-emergenza: 0,5-0,75 Kg/ha
Post-emergenza: 0,1-0,2 Kg/ha quando la barbabietola è nello stadio di 2-4 foglie vere.

Spinacio:
Pre-semina con incorporazione: 0,8-1 Kg/ha a una profondità di 2-3 cm.
Pre-emergenza: 1-1,2 Kg/ha
Post-emergenza: 0,2-0,3 Kg/ha in miscela con 3-6 l/ha di Fenmedifam al 15% p.a.

PRECAUZIONI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il trattamento può essere effettuato su tutta la superficie oppure localizzato sulle file di semina. I trattamenti localizzati possono essere fatti solo se in possesso di una attrezzatura irrorante adatta, curando il calcolo delle dosi che devono essere rapportate alla superficie realmente trattata, tenendo conto della larghezza della striscia e della distanza tra le file. La quantità d'acqua da usarsi per ottenere una buona uniformità di applicazione è di 200-400 litri per ettaro.
Per ottenere i migliori risultati è bene osservare che:
- nei trattamenti di pre-semina e pre-emergenza il terreno sia ben preparato, amminutato e libero da zollosità e da residui vegetali;
- che il terreno si trovi ad un giusto grado di umidità: una pioggia che cada entro 8-10 giorni dal trattamento, in quantità sufficiente ad approfondire il prodotto negli strati sottosuperficiali del terreno, ne favorisce l'azione. In caso contrario è consigliabile intervenire con una irrigazione a pioggia.Nel corso dell'esecuzione del trattamento occorre mantenere la poltiglia costantemente agitata; utilizzare quindi attrezzature munite di agitatore meccanico. Assicurarsi del perfetto funzionamento degli ugelli. Mantenere costante la velocità di avanzamento nel campo ad evitare gli sgocciolamenti.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: disperdere la dose occorrente in poca acqua, agitando vigorosamente fino a formare una poltiglia semiliquida senza grumi. Versare la poltiglia nel volume totale di acqua, tenendo costantemente in funzione l'agitatore.

FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non eseguire il diserbo in terreni sabbiosi o sciolti ed in quelli ricchi di scheletro dove il prodotto potrebbe provocare dei fenomeni secondari nei confronti della coltura. Al momento del trattamento è necessario mettere le bietole nelle migliori condizioni di sviluppo, evitando assolutamente infezioni fungine e infestazioni da parassiti animali, in quanto le stesse provocano rallentamenti di sviluppo o indebolimenti delle piantine che risultano più suscettibili alle manifestazioni fitotossiche. In particolari condizioni ambientali possono verificarsi lievi rallentamenti di sviluppo o clorosi delle nervature fogliari: si tratta di fenomeni passeggeri che rapidamente scompaiono nel giro di una-due settimane, senza alcun pregiudizio per la produzione. Un terreno trattato, in caso di forzata risemina, può essere riseminato solo con la coltura precedentemente seminata o con le colture per le quali è stato indicato l'impiego su etichetta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

AVVERTENZE: il prodotto può causare irritazioni alle mucose ed agli occhi: in tal caso lavarsi abbondantemente con acqua pura. Il prodotto non è volatile, non è corrosivo, non è infiammabile. Nei terreni fortemente organici ed in quelli torbosi si può avere un esito soltanto parziale anche adottando le dosi più elevate di impiego. Lavare accuratamente il macchinario usato per la distribuzione del diserbante. Non immagazzinare il prodotto a contatto con insetticidi, fungicidi e sementi. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette o animali domestici e bestiame.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. NON OPERARE CONTRO VENTO. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

AVVERTENZE D'USO: Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE.
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

20% 25%

1
Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua

2
Introdurre il numero di sacchetti idrosolubili chiusi, previsti (come da etichetta) nell'atomizzatore

3
Mettere in funzione l'agitatore

4
Attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti), ed.........

5
.......aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

BETACIL

Diserbante.
Tipo di formulazione: polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
Lenacil puro g. 80
Coformulanti ed inerti: quanto basta a g. 100

Avvertenza: leggere attentamente la confezione prima di utilizzare il prodotto.

g. 50-100-200-250-500 - Kg. 1

SARIAF S.p.A. - Via Morgagni, 68 – FAENZA (RA)

Registrazione n. 11864 del 10.12.2003 del Ministero della Salute

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

CUPROSAR FLUID

Fungicida a base di Ossicloruro di rame micronizzato in sospensione concentrata.

CUPROSAR FLUID Composizione:
- Rame metallo puro . . . . g. 22 (= 300 g/litro)
  (da Ossicloruro tetraramico)
- Coformulanti e Solventi: quanto basta a . . . . g. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SARIAF Spa – via Morgagni, 68
Faenza (RA)

Registrazione n. 12003 del 27/2/2004
del Ministero della Salute

Officine di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: litri 1 - 5 - 10 - 20 - 25

Partita n.: ....

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, ne fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti: penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle seguenti dosi per 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale, iniziando i trattamenti prima della comparsa della malattia e ripeterli secondo necessità.

VITE: Peronospora della vite: ml 320: effettuare i normali trattamenti sulla base dei calendari di lotta comunemente usati in zona. Impiegare il prodotto preferibilmente dopo la fioritura della vite, usando prima della fioritura ed in fioritura, fungicidi acuprici. In zone ed in annate con forti infezioni di Peronospora si può opportunamente aumentare la dose di impiego a ml 400-460.
Contro l'Oidio e Mal Bianco, aggiungere un antioidico specifico (zolfo bagnabile ecc).

MELO-PERO-COTOGNO: Ticchiolatura e Cancri rameali del melo, del pero e del cotogno. Trattamenti autunnali o di fine inverno: ml 530-660. Trattamenti pre-fiorali: ml 200-270. Da non usare durante il periodo vegetativo sulle varietà di melo e di pero sensibili ai prodotti rameici.

DRUPACEE: Bolla, Corineo, Cancri rameali (trattamenti invernali): ml 530-670

OLIVO ED AGRUMI: Occhio di Pavone e Lebbra dell'olivo: ml 320. Mal secco, Antracnosi e Fumaggine degli agrumi: ml 320. Iniziare i trattamenti prima della comparsa della malattia e ripeterli secondo necessità.

ACTINIDIA: Marciume del colletto: ml 530-670

FRAGOLA: Maculatura rosso-bruna e zonata (Marssonina e Gnomonia), Vaiolatura rossa (Mycosphaerella), intervenire in pre-fioritura e sulla vegetazione autunnale: ml 300

FRUTTIFERI MINORI ED A GUSCIO: Contro cancri rameali in trattamenti autunnali o di fine inverno: ml 530-670. In trattamenti primaverili: ml 200-260

PATATA: Peronospora ed altre crittogame parassite (Alternaria, Septoria, Cladosporiosi): ml 320-400

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: Cercospora della barbabietola: litri 1,8 per ettaro in 500-600 lt. di acqua, trattamenti ripetuti 2-3 volte secondo l'andamento della malattia.

ORTAGGI (Cavoli - Carciofo - Asparago - Ortaggi a foglia - Cucurbitacee - Solanacee - Legumi - Ortaggi a radice - Ortaggi a bulbo):
* Peronospora, Alternaria, Septoria, Cladosporiosi del pomodoro: ml 320-400
* Cercospora e Septoria del sedano e della carota: ml 330
* Peronospora ed Antracnosi del melone, anguria, zucchino, cetriolo: ml 320
* Antracnosi e Ruggine del pisello, fagiolo, fagiolino: ml 320
* Peronospora del cavolo e di altre crucifere: ml 320

OLEAGINOSE: Peronospora, Antracnosi: ml 320

TABACCO: Peronospora, Antracnosi: ml 320

CEREALI: Ruggine, Septoria: ml 320

FLOREALI - ORNAMENTALI E FORESTALI:
Ruggine, Peronospora, Ticchiolatura, Septoria di colture floreali (garofano, rosa, crisantemo) ornamentali e forestali: ml 320

Per tutti gli impieghi sopra indicati iniziare i trattamenti prima della comparsa delle malattie e ripetere i trattamenti secondo lo sviluppo delle stesse.

RISO: Per la lotta contro le alghe delle risaie intervenire alla prima comparsa delle alghe, impiegando lt. 3.0-4.0 per ettaro diluiti in 200-300 e più litri di acqua.
Avvertenza:
le dosi indicate corrispondono a quelle normalmente indicate per i prodotti a base di rame. In condizioni agronomiche e nei periodi stagionali diversamente favorevoli allo sviluppo della malattia si può aumentare o diminuire opportunamente le dosi sopra riportate.

Preparazione della poltiglia:
diluire il prodotto in poca acqua a parte, quindi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua mescolando accuratamente. Il prodotto è già neutro e quindi non richiede l'aggiunta di Calce.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari di uso primaverile-estivo ad eccezione delle miscele alcaline come Polisolfuri e Calce.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino, e alcune varietà di melo (Abbondanza "Belford", Black Stayman, Commercio, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgeaduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott.Jule Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Su tutte le colture orticole e floreali, visto l'elevato numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare un saggio preliminare su una piccola superficie, prima dell'impiego su larga scala.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. NON OPERARE CONTRO VENTO. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

PLIS

Regolatore di crescita

Tipo di formulazione: liquido solubile

PLIS
Composizione :
- Gibberelline A4 e A7 pure g. 1,8 (= 18,8 g/lt - isomero A4 + A7)
- Benziladenina pura g. 1,8 (= 18,8 g/lt)
- Coadiuvanti qb a 100
(contiene alcool tetraidrofurfurilico)

IRRITANTE

SARIAF spa- via Morgagni,68 - Faenza (RA)
Registrazione Ministero della Salute n. 12406 del 24/12/2004
Stabilimento di produzione:
SIPCAM Spa, Salerano sul Lambro (LO)
ALTHALLER ITALIA Srl, S.Colombano al Lambro (MI)
Taglie: ml 20-50-100-250-500 – lt 1-2-5-10
Partita n:

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: gibberelline 1,8% - 6-benziladenina 1,8% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: BENZILADENINA: irritazione cutanea degli occhi e dell'apparato respiratorio. Terapia: sintomatica. Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il PLIS è un fitoregolatore di crescita delle piante, che influenza in modo positivo i processi fisiologici del MELO con un incremento della qualità e della produzione; è dato dall'unione delle gibberelline A4 - A7 e dalla 6-Benziladenina.
MIGLIORAMENTO DELLA FORMA DEL MELO DEL GRUPPO DELLE DELICIOUS: impiegare 70-100 ml per ettolitro trattando tra la fioritura all'80% e la caduta dei petali, è consigliabile in due applicazioni a ml 35-50 per ettolitro a 7-10 giorni di distanza
PREVENZIONE DELLA RUGGINOSITA' DELLE MELE GOLDEN DELICIOUS: alla dose di ml 25-30 per ettolitro, con 3-4 trattamenti con il primo a fine della fioritura e i successivi ogni 7-10 giorni
ANTICIPO DI BRANCHETTE SU ASTONI DI MELO NON IN PRODUZIONE E VIVAI: trattare a lt 4,5-5,5 per ettaro equivalenti a litri 2,5 per ettolitro, su astoni della lunghezza di 50-70 cm che siano in piena crescita e con buon apparato fogliare. Bisogna effettuare in modo preciso la bagnatura della zona apicale (i 30 cm superiori).
PERO: per il miglioramento dell'allegagione a ml 60-80 \l per hl dall'inizio della fioritura, con due applicazioni (di preferenza) a ml 30-40 per hl, con il primo trattamento quando si ha il 25% circa dei fiori che siano aperti ed il secondo dopo circa 2-3 giorni al massimo.
NOTE PER UN CORRETTO IMPIEGO: la quantità finale di soluzione per ettaro deve essere regolata in funzione dello sviluppo delle piante e della forma di allevamento. E' bene aggiungere, quando si effettua il trattamento, un Bagnante adesivo per avere una migliore azione. Trattare piante sane e vigorose con interventi fatti al mattino o tardo pomeriggio. Non trattare con temperature inferiori ai 7°C e non superiore ai 32°C. Usare un getto molto fine bagnando bene la pianta trattata e non creando sgocciolamento dopo il trattamento - non effettuare l'eventuale diradamento prima di 4 - 5 giorni dall'ultimo trattamento.
COMPATIBILITA': compatibile con i bagnanti, concimi fogliari, zolfo bagnabile. Durante la preparazione delle miscele è opportuno aggiungere il PLIS nella dose richiesta per ultimo. Evitare di miscelare al prodotto sostanze alcaline (polisolfuri, poltiglia bordolese).
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

PLIS

Regolatore di crescita

Tipo di formulazione: liquido solubile

PLIS
Composizione :
- Gibberelline A4 e A7 pure g. 1,8 (= 18,8 g/lt - isomero A4 + A7)
- Benziladenina pura g. 1,8 (= 18,8 g/lt)
- Coadiuvanti qb a 100
(contiene alcool tetraidrofurfurilico)

IRRITANTE

SARIAF spa- via Morgagni,68 - Faenza (RA)
Registrazione Ministero della Salute n. 12406 del 24/12/2004
Stabilimento di produzione:
SIPCAM Spa, Salerano sul Lambro (LO)
ALTHALLER ITALIA Srl, S.Colombano al Lambro (MI)
Taglie: ml 20-50-100
Partita n:

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: gibberelline 1,8% - 6-benziladenina 1,8% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: BENZILADENINA: irritazione cutanea degli occhi e dell'apparato respiratorio. Terapia: sintomatica. Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

MIRADIN

INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO IN MICROEMULSIONE

MIRADIN

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:

Diazinone puro	15 g (180 g/l)
Coformulanti	q. b. a 100 g

SARIAF S.p.A. - via Morgagni,68 - Faenza (RA)

Officine di produzione:
CHIMAC AGRIPHAR S.A. - Ougrée (Belgio)
I.M.C. Limited - Naxxar (Malta)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD - Beer Sheva - ISRAELE
BRABANT CHEMIE B.V. - Oosterhout (Olanda).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Registrazione del Ministero della Salute N° 12465 del 9/2/2005

Lotto N° …… del ……

Contenuto: 10-15-20-25-30-35-40-50-100-200-250-300-350-500-600 ml / 1-5 litri

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

NORME PRECAUZIONALI:
Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione. Evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti sciacquandoli dopo l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficenza respiratoria. A distanza di 7 – 15 giorni dall'episodio acuto, si può avere un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida), in seguito spastica, delle estremità.
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi sintomi di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: MIRADIN è un insetticida in microemulsione che agisce per contatto, ingestione ed asfissia. Inoltre penetra nei tessuti vegetali (effetto citotropico) ed uccide gli insetti all'interno dei frutti o riparati negli accartocciamenti fogliari o annidati nell'interno delle foglie. Il prodotto risulta efficace nelle seguenti colture:
Pompelmo, Arancio, Pomelo: contro afidi, cocciniglie, minatrici, cimici, e tripidi; **Ciliegio, Pesco e Susino:** contro afidi, cidia, anarsia, cocciniglie, mosca (ciliegio), tripidi. Su pesco effettuare una sola applicazione. **Melo e Pero:** contro afidi, cocciniglie, carpocapsa, cecidonia (pero); **Melograno:** contro afidi; **Nocciolo:** contro balanino; **Barbabietola da zucchero:** contro cassida, altica, lisso, cleono; **Floricole, Ornamentali, Forestali, Pioppo:** contro tripidi, minatrici, afidi.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: MIRADIN si impiega in generale nei trattamenti a volume normale alla dose di 200-250 ml/hl. Per l'applicazione del prodotto si consiglia di irrorare fino a sgocciolamento quando si opera ad alto volume. Quando si opera a medio volume e basso volume è necessario mantenere constante la quantità di prodotto per unità di superficie. Il prodotto si versa direttamente lentamente sotto agitazione nel quantitativo di acqua richiesto o nella poltiglia già preparata.

COMPATIBILITA': MIRADIN è miscibile con i più comuni fitofarmaci ad eccezione di quelli a reazione alcalina come i polisolfuri e la poltiglia bordolese.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA': Non trattare durante la fioritura perché il prodotto è tossico per le api. Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE PESCHE, 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE ALTRE COLTURE.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

MIRADIN

INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO IN MICROEMULSIONE

MIRADIN

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:

Diazinone puro	15 g (180 g/l)
Coformulanti	q. b. a 100 g

SARIAF S.p.A. - via Morgagni,68 - Faenza (RA)

Officine di produzione:
CHIMAC AGRIPHAR S.A. - Ougrèe (Belgio)
I.M.C. Limited - Naxxar (Malta)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD - Beer Sheva - ISRAELE
BRABANT CHEMIE B.V. - Oosterhout (Olanda).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Registrazione del Ministero della Salute N° 12465 del 9/2/2005

Lotto N° ...... del ....

Contenuto: 10-15-20-25-30-35-40-50-100 ml

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo; ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficenza respiratoria. A distanza di 7 – 15 giorni dall'episodio acuto, si può avere un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida), in seguito spastica, delle estremità.
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi sintomi di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta/Foglio illustrativo

RESULT

FUNGICIDA SISTEMICO IN FORMULAZIONE LIQUIDA

COMPOSIZIONE:
Propamocarb-cloridrato puro g 33,2 (=350g/l)
Coformulanti ed inerti q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
CARATTERISTICHE: RESULT è un fungicida ad azione sistemica, utilizzato per il controllo di Pythium spp., Phytophtora spp., Peronospora, Pseudoperonospora, Aphanomyces spp., Bremia presenti nelle colture orticole, floreali ed ornamentali. Il prodotto viene assorbito prevalentemente per via radicale e traslocato nella parte fogliare della coltura. RESULT si può utilizzare con le seguenti tecniche: concia dei semi, bagno dei bulbi e talee, disinfezione dei terricciati e letti di semina, trattamenti al terreno in pre e post-trapianto per la difesa delle seguenti colture: pomodoro, peperone, melanzana, cucurbitacee,lattuga, cicoria, indivia, radicchio, spinacio, bietola da foglia e da costa, sedano, prezzemolo, basilico, cavoli, cavolfiore, carota, rapa, bietola rossa, aglio, cipolla, porro, tabacco, fragola, colture floreali ed ornamentali, campi da golf e prati ornamentali. RESULT trova inoltre impiego nella difesa delle piante di melo, pero, agrumi e piante forestali, sia in vivaio sia in pieno campo nei primi anni dopo la messa a dimora, dagli attacchi di Pythium spp., Phytophtora cactorum, P. citrophthora, P. parasitica, P. cinnamoni.
EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO:
CONCIA DEI SEMI: 2-8 ml/kg di seme per semi di piccola dimensione (es. tabacco, frumento); 20-80 ml/kg per semi leggeri e dotati di elevata superficie (es. girasole).
PREPARAZIONE DEI TERRICCIATI: 600ml/m3 di terriccio diluiti in 20 lt di acqua.
TRATTAMENTI AI SEMENZAI: 16-24 ml/mq di superficie in 4-5 litri di acqua (ripetere il trattamento 5 giorni prima del trapianto in 6-8 l/mq di acqua).
TRATTAMENTI AL TERRENO IN PRE-TRAPIANTO: 16-24 ml/mq in 3-5 lt di acqua.
TRATTAMENTI IN POST-TRAPIANTO: 100-200 ml/pianta di una soluzione allo 0,4 % (400ml/hl): ripetere il trattamento ogni 10-15 giorni (3-4 trattamenti).
AGRUMI, MELO, PERO, FRAGOLA, CAVOLI, LATTUGA, CICORIA, INDIVIA, RADICCHIO, SPINACIO, BIETOLA DA FOGLIA E DA COSTA, SEDANO, PREZZEMOLO, BASILICO, CUCURBITACEE, SOLANACEE, CAROTA, BIETOLA ROSSA, RAPA, CIPOLLA, AGLIO, PORRO, TABACCO, FLOREALI, FORESTALI: trattamenti fogliari alla dose di 3-6 l/ha in 5-10 hl di acqua per ettaro.
Indicazioni specifiche per alcune importanti colture floricole ed ornamentali:
GAROFANO, GERBERA: contro Pythium e Phytophtora – Trattamenti iniziali: 25-30 ml/mq di prodotto in 2-4 lt di acqua due giorni prima dell'impianto, su terreno in tempera, ed incorporare uniformemente; trattamenti successivi: 400 ml/hl per via fogliare bagnando abbondantemente (400-500 lt di soluzione ogni 1000 mq); si consiglia di effettuare i primi due trattamenti a distanza di 8-10 giorni e proseguire con interventi ogni 15 25 giorni.
BULBOSE: contro Pythium ultimum e Phytophtora. Immergere i bulbi per 20-30 minuti in una soluzione di 600 ml/hl di acqua; trattare quindi il terreno prima della messa a dimora con 20-24 ml/mq di acqua ed incorporare a 10-12 cm di profondità.
VIVAI DI PIANTE FORESTALI: contro Phytophtora cactorum, Phytophtora cinnamoni e Pythium. Trattare il substrato colturale con 600 ml/m3 di prodotto in 8-10 lt di acqua; intervenire all'emergenza ogni 15-18 giorni con 4-5 lt/mq di una soluzione allo 0,4 % di prodotto.
CAMPI DA GOLF, PRATI ORNAMENTALI: contro Pythium aphanidermatum ed eventuali altre specie, effettuare trattamenti fogliari alla dose di 2-3 ml/mq di prodotto, avendo cura di irrorare con almeno 100-200 lt di soluzione/1000 mq. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni microclimatiche favorevoli allo sviluppo della malattia (caldo umido) e ripetere i trattamenti ogni 14-15 giorni.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con i fungicidi a base di Rame, Mancozeb, TMTD, Clorotalonil e con i benzimidazolici.
Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame.
Per la distruzione delle sementi conciate devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossico-nocivi.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELLA RACCOLTA

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ERREGI S.r.l. – Corso M. D'Azeglio 112 – 10126 TORINO
Stabilimenti di produzione: PRO.PHY.M. Sarl Z.I. Les Attignours – LA CHAMBRE (Francia)
IRCA SERVICE S.r.l. – S.S. Cremasca 591, n° 10 – Fornovo S.Giovanni (BG)
Registrazione Ministero della Sanità n° 9838 del 30.11.1998
Contenuto netto: ml 20-50-100-250-500; lt 1-5-10-20 **Partita n°**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLEMENTAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

RESULT

FUNGICIDA SISTEMICO IN FORMULAZIONE LIQUIDA

COMPOSIZIONE:
Propamocarb-cloridrato puro g 33,2 (=350g/l)
Coformulanti ed inerti q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ERREGI S.r.l. – Corso M. D'Azeglio 112 – 10126 TORINO
Stabilimenti di produzione: PRO.PHY.M. Sarl Z.I. Les Attignours – LA CHAMBRE (Francia)
IRCA SERVICE S.r.l. – S.S. Cremasca 591, n° 10 – Fornovo S.Giovanni (BG)
Registrazione Ministero della Sanità n° 9838 del 30.11.1998

Contenuto netto: ml 20-50-100 **Partita n°**

ATTENZIONE: PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLEMENTAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

GARANTY

ERBICIDA SELETTIVO DI POST-EMERGENZA IN FORMULAZIONE LIQUIDA

GARANTY - Erbicida
COMPOSIZIONE:
Clopiralid puro gr 9,5 (= 100 g/l)
Coformulanti q.b. a gr 100

FRASI DI RISCHIO:
Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo della acque dalle aziende agricole e dalle strade.

IRRITANTE

ERREGI S.r.l. - C.so M. d'Azeglio, 112 - TORINO
Registrazione Ministero della Sanità n. 10.335 del 28.2.2000
Stabilimenti di produzione: SIPCAM S.p.A. – Via V. Veneto, 81 – SALERANO SUL LAMBRO (LO)
PRO.PHY.M Sarl – Z.I. Les Attignours – LA CHAMBRE (Francia)
Contenuto netto: ml 250 - 500; Litri 1 - 5 - 10 – 20 **Partita n°**
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
CARATTERISTICHE: Il prodotto agisce per assorbimento fogliare e in parte radicale.
Erbe infestanti sensibili: Anthemis arvensis (camomilla bastarda), Ammi majus (visnaga maggiore), Bifora spp. (coriandolo fetido), Cirsium arvense (stoppione), Daucus carota (carota selvatica), Helianthus spp. (girasole), Matricaria chamomilla (camomilla), Rumex spp. (romice), Sonchus spp. (crespino), Trifolium spp. (trifoglio), Vicia spp. (veccia), Xanthium italicum (nappola).
Erbe infestanti mediamente sensibili: Polygonum spp. (poligoni), Solanum nigrum (erba morella).
MODALITA' DI IMPIEGO
Da impiegare in post-emergenza della coltura e delle infestanti, intervenendo sulle erbe infestanti nei primi stadi di sviluppo. Applicare il prodotto utilizzando un volume di acqua di 200-300 litri ettaro utilizzando attrezzature a bassa pressione.
COLTURE E DOSI DI IMPIEGO
Barbietola da zucchero e da foraggio: in presenza di Cirsium arvense e altre infestanti: 0,8 - 1 l/ha. Con Matricaria chamomilla la dose va aumentata a 1,2 - 1,5 l/ha.
Frumento, Orzo, Avena, Segale: 0,8 - 1 l/ha tra la fase di accestimento e la fase di botticella.
Mais (da granella e da foraggio): 0,8 - 1 l/ha da applicare alla coltura alta 15 - 30 cm.
Orticole (cavoli, rapa, cipolla, bietola da orto): 1,2 - 1,5 l/ha applicando il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti.
Colza: 1,2 - 1,5 l/ha applicando il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': E' compatibile con Fenmedifam e con erbicidi fenossiacetici (2,4D; MCPA; Mecoprop; Diclorprop) sotto forma di sali. In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
ATTENZIONE: Il formulato contiene una sostanza attiva tossica per gli organismi acquatici. Impedire l'accesso di animali domestici alle aree trattate per almeno una settimana.
FITOTOSSICITA': Il prodotto è fitotossico per le colture dicotiledoni non indicate in etichetta. Non seminare soia sul terreno sodo dopo il cereale trattato.

Per il mais sospendere il trattamento 45 giorni prima del raccolto.

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta / Foglio illustrativo:

ARIEL DF

FUNGICIDA SISTEMICO IN FORMULAZIONE GRANULARE IDRODISPERSIBILE

ARIEL DF- Fungicida
COMPOSIZIONE:
Fosetil alluminio puro g 80
Coformulanti e inerti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per inalazione. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

ERREGI S.r.l. – C.so M. D'Azeglio, 112 - TORINO
Stabilimento di produzione: PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours – LA CHAMBRE (Francia)
SIPCAM S.p.a. – Saleranno sul Lambro (LO)
Registrazione Ministero della Sanità n. 10336 del 28.02.2000
Contenuto netto g 50-100-150-200-250-500; Kg 1-2- 5-10–15-20 Partita n°
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
CARATTERISTICHE: il prodotto è un fungicida sistemico, attivo nei confronti dei ficomiceti, in particolare contro le peronosporacee. Il principio attivo Fosetil alluminio è caratterizzato da una grande mobilità nelle piante. La sistemicità si manifesta sia in modo ascendente che discendente. Tale attività è tanto più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita. La mobilità del principio attivo permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega in trattamenti preventivi per la difesa di:
Vite: contro Peronospora (Plasmopara viticola): 250 g/hl di acqua. Si consiglia sempre l'associazione con formulati di copertura (rame escluso). Intervenire preventivamente ogni 10-14 giorni.
Agrumi (arancio, limone, mandarino, pompelmo): contro gommosi parassitaria (Phytophtora spp.), effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl di acqua utilizzando dieci litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione vanno effettuati in primavera e in autunno. E' possibile integrare i trattamenti fogliari con pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche). Questa pratica diventa indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida.
Vivai di agrumi: impiegare alla dose di 400 g/hl ad intervalli di due mesi.
Melo e Pero: contro Ticchiolatura (Venturia inaequalis), trattamenti preventivi a 150 - 250 g/hl di acqua; particolarmente nelle fasi pre-fiorali e immediatamente successive all'allegagione si consiglia l'associazione con fungicidi di copertura (rame escluso) o con dodina.
Pero: contro Maculatura bruna (Stemphyllium sp.), Colpo di fuoco (Erwinia amylovora), trattamenti preventivi a 250 g/hl di acqua. Contro maculatura bruna ridurre la dose di impiego a 150 g/hl nel caso di associazione con prodotti di copertura.
Melo, Pero, Pesco, Actinidia: contro Marciumi radicali (Phytphtora spp.): effettuare trattamenti alla vegetazione, a cadenza mensile, dalla sfioritura fino al periodo di carenza previsto per le singole colture impiegando 250 g/hl d'acqua. Su piante già debilitate dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida effettuare un'annaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino al periodo di carenza previsto per le singole colture utilizzando 1 -2 litri di poltiglia per pianta alla concentrazione di 5 Kg di prodotto per hl di acqua.
Vivai di fruttiferi: effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl di acqua ogni 30 giorni.
Fragola: contro Peronospora (Phytophtora cactorum e fragariae): l'immersione, per 15 minuti, delle piante prima del trapianto in una poltiglia contenente 250 g/hl di prodotto, seguita da 2-3 irrorazioni fogliari alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immergere le piante prima del trapianto in una poltiglia di 250 g/hl d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di 0,5 g di formulato per pianta.
Carciofo, Spinacio: contro Peronospora (Bremia lactucae) effettuare trattamenti preventivi a seconda delle necessità, alla dose di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire almeno 3 kg/ha di prodotto).
Lattuga: contro Peronospora (Bremia lactucae), effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl d'acqua (avendo cura di distribuire almeno 3 kg di prodotto per ettaro). Su lattuga romana effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici la lattuga può essere sensibile al prodotto. Intervenire fin dalle prime fasi vegetative ripetendo i trattamenti ogni 10-14 giorni.
Melone, Cocomero, Cetriolo: contro Peronospora (Pseudoperonospora cubensis) iniziare i trattamenti fin dalle prime bagnature infettanti e ripeterli ogni 8 - 10 giorni alla dose di 200 - 300 g/hl (avendo cura di distribuire almeno 3 kg di prodotto per ettaro).

Colture ornamentali: in pieno campo ed in serra, contro Marciume radicale (Phytophtora cinnamoni) di conifere, di Rododendro ed altre ericacee, Poinsettia, St. Paulia, Crisantemo e altre ornamentali, effettuare un'innaffiatura alla base delle piante con 5 - 10 g di formulato per mq. una volta al mese nel periodo primaverile. Contro Ficomiceti (Phytophtora, Plasmopara, Bremia) che possono attaccare le colture ornamentali impiegare 200 - 300 g/hl fin dalle prime fasi vegetative ripetendo i trattamenti ogni 10 - 14 giorni.
Tappeti erbosi di graminacee: contro i deperimenti dovuti a Pythium (Pythium aphanidermatum, Pythium myriotylum, Pythium arrhenomanes, Pythium vanterpoolli, Pythium graminicola, Pythium periilum): 24 Kg/ha in 500/1000 litri di acqua. Effettuare i trattamenti quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia e ripetere dopo 14 – 21 giorni.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Sciogliere la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione. Nel caso si debbano trattare colture con foglie lisce o cerose (es. agrumi e alcune ornamentali) si consiglia l'aggiunta di un bagnante non ionico per migliorarne l'adesività.

COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con formulati contenenti rame o a forte reazione acida o alcalina o con concimi fogliari contenenti azoto (nitrico o ammoniacale). Evitare miscelazioni con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta, In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela, preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.

AVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 15 giorni prima della raccolta su carciofo, cetriolo, cocomero, melone, lattuga, spinacio; 30 giorni su fragola; 40 giorni su melo, pero, pesco, vite, actinidia; 80 giorni su agrumi.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

AVVERTENZA: nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ARIEL DF

FUNGICIDA SISTEMICO IN FORMULAZIONE GRANULARE IDRODISPERSIBILE

COMPOSIZIONE:
Fosetil alluminio puro g 80
Coformulanti e inerti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per inalazione. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

IRRITANTE

ERREGI S.r.l. – C.so M. D'Azeglio, 112 - TORINO
Stabilimento di produzione: PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours – LA CHAMBRE (Francia)
SIPCAM S.p.a. – Saleranno sul Lambro (LO)
Registrazione Ministero della Sanità n. 10336 del 28.02.2000
Contenuto netto g 50-100 **Partita n°**

ATTENZIONE: prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta/foglio illustrativo

DICOTIL *Extra*

DISERBANTE SELETTIVO PER PRATI ORNAMENTALI, CAMPI DA GOLF, CAMPI SPORTIVI
- CONCENTRATO SOLUBILE -

DICOTIL Extra - Erbicida
COMPOSIZIONE:
Dicamba puro g 1,07 (=11,2 g/l)
(da sale dimetilamminico)
Mecoprop puro g 12,9 (=135,4 g/l)
(da sale dimetilamminico)
Clopiralid g 1,0 (= 10,5 g/l)
(da sale monoetanolamminico)
Coadiuvanti q.b.a g 100
FRASI DI RISCHIO:
Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il suo prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Titolare della registrazione: **ERREGI Srl – Cso M. d'Azeglio, 112 – TORINO**
Stabilimenti di produzione: DIACHEM SpA – U.p. SIFA – Caravaggio (BG)
PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours – La Chambre (Francia)
Distribuito da: ITAL-AGRO S.r.l. Via Juvarra 10 – Torino
Registrazione Ministero della Sanità n° 10.565 del 1.8.2000
Contenuto netto: ml 100 – 250 – 500; lt 1 - 2 - 5 - 10 - 20 **Partita n°**
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI:
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le isruzioni per l'uso.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Dicamba 1,07% - Mecoprop 12,9% - Clopiralid 1,0%
le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
DICAMBA: Sintomi: Irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia
MECOPROP: Sintomi: Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea, irritante oculare, miosi, Nausee, vomito, cefalea, ipertemia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG Muscoli: dolenzia, rigicità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. OSPEDALIZZARE.
CLOPIRALID - -
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

CARATTERISTICHE:
***DICOTIL Extra* è un diserbante ad azione rapida e completa contro le malerbe a foglia larga che infestano prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi.**
E' efficace contro le infestanti dicotiledoni a sviluppo annuale e perennante; controlla infatti:
Amaranto (Amaranthus r), Centocchio dei campi (Anagallis a), Borsa Pastore (Capsella b.p.), Farinello (Chenopodium a), Fumaria (Fumaria o), Papavero (Papaver r), Poligono Persicaria (Polygonum p), Poligono comune (Polygonum c), Centocchio (Stellaria), Veronica p, sia perenni come Convolvolo (Convolvolus a), Stoppione (Cirsium a).
DICOTIL Extra è particolarmente efficace nei confronti dei Trifogli (Trifolium spp), Camomilla (Matricaria spp), Camomilla dei tintori (Anthemis tinctoria) che si sviluppano spontaneamente nei tappeti erbosi. Il prodotto non è attivo nei confronti delle specie graminacee.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO:
Prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi
Al 1° anno di impianto: intervenire tra l'inizio dell'accestimento e l'inizio della levata con 5-7 l/ha (pari a 50-70 ml/100 mq);
prati affrancati (dal 2° anno in poi) trattare prima del 1° sfalcio su infestanti poco sviluppate o durante tutto il periodo primaverile-estivo intervenendo qualche giorno dopo il taglio con 7-9 l/ha (pari a 70-90 ml/100 mq)
Il prodotto va impiegato con volumi di acqua di 300-500 litri/ha (pari a 3-5 litri/100 mq) e con temperature comprese tra 12 e 25° C. Evitare che la nube irrorante giunga a contatto con colture sensibili quali fruttiferi, orticole, ornamentali, ecc.

Da non applicare con mezzi aerei

AVVERTENZA: Il prodotto si impiega da solo.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non rientrare nelle aree trattate prima di 24 ore dal trattamento. Segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del prodotto.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DICOTIL *Extra*

DISERBANTE SELETTIVO PER PRATI ORNAMENTALI, CAMPI DA GOLF, CAMPI SPORTIVI
- CONCENTRATO SOLUBILE -

COMPOSIZIONE:
Dicamba puro g 1,07 (=11,2 g/l)
(da sale dimetilamminico)
Mecoprop puro g 12,9 (=135,4 g/l)
(da sale dimetilamminico)
Clopiralid g 1,0 (= 10,5 g/l)
(da sale monoetanolamminico)
Coadiuvanti q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il suo prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Titolare della registrazione: ERREGI Srl – Cso M. d'Azeglio, 112 – TORINO
Stabilimenti di produzione: DIACHEM SpA – U.p. SIFA – Caravaggio (BG)
PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours – La Chambre (Francia)
Distribuito da: ITAL-AGRO S.r.l. Via Juvarra 10 – Torino
Registrazione Ministero della Sanità n° 10.565 del 1.8.2000
Contenuto netto: ml 100 **Partita n°**
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ATTENZIONE: prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta/Foglio illustrativo

ARBOKILL

ERBICIDA NON SELETTIVO AD AZIONE SISTEMICA

ARBOKILL - Erbicida liquido
COMPOSIZIONE:
Picloram puro . . . . g 11 (= 120 g/l)
Coadiuvanti . . . . q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle .
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano Da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico E mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

IRRITANTE

ERREGI S.r.l. – C.so Massimo D'Azeglio, 112 – 10126 TORINO
Stabilimenti di produzione: PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours LA CHAMBRE (Francia)
IRCA Service SpA – S.S.Cremasca 591, 10 FORNOVO S.GIOVANNI (BG)
Registrazione Ministero della Sanità n. 10.621 del 6.11.2000
Contenuto netto ml 100-250-500; lt 1-5-10-20 **Partita n.**
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Per evitare i rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: Irritante cutaneo ed oculare; nausea, alterazione del SNC. Nell'animale da esperimento danno epatico e leucopenia. Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE: ARBOKILL è un erbicida ad azione sistemica indicato per l'eliminazione della vegetazione arbustiva e legnosa in ge-nere infestante prati, pascoli, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree industriali e rurali in genere, nonché per le opere di de-cespugliamento.
ARBOKILL agisce per via fogliare e radicale contro • Dicotiledoni annuali quali Carduus spp., Cisto (Cistus spp.), Ferula (Ferula spp.), Poligo-no (Polygonum spp.) e • Dicotiledoni perenni quali Astragalo (Astragalus spp.), Erica (Erica spp.), Frassino comune (Fraxinus excelsior), Ginepro comune (Juniperus communis), Lentisco (Pistacia lentiscus), Olmo (Ulmus spp.), Pioppo (Popolus spp.), Quercia (Quercus spp.), Robinia (Robinia spp.), Rododendro (Rhododendron spp.), Romice (Rumex spp.), Rovo (Rubus spp.), Stoppione (Cirsium arvense), Vi-lucchio comune (Convolvulus arvensis); • Felce aquilina (Pteridium aquilium).
MODALITÀ D'IMPIEGO: Effettuare i trattamenti su piante ben sviluppate ed in piena attività vegetativa.
DISERBO TOTALE DI TERRENI INCOLTI
• su tutta la superficie . . . . lt 20-25/ha
Impiegando almeno 1000 litri di acqua.
• per trattamenti localizzati . . . . lt 2-3/hl di acqua
Utilizzando una quantità di acqua sufficiente a bagnare bene le piante ed il terreno circostante.
TRATTAMENTI LOCALIZZATI su infestanti arbustive, cespugliose e legnose . . . . lt 2-3/hl di acqua
Irrorare le piante fino a sgocciolamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il prodotto può essere miscelato con altri erbicidi fenossi-derivati per aumentarne lo spettro di azione.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: Il prodotto è altamente fitotossico per vite, pioppo, frutteti, colture arboree ed erbacee in genere. È pertanto necessario effettuare i trattamenti con accortezza, in giornate prive di vento e secondo i consigli prescritti onde evitare che il prodotto giunga a contatto con le colture sensibili.

DIVIETO DI IMPIANTARE EVENTUALI NUOVE COLTURE SU TERRENI TRATTATI PRIMA CHE SIA TRASCORSO 1 ANNO

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ARBOKILL

ERBICIDA NON SELETTIVO AD AZIONE SISTEMICA

COMPOSIZIONE:
Picloram puro . . . . g 11 (= 120 g/l)
Coadiuvanti . . . . q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano Da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitareil contatto con la pelle. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

IRRITANTE

ERREGI S.r.l. – C.so Massimo D'Azeglio, 112 – 10126 TORINO
Stabilimenti di produzione: PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours LA CHAMBRE (Francia)
IRCA Service SpA – S.S.Cremasca 591, 10 FORNOVO S. GIOVANNI (BG)
Registrazione Ministero della Sanità n. 10.621 del 6.11.2000
Contenuto netto ml 100 **Partita n.**
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ATTENZIONE: PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta / Foglio illustrativo:

SERIT DF

FUNGICIDA SISTEMICO IN FORMULAZIONE GRANULARE IDRODISPERSIBILE

SERIT DF- Fungicida
COMPOSIZIONE:

Fosetil alluminio puro		g 80
Coformulanti e inerti	q.b. a	g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per inalazione. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

ERREGI S.r.l. – C.so M. D'Azeglio, 112 - TORINO
Stabilimento di produzione: PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours – LA CHAMBRE (Francia)
Registrazione Ministero della Sanità n. 10775 del 23.03.2001
Contenuto netto g 10-25-50-100-150-200-250-500-750; Kg 1-5-10-20 **Partita n°**
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
CARATTERISTICHE: SERIT DF è un fungicida sistemico, attivo nei confronti dei ficomiceti, in particolare contro le peronosporacee. Il principio attivo Fosetil alluminio è caratterizzato da una grande mobilità nelle piante. La sistemicità si manifesta sia in modo ascendente che discendente. Tale attività è tanto più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita. La mobilità del principio attivo permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega in trattamenti preventivi per la difesa di:
Vite: contro Peronospora (Plasmopara viticola): 250 g/hl di acqua. Si consiglia sempre l'associazione con formulati di copertura (rame escluso). Intervenire preventivamente ogni 10-14 giorni.
Agrumi (arancio, limone, mandarino, pompelmo): contro gommosi parassitaria (Phytophtora spp.), effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl di acqua utilizzando dieci litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione vanno effettuati in primavera e in autunno. E' possibile integrare i trattamenti fogliari con pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche). Questa pratica diventa indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida.
Vivai di agrumi: impiegare alla dose di 400 g/hl ad intervalli di due mesi.
Melo e Pero: contro Ticchiolatura (Venturia inaequalis), trattamenti preventivi a 150 - 250 g/hl di acqua; particolarmente nelle fasi pre-fiorali e immediatamente successive all'allegagione si consiglia l'associazione con fungicidi di copertura (rame escluso) o con dodina.
Pero: contro Maculatura bruna (Stemphyllium sp.), Colpo di fuoco (Erwinia amylovora), trattamenti preventivi a 250 g/hl di acqua. Contro maculatura bruna ridurre la dose di impiego a 150 g/hl nel caso di associazione con prodotti di copertura.
Melo, Pero, Pesco, Actinidia: contro Marciumi radicali (Phytphtora spp.): effettuare trattamenti alla vegetazione, a cadenza mensile, dalla sfioritura fino al periodo di carenza previsto per le singole colture impiegando 250 g/hl d'acqua. Su piante già debilitate dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida effettuare un'annaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino al periodo di carenza previsto per le singole colture utilizzando 1 -2 litri di poltiglia per pianta alla concentrazione di 5 Kg di prodotto per hl di acqua.
Vivai di fruttiferi: effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl di acqua ogni 30 giorni.
Fragola: contro Peronospora (Phytophtora cactorum e fragariae): l'immersione, per 15 minuti, delle piante prima del trapianto in una poltiglia contenente 250 g/hl di prodotto, seguita da 2-3 irrorazioni fogliari alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immergere le piante prima del trapianto in una poltiglia di 250 g/hl d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di 0,5 g di formulato per pianta.
Carciofo, Spinacio: contro Peronospora (Bremia lactucae) effettuare trattamenti preventivi a seconda delle necessità, alla dose di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire almeno 3 kg/ha di prodotto).
Lattuga: contro Peronospora (Bremia lactucae), effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl d'acqua (avendo cura di distribuire almeno 3 kg di prodotto per ettaro). Su lattuga romana effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici la lattuga può essere sensibile al prodotto. Intervenire fin dalle prime fasi vegetative ripetendo i trattamenti ogni 10-14 giorni.
Melone, Cocomero, Cetriolo: contro Peronospora (Pseudoperonospora cubensis) iniziare i trattamenti fin dalle prime bagnature infettanti e ripeterli ogni 8 - 10 giorni alla dose di 200 - 300 g/hl (avendo cura di distribuire almeno 3 kg di prodotto per ettaro).

Colture ornamentali: in pieno campo ed in serra, contro Marciume radicale (Phytophtora cinnamoni) di conifere, di Rododendro ed altre ericacee, Poinsettia, St. Paulia, Crisantemo e altre ornamentali, effettuare un'innaffiatura alla base delle piante con 5 - 10 g di formulato per mq. una volta al mese nel periodo primaverile. Contro Ficomiceti (Phytophtora, Plasmopara, Bremia) che possono attaccare le colture ornamentali impiegare 200 - 300 g/hl fin dalle prime fasi vegetative ripetendo i trattamenti ogni 10 - 14 giorni.
Tappeti erbosi di graminacee: contro i deperimenti dovuti a Pythium (Pythium aphanidermatum, Pythium myriotylum, Pythium arrhenomanes, Pythium vanterpoolli, Pythium graminicola, Pythium periilum): 24 Kg/ha in 500/1000 litri di acqua. Effettuare i trattamenti quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia e ripetere dopo 14 – 21 giorni.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Sciogliere la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione. Nel caso si debbano trattare colture con foglie lisce o cerose (es. agrumi e alcune ornamentali) si consiglia l'aggiunta di un bagnante non ionico per migliorarne l'adesività.

COMPATIBILITA': SERIT DF non è compatibile con formulati contenenti rame o a forte reazione acida o alcalina o con concimi fogliari contenenti azoto (nitrico o ammoniacale). Evitare miscelazioni con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta, In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela, preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.

AVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 15 giorni prima della raccolta su carciofo, cetriolo, cocomero, melone, lattuga, spinacio; 30 giorni su fragola; 40 giorni su melo, pero, pesco, vite, actinidia; 80 giorni su agrumi.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

AVVERTENZA: nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SERIT DF

FUNGICIDA SISTEMICO IN FORMULAZIONE GRANULARE IDRODISPERSIBILE

COMPOSIZIONE:

Fosetil alluminio puro		g 80
Coformulanti e inerti	q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per inalazione. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

IRRITANTE

ERREGI S.r.l. – C.so M. D'Azeglio, 112 - TORINO
Stabilimento di produzione: PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours – LA CHAMBRE (Francia)
Registrazione Ministero della Sanità n. 10775 del 23.03.2001

Contenuto netto g 10-25-50-100 **Partita n°**

ATTENZIONE: prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta/ Foglio Illustrativo

BIOFLOR

INSETTICIDA LIQUIDO PER LA DIFESA DI FIORI E PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO, BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

BIOFLOR – Insetticida

Composizione

- Estratto di Piretro 25% (pari a gr 2 di Piretrine attive) . . . . gr 8 (= 18,4 g/l)
- Coformulanti: . . . . .q.b.a. gr 100

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

ERREGI S.r.l. C.so M.D'Azeglio, 112 - TORINO

Stabilimenti di produzione: PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours – LA CHAMBRE (Francia)
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
DIACHEM S.p.A. – U.p. SIFA – Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 11373/PPO del 18.06.2002

Contenuto netto: ml 2 -5-10 (5 x 2 ml) (2 x 5 ml) (1 x 10 ml) - 20-50-100 **Partita n°**

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI: Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Conservare nel recipiente originale. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertemia, sudorazione, edemi cutanei; collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione.

Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE E DOSI D'IMPIEGO: BIOFLOR è un insetticida di origine vegetale che agisce per contatto contro Aleurodidi, Afidi, Tingidi, Tripidi, Tentredini, Cicaline, Cimici, Metcalfa, Microlepidotteri defogliatori, che colpiscono i fiori e le piante ornamentali da appartamento, balcone e giardino domestico. Utilizzando l'apposito dosatore, diluire 1,4 –1,6 ml di prodotto per litro d'acqua intervenendo all'inizio della infestazione, bagnando accuratamente anche la pagina inferiore della foglie. Ripetere i trattamenti dopo 7-15 giorni in caso di forte attacco.

PERIODO DI IMPIEGO:

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Preparazione: per preparare la miscela occorre versare la dose stabilita di prodotto nel quantitativo di acqua previsto, mescolando accuratamente la soluzione acquosa ottenuta.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

Compatibilità: Si consiglia di impiegare il prodotto da solo.
Nocività: Il prodotto è nocivo per gli insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.

DA NON IMPIEGARE IN AGRICOLTURA E SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

BIOFLOR

INSETTICIDA LIQUIDO PER LA DIFESA DI FIORI E PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO, BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

Composizione
- Estratto di Piretro 25% (pari a gr 2 di Piretrine attive) . . . . gr 8 (= 18,4 g/l)
- Coformulanti: . . . . .q.b.a. gr 100

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

ERREGI S.r.l. C.so M. D'Azeglio, 112 - TORINO

Stabilimenti di produzione: PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours – LA CHAMBRE (Francia)
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
DIACHEM S.p.A. U.p. SIFA Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 11373/PPO del 18.06.2002

Contenuto netto: ml 2 -5-10 (5 x 2 ml) (2 x 5 ml) (1 x 10 ml) - 20-50-100 **Partita n°**

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

ATTENZIONE: PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta/Foglio illustrativo

TOLCLO

FUNGICIDA A LUNGA PERSISTENZA PER IL CONTROLLO DELLE CRITTOGAME PRESENTI NEL TERRENO
POLVERE BAGNABILE

TOLCLO – fungicida
COMPOSIZIONE:
Tolclofos metile g 50
Coformulanti: q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

ERREGI S.r.l. – C.so M. D'Azeglio, 112 - TORINO
Stabilimento di produzione: PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours – LA CHAMBRE (Francia)
Registrazione Ministero della Salute n° 11476 del 22/10/2002
Peso netto: g 10-20-50-100-250-500; kg 1-2-5-10-20 **Partita n°**
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Norme precauzionali: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Informazioni per il medico: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE: TOLCLO è un fungicida che agisce per contatto nei confronti delle crittogame presenti nel terreno e di quelle che possono colpire la parte aerea delle colture orticole, floricole, ornamentali, campi da golf nonché barbabietola da zucchero e frumento.
Dosi e modalità d'impiego: Il prodotto può essere impiegato in pre-semina, pre e post-emergenza.
POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, FAGIOLO, FAGIOLINO, COCOMERO, ZUCCHINO, CAROTA, CAVOLI: contro Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum, Corticium rolfsii, Alternaria solani, Leptosphaeria spp., Botritys sp.: 2-4 g/mq per applicazioni al terreno; 1-2 kg/ha per trattamenti fogliari.
LATTUGA, RADICCHIO: contro Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani : 2-4 g/mq per applicazioni al terreno. Aumentare la dose fino a 5-8 g/mq per cultivars molto sensibili a tali patogeni. 1-2 kg/ha per applicazioni fogliari, effettuando 2-3 applicazioni a 15-20 giorni di intervallo.
PATATA: contro Rhizoctonia solani: 200-300 g/hl per immersione o trattamento dei tuberi destinati alla semina; 10-20 kg/ha per applicazioni al terreno oppure 80-120 g per metro lineare per trattamento locale nei solchi.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Corticium rolfsii: 1-2 kg/ha per trattamenti al terreno; contro Rhizoctonia: g 80 per 100 kg di seme per la concia.
FRUMENTO: contro Rhizoctonia : 1-2 kg/ha per trattamenti fogliari.
BASILICO: contro Rhizoctonia : 0,5-1 g/mq per trattamenti al terreno.
CONCIA SEMI o TUBERI delle colture soprariportate: 80-100 g per 100 kg di seme; 1-2 g per kg di tuberi.
DISINFEZIONE TERRICCIO della colture colture previste: 200-250 g/mc.
FLOREALI e ORNAMENTALI: contro Rhizoctonia solani: 3-5 g/mq per trattamenti al terreno anche a mezzo irrorazione acquosa alla base della pianta.
CONCIA a secco di TUBERI, RIZOMI DI FLOREALI: 1 g per kg di materiale; per la concia ad umido: 200g/hl: preparare la sospensione ed immergervi il materiale per 10 minuti.
CAMPI DA GOLF : contro Rhizoctonia solani: 2-4 g/mq; *Avvertenza: segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione.*

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto non è compatibile con i fungicidi a reazione alcalina.
Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Nella concia delle sementi indicate i semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili, devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti speciali pericolosi.
Fitotossicità: Su cultivar poco diffuse effettuare prove preventive parcellari.
Sospendere il trattamento 15 giorni prima del raccolto per cavoli, 30 giorni per barbabietola da zucchero,fagioli, fagiolini, peperoni, pomodori, melanzana, lattuga, radicchio; 45 giorni per zucchino; 60 giorni per cocomero.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

TOLCLO

FUNGICIDA A LUNGA PERSISTENZA PER IL CONTROLLO DELLE CRITTOGAME PRESENTI NEL TERRENO
POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE:
Tolclofos metile g 50
Coformulanti: q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

ERREGI S.r.l. – C.so M. D'Azeglio, 112 - TORINO
Stabilimento di produzione: PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours – LA CHAMBRE (Francia)
Registrazione Ministero della Salute n° 11476 del 22/10/2002

Peso netto: g 10-20-50-100 Partita n°

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ATTENZIONE: PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

EUROAGRO S.r.l.

ETICHETTA FOGLIO ILLUSTRATIVO

CIOPPER

CONCENTRATO SOLUBILE

INSETTICIDA - ACARICIDA PER PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRARIE, ORNAMENTALI E FLOREALI, DI PIENO CAMPO, DI SERRA

Reg. n. 11013 del 25/09/2001 del Ministero della Salute

COMPOSIZIONE
Sostanza attiva:
- **Sali potassici di acidi grassi (C14-C18)** **g. 49 (455 g/l)**
  di cui oleato: 73%
  sali di potassio di altri acidi grassi: 27%
- **Coformulanti** q.b.a **g.100**

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

EUROAGRO Srl
Via Lazzaretti 5/A - 42100 Reggio Emilia
Distribuito da:
TECNITERRA Srl - Via Bronzino, 19 - 20133 Milano

Stabilimento di produzione:
ALTHALLER ITALIA Srl
San Colombano al Lambro (MI)
L. 0,05-0,1-0,15-0,2-0,5-1-2,5-4-5-10-20
Partita n.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di contatto con gli occhi, lavare con molta acqua. In caso di ingestione, bere molto latte. Il trattamento medico è sintomatico.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE GENERALI
Ciopper è un prodotto a base di sostanze di origine vegetale ed animale che, per le loro proprietà, si rivelano attivi per combattere i parassiti a corpo molle delle piante quali Afidi, Aleurodidi, Acari, Psille, Cicaline e neanidi di Cocciniglie. Ciopper agisce esclusivamente per contatto e, limitatamente sui parassiti colpiti, provoca la disgregazione delle pareti cellulari e quindi la loro morte. Ciopper è particolarmente indicato per la difesa integrata e biologica delle colture, sia per combattere le specie parassite resistenti, e favorire l'insediamento dei predatori naturali, sia per sinergizzare l'attività delle sostanze attive raccomandate, quando sono impiegate a dosi ridotte in agricoltura. Ciopper non possiede attività residuale. Ciopper è prontamente biodegradato e non persiste nell'ambiente.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Intervenire sulle colonie fondatrici, al primo apparire dei parassiti, cercando di ben colpire le forme giovanili (neanidi, ninfe) specialmente se queste sono localizzate sulla pagina inferiore delle foglie.
Ciopper si usa diluito in 1000-1500 litri d'acqua, impiegando attrezzature che assicurano la completa bagnatura dei parassiti. Diluire la quantità prestabilita di Ciopper in un secchio d'acqua. Dopo breve miscelazione versare il tutto nella botte riempita per tre quarti con acqua, quindi sciacquare il secchio con nuova acqua e versare nella botte. Riempire la botte con acqua. Considerato che il prodotto si disperde facilmente nell'acqua e non richiede forte agitazione, evitare l'impiego continuo dell'agitatore che provoca la formazione di schiuma. Ciopper non possiede attività biologica residua perciò può risultare necessario ripetere, con un intervallo di 7 giorni, altri interventi per controllare eventuali re-infestazioni.

DOSI D'IMPIEGO
Impiegare litri 1,5-2 di Ciopper per ogni 100 litri d'acqua, e ciò in relazione alla specie ed all'importanza dell'attacco del parassita. Se Ciopper viene usato in miscela con altre sostanze attive, esso va impiegato con una dose minore, pari a litri 1 per 100 litri di acqua. Il volume della miscela necessaria può variare in funzione della dimensione delle piante, della densità della vegetazione da proteggere e del livello di bagnatura richiesto per combattere il parassita.

CAMPO D'IMPIEGO
POMACEE (MELO, PERO): su Afidi, Psilla del pero
PESCO: su Afidi
VITE: su Cicaline
SOLANACEE (POMODORO, PEPERONE, MELANZANA): su Afidi, Aleurodidi, Acari
CUCURBITACEE (MELONE, CETRIOLO): su Afidi, Aleurodidi.
ERBE AROMATICHE (BASILICO, SALVIA, MAGGIORANA, ROSMARINO, MENTA e TIMO): su Afidi, Aleurodidi, Acari.
ORNAMENTALI (GERBERA, POINSETTIA): su Afidi, Aleurodidi, Cicaline.
Avvertenza: Per la preparazione della miscela non impiegare acque dure contenenti ione metallo (calcio, magnesio, ferro, ecc.) in quantità superiore a 300 ppm.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con varie sostanze attive quali Clorpirifos, Dicofol, Endosulfan, Piretroidi, Pirimicarb. Impiegare la miscela subito dopo la preparazione. Non miscelare Ciopper con prodotti contenenti ioni metallo (Ca, Fe, Zn, Mg, ecc.), con concimi fogliari, con sostanze chelanti, con Clorotalonil e Fosetil Al.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Vari fattori possono influire sulla selettività, quali il vigore vegetativo, la temperatura dell'aria, l'intensità luminosa, il pH, i componenti delle miscele, ecc. Ciopper va impiegato con cautela quando si è in presenza di nuove varietà non ancora saggiate. In serra e quando la miscela asciuga lentamente, il prodotto può risultare più aggressivo. Porre attenzione al comportamento della coltura quando: le piante sono sotto stress, quando sono realizzati più di 3 trattamenti con frequenza settimanale e se il pH della miscela risulta inferiore a 8. Alcune varietà di Cetriolo, Poinsettia, Schefflera, Gardenia, Azalea, si sono rivelate sensibili specie sul fiore.

EFFETTI SU ORGANISMI NON BERSAGLIO: Tutte le specie con dermascheletro duro (es. coleotteri) non risultano suscettibili. Gli insetti impollinatori e quelli utili non sono danneggiati se non vengono colpiti direttamente. Se Ciopper è impiegato nella lotta biologica, il lancio degli insetti utili va realizzato subito dopo che la vegetazione trattata si è asciugata.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per MELO, PERO, PESCO, VITE, CETRIOLO, MELONE, POMODORO, PEPERONE, MELANZANA.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva tossica per le api. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego. Non utilizzare in fioritura.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

CIOPPER Marchio depositato della EUROAGRO srl - Reggio Emilia

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CIOPPER

CONCENTRATO SOLUBILE

INSETTICIDA - ACARICIDA PER PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRARIE, ORNAMENTALI E FLOREALI, DI PIENO CAMPO, DI SERRA

Reg. n. 11013 del 25/09/2001 del Ministero della Salute

COMPOSIZIONE:	ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA
Sostanza attiva: - **Sali potassici di acidi grassi (C14-C18) g. 49 (455 g/l)** **di cui oleato: 73%** **sali di potassio di altri acidi grassi: 27%** - **Coformulanti q.b.a g.100**	

EUROAGRO Srl
Via Lazzaretti 5/A - 42100 Reggio Emilia

Distributo da:
TECNITERRA Srl - Via Bronzino, 19 - 20133 Milano

Stabilimento di produzione:
ALTHALLER ITALIA Srl
San Colombano al Lambro (MI)

ml 50-100 Partita n.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
In caso di contatto con gli occhi, lavare con molta acqua. In caso di ingestione, bere molto latte. Il trattamento medico è sintomatico.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

CIOPPER Marchio depositato della EUROAGRO srl - Reggio Emilia

ETICHETTA FOGLIO ILLUSTRATIVO

FLIPPER

CONCENTRATO SOLUBILE

INSETTICIDA - ACARICIDA PER PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRARIE, ORNAMENTALI E FLOREALI, DI PIENO CAMPO, DI SERRA

Reg. n. 10890 del 20/04/2001 del Ministero della Sanità

COMPOSIZIONE:
Sostanza attiva:
- **Sali potassici di acidi grassi (C14-C18)** **g. 49 (455 g/l)**
  di cui oleato: 73%
  sali di potassio di altri acidi grassi: 27%
- **Coformulanti** q.b.a g.100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

EUROAGRO Srl
Via Lazzaretti 5/A - 42100 Reggio Emilia

Stabilimento di produzione:
ALTHALLER ITALIA Srl
San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da:
GUABER SpA - Via P. Gobetti, 4 - 40050 Funo (BO)
SIPCAM SpA - Via Carroccio, 8 - 20123 Milano
AGROQUALITÀ Srl - Via Sempione, 195 - 20016 Pero (MI)

L. 0,05-0,1-0,15-0,2-0,5-1-2,5-4-5-10-20

Partita n.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di contatto con gli occhi, lavare con molta acqua. In caso di ingestione, bere molto latte. Il trattamento medico è sintomatico.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE GENERALI
Flipper è un prodotto a base di sostanze di origine vegetale ed animale che, per le loro proprietà, si rivelano attivi per combattere i parassiti a corpo molle delle piante quali Afidi, Aleurodidi, Acari, Psille, Cicaline e neanidi di Coccinigile. Flipper agisce esclusivamente per contatto e, limitatamente sui parassiti colpiti, provoca la disgregazione delle pareti cellulari e quindi la loro morte. Flipper è particolarmente indicato per la difesa integrata e biologica delle colture, sia per combattere le specie parassite resistenti, e favorire l'insediamento dei predatori naturali, sia per sinergizzare l'attività delle sostanze attive raccomandate, quando sono impiegate a dosi ridotte in agricoltura. Flipper non possiede attività residuale. Flipper è prontamente biodegradato e non persiste nell'ambiente.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Intervenire sulle colonie fondatrici, al primo apparire del parassiti, cercando di ben colpire le forme giovanili (neanidi, ninfe) specialmente se queste sono localizzate sulla pagina inferiore delle foglie.
Flipper si usa diluito in 1000-1500 litri d'acqua, impiegando attrezzature che assicurano la completa bagnatura dei parassiti. Diluire la quantità prestabilita di Flipper in un secchio d'acqua. Dopo breve miscelazione versare il tutto nella botte riempita per tre quarti con acqua, quindi sciacquare il secchio con nuova acqua e versare nella botte. Riempire la botte con acqua. Considerato che il prodotto si disperde facilmente nell'acqua e non richiede forte agitazione, evitare l'impiego continuo dell'agitatore che provoca la formazione di schiuma. Flipper non possiede attività biologica residua perciò può risultare necessario ripetere, con un intervallo di 7 giorni, altri interventi per controllare eventuali re-infestazioni.

DOSI D'IMPIEGO
Impiegare litri 1,5-2 di Flipper per ogni 100 litri d'acqua, e ciò in relazione alla specie ed all'importanza dell'attacco del parassita. Se Flipper viene usato in miscela con altre sostanze attive, esso va impiegato con una dose minore, pari a litri 1 per 100 litri di acqua. Il volume della miscela necessaria può variare in funzione della dimensione delle piante, della densità della vegetazione da proteggere e del livello di bagnatura richiesto per combattere il parassita.

CAMPO D'IMPIEGO
POMACEE (MELO, PERO): su Afidi, Psilla del pero
PESCO: su Afidi
VITE: su Cicaline
SOLANACEE (POMODORO, PEPERONE, MELANZANA): su Afidi, Aleurodidi, Acari
CUCURBITACEE (MELONE, CETRIOLO): su Afidi, Aleurodidi.
ERBE AROMATICHE (BASILICO, SALVIA, MAGGIORANA, ROSMARINO, MENTA e TIMO): su Afidi, Aleurodidi, Acari.
ORNAMENTALI (GERBERA, POINSETTIA): su Afidi, Aleurodidi, Cicaline.
Avvertenza: Per la preparazione della miscela non impiegare acque dure contenenti ione metallo (calcio, magnesio, ferro, ecc.) in quantità superiore a 300 ppm.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con varie sostanze attive quali Clorpirifos, Dicofol, Endosulfan, Piretroidi, Pirimicarb. Impiegare la miscela subito dopo la preparazione. Non miscelare Flipper con prodotti contenenti ioni metallo (Ca, Fe, Zn, Mg, ecc.), con concimi fogliari, con sostanze chelanti, con Clorotalonil e Fosetil Al.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Vari fattori possono influire sulla selettività, quali il vigore vegetativo, la temperatura dell'aria, l'intensità luminosa, il pH, i componenti delle miscele, ecc. Flipper va impiegato con cautela quando si è in presenza di nuove varietà non ancora saggiate. In serra e quando la miscela asciuga lentamente, il prodotto può risultare più aggressivo. Porre attenzione al comportamento della coltura quando: le piante sono sotto stress, quando sono realizzati più di 3 trattamenti con frequenza settimanale e se il pH della miscela risulta inferiore a 8. Alcune varietà di Cetriolo, Poinsettia, Schefflera, Gardenia, Azalea, si sono rivelate sensibili specie sul fiore.

EFFETTI SU ORGANISMI NON BERSAGLIO: Tutte le specie con dermascheletro duro (es. coleotteri) non risultano suscettibili. Gli insetti impollinatori e quelli utili non sono danneggiati se non vengono colpiti direttamente. Se Flipper è impiegato nella lotta biologica, il lancio degli insetti utili va realizzato subito dopo che la vegetazione trattata si è asciugata.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per MELO, PERO, PESCO, VITE, CETRIOLO, MELONE, POMODORO, PEPERONE, MELANZANA.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva tossica per le api. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego. Non utilizzare in fioritura.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Flipper Marchio depositato della EUROAGRO srl - Reggio Emilia

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

FLIPPER

CONCENTRATO SOLUBILE

INSETTICIDA - ACARICIDA PER PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRARIE, ORNAMENTALI E FLOREALI, DI PIENO CAMPO, DI SERRA

Reg. n. 10890 del 20/04/2001 del Ministero della Sanità

COMPOSIZIONE:
Sostanza attiva:
- **Sali potassici di acidi grassi (C14-C18) g. 49 (455 g/l)**
  di cui oleato: 73%
  sali di potassio di altri acidi grassi: 27%
- **Coformulanti q.b.a g.100**

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

EUROAGRO Srl
Via Lazzaretti 5/A - 42100 Reggio Emilia

Distribuito da:
GUABER SpA - Via P. Gobetti, 4 - 40050 Funo (BO)
SIPCAM SpA - Via Carroccio, 8 - 20123 Milano
AGROQUALITÀ Srl - Via Sempione, 195 - 20016 Pero (MI)

Stabilimento di produzione:
ALTHALLER ITALIA Srl
San Colombano al Lambro (MI)

ml 50-100 Partita n.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di contatto con gli occhi, lavare con molta acqua. In caso di ingestione, bere molto latte. Il trattamento medico è sintomatico.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

FLIPPER Marchio depositato della EUROAGRO srl - Reggio Emilia

06A05238

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G604004/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.